©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at

Dichotomische Übersicht über die rotgefleckten Hister-Arten aus der VII. Schmidt'schen Gruppe*).

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

1″ Enddorn der Vorderschienen gerade oder schwach gebogen. Flügeldecken mit drei Dorsalstreifen.

2″ Der zweite Dorsalstreifen vom Seitenrande der Flügeldecken mit dem ersten und dritten parallel verlaufend oder hinter der Mitte nur sehr wenig dem ersten mehr genähert. Die gemeinschaftliche schwarze Diskoidalfärbung an der Basis allmählich verbreitert.

3″ Der äussere Seitenstreifen des Halsschildes ist vollständig. Flügeldecken mit einer roten Schultermakel, welche mit einem roten Diskalflecken schräg verbunden oder getrennt ist. Vorderrand der Prosternumspitze ausgerandet.

Länge 6—8 *mm.*

In ganz Europa, Kaukasus, Transkaspien.

quadrinotatus Scriba.

3′ Der äussere Seitenstreifen (innerer Randstreifen) des Halsschildes ist hinter der Mitte unterbrochen. Flügeldecken rot, die Naht und Spitze sowie ein grosser, gemeinschaftlicher, dreieckiger Flecken an der Basis schwarz, der ganze Seitenrand mithin mit Ausnahme der Spitze rot; ein vorne stärker, hinten wenig verkürzter Nahtstreifen ist stets vorhanden, der meistens bei der vorigen Art fehlt oder nur angedeutet ist. Prosternalspitze undeutlich ausgerandet. Oberseite am Grunde, besonders der Halsschild mit deutlicher Mikroskulptur, diese eckig chagriniert*) und dazwischen punktiert. Die rote Färbung der Flügeldecken liesse sich aus jener des *quadrinotatus* ableiten. Die zwei schräg verbundenen roten Makeln sehr stark verbreitert und erweitert, sie reicht bis nahe zur Spitze und innen bis zum Nahtstreifen vor der Spitze.

Länge 7·5 bis 8·5 *mm.*

Amasia, Persien: Sultanabad; von Herrn E. v. Bodemeyer erhalten.

subalutaceus n. sp.

*) Siehe auch: Dichotomische Übersicht über die schwarzen Hister-Arten der VII. Schmidt'schen Gruppe in der Münchener Col. Zeitschr., III, 337.

*) Wie die Oberseite einer Menschenhand.

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at

2' Der zweite Dorsalstreifen am Seitenrande der Flügeldecken vor der Mitte nach hinten stark nach aussen geschwungen und hinter der Mitte dem ersten doppelt näher als dem inneren dritten. Die vorne gemeinschaftliche schwarze Makel zur Basis verschmälert. Der innere Randstreifen nach hinten stark verkürzt.

4'' Flügeldecken mit nierenförmiger roter Zeichnung, die Seitenränder bleiben mit Ausnahme der Schultern dunkel; Epipleuren schwarz.
Länge 5 bis 8 *mm*.
Im südlichen Europa, Syrien, Kaukasus, Turkestan.
sinuatus Illig.

4' Flügeldecken rot, Naht und Spitze schwarz, die dunkle Färbung der ersteren vor der Mitte etwas erweitert, daneben nach aussen mit einem kleinen, isolierten, schwarzen Flecken; Seitenrand und Epipleuren rot.
Länge 5 bis 8·5 *mm*.
Spanien, Algier, Marokko. *bipunctatus* Fabr.

1' Der grössere Enddorn der Vorderschienen geknickt, Flügeldecken mit vier Dorsalstreifen. Käfer kleiner.
Länge 4 bis 5 *mm*.
H. atticus Schmidt.
Südfrankreich, Griechenland, Kleinasien, Syrien.
limbatus Truqui.

Übersicht der kleinen Arten der Silphiden-Gattung Antroherpon, aus der nächsten Verwandtschaft des A. pygmaeum Apfelb. und Charon Reitt. aus den Grotten von Bosnien und der Herzegowina.*)

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

1'' Flügeldecken lang, abstehend behaart (Bosn.).
pygmaeum Apfelb.

1' Flügeldecken nur fein und kurz, fast anliegend behaart.

*) Eine Übersicht aller Arten ist enthalten in der Wien. Ent. Ztg. 1902, p. 206, und Münchener Col. Zeitsch. II (1904), p. 40.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Koleopterologische Rundschau

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: 2_1913

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: Dichotomische Übersicht über die rotgefleckten Hister-Arten aus der VII. SchmidtÂ'schen Gruppe. 169-170