

## Koleopterologische Rundschau, Band 52 (1975)

BESCHREIBUNG EINER NEUEN SUBSPECIES DES NEOPLECTES REITTERI RETOWSKI  
(CARABIDAE, COL.)

von Rudolf KENYERY, Wien

Manuskript eingelangt am 21.10.1975

*Neoplectes reitteri gaskoi* ssp.nov.

Anlässlich einer Sammelreise im August 1975 nach Ungarn konnte ich von einem ungarischen Sammelkollegen, der im Mai 1975 eine Sammelreise in den Kaukasus unternahm, dessen gesamte Carabenausbeute abtauschen. Dieser Sammelkollege, Herr Ing. Kalmar Gaskó in Veszprem, dem ich nochmals herzlich danke, gab mir eine kleinere Serie *Neoplectes*. Im September besuchte ich nochmals Ungarn und konnte von Ing. Imre Retezar vom selben Fundort eine weitere kleinere Serie *Neoplectes* eintauschen. Nach genauerer Betrachtung und Vergleich mit meiner *Neoplectes*-Sammlung und nach Rücksprache mit Herrn Dipl.Ing.Dr.Karl Mandl, dem ich ebenfalls meinen herzlichen Dank ausspreche, stellte ich fest, daß es sich zumindest um eine neue Subspecies des *Neoplectes reitteri* RET. handelt. Die Überprüfung des Penis ergab das typische Bild des *Neoplectes reitteri* RET., der aus der ganzen *Neoplectes*-Gruppe einmalig charakteristisch herausragt.


## Beschreibung der neuen Subspecies:

Der Subspecies *fallax* ROST entfernt ähnlich, doch ist der Halsschild nicht dicht gerunzelt punktiert, die Primärintervalle sind in lange Tuberkeln aufgelöst, die Sekundärintervalle sind keine Platten, sondern schwach geriffelte Rippen und die Tertiärintervalle sind als lange, schmale Rippenelemente deutlich entwickelt. Außerhalb des dritten Primärintervalls sind noch zwei in Körnchen aufgelöste Intervalle vorhanden. Die männlichen Tiere sind sehr stark glänzend. Die Färbung ist sehr variabel: schwarz, schwarzblau, grün, grünblau, violett, rot, rotbraun, kupfern und messingfarben. Größe: Männchen 32 - 38 mm, Weibchen 36 - 42 mm. Dem Entdecker dieser neuen Subspecies, Herrn Ing. Kalman Gaskó herzlich gewidmet.

Holotypus: Kaukasus, Abhasia, Suhumi, Lelasuri Valley, 17.-31. 5. 1975 leg.K.Gaskó, in coll.R.Kenyery. 1 rötliches Männchen, 36 mm.

Paratypen: Eine kleine Serie von dieser Subspecies mit denselben Fangdaten wie der Holotypus und einige Paratypen, leg. I. Retezar, in coll.Kenyery; zwei Paratypen in coll.Mandl und mehrere Paratypen in coll. I.Retezar, Budapest.

Lebensräume der Subspecies des *Neoplectes reitteri* RET.



Anschrift des Verfassers: Rudolf Kenyery, Pfeilgasse 48/7, 1080 Wien.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Koleopterologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [52\\_1975](#)

Autor(en)/Author(s): Kenyery Rudolf

Artikel/Article: [Beschreibung einer neuen Subspecies des Neoplectes reitteri Retowski \(Carabidae, Col.\). 113-114](#)