©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at

Geringe Größe (18—20 *mm*), sehr viel schlankere, parallelseitiger Gestalt, bedeutend kürzere Hinterlappen des Halsschildes, weniger stark vortretende Schultern, andere Skulptur der Flügeldecken. Die primären Intervalle sind nämlich nicht oder nur sehr wenig kräftiger, als die anderen und durch weniger zahlreiche Grübchen unterbrochen, also langgliedriger. Die sekundären und tertiären sind gleich kräftig entwickelt, nicht wie bei *vagans* nom. Die ersteren viel stärker, als die letzteren.

Färbung ziemlich lebhaft kupfrig oder grünlich.

6 Stück aus Grasse (Dept. Alpes maritimes) von Herrn A. Mathey-Biel erhalten.

Bei diesem Anlasse möchte ich erwähnen, daß es, was ich bisher in keiner carabologischen Arbeit gelesen habe, unter der großen, das Dept. Basses Alpes bewohnenden *vagans*-Rasse, wie bei *cancellatus* nicht sehr selten Exemplare mit roten Schenkeln und roter Fühlerwurzel gibt. Ich sah mehrere solche und besitze selbst deren.

Callisthenes Kuschakewitschi Plasoni nov. subsp.

Von Paul Born, Herzogenbuchsee (Schweiz).

Von *Kuschakewitschi* nom. durch bedeutendere Größe (22—25 *mm*) etwas schlankere Gestalt und vor allem durch sehr deutlichen Kupferschimmer auf der Oberseite verschieden. Die Seiten der Flügeldecken meist heller kupfrig, oft mehr messingen, oft mehr grünlich.

10 Stück aus dem Gouvernement Semirjetschinsk, ohne nähere Angabe der Lokalität seinerzeit von dem verstorbenen Dr. V. Plason in Wien erhalten.

Diese schöne *Kuschakewitschi*-Rasse ist mir schon seinerzeit bei Erhalt sehr aufgefallen; jetzt, bei Neuordnung meiner *Callisthenes* finde ich mich doch veranlaßt, sie zu benennen.

Call. Kuschakewitschi variiert lokalitätenweise ganz bedeutend, wie keine andere mir bekannte *Callisthenes*-Art. Ich habe noch andere abweichende Suiten davon, jedoch leider meist ohne andere Patria-Angabe, als „Turkestan" was zur Aufstellung von geographischen Rassen, die ich allein berücksichtige, nicht genügt.

Einzig aus Taschkent besitze ich eine sehr große, aber im Gegentheil zu *Plasoni* nicht schlanke, sondern sehr gedrungene, ganz kugelige und total schwarze Form, leider nur in 1 Exemplar, so daß ich eine Benennung unerlasse.

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at

Unter einer anderen Suite von *Aulie Ata* (Syr Darja), die ich von dem Herrn Dr. O. Staudinger und Herrn Bang-Haas erhielt, befinden sich einzelne Exemplare, bei denen die Punktstreifen stärker vertieft und auch die Intervalle auf der Scheibe, nicht nur diejenigen an den Seiten ziemlich deutlich quer gerunzelt sind und da auch der Kopf merklich kleiner ist, als bei anderen *Kuschakewitschi*, so halte ich diese Tiere als Uebergänge zu *Karelini Fisch.*

Auf jeden Fall sind auch bei *Callisthenes* zu viel „Arten" aufgestellt worden. Einzelne derselben sind bloß Lokalrassen von anderen.

Neubeschreibungen.

Bembidion testaceum v. *Lomnickii* Netol.
Ent. Blätt. 10—12 1916, 260. Galizien.

Anophthalmus speluncarius Reitt.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 297. Herzegovina; Ruga Pecina.

Anophthalmus Gabriellae Mallasz.
Rov. Lap. 5—8 1916, 119. Hung. orient.

Capnodis porosa ab. *cupricollis* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 258. Somchetien.

Capnodis tenebricosa ssp. *simulatrix* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 259. Marokko.

Buprestis aurulenta ab. *Zoufali* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 259. Nordostbosnien.

Phaenops Knoteki v. *hellenica* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 259. Südgriechenland.

Anthaxia mundula a. *Purkinei* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 259. Bulgarien.

Anthaxia grammica a. *tristicula* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 260. Krim.

Anthaxia Nephthys Obenb.
W. Ent. Ztg 8—10 1916, 260. Ägypten.

Acmaeodera Xerxes Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 236. Persien.

Acmaeodera discoidea ab. *luteola* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 237. Griechenland, Marokko.

Acmaeodera crinita v. *maroccana* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 237. Marokko.

Acmaeodera ottomana a. *Korbi* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 237. Kleinasien.

Acmaeodera Boryi v. *coptica* Obenb.
W. Ent. Ztg. 8—10 1916, 238. Ägypten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Koleopterologische Rundschau

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: 6_1917

Autor(en)/Author(s): Born [Born-Moser] Paul

Artikel/Article: Callisthenus Kuschakewitschi Plasoni nov.subsp. 13-14