

Peucedanum palustre - Selinum carvifolia

Wenn keine Blüten- oder Fruchtstände entwickelt sind, können diese beiden Arten gelegentlich miteinander verwechselt werden, zumal sie standörtlich ähnliche Biotope besiedeln können. Während Peucedanum aber recht streng an Grundwassernähe gebunden ist, vermag Selinum jedoch auch von Grundwasser gänzlich unbeeinflusste Lagen zu vertragen.

1. Letzte Fiederzipfel (in Verlängerung des Fiederstieles) bedeutend (ca 2 - 3x) länger als die beiden seitlich anschließenden Zipfel, diese stark überragend, Fiederzipfel mit stumpfer, kurzer (weißer oder rötlicher) Spitze

Peucedanum palustre

- 1.) Letzte Fiederzipfel nur wenig länger als die beiden seitlich anschließenden, diese nur wenig überragend, Fiederzipfel mit verlängerter, abgesetzter, weißer Stachelspitze, die nicht selten durch Abbrechen verlorrengt

Selinum carvifolia



links : Peucedanum palustre, rechts : Selinum carvifolia
(letzte Fiederzipfel, Spitzen der Fiederzipfel)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Kieler Notizen zur Pflanzenkunde](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [1_1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Peucedanum palustre - Selinum carvifolia 7](#)