

Zur Unterscheidung von *Anemone nemorosa* L. und *Anemone ranunculoides* L.

von Jürgen und Annemarie Eigner


Zur Unterscheidung der beiden Arten im vegetativen Zustand wurde bereits früher (H. WEBER, verf. Mskr. der Flor. A.G.) die Behaarung der Blattspreite und des Stengels herangezogen. Die Überprüfung im Freiland ergab jedoch, daß dieses Merkmal stark variiert und zur sicheren Unterscheidung nicht ausreicht. Brauchbar scheinen jedoch die Unterschiede in der Bewimperung des Blattrandes und Merkmale des Wurzelstockes zu sein, wobei die ersteren jedoch nur mithilfe eines objektiven Maßstabes angesprochen werden können:

- 1 Blattrand lang bewimpert, (Abb. 1a)  
 (Wimpern 0,3 - 0,5 mm lang, etwa 3 - 5 auf einen Millimeter des Blattrandes entfallend)  
 Rhizomabschnitte gleichmäßig, kurz zylindrisch, (Abb. 2b)  
 Endknospe daher gedrungen-kegelig, weißlich, grünlich-weiß oder weißlich-violett

*Anemone nemorosa* L.

- 1<sup>n</sup> Blattrand kurz und gleichmäßig bewimpert bis gezähnt, (Abb. 1b)  
 (Wimper-Zähnchen 0,1 - 0,2 mm lang, etwa 6 - 8 auf einen Millimeter)  
 Erster Rhizomabschnitt eines Jahres wesentlich größer und länger als die die engeren, jüngeren Abschnitte. Endknospe daher walzlich-länglich, gelblich. (Abb. 2a)

*Anemone ranunculoides* L.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Kieler Notizen zur Pflanzenkunde](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Eigner Jürgen, Eigner Annemarie

Artikel/Article: [Zur Unterscheidung von \*Anemone nemorosa\* L. und \*Anemone ranunculoides\* L. 26](#)