Zur Frühjahrs-Erfassung im Rahmen der Arealkartierung Schleswig-Holsteins

von E.-W. Raabe

Zahlreiche Pflanzenarten unseres Landes kommen so frühzeitig im Jahr zur Entwicklung und verschwinden schon wieder so frühzeitig im Sommer, daß sie im Hochsommer nicht mehr oder kaum noch ausreichend zu erfassen sind. Auf diese Arten ist also bei der Frühjahrs- bzw. Frühsommer-Begehung so gut zu achten, daß sie in den Beobachtungsflächen nach Möglichkeit vollständig erfaßt werden. Zu diesen Arten gehören vor allem:

Aira caryophyllea Aira praecox Apera spica venti Phleum arenarium Carex pulicaria Carex dioica Carex digitata Carex verna Arum maculatum Juneus filiformis Gagea spathacea Gagea lutea Allium ursinum Fritillaria meleagr. Paris quadrifolia Ornithogalum umbell. Platanthera chlor. Orchis maculatus Orchis fuchsii Orchis latifolia Polygonum bistorta Cerastium glomeratum Cerastium semedec. Cerastium pumilum Holosteum umbell. Minuartia viscosa Spergula vernalis Anemone nemorosa Anemone ranunculoides Anemone hepatica

Myosurus minimus Ranunculus ficaria Ranunculus bulbosus Ranunculus auricom. Papaver dubium Papaver argemone Corydalis cava Corydalis fabacea Teesdalia nudicaulis Erophila verna Cardamine hirsuta Cardamine flexuosa Cardamine prat. Cardamine bulbifera Alliaria officinalis Arabidopsis thal. Saxifraga granulata Saxifraga tridactyl. Chrysosplen. altern. Chrysosplen, oppos. Ribes silvestre Ribes spicatum Potentilla sterilis Trifolium striatum Trifolium micranthum Vicia lathyroides Viola hirta Viola silvatica Daphne mezereum

Circaea alpina Circaea lutetiana Circaea intermedia Chaerophyll, temu. Primula acaulis Primula elation Primula officinalis Trientalis europ. Myosotis silvatica Myosotis hispida Myosotis stricta Myosotis versicolor Lamium maculat um Stachys arvensis Veronica verna Veronica triphyllos Veronica hederaefol. Lathraea s quamaria Adoxa moschatell. Valerianella dent. Valerianella olit. Arnoseris minima Hypochoeris glabra Senecio vernalis

Centaurea nigra L. - Schwarze Flockenblume in Hütten (1524)

von Olga Kalkstein

Im Juli 1971 fand ich eine unbekannte Flockenblume. Sie fiel besonders durch die dunkelbraunen, gefransten Hüllblätter, die wie ein Pelz wirken und durch die fehlenden strahlenden Randblüten auf.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Raabe Ernst-Wilhelm

Artikel/Article: Zur Frühjahrs-Erfassung im Rahmen der Arealkartierung

Schleswig-Holsteins 2