

Linzer Biol. Beitr.	19/1	201-254	30.6.1987
---------------------	------	---------	-----------

BEITRÄGE ZUR FLORA DER TÜRKEI VII

Friederike SORGER, Wien und
Mathias MANN, Wien

Key words: Angiospermae, Pteridophyta. - Floristics. -
Flora of Turkey.

Summary

SORGER F. & MANN M. 1987. Contributions to the Flora of Turkey VII. - Linzer Biologische Beiträge 19/1. German with English summary. New records for the Flora of Turkey area, so far not considered by volumes 1-9 of DAVIS (1965-1985) are given: (1) New for the Flora of Turkey area: 3 species. - (2) New for continental Turkey: 4 species. - (3) New taxa (published elsewhere) based on material collected by the authors: 12 species and 2 subspecies. - (4) Remarkable rare taxa: 22. - (5) New records for at least one grid square: 398.

Zusammenfassung

SORGER F. & MANN M. 1987. Beiträge zur Flora der Türkei VII. - Linzer Biologische Beiträge 19/1. Deutsch mit englischer Zusammenfassung. Es wird über mehrere Neufunde

gegenüber der "Flora of Turkey", Bände 1-9 (DAVIS 1965-1985) berichtet: (1) 3 Arten, die erstmals für die Türkei nachgewiesen werden konnten. - (2) 4 Arten, die erstmals auf türkischem Festland gefunden wurden. - (3) 12 Arten und 2 Unterarten, die auf Grund von Belegen aus den Sammlungen der Verfasserin erst kürzlich beschrieben worden sind und daher in der "Flora of Turkey" noch nicht aufscheinen. - (4) 22 bemerkenswerte Seltenheiten (z.B. konnten 2 bisherige "Endemiten des Ulu Dağ" auch auf dem mehr als 200 km weiter östlich liegenden Köroglu Dağ festgestellt werden). - (5) 398 Neufunde für einzelne Rasterfelder. Es werden hier nur Neufunde für Rasterfelder (2×2 Grad) der "Flora of Turkey" (DAVIS 1965-1985) behandelt, nicht jedoch solche für eine Provinz; es sei denn, es handelt sich um eine Seltenheit.

Einleitung

Die Bearbeitung der Aufsammlungen der letzten Jahre sowie einige Belege anderer Sammler erlauben es, die Verbreitungsnachweise der in den Bänden 1-9 der "Flora of Turkey" (DAVIS 1965-1985) vorkommenden Arten zu vermehren (Kapitel 5). Überdies haben sich 3 Arten als neu für das Gebiet der "Flora of Turkey" erwiesen (Kapitel 1), außerdem gibt es 4 Erstnachweise für das türkische Festland (Arten, die bisher nur von Inseln des Flora of Turkey-Gebietes bekannt waren (Kapitel 2). 12 Arten und 2 Unterarten haben sich als für die Wissenschaft überhaupt neu herausgestellt (Kapitel 3). Die Neufunde der Kapitel (1) bis (3) sowie außerdem einige bemerkenswerte Seltenheiten (Kapitel 4) werden ausführlicher behandelt als die Rasterfeld-Neufunde (Kapitel 5).

Die Reihenfolge der Familien, Gattungen und Arten (innerhalb jedes Kapitels) erfolgt alphabetisch; bei jedem Taxon wird die betreffende Band- und Seitenzahl der "Flora of Turkey" angeführt.

Danach folgen Rasterfeld und Provinz ("A 2 Bursa" bedeutet: Rasterfeld A 2, Provinz Bursa), darauf eine kurze Fundortsangabe, die Höhenlage, und zuletzt die Belegnummer. Diese Belegnummer im Herbarium F.SORGER setzt sich wie folgt zusammen: Im Beispiel "81-30-7" bedeutet "81" das Sammeljahr 1981, "30" ist die Nummer des Fundortes innerhalb dieses Jahres und "7" ist die Nummer der Aufsammlung (Art bzw. Unterart) an diesem Fundort.

Bei gemeinsam mit anderen Sammlern veranstalteten Reisen werden nach der Belegnummer die Namen der Sammler abgekürzt angeführt, und zwar in folgender Weise:

So. et al. = Dr. F. SORGER, Dr. KIT TAN und M. MANN;

So. & Bu. = Dr. F. SORGER und Mag. P. BUCHNER;

So. & Ma. = Dr. F. SORGER und M. MANN;

So. & Mi. = Dr. F. SORGER und Dipl.Biol. J. MILBRADT;

Bei Belegen anderer Sammler wird die Belegnummer, sofern sie bekannt ist, angegeben und der Name, meist in abgekürzter Form zitiert:

Ak. = Doç.Dr. Hüseyin AKSOY, I.Ü. Orman Fakültesi,
Bahçeköy-Istanbul;

Bu. = Mag. P. BUCHNER, Pitten, Niederösterreich;

Huttar = Herbarium HUTTAR-WIDL, Wien;

Öz. = Assist. Gülen ÖZALP, I.Ü. Orman Fakültesi,
Bahçeköy-Istanbul.

Zahlreichen Spezialisten, denen ich Belege unterbreiten durfte (besonders Mitarbeitern von P.H. DAVIS, Edinburgh), bin ich für die Bestimmung zu großem Dank verpflichtet.

Es sind dies:

Prof. K. BROWICZ (Poznań): alle Gehölzpflanzen;

Prof. P.H. DAVIS (Edinburgh): diverse Gramineae und
Cyperaceae;

- Dr. M. DOGAN (Ankara): diverse Gramineae;
Dr. J.R. EDMONDSON (Liverpool): Gattungen der Liliaceae und Poa;
Doz.Dr. M.A. FISCHER (Wien): Veronica; etliche weitere neue Veronica-Funde werden an anderer Stelle publiziert (FISCHER & SORGER 1987);
Dr. I. MARKGRAF-DANNENBERG (Zürich): Festuca;
Dr. KIT TAN (Edinburgh): diverse Monocotyledoneae;
B. MATHEW (Kew): Iridaceae;
V.A. MATTHEWS (Edinburgh): Liliaceae;
Dr. R.R. MILL (Edinburgh): Scrophularia und diverse Monocotyledoneae;
Prof. Ö. NILSSON (Uppsala): Carex;
Dr. A. POLATSCHEK (Wien): Erysimum;
Dr. J. RENZ (Basel): Orchidaceae;
Dr. E.M. RIX (Ashford): Fritillaria und Gagea;
Prof. N.K.B. ROBSON (London): Hypericum;
Prof. H. SCHOLZ (Berlin): Paniceae, Stipa;
Dr. P. SMITH (Edinburgh): Bromus;
Dr. S. SNOGERUP (Lund): Juncaceae;
Dr. E. SCHÖNBECK-TEMESY (Wien): Rubiaceae;
Dr. C.A. STACE (Leicester): diverse Gramineae;
G. TAUBENHEIM (Mettmann): Orchidaceae;
Dr. E. TUZLACI (Istanbul): Asphodeline;
Dr. P. UOTILA (Helsinki): Helobiaeae;
Prof. P. WENDELBO (Bergen): Bellevalia, Hyacinthus;
Dr. H. WITTMANN (Salzburg): Ornithogalum.

Bei den laufenden Bestimmungen wurde ich in bewährter Weise wieder von Herrn K. FITZ, Wien, unterstützt, wofür ihm besonderer Dank gebührt. So wie bisher stand mir auch diesmal bei der Erstellung des Manuskriptes Herr Ing. J. DONNER zur Seite, dafür danke ich ihm ebenfalls. Ferner bin ich Univ.Doz. Dr. M.A. FISCHER für die Durchsicht des Manuskriptes sehr dankbar.

- 1) Arten, die erstmals für das Gebiet der "Flora of Turkey" nachgewiesen werden konnten:

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

Nah verwandt mit der weitverbreiteten Art *Digitalis sanguinalis*, dürfte bis jetzt in der Türkei übersehen worden sein.

A 8 Çoruh: ca. 10 km oberhalb von Sarigöl, an der Böschung eines Gebirgsbaches, mit *Lysimachia verticillaris*, *Xanthogalum purpurascens*, *Scrophularia umbrosa* und an Felspartien *Campanula seraglio*, *Microseria fruticosa* ssp. *serpyllifolia*, u.a.; 1600 m, 19.7.1982, 82-83-8, So.& Bu., det. SCHOLZ.

Jasminum officinale L.

Die in Südeuropa kultivierte und oft eingebürgerte Art konnte nun auch im türkischen Florenbereich festgestellt werden.

C 4 İçel: W von Aydincik, 15 m, 12.4.1985, 85-57-11, So.& Ma., det. BROWICZ.

Scrophularia divaricata Ledeb.

Diese im Kaukasus beheimatete *Scrophularia* wurde nun auch für das NE-Gebiet der Türkei nachgewiesen.

A 9 Kars: S von Posof, am Rand eines Buschwaldes mit *Ostrya carpinifolia*, *Philadelphus caucasicus*, *Lonicera caucasica*, *L. caprifolium*, *Rhododendron luteum*, vereinzelt *Pinus sylvestris* und im Unterwuchs *Mycelis muralis*, *Mulgedium quercinum*, *Melica picta*, *Hypericum hirsutum*, u.a.; 1400 m, 5.8.1982, 82-106-101, So. & Bu., det. MILL.

2) Arten, die erstmals auf dem türkischen Festland gefunden wurden:

Carpobrotus edulis (L.)N.E.Br. (2:345)

Die in Südafrika beheimatete Aizoacea wird oft an den S-Küsten Europas kultiviert und innerhalb des Gebietes für die Inseln Kos und Rhodos angegeben.
C 4 Içel: W von Aydincik, 10 m, 12.4.1985, 85-57-1,
So.& Ma.

Chlamydophora tridentata (Delile)Ehrenb.ex Less. (5:293)

Diese Composite wird im Gebiet nur für die Insel Rhodos angegeben. Die oft im Schutz kräftiger Salzpflanzen wachsenden, zarten (Stämmchendurchmesser oft nur 1 mm), kleinen (meist nur 8 cm hohen) und sehr frühblühenden Pflanzen (Februar-März) dürften bis jetzt übersehen worden sein. Wir fanden sie zusammen mit Halocnemum strobilaceum, Arthrocnemum fruticosum, Sagina maritima, Spergularia marina, Halimione portulacoides, Sphenopus divaricatus, u.a.; C 4 Içel: S von Silifke, S der kleinen Siedlung Kur-tulus, Salzsteppe, bis 5 m, 11.4.1985, 85-52-7,
So.& Ma.

Crepis fraasii Schultz Bip. (5:820)

Verbreitung: Ägäische Inseln, Griechenland und Kreta. Kaş liegt gegenüber der Insel Kastellorizon, die unter den ägäischen Inseln angeführt wird. So ist der Fund auf dem türkischen Festland nicht sehr überraschend.

C 2 Antalya: NE von Kaş, offener, felsiger Pinus brutia-Wald, 400 m, 22.4.1984, 84-15-8, So. et al., det. KIT TAN.

C 2 Muğla: W-Fuß des Dikmen Da., Pinus brutia-Wald, kalkreicher N-Hang, ca. 25°, 300 m, 29.3.1983,
B 83-13-3, Bu.

Crepis pusilla (Somm.) Merxm. (5:836)

Vorkommen: Kreta, Griechenland, Portugal, Sizilien und auf der Insel Kastellorizon, die SW-Anatolien vorgelagert ist, was den Fund dieser Art auf dem türkischen Festland nicht verwunderlich macht.

C 2 Antalya: NE von Kale, verkarsteter Kalkhügel, N-hang, 15°, mit roter Erde, 100 m, 31.3.1983,
B 83-22-1, Bu.

3) Neue Arten, die auf Grund von Belegen aus den Sammlungen der Verfasserin erst kürzlich beschrieben worden sind und daher in der "Flora of Turkey" noch nicht aufscheinen:

Allium nemrutdaghense Kit Tan & Sorger, sp.nova;

Pl.Syst.Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: C 7 Adiyaman: Nemrut Da., Felsschutt, 2100 m, 3.5.1980, 80-25-15, Sorger.

Campanula yildirimlii Kit Tan & Sorger, sp.nova;

Pl.Syst.Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: B 7 Tunçeli: Munzurgebirge NW von Ovaçik (Bekirdashe Da.), Schutt und Felsfluren, 2000 m, 17.8.1982, 82-127-18, So.& Bu.

Cirsium davisianum Kit Tan & Sorger, sp.nova; Pl.Syst.

Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: A 8 Erzurum: Dumlu Da., ca. 30 km N von Erzurum, Gebirgssteppe, 2500-2800 m, 14.8.1982, 82-123-12, So.& Bu.

Cirsium eliasianum Kit Tan & Sorger, sp.nova; Pl.Syst.

Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: A 9 Kars: Çidirsee, Wiesen, 1950 m, 29.7.1981, 81-58-7, Sorger.

Hypericum sorgerae N.Robson, sp.nova; Notes R.B.G.

Edinb. 43(2):255-265 (1986). Typus: B 6 Sivas: 18 km S von Zara, Steppenhügel, 1500 m, 9.7.1969, 69-37-26, Sorger.

Lotus armeniacus Kit Tan & Sorger, sp.nova; Pl.Syst.

Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: A 9 Kars: 25 km W von Tuzluca, Salzsteppe S der Hauptstraße, 1000 m, 20.8.1984, 84-69-3, Sorger & Kit Tan.

Omphalodes davisiana Kit Tan & Sorger, sp.nova; Pl.

Syst.Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: B 7 Tunceli: Sultan Baba Da., ca.40 km N von Tunceli, Schutt und Felsfluren, 2700 m, 20.8.1982, 82-130-3, So.& Bu.

Onobrychis cilicica Kit Tan & Sorger, sp.nova; Pl.Syst.

Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: C 4 İçel: 5 km S von Uzuncaburç, offener Pinus brutia-Wald, 800 m, 3.7.1977, 77-17-20, Sorger.

Onobrychis mutensis Kit Tan & Sorger, sp.nova; Pl.Syst.

Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: C 4 İçel: 1 km W von Köselerli (S von Mut), sandiger Steppenhügel, 200 m, 4.7.1977, 77-20-8, Sorger.

Onobrychis sivasica Kit Tan & Sorger, sp.nova; Pl.Syst.

Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: A 6 Sivas: Yıldız Da., Gebirgssteppe, 2000 m, 29.7.1976, 76-8-74, Sorger.

Ornithogalum sorgerae H.Wittmann, sp.nova; Stapfia 13:

177 pp.(1985). Typus: C 6 Maraş: 10 km N von Andırın, Brache, 900 m, 1.6.1973, 73-14-54, Sorger.

Papaver persicum Lindl. ssp. *fulvum* Kit Tan & Sorger, ssp.nova; Pl.Syst. Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: C 7 Malatya: ca.74 km SW von Malatya, Felsblockhalde, 1550 m, 25.6.1971, 71-45-29, Sorger.

Sempervivum brevipetalum Kit Tan & Sorger, sp.nova; Pl.

Syst.Evol. 154, 111-128 (1986). Typus: A 9 Kars: 17 km W von Kağızman, felsdurchsetzter Steilhang S der Hauptstraße, 1350 m, 18.8.1984, 84-62-14, Sorger & Kit Tan.

Sempervivum globiferum L. ssp. *aghricum* Kit Tan & Sorger, ssp.nova; Pl.Syst. Evol. 154, 111-128 (1986).

Typus: B 9 Ağrı: SW des Balık-Sees, Felsblockhalde, 2700 m, 5.8.1983, 83-37-16, Sorger.

4) Bemerkenswerte seltene Sippen

ARACEAE

Biarum eximium (Schott & Kotschy) Engler (8:57)

Diese in der Türkei endemische Araceae ist seit KOTSCHY und SIEHE nicht mehr gefunden worden. Eine im Frühjahr 1985 von uns gesammelte Knolle entwickelte im Herbst (25.9.1985) einen prachtvollen Blütenstand (Spatha 11 cm lang und innen scharlachrot). Interessant ist, daß der Fund von KOTSCHY mit 28.9.1853 (blühende Pflanze) datiert ist und die Blütezeit seiner Aufsammlung übereinstimmt mit der unseres in Kultur zum Blühen gebrachten Exemplares. C 4 Içel: ca. 37 km NW von Silifke (in Richtung Mut), in einer vegetationsarmen Senke E der Hauptstraße mit vereinzelt *Pinus brutia*, *Iberis acutiloba*, *Euphorbia helioscopia*, *Allium gayi*, *Gagea fibrosa*, *Sagina apetala*, u.a., 400 m, 10.4.1985, 85-49-1, So.& Ma.

CISTACEAE

Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller (1:517)

Diese für das Gebiet nur von alten Belegen angegebene Art (SINTENIS und BALANSA) wurde in neuerer Zeit für A 1(E) Kirkclareli (1978: ÖZHATAY), C 1 Aydin (1965: TANKER) und C 3 Antalya (1974: TUZLACI) nachgewiesen (TUZLACI: 1984). Wir haben diese Art nun auch in der Provinz Hatay gefunden.

C 6 Hatay: W von Serinyol (Kizil Da.), offener *Pinus brutia*-Wald, zusammen mit *Helianthemum salicifolium*, *Tuberaria guttata* var. *plantaginea*, *Briza maxima*, *PARENTUCELLIA latifolia*, *Anthemis palestina*, u.a., 400 m, 7.4.1985, 85-37-3, So.& Ma.

COMPOSITAE

Scorzonera lasiocarpa Chamberlain (5:651)

Die erst 1965 aufgestellte und nur bei Samandağ gefundene Art konnte nun N davon (im selben Rasterfeld) wieder entdeckt werden.

C 5 Hatay: 10 km S von Ulucinar, im Überschwemmungsbereich (Gerölle) eines Flusses zusammen mit *Lotus edulis*, *L.cytisoides*, *Hedysarum spinosissimum*, *Galium cassium*, u.a.; 30 m, 3.4.1985, 85-24-2, So.& Ma.

Senecio olympicus Boiss. (5:159)

Diese bisher als Endemit des Bithynischen Olympos (Ulu Da., Provinz A 2 Bursa) betrachtete Art konnte nun auch für die Provinz Bolu nachgewiesen werden (vergleiche dazu weiter unten *Lamium veronicifolium*)
A 3 Bolu: Körögü Da., schwach beweidete Matten mit Kalkfelsen durchsetzt, zusammen mit *Poa cenisia*, *Helictotrichon versicolor*, *Jasione supina* ssp. *akmanii*, *Picris olympica*, *Campanula cymbalaria*, u.a.; 2000-2300 m, 18.8.1983, B 83-70-14, Bu.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus caelesyriacus Boiss. (-:-)

Diese Art konnte erst 1984 (SORGER 1984) für das Gebiet nachgewiesen werden. Ein neuer Fund in der Provinz Içel bildet eine interessante Brücke zum östlichen Verbreitungsgebiet dieser Art.

C 4 Içel: 25 km SW von Silifke, offener *Pinus brutia*-Wald, zusammen mit *Convolvulus pentapetaloides*, *Vicia laxiflora*, *V. grandiflora*, *Lathyrus setifolius*, u.a.; ca.300 m, 12.4.1985, 85-53-6, So.& Ma.

CRUCIFERAE

Erysimum cheiri (L.)CR. (1:478)

Diese Art scheint in der "Flora of Turkey" noch unter

der Gattung *Cheiranthus* auf. Für das türkische Festland wird nur ein alter Beleg angegeben.

C 5 Hatay: NW von Samandağ, Sandstrand, zusammen mit *Echium plantagineum*, *Inula crithmoides*, *Matthiola incana*, *Euphorbia paralias*, *Ononis natrix* ssp. *hispanica*, u.a.; 5 m, 1.4.1985, 85-7-7, So.& Ma., det. POLATSCHEK.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia supina Rafin. (7:580)

Diese aus Amerika in den Mittelmeerraum eingeschleppte Art wird für die Türkei nur für C 6, N der Hafenstadt Iskenderun angegeben. Ein neuer Fund aus A 3 Zonguldak dürfte wahrscheinlich über den Hafen Zonguldak eingedrungen sein.

A 3 Zonguldak: NW von Devrek, am Rand eines Eichenwaldes, ca. 500 m, 16.8.1983, B 83-63-4, Bu.

FILICALES

Pteris vittata L. (1:44)

Der im Mediterrangebiet beheimatete Farn wird für das türkische Festland vor allem auf Grund alter Funde angegeben.

C 6 Hatay: Harbiye, Lorbeerhain (hier prachtvolle Exemplare dieses Farns), 200 m, 7.4.1985, 85-38-2, So.& Ma.

GRAMINEAE

Agrostis planifolia C.Koch (9:350)

Von der im Kaukasus und in Afghanistan beheimateten Gramineae werden in der "Flora of Turkey" nur einige, vor allem alte, Funde zitiert.

A 8 Çoruh: oberhalb von Sarigöl, im Quellgebiet des Barballflusses, Bachrand, Wiesen, Waldrand mit *Sorbus caucasica* var. *yaltiriki*, *Salix elbursensis*, *S.caprea*, *Heracleum apiifolium*, *Chaerophyllum aureum*, *Delphinium formosum*, *Scirpus sylvaticus*, *Dryopteris abbreviata*, *Thelypteris dryopteris*, *Campanula lactiflora*, u.a.; 1600-2000 m, 20.7.1982, 82-84-50, So.& Bu.

Scolochloa festucacea (Willd.)Link (9:399)

Diese Art scheint in der Verbreitungskarte von Großheims Kaukasus-Flora für heute türkisches Gebiet nur als Punkt auf und wurde in der "Flora of Turkey" zitiert, ohne daß ein Beleg überprüft worden wäre.
A 9 Kars: 8 km E von Ardahan in Richtung Çildır, N der Straße ein bultiger Großseggen-Sumpf mit *Carex kurdica*, *Sparganium emersum*, Sp. *minimum*, *Potamogeton natans*, *Utricularia minor*, *Elatine alsinastrum*, *Eleocharis acicularis*, u.a.; 1930 m, 1.8.1982, 82-98-8, So.& Bu., det. MARKGRAF-DANNENBERG.

Sphenopus divaricatus (Gouan)Reichb. (9:468)

Die im Mittelmeergebiet und E davon häufige Art ist in der Türkei sehr selten.

C 4 Içel: S von Silifke, S der kleinen Siedlung Kur-tuluş, reine Salzsteppe (Begleitflora wie bei *Chlamy-dophora tridentata*, Kap.2, angeführt), bis 5 m, 11.4.1985, 85-52-23, So.& Ma., det. FITZ.

GUTTIFERAE

Hypericum russeggeri (Fenzl)R.Keller (2:370)

Diese Art wurde seit Kotschy und Aucher nicht mehr in der Türkei gefunden.

C 5 Hatay: NW von Samandağ, Felshang (Kalk), 30° zum Meer abfallend, offene Garigue mit *Staeheline lobelii* (Massenvegetation), *Erica manipuliflora*, *Rhamnus*

punctatus (selten), Hamatolobium lotoides, Stachys petrocosmos, Hypericum thymifolium, Fumana scoparia, Euphorbia terracina, u.a.; 20-100 m, 1.4.1985,
85-8-9, So.& Ma., det. ROBSON.

LABIATAE

Lamium veronicifolium Bentham (7:135)

Dieses Lamium wurde bisher als Endemit des Bithynischen Olymps (A 2 Bursa) angesehen. Nun erwies sich, daß es ein beträchtlich größeres Areal einnimmt (der Köroğlu Da. liegt ca. 220 km ENE des Ulu Da.). Siehe auch Senecio olympicus weiter oben!

A 3 Bolu: Köroğlu Da., Gipfelbereich, zusammen mit Jasione supina ssp. akmanii, Silene caryophylloides ssp. subulata, Minuartia juniperina, Cerastium purpurascens, Hypericum linarioides, Plantago holosteum, u.a.; 2378 m, 18.8.1983, B 83-70-30, Bu.

Stachys officinalis (L.)Trevisan ssp. officinalis

(7:261)

Die in fast ganz Europa bis Zentralasien vorkommende Subspecies ist für das türkische Florengebiet bisher nur von alten Funden aus der Provinz Amasya bekannt. A 9 Kars: 30 km W von Çıldır, offener Pinus sylvestris-Wald neben einer Sandgrube, zusammen mit Corallorrhiza trifida, Platanthera chlorantha, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Antennaria dioica, Linum nervosum, Polygala major, u.a.; 1900 m, 1.8.1982, 82-99-13, So.& Bu.

Stachys petrocosmos Rech.fil. (7:226)

Die nur von der Typus-Aufsammlung (Akra Da., Juni 1909) bekannte Art konnte nun NW von Samandağ wieder gefunden werden.

C 5 Hatay: einige Kilometer NW von Samandağ, Felshang (Kalk), steil zum Meer abfallend, offene Garigue,

mit derselben Begleitflora wie bei *Hypericum russeggeri*, Kap. 4, angeführt!; 20-100 m, 1.4.1985,
85-8-11, So.& Ma., det. KIT TAN.

LEGUMINOSAE

Astragalus epiglottis L. (3:60)

Diese in der Mediterran-Region verbreitete Art ist für das türkische Festland nur von einem alten Fund (BALANSA 1855) bekannt.

C 4 Içel: 17 km W von Silifke, felsdurchsetzter Hang zum Meer abfallend, vegetationsreich, mit zahlreichen Arten, die Neufunde für die Provinz Içel darstellen. Es sind dies: *Arisarum vulgare* ssp. *vulgare*, *Alkanna confusa*, *Geropogon hybridus*, *Convolvulus pentapetaloides*, *Conringia grandiflora*, *Ochthodium aegyptiacum*, *Sisymbrium officinale*, *S. septulatum*, *Tamus communis* ssp. *communis*, *Alopecurus utriculatus* ssp. *anthoxanthoides*, *Trifolium alexarinum*, *Tr. spumosum*, *Malva parviflora*, u.a.; 10-100 m, 9.4.1985, 85-41-36, So.& Ma.

Astragalus viridis Bunge (3:244)

Diese im Iran und in Sowjet-Armenien vorkommende Art scheint in der Verbreitungskarte von Großheims Kaukasus-Flora für heute türkisches Gebiet nur als Punkt auf und wurde in der "Flora of Turkey" ohne Belegüberprüfung zitiert.

A 9 Kars: 17 km W von Kağızman, felsiger Steilhang S der Hauptstraße, zusammen mit *Berberis integerrima*, *Lonicera iberica*, *Euphorbia orientalis*, *Eragrostis collina*, *Asparagus officinalis*, *Rhamnus paliasii*, *Cerasus incana* var. *velutina*, *Spiraea hypercifolia*, *Hippomarathrum microcarpum*, *Ferulago pauciradiata*, u.a.; 1350 m, 18.8.1984, 84-62-21, So. et al.

LILIACEAE

Allium wendelboanum Kollmann (8:136)

Das nur von der Typus-Aufsammlung (SINTENIS 1169) bekannte und 1983 beschriebene Allium (Provinz Mardin) konnte nun in einer westlichen Provinz nachgewiesen werden.

C 6 Gaziantep: ca. 4 km N von Halfeti, Felsblockhalde, zusammen mit Hypericum cardiophyllum, Galium canum ssp. ovatum, Ficus carica ssp. rupestris, Scutellaria megalapsis, u.a.; 500 m, 24.5.1983, 83-5-6, Sörger.

MOLLUGINACEAE

Glinus lotoides L. (2:346)

Diese in Südeuropa beheimatete Molluginaceae wurde seit SINTENIS (1883) nicht mehr in der Türkei nachgewiesen.

A 1(A) Çanakkale: Umgebung von Çanakkale, Rand eines Reisfeldes, ca. 40 m, 1973, Huttar.

SCROPHULARIACEAE

Veronica panormitana Tineo ssp. panormitana (6:732)

Von der Subspecies V. panormitana werden in der "Flora of Turkey" nur alte Funde (SINTENIS & HAUSS-KNECHT) zitiert. (Näheres über die Taxonomie siehe FISCHER & SORGER, 1987).

C 6 Hatay: Antakya, in der Umgebung der Petrus-Kirche, am Fuß steiler Felswände, zusammen mit Alopecurus utriculatus ssp. utriculatus, Geranium rotundifolium, Trifolium clypeatum, Trigonella macrorrhyncha, Vallantia hispida, u.a.; ca. 100 m, 6.4.1985, 85-34-28, So. & Ma.

UMBELLIFERAEE

Bupleurum affine Sadler (4:408)

Diese weitverbreitete Umbellifera (Süd-, Zentral- und Ost-Europa bis Südwest-Rußland) wird für die Türkei nur von einem Fundort zitiert.

A 3 Bolu: N der Ortschaft Kibrisçik, felsdurchsetzes Weideland, zusammen mit Arenaria ledebouriiana, Gypsophila muralis. Velezia rigida, Aegilops markgrafii, Ae. triuncialis, Ae. columnaris, Stachys byzantina, Trifolium leucanthum, Tr. nigrescens, Tr. hirtum, Tr. striatum, Polycnemum verrucosum, u.a.; 1100 m, 20.8.1983, 83-71-41, Bu.

ZYGOPHYLLACEAE

Zygophyllum album L. (2:492)

Diese Zygophyllaceae wird für das Gebiet nur von einem alten Fund (BALANSA) zitiert.

C 4 Içel:S von Silifke, S der kleinen Siedlung Kur-tulus an der Küste, zusammen mit Thymelaea hirsuta, Euphorbia paralias, Bolboschoenus maritimus, Ononis natrix ssp. natrix, Tamarix tetrandra, u.a.; bis 5 m, 11.4.1985, 85-52-42, So.& Ma.

5) Neufunde für einzelne Rasterfelder

AIZOACEAE (2:344)

Carpobrotus edulis (L.)N.E.Brown (2:345): Neu für das türkische Festland!

C 4 Içel: W von Aydincik, 20 m, 85-75-1, So.& Ma.

ALISMATACEAE (8:5)

Alisma gramineum Lej. (8:8):

A 10 Kars: zwischen Orta Alican und der russischen Grenzstation, 800 m, 84-72-1, So.et al., det. UOTILA.

AMARANTHACEAE (2:340)

Amaranthus viridis L. (2:341):

C 1 Muğla: bei Herakleia, 20 m, 86-23-5.

AMARYLLIDACEAE (8:358)

Galanthus plicatus Bieb. ssp. byzantinus (Baker)D.A.Webb (8:367):

A 4 Zonguldak: Forstamt Yenice, Revier Çitdere, 1450 m, 27.4.1985, Öz.

Pancratium maritimum L. (8:380):

A 4 Zonguldak: N von Bartin, 5 m, B 83-73-1, Bü.

ANACARDIACEAE (2:542)

Pistacia lentiscus L. (2:544):

C 4 Içel: 5 km E von Ovaçık, 50 m, 85-56-2, So.& Ma.

ARACEAE (8:41)

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. (8:62):

C 4 İçel: 17 km W von Silifke, 10 m, 85-41-1, So.& Ma.;

C 5 Hatay: 7 km S von Uluçinar, 20 m, 85-23-1, So.& Ma.

Arum conophalloides Kotschy ex Schott var. conophalloides (8:50):

B 9 Van: 20 km E von Erciș, 2000 m, 82-43-1, So.& Mi.

A. dioscoridis Sm. var. dioscoridis (8:52):

C 4 Antalya: Strand E von Alanya, 5 m, 85-60-3,
So.& Ma.

A. dioscoridis Sm. var. liepoldtii (Schott)Engler (8:52):

C 4 Antalya: Strand E von Alanya, 5 m, 85-60-2,
So.& Ma.

Biarum eximium (Schott & Kotschy)Engler (8:57):

C 4 İçel: 37 km NW von Silifke in Richtung Mut, 150 m,
85-49-1, So.& Ma.

Eminium spiculatum (Blume)Schott (8:59):

C 8 Mardin: 30 km SW von Mardin, 500 m, 83-8-1.

BETULACEAE (7:688)

Alnus orientalis Decne. var. pubescens Dippel (7:693):

C 4 İçel: 14 km NW von Silifke, Göksu-Ufer, 80 m,
85-47-1, So.& Ma., det. BROWICZ.

BORAGINACEAE (6:237)

Alkanna confusa Samuelsson ex Rech.fil. (6:422):

C 4 İçel: 17 km W von Silifke, 50 m, 85-41-2, So.& Ma.

Anchusa stylosa Bieb. (6:396):

B 2 Manisa: 5 km W von Alaşehir, 100 m, B 83-48-1, Bu.

Heliotropium lasiocarpum Fisch.& Mey. (6:253):

A 9 Kars: 17 km W von Kağızman, 1300 m, 84-62-2, So. et al.; - A 10 Kars: zwischen Orta Alican und der russischen Grenzstation, 800 m, 84-72-5, So. et al.

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (6:258):

B 9 Van: 50 km S von Gürpinar, 2300 m, 84-74-1, So. et al.

Nonea obtusifolia (Willd.) DC. (6:407):

C 6 Hatay: 8 km SE von Samandağ, 60 m, 85-11-2, So. & Ma.

N. pulla (L.) DC. ssp. *monticola* Rech.fil. (6:410):

B 10 Van: 37 km NE von Çaldıran, 2600 m, 84-34-2, So. & Mi.

CAMPANULACEAE (6:2)

Campanula drabifolia Sm. (6:53):

C 4 İçel: 46 km W von Silifke, 200 m, 85-55-1, So. & Ma.

C. stricta L. var. *stricta* (6:43):

B 4 Ankara: 10 km SW von Şereflikoçhisar, 1000 m,

B 83-83-1, Bu.

CAPPARACEAE (1:495)

Cleome ornithopodioides L. (1:498):

B 4 Ankara: 10 km SW von Şereflikoçhisar, 1000 m,

B 83-83-7, Bu.

CARYOPHYLLACEAE (2:15)

Arenaria leptoclados (Reichb.) Guss. (2:28):

C 4 İçel: 15 km NW von Silifke, 80 m, 85-48-5, So. & Ma.

Cerastium glomeratum Thuill. (2:82):

C 4 İçel: 15 km NW von Silifke, 80 m, 85-48-6, So. & Ma.

Minuartia hybrida (Vill.)Schischk. ssp. *hybrida* (2:66):

C 4 Içel: 15 km NW von Silifke, 80 m, 85-48-7, So.& Ma.

M. juniperina (L.)Maire & Petitm. (2:50):

A 3 Bolu: Köroğlu Tepe, 2378 m, B 83-70-10, Bu.

Sagina maritima Don (2:91):

C 4 Içel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-1,

So.& Ma.; - C 6 Hatay: 23 km E Von Antakya in Richtung Reyhanli, Amik-Oase, 70 m, 85-20-6, So.& Ma.

Silene atociooides Boiss. (2:229):

C 2 Antalya: Yumru Da., N von Gömbe, 1300 m, 63-30-20, det. MELZHEIMER.

S. caryophylloides (Poir.)Otth ssp. *subulata* (Boiss.)

Coode & Cullen (2:221):

A 3 Bolu: Köroğlu Tepe, 2378 m, B 83-70-8, Bu.

S. gallica L. (2:238):

C 5 Hatay: 20 km SE von Uluçinar, 200 m, 85-31-2, So.& Ma.

Stellaria media (L.)Vill. ssp. *pallida* (Dumort.)Aschers.

& Graebn. (2:70):

C 4 Içel: 13 km NW von Silifke in Richtung Mut, 80 m, 85-46-3, So.& Ma.

CHENOPODIACEAE (2:294)

Arthrocnemum glaucum (Del.)Ung.-Sternb. (2:320):

C 1 Muğla: NW von Güllük, 40 m, 86-25-3.

Chenopodium murale L. (2:302):

C 1 Muğla: 20 km E von Datça, 200 m, B 83-42-1, Bu.

Halimione portulacoides (L.)Aellen (2:312):

C 4 Içel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-4, So.& Ma.

Petrosimonia brachiata (Pallas)Bunge (2:337):

C 1 Muğla: NW von Güllük, 40 m, 86-25-10.

Polycnemum verrucosum Lang (2:296):

A 3 Bolu: N von Kibrışcık, 1100 m, B 83-71-46, Bu.

Salsola ruthenica Iljin (2:329):

A 3 Zonguldak: Zonguldak, 15 m, B 83-61-1, Bu.

CISTACEAE (1:506)

Cistus salviifolius L. (1:508):

C 4 İçel: W von Aydincik, 20 m, 85-57-2, So.& Ma.

Fumana scoparia Pomel (1:520):

C 6 Hatay: 3 km E von Samandağ, 60 m, 85-10-3, So.& Ma.

Helianthemum aegyptiacum (L.)Miller (1:517):

C 6 Hatay: Kızılı Da., W von Serinyol, 400 m, 85-37-3, So.& Ma.

Tuberaria guttata (L.)Fourr. var. *guttata* (1:523):

C 4 İçel: 46 km W von Silifke, 200 m, 85-55-3, So.& Ma.

T. guttata (L.)Fourr. var. *plantaginea* (Willk.)Gross.

(1:523):

C 6 Hatay: Kızılı Da., W von Serinyol, 400 m, 85-37-2, So.& Ma.

COMPOSITAE (5:1)

Aethorhiza bulbosa (L.)Cass. ssp. *microcephala* Rech.fil.

(5:696):

C 4 İçel: 5 km E von Ovaçık, 20 m, 85-56-9, So.& Ma.

Anthemis arvensis L. (5:198):

C 4 İçel: 13 km NW von Silifke in Richtung Mut, 80 m, 85-46-4, So.& Ma.

A. palestina Reuter (5:219):

C 5 İçel: 5 km NW von Erdemli, 200 m, 85-39-3, So.& Ma.

Attractylis cancellata L. (5:604):

C 4 İçel: 5 km E von Ovaçık, 50 m, 85-56-11, So.& Ma.

Bellis annua L. (5:135):

C 6 Hatay: 23 km E von Antakya, Bereich der Amik-Oasen,
85-20-2, So.& Ma.

Carduus argentatus L. (5:432):

C 4 İçel: 5 km E von Ovaçık, 50 m, 85-56-13, So.& Ma.

C. pycnocephalus L. ssp. breviphyllarius Davis (5:437):

C 4 İçel: 17 km W von Silifke, 20 m, 85-41-9, So.& Ma.

Centaurea amasiensis Bornm. (5:484):

C 1 Aysin: 6 km W von Söke in Richtung Milipark, 150m,
86-19-2.

Chlamydophora tridentata (Delile) Ehrenb. ex Less. (5:293):

Neu für das türkische Festland!

C 4 İçel: S von Silifke bei Kurtulus, 5 m, 85-52-7,

So.& Ma.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist (5:133):

C 4 Antalya: 49 km W von Anamur, 20 m, 85-59-4, So.& Ma.

Crepis fraasii Schultz Bip. (5:820):

Neu für das türkische Festland!

C 2 Antalya: NE von Kaş, 400 m, 84-15-8, So. et al.

C. pusilla (Somm.) Merxm. (5:836):

Neu für das türkische Festland!

C 2 Antalya: N von Kale, 100 m, B 83-22-1, Bu.

Dichrocephala integrifolia (L.fil.) Kuntze (5:134):

A 3 Zonguldak: 10 km N von Devrek, 250 m, B 83-65-5, Bu;

A 4 Zonguldak: N von Bartın, 5 m, B 83-74-6, Bu.

Geropogon hybridus (L.) Schultz Bip. (5:668):

C 4 İçel: 17 km W von Silifke, 50 m, 85-41-13, So.& Ma.

Inula crithmoides L. (5:72):

C 4 İçel: S von Silifke bei Kurtulus, 5 m, 85-52-9,
So.& Ma.

I. montbretiana DC. (5:66):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-8, Bu.

Jurinea alpigena C.Koch (5:445):

A 4 Zonguldak: Forstamt Yenice, Revier Çitdere, SW-Hang,
1450 m, 19.7.1985, Öz.

- 223 -

Matricaria aurea (L.)Schultz Bip. (5:295):

C 4 Içel: 13 km NW von Silifke in Richtung Mut, 80 m,
85-46-5, So.& Ma.

M. chamomilla L. var. recutita (L.)Grierson (5:294):

C 6 Hatay: 23 km E von Antakya, Bereich der Amik-Oasen,
85-20-1, So.& Ma.

Micropus supinus L. (5:115):

C 4 Içel: S von Silifke bei Kurtuluş, 5 m, 85-52-10,
So.& Ma.

Picris olympica Boiss. (5:679):

A 3 Bolu: Körögülu Tepe, 2378 m, B 83-70-15, Bu.

Scorzonera lasiocarpa Chamberlain (5:651): Rar!

C 5 Hatay: 10 km S von Uluçinar, 20 m, 85-24-2, So.& Ma.

Senecio mollis Willd. (5:150):

B 4 Ankara: Tuz Gölü, 1000 m, B 83-83-4, Bu.

S. olympicus Boiss. (5:159): Rar!

A 3 Bolu: Körögülu Tepe, 2000 m, B 83-70-14, Bu.

S. vulgaris L. (5:165):

C 4 Içel: 15 km W von Silifke, 30 m, 85-40-3, So.& Ma.

C 6 Hatay: 26 km E von Antakya, 70 m, 85-35-4, So& Ma.

Sonchus oleraceus L. (5:691):

C 4 Antalya: 49 km W von Anamur, 20 m, 85-59-6, So&Ma.

C 6 Hatay: 8 km SE von Samandağ, 60 m, 85-11-4, Sa&Ma.

Tussilago farfara L. (5:168):

B 3 Isparta: 22 km SW von Akşehir, Sultan Da., 2000 m,
85-66-1, So.& Ma.

CONVOLVULACEAE (6:197)

Convolvulus caelesyriacus Boiss. (10: -):

C 4 Içel: 22 km W von Silifke, 300 m, 85-53-6, So.& Ma.

C. pentapetaloides L. (6:212):

C 4 Içel: 17 km W von Silifke, 50 m, 85-41-14, So.& Ma.

C. siculus L. ssp. siculus (6:212):

C 4 Içel: 5 km E von Ovaçık, 50 m, 85-56-22, So.& Ma.

CRUCIFERAE (1:248)

Aethionema eunomicoides (Boiss.) Bornm. (1:320):

A 4 Kastamonu: Ilgaz Da., S von Kastamonu, 2500 m,
B 83-80-16, Bu.

Arabis montbretiana Boiss. (1:428):

C 6 Hatay: zwischen Şenköy und Harbiye, 300 m, 85-5-2,
So.& Ma.

A. turrita L. (1:423):

C 1 Aydin: Samsundağ, 200 m, 86-19-5.

A. verna (L.) DC. (1:428):

C 6 Hatay: zwischen Şenköy und Harbiye, 300 m, 85-5-1,
So.& Ma.

Biscutella didyma Willd. (1:314):

C 4 Içel: 5 km NW von Silifke in Richtung Mut, 150 m,
85-45-3, So.& Ma.

C 5 Hatay: 7 km S von Uluçinar, 20 m, 85-23-4, So.& Ma.

Brassica tournefortii Couan (1:265):

C 4 Içel: S von Silifke bei Kurtulus, 5 m, 85-52-12,
So.& Ma.

Cakile maritima Scop. (1:275):

C 4 Antalya: E von Alanya, Strand, 85-60-8, So.& Ma.

Cardamine impatiens L. var. pectinata (Pall.) Trautv.

(1:443):

C 4 Içel: 15 km NW von Silifke, Göksu-Ufer, 90 m,
85-48-15, So.& Ma.

Conringia grandiflora Boiss.& Heldr. (1:276):

C 4 Içel: 17 km W von Silifke, 40 m, 85-41-18, So.& Ma.

Draba muralis L. (1:419):

C 2 Muğla: 10 km E von Çine, 250 m, B 83-45-4, Bu.

Enarthrocarpus arcuatus Lab. (1:271):

C 4 Içel: 5 km E von Ovaçık, 30 m, 85-56-26, So.& Ma.

Erysimum cheiri (L.) CR. (-:-): Scheint bei DAVIS,
"Flora of Turkey", Bd.1, Seite 478, noch unter Chei-
ranthus cheiri L. auf.

C 5 Hatay: NW von Samandag, Sandstrand, 5 m, 1.4.1985,
85-7-7, So.& Ma., det. PGLATSCHEK.

E. crassipes Fisch.& Mey. (1:475):

A 9 Kars: 17 km W von Kağızman, 1300 m, 84-61-18.

E. lazistanicum (Rupr.) Lipsky (-:-):

A 4 Zonguldak: Forstamt Yenice, Revier Çitdere, SW-Hang, 1450 m, 19.7.1985, Öz., det. POLATSCHEK.

Iberis acutiloba Bert. (1:311):

C 4 Içel: 37 km NW von Silifke in Richtung Mut, 400 m, 85-49-7, So.& Ma.

Isatis candolleana Boiss. (1:296):

C 5 Hatay: 4 km S von Uluçinar, 40 m, 85-22-4, So.& Ma.

Lepidium sativum L. ssp. *sativum* (1:281):

C 4 Içel: 15 km W von Silifke, 20 m, 85-40-5, So.& Ma.

Maresia nana (DC.) Batt. (1:462):

C 4 Antalya: Strand E von Alanya, 5 m, 85-60-10, So&Ma.

Matthiola longipetala (Vent.) DC. ssp. *pumilio* (Sibth. & Sm.) Ball (1:450):

C 4 Antalya: Strand E von Alanya, 5 m, 85-60-9, So.&Ma.

Ochthodium aegyptiacum (L.) DC. (1:347):

C 4 Içel: 17 km W von Silifke, 30 m, 85-41-19, So.& Ma.

Sisymbrium irio L. (1:485):

C 4 Içel: 13 km NW von Silifke in Richtung Mut, 80 m, 85-46-6, So.& Ma.

S. officinale (L.) Scop. (1:483):

C 4 Içel: 17 km W von Silifke, 40 m, 85-41-20, So.& Ma.

S. septulatum DC. (1:484):

C 4 Içel: 17 km W von Silifke, 30 m, 85-41-21, So.& Ma.

Thlaspi ceratocarpon Murr. (1:339):

C 9 Van: 85 km S von Gürpinar in Richtung Yalınca, 2800 m, 84-78-18, So.et al.

Torularia torulosa (Desf.) Schulz (1:488):

A 10 Kars: zwischen Orta Alican und der russischen Grenzstation, 800 m, 84-72-49, So.et al.

- 226 -

CUPRESSACEAE (1:76)

Cupressus sempervirens L. (1:76):

C 1 Antalya: zwischen Knidos und Datça, obs. Ma.

CYPERACEAE (9:32)

Bolboschoenus maritimus (L.)Palla var. cymosus (Reichb.)

Kit Tan & Oteng-Yeboah (9:64):

B 9 Van: S von Muradiye am Bendimahi-Fluß, 1650 m,
84-28-9, So.& Mi.; - C 4 İçel: S von Silifke bei
Kurtulus, 5 m, 85-52-15, So.& Ma.

Carex divulsa Stokes ssp. divulsa (9:96):

A 3 Bolu: S von Bolu, W von Karakasu, 800 m, 1977,
Aksoy, det. NILSSON; - B 9 Agri: SW des Balik-Sees,
2300 m, 83-32-12, det. NILSSON.

C. microglochin Wahlenb. (9:85):

B 9 Van: 1,5 km SW der Paßhöhe zwischen Başkale und
Güzel-su, 2850 m, 82-58-22, So.& Bu., det. NILSSON.

Isolepis cernua (Vahl)Roemer & Schultes (9:55):

C 2 Muğla: 22 km W von Marmaris, 150 m, 82-18-5,
So. et al., det. KIT TAN.

I. setacea (L.)R.Br. (9:54):

A 3 Bolu: 50 km E von Bolu, 1300 m, Kukkonen 8289,
det. KIT TAN.

DIOSCOREACEAE (8:552)

Tamus communis L. ssp. communis (8:553):

A 1 Edirne: 50 km NW von Gelibolu, 300 m, 63-2-7;
C 4 İçel: Uzuncaburç, 30 km N von Silifke, 900 m,
71-23-15.

T. communis L. ssp. cretica (L.)Kit Tan (8:553):

C 4 Antalya: 49 km W von Anamur, 60 m, 85-59-8,
So.& Ma.

- 227 -

EUPHORBIACEAE (7:566)

Euphorbia chamaesyce L. (7:580):

C 1 Muğla: bei Bodrum, 20 m, 86-22-1.

E. paralias L. (7:614):

A 4 Zonguldak: Inkum, N von Bartin, 3 m, B 83-73-3, Bu.

C 4 İçel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-16,

So.& Ma.

E. peplus L. var. peplus (7:605):

C 4 İçel: 15 km NW von Silifke, Göksu-Ufer, 100 m,

85-48-16, So.& Ma.

E. supina Rafin. (7:580):

A 3 Zonguldak: 30 km N von Devrek, 500 m, B 83-63-4, Bu.

FILICALES (1:38)

Asplenium adiantum-nigrum L. (1:50):

A 3 Zonguldak: 10 km E von Zonguldak, 20 m, B 83-59-11,
Bu.

A. septentrionale (L.)Hoffm. (1:51):

B 3 Isparta: 22 km SW von Akşehir, Sultan Da., 1500 m,
85-66-4, So.& Ma.

Cheilanthes catanensis (Cos.)Fuchs (1:43):

C 4 İçel: 46 km W von Silifke, 200 m, 85-55-5, So.& Ma.

Pteris vittata L. (1:44):

Rar!

C 6 Hatay: Harbiye, 200 m, 85-38-2, So.& Ma.

GERANIACEAE (2:450)

Geranium rotundifolium L. (2:459):

A 4 Zonguldak: Forstamt Yenice, Revier Çitdere, 1500 m,
19.7.1985, Öz.

GRAMINEAE (9:158)

Aegilops columnaris Zhukovsky (9:243):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-17, Bu.

A. markgrafii (Greuter) Hammer (9:236):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-15, Bu.

A. neglecta Req.ex Bertol. (9:244):

C 2 Denizli: Acığöl, NW-Ufer, 750 m, 64-48-5,
det. DAVIS.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. (9:569):

A 5 Çorum: 24 km SW von Sungurlu, 670 m, 77-63-5,
det. KIT TAN.

Agropyron cristatum (L.) Gaertner ssp. incanum (Náb.)

Melderis (9:205):

B 10 Van: 41 km NE von Çaldıran, 2800 m, 81-14-4,
det. MELDERIS.

Agrostis canina L. (9:349):

A 9 Kars: Umgebung von Ardahan, 1700 m, 82-94-63, So&Bu.

A. capillaris L. var. capillaris (9:352):

A 9 Çoruh: 20 km E von Şavşat, 1950 m, 81-70-10, det.
DOĞAN.

A. olympica (Boiss.) Bor (9:349):

B 9 Van: 1,5 km SW der Paßhöhe zwischen Başkale und
Güzelso, 2700 m, 82-58-29, So.& Bu.

A. planifolia C. Koch (9:350):

Rar!

A 8 Çoruh: Alm oberhalb von Sarigöl, SE des Kaçkar-
Hauptkammes, 2000 m, 82-84-50, So.& Bu.

Aira elegantissima Schur ssp. ambigua (Arc.) M.Doğan

(9:338):

A 4 Kastamonu: 39 km E von Karabük, 500 m, 69-9-8.

Alopecurus aequalis Sobol. (9:375):

B 9 Ağrı: Balık Gölü, SW-Ufer, 2300 m, 83-32-16.

A. aucheri Boiss. (9:380):

C 7 Adiyaman: Nemrut Da., 2100 m, 80-25-15, det. DOĞAN.

A. myosuroides Hudson var. myosuroides (9:384):

A 9 Kars: Umgebung von Posof, 1600 m, 82-106-56, So&Bu.

A. textilis Boiss. ssp. *textilis* (9:379):

A 6 Sivas: Yildiz Da., 2100 m, 76-8-56, det. DOĞAN.

A. utriculatus Sol. ssp. *anthoxanthoides* (Boiss.)M.Doğan
(9:385):

C 4 İçel: 17 km W von Silifke, 50 m, 85-41-28, So.& Ma.

Amblyopyrum *muticum* (Boiss.)Eig var. *loliaceum* (Jaub.&
Spach)Eig (9:233):

B 1 Çanakkale: 50 km W von Edremit, 500 m, 64-71-17;

C 2 Denizli: 10 km N von Denizli, 300 m, 65-14-47.

Anthoxanthum *odoratum* L. ssp. *alpinum* A.& D.Löve (9:372):

A 2 Bursa: 25 km E von Bursa, 300 m, 63-51-50;

A 9 Çoruh: 20 km E von Şavşat, 1950 m, 81-74-56.

A. odoratum L. ssp. *odoratum* (9:371):

A 8 Rize: Paßhöhe zwischen İkizdere und İspir, 2600 m,
82-119-51, So.& Bu.

Apera *intermedia* Hackel (9:347):

A 4 Ankara: 26 km N von Kızılıcahamam, 1550 m, 77-52-38;

C 2 Denizli: Pamukkale, 400 m, 66-6-10;

C 6 Adana: 25 km NE von Feke, 1200 m, 77-26-13.

A. spica-venti (L.)P.Beauv. (9:346):

B 1 Çanakkale: 37 km S von Çanakkale, 100 m, 64-72-10.

Arrhenatherum *kotschyi* Boiss. (9:315):

B 9 Van: 20 km E von Erciș, 2000 m, 82-43-81, So.& Bu.

Avena *sterilis* L. ssp. *sterilis* (9:306):

A 1 Çanakkale: 25 km N von Gelibolu, 5 m, 68-2-40.

A. wiestii Steudel (9:304):

C 7 Adiyaman: Eskikahhta, Burg, 900 m, 73-28-4.

Brachiaria *eruciformis* (Sm.)Griseb. (9:590):

A 3 Zonguldak: 25 km N von Devrek, 250 m, B 83-64-5, Bu.

Briza *media* L. (9:516):

A 9 Çoruh: 20 km E von Şavşat, 2100 m, 81-74-20, det.

DAVIS.

B. minor L. (9:518):

C 1 Muğla: zwischen Bodrum und Ortakent, 100 m,
84-10-8, So. et al.

Bromus cappadocicus Boiss. & Bal. ssp. cappadocicus (9:294):

- A 6 Sivas: Yıldız Da., 1700 m, 76-8-58; - B 4 Ankara:
15 km W von Kirikkale, 1000 m, 64-16-41, det. SMITH.
- B. commutatus Schrader (9:278):
B 9 Bitlis: W von Adilcevaz, 1660 m, 84-37-8, So. & Mi.
- B. hordaceus L. ssp. hordaceus (9:279):
B 9 Bitlis: 10 km S von Bitlis, 1500 m, 84-42-8,
So. & Mi., det. SMITH.
- B. japonicus Thunb. ssp. japonicus (9:282):
B 3 Kütahya: 50 km NW von Afyon, 1000 m, 63-46-44,
det. SCHOLZ.
- B. riparius Rehm. (9:296):
A 4 Ankara: 36 km NW von Ankara, 900 m, 62-80-27;
B 9 Van: 20 km E von Erciş, 2050 m, 82-43-9, So. & Bu.
- B. squarrosus L. (9:284):
C 3 Isparta: 17 km SW von Şarkikaraağaç, 1400 m,
66-44-149, det. SMITH.
- B. sterilis L. (9:289):
A 5 Çorum: Boğazkale, Hattusas, 1000 m, 71-7-46,
det. SMITH; - C 1 Muğla: NE von Knidos, 200 m, 84-4-14,
So. et al.
- B. tectorum L. (9:288):
A 4 Ankara: 26 km N von Kızılıcahamam, 1550 m, 77-52-17,
det. SCHOLZ.
- B. variegatus Bieb. ssp. villosulus (Steudel) P.M. Smith
(9:299):
A 8 Erzurum: Dumlu Da., 30 km Luftlinie N von Erzurum,
2650 m, 82-123-66, So. & Bu.; - B 9 Ağrı: Balık Gölü,
SW-Ufer, 2250 m, 83-32-18, det. FITZ.
- Calamagrostis epigejos (L.) Roth (9:342):
B 8 Erzurum: 16 km N von Hacıömer, 1500 m, 82-77-15,
So. & Bu.
- C. pseudophragmites (Haller fil.) Koeler (9:343):
A 9 Kars: Umgebung von Ardahan, 1700 m, 82-97-11,
So. & Bu.; - C 4 İçel: 12 km S von Mut, Göksu-Ufer,
200 m, 66-20-11, det. DOĞAN.

Catabrosia aquatica (L.)P.Beauv. var. aquatica (9:499):

C 9 Hakkari: 2 km NW von Hakkarı, 2000 m, 81-27-13,
det. MILL.

Cornucopiae cucullatum L. (9:387):

C 5 Hatay: Umgebung von Samandağ, 30 m, 85-6-5, So.& Ma.

Crypsis aculeata (L.)Aiton (9:586):

B 5 Kayseri: SE von Yesilhisar, 1050 m, 84-117-9.

C. schoenoides (L.)Lam. (9:585):

B 5 Kayseri: SE von Yesilhisar, 1050 m, 84-117-12.

Cynodon dactylon (L.)Pers. var. dactylon (9:580):

B 9 Van: Bendimahi, Campingplatz, 1700 m, 81-7-5;

C 2 Denizli: E von Pamukkale, 400 m, 67-40-11;

C 4 İçel: 2 km N von Mut, 290 m, 66-19-36.

Digitaria ciliaris (Retz.)Koeler (9:594): Neu für die
Türkei!

A 8 Çoruh: 10 km oberhalb von Sarigöl, 1600 m, 82-83-8,
So.& Bu., det. SCHOLZ.

D. sanguinalis (L.)Scop. (9:594):

A 4 Zonguldak: İnkum, N von Bartın, 3 m, B 83-73-6, Bu.

Echinaria capitata (L.)Desf. (9:526):

A 4 Ankara: 22 km NW von Ankara, 900 m, 71-6-28.

Echinochloa crus-galli (L.)P.Beauv. (9:591):

A 9 Kars: Çıldır-See, N- und S-Ufer, 1960 m, 82-101-11,
So.& Bu.

Elymus nodosus (Nevski)Melderis ssp. sinuatus (Nevski)

Melderis (9:216):

B 10 Ağrı: 15 km N von Doğubayazit, 1750 m, 83-38-13,
det. MELDERIS.

E. repens (L.)Gould ssp. elongatiformis (Drobov)Melderis
(9:221):

A 10 Kars: zwischen Orta Alicant und der russischen
Grenzstation, 800 m, 84-72-57, So. et al.

Eragrostis cilianensis (All.)Vign.-Lut.ex Janchen (9:574):

C 1 Muğla: NW von Güllük, 40 m, 86-25-14.

E. pilosa (L.)P.Beauv. (9:573):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-19, Bu.

Eremopyrum bonaepartis (Sprengel)Nevski ssp. bonaepartis
(9:228):

A 4 Ankara: 22 km NW von Ankara, 900 m, 71-6-32, det.
MELDERIS; - B 5 Kayseri: 45 km SW von Kayseri, 1000 m,
64-28-11, det. MELDERIS.

Gaudiniopsis macra (Bieb.)Eig ssp. macra (9:319):

C 3 Isparta: 17 km SW von Şarkikaraağaç, 1300 m,
66-44-144, det. DOĞAN; - C 4 Konya: 20 km NW des Ser-
tavul-Passes, 1300 m, 66-35-35, det. DOĞAN.

Hainardia cylindrica (Willd.)Greuter (9:522):

C 1 Muğla: Strand W von Knidos, 5 m, 84-6-15, So. et al.

Helictotrichon planiculme (Schrader)Besser ex Schultes &
Schultes fil. (9:312):

B 9 Van: S-Fuß des Tendurek Da., 2700 m, 82-65-20,
So.& Bu.

H. pratense (L.)Besser ex Schultes & Schultes fil. (9:311):

B 9 Van: Paßhöhe zwischen Başkale und Güzelsu, 2790 m,
82-57-35, So.& Bu.

H. versicolor (Vill.)Schultes & Schultes fil. (9:312):

A 3 Bolu: Körroğlu Tepe, 2378 m, B 83-70-24, Bu.;
A 9 Çoruh: 21 km E von Şavşat, 2400 m, 81-79-22.

Henrardia persica (Boiss.)C.E.Hubbard var. *glaberrima*
(Hausskn.ex Bornm.)C.E.Hubbard (9:272):

C 5 Niğde: 5 km W von Ulukışla, 1300 m, 62-65-7.

H. persica (Boiss.)C.E.Hubbard var. *persica* (9:271):

C 5 Niğde: 5 km W von Ulukışla, 1300 m, 62-65-9, det.
MELDERIS.

Hordeum murinum L. ssp. *leporinum* (Link)Arc. var.

leporinum (9:266):

A 4 Ankara: 22 km NW von Ankara, 900 m, 73-40-18,
det. MELDERIS.

Imperata cylindrica (L.)Raeuschel var. *cylindrica* (9:603):

C 2 Denizli: Pamukkale, zwischen den Ruinen, 400 m,
63-15-33.

Koeleria eriostachya Pančić (9:331):

B 9 Van: Güzeldere Geçidi, 36 km NW von Başkale,
2790 m, 81-35-4.

K. nitidula Velen. (9:331):

B 9 Van: zwischen Bendimahi und Vansee, 1700 m,
81-40-12, det. DOĞAN; - C 4 Konya: 20 km NW des Ser-
tavul-Passes, 1300 m, 66-35-37.

Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev ssp. sabulosus (Bieb.)

Tzvelev (9:260):

B 5 Kayseri: 15 km NE von Yeşilhisar, 1100 m, 84-113-2.

Lolium persicum Boiss. & Hohen. ex Boiss. (9:449):

C 4 Içel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-21, So.& Ma.

L. rigidum Gaudin var. rigidum (9:450):

A 3 Bolu: 26 km W von Gerede, 1000 m, 71-2-29;

C 2 Muğla: 20 km W von Marmaris, 100 m, 82-17-32,
So. et al., det. MILL.

C 4 Içel: 12 km N von Silifke, 300 m, 71-26-9.

Milium effusum L. (9:361):

B 2 Izmir: Boz Da., SE von der Ortschaft, 1500 m,
68-16-86.

M. vernale Bieb. ssp. vernale (9:362):

C 3 Isparta: Çiçek Da., 1450 m, 67-5-106.

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubbard (9:520):

C 4 Içel: S von Silifke bei Kurtuluş, 5 m, 85-52-22,
So. & Ma.

Phalaris paradoxa L. (9:370):

C 2 Denizli: 10 km N von Denizli, 300 m, 65-14-37;

C 4 Içel: 2 km N von Mut, 290 m, 66-18-7.

Phleum bertolonii DC. (9:391):

A 9 Kars: Kuyucuk-See, N-Ufer, 1800 m, 81-49-8, det.
DOĞAN.

P. boissieri Bornm. (9:397):

C 4 Konya: 16 km N von Konya, 1200 m, 66-38-55;

C 7 Adiyaman: 25 km E von Kahta, 700 m, 80-27-65, det.
DOĞAN.

P. montanum C.Koch ssp. *montanum* (9:394):

B 8 Erzurum: Paßhöhe zwischen Varto und Hinis, 2000 m,
78-79-22.

P. montanum C.Koch ssp. *serrulatum* (Boiss.)M.Doğan (9:394):

B 8 Muş: Paßhöhe NE von Varto, 2025 m, 82-75-17, So.&Bu.

P. paniculatum Hudson ssp. *ciliatum* (Boiss.)M.Doğan
(9:393):

B 9 Van: Fuß des Süpan Da., bei Göldüzu, 1660 m,
84-32-17, So.& Mi.

Poa cenisia All. (9:478):

A 3 Bolu: Körögöl Tepe, 2378 m, B 83-70-23, Bu.

P. diversifolia (Boiss.& Bal.)Hackel ex Boiss. (9:480):

A 4 Ankara: 22 km NW von Ankara, 900 m, 73-40-11,
det. EDMONDSON.

P. sterilis Bieb. (9:482):

A 4 Bolu: 34 km SE von Gerede, 1500 m, 62-82-31, det.
EDMONDSON; - B 10 Van: 41 km NE von Çaldiran, 2800 m,
81-14-15, det. EDMONDSON.

P. timoleontis Heldr.ex Boiss. (9:484):

A 8 Erzurum: Dumlu Da., 30 km Luftlinie N von Erzurum,
2650 m, 82-123-65, So.& Bu.

Rostraria berythea (Boiss.& Bal.)Holub (9:327):

C 2 Denizli: N von Pamukkale, 450 m, 63-16-68.

R. cristata (L.)Tzvelev var. *cristata* (9:328):

C 4 İçel: 3 km N von Silifke, 200 m, 77-15-7, det.
DOĞAN; - C 7 Adiyaman: 25 km E von Kahta, 700 m,
80-27-23, det. DOĞAN.

Scolochloa festucacea (Willd.)Link (9:399) Rar!

A 9 Kars: 8 km E von Ardahan, 1930 m, 82-98-8,
So.& Bu., det. MARKGRAF-DANNENBERG.

Sorghum halepense (L.)Pers. var. *muticum* (Hackel)Grossh.
(9:607):

A 10 Kars: zwischen Orta Alican und der russischen
Grenzstation, 800 m, 84-72-114, So.et al.

Sphenopus divaricatus (Gouan)Reichb. (9:468): Rar!

C 4 İçel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-23,
So.& Ma.

Taeniatherum caput-medusae (L.)Nevski ssp. asper (Simon-kai)Melderis (9:270):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-20, Bu.

T. caput-medusae (L.)Nevski ssp. crinitum (Schreber) Melderis (9:270):

A 1 Edirne: 50 km NW von Gelibolu, 300 m, 66-2-4;

C 1 Izmir: N von Kuşadası, 80 m, 64-59-39;

C 2 Antalya: Yumru Da., 1700 m, 63-31-11;

C 3 Konya: 2 km NE von Beyşehir, 1120 m, 64-39-17.

Tragus racemosus (L.)All. (9:587):

A 3 Zonguldak: 20 km SW von Zonguldak, 50 m,

B 83-58-10, Bu.

Trisetum sibiricum Rupr. (9:322):

A 8 Erzurum: 70 km NW von Erzurum, 2200 m, 82-122-42,

So.& Bu.; - B 9 Ağrı: Balık Gölü, SW-Ufer, 2700 m,

83-37-27; - B 10 Van: 30 km NE von Çaldırın, 2400 m,

82-47-43.

T. thospiticum Chrtek (9:322):

A 8 Çoruh: Alm SE des Kaçkar-Hauptkammes, 2500 m,

82-85-70, So.& Bu.

Ventenata dubia (Leers)Cosson (9:317):

B 9 Van: 10 km N von Muradiye, 1900 m, 83-48-10.

Vulpia ciliata Dumort ssp. ciliata (9:457):

B 9 Van: 25 km SW von Erciș, 1650 m, 84-36-4, So.& Mi.

V. unilateralis (L.)Stace (9:458):

B 5 Nevşehir: 8 km E von Ürgüp, 1200 m, 64-32-97,
det. STACE.

Zingeria biebersteiniana (Claus)P.Smirnov ssp. trichopoda (Boiss.)R.Mill (9:365):

B 8 Muş: Buglan Geçidi, 1640 m, 81-6-9.

Z. pisidica (Boiss.)Tutin (9:363):

B 8 Erzurum: 48 km N von Hinis, 1500 m, 82-77-16,
So.& Bu.

GUTTIFERAE (2:355)

- Hypericum russeggeri (Fenzl) R.Keller (2:370): Rar!
C 5 Hatay: NW von Samandag, 100 m, 85-8-9, So.& Ma.
H. sorgerae N.Robson (-:-): Neu für die Türkei!
B 6 Sivas: 18 km S von Zara, 1500 m, 69-37-26.
H. thymifolium Banks & Sol. (2:383):
C 5 Hatay: NW von Samandag, 5 m, 85-8-8, So.& Ma.

HALORAGIDACEAE (4:197)

- Myriophyllum spicatum L. (4:197):
C 1 Muğla: Bafasee, SW-Ufer, 0 m, 86-24-20.

ILLECEBRACEAE (2:245)

- Herniaria glabra L. (2:246):
C 6 Hatay: W von Serinyol, Kizil Da., 400 m, So.& Ma.
H. hirsuta L. (2:248):
A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-26, Bu.
C 4 Içel: 15 km NW von Silifke, 50 m, 85-48-22, So.& Ma.

IRIDACEAE (8:381)

- Crocus biflorus Miller ssp. isauricus (Siehe ex Bowles)
Mathew (8:423):
C 6 Maraş: 31 km SE von Göksun, 2000 m, 83-24-3.
C. biflorus Miller ssp. tauri (Maw) Mathew (8:424):
B 9 Bitlis: Nemrut Da., SW des Kratersees, 2350 m,
84-50-1, So.& Mi.

Gladiolus atroviolaceus Boiss. (8:448):

A 9 Kars: 45 km S von Posof, 1900 m, 82-105-5, So.& Bu.;
C 3 Isparta: E von Yenişarbademli, 1250 m, 67-13-7,
det. KIT TAN.

G. italicus Miller (8:443):

C 1 Izmir: 7 km N von Kuşadası, 30 m, 82-6-21, det.
KIT TAN.

G. kotschyanus Boiss. (8:444):

A 3 Bolu: 26 km W von Gerede, 1000 m, 71-2-32, det.
KIT TAN.

Iris germanica L. (8:392):

C 2 Antalya: NE von Kaş, 400 m, 84-15-15, So. et al.

I. pseudacorus L. (8:387):

A 3 Bolu: 26 km W von Gerede, 1000 m, 71-2-33, det.
MATHEW.

I. sari Schott ex Baker (8:400):

A 9 Kars: S der Bahnstation Başgedikler, 1800 m,
81-52-43.

I. schachtii Markgraf (8:395):

C 3 Isparta: 17 km SW von Şarkikarağaaç, 1400 m,
66-44-56.

Romulea columnae Seb. & Mauri ssp. columnae (8:441):

A 1 Çanakkale: 40 km NE von Eçeabat, 50 m, 82-1-18,
So. et al., det. MARAIS.

R. ramiflora Ten. ssp. ramiflora (8:440):

A 1 Çanakkale: 40 km NE von Eçeabat, 50 m, 82-1-19,
So. et al., det. MARAIS.

R. tempskyana Freyn (8:440):

C 1 Izmir: 5 km SE von Selçuk, 250 m, 82-11-47,
So. et al., det. MARAIS.

LABIATAE (7:36)

Clinopodium vulgare L. ssp. arundinum (Boiss.) Nyman (7:330):

B 8 Muş: Paßhöhe NE von Varta, 2000 m, 82-75-18, So. & Bu.

Lamium cariense R.Mill (7:129):

C 6 Hatay: Harbiye, 200 m, 85-38-4, So.& Ma.

L. purpureum L. var. purpureum (7:141):

C 6 Hatay: 8 km SE von Samandağ, 60 m, 85-11-11, So.& Ma.

L. veronicifolium Bentham (7:135): Rar!

A 3 Bolu: Köroğlu Tepe, 2378 m, B 83-70-30, Bu.

Phlomis sintenisii Rech.fil. (7:121):

B 9 Van: 5 km W von Gevaş, 1700 m, 78-91-10.

Salvia aethiopis L. (7:440):

C 6 Maraş: 31 km SE von Göksun, 1600 m, 83-23 14.

Satureja thymbra L. (7:315):

C 5 Hatay: 10 km S von Uluçinar, 10 m, 85-24-8, So.& Ma.

Scutellaria altissima L. (7:81):

A 9 Çoruh: 20 km E von Şavşat, 1950 m, 81-70-16.

S. galericulata L. (7:80):

B 9 Van: 10 km N von Muradiye, 1900 m, 82-53-13, So.& Bu.

S. hastifolia L. (7:81):

A 9 Kars: Gıldır-See, Ufer, 1950 m, 81-57-28.

Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. var. erythrantha (7:185):

C 4 Içel: 10 km NW von Silifke, 100 m, 71-21-1.

S. germanicopolitana Bornm. ssp. viridis Hausskn. ex Bornm. (7:195):

C 3 Isparta: Dedegöl Da., 1700 m, 65-43-33.

S. montana L. ssp. montana (7:183):

B 1 Çanakkale: 50 km W von Edremit, 500 m, 64-71-4;

B 3 Eskişehir: 3 km W von Sivrihisar, 1100 m, 64-13-7.

S. pisidica Boiss.& Heldr. (7:198):

C 4 Içel: 20 km W von Silifke, 150 m, 77-21-14.

Stachys cretica L. ssp. anatolica Rech.fil. (7:220):

B 8 Muş: 40 km SE von Varto, 2000 m, 82-74-17, So.& Bu.

S. iberica Bieb. ssp. stenostachya (Boiss.)Rech.fil.

(7:245):

A 9 Kars: 10 km S von Sarıkamış, 2200 m, 81-56-20.

- S. lavandulifolia Vahl var. *lavandulifolia* (7:240):
A 6 Sivas: 26 km SW von Suşehri, 1600 m, 69-34-18,
det. BHATTACHARJEE; - B 3 Isparta: 34 km NW von Sarki-
karaağaç, 1400 m, 67-2-3, det. BHATTACHARJEE; - C 7
Adiyaman: Nemrut Da., 2140 m, 73-29-36, det. MILL.
- S. macrostachya (Wend.)Briq. (7:261):
A 4 Zonguldak: Forstamt Karabük, Revier Keltepe,
S-Hang, 1250 m, 18.7.1985, Öz.
- S. melampyroides Hand.-Mazz. (7:256):
C 9 Siirt: 20 km NE von Cizre, 700 m, 83-12-4.
- S. officinalis (L.)Trevisan ssp. *officinalis* (7:261): Rar!
A 9 Kars: 30 km W von Çıldır, 1900 m, 82-99-13, So.& Bu.
- S. palustris L. (7:231):
A 2 Bursa: 4 km S von Uluabat, 2 m, 77-8-44.
- S. petrokosmos Rech.fil. (7:226): Rar!
C 5 Hatay: NW von Samandağ, Küste, 70 m, 85-8-11, So.& Ma.
- S. spinulosa Sm. (7:252):
C 1 Muğla: zwischen Knidos und Datça, 150 m, 84-8-24,
So. et al.
- Teucrium *brevifolium* Schreber (7:57):
C 2 Antalya: 5 km W von Kaş, 30 m, 67-33-3.
- T. chamaedris L. ssp. *chamaedris* (7:63):
A 8 Çoruh: Alm SE des Kaçkar-Hauptkammes, 2000 m,
82-84-65, So.& Bu.
- T. chamaedris L. ssp. *sinuatum* (Celak.)Rech.fil. (7:65):
C 3 Isparta: Ayvalı Çay, NE von Anamas, 1500 m,
68-37-63.
- T. chamaedris L. ssp. *sysspirense* (C.Koch)Rech.fil. (7:65):
C 9 Van: 78 km S von Gürpinar, 2250 m, 84-79-6, So. et al.
- T. chamaedris L. ssp. *trapezunticum* Rech.fil. (7:64):
A 9 Kars: Umgebung von Posof, 1600 m, 82-106-68,
So.& Bu.; - B 9 Van: 2 km S von Çaldiran, 2200 m,
82-60-14, So.& Bu.
- T. lamiifolium d'Urv. ssp. *stachyophyllum* (P.H.Davis)
Hedge & Ekim (7:74):
C 4 Içel: W von Anamur, Felswand, 100 m, 1978:7-27-10,
Hübl, Meusel u. Valant-Vetschera.

T. orientale L. var. orientale (7:59):

A 6 Sivas: 26 km SW von Suşehri, 1600 m, 69-34-29,
det. EKIM; - A 9 Kars: 10 km S von Sarıkamış, 2200 m,
81-56-21.

T. parviflorum Schreber (7:61):

C 5 Niğde: 3 km S des Çaykavak-Passes, 1400 m,
77-30-10, det. EKIM.

T. scordium L. ssp. scordioides (Schreber)Maire & Petitm.
(7:62):

B 6 Sivas: 11 km N von Sivas, Karacayır, 1300 m,
77-109-14, det. EKIM; - B 9 Bitlis: 5 km S von Bitlis,
1400 m, 77-94-15, det. EKIM.

Thymus cherlerioides Vis. var. cherlerioides (7:355):

B 4 Konya: 48 km NE von Konya, 1100 m, 70-41-4, det.
JALAS.

T. fallax Fisch. & Mey. (7:367):

A 9 Kars: S der Bahnstation Başgedikler, 1800 m,
81-52-36.

T. kotschyanus Boiss. & Hohen. var. eriophorus (Ronniger)
Jalas (7:370):

B 9 Bitlis: Nemrut Da., N Kraterrand, 2250 m, 83-54-14;
B 10 Van: 30 km NE von Çaldıran, 2600 m, 81-44-27.

T. leucostomus Hausskn. & Velen. var. argillaceus Jalas
(7:374):

A 4 Ankara: 36 km NW von Ankara, 900 m, 62-80-23, det.
JALAS.

T. longicaulis C.Presl ssp. longicaulis var. subisophyllus
(Borbás)Jalas (7:379):

A 5 Sinop: 20 km N von Boyabat, 1400 m, 69-17-7, det.
JALAS.

T. parnassicus Hal. (7:356):

A 6 Sivas: Kunduz Dere, 36 km NE von Sivas, 1900 m,
69-53-14, det. JALAS.

T. sipyleus Boiss. ssp. rosulans (Borbás)Jalas (7:372):

A 3 Ankara: 2 km E von Nallıhan, 700 m, 73-43-6, det.
JALAS; - C 3 Antalya: 29 km SW von Korkuteli, 1150 m,
65-23-9.

T. zygiodes Griseb. var. zygiodes (7:364):

B 1 Çanakkale: 46 km S von Çanakkale, 200 m, 84-1-6.

LEGUMINOSAE (3:1)

Adenocarpus complicatus (L.)Gay (3:34):

A 3 Zonguldak: 10 km S von Zonguldak, 300 m,

B 83-62-1, Bu.

Astragalus epiglottis L. (3:60): Rar!

C 4 İçel: 17 km W von Silifke, 60 m, 85-41-36, So.& Ma.

A. karamasicus Boiss. & Bal. (3:206):

A 3 Bolu: 15 km W von Kibrisçik, 1100 m, B 83-69-9, Bu.

A. lineatus Lam. var. lineatus (3:193):

A 4 Kastamonu: Ilgaz Da., 2500 m, B 83-80-24, Bu.

A. ponticus Pall. (3:184):

C 9 Van: 83 km S Gürpinar, 2800 m, 84-78-21, So. et al.

A. viridis Bunge (3:244): Rar!

A 9 Kars: 17 km W von Kağızman, 1250 m, 84-62-21,

So. et al.

Chamaecytisus hirsutus (L.)Link (3:17):

C 1 Aydin: Samsundağ, 200 m, 86-19-10.

C. pygmaeus (Willd.)Rothm. (3:20):

C 3 Isparta: Dedegöl Da., 1700 m, 66-46-6, det.

BROWICZ.

Lathyrus aphaca L. var. affinis (Guss.)Arc. (3:367):

C 4 İçel: 45 km W von Silifke, 5 m, 85-54-5, So.& Ma.

L. blepharicarpus Boiss. (3:360):

C 2 Antalya: NE von Kaş, 400 m, 84-15-16, So. et al.

L. saxatilis (Vent.)Vis. (3:351):

C 1 Muğla: zwischen Knidos und Datça, 150 m, 84-8-33,

So. et al.; - C 3 Antalya: Kumluca, 50 m, B 83-25-3, Bu.

Lens culinaris Medik. (3:327):

C 4 İçel: 5 km E von Ovaçık, 50 m, 85-56-30, So.& Ma.

Lotus edulis L. (3:520):

C 2 Muğla: Marmaris, 10 m, B 83-1-2, Bu.

L. halophilus Boiss. & Sprun. var. halophilus (3:522):

C 2 Antalya: 20 km S von Eşen, NW von Kaş, 400 m,
84-14-6, So. et al.

L. palustris Willd. (3:524):

C 1 Muğla: bei Herakleia, 20 m, 86-23-5.

Lupinus micranthus Guss. (3:39):

B 1 Izmir: zwischen Foça und Yenifoça, 50 m, 85-69-11,
So. & Ma.; - C 4 Antalya: 49 km W von Anamur, 30 m,
85-59-9, So. & Ma.

Melilotus messanensis (L.) All. (3:449):

C 6 Hatay: 23 km E von Antakya in Richtung Reyhanli,
70 m, 85-20-9, So. & Ma.

M. sulcata Desf. (3:449):

C 3 Antalya: 10 km E von Finike, 5 m, B 83-24-9, Bu.

Ononis natrix L. ssp. natrix (3:376):

C 4 Içel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-31,
So. & Ma.

Pisum fulvum Sibth. & Sm. (3:372):

C 4 Içel: 5 km E von Ovaçık, 100 m, 85-56-34, So. & Ma.

Sophora alopecuroides L. var. alopecuroides (3:11):

A 9 Kars: 17 km W von Kağızman, 1350 m, 84-62-22,
So. et al.

Trifolium alexandrinum L. (3:438):

C 4 Içel: 17 km W von Silifke, 50 m, 85-41-42, So. & Ma.

T. campestre Schreb. forma lagrangei Boiss. (3:404):

C 4 Antalya: 49 km W von Anamur, 60 m, 85-59-10, So. & Ma.

T. echinatum Bieb. (3:442):

C 7 Adiyaman: 25 km E von Kahta, 700 m, 80-27-36.

T. leucanthum Bieb. (3:441):

A 3 Bolu: N von Kibrışçık, 1100 m, B 83-71-26, Bu.

T. resupinatum L. var. microcephalum Zoh. (3:412):

C 3 Antalya: 10 km E von Finike, 5 m, B 83-24-11, Bu.

T. rytidosemium Boiss. & Hohen. var. rivulare (Boiss. &
Bal.) Zoh. (3:401):

C 9 Van: 94 km S von Gürpinar in Richtung Yalınça,
2500 m, 84-77-10.

T. spumosum L. (3:407):

C 4 İçel: 17 km W von Silifke, 50 m, 85-41-41, So.& Ma.

T. striatum L. (3:426):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-32, Bu.

Trigonella *crassipes* Boiss. (3:471):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-33, Bu.

Vicia *articulata* Hornem. (3:295):

B 2 Manisa: 5 km W von Alaşehir, 100 m, B 83-48-3, Bu.

V. bithynica L. (3:321):

C 1 Muğla: NW von Bodrum, zwischen Ortakent und Dağbelen, 200 m, 84-11-34, So. et al.

V. cuspidata Boiss. (3:317):

C 6 Hatay: Bereich von Şenköy, 500 m, 85-4-28, So.& Ma.

V. laxiflora Brot. (3:300):

C 4 İçel: 22 km W von Silifke, 300 m, 85-53-12, So.& Ma.

V. lutea L. var. *hirta* (Balbis)Lois. (3:311):

C 2 Antalya: Kale, 10 m, B 83-23-7, Bu.

V. narbonensis L. var. *serratifolia* (Jacq.)Ser. (3:322):

C 4 İçel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-32, So.& Ma.

LILIACEAE (8:67)

Allium *akaka* S.G.Gmelin (8:196):

B 10 Van: 32 km NE von Çaldiran, 2400 m, 81-16-1.

A. armenum Boiss.& Kotschy (8:155):

C 8 Mardin: 6 km E von Mardin, 1300 m, 83-9-23.

A. callidictyon C.A.Meyer (8:128):

B 4 Ankara: Gölbaşı, 17.7.1960, Fitz.

A. flavum L. var. *tauricum* Besser ex Reichb. (8:150):

B 9 Van: 3 km SW von Çaldiran, 2250 m, 81-38-1.

A. gayi Boiss. (8:120):

C 4 İçel: 37 km NW von Silifke in Richtung Mut, 400 m, 85-49-9, So.& Ma.

A. huber-morathii Kollmann, Özhata & Koyunçu (8:156):

A 3 Bolu: 15 km W von Kibrisçik, 1100 m, B 83-69-10, Bu.

- A. macrochaetum Boiss. & Hausskn. ssp. macrochaetum (8:170):
B 9 Van: 2 km SW von Çaldiran, 2230 m, 82-45-33, So&Bu.
- A. paniculatum L. ssp. paniculatum (8:139):
A 9 Kars: 11 km S von Posof, 1500 m, 82-108-14, So&Bu.
- A. pseudoflavum Vved. (8:151):
B 8 Muş: Paßhöhe NE von Varto, 2025 m, 82-75-5, So.&Bu.;
C 10 Hakkari: 3 km E der Abzweigung Yüksekova-Hakkari,
1700 m, 81-22-1.
- A. pustulosum Boiss. & Hausskn. (8:170):
A 9 Kars: S der Bahnstation Başgedikler, 1800 m, 81-52-5.
- A. roseum L. (8:123):
A 8 Çoruh: Alm SE des Kaçkar-Hauptkammes, 2000 m,
82-85-97, So.& Bu.
- A. sivasicum Özhataj & Kollmann (8:137):
C 6 Gaziantep: 3 km NW von Halfeti, 500 m, 83-5-9.
- A. stearnianum Koyunçu, Özhataj & Kollmann ssp. vanense
Kollmann & Koyunçu (8:171):
B 10 Van: 30 km NE von Çaldiran, 2400 m, 82-47-65,
So.& Bu.
- A. vienale L. (8:185):
A 8 Çoruh: 26 km E von Demirkent, 2100 m, 81-81-2;
A 9 Kars: Umgebung von Ardahan, 1750 m, 82-94-83, So.&Bu.
- A. wendelboanum Kollmann (8:136): Rar!
C 6 Gaziantep: 3 km NW von Halfeti, 500 m, 83-5-6.
- A. zebdanense Boiss. & Noe (8:121):
A 8 Çoruh: Alm SE des Kaçkar-Hauptkammes, 2000 m,
82-84-71, So.& Bu.
- Asparagus aphyllus L. ssp. orientalis (Baker)P.H.Davis
(8:77):
C 1 Muğla: zwischen Knidos und Datça, 150 m, 84-8-34,
So.et al.
- Bellevalia modesta Wendelbo (8:271):
C 4 İçel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-34, So.&Ma.
- B. trifoliata (Ten.) Kunth (8:266):
C 6 Hatay: 8 km SE von Samandağ, 60 m, 85-11-14, So.&Ma.

Eremurus spectabilis Bieb. (8:87):

B 10 Van: 30 km NE von Çaldiran, 2500 m, 84-35-15,
So.& Mi.

Gagea chrysantha (Jan)Schultes & Schultes fil. (8:319):

A 4 Ankara: 26 km N von Kizilcahamam, 1550 m, 71-3-57,
det. RIX.

G. foliosa (J.& C.Presl)Schultes & Schultes fil. (8:323):

C 4 Konya: Sertavul Geçidi, 1610 m, 85-50-3, So.& Ma.

G. juliae Pascher (8:325):

C 6 Hatay: 16 km S von Antakya, Ziyaret Da., 800 m,
85-12-2, So.& Ma.

G. luteoides Stapf (8:321):

B 5 Kayseri: Erciyas Da., 2700 m, 77-76-14, det. RIX.

G. peduncularis (J.& C.Presl)Pascher (8:324):

B 3 Afyon: NW von Dinar, SE von Gümüşsu, 900 m,
84-23-4, So.et al.

G. taurica Steven (8:315):

B 10 Van: 41 km NE von Çaldiran, "Araratblick", 2850 m,
84-33-8, So.& Mi.

Hyacinthus orientalis L. ssp. chionophilus Wendelbo (8:264):

C 7 Adiyaman: Nemrut Da., 2100 m, 80-25-6, det. WENDELBO.

Muscari comosum (L.)Miller (8:250):

B 1 Izmir: zwischen Foça und Yenifoça, 50 m, 85-69-13,
So.& Ma.

M. longipes Boiss. (8:253):

A 9 Kars: Kuyucuk-See, N-Ufer, 1800 m, 81-49-4, det.

MILL; - B 9 Muş: 10 km W von Malazgirt, 1400 m,
82-68-2, So.& Bu.

M. neglectum Guss. (8:257):

A 4 Ankara: 26 km N von Kizilcahamam, 1550 m, 70-5-116.

Ornithogalum arcuatum Steven (8:234):

A 8 Çoruh: 26 km E von Demirkent, 2100 m, 81-81-61,
det. MILL.

O. lanceolatum Labill. (8:234):

C 1 Izmir: 5 km SE von Selçuk, 200 m, 82-11-39,
So. et al., det. MILL.

O. montanum Cyr. (8:236):

A 9 Kars: Umgebung von Ardahan, 1750 m, 82-97-14, So. & Bu.

O. narbonense L. (8:233):

A 3 Bolu: Bolu Da., W von der Abzweigung zum Abantsee,
750 m, 70-3-29.

O. oligophyllum E.D.Clarke (8:235):

A 1 Edirne: 20 km SE von Edirne, 50 m, 63-58-11;
B 1 Balikesir: 9 km E von Burhaniye, 100 m, 82-31-16,
So. et al., det. MILL.

O. sphaerocarpum Kerner (8:233):

C 1 Muğla: 19 km E von Datça, 250 m, 82-24-25, So. et al.,
det. MILL.

O. ulophyllum Hand.-Mazz. (8:237):

C 7 Urfa: 15 km E von Birecik, 600 m, 80-15-46.

O. wiedemannii Boiss. (8:238):

A 9 Kars: Umgebung von Ardahan, 1750 m, 82-97-14,
So. & Bu.

Polygonatum *orientale* Desf. (8:83):

A 9 Kars: Umgebung von Posof, 1650 m, 82-106-78, So. & Bu.

Puschkinia *scilloides* Adams (8:227):

A 8 Çoruh: Alm SE des Kaçkar-Hauptkammes, 2500 m,
82-85-102, So. & Bu.

Scilla *bithynica* Boiss. (8:217):

C 4 İçel: 15 km NW von Silifke, 85-48-26, So. & Ma.

Smilax *aspera* L. (8:71):

C 4 İçel: 10 km NW von Silifke, 100 m, 71-21-5.

LORANTHACEAE (7:546)

Viscum *album* L. ssp. *austriacum* (Wiesb.)Vollman (7:548):

C 3 Antalya: Irmasan-Paß, oberhalb von Akseki, 1500 m,
85-64-3, So. & Ma.

LYTHRACEAE (4:174)

Lythrum thymifolia L. (4:177):

A 3 Bolu: N von Kibrışçık, 1100 m, B 83-71-49, Bu.

L. volgense D.A.Webb (4:178):

A 3 Bolu: N von Kibrışçık, 1100 m, B 83-71-47, Bu.

MALVACEAE (2:401)

Malva parviflora L. (2:407):

C 4 İçel: 17 km W von Silifke, 50 m, 85-41-49, So.& Ma.

MOLLUGINACEAE (2:346)

Glinus lotoides L. (2:346):

A 1 Çanakkale: Umgebung von Çanakkale, Rand eines Reisfeldes, 70 m, 1973, Hutter.

MORACEAE (7:640)

Ficus carica L. ssp. carica (7:643):

C 4 İçel: 5 km E von Ovaçık, 50 m, 85-56-42, So.& Ma.

Morus alba L. (7:641):

C 4 İçel: 5 km E von Ovaçık, 50 m, 85-56-43, So.& Ma.

OLEACEAE (6:145)

Jasminum officinale L. (6:145): Neu für die Türkei!

C 4 İçel: W von Aydincik, 20 m, 85-57-11, So.& Ma.;
det. BROWICZ.

ORCHIDACEAE (8:450)

Dactylorhiza romana (Seb.) Soó ssp. georgica (Kl.) Soó ex Renz & Taub. (8:539):

C 6 Hatay: 1 km N von Yayladağı, 600 m, 85-19-1, So.& Ma.

Serapias vomeracea (Burm.fil.) Briq. ssp. orientalis Greuter (8:504):

C 5 Hatay: 7 km S von Uluçinar, 20 m, 85-23-14, So.& Ma.

OXALIDACEAE (2:488)

Oxalis pes-caprae L. (2:488):

C 4 Içel: Kurtulus, S von Silifke, 5 m, 85-52-36, So.& Ma.

PAPAVERACEAE (1:213)

Corydalis integra Barbey & Major (1:240):

C 6 Hatay: 16 km S von Antakya in Richtung Yeditepe, Ziyaret Da., 800 m, 85-12-3, So.& Ma.

Fumaria capreolata L. (1:244):

C 2 Antalya: Halbinsel SSE von Kaş, 100 m, 84-16-25, So. et al.

F. densiflora DC. (1:245):

B 2 Denizli: 15 km SE von Sarigöl, 450 m, B 83-47-4, Bu.

F. officinalis L. (1:246):

C 5 Hatay: Bereich von Samandağ, 30 m, 85-6-10, So.& Ma.

Papaver commutatum Fisch. & Mey. (1:232):

B 2 Manisa: 5 km W von Alaşehir, 100 m, B 83-48-1, Bu.

P. lacerum Popov (1:232):

B 3 Afyon: NW von Dinar, SE von Gümüşsu, 900 m,

84-23-21, So. et al.; - C 6 Hatay: 10 km E von Samandağ, 60 m, 85-9-39, So.& Ma.

P. somniferum L. (1:230):

B 1 Izmir: zwischen Foça und Yenifoça, 50 m, 85-69-18,
So.& Ma.

PLANTAGINACEAE (7:504)

Plantago coronopus L. ssp. *coronopus* (7:508):

A 4 Zonguldak: N von Bartın, 5 m, B 83-74-4, Bu.

POLYGONACEAE (2:265)

Emex spinosus (L.)Campd. (2:293):

C 4 İçel: 15 km NW von Silifke, 25 m, 85-40-34, So.& Ma.

Polygonum arenarium Waldst.& Kit. (2:278):

A 3 Bolu: 15 km W von Kibrışık, 1100 m, B 83-19-12, Bu.

PORTULACACEAE (2:13)

Montia minor Gmelin (2:14):

A 3 Bolu: N von Kibrışık, 1100 m, B 83-71-36, Bu.

PRIMULACEAE (6:111)

Lysimachia nummularia L. (6:138):

A 3 Zonguldak: 10 km N von Devrek, 250 m, B 83-65-2,
Bu.

RANUNCULACEAE (1:95)

Anemone coronaria L. (1:136):

C 4 İçel: 5 km NW von Silifke, 150 m, 85-45-6, So.& Ma.

Nigella elata Boiss. (1:104):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-37, Bu.

Ranunculus chius DC. (1:189):

C 4 İçel: 13 km NW von Silifke in Richtung Mut, 80 m,
85-46-9, So.& Ma.

R. ficaria L.ssp. ficariiformis Rouy & Fouc. (1:193):

C 6 Hatay: 8 km SE von Samandağ, 60 m, 85-11-19, So.& Ma.

R. lateriflorus DC. (1:193):

A 3 Bolu: N von Kibrisçik, 1100 m, B 83-71-48, Bu.

RHAMNACEAE (2:523)

Rhamnus punctatus Boiss. var. punctatus (2:523): Rar!

C 5 Hatay: 20 km SE von Uluçinar, 200 m, 85-31-13,
So.& Ma., det. BROWICZ.

RUBIACEAE (7:722)

Asperula rumelica Boiss. (7:756):

A 3 Zonguldak: 20 km SW von Zonguldak, 50 m,
B 83-58-10, Bu.

Crucianella angustifolia L. (7:730):

A 3 Bolu: 15 km W von Kibrisçik, 1100 m, B 83-69-14, Bu.

Galium murale (L.) All. (7:848):

C 4 İçel: 5 km NW von Silifke in Richtung Mut, 85-45-7,
So.& Ma., det. SCHÖNBECK-TEMESY.

G. tricornutum Dandy (7:832):

C 5 Hatay: Strand NW von Samandağ, 5 m, 85-7-24, So.& Ma.

Sherardia arvensis L. (7:724):

C 4 İçel: 22 km W von Silifke, 300 m, 85-53-15, So.& Ma.

Valantia hispida L. (7:856):

C 4 İçel: 5 km NW von Silifke in Richtung Mut,
85-45-8, So.& Ma.

SANTALACEAE (7:535)

Osyris alba L. (7:545):

C 4 Içel: 15 km W von Silifke, 30 m, 85-40-36, So.& Ma.

SCROPHULARIACEAE (6:458)

Kickxia commutata (Bernh.ex Reichb.)Fritsch ssp. commutata (6:675):

A 3 Zonguldak: 10 km E von Zonguldak: 20 m, B 83-59-10, Bu.

Scrophularia divaricata Ledeb. (6:614): Neu für die Türkei!

A 9 Kars: Umgebung von Posof, 1650 m, 82-106-101, So.& Bu., det. MILL.

Veronica panormitana Tineo ssp. panormitana (6:732): Rar!

C 6 Hatay: Antakya, Umgebung der Petrus-Kirche, 150 m, 85-34-28, So.& Ma., det. FISCHER.

V. pectinata L. var. pectinata (6:744):

A 4 Zonguldak: Forstamt Yenice, Revier Çittdere, E-Hang, 1300 m, 19.7.1985, Öz.

SELAGINELLACEAE (1:36)

Selaginella denticulata (L.)Link (1:36):

C 4 Içel: 15 km NW von Silifke in Richtung Mut, 80 m, 85-48-31, So.& Ma.

SOLANACEAE (6:437)

Mandragora autumnalis Bertol. (6:450):

C 4 Içel: 15 km W von Silifke, 30 m, 85-40-37, So.& Ma.

TAMARICACEAE (2:348)

Tamarix parviflora DC. (2:350):

C 4 İçel: 5 km E von Ovaçık, 15 m, 85-56-52, So.& Ma.

T. tetrandra Pall.ex Bieb. (2:349):

C 4 İçel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-40, So.& Ma.

THYMELAEACEAE (7:521)

Thymelaea hirsuta (L.)Endl. (7:528):

C 4 İçel: Kurtuluş, S von Silifke, 5 m, 85-52-41, So&Ma.

UMBELLIFERAE (4:265)

Ammi visnaga (L.)Lam. (4:426):

A 4 Zonguldak: N von Bartın, Küste, 5 m, B 83-74-5, Bu.

Bupleurum affine Sadler (4:408): Rar!

A 3 Bolu: N von Kibrışçık, 1100 m, B 83-71-41, Bu.

Oenanthe silaifolia Bieb. (4:374):

C 2 Muğla: 22 km W von Marmaris, 10 m, 82-18-8, So. et al.

Peucedanum obtusifolium Sm. (4:477):

A 4 Zonguldak: Inkum, N von Bartın, Küste, B 83-73-5, Bu.

Torilis ucranica Sprengel (4:522):

A 3 Bolu: N von Kibrışçık, 1100 m, B 83-71-44, Bu.

URTICACEAE (7:633)

Urtica urens L. (7:635):

C 4 İçel: 13 km NW von Silifke in Richtung Mut, 80 m, 85-46-10, So.& Ma.

- 253 -

VALERIANACEAE (4:550)

Valerianella echinata (L.) DC. (4:567):

C 4 Içel: 15 km NW von Silifke in Richtung Mut, 80 m,
85-48-34, So.& Ma.

V. obtusiloba Boiss. (4:578):

C 3 Antalya: 13 km SW von Kemer, 50 m, B 83-28-10, Bu.

VIOLACEAE (1:524)

Viola odorata L. (1:525):

A 4 Zonguldak: Forstamt Yenice, Revier Çitdere, 1450 m,
25.4.1985, Öz.; - B 3 Isparta: 22 km SW von Akşehir,
Sultan Da., 2000 m, 85-66-11, So.& Ma.; - C 5 Hatay:
20 km (Luftlinie) SE von Uluçinar, 800 m, 85-32-8,
So.& Ma.

ZYGOPHYLLACEAE (2:491)

Zygophyllum album L. (2:492):

Rar!

C 4 Içel: Kurtuluş, S von Silifke, 3 m, 85-52-42,
So.& Ma.

Literatur

AKMAN Y., AYDOĞDU M. & ILARSLAN R.(1985): New Records
for the A 3 Square in the Flora of Turkey. - Doğa
Bilim Dergisi; A2,9,3:467-472.

BAŞKARAÇAÇ S. & EKIM T.(1985): Çile Dağının Florası. -
Doğa Bilim Dergisi; A2,9,2:170-192.

DAVIS P.H.(1965-1985): Flora of Turkey and the Aegean
Islands. Vol.1-9. - Edinburgh.

- EKIM T., ILARSLAN R., MALLYER H. & VURAL M.(1985): Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı Flora. - Doga Bilim Dergisi; A2,9,2:215-247.
- EKIM T. & ILARSLAN R.(1985): New Floristic Records from Turkey Grid Square B 5. - Doga Bilim Dergisi; A2,9,3: 515-524.
- ERIK S.(1985): New Floristic Records from Anatolia. - Phyton (Austria); 25(1):51-64.
- ERIK S. & DEMIRKUŞ N.(1985): Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareeler İçin Yeni Kayıtlar. - Doga Bilim Dergisi; A2,9,1:51-61.
- FISCHER M.A. & SORGER F.(1987): Additions and Corrections to Veronica in Flora of Turkey. - Linzer Biol. Beitr.(in Vorbereitung).
- GROSSHEIM A.A.(1939-1967): Flora Kavkasa.
- KIT TAN & SORGER F.(1986): Even More New Taxa from South and East Anatolia I. - Pl.Syst.Evol. 154: 111-128.
- ROBSON N.(1986): A Review of Hypericum Sect. Hirtella. - Notes R.B.G.Edinb.; 43(2):255-265.
- SORGER F. & BUCHNER P.(1983): Beiträge zur Flora der Türkei IV. - Linzer Biol.Beitr.; 14/2:157-208.
- SORGER F.(1984): Beiträge zur Flora der Türkei V. - Linzer Biol.Beitr.; 16/2:113-172.
- SORGER F.(1985): Beiträge zur Flora der Türkei VI. - Linzer Biol.Beitr.; 17/1:121-169.
- TUZLACI E.(1984): The Distribution of Helianthemum aegyptiacum (L.)Miller in Turkey. - Istanbul Ecz. Fak.Mec.; 20:97-102.
- WITTMANN H.(1985): Beitrag zur Systematik der Ornithogalum-Arten mit verlängert-traubiger Infloreszenz. - Stapfia; 13:177 pp.

Anschrift der Verfasser:

Dr. Friederike SORGER Uetzgasse 15 A-1100 Wien, Österreich	Matthias MANN Reinprechtsdorfer Str.62 A-1050 Wien, Österreich
--	--

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Linzer biologische Beiträge](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [0019_1](#)

Autor(en)/Author(s): Sorger Friederike, Mann M.

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora der Türkei VII. 201-254](#)