

Eine neue Lokalarasse von *Euchloe belia* v. *ausonia* Hbn.

Vorgelegt im Verein für Insektenkunde Frankfurt a. M.,
von Dipl.-Ing. Carl Trautmann.

Vor einiger Zeit erhielt ich von Herrn Dr. Pfaff je 2 ♂ ♀ einer *ausonia*-Form aus Kisilsk im Ural, die er als *belia* erhalten hatte. Der eigenartige Habitus der Tiere machte es mir sofort wahrscheinlich, daß ich es hier mit einer neuen Form zu tun habe. Nach eingehendem Studium der einschlägigen Literatur bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß das Tier noch nicht beschrieben ist und eher einen Namen verdient, als manches andere, das bei der heutigen Sucht nach Neubenennungen als Rasse anerkannt wird.

Die Tiere übertreffen an Größe weit alle mir bekannten Formen. Die Flügelform ist wesentlich mehr gerundet als bei der Stammform, übertrifft in dieser Hinsicht noch *simplonia* Frr. und gemahnt, besonders beim ♀, etwa an die von *Pieris brassicae*. Apex der Vfl. durch sehr große weiße Flecke aufgehellte, unterseits nur leicht gelb angeflogen mit geringen Spuren einer grünen Bestäubung. Die weißen Flecke der Hfl.-Unterseite sind stark vergrößert und das Grün ist soweit reduziert, daß die gelbe Grundfärbung längs der Adern deutlich sichtbar wird. Der schwarze Zellfleck der Hfl.-Unterseite tritt deutlich hervor.

Größe: ♂ 47–49 mm, ♀ 52–53 mm. Flugzeit Juli.

Ich gebe dem Tier zu Ehren seines Entdeckers den Namen *Pfaffi* C. Tr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lepidopterologische Rundschau, Wien](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Trautmann Carl

Artikel/Article: [Eine neue Lokalrasse von *Euchloe belia* v. *ausonia* Hbn. 109](#)