

Euchloë ausonia pfaffi Trautmann.

Von Leo Sheljuzhko, Kijev.

Herr C. Trautmann beschreibt in seinem Artikel: „Eine neue Lokalrasse von *Euchloë belia* v. *ausonia*“ (Lep. Rundschau, vol. I, 1927, Nr. 12, p. 109) als neu unter dem Namen *pfaffi* die große ostrussische Sommerform von *Euchloë ausonia* Hb. Die Form wurde aber schon zweimal benannt, und zwar von L. Krulikovsky (als *volgensis*) und von M. Bartel (als *uralensis*).

Eine Zusammenstellung der entsprechenden Literatur wäre also:

Euchloë ausonia volgensis Krul. (typ. Saratow), Saratowskaja Zemskaja Nedelja, 1897, Nr. 1—2; Travaux de la Soc. d. Natural. à Saratow, vol. I, p. 36 (1901); Materialy k poznaniju fauny i flory Ross. Imp., Moskau, fasc. VI, p. 245, t. II, f. 1—2 (1904).

= *uralensis* Bartel (typ. Orenburg), D. E. Z. Iris, vol. XV, p. 189 (1903); Röber in Seitz, Gr.-Schmett., vol. I, p. 52, t. 22 c (1907); Verity, Rhopal. pal., p. 177, t. XXXVI, f. 41 (1909).

= *pfaffi* C. Trautmann (typ. Kizilsk), Lep. Rundschau, vol. I, p. 109 (1927).

Erwähnen möchte ich noch, daß mir die Originale von *volgensis* Krul. vorliegen (Saratow, 28.—30. VI. 1896), wie auch ein ♂ der Typen von *uralensis* Bartel (Orenburg, VI. 1902). Außerdem besitze ich noch eine Serie (6 ♂, 11 ♀) aus Uralsk und je 1 ♀ aus Sarapul und Urzhum (Gouvern. Vjatka), wo die Art schon etwa ihre nördliche Verbreitungsgrenze zu erreichen scheint. Stücke dieser Lokalitäten sind miteinander (abgesehen von individuellen Abweichungen) ziemlich identisch und beweist das Material die ausgedehnte Verbreitung der Subspezies in Ost-Rußland.

*) Es ist dasselbe Stück (e. coll. M. Bartel), welches Verity (l. c.) abgebildet hat.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lepidopterologische Rundschau, Wien](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Sheljuzhko Leo Andrejewitsch

Artikel/Article: [Euchloe ausonia pfaffi Trautmann. 144](#)