

# Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg.

Von J. Bauer, Wien.

(Fortsetzung.)

363. *Pyrrhia purpurites* Tr. bei St. Georgen vereinzelt.

364. *Pyrrhia umbra* Hufn. bei Bösing und St. Georgen nicht häufig

365. *Acontia lucida* Hufn. Braunsberg und Hundsheimberg bei Hainburg vereinzelt. Thebner Kogel häufiger.

366. *Acontia luctuosa* Esp. im ganzen Gebiete, bei Bösing und Rohrbach häufig.

367. *Eublemma arcuinna* Hb. Braunsberg und Pfaffenberg bei Hainburg vereinzelt.

368. *Thalpochares dardouini* B. an den Felsenköpfen des Braunsberg vereinzelt.

369. *Thalpochares respersa* Hb. nur bei Szeleskut wenige Stücke.

370. *Thalpochares panonica* Frr. Modern, Bösing und St. Georgen vereinzelt.

371. *Thalpochares paula* Hb. bei Theben-Neudorf in der Nähe von Erdschwalbennestern ziemlich häufig.

372. *Erastria argentula* Hb. Batzenhäusel und in den Donauauen der Umgebung von Preßburg vereinzelt, bei Theben häufiger.

373. *Erastria uncula* Cl. im ganzen Gebiete nicht häufig.

374. *Erastria obliterata* Rbr. Braunsberg, Thebner Kogel und Gernsberg nicht häufig.

375. *Erastria venustula* Hb. bei Modern in der Nähe eines Tümpels auf Wasserschiebling sitzend, 4 Exemplare.

376. *Erastria deceptoris* Sc. im ganzen Gebiete vereinzelt.

377. *Erastria fasciana* L. gleichfalls im ganzen Gebiete, stellenweise häufig.

378. *Rivula sericealis* Sc. im ganzen Gebiete mehr weniger häufig.

379. *Prothymnia viridaria* Cl. im ganzen Gebiete überall häufig.

380. *Mesotrosta signalis* Tr. bei Rohrbach, Bösing und Modern vereinzelt.

(Fortsetzung folgt.)