download unter www.biologiezentrum.at

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg.

Von J. Bauer, Wien.

(Fortsetzung.)

445. *Geometra papilionaria* L. nur bei Szeleskut wenige Stücke.

446. *Euchloris vernaria* Hb. bei Bösing und Modern nicht selten.

447. *Nemoria viridata* L. im ganzen Gebiete mehr weniger häufig.

448. *Nemoria pulmentaria* Gn. bei Hainburg und Preßburg nicht häufig.

449. *Thalera fimbrialis* Sc. bei Theben, Hainburg, Modern und Bösing häufig.

450. *Thalera putata* L. bei Modern und Rohrbach vereinzelt.

451. *Thalera lactearia* L. bei Preßburg, Theben, Hainburg, Rohrbach, Bösing und St. Georgen nicht häufig.

452. *Hemithea strigata* Müll. Braunsberg, Hundsheimberg bei Hainburg vereinzelt.

453. *Acidalia similata* Thbrg. Braunsberg und Thebner Kogel ziemlich häufig.

454. *Acidalia muricata* Hufn. bei Bösing und St. Georgen vereinzelt.

455. *Acidalia dimidiata* Hufn. im ganzen Gebiete nicht häufig.

456. *Acidalia contiguaria* Hb. an den Felsenköpfen des Braunsberges bei Hainburg bisweilen häufig.

457. *Acidalia virgularia* Hb. im ganzen Gebiete mehr weniger häufig.

458. *Acidalia pallidata* Bkh. bei Bösing und Szeleskut vereinzelt.

459. *Acidalia herbariata* F. im ganzen Gebiete nicht häufig, bei Szeleskut an den Wänden einer verfallenen Holzhütte in Anzahl gefangen.

460. *Acidalia bisetata* Hufn. im ganzen Gebiete nicht häufig.

461. *Acidalia trigeminata* Hw. Hundsheimberg und Thebner Kogel ziemlich häufig.

462. *Acidalia rusticata* F. bei Rohrbach, Szeleskut und Bösing nicht häufig.

463. *Acidalia dilutaria* Hb. Braunsberg, Hundsheimberg und Thebner Kogel vereinzelt.

download unter www.biologiezentrum.at

464. *Acidalia interjectaria* B. in den Donauauen bei Preßburg ziemlich häufig.

465. *Acidalia humiliata* Hufn. im ganzen Gebiete stellenweise häufig.

466. *Acidalia nitidata* HS. Braunsberg, Gemsenberg, bei Bösing vereinzelt.

467. *Acidalia inornata* Hw. bei Theben und Rohrbach nur vereinzelt.

468. *Acidalia aversata* L. bei Rohrbach, Modern und Bösing nicht häufig.

469. *Acidalia emarginata* L. im ganzen Gebiete nicht häufig.

470. *Acidalia immorata* L. wie die vorige weit seltener.

471. *Acidalia rubiginata* Hufn. im ganzen Gebiete häufig.

472. *Acidalia marginepunctata* Goeze. Braunsberg und Thebner Kogel nicht häufig.

473. *Acidalia incanata* L. Rachsthurn, Wetterling, bei Bösing und Modern nicht häufig.

474. *Acidalia fumata* Stph. bei Szeleskut, Modern und St. Georgen vereinzelt.

475. *Acidalia remutaria* Hb. Thebner Kogel und Galgenberg bei Theben vereinzelt.

476. *Acidalia nemoraria* Hb. bei Rohrbach und Szeleskut nur vereinzelt.

477. *Acidalia immutata* L. bei Bösing und St. Georgen nicht häufig.

478. *Acidalia strigaria* Hb. bei St. Georgen nur wenige Stücke.

479. *Acidalia strigilaria* Hb. bei Rohrbach und Bösing vereinzelt.

480. *Acidalia ornata* Sc. im ganzen Gebiete stellenweise häufig.

481. *Codonia pendularia* Cl. bei Bösing und St. Georgen nicht häufig.

482. *Codonia orbicularia* Hb. bei Szeleskut und Bösing vereinzelt.

483. *Codonia annulata* Schultze. Thebner Kogel und bei Preßburg vereinzelt.

484, *Codonia porata* F. Hundsheimberg, Thebner Kogel bei Bösing, Modern und St. Georgen nicht häufig.

485. *Codonia punctaria* L. im ganzen Gebiete, jedoch nur vereinzelt.

(Fortsetzung folgt.)

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und verantwortl. Schriftleiter Adolf Hoffmann, Wien, XIII.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Lepidopterologische Rundschau, Wien

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Bauer J.

Artikel/Article: Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg. 183-184