

Berichtigungen.

In der Veröffentlichung Nr. III der Stelle beziehen sich die auf S. 159 über *Orgyia gonostigma* F. angegebenen Beobachtungen nach Mitteilung des Einsenders nicht auf diese Art, sondern auf *Dasydira fascelina* L.

Ebenda auf Seite 158 ist unter *Cochlidion limacodes* Hufn. der erste Teil des zweiten Satzes von „Am andern Tage“ bis „Eier“ nach Mitteilung des Einsenders folgendermaßen zu ändern: „Ich fing das Weib und setzte es am anderen Tage in ein Zuchtglas, wo es, wiederum der Sonne ausgesetzt, den Rest seiner Eier“.

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg.

Von J. Bauer, Wien.

(Fortsetzung.)

541. *Larentia tristata* L. Gemsenberg bei Preßburg, Bradlo und Visoka vereinzelt.
542. *L. luctuata* Hb. im ganzen Gebiete nicht häufig.
543. *L. alchemillata* L. bei Rohrbach und St. Georgen nicht häufig.
544. *L. lugdunaria* HS. Modreiner Kogel wenige Stücke.
545. *L. albulata* Schiff. im ganzen Gebiete ziemlich häufig, am Plateau des Thebner Kogels gemein.
546. *L. blomeri* Curt. Rachsthurn und Wetterling je ein Exemplar.
547. *L. obliterata* Hufn. Braunsberg bei Hainburg, Hundsheimberg, Gemsenberg bei Preßburg nicht selten.
548. *L. luteata* Schiff. im ganzen Gebiete etwas häufiger als die vorige.
549. *L. bilineata* L. im ganzen Gebiete stellenweise sehr häufig.
550. *L. sordidata* F. Bradlo, Rachsthurn, Wetterling, Visoka und Ahornberg, Klokocava nicht häufig.
551. *L. silaceata* Hb. im ganzen Gebiete nicht häufig.
552. *L. herberata* Schiff. bei Rohrbach und Szeleskut vereinzelt.
553. *L. comitata* L. im ganzen Gebiete vereinzelt, bei Modern häufig.
554. *Asthenia candidata* Schiff. bei Röhrbach, Bösing und St. Georgen ziemlich häufig.

555. *Tephroclystia oblongata* Thnbg. Braunsberg bei Hainburg, Gemsenberg bei Preßburg, Rohrbach, Bösing und Stampfen, nicht selten.

556. *T. linariata* F. im ganzen Gebiete nicht häufig.

557. *T. pusillata* F. bei Rohrbach, Stampfen, St. Georgen, Bösing nicht häufig, am Plateau des Pfaffenberges bei Deutsch-Altenburg häufig.

558. *T. indigata* Hb. gleichfalls am Pfaffenberg ziemlich selten.

559. *T. euphrasiata* HS. Visoka und Bradlo nur wenige Stücke.

560. *T. pimpinellata* Hb. bei Stampfen und Bösing wenige Exemplare.

561. *T. absinthiata* Cl. im ganzen Gebiete, stellenweise sehr häufig.

562. *T. vulgata* Hw. im ganzen Gebiete nicht selten.

563. *T. castigata* Hb. wie vorige, weit häufiger.

564. *T. veratraria* HS. Visoka und Bradlo wenige Stücke.

565. *T. satyrata* Hb. im ganzen Gebiete nicht häufig.

566. *T. succenturiata* L. bei Rohrbach und Stampfen nicht häufig.

567. *T. scabiosata* Bkh. bei St. Georgen und Modern wenige Stücke.

568. *T. plumbeolata* Hw. beim Kaltenbründl am Thebnerkogel in Anzahl.

569. *T. tenuiata* Hb. bei Theben-Neudorf vereinzelt.

570. *T. inturbata* Hb. bei Rohrbach, Stampfen, Modern und Bösing häufig.

571. *T. innotata* Hufn. im ganzen Gebiete stellenweise häufig.

572. *T. sobrinata* Hb. bei Rohrbach und St. Georgen nur wenige Stücke.

573. *Chloroclystis rectangulata* L. im ganzen Gebiete stellenweise häufig.

574. *Phibalapteryx aquata* Hb. bei St. Georgen ein ♂.

575. *Ph. vitalbata* Schiff. Thebner Kogel. Gemsenberg, Rohrbach, Bösing, Szeleskut und St. Georgen nur vereinzelt.

576. *Ph. tersata* Hb. Braunsberg bei Hainburg, Pfaffenberg, bei Bösing und Szeleskut nur vereinzelt.

577. *Abraxas grossulariata* L. im ganzen Gebiete, stellenweise häufig.

578. *A. marginata* L. bei Bösing, Modern und Szeleskut nicht häufig.

579. *Stegania dilectaria* Hb. Thebner Kogel, Batzenhäusel bei Preßburg, Modern und Bösing nicht häufig.
580. *St. cararia* Hb. bei Stämpfen nur zwei Exemplare.
581. *Deilinia pusaria* L. im ganzen Gebiete, bei Rohrbach häufig.
582. *Numeria pulveraria* L. Thebner Kogel, Gemsenberg, Bösing und Rohrbach nicht häufig.
583. *N. capreolaria* F. Thebner Kogel nur wenige.
584. *Ellopiä prosapiaria* L. am Plateau des Pfaffenberges nur vereinzelt.
585. *Metrocampa margaritata* L. bei Bösing, Modern, Ahornberg vereinzelt.
586. *Ennomos quercinaria* Hufn. im ganzen Gebiete nicht häufig.
587. *E. erosaria* Hb. bei Bösing vereinzelt, Modern häufiger.
588. *E. quercaria* Hb. Braunsberg bei Hainburg wenige Exemplare.
589. *Selenia bilunaria* Esp. im ganzen Gebiete nicht häufig.
590. *S. lunaria* Schiff. wie vorige, etwas häufiger.
591. *Therapis evonymaria* Schiff. Galgenberg bei Theben nur vereinzelt.
592. *Crocallis elinguarä* L. Thebner Kogel, bei Bösing und Modern nur vereinzelt.
593. *Ourapteryx sambucaria* L. bei Szeleskut und Bösing nur vereinzelt.
594. *Opisthograptis luteolata* L. bei Modern und Szeleskut ziemlich häufig.
595. *Epione parallelaria* Schiff. Thebner Kogel und bei Modern vereinzelt.
596. *Caustoloma flavicaria* Hb. Ahornberg zwei Exemplare.
597. *Venilia macularia* L. im ganzen Gebiete ziemlich häufig.
598. *Amphidasis betularia* L. Hundsheimberg, Gemsenberg und St. Georgen vereinzelt.
599. *Synopsia sociaria* Hb. Thebner Kogel und bei Modern nur wenige Stücke.
600. *Boarmia secundaria* Schiff. am Plateau des Pfaffenberges einige Exemplare, durchwegs ♂♂, am Wetterling ein ♀.
601. *B. ribeata* Cl. in Gesellschaft der obigen, nur 2 Stücke.
602. *B. crepuscularia* Schiff. Preßburger Auen und bei Rohrbach wenige.

603. *B. punctularia* Hb. Preßburger Auen, Kaltenbründl am Thebner Kogel und bei Rohrbach ziemlich häufig.

604. *Gnophos dumetata* Tr. Rachsthurn im Schatten eines überhängenden Felsen sitzend, ein Pärchen in Kopula.

605. *G. obscuraria* Hb. Braunsberg bei Hainburg ein ♂.

606. *G. dilucidaria* Hb. Rachsthurn und Wetterling vereinzelt.

607. *G. operaria* Hb. Rachsthurn an der Wand einer verfallenen Köhlerhütte in wenigen Exemplaren.

608. *Fidonia fasciolaria* Rott. Braunsberg, Hundsheimberg vereinzelt.

609. *Ematurga atomaria* L. im ganzen Gebiete verbreitet, besonders häufig am Plateau des Thebner Kogels.

610. *Bupalus piniarius* L. im ganzen Gebiete, am Plateau des Pfaffenberges gemein.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturschau.

Krüger, Eine neue Varietät von *Castnia juturna* Hpfrr. *Castnia vesta* Krüger. I. E. Z. Guben XXI, 385. — **Niepelt**, Neue Tagfalter aus Columbien. I. E. Z. Guben XXI, 390. — **Gehlen**, Neue SpHINGIDEN-Arten, Unterarten und Formen. I. E. Z. Guben XXI, 391. — **Bodenstein**, Ein für Ostpreußen neuer Micro. I. E. Z. Guben XXI, 401. — **Völker**, Die Großschmetterlinge der Jenaer Umgebung. I. E. Z. Guben XXI, 415. — **Tschauner**, Durch Schimmelbildung melanisierter *P. machaon*. I. E. Z. Guben XXI, 418. — **Niepelt**, Eine neue SpHINGIDEN-Form von Süd-Amerika, I. E. Z. Guben XXI, 434. — **Stock**, Zum Rückgang der Falterwelt. E. Z. Frankfurtmain XXXI, 419. — **Gönnert**, Der Trauermantel (*Vanessa antiopa* L.) und sein Formenkreis. E. Z. Frankfurtmain XXXI, 435. — **Krüger**, Eine neue Erycinide - *Simnachaia margaretha* Krüger. E. Z. Frankfurtmain XXXI, 442. — **Raab**, Verschwinden des Apollo-Falters. E. Z. Frankfurtmain XXXI, 443. — **Bryk**, Über den Mimetismus der afrikanischen Papilio-Arten. Soc. ent. XXXIII, 9. — **Schade**, Die Kolonie Independencia als Sammelgebiet. E. Rundsch. XXXV, 6. — **Zikan**, Die Macro-Lepidoptera des Itatiaya (Südabhang bei Campo-Bello). E. Rundsch. XXXV, 6. — **Seitz**, Das System der Schmetterlinge. E. Rundsch. XXXV, 8. — **Sauermann**, Über Raupenzuchten aus dem Ei mit besonderer Berücksichtigung der Aufzucht einiger Notodontiden. Z. d. Ver. d. Naturb. u. Sammler II, 22. — **Perner**, Sammlungsschädlinge. Z. d. Ver. d. Naturb. u. Sammler II, 21. — **Stättermayer**, Interessante und seltene Falter der Palaearktis. Z. d. Ver. d. Naturb. u. Sammler II, 23. — **Stichel**, Nacharbeiten zur Revision der Riodinidae. Z. f. wiss. Insbiol. XXIII, 35. — **Dr. M. Schmidt**, Ein Massenvorkommen von *Agrotis praecox* L. Z. f. wiss. Insbiol. XXIII, 52. **Derenne**, Espece nouvelle pour la faune belge. Lambill. XXVIII, 10.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lepidopterologische Rundschau, Wien](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer J.

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der Kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg. 85-88](#)