

FARBÄNDERUNG BEI AESHNA CYANEA MÜLL. DURCH VERLETZUNG¹⁾

von Hermann Frank

Am 16.8.84 beobachtete ich im Pfrunger Ried ein Weibchen von *Aeshna cyanea*, das sich an mehreren Plätzen sonnte. Auffallend war die andersartige Färbung des Hinterleibs. Die Bereiche, die beim Weibchen normalerweise grün gefärbt sind, waren bei diesem Exemplar deutlich blau gezeichnet.

Die Ursache dieser Farbänderung könnte eine Verletzung des Hinterleibs sein. Zwischen dem 7. und 8. Segment zeigte der Hinterleib einen Knick, der möglicherweise bereits beim Schlupf entstanden war.

Zu späteren Daten konnte ich dieses Exemplar nicht mehr finden, obwohl das Gebiet und die Umgebung noch öfter aufgesucht und mehrmals Männchen von *Aeshna cyanea* beobachtet wurden.

Anmerkung der Redaktion:

Der Redaktion liegt ein Dia des beschriebenen Tieres vor, das leider aus drucktechnischen Gründen nicht wiedergegeben werden kann.

R.Rudolph teilt mit, daß er im August 1985 in Münster ein tiefblau gefärbtes Weibchen fing.

Anschrift des Verfassers:

Hermann Frank
Drosselweg 5
D - 7983 Pfrungen

1) Neudruck des Beitrags als Druckfehlerberichtigung

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Libellula](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [5_3-4](#)

Autor(en)/Author(s): Frank Hermann

Artikel/Article: [Farbänderung bei Aeshna cyanea Müll. durch Verletzung 40](#)