download unter www.biologiezentrum.at

überall. P. Ludoviciana im Westen von Kansas bis Oregon und Mexico; P. hepatica Swains. ist bloss von Neu-Mexico. Zum Fl. Thorn) bedient. Baird, der eher Spezies zusammenzieht als spaltet, nennt noch 17 Arten Syoicolinen als zweifelhaft in Nord-Amerika!

Von den 7 Hirundiniden ist ausnahmsweise keine Art bloss dem Osten eigenthümlich; der Westen dagegen hat sie alle bis auf H. thalassia gemeinschaftlich mit Hirundo horreorum Barton (rustica Aud.), Neufundland, Mexico, Calif.), M. lunifrons Say (Penns., Oreg-Luisiana), bicolor Vicill. (Labrador — Mex., alle drei, sowie die 4te und 6te auch in Utah), thalassina (Nebraska, Oregon, Mex.), Cotyle riparia (Penns., Nebraska, Californ. Florida) serripennis (Penns. Steilacoom — Mexiko), Progne purpurea (Penns., Jova, Luis., Calif., Mex.).

Die Bombicilliden vertritt in den Ver. Staaten zumeist nur der Ampelis cedrorum Baird (Neuschottland, Jamaika, Guatemala); A. garrulus kömmt nur in strengen Wintern vom Norden bis Philadelphia, Wisconsin, Kansas. (Schluss folgt.)

Zur Flora der Stadt Niemes und deren Umgebung.

Mitgetheilt von *Josef Schauta*, Revierförster in Höflitz.

(Fortsetzung von S. 31.)

Muscari comosum Mill. Auf Feldern bei Niemes.
Myosotis versicolor L. Im Schwabitzer Strassengraben.
Myriophyllum spicatum L. Im Höflitzer Bache.
Myrrhis odorata L. In einem Grasgarten, sehr selten.
Nasturtium amphibium R. Br. Bei Gabel.
„ officinale Rtz. In Gräben bei Höflitz.
Neottia Nidus avis Rich. Am Rollberge unter Buchen.
Nuphar luteum Sw. Im Teiche bei Weisswasser.
Nymphaea alba L. Im Hammerteich.
„ N. semiaperta Wlgslgf. Im Teichel bei Grünau.
Ophioglossum vulgatum L. Unter dem Rollberg bei Warta.
Orchis ustulata L. Ebendaselbst. — O. fusca Jacq. Im Walde Baba bei Kosmanos. — O. maculata L. Am Rollberge und im Barzdorfer Büschel.
Orobus variegatus Tenore. Am Rollberge, nicht häufig.
Oxalis corniculata L. und stricta L. Im Niemeser Schiessgarten.
Panicum glabrum Gd. Am Rollberge an Feldern.
Paris quadrifolia L. In Rollberg.
Parnassia palustris L. Auf Wiesen bei Höflitz.

Petasites albus Gaetrn. Am Rollberge (Nordseite).
„ officinalis Moench. Bei Dobern.
Peucedanum Oreoselinum Moench. Am Rollberge.
Perija Pinea. Auf dürren Zweigen der Fichte.
„ pulchella auf dürren Zweigen der Eiche.
Phellandrium aquaticum. Am Walterteich bei Gabel.
Pinus Laricio Fries. Am Rollberge, nicht häufig.
„ Strobus L. Roll und Glashütten-Revier.
Plantago arenaria W. Auf Weideplätzen bei Kummer.
Polygonum amphibium L. In Schwabitz.
„ Bistorta L. Auf Wiesen bei Höflitz.
„ minus Huds. Bei Leipa.
Polypodium Dryopteris L. und Phegopteris L. Auf dem Rollberge.
Postichum Filix mas Bth. und spinulosum Dc. Am Rollberge.
„ Thelypteris Bth. Um den Droskenteich.
Populus alba L., balsamifera L. und monilifira Act. Um Niemes.
Potamogeton crispus L. Im Höflitzer Bach.
„ lucens L. Im Hammerteich.
Potentilla collina Wth. An Waldrainen am Rollberge.
„ recta L. Am Berge Bösig.
Prenanthes purpurea L. Auf dem Rollberge.
Primula elatior Jacq. In Rollberg.
Pyrola rotundifolia L., secunda L., umbellata L., uniflora L. Am Rollberge.
Ranunculus aquatilis L., fluitans Lam. Im Polzenfluss.
„ Lingua L. Im Hammerteich.
„ lanuginosus L. In Büschen bei Dobrž.
„ polyanthemos L. An Feldrainen, selten.
Rhamnus cathartica L. Bei Grünau am Bärenteichdamme.
„ Frangula L. Um Czistay bei Höflitz.
Rhynchospora alba Vahl. Bei Czistay auf Moorgrund.
Ribes alpinum L. Auf dem Rollberg zwischen Basalt.
Rosa tomentosa Smith. Ebenda.
Rubus corylifolius. Ebenda.
Rumex aquaticus L. An den Ufern des Polzenflusses.
„ conglomeratus L. Am Polzenflusse und Rollberg.
„ maritimus L. Am Niemeser Mühlgraben und im Dorfe Bösig.
„ sanguineus L. Am Rollberg.
Salix cinerea L. und alba L., triandra L., purpurea L. Am Polzenfluss.
„ rosmarinifolia L. In Sümpfen bei Habichstein.
Sambucus Ebulus L. Beim Neuländer Meierhof.

download unter www.biologiezentrum.at

Sambucus nigra L. und racemosa L. Am Rolberg.
Sanicula europaea L. Auf dem Rollberge.
Sarothamnus vulgaris Wim. Am Czistay.
Scorzonera angustifolia Gaud., humilis L. und plantaginea Schleich. Auf Wiesen unterhalb der Roller Ziegelhütte.
Scrophularia Neesii Wirtg. Am Höflitzer Bach.
Sedum purpurascens. Auf dem Rollberge.
" reflexum L. Unter der Ruine bei Habichtstein.
" villosum L. Auf Wiesen um Höflitz.
Selinum carvifolia L. In Warta am Rollberg.
Sempervivum hirtum L. Bei Habichtstein und am Rollberg.
Senecio nemorensis L. mit var. Frachsie. Auf grasigen Anhöhen im Rollberg.
Silybum marianum Gaertn. Auf dem Niemeser Kirchberg.
Suim latifolium L. In Gräben um Czistay.
Solanum Dulcamara L. An den Ufern des Polzenflusses.
Solidago Virga aurea L. Auf dem Rollberg.
Sonchus asper Vill. An der Strasse bei Plauschnitz.
Sorbus domestica L. Am grossen Hirschberge unter hohen Felsen.
" torminalis Cass. In der Niemeser Schiesstätte.
Sparganium natans L. In Sümpfen bei Habichtstein.
Spiranthes autumnalis Rich. Auf Wiesen bei Warta und Barzdorf.
Stellaria glauca Wth. Auf Wiesen bei Czistay.
" nemorum L. Am Rollberg unter dem faulen Brückel.
Teesdalia nudicaulis L. Auf Feldern bei Rabendorf.
Tetraconolobus siliquosus Roth. Am Strassengraben hinter Hühnerwasser.
Thalictrum angustifolium Jacq. Auf Wiesen bei Niemes.
Thesium alpinum L. Auf Feldrainen bei Rabendorf.
" montanum Ehrh. Bei der Ruine am Rollberg.
Thysselinum palustre Hoffm. Um Czistay bei Höflitz.
Trientalis europaea L. Am Rollberg.
Trifolium elegans Reichl. Auf Wiesen bei Niemes.
" spadiceum L. Auf Wiesen.
Triglochin palustre L. In Sümpfen bei Habichtstein.
Triodia decumbens L. Auf grasigen Plätzen in Rollberg.
Trollus europaeus L. Auf Wiesen um den Polzenfluss.
Turritis glabra L. Am Rollberg.
Typha angustifolia L. Im Ziegelteichel unter Roll.
T. latifolia L. Im Hammerteich.
Vaccinium Oxycoccos L. Unter Czistay auf der Torfwiese.
" Vitis Idaea L. In Kiefern-Waldungen.

download unter www.biologiezentrum.at

Valeriana dioica L., und V. sambucifolia Mik. Um Czistay.
Verbascum nigrum L. Am Niemeser Mühlgraben.
„ Schraderi Mey. thapsiforme Schr. Am Rollberg.
Veronica Buxbaumii. Auf Feldern bei Barzdorf.
„ montana L. Auf dem Rollberg.
Viburnum Opulus L. Am Bolzenfluss.
Vinca minor L. Im Reichstädter Gehege ober der Papiermühle.
Viola arenaria DC. Auf trockenen Grasplätzen bei Höflitz.
„ palustris L. Auf Torfwiesen bei Höflitz.
„ collina Bess. Am Rollberg (Südwestseite).
„ saxatilis Schmidt. Höchste Basaltfelsen des Rollberges.
Woodsia ilvensis R. Br. Ebenda zwischen Basalt.
Xanthium strumarium L. Auf Feldern um Niemes.

Sollte ein oder der andere Freund der Botanik auf Grundlage des vorliegenden Verzeichnisses geneigt sein mit mir in Tausch zu treten, so wolle es gefällig sein mir unter meiner Adresse (Post Niemes, Böhmen) in einem frankirten Schreiben die gewünschten Species namhaft zu machen und gleichzeitig ein Verzeichniss von Dubletten aus seiner Gegend zu meiner Gegen-Auswahl an mich einzusenden.

Pflanzengeographische Mittheilungen.

Von Dr. *Johann Palacký* in Prag.

(Fortsetzung von Lotos 1861 S. 8).

Sisymbrium hesperidiflorum, Iberidella tenuis heterophylla, Lepidium intricatum; Isatis leucorum, biscutellaefolia, Dianthus Falyschenidi, Gypsophila adenophora, Silene nedbarica, sisianica, tineata, sahendica, Stellaria alsinoides, Althaea flavovirens, tabrisiana, Zygophyllum eurypterum gesellig (auch in Afgenistan, Chriffith und Belutschistan (Stocks) Pistazia acuminata, Pokokia lineata, Oxytropis Szovitsii, rurensis, Astragalus hololeucus, melanocalyx, jodostachys, jesdianus, kentrodes, macrolacis, sahendi, Fisheri, leptacanthus, tabusianus, callistachys, mesites, Spachianus, subalpinus, Merklinii, demavendicus; Vicia Jouberti, Reuteriana, Hedysarum Buhseanum, Onobrichis Belangesi, Alhagi persorum, Edwardsia hortensis, persica, Amygdalus Reuteri, Rosa bungeana mitis, lacerans, Pyrus Boisseriana; Epilobium nervosum; Eryngium nigromontanum, Carum falcarioides, Bupleurum nervosum, Ferula puberula, galbaniflua (liefert das galbanum) Peucedanum oopodum, Heracleum sisianense, Torilis persica, Prangos stenoptera; Loranthus Grevinkii, Lonicera bracteolaris floribunda, Galium Kützingii, Calepelthis aperta, Valerianella triplaris Scabiosa Schimperiana, Erigeron nigromontanus. Achillea cuneatiloba,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Schauta Josef

Artikel/Article: Zur Flora der Stadt Niemes und deren Umgebung 48-51