

## Die Vögelfauna der Provinz von Murcia in Spanien.

Von Med. Dr. *W. R. Weitenweber.*

(Beschluss von S. 160.)

### *Orden XI. Alectoridens.*

145. *Glareola torquata* Meyer (kastil. *Glareola comun.*) Sehr selten, an den Ufern des Mar Menor und des mittelländischen Meeres.

### *Orden XII. Corredoras.*

146. *Otis tetrax* Linn. (Volks-N. *Sison.* — kast. *Abutarda sison.*) Ziemlich gemein, während des Sommers auf wüsten Feldern.

### *Orden XIII. Zancudas.*

147. *Oedienemus crepitans* Temm. (V. N. *Chorlito.* — kast. *Alcaraván zancudo.*) Gemein, wahrscheinlich stationär.
148. *Himantopus melanopterus* Meyer (kastil. *Zancudo alinegro.*) Aeusserst selten. Verf. besitzt bloss ein todtes Exemplar vom J. 1843.
149. *Haematopus ostralegus* Linn. (kastil. *Patirojo ostrero.*) Aeusserst selten. Verf. sah bloss ein todtes Exemplar v. J. 1848.
150. *Charadrius pluvialis* Linn. (V. N. *Reolin.* — kastil. *Chorlito pluvial.*) Gemein in regnerischen Wintern, namentlich auf den Feldern von Sangonera und in der Umgegend der Hauptstadt.
151. *hiaticula* Linn. (V. N. *Andarrio.* — kast. *Chorlito patiaureo.*) Ziemlich selten, an Flüssen, während der Winterszeit.
152. *minor* Meyer (V. N. *Andarrio.* — kast. *Chorl. piquinegro*) Ganz wie die vorige Art.
153. *cantianus* Lath. (V. N. *Martinete.* — kastil. *Chorl. litoral.*) Sehr gemein an den Ufern des Mari Menor, wo er stationär zu sein scheint.
154. *Vanellus cristatus* Meyer (V. N. *Indla, Avefria.* — kast. *Avefria moñuda.*) Kommt während der Winterszeit, namentlich in regnerischen und kalten Wintern, an.
155. *Strepsilas callaris* Temm. (kast. *Revolvedor pedrero.*) Selten, zur Winterszeit, an den Ufern das Mar Menor.
156. *Ardea cinerea* Lath. (V. N. *Garza* — kast. *Garza real.*) Ziemlich gemein an Bächen und Quellen.

157. *Ardea purpurea* Linn. Ebenso.
158. " *garzetta* Linn. (kast. *Garza garcetta* ó *Garzota*). Seltener als die beiden vorigen Arten.
159. " *stellaris* Linn. (kast. *Garza avetore*). Ziemlich gemein an Bächen.
160. *ralloides* Scop. (kast. *G. cangrejera*). Ebenso.
161. " *minuta* Linn. (V. N. *Garcica*. — kast. *Garza pecqueña*). Wie die vorhergehenden.
162. *Nycticorax ardeola* Cur. (V. N. *Garzota*. — kast. *Garza zumaya*). Gemein.
163. *Recurvirostra avoceta* Linn. (kast. *Avoceta blanquinegra*). Selten, nur zufällig, Mitte März und April; an den Ufern des Mar Menor, bei Lorca.
164. *Numenius phaeopus* Lath. (V. N. *Picarna grande*. — kast. *Zarapito comun*). Viel häufiger, als die vorhergehende; dem Anschein nach Standvogel.
165. *Tringa subarquata* Temm. (kast. *Picudilla africana*). Sehr gemein und stationär, an den Küsten des Mar Menor.
166. *variabilis* Meyer (kast. *Pic. variable*). Selten, im kalten October, an den Küsten des Mar Menor.
167. " *Temminkii* Leisl. Ziemlich gemein; am Mar Menor, vom October bis Frühjahr.
168. *minuta* Leisl. (kast. *Picudilla pequenita*) Seltener.
169. " *cinerea* Linn. Ziemlich häufig.
170. " *pugnax* Linn. (kast. *Pic. combattente*). Selten, bei Sangonera.
171. *Totanus fuscus* Leisl. (kast. *Andarrio parduzco*). Minder gemein, am Flusse bei Sangonera und Alhama, in der Nähe von Murcia.
172. " *calidris* Bechst. (kast. *And. patirrojo*). Zahlreicher und ausgebreiteter als der vorhergehende; auch an den Ufern des sog. Mar Menor.
173. " *stagnatilis* Bechst. (kast. *And. palustre*). Sehr selten; auch in der Umgegend der Hauptstadt.
174. *ochropus* Temm. (kast. *And. coliblanco*). Wie der vorige.
175. *glareola* Temm. (kast. *And. cascajoso*). Ebenso.
176. *glottis* Bechst. (kast. *And. agrisado*). Ebenso.
177. *Scolopax rusticola* Linn. (kast. *Becada chocha* ó *Chocha perdiz*). Auf feuchten Feldern, an Flüssen und Sümpfen, zahlreicher in kalten und regnerischen Wintern als in trockenem.

178. *Scolopax gallinago* Linn. (kast. Bec. agachodiza). Gemeiner als die vorhergehende.
179. *gallinula* Linn. (V. N. Picarnica, — kast. Bec. raynelo). Ebenso.
180. *Rallus aquaticus* Linn. (kast. Pollagua palustre). Minder gemein, auf den Feldern um Murcia und an anderen Orten der Provinz, in regnerischen Wintern.
181. *Gallinula crex* Lath. (V. N. Guia de codornices, Mareša, kast. Rascon comun.) Sehr häufig auf feuchten Wiesen.
182. *porzana* Lath. (V. N. Polla de aqua, Zaramagullou. — kast. Rascon mediano). Lebt das ganze Jahr hindurch...
183. *pusilla* Bechst. (kast. Rasc. pequeno). Wie die vorige Art, aber sehr selten.
184. *Bailloni* Vieill. Nicht so selten wie die vorhergehende.
185. *chloropus* Lath. (V. N. Polla de aqua, Pioverde. — kast. R. oscuro.) An den vom Meer gebildeten Tümpeln, an Gräben im Rohrgebüsch, ziemlich gemein; in der Umgegend der Hauptstadt.
186. *Porphyrio hyacinthinus* Temm. (kast. Calamon vetusto). Sehr selten und immer nur gelegentlich.
187. „ *variegatus* Guirao (kast. Cal. abigarcado). Im Herbst 1854 vom Verf. unmittelbar am sog. Mar Menor beobachtet und in der Original-Abhandlung ausführlich beschrieben und abgebildet.

*Orden XIV. Pinnatipedas.*

188. *Fulica atra* Linn. (V. N. Focha. — kast. Fulica negra). Zur Winterszeit gemein in den Gegenden am Meere und an den Lagunen.
189. *Podiceps cristatus* Lath. (V. N. Gallineta. — kast. Somorgajo moñudo). Am Mar Menor beinahe das ganze Jahr hindurch, aber selten.
190. „ *cornutus* Lath. Ebenso.
191. „ *auritus* Lath. Häufiger als die vorigen Arten.
192. „ *minor* Lath. Sehr häufig durchs ganze Jahr am Mar Menor; wurde auch an einigen Stellen am Segura-Flusse erlegt.

*Orden XV. Palmipedas.*

193. *Sterna caspia* Pallas (V. N. Gavina. — kast. Gavina caspia). Manches Jahr häufig am Mar Menor.

194. *Sterna cantiaxa* Gmel. (kast. *Gavina africana*). Ebenso.
195. „ *hirundo* Linn. (kast. *G. galondrina*). Sehr häufig das ganze Jahr hindurch, meistens an den Ufern des Mar Menor.
196. *anglica* Montag (kast. *G. piquinegra*). Spärlich.
197. *nigra* Linn. (V. N. *Espumaell.* — kast. *G. variable*). Sehr gemein um Mar Menor.
198. „ *minuta* Linn. (V. N. *Charranes.* — kast. *G. pequeña*). Ebenfalls sehr gemein durch das ganze Jahr, am sog. Mar Menor, in dessen Umgebung sie auch nistet.
199. *Larus marinus* Linn. (V. N. *Gavinote*). Ebenso.
200. „ *argentatus* Brum. Kommt nur spärlich vor.
201. „ *canus* Linn. Selten, zur Herbstzeit.
202. „ *tridactylus* Lath. An den Ufern des Mar Menor und an der Küste des mittelländischen Meeres in dieser Provinz.
203. *ridibundus* Zeisler (kast. *Gaviota risueña*). An den Küsten des mittelländischen Meeres, überall.
204. *Thalassidroma pelagica* Linn. (kast. *Talassidroma marina*). Nistet alljährlich auf einigen wüsten Inselchen des mittelländischen Meeres, Las Hormigas und Isla Grosa.
205. *Anser segetum* Briss. (kast. *Ganso bravo*). Selten und gelegentlich im Herbst, kommt in die Nähe an die Ufer von Segura, an vereinzelt Stellen.
206. *Anas Boschus* Linn. (V. N. *Pato.* — kast. *Anade colliverda*). Ziemlich häufig an den Ufern der Flüsse und Gräben.
207. *acuta* Linn. (kast. *A. colilargo*). Selten und gelegentlich im Winter.
208. *Penelope* Linn. (kast. *A. silbador*). Spärlich an Flüssen und sumpfigen Stellen der Provinz.
209. *clypeata* Linn. (V. N. *Pato.* — kast. *A. cuchareta*). Selten und gelegentlich, zur Winterszeit.
210. *querquedula* Linn. (V. N. *Patico.* — kast. *A. cercetilla ó Cerceta comun*). Häufiger als die vorhergehenden Arten, mehr im Frühjahr als im Winter.
211. „ *crecca* Linn. (V. N. *Patica*). Bloss zur Winterszeit.
212. „ *marmorata* Temm. (kast. *A. jasperdo*). Selten; bloss im Frühjahr.
213. *rufina* Pall. (kast. *A. moñirojo*). Selten *panracis* zur Winterszeit.
214. „ *fulgula* Linn. (kast. *A. moñinegro*). Ebenso.

215. *Carbo cormoranus* Meyer (V. N. Cuervo marino. — kast. Cuervo-mar grande).
216. *Colymbus septemtrionalis* Linn. (kast. Colimbo cuellirojo). Zufällig, am Mar Menor.
217. *Uria troile* Lath. (kast. Uria patioscura). Auch sehr selten und wohl zufällig, in der Nähe des Mar Menor.
218. *Mormon fratercula* Temm. (kast. Prailecillo pequeño). Ebenso.

### Bruchstück aus der Argentinischen Flora.

Von Dr. *Johann Pulacký*.

Beinahe alle Länder der Erde besitzen wenigstens einen Versuch einer Flora; nur der ungeheuerere Länderstrich Süd-Amerikas, südlich von Brasilien und Chili, besitzt nichts derart, nicht einmal eine Lokalfloora, obwohl Danoin, Gillies, Tweedie, Wilkes, Orbigny, Sellow Commerson u. A. hier sammelten. Wir theilen unsere Excerpte hauptsächlich aus Hooker zu dem Zwecke mit, wenn es Jemand, z. B. Burmeister, gefällig wäre, an Ort und Stelle etwas zu sammeln.

*Clematis bonariensis* Juss. (auch Cordova, Mendoza Entrerios), *Thalictrum rutidocarpum* DC. (S. Luis), *Anemone decapetala* L. (Uruguay, Mend), *triternata* Vahl (Urug, Buenos Ayres), *Ranunculus trisepalus* Gillies (B. A., Parana), *cymbalariae* Pursch (Mend), *sceleratus* L. (B. A.), *musicatus* L. (B. A., Lecuman), *peduncularis* Len. (Mend.), *apiifolius* (B. A.), *Cissampelos australis* St. Hilaire (Urug), *Berberis ruscifolia* Lam. (B. A., Cond.), *Grevilleana* (Gill- M., Anden), *empetrifolia* Lam. (detto) *Argemone mexicana* L. (B. A., Mend., Pampas), *Fumaria capreolata* L. (B. A., cult), *Draba magellanica* (Mend. Anden), *Gilliesii* Hook. (detto). *Arabis spathulata* (B. A.), *Commersonii* (dri.), *Capsella bursa pastoris* (Pampas), *Thlaspi magellanicum* Pers. (Mend), *Vesicaria arctica* Rich. (St., Luis, Mend.), *Sisymbrium Arnottianum* Gill (Mend.), *irio* L. (M.) *stenophyllum* Gill. (Cordova), *frutescens* Gill. (Mendoza), *canescens* Nutt. (M., B. Ayr., St. Luis), *Cardamine bonariensis*, *Nasturtium bonariense*, *Erysimum pusillum* Gill. (M.), *Senebiera serrata* (Monte Video = MV), *pinatifica* (B. A.), *Lepidium bonariense* L., *ruderales* L. (M.), *Hexaptera filifolia* (M.), *spathellata* Gill. (M.), *cuneata* Gill. (M.), *Crambe filiformis* (Patagonia, Wilkes) *Cleome crenopetala* (Urugzy), *hexaphylla* L. (BA.), *psoraleaefolia* DC. (St. Luis), *affinis* DC (Missionen), *Atamisquea emarginata* Miers (M.), *Victoria cruziana* Pl. (Paraguay), *Helianthemum brasiliense* Pers. (BA,

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Weitenweber Wilhelm Rudolph

Artikel/Article: [Die Vögelfauna der Provinz von Murcia in Spanien 212-216](#)