

215. *Carbo cormoranus* Meyer (V. N. Cuervo marino. — kast. Cuervo-mar grande).
216. *Colymbus septemtrionalis* Linn. (kast. Colimbo cuellirojo). Zufällig, am Mar Menor.
217. *Uria troile* Lath. (kast. Uria patioscura). Auch sehr selten und wohl zufällig, in der Nähe des Mar Menor.
218. *Mormon fratercula* Temm. (kast. Prailecillo pequeño). Ebenso.
-

Bruchstück aus der Argentinischen Flora.

Von Dr. Johann Pulackj.

Beinahe alle Länder der Erde besitzen wenigstens einen Versuch einer Flora; nur der ungeheuren Länderstrich Süd-Amerikas, südlich von Brasilien und Chili, besitzt nichts derart, nicht einmal eine Lokalflora, obwohl Danoin, Gillies, Tweedie, Wilkes, Orbigny, Sellow Commerson u. A. hier sammelten. Wir theilen unsere Excerpte hauptsächlich aus Hooker zu dem Zwecke mit, wenn es Jemand, z. B. Burmeister, gefällig wäre, an Ort und Stelle etwas zu sammeln.

Clematis bonariensis Juss. (auch Cordova, Mendoza Entrerios), *Thalictrum rutidocarpum* DC. (S. Luis). *Anemone decapetala* L. (Uruguay, Mend.), *triternata* Vahl (Urug, Buenos Ayres), *Ranunculus trisepalus* Gillies (B. A., Parana), *cymbalariae* Pursch (Mend.), *sceleratus* L. (B. A.), *musicatus* L. (B. A., Lecuman), *peduncularis* Len. (Mend.), *apiifolius* (B. A.), *Cissampelos australis* St. Hilaire (Urug), *Berberis ruscifolia* Lam. (B. A., Cond.), *Grevilleana* (Gill- M., Anden), *empetrifolia* Lam. (detto) *Argemoue mexicana* L. (B. A., Mend., Pampas), *Fumaria capreolata* L. (B. A., cult), *Draba magellanica* (Mend. Anden), *Gilliesii* Hook. (detto). *Arabis spathulata* (B. A.), *Commersonii* (dri.), *Capsella bursa pastoris* (Pampas), *Thlaspi magellanicum* Pers. (Mend.), *Vesicaria arctica* Rich. (St., Luis, Mend.), *Sisymbrium Arnottianum* Gill (Mend.), *irio* L. (M.) *stenophillum* Gill. (Cordova), *frutescens* Gill. (Mendoza), *canescens* Nutt. (M., B. Ayr., St. Luis), *Cardamine bonariensis*, *Nasturtium bonariense*, *Erysimum pusillum* Gill. (M.), *Senebiera serrata* (Monte Video = MV), *pinatifida* (B. A.), *Lepidium bonariense* L., *ruderale* L. (M.), *Hexaptera filifolia* (M.), *spathellata* Gill. (M.), *cuneata* Gill. (M.), *Crambe filiformis* (Patagonia, Wilkes) *Cleome crenopetala* (Urugzy), *hexaphylla* L. (BA.), *psoraleaeifolia* DC. (St. Luis), *affinis* DC (Missionen), *Atamisquea emarginata* Miers (M.), *Victoria cruziana* Pl. (Paraguay), *Helianthemum brasiliense* Pers. (BA,

Pampas). Ferner *Viola congesta* Gill. (Mend.), *volcanica* Gill. (Cerro del Diamante), *Jonidium glutinosum* Vent. *diffusum* G. (BA.), *Polygala gnidiooides* Willk. (M.), *Neaei* DC. (Cordova), *polycephala* St. Hil. (BA., Meng.), *linoides* Poiret (BA., Urag.), *dictans* St. Hil. (Urag.), *obovata* St. Hil. (Urag.) *spinescens* Gill. (M.) *Monnina pterocarpa* Raiz (M.), *cardiocarpa* St. Hil. (Urug.), *Silene gallica* BA., *Spergularia platensis*, *Sagina procumbens* BA., *Arenaria media* DC. (BA.), *bonariensis* Gill., *Cerastium vulgatum* (M.), *latifolium* (M.) *arvense* (M.), *Casearia montevidensis*, *lanceolata*, *Linum junceum* St. Hil. (Ur.) *Malva sulphurea* G. (M.), *humilis* Hook. (M.), *peduncularis* (Cordova), *crispa* (M., Bot.) *tenella* Cav. (M.), *miniata* Cav. (M.), *obtusiloba* Hook. (M.), *lonariensis* Cov. (BAyr., Cord.), *glomerata* Hook. (Parana), *geranioides* Gill. (M.), *Pavonia communis* St. Hil. Parana, *hastata* Cav. (St. Luis, BA., Ur.), *Hibiscus amoenus*, *angustifolius* Hook. (Plata), *Cristaria heterophylla* Hook. (M.) *Anoda hastata* Cav. (BA.) *Sida*, *rhombifolia* (BA.), *hastata* St. Hil. (Ur.), *Jussieuana* DC. (Entrerios), *Sida candicans* DC. (M.), *sessiliflora* Hook. (BA.), *picta* Gill. (BA.), *Grevilleana* Gill. (M.), *mollis* Ort. (Martin Garcia), *Arnottiana* Gill. (S. Luis) *densiflora* Hook. (C. Borja), *Melochia pyramidata* L. (Ur.), *Corchorus argutus* Kunth (Missionen), *Luhea divaricata* Martius (Ur.). *Ximenia americana* L. (BA.), *Hippocratea connatum* (MV.), *tamariscinum* (MV.), *parviflorum* St. Hil. (Ur.), *myrianthum* (MV.), *Bunchosia multiflora* Hook (Cossientes), *Bannisteria bonariensis* Hook; *Heteropteris glabra* Hook. (Entrerios), *Tricomaria usillo* H. (M.), *Cardiospermum velutinum* H. (Missionen), *Serjania sinuata* Schumacher (U.), *Cupania uraguensis* H. (Ur.), *Schidelia edulis* St. Hil. (Corrientes), *Dodonea jamaicensis* DC. (Ur.), *Cissus bonariensis* H. (BA. Ur.), *Geranium acaule* Willd. (Mend., *dissectum* (M.), *Erodium cicutarium* (BA.). *moschatum* (BA.), *Tropaeolum pentaphyllum* Lam. (BA.), *polyphyllum* Cav. (M.) *Oxalis repens* Thbg. (Ur.), *andicola*, *lineata*, *macrorhiza*, *compacta*, *erythrorhiza*, *subacaulis* (alle Gill. Hk., M.), *geminata* Hk. (Mend.) *violacea* (BA., Ur.) *bipunctata* Graham (BA.), *autumnalis* St. Hil. (Bot.), *acetosella* (BA. ?), *adenophylla* Gill. (M.), *lasiopetala* (MV.), *Tribulus lanuginosus* (M.), *Larrea nitida* Cav. (M.), *divaricata* (M.), *cuneifolia* (M.), *Zygophyllum retama* Gill. (S. Juan, M.), *Plectrocarpa tetracantha* Gill. (Travesia (Wüste) de St. Juan), *Porlieria hygrometrica* (Ruiz, S. Luis), *Zanthoxylon coca* Gill. (St. Luis), *Guindilia trinervis* Gill. (M.), *Ilex cuneifolia* (BA.) *Todina* (Hook.) *rhombifolia* (Ur., B. Ayr., S. Luis), *Celastrus quadrangularis* DC. (Ur. Entrerios), *Sageretia trinervis* Gill. (Mend.), *Condolia microphylla* Cav. (M.), *paradoxa* Spreng. (Montevideo, Moldonado), *Discaria americana* Hook. (BAyr., St. Luis, Cord.), *Colletia*

spinosa Lam., (M.), ferox Hook. (M.), longispina (Hock., U.), Gouania ternifolia (Hook., Ur.), Caselia oblongifolia St. Hil. (Corientes) Dunana descendens DC. (M.) longifolia (BA.), Schinus terebintifolia (Missionen), ternifolius G. (S. Luis), Crotalaria B. Brownei Bert. (Ur.) Genista elegans G. (M.), rigida G. (Mend.); Medicago sativa, minima, denticulata Willd. (nach Tweedie der gemeine Pampasklee), Melilotus lanceolata (BA.), passiflora (BA., M., St. Juan), Trifolium obcordatum (Ur., Bot.), polymorphum (BA.), Psoralea glandulosa (BA.), higuerrilla G. (Cord.), Indigofera anil (Missionen), Clitoria brasiliiana (dtto), Cologania heterophylla Gill. (MV.) Galactia Jussieuana Kunth (Pampas), stenophyllum St. Hil. (Ur.), Dalea elegans G. (St. Luis), pulchella, Glycyrrhiza astragalina G. (M.) Galega officinalis BA.), Sesbania occidentalis Pers. (BA.), Colutea arborescens (Mend. cult.), Sutherlandia frutescens (R. Br. c. M.), Phaca inflata G. (M.), Arnottiana G. (M.), Cruikshankii (St. H. M.), carinata Hook. (M.), Astragalus Benthamianus G. (M.), complicatus G. (M.), Poiretia psoraleoides DC. (MV., Pampas), Zornia angustifolia Sm. (Pampas), Adesmia bicolor (MO), pendula (BA., MVid.), retrofracta St. Hil. (M.), Gilliesii Hook. (M.), confesta (S. Luis), grandiflora G. (M.), aspera G. (M.), punctata (MV. BA.), muricata (Patagon), coluteoides (G., M.), trijuga (G., M.), horrida (G. M.), pinifolia, Atpallatensis, trifoliolata (dtto.), Aeschynomene montevidensis, latifolia Spr., Desmodium acuminatum (Ur.) cuneatum Hook. (U.) leiocarpum (MV.), Vicia tephrosioides (M. V., Sel-loi (MV. stenophylla (MV.) nana, obscura, montevidensis (dtto) graminea (Bot., Mend., St. Luis), dentata (G. Bot.), bijuga (G. M.), Lathyrus sessilifolius (BA.) pubescens (M.) tomentosus (BA.) macropus (G. M.), subulatus (MV. BA.), crassipes G. (BA.) montevidensis, sericeus (MV.), nervosus (MV.) Rhynchosia mendoziensis (G. M.), sericea (G., St. Luis) senna (Gill. Cordova), Dolichos vexillatus HBK., Lablab vulgaris (BA. MV. c.), Canavalia paranaensis, Camptosema rubicundum Hook. (Ur.), Lupinus albuscens (HK., Ur.), aureonitens (Gill. M.), ancicola, microcarpus (M.), incanus BAyr.), multiflorus (BA.), bracteolaris (MV.), Erythrina crista galli (c. BA. MVid.), Swartzia ochracea (BA.) Mimosa adpressa HK. (Ur., Entrerios), uraguensis, asperata, hirsuta, Inga uraguensis, parvifolia (HK. Ur.), Desmanthus strictus (BA.), Prosopis dulcis Kunth (S. Luis), flexuosa DC., siliquastrum (M.) torquata (St. Luis), astringens (Gill., Men., St. Juan), humilis Gill. (BA.), ephedrioides (G., S. Luis), sericantha (G., St. Luis), globosa (G. M.) affinis, denudans (Patagonien), Calliandra bicolor (Ur.) Acacia strombulifera (M.), Sprengelii (HK., Ur., BA., MV.), Bonplandii (G., BA.), lepidota (HK., Ur.) adenocarpa (HK., Ur.), cavenia (M. BA.), aroma (G., St. Juan), furcata

(G. BA., Mend.), bonariensis (G. Entrerios, BA.), Spirolobium australe (Orbig. Patagonien), Enterolobium timousa Ur.), Coulteria tinctoria BK., Gourliea decorticans (G., M. Cord., S. Luis.) Caesalpinia praecox (Ruiz, Men-doza), Poinciana Gilliesii (HK., S. Luis), Hoffmanseggia falcata Cav. (S. Luis), Parkinsonia aculeata (Entrerios), Zuccagnia punctata (Cav., Mend.), Stylozanthes montevidensis, Cassia corymbosa (BA., M.), Hooke-riana (G. S. Luis), Arnottiana (G. M.), occidentalis L. (BA.), aphylla Cav. (M., St. Luis), Bauhinia forficata (Ur.), Frageria bonariensis, Mar-gyricarpus setosus Ruiz (BA., U., Cord.) alatus (Gill. C. Luis), Acaena integerrima (G., M.), caespitosa (G., M.), pinnatifida (Ruiz., M.), myriophylla (BA.), adscendens Vahl (M.), sericea (Patag., Port Désiré), Rubus Selovii (MV.), Epilobium alpinum L. M., pedicellare Presl (M.), Oenothera mendocinensis G., longiflora (BA., Entrerios), odorata (M., Patag.), acaulis Cav., mollissima BA., centauriflora (MV.), australis (Pa-tag.), Gayophytum micranthum Hook. (M. St. Luis), Jussiaea repens L. (M., BA.), montevidensis, multinervis (HK., BA.), longifolia DC. (BA.), bracteata Hook. (Urug.), bexapetala Hook. (U.), stenophylla (Gill.) Myriophyllum proserpinacoides (G., BA.) ternatum (Gaud. M.), Lythrum hyssopifolium L. (M.), flavum (MV.), Cuphea ligustrina (BA., MV.). glabrata (G., BA.), spicata Cav. (U.) glutinosa Cham. (Bot.), Heincia grandiflora (BA.), salicifolia (Cord.), Myrtus lurida (MV.), triflora (MV.), Psidium amygdalinum! Hook. (Conientes), Tetrastemon loranthoides Hook. (Missionen) Eugenia Tweedii Hook. (Ur.), elliptica Hook. (Ur.), Rhexia heterophylla Hook. (U.) Arthrostemmanitidum (BA.), Clidemia paraguayensis Miconia Renggeri, Fleischeriana, repandocrenata (Paraguai excl.), Bryonia ficifolia (BA.), tenuifolia Gill. (S. Fè, BA. Cord.) Momordica hystric (G., BA.), Cucurbita asperata (G., M.).

(Fortsetzung folgt.)

M i s c e l l e n.

** Prof. Harting in Utrecht hat ein neues Instrument, um den Umfang des Kopfes in verschiedener Richtung an lebenden Menschen genau graphisch darzustellen und zu vermessen, erfunden und dasselbe in einer eigenen Schrift: Le Képhalographe etc. (Utrecht 1861 mit Figuren) beschrieben, Prof. Vrolik hatte das etwas complicirte Instrument für die Anthropologen-Versammlung in Göttingen zur Einsicht und Prüfung mitgebracht.

** Im neuesten Hefte des Jahrbuches der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien (XII. Band Nr. 3 Mai - August 1862) sind noch folgende schätzbare

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Palacky Jan Kritel Kaspar

Artikel/Article: [Bruchstücke aus der argentinischen Flora 216-219](#)