

bahnverbindung neuerlich gewordenen Annäherung des angeblichen böhmischen Fundortes der *V. nummlariaefolia* All. ist wohl sicher zu hoffen, dass die Prager Botaniker im nächsten Frühjahr fleissig nach dieser Pflanze zu suchen, die Mühe nicht scheuen werden.

Beiträge zur Flora Böhmens.

Von med. stud. A. Reuss.

Ich gebe in Folgendem ein Verzeichniss der von mir in diesem Jahre gesammelten, weniger häufigen böhmischen Pflanzen, als Fortsetzung einiger in den früheren Jahrgängen dieser Zeitschrift enthaltenen Verzeichnisse. Dass viele schon bekannte Standorte darin enthalten sind, glaube ich dadurch entschuldigen zu können, dass diese theils nur in engeren Kreisen bekannt sein dürften, theils zur genaueren Bestimmung älterer Fundorte dienen mögen. Die angegebenen Pflanzen sind meist in der Umgebung von Prag, Raudnitz, Teplitz, Komotau, Poděbrad und Weisswasser gesammelt.

Festuca Pseudo-myuros Soyer-Willemet. Auf einem sonnigen Abhange bei Weisswasser.

Corynephorus canescens Beauv. Sehr häufig auf Sandfeldern und in Kieferwäldern bei Raudnitz; bei Hirschberg in der Nähe des Grossteiches; auf Sandfeldern bei Weisswasser.

Carex pulicaris L. Auf einer sumpfigen Wiese an der Eisenbahn bei Běchovic nächst Prag.

Carex canescens L. Auf sumpfigen Wiesen bei Neudorf nächst Weisswasser.

Carex paniculata L. Mit der vorigen, häufig.

Carex Micheli Host. Häufig im Raudnitzer Thiergarten.

Carex filiformis L. In den Sümpfen am Ufer des Heideteiches bei Hirschberg.

Gagea bohemica Schult. In den Umgebungen Prags: an einem Felde am Belvedere, in der Podhava, auf dem Höhenzuge von der Fliedermühle bis Hrdlořez und am Berge Tabor, am Žižkaberge oberhalb des Invalidenhauses.

Allium acutangulum Schrad. Häufig auf den Wiesen bei Libio und auf der Blátowiese nächst Poděbrad.

Muscari comosum Mill. In der Podbaba bei Prag; auf Feldern zwischen Jungbunzlau und Weisswasser.

Gymnadenia conopsea R. Br. und

Listera ovata R. Br. Nächst dem Berge Bösig bei Weisswasser.

Cephalanthera pallens Rich. Wälder bei Tuchoměřic nächst Prag.

Epipactis palustris Crantz. Häufig auf einer sumpfigen Wiese nächst der Cibulka bei Prag.

Epipactis latifolia All. Am Woschkaberge bei Poděbrad.

Najas major All. In der Elbe bei Launken zwischen Raudnitz und Leitmeritz.

Potamogeton perfoliatus L. und

Potamogeton pectinatus L. Im Mrdlinabache bei Nimburg.

Betula pubescens Ehrh. Im „Rovneyer Busche“ bei Raudnitz; am Ufer des Heideteiches bei Hirschberg.

Salsola Kali L. Auf dem Eisenbahndamme in Holešowic bei Prag.

Passerina annua Wickstr. Auf einem grasigen Waldwege in der sog. Habrovka in bis 1 $\frac{1}{2}$ ' hohen, besenartig-ästigen Exemplaren und auf Feldern beim Hofe Kalešov nächst Raudnitz.

Plantago arenaria WK. Häufig auf dem Eisenbahndamme in Holešowic bei Prag; auf Sandfeldern bei Wettel nächst Raudnitz.

Eupatorium cannabinum L. Auf dem Woschkaberge bei Poděbrad.

Petasites albus Gärtn. Bachufer im Grundthale bei Komotau.

Petasites officinalis Mönch. Mit dem vorigen, jedoch viel seltener.

Solidago alpestris WK. Auf Wiesen bei Zinnwald im Erzgebirge.

Helichrysum arenarium DC. Selten im Deberschethale bei Bilin.

Echinops sphaerocephalus L. Am Eisenbahndamme des Raudnitzer Bahnhofes.

Jurinea cyanoides Rchb. Auf einem Felde nächst dem Berge Sowitz bei Raudnitz. (Viel häufiger jedoch zwischen Raudnitz und Theresienstadt).

Arnoseris pusilla Gärtn. Auf einem Sandfelde zwischen Raudnitz und Wettel.

Podospermum laciniatum DC. Strassenränder bei Dewic nächst Prag.

Xanthium spinosum L. Sehr häufig am Bahnhofe und im Dorfe Peček bei Poděbrad.

Xanthium strumarium L. Am Woschkaberg bei Poděbrad.

Lonicera coerulea L. Im Krinsdorfer Grunde bei Klostergrab im Erzgebirge.

Gentiana Pneumonanthe L. Auf der Blátowiese bei Pátek nächst Poděbrad.

Stachys germanica L. Am Woschkaberg bei Poděbrad.

Chaiturus Marrubiastrum Rchb. Klein-Zboží bei Poděbrad.

Ajuga Chamaepitys Schreb. Auf Feldern am Woschkaberg bei Poděbrad; nächst dem Hofe Katešov bei Raudnitz; bei Brozan nächst Theresienstadt.

Stachys annua L. Felder um Raudnitz.

Cerintho minor L. Am Woschkaberge bei Poděbrad.

Verbascum Blattaria L. An Rainen bei Poděbrad und Nimburg; in der Raudnitzer Fasanerie.

Verbascum Schiedeanum Koch. (*V. nigro-Lychnitis* Schiede). Unter den Stammeltern in der Lippnai bei Teplitz.

Linaria Elatine Mill. Auf Feldern am Woschkaberge bei Poděbrad; häufig auf Feldern um Křečkov bei Poděbrad.

Linaria spuria Mill. Auf Feldern am Woschkaberge bei Poděbrad; auf Feldern am Rande der Brozauer Fasanerie. An beiden Orten in Gesellschaft von *Euphorbia falcata* L. und *Ajuga Chamaepitys* L.

Linaria arvensis Desf. Auf einem Kleefelde bei Komotau; auf einem Getreidefelde bei Ouval nächst Prag.

Veronica praecox All. Verbreitet auf Feldern bei Raudnitz.

Utricularia minor L. In Gräben in den Sümpfen am Ufer des Heide-
teiches bei Hirschberg.

Androsace septemtrionalis L. Auf Sandfeldern bei Dobřin nächst Raudnitz; auf Eisenbahndämmen und Sandfeldern zwischen Raudnitz und Theresienstadt. An beiden Orten häufig.

Lysimachia nemorum L. Häufig im Sunegrunde zwischen Eichwald und Zinnwald im Erzgebirge; bei Neudorf nächst Weisswasser.

Pyrola uniflora L. Bei Neudorf nächst Weisswasser.

Pyrola minor L. Mit der vorigen.

Peucedanum alsaticum L. Am Berge Sovic bei Raudnitz, selten.

Scandix pecten Veneris L. Auf Feldern am Wege in den Raudnitzer Thiergarten.

Sedum villosum L. Auf sumpfigen Stellen am Ufer des Hirschberger Grossteiches.

Sedum purpurascens Koch. An steinigten Feldrändern bei Zinnwald im Erzgebirge.

Saxifraga decipiens L. Am Selnitzer Berge bei Bilin.

Saxifraga tridactylites L. Am Georgsberge bei Raudnitz.

Thalictrum aquilegifolium L. Häufig im Grundthale bei Komotau.

Thalictrum flavum L. Bei Libic und auf der Blátowiese bei Poděbrad.

Pulsatilla patens Mill. An einer trockenen sonnigen Stelle am Waldrande bei Schönalind im Erzgebirge nächst Komotau.

Adonis vernalis L. Nächst dem Hofe Kalešov bei Raudnitz.

Myosurus minimus. Allgemein verbreitet auf Feldern bei Eidlitz und Komotau; bei Brüx.

Nasturtium officinale RBr. Wiesengräben bei Weisswasser und Dauba.

Nasturtium austriacum Crantz. Auf einer Wiese bei Wědomic nächst Raudnitz.

Conringia orientalis Rehb. Auf einem Felde am Wege in den Raudnitzer Thiergarten.

Taesdalia nudicaulis RBr. Sehr häufig auf Sandfeldern und in den Kieferwäldern bei Dobřin nächst Raudnitz; auf Sandfeldern bei Weisswasser.

Viola palustris L. Bachufer im Komotauer Grundthale.

Corrigiola litoralis L. Häufig am Elbeufer bei Launkon; selten bei Wědomic nächst Raudnitz.

Herniaria hirsuta L. Auf sandigen Feldern zwischen Weisswasser und Jungbunzlau.

Spergula Morisonii Bor. Bei Weisswasser; in der Scharka und auf der Höhe hinter der Fliedermühle bei Prag.

Alsine verna Bartl. Im Walde nächst Weisswasser an der Strasse nach Jungbunzlau.

Lavatera thuringiaca L. Am Woschkaberge bei Poděhrad.

Malva Alcaea L. Ungemein häufig in der Černowitzer Fasanerie bei Raudnitz.

Elatine hexandra DC. Sehr häufig am Ufer des Barbarateiches bei Dux.

Elatine Alsinastrum L. Mit der vorigen, aber viel seltener.

Polygala Chamaebuxus L. Schönling im Erzgebirge bei Komotau.

Euphorbia lucida L. In den Umgebungen von Poděhrad: bei Libic, bei Křečkov, auf der Blátowiese zwischen Wokřínek und Pátek.

Euphorbia falcata L. Auf Feldern bei Brozan, am Woschkaberge bei Poděhrad; am Sowitz bei Raudnitz bei Bilin.

Circaea alpina L. An einem Graben bei Niklasberg im Erzgebirge.

Lythrum hyssopifolia L. Sehr häufig auf einem Grasplatze in Wrbní-Lhota bei Poděhrad.

Potentilla supina L. Elbeufer bei Wědomic nächst Raudnitz; in einem ausgetrockneten Teiche bei Neosablitz nächst Komotau.

Trifolium parviflorum L. An einem sonnigen, trockenen Abhange bei Ounětic nächst Prag.

Tetragonolobus siliquosus Roth. Auf einer nassen Wiese bei Tuchoměřic nächst Prag; bei Křečkov nächst Poděhrad in einem lichten Gehölze.

Galega officinalis L. Am Mrdlinabache, und an einem Graben bei Wrbní-Lhota nächst Poděhrad.

Vicia pisiformis L. Am Woschkaberge bei Poděhrad.

Vicia dumetorum L. Ebenda.

Lathyrus silvestris L. In einem Graben an der Eisenbahn zwischen Běchovic und Ouval bei Prag.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Reuss August

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora Böhmens 235-238](#)