

Entomologische Notizen aus dem Egerlande *)

von *Dr. Karl v. Dalla Torre*, k. k. Professor in Linz.

I. Hymenoptera.

Fam. Tenthredonidae Leach.

- Cimbex lutea* L. Selten; an Birken, Erlen im Egerthale und bei Maria Kulm (Juni ♀ ♂).
- C. betulae* Zadd. Träge an einer Birke hängend, einmal am Annaberg (14. Juni ♂).
- C. saliceti* Zadd. Sehr selten; an einer Weide im Egerthale (Juni ♂).
- Trichiosoma lucorum* Fbr. nicht sehr selten; im Egerthale und im Franzensbader Park (Juni je ein ♀ und ♂) auf Birken.
- Clavellaria amerinae* Leach. Sehr selten; bei Siechenhaus auf einer *Spiraea* ein ♀ gefangen (Juni).
- Abia nitens* L. (= *sericea* L.) Auf Umbelliferen zweimal: bei Pograth (10. Juli ♀) und im Egerthal gegen Stein (13. Juni ♂).
- Hylotoma atrata* Kl. Gegen Kammerbüchl auf *Vicia sepium* (Juni ♀); Maria Kulm auf *Heracleum spondylium* (Juli ♀).
- H. coerulescens* Fbr. Selten bei Pograth (10. Juli ♀) auf *Pimpinella magna*.
- H. enodis* Fbr. Nicht selten auf Rosen und Umbelliferen, bes. *Carum Carvi* (Juni, Juli ♀ ♂).
- H. pagana* Puz. Sehr selten: Stein (Juni ♀).
- H. rosarum* Fbr. Gemein, wie allerorts auf Rosen (Maria Kulm in copula Juli), Birken und Dolden. Juni, Juli.

*) Zugleich als „Primitiae einer Fauna des Egerlandes.“

- H. ustulata* L. Auf Birken, Weiden und Umbelliferen mehrmals gefangen: Egerthal, Maria Kulm, Sandau (Juni ♀ ♂).
- H. violacea* Kl. ♂ auf *Anthriscus silvestris* im Fürst Metternich'schen Parke bei Sandau (Juni).
- Lophyrus memorum* L. Sehr selten: Wies auf *Pinus silvestris* (Juli ♀).
- L. pini* L. Ganz einzeln: St. Anna und Maria Kulm auf *Pinus abies* (Juni ♀).
- L. similis* Htg. Sehr selten. Egerthal. (Juli ♀).
- L. variegatus* Htg. Königswart im Parke (Juni).
- Croesus septentrionalis* L. Sehr selten: Egerthal auf einer Erle (Juni).
- Cladius difformis* Puz. Ein ♀ auf *Rosa centifolia* in einem Garten (Juni).
- Nematus abbreviatus* Hrt. Egerthal (Juni ♀) auf *Alnus*.
- N. betulae* Hrt. Franzensbader Park auf Birken (Juli ♀).
- N. flaviventris* Puz. St. Anna. (Juni ♀).
- N. melanocephalus* Hrt. Egerthal (Juni ♀) und Pograth (Juli).
- N. Saxeseni* Kl. Pograth (Juni) auf Binsen.
- Cryptocampus nigricornis* Kl. Franzensbad (Juli ♀).
- Harpiphorus lepidus* Kl. Marienbad (Juni ♀).
- Phyllotoma melanopygus* Kl auf Umbelliferen gegen Stein (Juni ♀).
- Fenusa pumila* Kl. auf *Rosa canina* beim Schöllsl (Juni ♀).
- F. pygmaea* Kl. auf *Viburnum lantana* im Franzensbader Park (Juni ♀).
- Blennocampa aethiops* Fbr. Auf *Rosa canina* — gegen Franzensbad (Juni ♀).
- B. betuleti* Kl. Um Wies; 3 ♀, Juni.
- B. ephippium* Puz. Egerthal; auf Erlen und Umbelliferen in deren Nähe zahlreich (Juni ♀).
- Leptopus hypogastricus* Hrt. Egerthal auf *Alnus* (Juni ♀).
- Dineura stylata* Kl. Egerthal (Juni ♀) auf *Viburnum lantana*.
- Mesoneura opaca* Fbr. Franzensbader Park (Juni ♀).
- Dolerus aeneus* Hrt. Pograth auf *Heracleum spondylium* (Juni ♀).
- D. anticus* Kl. wie vorige und mit ihr.
- D. eglanteriae* Fbr. Auf Erlen im Egerthale (Juni) und Franzensbad (Juni); Marienbad (Juni ♂).
- D. gonager* Fbr. Maria Kulm (Juli) auf *Rosa canina*.

- D. haematodes* Schrk. Im stillen Thal (Mai ♀) auf Birken; Kulm und Pograth auf Erlen und *Rubus fruticosus*.
- D. niger* Kl. Ramberg (Mai ♀) am Boden und auf *Philadelphus coronarius*.
- D. palustris* Kl. bei Stein (Mai ♀) auf Binsen.
- D. tremulae* Kl. Siechenhaus (April, Mai ♀).
- D. vestigialis* Kl. beim Schlössl massenhaft und die Vogelbeerbäume (*Sorbus aria*) total zerstörend, rauchwolkenartig den Gipfel des Baumes umgebend (Juni ♀ ♂).
- Emphytus coxalis* Kl. Egerthal (Juni ♀).
- E. grossulariae* Kl. Eger-Pograth und Kulm auf *Ribes rubrum* und *grossularia* (Juni).
- E. tibialis* Puz. Franzensbad (Juni) in *Campanula patula*.
- Monophadnus gagathinus* Kl. Egerthal (Juni) auf Birken; Franzensbad und Kulm auf Umbelliferen (Juni, Juli).
- M. nigerrimus* Kl. Schustersprung auf Dolden (Juni ♀).
- M. Spinolae* Kl. Königswart (Juni) auf *Chrysanthemum Leuc.*
- Hoplocampa brunnea* Kl. Um Eger auf *Rosa centifolia* u. *Crataegus oxyacantha*.
- H. crataegi* Kl. mit voriger.
- Eriocampa ovata* Kl. Schlössl. Auf *Ajuga reptans* (Mai ♀); Egerthal auf Erlen (Juni).
- Selandria morio* Fbr. Auf Rosen und Ribesarten in Gärten von Eger, Karlsbad und Marienbad (Mai, Juni ♀).
- S. stramineipes* Kl. Egerthal auf Erlen (Juni ♀).
- Athalia annulata* Kl. gegen Franzensbad auf Umbelliferen (Juni ♀).
- A. rosae* L. Auf Rosen, *Crataegus oxyacantha* und *Sorbus* um Eger; doch selten (Juni ♀).
- A. spinarum* Fbr. Pograth und Stein auf Dolden (Juni ♀); Karlsbad (Juli ♀).
- Sciaperix consobrina* Kl. Bahnhof von Eger auf Umbelliferen (Juni ♀).
- Allanthus cingulum* Kl. Auf Umbelliferen bei Stein (Juni ♀).
- A. dispar* Kl. Franzensbad (Juni) auf Umbelliferen.
- A. nothus* Kl. in vielen Abänderungen — sehr häufig auf Rosen, Pflaumen und Dolden im Egerlande (Juni ♀).
- A. scrophulariae* L. Auf Dolden am Wege nach Franzensbad. (Juni ♀).
- A. zonulus* Kl. mit voriger; auch bei Marienbad und Maria Kulm (Juni ♀).

- Macrophya albicincta* Schrk. Pograth (Juni ♀) auf Umbelliferen.
- M. duodecimpunctata* L. Egerthal auf Erlen (Juni ♀). auch var 10-punctata Krb.
- M. punctum* Fbr. Dolden um Königsberg und Marienbad — nicht selten (Juni ♀); Schlössl und Pograth (Mai ♀).
- M. quadrimaculata* Fbr. Schlössl auf *Rosa canina* (Juni ♀).
- M. ribis* Schrk. mit voriger; auf *Ribes* und *Crataegus*arten um Eger. (Juni ♀).
- M. rustica* L. Am Wege gegen Franzensbad auf *Viburnum lantana* und Umbelliferen (Juni ♀).
- Pachyprotasis rapae* L. Auf Reps gegen und um Franzensbad (Mai ♀); Marienbad (Juni ♀).
- Taxonus agilis* Kl. Auf *Ribes grossolariae* in einem Garten bei Eger (Juni).
- Strongylogaster linearis* Kl. Wies (Juni 2 ♀) auf Kiefern.
- Pocilostoma impressa* Kl. Marienbad (Juni ♀).
- Tenthredo albicornis* Fbr. Einzeln auf Dolden gegen Pograth und um Franzensbad (Juni ♀).
- T. atra* L. Sandau und Königswart (Juni ♀)
- T. aucupariae* L. Um Eger auf Dolden (Juni ♀) selten.
- T. balteata* Kl. Auf Dolden im Egerthal (Juni ♀).
- T. bicincta* L. Franzensbad (Juli ♀) auf *Heracleum giganteum*.
- T. dimidiata* Fb. Königswart (Juli ♀).
- T. fagi* Puz. Marienbad (Juli) auf Scabiosen.
- T. livida* L. Franzensbad (Juni ♀), Königswart (Juni ♀).
- T. rufipes* L. Stein (Juni 1 ♀) auf Weiden.
- T. scalaris* Kl. Königsberg, Egerthal, Franzensbad u. s. w. nicht selten (Juni ♀) auf Dolden.
- T. viridis* L. Wie vorige, doch häufiger; auch bei Maria Kulm (Juni ♀). Einmal auf *Heracleum spondylium* kleine Ameisen verzehrend.
- Tenthredopsis instabilis* Kl. Wies und Stein bei Eger (Mai ♀).
- T. sordida* Kl. Ein ♀ auf *Heracleum giganteum* im Franzensbader Park (Juli).
- Tarpa cephalotes* Fbr. Egerthal: 1 ♀ auf Erlen (Juli).
- Lyda arbustorum* Fbr. Wies (Juni ♀) auf Erlen.
- L. betulae* L. mit voriger ein ♀.
- L. Falleni* Dlm. Königsberg auf einem Holzblock (Juni ♀).
- L. silvatica* L. Maria Kulm auf *Rubus* (Juli ♀).

Cephus pygmaeus L. Massenweise auf dem Getreide und den um- und anliegenden Pflanzen auf der Südwestseite des Gebietes, ♀ und ♂ gleich häufig. Juni-Anf. Juli.

Xyela pusilla Dlm. ein ♀ bei Pechtersreuth (Mai) auf einer Birke.
Oryssus vespertilio Fbr. 1 ♀ auf *Heracleum giganteum* in Franzensbad (Juli).

Xiphydria camelus Fbr. Egerthal auf *Alnus* (Juni).

Sirex gigas L. Häufig um ganz Eger, besonders bei Wies, St. Anna und Königsberg; auch die ♂ nicht selten. Juni.

99. *S. spectrum* L. ein ♀ in Marienbad (Juli).

Fam. Cynipidae.

Teras terminalis Hrt. Im Egerthale in den Gallen gesammelt.

Cynips fecundatrix Hrtg. Im Egerthale und im stillen Thale die Gallen häufig.

C. hieracii L. aus Gallen von Sandau erhalten.

C. quercus baccarum L. und *pedunculi* L. im Egerthale nicht selten in Gallen.

Neuroterus Reaumeri Hrt. Gallen bei Pechtersreuth an einem Strauche.

Rhodites centifoliae Hrtg. Die Gallen beobachtet.

Rh. rosae L. Die gemeinste Galle im Gebiete — doch die ♂ gar selten gezogen.

9. *Anacharis typica* Wlk. gestreift. Juni.

Fam. Evanidae.

Brachygaster minutus Oliv. Im Juni in *Scabiosa* gefangen.

Foenus jaculator L. Eine der gemeineren Ichneumoniden.

3. *Evania appendigaster* Ill. Nicht selten auf Blüten vom Mai an.

Fam. Ichneumonidae.

Eupalamus oscillator Wsm. Auf *Verbascum*. Juni.

Chasmodes motatorius Grv. Ein Stück (♀) am Fenster gefangen.

Ichneumon aethiops Grv. Im Egerthale ein paarmal.

- J. albicinctus* Grv. Kulm auf Fenchelblüthen. Juni.
J. anator Fbr. Auf *Heracleum spondylium* 1 Stück.
J. annulator Fbr. Häufig vom Mai an.
J. balteatus Rtz. Auf *Heracleum spondylium*.
J. bimaculatorius Wsm Ein Stück am Bahndamme.
J. brunnicornis Grv. Im Egerthale. Juni.
J. brunniventris Rtz. Ebendaher.
J. commitator L. Auf Dolden, einzeln.
J. confusorius Grv. Auf Fenchel ein ♀. Juni.
J. culpator Grv. Selten auf Dolden. Juni.
J. deliratorius Grv. Ein Stück am M. Kulm. Juni.
J. extensorius Grv. nicht selten auf Dolden.
J. fabricator Grv. wie vorige, auch aus Puppen gezüchtet; ♂ zahlreicher.
J. fusorius Gr. Gar häufig auf Dolden; Mai-Aug.
J. ingratorius Puz. Ein Stück aus einer Noctuenpuppe gezüchtet.
J. lineator Grv. Pograth u. Kulm je ein ♂ im Mai auf Dolden.
J. luctatorius Grv. Häufig auf Dolden vom Mai an.
J. monotonus Rtz. Im Egerthal ein ♀. Juni.
J. nigritarsus Grv. Egerthal. Juni.
J. pictus Grv. Auf Asparagusblüthe ein Stück. Mai.
J. pisorius Grv. Häufig, auf Dolden.
J. pusillator Grv. Im Egerthale; auch auf *Heracleum giganteum* ein Stück.
J. quadrialbatus Grv. Pograth auf Rosen, mehrere ♂. Juni.
J. raptorius L. Auf Dolden nicht selten. Juni.
J. saturatorius Grv. Ein Stück auf *Orchis morio*. Juni.
J. sexlineatus Rtz. Egerthal.
J. submarginatus Grv. Auf *Chaerophyllum*, im Juni bei Pograth.
J. trilineatus Grv. Maria Kulm auf Rosen. Juni.
Catadelphus arrogator Grv. Auf Dolden, zweimal.
Amblyteles amatorius Grv. Auf *Philadelphus coronarius* in Franzensbad. Juni.
A. amputorius Grv. Pograth, auf *Chaerophyllum*. Juni.
A. castigator Grv. Gezüchtet aus einer Spinner-Puppe.
A. divisorius Grv. Einzeln, bei Pograth an einem Zaune.
A. oratorius Grv. Auf Dolden, nicht selten. Mai-Juli.

- A. sputator* Grv. Wie vorige, selten. Juli.
A. uniguttatus Grv. Ein Stück bei Kulm im Walde.
A. vadatorius Grv. Egerthal. Juni.
Trogus flavatorius Puz. Nicht selten auf Dolden. Mai.
T. lutorius Grv. wie vorige.
Listrodromus nyctemerus Wsm. Ein Stück auf *Heracleum spondylium*.
Probolus fossorius grv. Auf Dolden, zweimal.
Platylabus pedatorius Fbr. Ebenso.
Colpognathus celerator Grv. bei St. Anna auf Holz. Juni.
Alomya ovator Fbr. Auf Dolden, nicht gar selten.
Diadromus collaris Grv. Am Fenster, einmal.
D. troglodytes Grv. Egerthal. Juli.
Ischnus porrectorius Wsm. Ebendort.
J. truncator Wsm. Auf *Heracleum giganteum* in Franzensbad.
Crypturus argiolus Grv. Ein Stück auf einem Zaune.
Stilpnus gagates Grv. Auf Dolden bei Pograth.
Cryptus analis Grv. Auf Fenchelblüthen. Juni.
Cr. armatorius Grv. Auf Dolden bei Pograth ein Stück.
Cr. assertorius Grv. Auf Dolden häufig; Juni.
Cr. cinctorius Fbr. Egerthal im Fluge. Juni.
Cr. flagiator Grv. Auf Dolden — dann und wann, selten. Juni.
Cr. flavilabris Hrtg. Im Egerthale auf *Viburnum lantana* L. Juni.
Cr. incertus Brshke. Pograth; ein Stück. Juni.
Cr. nubeculatus Grv. Im Egerthale, ein Stück.
Cr. peregrinator Grv. Nicht selten — auf Dolden. Juni, Juli.
Cr. rufulus Gr. Franzensbad auf *Heracleum giganteum*. Juli.
Cr. sponsor Fbr. Auf Dolden, einzeln. Juni.
Cr. tarsoleucus Grv. wie vorige. Mai und Juli.
Cr. titillator L. Häufig — auf Dolden. Mai-Juli.
Cr. viduatorius Grv. Auf Rosen, zweimal. Juni.
Cubocephalus fortipes Grv. Egerthal. Juni.
Mesostenus gladiator Scop. Nicht selten auf Pflanzen an Rainen und
Wegen, auf Dolden (*Daucus carota* und *Chaerophyllum*),
Mai-Juli.
Phygadeuon abdominator Grv. Auf Dolden, häufig. Juni.
Ph. profligator Fbr. Auf Dolden, nicht selten. Mai-Juli.
Ph. sericans Grv. Auf *Heracleum giganteum* in Franzensbad. Juni.

- Catalytus Mangeri* Grv. Auf einer Pastinaca-Dolde im Juli.
Pezomachus circumcinctus Frst. Am Wege ein Stück. Juli.
Aptesis nigrocincta Grv. Egerland.
Theroscopus pedestris Grv. Wie vorige; ein Stück gefangen.
Ischnoceros rusticus Frcz. Auf *Heracleum spondylium*, einzeln.
Hemiteles areator Puz. Auf einer Sonnenblume bei Pograth. Juni.
H. dispar Rtz. Egerthal, ein Stück.
H. modestus Grv. Königswart, auf Dolden. Juni.
H. similis Grv. Egerthal, Juli.
Plectiscus erythrostoma Grv. Auf Dolden von *Heracleum spondylium*,
zweimal. Juni.
Linoceras macrobatus Grv. Im Walde bei Stein, 2 Stücke.
Orthopelma luteolator Grv. Egerthal. Juni.
Mesoleptus confusus Hgr. Auf Weidenblättern; Juni.
M. nemoralis Frc. Auf *Heracleum spondylium* im Juni.
M. testaceus Grv. Ebenso, selten.
*Euryproctes regenerato*r Fbr. am Brückenpfehl im Egerthale, ein Stück.
Mesoleius erythrocerus Gr. Egerland.
M. rufus Grv. Auf Dolden, mehrmals. Juni.
M. virgultorum Grv. Pograth, auf einer Lythrumblüthe.
Perilissus flicornis Grv. Nicht selten auf Dolden.
Catoglyptus fortipes Gr. ebenso.
C. foveolator Hgr. bei Stein, ein Stück; Juli.
C. fuscicornis Gmel. ebenfalls ein Stück, bei Kulm.
Prionopoda stictica Fbr. Königsberg auf *Galium*. Juli.
Tryphon calceator Grv. Auf Dolden. Juni.
T. praerogator Grv. Wie vorige. Juni.
T. rutilator Grv. ebenso, nicht selten; auch im Winter einmal am
Fenster gefangen.
T. segmentarius Fbr. Gr. Auf *Heracleum giganteum* in Franzensbad.
Monoblastus neustriae Rtz. Egerthal. Juli.
Acrotomus lucidulus Gr. Kulm auf Rubusarten. Juli.
Exenterus lituratorius L. Auf Dolden, als die einzige Art dieser
Gattung von mir aufgefunden.
Colpotrochia elegantula Schrk. Auf Dolden — einzeln.
Exochus curvator Grv. Egerthal auf Rubus. Juni.
Bassus laetatorius Fbr. Franzensbad an Weiden.

- B. strigator* Fbr. Auf Holz, bei Stein.
- Metopius necatorius* Fbr. Auf *Heracleum spondylium* und *Daucus carota* — zweimal. Juni.
- Exyston cinctulus* Grv. Kulm an *Rubus*.
- Helwigia elegans* Grv. Aus dem Egerlande.
- Ophion luteus* L. Häufig auf Dolden.
- O. merdarius* Grv. Stein an einer Nessel. Juni.
- O. ramidulus* L. Nicht selten auf Dolden. Mai.
- Schizoloma amictum* Fbr. Im Egerthale. Juli.
- Exochilum circumflexum* L. Auf Dolden, nicht selten. Mai.
- Agrypon canaliculatum* Rtz. Ein Stück von Kulm. Juli.
- Anomalon aphidum* Puz. Auf Dolden, einzeln. Juni.
- A. clandestinum* Grv. Im Egerthale, einzeln.
- A. ferrugator* Fbr. Auf *Daucus* am Bahndamm einmal. Juli.
- A. xanthopus* Schrk. Auf *Heracleum giganteum* in Franzensbad.
- Ophoteles glaucopterus* L. Auf Dolden, einzeln. Juni.
- Paniscus testaceus* Grv. Wie vorige.
- Campoplex inculcator* L. In *Campanula drachelium* ein Stück.
- C. pupillator* L. Häufig, ja zahlreich auf Dolden. Mai-Juli.
- Limneria armillata* Grv. Auf Dolden, einzeln.
- L. fulviventris* L. Kulm auf einer Weide; Juni.
- L. ruficineta* Gr. Im Egerthale. Juni.
- L. viennensis* Grv. Ein Stück auf *Taraxocum officinale*.
- Exolytus laevigatus* Frst. Auf Dolden, einzeln, Juli.
- Mesochorus cimbicis* Rtz. Egerthal, ein Stück.
- Banchus pictus* Fbr. Zahlreich auf *Viburnum opulus* in Franzensbad. Juni.
- B. volutatorius* L. Auf Dolden, nicht ganz selten. Juni.
- Exetastes laevigator* Vill. und
- E. tarsator* Fbr. auf *Daucus carota* — Dolden. Juni.
- Lampronota caligata* Grv. — Franzensbad ein Stück. Juni.
- Glypta fronticornis* Grv. Kulm auf einer Nessel. Juli.
- Meniscus catenator* Puz. Egerland. Juni.
- Lissonota cylindrator* Vill. Auf Dolden, einzeln; einmal auf *Centauraea jacea*. Juni.
- Polysphincta areolaris* Rtz. Stein; Juni, am Wege.
- Pimpla augens* Grv. Egerthal.

- P. examinatus* Fbr. und
P. instigator Puz. ebendort.
P. stercorator Grv. Auf einer Weide bei Pograth gefangen.
P. turionella L. Egerthal. Juni.
Theronia flavicans Fbr. Auf Dolden, nicht selten Juli.
Ephialtes carbonarius Christ. Stein und Kulm, Juli.
E. manifestator L. und
E. imperator Krb. auf Dolden und an Holzlagern nicht selten,
namentlich erstere; auch
E. rex Krb. in einem Stücke im Egerthal gefangen.
Acoenites arator Gr. Auf *Heracleum spondylium* bei Kulm und
Pograth; einzeln. Juni, Juli.
Echthrus reluctator L. Auf *Daucus carota* L. am Bahndamm.
152 *Coleocentrus excitator* Poda. Auf *Heracleum giganteum* in
Franzensbad.

Fam. Chrysidae Leach.

- Cleptes nitidula* Fbr. 1 Exempl. auf *Heracleum giganteum* in Fran-
zensbad. Juni.
Omalus auratus Dhlb. Auf *Chrysanthemum leucanthemum*, *Cornus*
sanguinea und blühendem *Rubus* in einem Dutzend ♀ bei
Maria Kulm. Juni.
O. coeruleus DG. 1 Ex. bei Marienbad auf *Trifolium rubens*. Juli.
Holopyga ovata Dhlb. 1 Exemplar auf *Centaurea Jacea* im Egerthal. Juli.
Hedychrum lucidulum Dhlb. Auf *Chrysanthemum leucanthemum* im
Egerthale; 1 Stück auf einem Brückenpfeiler. Juni.
H. rutilans Dhlb. Aus dem Egerlande.
Chrysis bidentata L. 2 ♀ aus Compositen bei Marienbad; 1 ♀ auf
*Rubus*blüthen von Maria Kulm. Juli.
Chr. cyanea L. in mehreren Stücken auf *Scabiosa arvensis* und *An-*
thriscus silvestris; bei Franzensbad und am Viadukt. Juli.
Chr. ignita L. Die häufigste Art im Gebiete, besonders beim Via-
dukt an Hölzern und Dielen, oft verjagt an 10 mal wieder-
kehrend; auch um Kulm und Marienbad. Juli.
Chr. nitidula Fbr. ein ♀ im Egerthal. Juli.
Chr. succincta L. Ein Exempl. auf *Rubus*blüthen; ein zweites aus
dem Neste von *Trypoxylon figulus*. Juli.
12. *Chr. vitripennis* Schick. mehrmals an Holzwänden. Juni.

Fam. Sphegidae Wstw.

- Mutilla europaea* L. Sehr selten; auch einzeln anzutreffen: Am Feldwege nach Pechtersreuth und ein ♀ hinter dem Schustersprung. Juli.
- M. rufipes* Fbr. 1 ♀ auf *Anthriscus silvestris* Dolden. Juli.
- Myrmosa melanocephala* Fbr. 1 ♀ auf *Heracleum spondylium* bei Stein. Juli.
- M. nigra* Ltr. 2 ♂ bei Königsberg auf *Cornus sanguinea*. Juli.
- Scolia flavifrons* Fbr. in einem Ex. aus dem Egerlande. (Folgt wohl dem *Oryctes nasicornis* in seiner Verbreitung, wie *Scolia haemorhoidalis* dem *Or. gryphus*? So wenigstens bei Bozen!)
- Tiphia femorata* Fbr. Auf *Heracleum spondylium* manchmal sehr zahlreich; meist ♀. Juni, Juli.
- T. minuta* Fbr. in 3 Exemplaren auf Hieracien bei Königsberg. Juli.
- Sapyga clavicornis* L. (prisma Kl.) in 1 ♀ auf *Anthriscus silvestris* bei Franzensbad. Juni.
- Dolichurus corniculatus* Spin. an einer Stelle am Wege zwischen dem Bahnhofe und der Kirche zu Königswart. Juli.
- Ceropales maculata* Fbr. Auf *Föniculum officinale* in einem Garten zu Dutzenden. Juli.
- C. variegata* Fbr. in 3 Ex. mit voriger.
- Aporus unicolor* Spin. 1 ♂ auf *Heracleum spondylium* gegen Stein. Juli. —
- Pogonius variegatus* odL. 1 Ex. bei Maria Kulm am Wege. Juni.
- P. hyalinatus* Dhlb. mit voriger, doch zahlreicher.
- Agenia punctum* Puz. (canaliculata Schck.) Ein ♀ auf *Heracleum spondylium*. Juli.
- Pompilus eintellus* odL. Am Wege nach Königsberg. Juli.
- P. pectinipes* vdL. Häufig am Wege zwischen Sandau und Königsberg; ein ♀ auf einer Dolde bei Pechtersreuth. Juli.
- P. quadripunctatus* Fbr. Ein ♀ auf *Heracleum spondylium* im Egerthale. Juli.
- P. trivialis* odL. 2 ♀ auf *Rubus* bei Maria Kulm. Juli.
- P. viaticus* Ltr. Auf Wegen nicht selten. Juni, Juli.
- Prionemis affinis* vdL. bei Maria Kulm. Juni.

- P. exaltatus* Puz. bei Sandau, einen kleinen Wurm eintragend. Juli.
- P. minutus* odL. Auf Dolden, nicht selten. Juli.
- P. variegatus* Fbr. Ein ♀ bei Sandau. Juli.
- Miscophus bicolor* Jur. 1 ♀ auf *Heracleum giganteum* bei Franzensbad. Juli.
- Tachytes Panzeri* odL. in 1 Exempl. mit voriger.
- T. pectinipes* L. auf *Daucus Carota* in 2 ♀ bei Pechtersreuth. Juli.
- Dinetus pictus* Spin. 3 ♀ auf *Heracleum spondylium* bei Franzensbad. Juli.
- Mimesa bicolor* Shek. bei Sandau auf Dolden. Juli.
- M. unicolor* odL. auf Dolden bei Wies auf einer Waldblösse; ein ♀ auf *Euphorbia cyparissias*.
- Ammophila sabulosa* L. gemein wie allerorts z. B. gegen Königsberg und St. Anna. Juli.
- Miscus campestris* Latr. Viel seltener als vorige, doch mit ihr im Verhältnisse 1 10.
- Psammophila affinis* K. Nicht selten; Königsberg und St. Anna, je einmal. Juni, Juli.
- Ps. viatica* L. Häufig an sonnigen, sandigen Stellen, wo sie in der Nähe von Steinen wohnt und Spinnen z. B. *Calliethera scenica* u. *histrionica*, sowie Spannerraupe und selbst eine *Selandria* sp. einträgt.
- Sphex maxillosa* Fbr. Ein ♀ bei Maria Kulm mit einer Raupe von *Larentia achatinata*. Juli.
- Mellinus arvensis* L. Häufig an sandigen Stellen und auf Dolden; trägt *Leptis tringaria* und *Exorista lucorum* ein. Juli.
- M. sabulosus* Fbr. Ein ♀ auf *Heracleum spondylium* gegen St. Anna. Juli.
- Alyson bimaculatum* Puz. Auf *foeniculum officinale* in einem Garten bei Eger. Juli.
- Hoplisis quinquecinctus* Fbr. ein ♂ auf *Echium vulgare* beim Viadukt. Juli.
- Gorytes mystaceus* L. zu 2 ♂ Exemplaren auf *Vicia sepium*, beim Schössl. Juni.
- Phyllanthus triangulum* Fbr. Häufig in der Erde nistend und auf Dolden; trägt *Anthomyia*arten ein. Juli.
- Cerceris variabilis* Schrk. Egerland.
- C. labiata* odL. 1 ♀ und ♂ bei Königswart. Juli.

- Passaloecus monilicornis* Dhlb. und
P. turionum Dhlb. auf Dolden gesellig, selten z. B. Marienbad und
 St. Anna. Juni.
- Stigmus pendulus* odL. 1 ♀ auf *Heracleum giganteum* bei Franzens-
 bad. Juli.
- Pemphredon lugubris* Fbr. 1 ♀ im Egerthal, unweit der Pulver-
 mühle an Holzstämmen. Juli.
- Trypoxylon figulus* L. Häufig in Holzwerk. Juni, Juli.
- Rhopalum tibiale* Fbr. 1 Exempl. auf Dolden im Egerthale. Juli.
- Oxybelus uniglumis* L. 2 ♀ auf *Daucus carota* bei Sandau. Juli.
- Thyreopus cribarius* L. Einige Exemplare an Baumstämmen bei
 Maria Kulm, abwechselnd zufliegend. Juli.
- Entomognathus brevis* odL. ein ♀ auf Dolden. Juli.
- Lindenius albilabris* Fbr. mit vorigem.
- Crossocerus bimaculatus* Lep. Auf *Heracleum spondylium* bei Sandau.
 Juni, Juli.
- Cr. scutatus* Shck. ein ♀ bei Königsberg. Juni.
- Ceratocolus alatus* Puz. Mehrere ♀ und 1 ♂ auf Dolden bei Stein
 und Königswart. Juli.
- C. vexillatus* odL. mit voriger; auch bei Pechtersreuth 2 ♀. Juli.
- Solenius cephalotes* Shck 1 ♀ auf *Centaurea scabiosa* bei Königs-
 wart. Juli.
- S. lapidarius* Lep. mehrere ♀ auf Dolden; trägt kleine Spanner-
 raupen ein.
- Crabro fossorius* L. Häufig auf Dolden. Juni, Juli.
- C. ornatus* Puz. 1 ♀ auf *Daucus carota* bei Sandau. Juli.
- Ectemnius dives* Lep. Auf Dolden 2 ♂, bei Franzensbad. Juli.
63. *E. vagus* odL. Auf einer Dolde von *Chaerophyllum hirsutum* im
 Egerthale. Juni, Juli.

Fam. Vespidae.

- Polistes diadema* Ltr. Gemein wie überall, auch stylopisirte ♀ manch-
 mal. Mai-Aug.
- P. gallica* L. ungleich seltener: Holzstämmen beim Viadukt. Juli.
- Vespa germanica* L. Die gemeinste Art; überall an Häusern und
 bei Obstvorräthen. Mai-Sept.

- V. media* Lep. In einzelnen Exemplaren auf Dolden im ganzen Gebiete; selten. Juli.
- V. norvegica* Fbr. 2 ♀ u. 1 ♂ bei Pechtersreuth. Juli.
- V. rufa* L. zahlreich an einer sonnigen Wegstelle gegen Kulm, Juli;
Chrysis succincta L. in deren Nähe, ob Parasit derselben?
- V. saxonica* L. Ein ♀ auf *Heracleum spondylium* im Egerthale. Juli.
- V. vulgaris* L. Gemein an Häusern u. s. w.
- V. crabro* L. Häufig, in Hausbalken, Zäunen und Baumstämmen.
Mai, Juli.
- Eumenes coarctata* Fbr. 1 ♀ auf *Heracleum spondylium*, Nest zwischen Steinen einer verfallenden Gartenmauer.
- Symmorphus sinuatus* Fbr. 1 ♀ auf *Rubus* bei Maria Kulm; Juni.
- Ancistrocerus parietum* Sauss. Auf Dolden nicht selten; ebenso in Mauern und Planken. Juni, Aug.
- A. trifasciatus* Fbr. Ein ♀ auf *Heracleum spondylium*. Juli.
- Leionotus minutus* Lep. 1 ♀ auf *Scabiosa*. Juli.
- L. nigripes* Schch. Auf Dolden mehrmals gefangen: Franzensbad und Stein. Juli.
- Oplopus spinipes* L. Auf Dolden nicht selten: Franzensbad, Königswart und St. Anna. Juli.
- O. Herrichii* Sauss. 1 ♀ auf *Rubus* bei Maria Kulm. Juli.
18. *Pterochilus interruptus* Klg. Im Egerlande.

Fam. Formicidae.

- Camponotus ligniperdus* Ltr. Gemein im Egerlande. Mai, Juli.
- C. herculeanus* L. Fast ebenso häufig, wie vorige. Juli.
- Lasius fuliginosus* Ltr. Egerthal. Juli.
- L. niger* L. gemein im Egerlande. Juni, Juli.
- L. brunneus* Ltr. Maria Kulm. Juni.
- L. flavus* Deg. gemein z. B. Pechtersreuth und Königswart. Juni.
- L. umbraticus* Nyl. Hinter Siechenhaus. Juli.
- Formica sanguinea* Ltr. Häufig im Egerthale und gegen Kulm. Juli.
- F. rufa* L. häufig in Wäldern. Mai, Juli.
- F. pratensis* Deg. Franzensbad. Juli.
- F. gagates* Ltr. bei Franzensbad gegen Schlada. Juli.
- Tapinoma erraticum* Frst. Bahnhof gegen Pograth. Juli.

- Myrmica laevinodis* Nyl. St. Anna und Maria Kulm. Juni.
M. scabrinodis Nyl. Maria Kulm. Juli.
Leptothorax acervorum Fbr. Egerthal und Königswart. Juli.
L. unifasciatus Ltr. Egerthal. Juli.
Tetramorium caespitum L. Gegen Pograth und Franzensbad. Juni;
 Wies in Waldschlägen. Juli.
 18. *Stenamma Westwoodii* Wstw. Einige ♀ im Egerthale. Juli.

Fam. Apidae.

- Colletes succincta* L. Gegen St. Anna in Callunua. Juli.
Prosopis annulata L. In Compositen und Umbelliferen, nicht selten.
 Juli. —
P. armillata Nyl. wie vorige.
P. communis Oyl. wie vorige, doch seltener.
P. confusa Nyl. wie vorige, häufig bes. auf Dolden.
P. propinqua Nyl. die häufigste Art dieser Gattung.
P. signata Puz. 1 ♀ und ♂ auf *Scabiosa arvensis*. Juli.
Sphecodes ephippius L. Häufig und zahlreich auf *Heracleum spondylium* bei Franzensbad und Königswart. Juni, Juli.
Sph. fuscipennis Grm. Auf *Scabiosa* ein ♀. Juli.
Sph. gibbus L. Gesellschaftlich auf Dolden häufig. Juli.
Sph. subquadratus Sm. ein ♀ auf *Euphorbia cyparissias* L. Juli.
Halictus cylindricus Fbr. Puz. wie allerwärts, auf Disteln und Compositen, nicht selten. Juni, Juli.
H. albipes Fbr. Einzeln in Ligulifloren. Juli.
H. convexiusculus Schck. In *Campanula glomerata* bei Stein. Juni.
H. fasciatus Nyl. Einzeln in Compositen, bes. auf Sümpfen: Stein und Franzensbad. Juli.
H. laevis Kirb. 2 ♀ auf *Rubus* bei Maria Kulm. Juli.
H. leucozonius Kirb. Nicht selten in Disteln und *Rosa canina*; gegen den Friedhof und Schlada. Juni, Juli.
H. maculatus Sm. Einzelne ♀ auf *Scabiosa*, *Centaurea jacea* und *Trifolium arvense*, im Egerthale und bei Königswart. Juli.
H. morio Kirb. Ausschliesslich nur auf *Convolvulus arvensis* am Wege gegen Franzensbad gefangen. Juli.
H. pusillus Schck. einzeln auf *Campanula glomerata* u. *patula*. Juli.

- H. tetrazonius* Kl. (= *quadricinctus* Fbr.) Einigemale auf Umbelliferen und Compositen, bes. Disteln: Königswart und Pechtersreuth. Juli.
- H. quadricinctus* Fbr. (= *quadristrigatus* Ltr.) auf Cirsien, oft selbe massenhaft belagernd, besonders ♀ zahlreich: Schlada und Pograith.
- H. smeathmanellus* Kirb. Auf *Campanula trachelium* und *patula* nicht selten, bes. ♂. Juni.
- H. villosulus* Kirb. Bei Stein und Egerthal auf *Ranunculus reptans* besonders ♀ zahlreich. Juni, Juli.
- H. zonulus* Sm. 2 ♀ auf *Rosa canina* ausserhalb Bruckthor gegen Franzensbad. Juni, Juli.
- Andrena albicans* Kirb. Egerthal und St. Anna auf *Salix*arten ziemlich zahlreich. Mai.
- A. albicus* Kirb. wie vorige, doch ganz einzeln.
- A. Cetti* Schrk. ein ♀ auf *Cirsium lanceolatum*, ein zweites auf *Scabiosen*. Mai.
- A. cineraria* L. Auf Weiden nicht selten; Mai.
- A. collinsonana* Kirb. ein ♀ auf *Salix purpurea* bei Stein. Mai.
- A. convexiuscula* Kirb. auf *Campanula trachelium* 2 ♀. Juni.
- A. fulva* Schrk. auf *Ribes rubrum* und *grossularia* nicht selten. Mai.
- A. fulvicrus* Kirb. Auf *Rosa canina* und *Campanula glomerata* eine der häufigeren Arten. Mai.
- A. Gwynana* Kirb. Auf Weiden; häufig: Egerthal, St. Anna und Franzensbad. Mai.
- A. Hattorfiana* Fbr. ein ♀ auf *Scabiosa arvensis* bei Stein. Juni.
- A. helvola* L. einzeln, auf Compositen. Mai.
- A. parvulus* Kirby. Auf *Calunna vulgaris* ein ♀. Oct.
- A. pilipes* Fbr. Auf Compositen und *Trifolium pratense* bei Franzensbad und Königswart. Mai.
- A. rosae* Sm. Auf *Rosa canina* bei Bruckthor. Mai.
- A. tibialis* Kirb. Häufig auf Weiden im Egerthal. Mai.
- A. varians* Rossi 2 ♀ mit voriger. Mai.
- A. xanthura* K. Auf *Trifolium pratense* beim Viadukt 1 ♀. Juni.
- Cilissa haemorrhoidalis* Fbr. bei Kulm auf *Centaurea jacea* 2 ♀. Juli.
- Dasypoda hirtipes* Fbr. mit voriger 2 ♀; ein ♂ auf *Cirsium* bei Franzensbad. Juli.

- Panurgus calcaratus* Scop. Auf Ligulifloren sehr häufig im ganzen Gebiete. Juli.
- Dufourea vulgaris* Schck. ein ♀ auf *Arnica montana* bei Kreuzenstein. Juli.
- Osmia acnea* L. 2 ♀ auf *Scabiosa arvensis* bei Kulm. Juni.
- O. aurulenta* Pnz. auf Cirsien- und *Carduus*arten nicht selten: Egerthal, Pograth und Maria Kulm. Juni, Juli.
- O. bicolor* Schrk. Auf *Echium vulgare* am Bahnhofravin nicht selten. Juli, Aug.
- O. rufa* L. Auf Weiden sehr zahlreich; einzeln auf *Rosa canina* ♀ zahlreicher als ♂. Mai, Juni.
- O. fulviventris* Puz. auf Disteln wie *aurulenta*.
- Megachile argentata* Fbr. Auf *Centaurea scabiosa* ein ♀ bei Franzensbad. Juni.
- M. centuncularis* L. ein ♀ auf *Lonicera caprifolium* hinter dem Schlössl. Juni.
- M. maritima* Kirb. ein ♀ auf *Trifolium pratense*. Juli.
- M. Willughbiella* Kirb. Bei Königswarth 2 ♀ nacheinander auf *Sarothamnus scoparius* gefangen. Juli.
- Anthidium manicatum* L. ein einziges ♀ auf *Stachys palustris* gegen Pograth gefangen. Juli.
- A. punctatum* Ltr. Egerland.
- Chelostoma florissomne* L. 1 ♀ und 2 ♂ auf *Campanula trachelium* bei Königsberg unweit des Bahnhofs. Juli.
- Heriades campanularum* Kirb. 3 ♀ in *Campanula patula*, ein ♀ in *Hieracium pilosellae* bei Königswarth. Juli.
- Trypetes truncorum* L. Auf *Heracleum spondylium* 2 ♀; an 6 ♀ in *Lathyrus palustris*. Juli.
- Nomada alternata* Kirb. 1 ♀ auf *Centaurea scabiosa* bei Kulm. Juli.
- N. Fabriciana* L. Bruckthor auf *Rosa canina*, 1 ♀. Juni.
- N. flavoguttata* Kirb. Marienbad auf *Trifolium montanum*. Juni.
- N. germanica* Puz. ein ♀ auf *Vicia eracca*. Juni.
- N. lateralis* Puz. Auf *Echium vulgare* bei Pograth. Juni.
- N. ruficornis* L. 1 ♀ auf *Salix viminalis* im Egerthal, 1 anderes in *Campanula trachelium*. Mai, Juni.
- N. solidaginis* Puz. Maria Kulm auf *Vicia sepium* 2 ♀. Juli.
- N. succincta* Puz. Auf Weiden nicht sehr selten; 2 ♀. Mai, Juni.

- Coelioxys convidea* Ill. ein ♀ bei Pograth auf *Echium*. Juli.
- C. quadridentata* L. neben voriger, 2 ♀.
- C. simplex* Nyl. ebenfalls auf *Echium vulgare*, bei Kammerhof. Juli.
- Stelis aterrima* Puz. 1 ♀ bei Maria Kulm an einem Zaunpfahle. Juli.
- St. phaeoptera* K. In 3 ♀ im Grunde von *Campanula patula* beim Viadukt; 1 einzelnes ♀ auf *Ribes rubrum*. Juni.
- Eucera longicornis* L. Häufig wie überall, besonders auf *Trifolium pratense*. *Vicia sepium*, *Echium vulgare* und *Lonicera caprifolium*; ♂ zu ♀ im Verhältnisse 1:6.
- Tetralonia salicariae* Lep. 2 ♂ und 1 ♀ auf *Lythrum salicaria*, 2 ♀ in den Blüten von *Lysimachia thyrsoiflora* bei Pograth. Juli.
- Anthophora aestivalis* Puz. 1 ♀ auf *Lathyrus pratensis* bei Kammerhof. Juli.
- A. pilipes* Fbr. Häufig wie überall, besonders auf *Trifolium pratense*, und *Vicia sepium*; ♀ zu ♂ im Verhältnisse 5:1.
- A. quadrimaculata* Fbr. 1 ♀ auf *Galeopsis palustris* gegen Pograth. Juli.
- Psithyrus rupestris* Fbr. 1 ♀ bei Maria Kulm, in Nähe eines Nestes wo *Bombus lapidarius* ab- und zuflog; ein zweites im Egerthal auf *Cirsium palustre*; 1 ♂ auf *Cirsium oleraceum*. Juni, Sept.
- Ps. saltum* Puz. 2 ♀ auf Cirsien gegen Franzensbad; 3 ♂ bei Schlada ebd. Juni, Spt.
- Ps. campestris* Puz. 1 ♀ und 1 ♂ auf *Centaurea scabiosa* bei Königswart. Juli.
- Ps. vestalis* fourc. Ziemlich häufig ♀ auf Compositen im Königswarter Parke, bei Marienbad und Pechtersreuth. Juli.
- Bombus confusus* Schck. 3 ♀ auf *Trifolium pratense*, bei Kammerbüchl. Juni.
- B. hortorum* L. Selten und ganz einzeln; Königswart und Schlada auf Labiaten. Juni.
- B. ruderatus* Fbr. 1 ♂ auf *Campanula glomerata* bei Schlada. Juli.
- B. hypnorum* L. 1 ♀ auf *Echium vulgare* bei Pograth, 1 ♀ auf *Trifolium pratense* bei Kammerhof. Juni, Juli.
- B. mesomelas* Grst. Ein ♀ auf *Echium vulgare* beim Kammerhof, Mai; (wohl der nördlichste Punkt ihrer Verbreitung?)
- B. Derhamellus* K. in 2 ♀ auf *Trifolium pratense* bei Kulm und 2 ♂ im Egerthale. Juni.

- B. lapidarius* L. Gemein wie allerorts. Mai-Sept.
B. Latreillellus Ill. 1 ♀ aus dem Egerlande. Juni.
B. senilis Fbr. Auf verschiedenen Pflanzen, besonders auf *Lonicera caprifolium* und *Lathyrus pratensis* nicht selten v. Mai-Sept., auch var. *melanotus* Krb.
B. muscorum L. wie vorige, doch viel häufiger, besonders ♂.
B. pomorum L. 3 ♀ auf *Echium vulgare* am Kammerhof, 2 ♀ bei Kulm und 1 ♂ bei Marienbad. Mai-Juli.
B. pratorum L. 1 einziges ♀ auf *Cirsium palustre* bei St. Anna. Juni.
B. Scrimshiranus Ill. 1 ♂ auf *Scabiosa arvensis* bei Königswart. Juli.
B. silvarum L. die gemeinste gelbhaarige Hummelart — wie wohl allerorts. Mai-Sept.
B. terrestris L. Häufig, bes. auf Papilionaceen und *Echium*. Mai; auch var. *lucorum* Fbr. im Herbst auf Disteln.
98 *Apis mellifica* L. gezüchtet — nebst var. *ligustica* Spin

II. Coleoptera.

Fam. Carabidae.

- Cicindela campestris* L. Gemein wie allerwärts an Wegen, in Waldblößen; gegen Wies, St. Anna, Pograth, Marienbad, Karlsbad u. s. w. vom April an. Weibchen doppelt zahlreicher als Männchen; häufig im Sonnenschein in copula.
var. *affinis* Fisch. in einem Exemplare bei Wies. April.
C. hybrida L. Häufig, doch nur stellenweise: bei Marienbad. Juni.
C. silvatica L. Ein ♀ bei Pograth. Juni.
C. germanica L. Einzeln in Feldwegen gegen Franzensbad. Juli.
Omophron limbatum L. in 2 Exempl. an der Eger. Mai. (♂ u. ♀).
Notiophilus aquaticus L. Häufig an Bächen, unter Steinen: Pograth, Marienbad, Franzensbad u. s. w. April-Juni (stets nur ♀)
N. biguttatus Fbr. Franzensbad, 1 ♀. Juli.
Elaphyrus uliginosus Fbr. An der Eger bei Stein. Mai.
Carabus coricaeus L. Häufig in der ganzen Gegend im Mai und Juni, bes. ♂. —
C. intricatus L. Nicht selten, in Wäldern; bes. ♀. Juni.
C. auronitens L. 1 ♀ am Aufstiege von Maria Kulm, unter trockenem Pferdemit — wohl auf Larvenjagd. Juni.

- C. nitens* L. Ein sehr hübsches, frisch ausgeschlüpftes ♂ am 5. Mai im Egerthal an der Eger gefangen.
- C. cancellatus* Ill. femoribus rubris häufig, wie allerwärts; die ♂ in überwiegender Mehrzahl; auch im Franzensbader Park. femoribus nigris — ebenfalls nicht selten; mit voriger.
- C. granulatus* L. Häufig, doch später als voriger, den er vertritt; ♀ vorwiegend.
- C. arvensis* Fbr. 2 Exemplare von schön metallischem Kolorite an einer Grasstelle zwischen Königsberg und Kulm. Juni.
- C. catenulatus* Scop. nicht selten — Mai-Juni, bes. ♀.
- C. nemoralis* Müll. Neben *cancellatus* wohl die häufigste Art dieser Gattung; ebenfalls die ♀ zahlreicher.
- C. silvestris* Fbr. Ein ♀ aus der Gegend von Eger. Juni.
- C. violaceus* L. Ganz einzeln; Mai-Juni; stets nur ♂ gefunden.
- Nebria livida* L. Am Wege, Abds. herumlaufend. Juni. 2 Exempl.
- N. picicollis* Fbr. Etwas häufiger als vorige; Kulm 1 ♀. Egerthal 2 mal ♂, ♀, Marienbad. Juni. —
- N. brunnea* Dft. 2 ♀ im Egerthal. Juni.
- Leistus ferrugineus* L. Ein ♂ am Wege nach St. Anna.
- Clivina fossor* L. unter Steinen vom März an nicht selten; in Wäldern und auf Baugründen; gesellschaftlich.
- Cl. collaris* Hrbst. 2 Exempl. mit vorigem, bei Pograth.
- Dyschirius globosus* Hrbst. bei Franzensbad. Juni.
- D. salimus* Schm. mit vorigem; 3 Exempl.
- D. nitidus* Dej. mit vorigem; einzeln.
- Brachinus crepitans* L. Am Wege gegen Pograth mehrere Exemplare. Juni, Juli.
- B. explodens* L. 1 ♀ mit vorigem und 1 ♀ am Wege nach Franzensbad. Juni.
- Demetrias atricapillus* L. 2 Exemplare am Wege nach Franzensbad. Juni.
- Dromius marginellus* Fbr. zu Folge einer freundlichen Mittheilung des Hrn. H. Gratl bei Wies im Juni, zahlreich. —
- Dr. agilis* L. Häufig, doch stets einzeln: am Wege nach St. Anna, bei Marienbad, Pograth. Juni.
- D. quadrimaculatus* L. Am Wege nach St. Anna. Juni.

Blechnus glabratus Dft. Häufig unter Steinen im Egerthale, St. Anna, Kulm. Mai–Juli.

Metabletus truncatellus L. Wie vorige; auch bei Pograth; Juni.

Lebia cyanocephala L. Ein ♀ am Wege nach Königsberg. Juni.

L. chlorocephala Ent. Hft. ein paarmal im Gebiete, auch bei Kulm. Juni. —

L. crux minor L. Einzeln — Stein, Pograth und Kulmer Strasse. Juni. —

L. haemorrhoidalis L. Gestreift am Viadukt. Juli.

Cymindis humeralis L. St. Anna und Kulm, unter Steinen. Mai, Juni.

C. cingulata Dej. Ein Exempl. bei Pograth. Juni.

C. vaporariorum L. St. Anna im Mai unter Steinen. Juni.

Loricera pilicornis Fbr. Egerthal und Pograth, je 3 Exemplare. Juni.

Panagaeus crux major L. Ein Exempl. bei Marienbad auf Rubus; Juni. —

Chlaenius Schrankii Dft. Mit folgender; selten.

Chl. tibialis Dej. Nicht bes. selten auf Ackerboden: gegen Pograth und Franzensbad.

Chl. nigricornis Fbr. Die häufigste Art; mit voriger. Juni.

Licinus cassideus Fbr. Unter einem Ziegelstücke im Keller 2 Exemplare; geht auf Spinnen. — Juni.

Badister bipustulatus Fbr. Einzeln und gesellschaftlich, am Wege und auf Blumen. Juni.

Brosicus cephalotus L. Ein Exemplar, Abends am Wege nach Wies. Juni.

Patrobus excavatus Pk. 2 Exempl. am Wege gegen St. Anna.

Sphodrus leucophthalmus L. 1 ganz frisch ausgeschlüpfte ♀ unter einem halbfaulen Brette in Schlingelhau. — Juni.

Calathus cisteloides Ill. Nicht selten, an Wegen. Mai, Juni.

C. ambignus Payk (*fuscus* Fbr.) etwas häufiger als vorige, bes. ♂ zahlreicher. Juni.

C. melanocephalus Dft. unter Steinen am St. Anna; Marienbad. Juni.

Anchonomus junceus Scop (*angusticollis* Fbr.) An Wegen, bes. sonnenbeschienenen Stellen, ein paarmal auch in Marienbad — vor dem Kirchplatze. —

A. dorsalis Müll. (*prasinus* Thmb). Im Frühlinge unter Steinen, Holz und im Sande, gesellig.

- A. albipes* Fbr. 1 ♀ im Egerthale. Juni.
A. marginatus L. ♀ wie im Egerthale. Mai.
A. impressus Puz. 1 ♀ am Wege zwischen Pograth u. Loretto. Juli.
A. 6 punctatus Fbr. Nicht selten in Wäldern und an Wegen: Egerthal, Kulm und Wies. Mai, Juni.
A. parumpunctatus Fbr. Wie vorige; doch häufiger. Juni.
A. lugens Dft. Ein ♀ im Egerthale, unter einem Stein. Mai.
A. möstus Dft. In 2 Exemplaren im Egerthale, unter Steinen. Mai.
Stomis pumicatus Puz. 1 Exempl. in Pograth, ein zweites in Marienbad. Mai.
Feronia cuprea L. Gemein wie allerwärts, vom April bis Juli, bes. ♂ vorherrschend. —
F. versicolor (Thoms) Redtb. Mit der vorigen, doch etwas seltener (etwa im Verhältniss 3 1); auch in Copula. Juni.
F. affinis St. Maria Kulm, Juli, 1 ♀.
F. lepida Fbr. Häufig, doch nicht gemein wie *cuprea*. Mai, Juni.
F. vernalis Puz. 2 ♀ am St. Annaberg unter Steinen. Mai.
F. vulgaris L. Vom Ende Mai an häufig, besonders die ♀: Siechenhaus, Kammerbüchl, Galgenbüchl, Marienbad u. s. w.
F. nigrita Fbr. Nicht selten; bes. die ♂. Mai, Juni.
F. strenua Puz. 1 ♀ bei Maria Kulm. Juni.
F. madida Fbr. nicht selten — im Egerthal: 2 ♂ und 2 ♀. Juni.
F. aethiops Puz. St. Anna, Grüneberg, Siechenhaus. April, Mai. 2 ♂.
F. metallica Fbr. Einzeln im Egerthal; bes. ♀. Juni.
F. carinata Dft. Ein ♀ am St. Annaberg. Juni.
F. striolata Fbr. Ein ♀ am Grüneberg, ein zweites bei Marienbad.
F. elata Fbr. 3 ♂ im Egerthal. Juli.
Amara lepida Zgl. 1 ♀ gegen Pograth. Juni.
A. plebeja Gyll. 2 ♀ gegen Wies. Juni.
A. similata Gyll. 1 ♀ und 1 ♂ im Egerthale. Juni.
A. communis Puz. ziemlich häufig, bes. die ♀ an Wegen und Aeckern. Juni.
A. lunicollis Schd. (*vulgaris* Puz). 2 ♀ am Wege nach Wies. Juni.
A. trivialis Gyll. eine der häufigeren Arten: an Wegen, unter Steinen und in Aeckern. Juni.
A. spreta Dej. Viaduct. Juni.

- A. spreta* Dej. Viadukt. Juni.
- A. familiaris* Dft. Am Wege nach Pograth und im Siechenhaus; auch anderwärts, wie vorige. Mai, Juni.
- A. aulica* Puz. 1 ♂ auf Maria Kulm, 1 ♀ bei Marienbad — im Park. Juni.
- A. apicaria* Payk. Am Galgenbühl und bei Pograth. 2 ♀. Juni.
- Zabrus gibbus* L. Am Wege gegen Wies, Abends in mehreren Exemplaren über den Weg laufend. Juni.
- Diachromus germanus* L. 2mal erbeutet: 1 ♂ bei Pograth, ein ♀ in Franzensbad.
- Anisodactylus binotatus* Fbr. An Wegen und Aeckern nicht selten; Abds. umherlaufend. Juni.
- A. nemorivagus* Dft. Franzensbad 2 ♀; Königsberg 1 ♂. Juni.
- Harpalus sabulicola* Puz. 1 ♀ am Wege nach Pograth. Juni.
- H. azureus* Fbr. Einzeln am Wege: Pograth, Wies und Marienbad. Juni. —
- H. cribricollis* Dej. 1 ♂ im Egerthal. Juni.
- H. maculicornis* Dft. 1 ♀ am Wege nach Franzensbad. Juni.
- H. hospes* St. 2 Exempl. am Wege nach Pechtersreuth zwischen Aeckern. Juni.
- H. pubescens* Müll. (*ruficornis* Fbr.) Gemein, wie allerorts — an Wegen und Aeckern; Mai-Juli.
- H. griseus* Puz. Selten und ganz einzeln: St. Anna, Marienbad und Wies im Walde. April-Juni.
- H. hottentotta* Dft. Am Wege; einzeln. Juni.
- H. laevicollis* Dft. 1 ♂ bei Pograth. Juni.
- H. honestus* Dft. Am Wegen nicht selten: Pograth, Wies, Franzensbad und Marienbad im Parke. Mai, Juni.
- H. distinguendus* Dft. Auf Wegen einzeln. Juni.
- H. aeneus* Fbr. Gemein wie allerorts, auch
- H. confusus* Dej. nicht selten; farbenreich. April-Juni.
- H. rubripes* Dft. im Egerthale, einzelne Male. Mai.
- H. latus* L. Stein, auf Wegen. Juni 1 ♀.
- H. tenebrosus* Dej. ein ♀ beim Schloßl. Juni.
- H. tardus* Pnz. Egerland; Juni.
- H. caspius* Stev. einzeln, unter Steinen. Mai.
- H. servus* Dft. ebenso, nicht selten. Juni.

- H. anxius* Dft. einzeln, unter Steinen und Moos im Egerthale. Juni.
Stenolophus teutonius Schrk. Einzeln auf Wegen. April-Juli.
St. vespertinus Pnz. Einzeln, auf Wegen, auch in Baummulm bei
 Stein u. s. w. Mai.
St. exiguus Dej. Unter Steinen, selten. Mai.
St. meridianus L. Häufig, an Wegen u. s. w.
Bradycellus rufithorax Shlb. ein ♀ bei Franzensbad unter einem
 Steine. Mai.
Trechus minutus Fbr. Gemein — an Brettern und Pflanzen, zahl-
 reich in Pograth. Mai. Auch
T. ochreateus Dej.
T. lithophilus Putz und
T. secalis Payk. fing ich im Egerlande.
Trachis 6 striatus Dft. am Kammerbüchl. Mai.
Bembidium biguttatum Fbr.,
B. assimile Gyll,
B. fumigatum Dft. einzeln unter Steinen;
B. quadrimaculatum L. häufiger;
B. modestum Fbr. im Egerthale unter Moos. —
B. andreae Fbr. und *lamposus* Hrb. sehr häufig — gesellig; auch
B. littorale Oliv.
B. varium Oliv. und
B. punctulatum Drap. unter Steinen, namentlich im Egerthale und
 bei Kulm gefunden.
Tachypus pallipes Dft. und
 120 *T. flavipes* L. im Egerthale und bei Franzensbad, einzeln. Juni.

Fam. Dytiscidae.

- Haliphus obliquus* Fbr.,
H. confinis Steph. (*lineatus* Aubé),
H. fulvus Fbr.
H. affinis Steph. (*cinereus* Aubé).
H. fluviatilis Aubé — in Tümpeln — oft nebeneinander bei Fran-
 zensbad und am Viaduct.
Hyphydrus ovatus L. einzeln bei Pograth in der Wondreb.
Hydrophorus inaequalis Fbr. selten.

- H. geminus* Fbr. und *granularis* L. gar häufig in Tümpeln; auch
H. novemlineatus Steph.
H. unistriatus Schrk.
H. platynotus Grm. einzeln; ausser diesen
H. assimilis Payk,
G. oblongus Steph.,
H. piceus Steph.
H. erythrocephalus L. und
H. palustris L. beobachtet. April-Juli.
Laccophilus hyalinus Er. (*obscurus* Puz) in der Eger. Juni.
Colymbetes fuscus L. häufig in Wässern. Juni.
D. pulverosus Steph.
C. notatas Fbr.
C. aberratus Hg. (*adpersus* Fbr.) und
C. exoletus Frst. (*collaris* Payk) sind häufig; auch
C. consputus Sturm fand ich in der Wondreb. Juni.
Ilybius fuliginosus Fbr. und *ater* Deg. in Tümpeln nicht selten;
Liopterus agilis Fbr. bei Franzensbad, einzeln.
Agabus bipustulatus L. und *maculatus* L., die häufigsten Arten
der Gattung; auch
A. chalconotus Pnz, *congener* Payk, *paludosus* Fbr., *nebulosus* Frst.
(*bipunctatus* Fbr.) u. *abbreviatus* Fbr. in Tümpeln der Eger,
einzeln. —
Cybister virens Müll. (Roeseli Brgstr.) — dann
Dytiscus latissimus L. einzeln und selten in Egertümpeln beim
Viaduct,
D. marginalis L. sehr häufig und *circumflexus* Fbr. in einem ♀ im
Egerlande gefangen,
Acilius sulcatus L. gemein,
19 *Hydaticus Hybneri* Fbr. und *transversalis* Brgstr. einzeln.

Fam. Gyriinidae.

- Gyrinus natator* L., die häufigste Art der Gattung; doch auch
4 *G. striatus* Fbr., *urinator* Ill., *marinus* Gyll. in Gewässern allent-
halben, wenngleich einzeln.

Fam. Hydrophilidae.

- Hydrophilus piceus L. häufiger als der ebenfalls nicht ganz seltene
H. aterrimus Eschsch;
Hydrous caraboides L. häufig in allen Gewässern vom Mai-Sept.
Hydrobius fuscipes L. gemein in allen Lachen.
H. globulus Payk und *aeneus* Grm. einzeln und seltener.
Philhydrus testaceus Fbr. und
Ph. melanocephalus Fbr. nicht selten in Gewässern, auch in Salzwasser;
Ph. marginellus Fbr. in der Wondreb neben voriger.
Laccobius minutus L. in Tümpeln, häufig.
Berosus luridus L. Häufig; auch *B. aericeps* Curt. erhielt ich aus dem Egerlande.
Limnebius truncatellus Thunb.
L. truncatullus Thms u.
L. picinus Mrs. in Tümpeln — auch in Lachen nicht selten.
Chaetarthria seminulum Payk. In Mist einmal an der Eger im Egerthale aufgefunden. Mai.
Helophorus nubilus Fbr. *aquaticus* L. u. *granularis* L. in der Eger und Wondreb; Mai-Juli, stets einzeln.
Hydrochus carinatus Grm. — Kulm; auch von
Ochthebius gibbosus Grm. 3 Exemplare von ebendort her.
Hydraena palustris Er., *riparia* Kug. und *pulchella* Grm. aus dem Egerland in Algen erbeutet. Mai-Juli.
Cyclonotum orbiculare Fbr in Mist, selten, einzeln. Juni.
Sphaeridium scarabaeoides L. sehr häufig, auch
 var. *quadrimaculatum* Küst. darunter. Mai-Juli.
St. bipustulatum Fbr. Seltener — z. B. bei Kulm;
 var. *marginatum* Scriba einzeln.
Cercyon haemorrhoidale Fbr. *haemorrhoum* Gyll, *laterale* Mrs., *flavipes* Fbr., *unipunctatum* L., *quisquiliun* L., *melanocephalum* L., *minutum* Fbr., *anale* Payk u. *granarium* Er. aus Blüten gestreift, aus Laub geschüttelt und in Mist gesammelt, manche zu hunderten.
 38 *Cryptopleurum atomarium* Fbr. in altem Tischholze in Pograth. Juni zahlreich.

Fam. Staphylinidae.

- Falagria obsura* Grv. Kulm. Juni.
Bolitochora lunulata Payk. auf Klee ein Stück. Juli.
Ichnoglossa corticina Er. auf weisses Papier gekrochen. Pograth —
 vermuthlich aus Holzmulm. Juni.
Thiasophila angulata Er. In einem Ameisenneste bei Siechenhaus
 aufgefunden. —
Alcochara fuscipes Grv. Die gemeinste Art; — auch
A. ruficornis Grv., *bipunctata* Oliv., *morion* Grv. und *tristis* Grv. fand
 ich in Mist.
A. lanuginosa Grv. kroch an einer weissen Wand.
Lomechusa strumosa Fbr. aus dem Egerland. Juui.
Myrmedonia canaliculata Fbr. Häufig im Egerthal am Holze der
 Bänke, unter Brettern und Steinen.
Tachiusa balteata Er. Franzensbad, im Moos. Juni.
Oxyroda umbrata Gyll., häufig; einzeln.
O. lateralis Munh., *longiuscula* Er., *alternans* Grv., *annularis* Shlb.
 und *togata* Er. —
Homalota Manh. — Die artenreichste Gattung dieser Familie lie-
 ferte mir: *graminicola* Gr., *gregaria* Er.; *elongatula* Grv.,
terminalis Gyll, *atricilla* Er., *angustula* Gyll, *analisis* Grv.,
brunnea Fbr., *trinitata* Krtz., *gagatina* Jaudi, *inquinula* Er.
 und *stercoraria* Krtz.
Phloeodroma concolor Kr. Egerthal ein Stück. Mai.
Oligota granaria Er. Pograth auf weissem Papiere. Juni
Gyrophana nana Payk. Häufig boleti L. selten, beide in *Campanula*
 gefangen. —
Pronomea rostrata Er. Pograth unter Laub, ein Stück. Juni.
Myllaena minuta Grv. Egerthal, unter Steinen. Juni.
Cilea silphoides L. Ebenda, im April.
Tachinus rufipes DG., *flavipes* Fbr., *fimetarius* Fbr. häufig in Blüten
 von *Campanula*, *Viburnum*, *Trifolium* u. s. w. Mai-Juli.
T. marginellus Fbr. selten.

- Tachyporus chrysomelinus* L. hypnorum Fbr. sehr häufig in Blumen von Mai-Aug.; auch
- T. scitulus* Er., *brunnens* Fbr. und *obtusus* L. nicht selten.
- Conorus* (*Conosoma*) *pubescens* L. Sehr häufig, unter Moos und in Blumen angetroffen.
- C. littoreus* L. bei Siechenhaus ein ♂ unter Rinde. Mai.
- Boletobius atricapillus* Fbr. in Schwämmen, aber auch in Blüten, z. B. *Campanula* — einzeln.
- B. lunulatus* L. und *pygmaeus* Fbr. ebenfalls in Blüten.
- Mycetoporus lepidus* Grv. in Dünger bei Kulm. Juni.
- Euryporus picipes* Pk. Gestreift beim Schlössl. Juni.
- Heterothops praeivius* Er. bei Kulm in Moos. Juni.
- Quedius fulgidus* Fbr. Die häufigste Art der Gattung; ausserdem *scitus* Grv., *bristis* Grv., *fimbriatus* Er., *boops* Grv. u. *xanthopus* Er. in einzelnen Exemplaren gefangen. Mai-Juli.
- Creophilus maxillosus* L. Gelegentlich allerorts. Mai-Juli.
- Emus hirtus* L. Einzeln, im Mist vom April ab.
- Leistotrophus nebulosus* Fbr. und *murinus* L. nicht selten; letztere unter anderem im Aas gesammelt. März.
- Staphylinus lutarius* Grv. ein Stück am Kammerbüchl in Mist. Juni.
- St. stercorarius* Oliv. und *pubescens* Deg. zwei häufige Arten; *caesareus* Cdh. gemein; auch *erythropterus* L. nicht selten; *fossor* Scop. und *fulvipes* Scop. selten unter Steinen und am Wege.
- Ocypus similis* Fbr., *picipennis* Fbr. und *morio* Grv. häufig an Wegen und unter Steinen; April-Juni.
- O. cyaneus* Payk. einmal bei Pechteisreuth. Juni.
- Philonthus splendens* Fbr. — die gemeinste Art; ausserdem fieng ich: *laminatus* Crtz., *nitidus* Fbr., *succicola* Thms, *aeneus* Fbr., *politus* L., *atratus* Grv., *umbratilis* Grv., *sordidus* Grv., *cephalotes* Grv., *ebeninus* Grv., *sanguinolentus* Grv., *debelis* Grv., *quisquiliarius* Grv., *fulvipes* Grv., *tenuis* Fbr. und *villosulus* Steph. (*elongatulus* Er.)
- Xantholinus relucens* Gr. bei Siechenhaus in Dünger.
- X. tricolor* Fbr. in Blüten von *Allium*.
- X. linearis* Oliv. und *fulgidus* Fbr. in Aas im März. —
- Othius fulvipennis* Fbr. zwei Stücke in Aas.

- Lathrobium boreale* Hochh. im Egerthale, ein Stück, unter einem Steine.
- L. quadratum* Payk., *terminatum* Grv., *filiforme* Grv., *longulum* Grv. im Egerland gefunden.
- Achenium depressum* Grv. unter einem Steine bei Franzensbad. Juni.
- Dolicoon biguttulus* Bois. Am Friedhofe unter Moos. Mai.
- Stilicus orbiculatus* Payk. die häufigste Art — auf Wegen; von *similis* Er. und *rufipes* Grm. je ein Stück.
- Scopaeus rubidus* Mls. und Ray. Im Egerthal. Mai.
- Lithocharis ochraecea* Grv. *brunnea* Er., *obsoleta* Nrdm. — im Egerland beobachtet.
- Sunius filiformis* Ltr. ziemlich häufig unter Steinen. Mai, Juni.
- Paederus littoralis* Grv. Allerorts unter Steinen;
- P. ruficollis* Fbr. ungleich seltener;
- P. limophilus* Er. bei Franzensbad; Juni.
- P. riparius* L. und *vulgaris* Mill. einzeln, selten.
- Stenus biguttatus* L. und *Juno* Fbr., häufig; ich fand noch unter Steinen: *morio* Grv., *circularis* Grv., *humilis* Er., *picipes* Sph. (*rusticus* Er.), *Erichsoni* Rye (*flavipes* Er.), *tarsalis* Ljungh, *bupthalmus* Grv., *carbonarius* Gyll. und *bimaculatus* Gyll.
- Oxyporus rufus* L. Ganz einzeln in Schwämmen; Mai, Juni.
- O. maxillosus* Fbr. Ein Stück in einem Schwamme bei Kulm. Juni.
- Bledius tricornis* Hrb. (Rdtb.) Franzensbad am Wege. Juni.
- Platystethus morsitans* Payk. Unter Brettern und Ziegeln einzeln, nicht selten — vom Mai an.
- Oxytelus rugosus* Fbr. die häufigste Art; *piceus* L. seltener; *sculptus* Grv., *depressus* Grv. und *sculpturatus* Grv. einzeln, bes. auf weisses Papier angefliegen od. angekrochen.
- Thinodromus dilatatus* Er. Unter Steinen im Egerthale. Juni.
- Trogophloeus corticinus* Gr. und *riparius* Lec. beobachtet.
- Syntomium aeneum* Müll. Ein Stück aus dem Egerthale. Mai.
- Deleaster dichrous* Grv. Im Moos bei Franzensbad, einige ♂ und ein ♀. —
- Anthophagus armiger* Grv. St. Anna gestreift;
- A. testaceus* Grv. in *Campanula persicifolia* zahlreich beim Schlössl. Juni. —

Lesteva macroelytron Frc. (bicolor Fbr.) unter Steinen bei Kulm, einzeln.

Lathrimaeum melanocephalum Ill. ein Stück von Sandau.

Deliphrum tectum Payk. unter einem Steine bei Siechenhaus.

Arpedium quadrum Grv. Gestreift; Juni.

Omalium rivulare Payk. Häufig, unter Moos und Steinen;

O. vile Er., florale Payk. und *pusillum* Grv. einzeln.

Anthobium abdominale Grv. und florale Puz. einzeln;

A. sorbi Gyll. beim Schlössl einmal zahlreich;

A. anale Er. gestreift.

Megarthus sinuato-collis Lac. Er. Unter Staub bei Pograth. Juni.

Thoracophorus (Glyptoma) corticina Motsch. Einige Stücke in Aas am Kammerbüchl. —

122 *Micropeplus porcatus* Fbr. im Fluge einige Stücke, nur 1 ♂.

Fam. Pselaphidae.

Pselaphus Heissei Hrb. St. Anna und Grüneberg, unter Steinen. Juni.

Batrissus venustus Rehb.

Bryaxis sanguinea L. Stellenweise — nicht selten. Mai, Juni.

B. haematica Rehb. Einzeln, seltener. Juni.

Bythinus bulbifer Rehb. Einige Stücke im Egerthale. Mai.

B. securiger Rehb. Ein Stück auf weisses Papier gekrochen. Mai.

7 *Euplectes sanguineus* Denny. In Baummulm bei Pograth. Juni.

Fam. Scydmaenidae.

3 *Scydmaenus scutellaris* MK, *collaris* MK. u. *hirticollis* Ill. von mir aufgefunden.

Fam. Silphidae.

Choleva spadicea Strm., *angustata* Fbr. *cisteloides* Frl. und *agilis* Ill. in einem Aase nach einander angetroffen; Kammerbüchl. März-Juni.

Catops nigricans Spce., *nigrita* Er., *chrysoloides* Puz, *tristis* Puz. u. *sericeus* Pnz. ebenfalls dort, einige mit vorigen. Mai, Juni.

Colon viennensis Hrb. ein Stück im faulem Holze bei Siechenhaus.

Juni. —

Silpha thoracica Fbr. Einzeln, an Menschenkoth. Juni.

S. rugosa Fbr. An Hundeaas am Kammerbüchl, März; auch anderwärts; später von

S. sinuata Fbr. vertreten.

S. tristis Ill. ein Stück unter Hunderten von *S. obscura* Fbr.

S. reticulata Fbr., *nigrita* Crt. und *atrata* Fbr. einzeln;

S. laevigata Fbr. selten.

Necrophorus mortuorum Fbr. Sehr einzeln — auf Aas mit

N. vespillo L., die ungleich häufiger ist;

N. fossor Er. einzeln — neben voriger.

20 *N. raspator* Er. in einem Stücke gefangen.

Fam. Anisotomidae.

Anisotoma cinnamonea Puz., *rotundata* Er., und *dubia* Pnz, gestreift in je einem Stücke.

Colenis dentipes Gyll. Unter Steinen, einige Stücke bei Sandau. Juni.

Agathidium seminulum L. In einem Schwamme 3 Stücke (♂);

6 *A. marginatum* Strm. und *laevigatum* Er. einzeln.

Fam. Clambidae.

Clambus armadillo Deg. Gestreift aus faulen *Centaurea*-blüthen. Juni.

Fam. Trichopterygidae.

Ptenidium pusillum Gyll. Angeflogen auf ein weisses Tuch. Juni.

inquilium Er. und *Ptilium myrmecophilum* Allib. und

P. Spencei Allib. (*angustatum* Er.) ebenso gefangen.

P. transversale Gillm. fieng ich durch Streifen.

Ptinella tenellum Er. Einige Stücke gekötschert. Juli,

7 *Trichopteryx intermedia* Gillm. Auf einer weissen Wand. Juni.

Fam. Scaphididae.

Scaphidium 4 maculatum Fbr. In Baummoder einige Stücke, ♂ zahlreicher. Juli.

3 *Scaphisoma agaricinum* Fbr. und *boleti* Puz. Aus Moder ein paar-
mal — besonders im Walde bei Königswart.

Fam. Histeridae.

Platysoma frontale Payk. einzeln, *depressum* Fbr. etwas häufiger
unter Rinden; Egerthal und Kulm. Mai.

Hister stercorarius Illig. sehr häufig, namentlich an den Reifen der
Latrinenröhren in Franzensbad. Juli. Ausserdem *major* L.
einzeln; *unicolor* L., *cadaverinus* Ill., *merdarius* Ill., *carbo-*
narius Ill., *purpurascens* Hrb., *sinuatus* Ill., *4 notatus* Scz.,
bissexstriatus Fbr., *bimaculatus* L. in Mist und Aas vom
März an.

Paromalus flavicornis Hrb. gekötschert bei Kulm.

Saprinus nitidulus Payk., *immundus* Gyll., *aeneus* Fbr., *lautus* Er.,
conjungens Payk. und *rugifrons* Payk. im Egerland —
einzeln gesammelt.

Gnathoncus rotundatus Ill. in Mist getroffen. Mai.

Onthophilus striatus Fbr. ebenso.

Abraeus granulum Er. Schlössl, gestreift.

27 *Acritus nigricornis* Ex. und *minutus* Fbr. unter Steinen, nicht gar
selten. Juni, Juli.

Fam. Phalacridae.

Phalacrus corruscus Payk. häufig gestreift;

Ph. substriatus Gyll. nur zweimal: einer auf *Chrysanthemum leucan-*
themum L.

8 *Olibrus bicolor* Fbr. Sehr häufig gestreift; auch *O. corticalis* Puz.,
aeneus Ill., *affinis* Strm., *millefolii* Payk. und *geminus* Ill.
stellenweise gestreift.

Fam. Nitidulidae.

Cercus sambuci Er. und *pedicularius* Er. gestreift.

Brachypterus gravidus Ill. von Nesselu gestreift; auch auf Hopfen
einmal. Juni.

B. urticae Fbr. häufiger als vorige Art.

Carpophilus hemipterus L. An einer faulenden Rinde zahlreich, im Egerthale. Juni.

Epuraea aestiva Hrb., *obsoleta* Fbr. und *florea* Er. gestreift; *immunda* Strm., *neglecta* Heer., *obsoleta* Fbr., *longula* Er. und *limbata* Fbr. aus dem Egerlande vorliegend.

Nitidula rufipes L., *bipustulata* L. und 4 *pustulata* Fbr. an einem faulenden Kohlstrunke; meist ♂. Juni.

Soronia grisea L. einzeln, an feuchten Stellen; zahlreiche Stücke bei Pograth an einer Weinbutte. Juni.

Omosita colon L. und *discoidea* Fbr. gleich häufig an Blumen und in faulenden Stoffen. Mai, Juli.

Pria dulcamarae Scop. Häufig; auf Kartoffel und *Dulcamara* gestreift. Mai.

Meligethes rufipes Gyll., *lumbaris* Strm., *hebes* Er., *aeneus* Fbr. *viridescens* Fbr. *coracinus* Strm., *symphyli* Heer., *difficilis* Heer., *vidiatus* Sturm, *pedicularius* Gyll., *assimilis* Strm., *umbrosus* Strm., *maurus* Sturm, *tristis* Strm., *picipes* Strm., *lugubris* Strm., *erythropus* Gyll., *exilis* Strm., *solidus* Kug. — sämtlich gestreift und zu den häufigeren Arten zählend; *ochropus* Strm., *flavipes* Strm., *brevis* Strm., *corvinus* Er. — mehr einzeln. —

Strongylus (Cyllodes) ater Hrb. Gestreift.

Cychramus fungicola Heer. Egerthal, einzeln. Juni.

Byturus fumatus Fbr. und *tomentosus* Fbr. Auf *Rubus* zahlreich im Egerthale, bei Kulm und Königswart. Juli.

Ips 4 *guttatus* Fbr., 4 *punctatus* Hrb. und 4 *pustulatus* Fbr. — einzeln, gestreift und im Fluge gesammelt. Juni.

Pityophagus ferrugineus L. Im Egerthale, unter Rinde. Juli.

55 *Rhizophagus depressus* Fbr., *dispar* Payk., *ferrugineus* Payk., *bipustulatus* Fbr. einzeln im Fluge oder unter Mulm erhalten.

Fam. Trogositidae.

3 *Peltis grossa* Fbr. Ein Stück auf einer Mauer. — Juli.

P. ferruginea L. und *oblonga* L. in altem Bauholze einmal beim Sigel zahlreich — nach H. Gratl auch bei der Schiessstätte. Juli.

Fam. Colydidae.

- Synchita juglandis* Fbr. St. Anna, auf Weidenrinde. Juli.
2 *Cerylon histeroides* Fbr. Wie vorige, doch häufiger. Juli.

Fam. Cucujidae.

- Laemophloeus denticulatus* Preyssl, testaceus Fbr., einzeln; ferrugineus Steph. einmal geklopft.
Sylvanus surinamensis L. (*frumentarius* Fbr.) Stellenweise häufig; einmal auf einer weissen Wand zahlreich. Juni.
S. unidentatus Fbr. in Hollunderröhrchen. Mai.
6 *Monotoma picipes* Payk. Egerthal unter Mist. Juni.

Fam. Cryptophagidae.

- Telmatophilus caricis* Heer. und *typhae* Fall. Gestreift in Sümpfen von Pograth, Franzensbad und Egerthal. Juni.
Cryptophagus lycoperdi Hrb. *setulosus* Strm., *pilosus* Gyll., *saginitus* Sturm, *scanicus* L., *affinis* Strm., *cellaris* Scop., *dentatus* Hrb., *subdepressus* Gyll. — sämtlich im Egerlande erbeutet, meist im Egerthale.
Paramecosoma abietis Payk. Geklopft — Königswart. Juni.
Atomaria fimetarii Hrb., *mesomelas* Hrb., *nigripennis* Hrb., *atra* Hrb., *fuscata* Schh., *atricilla* Steph., *pusilla* Hrb. und *testacea* Steph. (*analis* Er) einzeln im Egerlande erbeutet.
21 *Epistemus gyrinoides* Mrsh. Egerthal, geklopft. Juni.

Fam. Lathridiidae.

- Lathridius angusticollis* Hum. *rugosus* Hrb., *minutus* L. — aus dem Egerlande.
8 *Corticaria pubescens* Gyll., *fulva* Com., *gibbosa* Hrb., *transversalis* Gyll., *truncatella* Mnh. — im Egerland gesammelt.

Fam. Mycetophagidae.

Mycetophagus 4 pustulatus L. Gestreift, stellenweise zahlreich; *variabilis* Hbr. (*niceus* Fbr.) *atomarius* Fbr., *multipunctatus* Wlw. einzeln.

Litargus bifasciatus Fbr. Pograth, 3 Stücke.

6 *Typhaea fumata* L. Auf *Rubus*, *Rosa* und — Esche gesammelt, häufig. —

Fam. Dermestidae.

Dermestes lardarius L. Allüberall, wo es thierische Stoffe gibt, gemein; auch *murinus* L. und *frischii* Ill. nicht selten; in einem Hundeaas am Kammerbüchl ein *D. tessellatus* Fbr., ein *cadaverinus* Fbr. und ein *undulatus* Brhm.; letzterer auch an einem ausgelegten Kohlstrunke.

Attagenus pellio L. Allzu gemein; *megatoma* Fbr. auf Nesseln; 20 *punctata* Fbr. auf *Rubus* in Kulm.

Megatoma undata L. auf einer Weissdornblüthe, ein ♂. Juni.

Anthrenus scrophulariae L. Auf der Nessel gesellig zu hunderten bei Schlada; einzeln gestreift allerwärts. Mai.

A. pimpinellae Fb. kaum seltener;

A. varius Fbr. und *museorum* L. in Sammlungen. März bis Nov.

4 *Orphilus glabratus* Fbr. Dieses seltene Thierchen streifte ich auf *Rubus* bei Kulm. Juni.

Fam: Byrrhidae.

Syncalypta setigera Ill. ein Stück unter einem Ziegel im Egerthale Juni. —

Byrrhus ornatus Puz, *fasciatus* Fbr, *dorsalis* Fbr. und *murinus* Ill. — einzeln; ein schöner luniger Grm. (Er.) stammt von Kulm; *pilula* L. wie allerorts die gemeinste Art.

Cytilus varius Fbr. und

Morychus aeneus, wie *nitens* Pnz. unter Steinen, einzeln.

11 *Simplocaria metallica* Strm. bei Kulm.

Fam. Parnidae

Parnus prolifericornis Fbr. die häufigste, *viennensis* Fbr. und *auriculatus* Ill. seltener bei Eger vorkommende Arten.

Elmis aeneus Müll., *obscurus* Müll., *Volkmari* Puz., *cupreus* Müll., an der Eger und Wondreb, auch bei Franzensbad, doch sehr sporadisch. Mai-Juli.

8 *Stenelmis canaliculatus* Gyll. fand ich bei Franzensbad unter einem feuchten Brette. Juli.

Fam. Heteroceridae.

Heterocerus fossor Ksw. und *laevigatus* Puz. — bei Franzensbad beobachtet; letzterer gesellig. Juli.

Fam. Lucanidae.

Lucanus cervus L. wie dessen Monstrosität: *capreolus* Fbr. einzeln, doch nicht selten in Eger. Mai.

Dorcus parallelipedus L. noch häufiger, namentlich in Holzlagern (Sigel, Bahnhof u. s. w.) Mai.

Platycerus caraboides L. und *rufipes* Fbr. nicht ganz selten, meist gesellig. Juni.

5 *Sinodendron cylindricum* L. In einem Stücke aus Königswart — in einer Schülersammlung getroffen.

Fam. Scarabaeidae.

Copris lunaris L. Einzeln — nicht oft zahlreich z. B. am Kammerbüchl. Juni.

Caccobius Schreberi L. Stellenweise, gesellig; selten. Juni.

Onthophagus amyntas Oliv. (*Hübneri* Pnz.) *taurus* L., *nutans* Fbr., *vacca* L., *coenobita* Hrb., *fracticornis* Prssl., *nubicornis* L., *lemur* Fbr., *ovatus* L. — in Dung oft einzeln, oft gesellig, namentlich auf freien Weidestellen. Mai-Aug.

Aphodius erraticus L., *scrutator* Hrb., *fossor* L., *haemorrhoidalis* L., *conjugatus* Pnz., *scybalarius* Fbr., *foetens* Fbr., *fimetarius* L. (die gemeinste), *ater* L., *granarius* L., *immundus* Crtz., *niger* Pnz., *inquinatus* Fbr., *sticticus* Puz., *conspurcatus* L., *obscurus* Fbr., *pusillus* Hrb., *merdarius* Fbr., *prodromus* Brhm., *punctatosulcatus* Strm., *contaminatus* Hrb., *rufipes* L., *luridus* Payk., *depressus* Kug., *sus* Fbr. und *porcatus* Fbr. — einzeln oder gesellig in Dünger und Koth aufgefunden. März-November.

Rhyssenus germanus L. Kammerbüchl. April.

Psammodius caesius Puz. Häufig — *vulneratus* Strm. einzeln; auch von *sulcicollis* Ill. ein Stückchen.

Odontaeus mobilicornis L. Ein ♂ im Fluge erbeutet. April, Abds.

Geotrupes stercorarius L. und *mutator* Mrsh. selten; *spiniger* Mrsh. (*mesoleius* Thms.) und *sylvaticus* Puz. sehr häufig; *vernalis* L. einzeln.

Trox hispidus Laich. ein Stück; *sabulosus* L. häufiger, namentlich unter einem Tuchlappen an einer Feldkapelle gegen Franzensbad. Juni.

Hoplia farinosa L. — nicht selten, in Gärten und Anlagen. Mai.

Serica holoserica Scop. und *brunnea* L. in je einem Stücke im Egerthale geklopft. Mai.

Melolontha vulgaris L. — der allgemeinste Proletarier des Käferreiches ungleich häufiger als *hippocastani* Fbr.

Rhizotrogus solstitialis Fbr. nicht selten einige Abende hindurch zahlreich. Juni.

Anisoplia segetum Hrb. (*fruticola* Fbr.) und *agricola* Fr. einzeln auf *Buxus*, *Rosa* und *Sorbus* in Gärten. Mai, Juni.

Phyllopertha horticola L. Häufig auf Gesträuchen. Mai, Juni.

Anomala aenea Deg. (*frischii* Fbr.) Einzeln — bei Königswart. Juli

Oryctes nasicornis L. von Schülern mehrmals am „Schustersprung“ erbeutet — wo er in der Lohe Verstecke hat; auch *aries* Jabl. unter ihnen.

Oxythyrea stictica L. Auf Gebüsch, nicht selten und allerwärts. Mai, Juni.

Cetonia marmorata Fbr. und *floricola* Hrb. (var *aenea* Gyll.) selten; *aurata* L. — gemein. Mai, Juni.

- Osmoderma eremita* L. Einzeln, doch alljährlich vorkommend ;
Gnorimus nobilis L. ebenso — auf *Spiraea* beim Schlössl. Juni.
Trichius fasciatus L. Häufig, meist einzeln, auf *Spiraea* zahlreich
 beim Schlössl. Juni.
 67 *Valgus hemipterus* L. Oeftern gestreift — bei Franzensbad. Juni.

Fam. Buprestidae.

- Buprestis mariana* L. Im Egerthale, einmal; selten. Juni.
Poecilonota rutilans Fbr. ein ♀ gestreift. Juli.
Buprestis (Ancylocheira) rustica L. einzeln, selten. Juni, Juli.
Phaenops (Melanophila) cyanea Fbr. Auf einem Holzsaum bei Pogratz ein ♀.
Anthaxia nitidula Rssi. einige Male gestreift. Mai-Aug.
A. sepulchralis Fbr. Ein Stückchen unter Hunderten von
A. 4 punctata L. ausgelöst. Juni, Juli.
Ptosima flavoguttata Ill. Ein Stückchen gestreift von *Rosa canina*
 — gegen Franzensbad. Juli.
Agrilus biguttatus Fbr., *viridis* L. (*nocivus* Rtzb.) *Roberti* Chvr.
 (*pratensis* Rtzb.), *tenuis* Rtz. und *angustulus* Ill. in spärlichen
 Exemplaren gestreift und gekötschert.
 15 *Trachys minutus* L., in zwei *nanus* Hrb. in 5 Stücken durch Streifen
 erhalten.

Fam. Eucnemidae.

- Einzig durch *Throscus dermestoides* L. vertreten.

Fam. Elateridae.

- Lacon murinus* L. — gemein vom April-November.
Drasterius bimaculatus L. gestreift, aus Compositen. Juni.
Elater sanguineus L., *erubescens* Esch. (*crocatu*s Gft.) u. *balteatus* L.
 — einzeln; von *lythropterus* Grm. und *ferrugatus* Lap. (*porum*
 Gft.) je ein Stück. Juni.

- Betarmon bisbimaculatus Schh. von Rosen geschlagen; Schlössl. Juni.
 Cryptohypnus 4 pustulatus Fbr. auf geschichtetem Holze beim Siegel,
 2 Stücke.
- Cr. lapidicola Grm. Auf ein weisses Tuch geflogen. Juli.
- Cardiophorus thoracicus Fbr. Auf Viburnum lantana 1 Stück bei
 Franzensbad. Juni.
- C. rufipes Fbr., musculus Er., und equiseti Hrb. gestreift. Juni, Juli.
 Melanotus rufipes Hrb. Pograth, ein Stück. Juni.
- Limonius aeruginosus Oliv. (cylindricus Payk.), nigripes Gyll., lythrodes
 Gyll. öfters gestreift. Juni-Aug.
- Athous niger L., haemorrhoidalis Fbr. — gemein; vittatus Fbr. und
 subfuscus Müll. einzeln, gestreift.
- Corymbites pectinicornis L., cupreus Fbr., purpureus Poda. (haema-
 todes Fbr.), castaneus L., virens Schrk. (aeneicollis Oliv.),
 sjalandicus Müll. (tesselatus Fbr.), tessellatus L., holoseri-
 cens L. und aeneus L. — allesammt nicht besonders selten;
 ein C. latus Fbr. und cruciatus L. auf Rosen im Schlössl.
 Juli. —
- Ludius ferrugineus L. Ein Stück bei Wies. Juli.
- Agriotes ustulatus Schal, sputator L., lineatus L., obscurus L., palli-
 dullus Ill. mehrmals gestreift, nie in schädlicher Menge an-
 getroffen. Mai, Juli.
- Sericus (Sericosomus) brunneus L. Auf einer Spiraea ein Stück beim
 Schlössl. Juli.
- Ctenonychus filiformis Fbr. Gestreift; ganz einzeln. Juni.
- 45 Adrastus limbatus Fbr., pallens Fbr., lacertosus Er., nanus Hrb.
 (pusillus Er.), auf Compositen, namentlich nicht selten.
 Juni, Juli.

Fam. Dascillidae.

- Dascillus cervinus L. Auf Dolden, einzeln, nicht selten. Juli.
 Helodes minutus L. Gestreift. Juni.
 Cyphon coarctatus Payk. und variabilis Thb. gestreift.
 C. padi L. im Egerthale auf Prunus padus L. Mai.
 Hydrocyphon deflexicollis Müll. und

- Scirtes haemisphaericus* L. Gestreift. Juli.
 7 *Eubria palustris* Grm. Stein auf Nesseln. Juni.

Fam. Malacodermata.

- Dictyoptera sanguinea* L. Ein Stück auf *Silene inflata* im Egerthale. Mai.
Eros coccineus L. (aurora Hrb.) und *minutus* Fbr. gestreift; Kammerbüchl und Königswart. Juni.
Lampyris noctiluca L. Seltener als
Lamprorhiza splendidula L. — beide im Gehäusche des Egerthals, Schloßl, Franzensbader Anlagen u. s. w.
Telephorus (*Cantharis*) *abdominalis* Fbr. Pechtersreuth auf Birken, 2 Stücke. Juni, *fusca* L., *rustica* Fall., *obscura* L., *livida* L. (*dispar* Fbr.), *pallidus* Gz. (*bicolor* Puz.) und *fulvicollis* Fbr. mehr weniger gemein; *pellucida* Fbr., *nigricans* Müll., *albo-marginata* Mrk., *haemorrhoidalis* Fbr., *bicolor* Hrb. (*thoracica* Oliv.), *oralis* Grm., *paludosa* Fall. und *discoidea* Ahr. gestreift in 1—3 Stücken. Mai-Juli.
Rhagonycha fulva Scop. und *testacea* L. gemein; *signata* Grm., *translucida* Kst. (*rufescens* Ltzn.), *nigriceps* Wtl., *ustus* Gemm. (*terminalis* Rdtb.), *atra* L. und *pallipes* Fbr. (*pallida* Fbr.) gestreift, namentlich von Dolden. Juni, Juli.
Malthinus fasciatus Fall. und *biguttatus* L. (*biguttulus* Payk.) nicht selten auf *Achillea* und *Boragineen*. Mai, Juli.
Malthodes minimus L. (*sanguinolentus* Fall.) — häufig; *marginatus* Ltr., *pellucidus* Ksw., *mysticus* Ksw., *dispar* Grm., *pulicarius* Rdtb. einzeln. Juni, Juli.
Dvilus flavescens Fbr. Gestreift am Kammerbüchl. Juni.
Malachius aeneus L., *bipustulatus* L., *viridus* Fbr. und *marginellus* Oliv. sehr häufig, ja gemein; *scutellaris* Er., *elegans* Oliv. und *spinipennis* Grm. einzelne Male gestreift. Mai, Juli.
Axinotarsus pulicarius Fbr.
Anthocomus equestris Fbr. und *fasciatus* L. — gestreift und aus der Luft angefliegen. Juni, Juli; ebenso
Ebaeus pedicularius Schrk. und *flavicornis* Er.

Charopus flavipes Fbr. und
 Trogllops albicans L., letztere auf Nesseln oftmals gefunden.
 Dasytes niger L. flavipes Oliv. (plumbeus Müll.), zahlreich, ja
 massenhaft; ein
 D. coeruleus Deg. und ein obscurus Gyll. von Pograth.
 Dolichosoma lineare Rossi auf Centaureen ein paarmal;
 Haplocnemus pini Rdtb. — bei Pograth in zwei Stücken.
 Julistes floralis Oliv. und
 59 Danacaea pallipes Puz. — gestreift.

Fam. Cleridae.

Tillus elongatus L. auf Achillea ein Stück gestreift;
 Opilo mollis L. — einige Male: Kulm in Spinnennestern zu 5
 Stücken gesehen — auch gestreift; auch
 O. domesticus Strm. mitunter. — Juni, Juli.
 Thanasimus (Clerus) formicarius L. gemein — ;
 Trichodus apiarius L., stellenweise z. B. bei Königswart auf Cen-
 taurea, Trifolium und anderen Wiesenblumen nicht selten;
 Juni, Aug.
 Corynetes coeruleus Deg. u. rufipes Fbr. — je ein Stück im Schlössl.
 8 Hylocoetus dermestoides L. von Pograth. Juni.

Fam. Ptinidae.

Hedobia imperialis L. — ein Stück: Siechenhaus in einer Tisch-
 fuge. Juli.
 Ptinus fur. L. gemein; rufipes Fbr., latro Fbr. und dubius Strm.
 mehr weniger einzeln. Febr.-Nov.
 Niptus griseofuscus Deg. (crenatus Fbr.) — in einer Motivtafel am
 Wege nach Franzensbad. Juni.
 7 Gibbium scotias Fbr. von Schülern häufig in Bodendielen gefangen.
 Mai-Juni.

Fam. Anobiidae.

Anobium pertinax L., domesticum Fcr., rufipes Fbr., hirtum Ill.
 und — häufig paniceum L. von Schülern beigebracht
 Feb.-Nov.

- Ernobius abietis* Fbr. und *mollis* L. geklopft im Egerthale und bei Pograth. Juni.
- Ptilinus pectinicornis* L. — in einer alten Bildrahme in mehreren Stücken (5 ♂, 3 ♀) gefunden.
- Trypopyts carpini* Hrb. Franzensbad, Juli — geklopft von einer Birke. —
- Bostrichus* (*Apate*) *capucina* L. einmal in einem behauenen Holzbalken 5 Stücke — bei Pograth. Juli.
- Lyctus canaliculatus* L. mehrmals — namentlich im Moos der Häuserdeckungen im Egerthal, in Strohdachschindeln u. s. w. einzeln. April-Juli; einmal ebendort ein Stück.
- L. brunneus* Steph.
- 13 *Cis boleti* Scop. zahlreich unter Rinde gesammelt; *micans* Ol. auf einem weissen Tuche in Siechenhaus zwei Stücke gefunden. Juni. —

Fam. Tenebrionidae.

- Blaps similis* Ltr. einige Stücke unter einem Ziegel zwischen Eger und Franzensbad; einige Stücke aus einem Keller. Juli.
- Crypticus quisquilius* L. — Franzensbad unweit Cartelieris Badesalon — ein Stück unter einem Steine. Juni.
- Opatrum sabulosum* L. Gemein. März-Apr.
- Eledona agaricola* Hrb. auf einer Rosenblüthe. 2 Stücke. Juni.
- Scaphidema metallicum* Fbr. (*aeneum* Payk.) — von einem Schüler erhalten, der sie angeblich unter Rinde fing. Juni.
- Hypophloeus melinus* Hrb. (*depressus* Fbr.) und *cimeterius* Hrb., *castaneus* Fbr., die beiden häufigsten Arten; *fraxini* Kug., *pini* Pnz., *bicolor* und *fasciatus* Fbr. in je einem Stücke unter Rinde. Mai-Juli.
- Uloma culinaris* L. Am Bahnhofs einige Stücke, vermutlich eingeschleppt. Juli.
- Tenebrio molitor* L. Gemein, auch gezüchtet.
- Menephilus cylindricus* Hrb. (*curvipes* Fbr.) ein ♂ bei Siechenhaus unter einem Dachschindel. Juli.

17 *Helops lanipes* L. Häufig, auch in Spinnennetzen ; ein *Fabricii* Gemm. (*quisquilius* Fbr.) unter einem Brette am Schustersprung. Juli.

Fam. Cistelidae.

Allecula morio Fb. Auf Dolden gelegentlich. Juni, Juli.

Cistela murina L. häufig: auch *ceramboides* L., *luperus* Hrb., *fuscipes* Fbr. (*fusca* Ill.), *semiflava* Hrb. mehr einzeln. Juni, Juli.

Mycetophila (*Mycetochares*) *bipustulata* Ill. bei Pograth auf *Carex* ein Stück. Juni.

Cteniopus flavus Scop. (*sulphureus* L.) auf *Pastinaca* einmal zahlreich angetroffen — am Bahndamm. Juli.

11 *Omophlus betulae* Hrb. *lepturoides* Fbr. und *amerinae* Curt. — auf Dolden, nicht sehr häufig. Juni, Juli.

Fam. Pythidae.

Salpingus ater Payk. Gestreift im Franzensbader Moore. Juli.

Fam. Melandryidae.

Eustrophus dermestoides Fbr. Königswart auf *Heracleum spondylium* 3 Stücke gestreift. Juni.

Dircaea laevigata Hell. Unter Rinde ein Stück bei Pograth. Juni.

3 *Phrygaenophilus analis* Fbr. (*ruficollis* Fbr.) Franzensbad an einer weissen Mauer. Juli.

Fam. Lagriadae.

Lagria hirta L. Auf *Rubus* viele Stücke bei Kulm (meist ♀) und Königswart (♀), ♂ nur 3 Stücke. Juni.

Fam. Anthicidae.

Notoxus cornutus Fbr. in *Chrysanthemum* einige Stücke am Bahndamm gegen Pograth. Mai.

- 6 *Anthicus antherirus* u. *hispidus* Rossi häufig, *floralis* Fbr., *fasciatus* Chrz. und *salinus* Crotch. einzeln gestreift. Juni, Juli.

Fam. Pyrochroidae.

- Pyrochroa coccinea* L. Ein Stück von Franzensbad. Juli.
P. serraticornis Scop. (*satrapa* Schrk.) zweimal auf Scabiosen. Juli.
 3 *P. pectinicornis* L. Im Egerthale. Mai, Juli.

Fam. Mordellidae.

- Tomoxia biguttata* Gyll. Gestreift bei Königswart. Juni.
Mordella fasciata Fbr. und *aculeata* L. nicht selten auf Gartenpflanzen; *bipunctata* Grm. Gestreift. Juli.
Mordellistena pumila Gyll. und *humeralis* L. im Egerlande gestreift, Juni, Juli.
 10 *Anaspis frontalis* L. häufig; *rufilabris* Gyll., *flava* L., *ruficollis* L. einzeln gestreift und *melanopa* Frst. (*maculata* Frc.)

Fam. Meloidae.

- Meloë proscarabaeus* L. und *violacea* Mrh. im Frühlinge nicht selten; doch *autunnalis* Oliv., *reticulata* Brdl., *rugosa* Mrs. und *brevicollis* Pnz. nur einzeln.
 7 *Cantharis* (*Lytta*) *vesicatoria* L. Gesellig — an verschiedenen Stellen auftauchend. Mai, Juni.

Fam. Odemeridae.

- Calopus serraticornis* L. — Nach einer mündlichen Mittheilung des Hrn. Gratl bei Waldsassen — der Warte von Egerland — unter Rinde an einem Zaunpfahle zu 30 Stücken (♂ und ♀) getroffen; meine Egerländer Exemplare stammen daher. Juni.
Dryops femorata Fbr. bei Franzensbad gestreift. Juni.
Oedemera podagrariae L., *femorata* Scop. (*flavescens* L.), *nobilis* Scop. (*coelarea* L.), *flavipes* Fbr., *virescens* L. und *lurida* L. mehrmals gestreift oder namentlich von Dolden abgefangen. Juni, Juli.

- Nacerdes* (*Anoncodes*) *adusta* Puz. und *ruficollis* Fbr. bei Königswart und St. Anna gestreift; Juli.
Chrysanthia viridis Schm. Franzensbad auf *Hieracium murinum*. Juli.
 12 *Mycterus curculionoides* Fbr. von Birken geschüttelt. Juni.

Fam. Curculionidae.

- Otiorhynchus obsoletus* Stierl — einmal; bei Kulm auf einem Farren. Juni.
O. geniculatus Grm. einzeln, doch nicht selten. Juli.
O. planatus Fbr., *tenebricosus* Fbr. und *laevigatus* Fbr., einzeln niger Fbr. bei Wies in mehreren Stücken; *morio* Fbr. (*unicolor* Hrb., und *ebeninus* Gyll., *orbicularis* Fbr., *scabrosus* Mrsh., *porcatus* Hrb., einzeln; *picipes* Fbr. häufiger ebenso *gemmatus* Fbr. und in 3^o/₁₀ *chlorophanus* Boh., *lepidopterus* Fbr., *prolixus* Rosh., *nubilus* Boh. einzeln: *ligustici* L. häufig an Eschen und Liguster; *ovatus* L. am Grüneberg — vom Mai an.
Peritelus leucogrammus Grm. ein Stück bei Stein auf einer Nessel. Juni.
Omius forticornis Boh. Egerthal im Moos ein Stück. Juni.
Platytarsus setulosus Boh. Gestreift bei Pograth. Juni.
Phyllobius glaucus Scop. (*calcaratus* Fbr.), *alneti* Fbr., *pittacinus* Grm., *argentatus* L., *maculicornis* Grm., *oblongus* L. *mus* Fbr., *piri* Fbr., *betulae* Fbr., *pomonae* Oliv., *viridiaereus* Laich. (*uniformis* Mrsh.) — mehr weniger häufig und gesellig im ganzen Egerlande.
Cneorhinus globatus Hrb. (*geminatus* Fbr.) — bei Königswart ein Stück; Juli.
Liophloeus nubilus Fbr. gemein; auch
Barynotus obscurus Fbr. nicht selten. Juni, Juli.
Strophosomus coryli Fbr. — auf Haselstrauch häufig und zahlreich; auch *faber* Hrb. bei Königswart geschüttelt. Juni.
Sciaphilus micans Fbr. auf Birken mehrmals gefunden, einzeln. Juni.
Eusomus ovulus Ill. Unter einem Steine im Egerthal. Juni.
Brachyderes incanus L. einzeln auf Wegen. Mai, Juni.

- Sitones* griseus Fbr., flavescens Mrsh., sulcifrons Thbg., lincellus Bhm., crinitus Oliv., lineatus L., discoideus Gyll., hispidulus Fbr. — in allen Culturen gestreift; manchesmal massenhaft. Juni, Juli.
- Metallites* mollis Grm. — atomarius Oliv. und marginatus Steph. abwechselnd — einzeln auf Wegen, Blumen und Gesträuch. Juni.
- Polydrusus* undatus Fbr., flavipes Deg., coruscus Grm., cervinus Gyll. picus Fbr., sericeus Schall. — mehr einzeln, gestreift und von Sträuchern geklopft. Juni.
- Scytropus* mustela Hrb., Einzeln von Gebüsch gestreift. Juni.
- Thylacites* fritillum Puz. Von Wiesenblumen gestreift. Juni.
- Tanymecus* palliatus Fbr. Auf Haselnusssträuchern, nicht selten. Juni.
- Chlorophanus* viridis L. gemein auf Gebüsch; auch salicicola Grm. und graminicola Gyll. fand ich einzeln Juni.
- Gronops* lunatus Fbr. Am Kammerbüchl unter einem Steine zwei Stücke. Juni.
- Liparus* (Neolytes) germanus L. An Wegen einzeln, nicht selten Mai-Juli.
- Liosomus* ovatulus Clv. Im Egerthal gestreift und Kulm an *Rubus* einige Stücke. Juni.
- Alophus* triguttatus Fbr. Gestreift — doch einzeln an verschiedenen Punkten. Juni, Juli.
- Hypera* tessellata Hrb., palumbaria Grm., punctata Grm., pollux Fbr., suspiciosa Hrb., plantaginis Deg., variabilis Hrb., polygoni Fbr., meles Fbr., nigrirostris Fbr. — gestreift an verschiedenen Punkten. April-Mai.
- Cleonus* ophthalmicus Hrb. einzeln an Wegen;
- Cl.* sulcirostris L., marmoratus Fbr. obliquus Fbr., cinereus Schrk., albidus Fbr. und glaucus Fbr. einzeln an Holzvorräthen, am Wege u. s. w. Mai, Juli.
- Rhynocyllus* antidontalgicus Grbi. — gestreift von Compositen (Cirsien) und *Rubus*. Juni, Juli.
- Lixus* paraplecticus L. und filiformis Fbr. dann und wann am Wege; auch von Compositen gestreift. Juni, Juli.
- Lepyrus* colon Fbr. häufig, capucinus Schall. (binotatus Fbr.) seltener (25 1);

- Curculio* (*Hylobius*) *abietis* L. — gemein in allen Wäldern. Mai.
- Pissodes* *piceae* Ill. seltener, *pini* L. und *notatus* Fbr. häufig im Egerlande; auch *validirostris* Gyll. in einem Stücke bei Wieserbeutet.
- Gryphidius* *equiseti* Fbr. mehrmals gestreift — bei Pograth, Kulm und im Egerthale. Juni, Juli.
- Eirrhinus* *acridulus* L., *festucae* Hrb. und *affinis* Payk. mehrmals gestreift; *longimanus* Frst. (*vorax* Fbr.), *tremulae* Payk. u. *majalis* Payk. — einzeln. April-Juni.
- Mecinus* *pyraster* Hrb. Auf *Rubus* bei Kulm gestreift. Juni.
- Hydronomus* *alismaticus* Mrsh. Im Egerthale und bei Franzensbad gestreift. Juni.
- Bagous* *lutosus* Gyll. als einzige Art bei Pograth auf *Carex* gestreift. Mai.
- Smicronyx* *Jungermanniae* Rch. (*cicur* Rch.) gestreift im Egerthale. Juni.
- Anoplus* *plantaris* Naetz. Ebendort gestreift von Erlen und Birken. Juni.
- Brachonyx* *pineti* Payk. (*indigena* Hrb.) einzeln: Franzensbad und Pograth. Juni.
- Balaninus* *cerasorum* Fbr. (*villosus* Hrb.) *glandium* Mrsh., *nucum* L. *tessellatus* Fcr (*turbatus* Gyll.), *Herbsti* Gemm. (*cerassorum* Hrb.), *crux* Fbr., *brassicae* Fbr. und *pyrrhoceras* Mrsh. — alle — mehr weniger einzeln an verschiedenen Stellen im Gebüsch. Mai-Juli.
- Anthonomus* *ulmi* Deg. bei Franzensbad im April, einzeln; *pomorum* L., *rubi* Hrb. und *druparum* L. vom Gebüsch gestreift. Mai, Juni.
- Acalyptus* *carpini* Hrb. bei Franzensbad ein Stück. Juni.
- Orchestes* *quercus* L., *rufus* Oliv., *testaceus* Müll. (*seutellaris* Fbr.), *pubescens* Steph., *alni* L., *jota* Fbr., *fagi* Fbr., *pratensis* Grm., *loniceræ* Hrb., *populi* Fb., *avellanae* Donovan., *stigma* Grm., *foliorum* Müll. (*saliceti* Fbr.), *salicis* L., *rufitarsis* Grm. — gestreift von Wiesenblumen und Gebüsch. April-Sept.
- Lignyodes* *enucleator* Puz. im „stillen Thale“ ein Stück gestreift von einem Eichenstrauche. Juli.

- Elleschus scanicus* Payk. und *bipunctatus* L. im Egerthale auf Erlen- und Birkenruthen. April.
- Tychius quinquemaculatus* L. (= *5 punctatus* L.) und *tomentosus* Hrb. gestreift im Egerthale und bei Kulm. Juni.
- Cionus scrophulariae* L., *suberculosis* Scop. (*verbasci* Fbr.), *Olivieri* Rsch., *similis* Müll., (*thapsus* Fbr.), *Blattariae* Fbr., *solani* Fbr. und *fraxinus* Deg. — gestreift oder aus Blüthen (*Verbascum*, *Campanula*, *Solanum* u. s. w.) abgelesen. Juni, Juli.
- Nanophyes lythri* Fbr. Gestreift — im Egerthale und bei Pograth — doch gar selten. Juli.
- Gymnetron beccabungae* L., *veronicae* Grm., *teter* Fbr., *pilosus* Gyll., *graminis* Gyll., *campanulae* L. gestreift. April.
- Acalles lemur* Grm. und *hypocrita* Boh. in je einem Stücke gestreift bei Stein. Juli.
- Cryptorhynchus lapathi* L. — oftmals auf Sumpfpflanzen gestreift und abgelesen. April-Juli.
- Rhamphus flavicornis* Clv. im Egerthale gesireift. April.
- Mononychus punctum album* Hrb. (*pseudacori* Fbr.) Pograth, im Geschilfe gestreift. Mai.
- Cöliodes dryados* Gmel. (*quercus* Fbr.) im Egerthale; *ruber* Mrsh., *cardui* Hrb. (*fuliginosus* Mrsh.), *4 maculatus* L., *geranii* Payk. gestreift, namentlich auf Wiesenblumen. Juni, Juli.
- Centhorrhynchus macula alba* Hrb., *syrites* Grm., *animilis* Payk., *erysimi* Fbr., *contractus* Mrsh., *cochleariae* Gyll. (*atratus* Gyll.), *ericae* Gyll., *geographicus* Göze (*echii* Fbr.), *raphani* Fbr., *cruciger* Hrb. (*crucifer* Oliv.), *asperifoliarum* Gyll., *campestris* Gyll., *Chrysanthemi* Gyll., *quadridens* Puz., *margi-natus* Payk., *rapae* Gyll., *Napi* Gyll., *scapularis* Gyll., *barbareae* Suffr., *signatus* Gyll. (*pubicollis* Gyll.), *spinus* Göze (*horridus* Fbr.), *troglydites* Fbr., *lineola alba* Hrb. (*quercicola* Fbr.), *floralis* Payk. und *pyrrhorynchus* Mrs. (*cochleariae* Fbr.). — gestreift in mehr oder weniger zahlreichen Exemplaren. Mai-Juli.
- Amalus scortillum* Hrb. Mehrmals aus halbfaulen Knochen — im stillen Thale — geschüttelt. Juni.
- Phytobius velatus* Beck. Egerthal auf *Sagittaria*. Juli.
- Ph. rotula* Grm. ebendort je ein Stück. Juni.

- Rhinoncus castor* Fbr. Nicht selten von *Rubus* und *Cirsien* gestreift.
Juni.
- Rh. pericarpus* Fbr. Häufig aus Blumen (*Campanula* u. s. w.) geklopft und gestreift.
- Rh. perpendicularis* Reche. (*guttalis* Grv.) auf *Hieracium* ein Stück am Wege nach Franzensbad. Juni.
- Poophagus sisybrii* Fbr. bei Franzensbad mehrmals gestreift. Juli.
- Baris artemisiae* Hrb., *viridisericea* Gze. (*cuprirostris* Fbr.), *chloris*, *coerulescens* Scop., *lepidii* Grm. und *T. album* L. gestreift — doch nur in einzelnen Stücken, bes. um Franzensbad. Juni.
- Sphenophorus piceus* Fbr. bei Franzensbad auf Sumpfpflanzen einzeln; *abbreviatus* Fbr. bei Kulm auf *Rubus*-Dolden. Juni.
- Calandra granaria* L. und *oryzae* L. — öfters aus Reiskörnern ausgeklaut. Juni.
- Dryophthorus lymexylon* Fbr. — ein Stück aus *Rubus*stängeln. Juni.
- Cossonus linearis* L., *ferrugineus* Clv. und *cylindricus* Shlb. — im Egerthale unter Rinden — einzeln; auch bei Kulm. Juni
- Rhyncolus cylindricus* Boh. — *chloropus* Fbr., *elongatus* Gyll. und *truncorum* Grm. — einzeln aus Baumrinde ausgelesen. Juni.
- Magdalis* (*Magdalinus*) *violaceus* L. auf Birken stellenweise häufig; *frontalis* Gyll., *duplicatus* Grm., *cerasi* L. und *pruni* L. öfters gestreift und von Gesträuchern gekötschert. Mai.
- 262 *Apion pomonae* Fbr., *craccae* L., *subulatum* Kby., *ochropus* Grm., *carduorum* Kby., *onopordi* Kby., *brunnipes* Bhm. (*laevigatum* Kby.), *vicinum* Kby., *defficile* Hrb., *fuscirostre* Fbr., *urticarium* Hrb., (*vernale* Hrb.), *aeneum* Fbr., *radiolus* Kby., *curvirostre* Gyll., *pubescens* Kby., *simile* Kby., *rufirostre* Kby., *seniculus* Kby., *viciae* Payk., *diforme* Grm., *ononidis* Gyll., *apricans* Hrb., (*fagi* Kby.), *assimile* Kby., *trifolii* L., *flavipes* Fbr., *tenne* Kby., *virens* Hrb., *ervi* Kby., *ononis* Kby., *filirostre* Kby., *minimum* Hrb., *laevigatum* Payk. (*sorbi* Hrb.), *scutellare* Kby., *loti* Kby. (*angustatum* Kby.), *vorax* Hrb.), *miniaturum* Grm., *frumentarium* L., *sanguineum* Deg., *malvae* Fbr., *aciculare* Grm., *violaceum* Kby., *humile* Grm. — alle gestreift — manche massenweise auf Blumen.

Fam. Scolytidae.

Hylastes cunicularius Er. und *palliatu*s Gyll. — einzeln im Egerthale. Juni.

Hylurgus ligniperda Fbr. ein Stück bei Pograth gefangen. Juni.

H. piniperda L. massenweise in jungen Tannen bei Wies — zunächst von Hrn. H. Gratl entdeckt. Mai.

Hylesinus fraxini Fbr. ein Stück bei Siechenhaus im Fluge. Juni.

Scolytes Geoffroyi Gze. (*destructor* Oliv.) und *rugulosus* Rtz. in je einem Stücke im Egerthale. Juni.

Cryphalus piceae Rtz. Kulm — in einer Rinde ein Stück. Juni.

Tomicus (Bostrychus) sexdentatus Brn. (*stenographus* Dft.) und *tytopographus* L. — einzeln gefunden in Rinden; auch im Fluge. Juni.

Dryocetes bicolor Hrb. bei Pograth — Loretto, einige ♀ in Baumrinde. Juni.

12 *Trypodendron (Xyloterus) lineatus* Er. in einigen Stücken in Pappelbäumen gegen Wies. Juni.

Fam. Attelabidae.

Apoderus conyli L. und var. *avellanae* L. auf Erlen im Egerthale u. s. w. stellenweise zahlreich. Juni.

2 *Attelabus curculionoides* L. einige Stücke auf Erlen im Egerthale. Juni.

Fam. Rhinomaceridae.

Rhynchites auratus Scop. — ein Stück auf *Cirsium* bei Königswart. Juni.

7 *Rh. aequatus* L., *cupreus* L., *interpunctatus* Steph. (*alliariae* Payk.) und *populi* L. auf Blumen und Gesträuch, im Egerthale, bei Wies u. s. w. einzeln; *betuleti* Fbr. und *betulae* L. häufiger. Juni.

Fam. Anthribidae.

- Platyrhinus latirostris* Fbr. — auf einer Erle im Egerthale; ein Stück. Juni.
- Tropidoderes niveirostris* Fbr. einige Stücke in Rinde bei Siechenhaus. Juni.
- Anthribus* (*Anthribus*) *albinus* L. ein Stück bei Franzensbad — im Parke. Juni.
- 4 *Brachytarsus varius* Fbr. Gestreift bei Pograth. Juni.

Fam. Bruchidae.

- Urodon rufipes* Oliv. und *saturalis* Fbr. auf Blumen gestreift, namentlich auf *Campanula*, *Centaurea* u. s. w. auf Bahndämmen. Juni.
- Spermophagus cardui* Gyll. mehrmals gefunden auf Compositen, gegen Franzensbad, Pograth u. s. w. Juni.
- 14 *Bruchus bimaculatus* Oliv. (*variegatus* Grm.), *marginellus* Fbr., *varius* Ol., *imbricornis* Pnz., *rufimanus* Bhm., *seminarius* L., *luteicornis* Ill., *viciae* Oliv., *loti* Payk., *villosus* Fbr. (*ater* Mrsh.) — auf verschiedensten Wiesenblumen gestreift; *pisorum* L. (*pisi* L.) in schädlicher Menge bei Sandau auftretend. Mai-Juli.

Fam. Cerambycidae.

- Spondylis buprestoides* L. in Holzlagern sehr häufig — oft gesellig. Mai, Juli.
- Cerambyx Scopoli* Fssl. auf Weiden häufig, auch auf Erlen und Pappeln. Juni.
- Aromia moschata* L. ebenso, nicht selten. Juni.
- Callidium femoratum* L. ein Stück bei Franzensbad an einer weissen Wand. Juli.
- C. violaceum* L. gemein auf Holzlagern u. in Häusern; Mai-Sept.; auch *C. variabile* L. in den verschiedensten Abänderungen nicht selten.

- C. alni* L. und *sanguineum* L. einzeln auf Gesträuch im Egerthale. Juli.
- C. undatum* L. bei Pograth auf Erlen. Juli.
- Hylotrupes bajulus* L. Auf Holzlagern, auch auf Erlen, Birken u. s. w. häufig; Mai-Sept.
- Tetropium luridum* L. auf *Heracleum spondylium* auf Wiesen — einzeln, auch auf Gesträuch. Juni, Juli.
- Asemum striatum* L. und
- Criocephalus rusticus* L. ebenso. Juli.
- Clytus arcuatus* L. ein Pärchen bei Königswart auf *Cirsium*; auch *C. arietis* L., *ramni* Grm. und *verbasci* L., *figuratus* Scop. (*plebejus* Fbr.) und *mysticus* L. auf Gesträuch und Dolden einzeln im Egerthale, bei Kulm u. s. w.; ein *glabromaculatus* Gze., (*quadripunctatus* Fbr.) auf *Rubus* bei Kulm. Juni.
- Obrium brunneum* Fbr. auf Holzlagern bei Königswart im Sonnenschein 2 Stücke. Juni.
- Gracilia minuta* Fbr. *pygmaea* Fbr. und
- Stenopterus rufus* L. einzeln auf Dolden; Juli.
- Lamia textor* L. gemein im Gebüsch des Egerthals u. s. w.;
- Monochammus sartor* Fbr. — einzeln, selten. Juni.
- Acanthoderes clavipes* Schrk. (*varius* Fbr.) und
- Astynomus aedilis* L. — auf Holz, — letztere gar häufig auch in Häusern, besonders im Herbste;
- Liopus nebulosus* L. ein Stück bei Königswart auf einem Zaunbalken. Juni,
- Pogonocherus ovatus* Goze, *fasciculatus* Deg. und *hispidus* L. einzeln auf Compositen an sonnigen Stellen, besonders an Waldrändern in Nähe von Holzlagern u. s. w. Juli.
- Anaesthethis testacea* Fbr. auf *Rubus* bei Kulm ein Stück. Juni.
- Agapanthia angusticollis* Gyll. und *Cardui* L. ganz einzeln auf Compositen in 2 Stücken im Juli.
- Saperda carcharias* L. Auf den Pappelbäumen gegen Wies, besonders Abends nicht selten; Juni.
- S. scalaris* L. und *octopunctata* Scop. (*tremulae* Fbr.) auf Dolden und im Gebüsch; *populnea* L. mehrmals gesellig angetroffen, bes. im Egerthale. Juni.
- Oberea oculata* L. ein Stück von Franzensbad. Juli.

- Phytoecia pustulata* Schrk. (*lineola* Fbr.), *ephippium* Fbr. und *vi-rescens* Fbr. auf vielblüthigen Pflanzen nicht gar selten; ein *Ph. argus* Frhl. von *Heracleum giganteum* bei Franzensbad. Juli.
- Necydalis minor* L. Im Fluge und auf Blüten, einzeln; *minimus* Scop. (*umbellatarum* L.) auf einem Pappelstamme in 3 Stücken. Juli.
- Rhamnusium bicolor* Schrk. (*salicis* Fbr.) aus dem Egerlande ein Stück. —
- Stenocerus* (*Rhagium*) *sycophanta* Schrk. (*mordax* Fbr.), *Linnei* Laich (*inquisitor* Fbr.), *inquisitor* L. (*indagator* L.) und *bifasciatum* Fbr. — stellenweise einzeln auf Holz, Dolden und Gebüsch. Mai, Juli.
- Toxotes cursor* L. einzeln auf Gesträuch; *meridianus* L. auf Farren, beide nicht häufig. Juli.
- Pachyta quadrimaculata* L., *sexmaculata* L. und *cerambyciformis* Schrk. auf Dolden nicht selten; auch *collaris* L. stellenweise zahlreich, *virginica* L. bei Kulm auf *Leucanthemum* L.
- Strangalia quadrifasciata* L. auf einem Zaune bei Kammerbüchl; *aethiops* Fbr. (*atra* Fbr.), *maculata* Poda, *attenuata* L., *nigra* L., *bifasciata* Müll., *melanura* L. und *septempunctata* Fbr. auf Blumen mehr weniger häufig;
- St. pubescens* Fbr. fand ein Zögling im Egerthale. Juli.
- Leptura rubra* L. (*testacea* L.) gemein, besonders ♀; auch *sanguinolenta* L., *maculicornis* Deg., *livida* Fbr. fand ich im Gebiete nicht selten;
- L. virens* L., *scutellata* Fbr. und *fulva* Deg. im Egerlande einzeln getroffen.
- Anoplodera rufipes* Schall. und *lurida* Fbr. auf Dolden, nicht selten.
- 80 *Grammoptera tabacicolor* Deg. gemein; *ruficornis* Fbr., *ustulata* Schall. und *holosericea* Fbr. einzeln bes. auf *Rubus* und *Rosen*.

Fam. Chrysomelini.

- Orsodaene cerasi* Fbr. nicht selten gestreift im Grase und von Gesträuchen geklopft; auf *Rosen*, *Rubus* u. *Padus* beobachtet. Mai.

- Donacia* Fbr. in reicher Auswahl auf allen Sumpfwiesen des Egerthals zahlreich vertreten; ich fieng mit dem Streifsacke: *crassipes* Fbr. selten; *versicolora* Brhm. (*bidens* Oliv.) häufiger; *dentata* Hope, *spargani* Ahr. ein Stück bei Franzensbad, Juni; *aquatica* L. (*dentipes* Fbr.), *limbata* Fbr., (*lemnae* Fbr.), *bicolora* Isch. (*sagittariae* Fbr.), *obscura* Gyll. einzeln; *impressa* Payk. selten, *sericea* L. und *discolor* Jeppe gemein, *affinis* Knze. einzeln bei Franzensbad, *semicuprea* Pnz. ebenso, *clavipes* Fbr. (*menyanthidis* Fbr.) einzeln, *simplex* Fbr. (*linearis* Fbr.) häufig, z. B. im Egerthale, und *cinerea* Hrb. (*hydrocharidis* Fbr.) vom Mai an.
- Haemonia appendiculata* Puz. (*equiseti* Fbr.) einige Stücke bei Pograth in der Wondreb gestreift. Juni.
- Zeugophora subspinosa* Fbr. Auf Weissdornblüthen gestreift. Juni.
- Z. scutellaris* Suffr. gestreift.
- Lema puncticollis* Curt. 2 Stücke auf *Cirsium* im Juni bei Pograth; *cyanella* L. mehrmals gestreift, auch an weissen Wänden (im Egerthale) gefangen, Juni; auch *melanopa* nicht sehr selten; von *flavipes* zwei Stücke auf *Rubus* bei Wies; Juni.
- Crioceris merdigera* L. gemein auf Gartenpflanzen; auch *asparagi* L. kaum seltener; *C. brunnea* L. *12 punctata* L. u. *dodecastigma* Suffr., *5 punctata* Fbr. und *campestris* L. einzeln gestreift auf etwas sumpfigen Stellen bei Franzensbad. Juni.
- Clythra tridentata* L. und *lucida* Grm. (*axillaris* Lac.) gestreift bei Franzensbad. Juni.
- C. laeviuscula* Rtz. und *4 punctata* L. auf Sumpfwiesen und in Gärten mehrmals gestreift. Juni.
- C. salicina* Scop. (*cyanea* Fbr.) und *affinis* Hllw. oftmals gestreift *xanthaspis* Grm. einzelne Male bei Pograth und Kulm. Juni.
- C. scopolina* L. und var. *tetradyma* Küst., sowie *unifasciata* Scop. (*quadrinaculata*) L. im Egerthale u. s. w. auf verschiedenen Blumen und Gesträuchen gestreift. Juni, Juli.
- Adoxus* (*Eumolpus*) *obscurus* L. Gelegentlich auf Wiesenblumen. Juli
- Pachnophorus pilosus* Rssi (*arenarius* Puz.) Am Kammerbüchl gestreift. Juni.
- Colaspidema sophiae* Schall. Gestreift namentlich von Cruciferen *Barbareae*, *Lepidium* u. s. w. Juni.

- Cryptocephalus Gff. ebenfalls eine der reichsten Gattungen :
- C. coryli* L. auf Erlen und Hasel im Egerthale, einzeln. Juni.
- C. Loreyi* Soll. 1 Stück auf Cirsium, Juli.
- C. cordiger* L. und *variegatus* Fbr. ebenfalls einzeln, gestreift. Juni.
- C. octopunctatus* Scop. (*variabilis* Schneid.) nicht selten gestreift, auf Nessel, *Crataegus* u. s. w. Juni.
- C. sexpunctatus* L. und *signatus* Laich. (*interruptus* Suffr.) einzeln, gestreift. Juni.
- C. violaceus* Laich. einzeln wie *virens* Suffr. — in Wiesengras; *sericeus* L. mit *aureolus* Suffr. und *Hydrochoeridis* L. wohl die gemeinste Art, auf Compositen von Mai an.
- C. pini* L. einzeln gestreift; *nitidus* L. (*nitens* L.); ebenso; *marginalis* Oliv. ein Stück bei Franzensbad gestreift. Juni.
- C. flavoguttatus* Oliv. (*Moraei* L.) sehr häufig; *flavipes* Fbr. öfters gestreift. Juni.
- C. decempunctatus* L. und *frenatus* Fbr. bei Franzensbad gestreift auf Sumpfboden, nicht selten. Juni.
- C. nigrocoeruleus* Gze. (*fulcratus* Grm.) und *marginatus* Fbr. ziemlich einzeln gestreift; *vittatus* Fbr. und *bilineatus* L. häufiger, auch *pygmaeus* Fbr. an verschiedenen Stellen erhalten; *fulvus* Goze (*minutus* Fbr.) in einem Stücke auf *Centaurea jacea* L. am Kammerbüchl. Juli.
- C. labiatus* L. bei Franzensbad mehrmals gestreift.
- C. ocellatus* Drap. (*geminus* Gyll.) häufiger auf Wiesen. Juni.
- C. bipunctatus* Grm. und *bipustulatus* Fbr. zwei häufige Arten.
- Pachybrachys tristis* Laich. (*fimbriolatus* Suffr.) selten, *hieroglyphicus* Fbr. häufiger, auf Weiden stellenweise massenhaft. Juni.
- Timarcha violaceonigra* Deg. (*coriaria* Fbr.) ganz einzeln; *metallica* Fbr. ebenso, unter Steinen. Juni.
- Chrysomela staphylea* L. häufig, auf *varians* Schall. nebst den *Var. hyperici* Deg. und *centaurei* Fbr. häufig. Mai. Juni.
- Ch. göttingensis* L. Auf Münze und unter Steinen, einzeln nicht selten.
- Ch. olivacea* Suffr. ein Stück unter einem Steine am Grüneberg. Mai.
- Ch. haemoptera* L. einzeln auf Blättern, nicht selten. Mai-Juli.
- Ch. sanguinolenta* L. und *marginalis* Dft. — einzeln gefunden, öfters unter Steinen. Juni.

- Ch. *limbata* Fbr. ein Stück von *Cirsium* bei Kulm; ebenso
 Ch. *marginata* L. nur in einem Stücke von Kulm. Juni.
 Ch. *analis* L. und Schach Fbr. (Rdtb.) gestreift bei Stein je 1 Stück.
 Juni.
 Ch. *coerulans* Scr. (*violacea* L.) häufiger im Egerthale, bei Kulm
 und St. Loretto beobachtet. Juli.
 Ch. *menthastri* Suffr. ein Stück im Egerthale auf *Galeopsis tetrahit*.
 Ch. *graminis* L. auf einer *Cirsium* gegen Franzensbad gefunden.
 Ch. *fastuosa* L. Einige Male auf Libiaten, Compositen und Gesträuch,
 oft gesellig. Juli.
 Ch. *cerealis* M. Einzeln zwischen niedrigem Gras auf sonnigem
 Boden. Juli.
 Ch. *polita* L., *lamina* Fbr., *hyperici* Frst. (*fucata* Fbr.) einzeln auf
Rosa canina, *Rubus*, *Cirsium* an verschiedenen Punkten
 beobachtet. Juli; auch *geminata* Payk. kaum häufiger. Juli.
Melasoma (*Lina*) *aenea* L. stellenweise häufig: Egerthal auf Erlen
 u. s. w. Juni.
L. cuprea Fbr. einzeln, gelegentlich angefliegen auf weisse Wände,
 2 mal. Mai, Juni.
L. lapponica L. wurde von Hrn. Gratl bei Eger zuerst aufgefunden,
 und mir mitgetheilt. Juni, Juli.
L. populi L. und *tremulae* Fbr. Abwechselnd gleich häufig auf Ge-
 stäuch, oft massenhaft. Mai-Juli.
L. vigindipunctata Scop. einmal auf *Cirsium eriophorum* beim Kammer-
 hof. Juni.
Phytodecta (*Gonioctena*) *viminalis* L. in vielen Abänderungen auf
 Blumen und Gesträuch gestreift; häufig. Mai-Juli.
G. rufipes Deg. und *fornicata* Brgg. (6 *punctata* Puz.) mehr einzeln;
 von Espen öfters geklopft. Juni.
Gastroides (*Gastrophysa*) *polygoni* L. im Wiesengrase und auf Sumpfpflanzen häufig gestreift. Juni.
Plagiodera armoraciae L. gemein allerorts; Mai, Juli.
Phaedon cochleariae Fbr. nicht selten; z. B. bei Schlada. Juni.
P. Graminicola Dft. (*pyritosus* Oliv.), *galeopsis* Letz. (*sabulicola* Suffr.)
betulae Küst. — einzeln auf Gebüsch und unter Steinen.
 Juni, Juli.

- Phyllodecta* (*Phratora*) *vitellinae* L. und *vulgatissima* L. — auf Gebüsch, stellenweise häufig, gesellig; manchmal neben einander. Mai-Oct.
- Prasocuris aucta* L. häufig; *marginella* L. nicht selten auf niedrigen Sumpfpflanzen gestreift; auch
- P. Phellandrii* L. und *junci* Brhm. (beccabunge Ill.) stellenweise nicht selten — alle bei Franzensbad in Sumpfräben. Juni.
- Adimonia taneceti* L. und *rustica* Fbr. häufig; letztere einmal an einer Distel zwischen Eger und Franzensbad massenhaft. Juni.
- A. crataegi* Frst. (*sanguinea* Fbr.) auf blühendem *Viburnum* und *Crataegus* gesellig doch selten; *capreae* L. zahlreicher, besonders im Gebüsch des Egerthals und bei Franzensbad oft massenhaft. Mai, Juni.
- Galeruca viburni* Payk., *xanthomelaena* Schrk., *crataegi* Frst., *lineola* Fbr., *calmariensis* L., *tenella* L. mehr weniger häufig auf Wiesenblumen, Disteln und Gebüsch. Mai-Juli.
- G. sagittariae* Gyll. und *Nymphaeae* L. auf Torfmoorpflanzen bei Franzensbad gestreift, doch spärlich. Juni, Juli.
- Agelastica alni* L. gemein; *Agelasia halensis* L. von Hrn. Gratl im Egerlande entdeckt und mir freundlichst mitgetheilt.
- Phyllobrotica* 4 *maculata* L. auf einer Distel bei Pograth. Juni.
- Luperus nigrofasciatus* Gze. (*circumfusus* Mrsh.) bei Loretto auf Disteln, 3 Stücke, Juni; *pinicola* Dft. gestreift bei Kammerbüchl. Juli.
- L. xanthopus* Schrk. (*rufipes* Fbr.) und *flavipes* L. gestreift bei Königswart und Pograth. Juni.
- Crepidodera ventralis* Ill., *impressa* Fbr., *rufipes* L., *Modeeri* L., *nitidula* L., *helxinus* L. und *aurata* Mrsh. gestreift.
- C. ferrugina* Scop. unter feuchtem Holzwerke mehrmals. Juni.
- Hermaphysa* (*Linorosta*) *mercurialis* Fbr. im Egerthale gestreift. Juni.
- Haltica* (*Graptodera*) *quercetorum* Fbr. (*eruae* Oliv.), *lythri* Aubé gestreift; *G. oleraceae* L. sehr gemein.
- Aphthona cyparissiae* Koch., *flaviceps* All., *nonstriata* Gze. (*coerulea* Payk), *euphorbiae* Schrk. (*ovata* All.), *atrovirens* Frst., *herbigrata* Curt., *venustula* Ktsch. (*euphorbiae* All.), *atrocoerulea* Steph. und *violacea* Kch. gestreift, namentlich im Kammerbüchl und Franzensbad. Juni.

- Sphaeroderma cardui* L. Auf Disteln, einzeln an verschiedenen Punkten; ebenso, doch seltener *testaceum* Fbr.
- Phyllotreta nodicornis* Mrsh. (*axtenuata* Kch.), *crucifera* Gyl. (*atra* Kch.), *nigripes* Pnz., *armoraceae* Kch. (auf Rüps), *nemorum* L., *vittula* Rdtb., *flexuosa* Ill., und *exclamationis* Thb. (*brassicae* Fbr.) gestreift, wie oben.
- Podagrica* Alld. in allen drei deutschen Arten aus dem Egerlande vorliegend: *fuscipes* Fbr., *malvae* Ill. und *fuscicornis* Ill. bei Franzensbad u. s. w. gestreift.
- Batophila rubi* Payk. Franzensbad im Gebüsch bei Cartellier's Curhaus gestreift — auf *Spiraea*. Juni.
- Chaetocnema* (*Plectroscelis*) *chlorophana* Dft., *semicoerulea* Ktsch., *concinna* Mrsh. (*dentipes* Hffm.), *tibialis* Ill., *aridula* Gyll., und *hortensis* Frer. (*aridella* Payk.) gestreift, keine Art auffallend häufig.
- Mantura* (*Balanomorpha*) *rustica* L. und *Chrysanthemi* Ex. gestreift. erstere bei Franzensbad, letztere bei Pograth und Kulm. Juni
- Apteropoda orbiculata* Mrsh. (*ciliata* Oliv.) bei Kammerbüchl gestreift.
- Hypnophila obesa* Wtl. gestreift, ein Stück bei Loretto. Juli.
- Longitarsus* (*Thyamis*) *tabidus* Fbr. (*verbasci* Puz.), *apicalis* Beck. (*analisis* Crz. = Dft. Rdb.), *atricapillus* Dft. (*melanocephalus* Gyll.), *longipennis* Ktsch. (*pratensis* All.), *atriceps* Ktsch., *pulex* Schrk. (*obliteratus* Rsh.), *echii* Kch., *atricilla* L., *brunnea* Dft., *minuscula* Fdr., *flavicornis* Steph., *aeruginosa* Fdr., *exoleta* L. (*femoralis* Mrsh.), *fusco aenea* Rdtb., *anchusae* Payk., *lurida* Scop., *lycopi* Fdr., *nasturtii* Fbr., *saturella* Dft. (*thoracica* All.), *sisymbrii* Fbr., *Jacobaeae* Wth. (*tabida* Ol.), *ochroleuca* Mrsh., *ater* Fbr. (*parvula* Payk.) — sämtlich gestreift, manche zahlreicher.
- Dibolia cryptocephala* Ex. und *cynoglossi* Ex. in je 2 Stücken von Franzensbad.
- Psylliodes nigricollis* Mrsh., *chrysocephalus* L., *rapae* Ill. (*napi* Kch.), *cupreus* Kch., *cupronitens* Frst. (*herbaceus* Fdr.), *attenuatus* Kch., *affinis* Payk., *picina* Mrsh. (*rufilabris* Kch.), *dulcimaruae* Kch., *cucullatus* Ill. — gestreift auf Blumen und Gebüsch, alle mehr einzeln.

- Cassida murraea* L. einzeln; *fastuosa* Schall. (*vittata* Fbr.) ganz einzeln; *sanguinosa* Suffr. häufiger; *rubiginosa* Ill. auf Boragineen gegen Kammerbüchl; *liriophora* Kby. (*vibex* Fbr.) häufig auf Wiesenblumen; *sanguinolenta* Müll. im Egerthale ziemlich zahlreich gesammelt; auch *vittata* Vill. (*oblonga* Ill.) dortselbst und bei Loretto.
- C. nobilis* L. ein Stück auf *Rubus* bei Kulm; Juni.
- C. margaritacea* Schall. bei Loretto auf *Carduus* ein Stück;
- C. nebulosa* L. und *affinis* Fbr. allerorts gelegentlich;
- C. subferruginea* Schrk. (*ferruginea* Fbr.) auf grösseren Wald- und Wiesenblumen mehr einzeln; Juli.
- C. flaveola* Thbg. (*obsoleta* Ill.) einzeln auf *Cirsium* u. *Carduus*. Juli.
- 235 *C. viridis* L. (*equestris* Fbr.) Sehr häufig und wohl die häufigste Art auf Nesseln, Compositen und Gebüsch. Mai-Sept.

Fam. Erotylidae.

- Dacne* (Engis) 2 *pustulata* Thbg. (*humeralis* Fbr.) aus Egerland erhalten. Juli.
- 2 *Triplax russica* L. ein Stück unter einer Baumrinde bei Wies. Juni.

Fam. Endomychidae.

- Endomychus coccineus* L. -- im Egerthale, Kulm u. s. w. ganz einzeln. Juli.

Fam. Coccinellidae.

- Hippodamia* 13 *punctata* L. Oefters gestreift, namentlich um Franzensbad; var. 11 *maculata* Schff. ein Stück. Mai-Juli.
- Coccinella* 19 *punctata* L. im Egerthale und bei Franzensbad je einmal. Juni.
- C. variegata* Gze. (*mutabilis* Scr.) in mehreren Abänderungen oftmals gestreift. April-Juli.
- C. oblitterata* L. im Egerthale zweimal. Juni.

- C. bipunctata* L., auch in var. *pantherina* L. und *4 maculata* Scop.
— gar häufig gestreift. April-Nov.
- C. 11 notata* Schneid. einige Stücke auf Disteln bei Königsberg. Juni.
- C. 4 punctata* Pantopp. (*margimepunctata* Schal.) bei Kulm und im Egerthale je ein Stück gestreift. Juni.
- C. 18 punctata* Scop. (*impustulata* L.) Gemein wie allerwärts.
- C. lyncea* Fbr. (*12 pustulata* Fbr.) — ein Stück gestreift bei Stein, von Nessel. Juni.
- C. 14 pustulata* L. Auf Wiesen mehrmals gestreift, namentlich an Blütenköpfchen. Juni.
- C. 10 punctata* L. (*variabilis* Fbr.) in unzähligen Abarten gemein und massenhaft vom März-Novemb.
- C. 7 punctata* L. sehr gemein auch an Wänden. März-Oct.
- C. hieroglyphica* L. einzeln bei St. Anna, Kulm und Königswart erbeutet. Mai-Juli.
- Halyzia ocellata* L. und *oblongopunctata* L. ein paar Mal erbeutet, gestreift auf Gebüsch. Juni.
- H. 18 guttata* L. gestreift auf hochblüthigen Pflanzen einzeln. Juni; ebenso *14 punctata* L. (*14 guttata* L.)
- H. 10 guttata* L. ein Stück auf Nessel. Juni.
- H. 15 guttata* Fbr. (*bis 7 guttata* Schl.) gestreift; auf *Rubus*. Juni.
- H. 16 guttata* L. drei Stücke gestreift im Egerthale.
- H. 22 punctata* L. einige Stücke auf *Rosa canina*, *Rubus*, *Verbascum* u. s. w. gefangen. Juni.
- H. conglobata* L. Häufig gestreift im Gebüsch. Juli.
- Micraspis 16 punctata* L. (*12 punctata* L.) Gestreift im Grase. Juni.
- Chilocorus similis* Rossi (*renipustulatus* Scr.) und *bipustulatus* L. sehr häufig gestreift; namentlich letztere. April, Juni.
- Exochomus 4 pustulatus* L. ebenso häufig. Mai, Juli.
- Hyperaspis reppensis* Hrb. stellenweise häufig gestreift. Juni.
- Epilachna 24 punctata* L. (*globosa* Schneid.) gemein Apr.-Juli.
- E. impunctata* L. einzeln auf Compositen. Juni.
- Platynaspis luteorubra* Gze. (*villosa* Frer.) einige Male bes. auf *Rubus* gestreift. Mai, Juni.

Scymnus pulchellus Hrb. (4 *lunulatus* Ill.), *nigrinus* **Kug.**, *rubromaculatus* Gze. (*pygmaeus* Frer.), *interruptus* Gze. (*marginalis* Rssi.), *frontalis* Fbr., *abietis* Payk., *subvillosus* Gze. (*fasciatus* Frer.), *suturalis* Thbg. (*discoideus* Ill.), *ferrugatus* Moll. (*analis* Fbr.), *haemorrhoidalis* Hrb., *capitatus* Fbr., sämtlich gestreift oder von weissen Wänden abgelöst. April-Nov.

44 *Coccidula rufa* Hrb. und *scutellata* Hrb. mehrmals durch Streifen erhalten, auf Wiesen und Feldern. Juni.

Fam. Corylophidae.

Corylophus cassoideus Mrsh., ein Stück an einem Hundeaas. April.

III. Neuroptera.

Fam. Panorpididae.

Panorpa germanica L. Sehr selten: Schlössl. Juli.

P. communis L. Gemein: Egerthal, Wies, Pograth, Maria **Kulm.** Juni.

3 *Bittacus tipularius* Br. Siechenhaus. Juli.

Fam. Phryganidae.

Rhyacophila angularis P. (= *umbrosa* Br.) Selten: Egerthal. Juni.
Rh. vulgaris Pict. Häufig: Egerthal, St. Anna, Pograth, Stein. Juni.
Philopotamus scopulorum Step. (= *montanus* Pict.) Selten: Pechtersreuth, 1 Exempl. Juni.

Hydropsyche nebulosa P. selten: Viadukt. Juni.

Mystacides atra P. Nicht selten: Stein, Pograth, Königswart. Juni.

Leptocerus bifasciatus P. (*Mystacides bif.*) Selten: Pograth. Juni.

Goëra flavipes Curt. (*Trichostoma capillatum* P.) selten: Pechtersreuth und Siechenhaus. Juni.

Neuronia ruficus Scop. Häufig: Pograth und Stein, Franzensbad. Juni.

N. reticulata L. Seltener: Egerthal und Stein. Juni.

- Phrygaena striata L. Selten : Franzensbad. Juni.
 Ph. grandis L. Etwas häufiger : Stein, Viadukt. Juni.
 Chaetopteryx villosa Fbr. Egerthal. 1 Ex. Oct.
 Halesus digitatus Schrk. Pograth und Franzensbad. Juli.
 H. auricollis Pict. (nigricornis B.) Selten : Egerthal. Spt.
 Anabolia furcata Hg. Selten Franzensbad. Juli.
 Stenophylax latipennis Curt. (Anab. pantherinus Br.) Selten : Egerthal. Juli.
 Limnophilus rhombicus L. Selten : Pograth und Stein. Juni.
 L. flavicornis Fbr. Selten : Franzensbad. 1 Ex. Juni.
 L. politus ML. (vibex Br.) Selten: Schlössl. Juni.
 L. vittatus Fbr. Häufig: Egerthal, Franzensbad, Stein und Königswart. Juli.
 L. griseus L. Nicht selten : Ramberg und Egerthal. Juni.
 L. extricatus ML. (hirsutus Br.) Selten : Stein. Juni.
 Glyptotaelius pellucidus Retz. Selten: Kammerhof 1 Ex. Juni.
 24 Grammotaulius atomarius Fbr. Selten : Egerthal und Franzensbad. Juni. —

Fam. Scalidae.

- Sialis lutaria L. Häufig: St. Anna, Stein, Königswart, Franzensbad. Juni.
 Rhapsidia xanthostigma Schm. Selten : Wies. Juni.
 Rh. ophiopsis Schm. Nicht ganz selten Viadukt, Egerthal und Maria Kulm. Juni.
 4 Rh. notata Fbr. Egerthal 1 Ex. Juni.

Fam. Hemerobiidae.

- Osmylus maculatus Fbr. (= chrysops Br.) Selten : Egerthal. Juni.
 Drepanopteryx phalaenoides L. Nicht selten, auf Ahorn und Ulmen: Ramberg, Egerthal, Franzensbad. Mai, Juni.
 Hemerobius elegans Steph. (= pygmaeus Rmb.) Selten, auf Ahorn; Ramberg. Juni.
 H. nitidulus Fbr. (= ochraceus Wsm.) Häufig: Schlössl, Egerthal, Pograth. Juli.

- H. limbatus* Wsw. Selten: Franzensbad. Juli.
H. humuli L. Selten; Wies und Tirschnitz. Juli.
H. nervosus Fbr. Selten Franzensbad. Juni.
Micromus paganus L. Selten; Grüneberg. Juli.
M. variegatus Fbr. Selten: Pograth. Juli.
Chrysopa vulgaris Schneid. Gemein: Schlössl, Kammerbüchl, Franzensbad und St. Anna. Juli, bes. auf Nesseln. —
Chr. nigrocostata Br. Selten: Wies und Franzensbad. Juli.
Chr. microcephala Br. 1 Ex. bei Stein. Juni.
Chr. dorsalis Brm. var. *pini* Br. Grüneberg. Juli.
Chr. gracilis Haydn. (= *tricolor* Br.) Selten; St. Anna, Egerthal. October.
Chr. vittata Wsm. Ramberg 1 Ex. Juni.
Chr. flavifrons Br. Schlössl, Ramberg. Juli.
Chr. prasina Brm. nicht selten: Schlössl, Franzensbad, Maria Kulm, Siechenhaus. Juli.
Chr. septempunctata Wsm. Siechenhaus 1 Ex. Juni.
Chr. perla L. Sehr häufig: Schlössl, Franzensbad, Pograth, Stein, Wies. Juli.
Chr. abbreviata Curt. Egerthal. Juni.
21 *Myrmeleon formicarius* L. Selten und einzeln: Schindelhaü 1 Ex., ein anderes bei Kammerhof. Juli.

IV. Orthoptera.

Fam. Libellulidae.

- Libellula quadrimaculata* L. nicht selten; Stein, Franzensbad. Juni.
L. fulva Müll. Selten: Stein. 1 Ex. Juni.
L. depressa L. Sehr gemein: Pograth, Stein, Franzensbad. Mai, Juni.
Libella cancellata L. Häufig, Franzensbad, Stein; Egerufer. Juli.
L. brunnea Fons. Maria Kulm 1 Ex. Juni.
Diplax striolata Charp. nicht selten; Königswart, St. Anna. Juli.
E. meridionalis Sel. Sehr selten; Wies 1 Ex. Juni.
D. vulgata L. Häufig: Wies, Egerufer, St. Anna. Juli.
D. sanguinea Müll. nicht selten: Viadukt, Pograth, Juli.
Cordulia aenea L. Sehr gemein: Franzensbad, Egerthal, Pograth. Juni.

- Eupitheca metallica* VdL. wie vorige und mit ihr. Juni, Juli.
E. flavomaculata VdL. 1 Ex. im Egerthal auf Erlenblatt. Juni.
Gomphus vulgatissimus L. Sehr gemein: Egerthal, St. Anna,
 Wies. Juli.
Cordulegaster annulatus Ltr. Selten: Maria Kulm, Franzensbad. Juli.
Anax formosus VdL. Sehr häufig: Stein, Viadukt, Wies. Juli.
Aeschna cyanea Müll. Selten: Maria Kulm, Königswart. Juli.
A. mixta Ltr. Selten: Pograth, Wies. Juli.
A. grandis L. Selten: gegen Kammerbüchl in einem Kornfelde. Juli.
A. rufescens VdL. Maria Kulm 1 Ex. Juli.
Calopteryx virgo L. Sehr gemein; Stein, Franzensbad, Pograth
 u. s. w. ♂ zu ♀ wie 1 : 6. Juli.
C. splendens Harr. mit voriger, und wie sie gemein.
Lestes viridis VdL. Egerthal. Juli.
L. sponsa Hns. Selten: Maria Kulm 2 Ex. Juli.
Platycnemis pennipes Pall. Selten doch zahlreich: Pograth. Juli.
Agrion cyathigerum Charp. Häufig: Stein, Viadukt, Königswart. Juli.
A. pulchellum VdL. gemein und zahlreich: Stein, Egerufer, Po-
 grath. Juli.
A. puella OdL. mit voriger und wie sie gemein. Juni.
Ischnura pumilio Charp. Egerland:
 29 *Isch. elegans* VdL. nicht selten: Stein, Wies, Maria Kulm. Juni.

Fam. Ephemeridae.

- Ephemera vulgata* L. Gemein: Stein, Kammerbüchl, Franzensbad.
 Juli.
E. glaucops P. Selten, Egerthal 1 Ex. Juni.
Baëtis pumila Burm. Franzensbad. Juni.
Heptagenia fluminum P. nicht selten: an der Eger bei Stein, Wald-
 schlössl, Viadukt. Juli.
H. venosa Fbr. gemein: Egerthal, Wies, Pechtersreuth, Franzens-
 bad. Juli.
 6 *Cloëon dipterum* L. selten: Stein und gegen Franzensbad. Juli.

Fam. Perlidae.

- Dictyopteryx microcephala* P. Selten; Pograth. 1 Ex. Juni.
Isogenus nubecula Nwm. Häufig, unter Steinen; St. Anna, Wies
 Schlössl. Mai.
Perla maxima Scop. (*bicaudata* Br.) Nicht Selten: Egerthal und
 Pechtersreuth. Juni.
P. cephalotes Curt. Selten: Pograth. Juni.
Chloroperla grammatica Scop. Selten; Pograth, Loretto. Juli.
Isopteryx tripunctata Scop. Selten: Stein 1 Ex. Juni.
Taeniopteryx nebulosa L. Selten: Egerthal. Mai, Juni.
Leuctra cylindrica DG. Selten; Egerthal. Juli.
Nemura variegata Ol. Häufig; Schlössl, Egerthal, Franzensbad, in
 Häusern und an Mauern. Mai, Juni.
N. cinerea Ol. Selten; Waldschenke im Egerthal. 1 Ex. Juni.
 11 *N. marginata* P. Selten: St. Anna. Juni. 1 Ex.

Fam. Psocidae.

- Clothilla pulsatoria* L. Leider in Insektensammlungen oft zu gemein.
Stenopsocus cruciatus L. Pulvermühle. Juni.
Psocus longicornis Fbr. (*lineatus* Ltr.) Pograth. Juni.
 4 *Coecilius flavidus* Steph. St. Anna, zwischen Weidenbüschen. Oct.

Fam. Forficulidae.

- Forficula minor* L. Sehr zahlreich zwischen Holzstücken bei Pograth,
 einzeln im Siechenhauser Wald. Juni, Juli.
F. biguttatus Ltr. Viadukt 1 Ex. im Fluge.
 3 *F. auricularia* L. Ueberall gemein; unter Brettern und Steinen, be-
 sonders in Doldenstängeln und Düten. Mai, Juli.

Fam. Blattidae.

- Blatta maculata* Schreb. Sehr selten: St. Anna, 1 Ex. Juli.
B. lapponica L. Häufig im Gesträuche und Moos, unter Steinen, be-
 sonders im Siechenhauser Wald und Pograth, Maria Kulm.
 Juni, Juli.

- B. germanica* L. Ueberall in Häusern und Küchen verbreitet durch das ganze Jahr.
 4 *Periplaneta orientalis* L. wie vorige, bes. in Backstuben, gemein.

Fam. Grylloidea.

- Grylotalpa vulgaris* L. Ueberall auf Wiesen und Feldern gemein; Viadukt, gegen Pograth, vor Stein u. s. w. Juli.
Gryllus campestris L. Selten und einzeln: Viadukt und Kammerbüchl. Juni, Juli.
Gr. domesticus L. Nicht selten, doch tagüber verborgen. Juli.
 4 *Gr. silvestris* L. In trockenem Grase hinter Siechenhaus. 1 Ex. Juli.

Fam. Locustidae.

- Odontura serricauda* Fbr. An der Ostbahnlinie gegen Waldsassen 1 Ex. Juli.
Meconema varium Fbr. Kammerbüchl. 2 Ex. Juli.
Xiphidium fuscum Fbr. Einzeln bei Stein und gegen Rollenburg. Juni, Juli.
Locusta viridissima L. Nicht selten auf warmen, sonnigen Wiesen in 3 Entwicklungsstadien zu gleicher Zeit: Kammerbüchl, Ostbahnlinie, Pograth. Juli, Aug.
L. cantans Fuessly Kammerhof 1 Ex. Juli.
Decticus griseus Fbr. Häufig: Viadukt, Pechtersreuth, Pograth, Kammerbüchl. Juli.
D. brevipennis Charp. Selten und einzeln: Ost- und Franz Josephsbahnlinie. Juli, Aug.
D. brachypterus L. mit vorigem, etwas häufiger; auch bei Königswart im Gebüsch. Juli.
 9 *D. verrucivorus* L. von allen die häufigste: gegen Pechtersreuth, Kammerbüchl, Stein und Königswart. Juli.

Fam. Acrididae.

- Opomala dispar* Hey. Pechtersreuth. Juli 1 Expl.
Stenobothrus elegans Charp. nicht selten; Viadukt, Kammerbüchl, Stein. Juli.

- St. dorsatus* Ztt. mit vorigem, doch seltener; Franzensbad. Juli.
- St. pratorum* Fieb. von allen der häufigste; überall, wo Heu und trockenes Moos ist: Pechtersreuth, Kammerhof, Pograth u. s. w.
- St. lineatus* Pnz. fast so häufig wie vorige und mit ihm vorkommend; auch Bahndämme und Königswart. Juli.
- St. viridulus* L. Selten: Stein. Juli.
- St. rufipes* Ztt. mit folgendem, doch seltener. Juli.
- St. apicarius* L. Selten. Viadukt. Juli.
- St. variabilis* Fieb. Gemein und in einer Menge von Varietäten um Eger verbreitet: Pechtersreuth, Pograth, Franzensbad, St. Anna, Wies u. s. w. Juni, Aug.
- St. biguttatus* Chr. Sehr häufig auf niedrigem Graswuchs bei St. Anna und Stein. Juli.
- St. rufus* L. Seltener: Stein und Viadukt. Juli.
- St. grossus* L. Nicht häufig: Kreuzenstein und Franzensbad. Juli.
- St. variegatus* Sulz. Selten: Viadukt und Kammerbüchl. Juli.
- Parapleurus typus* Fisch. Selten: Kreuzenstein und Pograth. Juli.
- Pezotettix pedestris* L. Sehr selten: St. Anna, Grüneberg. Juli.
- Pachytylus migratorius* L. zeigt sich einzeln dann und wann im Egerlande.
- P. stridulus* L. Selten und einzeln an der Franz-Josefbahn, bei Wies. Juli.
- Oedipoda fasciata* Sieb. Selten und einzeln: Kammerbüchl, und Pechtersreuth. Juli.
- Tettix subulata* L. Sehr häufig: Kammerbüchl, St. Anna, Maria Kulm, Königswart. Juli.
- 20 *T. bipunctata* L. Häufig: Wies, Königswart und Stein, bes. in Waldblössen. Juni, Juli.

V. Diptera.

Fam. Stratiomyidae.

- Pachygaster ater* Pnz. Franzensbad beim Parke. Mai.
- Nemotelus pantherinus* L. u. *nigrinus* im Egerthale gefangen; *signatus* Friv. in einem Stücke bei Franzensbad.
- Lasiopa villosa* Fbr. bei Pograth und Stein je ein Stück auf *Heraclium spondylium*. Juni.

Ephippium thoracicum L. ganz einzeln, doch einige Male auf Dolden.
Juni.

Oxycera pulchella Mg. Pograth gegen Loretto einige Stücke. Juni.
Stratiomys equestris Mg. mehrmals im Egerlande auf Wiesenblumen
ebenso *St. cenisia* Mg.;

St. chamaeleon Deg. — obwohl sonst gemein nur zweimal auf Um-
belliferen etwas zahlreicher angetroffen. Juli.

Odontomyia tigrina Fbr., *annulata* Mg., *hydroleon* L., einzeln auf
Dolden; *O. viridula* Fbr. etwas zahlreicher.

Sargus infuscatus Mg. bei Loretto auf einer Distel. Juni; *cuprarius*
L. sehr häufig auf Gebüsch. Juni.

Chrysomyia polita L. und *melampogon* Zell. einzeln; *formosa* Scop.
sehr häufig im Gebüsch. Juni.

17 *Beris clavipes* L. auf Rubusblüthe ein Stück bei Kulm. Juni.

Fam. Xylophagidae.

Xylophagus ater Fbr. im Egerthale hinter Siechenhaus ein Stück an
einem Zaunpfahle. Juni.

Fam. Cönoomyidae.

Coenomyia ferruginea L. einzeln überall häufig auf der Erde oder
auf Steinen sitzend — plump. Juni.

Fam. Tabanidae.

Tabanus gigas Fbr., 1 Stück bei Pograth gefangen an einer weissen
Wand.

T. luridus Fall. in einem schönen Stücke bei Königswart erbeutet.
Juni.

T. plebejus Fall. aus Egerland.

T. rusticus L. und *fulvus* Mg., *bovinus* L., *fulvicornis* Mg., *glaucopis*
Mg., *autumalis* L., *bromius* L. mehr weniger zahlreich auf
Dolden und Disteln erbeutet. Mai. Juli.

Hexatoma pellucens Fbr. Franzensbad. Juli.

Haemotopota pluvialis L. und *italica* Mg. ziemlich häufig; Quäl-
geister des Menschen, namentlich erstere; letztere mehr in
Waldblössen. Mai, Sept.

Chrysops quadratus Mg. Auf Dolden bei Pograth mehrmals; Juni, *coecutiens* L. gemein, auch auf Sandboden; ebenso *relictus* Mg. Juni, Juli.

16 *Silvius vituli* Fbr. ganz einzeln (zu *Tabanus* sp. im Verhältnisse 1 : 1000 auch nach der Aussage eines Bauern im Egerlande!).

Fam. Bombyliidae.

Lomatia Sabaea Fbr. am Kammerbüchl, ein Stück. Juli.

Anthrax fenestrata Fall. ganz einzeln, auf *Rubus*, Juni, *maura* L. und *morio* L. häufig —; *paniscus* Rssi und *hottentotta* L. ein paar Mal auf Sandstellen bei St. Anna, Pechtersreuth und Königswart. Juni, Juli.

Exoprosopa capucina Fbr. ein Stück auf einem Steine bei Königswart sonnend. Juli.

Bombylius ater Scop., *discolor* Mik., *major* L., *venosus* Mik., *canescens* Mik., *cinerascens* Mik. und *minor* L. ziemlich häufig, wenn auch meist nur einzeln vorkommende Arten vom März-Sept.

Systoechus sulphurens Mik. ein Stück bei Pograth.

Ploas viresceus Fbr. sammelte ich auf *Heracleum spondylium*-Dolden bei Pograth, sonst nie. Juni.

17 *Pthiria Gaedi* Mg. Franzensbad auf *Heracleum giganteum* ein Stück. Juni.

Fam. Acroceridae.

Ogcodes gibbosus L. ein ♀ bei Stein — nie ein zweites Stück beobachtet.

Fam. Empididae.

Cyrtoma pallipes Mg. gestreift bei Wies. Juni.

Hybos femoratus Müll. Ein Stück auf *Rubus* bei Sandau. Juni.

Microphorus velutinus Mcq. „Wiesengräben“ bei Franzensbad einzeln, gestreift. Juni.

Ocydromia glabricula Fall. in vielen Varietäten oftmals gestreift. Oct.
Hemerodromia stigmatica Wlk. ein Stück bei Stein von Nessel gestreift. Juli.

Clinocera Wesmaeli Mcq. Gestreift auf Nessel bei Stein. Juni.

Phyllodromia albiseta Zett. bei Königswart ein Stück auf Distel. Juni.

Platypalpus maculipes Mg. *curbitans* Fbr. und *minutus* Mg. im Egerlande gestreift. Mai, Juni.

Tachydromia cimicoides Fbr. Egerthal und Loretto, einige Stücke. Juni.

T. arrogans Fbr. und *calcanea* Mg. einzeln, gestreift. Juni.

Drapetis exilis Mg. Pograth auf Holz ein Stück. Juli.

Rhanophomyia platyptera Puz. Am Fenster des Theaters mehrmals, April; auch

Rh. spissirostris Fall. *nigripes* Fall. und *anthracina* Mg. im Egerlande beobachtet.

Empis maculata Fbr. selten, *E. tessellata* Fbr. häufiger, namentlich auf trockenen Wiesenrainen. Juni.

E. bistortae Mg. ein Stück bei Pograth. Juli.

E. livida L. Gemein. Juni.

E. rustica Fall. ein Stück bei Kulm auf *Rubus*, Juni; auch

E. borealis L. in zwei Stücken von Loretto. Mai.

E. vitripennis Mg. ein Stück v. Franzensbad. Juli.

E. pennipes L. und *E. lutea* Mg. auf Blumen einige Male. Juni.

E. stereoraria L. Häufiger bei Wies, Pograth u. s. w. auch *E. monogramma* Mg. kaum seltener. Juni.

E. tigrannua Mg. (Schin) bei Franzensbad auf *Heracleum spondylium* ein Stück. Juli.

Pachymeria femorata Fbr. mehrmals auf *Campanula*, *Potentilla* und *Verbascum*. Juni.

Hilara flavipes Meig. — *pruinosa* Mg. *vulnerata* Schin., *flava* Schin. einzeln an einigen Punkten gesammelt. Juni.

31 *Hilarimorpha singularis* Egg. gestreift bei Franzensbad. Juni.

Fam. Asilidae.

Leptogaster cylindricus Deg. häufiger, *guttiventris* Zett. seltener auf Dolden. Juni.

- Dioctria humeralis* Zell. ein Stück auf *Heracleum* ;
D. Reinhardi Wdm. einige Male, Juni.
D. atricapilla Mg. ziemlich häufig. Juni.
D. oelandica L. ebenso.
D. rufipes Deg. oftmals gestreift und gefangen. Juni.
D. linearis Fbr. und *lateralis* Mg bei Kulm, einzeln. Juli.
Dasypogon teutonius L. spärlich im Gebüsch bei Stein. Juni.
Styhopogon elegantulus Mg. Franzensbad, ein ♀. Juli.
Holopogon clavipes Low. in einem Stücke auf einem Baumaste im Egerthale. Juli.
Lasiopogon cinctus Fbr. Einzeln gefangen — am Kammerbüchl und bei Sandau. Juni.
Laphria flava L. bei Wies, einzeln. Juli; auch
L. fuliginosa Pnz. im Egerlande gesammelt. Juli.
Andrenosoma atra L. Ein Stück im Egerthale, ein zweites von einem Schüler gefangen. Juli.
30 *Asilus crabroniformis* L., *albiceps* Mg., *germanicus* Fbr., *varipes* Mg., (ein Stück), *punctipennis* Mg., *forcipula* Zett., *praemorsus* Lw., *stylifer* Löw., *bifurcus* Low., *rusticus* Mg., *pallipes* Mg., *cothurnatus* Mg., *paragra* Zett. und *cingulatus* Fbr. meist einzeln und in wenigen Stücken im Egerlande gesammelt; April-Sept.

Fam. Scaenopidae.

- Scaenopius fenestralis* L. thatsächlich an Fenstern gemein. Juli, Aug.
2 S. *glabrifrons* Mg. 3 Stücke ebendort. Juli.

Fam. Therevidae.

- Thereva anilis* L. Ein Stück am Kammerbüchl auf Compositen. Juli.
Th. nigripes Löw. Franzensbad im Gebüsch, 3 Stück. Juni.
Th. nobilitata Fbr. mehrmals an verschiedenen Punkten gefangen. Juli.
Th. annulata Fbr. ein ganz unversehrtes Stück auf *Heracleum giganteum* in Franzensbad gefangen. Juni.

- 7 *Th. plebeja* L., *arcuata* Lw. und *Th. ardea* Fbr. ziemlich häufig im Gebiete (Juni) und *apicalis* Wdm. von Franzensbad in je einem Stücke. Juli.

Fam. Leptidae.

- Leptis scolopacea* L. mehrmals gefangen. Juni.
L. strigosa Mg., *vitripennis* Mg. und *tringaria* L. auf Wiesenblumen zahlreich gesammelt;
L. lineola Fbr. stellenweise zahlreich. Juli.
Chrysopila nubecula Fll. ein Stück von Loretto; Juli; *atrata* Fb. zweimal auf Lappa. Juni.
 8 *Atherix marginata* Fbr. Im Egerthale, mehrere Stücke. Juni.

Fam. Dolichopidae.

- Psilopus nervosus* Lehm. Gestreift bei Kulm im Gras. Juni.
P. platypterus Fbr. überall häufig. Juni.
Neurigenia pallida Fall. Gestreift bei Franzensbad. Juni.
Chrysotus laesus Wdm. Häufig und zahlreich im Gebiete. Juni; *gramineus* Fall. seltener.
Diaphorus oculatus Fall. gestreift 2 Stücke bei Pograth. Juni.
Argyra diaphana Fbr. und *leucocephala* Mg. bei Franzensbad im Gebüsch gestreift. Juni.
Rhaphium caliginosum Mg. Franzensbad u. Pograth, einige Stücke. Juni.
Porphypops spinicoxa Lw. und *nemorum* Mg. — mehrmals gestreift; Juni; auch ein *pennicillatus* Lw. von Pograth. Juni.
Tachytrechus notatus Stan. bei Franzensbad gestreift. Juni.
Gymnopternus nobilitatus L. gestreift, doch spärlich; *nigricornis* Mg. zahlreicher, auch *chaerophylli* Mg. auf Wiesen gestreift.
G. fumipennis Stan. und *chrysozygos* Wdm., *nigripennis* Fll., *aerosus* Fall. und *caudatus* Lw. aus dem Gebiete. Juni, Juli.
Dolichopus Falleni Löw., *campestris* Mg., *nubilus* Mg., *latelimbatus* Mg., *claviger* Stan., *plumipes* Scop., *signatus* Mg., *nitidus* Fall., *pictipennis* Whlb., *festivus* Hld., und endlich *aeneus* Deg. — gestreift; letzte massenhaft, die anderen nicht so zahlreich vom Mai ab.

Sybistroma nodicornis Mg. bei Kulm ein Stück. Juni.

Hypophyllus obscurellus Fall. häufig gestreift; *sphenopterus* Lw. seltener. Juni.

Thinophilus flavipalpis Zett. — scheint als eine „Salzfliege“ bei Franzensbad nicht gar selten zu sein; ich fing am 13. Juni 1875 3 Stückchen.

Liancalus virens Scop. häufig gestreift bei Pograth, Loretto und im Egerthale. Oct.

Hydrophorus bipunctatus Lhm. bei Franzensbad mehrmals beobachtet und gefangen. Juli.

Campsicnemus magius Löw. ebendort, einzeln. Juli.

C. curvipes zahlreicher auch bei Pograth. Juli.

40 *Medeterus diadema* L. gefangen auf einer Bretterwand bei Franzensbad. Juni.

Fam. Pipunculidae.

Pipunculus elegans Schin ein Stück von Pograth auf einer Nessel. Juli. —

Fam. Syrphidae.

Microdon mutabilis L. und *devius* L. auf Gras, mehrmals gestreift. Juni.

Psarus abdominalis Fbr. ein Stück auf *Rubus* bei Sandau. Juli.

Chrysotoxum silvarum Mg. Egerthal auf *Viburnum* 1 Stück.

Ch. bicinctum L. ziemlich häufig auf Gedölde. Juni-Sept.

A. festivum L., *octomaculatum* Curt. und *elegans* Lw. auf Dolden abwechselnd recht häufig. Juni.

Paragus tibialis Fall., *albifrons* Fall. und *bicolor* Fbr. ebenso, auch auf *Rosa* und *Rubus*; einzeln. Juni, Juli.

Pipizella virens Fbr. und *annulata* Mcq. auf Dolden, oft zahlreich bes. ersten Mai, Juni.

Pipiza quadrimaculata Puz. ein Stück bei Pograth auf *Rubus*. Juni.

P. festiva Mg. häufig; auf Dolden. Juni, Juli.

P. austriaca Mg. ein Stück von *Cirsium arvense* bei Pograth. Juli.

- P anthracina* Mg. ein Stück gestreift auf *Centaurea* bei Franzensbad. Juli.
- Psilota anthracina* Mg. ebendort, bei Schlada. Juni.
- Chrysogaster metallina* Fbr., *viduata* L., *coemeteriorum* L. und *chalybeata* Mg. — alle einzeln gefangen, keine massenhaft. Juli.
- Orhoneura elegans* Mg. bei Pograth, einzeln auf Dolden. Juli.
- O. nobilis* Fall. 2 Stücke von Franzensbad; auf Ranunkeln. Juli.
- Cheilosia oestracea* L. Kulm; gesellig. Juli.
- Ch. pigra* Lw. Pograth an einem Düngerhaufen am Wasser einige Stücke. Juni.
- Ch. barbata* Löw., massenhaft doch nur stellenweise: Loretto und Kulm. Juni.
- Ch. variabilis* Puz. Grüneberg. Juni.
- Ch. sparsa* Löw. und *antiqua* Mg. sehr häufig auf den verschiedensten Wiesen- und Sumpflumen; Juni-Sept.; auch *soror* Zett. und *scutellata* Fall. kaum seltener. Juni.
- Ch. pulchripes* Lw., *albitarsis* Mg., *mutabilis* Fall., *chloris* Mg., *vernalis* Fall., *praecox* Zett. mehr einzeln.
- Ch. flavicornis* Fbr. am Grüneberg an Windeblüthen zahlreich. April.
- Ch. fasciata* Löw. Egerland.
- Melanostoma hyalinata* Fall. ein Stück im Egerthale. Juni.
- M. mellina* L. gemein auf Wiesenblumen. Mai, Juli.
- Platycheirus albimanus* Fbr. und *peltatus* Mg. in je einem Stücke auf Dolden. — Mai.
- P. scutatus* Mg. etwas häufiger. Juni.
- Syrphus pyrastris* L. gemein. Mai-Juli.
- S. laternarius* Mill. ein Stück v. Kammerbüchl. Juli.
- S. glaucius* L. einige Male auf Dolden. Juli.
- S. arcuatus* Fall. auf Compositen, einzeln. Juli.
- S. corollae* Fbr. und *luniger* Mg. ziemlich häufig. Juni, Juli.
- S. umbellatarum* Fbr. auf *Rubus* bei Pograth, und *Rosa* bei Eger, je ein Stück. Juni.
- S. balteatus* Deg. und *ribesii* L. sehr häufig. April.
- S. bifasciatus* Fbr. einzeln nicht gar selten. Mai.
- S. grossulariae* Mg. ein Stück von Pograth. Juli.

- S. excisus* und *cinctus* Fall. in je einem Stücke bei Franzensbad.
Juli. —
- Didea fasciata* Mcq. ein Stück von Kulm. Juni.
- Paleococera scaevoides* Fall. Egerland.
- Melithreptus strigatus* Staeg., *pictus* Mg. und *menthastri* L. einzeln
in je einem Stücke auf Umbellen gefangen. Juli.
- M. scriptus* L., *dispar* Lw. und *taeniatus* Mg. sehr zahlreich.
Mai, Juli.
- Xanthogramma citrofasciata* Deg. häufig im Gebüsch des Egerthals,
Franzensbad u. s. w. Mai.
- X. ornata* Mg. nur zweimal auf *Rubus* und *Rosa*. Juni.
- Doros conopseus* Fbr. ein Stück auf einer Distel bei Pograth. Juli.
- Ascia lanceolata* Mg. ein Stück bei Pograth. Juli.
- Bacha elongata* Fbr. Franzensbad — ein Stück. Juni.
- Myolepta varia* Puz. ein Stück im Egerthale. Juni.
- Rhingia rostrata* L. auf *Rubus* ein ♀ gefangen. Juni.
- Volucella bombylans* L. in var. *bombylans* Mg. und *plumata* Mg.
beobachtet, doch nie zahlreich oder gesellig. Juni.
- V. pellucens* L. stellenweise zahlreich. Juni, Sept.
- V. zonaria* Poda. und *inanis* L. mehrmals in lichten Waldstellen. Juli.
- Arctophila bombiformis* Fll. in einem Stücke aus dem Egerlande.
Fangzeit unbekannt.
- Eristalis sepulchralis* L. sehr häufig in Wiesengräben. Mai.
- E. aeneus* Scop. Häufig auf Blumen, Weidenkätzchen und an Mauern.
April.
- E. tenax* L. nebst var. *hortorum* Mg., *campestris* Schin. gemein.
- E. intricarius* L. bei Pograth ein Stück auf Distel. Juni.
- E. arbosturum* L., *pertinax* Scop. sehr häufige *nemorum* L. und
horticola Deg. ziemlich seltene Arten vom April an.
- Helophilus floreus* L. gemein vom Mai an; auch
- H. pendulus* L. und *trivittatus* Fbr. nicht sehr selten; Juli.
- H. vittatus* Mg. und *lunulatus* Mg. in je einem Stücke gefangen. Juli.
- Merodon equestris* Fbr. ein Stück ♂ auf *Rubus* bei Pograth. Juni.
- Tropidija fasciata* Mg. einige ♀ von Franzensbad. Juni.
- Cneorhina oxyacanthae* Mg. ein ♂ auf *Salix*; Egerthal. April.
- Brachypalpus valgus* Pnz. und *Meigeni* Schin. in je einem Stücke
gefangen.

Xylota segnis L. gemein; Mai-Sept.

X. lenta Mg., *silvarum* L. und *nemorum* Fbr. seltener — auf Dolden gelegentlich. Juni.

Syritta pipiens L. — gemein. Mai-Okt.

Eumerus tarsalis Lw. ein Stück v. Kammerhof. Juli.

E. tricolor Fbr. zweimal im Gebiete beobachtet. Juni.

E. ruficornis Mg. und *lunulatus* Mg. ebenso selten.

Chrysochlamis cuprea Scop. Franzensbad einige Male; auch ein *nigrifinos* Egg. mitgefangen. Juli.

Spilomyia saltuum Fbr. *bombylans* Fbr. und *vespiformis* L. ganz einzeln. Juni, Aug.

114 *Ceria conopsoides* L. ein Stück von Pograth. Juni.

Fam. Conopidae.

Conops coronatus Rond. ein Stück bei Schlada auf einer Sonnenblume erbeutet. Juli.

C. vesicularis L., *4 fasciatus* Deg. und *ceriaeformis* Mg. in je einem Stücke in Waldlichten gefangen; Juni.

C. flavipes L. Mehrmals auf Wald- und Wiesengrund beobachtet.

Physocephala nigra Deg. und *rufipes* Fbr. in einigen Stücken aus aus dem Egerlande. Juli.

Zodion cinereum Fbr. Oftmals gestreift und gesammelt. Juli; *notatum* Mg. — dagegen nie.

Occemyia atra Fbr. ebenso häufig. Juli.

Sicus ferrugineus L. einige Stücke aus dem Egerlande. Juli.

12 *Myopa buccata* L. und *testacea* L. in je zwei Stücken auf *Centaurea* u. s. w. erbeutet; auch ein Stück v. *occulta* Mg. auf *Rubus* bei Kulm. Juni.

Fam. Östridae.

Gastrophilus equi Fbr. ein Stück bei Pograth an einem Zaunbalken gefangen. Juni.

2 *Östrus ovis* L. brachte mir ein Schüler in drei Stücken. Juni.

Fam. Muscidae.

Phasia analis Fbr. Ganz einzeln, doch einige Male auf *Rubus*, *Spiraea* und Umbellen getroffen. Juli.

Ph. crassipennis Fbr. ebenso, doch seltener. Juli.

Alophora hemiptera Fbr. durch Streifen am Bahndamme bei Pograth einige Stücke erhalten. Juli.

A. aurulans Mg. ebenfalls in einigen Stücken aus dem Egerlande. Juli.

Syntomogaster singularis Egg. ein Stück im Streifsack bei Pograth erhalten. Juli.

Gymnosoma rotundata L. Gemein; Juni-Sept.

G. nitens Mg. ein Stück gestreift. Juni; ebenso

Cistogaster globosa Fbr. in einem Stücke von Stein. Juli.

Ocyptera pusilla Mg. in 2 Stücken gestreift;

O. brassicaria Fbr. sehr häufig im Streifsacke erhalten. Juli.

O. cylindrica Fbr. Egerland.

Clairvillia ocypterina Rob. und

Lophosia fasciata Mg. einzeln gestreift. Juli.

Phania obscuripennis Mg. in einem Stücke von Stein. Juli.

Uromyia curvicanda Fall. im Egerthale, gestreift. Juli.

Echinomyia fera L. und *tessellata* Fbr. ziemlich oft gefangen;

E. grossa L. und *ferax* Pnz. einzeln; *magnicornis* Zett. in einem Stücke von Kulm. Juli.

Micropalpus vulpinus Fall. und *pictus* Mg. in einigen Stücken gesammelt, doch wohl nicht gemein. Juli.

Gymnochaeta viridis Fall. an Weiden im Egerthale; 2 Stücke. April

Demoticus plebejus Fall. Auf Dolden öfters zahlreich. Juni.

D. frontatus Boh. ein ♀ von Kulm auf *Spiraea*.

Oliviera lateralis Fbr. gemein. Mai-Juli.

Zophomyia temula Scop. Auf Wiesenblumen einige Male gefangen. Juni.

Peteina erinacea Fbr. Auf Dolden einige Stücke bei Kulm; Juli.

Germaria ruficeps Fall. ein Stück von *Rosa* bei Pograth. Juni.

Gonia fasciata Mg. und *divisa* Mg. auf Weidenkätzchen gefangen. April.

Cnephalia bucephala Mg. einige Stücke gestreift. Juni.

Nemoraea puparum Fbr., *radicum* Fbr. und *quadripustulata* Fbr. gestreift, namentlich im Egerthale. Juni.

- Epicamponera succincta* Mg. im Egerthale, gestreift. Juli.
- Exorista vulgaris* Fall., *vetula* Mg., *lucorum* Mg., *leucophaea* Mg. und *dubia* Fall. mehr weniger einzeln gesammelt und gestreift. Mai-Juli.
- Meigenia bisignata* Mg. und *floralis* Mg. — auf *Crataegus* und Spireen einige Male gefangen.
- Tachina polita* Mg., *larvarum* L., *gemein*, *crucarum* Rud., *rustica* Mg. *gemein*, *vagabunda* Mg., *doris* Mg., *agilis* Mg., *tibialis* Fall. und *bella* Mg. meist gestreift. Juni-Sept.
- Masicera flavoscutellata* Zett. (1 Stück), *pratensis* Mg., *silvatica* Fall. und *fatua* Mg. gestreift. Juni.
- M. major* Mcq. Egerland.
- Phorocera concinnata* Mg. Auf Umbelliferen einige Male gefangen auch *assimilis* Fall. und *pumicata* Mg. fing ich einige Male.
- Baumhaueria vertigiosa* Mg. gestreift bei Pechtersreuth. Juni.
- Frontina laeta* Mg. einige Stücke auf Dolden. Juli.
- Metopia leucocephala* Rossi zahlreicher als *argyrocephala* Mg. die ich mit ihr auf Blumen fing. Juli.
- Macronychia agrestis* Fall. ein Stück von Kulm auf Salat-Blättern. Juni.
- Miltogramma ruficornis* Mg., ein Stück gestreift. Juli.
- Halidaya argentea* Egg. ein Stück gestreift bei Schlada. Juli.
- Leskia aurea* Fall. gestreift ein Stück. Juni.
- Myobia fenestrata* Mg. und *inanis* Fall. durch Streifen erhalten. Juni, Juli.
- Röselia antiqua* Mg. Franzensbad — gestreift. Juni.
- Thryptocera setipennis* Fall. Egerthal, einige Stücke auf blühender *Salix*. April; auch *exoleta* Mg. mehrmals gestreift.
- Siphona cristata* Fbr. und *geniculata* Deg. mehrmals gestreift. Juli.
- Clytia continua* Pnz. auf Wiesenblumen gestreift. Juni.
- Macquartia dispar* Fall. gestreift. 2 ♂ 1 ♀;
- M. chalconota* Mg. Franzensbad einige Stücke. Juni.
- M. tenebricosa* Zett., *nitida* Zett. und *chalybeata* Mg. gestreift, nie zahlreich.
- Degeeria collaris* Fall. gestreift Pograth, Egerthal u. s. w. Juni.
- Hypostena medorina* Schin. auf Gebüsch und Blumen einige Male gestreift. Juni.

- Scopolia morio* Fall., *carbonaria* Pnz. und *cunctans* Mg. gestreift;
auch an Baumkätzchen. April-Oct.
- Leucostoma simplex* Fall. gestreift. Juni.
- Rhinophora atramentaria* Mg. vielmals gestreift. Mai, Juni;
auch *melania* Mg. doch seltener.
- Phyto melanocephala* Mg. ein Stück von Königsberg. Juni.
- Morinia nana* Mg. und *melanoptera* Fall. gestreift — einzeln. Juni
- Melanophora ruralis* L. bei Schlada mehrere Stücke gestreift. Juli.
- Nyctia holterata* Mg. auf Rubusgesträuch gestreift. Juni.
- Thelaira leucozona* Pnz. auf Gebüsch bei Franzensbad gestreift; auch
Melania volvulus Fbr. im Juni von dorthier.
- Mintho praeceps* Scop. Auf Disteln, einzeln. Juni, Juli.
- Prosenia siberita* Fb. Sehr häufig auf Compositen und Scabiosen Juni;
longirostris Egg. — einzeln mit ihr.
- Dexia carinifrons* Fall. einzeln im Juli auf Dolden; ebenso *D. fe-*
rina Fall., *D. rustica* Fbr. und *canina* Fbr. ziemlich häufig
auf Compositen.
- Phorostoma pectinata* Mg. nur ein Stück im Egerthale. Sept.
- Theria muscaria* Mg. gestreift im Juni bei Kammerhof.
- Sarcophila Meigeni* Mg. und *latifrons* Fall. einzeln auf Compositen
gefangen. Juni.
- Sarcophaga atropos* Mg., *vagans* Mg., *pumila* Mg., *striata* Fbr., *car-*
naria L., *albiceps* Mg., *vulnerata* Schin., *haemorrhoidalis* Mg.,
cruentata Mg., *haemorrhoea* Mg., *erythrura* Mg., *haematodes*
Mg., *dissimilis* Mg., *offuscata* Mg., *nigriventris* Mg. u. *grisea*
Mg. also fast alle deutschen Arten im Egerlande angetroffen,
einzelne auch sehr zahlreich. März-Oktob.
- Cynomyia mortuorum* L. gemein wie allerorts, vom April an.
- Onesia sepulchralis* Mg., *floralis* Rob., *cognata* Mg. und *gentilis* Mg.
gesammelt. April-Oct.
- Stomoxys calcitrans* L. und *stimulans* Mg. gefangen; erstere zahl-
reicher z. B. St. Anna. Mai.
- Graphomyia maculata* Scop. Auf Disteln einige Male. Juli.
- Mesembrina mystacea* L. einige Male auf Dolden. Mai-Oct.
- M. meridiana* L. ebenfalls häufig auf Blumen. Mai-Oct.
- Calliphora vomitoria* L. und *erythrocephala* L. gemein. März-Novbr.
- C. azurea* Fall. auf Rubusgesträuch ein Stück bei Kammerbüchl. Juli.

- Pollenia vespillo* Fbr., *rudis* Fbr., *atramentaria* Mg., sehr häufig, auch ein *P. lanio* Puz. und *depressa* Mg. März-Oct.
- Dasyphora versicolor* Mg. einzeln, *pratorum* Mg. zahlreich erbeutet. April-Juli.
- Lucilia regina* Mg., *caesar* L., *cornicina* Fbr. und *silvarum* Mg. zahlreich — auch ein *ruficeps* Mg. dabei. März-Oct.
- Pyrellia cadaverina* L. und *serena* Mg. — oftmals auf Blumen und auf Dung gefangen; auch gestreift.
- Musca domestica* L., gemein; März-Nov.
- M. corvina* Fbr., *vitripennis* Mg. und *tempestiva* Fall. mehr weniger zahlreich. April-Nov.
- Cyrtoneura hortorum* Fall. und *stabulans* Fbr. häufig; seltener.
- C. pabulorum* u. *pascuorum* Mg. auf Blumen. Juni, Juli.
- Myospila meditabunda* Fbr. oftmals gefangen. Juni.
- Aricia* Rob. Des. fing ich meist durch Streifen in folgenden Arten *lucorum* Fall., *obscurata* Mg., *larvaria* Fbr. (gemein), *serva* Mg. bei Kulm auf blühendem *Rubus*, Juni; *alboli neata* Fall., *incana* Wdm. bei Franzensbad; 4 *notata* Mg., *laeta* Fall. ein Stück auf einem Baumstrunk bei Wies, Juni; *signata* Mg. gemein; *erratica* Fall. häufig, *errans* Mg. ein Stück auf einer Dolde, *vagans* Fall. und *pallida* Fbr. gemein und *populi* Mg. in einem Stücke von Franzensbad im Curparke. Juni, Sept.
- Spilogaster* Mcq. ebenfalls meist gestreift: *semicinerea* Wdm., *quadrum* Fbr., *duplicata* Mg., *notata* Fall., alle häufig; *maculosa* und *carbonella* Zett. einzeln; *nigriventris* Ztt. einmal zahlreich unter Haselbüschen bei Königswart; *vespertina* Fall. gemein; *divisa* Mg. einzeln; *uliginosa* Fll., *fusca* Fall., *impuncta* Fall. gemein; *pagana* Fbr. einzeln auf Dolden zweimal. Juni *angelicae* Scop. im Gedölde um Franzensbad zahlreich. Juni.
- Hydrotaea ciliata* Fbr., *silvicola* Lw., *dentipes* Fbr., *armipes* Fll. und *meteorica* L. häufig gestreift. Juni.
- Ophyra leucostoma* Wdm. häufiger als die ebenfalls gestreifte *anthrax* Mg.
- Hylemyia hilaris* Fall. einige Stücke von Grüneberg u. Pechtersreuth. Juli; *flavipennis* Fall. ein Stück; *conica* Wdm. zahlreicher gestreift. Juli.

- Anthomyia mitis* Mg., *albescens* Zett., *sepia* Mg., *lactucae* Bch., *pratensis* Mg., *antiqua* Mg. Bch., *platūra* Mg., *radicum* L., *pluvialis* L. gestreift März-Nov.
- Homalomyia scalaris* Fbr. — gestreift bei Schlada. Juni.
- Myopina riparia* Fall. — einige Stücke von Stein. Juli.
- Lispe crassiuscula* Low. ein Stück dieser halophilen Art bei Franzensbad auf Compositen ;
- L. teutaculata* Deg. aus dem Egerthale. Juni.
- Condylura pubera* L. Einzeln, gestreift oder gefangen auf Gebüsch beim Schössl. Juni; auch *C. albipes* Fbr. in zwei Stücken.
- Norellia spinimana* Mg., bei Franzensbad einige Stücke am Wassergraben. Juni.
- Cleigastra macrocera* Mg. und *punctipes* Mg. gestreift auf Blumen Juni.
- Scatophaga analis* Mg. und *scybalaria* L. einzeln im Juli auf Dung *S. lutaria* Fbr., *inquinata* Mg., *stercoraria* L. und *merdaria* Fbr. sehr häufig vom April-Nov.
- Helomyza rufa* Fll., *flava*, *ustulata* Mg., *similis* Mg., *pallida* Fll. ziemlich zahlreich, im Egerwalde bei Pograth und Franzensbad gestreift.
- H. olens* Mg. in einem Stücke gefangen auf Distel. Juli.
- Leria serrata* L. auf einem Baumstrunke sonnend bei Wies. März
- Heteromyza atricornis* Mg. Königswart, Juni, 1 Stück.
- Dryomyza anilis* Fll. „auf Excrementen“ im Egerthale, einige Stücke Juli.
- Phaeomyia fuscipennis* Mg. gestreift bei Stein. Juni.
- Sciomyza lata* Zett. bei Stein ein Stück. April.
- S. dorsata* Fall. Schlada-Franzensbad auf Dolden. Juni.
- Cormoptera linbata* Mg. Gestreift bei Pograth im Grase. Juni.
- Tetanocera silvatica* Mg., *ferruginea* Fall., *reticulata* Fbr. (einzeln), *umbrarum* L., *punctulata* Scop. und *coryleti* Scop. — ziemlich oft gestreift an Waldrändern und Wiesenblumen. Mai-Juli.
- Limnia unguicornis* Scop. Auf Moorbodenpflanzen bei Franzensbad. Juni ;
- L. obliterata* Fbr. gestreift, ein Stück von Pograth. Juni.
- Elgiva albisetia* Scop. Egerland; auch *dorsalis* Fbr. und *lineata* Fall erhielt ich dort. Juni,

- Sepedon sphegens* Fbr. und *spinipes* Scop. gestreift, doch ziemlich spärlich. Juli.
- Otites lamed* Schrk. im Egerthale an einem Baum ein Stück; *bucephala* Mg. in 3 Stücken durch Streifen erhalten. Juni.
- Ortalis formosa* Pnz. von Franzensbad, wo sie auf Dolden umtummelte. Juli.
- Ceroxys crassipennis* Fbr. ein Stück im Egerthale erbeutet; *hyalinata* Pnz. schon im März beim Stadttheater einige Stücke.
- Herina frondescentiae* L. Egerland häufig. Juni.
- Platystoma seminationis* Fbr. „beim Schlössl“ zwischen Franzensbad und Eger einmal massenhaft auf *Vicia sepium* L. 14. Juni.
- Myodina vibrans* L. einige Stücke durch Streifen erhalten, zahlreicher bei Franzensbad. Juni.
- Ulidia erythrophthalma* Mg. von Pograth in ziemlich grosser Zahl mitgebracht; gestreift. Juni.
- Sapromyza longipennis* Fbr., *fasciata* Fll., *quadripunctata* L. *apicalis* Löw. und *praeusta* Fall. gestreift.
- Platyparaea poeciloptera* Schrk. ein Stück von Kulm auf einem Salatblatte. Juni.
- Acidia heraclei* L. gestreift in zwei Stücken bei Franzensbad. Juni.
- Spilographa cerasi* L. gestreift. Juni.
- Orellia Wiedemanni* Mg. gestreift auf *Lonicera caprifolium* beim Schlössl. Juni.
- Trypeta onothrophes* Lw. 1 Stück, *tussilaginisi* Fbr., mehrere Stücke und *colon* Fbr. in zwei Stücken gestreift auf Wiesenpflanzen. Mai-Juli.
- Urophora solstitialis* L. auf Disteln ganz einzeln als einzige Art beobachtet. Juni.
- Ensina sonchi* L. gestreift auf Ruderalpflanzen am Ramberg. Juli. 1 Stück.
- Oxyphora miliaria* Schrk. and *corniculata* Fll. gestreift auf Compositen, je ein Stück. Juni.
- Tephritis pantherina* Fll. ein Stück von Pograth; Juni.
- T. postica* Löw. ebendort. Juni.
- T. pulchra* Löw. Egerland.
- Sepsis annulipes* Mg., *punctum* Fb. und namentlich *cynipsea* L. gestreift. April-Juli.

- Nemopoda cylindrica* Fbr. mehrmals gestreift namentlich im Schustersprung. Juni.
- Temira putris* L. Franzensbad an einer Abortstelle zahlreich; auch anderwärts einige Stücke. Mai, Juni.
- Tanipeza longimana* Fall. Einige Male, einzeln gefangen oder gestreift. Juni.
- Calobata cibaria* L. Auf Gebüsch ziemlich zahlreich. Mai.
- Micropeza corrigiolata* L. Gemein. Juni, Juli.
- Loxocera ichneumonea* L. ziemlich oft gestreift oder von Blättern (Nesseln) gefangen. Juni.
- Chyliza atriseta* Mg. ein Stück gestreift — Egerthal. Juni.
- Psila fimetaria* L. Wiederholt auf Blättern und Distelköpfen gefangen; doch nicht gemein. Mai; auch
- P. rufa* Mg., *pallida* Fall. und *rosae* Fbr. fing ich, seltener.
- Platycephala planifrons* Fbr. und *umbracula* Fbr. durch Streifen erhalten: Pograth, Franzensbad. Juni.
- Meromyza pratorum* Mg. gestreift, auf Disteln gefangen;
- M. saltatrix* L. auf der Erde und auf Blättern (*Lappa* u. s. w.) erbeutet.
- Chlorops nasuta* Schrk., *circumdata* Mg., *lineata* Fbr. und *taeniopus* Mg. im Egerlande erbeutet. Mai.
- Mosillus arcuatus* Ltr. einige Stücke an einem Abortfenster in Franzensbad erbeutet. März.
- Hydrellia ranunculi* Hal. Franzensbad. Juni.
- Parydra coarctata* Fll. gestreift mit verwandten Arten, sehr zahlreich; auch *aquila* Fall. dabei.
- Drosophila fenestrarum* Fall., *funebri* Fbr. und *graminum* Fall. gestreift. Mai–Juli.
- Geomyza tripunctata* Fll. im Egerthal, ein Stück auf einem Schwamme. Juni.
- Borborus geniculatus* Mcq. *niger* Mg., und *equinus* Fall. gestreift an Pfützen: Franzensbad. Juni,
- 301 *Limosina crassimana* Hal. gestreift. Juni.

Fam. Phoridae.

- Phora incrassata* Mg. Gestreift, einige Stücke. Juli.

- P. mordellaria* Fall., *rufipes* Mg. zahlreich, *peraclella* Bche. mehrorts gestreift. März-Juli; ebenso
 5 *Trineura aterrима* Fbr.

Fam. Bibionidae.

- Scatopse notata* L. bei Franzensbad unweit Dr. Cartellieris Badeanstalt an einem Excrementhaufen. Juli.
Dilophus vulgaris L. auf Wiesenblumen stellenweise zahlreich. Mai, Juni.
 8 *Bibio marci* L., *hortulanus* L., *nigriventris* Hal. ein Stück, *Johannis* L., *varipes* Mg. und *laniger* Mg.; erstere beide ziemlich zahlreich, letztere mehr einzeln gefangen; ♂ vorherrschend vom April-Juli.

Fam. Simulidae.

- Simulia ornata* Mg., *reptans* L. gestreift, auch im Gebüsch mehrmals, z. B. beim Schöllsl, Kulm, Königswart u. s. w. April, Mai.

Fam. Mycetophilidae.

- Sciara Thomae* L. auf Dolden einige Male. Mai-Juli.
S. morio Fbr., *analis* Egg. und *flavipes* Pnz. gestreift. April-Juni.
Bolitophila fusca L. gestreift im Egerthale und bei Kulm an Grasbüschen; Juni.
Platyura marginata Mg. ein Stück im Streifsack erhalten. Juni.
 10 *Mycetophila punctata* Mg., *lineola* Mg., *signata* Mg. u. *luc uosa* Mg. durch Streifen auf Waldwiesen mehrmals gesammelt. Mai-Juni.

Fam. Rhyphidae.

- Rhyphus fenestralis* Scop. sehr gemein an Mauern und Fenstern; auch in Spinnweben. April.

Fam. Tipulidae.

- Ptychophora albimana* Fbr. und *contaminata* L. häufig im Gebüsch an Gewässer z. B. „beim Stephan“ gefangen; Juli.
- P. scutellaris* Mg. und *paludosa* Mg. ungleich seltener. Mai.
- Ctenophora bimaculata* L. sehr zahlreich, einzeln erbeutet. Juni.
- Ct. atrata* L., *pectinicornis* M. und *flaveolata* Fbr. einzeln. Mai, Juni.
- Nephrotoma dorsalis* Fbr. einzeln, an verschiedenen Punkten: Franzensbad, Egerthal und Pograth im Gebüsch. Juni, Juli.
- Pachyrhina annulicornis* Mg. 1 Stück; *lunulicornis* Schumm., *quadri-faria* Mg., *iridicolor* Schumm. ziemlich zahlreich; *scarra* Mg. ein Stück v. Franzensbad; *P. histrio* Fbr. und *maculosa* Mg. gemein, wie *pratensis* L.; *crocata* L. an Heerstrassen (Pappelholz!) einige Stücke. Mai-Juli-Sept.
- Tipula lutesceus* Fbr. einzeln im Gebüsch; Egerthal, Franzensbad Wies. Juli.
- T. gigantea* Schrk. Im Gehölze, einzeln, ziemlich selten. Juni, Juli.
- T. vittata* Mg. und *truncorum* Mg. in je einem Stücke im Gebüsch beim Stephan. Juni.
- T. pabulina* Mg., *hortensis* Mg., *varipennis* Mg., *pictipennis* Stg. einzeln;
- T. scripta* Mg. und *nubeculosa* Mg., *vernalis* Mg. u. *nigra* L. ziemlich zahlreich, auch auf Dolden mitunter, sowie an Nesselbüschen.
- T. nigra* L. Egerland.
- T. paludosa* Mg. und *nubeculosa* Fbr. einige Stücke; auch *oleracea* L. nicht gemein; *nodicornis* Mg., *pruinosa* Wdm., *diana* Mg., *lunata* Mg. liegen mir nur in je einem Stücke vor; Stephan, an der Eger.
- T. ochracea* Mg. und *pelio stigma* Schumm. in vielen Stücken;
- T. selene* Mg. und *fuscipennis* Mg. in je einem ♂ von Franzensbad im Gebüsch. April-Sept.
- Pedicia rivosa* L. in einem wahren Prachtexemplare in Kulm auf einem Rubus-Strauche erbeutet. Juni.
- Dicranota bimaculata* Schumm., Egerland.
- Tricyphona immaculata* Mg. Franzensbad. Juni ♂.
- Pentoptera clandestina* Scop. ein Stück auf *Chaerophyllum* bei Pograth. Loretto. Juni.

- Gnophomyia pilipes* Fbr. Auf *Heracleum* bei Pograth ein Stück erbeutet. Juli.
- Dasyptera haemorrhoidalis* Zett. in einigen Stücken, *D. lineata* Mg. in einem Stücke bei Kulm erbeutet.
- Trichosticha maculata* Mg. und *lutea* Mg. in je 3 Stücken im Franzensbader Torfmoor. Juni, Juli.
- Symplecta punctipennis* Mg. im Mai bei Franzensbad ein Stück an einer Mauer.
- Trichocera maculipennis* Mg., *regulationis* L. und *annulata* Mg. in einigen Stücken an verschiedenen Punkten gestreift, *T. lucinalis* Deg. unter Rinde, an einem Zaune. April.
- Epiphragma picta* Fb. ein Stück von Wies, auf einem Steine sonnend. Juni.
- Poecilostola punctata* Mg. und *pictipennis* Mg. in einigen Stücken. *E. barbipes* Mg. in einem Stücke bei Kulm. Juni.
- Limnophila nemoralis* Mg., *fuscipennis* Mg., *ferruginea* Mg. sind häufig; doch fand ich nur ein Stück von *discicollis* Mg. und *lineola* Mg.
- Elliptera omissa* Egg. ein Stück von Stein. Juni.
- Phalacrocer* *nudicornis* Schmm. ebenfalls in einem Stücke bei Pograth erbeutet. Juni.
- Rhiphidia maculata* Mg. gestreift. Juni.
- 77 *Limnobia maculata* Mg., *quadrinotata* Mg., *flavipes* Fbr., *silvicola* Schml. ein Stück, *nigropunctata* Schumm., *xanthoptera* Mg. und *tripunctata* Fbr. häufig, *chorea* Mg., *trinotata* Mg., *modesta* Mg. und *morio* Fbr. im Egerlande gefangen. Mai-Sept.

Fam. Culicidae.

- Corethra plumicornis* Fbr. Juni.
- Anopheles maculipennis* Mg. März.
- Culex annulatus* Schrk., *annulipes* Mg., *nemorosus* Mg. und *pipiens* L., sowie *ornatus* Mg. aus der Luft geschöpft oder gestreift. Juni.

Fam. Psychodae.

Psychoda phalaenoides L. in und an Häusern mehrmals beobachtet.
Juli-Oct.

Fam. Hippoboscidae.

Hippobosca equina L. An Rind einmal zahlreich gefangen. Juni.
Ornithomyia tenella Schin. in einem, *avicularia* L. in einigen Stücken
auf mehreren gefangenen Schwalben- und *Cypselus*stücken.
Juni, Sept.

Melophagus ovinus L. Egerland.

5 *Braula coeca* Ntsch. Egerland.

Fam. Nycteribidae.

Nycteribia vexata Kol. Ein Stück an einer lebenden Fledermaus
(*Myotis murinus*). Juni.

VI. Lepidoptera.**Fam. Papilionidae.**

Papilio podalirius L. Schm. sehr selten; Mai-Juli; Rp. auf Schlehen.

P. Machaon L. Schm. etwas häufiger; Mai-Aug. Rp. auf Umbellen. Mai.

Doritis mnemosyne L. ein Stück auf Distel bei Pograth. Juni.

Leucophasia sinapis L. Auf Waldwiesen (Wies) häufig. Juni-Aug.

Pieris crataegi L. Gemein wie allerorts; Juni, Juli.

P. brassicae L. fast noch häufiger. März-Juli.

P. rapae L. und *napi* L. wie voriger, ebenso gemein. Mai, Juni.

P. Daplidice L. und *Bellidice* Hbn. ganz einzeln und selten. Mai-Aug.

P. cardamines L. Stellenweise ziemlich häufig. Mai, Juli.

Colias palaeno L. Als eine wahre Torfform im Egerlande ziemlich
häufig; die Rp. fand ich am Kammerbüchl am Wege. Mai.

C. hyale L. häufig Mai, Sept.; *C. edusa* Fbr. seltener auf Wiesen.
Aug., Sept.

C. myrmedone Esp. fing ein Schüler bei Stein. Juli.

Gonopteryx rhamni L. wohl ziemlich gemein vom April an.

Vanessa atalanta L., *urticae* L., *C. album* L. und *cardui* L. sind gemeine Arten; *V. antiopa* L., *Jo* L., *polychloros* L. und *prorsa* L. begegnen nur einzeln; von letzterer fing ich *levana* L. in drei, *prorsa* L. in zwei Stücken; nie eine *porima* Ochys; letztere sah ich auch in keiner Sammlung.

Melitaea matura L., *aurinia* Rott., *dydima* Esp. (ein Stück), *cinxia* L., *dictyona* Esp., *athalia* Esp. zahlreich in mehreren Stücken gefangen. Vom Juni ab.

Argynnis euphrosyne L. auf Wiesen, einigemale. Juni auch

A. dia L. kaum seltener; *A. adippe* L. in einem Stücke von Königswart.

A. pales L. ein Stück von Franzensbad. Juni.

A. niobe L. *aglaja* L. und *Latonia* L. sind häufigere Arten; auch *paphia* L. fing ich in einigen Stücken; namentlich bei Kulm und Wies;

Limenitis sibilla L. ein Stück auf *Rubus* an einer Waldstelle bei Kulm. Juni.

Apatura iris L. Aus dem Egerlande gesehen; ich fing sie nie.

A. ilia Schiff. erhielt ich von einem Schüler aus Pograth. Juli.

Satyrus alcyone Schiff. fing ich in einem Stücke bei Königswart.

S. phaedra L. auf Torfmoor bei Franzensbad und in einer Waldlichte bei Kulm.

Erebia medusa Schiff. Häufig auf Waldwiesen und Waldlichten. Mai, fast ebenso häufig *E. medea* Esp.

Arge galathea L. In einigen wenigen Stücken auf Waldstellen z. B. bei Wies.

Pararge maera L. Auf offenen Stellen, einzeln. Juni, Juli.

P. megaera L. häufiger; namentlich auf Wegen und Mauern. Juni.

P. egeria L. sehr häufig in den verschiedensten Terrainarten. Juni.

Ephinephle hyperanthus L. gemein z. B. St. Anna. Juli.

E. janira L. kaum seltener. Juni, Juli.

E. tithonus L. ganz einzeln. Juli, Aug.

Coenonympha hero L. Im Egerthale, einzeln, auch von Pechtersreuth. Juli; auch

- C. iphis* Schiff., *arcania* L. und *pamphilus* L. sind nicht selten; letzterer namentlich auf Waldlichten. Juni-Aug.
- C. davus* L. fing ein Schüler bei Schlada. Juni.
- Nemeobius lucina* L. fing ich in einem defecten Stücke bei Kulm auf *Rubus*. Juni.
- Lycaena arcas* Rott. einzeln bei Franzensbad und Pograth. Juli.
- L. arion* L., *semiargus* Rott., *argiolus* L., *icarus* Rott., *argus* L., *aegon* L. und *tiresias* Rott. ziemlich häufig an Waldblößen, Misthaufen und Wegen — namentlich St. Annaberg, vom Mai an.
- L. medon* Hfn., *hylas* Schiff. und *cyllarus* Hfn. fing ich ganz einzeln und
- L. telecanus* Hrb. einmal auf Nessel bei Königswart. Juli.
- Polyommatus helle* Schiff. nicht besonders selten. Juni; mit ihr auch *hippotoë* L. einzeln.
- P. dorilis* Hfn. bei Wies und Königswart in je einem Stücke. Juli.
- P. alciphron* Rott., *eurydice* Rott. zahlreich auf St. Annaberg, auch bei Kulm, Juni;
- P. virgaurea* L. und *phleas* L. gelegentlich in Waldlichten und Waldwiesen, namentlich letztere häufig. Juni, Juli.
- Thecla rubi* L., *pruni* L. und *betulae* L. ziemlich häufig, stellenweise erstere gemein. Mai-Juli.
- Th. ilicis* Brkh. und *quercus* L. mehr einzeln, häufig auf Gesträuch. Juni.
- Th. W*— *album* Kn. erhielt ich auf einer Birke bei Wies im Juni.
- Syrichthus tages* L., *malvarum* Ill., *alveus* Hbn. und *alveolus* Hbn. alle durcheinander auf Wiesenblumen in Waldlichtungen vom Juni-Aug.; *sao* Hbn. am Kammerbüchl. Juli.
- Cyclopides speculum* Rott. streifte ich bei Franzensbad in einem Stücke. Juli.
- Carterocephalus paniscus* Sulz mit *Syrichthus*; einzeln im Juli.
- 95 *Hesperia comma* L., *silvanus* Esp. und *thamnus* Hfn. ziemlich häufig und oft zahlreich auf Wiesenblumen; auch *actalon* Esp. und *lineola* Ochs. fing ich, freilich ganz einzeln. Juni.

Fam. Sphingidae.

- Acherontia atropos* L. wurde im Egerlande gefunden; ich fing sie nie, weder den Schmetterling, noch die Raupe, obwohl viel Kartoffel angebaut wird.
- Sphinx pinastri* L. einzeln, Abends einige Male gefangen. Juni.
- S. convolvuli* L. ziemlich häufig; ich fing ihn mehrmals im Fluge und in Ruhe an Mauern. Juni, Juli; auch
- S. ligustri* L. in zwei Stücken.
- S. euphorbia* L. die gemeinste Art der Gattung, ungleich seltener als gezüchtet. Juni, Juli.
- S. elpenor* L. fing ich einmal; im Juli.
- S. porcellus* L. dagegen ziemlich zahlreich. Mai, Juni.
- Smerinthus tiliae* L. und *populi* L. so wenig selten, wie allerorts, Juli; von *Sm. ocellatus* L. fand ich nur Raupen. Sept.
- Macroglossa stellatarum* L. der häufigste Repräsentant dieser Familie, auch am Tage und selbst in die Zimmer fliegend. Juni-Sept.
- M. bombyliformis* Ochs. fing ein Schüler in einem Stücke.
- 13 *M. fuciformis* L. ist häufig.

Fam. Thyrididae.

- Thyris fenestrella* Scop. streifte ich zu meiner Freude an einem Rubus-Strauche bei Stein im Juli. 1 Stück.

Fam. Sesiidae.

- Trochilia apiformis* L. oftmals gefangen, auch am Tage fliegend; var. *sireciformis* Esp. fing ein Schüler bei Wies. Juni.
- Sciapteron tabaniforme* Rtt. Die Raupe in einem Pappelstamme (*Populus tremula* beim Siechenhaus) gefunden. Juni.
- Sesia tipuliformis* L. in zwei Stücken gefangen (auf *Verbascum* und einer auf *Teucrium*); von
- S. spheciformis* Fbr., *culiciformis* L. und *empiformis* Esp. je ein Stück bei Tage im Fluge gefangen. Juni, Juli.

7 *Bembecia hylaeiformis* Lsp. in einem Stücke an einer sonnigen Stelle auf *Rubus* bei Königsberg gefangen. Juli.

Fam. Zygaenidae.

Ino pruni Schiff. und *statices* L. ziemlich häufig, *globulariae* Hbn. etwas seltener auf allerlei Wiesenblumen; vom Juni an.

Zyganea minos Schiff., *filipendulae* L. und *ephialtes* L. die häufigsten Arten; *falcata* Hbn. einzeln; häufiger ist

Z. scabiosae Esp. und *trifolii* Esp.

Z. lonicerae Esp. und *meliloti* Scop. fing ich ein parmal auf niederen Waldblumen (*Trifolium*, *Campanula*) u. s. w.

Z. fausta in einem schönen Stücke auf einem *Verbascum*-Blatte im Kammerbüchl. Juli.

Syntomis phegea L. einige Male z. B. am St. Annaberg, Kulm u. s. w.

14 *Naclia ancilla* L. fast ebenso, seltener. Juli.

Fam. Lithosidae.

Mudaria mundana L. einigemale an „Planken und Baumstämmen“ erbeutet; auch die Raupe z. B. im Egerthale. Juni.

Calligenia miniata Forst. Diese schöne Art erhielt ich durch Streifen bei Kulm in einem Stücke. Juni.

Setina irrorella L. Häufig, auf *Vacciniensträuchern* sowie auf *Rhamnus Prunus* u. s. w. Juli.

Lithosia sororcula Hfn. die häufigste Art, mehrmals gefunden;

L. muscarda Hfn., *griseola* Hbn., *depressa* Esp (ein ♂ *helvola* Ochs), und *complana* L. fing ich einzeln an Planken oder an Blumen.

10 *Gnophria quadra* L. ist recht häufig. Juni-Aug.; dagegen erhielt ich nur eine *rubricollis* L. durch einen Schüler.

Fam. Arctiidae.

Emydia grammica L. Häufig, namentlich Franzensbad. Juni, Juli.

E. cribrum L. nur eiumal bei St. Anna. Juli.

Euchelia jacobaea L. ziemlich häufig erbeutet. Mai, Juli.

- Callimorpha dominula L. mehrmals an Grashalmen u. s. w. Juli.
 C. hera L. in nur einem Stücke gefangen an Rubus. Juli.
 Pleretes matronula L. sah ich aus dem Egerlande. Juli.
 Arctia russula L. einige Male auf Gesträuch, Planken u. s. w. gefangen. Juni; auch
 A. plantaginis L. nicht seltener. Juni, Juli.
 A. caja L. einzeln, doch häufig wie allerwärts. Juli.
 A. villica L. fing ein Schüler im Egerthale. Juni.
 A. hebe L. ist wohl häufiger. Juni.
 A. lubricipeda Fbr. und menthastri Schiff. sind häufig, namentlich auf Nesseln u. s. w.; auch urticae Esp. und mendica L. fing ich.
 16 Phragmatobia fuliginosa L. an Grashalmen einigemale gefangen und gestreift. Juni, Sept.

Fam. Liparidae.

- Orgyia gonostigma Fb. und antiqua L. sind häufige Arten — auch die Raupen fing ich mehrmals auf jungen Eichen im Juni.
 Dasychira fascelina L. und pudibunda L. wie vorige und wie überall nicht selten. Ein Schüler fing eine schöne.
 D. abietis Esp. im Egerthale. Juli.
 Leucoma salicis L. ist gemein. Juni, Juli.
 Ocneria rubra Schiff. und monacha L. höchst selten und einzeln im Egerlande; dispar L. stellenweise, doch kaum zahlreich. Juli.
 Porthesia chrysorrhoea L. etwas zahlreicher als
 11 P. auriflua L. von der ich nur zwei Stücke fing. Juli.

Fam. Cossidae.

- Cossus ligniperda Fbr. stellenweise wie allerwärts der Pappel- und Weidenzerstörer; der Schmetterling selten. Juni, Juli.
 2 Phragmatoecia arundinis Hbn. fand ein Schüler an einem Holzstamm bei Pograth. Juli.

Fam. Cocliopodae.

Limacodes testudo Fbr. Ein Stück von Franzensbad an einer Bretterwand. Juni.

Fam. Hepialidae.

Hepialus humuli L. Die Raupe an Hopfenwurzeln einmal erbeutet, den Schm. fing ich nie. Juni, dagegen erhielt ich

H. silvinus L. von einem Schüler und fing

4 *H. lupulinus* L. und *hecta* L. in je einem Stücke auf Rosen beim Schlössl. Juni.

Fam. Psychidae.

Psyche unicolor Hfn. streifte ich oftmals von Wiesenblumen; Juni, Juli
P. viciella Schiff. in einem Stücke am Kammerbüchl. Juni.

4 *Fumea nitidella* Hbn. bei Stein und *sepium* Sp. bei Pograth gestreift. Juni.

Fam. Drepanulidae.

Cilix spinula Schiff. in drei Stücken auf Schlehen gefangen. Juni.

Platypteryx lacertinaria L. Ebenso, auch auf der Espe ein Stück gefunden. Juni.

Drepana cultraria Fbr. einzeln, bei Franzensbad an einer Mauer, bei Kulm auf *Rubus*; von *binaria* Hfn. ein Stück bei Schlada. Juni.

5 *D. falcataria* L. mehrmals und an mehreren Orten gefangen. Juni.

Fam. Saturnidae.

Endromis versicolora L. und

Aglia tau L. wurde im Egerlande gefangen. Von

3 *Saturnia carpini* Schiff. fing ich die Raupe an Schlehen unweit vom Friedhofe. Juli.

Fam. Bombycidae.

- Gastropacha betulifolia* Fbr. ein Stück im Egerthale an einem Holzbalken gefunden. Juni.
- G. querciolia* L. mehrmals als Raupe gefunden und gezüchtet. Mai, Juni, Schmetterling im Juni. Von
- G. pruni* L. und *pini* L. fing ich im Egerthale je ein Stück. Juni, Juli.
- G. potatoria* L. Mehrmals gezüchtet; den Schmetterling fing ich nie.
- G. trifolii* Schiff. ziemlich häufig, auf Heide fliegend. Juli.
- G. quercus* L. gezüchtet; Raupen auf Schlehen gefunden im Juli.
- G. crataegi* L. fing ich einmal an einer Planke bei Wies. Sept.
- G. populi* L. an Wege gegen Franzensbad an einem Pappelbaum ein Paar in copula. Spt.
- G. neustria* L. an manchem Baume zahlreich (Weidezweitschke) an andern nebenstehenden fehlend.
- G. lanestris* L. auf Weissdorn die Raupe gefangen (2 Stücke) und gezüchtet. Schm. im Oct.
- 12 *Lasiocampa dumeti* L. brachte mir ein Schüler.

Fam. Notodontidae.

- Pygaera anachoreta* Schiff. und *curtula* L. in je einem Stücke von Pograth die anderen von Kulm gefangen. Juni.
- Phalera bucephala* L. Als Raupe an einer Weide einmal in Menge gesammelt und gezüchtet; der Schm. scheint selten zu sein. Juli. —
- Cerura vinula* L. Ebenfalls die Raupe einigemale an Weiden gefunden und gezüchtet; ein Schmetterling an einer Weidenrinde. Juli.
- C. bifida* Brkh. und *furcula* L. in einigen Stücken im Egerthale und bei Wies gefangen. Juni.
- Uropus ulmi* Schiff. fing ich in einem Hausgange in Franzensbad im Juni.
- Pterostoma palpina* L. in nur einem Stücke bei Kulm am Kirchhofe gefangen. Juni.

- Lophopteryx cucullina* Schiff. Ein Stück an einer *Populus tremula* bei Siechenhaus. Juli.
- L. camelina* L. fing ich mehrmals Abends im Fluge und sitzend an einem Brette am Ramberg. Juni.
- Microdonta bicolora* Schiff. fing ein Schüler im Juni.
- Leiocampa dictaea* L. und *dictaeoides* Esp. einzeln an Baumstämmen, letztere seltener. Juni; ebenso
- L. ruficornis* Hfn. und *dodonea* Schiff.; doch schon im Mai im Egerthale auf Laubholzstämmen und Planken gefangen.
- Notodonta dromedarius* L. und *ziczak* L. fing ich mehrmals an Rinde; Mai-Juli; die seltene
- 18 *N. tritophus* Schiff. brachte mir ein Schüler. Juni.

Fam. Cymatophoridae.

- Thyatira batis* L. In einem Stücke an einer Holzwand im Friedhofe aufgefunden. Juni.
- Cymatophora* or Schiff., *ocularis* L. und *duplaris* L. fing ich und sah sie von Schülern — meist an Holzbalken. Juni.
- Asphalia flavicornis* L. ein Stück bei Siechenhaus; Mai.
- 6 *A. ridens* Fbr. in einer Fensternische in Franzensbad. Juni.

Fam. Noctuidae.

- Diloba coeruleocephala* L. Die Raupe im Mai und Juni auf Schlehgesträuch, einzeln auch an Kohl beobachtet; der Schm. im Herbst fliegend, nur ein Stück im Freien gefangen.
- Demas coryli* L. im Egerthale, ein Stück. Juni.
- Craniophora ligustri* Schiff. fing ein Schüler. Juni.
- Acronycta leporina* L., *tridens* Schiff., *psi* L., *runicis* L., *megacephala* Schiff. und *aceris* L. erbeutete ich mehrmals; von
- A. menyanthidis* View. ein Stück bei Schlada, im Juni.
- Moma orion* Esp. ebenfalls nur ein Stück an einem Pappelstamme bei Wies. Juni.
- Bryophila perla* Schiff. bei Königswart.
- B. algae* Esp. an einer Mauer in Franzensbad erbeutet. Juni.

- Simyra venosa* Borkh. gestreift, Pograth. Juni.
- Nonagria typhae* Esp., *sparganii* Esp. und *arundinis* Hbn. sind namentlich in Franzensbad ziemlich häufige Arten.
- Meliana flammea* Curt. Ein Stück an einem Zaunpfahle bei Pograth. Juni.
- Leucania pudorina* Schiff. bei Königswart ein Stück auf Gras ;
L. pallens L. mehrmals an Mauern erbeutet. Juni ; ebenso ein Stück von *L. comma* L. *Straminea* Tz. bei Kulm, und ein Stück von *L. Caradrina morpheus* Hfn. in einem Stücke an einer Kapelle gegen Franzensbad ; *palustris* Hbn. häufiger. Juni.
- Acosmetia caliginosa* Hbn. gestreift bei Pograth. 1 Stück.
- Grammesia trigrammica* Hfn. und
Asteroscopus sphinx Hfn. in je einem Stücke an einer Mauer im Egerthale.
- Lupernia virens* L. bei Franzensbad 1 Stück. Juli.
- Panolis piniperda* Esp. im Egerthale, ganz einzeln. Juni.
- Charaeas graminis* L. einigemale erbeutet, auch die Raupe. Juli, Aug.
- Taeniocampa gothica* L., *stabilis* Schiff. und *incerta* Hfn. nicht selten an Mauern u. s. w. ; ausserdem ein Stück *cruda* Schiff. und ein Stück *munda* Schiff. von Franzensbad. Juni.
- Pachnobia leucographa* Schiff. brachte ein Schüler von Pograth. Juni.
- Orthosia circellaris* Hfn. in drei Stücken bei Schlada, *lota* L. in einem im Kirchhofe von Kulm erbeutet. Juni.
- Plastenis retusa* L. Ein Stück am Theater. Juni.
- Cosmia trapezina* L. und *pyralina* Schiff. einzeln gefangen ; einmal auch gestreift. Juni.
- Hydroecia nycitans* L. in einem Stücke von Schlada. Juni.
- H. flavago* Schiff. von einem Schüler erhalten.
- Xanthia gilvago* Esp. Ein Stück am Siechenhaus. Juni.
- X. fulvago* L. und *togata* Esp. in einigen Stücken von verschiedenen Punkten ; Juni, Juli.
- X. citrargo* L. ein Stück in einem Gange von Dr. Cartellieris Badhaus in Franzensbad. Juni.
- Scopelorama satellitum* L. fand ich in einem Stücke am Friedhofe auf Holz. Juni.
- Orrhodia vaccinii* L. Egerthal. Juli ; *silene* Schiff. in einem Stücke von Königswart. Juni.

- Scoliopteryx libatrix* L. Im Egerthale ein Stück sitzend an einem Mauerstein. Juli.
- Amphipyra tragopogonis* L. gestreift ein Stück.
- A. pyramidea* L. in mehreren Stücken erbeutet. Juli.
- Tryphaena fimbria* L. in Waldstellen, einzeln, mehrmals. Juli.
- T. janthina* Schiff. nur einmal bei Schlada an einer Laube. Juni.
- T. pronuba* L. häufig, ein Stück mit *Comes* Hbn. an *Capri folium* beim Schössl gefangen. Juli.
- Opygena polygona* Schiff. Franzensbad ein Stück, Juli.
- Agrotis xanthographa* Schiff. (zweimal); *festiva* Schiff. von Pograth. Juli; *boja* Schiff. zwei Stücke in *Copula* von Kulm im Kirchhof im Juli; *triangulum* Rtt. häufiger; *C. nigrum* L. von einem Schüler gefangen; *glareosa* Esp. St. Anna Sept.
- A. plecta* L. Pograth. Juli.
- A. praecox* L. Ein Stück bei Stein; Juli, *A. tritici* L. und *obelisca* Schiff je ein Stück von Pograth. Juli.
- A. segetum* L. die gemeinste Art der Gattung; auch *exclamationis* L. kaum seltener; Juni, Juli.
- A. ypsilon* Hfn. nur einmal im Siechenhaus gefangen. Juli.
- Apamea testacea* Schiff. gestreift. Königswart. Juli.
- Neuronia popularis* Fbr. Wies in einer Gartenlaube. Juni.
- Cerigo matura* Hfn. ein Stück auf einer Planke am Schustersprung. Juli.
- Miselia oxyacanthae* L. Raupe im Mai und Juni an Schleh- und Weissdorn (Trommelgasse); Schm. im Oct.
- Dichonia aprilina* L. Mehrmals gefangen und von Schülern erhalten; fliegt einzeln auch am Tage. Juni.
- Polia chi* L. mehrmals von Mauern abgenommen (Egerthal Kulm und Schössl. Juni.
- Mamestra cucubali* Schiff., *luteago* Schiff. (1 Stück), *saponariae* Brkh., *dysodea* Schiff., *chenopodii* Schiff. (häufig), *dentina* Schiff., *oleracea* L. (häufig), *pisi* L. (häufig), *persicariae* L. (häufig), *brassicae* L. (gemein) und *nebulosa* Hfn. fing ich mehrmals; dagegen liegen *compta* Schiff., *thalassina* Hfn. und *leucophaea* Schiff. nur in je einem Stücke vor. Vom Mai an bis Sept.
- Hadena leucostigma* Hbn., *atriplicis* L. und *strigilis* L., *didyma* Esp. an mehreren Punkten gefangen; *rurea* Fbr. von Kulm. Juni; und *furuncula* Schiff. fing ich in je einem Stücke. Juni, Juli.

- Hyppa rectilinea* Esp. ein Stück an einem Haselstrauche bei Kulm an der Unterseite eines Blattes gefangen. Juni.
- Euplexia lucipara* L. ebenfalls bei Kulm an der Kirchhofmauer ein Stück. Juni.
- Brotolomia meticulosa* L. einige Stücke an verschiedenen Punkten gefangen, Juni; fliegt auch am Tageslichte.
- Mania maura* L. ein Stück von Schlada. Juli.
- Naenia typica* L. Franzensbad an einer Hausmauer. Juni.
- Rhizogramma petrorhiza* Brkh. in einem Stücke an einem Baumstamme bei Pograth erbeutet; ob nördlichste Verbreitung? Juli. —
- Xylina furcifera* Hfn. Franzensbad, ein Stück. Juli.
- Egira solidaginis* Hbn. Wies, ein Stück auf *Ribes rubrum* Strauch. Sept.
- Xylocampa lithorhiza* Brkh. Im Egerthale ein Stück an einem Zaunpfahle. Juni.
- Cucullia scrophulariae* Schiff. Franzensbad ein Stück. Juni.
- C. umbratica* L. mehrmals beobachtet. Juni-Juli; ebenso
- C. taneceti* Schiff.
- Heliothis dipsaceus* L. fing ein Schüler. Juli.
- Heliaca tenebrata* Scop., und
- Anarta myrtilli* L. bei Franzensbad gestreift. Juni.
- Abrostola triplala* L. St. Anna und Kulm, je ein Stück. Juni.
- Plusia chrysitis* L. in zwei Stücken im Egerthale;
- P. gamma* L. gemein, doch nur stellenweise z. B. bei Wies;
- P. jota* L. ein Stück von Kulm. Juni.
- Acontia luctuosa* Schiff. 1 Stück von einem Schüler. Juli.
- Catephia alchemysta* Schiff. kam ins Zimmer geflogen. Juli.
- Catocala fraxini* L. fing ich nie; dagegen ist
- C. nupta* L. und *sponsa* L. ziemlich häufig; eine
- C. promissa* Fbr und eine *C. elocata* Esp. brachte ein Schüler. Juli.
- Euclidia glyphica* L. und *Mi* L. sind nicht selten, wengleich einzeln. Juni, Juli.
- Toxocampa cracca* Schiff. ein Stück von einer Distel bei Schlada. Juli.
- Erastria uncana* L. mehrmals gestreift. Juli; auch
- E. deceptor* Scop. und *pygarga* Hfn. gestreift. Juli.
- Prothymia laccata* Scop. Egerland. Juli.

- Boletobia fuliginaria* L. Im Egerthale, einige Stücke. Juli.
Herminia cribralis Hbn. und *tentucalis* L. gestreift bei Wies und Pograth. Juni, Juli.
Hypena rostralis L. ebenfalls durch Streifen erhalten. Juli.
 134 *Rivula limbata* L. ein Stück an einem Tische in Siechenhaus. Juli

Fam. Nycteolidae.

- Nola curculatella* L. und *confusalis* Ht. im Egerlande einzeln gefangen. Juni, Juli.
 3 *Sarrothripus revayanus* Schiff. in einer Schülersammlung.

Fam. Chloephoridae.

- Halias prasinana* L. An Mauern, ein Stück auf Distel gefangen. Juni, Juli.
 2 *Chloephora bicolorana* Fssl. in einem Stücke bei Pograth gestreift. Juli. —

Fam. Brepidae.

- Brephos parthenias* L. ein Stück am Friedhofe v. Eger an einem Strauche, Abends. Mai.

Fam. Geometridae.

- Ellopia fasciaria* L. Ein Stück im Egerthale. Juli.
Metrocampa margaritaria L. An einer Mauer ein Stück in Franzensbad, ein zweites bei Pograth an einem Baumstamme gefangen. Juni, Juli.
Eugonia alniaria Esp. Mehrmals im Egerthale, bei Loretto und bei Königswart gefangen. Juni, Juli; auch
E. angularia Schiff. und *canaria* Fbr. in je einem Stücke. Juli.
Selene tetralunaria Esp. ein Stück von Franzensbad. Juli.
Theraphis evonymaria Schiff. ein Stück im Egerthale hinter Siechenhaus erbeutet. Juli.

- Pericallia syringaria* L. In mehreren Exemplaren und von verschiedenen Punkten im Egerlande vorliegend. Juni, Juli.
- Crocallis elinguaris* L. Ein Stück gestreift bei Pograth. Juli.
- Eurymene delobraria* L. An Gesträuch und an Zaunplanken mehrmals, vom Mai an.
- Epione advenaria* Hbn. *vespertaria* L. und *apicaria* Schiff. aus dem Egerlande; letztere in Copula an einer *Populus tremula* bei Siechenhaus. Juli, Aug.
- Venilia macularia* L. Eine der häufigsten Arten. Mai, Juni.
- Macaria notata* L. von Kulm ein Stück. Juni.
- M. liturata* L. in zwei Stücken, eines im Egerthale, das andere von einem Schüler gefangen. Juni.
- Urapteryx sambucaria* L. Einzeln fliegend. Juni, Juli.
- Rumia crataegata* L. Mehrmals und zahlreich erhalten; so bei Königswart und bei Kulm; ein ♂ in der Trommelgasse. Juni.
- Angerona prunaria* L. Häufig, wie vorige. Juni, Juli.
- Hypoplectis adspesaria* Fbr. Königswart im Gebüsch gegen den Bahnhof. Juni.
- Scoria dealbata* L. Auf Waldlichtern, mehrmals. Juni.
- Phasiane petraria* Hübn. Wies an einem Dung ein Stück. Juni.
- Numeria pulveraria* L. im Egerthale und bei Franzensbad je ein Stück. Juni; ebendort ein Stück *capreolaria* Schiff.
- Cabera pusaria* L. und *exanthemaria* Scop. beide mehrmals an verschiedenen Punkten gefangen, Juni, Juli.
- Zerene adustata* Schiff. Im Egerthale, ein Stück. Juni.
- Abraxes grossulariata* L. ziemlich häufig, an Gebüsch; Juli.
- A. marginata* L. seltener; Juni.
- Hibernia defoliaria* L., *aurantiaria* Esp., *progenuariaria* Hbn., *leucophaearia* Schiff. u. *bajaria* Schiff. jede in mehreren Stücken gefangen; flogen gerne im Sonnenlichte oder stecken in Steinhöhlen wie im Egerthale; bei Kulm an einer Kapellenwand. Juni.
- Rhyparia melanaria* L. Kammerbüchl, ein Stück. Juli.
- Fidonia pinaria* L. und *atomaria* L. ziemlich häufig; von F. brunneata Thbg. fing ein Schüler ein Stück.

- F. wawaria* L. und *clathrata* L. fing ich an Schlehensträuchern mehrmals. Juni, Juli. Von
- Gnophos obscurata* Schiff. ein Stück bei Kulm gefangen. Juni.
- Boarmia lichenaria* Hfn. im Egerthale mehrmals. Juni.
- B. cinctaria* Schiff., *rhomboidaria* Schiff., *crepuscularia* Schiff. und *punctulata* Schiff. im Egerlande mehrmals gefangen. Juni.
- Biston hirtarius* L. und *pilosarius* Schiff. ebenso, in mehreren Stücken, bei Pograth, Kulm und Schlada einzeln gefangen. April, Juni.
- Amphidasis betularia* L. Wies und Siechenhaus u. s. w. auf *Rubus* und auf Wiesenblumen nicht selten. Mai, Juni.
- Pseudoterpna pruinata* Hfn. und
- Geometra papilionaria* L. sind ziemlich häufige Arten; Juni, Juli.
- Nemoria thymiaria* L. Franz-Josef-Bahndamm. Juli.
- N. fimbriata* Hfn., *viridata* L., *vernaria* Hbn., *lactearia* L., *putataria* L., auf Wiesenblumen alle ziemlich häufig anzutreffen. Juni, Juli.
- Acidalia ochreatea* Schiff., *pallidata* Schiff., *straminata* Tr., *virgularia* Hbn., *bisetata* Hfn., *aversata* L., *emarginata* L., *remutata* Hbn., *paludata* L. und *immorata* L. repräsentiren diese Gattungen.
- Pollonia vibicaria* L. Franzensbad 1 Stück auf *Heracleum spondylium* L. Mai.
- Timandra amataria* L. Franzensbad an einer Mauer; Juli, Spt.
- Zonosoma trilineata* Borkh. und *punctaria* L. auf Wiesenblumen bei Pograth und an Mauern mehrmals. Juni.
- Anisopteryx aescularia* Schiff. Franzensbad, ein Stück von einem Schüler gebracht. Mai.
- Odezia chaerophyllata* L. und
- Minoa fuscata* Hfn. bei Pograth erbeutet. Juni.
- Lythria purpuraria* L. Schlada an einer Mauer. Juni.
- Anaitis sororiata* Hbn. ebendort gestreift. Juni.
- Chesias griseata* Schiff. im Egerthale, ein Stück an einem Stein. Juni.
- Lobophora carpinata* Brkh. Siechenhaus im Hausgange; ein Stück. Juni; *L. halterata* Hfn. mehrmals. Juni.
- L. sexalata* Vill. fing ein Schüler. Juni.
- Ortholitha chenopodiata* L. an verschiedenen Punkten.

- O. bipunctaria* Schiff. und *comitata* L. fing ich nur einmal. Juni.
Scotosia dubitata L. häufig, an den verschiedensten Punkten. Juni.
S. certata Hbn., *undulata* L., *transversata* Hfn. und *vetulata* Schiff.
 mehr einzeln und seltener. Juni, Juli.
Collix sparsaria Hbn. Königswart gegen den Bahnhof. Juni.
Larentia silaceata Hbn. einzeln; ungleich seltener als *L. prunata* L.,
variata Schiff., *ferrugata* L., *quadrifasciaria* L., *hastata* L.
 und *albicillata* L. — sind die am zahlreichst gefundenen
 Arten; ausserdem fing ich auf Wiesenblumen einzeln: *testata*
 L., *populata* Schiff., *pyralinata* Schiff., *corylata* Thlb., *viridaria*
 Fbr., *montanata* Schiff., *ocellata* L., *rubidata* Schiff.
 (Kulm), *cucullata* Hfn. *bicolorata* Hfn., *bilineata* L., *elutata*
 Schiff., *vespertata* Hbn., *alchemillata* L. und *blandiata* Schiff.
 vom Mai an, mehrmals gestreift.
Oporabia dilutata Schiff. Franzensbad im Torfmoor. Mai.
Cheincatobia brumata L. und *boreata* Hbn. mehrmals im Gebüsch,
 doch nie in schädlicher Menge. Spätherbst.
Hydrelia cambrica Curt. durch Streifen beim Kammerbüchl erhalten.
 Juni; ebenso
H. albulata Hfn. *luteola* Schiff. und *obliterata* Hfn. gestreift.
 Mai, Juni.
 120 *Eupithecia centureata* Schiff. Gestreift in mehreren Stücken bei
 Franzensbad. Juli; ausserdem erhielt ich durch Streifen
satyrata Hbn., *vulgata* Haw. und *millefoliata* L. Juni.

VII. Rhynchota.

A. Rh. heteroptera.

Fam. Corisidae.

- Corisa coleoptrata* Fab. Eger, Tümpel. Mai, Juni.
C. Geoffroyi Leach. Franzensbad. Juli.
C. Linnei Fieb. mit folgender.
C. nigrolineata Fieb. Gschirrgartenweiher. Juli.
C. falleni Fieb. Königswarter Weiher. Juli.
 6 *C. fossarum* Leach. Stein und Eger; Tümpel. Juli.

Fam. Notonectidae.

- 1 *Notonecta Fabricii* Fieb. (glauca L.) Häufig um Eger und Franzensbad in Tümpeln. Juni.

Fam. Nepidae.

- Nepa cinerea* L. Sehr häufig um Eger, besonders in der Eger. Mai, Juni.
- 2 *Ranatra linearis* L. Ein ♂ bei Franzensbad. Juni.

Fam. Naucoridae.

- Naucoris cimicoides* L. Tümpel um Franzensbad nicht selten. Juni.

Fam. Linnobatidae.

- 1 *Linnobates stagnorum* L. In der Eger um Stein und Viadukt zwischen Schilf, nicht selten. Juni.

Fam. Hydroessidae.

- 1 *Velia currens* Fab. an der Eger und bei Franzensbad. Juni.

Fam. Hydrometridae.

- Hydrometra rufoscutellata* Ltr. In einem Tümpel bei Pograth
1 Exempl. Juni.
- H. paludum* Fab. Gschirrgartenweiher. Juni.
- H. thoracica* Schml. Stein und Pograth. Juli.
- H. gibbifera* Schml. Pograth (1 Exempl.) Juli.
- H. lacustris* L. Gemein: Eger, Franzensbad und Königswart. Juni, Okt.
- H. odontogaster* Zett. Eger, einzeln. Juni.
- 7 *H. argentata* Schml. Pograth, Stein und Franzensbad, selten; ♂
zahlreicher. Juni

Fam. Aradidae.

- Aradus depressus* Fabr. Siechenhauswald unter Rinde. Juni.
2. *A. betulae* L. mit voriger, auch bei Königswart. Juli.

Fam. Tingididae.

- Zosmenus capitatus* Wulf. Ramberg, 1 Ex. Juni.
- Agramma lacta* Fall. 1 ♀ am Kammerbüchl. Juni.

- Monanthia grisea* Ger. am Bahndamm bei Pograth gestreift. Juli.
M. cardui L. Auf Dolden und Disteln nicht selten; Königswart,
 Egerthal und Kammerbüchl. Juni, Juli.
M. costata Fab. Auf *Spartium* und *Genista* sowie *Hypericum* zu
 wiederholten Malen: Egerthal, Königswart, Franzensbad. Juli.
M. dumetorum Htch. Auf *Pyrus communis* im Gschirrgarten. Juni.
M. echii Fbr. Gemein, bes. an Bahndämmen in der Umgebung.
 Juni, Juli.
Dictyonota crassicornis Fall. Auf niedrigen Pflanzen, sehr häufig,
 doch einzeln: St. Anna, Kammerbüchl, Königswart. Juli.
Tingis pyri Gff. Auf einem Birnbaum im Gschirrgarten; mehrmals
 auf *Sorbus Aria* beim Schlössl. Juli.
T. maculata Htch. Auf niedrigen Pflanzen am St. Annaberg, auch
 Maria Kulm, doch mehr einzeln. Juni, Juli.
Orthostira cassidea Fall. mit folgender.
O. nigrina Fall. an der Eger gestreift. Juni.
 13 *Campylostira ciliata* Fieb. Egerthal unweit der Waldschenke.
 Juni.

Fam. Microphysidae.

- Myrmedobia coleoptrata* Fall. Am Kammerbüchl gestreift. Juni.
 2 *Zygonotus stigma* Fieb. mehrere ♀ doch kein ♂ beim Wies in
 Waldschlägen. Juni.

Fam. Acanthiadae.

- 1 *Acanthia lectularia* L. Leider zu gemein. Das ganze Jahr.

Fam. Anthocoridae.

- Tetraphleps vittatus* Fieb. Kreuzenstein und Maria Kulm. Juni.
Temnostethus pusillus Htch. Mehrmals am Wege gegen Wies. Juni.
Anthocoris nemoralis Fab. Im Franzensbader Park zahlreich auf
 Uhen und Buchen. Mai, Juli.
A. nemorum L. Gemein in mehreren Abänderungen in der ganzen
 Umgebung. Juni, Juli.
Lyctocoris domesticus Schill. ein paar Mal in Häusern. Juni
Piezostethus rufipennis LDuf. 3 Exempl. im Königswarter Park. Juni.
Triphleps niger Wulff. Häufig auf den Blumen der Bahnravine um
 Eger; auch am Kammerbüchl. Juni, Juli.

- 8 *T. minutus* L. oft zu Dutzenden gestreift, bes. am Viadukt und am Wege nach Maria Kulm; auf Blüten von *Silene inflata* und *Anthyllis vulneraria*. Juni, Juli.

Fam. Ceratocombidae.

- 1 *Ceratocombus muscorum* Fall. In mehreren Stücken in den Nestern von *Lasius niger*. Juni.

Fam. Saldidae.

- Salda orthochila* Fieb. Ein Ex. bei Kammerbüchl auf *Dianthus deltoides*. Juli.
S. saltatoria L. Gemein an feuchten Stellen gegen St. Anna und Maria Kulm. Juni, Juli.
 3 *S. flavipes* Fbr. 1 Ex. bei Wies, unter Rinde mit *Hylecinus piniperda*.

Fam. Leptopidae.

- 1 *Leptopus boopis* Tourc. Egerthal, im Moos einzeln. Oct.

Fam. Reduvidae.

- Plocaria erratica* Fall. 1 Ex. im Cursale zu Marienbad. Juli.
P. vagabunda L. einige Stücke an feuchten Dielen beim Viadukt; ein Ex. in Rinde bei Königswart. Juli.
Pygolampis bifurcata L. Auf Grasboden am Kammerbüchl, gestreift. Juni.
Harpactor iracundus Scop. Auf sonnigen steinigen Hügeln nicht selten: bei Königswart und am Kammerbüchl. Juni, Juli.
H. annulatus L. in 2 Exemplaren bei Königswart auf *Scabiosa columbaria*. Juni, Juli.
Colliocoris pedestris Wolf. Auf Bahndämmen häufig. Juni, Juli.
 7 *Reduvius personatus* L. 2 Ex. in Häusern; 1 aussen im Gassenstaub. Juni, Juli.

Fam. Nabidae.

- Metastemma guttula* Fab. Siechenhaus. Juni.
Nabis brevipennis Hhn. Gemein, bes. auf Bahndämmen und im Graswuchs der Stümpfe bei Maria Kulm. Juni, Juli.

N. brevis Scholz. Häufig, besonders auf Dolden. St. Anna, Pograth, Kulm. Mai-Juli.

N. longipennis Costa. Wie vorige; auch am Kammerbüchl gegen Stein. Juni, Juli.

5 *N. ferus* L. Gemein im ganzen Egerlande. Mai, Juli.

Fam. Pyrrhocoridae.

1 *Pyrrhocoris apterus* L. Gemein, manche Stellen bes. Wegränder geradezu purpurroth färbend, z. B. Viadukt. Mai-Okt.

Fam. Lygaeodae.

Lygaeus saxatilis Scop. Nicht selten an Wegen und auf Bahndämmen, auf Compositen-Stängeln. Juni, Juli.

L. equestris L. Häufiger als vorige, bes. auf Scabiosen. Juni, Juli.

L. militaris Fab. in einigen Stücken am Kammerbüchl. Juli.

Lygaeosoma punctatoguttata Fab. 2 Ex. bei Königswart. Juli.

Nysius thymi Wlf. Am Ramberg nicht zahlreich. Juli.

Plociomerus fracticollis Schill. Franzensbader Moor, gestreift. Juli.

Ophthalmicus grylloides L. bei St. Anna und Königswart zahlreich auf *Stellaria* und *Scleranthus*; auch bei Maria Kulm. Juli.

O. ater Fab. mit vorige, auch am Kammerbüchl. Juni, Juli

Plinthisus pusillus Schlz. 2 Ex. in *Campanula* am Kammerbüchl. Juli.

Drymus silvaticus Fab. Königswart und Kulm auf *Verbascum* in je 2 Expl. Juni.

Ischnocoris pallidipennis Htchff. Am Bahndamme gegen Pograth. Juni.

Megalonotus antennatus Schill. Franzensbad am Moor. Juni.

M. praetextus Htch. Nicht selten auf Wiesen und Blumen bei Königswart, Kammerbüchl und Viadukt. Juni, Juli.

M. chiragra Fab. wie vorige, doch häufiger. Juli.

Stygnus rusticus Fall. Einige Male bei Wies und Königswart. Juni, Juli.

St. sabulosus Schill. wie vorige, und häufiger.

Homalodema ferrugineus L. St. Anna und Stein. April.

Eremocoris erraticus Fbr. je 1 Exemplar bei Wies und Maria Kulm auf *Heracleum spondylium*-Blatt. Juli.

Scolopostethus pictus Schill. Häufig auf Dolden und Graswuchs, Kammerbüchl und Königswart. Juni, Juli.

- Trapezonotus nebulosus* Fall. Auf Dolden bei Pograth. Juni.
T. agrestis Fall. Franzensbad und Kammerhof auf niedrigen Pflanzen.
 Juni.
Ischnotarsus luscus Fab. Zahlreich auf Dolden u. im Laube: Egerthal,
 Wies und Maria Kulm. Juni, Juli.
Microtoma carbonarius Rossi. Kammerbüchl, oftmals und zahlreich.
 Mai, Juli.
Rhyarochromus lynceus Fab. 1 Ex. auf *Centaurea Scabiosa* bei
 Königswart. Mai.
Rh. phoeniceus Rossi. Im ersten Frühling am Kammerbüchl auf
 Aas, in mehreren Stücken; auch auf *Plantago media* und
Lonicera xylosteum-Stämmen. Juni, Juli.
Rh. pini L. Einzeln, gegen St. Anna. Juni.
Rh. vulgaris Schill. im Parke bei Königswart, häufig. Juli.
Rh. pedestris Pz. mit voriger, auch in den Höhlen bei Maria Kulm
 und am Friedhofe. Juli. (Scheinen dem Aasgeruche zu folgen).
Beosus quadratus Fab. 1 Ex. bei Königswart, auf *Verbascum*. Juli.
Ischnorhynchus didymus Zett. Kulm auf Scabiosen. Juli.
Cymus glandicolor Hhn. Königsberg. Juli 1 Ex.
Camptotelus lineolatus Schill. Zahlreich unweit der Salzquelle bei
 Franzensbad. Juni.
 33 *Oxycarenus modestus* Fall. Auf Erlen im Egerthal. Oct.

Fam. Berytidae.

- Neides tipularius* L. Am Kammerbüchl, zahlreich auf niedrigen
 Pflanzen. Juli.
Berytus clavipes Fab. wie voriger; auch bei Königsberg. Juni.
 3 *Metacanthus elegans* Curt. Egerthal 2 Ex. im Gebüsch, auf Nesseln.
 Juli.

Fam. Coreidae.

- Pseudophloeus falleni* Schill. Im Gesträuch bei Pograth, bes. in Cy-
 tissusblüthen. Juni.
Coreus pilicornis Klug. Kammerbüchl in Aas. April.
Bothrostethus decticulatus Scop. Königswart im Park. Juli.
Stenocephalus agilis Scop. Häufig, bes. gegen St. Anna. Juli.
Alydus calcaratus L. Königswart auf Klee; ebenso bei Karlsbad. Juli.

- Chorosoma Schillingi* Schml. Auf Moos bei Maria Kulm. Juli.
- Myrmus myrmiformis* Fall. Königswart am Bahnhof an Halmen. Juli.
- Syromastes marginatus* L. Häufig, auf Scabiosen und Dolden, verfolgt Blattläuse: Ramberg, Stein, Kulm u. s. w. Mai, Juli.
- Verlusia rhombea* L. Königswart auf Rosen. Juli.
- Gonocerus venator* Fab. Königswart u. Kulm, auf Rosen. Juni, Juli.
- Enoplops scapha* Fab. Egerthal und Siechenhaus. Oct.
- Therapha hyosciami* L. An verschiedenen Pflanzen am Bahngraben bei Pograth. Juni.
- Rhopalus Abutilon* Rossi (flavescens) einige Exemplare auf Dolden bei Königswart und Kammerhof. Juni, Juli.
- Rh. crassicornis* L. An Wegpflanzen bei Wies und Siechenhaus, auch Pograth, sporadisch. Juni, Juli.
- Corizus onaculatus* Fieb. Auf niedrigen Pflanzen bei Franzensbad gestreift. Juli.
- C. capitatus* Fab. Gestreift bei Königswart, Wies und Maria Kulm. Juni, Juli
- C. parum punctatus* Schill. An Feldwegen und niedrigen Pflanzen bei Pograth und Königsberg. Juli.
- 18 *Brachycarenum tigrinus* Schill. Siechenhaus im Walde. Juli.

Fam. Phytocoridae.

- Monalocoris filicis* L. Egerthal, gestreift. Oct.
- Bryocoris pteridis* Fall. Gestreift bei Wies. Juli.
- Miris laevigatus* L. Häufig an Felddrainen und auf Dolden im ganzen Gebiete. Juni, Juli.
- M. holsatus* Fab. 3 Ex. gestreift beim Viadukt. Juni.
- Brachytropis calcarata* Fall. Königsberg auf Dolden. Juli.
- Netostira eratica* L. In beiden Varietäten (hell und dunkel) häufig im ganzen Gebiete, auch bei Karlsbad. Juli.
- Lobostethus virens* L. Gestreift bei Königswart. Juli.
- Trigonotylus ruficornis* Fall. Egerthal. Juni, Juli. 3 Ex.
- Acetropis carinatus* Htch. Wies im Walde. ♂ Juli.
- Leptopterna dolabrata* L. In beiden Varietäten untereinander massenhaft und durch Streifen zu Hunderten beim Schloß u. s. w. an niedrigem Krautwuchs, auch bei Karlsbad. Juni, Juli.

- Oncognathus binotatus* Fab. 2 Ex. bei Franzensbad. Juli.
- Camptobrochis falleni* Hhn. Häufig auf Rainfarren beim Friedhofe. Juli.
- C. punctulatus* Fall. Egerthal u. St. Anna auf Heiden. Juni, Juli.
- Homodemus ferrugatus* Fab. beim Viadukt und Schlössl auf *Cerastium*, *Trifolium*, *Potentilla argentea* u. s. w. nicht selten, ebenso Königswart und Karlsbad. Juni, Juli.
- Calocoris striatellus* Fab. Auf *Heracleum spondylium* in 3 Stck. bei Franzensbad. Juni, Juli.
- C. fulvomaculatus* Deg. Auf Gartensträuchern, selten: *Prunus spinosa* 1 Ex. bei Schlössl, *Rubus rubrum* 1 Ex. bei Königswart. Juni, Juli.
- C. affinis* Htch. einzeln am Bahndamm gegen Pograth. Juli.
- C. bipunctatus* Fab. Feldraine auf Dolden, bes. *Daucus carota* und *Falcaria Rivini* beim Schlössl und Franzensbad. Juli.
- C. chenopodii* Fall. Häufig ja gemein auf Schuttpflanzen an Wegen und Rainen. Juni, Juli.
- C. seticornis* Fab. Mehrere Stücke bei Königswart am Bahnhof. Juli.
- Phythocoris ulmi* L. Franzensbad an Hecken mehrmals. Juni.
- P. divergens* Mey. Gestreift auf Bahndämmen um Eger, auch bei Karlsbad. Juli.
- P. populi* L. Königswart am Hügel auf Rosen und Galien in 5 Ex. auch St. Anna 1 Ex. Juli.
- P. tiliae* Fab. Königswart auf Rosen. 2 Ex. Juli.
- Closterotomus bifasciatus* Fab. Auf *Heracleum spondylium* mehrmals, am Bahndamm. Juni, Juli.
- Pycnopterna striata* L. Auf *acer campestre* und *Lonicera xylosteum* im Egerthale. Juni.
- Rhopalotomus ater* L. An sonnigen Stellen, auf Wiesenblumen zahlreich, am Bahndamme und bei Königswart. Juni, Juli.
- Capsus trifasciatus* L. Egerthal auf Gesträuch. Juni.
- C. cappillaris* Fab. Gemein, bes. am Bahndamme und bei Königswart. Juni, Juli.
- Lopus Gothicus* L. Sehr häufig, bes. Königsberg und Kammerbüchl. Juni, Juli.
- Liocoris tripustulatus* Fab. in den verschiedensten Variationen sehr häufig, bes. auf Compositen und Dipsaceen und Umbellaten. Juni, Juli.

- Lygus pratensis* Fab. In mehreren Varietäten (bes. 8 Fieb.) sehr häufig, auf niedrigen Pflanzen bei Pograth, Kammerbüchl, Königswart; auch bei Marienbad. Mai, Juni.
- L. campestris* L. Eben so häufig auf den verschd. Pflanzen. Mai-Juli.
- L. pabulinum* L. Egerthal an Erlen und Weiden, zahlreich, auch im Grase. Mai, Juli.
- Poeciloscytus unifasciatus* Fab. Königswart auf *Rosa arvensis*. Juli
- Hadrodema rubicunda* Fall. Egerthal und Franzensbad, im Gebüsch. Juni, Juli.
- Orthops cervinus* May. Königswart auf *Scabiosa Columbaria*. Juli.
- O. flavovarius* Fab. Gemein in mehreren Abänderungen auf Wiesenblumen, bes. Galien und Scabiosen. Juni, Juli.
- Stiphrosoma leucocephala* L. Auf *Galium erectum* am Kammerbüchl. Juni.
- St. lurida* Fall. Bei Königswart gestreift. Juli.
- Halticus pallicornis* Fab. Häufig am Bahndamme. Juli.
- Cyllocoris histrionicus* L. Hecken in Franzensbad. Juli.
- Globiceps sphegiformis* Rossi. 1 Ex. auf *Centaurea Scabiosa* bei Königswart ein zweites bei Marienbad. Juni.
- Mecomma ambulans* Fall. Maria Kulm 2 Ex. Juli.
- Aetorrhinus angulatus* Fall. Egerthal, geklopft. Juni.
- Litocoris ericetorum* Fall. St. Anna gestreift. Juni.
- Orthotylus flavosparsus* Shb. Auf Ruderalplätzen bei Franzensbad. Juli. 2 Ex.
- O. nassatus* Fab. Egerthal und Königsberger Park. Juli.
- Heterotoma meriopterus* Scop. Egerthal. Juli.
- Heterocordylus tumidicornis* Htch. Am sog. Galgenbühl auf Scabiosen gestreift. 1 Ex. Juni.
- H. leptocerus* Kbm. mit folgendem
- H. unicolor* Hhn. Bei Wies und bei Schlada. Juli.
- Orthocephalus saltator* Hhn. St. Anna und Maria Kulm; einmal in Gewalt einer *Dolomedes*-Art. Juni, Juli.
- O. mutabilis* Fall. Bei Franzensbad. Juni.
- O. Panzeri* Fieb. Bei Karlsbad ♂. Juli.
- Atractotomus oculatus* Kbm. 2 Ex. bei Königswart auf Brennesselblättern. ♂ ♀. Juli.
- Brachyarthrum pinetellum* Zett. Auf jungen Tannen bei Wies mit *Hylurgus piniperdus*. Juni.

- Criocoris crassicornis* Hhn. St. Anna, gestreift. Juli.
- Plagiognathus arbustorum* Fab. In mehreren Abänderungen gestreift :
Königswart, Pograth und Egerthal. Juli.
- P. viridulus* Fall. Auf Rosensträuchen bei Maria Kulm. Juli.
- Apocremus ambignus* Fall. Auf Birken bei St. Anna, an Stamm und
Blättern nicht selten. Juli.
- A. variabilis* Fall. Kammerbüchl, gestreift. Juli.
- Psallus sanguineus* Fab. 1 Ex. auf *Salix purpurea*, in Egerthal ge-
streift. Juni.
- Ps. roseus* Fab. Egerthal, auf *Lonicera xylosteum* L. Juni.
- Agalliaestes evanscens* Boh. Mehrmals bei Königswart gestreift. Juni.
- A. saltitans* Fall. Häufig, im niederen Graswuchs bei St. Anna, Kulm
und Karlsbad. Juli.
- A. pulicarius* Fall. Mehrmals gestreift : Pograth. Juni.
- Malthacus caricis* Fall. Sehr zahlreich am Franzensbader Torfmoor.
Juni.
- Camaronotus clavatus* L. Egerthal geklopft. Juni.
- Phylus melanocephalus* L. mit folgender
- Ph. coryli* L. nicht selten auf Haselnuss- und Erlengesträuch im
Egerthale und bei Pechtersreuth. Karlsbad. Mai, Juni.
- Amblytylus albidus* Hhn. 1 Ex. bei Pograth auf *Spartium scopar-
ium*. Juni.
- Macrocolens molliculus* Fall. 1 Ex. am Bahndamm bei Pograth ge-
streift. Juni.
- Malacocoris chlorizans* Block. ebendaher 1 Ex.
- Systellonotus triguttatus* L. St. Anna auf *Calluna*, gestreift. Juni.
- 76 *Dicyphus errans* Wlf. Auf Wiesenpflanzen, bes. *Carex* im Moor
bei Franzensbad. Juli.

Fam. Micropeltidae.

- Sastragala ferrugator* Fab. Auf Rosen und *Ribes rubrum* selten :
Maria Kulm und Königswarter Bahnhof je 1 Ex. Juli.
- Acanthosoma haemorrhoidalis* L. Auf Buchenhecken und Birken in
Franzensbad und St. Anna. Juni.
- Cybstethus lituratus* Fab. Kreuzenstein auf Wachholder. Juni.
- Elasmostethus dentatus* Deg. Auf Birken und Erlen nicht selten :
Franzensbad, St. Anna, Königsberg. Juni.

- E. griseus* L. wie vorige.
- Rhapigaster griseus* Fbr. wie vorige; gestreift. Juni, Juli. 2 Ex.
- Tropicorus rufipes* L. Sehr häufig, selbst in Häusern und in Gassen der Stadt angetroffen; verfolgt Blattläuse. Juni, Juli.
- Rhacostethus lunatus* L. 1 ♀ auf *Centaurea Scabiosa* bei Königsberg. Juli.
- Eusarcoris aeneus* Scop. 2 Ex. auf *Rosa arvensis* bei Königsberg. Juli. —
- Mormidea baccharum* L. Sehr häufig auf Stengeln und Blüten, bes. Dolden in der ganzen Umgebung; auch bei Karlsbad. Juni, Juli.
- M. nigricornis* Fab. in vielen Var. gemein auf Dolden und Bäumen. Larven gesellig zu Hunderten an Distelstängeln im Königsberger Park und beim Schloß in den verschiedensten Grössen: 1 mm. 8 mm. im Juni.
- M. Lynx* Fab. 1 Ex. bei Pograth gestreift. Juli.
- Pentatoma pinicola* Muls. Egerthal an einer Stelle zahlreich auf Tannen. Juli.
- P. juniperi* L. Kreuzenstein auf *Juniperus*, auch auf *Corylus* und *alnus* mehrmals. Juli.
- Cimex vernalis* Wlf. Auf *Heracleum Spondylium* 2mal bei Pograth. Mai.
- C. prasinus* L. Nicht selten, bes. auf Dolden, Königswart und Pograth. Mai–Juli.
- C. dissimilis* Fab. Ungleich häufiger: Stein, Franzensbad, St. Anna, und Karlsbad. Juni, Juli.
- Strachia festiva* L. Selten; auf Raps gegen Pograth und Franzensbad. 2mal. Juli.
- St. ornata* L. Ebenso selten, wie vorige. Juli.
- St. oleracea* L. Die gemeinste Art dieser Gattung und der gemeinsten dieser Ordnung. Mai, Aug.
- Zicrona coerulea* L. Auf Rosen und *Rubus*-Arten nicht besonders selten: bei Königswart, Franzensbad und Maria Kulm. Mai, Juni.
- Jalla dumosa* L. 2 Exemplare bei Königsberg gestreift; auf *Centaurea Scabiosa*. Juli.
- Rhacognathus punctatus* L. St. Anna und Pechtersreuth auf Birken und Erlen nicht selten. Juli.

- Arma custos* Fab. 1 Ex. auf einer Distel beim Schlössl. Juli.
Picnomerus bidens L. St. Anna auf Birken; Wies auf Erlen nicht selten. Juli.
Podops inunctus Fab. Am Kammerbüchl und bei Königswart je 1 Exempl. gestreift; ein 3. auf Nessel am Friedhof. Juni.
Aellia acuminata L. Auf Aeckern und Wiesen im ganzen Gebiete sehr häufig. Juni, Juli.
A. pallida Küst. mit folgender
A. Burmeisteri Küst. bei Königswart und Franzensbad gestreift. Juni, Juli.
Platysolen inflexus Wlf. Ziemlich häufig auf versch. Wiesenpflanzen bes. Dolden und Compositen; Kammerbüchl und Königswart. Juni.
Scicoris umbrinus Wlf. Kammerbüchl auf Scabiosen. 1 Ex. Juli.
 32 *S. terreus* Schrk. 2 Ex. am Kammerbüchl und bei Königswart. Juli. —

Fam. Cydnidae.

- Brachypelta aterrima* Forst. 2 Ex.; Pograth und Kammerbüchl auf *Potentilla argentea*. Juli.
Cydnus flavicornis Fab. 1 Ex. auf *Centaurea Scabiosa* bei Königswart. Juli.
C. nigrita Fab. Mehrmals bei St. Anna, Kulm und Königswart; auch bei Karlsbad. Juli.
Corimelaena scarabaeoides L. Auf Grasboden mehrmals gestreift; Pograth, Königswart und Franzensbad. Juni, Juli.
Gnathoconus albomarginatus Fbr. ein Ex. bei Königswart.
Schirus morio L. Auf versch. Pflanzen bes. *Heracleum spondylium* ziemlich häufig im ganzen Gebiete. Juni, Juli.
S. biguttatus L. St. Anna im Heidekraut. 2 Ex. Juli.
S. bicolor L. bei Pograth einige Male in Rosen; auch auf *Rubus fruticosus*. Mai.
 9 *S. 6 maculatus* Fbr. Ziemlich häufig, bes. auf Umbelliferen und Corymbosen: Pograth, Franzensbad und Karlsbad. Mai, Juli.

Fam. Tetyridae.

- Eurygaster hottentotus* Fab. Einzeln doch nicht selten und leicht zu beobachten auf Nesseln und Gesträuch im Gebiete. Mai, Juli.

- E. maurus* Fab. wie vorige, doch häufiger und wechselnder in Grösse
u. Farbe: Königsberg, Galgenbüchl, Karlsbad u. s. w. Juni, Juli.
- Graphosoma lineata* L. 1 Ex. auf *Rosa canina* bei Franzensbad. Juli.
- Ancyrosoma albolineata* Fbr. 1 Ex. bei Königsberg auf Distel. Juli.
- Psacasta Allionii* Gmel. Auf *Betula* im Franzensbader Park. 1 Ex. Juli.
- Odontotarsus grammicus* L. Am Bahndamme gegen Pograth nicht
sehr selten, bes. auf *Hieracium pilosella*. Juni, Juli.
- 7 *Odontoscelis fuliginosus* L. 2 Ex. Am Bahndamm bei Pograth
auf Disteln. Juli.

Fam. Arthropteridae.

- 1 *Coptosoma globus* Fabr. Mehrmals gestreift, bes. auf Klee. Juni, Juli.

B. Rh. homoptera.

Fam. Membracidae.

- Centrotus cornutus* Fbr. Wies: *Pteris aquilina*, Juni 1 Ex.
- 2 *Gargara genistae* Fbr. Königswart, Juli. 1 Ex.

Fam. Fulgoridae.

- Tettigometra virescens* Puz. Viadukt, Kammerbüchl. Juni. Juli.
- Myndus* (*Entithena* Fb. cf. Kschb.) *musivus* Grm. Stein 1 Ex. Juli.
- Cixius nervosus* L. Wies, Kammerbüchl und St. Anna. Juli.
- C. contaminatus* Grm. (*pilosus* var. *cont.* cf. Fieb.) Wies, Viadukt. Juli.
- Dictyophara europaea* L. Viadukt, Franzensbad, Wies; selten. Juli.
- Issus coleoptratus* Fbr. Schr häufig: Viadukt, Kammerbüchl, Wies
und Franzensbad, Königswart und Karlsbad. Juni, Juli.
- Asiraca clavicornis* Ltr. Einzel, Siechenhaus und Viadukt. Juni.
- Stenocranus lineolus* Gez. (*Delphax latifrons* Boh. Kschb.) Viadukt.
1 Ex. Juli.
- Kelisia guttula* Grm. (*Delphax gutt.* Kschb.) Franzensbad u. Wies. Juli.
- Delphacinus mesomela* Boh. (*Delphax mes.* Kschb.) Stein und Via-
dukt. Juli.
- Chloriona glaucescens* Fieb. Königswart. Juni.
- Conomelus limbatus* Fbr. (*Delphax limb.* Kschb.) Maria Kulm,
Stein. Juli.
- Liburnia elegantula* Boh. (*Delphax el.* Kschb.) Stein und Viadukt. Juli.

- L. distinguenda* Kschb. (Delphax dist. Kschb.) Viadukt, Schlössl, Franzensbad, Juli.
- L. collina* Boh. (Delphax coll. Kschb.) mit voriger. Juni.
- L. striatella* Fall. (Delphax str. Kschb.) St. Anna, Stein. Juli.
- L. sordidula* Stal. (Delphax sord. Kschb.) Franzensbad, Pograth. Juli.
- L. leptosoma* Flor. (Delphax albolimbata Kschb. ♂) mit voriger; auch bei St. Anna. Juli.
- L. cognata* Fieb. (Delphax obsoleta Kschb.) Königswart, Franzensbad. Juli.
- L. exigua* Boh. (Delphax ex. Boh.) Franzensbad. Juli.
- L. spinosa* Mink. (Delphax ferruginea Kschb.) St. Anna, Kammerwald. Juli.
- L. pellucida* Fall. (Delphax dispar et dubia Kschb.) Siechenhaus und Franzensbad. Juni, Juli.
- L. hyalinipennis* Stal. Franzensbader Torfmoor. Juni.
- Dicranotropis hamata* Boh. (Delphax ham Kschb.) Franzensbad. Juli.
- Stiroma pteridis* Gene. (Ditropis pt. Kschb.) Wies u. Kammerbüchl. Juli.
- 26 *St. bicarinata* Htch. (Ditropis bic. Kschb.) St. Anna, Maria Kulm. Juli, Aug.

Fam. Cecropida.

- Lepyronia coleoptrata* L. (*Ptyelus angulatus* Fbr.) nicht selten auf Grasboden und im Gebüsch. Juni, Juli.
- Aphrophora salicis* DG. Franzensbad und Egerthal, nicht selten. Juli.
- A. alni* Fall. mit voriger; Königswart. Juli.
- A. corticea* Grm. St. Anna und Wies. 2 Ex. Juli.
- Philaenus* (*Ptyelus* Lep. Kschb.) *lineatus* L. Stein u. Franzensbad. Juli.
- Ph. campestris* Fall. Stein. Juli 1 Ex.
- 27 *Ph. spumarius* L. Sehr häufig in vielen Varietäten, überall auf Grasplätzen. Mai-Juli.

Fam. Ulopidae.

- 1 *Ulopa reticulata* Fbr. (*Ulopa obtecta* Fall.) St. Anna u. Egerthal. Juli.

Fam. Paropidae.

- 1 *Megophthalmus* (*Paropia* Grm. Kschb.) *scanicus* Fall.: Wies und Franzensbad. Juni, Juli.

Fam. Scaridae.

1 *Ledra aurita* L. nicht selten um Wies, Franzensbad, Königswart und Ramberg. Juni, Juli.

Fam. Jassidae.

Idiocerus Germari Fieb. (*Bythoscopus crenatus* Ger.) Franzensbad.
1 Ex. Juli.

J. adustus Htch. (Id. *Herrichii* Kschb.) Siechenhaus, Kammerbüchl, Stein. Juli.

J. notatus Htch. (Id. *larvatus* Kschb.) Stein, Franzensbad. Juli.

J. tremulae Esth. Siechenhaus, Franzensbad. Juli.

J. varius Fabr. Pograth in Sümpfen. Juli.

J. laminatus Fbr. mit *tremulae*; Juli.

J. populi L. Siechenhaus; Juli.

J. confusus Fbr. Siechenhaus, Wies, Franzensbad; Juli.

Macropsis lanio L. Ramberg und Königswart. Juli.

Bythoscopus fruticalus Fall. (*Pediopsis fr.* Kschb.) Kammerbüchl und Siechenhaus. Juli.

Pediopsis scutellata Boh. (*diadema* Kschb.) Siechenhaus, Pograth. Juli.

P. nassata Grm. Schlössl, Kammerbüchl. Juni.

P. virescens Fbr. Gemein auf Grasbogen. Juni.

Agallia venosa Grm. Siechenhaus, Maria Kulm. Juli.

Penthimia atra Fbr. mit *Ledra aurita*; auch am Kammerbüchl. Juli.

Tettigonia viridis L. Gemein auf Wiesen: Viadukt, Stein, Kammerbüchl, Königswart. Juni, Juli.

Enacanthus interruptus L. Nicht selten auf Wiesen bei Wies, Kammerbüchl und Königswart. Juni, Juli.

E. acuminatus Fbr. Seltener als vorige: Viadukt; Juni, Juli.

Eupelix cuspidata Fbr. Franzensbad 1 Ex. Juni.

Strongylocephalus agilis Fall. (*Acocephal.* Kschb.) Hinter St. Anna. Juli.

Acocephalus rusticus Fbr. Häufig; Siechenhaus, Egerthal, Kammerbüchl, Stein. Juni, Juli.

A. albifrons L. (*dispar* Zett. Kschb.) wie vorige und mit ihr

A. rivularis Grm. Pograth. 1 Ex. Juli.

A. polystolus Fieb. (var. *confusus* Kschb.) Franzensbad, Königswart. Juli.

Selenocephalus obsoletus Grm. (*Jassus* Kschb.) St. Anna, Königswart. Juli.

- Gnathodus punctatus* Thnbg. (Jassus Kschb.) Pechtersreuth, Stein und Maria Kulm auf Sumpfboden. Juli.
- Cicadula 6 notatus* Fall. (Jassus Kschb.) Gemein auf Grasplätzen im ganzen Gebiete. Juni, Juli.
- C. punctifrons* Fall. Häufig: Viadukt, Pograth, Siechenhaus. Juni, Juli.
- Grypotes puncticollis* Htch. (Jassus Kschb.) Häufig: Viadukt, Egerthal, Pograth, Stein. Juli.
- Doratura stylata* Boh. (Jassus Kschb.) Königswart. Juli. 1 Ex.
- Thamnotettis abietina*. (Jassus Kschb.) Fall. Siechenhaus. Juli 1 Ex.
- Th. cruentata* Puz. Siechenhaus. 1 Ex. Juli.
- Th. virescens* Fall. Häufig an Grasstellen im ganzen Gebiete. Juni, Juli.
- Th. 4 notata* Fbr. Häufig, auch mit voriger.
- Th. fenestrata* Htch Siechenhaus, Juli.
- Th. crocea* Htsch. (oxypterus Kschb.) Franzensbad auf Seygen. Juli.
- Th. attenuatus* Grm. (croceus Kschb.) mit voriger. Juli.
- Th. ventralis* Fall. Franzensbad. Juni.
- Athysanus argentatus* Fbr. (Jassus Kschb.) Viadukt, Pograth und Franzensbad. Juni, Juli.
- A. impictifrons* Boh. (sulphureus Kschb.) Siechenhaus 2 ♂. Juli.
- A. subfuscus* Fall. mit 2 guttatus.
- A. quadrum* Boh. Stein 1 Ex. auf Nessel. Juni.
- A. plebejus* Zett. Häufig: Stein, Wies, Franzensbad. Juni, Juli.
- A. sordidus* Zett. (confusus Kschb.) mit argentatus, doch seltener. Juli.
- A. biguttatus* Fbr. Siechenhaus, Wies. Juli.
- A. striatulus* Fall. Kammerbüchl. Juni. 1 Ex.
- A. palleus* Zett. Franzensbad. Juni. 1 Ex.
- A. simplex* Htch. (prasinus Kschb.) Königswart, Stein. Juli.
- A. variegatus* Kschb. Häufig mit 2 guttatus, Viadukt u. Schlössl. Juli.
- A. brevipennis* Kschb. Königswart. 1 Ex. Juli.
- Goniagnathus brevis* Htg. (Jassus Kschb.) Stein. 1 Ex. Juli.
- Allygus atomarius* Grm. (Jassus Kschb.) Viadukt u. Königswart. Juli.
- A. mixtus* Grm. St. Anna, Wies, Maria Kulm. Juli.
- Platymetopius undatus* DG. (Jassus Kschb.) St. Anna. Juli.
- Deltocephalus formosus* Boh. (Jassus Kschb.) Stein und Pograth. Juli.
- D. socialis* Flor. Stein und Schindelhau. Juli.
- D. ocellaris* Fall. Mühlbach und Pechtersreuth. Juli.
- D. distinguendus* Flor. (pseudocellaris Flor.) nicht selten: Franzensbad, Bahndamm gegen Waldsassen. Juli.

- D. pulicaris* Fall. Stein und Egerthal. Juli.
D. striatus L. Königswart, Siechenhaus und Stein. Juni, Juli.
D. collinus Dhlb. mit folgender, zahlreicher.
D. cephalotes Htch. (*citrinellus* Kschb.) Viadukt und Stein. Juni
J. Minki Fieb. (*pascuellus* Kschb.) Stein auf *Scabiosa Columbaria*.
 Juli.
Alebra albostriella Fall. (*Typhlocyba* Kschb.) Stein u. Schlössl. Juni.
Notus aureolus Fabr. (*Typhlocyba* Kschb.) Königswart. Juli.
N. flavipennis Fabr. Maria Kulm, Wiesensämpfe. Juni.
Chlorita flavescens Fabr. (*Typhlocyba* Kschb.) Sehr häufig bei Franzensbad und Schlössl. Juli.
Ch. viridula Fall. Königswart und Stein. 3 Ex. Juli.
Kybos smaragdulus Fall. (*Typhlocyba* Kschb.) Stein, Siechenhaus u. Kammerbüchl, ziemlich zahlreich. Juli.
Typhlocyba pulchella Fall. Ramberg. Juli. 1 Ex.
T. aurata L. Kammerbüchl. Juli.
T. stellulata Bur. Ramberg auf „Jasmin.“ Juni.
T. carpini Four. (*picta* Kschb.) Franzensbad auf Erlen. Juli.
T. vittata L. mit voriger.
T. urticae Fbr. Häufig bei Schlada gegen Sandau am Bahndamm, Königswart und auf Hopfen bei St. Anna. Juli.
T. Curtisi Flor. Pograth. 1 Ex. Juni.
Anomia Rosae L. Fbr. (*Typhlocyba* Kschb.) Gemein in Gärten auf Ziersträuchen. Mai, Juli.
A. geometrica Schrk. Wies auf Moos. Juni.
A. ulmi L. Egerthal und Franzensbad im Gesträuch. Juli.
A. 6 punctata Fall. (*T. 10 punctata* Fall.) Stein u. Wies. Juni, Juli.
Zygina parvula Boh. (*Typhlocyba* Kschb.) Pograth und Wies auf Sumpfboden. Juni.
Z. blandula Rossi. St. Anna und Stein. Juli.
 83 *Z. alneti* Dhl. Egerthal. Juni, Juli.