

# Verzeichniss

der im

## Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten nebst deren Volksnamen und Standorten bez. Fundorten

Anton Schott.

### Cryptogamae vasculares.

#### I. Familie. **Equisetaceae.**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Equisetum L. | 1. silvaticum L. Zinnkraut. So ziemlich im ganzen Gebiete in feuchten Fichten- und Tannenwäldern.<br>2. arvense L. Ueberall a. feuchten Aeckern.<br>3. maximum Orth. Hier und da in Waldsümpfen.<br>4. palustre L. Zinnkraut.<br>5. ramosissimum Desf. Oefter zu finden. |
|-----------------|--|

#### II. Familie. **Lycopodiaceae.**

- |                  |   |
|------------------|---|
| 2. Lycopodium L. | 6. Selago L. Ossawälder, Seewand Ueberhaupt in höher gelegenen feuchten Wäldern, meist überall.<br>7. clavatum L. Lauskraut. Gemein.<br>8. inundatum L. Mucken-, Ossa-, Arberwälder u. a. O.<br>9. annotinum L. Hochgebirgswälder.<br>10. complanatum L. Nicht selten in hochgelegenen Wäldern.<br>11. alpinum L. Am Arber. |
| 3. Isoëtes L.    | 12. lacustris L. Im Schwarzen und Teufelssee.   |

### III. Familie. **Polypodiaceae.**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 4. Polypodium L.      | 13. vulgare L. Steinwurzel. In Fels-spalten am Hochbogen, Ossa, Keiters-berg, Kienberg u. a. O.             |
| 5. Polystichum Rth.   | 14. Phegopteris L. In den Vorbergen.  |
| 6. Aspidium R. Br.    | 15. Filix mas Rth. Häufig.  |
| 7. Asplenium L.       | 16. montanum Rth. Selten.   |
| 8. Blechnum L.        | 17. Thelypteris Rth. Seewand. Auf Wald-wiesen des nördl. und Torfwiesen des mittleren u. südlichen Theiles. |
| 9. Pteris L.          | 18. Lonchitis L. Bei Hatzles (bei Fried-berg) an einem steinigen Süd-hange.                                 |
| 10. Struthiopteris W. | 19. Trichomanes L. In Fels- u. Mauer-spalten im ganzen nördl. Theile.                                       |
|                       | 20. septentrionale Hoffm. Bei Hinter-häuser, weisse Riegeln bei Mücken-hof u. a. O.                         |
|                       | 21. Spicaut Rth. Mückenwälder, Ossa-wälder, Arberwälder u. a. O.  |
|                       | 22. aquilina L. Gemein.   |
|                       | 23. germanica Wld. In den Ossa- und Arberwäldern, am Kubani u. a. O.  |

### IV. Familie. **Ophioglossaceae.**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 11. Botrychium Sw. | 24. Lunaria L. Eberwiese bei Hinter-häuser, bei Krummau. |
|                    | 25. rutaefolium A. Br. Um Aussergefiedel.                |

## Phanerogame.

### A. **Gymnospermae.**

### V. Familie. **Coniferae.**

- |               |   |
|---------------|---|
| 12. Abies DC. | 26. pectinata DC. *)  |
|               | 27. excelsa DC.   |
|               | 28. Var. $\alpha$ , viminalis. In einigen Exemplaren an der Seebachstrasse. |

\*) Wo keine Fund- bzw. Standortsbezeichnung steht, bedeutet dies das mehr, minder häufige Vorkommen der betr. Species im Gebiete.

- |                  |  |
|------------------|--|
| 13. Larix DC.    | 29. europaea DC.   |
| 14. Pinus L.     | 30. silvestris L. Föhre.<br>Laricio Poir.                                    |
|                  | 31. Var. $\alpha$ nigricans Host. Bei Obermoldau.                            |
|                  | 32. montana Mill. Unter der Arberspitze<br>u. a. O.                          |
|                  | 33. Var. $\alpha$ . uncinata Ramd. In den Torf-<br>mooren.                   |
|                  | 34. $\beta$ . Pumilio Hke. An den Seen.                                      |
| 15. Juniperus L. | 35. Strobus L. Angepflanzt; z. B. im<br>Rantscherwalde.                      |
|                  | 36. communis L. Kronwitt Sehr häufig<br>im nördl Theile.                     |
|                  | 37. Sabina L. Segelbaum. Angepflanzt<br>und verwildert bes. im südl. Theile. |

## B. Monocotyledoneae.

### VI. Familie: **Lemnaceae**.

- |              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 16. Lemma L. | 38. minor L. Teiche in den Vorbergen. |
|--------------|---------------------------------------|

### VII. Familie. **Najadeae**.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 17. Najas L.       | 39. minor All. Im Langenbrucker Teiche.                            |
| 18. Zanichellia L. | 40. palustris L. In Teichen der Vor-<br>berge; auch in der Moldau. |

### VIII. Familie. **Potamogetoneae**.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 19. Potamogeton L. | 41. lucens S. Bei Krumnau.                          |
|                    | 42. natans L. Um Bystritz; auch bei<br>Schwarzbach. |

### IX. Familie. **Aroideae**.

- |              |   |
|--------------|---|
| 20. Calla L. | 43. palustris L. Soll bei Krummau<br>wachsen. |
|--------------|---|

### X. Familie. **Typhaceae**.

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 21. Sparganium L. | 44. ramosum L. Um Hofenfurth, bei der<br>Kiemühle. |
|                   | 45. affine Schnitzl. Im Schwarzen See.             |

### XI. Familie. **Gramineae**.

- |               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 22. Nardus L. | 46. stricta L. Burstling Gemein. |
|---------------|----------------------------------|

23. *Lolium* L.
24. *Bradypodium* P. B.
25. *Agropyrum* P. B.
26. *Elymus* L.
27. *Bromus* L.
28. *Festuca* L.
29. *Cynosurus* L.
30. *Triodia* R. Br.
31. *Molinia* Mch.
32. *Dactylis* L.
47. *temulentum* L. Hammerl. Gemein  
auf Feldern.
48. Var.  $\beta$  *speciosum* Stev.
49.  $\gamma$  *arvense* With.
50. *silvaticum* P. B. Hier und da.
51. *repens* P. B. Schosswürze. Gemein.
52. *caninum* R. Sch. Oefters vorkommend.
53. *europaeus* L.
54. *secalinus* L. Dür.
55. Var.  $\alpha$ . *vulgaris*.
56.  $\beta$ . *grossus* Desf.
57. *mollis* L.
58. *racemosus* L.
59. *patulus* M. K.
60. *commutatus* Schrad.
61. *arvensis* L.
62. *asper* Murr.
63. *sterilis* L. Soltener.
64. *tectorum* L. Meist in den Vorbergen  
auf Strohdächern.
65. *amethystina* L. Um Hohenfurth,  
Sarau.
66. *ovina* L.
67. Var.  $\alpha$ . *vulgaris* Koch.
68.  $\beta$ . *duriuscula* L.
69. *rubra* L.
70. *drymeja* M. K.
71. *silvatica* Vill.
72. *gigantea* Vill.
73. *elatior* L.
74. *arundiacea* Schreb. In den Moldau-  
auen.
75. *cristatus* L. Gemein.
76. *decumbens* P. B. Kieferwälder der  
Vorberge.
77. *coerulea* Mnch. Torfmoore.
78. *altissima* Host. Torfmoore, moorige  
Wälder; selten.
79. *glomerata* L. Gemein.

33. *Melica* L.  
 34. *Briza* L.  
 35. *Poa* L.  
 36. *Sclerochloa* P. B.  
 37. *Catabrosa* P. Br.  
 38. *Koeleria* P  
 39. *Holeus* L.  
 40. *Avena* L.  
 41. *Aira* L.  
 42. *Milium* L.  
 43. *Agrostis* L.  
 44. *Calamagrostis* Rth.  
 45. *Phragmites* L.  
 46. *Alopecurus* L.  
 47. *Phleum* L.  
 48. *Anthoxanthum* L.  
 80. *nutans* L. Holletitz, Zwiesel, Hohen-  
     furth u. a. O.  
 81. *picta* C. Koch. Vorberge; häufiger.  
 82. *media* L. Scheppel.  
 83. *compressa* L.  
 84. *sudetica* L.  
 85. *bulbosa* L.  
 86. *alpina* L.  
 87. *annua* L.  
 88. *pratensis* L.  
 89. *nemoralis* L.  
 90. *trivialis* L.  
 91. *fertilis* Host.  
 92. *dura* P. B. Seltener.  
 93. *aquatica* P. B. Seltener.  
 94. *cristata* P.  
 95.     Var.  $\beta.$  *gracilis* Koch.  
 96.      $\gamma.$  *montana* Hausm.  
 97. *lanatus* L.  
 98. *flavescens* L. Seltener.  
 99. *fatua* L. Thauhafte.  
 100. *flexuosa* L.  
 101. *caespitosa* L.  
 102. *effusum* L. Vorberge  
 103. *vulgaris* L.  
 104. *stolonifera* L. Vorberge.  
 105. *spica venti* L.  
 106. *canina* L.  
 107. *lanceolata* Rth.  
 108. *arundiacea* Rth.  
 109. *communis* Trin. Vorberge.  
 110. *agrestis* L. Um Schüttenhofen und  
       Krummau.  
 111. *pratensis* L.  
 112. *geniculatus* L.  
 113. *fulvus* Sm.  
 114. *Boehmeri* Wib. Selten.  
 115. *pratense* L.  
 116. *odoratum* L.

49. Baldingera Fl. Wett. 117. arundinacea Dum. Moldauufer bei Kienberg u. a. O. zerstreut.  
 118. Var.  $\beta.$  vittata W. Fürtuch-bandln. Im nördl. Theile cultivirt und verwildert.

### XII. Familie. **Cyperaceae.**

50. Carex L. 119. pulicaris L.  
 120. muricata L.  
 121. Var.  $\alpha.$  densa Neilr.  
 122.  $\beta.$  interrupta Neilr.  
 123. teretiuscula L.  
 124. remota L.  
 125. echinata Murr.  
 126. elongata L.  
 127. canescens L.  
 128. acuta L.  
 129. vulgaris Fr.  
 130. Buxbaumii Whlbg.  
 131. flacca Schreb.  
 132. supina Whlbg.  
 133. pilulifera L.  
 134. silvatica Huds.  
 135. flava L.  
 136. filiformis L.  
 137. rostrata With.  
 51. Helleocharis R. Br. 138. palustris R. Br. Meist in den Vор-bergen.  
 52. Scirpus L. 139. acicularis R. Br.  
 140. caespitosus L. Filze.  
 141. pauciflorus Lightf.  
 142. lacustris L.  
 143. maritimus L.  
 144. silvaticus L.  
 145. alba Vahl. In den Torfmooren.  
 146. alpinum L. Um Hohenfurth, in den Filzen; seltener.  
 147. vaginatum L. Filze.  
 148. angustifolium Roth. Weiher-federn. Gemein.  
 149. latifolium Hppe. Gemein.

55. Cladium R. Br.      150. Mariscus R. Br. Vorberge; sehr selten.  
 56. Cyperus L.      151. flavecens L.  
                         152. fuscus L.

### XIII. Familie. **Irideae.**

57. Iris L.      153. variegata L. Hahnen sichel.  
                         Cultivirt und verwildert.

### XIV. Familie. **Amaryllideae.**

58. Galanthus L.      154. nivalis L. Oefter verwildert.

### XV. Familie. **Alismaceae.**

59. Alisma L.      155. Plantago L. Um Neuern. Holletitz,  
                         Bystritz u. a. O.

### XVI. Familie. **Butomeae.**

60. Butomus L.      156. umbellatus L. Bystritzer Wiesen;  
                         selten.

### XVII. Familie. **Juncagineae.**

61. Scheuchzeria L.      157. palustris L. Torfmoore, seitwärts  
                         der Ahornsäge.  
 62. Triglochin L.      158. palustre L. Torfmoore; seltener.

### XVIII. Familie. **Hydrocharideae.**

63. Hydrocharis L.      159. Morsus ranae L. Teich bei Bystritz.

### XIX. Familie. **Orchideae.**

64. Orchis L.      160. Morio L.  
                         161. mascula L.  
                         162. ustulata L. Vorberge.  
                         163. militaris L.  
                         164. latifolia L.  
                         165. maculata L.  
 65. Gymnadenia R. Br.      166. albida R. Br. Brandwiese b. Mucken-  
                         hof; Hochregion.  
                         167. conopea R. Br. Hinterhäuser, Tau-  
                         scheinöd u. a. O.

66. *Platanthera* Rich.      168. *bifolia* Rich. Falkrikanum  
Hohenfurth  
169. *chlorantha* Custer. Um Neuern,  
Hohenfurth u. a. O.  
170. *Monorchis* R. Br. Ober Kapelle;  
sehr selten.  
171. *rubra* Rich. Um Krummau.  
172. *latifolia* All. Rantscherwald, Mücken-  
wald, Seewand u. a. O.  
173. *ovata* R. Br. Bei Bayereck u. a. O.  
in den Vorbergen.  
174. *cordata* R. Br. Sandhütte, Arber-  
wälder, Mader, Dreisesselberg,  
Schöninger.  
175. *Nidus avis* L. Kieferwald bei  
Holletitz.  
176. *innata* R. Br. Im Rantscherwalde.  
177. *aphyllus* Sw. Am Kubani.

#### XX. Familie. *Juncaceae.*

74. *Luzula* D. C.      178. *pilosa* W. Vorberge.  
179. *silvatica* Gaud. Holzschläge und  
Wälder des nördl. Theiles häufig,  
im südl. Theile seltener.  
180. *angustifolia* Grk. Vorberge.  
181.       Var.  $\alpha$ . *rubella*. Hppe.  
182.        $\beta$ . *fuliginosa* Aschers.  
183. *campestris* DC.  
184. *multiflora* Lej. Wälder des nördl.  
Theiles.  
185. *sudetica* Presl. In d. Torfmooren, bei  
Hurkenthal, Sarau, Kubern u. a. O.  
186. *pallescens* Bess. Vorberge, Kiefer-  
wald bei Holletitz u. Hohenfurth.  
75. *Juncus* L.      187. *trifidus* L. Geisbart. Am Ossa.  
188. *supinus* Mnch. Um Hohenfurth,  
beim schwarzen See.  
189. *compressus* Jcqu. Friedberg,  
Schwarzbach u. a. O.  
190. *obtusiflorus* Ehrh.

75. *Juncus* L.      191. *lamprocarpus* Ehrh.  
                         192. *acutiflorus* Ehrh.  
                         193. *squarrosus* L. Torfmoore, um Mader.  
                         194. *glaucus* Ehrh. Moldauufer.  
                         195. *effusus* L.  
                         196. *filiformis* L. Vorberge, Moldauthal.

## XXI. Familie. **Colchicaceae.**

76. Tolfieldia Huds. 197. calyculata Wahl. Am Schöninger.

## XXII. Familie. Asparageae.



### XXIII. Familie. Liliaceae.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 82. Allium L.       | 204. ursinum L. Bei Eisenstein; selten.<br>205. Schoenoprasum L. Schnittling.<br>Cultivirt und verwildert.  |
|                     | 206. oleraceum L. Wilder Knoblauch. Auf Brachen um Neuern,<br>Neukirchen, Sarau.  |
|                     | 207. rotundum L. Helmhof, St. Catharina,<br>Swinau.   |
| 83. Ornithogalum L. | 208. umbellatum L. Vorberge; sehr<br>selten.  |
| 84. Gagea Salisb.   | 209. lutea Schult. Neuern, St. Catharina<br>u. a. O.  |
| 85. Lilium L.       | 210. pratensis R. Sch. Neuern, Glashütten.<br>211. croceum Chaix. Cult. u. verwildert.<br>212. bulbiferum L. Cult. und verwildert<br>z. B. bei Gromaling.<br>213. Martagon L. Um Hohenfurth, Eleonorenhain u. a. O. |

C. **Dicotyledoneae.**

α. **Apetalae.**

XXIV. Familie. **Ceratophylleae.**

86. *Ceratophyllum* L. 214. *demersum* L. Teiche der Vorberge,  
Langenbrucker Teich.

XXV. Familie. **Hippurideae.**

87. *Hippuris* L. 215. *vulgaris* L. Teiche der Vorberge.

XXVI. Familie. **Callitrichineae.**

88. *Callitriche* L. 216. *stagnalis* Scop. Bäche der Vorberge.

XXVII. Familie. **Salicineae.**

89. *Salix* L. 217. *alba* L.  
218. *fragilis* L. Fellerbaum. Ange-  
pflanzt und wild.  
219. *viridis* Fr. — *fragilis* × *alba*. —  
Häufiger als vorige.  
220. *pentandra* L. Bei Obermoldau,  
Kuschwarda, Oberplan, Schwarz-  
bach u. a. O.  
221. *purpurea* L. Fellerstaude. Bis  
600 m hinauf.  
222. *viminalis* L. Meist angepflanzt.  
223. *cinerea* L.  
224. *aurita* L. Bis über 900 m hinauf.  
225. *grandifolia* Sw. Beinweindl. Be-  
sonders im nördlichen Theile.  
226. *caprea* L. Palmkatzl- oder  
Weindlstaude.  
227. *mytilloides* L. Filze z. B. bei  
Fürstenhut, sehr selten.  
228. *repens* L. Um Hohenf. u. Krummau.  
229. Var. β. *rosmarinifolia*. L. Um  
Hohenfurth; sehr selten.  
90. *Populus* L. 230. *tremula* L. Espe.  
231. *alba* L. Hinter Hohenfurth an der  
Strasse.  
232. *nigra* L.  
233. *pyramidalis* Roz.

XXVIII. Familie. **Betulaceae.**

91. *Alnus* Tourn.                    234. *glutinosa* Gaertn. E r l e.  
     235. *viridis* DC. Um Hohenfurth an der  
     Moldau, Blanskerwald.  
 92. *Betula* L.                        236. *nana* L. Filze bei Aussergefiedl,  
     Fürstenhut, Kuschwarda, Schattawa.  
     237. *alba* L.  
     238.      Var.  $\alpha$ . *pubescens* Ehrh. Filze  
     um Ferchenhaid, Zwiesel  
     u. a. O.  
     239.       $\beta$ . *glabrata* Wk. S c h w a r z -  
     b i r k e. Filze, z. B. bei  
     Kuschwarda, Fürstenhut  
     u. a. O., auch am Plöcken-  
     steinsee.  
     240. *verrucosa* Ehrh.  
     Var.  $\beta$ . *pendula* Hoffm. H e x e n -  
     b i r k e.

XXIX. Familie. **Carpineae.**

93. *Carpinus* L.                    241. *Betulus* L. H a i n b u c h e. Im oberen  
     Moldauthale hier und dort.  
 94. *Corylus* L.                     242. *avellana* L. H a s e l s t a u d e.

XXX. Familie. **Cupuliferae.**

95. *Quercus* L.                    243. *sessiliflora* Sm.  
     244. *pedunculata* Ehrh. Meist nur in  
     Parken.  
 96. *Fagus* L.                      245. *silvatica* L.

XXXI. Familie. **Ulmaceae.**

97. *Ulmus* L.                      246. *campestris* L. Vorberge.  
     247. *montana* Sm. Elm. Bis 900 m hinauf.

XXXII. Familie. **Cannabineae.**

98. *Humulus* L.                    248. *Lupulus* L. Garten- und Uferhecken  
     besonders der Vorberge.

XXXIII. Familie. **Urticaceae.**

99. *Urtica* L.                      249. *urens* L. H a f e r n e s s e l.  
     250. *dioica* L. B r e n n n e s s e l.

### XXXIV. Familie. **Chenopodiaceae.**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 100. Blitum L.      | 251. virgatum L. Bei Krummau.                             |
| 101. Chenopodium L. | 252. Bonus Henricus L. Hundszunge<br>im n. Theil. Gemein. |
|                     | 253. Vulvaria L.  |
|                     | 254. hybridum L.  |
|                     | 255. murale L.  |
|                     | 256. rubrum L. Besond. um Hohenfurth.                     |
|                     | 257. glaucum L. Vorberge.                                 |
|                     | 258. album L.   |
| 102. Atriplex L.    | 259. hastatum L. Vorberge.                                |

### XXXV. Familie. **Amarantaceae.**

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 103. Polycnemum L. | 260. arvense L. Vorberge.       |
| 104. Amaranthus L. | 261. viridis L. Vor Krummau.    |
|                    | 262. silvestris Desf. Vorberge. |

### XXXVI. Familie. **Polygonaceae.**

- |               |  |
|---------------|--|
| 105. Rumex L. | 263. paluster L.   |
|               | 264. Hyarolapathum Huds. Kirchschlag,<br>Krummau.  |
|               | 265. nemorosus Schrad.   |
|               | 266. Var. $\beta$ . sanguineus L.  |
|               | 267. maximus Schreb. Moldauufer bei<br>Hohenfurth.   |
|               | 268. conglomeratus Mnch. Bis gegen<br>900 m hinauf.  |
|               | 269. obtusifolius L.<br>Var. agrestis Fr. Oberhalb<br>Kuschwarda auf Wiesen.                               |
|               | 270. aquaticus L. Zwischen Rosenberg<br>u. Hohenfurth, am Kalschingbache.                                  |
|               | 271. alpinus L. Sehr selten.   |
|               | 272. scutatus L. Bei Krummau.  |
|               | 273. acetosella L. B. auf d. Arbergipfel.  |
|               | 274. acetosa L. Sau erampfer.  |
|               | 275. arifolius All. Am Arber, Falkenstein,<br>Lusen, Dreisesselberg, Hochsichtet,<br>oberhalb Glöckelberg. |



112. *Campanula* L.                    294. *rapunculoides* L. Besonders im nördl. Theile häufig.  
    295. *bononiensis* L. Trockene Wälder d. nördl. Gegenden u. bei Krummau.  
    296. *Trachelium* L. Im Rantscherwalde — meist weiss — um Hohenfurth u. a. O.  
    297. *patula* L. Hier und da.  
    298. *glomerata* L. Frohnleite bei Hohenfurth, Blanskerwald.  
    299. *Cervicaria* L. Tusster Wald.  
 113. *Phyteuma* L.                    299. *spicatum* L. Ossa-, Arberwälder, Filze, b. Kuschwarda, Obermoldau, Salnau, Oberplan, im St. Thomaswalde, in der Teufelsmauer u. a. O.  
    300. Var. *coeruleum*. In der Teufelsmauer bei Hohenfurth, im Blanskerwalde.  
    301. *nigrum* Schm. Rauchfangkehrer. Um Friedberg, Hohenfurth. Eleonorenhain, Kuschwarda auf moor. Wiesen. Fehlt im n. Theile ganz.  
 114. *Jasione* L.                    302. *montana* L.

### XLII. Familie. **Ambrosiaceae.**

115. *Xanthium* L.                    303. *strumarium* L. Um Krummau, aber selten.

### XLIII. Familie. **Compositeae.**

116. *Lampsana* L.                    304. *communis* L. Bis hoch hinauf.  
 117. *Arnoseris* Gaertn.            305. *minima* L. Gemein.  
 118. *Leontodon* L.                    306. *hastilis* Koch.  
    307. Var.  $\alpha$ . *glabratus* Neilr.  
    308.                   $\beta$ . *hispidus* Neilr.  
    309. *autumnalis* L.  
    310. Var.  $\beta$ . *trichocephalus* Neilr.  
    Am Brückl. Tauscheinöd.  
 119. *Picris* L.                      311. *hieracioides* L. Um Leonorenhain.  
 120. *Tragopogon* L.                312. *pratensis* L.

121. *Scorzonera* L.      313. *humilis* L. Vorberge. Z. B. um Winterberg, Krummau, i. Blanskerwalde.
122. *Hypochaeris* L.      314. *hispanica* L. Schwarzwurz. Verwildert.
123. *Achyrophorus* Koch.      315. *glabra* L. Vorberge; seltener.
124. *Taraxacum* Juss.      316. *radiata* L. Bis hoch hinauf.
125. *Willemetia* Neck.      317. *maculatus* Scop. Um Lagau, am Blansker.
126. *Prenanthes* L.      318. *officinale* Wigg. Maiblume, Mai-distel, Maistock.
127. *Lactuca* L.      319. Var.  $\alpha$ . *genuinum* Koch. Gemein.
128. *Sonchus* L.      320.                   $\beta$ . *corniculatum* Neilr. Weiden. Seltener.
129. *Mulgedium* Cass.      321. *palustre* DC. Um Sarau, bei Grün in je einem Exemplare gefunden, dürfte recht selten sein.
130. *Crepis* L.      322. *apargioides* Less. Um Neuern, Stubenbach, Aussergefiedl u. a. moorigen Orten.
131. *Hieracium* L.      323. *purpurea* L. Bis auf den Arber.
324. *muralis* Gaertn. Wie vorige.
325. *Scariola* L. Vorberge.
326. *oleraceus* L.
327. *arvensis* L. Milchdistel.
328. *alpinum* Cass. Am Teufelssee, auf d. Seewand, am Arber, am Plöckenstein, bei Glöckelberg, in d. Filzen.
329. *praemorsa* Tausch. Um Krummau.
330. *virens* L. Vorberge.
331. *tectorum* L.
332. *biennis* L.      ”
333. *succisaefolia* Tsch. Christianberg, Krummau.
334. *paludosa* Mnch. Bis hoch hinauf.
335. *Pilosella* L.
336. *stoloniflorum* W. Kit. Vorb.; seltener.
337. *Auricula* L. Noch am Rachel.
338. *floribundum* Wimm. Grb. Um Furth. Zwiesel.

131. *Hieracium L.*
132. *Eupatorium L.*
133. *Adenostyles Cass.*
134. *Petasites Tourn.*
135. *Homogyne Cass.*
136. *Tussilago L.*
137. *Bellis L.*
138. *Erigeron L.*
139. *Solidago L.*
140. *Pulicaria Gaertn.*
339. *praealtum Koch.* Hinterhäuser,  
Krummau.
340. *aurantiacum L.* Um Aussergefiedl,  
Ahornsäge, Neubrunn, u. a. O.  
Dürfte in und an den „Filzen“  
nicht gerade selten sein.
341. *glaucinum L.* In Holzschlägen hier  
und dort.
342. *gothicum Fr.* Rachel u. Lusen.
342. *murorum L.* Hasenöhrl.
343. *fastigiatum Fr.* In Holzschlägen;  
selten.
344. *silvaticum Lanck.* Wälder d. nördl.  
Theiles.
345. *umbellatum L.* Vorberge.
346. *boreale Fr.* Vorberge.
347. *cannabinum L.* Blanskerwald.
348. *albifrons Rehb.* Bei Stubenbach;  
angeblich.
349. *viridis Cass.* Bei Maidstein, selten.
350. *albus Gaertn.* Im Rantscherwalde,  
Aussergefiedl, am Kubani, b. Kusch-  
warda, Böhmischröhren, Lagau.
351. *alpina Cass.* Im nördl. Theile, häufig  
in hochgelegenen Wältern, im  
südl. seltener; z. B. Plöckenstein,  
Dreisesselberg, St.Thoma, Golitsch,  
Blansker.
352. *Farfara L.* Hufblätter.
353. *perennis L.* Anger-, Gänse-  
blümchen.
354. *acer L.* Im Osserschlage; auch  
anderwärts.
355. *Virga aurea L.* Im Osserschlage, am  
Arber, Rachel, Lusen, Plöcken-  
stein u. a. O.
356. *serotina Ait.* Moldauufer b. Hohen-  
furth, Angelufer u. s. w.
357. *vulgaris Gaertn.* Vorberge.

141. *Inula L.* 358. *Conyza DC.* Carlsburg bei Bergreichenstein, Krummau, Blansker, Adolfsthal u. a. O.
142. *Bidens L.* 359. *salicina L.* An einem Felsen an d. Moldau bei Krummau.
143. *Filago L.* 360. *tripartitus L.* Vorberge.
144. *Gnaphalium L.* 361. *cernus L.* Todtentblüm'l. Geht etwas höher hinauf als voriger.
145. *Artemisia L.* 362. *germanica L.*
146. *Tanacetum L.* 363. *arvensis L.* Vorberge.
147. *Achillea L.* 364. *minima Fr.* Vorberge.
148. *Anthemis L.* 365. *silvaticum L.* Neidkraut. Waldschläge, häufig.
149. *Matricaria L.* 366. *norvegicum Gunw.* Sehr selten.
150. *Leucanthemum L.* 367. *luteo-album L.* Krummau.
151. *Pyrethrum L.* 368. *dioicum L.* Katzenpfötl.
369. *vulgaris L.* Vorberge.
370. *Absynthium L.* Wermut. Cultiv. und verwildert.
371. *vulgare L.* Rainfling. Vorberge. Im Gebirge cultiv. u. verwildert.
372. *Balsamita L.* Frauenblattl. Cultivirt und verwildert.
373. *Ptarmica L.* St. Catharina, Eisenstein, Rosenberg u. a. O.
374. *Nilreichii Kern.* Lagau, Kirchschlag, Höritz.
374. *collina Beck.* Vorberge.
375. *Millefolium L.* Mit weissen u. rothen Strahl. Im inneren Walde häufig.
377. *tinctoria L.* Winterberg, Rosenberg, Krummau; selten.
378. *Cotula L.* Hohenfurth; selten.
379. *arvensis L.*
380. *Chamomilla L.*
381. *vulgare Lam.* Weiss, Johannisklumme.
382. *montanum L.* Kubani.
382. *Parthenium Sm.* Bayereck, Krummau wild; oft cult.

152. *Doronicum* L.
153. *Arnica* L.
154. *Senecio* L.
155. *Cineraria* L.
156. *Serratula* L.
157. *Centaurea* L.
158. *Lappa* Tourn.
159. *Onopordon* L.
383. *Pardalianches* L. Stubenbach.
384. *austriacum* Jcqu. Arberwälder, Mader, Aussergefiedl, Buchwald, Kuschwarda, Böhmischröhren, Kubani, Dreisesselberg, Plöckenstein.
385. *montana* L. Arnika, Hannsblumen.
386. *vulgaris* L.
387. *silvaticus* L. Kleines Geiskraut.
388. *erucifolius* Huds. Vorberge.
389. *Jacobaea* L. Vorberge.
390. *subalpinus* Koch. Am Arbersee, Rachel.
391. *nemorensis* L. Grosses Geiskraut.
392. Var  $\beta$ . *Fuchsii* Gmel. Holzschläge bis hoch hinauf.
393. *crispa* Jcqu. Torfmoore und Torfwiesen, selten.
394. *palustris* L. Langenbrucker Teich.
395. *tinctoria* L. Soll bei Krummau vorkommen.
396. *Jacea* L.  
Var.  $\alpha$ . *vulgaris* Koch. Vorberge.
397.  $\beta$ . *pratensis* Thuil. Höher.
398. *nigrescens* Willd. Südhänge, seltener.
399. *phrygia* L. Moldauwiesen um Hohenfurth u. a. O.
399. *montana* L. B. Hohenfurth, Krummau u. a. O.
400. *axillaris* W. Bei Aussergefiedl.
401. *Cyanus* L.
402. *Scabiosa* L. Geht stellenweise hoch hinauf.
403. *rhenana* Bor. Krummau.
404. *officinalis* All. Klette. Bei Bayereck, St. Catharina.
405. *tomentosa* Lmk. Um Krummau.
406. *Acanthium* L.

160. *Carduus* L.                    407. *nutans* L.  
     408. *acanthoides* L. In d. südl. Vorbergen.  
     409. *Personata* Jcqu.  
 161. *Cirsium* Tourn.                410. *eriophorum* Scop.  
     411. *lanceolatum* Scop.  
     412. *palustre* Scop.  
     413. *heterophyllum* All. Am Schwarzen  
     See, in d. Filzen, bei Obermoldau,  
     Kuschwarda, Böhmischröhren,  
     Salnau, Tusset, auch am Blansker.  
     414. *arvense* Scop. Haferdistel.  
     415. *oleraceum* Scop. Schindlhof in St.  
     Catharina, Schattawa, Leonoren-  
     hain, wahrscheinlich auch ander-  
     wärts.  
     416. *affine* Tausch. — *oleraceum* × *he-*  
     *terophyllum*. — Um Kuschwarda.  
 162. *Carlina* L.                     417. *vulgaris* L. Eberwurz. Häufig im  
     nördl. Theile.  
     418. *acaulis* L. Häufig im südl., seltener  
     im nördl. Theile.

XLIV. Familie. **Dipsaceae.**

163. *Dipsacus* L.                  419. *silvester* Huds. Um Krummau.  
 164. *Knautia* Coult.                420. *silvatica* Duby. Geht bis am Arber  
     hinauf.  
     421. *arvensis* Duby.  
 165. *Succisa* Merl. Koch.        422. *pratensis* Mnch.  
 166. *Scabiosa* L.                  423. *columbaria* L. Leonorenhain u. a.  
     O.; seltener.

XLV. Familie. **Valerianaceae.**

167. *Valeriana* L.                424. *sambucifolia* Mik. Angelthal, Ober-  
     moldau, Oberplan.  
     425. *officinalis* L.  
     426. *dioica* L.  
 168. *Valerianella* Tourn.        427. *olitoria* Mnch. Nicht gerade selten.

XLVI. Familie. **Rubiaceae.**

169. *Sherardia* Dill.              428. *arvensis* L.  
 170. *Asperula* L.                  429. *arvensis* L. Um Furth; selten.

## XLVII. Familie. Lonicereae.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 172. Adoxa L.                 | 445. Moschatellina L. Im Rantscherwalde,<br>bei Hatzles u. a. O.  |
| 173. Sambucus L.              | 446. Ebulus L. In der Umgegend des<br>Schwarzen Sees, bei Eisenstein,<br>Schattawa, Rosenberg, Krummau. |
| 174. Viburnum L.              | 447. racemosa L. Häufiger im nördl.,<br>seltener im südl. Theile.                                       |
| 175. Lonicera L.              | 448. Opulus L. Bei Hohenfurth, Rosen-<br>berg; fehlt im nördl. Theile.                                  |
|                               | 449. coerulea L. Einige Exemplare im<br>Rissloche am Arber.   |
|                               | 450. Xylosteum L. Eleonorenhain,<br>Krummau, Blansker.  |
| 176. Symphoricarpos<br>Adans. | 451. nigra L. Hundsbäre.<br>452. racemosus Mich. Bei Hohenfurth,<br>cultivirt und verwildert.           |

## XLVIII. Familie. Oleaceae.

178. *Fraxinus* L. 454. *excelsior* L. Langeschel. St. Catharina, Hinterhäuser, Hohenfurth, Krummau u. a. O.

### XLIX. Familie. **Asclepiadaceae.**

179. *Vincetoxicum* Mnch. 455. *officinale* Mnch. Kalkfels b. Krummau.

### L. Familie. **Gentianaceae.**

180. *Menyanthes* L. 456. *trifoliata* L. Bitterklee. Um Grün, in den Filzen, bei Schattawa, Friedberg, Hohenfurth u. a. O.  
 181. *Gentiana* L. 457. *germanica* W.  
 458. *amarella* L. Um Seewiesen, Bergreichenstein, Winterberg, Obermoldau, Oberplan, Mader, Blanskerwald.  
 459. *ciliata* L. Um Krummau.  
 460. *Pneumonanthe*. Vorberge des südl. Theiles; selten.  
 461. *cruciata* L. Vogeltenn.  
 462. *pannonica* Scop. Im Arberzuge, auf der Seewand, am Rachel, Lusen, Plöckenstein; b. Eisenstein, Mader, Aussergefiedl, Fürstenhut, Glöckelberg.  
 182. *Erythraea* L. 463. *ramosissima* P. Um Krummau; selten.  
 464. *Centaurium* L. St. Catharina, Frohnleiten bei Hohenfurth u. a. O.

### LI. Familie. **Labiateae.**

183. *Mentha* L. 465. *aquatica* L. Vorberge.  
 466. *piperita* L. Cultiv. und verwildert.  
 467. *silvestris* L.  
 468. Var.  $\beta$ . *viridis* L. Seltener als vorige.  
 469. *rotundifolia* L. Pulsen. Cult. und verwildert.  
 470. *arvensis* L. Wilde Pulsen.  
 471. *palustris* Mnch. Um Schwarzbach.

184. *Lycopus* L. 472. *europaeus* L. Oberplan, Schwarzbach, Unterwuldau.
185. *Salvia* L. 473. *pratensis* L. Vorberge; selten.
186. *Origanum* L. 474. *glutinosa* L. Ottau, Krummau.
187. *Thymus* L. 475. *verticillatta* L. Soll bei Krummau vorkommen.
188. *Clinopodium* L. 476. *vulgare* L. Wolgemuth. St. Catharina, bei Schönhub u. a. O.
189. *Glechoma* L. 477. *angustifolius* P. Auf saudigem Granitboden im südl. Theile.
190. *Lamium* L. 478. *Marschallianus* W. St. Catharina, Swinau u. a. O.; seltener.
191. *Galeobdolon* Huds. 479. *Chamaedrys* Fries.
192. *Galeopsis* L. 480. *vulgare* L. Rosenberg, Schönhub u. a. O.
193. *Stachys* L. 481. *hederacea* L. Guarn', Gundersmann.
194. *Betonica* L. 482. *purpureum* L.
195. *Leonurus* L. 483. *amplexicaule* L. Im nördl. Theile selten.
196. *Marrubium* L. 484. *album* L.
197. *Prunella* L. 485. *maculatum* L.
198. *Ajuga* L. 486. *luteum* Huds.
199. *Chamaepitys* Schreb. 487. *Ladanum* L.
200. *reptans* L. 488. *pubescens* Bess.
201. *Myosoton* L. 489. *speciosa* Mill.
202. *Agrostemma* L. 490. *Tetrahit* L. Louger im nördl. Theile.
203. *Geum* L. 491. *recta* L. Vorberge.
204. *Geum urbanum* L. 492. *palustria* L. Um Rosenberg.
205. *Geum urbanum* L. 493. *silvatica* L. Bis über 900 m.
206. *Geum urbanum* L. 494. *alpina* L. In Holzschlägen hier u. da.
207. *Geum urbanum* L. 495. *officinalis* L. Vorberge.
208. *Geum urbanum* L. 496. *Cardiaca* L. Vorberge.
209. *Geum urbanum* L. 497. *vulgare* L. Um Krummau.
210. *Geum urbanum* L. 498. *vulgaris* L. In den Vorbergen, doch selten.
211. *Geum urbanum* L. 499. *Chamaepitys* Schreb. Kelsen bei Krummau.
212. *Geum urbanum* L. 500. *reptans* L.

198. *Ajuga* L. 501. *genevensis* L. Bis etwa 700 m hinauf.  
                   502. *pyramidalis* L.  
 199. *Teucrium* L. 503. *Scorodonia* L. Südl. Theil und auf  
                   bayerischer Seite.  
                   504. *Botrys* L. Um Krummau an der  
                   Moldau.

### LII. Familie. **Verbenaceae.**

200. *Verbena* L. 505. *officinalis* L. Vorberge.

### LIII. Familie. **Asperifoliae.**

201. *Cynoglossum* L. 506. *officinale* L. Um Krummau u. a. O.  
 202. *Echinospermum* Sw. 507. *Lappula* Lehm. Vorberge, z. B. um  
                   Neukirchen, Kötzing, Neuern,  
                   Winterberg.  
 203. *Myosotis* L. 508. *palustris* L.  
                   509. *versicolor* Pers.  
                   510. *sparsiflora* Mik. Neuern, Neukirchen,  
                   Lam, Zwiesel, Hohenfurth u. a. O.  
                   511. *silvatica* Hoffm.  
                   512. *suaveolens* W. Kit. Arber, Rachel.  
                   513. *striata* Lmk.  
                   514. *hispida* Schdl. Um Hohenfurth  
                   u. a. O.  
 204. *Lithospermum* L. 515. *arvense* L. Vorberge.  
 205. *Echium* L. 516. *vulgare* L.  
 206. *Cerinthe* L. 517. *minor* L. Bärnloch b. St. Catharina,  
                   Krummau.  
 207. *Pulmonaria* Tourn. 518. *officinalis* L.  
                   519. *obscura* Dumort.  
 208. *Anchusa* L. 520. *officinalis* L.  
 209. *Lycopsis* L. 521. *arvensis* L. Vorberge. Z. B. um  
                   Neuern, Neukirchen u. a. O.  
 210. *Symphytum* L. 522. *officinale* L. Cult. u. verwildert.  
                   523. *tuberosum* L. Im südl. Theile, z. B.  
                   bei Hohenfurth, Friedberg, Rosenberg,  
                   am Schöninger.

### LIV. Familie. **Polemoniaceae.**

211. *Polemonium* L. 524. *coeruleum* L. Hinter Hohenfurth,  
                   an der Moldau.

LV Familie. **Convolvulaceae.**

212. *Convolvulus* L.      525. *sepium* L. Vorberge.  
                                   526. *arvensis* L. Liebfrauenkelch,  
                                   Sauschnерfling.

LVI. Familie. **Cuscuteae.**

213. *Cuscuta* L.      527. *Epilinum* Weihe. Seidenwinde.  
                                   528. *Epithymum* L.  
                                   Var. *trifolii*. Bab. Kleeheide.  
                                   529. *major* DC. Bei Sonnberg, um Rosen  
                                   berg u. a. O. in Gebüschen.

VII. Familie. **Solanaceae.**

214. *Solanum* L.      530. *Dulcamara* L. Um Holletitz, Chudiva, Hohenfurth. Ueberhaupt in den Vorbergen.  
                                   531. *Belladonna* L. Um Hartmanitz, Reichenstein, Hohenfurth, Krummau.  
                                   532. *niger* L. Um Holletitz — selten —, um Krummau.  
                                   533. *Stramonium* L. Soll im „Klosterwalde“ bei Hohenfurth wachsen.

LVIII. Familie. **Scrophulariaceae.**

218. *Verbascum* L.      534. *phlomoides* L. Königskerze im nördl., Himmelbrand im südl. Theile. Bei Bayereck, Neuern, Neukirchen, Hohenfurth, Krummau u. a. O.  
                                   535. *nigrum* L. Vorberge, hier und da.  
                                   536. *Thapsus* L. Im südl. Theile hier u. da; selten, z. B. bei Krummau.  
                                   537. *Thomaeanum* Wirtg — *Thapsus* ~~×~~ *nigrum* — Zwischen Hohenfurth u. Rosenberg an der Moldau.  
                                   538. *nodosa* L.  
                                   539. *alata* Gilib. Moldaufer um Hohenfurth.

220. *Limossella* L.                    540. *aquatica* L. Soll um Krummau wachsen.  
 221. *Mimulus* L.                    541. *luteus* L. Bei Deffernik, Ferchenhaid, verwildert.  
 222. *Linaria* Mill.                    542. *minor* Desh. Um Krummau.  
 223. *Digitalis* L.                    543. *vulgaris* Mill. Im nördl. Theile wildes Teufelskraut.  
 224. *Veronica* L.                    544. *ambigua* Murr. Bei Hohenfurth, Rosenberg, Krummau, im Blansker.  
     545. *longifolia* L. Bei Neuhäusel und Kienberg.  
     546. *Beccabunga* L.  
     547. *Anagallis* L.  
     548. *scutellata* L. Bei Schattawa, bei Furkenthal u. Hohenstegen u. a. O.  
     549. *Chamaedrys* L.  
     550. *officinalis* L.  
     551. *montana* L. Am Schwarzen See, bei Eisenstein, am Arber u. a. O.  
     552. *prostrata* L.  
     Var.  $\beta$ . *glomerata*. Am Brennberge bei Grün.  
     553. *hederifolia* L.  
     554. *opaca* Fr. Bei Hohenfurth, am Golitsch.  
     555. *avensis* L.  
     556. *serpyllifolia* L.

### LIX. Familie. **Rhinanthaceae.**

225. *Euphrasia* L.                    557. *Odontites* L. In den Vorbergen. Z. B. um Hohenfurth.  
     558. *Rostkoviana* Hayne. Vorberge.  
     559. *stricta* Host. Herbstblüml. Bis zu höchst.  
 226. *Pedicularis* L.                    560. *silvatica* L. Bis über 800 m.  
     561. *palustris* L. In den Filzen, bei Hohenfurth u. a. O.  
 227. *Rhinanthus* L.                    562. *minor* Ehrh.  
     563. *serotinus* Schönh. Um Hohenfurth.

227. Rhinanthus L. 564. major Ehrh. Kloft im nördl. Theile.  
 228. Melampyrum L. 565. hirsutus All.  
                         566. nemorosum L. Um Hohenfurth, bei  
                         Gromaling u. a. O.  
                         567. silvaticum L. In Holzschlägen und  
                         Wäldern des höheren Gebirges.  
                         568. pratense L. Bis zu höchst hinauf.  
                         569. arvense L. Bei Hohenfurth und  
                         Krummau.  
 229. Lathraea L. 570. Squamaria L. B. Hinterhäuser, Hohen-  
                         furth, Krummau u. a. O.

#### LX. Familie. **Orobancheae.**

230. Orobanche L. 571. purpurea Jequ. Bei Hohenfurth.  
                         572. alba Steph. Bei Oberplan, Krummau.  
                         573. pallidiflora Wimm & Grab. Bei  
                         Stockern.

#### LXI. Familie. **Plantagineae.**

231. Plantago L. 574. lanceolata L.  
                         575. Var.  $\beta$ . pumila Maly.  
                         576. major L.  
                         577. media L.

#### LXII. Familie. **Utriculariaeae.**

232. Pinguicula L. 578. vulgaris L.  
 233. Utricularia L. 579. vulgaris L. Im Bystritzer Schloss-  
                         teiche, Moor bei Schwarzbach.  
                         580. neglecta Lehm. Bei Schwarzbach  
                         und Lagau.

#### LXIII. Familie. **Primulaceae.**

234. Primula L. 581. officinalis Scop.  
                         582. elatior Ehrh. Bei Holletitz, Hohen-  
                         furth, Lagau, im Blansker.  
 235. Soldanella Tourn. 583. montana Willd. Am Arber, auf der  
                         Brandwiese, im Seewalde; bei  
                         Eisenstein, Aussergefild, Winter-  
                         berg, Hohenfurth, Rosenberg; am  
                         Kubani, Plöckenstein, Dreisesselb.,  
                         Blansker u. a. O.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 236. <i>Trientalis</i> L.  | 584. <i>europaea</i> L. Bis auf den Arber.                                     |
| 237. <i>Lysimachia</i> L.  | 585. <i>thyrsiflora</i> L. Moldauufer b. Kienberg, Rosenberg, Ottau, Krunzmau. |
|                            | 586. <i>vulgaris</i> L. Um Neuern, Millik u. a. O.                             |
|                            | 587. <i>nemorum</i> L. Hochgelegene Wälder.                                    |
|                            | 588. <i>Nummularia</i> L.  |
| 238. <i>Anagallis</i> L.   | 589. <i>arvensis</i> L.  |
|                            | 590. <i>coerulea</i> Schreb. Seltener.   |
| 239. <i>Centunculus</i> L. | 591. <i>minimus</i> L. Vorberge, seltener.                                     |

#### LXIV. Familie. **Ericaceae.**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 240. <i>Calluna</i> Salisb.       | 592. <i>vulgaris</i> Salisb. Haiderer im nördl. Theile.                      |
| 241. <i>Erica</i> L.              | 593. <i>carnea</i> L. Ober Hohenfurth im Moldauthal (Teufelsmauer).          |
| 242. <i>Audromeda</i> L.          | 594. <i>polifolia</i> L. In den Filzen, am Rachel, Lusen, Plöckenstein.      |
| 243. <i>Ledum</i> L.              | 595. <i>palustre</i> L. Schönau, Oberplan, Schwarzbach; fehlt in den Filzen. |
| 244. <i>Arctostaphylos</i> Adans. | 596. <i>uva ursi</i> Spr. Soll am Dreisesselberge vorkommen.                 |

#### LXV. Familie. **Vaccinieae.**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 245. <i>Vaccinium</i> L.    | 597. <i>vitis idaea</i> L. Preisselebe er, Zwengerling im nördl. Theil, Grandln im südlichen.   |
|                             | 598. <i>Myrtillus</i> L. Haidbeer im nördl., Schwarzbeer im südl. Theile.   |
|                             | 599. <i>uliginosum</i> L. Beim Schwarzen See — selten —, in d. Filzen — häufig; bei Ferchenhaid, Maderhäuser, Kuschwarda, Schwarzbach, Kapelln bei Friedberg; am Lusen, Plöckenstein. |
| 246. <i>Oxycoccus</i> Pers. | 600. <i>palustris</i> Pers. Beim Schwarzen See — selten —, am Dreisesselberge, Moore des Moldauthales.  |

LXVI. Familie. **Pirolaceae.**

247. *Pirola* L.      601. *uniflora* L. Häufig in den Wäldern des nördl. Theiles; bei Mader, Aussergefiedl, um Hohenfurth, am Blansker.  
                         602. *umbellata* L. Rittsteiger Wälder; sehr selten.  
                         603. *secunda* L.  
                         604. *rotundifolia* L. Am Schwarzen See am Blansker u. a. O.  
                         605. *minor* L. Bis über 900 m hinauf.  
 248. *Monotropa* L.      606. *Hypopitys* L. Vorberge. Z. B. bei Hohenfurth, Schönhub, Winterberg; am Blansker.

*γ. Dialypetalae.*LXVII. Familie. **Corneae.**

249. *Cornus* L.      607. *mas* L. Vorberge, cult. und verwildert.

LXVIII. Familie. **Araliaceae.**

250. *Hedera* L.      608. *Helix* L.

LXIX. Familie. **Umbelliferae.**

251. *Sanicula* L.      609. *europaea* L. Sanikel. Im Rantscherwalde, am Dreisesselberge, am Blansker.  
 252. *Astrantia* L.      610. *major* L. Bei Obermoldau, im Blanskerwalde.  
 253. *Cicuta* L.      611. *virosa* L. Rosskümmele.  
 254. *Berula* L.      612. *angustifolia* M. Koch. Hier und da; selten.  
 255. *Apium* L.      613. *graveolens* L. Hier und da aus Gärten verwildert.  
 256. *Pimpinella* L.      614. *magna* L. Um Eleonorenhain, Rosenberg, am Blansker.  
 257. *Carum* L.      615. *carvi* L. Keri im nördl., Kum im südl. Theile.

258. *Aegopodium* L.      616. *Podagraria* L. Auenwälder der Vorberge; seltener.  
 259. *Oenanthe* L.      617. *fistulosa* L. Um Schwarzbach; selten.  
 260. *Libanotis* L.      618. *montana* L. Um Krummau.  
 261. *Aethusa* L.      619. *Cynapium* L.  
 262. *Silaus* Bess.      620. *pratensis* Bess. Vorberge.  
 263. *Meum* L.      621. *Mutellina* Gaertn. Am Arber, Rachel,  
                                   Lusen, Brennet (Irlwiese), beim  
                                   Schwarzen See, bei Stubenbach,  
                                   Aussergefiedl.  
 264. *Angelica* L.      622. *silvestris* L. In den mittleren Höhen.  
 265. *Levisticum* Koch.      623. Var. *montana* Schleich. Zwieseleck.  
 266. *Peucedanum* L.      624. *officinale* Koch. Ludstöckl, im  
                                   nördl. Theile cult. und verwildert.  
 267. *Imperatoria* L.      625. *palustre* Mnch. Schwarzbach,  
                                   Hohenfurth.  
 268. *Anethum* L.      626. *Cervaria* Lap.  
 269. *Pastinaca* L.      627. *Oreoselinum* Mnch. Seltener als  
                                   voriges.  
 270. *Heracleum* L.      628. *Ostruthium* L. Meisterwurz.  
                                   Cult. und verwildert.  
 271. *Chaerophyllum* L.      629. *graveolens* L. Hier und da cult.  
                                   630. *sativa* L. Um Krummau, meist  
                                   angebaut.  
                                   631. *Sphondylium* L.  
                                   Var. *latilobatum* Neirl.  
                                   632. *hirsutum* L. Kälberkern.  
                                   633. *aureum* L. Kuschwarda, Kubani,  
                                   Zwieseleck.  
                                   634. *temulum* L. Vorberge.  
                                   635. *aromaticum* L. Lagau, Krummau.  
                                   636. *vulgaris* L.  
                                   637. *silvestris* Hoffm. Rosskem.  
                                   638. *maculatum* L.  
                                   639. *Carvifolia* L.  
                                   640. *latifolium* L. Soll bei Lagau vor-  
                                   kommen.  
                                   641. *Carota* L. Krempfer in nördl.  
                                   Theile.

277. *Caucalis* L. 642. *daucoides* L.  
 278. *Torilis* Adans. 643. *infesta* Koch. Vorberge; sehr selten.

### LXX. Familie. **Saxifragaceae.**

279. *Saxifraga* L. 644. *granulata* L.  
 280. *Chrysosplenium* L. 645. *oppositifolium* L. Selten.  
                               646. *alternifolium* L.  
 281. *Parnassia* L. 647. *palustris* L.

### LXXI. Familie. **Ribesiaceae.**

282. *Ribes* L. 648. *rubrum* L. Ribisel.  
                           649. *nigrum* L. Bei der Kienmühle bei  
                           Hohenfurth verwildert.

### LXXII. Familie. **Crassulaceae.**

283. *Sedum* L. 650. *purpureum* Lk. Rother Schnerer  
                           im nördl. Theile.  
                           651. *maximum* Sut. Weisser  
                           Schnerer.  
                           652. *acre* L.  
                           653. *villosum* L. Um Eisenstein, Stuben-  
                           bach, Filipshütte, Ferchenhaid,  
                           Kuschwarda, Krummau, Hohen-  
                           furth u. a. O.  
 284. *Sempervivum* L. 654. *tectorum* L. Hohenfurth, Krummau,  
                           sonst nur auf Dächern gezogen.  
                           655. *soboliferum* Sims. Um Rosenberg.

### LXXIII. Familie. **Ranunculaceae.**

285. *Thalictrum* L. 656. *aquilegifolium* L. Um Freyung,  
                           Hohenfurth u. a. O.  
 286. *Anemone* L. 657. *nemorosa* L.  
 287. *Pulsatilla* Tourn. 658. *silvestris* L. Bei Krummau.  
                           659. *vernalis* Mill. Vorberge, sehr selten.  
                           660. *vulgaris* Mill. Granitboden d. südl.  
                           Theiles.  
                           661. *pratensis* L. Kalkboden des nördl.  
                           Theiles.

288. Hepatica Dill. 662. *triloba* Choix. Vorberge; selten.  
 289. Batrachium E. May. 663. *fluitans* L. Bei Krummau.  
     664. *aquatile* L. Im Bystritzer Schloss-  
       teiche, bei Hohenfurth u. a. O.  
 290. Ranunculus L. 665. *aconitifolius* L. Im Hüttenwalde, in  
       den Ossawältern, Arberwältern,  
       am Schwarzen See, bei Eisenstein,  
       am Rachel, Lusen, um Stubenbach,  
       bei Aussergefiedl, Fürstenhut,  
       Kuschwarda, am Kubani, Dreis-  
       sesselberg, Plöckenstein, bei St.  
       Thoma — seltener — u. a. O.  
     666. *Lingua* L. Vorberge.  
     667. *flammula* L.  
     668. *sceleratus* L.  
     669. *arvensis* L. Schmalzblüml.  
     670. *acer* L.  
     671. *bulbosus* L. Vorberge; seltener.  
     672. *repens* L. Spärlich, aber bis auf  
       den Arber.  
     673. *nemorosus* L. Vorberge.  
     674. *ranunculoides* Rth. Vorberge.  
     675. *palustris* L. Im nördlichen Theile  
       Schmierker, im mittl. Oster-  
       blume, im südl. Schmalzblume.  
 291. Ficaria Dill. 676. *europaeus* L. Bei Neuern, Holletitz  
 292. Caltha L. u. a. O.  
 293. Trollius L. 677. *niger* L. An erlwurz. Arberwälder.  
 294. Helleborus L. 678. *vulgaris* L. Meist aus Gärten ver-  
 295. Aquilegia L. wildert.  
 296. Delphinium L. 679. *Consolida* L. Vorberge.  
 297. Aconitum L. 680. *Napellus* L. Rössl. Arber, See-  
       wand, Plöckenstein, Eleonorenhain,  
       bei Hohenfurth, Rosenberg, am  
       Blansker.  
 298. Actaea L. 681. *variegatum* L. Bei Schattawa.  
     682. *Lycocotonum* L. Am Rachel, im  
       Blanskerwalde.  
     683. *spicata* L. Rantscherwald u. a. O.

LXXIV. Familie. **Berberideae.**

299. Berberis L. 684. vulgaris L. Bei St. Catharina, Lagau,  
Krummau u. a. O.

LXXV. Familie. **Nymphaeaceae.**

300. Nymphaca L. 685. alba L. Bei Hohenfurth.  
301. Nuphar Sm. 686. luteum Sm. Grosser Arbersee.

LXXVI. Familie. **Papaveraceae.**

301. Papaver L. 686. dubium L. Um Hohenfurth und  
Krummau.  
302. Chelidonium L. 687. Rhoeas L. Vorberge.  
688. majus L. Schöllkraut. Im nördl.  
Theile auch als Vieharzneipflanze  
bei den Häusern gezogen.

LXXVII. Familie. **Fumariaceae.**

303. Corydalis DC. 689. cava Schweigg. Vorberge; seltener.  
304. Fumaria L. 690. officinalis L. Felder bei St. Catharina,  
Rosenberg u. a. O.

LXXVIII. Familie. **Cruciferae.**

305. Thlapsi L. 691. montanum L. Kalkboden um Hinterhäuser und St. Catharina.  
692. arvense L.  
306. Lepidium L. 693. campestre L.  
694. ruderale L. Vorberge.  
307. Capsella Vent. 695. Bursa pastoris L.  
308. Camelina Crtz. 696. microcarpa Andrz. Um Hohenfurth und Krummau.  
309. Armoracia Th. Wett. 697. rusticana Fl. Wett. Cult. und verwildert.  
310. Nasturtium Rchb. 698. officinale R. Br. Brunnenkressen.  
311. Erophila DC. 699. verna E. May.  
312. Draba L. 700. muralis L.  
313. Lunaria L. 701. rediviva L. Bei Leonorenhain.  
(Schillerberge.)  
314. Alyssum L. 702. saxatile L. Bei Krummau.

315. *Arabis* L.                    703. *Hallerii* L. Bei Aussergefild; selt.  
     704. *arvensis* L. Um Rosenthal und  
     Krummau.  
 316. *Turritis* L.                    705. *glabra* L. Um Hohenfurth.  
 317. *Cardamine* L.                706. *resedifolia* L. Am Falkenstein; selten.  
     707. *trifolia* L. Im südl. Theile; selten.  
     708. *Impatiens* L. Am Hohenfurth.  
     709. *hirsuta* L. Um Arber, Rachel, bei  
     Eisenstein, Krummau, Ausser-  
     gefield u. a. O.  
 318. *Dentaria* Tourn.            710. *amara* L. Im Regenthal, bei Stuben-  
     bach, Krummau u. a. O.  
     711. *pratensis* L.  
     712. *bulbifera* L. Bei Hohenfurth.  
 319. *Sisymbrium* L.                713. *enneaphyllos* L. Bei St. Thoma.  
 320. *Erysimum* L.                714. *officinale* Scop. Vorberge.  
 321. *Barbarea* R. Br.            715. *repandum* L. Im südl. Theile.  
 322. *Sinapis* L.                    716. *cheiranthoides* L. Vorberge.  
 323. *Raphanus* L.                717. *vulgaris* R. Br. Blansker.  
 324. *Neslia* Desc.                718. *arvensis* L.  
     719. *Raphanistrum* L. Drill im nördl.  
     Theile.  
     720. *paniculata* Desc. Um Hohenfurth.

### LXXIX. Familie. **Cistineae.**

325. *Helianthemum* Tourn.      721. *Chamaecistus* Mill. Vorberge; auch  
     höher hinauf.

### LXXX. Familie. **Droseraceae.**

326. *Drosera* L.                722. *rotundifolia*. Bei Hinterhäuser,  
     Hammern, beim Schwarzen See,  
     bei Eisenstein, in den Filzen, bei  
     Kuschwarda, Schattawa, Salnau,  
     Hohenfurth, am Blansker u. a. O.

### LXXXI. Familie. **Violaceae.**

327. *Viola* L.                    723. *tricolor* L.  
     Var.  $\alpha$ . *arvensis* Murr.  
     724.                                     $\beta$ . *vulgaris* Koch.

327. *Viola* L.      725. *palustris* L. Bis über 1000 m hinauf.  
                         726. *hirta* L.  
                         727. *collina* Bess. Um Krummau u. a. O.  
                         728. *odorata* L.  
                         729. *silvestris* Lamk.  
                         730. *canina* L.  
                                    Var.  $\alpha$ . *longifolia* Neirl.  
                         731.                      $\beta$ . *brevifolia* Neirl.

## LXXXII. Familie Portulacaceae.

328. *Montia* L.      732. *rivularis* Gmel. Um Neuern, Neu-kirchen, Lam, Eisenstein, Gut-wasser, Stubenbach, Kuschwarda, Andreasberg, Rosenberg, Hohen-furth, Ottau, Krummau, am Blansker u. a. O.

### LXXXIII. Familie. **Sclerantheae.**

329. *Scleranthus* L.      733. *perennis* L.  
                                 734. *annuus* L. Im nördl. Theile kleiner  
                                 Knieboss.

## LXXXIV. Familie Paronychiaceae.

330. Illecebrum L. 735. verticillatum L. Im südl. Theile.  
 331. Spergula L. 736. arvensis L. Grosser Knieboss.  
                       737. pontandra L.  
 332. Spergularia Pers. 738. rubra P. Hier und da; seltener.

## LXXXV. Familie. **Alsineae.**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 333. <i>Sagina</i> L. | 739. <i>apetala</i> L. Vorberge.<br>740. <i>procumbens</i> L.<br>741. <i>Linnaei</i> Presl. Arber, Ossa, Rachel,<br>bei Seewiesen u. a. O.<br>Var. $\alpha$ . <i>micrantha</i> Fzl.<br>742. $\beta$ . <i>decandra</i> Fzl.<br>743. <i>nodosa</i> E. May. Filze u. a. O. |
| 334. <i>Alsine</i> L. | 744. <i>verna</i> Bartl. Vorberge; seltener.  |

335. Moehringia L.      745. trinervia Choix. Bis über 900 m hinauf.  
 336. Arenaria L.      746. serpyllifolia L. Am Rachel; auch am Arber getroffen.  
 337. Holosteum L.      747. umbellatum L. Vorberge.  
 338. Stellaria L.      748. nemorum L. Vorberge. Z. B. um Hohenfurth. In feuchten Hochwäldern bis hoch hinauf; z. B. an der Seewand, am Ossa, Arber, Rachel u. a. O.  
 749. media Lill. Hühnerdarm.  
 750. Var.  $\alpha$ . apetala W. Hier u. da.  
 751. viscosa Bilb. Vorberge; seltener.  
 752. Holostea L.  
 753. Friesiana Sw. Sumpfige Wälder des südl. Theiles.  
 754. graminea L.  
 755. palustris Ehrh. Im südl. Theile.  
 756. uliginosa Moor.  
 757. erecta Ehrh. Vorberge.  
 758. aquaticum Tr. Moldauufer.  
 759. triviale Lk. Vorberge.  
 760. Var.  $\beta$ . nemorale Uechtr. Auen des Moldauthales.  
 761. semidecandrum L.  
 762. arvense L.

LXXXVI. Familie. **Sileneae.**

342. Dianthus L.      763. deltoides L. Rainnagerln.  
 764. Carthusianorum L. Rosenberg.  
 765. superbus L. Hohenfurth, Krummau.  
 343. Silene L.      766. inflata Sm. Bis auf den Arber.  
 767. nutans L. Um Hohenfurth.  
 344. Melandryum Röhl.      768. silvestre L. Im nördlichen Theile.  
                                   Nasenblüter.  
 769. pratense Röhl.  
 345. Lychnis L.      770. viscaria L. Pickender Hansl.  
 771. Flos eculi L.

346. *Agrostemma* L.      772. *Githago* L. Robe im nördlichen,  
Raden im südl. Theile.

#### LXXXVII. Familie. **Malvaceae.**

347. *Malva* L.      773. *silvestris* L. Käsepappel.  
774. *crispa* L. Um Krummau u. a. O.  
775. *vulgaris* Tr. Vorberge.

#### LXXXVIII. Familie. **Tiliaceae.**

348. *Tilia* L.      776. *platyphyllos* Scop. Meist nur angepflanzt.  
777. *ulmifolia* Scop. Wälder.

#### LXXXIX. Familie. **Hypericineae.**

349. *Hypericum* L.      778. *humifusum* L. Um Neuern, Seewiesen, Gutwasser, Hartmanitz, Hohenfurth, im Blanskerwalde u. a. O.  
779. *hirsutum* L. Um Hohenfurth, im Blansker.  
780. *montanum* L. Am Kubani, Frohnleite bei Hohenfurth, Blansker.  
781. *perforatum* L. Falscher Wogemuth, wilder Margram im nördl. Theile.  
782. *tetrapterum* Fr. Bei Rosenberg, am Mühlbache.  
783. *quadrangulum* L. Seewand, Eisenstein, Neuern, Hartmanitz, um Stubenbach, Schattawa, Blansker.

#### XC. Familie. **Acerineae.**

350. *Acer* L.      784. *platanoides* L. Spitzahorn. Vorberge.  
785. *campestre* L. Bis ins mittlere Gebirge.  
786. *pseudoplatanus* L. Bis 1300 m.

IXC. Familie. **Polygalaceae.**

351. *Polygala* L.      787. *vulgaris* L. Vorberge.  
                               788. *amara* L. Sumpfwiesen.

XCII. Familie. **Rhamneae.**

352. *Rhamnus* L.      789. *cathartica* L. Vorberge.  
                               790. *Frangula* L.

XCIII. Familie. **Empetreae.**

353. *Empetrum* L.      791. *nigrum* L. Krähenaugl. Am  
                               Arber, Plöckenstein, bei Ferchen-  
                               haid, in den Filzen.

XCIV. Familie. **Euphorbiaceae.**

354. *Euphorbia* L.      792. *dulcis* L. Gillowitz; Vorberge.  
                               793. *Helioscopia* L. Bis ins mittlere Ge-  
                               birge.  
                               794. *Cyprassias* L. Teufelskraut.  
                               795. *Esula* L. Seltener.  
                               796. *falcata* L. Vorberge; seltener.  
                               797. *Peplus* L. Bis ins mittl. Gebirge.  
 355. *Mercurialis* L.      798. *perennis* L. Rantscher, Blanskerwald.  
                               799. *annua* L. Vorberge.

XCV. Familie. **Geraniaceae.**

356. *Geranium* L.      800. *pratense* L. Vorberge, z. B. bei  
                               Holletitz.  
                               801. *silvaticum* L. Vom mittleren Ge-  
                               birge an, z. B. Rantscher, Lusen,  
                               Kubani, Plöckenstein u. a. O.  
                               802. *Robertianum* L.  
                               803. *columbinum* L. Um Krummau.  
                               804. *pusillum* L. Vorberge; seltener.

IVC. Familie. **Lineae.**

357. *Radiola* L.      805. *linoides* Gmel. Soll um Krummau  
                               vorkommen.

358. Linum L.                    806. catharticum L. Bei Leonorenhain  
u. a. O.

### III C. Familie. **Oxalideae.**



## HC. Familie. Balsamineae.

360. Impatiens L. 808. Nolitangere L. Moospflanzen.

## IC. Familie. **Oenotherae.**

361. *Epilobium L.*

  - 809. *angustifolium* L. Bis auf den Arber.
  - 810. *obscurum* Rchb. Bei St. Thoma, Hohenfurth, Rosenberg, Krummau, im Blansker u. a. O.
  - 811. *roseum* L. Vorberge, seltener höher hinauf.
  - 812. *anagallidifolium* Lmk. Seewand, Arber.
  - 813. *nutans* Schmidt. Kubani.
  - 814. *palustre* L. Bis ins mittl. Gebirge.
  - 815. *parviflorum* Schrb.
  - 816. *montanum* L. Holzschläge; seltener.
  - 817. *collinum* Gmel.
  - 818. *alpina* L. Im Rantscherwalde, bei Hinterhäuser, unterhalb d. Brandwiese, bei Lambach, Seewand, Arber, Rachel, Chumberg, St. Thoma, Langenbrucker Teich u. a. O.
  - 819. *intermedia* Ehrh. Bei Krummau.

362. *Circaea L.*

### C. Familie. Halorageae.

CI. Familie. ***Lythrarieae.***

364. *Lythrum* L. 822. *Salicaria* L. Vorberge, z. B. um Neuern, Rosenberg u. a. O.

CII. Familie. ***Pomaceae.***

365. *Crataegus* L. 823. *Oxyacantha* L. **Mehlbeerstaude.**  
366. *Sorbus* L. 824. *aucuparia* L. Faulbeer im nördl.,  
Vogelbeer im südl. Theile.  
Allgemein, bis unter d. Arberkuppe.  
367. *Pirus* L. 825. *Malus* L.  
Var.  $\beta.$  *silvestris* Mill. Holz-  
apfel.  
826. *communis* L.  
Var.  $\beta.$  *Pyraster* Wallr.  
827.  $\gamma.$  *Achras* Wallr.

CIII. Familie. ***Rosaceae.***

368. *Rosa* L. 828. *alpina* L. Vorberge und höher, z. B.  
bei Hohenfurth, am Falkenstein,  
Kubani, am Chumberge, b. Lagau,  
Krummau, Rosenberg u. a. O.  
829. *turbinata* Ais. Soll um Krummau  
vorkommen.  
830. *tomentosa* Sm. Krummau u. a. O.  
831. *canina* L. Haarwutzelstaude,  
wilde Rosenstaude, Dorn-  
rösel.  
832. *collina* Jcqu.  
Var. *alba* L. Weisses Dorn-  
rösel.  
833. *rubiginosa* L. Schmeckende  
Röselaude. Bei St. Catharina,  
Dörrstein, Neukirchen, Lam.  
369. *Rubus* L. 834. *odoratus* L. Bystritz, verwildert.  
835. *saxatilis* L. Hohenfurth, Lagau,  
Blansker.  
836. *idaeus* L. Himbeer oder Hol-  
beer im nördl., Marienbeer  
im südl. Theile.

369. *Rubus* L.                    837. *suberectus* Anders. Rosenberg u.  
    a. O.
370. *Comarum* L.                838. *thyrsodeus* Wimm.
371. *Fragaria* L.                839. *villicaulis* Köhler.
840. Var.  $\beta$ . *silvaticus* Weihe & Nees.  
                                       $\gamma$ . *glandulosus* Beclar.
372. *Geum* L.                    841. *caesius* L.
373. *Potentilla* L.              842. *palustre* L. Kuschwarda, Hohen-  
                                      furth, Rosenberg, Krummau,  
                                      Blansker.
843. *elatior* L. Vorberge, z. B. Holletitz,  
                                      Hohenfurth.
844. *collina* Ehrh. Seltener.
845. *vesca* L. Erdbeere im nördl.,  
                                      Rothbeere im südl. Theile.
846. *urbanum* L. Bis ins mittlere Ge-  
                                      birge.
847. *rivale* L. Bei Hohenfurth, Rosen-  
                                      berg, Lagau, Krummau.
848. *alba* L. Hohenfurth.
849. *supina* L.
850. *anserina* L.
851. *recta* L. Rosenthal, Krummau.
852. *canescens* Bess. Stuben, Winterberg,  
                                      Salnau, Oberplan, Krummau, im  
                                      Blanskerwald u. a. O.
853. *reptans* L. Vorberge.
854. *heptaphylla* Mill. Seltener.
855. *verna* L.
374. *Tomentilla* L.            856. *erecta* L. Bauchwehwurzel.
857. *reptans* L.
375. *Alchemilla* L.            858. *vulgaris* L. Frauenmantel.  
                                      Var. *glabra* Maly. Kubani.
859. *arvensis* Scop. Sinau. Lagau,  
                                      Krummau.

#### CIV. Familie. **Sanguisorbeae.**

376. *Poterium* L.                860. *Sanguisorba* L. Vorberge, z. B. um  
                                      Hohenfurth.

377. *Sanguisorba* L.      861. *officinalis* L. Im nördl. Theile.  
B r a u n e l l e n.

#### CV. Familie. **Spiraeaceae.**

378. *Spiraea* L.      862. *Ulmaria* L. Bär mutter sträusse.  
Bis hoch hinauf.  
863. *Aruncus* L.  
864. *salicifolia* L. Leonoren hain, Kusch-  
warda, Hohenfurth, Schönau, Ober-  
plan, Schwarzbach, Krummau.

#### CVI. Familie. **Amygdalaceae.**

379. *Prunus* L.      865. *spinosa* L. Schlehe.  
866. *avium* L. Verw. u. wild wachsend.  
867. *Padus* L. Sehr selten.

#### CVII. Familie. **Papilionaceae.**

380. *Onobrychis* L.      868. *sativa* L. Eisenbahndämme bei  
Neuern u. Holletitz, um Krummau.  
381. *Astragalus* L.      869. *arenarius* L. Kieferwälder der  
Vorberge.  
870. *glycyphyllos* L. Frohnleite bei  
Hohenfurth.  
382. *Pisum* L.      871. *arvense* L.  
383. *Vicia* L.      872. *dumetorum* L. Hinterhäuser, St.  
Catharina, Seewiesen.  
873. *Cracca* L. Vogelwickel.  
874. *villosa* Rth. Selten.  
875. *sativa* L.  
876. *angustifolia* Rth.  
877. *sepium* L.  
878. *pisiformis* L. Vorberge.  
879. *silvatica* L.  
880. *cussubica* L. Seltener.  
384. *Ervum* L.      881. *tetraspermum* L. Meist nur in den  
Vorbergen.  
385. *Lathyrus* L.      882. *silvester* L. Um Krummau, am  
Schöninger u. a. O.  
883. *heterophyllus* L. Bei Winterberg.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 385. <i>Lathyrus L.</i>       | 884. <i>pratensis L.</i> Meist in d. Vorbergen.   |
|                               | 885. <i>tuberosus L.</i> St. Catharina, bei<br>Hinterhäuser, bei Hohenfurth, bei<br>Krummau, sonst recht selten.              |
| 386. <i>Orobus L.</i>         | 886. <i>vernus L.</i> Vorberge.   |
| 387. <i>Lotus L.</i>          | 887. <i>corniculatus L.</i><br>Var. $\alpha$ . <i>vulgaris Koch.</i>  |
| 388. <i>Melilotus L.</i>      | 888. $\beta$ . <i>hirsutus Thuill.</i>  |
| 389. <i>Trifolium L.</i>      | 889. <i>albus Desr.</i> Vorberge.   |
|                               | 890. <i>officinalis Desr.</i> Vorberge.   |
|                               | 891. <i>montanum L.</i> Weisser Klec.   |
|                               | 892. <i>repens L.</i> Bis hoch hinauf.  |
|                               | 893. <i>spadiceum L.</i> Bis auf den Arber.   |
|                               | 894. <i>minus Sm.</i>   |
|                               | 895. <i>agrarium L.</i>   |
|                               | 896. <i>procumbens L.</i>   |
|                               | 897. <i>arvense L.</i> Um Neuern, Kötzing,<br>Rosenberg, Hohenfurth u. a. O.<br>der Vorberge.                                 |
|                               | 898. <i>pratense L.</i>   |
|                               | 899. <i>alpestre L.</i> Hochgelegene Wiesen.  |
| 390. <i>Medicago L.</i>       | 900. <i>medium L.</i> Im mittleren Gebirge.   |
| 391. <i>Anthyllis L.</i>      | 901. <i>minima L.</i> Um Krummau.   |
| 392. <i>Ononis L.</i>         | 902. <i>Vulneraria L.</i> Golitschberg bei<br>Friedberg, Lagau, Krummau u. a. O.  |
| 393. <i>Sarothamnus Wimm.</i> | 903. <i>spinosa L.</i> Vorberge, besonders um<br>Krummau.   |
| 394. <i>Genista L.</i>        | 904. <i>scoparia Koch.</i> Um Furth, Holletitz,<br>Deschenitz, Lam u. a. O. des nördl.<br>Theiles; im südl. n. b. Goldenkron. |
| 395. <i>Cytisus L.</i>        | 905. <i>tinctoria L.</i> Im südl. Theile.   |
|                               | 906. <i>germanica L.</i> Um Hohenfurth, Fried-<br>berg, Rosenberg, Krummau, Ottau,<br>im Blanskerwalde u. a. O.               |
|                               | 907. <i>nigricans L.</i> Am Kubani, um Hohen-<br>furth, bei Krummau, im Blansker-<br>walde.                                   |
|                               | 908. <i>capitatus Jacqu.</i> Um Friedberg,<br>Hohenfurth, Krummau.  |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Schott Anton

Artikel/Article: [Verzeichniss der im Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten  
nebst deren Volksnamen und Standorten bez. Fundorten 1-42](#)