

Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen.

VI.

Zusammengestellt von

Univ.-Assistent FRANZ MATOUSCHEK.
(Prag.)

Herr Bürgerschuldirektor Anton Schmidt (Haida) und Herr Bürgerschullehrer Josef Anders (Leipa) hatten die Liebenswürdigkeit, mir Verzeichnisse von Moosen zu senden, welch' letztere sie in Nord-Böhmen selbst gesammelt haben. Die Belegexemplare befinden sich in den Herbarien der genannten Herren.

Hepaticae.

1. *Riccia glauca* L. Lehmäcker bei Leipa (Anders).
2. *Fimbriaria pilosa* Tayl. An einem Felsen des Kleis (auf der Ostseite) bei Haida, 16. V. 1890, für Böhmen von Schmidt entdeckt.
3. *Anthoceros laevis* L. Lehmäcker um Leipa (Anders).
4. *Pellia Neesiana* (Gottsche) Limpr. Turnau, 26. V. 1896 (Schmidt).
5. *Sarcoscyphus Sprucei* Limpr. An Sandsteinblöcken bei Schwora, 1895 (Schmidt).
6. *Sarcoscyphus Funckii* Nees. Bei Rodowitz auf Waldwegen, c. fr. 1895. — Im Thiergarten bei Haida (Schmidt).
7. *Sarcoscyphus sphacelatus* (Gies.) Nees. Beim Elbfall im Riesengebirge, VIII. 1893 (Schmidt).
8. *Alicularia minor* Limpr. Auf Basalt im Koselgebirge bei Leipa. — Strasse bei Wolfsberg (Schmidt.)
9. *Scapania rosacea* (Corda) Dum. Bei Habstein (Schmidt).

10. *Scapania irrigua* (Nees) Dum. Beim Bahnhof in Schönlinde (Schmidt). — Elbwiese im Riesengebirge, 1895 (Schmidt).
11. *Scapania uliginosa* (Swartz, Nees) Dum. Beim Pantschefall und im Riesengrund im Riesengebirge, 1893 (Schmidt).
12. *Scapania undulata* (L.) Dum. Im Kleisbach bei Haida (Anders).
13. *Scapania nemorosa* (L.) Dum. Auf Lehmerde im Walde zwischen Haida und Johannisdorf (Anders).
14. *Diplophyllia obtusifolia* (Hook.) Falkenau bei Leipa (Schmidt). — Auf Leimboden im Haidaer Thiergarten (Anders).
15. *Mylia Taylori* (Hook.) Gray. Auf dem Quarzit des Jeschkengipfels, 1000 m (Anders).
16. *Aplozia sphaerocarpa* (Hook.) Dum. Im Pfarrwalde bei Turnau, V. 1896 (Schmidt).
17. *Aplozia nana* (Nees) Breidler. Bei Wurzelsdorf im Riesengebirge, VIII. 1895 (Schmidt).
18. *Aplozia tersa* (Nees) Bernet. In den Teufelslöchern bei Hillemühl (bei Haida), spärlich (Schmidt). — Weissbach im Isergebirge (Schmidt).
19. *Aplozia autumnalis* (D. C.) Heeg (= *Jungerm. subapicalis* Nees = *Jung. Schraderi* Mart.) Beim Wittighaus im Isergebirge (1885 legit Schmidt).
20. *Aplozia lanceolata* (L.) Dum. An den Ufern des Friedrichsbaches bei Morgenthau nächst Haida (Anders). — Am Kleisbache bei Haida c. per.; (1895 legit Schmidt).
21. *Jungermannia Mülleri* Nees. Im Pfarrwalde bei Turnau, V. 1896 (Schmidt).
22. *Jung. alpestris* Schleich. Beim „Zeughaus“ in der böhm.-sächs. Schweiz (Schmidt).
23. *Jung. ventricosa* Dicks. Var.: *longidens* (Lindbg.) Breidler. Am Mertendorfer Steinberg bei Leipa (Schmidt).
24. *Jung. excisa* Dicks (= *Jung. intermedia*, β -*major* Nees). Im Stadtwalde bei Bensen, IX. 1890 (Schmidt).
25. *Jung. gracilis* Schleich. (= *Jung. attenuata* Lindenb.) Beim Wittighause im Isergebirge, September (1888 von Schmidt gesammelt).

26. *Cephalozia connivens* (Dick.) Spruce. Bei Haida in der Nähe der Steinbrüche gegen Rodowitz, an einer feuchten Stelle (Schmidt).
27. *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. Auf Sandstein im Thiergarten zu Haida (Anders).
28. *Sphagnocoetis Hübneriana* Rbh. An Sandsteinfelsen bei Bürgstein, Juni 1897 (Schmidt).
29. *Lophocolea bidentata* (L.) Dum. Höllengrund bei Leipa, c. fr. (Schmidt). — Piessnig bei Leipa (Anders).
30. *Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Dum. Auf morschem Holze in Wäldern bei Morgenthau und Nordseite des Kleis bei Haida (hier c. per.) (Anders).
31. *Harpanthus scutatus* (Web. et Mohr) Spruce. An Sandsteinfelsen bei Habstein; leg. 1886 Schmidt.
32. *Harpanthus Flotowianus* Nees. In der Nähe der Elbfallbaude im Riesengeb., Aug. 1896 (Schmidt). — Auf der grossen Iserwiese; leg. 1888 Schmidt.
33. *Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda. Im Friedrichsbach bei Morgenthau nächst Haida (Anders).
34. *Geocalyx graveolens* (Schrad.) Nees. Fruchtend an Sandstein beim Grohmanns-Berge bei Haida (Anders).
35. *Lepidozia setacea* (Web.) Mitt. An Sandstein bei Rodowitz nächst Haida (Anders).
36. *Bazzania trilobata* (L.) Gray. Nordseite der Rabensteine bei Rodowitz nächst Haida, auf Sandstein, reichlichst fruchtend (Anders).
37. *Bazzania triangularis* (Schleich.) Lindb. Bei den Rabsteinen nächst Haida (Schmidt). — Grosse Iserwiese, Sept. 1888, und Elbwiese im Riesengebirge, Aug. 1896 (Schmidt).
38. *Trichocolea tomentella* (Ehrh.) Dum. Weissbach im Isergeb. (1896 legit Schmidt).
39. *Ptilidium pulcherrimum* (Web.) Hpe. Fruchtend auf Phonolith an der Nordseite des Kleis bei Haida (Anders).
40. *Ptilidium ciliare* (L.) Hpe. Auf Haideboden bei Leipa und Haida, häufig (Anders).
41. *Lejeunia cavifolia* (Ehrh.) Lindb. (= *Lej. serpyllifolia* Libert.) Auf Phonolith der Nordseite des Kleis nächst Haida (Anders). — Paulinenthal bei Leipa, c. per. (Schmidt).

Musci.

42. *Sphagnum imbricatum* (Hornsch.) Russ. Am Fusse des Kleis nächst Rodowitz (1896 legit Schmidt et Schiffner).
43. *Sph. medium* Limpr. Var.: *glaucescens* Warnst. forma *brachy-anoclada*. Bei der oberen Brettmühle bei Herrnskretsch (Schmidt).
44. *Sph. quinquefarium* (Braithw.) Warnst. Im Kaathale in der böhm. Schweiz und bei Sonneberg (Schmidt). — Var.: *pallesceus* Warnst. Bei Wartenberg nächst Gabel (Schiffner).
45. *Sph. obtusum* Warst. Im Strassengraben bei Neuhütte in Nordböhmen (legit Sept. 1888 Schmidt).
46. *Sph. riparium* Ångstr. Ebenda (1893 legit Schmidt).
47. *Sph. subnitens* Russ. et Warnst. Hierher gehören die im „Lotos“ N. F. VII. Band, pag. 68 unter *Sph. acutifolium* Ehrh. Var. δ) publicirten Standorte: Fohlenwiesen bei Kienast nächst Leipa, c. fr.; Sumpfwiesen bei Schwora, steril; Kleis; ferner noch Rodowitz bei Haida (legit Schmidt).
48. *Sph. Russowi* Warnst. Rodowitz bei Haida, c. fr., ferner Sonneberg bei Leipa (Schmidt).
49. *Sph. subsecundum* (N. ab E.) Limpr. Rodowitz bei Haida (Schmidt).
50. *Sph. fimbriatum* Wils. Khaa in der böhm. Schweiz, steril (Schmidt).
51. *Andreaea petrophila* Ehrh. Im Schaiba-Wald bei Haida auf Phonolith; im Arnsdorfer Wald (bei Haida), ebenfalls auf diesem Substrate (Anders).
52. *Acaulo muticum* (Schreb.) C. Müller. Auf Kleebrachen bei Rodowitz nächst Haida (300 m etwa), Oct. 1889 legit Schmidt.
53. *Rhabdoweisia fugax* (Hedw.) Bryol. eur. Auf Sandsteinfelsen bei Haida z. B. in Ronge's Gründel, beim Grohmanns-Berge, bei Rodowitz, häufig und stets fruchtend (Anders).
54. *Cynodontium torquescens* (Bruch.) Limpr. Bei Widim (Schmidt).

55. *Dichodontium pellucidum* (L.) Schpr. In einem Wassergraben der Jarischmühle beim Kleis nächst Haida (Schmidt).
56. *Dicranella varia* (Hedw.) Schpr. Fruchtend an Wegrändern im Gemeindewalde zu Bensen (April 1888 Schmidt).
57. *Dicranum Blytii* Bryol. eur. Unterhalb der Wiesenbaude im Riesengebirge, 1893 legit Schmidt. Ist schon hier von Milde gefunden worden.
58. *Dicranum Starkei* Web. et Mohr. Beim Mummelgrund im böhmischen Riesengebirge, 1893 von Schmidt gesammelt.
59. *Dicr. scoparium* Hedw. Var. *orthophyllum* Bryol. eur. Schneeberg bei Tetschen (Schmidt).
60. *Seligeria pusilla* (Ehrh.) Bryol. eur. An feuchten Felstrümmern im Pfarrwalde bei Turnau, 26. V. 1896 von Schmidt gefunden. Ist von hier schon von Prof. Dědeček publicirt worden.
61. *Brachydontium trichodes* (Web. fil.) Bruch. Nach Breidler's Untersuchung gehört die am Nordabhange des Kleis auf Phonolithtrümmern fruchtende Pflanze (Siehe „Lotos“ N. F. X. Bd. pag. 10.) hieher.
62. *Ditrichum tortile* (Schrad.) Lindb. Auf Sandstein bei Habstein (Schmidt). — Schnauhübel bei Khau (Schmidt).
63. *Distichum capillaceum* (Sw.) Br. eur. Blottendorfer Berg (622 m) bei Haida (Schmidt).
64. *Barbula unguiculata* (Huds.) Hedw. Auf Phonolithfelsen der Ostseite des Kleis bei Haida (Schmidt).
65. *Tortula subulata* (L.) Hedw. Kahler Berg (290 m) bei Leipä (Anders).
66. *Tortula ruralis* (L.) Ehrh. Auf Phonolith des Ortelsberges (350 m) bei Zwickau (Anders).
67. *Schistidium confertum* (Funck.) Bryol. eur. Auf Phonolith des Kleis (750 m) bei Haida (Schmidt 4. IV. 1891 legit).
68. *Grimmia incurva* Schwgr. An Felsen des Riesengebirgs-Kammes, VIII. 1895 legit Schmidt.
69. *Gr. funalis* (Schwgr.) Schimp. Auf dem Kleis bei Haida von Schmidt 16. V. 1890 gefunden.

70. *Dryptodon Hartmanni* (Schpr.) Limpr. Am Zeidler-Hübel (460 m) bei Wolfsberg nächst Schönlinde (Schmidt).
71. *Racomitrium protensum* A. Braun. Beim Buchberge im Isergebirge (Sept. 1888 von Schmidt gesammelt).
72. *Rac. sudeticum* (Frunck) Br. eur. Weissbach im Isergebirge (1885 leg. Schmidt).
73. *Rac. lanuginosum* (Hedw.) Brid. Wannow bei Aussig (Schmidt).
74. *Hedwigia albicans* (Web.) Lindb. Auf Basalt und Phonolith um Haida, Zwickau und Leipa häufig (Anders).
75. *Amphoridium Mougeotii* (Bryol. eur.) Schimp. Auf Sandsteinfelsen des Kirnitschthales bei Khaa (Schmidt).
76. *Orthotrichum fastigiatum* Bruch. Bei Kreibitz, Wolfsberg und Schönlinde (Schmidt).
77. *Orth. straminium* Hornsch. Keuliger Berg (940 m) bei Weissbach im Iserg., auf Buchen (Schmidt).
78. *Orth. diaphanum* Schrad. Auf Pappeln bei Haida, Zwickau, Gabel (Schmidt).
79. *Encalypta vulgaris* Hedw. An Wegrainen oberhalb Praskowitz a. d. Elbe (Anders).
80. *Enc. ciliata* (Hedw.) Hoffm. Auf dem Langenauer Berge (460 m) bei Leipa (Schmidt).
81. *Schistostega osmundacea* (Dickson) W. et M. Bei der oberen Schleusse nächst d. Restauration im Khaathale. Aug. 1894 von Schmidt gesammelt.
82. *Physcomitrium pyriforme* (L.) Brid. Beim Leipaer Bräuhaus (Anders) und im Schulgarten zu Haida (Schmidt).
83. *Webera annotina* (Hedw.) Schwgr. Tellnitz im Erzgebirge (legit Maly, teste Schmidt).
84. *Bryum affine* (Bruch.) Lindb. Var.: *cirrhatum* (Jur.) Breidler. Riesengebirgskamm, VIII. 1895 (Schmidt).
85. *Bryum erythrocarpum* Schwgr. Bei der Schleifmühle nächst Leipa, VI. 1885 (Schmidt). — Bei Rodowitz nächst Haida (Schmidt).
86. *Bryum Mildeanum* Jur. Basalt des Herrnhausberges bei Steinschönau (Schmidt IV. 1891). War schon Juratzka von hier bekannt.
87. *Mnium rostratum* Schrad. Am Grunde von Mauern in der Stadt Haida (Anders).

88. *Bartramia ithyphylla* Brid. Auf dem Phonolith des Kleis bei Haida (Anders).
89. *Bartr. pomiformis* (L.) Hedw. Kleis und am Langerberg bei Habstein, auf Phonolith (Anders).
90. *Bartr. Halleriana* Hedw. Zwischen Phonolithblöcken auf der Nordseite des Kleis (Anders).
91. *Philonotis fontana* (L.) Brid. An feuchten Stellen im Schaibaer Wald bei Haida und in den Wäldern am Kleis bei Haida (Anders et Schmidt).
92. *Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) Lam. Oberhalb des Wittighauses im Isergeb., im Menge fruchtend (9. IX. 1888 legit Schmidt).
93. *Pogonatum aloides* (Hedw.) P. Beauv. Schreckenstein bei Aussig (Schmidt).
94. *Pogonatum alpinum* (L.) Roehl. Zeschkenstein bei Parchen nächst Haida (Schmidt).
95. *Buxbaumia aphylla* L. Kleiswälder bei Haida (Schmidt).
96. *Buxb. indusiata* Brid. Nordseite des Kleis bei Haida (Anders).
97. *Fontinalis antipyretica* L. Im Kleisbache bei Haida und im Sonneberger Bache bei Langenau nächst Leipä (Anders).
98. *Homalia trichomanoides* (Schreb.) Schimp. Auf Basalt des Steinberges bei Franzensthal (Anders).
99. *Leskea nervosa* (Brid.) Myr. An Laubholz bei Parchen nächst Haida (Schmidt).
100. *Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Bryol. eur. Arnsdorfer Wald bei Haida (Anders).
101. *Pterigynandrum filiforme* (Timm) Hedw. Kleiswälder bei Haida (Anders).
102. *Brachythecium reflexum* (Starke) Bryol. eur. Weissbach im Isergeb. (1896 Schmidt legit).
103. *Eurhynchium strigosum* (Hoffm.) Br. eur. Var.: *imbricatum* Bryol. eur. Kleinwöhlen bei Bensen und Höllengrund bei Leipä (1888 und 1887 legit Schmidt).
104. *Thamnium alopecurum* (L.) Bridel. Schnauhübel im Langehorngrunde bei Schönlinde und beim Kalkofen nächst Daubitz (Schmidt).

105. *Plagiothecium nitidulum* (Wahlenbg.) Bryol. europ. An Bäumen bei Weissbach im Isergeb. (von Schmidt VIII. 1895 gefunden).
 106. *Plag. silesiacum* (P. Beauv.) Br. eur. Kleis. auf Baumstrünken (1891 von Schmidt gesammelt).
 107. *Hypnum Sommerfeltii* Myrin. Strassenmauern bei Haida, 1888 (Schmidt).
 108. *H. cordifolium* Hedw. Thiergarten bei Haida (Anders).
 109. *H. dilatatum* Wils. Elbfall im Riesengeb. (1895 von Schmidt aufgefunden).
 110. *H. eugyrium* Schmp. Buchberg im Isergeb. (Schmidt).
 111. *H. molle* Dicks. In der Wittig bei Weissbach im Isergebirge (IX. 1888 von Schmidt entdeckt).
 112. *H. Crista Castrensis* L. Sonneberg bei Leipa, c. fr. (Schmidt). — Langenauer Berg bei Leipa (Schmidt). — Auf Humus- und Basaltboden im Schaibaer Wald, in den Kleis- und Arnsdorfer Wäldern bei Haida (Anders).
 113. *H. exannulatum* Güm b. Grosse Iserwiese im Isergeb. (Schmidt).
 114. *H. Sendtneri* Schimp. Habsteiner Supfwiesen (Schmidt)
 115. *H. intermedium* Lindb. In Gräben an der Bahn bei Nieder-Liebich bei Leipa (Schmidt).
 116. *H. reptile* Rich. Sieghübel und Buchberg im Isergeb., auf alten Stöcken (Schmidt).
 117. *Hylocomium squarrosus* (L.) Bryol. europ. Var.: *subpinnatum* (Lindbg.) Schimp. Nordseite des Buchberges im Isergeb. (1888 legit Schmidt).
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Matouschek Franz

Artikel/Article: [Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen VI. 90-97](#)