

sind kaum mit einem häutigen Rande umgeben. 3. Die Pflanze ist armblüthig, höchstens 3-blüthig. Von *C. latifolium* und *alpinum*, denen es der Blüthe und den Deckblättern nach nahe steht, durch den zarten sparrigästigen Stengel und ebenfalls durch die Blätterbüschel. — Syn. *C. serpyllifolium* Tausch herb. Nro. 253, *C. alsinifolium* Tausch (?) Syll. II. 244.

Cerastium Kablikianum Wolfner.

(Orthodon Ser. — Capsulae cylindricae vel ovatae, dentibus margine revolutis.)

Caudiculis adscendentibus; caulibus sterilibus erectis, floriferis dichotomo-ramosis, multifloris; foliis turionum spathulatis vel lanceolatis, pilosis vel glabriusculis; caulinis ovatis, ovato-lanceolatis vel lanceolatis, obtusiusculis, pilosis; floribus dichotomo-ramosis; pedicellis pilosis, calyce multo longioribus; defloratis refractis; bracteis herbaceis, dense hirsutis ciliatis, apice subbarbatis, petalis calyce duplo longioribus; sepalis late membranaceis acutiusculis; capsulis cylindricis, calyce duplo vel triplo longioribus. — Habit. prope Einsiedel in Bohemia et detectum ab cl. Domin. Josefine Kablik. — Syn. *C. alsinifolium* Kablik in sched. (non Tausch.)

Steht zwischen *C. latifolium*, *alpinum* und *ovatum* in der Mitte, unterscheidet sich jedoch durch folgende Merkmale. Von *C. latifolium*: 1. durch den gabelgästigen, vielblüthigen (nicht 1—3 blüthigen) Stengel. 2. die nicht blühenden Stämmchen sind viel kleiner (nicht so gross) als die blühenden und 3. durch die Blätter, welche in verschiedener Höhe verschieden gestaltet sind. Von *C. alpinum*: 1. Durch die nicht kriechenden Stämmchen. 2. Durch die sehr langen Blüthenstielchen, und 3. durch die fast gebarteten Spitzen der krautigen, kaum häutigen Deckblätter. Von *C. ovatum* vorzüglich durch den Mangel eines breithäutigen Randes der Deckblätter und durch den reichblüthigen Stengel; und von allen dreien durch die sehr lange Kapsel, die im ganz reifen Zustande 3 mal so lang als der Kelch ist. —

Aus James Dana's Conspectus of the Crustacea.

Mitgetheilt von Dr. Weitenweber.

(Fortsetzung).

Aus der von J. Dana ferner aufgestellten zweiten Familie aus der Abtheilung der Crustacea Cancroidea, nämlich den Eriphiden, sind folgende neue Arten mitzutheilen:

117. *Galeus hawaiensis*. Pedes postici 8 sat graciles, articulo-

3^{to} supra paulo pubescente, sequentibus pubescens; margine antero-lateralis 4-dentato, dentibus duobus anticis obtusis, anteriore ad marginem paulo excavato. Habit. ad insulas Hawaienses. Longit. carap. $7\frac{1}{2}$ "", latit. $10\frac{1}{2}$ ". — An varietas *G. natalensis* Krauss?

118. *Pseudozius planus*. Carapax latus, laevis, fere planus, non areolatus, antice prope marginem leviter impressus, fronte fere rectâ, paulo emarginatâ, margine antero-lateralis paulo acuto, fere integro, levissime 4-lobato, margine postero-lateralis paulo recto. Articulus antennarum extern. unus angustus et brevis, frontem non attingens. Pedes antici paulo inaequales, laeves et nudi, carpo non rugato, manu supra rotundata; digitis acuminatis, sat longis, non canaliculatis, digito mobili prope basin armato cum dente crasso obliquo. Pedes postici fere nudi, tarso hirsuto. Habit. ad insulas Pœumotenses et insulam Wakes. Long. carap. $5\frac{1}{2}$ "", latit. 9".

119. *Pseudozius inornatus*. Carapax paulo latior, prope marginem anticum abruptius impressus, margine antero-lateralis distinctius 4-lobato. Articulus antennarum externe unus angustus et brevis, frontem non attingens. Pedes antici inaequales, carpo leviter rugato, digitis acuminatis. Pedes postici latiores, articulo penultimo supra sparsim hirsuto, tarso hirsuto. Habit. ad insulas Hawaienses. Long. carap. foeminae ovigerae $6\frac{1}{2}$ "", latit. $11\frac{1}{4}$ ". — *P. planus* carapace affinis.

120. *Pseudozius dispar*. Carapax angustus, laevis, paulo nitidus, omnino usque ad frontem nec areolatus nec inaequalis; fronte fere rectâ, leviter emarginatâ, margine antero-lateralis laevissime 3-dentato, dentibus non salientibus. Pedes antici inaequales; major crassus, laevis, nudus, manu supra rotundata; manu minore minute tuberculata, tuberculis partim paulo seriatis; digitis acuminatis. Pedes postici fere nudi, paucis pilis sparsis. Habit. in mari Suluensi. Long. carap. foeminae 3, 3 "", latit. 4".

121. *Pilumnus globosus*. Carapax valde convexus, subglobosus, parce transversus, non areolatus, vix granulosus, breviter pubescens; fronte emarginatâ, margine antero-lateralis fere integro, dentibus minutis 3—4 granuliformibus, isolatis. Pedes antici crassi, inaequales; omnino hirsuti minuteque tuberculati, tuberculis non seriatis. Pedes 8 postici omnino hirsuti. Habit. ad insulam Tahiti, Waterland et Raraka. Longit. carap. $5\frac{1}{2}$ "", latit. $6\frac{1}{2}$ ".

122. *Pilumnus laevimanus*. Carapax parce convexus, non areolatus, antice vix laevis, fronte emarginatâ; margine antero-lateralis 3-dentata, angulo orbitae externo vix prominente excluso, dentibus minutis, non acutis. Pedes antici valde inaequales; carpo obsoleto tuberculato, manu majori crassâ, nudâ, laevi, extus non costatâ, minore hirsutâ et minute tuberculatâ. Pedes reliqui partim hirsuti. Habit. in freto Balabac. Long. carap. maris 3 "", latit. 4".

123. *Pilumnus laevis*. Carapax omnino laevis, nitidus, non areo-

latus, parce convexus; fronte emarginatâ; margine antero-lateralî 3-dentatâ, dentibus minutis spiniformibus, posteriore minimo, angulo orbitae externo non prominente. Pedes antici valde inaequales, carpo laevi, non obsolete tuberculato; manu majore omnino laevi, minore sparsim hirsutâ, non tuberculatâ. Pedes 8 postici tenues, paulo hirsuti. Habit. in freto Balabac. Longit. carap. foem. 2'', lat. 3''. — *P. laevimanus affinis*, latior.

124. *Pilumnus calculosus*. Carapax parce convexus, antice non areolatus, pubescens; fronte emarginatâ, margine antero-laterali perbrevi, 4-dentato, dente postico minime, reliquis crassiusculis; margine orbitali inferiore 3-dentato. Pedes antici subaequales; carpo tubercululis paucis grandibus, elongatis, nudis, complanatis armato et inter haec tubercula hirsuto; manu supra quoque armatâ. Pedes 8 postici hirsuti, articulis 4to 5toque supra gibbosis. Habit. ad insulam Madeira (?). Long. carap. $3\frac{1}{4}$ '', latit. $4\frac{1}{4}$ ''.

125. *Pilumnus tenellus*. Carapax pedesque toti subtilissime tomentosi. Carapax convexiusculus, non areolatus, fere quadratus, paulo transversus; fronte emarginatâ, margine antero-laterali perbrevi, 3-dentato, dentibus minutis spiniformibus, posteriore minimo. Pedes antici non tuberculati, 8 postici longi et pertenues, filiformes, tarso subtilissime pubescente. Habit. in mari Suluensi. Long. carap. $2\frac{1}{2}$ '', latit. 3''.

126. *Pilumnus mus*. Carapax pedesque dense crasseque lanati, capillis longis tubulatis. Carapax parce granulatus; frons simbria longâ ornata, margine antero-laterali crasse 3-dentato, dente altero brevi inter duos anteriores infra insito. Pedes antici inaequales, manu minute tuberculatâ, tuberculis superficie exterae seriatis. *P. ursulo* affinis. Habit. ad insulas Samoenses vel Tonigenses. Long. carap. $11\frac{1}{2}$ '', lat. 16''.

127. *Actumnus tomentosus*. Carapax angustus, convexus, subglobosus, subtiliter tomentosus, antice leviter partim areolatus, fronte et lateribus curvatim declivis; fronte emarginatâ, margine antero-laterali leviter 4-lobato, in margine postero-laterali concavo, laevi. Articulus antennarum externarum primus processum frontis oblongum attingens tantum. Pedes antici crassi, subaequales, subtilissime tomentosi, minute tuberculati, digitis brevibus, dentibus eorum contiguis et non hiantibus. Pedes 8 postici aeque tomentosi, posteriores paulo dorsales. Habit. ad insulam Opolu vel Tahiti. Long. carap. 4'', latit. 5''.

128. *Actumnus obesus*. Carapax maxime convexus, suborbicularis, antice laeviter areolatus, areolis planis, granulosis, granulis nudis, interstitiis et sulcis subtilissime velutinis; fronte paulo productâ, emarginatâ; margine antero-laterali arcuato, fere integro, laevissime 4-lobato, lobis minute denticulatis; margine postero-laterali valde concavo. Pedes antici crassi, manu acie supra instructâ, valde granulosâ, granulis vix seriatis, superioribus paulo

elongatis acutisque, digito mobili spinulo-granulato, postice perbrevi. Pares reliqui valde compressi, minute velutini, marginibus hirsutis. Habit. prope insulam Maui Hawaiensem. Long. carap. $6\frac{1}{4}$ "", latit. $8\frac{1}{2}$ "".

129. *Eriphia scabricula*. Carapax partim scabriculus, areolis non transversim rugatis, regione antero-laterali non areolatâ; fronte integrâ, subtilissime denticulatâ; margine orbitali nec infra nec supra spinulosa. Pedes antici omnino scabriculi, manu carpoque pubescens, digito mobili cum dente basali paulo grandi armato. Pedes postici subtenues, paulo hirsuti. Habit. ad insulas Vitienses et Tahitienses, quoque in mari Suluensi. Long. carap. maris $6\frac{3}{4}$ "", latit. 10"".

130. *Eriphia armata*. Mediocriter crassa. Carapax antice transversim paulo rugatus, margine areolarum nonnullarum per rugam granulosam conspicuo, areolis duabus circumscriptis, spinosis; fronte paulo deflexâ, emarginatâ, denticulatâ, denticulis parvulis conicis; regione orbitali internâ 1—2 spinosâ, ejus margine externo 2—3 spinoso, margine superno subtiliter denticulato; margine antero-laterali carapacis subacuto, 5-spinoso (spinis orbitae exclusis), spinis acutis. Pedes antici spinulis valde armati et extus hirsuti, manu majore extus seriatim spinulosâ, infra laevi, digito ejus mobili cum dente magno obliquo infra armato. Pedes postici hirsuti. Habit. juxta portum Rio negro Patagoniae orientalis. Longit. carap. $9\frac{1}{2}$ "", latit. $13\frac{3}{4}$ "".

131. *Trapezia speciosa*. Latera carapacis inermia; frons fere integra, versus oculos et ad medium obsolete emarginata. Pedes antici subaequales, carpo supra obtuso, articulo 3to apicem internum acuto (rectangulato) et marginem internum denticulato, denticulis subquadratis, minutis. Pares reliqui toti tenues, articulis 3to et sequentibus perangustis, subcylindricis. Habit. ad insulam Carlshoff Paumotensem. Longit. $2\frac{1}{2}$ "". Carapax carneus, lineis paucis rubris latissime areolatus.

132. *Trapezia bella*. Latera carapacis inermia; frons subintegra, obsolete sinuosa, crenaturis sex obsoletis. Pedes antici subaequales, nudi, carpo obtuso; articulo 3to ad apicem internum acuto (rectangulato) marginemque regulariter serrulato, denticulatis triangularibus. Pedes 8 postici graciles, articulis 3to et sequentibus subcylindricis. Habit. ad insulam Carlshoff. Longit. $2\frac{1}{2}$ "". Carapax carneus rubro punctulatus. An varietas T. speciosae?

133. *Trapezia areolata*. Latera carapacis dente armata. Frons sinuosa, angulo orbitae inferiore interno subacuto. Pedes antici mediocres, margine articuli 3to interno serrato, dente apicali curvato, carpo ad angulum internum acuto. Pedes reliqui sat breves, sparsim pubescentes; tarsio paulo breviore quam articulus praecedens. Carapax colore bruneo late areolatus. Habit. ad insulam Tahiti. Long. carap. $3\frac{1}{2}$ "", latit. 4"". T. dentata M'Leay affinis; an varietas alia. Forsan varietas T. ferruginea?

134. *Tetralin nigrifrons*. *Latera carapacis inermia*. Frons subtiliter denticulata, parce sinuosa, medio obsoleta bilobata. Pedes antici valde inaequales, carpo intus spini-acuto. Pedes reliqui fere nudi, articulo tertio parisi postici latissimo, sesqui longiore quam lato, fere triplo latiore quam articulus 5tus. Ilhabit. ad insulam Ilonden Paumotensem. Long. 2—3''. Carapax albus, margine antico nigro, pedes fusci.

135. *Tetralia armata*. *Carapacis latus spinâ armatum*. Frons subtilissime denticulata, non sinuosa. Pedes antici inaequales, manu extus prope basin pubescente, carpo spinis duabus intus armato; articulo 3tio prope apicem internum 4 denticulis tenuibus ornata. Pedes postici mediocres, articulo 3tio paulo angusto. Ilhabit. ad insulam Tongatabu. Longit. 2''.

136. *Quadrella coronata*. *Carapax laevis*, subquadratus, lateribus pauculum arcuatis et medio 1-spinosis, dentibus frontis 6 medianis paulo longioribus, externis perbrevibus, dente infra-orbitali elongato. Pedes antici elongati, manu angustâ, triplo longiore quam corporis dimidium, inermi, laevi; carpo intus 2-spinoso, brachio ad marginem anticum bene 7-spinoso. Pedes postici graciles, fere cylindrici, articulis subtilissime pubescensibus; articulo 5to marginibus parce pubescenti, tarso infra spinuloso. Habit. in mari Suluensi. Long. carap. et latit. $3\frac{1}{2}''$. Longit. manus $5\frac{1}{2}''$, digiti mobilis $2\frac{1}{2}''$, brachii $3\frac{1}{4}''$.

(Beschluss.)

Ueber Veronica Lappago Schrank.

Von P. M. Opiz in Prag.

Im Jahre 1807 bemerkte ich auf einem Felde zwischen Winterkorn unter *Veronica hederaefolia* L. eine Pflanze, die sich auf den ersten Blick von dieser, durch den gedrängten Wuchs, das grauliche Aussehen, die kleineren, dickern, 3lappigen Blätter und die gesättigt blauen, stets kurz gestielten Blüthen, welche an *Veronica triphyllus* L. erinnern, unterscheidet.

Da mir die wenigen Werke, welche mir dazumal zu Gebote standen, keinen weitern Aufschluss über diesen Ehrenpreiss geben konnten, führte ich denselben in meinem Herbarium oder systematischen Verzeichniss der in meiner Pflanzensammlung befindlichen Pflanzen (1808 mst. unter Nro. 181) als eigene Art, mit folgenden Worten an:

Veronica triloba Opiz; floribus pedunculatis, folio brevioribus; foliis petiolatis, trilobis, cordatis, laciniis (!) calycinis cordatis, caule procumbente (floribus saturate caeruleis).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Weitenweber Wilhelm Rudolph

Artikel/Article: [Aus James Dana's Conspectus of the Crustacea 153-157](#)