

Folgen der neuen Wirthschaft und ihren Einfluss auf Ackerbau und National-Reichthum etwas gründlicher besprechen werden.

## Zwei neue Pflanzenarten aus Böhmen.

Beschrieben von *Wilhelm Wolfner*.

### 1. *Allium (Molium) Opizii Wolfner!*

(Stamina omnia simplicia, basi subdilata, subhypogyna.)

**Diagnosis.** Scapo trigono, nudo, ad basin semper monophyllo; folio lineari-lanceolato, plano, subtus carinato, glabro, acutiusculo; spatha monophylla, 1—2 laciniata; umbella 1—2 flora, capsulifera; petalis oblongis, obtusiusculis, staminibus duplo longioribus. — Flores albi, carina viridi.

Stern prope Pragam legit mense Majo 1854 Dom. Konopasek, et ab cl. Opizio quasi nova spec. distincta.

**Descriptio.** Bulbus ovato-rotundatus, tunicatus, magnitudine nucis avelanae. Scapus acute trigonus, debilis, pedalis, viridis, versus basin semper monophyllus. Folium lineari-lanceolatum, planum, subtus carinatum, acutiusculum, scapo aequante vel paulo superante, (3—4''' lat.) Umbella 1—2 flora, capsulifera. Capsulae albae, nitidae, magnitudine pisi. Spatha monophylla, 1—2 laciniata, membranacea. Pedicelli pollicares, penduli. — Perigonium campaniforme. Petala oblonga, obtusiuscula, alba, linea media viridi carinata (3—4''' longa, 2—2¼''' lata). Filamenta teretiuscula, alba, basi subdilata, perigonio ½ lin. adnexa. Antherae luteae. —

Proxime *A. pendulino* Tenor. (flor. neapol. I. 168 t. 31), sed differt: scapo ad basin semper monophyllo, umbella semper 1—2 flora (nunquam 6—20 flora), petalis obtusiusculis. — Cfr. Don monog. All. p. 88., Tenor l. c., Gusson prodr. flor. sicul. p. 400. —

### 2. *Cytisus repens Wolfner!*

Caule ramoso, repente, prostrato; ramis annotinis adscendentibus, patenti-pilosis; foliolis obovatis, vel ovali-ellipticis, subtus adpresse pilosis, supra subglabris; floribus terminalibus umbellato-capitatis, numerosis, flavis; vexillo disco aurantiaco; pedunculis exterioribus bracteatis.

In sylvis circa Biechowitz prope Pragam legit mense Junio 1854 W. Wolfner.

Differt a *C. austriaco*: caule repente, foliis obovatis vel ovali-ellipticis, supra subglabris; a *C. capitato*: Caule repente, foliolis subtus adpresse pilosis; a *C. supino*: floribus numerosis; a *C. hirsuto*: floribus terminalibus (non axillaribus), — Cfr. Koch Syn. Ed. II. (germanic.) 180, Gren. et Godr. flor. de Franc. I. 362, Woods the tourists flora 79. —

## Ergänzungsblätter zur Synopse der europäischen Orthopteren.

Von Dr. Franz X. Fieber in Hohenmauth.

(Fortsetzung.)

### Zur Fam. 4. *Acridiodea*.

1. **Tryxalis.** Ohne Brustknorpel. Mittelbrust länglich-trapezförmig, hinten 4eckig ausgeschnitten; Hinterbrust 6eckig, fast dreieckig ausgeschnitten. Rückenkiele ganz. Beine lang, schlank. Fühler vor dem obern Augeneinde fast unter dem erweiterten schneidigen Rande des Scheitels eingefügt.
1. **T. Klugii.** Körper grau, gelblich, grünlich ins röthliche ziehend, grün oder rosig gestreift und gekielt. Hinterschenkel aussen weisslich. Randfeld der Decken durchsichtig, häutig, grossmaschig. ♂ 4 Rückenschien mit paarigen schwärzlichen Flecken. Leibende schwärzlich.
2. **P. nasutus.** Pronot. fast parallel, hinten wenig erweitert. Flügel gelblich. Stirne und Pronot. oft rosig gestreift. Rückenkiele fast gerade. Decken-Mittelfeld mit weissem, rosigem und dunklem Streif, auch ohne diese variirend. Randfeld kleinmaschig, undurchsichtig. Seitenlappen hinten tief bogig ausgeschnitten. Stirne, Brust und Bauch eingestochen punktirt. Hinterleib oben rosig oder schwärzlich. *Gryllus nasutus* L. Sulz. hist. t. 8. f. 5. — Ins. t. 8 f. 57. — Rösel Ins. II. t. 4 ♀ — *Gryll. turritus* Vill. — *G. conicus* Stoll. *Truxalis hungaricus* Fab. *Trux. rufescens* Palis. Beauv. — ♂ 16—20, ♀ 20—27 Lin.
2. **Pyrgomorpha.** Brustknorpel plattenförmig. Mittelbrust 6eckig, hinten verkehrt-trapezf. ausgeschnitten. Hinterbrust fast trapezf.-6eckig, hinten quer 4eckig ausgeschnitten. Beine kurz; seitliche Rückenkiele körnig, unterbrochen. Fühler unter dem gerundeten Scheitelende eingefügt.
1. **P. grylloides.** Bräunlich. Scheitel und Pronot. braun. Wangen und Unterhälfte des Pronot. weisslich. Decken schmutziggelb, und wie die Schenkel schwarz gestrichelt. Flügelgrund rosig. *Truxalis rosea* var. Serv. O. 585. ♂ 8 $\frac{1}{2}$ , ♀ 11 Lin.
2. **Calephorus dubius.** Flügel ungefärbt, mit oft röthlichem Grunde und

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Wolfner Wilhelm

Artikel/Article: [Zwei neue Pflanzenarten aus Böhmen 176-177](#)