

Folgen der neuen Wirthschaft und ihren Einfluss auf Ackerbau und National-Reichtum etwas gründlicher besprechen werden.

## Zwei neue Pflanzenarten aus Böhmen.

Beschrieben von *Wilhelm Wolfner*.

### **1. Allium (Molium) Opizii Wolfner!**

(*Stamina omnia simplicia, basi subdilatata, subhypogyna.*)

**D i a g n o s i s.** Scapo trigono, nudo, ad basin semper monophyllo; folio linear-lanceolato, plano, subtus carinato, glabro, acutiusculo; spatha monophylla, 1—2 laciniata; umbella 1—2 flora, capsulifera; petalis oblongis, obtusiusculis, staminibus duplo longioribus. — Flores albi, carina viridi.

Stern prope Pragam legit mense Majo 1854 Dom. Konopasek, et ab cl. Opizio quasi nova spec. distincta.

**D e s c r i p t i o.** Bulbus ovato-rotundatus, tunicatus, magnitudine nucis avelanae. Scapus acute trigonus, debilis, pedalis, viridis, versus basin semper monophyllus. Folium linear-lanceolatum, planum, subtus carinatum, acutiusculum, scapo aequante vel paulo superante, (3—4" lat.) Umbella 1—2 flora, capsulifera. Capsulae albae, nitidae, magnitudine pisi. Spatha monophylla, 1—2 laciniata, membranacea. Pedicelli pollinaires, penduli. — Perigonum campaniforme. Petala oblonga, obtusiuscula, alba, linea media viridi carinata (3—4" longa, 2—2 $\frac{1}{4}$ " lata). Filamenta teretiuscula, alba, basi subdilatata, perigonio  $\frac{1}{2}$  lin. adnexa. Antherae luteae. —

Proxime *A. pendulino* Tenor. (flor. neapol. I. 168 t. 31), sed differt: scapo ad basin semper monophyllo, umbella semper 1—2 flora (nunquam 6—20 flora), petalis obtusiusculis. — Cfr. Don monograf. All. p. 88., Tenor l. c., Gusson prodr. flor. sicul. p. 400. —

### **2. Cytisus repens Wolfner!**

Caule ramoso, repente, prostrato; ramis annotinis adscendentibus, patent-pilosus; foliolis obovatis, vel ovali-ellipticis, subtus adpresso pilosis, supra subglabris; floribus terminilibus umbellato-capitatis, numerosis, flavis; vexillo disco aurantiaco; pedunculis exterioribus bracteatis.

In sylvis circa Biechowitz prope Pragam legit mense Junio 1854 W. Wolfner.

Dillert a C. austriaco: caule repente, foliolis obovatis vel ovali-ellipticis, supra subglabris; a C. capitato: Caule repente, foliolis subtus adpresse pilosis; a C. supino: floribus numerosis; a C. hirsuto: floribus terminalibus (non axillaribus), — Cfr. Koch Syn. Ed. II. (germanic.) 180, Gren. et Godr. flor. de Franc. I. 362, Woods the tourists flora 79. —

---

## Ergänzungsblätter zur Synopse der europäischen Orthopteren.

Von Dr. Franz X. Fieber in Hohenmauth.

(Fortsetzung.)

### Zur Fam. 4. Acriodiodea.

1. **Tryxalis.** Obne Brustknorpel. Mittelbrust länglich-trapezförmig, hinten 4eckig ausgeschnitten; Hinterbrust 6eckig, fast dreieckig ausgeschnitten. Rückenkiele ganz. Beine lang, schlank. Fühler vor dem obern Augenende fast unter dem erweiterten schneidigen Rande des Scheitels eingefügt.
1. **T. Klugii.** Körper grau, gelblich, grünlich ins röthliche ziehend, grün oder rosig gestreift und gekielt. Hinterschenkel aussen weisslich. Randfeld der Decken durchsichtig, häutig, grossmaschig. ♂ 4 Rückenschienen mit paarigen schwärzlichen Flecken. Leibende schwärzlich.
2. **P. nasutus.** Pronot. fast parallel, hinten wenig erweitert. Flügel gelblich. Stirne und Pronot. oft rosig gestreift. Rückenkiele fast gerade. Decken-Mittelfeld mit weissem, rosigem und dunklem Streifl, auch ohne diese variirend. Randfeld kleinmaschig, undurchsichtig. Seitenlappen hinten tief bogig ausgeschnitten. Stirne, Brust und Bauch eingestochen punktirt. Hinterleib oben rosig oder schwärzlich. Gryllus nasutus L. Sulz. hist. t. 8. f. 5. — Ins. t. 8 f. 57. — Rösel Ins. II. t. 4 ♀ — Gryll. turritus Vill. — G. conicus Stoll. Truxalis hungaricus Fab. Trux. rufescens Palis. Beauv. — ♂ 16—20, ♀ 20—27 Lin.
2. **Pyrgomorpha.** Brustknorpel plattenförmig. Mittelbrust 6eckig, hinten verkebt-trapezf. ausgeschnitten. Hinterbrust fast trapezf.-6eckig, hinten quer 4eckig ausgeschnitten. Beine kurz; seitliche Rückenkiele körnig, unterbrochen. Fühler unter dem gerundeten Scheitelende eingefügt.
1. **P. gryliooides.** Bräunlich. Scheitel und Pronot. braun. Wangen und Unterhälfte des Pronot. weisslich. Decken schmutziggelb, und wie die Schenkel schwarz gestrichelt. Flügelgrund rosig. Truxalis rosea var. Serv. O. 585. ♂ 8 $\frac{1}{2}$ , ♀ 11 Lin.
2. **Calephorus dubius.** Flügel ungefärbt, mit oft röthlichem Grunde und

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Wolfner Wilhelm

Artikel/Article: [Zwei neue Pflanzenarten aus Böhmen 176-177](#)