2. *Cicindella tarsalis*; elongata, vix cylindrica, fusco-picea opaca, thorace lateribus rotundatis, utrinque leviter constricto, breviter albo-pubescente, elytris ochreis, sutura antice lineolisque obliquis fuscis, apice oblique attenuatis serrulatis; labro transverso, edentato; tibiis testaceis, trochanteribus posticis flavis, tarsis posticis longissimis. Long. 0,48. Am Canotche rives in Georgien. — *C. blanda* var. γ Leconte.

3. *Chloenius vaffer*; nigro-piceus, capite cyaneo, thorace cyanescente, latitudine brevior, antrorsum angustato et ad latera rotundato, subtiliter obsolete punctato; elytris thorace latioribus, dense punctulatis, pubescentibus; striis fere ad apicem fortiter punctatis; antennarum basi pedibusque ferrugineis. Long. 0,45. — Creek-Gränze. Ist verwandt mit *C. tricolor*, nemoralis und vicinus.

4. *Eleodes sulcata*, nigra, thorace parvo, ovato, parce punctulato, basi truncato; elytris ovalibus apice acutis, dorso depressis, postice valde declivibus, profunde sulcato-striatis, sulcis granulatis; femoribus anticis breviter armatis. Long. 0,75—0,97. Kommt häufig in allen Theilen des Missouri-Gebietes vor.

5. *Myodes scaber*; ater, confertim punctatus, vertice elevato; thorace antrorsum angustato, utrinque truncato, medio obsolete carinato; elytris parce punctatis abdomineque flavis. Long. 0,35. — Aehnlich dem *M. subdipterus*.

6. *Acmaeodora variegata*, cupreo-aenea, pilosa, thorace brevi confertissime punctato, macula laterali lutea, elytris basi minus convexis, fasciis irregularibus luteis, anterioribus confluentibus. Long. 0,35.

7. *Dicera Woodhousii*; aenea, nitida, chalybeo-variegata; thorace cribratim punctato, brevi, lateribus valde rotundatis, antrorsum angustato, angulis posticis rectis; elytris apice integris, seriatim crenatis, maculis irregularibus, opacis, transversis profunde impressis. Long. 0,72—0,97.

8. *Pristilophus puncticollis*; niger, nitidus, thorace antrorsum subangustato, lateribus confertim, disco minus dense punctato; elytris crenato-striatis, interstitiis paulo convexis, distinctius punctulatis. Long. 0,75—0,90. — Ziemlich häufig in allen Theilen des Missouri-Gebietes; ist ähnlich dem *P. morio* Germar (Zeitschr. IV. 85.).

M i s c e l l e n.

* * Bekanntlich sind die Gestalten der Eiskrystalle, aus welchen die Schneeflocken bestehen, sehr mannigfaltig, und wurden von Scoresby auf fünf Hauptarten zurückgeführt. Sternförmige und sechsseitige Schneefiguren mit Strahlen, Zacken oder hervorstehenden Winkeln kommen am gewöhnlichsten

vor. Der Antheil der Spitzen und sechsseitigen Prismen beträgt, nach unsers geschätzten Meteorologen C. Fritsch zahlreichen und sorgfältigen Beobachtungen, etwa 10 Procent; alle anderen Formen sind verhältnissmässig selten. Eine Abhängigkeit der Gestalt des Schnees von dem Grade der Temperatur scheint nicht zu bestehen, da alle Formen sowohl bei hoher, als bei tiefer Temperatur vorgekommen sind. Doch wird die Abnahme der Grösse des Durchmessers der Schneefiguren mit der Lufttemperatur durch Hrn. Fritsch's Beobachtungen bestätigt. Nur in seltenen Fällen sind bei einem und demselben Schneeniederschlage die Flocken aus bloss einerlei Figuren zusammengesetzt, und gewöhnlich nehmen mehrere verschiedenartige Formen an ihrer Bildung Antheil. (Wiener Sitz.-Berichte.)

* * *Berichtigung.* Die unter dem Namen Chamaemelum Cotula β discoideum Opiz im v. J. durch die Tauschanstalt vertheilte Pflanze fand ich am 29. Junius 1853 unter Chamaemelum Cotula Gaertn. Mey. et Scherb. im Dorfe Zabählic bei Prag, und hielt sie sonach für eine bloss Varietät dieser Art, der sie habituel äusserst nahe steht. Ein vom Hrn. Bagge aus der Gegend von Frankfurt am Main erhaltenes Exemplar, und die nähere Würdigung ihres allgemeinen Kelches, lässt nun keinen Zweifel übrig, dass sie mit Chamomilla discoidea Gny einerlei sei, welche nach Mohl u. Schlechtendals bot. Zeit (10 Jahrg. S. 650) die nachstehenden Synonyme hat, als: *Matricaria discoidea* Dec., *Tanacetum parviflorum* Bernh., *Coenocline parviflora* Koch, *Cotula matricarioides* Bongard, *Artemisia matricarioides* Less. in Linnea, *Tanacetum matricarioides* Lessing synops., *Matricaria tanacetoides* Fisch., *Santolina suaveolens* Pursh. *Tanacetum suaveolens* Hook., *Lepidothera suaveolens* Nutt., *Akylopsis suaveolens* Lehm. Cat. Hamb., *Pyrethrum defloratum* Hortor. (1815) Lehmann in bot. berol. Heuer fand ich sie auch bereits; da ich jedoch viel früher als im v. J. in Zabählic war, nur in einzelnen Exemplaren. Ich ersuche daher unsere vaterländischen Naturforscher, auf ihr Vorkommen auch an anderen Orten gefälligst aufmerksam sein zu wollen, und im Falle des Auffindens hiervon in der gegenwärtigen Zeitschrift Nachricht zu geben.

P. M. Opiz.

* * Zum Belege, wie misslich es sei, die wenn auch von Alters her volksgebräuchlichen Pflanzennamen noch gegenwärtig in Anwendung zu ziehen — wie es manche Schriftsteller in Schutz nehmen wollen — möge folgende Notiz dienen. Wir wollen beispielsweise einen Fall aus der deutschen Sprache nehmen. Nach dem berühmten Wörterbuche von Jak. und Wilh. Grimm (II. Bds. 1 Lief. S. 186) ist „Blutkraut“ die Benennung verschiedener Pflanzen, als: *Rumex sanguineus*, *Sanguisorba*, *Geranium sanguineum*, *Chelidonium majus* und so weiter; Blutkrautwurz ist *Spiraea Ulmaria*; Blutwurz (S. 197) *Tormentilla*

oder *Geranium sanguineum*. — Wie soll man nun wissen, welche Pflanze unter derselben Benennung im concreten Falle gerade gemeint ist? Nebenbei beweist dieses Beispiel, dass die sogenannten Volksnamen, als offenbar Verwirrung und Missverständniß machend, für den jetzigen Botaniker, wenn nicht der botanische systematische Name dabei steht, ganz unbrauchbar und nur ein unnützer Ballast für sein, ohnediess auch anderweitig so sehr in Anspruch genommenes, Gedächtniß sind. *Weitenweber.*

* * Der soeben erschienene XXIV Band (1. Abtheilung) der *Nova acta Academiae Caesar. Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum (Vratislaviae et Bonnae 1854)* enthält nebst einem Vorworte, der Beschreibung der zweiten Säcularfeier und einer Fortsetzung des Mitgliederverzeichnisses bis zum December 1853, folgende höchst beachtenswerthe Abhandlungen: 1.) Zur Anatomie des *Rhinoceros indicus*. Nachtrag zu meiner Anatomie der Pachydermen, von Mayer; mit 4 Tafeln Abbild. — 2.) Duplicität des grösten Theiles des Körpers, beobachtet bei einem jungen Hasen, von Ludwig Neugebauer; mit 1 Tafel. — 3.) Over eenige nieewe Soorten van Notopterus van den Indischen Archipel, door P. Bleeker, mit 5 Tafeln. — 4.) Weitere Nachträge zur Kenntniß der Equiseten und ihrer Entwicklung, von J. Milde; mit 2 Tafeln. — 5.) Ueber den Bau der *Cecropia peltata* Linné, von H. Karsten; mit 2 Tafeln. — 6.) Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der mikroskopischen Algen und Pilze, von Ferd. Cohn, mit 6 Tafeln. — 7.) Das Epithelialgewebe des menschlichen Körpers, von Friedr. Günsburg mit 1 Tafel. — 8.) Ein Beitrag zur Kenntniß fossiler Ueberreste aus der Gattung *Arctomys*, von R. F. Hensel, mit 2 Tafeln Abbild. — 9.) Untersuchungen über die Wirkungen des Wassers, von Böcker. — 10.) Ueber die nordischen Geschiebe der Oderebene um Breslau, von E. F. Glocker. Diese Abtheilung zeichnet sich wiederum ebenso durch die Mannigfaltigkeit als die Gediegenheit der hier mitgetheilten Aufsätze aus. *Weitenweber.*

* * * An meine Pflanzentauschanstalt können aus den Buchstaben U. und V. bis Ende Februar 1855 alle Arten und Varietäten bis zu 25 Exemplaren eingeliefert werden, nur nicht: *Veronica hederaefolia* L. (Münchengrätz, Sekera) *V. triphyllus* L. (Frankfurt am Main, Bagge), *Vicia sativa* L. (Brüx, Gymnasium). Zugleich ersuche ich um Berichtigung des jährlichen Beitrages, genaue Angabe der Adresse und jener Gelegenheit, durch welche die Gegenseindung gemacht werden soll, die für mich, durch Buchhandlungen mit den geringsten Schwierigkeiten verbunden ist. *P. M. Opiz.*

Redacteur: Dr. Wilh. Rud. Weitenweber.

Druck von **Kath. Gerzabek.**

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Miscellen 190-192](#)