© Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

tato; fronte 4-dentatâ, dentibus acutis, inter se non aeque remotis, medianis proprioribus. Pedes antici fere aequales, carpo granulis minutis reticulato et scabriculo, intus elongate acuto; manu granulis asperatâ, inferne transversim pliculatâ. Pedes postici ad margines dense ciliati, articulo 3-tio superne non denticulato; tarso fere duplo longiore quam lato. Abdomen maris fere lineare, segmento penultimo ad basin non latiore. Carapax purpureo-punctatus, regionis medianae parte posteriore valde purpureus et sublunatus. Habit. juxta portum Valparaiso. Longit. carap. 2″ 6‴, latit. 3″ 4‴.

In Beziehung auf die zweite Abtheilung der Crustaceen, unter dem Titel der Corystoideen, verweist Dana darauf, dass er eine Uebersicht der dahin gehörigen Familien und Gattungen bereits im American. Journal scient. (Series II.) geliefert habe, und erwähnt hier nur aus der Familie der *Trichoceriden* die einzige Species:

149. Trichocera oregonensis. Carapax transversus, convexus, gibbosus, granulosus, antice et ad latera bene arcuatus, angulo laterali vix nstructus; margine laterali (postero-laterali incluso) 13-dentato, dentibus regularibus, brevibus; margine postero-laterali recto; fronte interantennali brevi rectâ, medium non emarginato. Pedes antici crassi; manu perbrevi, altâ, superne minute tuberculatâ, extus laevi et obsolete 5-costatâ. Pedes 8-postici pubescentes. Habit. in freto Pugettensi. Long. carap. $8^1|_2$‴, latit. 11‴.

Endlich aus der Familie der Corystiden ist eben auch nur eine einzige neue Art anzuführen:

150. Gomeza serrata. Carapax subovatus, scaber, breviter hirsutus, rostro ad apicem truncato, margine juxta apicem utrinque inciso; lateribus acute 5-serratis, serraturâ 4-ta fere medianâ, quoque subtilissime denticulatis. Habit. in mari prope Patagoniam orientalem. Long. carap. $1^1/_2$‴.

Bemerkungen über das Beisetzen der Autoren-Namen.

Von *P. M. Opiz.*

Viele Botaniker halten es noch itzt für überflüssig, dem systematischen Pflanzennamen jenen des betreffenden Autors beizusetzen. Um jedoch die Nothwendigkeit dieser Beisetzung zu beweisen, will ich hier beispielsweise die homonymen Namen einer unserer gemeinsten Pflanzen, der Fumaria officinalis aufführen und diesen ihre dermaligen Benennungen beifügen, da ich bei der Bearbeitung der Materialien meines Nomenclator botanicus so eben mit Einschaltung der meisten Synonyme dieser Gattung fertig geworden bin.

© Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Fumaria officinalis Bert. pl. exsicc. = 1844. Fumaria capreolata γ fructibus laevibus vel rugosis, pedicellis fructiferis erectis, floribus magnitudine ut in praecedentibus varietatibus vel minoribus, sepalis angustioribus. Parlatore giorn. bot. italian. an. 1. Tom. 1 p. 150—7.

— officinalis Burm. prodr. fl. cap. p. 20 = 1806 Fumaria agraria. Lagasc. elench. plant. h. reg. botan. matrit. 1806 p. 21. n. 282.

— officinalis Chaub. nuov. fl. dè pélop. 145. 1115 = 1816. Fumaria micrantha Lagasc. elench. pl. hort. bot. matrit. a. 1816 p. 21. n. 281.

— officinalis Fisch. pl. sic. in herb. del c = 1809. Fumaria Vaillantii Loisl. notis. p. 102.

— officinalis Linn. sp. pl. ed. I. J. 2. p. 700—7.

— officinalis Sturm flor. Deut. = 1824. Fumaria Sturmii Opiz Naturaltausch Nr. 10 p. 267.

— officinalis Tenor. pl. exsicc. ex Neapol = 1844. Fumaria officinalis β densiflora Parlatore. l. c. p. 127 n. 1.

— officinalis Webb. phyt. can. p 53 = 1753. Fumaria capreolata Linné spec. 985.

— officinalis ex promontorio bon. spei Masson in herb. mus. brit. = 1844 Fumaria capreolata γ Parlatore l. c. p. 150—7.

— officinalis! Isle de france Commerson herb. = 1844. Fumaria capreolata γ Parlat. l. c. p. 150—7.

Diese Probe mag auch nebenbei zeigen, ob mein Nomenclator etwas vollständiger werden wird, als Steudel's Nomenclator botanicus ist, bei welchem man leider die literärischen Quellen sehr selten genau angegeben findet. Bereits sind 1139 Fascikeln fertig, mehr als 600 Quellen benützt. Nehme ich den Fascikel mit 400 Octavblättchen an, so ergibt dies schon itzt eine Summe von 455.600 Blättchen.

Miscellen.

*** *Briefliche Mittheilung.* Dass seit ungefähr einem Jahrzehent eine wesentliche totale Veränderung der klimatischen Verhältnisse eingetreten ist, wird gewiss Niemand bezweifeln; denn abgesehen davon, dass nach Zeitungsberichten vor einigen Jahren zu einer und derselben Zeit in südlichen Ländern Europas, wo man Schnee und Eis bloss dem Namen nach kannte, plötzlich eine nördliche Kälte und in nördlichen Ländern eine ungewöhnlich warme Witterung eingetreten war — haben wir den Beweis des eingangs Erwähnten auch in der seit schon mehr als zehn Jahren dauernden Erdäpfel-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Opiz Philipp Maximilian

Artikel/Article: Bemerkungen über das Beisetzen der Autoren-Namen 254-255