

II. Originalmittheilungen.

Notizen zur Flora des südlichen Böhmerwaldes.

Von

ADOLF A. PASCHER, stud. phil.

(Aus dem botanischen Institute der k. k. deutschen Universität
in Prag.)

Im Folgenden sind die Standortsangaben einiger Pflanzen, deren Vorkommen weniger bekannt oder für Südböhmen neu ist, gegeben. Die Angaben beschränken sich grösstentheils auf jenen Theil des Böhmerwaldes, welcher den Krummauer Bezirk bildet.

Ueber die Flora dieses Theiles des Böhmerwaldes handeln hauptsächlich zwei Schriften: Allram: Die Phanerogamenflora von Krummau im Jahresberichte des k. k. Staatsobergymnasiums in Krummau 1882/1883 und Rodler: Verzeichnis der auf der Domaine Krummau, in Böhmen wildwachsenden, verwilderten und gewöhnlich cultivierten Pflanzen. Fürstlich-Schwarzenberg'sche Herrschaftsdirection in Krummau. 1873. Letztere Arbeit ist eine blosse Aufzählung von Namen ohne jegliche Standortsangabe. Ueber die Laubmoose um Krummau schrieb Prof. W. Essl. Viele Angaben machten auch Mardetschläger und Jungbauer.

Als Bestimmungsbücher wurden vor allem Beck R. v. Mannagetta: Flora von Nieder-Oesterreich, sowie L. Čelakovsky: Prodromus der Flora von Böhmen benützt.

Blechnum spicant Sm. Am Gehänge des Hochfichtels der St. Thoma, bei Mugrau, Höritz.

Botrychium lunaria Sw. An der Fuchswiese: in Wiesen bei Altspitzenberg; Spitzwald, Ogfolderhaid.

Poa fertilis Host. Bei Krummau, am Ufer des Kalschingerbaches (Krummauer Gymnasialherbar).

- Eragrostis minor* Host. Bei Krummau, auf sandigen Stellen bei der Papierfabrik Pötschmühle (Krummauer Gymnasialherbar).
- Carex teretiuscula* Good. In sumpfigen Wiesen nächst Maltschitz bei Krummau (Krummauer Gymnasialherb.).
- Carex paniculata* L. Auf nassen Wiesen bei Gojau nächst Krummau, sehr zerstreut.
- Carex elongata* L. Im Sachsenthal bei Krummau.
- Carex Buxbaumii* Wahlbg. In der Wasserkunst bei Krummau (Krummauer Gymnasialherbar).
- Carex caespitosa* L. In Wiesen nächst Maltschitz bei Krummau (Krummauer Gymnasialherbar).
- Carex Michellii* Host. In Wiesen bei Turkowitz; am Kalschingerbach bei Krummau.
- Cyperus flarescens* L. Auf Gehängen beim Mollebauerhof nächst Krummau (Krummauer Gymnasialherbar).
- Spirodela polyrhiza* Schleid. Bei Krummau, am Fischteiche rechts der Strasse nach Kalsching-Oberplan.
- Juncus glaucus* Ehrh. In Strassengraben bei Turkowitz nächst Krummau (Krum. Gymnasialherbar).
- Allium vineale* L. Mugrau bei Oberplan, am Nussberg bei Schlackern.
- Allium acutangulum* Schrad. Rabenstein bei Krummau (Krum. Gymnasialherbar).
- Muscari comosum* Mill. wird von Prof. Čelakovsky für die Umgebung Krummaus angeführt, wurde jedoch seither nicht wieder gefunden.
- Orchis ustulata* L. Krummau. Rosszipfwiese bei den „sieben Hügeln“.
- Orchis sambucina* L. Am Höchfichtel, auf der Fuchswiese, Lissi, bei Andreasberg, Ogfolderhaid.
- Cephalanthera rubra* Rich. Bei Krummau sehr selten; nächst Mugrau, Schwarzbach bei Oberplan, am Haselberg und am Nussberg.
- Herminium monorchis* R. Br. Bei Mugrau nächst Oberplan, seltener Weise auf einer Halde des Graphitbergwerkes.
- Listera orata* R. Br. Bei Mugrau u. Schwarzbach bei Oberplan, in Föhrengehölzen.
- Epipogon aphyllus* Sw. In Buchenwäldern, auf der Fuchswiese am Lissi bei Ogfolderhaid, bei Andreasberg; sehr selten und unbeständig. (P. Alois Petschl.)

- Salix repens* L. Auf nassen Wiesen am Abhange des Schöninger gegenüber dem Kalksteinbruche in Weichseln bei Krummau.
- Thesium pratense* Ehrh. An Ackerrainen, in trockenen Wiesen bei Mugrau-Nussdorf am Buchwald, bei Langenbruck, Krummau.
- Dianthus carthusianorum* L. In den Rosszipfwiesen bei Krummau, sehr spärlich.
- Dianthus superbus* L. Am Stubener-Berge bei Stuben, bei Oberplan, Kalsching, Polletitz.
- Kohlruschia prolifera* Kth. Krummau, auf Kalkfelsen unterhalb der Bahnaufmauerung. — Wahrscheinlich bis jetzt immer übersehen, da ich sie in dem Herbarium in Krummau nicht vorfand, und sie weder von Allram in seiner „Phanerogamenflora von Krummau“ noch von Rodler in seinem „Verzeichnis der auf der Domaine Krummau wildwachsenden . . . Pflanzen“ angeführt wird. Die Pflanze wurde bis in den October hinein blühend gefunden.
- Nuphar pumilum* Sm. Im Olschbach bei Mugrau, Schwarzbach bei Oberplan.
- Trollius europaeus* L. Auf feuchten Wiesen bei Schüttenhofen, bei Schichowitz.
- Ranunculus sardous* Crtz. Auf Weiden rechts an der Strasse von Höritz nach Oberplan; bei Kirchs Schlag, Platten.
- Sempervivum soboliferum* Sims. Mugrau, Spitzwald, in Mugrau durch einige Jahre schon ziemlich regelmässig blühend.
- Rubus bifrons* Vest. Krummau, Eichberg, Rosszipf, Reit.
- Potentilla fragariastrum* Ehrh. Wurde von mir an einer Stelle des Schindlauer-Berges bei Aigen gefunden. Leider kam mir das Exsiccata bei einer Besichtigung des Herbars abhanden.
- Poterium sanguisorba* L. In Südböhmen ziemlich verbreitet, Oberplan, Friedberg, Untermoldau etc.
- Alchemilla arvensis* Scop. Entgegen der Angabe im Prodomus um Krummau sehr zerstreut.
- Polygala amara* L. Langenbruck, auf den Wiesen gegen Ogfolderhaid und Ottetstift.
- Malva alcea* L. Beim Neusiedler Hammer bei Gojau.
- Hypericum acutum* Mnch. In feuchten Wiesen, Dorfgräben bei Oberplan, Langenbruck, Hohenfurth, Untermoldau, Kladen.

Hypericum quadrangulum L. Um Krummau, sowie im ganzen südlichen Böhmerwalde verbreitet; bei Oberplan, Friedberg, Hohenfurt etc. etc.

Chamaenerium palustre Scop. Krummau, Rosszipf. Diese Pflanze wurde am 12. August 1902 an einem gerölligen, übergrabenem Platze an oben bezeichneter Localität gefunden. Da der Boden überwühlt war, konnte ich nicht feststellen, ob sich die Pflanze hier schon durch mehrere Jahre eingebürgert hatte. Von 3 blühenden Exemplaren, die aber leider ebenfalls schon theilweise geknickt oder abgebrochen waren, entnahm ich das nothwendige Belegmateial. Da sich weder in Čelakovky's Prodrömus und in dessen Nachträgen Angaben über Standorte dieser Species in Böhmen finden, noch Allram und Rodler sie erwähnen, so ist wohl anzunehmen, dass somit der bis jetzt erste Fundort von *Chamaenerium palustre* für Böhmen sichergestellt ist. Soweit mir bekannt, sind die Donau-Auen bei Enns und Mauthausen in Oberösterreich die nächstgelegenen Standorte dieser Pflanze. Wahrscheinlich wurden von dorther Samen bis zum obigen Standort durch den Wind verschleppt, wie ja auch der einzelne Fund den Charakter einer Verschleppung in sich trägt.

Caucalis daucoides L. wurde seit langem nicht mehr bei Krummau gefunden.

Cicuta virosa L. Im Olschbach bei Mugrau-Schwarzbach, Mörderteiche bei Krummau im Sachsenthale.

Naumburgia thyrsiflora Rehb. In Strassengraben und Tümpeln bei Oberplan, Salnau.

Menyanthes trifoliata L. Weichseln bei Krummau; nasse, torfige Wiesen bei Mugrau, Schwarzbach, Ogfolderhaid, ziemlich häufig.

Ajuga pyramidalis L. Am Moritzwerk bei Mugrau, bei Oberplan.

Brunella grandiflora L. Um Krummau, Oberplan, Mugrau, Ogfolderhaid, Wallern ziemlich verbreitet.

Salvia glutinosa L. Um Krummau, in der Reit, im Rosszipf ziemlich häufig.

Nepeta nuda L. von Prof. Čelakovsky für Krummau angegeben, ich fand sie bis jetzt niemals.

Nepeta cataria L. An der Strasse von Hörnitz nach Mugrau, doch seit einigen Jahren verschwunden.

- Betonica officinalis* L. Um Krummau (auf Kalkfelsen, Reit, Eichberg etc.), Priethal, Gojau ziemlich häufig.
- Stachys arvensis* L. Wurde in Südböhmen (bei Kaplitz, Gratzen, Krummau) nicht gefunden, vergeblich gesucht, wie ja auch Prof. Čelakovský das Vorkommen an den genannten Orten bezweifelt.
- Leonurus cardiaca* L. Krummau, am Wege zum neuen Friedhof; an der Parkgrabenmauer.
- Phyteuma spicatum* L. Buchwald bei Mugrau, bei Oberplan, Schwarzbach.
- Galium cruciata* Scop. In Bachschluchten bei Bergreichenstein, Unterreichenstein, Schüttenhofen.
- Petasites albus* Gaert. Krummau, beim Holzrechen, bei der Dreifaltigkeit.
- Aster salicifolius* Scholl. Krummau; am Moldauufer im Rosszipf, in einigen wenigen Stöcken; von Allram als *Aster^Ntripolium* angeführt.
- Doronicum austriacum* Jaqu. Krummau, Oberplan, Mugrau, Langenbruck bei Krummau; an den Moldaufern beim hängenden Stein.
- Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey. Krummau, beim Krenauhofe am Wege nach Polletitz, bei Prachatitz, Kalsching.
- Centaurea montana* L. Schwarzbach-Mugrau am Nussberge, gegen Planles, um Friedberg, zerstreut.
- Cirsium heterophyllum* All. Mugrau, Oberplan, Krummau, Markwatitz.
- Chondrilla juncea* L. Fuchswiese, Ogfolderhaid bei Andreasberg. (P. Alois Petschl.)
- Scorzonera humilis* L. Mugrau, bei Oberplan in torfigen Wiesen ziemlich häufig. Langenbruck, Oberplan.
- Hieracium aurantiacum* L. Fuchswiese bei Ogfolderhaid, Kum bei Andreasberg, Spitzwald. (P. Petschl.)
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Pascher Adolf

Artikel/Article: [II. Originalmittheilungen - Notizen zur Flora des südlichen Böhmerwaldes 115-119](#)