

## Originalmitteilung.

# Beitrag zur Pilzflora von Mährisch-Weißkirchen.

Von

Prof. Dr. G. Ritter BECK v. MANNAGETTA.  
(Prag).

Gymnasialprofessor K. Loitlesberger, d. Z. in Görz, hatte im Herbste des Jahres 1896 die Güte, mir mehrere Sendungen von Hutpilzen aus der Umgegend von Mährisch-Weißkirchen zur Bestimmung einzusenden. Es erschien mir zweckdienlich, die daselbst constatirten Arten, wenn dieselben auch z. T. weit verbreitet sind, durch Namhaftmachung der Vergessenheit zu entreißen, daher ich dieselben hier zur Aufzählung bringe.

*Clavaria cristata* (Holmsk.); Oktober.

*Stereum hirsutum* (Willd.). Überall häufig.

*Craterellus cornucopioides* (L.). In der Hurka, September.

*Hydnum repandum* (L.); September, Oktober.

*Hydnum scrobiculatum* Fries. Oktober.

*Polyporus versicolor* (L.). Oktober.

*Pelyporus* (*Merisma*) *cristatus* Fries, in Wäldern an der Beczwa, September.

*Polyporus perennis* L. In der Hurka, September; in Wäldern an der Beczwa, September.

*Boletus luridus* Schaeff. September, Oktober.

*Cantharellus infundibuliformis* Fries. In der Hurka, September.

*Lactarius subdulcis* (Bull.), Oktober.

*Lactarius scrobiculatus* (Scop.). In Wäldern an der Beczwa, September.

*Lactarius pallidus* (Pers.) Ebendaselbst.

*Hygrophorus mellizeus* Fr. Überall häufig, September.

*Hygrophorus rubellus* n. sp.

Pileus 4·5—9 cm latus, carnosus, convexus, laevis, glutinoso-mucidus, in margine primum involutus, alutaceus, subluteus, subaurantiacus v. subcarneus, carne pulchre rosaceo. Stipes solidus, firmus, deorsum ventricosus, rarius subcylindraceus, brevis, basi luteolus, supra albidus et floccoso-verrucosus, carne firmulo, subalbido. Lamellae distantes, primum obtusae, adnatae, subalbidae. Sporae ellipsoideae, basi obliquae, albiae, 7·4—9·9  $\mu$  longae, 3·7—4·9  $\mu$  latae. Altitudo 6—12 cm. Odor subingratus I. — Moravia: prope Mährisch-Weißkirchen (leg. Loitlesberger). Austria inf. prope Kranichberg, m. Sept. l. L. Ganglbauer.

A *Hygrophoro pudorino* Fries, Hym. europ., 407, sec. Fries *H. eburneo* affini, differt stipite crasso brevi, ventricosus, albo basi luteolo, sporis majoribus (non subrotundis 4·4—6·1 2·5—3·7  $\mu$ ).

*Hygrophoro* (an *Tricholoma*?) *russula* (Schaeff.) = *H. erubescens* Fries, l. c. 407 habitu affinis, sed pileus subaurantiacus, non granulatus, lamellae distantes, caro rubellus, sporae minores (non sec. Britzelmayr 10—11  $\mu$  : 8  $\mu$ .)

An *Agaricus purpurascens* Scop., Fl. carn., ed II, II, 424, cuius pileus subruber, biuncinalis modo et stipes albus observantur?

Ex „fulventes“ (Fries, l. c. 408) differunt; *H. arbustivus* Fries pileo innato-virgato, fulvente, stipite aequali, elastico, pallido; *H. discoideus* Fries pileo tenui (non carnosus), stipite farcto, molli, lamellis decurrentibus, carne gilvo-pallente; *H. nitidus* Fries lamellis longe decurrentibus, stipite apice laevi, carne albo.

*Cortinarius (Inoloma) hircinus* Fr. In Wäldern an der Beczwa September, Oktober.

*Cortinarius (Inoloma) amethystinus* (Schaeff.) In Wäldern an der Beczwa; Oktober.

*Agaricus (Hypholoma) fascicularis* (Huds.) Überall häufig, September.

*Agaricus (Psalliota) sylvatica* Schaeff. Oktober.

*Agaricus (Psalliota) campestris* L. September.

*Agaricus (Flammula) sapineus* Fr. September.

- Agaricus (Leptonia) euchrous* Pers. In Wäldern an der Beczwa, September.
- Agaricus (Pholiota) squarrosus* Müll. September.
- Agaricus (Collybia) radicans* Relh. Überall zerstreut, September.
- Agaricus (Collybia) longipes* Bull. Oktober.
- Agaricus (Clitocybe) gilvus* Pers. In Wäldern an der Beczwa, September.
- Agaricus (Clitocybe) nebularis* Batsch. Oktober.
- Agaricus (Clitocybe) laccatus* Scop. Überall häufig. Oktober.
- Agaricus (Tricholoma) panaeolus* Fries. September.
- Agaricus (Tricholoma) saponaceus* Fries. In Wäldern an der Beczwa in der Hurka, September.
- Agaricus (Tricholoma) terreus* Schaeff. In Wäldern an der Beczwa, September, Oktober.
- Agaricus (Tricholoma) russula* Schaeff. In der Hurka, September, Oktober.
- Agaricus (Tricholoma) elyptroides* Scop. In Wäldern an der Beczwa, September.
- Agaricus (Tricholoma) bufonius* Pers. September.
- Agaricus (Tricholoma) cartilagineus* Bull. Oktober.
- Agaricus (Tricholoma) frumentaceus* Bull. Oktober.
- Agaricus (Armillaria) melleus* L. Massenhaft in den Wäldern an der Beczwa, September.
- Agaricus (Amanita) pantherinus* DC. Oktober.
- Geaster hygrometricus* (Pers.). September.

- 
- Humaria Sydowia* (Rehm). Oktober.
- Spathularia clavata* (Schaeff.). September.
- Helvella elastica* Bull. Selten, im September.
- Helvella crispa* (Scop.). September.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Beck von Mannagetta, Ritter Günther

Artikel/Article: [Originalmitteilung - Beitrag zur Pilzflora von Mährisch-Weißkirchen 12-14](#)