

die wir bei Weckelsdorf kennen gelernt hatten, — abgesehen davon, daß auch die einzelnen Erosionsformen, entsprechend der gleichen Gesteinsbeschaffenheit, ganz analoge sind. Aber während dort die synklinale Lagerung in Verbindung mit dem Wechsel verschieden widerstandsfähiger Gesteinskomplexe die Entwicklung einer Hilslandschaft mit dem ihr eigenen Entwässerungssystem herbeiführte, hat die flache, nur einseitig etwas geneigte Schichtenlagerung im Elbesandsteingebirge eine Tafellandschaft zur Folge, in der dank der etappenweise erfolgten Hebung des Gebietes und dank dem Umstande, daß sie von einem starken Fluß durchströmt wird, zahlreiche Erosionsstufen deutlich zum Ausdruck kommen. — Ganz im Gegensatz zu diesen beiden Kreidelandschaften hatten wir im Lausitzer Gebirge eine Landschaft vor uns, in deren Form sich auch heute noch wesentlich nur die Tektonik äußert, das somit morphologisch nähere Verwandtschaft mit den krystallinen Schollengebirgen der westlichen Sudeten aufzeigt.

Mit dem Abstieg nach Eulau und der Fahrt mit der Bahn zurück nach Bodenbach fand unsere Exkursion ihren Abschluß.

## Einige Bemerkungen über das Auftreten gelegentlich erbeuteter Fledermausarten.

Von Kurt Loos.

Das Studium der Fledermäuse wird, obgleich ein solches recht dankbar ist, selten geübt. Gelegentlich hat der Berichterstatter bei zufällig erlangten Exemplaren die Artzugehörigkeit bestimmt und legt die Ergebnisse im Folgenden nieder.

1. *Rhinolophus hipposideros*, Bechst., in Liboch am 2. Okt. 1899 bestätigt.

2. *Plecotus auritus*, L., in Schluckenau und von Lehrer E. Sprenger jr. in Dauba erbeutet und vom Verfasser bestimmt.

3. *Vesperugo kuhlii*, Natt., wurde in Schluckenau bestätigt.

4. *Vesperugo noctula*, Schreb. Ziemlich häufig in Liboch.

5. *Vesperugo discolor*, Natt., 2 Exemplare wurden in Schluckenau gefangen und anfangs November 1913 ein Stück in Liboch.

6. *Vesperugo serotinus*, Schreb., 22. Mai 1900 bei Jeschwitz 1 Stück erbeutet und im Herbst 1913 am Schloßboden in Liboch 1 Exemplar tot aufgefunden.

7. *Vespertilio murinus*, Schreb., 30. April 1900 1 Exemplar in Liboch.

8. *Vespertilio Nattereri*, Kuhl., 21. Mai 1905 in Liboch erbeutet.

9. *Vespertilio dasycneme*, Boie, 28. Dezember 1913 tot auf Schloßboden in Liboch gefunden.

Möge diesen Tieren die nötige Beachtung in Zukunft nicht versagt bleiben und diese Notiz dazu beitragen, daß wir bald über das Vorkommen dieser Geschöpfe innerhalb Böhmens ausführliche Daten in hinreichender Menge erhalten werden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [63](#)

Autor(en)/Author(s): Loos Kurt (Curt)

Artikel/Article: [Einige Bemerkungen über das Auftreten gelegentlich erbeuteter Fledermausarten 99](#)