

des Nordens von Europa, Asien und Amerika. Nach der Angabe des Hrn. Dr. A. A. Palliardi in seiner „Systematischen Uebersicht der Vögel Böhmens“ (S. 64 und 66) kommen diese Zugvögel auch dort nur selten vor.

Zu diesen Erscheinungen aus dem hohen Norden hat sich auch ein bei uns seltener Gast aus dem Süden gesellt, der meines Wissens unsere Gegend auf seinen Streifzügen zum ersten Mal besucht, nach Böhmen aber sich noch nie verirrt hat; — es ist diess die Zwerg-Scharbe (*Phalacrocorax pygmaeus* Dum., *Carbo pygmaeus* Temm.), ein junger Vogel ♂, welcher von einem Forstadjuncten auf den Teichen bei Mährisch-Ostrau am 10. October I. J. geschossen und an Hrn. Dr. Schwab in Neutitschein geschickt wurde. Die eigentliche Heimat dieses Vogels ist das kaspische Meer und Südeuropa.

Die der gelben Bachstelze (*Motacilla flava* Cuv.) ähnliche Varietät: *Motacilla Feldeggii*, welche im Egerlande, namentlich bei Franzensbad nach der Angabe des Dr. Palliardi (a. a. O.) schon einige Mal geschossen worden ist, wurde bei uns am 8. September I. J. zum ersten Mal an den Ufern des mährisch-schlesischen Gräuzflusses Ostrawitz erlegt. Das Exemplar ähnelt der *M. flava*, doch fehlt der weisse Strich über den Augen, der Kopf ist mehr schwarz als grau und der Schwanz länger. Es befindet sich in der Sammlung des oben erwähnten eifrigen Ornithologen Hrn. Schwab in Mistek, wohin auch ein ganz weißer Feldsperling (*Fringilla montana* Linné), der am 20. August bei Wallachisch-Meseritsch in Mähren geschossen worden, gekommen ist.

Diagnosen einiger neuer und minder bekannter Hemiptern.

Nach *Mulsant* und *Rey* mitgetheilt von Weitenweber.

Im neuesten Bande der für die Förderung der gesammten Naturwissenschaft sehr beachtenswerthen *Annales de la Société Linnaéenne de Lyon* (Nouvelle série Tome deuxieme, 1855) haben die beiden geschätzten französischen Naturforscher, Prof. E. Mulsant und Cl. Rey in Lyon, eine grössere Abhandlung veröffentlicht, in welcher eine Reihe von neuen oder weniger bekannten Arten Hemiptern-Homoptern aufgestellt und ausführlich beschrieben werden. Da wir mit einem Grunde vermuten, dass einige derselben auch in Deutschland und Oesterreich aufgefunden werden dürfen, so erscheint es wohl gerechtfertigt, wenn wir an diesem Orte die betreffenden Diagnosen auszugweise liefern, um sie auch unseren Lesern zugänglich zu machen.

I. Aus der Tribus der Fulgoriten:

1. *Dictyophora multireticulata*. Elongata, virescens; capite producto,

conico, lateribus rotundato; vertice recto; fronte, prothorace scutelloque tricarinatis; homelytris vitreis, apice numerosissime reticulatis, nervis viridibus; pedibus anticis rufo-testaceis. Longit. 0,012 — 0,014 millimetr. — Kommt um Lyon, doch ziemlich selten vor.

2. *Delphax tuberipennis*. Elongata, capite obtuse conico; fronte, vertice, prothorace scutelloque tricarinatis; fusco-brunea; carinis frontis, geniculis, tibiarum apice antennisque pallidis, his basi fusco-lituratis; vertice, prothorace scutello suturaeque basi pallido-luteis; homelytris post medium pelucido-maculatis, et transversim trituberculatis. — Longit. 0,004 millimetr. — In der Umgebung von Nimes, im Monat Juni.

II. Aus der Tribus der *Issiten*:

3. *Hysteropterum maculifrons*. Subovale, medio dilatum, griseo-ferrugineum; homelytris ad basim distincte nervosis, postice reticulatis, margine laterali pallidis; fronte subconvexa, tenuiter tricarinata; lateribus punctis seriatis, disco maculis 4 majoribus, nigris. — Long. 0,005 — 0,006 millim., larg. 0,003 millim. — In der Provence, Lanquedoc. Juni; ziemlich selten.

4. *Conosimus* *) *coelatus*. Ovalis, fortiter nervosus, vage reticulatus, griseus, punctis maculisque fuscis variegatus, nervis carinisque pallidioribus; fronte leviter tricarinata, macula media pallida; vertice antice angulato, prothoraceque medio carinatis; homelytris lateribus subgibbosis, pallido-subfasciatis, clavo medio oblongo-foveolato. — Long. 0,004 millim., larg. 0,0015 millim. — Anf den Hyären, im Jänner und Februar; um Marseille im Mai.

5. *Peltonotus* **) *rani(ae-)formis*. Crassus, brevis, subcylindricus, infrâ aiger pallido-maculatus, suprâ griseo-pallidus; frontis maculis uniformibus 2, verticis suhtriangularibus 4, thoracis vittâ mediâ, scutelli vittis 3, brunneis; homelytris fuscis, vittâ subobliquâ pallidiori, abdomine suprâ 6. nigro-lineato; seniorum maculis 2 et tarsorum apice obscuris; fronte, thorace, scutello, abdomine biseriatim, lateribus pupillatis. — Loug. 0,003 millim., larg. 0,002 millimetr. — Bei Faillefeu (Basses-Alpes).

III. Aus der Tribus der *Tettigometriden*:

6. *Tettigometra sulphurea*. Oblonga, sulphurea, crebro punctata; cly-

*) *Charact. generis*: Corpus oblongo-ovale; vertex leviter transversus, antice obtuse angulatus; frons oblonga, tricarinata; oculi rotundati, integri; ocelli non conspicui; homelytra lateribus subgibbosa; alae nullae, pedes breves, spinosuli.

**) *Char. generis*: Corpus crassum, syb cylindricum; vertex transversus, antice truncatus; frons lata, tricarinata; oculi transversim-ovati, ocelli non conspicui. Prothorax antice peltato-dilatatus; scutellum maximum, prothoracis latitudine. Homelytra abbreviata, tricarinata, subparallela. Alae nullae. Pedes breves, spinosuli.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
 peo, pectore pedibusque nigro-purpureis; tibiarum apice tarsisque pallidioribus,
 unguiculis nigris. — Larg. 0,007 — 0,008 millim. — In den Umgebungen
 von Nimes. Juni, auf Onopordon Acanthium. Steht zunächst der T. vires-
 cens Latreille.

7. *Tettigometra impressifrons*. Breviter ovata, punctata, nitida, nigro-
 picta; puncto capitis antico, ano, metasterno, geniculis, tibiarum apice tar-
 sisque pallidis; vertice medio sensim, fronte profundius, late excavatis. —
 Long. 0,003 millimet., larg. 0,002 millim. — In Lanquedoc. Mai.

IV. Aus der Tribus der *Levipeden*, Amyot.

8. *Ptyelus notatus*. Oblongus, tenuiter albido-pubescent, punctulatus,
 pallido-flavus; vertice, prothorace scutelloque lineâ longitudinali nigro-brun-
 nea; homelytris lineâ subsuturali vittâque submarginali fuscis, ad angulum
 apicalem puncto nigriore, capite triangulariter acute producto. — Long. 0,008
 millimet. — In der Provence.

V. Aus der Tribus der *Seripeden*, Amyot:

9. *Chiasmus* *) *translucidus*. Oblongus, capite trigono, suprâ ad basim
 carinato; pallidus, pectore ventreque medio nigris; vertice scutelloque nigro
 luteoque variegatis; homelytris niveis diaphanis, distincte nervosis, postice
 ad suturam sinnatim decussatis. — Long. 0,0035 millim. — Um Marseille.
 Juni, sehr selten.

10. *Bythoscopus ustulatus*. Elongatus, apice attenuatus, subtilissime
 coriaceus, pallidus; scutello suturâque ferrugineo-maculatis, pectore autice
 nigro; homelytris nitidulis, pellucidis, ad apicem subinfuscatis. — Long.
 0,005 — 0,006 millim. — Um Avignon, Barthelasse-Insel; auf weissen
 Pappeln, im Mai und Juni, ziemlich gemein. Mit zwei Varietäten um Lyon.

11. *Bythoscopus ocularis*. Elongatus, subtilissime coriaceus, fusco-
 luteus, vertice scutelloque pallescentibus; hoc basi maculis duabus triangul-
 laribus, illo maculis duabus rotundatis, nigris; prothorace antice obscur-
 maculato; homelytrorum nervis albis, plus minusve fusco-interruptis; po-
 dibus flavis. — Long. 0,004 millim. — Auf den Hyères, la Seyne. Januar,
 Juni. Diese kleine Art steht am nächsten dem B. notatus Herr.- Schäff.

12. *Bythoscopus sinuatus*. Elongatus, subtilissime coriacens, capitis
 basi sub oculis sinuatâ; pallidus, pectore medio nigro; vertice et prothorace
 postice punctis duabus rotundatis nigro; scutello croceo basi nigro-bimacu-
 lato; homelytris apice attenuatis, subdiaphanis, nervis postice attenuatis. —
 Long. 0,0045 mill. — Um Marseille, Avignon; im Juni, ziemlich selten.

*) *Char. generis*: Corpus oblongum; vertex triangularis; frons oblonga,
 subparallela, oculi magni, transversi; ocelli conspicui. Prothorax bre-
 vis, transversus; scutellum triangulare. Homelytra ad apicem sinuata,
 decussata. Pedes elongati, spinosi.

13. *Stegelytra* *) *alticeps*. Oblongo-ovata, subrugosa, tenuiter bispido-pilosa, griseo-teatacea, punctis obscuris subtilibus irrorata; capite obtuse trigono; vertice transversim excavato, medio fusco-ferrugineo, margine postico elevato. Elytris, lateribus compressis, vage reticulatis, suturâ altissimis punctoque medio pallido notatis. Pedes pallidi, fusco-punctati. — Long. 0,006., larg. 0,0025 — 0,003 millim. In Lanquedoc, Provence. Januar, März; ziemlich selten.

14. *Jassus Cyclops*. Elongatus, apice attenuatus, nitidulus, capite obtuse trigono; pallide testaceus; verticis basi puncto majore rotundato, alteroque minore utrinque sub oculis, nigris; sutura obscuro-bipunctata; tibiis posticis obsolete fusco-punctatis. — Long. 0,006 millim. In der Provence.

15. *Jassus haematoceps*. Elongatus, postice attenuatus, vertice basi subtiliter canaliculato; rufescens; capite obtuse trigono, scutello thoraceque sanguineo variegatis, hoc basi nigro-bimaculato, homelytris nitidulis, subpellucidis, maculis oblongis albidis, nervis rubris; pectore ventrisque basi nigris. Pedes pallido-flavi, fusco-punctati. — Long. 0,0035 millim. Auf den Hyèren; im März. Diese Art hat viel Aehnlichkeit mit dem *Jassus croceus* Herr.-Schaeffer.

16. *Jassus didymus*. Elongatus, subdepressus, nitidulus, capite obtusissime trigono; nigricans; duabus lineolis apice frontis, duabus ante ocellos; thoracis macula laterali lineâque longitudinali mediâ, croceis; pedibus lividis, nigro-punctatis, femoribus infuscatis. — Long. 0,0035 millim. — Bresse. Im September, selten.

17. *Athysanus quadrinotatus*. Oblongus, nitidus, pallidus; pectore ventrisque busi, verticis obtuse trigoni punctis quatuor rotundatis, thoracis lineolis duabus anticus nigris, scutello basi punctis duobus fuscis; homelytris vitreis, apice infuscatis, laete fusco-nervosis. ad suturam postice vix sinuatis; pedibus fusco-punctatis. — Long. 0,006 millim. Auf den Bergen um Beaujolais. Im November, selten. Ist dem *Athysanus plebejus* Fallèn sehr ähnlich.

18. *Deltcephalus medius*. Elongatus, capite trigono; pallido-chlorizans, verticis lineolis duabus, pectore ventrisque basi, nigris; prothorace fusco-quadrilineato; homelytris pellucidis albescensibus, fortius nervosis; pedibus fusco-punctatis. — Long. 0,0045 millim. — In der Umgegend von Lyon; sehr selten. (Beschluss).

*) *Char. generis*: Corpus crassum, postice compressum. Caput obtuse trigonum; vertex excavatus; frons elongata, subparallelia; oculi magni postice supra thoracis discum producti; ocelli conspicui, antici. Prothorax brevis, transversus; scutellum magnum, triangulare. Homelytra postice adscendentia, suturâ elevatâ. Pedes elongati, spinosi.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Weitenweber Wilhelm Rudolph

Artikel/Article: [Diagnosen einiger neuer und minder bekannten
Hemipteren 235-238](#)