dem Material ergibt sich, daß auf Lussin beide Arten vorkommen (*Sc. italicus* am Monte Asino, 10./4. und *Sc. carpathicus* bei Lussin Grande), dagegen auf Asinello, San Pietro, Sansego, Tasorka, Oruda, Oruda grande, Palazzuoli nur *Sc. carpathicus*. Auf Veglia fand ich selbst nur diese letztere Art. — Auch auf Curzola lebt *Sc. carpathicus* (Galvagni, 25./7. 08). Eine weitere Berücksichtigung dieser Tiere bei Sammeltätigkeit auf den istrianischen und dalmatinischen Inseln würde zweifellos ganz interessante Ergebnisse in bezug auf die Verbreitung der beiden Arten liefern.

11. Hymenoptera.

Nach Bestimmungen von Prof. Dr. G. MAYR und Kustos F. KOHL¹⁾.

I. Formicidae.

(Nach Bestimmungen von Prof. Dr. G. Mayr.)

Meleda.

1. *Cremastogaster sordidula* Nyl. (leg. Wessely).
2. *Pheidole pallidula* Nyl. ♀ (leg. Miestinger).
3. *Aphaenogaster barbara* L. var. *meridionalis* André (leg. Miestinger).
4. *Tetramorium caespitum* L. (leg. Miestinger).
5. *Tetramorium caespitum* var. *semilaeve* André (leg. Miestinger).
6. *Bothriomyrmex meridionalis* Rog. (leg. Miestinger).
7. *Acantholepis Frauenfeldi* Mayr (leg. Miestinger).
8. *Camponotus maculatus* Fabr., subsp. *silvaticus* Ol. (leg. Rogenhofer).

Lissa.

1. *Cremastogaster sordidula* Nyl. (leg. Miestinger).
2. (9.) *Cremastogaster scutellaris* Ol. ♀ (leg. Rogenhofer).
3. *Pheidole pallidula* Nyl. (leg. Miestinger).
4. *Aphaenogaster barbara* L. var. *meridionale* André (leg. Rogenhofer).
5. (10.) *Aphaenogaster structor* Latr. (leg. Miestinger).
6. (11.) *Aphaenogaster testaceopilosa* Luc. (leg. Miestinger).
7. *Bothriomyrmex meridionalis* Rog. (leg. Miestinger).
8. *Acantholepis Frauenfeldi* Mayr (leg. Miestinger).

¹⁾ Den beiden Herren sei für die freundliche Durchführung der Bestimmung hier öffentlich Dank gesagt.

9. *Camponotus maculatus* Fabr., subsp. *silvaticus* Ol. (leg. Miestinger).

Es sei hier noch erwähnt, daß Galvagni¹⁾ im Jahre 1901 auf Lissa außer den hier angeführten *Cremastogaster scutellaris* Ol. und *Aphaenogaster barbara* L. noch *Camponotus aethiops* Latr. und *Formica cinerea* Mayr gefunden hat, so daß bisher 11 Spezies von Lissa bekannt erscheinen.

Umgebung von Spalato.

1. *Cremastogaster sordidula* Nyl. (Clissa—Salona) (leg. Miestinger).

2. *Cremastogaster scutellaris* Ol. (Traù) (leg. Miestinger).

3. *Pheidole pallidula* Nyl. (Clissa—Salona, Castellvecchio) (leg. Miestinger).

4. *Aphaenogaster barbara* L. var. *meridionalis* André (Clissa—Salona) (leg. Wessely).

5. *Aphaenogaster structor* Latr. (Castellvecchio) (leg. Miestinger).

6. *Aphaenogaster testaceopilosa* Luc. (Castellvecchio) (leg. Miestinger).

7. *Bothriomyrmex meridionalis* Rog. (Clissa—Salona) (leg. Miestinger).

8. *Acantholepis Frauenfeldi* Mayr. (Salona) (leg. Miestinger).

9. (12.) *Plagiolepis pygmaea* Latr. (Clissa—Spalato) (leg. Rogenhofer).

10. (13.) *Lasius niger* L. (Salona) (leg. Miestinger).

11. (14.) *Myrmecocystus cursor* Fonsc. (Clissa—Salona) (leg. Miestinger).

12. *Camponotus maculatus* Fabr. subsp. *silvaticus* Ol. (Clissa, Castellvecchio) (leg. Rogenhofer).

Curzola.²⁾

1. *Aphaenogaster testaceopilosa* Luc. (Rog.) ♀ ♂.

2. *Aphaenogaster barbara* L. (Rog.) ♀.

3. *Acantholepis Frauenfeldi* Mayr. ♀ ♂.

4. (15.) *Camponotus herculeanus* L.

¹⁾ E. Galvagni, Beiträge zur Kenntnis der Fauna einiger dalmatinischen Inseln. Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien 1902.

²⁾ Die hier angeführten Arten wurden in diesem Sommer (1908) von Dr. E. Galvagni gesammelt und von Herrn Kustos F. Kohl bestimmt.

II. *Ichneumonidae* sens. lat. und *Vesparia*.

(Nach Bestimmungen von Kustos F. Kohl.)

Meleda.

1. *Paniscus* sp. (leg. Galvagni).
2. *Vespa germanica* (leg. Galvagni).
3. *Polistes* sp. (leg. Werner).
4. *Ancistrocerus parietum* (leg. Werner).
5. *Bombus terrestris* (leg. Galvagni).
6. *Apis mellifera* L. (leg. Klaptocz).
7. *Podalirius acervorum* L. (leg. Galvagni).
8. *Podalirius acervorum* var. *nigra* Friese (leg. Galvagni).
9. *Eucera difficilis* Pérez (leg. Galvagni).
10. *Eucera caspica* var. *nigrita* Friese (leg. Galvagni).
11. *Andrena morio* Brullé (leg. Galvagni).
12. *Andrena nigroaenea* Kirby (leg. Galvagni).

Lissa.

1. (13.) *Gravenhorstia picta* Boie (leg. Rogenhofer).
2. *Bombus terrestris* L. (leg. Klaptocz).

Sabioncello.

1. (14.) *Cryptus investigatur* Tschek. (leg. Galvagni).
2. (15.) *Banchus volutarius* L. (leg. Klaptocz).
3. *Polistes* sp. (leg. Galvagni).
4. *Apis mellifera* L. (leg. Galvagni).

Umgebung von Spalato.

1. (16.) *Ophion luteus* L. (leg. Rogenhofer), (Clissa).
2. *Polistes* sp. (leg. Klaptocz), (Traù).
3. (17.) *Chrysis dichroa* Dahlb. (leg. Rogenhofer), (Bua).
4. *Bombus terrestris* L. (leg. Miestinger), (Clissa).
5. *Apis mellifera* L. (leg. Klaptocz), (Salona).
6. (18.) *Podalirius nigrocinctus* Klug. (leg. Klaptocz), (Salona).
7. (19.) *Xylocopa violacea* L. (leg. Klaptocz), (Clissa).
8. (20.) *Chalicodoma muraria* F. (leg. Rogenhofer), (Clissa).

Curzola.¹⁾

1. (21.) *Scolia haemorrhoidalis* L.
2. (22.) *Polistes gallica* L.

¹⁾ Die hier angeführten Arten wurden in diesem Sommer (1908) von Dr. E. Galvagni gesammelt und von Herrn Kustos F. Kohl bestimmt.

3. (23.) *Leionotus dubius* Sauss.
 4. (24.) *Prionemis annulatus* F.
 5. (25.) *Ammophila Heydenii* Dahlb.

12. Amphipoda.

Von Dr. K. SCHÄFERNA (Prag).

Die Ausbeute an Amphipoden aus Dalmatien weist leider nur wenige Formen auf. Da die Exkursionsteilnehmer hauptsächlich die Landfauna ins Auge gefaßt hatten, sind die gesammelten Tiere ausschließlich litorale Formen, und zwar sowohl jene von der dalmatinischen Küste als auch die von der Insel Meleda.

Von der letztgenannten Insel wurden folgende drei Formen mitgebracht:

1. *Orchestia mediterranea* A. Costa, 4 Exemplare, und zwar alle Weibchen. West-Meleda.

2. *Gammarus locusta* L. Aus dem See bei Prožura, für welchen der Salzgehalt mit $1\frac{1}{4}\%$ angegeben wird.

3. Nicht weniger interessant ist das Vorkommen einer *Niphargus*-Spezies, welche zufolge dem mit Greifborsten bewaffneten Hinterrande der 3 letzten Abdominalringe der Form *Niphargus virei* Chevreux sehr nahe steht. Fundort: In dem Tümpel der Höhle Ostaševica auf Meleda (leg. Miestinger).

Auf dem Festlande hat Dr. Rogenhofer den allgemein an der Küste verbreiteten *Gammarus pungenis* M. E. in den Tümpeln bei Traù gefunden.

Bei Clissa ist der auf dem Festlande lebende *Gammarus pulex* L. festgestellt worden.

VORTRÄGE.

Geographische und ethnographische Notizen von einer Reise durch Nord-Syrien.

Vorträge, gehalten von Dr. F. KÖNIG am 5. März und 26. Mai 1908.

(Mit Lichtbildern.)

Vortragender hatte Gelegenheit, gemeinsam mit Dr. H. Vettors Nordsyrien, d. h. die nördlichen Teile des zum Wilajet Beirut gehörigen Liwa Ladikieh und die anstoßenden Teile des Wilajets Aleppo (Liwa Suedije) zu durchreisen.

Der Arbeitsrayon umfaßte ein durch seine etwas eigenartige Lage nicht, uninteressantes Gebiet, das vorher durch M. Hartmann [1881] und später durch

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins an der Universitaet Wien](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Rogenhofer Alois Friedrich

Artikel/Article: [Die zoologische Reise des naturwissenschaftlichen Vereines nach Dalmatien im April 1906. B. Spezieller Teil. Bearbeitung des gesammelten Materials. 11. Hymenoptera. 123-126](#)