

6 T. — TAF-H

# Reise im Nordost-Afrika.

Schilderungen

aus dem

## Gebiete der Beni Amer und Habab

nebst zoologischen Skizzen

und einem Führer für Jagdreisende

von

M. Th. v. Heuglin.

Zwei Bände.


Zweiter Band.

Mit drei colorirten Tafeln und drei Illustrationen.

Braunschweig,


Druck und Verlag von George Westermann.


1877.




Reise in Nordost-Afrika.

---







Verlag von G. Westermann in Braunschweig

1

Cromie Lith. vor. Th. Fischer, Cassel

*Batis orientalis*, Hgl

a. —

b. —

# Reise im Nordost-Afrika.

Schilderungen

aus dem

## Gebiete der Beni Amer und Habab

nebst zoologischen Skizzen

und einem Führer für Ingkreisende

von

M. Th. v. Heuglin.

Zwei Bände.


Zweiter Band.

Mit drei colorirten Tafeln und drei Illustrationen.

Braunschweig,

Druck und Verlag von George Westermann.

1877.



Alle Rechte vorbehalten.

## Inhaltsverzeichniß.

---

### A. Säugethiere.

Ord. Affen . . . . .	S. 3
Ord. Fledermäuse . . . . .	S. 13
Ord. Raubthiere . . . . .	S. 36
Ord. Nagetiere . . . . .	S. 57
Ord. Zahnslüder . . . . .	S. 86
Ord. Einhufer . . . . .	S. 87
Ord. Dachhäuter . . . . .	S. 91
Ord. Wiederläuer . . . . .	S. 99
Ord. See-Säugethiere . . . . .	S. 135

### B. Vögel.

Ord. Raubvögel . . . . .	S. 143
I. Tagraubvögel . . . . .	S. 143
II. Eulen . . . . .	S. 156
Ord. Singvögel . . . . .	S. 158
I. Sperrschnäbler . . . . .	S. 158
II. Dünn schnäbler . . . . .	S. 168
III. Zahnschnäbler . . . . .	S. 171
IV. Regelschnäbler . . . . .	S. 202
Ord. Klettervögel . . . . .	S. 223
Ord. Tauben . . . . .	S. 232
Ord. Hühnervögel . . . . .	S. 235
Ord. Straußvögel . . . . .	S. 240
Ord. Laufvögel . . . . .	S. 240
Ord. Schwimmvögel . . . . .	S. 261


Verzeichniß der im nordöstlichen Afrika gebräuchlichen Benennungen der Säugetiere und Vögel . . . . .	S. 271
Nachträge und Berichtigungen zur Aufzählung der Säugetiere und Vögel des Gebietes der Beni Amer und Habab . . . . .	S. 287
Nachträge zum Verzeichniß der Fremdwörter, Th. I, p. 266 sc. . .	S. 294


---

## Illustrationsverzeichniß.



Afrikanisches Nashorn (Rhinoceros Keitloa) . . . . .	S. 93
Langohrige Gazelle (Antilope leptoceros) . . . . .	S. 401-75
Baker's Pferd-Antilope (Hippotragus Bakeri) . . . . .	S. 110
Gehörne von Löw-Antilopen (Acronotus Lelwel und Acronotus Caama) . . . . .	S. 124
Kleiner Braunschwanz (Philothamna minor) . . . . .	S. 482-43
Ostafrikanischer Feldschnepfer (Batis orientalis) . . . . .	S. 104 Titel






## A. Säugethiere.

---

### Bemerkung.

Alle im Text vorkommenden Messungen beziehen sich auf den alten französischen Fuß (pied du roi).

- Die hier hauptsächlich citirten Schriften sind folgende:
- Rüpp. Atl.: Rüppell, Atlas zu der Reise im nordöstlichen Afrika. Frankfurt 1826.
- Rüpp. N. W.: Rüppell, Neue Wirbelthiere zur Fauna von Abessinien gehörig. Frankfurt 1835.
- H. et Ehr. Symb. phys.: Hemprich et Ehrenberg, Symbolae physicae. Berol. 1828—1830.
- Sehreb. Säugeth.: Schreber, Die Säugethiere. Mit Fortsetzung und Supplementen von A. Wagner.
- Heugl. Fauna R. M.: Henglin, Fauna des Nothen Meeres und der Somali-Küste. Peterm. Geogr. Mittb. 1861, p. 11 bis 32.
- Brehm, Habesch: Brehm, Ergebnisse einer Reise nach Abessinien. Hamburg 1863.
- Fitz. u. Heugl. Säugeth.: Fitzinger und Heuglin, Systematische Uebersicht der Säugethiere Nordost-Afrika's. Sitzungsber. der k. k. Akad. der Wissenschaften, Wien 1866, Separat-Abdruck.
- Blanf. Abyss.: Blanford, Observations on the Geology and Zoology of Abyssinia. London 1870.



### Ord. Affen (Simiae).

Fam. Schmalnäsig Affen (Simiae catarrhinae).

#### 1. Die Guériéza, *Colobus Quereza* (Rüpp.).

Rüpp. N. W. t. I. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 2. — Heugl. Reise in das Gebiet des Weissen Nil, p. 329. — Heugl. Reise naeh Abyssinien 1852/53. p. 33. — Heugl. Reise nach Abessinien 1861/62. p. 232. — Sehreb. Säugeth. Suppl. I. p. 166.

Amhar. Guériéza. Gecz Fonges.

Ich nehme die Guériéza unter die Säugetiere unseres Beobachtungsgebietes im weiteren Sinne auf, weil sie sich hauptsächlich in den Niederungen des Quellenlandes der Flüsse Takazie (Setit), Mareb (Dasch) und um die Quellen des Nahad und Dender findet; ohne Zweifel kommt dieselbe auch im oberen Barkah vor; endlich in Godscham, Damot, im wärmeren Schoa und um den Kir, wohl bis Kafa, Marea und Duranguié. Nach Blanford (Abyss. p. 226) werden häufig Häute dieses Affen von den Bergen des Somal-Landes nach Aden gebracht. Man trifft sie nur in der Waldregion des Tieflandes und zwar stets in der Nähe von Wasserplätzen.

Sie ist von gesellschaftlichem Wesen und treibt sich fast beständig in den höchsten Gipfeln dichtbelaubter Bäume umher, in ungeheuren Sägen sich von einem Ast zum anderen schwingend.

Verfolgt man sie, so bergen sich diese herrlichen Thiere im Ge-  
wirr von Schlingpflanzen, oder sie drücken sich fest an dicke  
Astete, falls die Dertlichkeit ein Abstehlen von Baumkrone zu  
Baumkrone nicht erlaubt.

Glaubt sich die Heerde in ihren lustigen Wohnsitzen aber  
sicher genug, so kläffen die Affen, den Kopf und Oberkörper tief  
zwischen die aufgestemmtten Vorderfüße legend, den Gegenstand  
ihrer Neugierde an.

Anmerkung. In der abessinischen Provinz Agaumeder,  
im Gau Matakel, findet sich nach Aussage meiner Jäger ein  
Colobus, der Guériéza in Gestalt (namentlich auch Mangel des  
Daumens und in Schwanzbildung) und Lebensweise sehr ähnlich.  
Der selbe unterscheidet sich durch dunklen Kopf mit weißer Binde  
über die Schläfe und durch rauhborstige Behaarung des Rückens,  
die sowohl in Bezug auf Bildung als Farbe derjenigen von  
Oreotragus saltatrix gleichen soll.

Einen anderen, wohl auch zur Gattung Colobus gehörigen  
Affen vom Niamniam-Lande beschrieb ich unter der Benennung  
C. diadematus (vielleicht identisch mit der eben erwähnten Form  
aus Agaumeder). In denselben Gegenden, um die westliche Wassers-  
scheide des oberen Nil, lebt ferner eine dem Gorilla und Schimpanse  
nahe verwandte Art, die paar- und familiweise auf  
Hochbäumen längs einiger größerer, nach Nordwest abfließender  
Ströme haust und ungeheure Nester und Schirmdächer zwischen  
Astgabeln anlegt. Die Niamniam nennen dieses von ihnen  
wegen seiner ausnehmenden Kraft und Wildheit gefürchtete Thier  
M'bán. Die Färbung ist olivenbraunschwarzlich mit weißlichem  
Gefäß. Gesicht nackt, Oberseite der Hände mit einzelnen schwar-  
zen Haaren besetzt.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vergl. Henglin, Reise in das Gebiet des Weißen Nil, p. 208. — Könnte identisch sein mit *Troglodytes niger*, Geoffr.

2. Die graugrüne Meerkatze, *Cercopithecus griseo-viridis* (Desm.).

*C. griseus*, Fr. Cuv. Mammif. t. 20. — *C. sabaeus*, Is. Geoffr. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. I. p. 115, u. V. p. 39. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 3. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 2. — Brehm, Habesch, p. 72. — Blanf. Abyss. p. 224. — Heugl. Reise nach Abessinien 1861/62. p. 172. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. I. p. 114.

Arab. Abu Leng oder Lang, auch Abaleng. Amhar. Tota. Tigr. Wag oder Woág. Masauan. Wagié. Nach Endolf auf Geez zalestejo, was wahrscheinlich Wildesel bedeutet.

Diese allbekannte Meerkatze bewohnt meist in größeren Gesellschaften die abessinischen Tiefländer, den Fuß des Ost-Walls der Berge gegen Masaua hin bis zum oberen Anjeba, namentlich die Wasserplätze um den Taranta, bei Ailet und Azuz, ferner das südliche Nubien nordwärts bis gegen Abu Hamid, den Blauen und Weißen Nil sowie Ost-Kordofan.

Tritt an den Gebirgsbächen Wassermangel ein, so wandern die dort ansässigen Meerkatzen über die Zeit der Trockenheit aus. Sie lieben vorzüglich baumreiche Gegenden, namentlich solche, wo viel wildes Steinobst (*Rhamnus*, *Balanites* &c.) wächst, deren Früchte sie besonders gern genießen.

Anmerkung. Nicht in unserem engeren Beobachtungsgebiet vorzukommen scheint *Cercopithecus ruber*, Gm., der im westlichen Afrika heimisch ist, sich aber bis Kordofan und Senar ostwärts erstreckt. Im östlichen Sudan heißt die rothe Meerkatze Abulang ah'mar, nach Rüppell in Kordofan Nango.

Eine angeblich aus Darfor stammende, ähnlich aber hunder gefärbte, ansehnlich größere Art beschreibt Ehrenberg als *Cercopithecus pyrrhonotus*. — Von dieser wiederum verschieden scheint eine prachtvolle Meerkatze, von welcher ich ein lebendes Exemplar aus Fazogl erhielt und welche ich später im Freileben

in den Ehenen zwischen dem Kir und Rosanga=Fluß öfter zu beobachteten Gelegenheit hatte. Ihr wurde die unpassende Benennung *Cereopitheeus poliophaeus* beigelegt. Dieselbe muß in *C. poliolophus* umgeändert werden. Diese Art ist dem *C. pyrrhonotus* nächst verwandt, jedoch von noch ansehnlicherer Statur, mit sehr langem, wallendem grauen Mantel, dieser beim jüngeren Männchen weniger entwickelt und von mehr dunkel rufgrauer Färbung. Gesicht schwarz, die Oberlippe mit deutlichem weißen Bart; Oberseite des Schwanzes glänzend und dunkel purpurbraunroth; Kranzhaare der lebhaft spargrünen bis türkisblauen Geschlechtstheile glänzend safrangelb; Gesäßschwielen von schönsten Rosenroth. Das Weibchen kenne ich nicht.

In Abessinien erzählte man mir von einer weißen Meerkatze mit schwarzen Gesäßschwielen, die gesellschaftlich auf Bäumen zwischen Tselsnit und Mai-Tsahlo heimisch sein soll. Sie wird dort *Tota* benannt, wie *Cereopitheeus griseo-viridis*.

Der Hundsaaffe, *Inuus ecaudatus*, Linn., kommt hier und da durch Pilger oder Karawanen aus dem nordwestlichen Afrika (Algerien) nach Egypten. Er heißt dort Nisnás (d. h. Menschen-gesicht). Ich bezweifle sehr die Angabe Rüppell's, daß diese Art auch in den Däsen der libyschen Wüste heimisch ist. In Algerien wird sie Šadi und Gird benannt.

Der Tschelada, *Theropitheeus Gelada*, Rüpp. (arab. Tselada, nicht Gelada), sowie mehrere Verwandte dieses Pavians, nämlich *Theropitheeus obseurus*, Heugl. (arab. Toqur Zendzero, d. i. schwarzer Pavian) und *Theropithecus senex*, Puch., leben ausschließlich in den abessinischen Hochgebirgen.

Bermuthlich ist *Th. senex* derjenige Erdpavian, welcher mir Unquelal (von Unqolaleh, das Ei) benannt wurde. Kleiner als der Tschelada, von weißlicher Farbe, hat er keinen nackten Brustfleck und lebt in Helsen des Schoada-Thales am Südwest-Abhang von Semien.

Eine noch kleinere Art wurde mir Taneš Zendšero (d. i. Zwerg-Pavian) benannt, eine dritte, mit kleinem, plattem Gesicht und von dunkel braunschwarzlicher Farbe, kommt nach Schimper im Distrikt Damo in Tagadié vor.

### 3. Der graue Pavian, *Cynocephalus Hamadryas* (Linn.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. I. p. 153 u. V. p. 62. — Ehr. Symb. phys. II. t. 11. — Heugl. Fauna R. M. p. 12. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 5. — Brehm, Habesch, p. 81. — Blanf. Abyss. p. 222. — Brehm, Thierleben, I. p. 75. — Schreb. Säugeth. Suppl. I. p. 153.

Heißt bei den Arabern des Rothen Meeres Robah; in Egypten Qird. Geez Hebej. Tigr. und amhar. Žindšero. Bel. Djogura. Halenga-Dialekt H'awoleh. Masauan. Kombai. Danak. Domātu. Som. Dajer. Nach Rüppell in Kordofan und Dar Farkale.

Der graue Pavian scheint den 19. Grad nördl. Br. kaum zu überschreiten. Hemperich und Ehrenberg trafen ihn aber noch in den Gebirgen der Wehabiten und bei Qonsudah in Arabien. Hier reicht er südwärts bis zum Bab el Mandeb und Aden. Seine östliche Verbreitung ist mir unbekannt. Auch im nördlichen Somal Gebiet soll sich derselbe noch finden. Häufig trifft man ihn im Lande der Danakil, am Ost-Abfall der abessinischen Gebirge, im östlicheren Habesch, hier zuweilen bis über die Woina Dega ansteigend (8000 Fuß Meereshöhe); im Gebiet des Anseba und Barkah, bis nach Kasalah hinaüber; angeblich endlich auf einigen Felsinseln des Rothen Meeres. Ueber sein Vorkommen nördlich vom Barkah habe ich niemals sichere Kenntnisse erlangen können. Nach Rüppell wäre endlich diese Art auch in Senar, Kordofan und Dar Foz heimisch, wo ich ihr weder im Freileben begegnet bin, noch sie in Gefangenschaft gesehen habe.

Lebt in Familien und Gesellschaften von zehn bis hundert und mehr Individuen beisammen, doch scheint die Zahl der alten Männchen stets geringer als diejenige der Weibchen. Jedes Rudel hat seine besonderen Standorte, von wo aus die Thiere unter Anführung eines alten Männchens, des Schach, wie sich die arabischen Jäger ausdrücken, weite Streifzüge unternehmen. Zeitig am Abend, und stets noch vor Sonnenuntergang, finden sie sich aber wiederum in ihrer eigentlichen Ansiedlung ein, meist auf hohen isolirten Felsgruppen mit senkrechten Wandungen und überhängenden Gesimsen oder Höhlen, von wo sie sich selbst bei vielfältiger Verfolgung nicht auf lange Zeit vertreiben lassen.

Während der heißen Jahreszeit kommt die ganze Heerde sowohl in den Vormittags- als in den Abendstunden zur Tränke und nur durch eintretenden Wassermangel sieht sich die Gesellschaft zuweilen veranlaßt, ihre Standorte zu verlassen. Bei Wanderungen halten diese Thiere immer ihre gewohnten Wechsel ein, welche längs der steilen Felsgehänge auf schmalen Absätzen hinführen; sie überschreiten aber auch weite Thäler und Hochebenen. Eigentliche Hochbäume besucht der graue Pavian nicht, dagegen benutzt er überhängende Wurzeln und Stämme zu seinem Auf- und Absteigen an den Berglehnen und klettert wohl, um Rundschau zu halten, hier und da auf einen niedrigen Ast.

Die Nacht bringt er, wie gesagt, womöglich in Höhlen, Kluftn oder unter Felsvorsprüngen an möglichst steilen und geschützten Orten zu. Dort drängt sich die Familie dicht zusammen. Ist die Luft kühl, so zieht er nicht früh auf Nahrung aus, sondern wärmt sich an vor Wind geschützten Stellen behaglich im Sonnenschein. Gegen Regen und Kälte ist das Thier höchst empfindlich.

Die Nahrung der Paviane besteht in saftigen Kräutern, Halmen, Knospen, Zwiebelgewächsen, Wurzeln, Leguminosen, wilden Feigen und Steinfrüchten, Getreide alter Art, Delikatessen

u. dergl., mit Vorliebe verzehren sie jedoch auch Larven alter Art, namentlich diejenigen großer Käfer, ferner Ameisen, Puppen, Schnecken und Würmer, zuweilen fangen sie Heuschrecken, Spinnen, Käfer und Schmetterlinge; sie verauben die Nestter, gleichviel ob dieselben Eier oder Junge enthalten, und freßen gelegentlich auch kleinere und junge Säugethiere. Ueberhaupt scheint ihnen von Zeit zu Zeit animalische Nahrung Bedürfniß zu werden. Beim Anblick von Schlängen und großen Eidechsen legen sie eine entsetzliche nervöse Aufregung und einen derartigen Schreck an den Tag, daß sie eine Zeit lang sich nicht von der Stelle zu rühren vermögen. Auch meidet der Pavian, wie die meisten Affen, in nähere Berührung mit tieferem Wasser zu kommen, obwohl sie sonst nicht selten Beweise von großer Kühnheit und Geistesgegenwart liefern. Ueber die Lebensweise schreibt namentlich Brehm sehr anziehend und ausführlich. Nie habe ich gehört, daß der Hundskopf-Pavian, sei er einzeln oder in Gesellschaft, den Menschen angreife, vorausgesetzt, daß er nicht etwa schwer verwundet in die Enge getrieben wird. In solchen Fällen vertheidigt er sich mit seinen furchterlichen Edzähnen und unter grimmigem Bellen und wüthendem Geschrei aufs Neuerste. Angeschossene Thiere entleeren sofort eine große Menge des Inhalts der Eingeweide. Man sagt, daß diese Affen, wenn sie sich in ihre Schlupfwinkel verfolgt seien, die Angreifer durch einen förmlichen Steinhangel fernzuhalten suchen. Auch dies ist mir bei vielfacher Begegnung mit Pavianen nicht vorgekommen, dagegen habe ich gesehen, wie sie an steilen Gehängen Steine losmachten und herabrollten, und endlich, daß sie zuweilen bis kopfgroße Felsbrocken zu werfen versuchten, jedoch stets nach rückwärts, d. h. mit nach mir zugekehrtem Rücken und abwärts. Um sich von der Wirkung ihrer Geschosse zu überzeugen, neigten sie den Kopf gegen den Boden und sahen zwischen den Hinterfüßen durch. Ich glaube nicht, daß ein Affe im Stande sei, irgend einer

schwereren Gegenstand mit großer Gewalt in horizontaler oder aufsteigender Richtung vorwärts zu schleudern.

In Gesellschaft anderer Arten sind wir dem grauen Pavian nicht begegnet, dagegen haben wir gesehen, wie eine Truppe von Hamadryaden zugleich mit mehreren Familien von Tscheladas auf einer und derselben Ebene ruhig ihrer Nahrung nachging, ohne sich scheinbar um ihre Nachbarn zu bekümmern. Beide Gesellschaften waren eifrig beschäftigt, größere Steinblöcke umzuwenden, um sich der darunter befindlichen Insecten, Larven und Schnecken zu bemächtigen. Einmal war ich dagegen Augenzeuge eines Ueberfalls, den eine Heerde von Hunderten von Pavianen auf das Getreidemagazin eines kleinen Strohhüttendorfes machte. Sie schlichen im Schutz einer Bergwand in größter Stille an, erbrachen das niedrige Dach und füllten hastig die Bäden mit Korn; natürlich sielen die Dorfbewohner unter Geschrei, Stein- und Lanzenwürfen über die Plünderer her, die selbstverständlich die Flucht ergriffen, aber zum Theil noch versuchten, in aller Eile einiges Getreide in den über die Brust gekreuzten Armen mit sich fortzuschleppen.

Der Pavian braucht sehr lange Zeit, bis er ganz ausgewachsen ist; doch pflanzen sich auch jüngere Individuen bereits fort. Die Weibchen kommen mindestens drei oder vier Mal im Jahr in Brunft und werfen deshalb auch nicht gleichzeitig.

Der vorzüglichste Feind dieser Thiere ist der Leopard und der Hyänenhund.

Die Abessinier bedienen sich hier und da der dicht behaarten Felle der alten Männchen als Pelzwerk; sonst wird ihnen im Allgemeinen nicht nachgestellt, obgleich sie viel Schaden in Gersten- und Erbsenfeldern anrichten.

Man erlegt den Pavian am sichersten auf dem Außtand bei den Trinkplätzen, die er regelmäßig zu besuchen pflegt. Auch sind die Hamadryaden dort, wo sie nicht systematisch verfolgt werden, keineswegs schüchtern und menschenscheu. Zu Pferde

kamen wir öfter an größeren Gesellschaften vorüber, die sich kaum durch die Gegenwart von Menschen in ihren Beschäftigungen und Spielen stören ließen. Mehrere Male wurden große Gesellschaften dieser Thiere von meinen Jägern mit Einbruch der Nacht auf ihren heimathlichen Felsen heimgesucht, wo man eine Menge von den höchsten Vorsprüngen herabschießen konnte. Der Lärm, den die aufgeschreckten und beschossenen Thiere in solchen Fällen machen, ist ein wahrhaft entsetzlicher, ein wütendes Bellen, Fauchen, Heulen, dazwischen das Wimmern und Angstgeschrei der Jungen und ihrer sorgsamen Mütter.

Angeschossene Paviane suchen sich zuweilen abzustehlen oder zwischen Klüften zu verstecken; auch bin ich fast gewiß, daß sie, wenn es möglich ist, von ihren Gefährten noch weggeschleift und in Sicherheit gebracht werden.

**Anmerkung.** Im südlichen Abessinien, namentlich im Gebiet der Wolo-Gala, trafen wir häufig noch eine zweite Art von *Cynocephalus* an, von der ich aber leider nur ein jüngeres Individuum erlegen konnte. Dieser Pavian heißt bei den Ein-geborenen Netso oder Nets-Zendsero, bei den Gala Gewerié. Er geht höher in die Gebirge als der graue Pavian, ist stärker bemähnt, heller von Farbe, hat theilweise nackte, rosenrothe Keulen, ebenso gefärbtes Gesicht und Schwiele, sowie einen dunklen Ring um die Augen. Ich habe ihn C. Netscho benannt.

Im Nil-Gebiet nordwärts bis zur Baiuda-Steppe, in Senar und Kordofan ostwärts bis Dalabat und Takah, südwärts aber Fazogls noch überschreitend, häuft ebenfalls gesellschaftlich und zumeist auf Felsen lebend der Babuin, *Cynocephalus Babuin*, Desm. (*C. Anubis*, Fr. Cuv.), der von Peters auch in Mozambique aufgefunden wurde. Er heißt im Sudan Qird, nach Rüppell in Senar Bedir, in Syrien S'adān, türkisch Mai-mun, wie *Cynocephalus Hamadryas*.

Rüppell läßt den Babuin auch am Tana-See und in der

Guola (Tießland von Habsch) vorkommen, verwechselt ihn aber wohl theilweise mit *Cynocephalus porcarius*, Bodd., den wir im nordwestlichen Abessinien, sowohl in tiefer gelegenen Districten als im Gebirge bis auf 9000 Fuß Höhe, endlich auch in großer Zahl auf den Schilf-Inseln im Weissen Nil angetroffen haben. Es war mir nicht möglich, die von mir eingesammelten Bälze und Schädel der Dokerié, wie dieser Pavian von den Abessiniern benannt wird, mit den nächst verwandten Arten zu vergleichen. Fitzinger erklärt ihn für identisch mit *C. porcarius*, der sich durch schwärzere Extremitäten, intensivere, mehr oliven-grüne Färbung des Pelzes und längeren Schwanz von *C. ursinus*, Penn., unterscheidet. Pucheran dagegen hält den abessinischen Schwein-Pavian für eine besondere Species, welche er *Cynocephalus Doquera* benennt.<sup>1</sup>

#### Fam. Halbaffen (Prosimii).

Aus der Familie der Halbaffen (Prosimii) findet sich im Gebiet des Weissen und Blauen Nil sowie in Kordofan nicht selten der gemeine Galago (*Otolienus galago*, Schreb. — *O. senegalensis*, Geoffr. — *O. Teng*, Sund. — *O. Moholi*, A. Smith), von den Sudan-Arabern Ten oder Teng benannt.

Dieses niedliche Thier mit seinen großen, feurigen, hochrothen Augen und eigenthümlich schließbaren Ohren lebt familienweise auf Hochbäumen, vorzüglich auf alten Tamarinden längs der Ströme und Wildbäche; seine Nahrung besteht in Gummi, Früchten, Körnern, vorzüglich aber in Insecten. Er führt eine vollkommen nächtliche Lebensweise und verrät seine Gegenwart oft durch sein geck-artiges Geschrei. Ob der Teng in unserem engeren Beobachtungsgebiet vorkomme, weiß ich nicht zu sagen.

---

<sup>1</sup> Rev. et Mag. de Zool. 1856. p. 96. et 1857. p. 250.

In den Wäldern des Kair trifft man noch eine zweite, grüßere, rostbräunlich gefärbte und dickschwänzige Art, wohl Otolienus crassicaudatus, Geoffr., im Miamiam-Lande den Zwerg-Galago, Otolienus Demidoffii.

### Ord. Fledermäuse (Chiroptera).

Das nordöstliche Afrika beherbergt eine ungewöhnlich große Artenzahl von Fledermäusen; in Egypten sind es namentlich die Gattungen Taphozous, Nycteris, Plecotus, Rhinopoma und Rhinolophus, welche auch an Individuen reich vertreten sind und meistens in alten Gräbern, Moscheen, Katakomben, Felsen-tempeln und im Innern der Pyramiden wohnen. Die einzelnen Arten halten sich hier streng an gewisse Dertlichkeiten und mischen sich selten unter andere.

Weiter im Süden herrschen die Baum- und Waldfledermäuse vor, die — wenige Formen ausgenommen — meist nicht sedentär sind, eine Art von Wanderleben führen und sich während der Regenzeit nur selten zeigen.

Das Wandern wird hauptsächlich durch die Nahrung bedingt. Die Flughunde (Pteropus) leben fast ausschließlich von Früchten und schweifen, je nachdem sie in einer Gegend viel reife Sycomoren, Cordien, Doleb-Nüsse (Borassus) u. dergl. finden, meist gesellschaftlich weite Reisen dahin. Sie schwärmen und ziehen zur Nachtzeit, sehen aber auch bei hellem Sonnenschein vortrefflich und sind, kühle Morgen ausgenommen, den ganzen Tag über lebhaft und mit Fressen beschäftigt, ohne jedoch ihre einmal eingenommenen Standorte gern zu verlassen, bis die betreffenden Bäume ihrer Erzeugnisse vollkommen beraubt sind. Dann zieht die Schaar plötzlich weiter und es können Monate und Jahre vergehen, bis man sie wieder auf derselben Stelle findet.

In vielen Gegenden Abessiniens folgen die kleineren raub-

fressenden Fledermäuse den Viehherden vom Gebirg zum Tiefland und umgekehrt, weil letztere stets von großen Schwärmen von Fliegen und Schnaken begleitet werden. Während des Tages suchen diese Flatterthiere in Klüsten, Baumhöhlen, unter überhängenden Wurzeln und unter Blatthcheiden der Palmen, viele sogar in den Nestern von Webervögeln Schutz, nur selten dagegen verkriechen sie sich in die Strohhütten der Eingeborenen, woselbst sich bekanntlich auch der Sperling nicht heimisch fühlt. Anders ist es in den Hafenstädten des Roten Meeres, wo man das ganze Jahr über Fledermäuse in größerer oder geringerer Anzahl findet, welche in Moscheen, alten Gebäuden aus Madreporenkalk und Magazinen tausende Wohnplätze finden und wo es ihnen niemals an Nahrung gebricht. Doch ist die Mannigfaltigkeit der speciell hier vorkommenden Arten eine sehr beschränkte.

### Fam. Flederhunde (Chiroptera frugifera).<sup>1</sup>

Aus dieser Familie kann ich keine in unserem Beobachtungsgebiete vorkommende Art anführen, obgleich eine solche hin und wieder im oberen Anseba-Thal und seiner Umgebung erscheinen soll. Mein abessinischer Jäger Gebrä Giorgis, ein aufmerksamer Beobachter und Kenner aller Säugethiere und Vögel seiner Heimat, versicherte mich, mehrmals größere Flüge von Flederhunden unsern Herren gesehen zu haben, welche höhere Gestränke, die eben reife Beeren und Steinfrüchte trugen, plünderten.

Anmerkung. Wir kennen von nordostafrikanischen Flederhunden folgende Arten:

Pteropus stramineus, Geoffr. — Wagn. Schreb. Suppl. V. p. 603. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 8. —

<sup>1</sup> Die Fledermäuse heißen auf Arab. *Wutwāt* und *Abu Rugheā*. Som. *Fi-mer*. Denk. *Hari-Kumbaro*. Amq. *Joslet* und *Ja Lelit* wof. Tigr. *Of-Leiti* und *Aura*. Bel. *Qerka 'äreb*.

*Pteropus palmarum*, Heugl. (?) — Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. 1865. Heft 5. Nr. 3 u. 4. (Ob diese Art wirklich identisch sei mit Pt. stramineus, wage ich ohne besondere eingehende Vergleichung beider Formen nicht zu bestimmen. Letztere ist mir aber unmöglich, da die Originaltype von Pt. palmarum sich nicht mehr im Stuttgarter Museum befindet.)

Namentlich in der Region der Doleb-Palme, sowohl längs des Blauen als des Weißen Nil zwischen dem 9. und 14. Grad n. Br. lebt gesellschaftlich und frisst sich oft dergestalt in die großen Doleb-Mäuse ein, daß er beim Herunterschießen derselben mit zur Erde fällt.

*Pteropus leucomelas*, Fitz. — Fitz. Chiroptera p. 77. Wohl kaum spezifisch von Pt. stramineus trennbar und gleiche Wohnorte inhabend.

*Pteropus Geoffroyi*, Tem. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 603. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 8.

In Egypten. Colonienweise in Felspalten wohnend und nachts, namentlich bei hellem Mondchein, stets in Bewegung. Plündert mit Vorliebe wilde Feigen.

*Pteropus (Epomophorus) labiatus*, Tem. — Tem. Monogr. II. p. 83. t. 39. — Fitz. Chiropt. II. p. 8.

Aus Abessinien: Botta.

Hierher rechne ich mit einigem Zweifel einige von mir im Thal des Belegaz-Flusses in Central-Abessinien eingesammelte Exemplare, die Dr. Fitzinger zu Pt. schevanus zählt.

Die Färbung ist nicht graugelb ins Hirschbräunliche; Bauchmitte heller, weißlich; zu jeder Seite des Ohres befindet sich ein weißer HaarbüscheL Beim Männchen liegen die Brustwarzen in einer Brusttasche, welche mit schneeweissen Haaren ausgekleidet ist; auch der Rand dieser eigenthümlichen Tasche ist weiß. Auge groß, hell erdbraun, der verdeckte (innere) Theil des Augapfels weiß; Gesicht hundeartig; Oberlippen seitlich frei und hängend; die Kiefer öffnen sich ungemein weit; die Lippen sind namentlich

nach vorne zu hängend, oben und unten faltig und schwulstig; Ohr klein, am Hinterrand mit einem unbedeutenden stumpfen Ausschnitt; Nase wenig gespalten; Nasenlöcher **u** förmig; Nasenrücken in der Mitte etwas gewölbt; Stirn abschüssig; im Gaumen 6 bis 7 Falten, deren letzte mit vornwärts gerichteten Zähnen, die drei hintersten in ihrer Mitte getheilt; Zunge groß, weich, muskulös und sehr fleischig, mit Eindrücken der Gaumenfalten und rückwärts gerichteten Häfchen an der Spitze; der Magen besteht eigentlich nur in einer geringen Erweiterung der Ein geweide und ist derselbe sehr in die Länge gezogen; ersterer war übrigens bei den von mir untersuchten Exemplaren ganz leer. — Körperlänge circa 5". Kopflänge gegen 1" 8"". Ohrhöhe 6"" bis  $6\frac{1}{2}$ "". Vorderarm 2" 5"" bis 2" 6"". Daumen mit Nagel 1" 1"". Zeigefinger mit Nagel 1" 10,5"". Hinterstes Glied des Mittelfingers 1" 10"". Nächstes Glied desselben 1" 2"".

Lebt paarweise, wohnt in Felspalten, hohlen Bäumen und unter Luft Wurzeln von *Ficus*-Arten, fliegt auch bei Tage und hängt sich mit den Hintersüßen an Äste an.

Dieser Art sehr ähnlich ist:

*Pteropus (Epomophorus) anurus*, Heugl. — Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. V. XXXI. — Fitz. Chiropt. II. p. 5.

Unterscheidet sich von meinem Pt. labiatus durch viel spitzeren Kopf, weit weniger verlängerte, also mehr zurückstehende Unterlippe, die vom Rand der Oberlippe seitlich nicht überragt (umhüllt) ist, durch gerades, nicht abgesetztes Stirn- und Nasenprofil,<sup>1</sup> höher ange setzte, spitzere und längere Ohren ohne Ausbuchtung auf der Oberhälfte des hinteren Randes, etwas abweichende Körperverhältnisse, endlich durch die tief eingeschnittene Oberlippe, trichterförmig erhabene Nasenlöcher und zwei Falten in den Oberlippchen, die den Lippenrand nicht erreichen.

<sup>1</sup> Es liegen mir nach dem Leben gefertigte Zeichnungen beider Formen vor, die unbedenklich ihre artliche Verschiedenheit darthun.

Auch bei dieser Art zeigt das Männchen Brusttaschen, die weiß ausgefüttert, am Rande aber mit großen weißen Haarbüscheln bekleidet sind. Bei *Pteropus labiatus* ist das äußere Daumenglied weit weniger weit von der Flughaut umhüllt, als bei *Pt. anurus*, der Daumen selbst viel kürzer, sein Nagel weit schwächer, weniger gekrümmt und heller gefärbt.

In der Färbung kein namhafter Unterschied, nur hat *Pt. anurus* viel dunklere Flughäute. Letzterer misst: Ganze Länge 5" 3""". Vorderarm 2" 9"" bis 3"". Daumen mit Nagel 1" 2"" bis 1" 3"". Zeigefinger mit Nagel 2" 1"" bis 2" 2""". Wurzelglied des Mittelfingers 2" bis 2" 2""". Das Mittelglied des Mittelfingers 1" 2"".

Bei Vergleichung der Schädel von *Pteropus labiatus* und *Pt. anurus* stellt sich folgender Unterschied heraus. *Pt. labiatus* hat kleineren, schmäleren Kopf, ein viel kürzeres Schnauzentheil, letzteres an der Spitze niedriger, beträchtlich steiler abgedacht; die Wirbelgegend höher, bauchiger, der obere Rand der Augenhöhlen niedriger liegend, die Lücken zwischen den 3 vorderen Backenzähnen größer, die obere, vordere Fläche der Hirnkapsel (des Stirnbeines) schmäler, dagegen weit mehr nach dem Scheitelbeine in die Länge gezogen, also nach hinten weit spitzwinkliger, die Zähne schwächer.

Schädel von:	<i>Pt. labiatus</i>	<i>Pt. anurus</i>
Länge . . . . .	1" 6,8""	1" 9,5""
Größte Breite . . . . .	—" 10""	—" 11,2""
Schnauzentheil vom vorderen Rand der Augenhöhle . . . . .	—" 7,8""	—" 9,1""
Geringste Breite der Stirn zwischen dem Oberrand der Augenhöhlen —" 3""		—" 4""
Größte Höhe des Unterkiefers am Kronfortsatz . . . . .	—" 5,5""	—" 6,3""
Länge des Unterkiefers . . . . .	1" 2,5""	1" 5""

Pteropus (Epomophorus) schovanus (Heugl. et Rüpp.) Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 131. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 608. (*Pt. schoensis*). — Fitz. Chiropt. II. p. 19. — *Pt. labiatus* jun. (Peters).

Aus Schowa. Ich glaube die Benennung schoensis in schovanus umändern zu dürfen. Schoa, Shoa, zoa der Schriftsteller wird äthiop. Siéwa, auch. aber Schowa oder Schewa geschrieben.

### Fam. Blatt-Nasen (Istiophora).

#### 4. Die Hohlnase, *Nycteris labiata* (Heugl.).

Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. 1861. Separ.-Abdr. p. 5.

In der Gegend von Keren im Bogos-Gebiet sammelte ich im Monat Juli und October mehrere Hohlnasen ein, welche von Prof. Dr. Peters als thebaica bestimmt wurden. Die Form des Bogos-Landes übertrifft die egyptische an Größe; auch Färbung und Nasenschmuck dürften etwas abweichen. Scheitel, Nasengegend, Behaarung des Oberarmes und Unterleib weißlich; Augengegend, ein Streif hinter dem Auge bis zum Ohr, Stirn, Nacken und Oberseite des Rumpfes mausgrau; Seiten des Halses und Schultern lebhaft graulich-rostfarben angehaucht, Ohren hell und nicht rauchschwärzlich, sein schwarz gesäumt; innen zart und lang behaart; Flughaut braunschwarzlich; Lippen fleischfarbig, an den Wurzeln der Barthaare violett punktiert. Ganze Körperlänge 2". Flugweite 10" bis 11". Schwanz 2" bis 2" 2"". Ohrhöhe 1" 1"". Ohrbreite 9"". Kopflänge 9"" bis 10"".

Eine ähnliche Hohlnase ist mir auch in Felsgräbern und Höhlen in Abessinien aufgestoßen.

*Nycteris thebaica* fand ich in großer Menge in den

Ruinen und Katakomben von Oberegypten; Nycteris Geoffroyi, Desm., soll in Senar vorkommen, N. discolor, Wagn., im nördlichen Nubien.

### 5. Die Zwergfußfledermaus, *Rhinolophus minimus* (Heugl.).

? *R. Hippocrepis*, Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 672. — *Rhinolophus minimus*, Heugl. Verh. L. Carol. Akad. 1861. Sep.-Abdr. p. 6.

Professor Peters bestimmte eine von mir im Bogos-Land eingesammelte und als Rh. minimus beschriebene Fußfledermaus als Rh. Hippocrepis. Aber mein Thier scheint doch in einigen Stücken von der europäisch-asiatischen Form abzuweichen, abgesehen davon daß es beträchtlich geringere Körperverhältnisse zeigt. Der Rand des äußersten Nasenblattes ist bei Rh. minimus nicht gezähnt, breiter und weniger in die Länge gezogen, unten in der Mitte wohl etwas eingezähnt aber nicht gespalten, am oberen Rand, jederseits unmittelbar unter dem Prosthema mit einem kreisrunden Ausschnitt; Prosthema selbst, wohl mit der Sella verbunden, jedoch am unteren Rand umgeschlagen; die Nasenlöcher stehen dem unteren Rand des Blattes viel näher, ihre breite Öffnung steht nach unten, von wo aus sich die Nasenritzen bogig nach auss- und aufwärts ziehen; das Ohr zeigt keine Längsfurchen, sondern nur oben am Außenrand 5 bis 6 undeutliche Querfalten; unter und hinter dem breiten und tiefen lappenartigen Ausschnitt an der Wurzel des Außenrandes des Ohres eine in den Gehörgang eingesenkte Wulst, welche die Stelle des Tragus vertritt. Behaarung sehr fein, licht mausgrau, dem Hinterrücken zu etwas dunkler; Lippen fleischfarbig, die Unterlippe fast nackt, obere und untere Lippe in ihrer Mitte gespalten; Flughäute und Ohren sehr zart, durchscheinend, hell rauchgrau ins Fleischfarbige; Innenseite der Flughäute zwischen den Armen

und Füßen mit regelmäßigen Reihen von kleinen Wärzchen und einzelnen sehr feinen Haaren. Körperlänge 1" 2"" bis 1" 3"". Schwanz 11"". Flugweite 8" 8"". Vorderarm 1" 3½"".  
Ohrhöhe fast 6½"".

6. Die südliche spitzkammige Hufeisennase, *Rhinolophus acrotis* (Heugl.).

Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. 1861. Sep.-Abdr.  
p. 10. — *Rh. clivosus*, Peters, Mus. Stuttg.

Im Bogos-Gebiet.

Sehr ähnlich dem *Rh. clivosus*, aber größer und dunkler gefärbt. Nasenblatt breiter als hoch, unten etwas eingeschnitten, unter seinem Rand rundum eine regelmäßige Reihe von kleinen Wärzchen; Sattel oben nicht zugespitzt, sondern gerade abgeschrumpft. Hell mausgrau, Unterseite etwas lichter; Flughäute, Ohren und Nasenbesatz fleischfarbig ins Graublaue; Nägel hell fleischfarbig mit weißlicher Spitze und rostbraunem Fleck in der Mitte; Zehenrücken mit feinen, weißen, borstigen Haaren besetzt. Körperlänge 2". Schwanz 1" 3"". Ohrhöhe 9¼"". Vorderarm 1" 9"".  
Flugweite 13".

7. Die großohrige Hufeisennase, *Rhinolophus megalotis* (Hengl.).

*Phyllorrhina megalotis*, Heugl. Verh. L. Carol. Akad. 1861. Sep.-Abdr. p. 8.

Aberante Form. Ohren durch eine niedrige Hautfalte vereinigt; Nasenbesatz aus einem einfachen Hufeisen bestehend; in der beckentartig vertieften Nasengrube drei Fleischläppchen, zwischen denen die Nasenlöcher sich befinden; diese Läppchen dienen wohl zum Verschließen der Nasenöffnung und der Schmuck des Nasenblattes erhält dadurch eine regelmäßige U-förmige Unterform; dahinter

befindet sich der mit 4 nach vorne gerichteten Wärzchen verschene ungekerbte Querkamm, der nach hinten und oben strahlenförmig mit einem rundlichen, auf- und vornwärtsgerichteten niedrigen Hautblatt geziert ist; Ohrmuschel mit etwa 20 feinen Querfalten; der Innenrand und ein ihm nahe liegender und mit demselben parallel laufender Faltenrücken auf der Innenseite der Ohrmuschel behaart. Behaarung fein, nur an der Schnauze kräftiger und dichter; Gesicht fuchsroth ins Gelbliche, diese Farbe nach hinten nicht scharf begrenzt; durch die kleinen Augen ein schwärzlicher Streif; Oberseite weißlichgrau, alle Haare mit hoeoladebrauner Spitze; Unterseite weißlich, namentlich nach den Seiten zu rostfarb angehaucht; Flughaut grauslich; im Innern der Ohrmuschel zwischen jeder Querfalte eine Reihe weißlicher drüsenaartiger Punkte. Körperlänge 1" 5"". Der fast bis zur Spitze in die Flughaut eingehüllte Schwanz 11"". Ohrhöhe 9"". Ohrbreite 6½" bis 7". Flugweite 8".

Im August bei Keren im Bogos-Gebiet eingesammelt.

#### 8. Die Kaffer-Kamminase, *Rhinolophus caffer* (Wahlb.).

*Phyllorrhina caffra*, Peters, Mozamb. I. p. 39. t. 8. — Sundev., Öfvers. k. Vetensk. Akad. Förhandl. 1846. p. 118. — *Ph. bicornis*, Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. 1861. Sep.-Abdr. p. 7.

Von Herrn Professor Dr. Peters wurde *Phyllorrhina bicornis*, Heugl., die ich im Bogos-Land in mehreren Exemplaren erlangte, zu *Rhinolophus caffer* gestellt, obwohl beide Formen in Bezug auf Gestalt des Nasenblattes und der Ohren, Größe und Färbung einige Differenzen zeigen.

Die Lippen von *Rh. bicornis* sind mit kleinen violettröthlichen Drüsen besetzt und zart behaart; der Pelz grauslichweiß, alle Haare mit röthlichgrauen bis rauchgrauen Spitzen, welche

auf Oberkopf, Rücken und Hals am dunkelsten erscheinen; Gesicht hell mausgrau; Gegend um die Geschlechtstheile weiß; Ohrmuschel hell rauchgrau, im Innern ins Violette spielend; Flughaut schwärzlich. Körperlänge 2". Schwanz 11<sup>1/2</sup>" bis 13<sup>1/2</sup>". Ohrhöhe 6<sup>1/2</sup>". Vorderarm 1" 9<sup>1/2</sup>". Flugweite 10<sup>1/2</sup>".

Anfangs October in der Umgegend von Keren.

Ein ähnliches Exemplar erhielt das Stuttgarter Museum durch J. W. v. Müller, wahrscheinlich aus der Gegend von Chartum oder aus Kordofan.

Anmerkung. *Rhinolophus tridens*, Geöffr. — Findet sich in Egypten und Nubien, namentlich in Felsgräbern.

*Rhinolophus clivosus*, Rüpp. — Ebendaselbst, auch im peträischen Arabien und in der Gegend von Moilah.

*Rhinolophus Euryale*, Blas. — Nach Blasius in Egypten.

*Rhinolophus Landeri*, Martin. — Nach Fitzinger in Fazogl, wo von Kotschy erbeutet.

*Rhinolophus capensis*, Licht. — Egypten.

*Rhinolophus fumigatus*, Rüpp. — Im Frankfurter Museum aus Showa.

Hierher rechnet Peters eine Fledermaus, die ich nicht selten in der Gegend von Adowa in Abessinien angetroffen habe. Ich nannte dieselbe:

*Rhinolophus macrocephalus*, Heugl.

Ohren groß, breit, mit ziemlich scharfer Spitze und 8 bis 9 Querfalten; Nasenblatt einfach, in der Mitte des unteren Randes mit einem Einschnitt; jederseits am oberen Ende dieses Randes eine kleine Warze; die Nasengegend um das Blatt mit einer regelmäßigen Reihe von Hautwärzchen besetzt. Sattel seitlich sehr zusammengedrückt, also schmal, nach unten und vorne eine etwas hohle Fläche bildend, die in der Mitte einwärts, mit der Spitze auf- und vorwärts gebogen ist, sowie mit zwei zusammenlaufenden trichterartigen Hautlappen, welche in die Nase

münden; Prosthema mit zwei Querfalten und breiter lauzettförmiger Spitze, welche ungefähr so hoch als breit ist. Schwanz verhältnismässig kurz, mit dem Patagium interfemorale endend und hier kein gabelförmiger Einschnitt. Die genannte Flughaut außen und innen fein behaart. Kopf dick und gross; am vorderen Rand des Ohres ein wolliger Haarbüschel, sonst die Ohrbehaarung sehr zart und sparsam.

Die oberen äusseren Schneidezähne hirsekornartig abgerundet, die  $\frac{2}{2}$  des Unterkiefers stärker, mit deutlich dreizähniger Schneide, alle 4 quer gestellt. Der obere Eckzahn kräftig; der demselben zur Seite stehende falsche Backzahn nach hinten und außen mit einer zweiten Spitze. Zehen stark behaart, wenn ich recht unterscheide, sämtliche nur zweigliedrig. Die Halsflughaut umfasst beiderseits das ganze erste Daumenglied; die Schenkelflughaut reicht bis zum Handgelenk des Fusses. Färbung mausgrau, unten etwas heller; Flughäute schwärzlich; Arme und Füsse auf der Innenseite fleischfarbig. Körperlänge 2 $^{\prime \prime}$  3 $^{\prime \prime \prime}$ . Schwanz 10 $\frac{1}{4}$  $^{\prime \prime \prime \prime}$  bis 10 $\frac{1}{2}$  $^{\prime \prime \prime}$ . Vorderarm 1 $^{\prime \prime}$  10 $^{\prime \prime \prime}$ . Ohrhöhe fast 11 $^{\prime \prime \prime}$ . Flugweite 12 $^{\prime \prime}$ . Im Stuttgarter Naturalienabinet als Rh. fumigatus aufgestellt. — Rüppell giebt die Farbe seines Rh. fumigatus als dunkel rauchgrau an, die Körperlänge zu 2 $^{\prime \prime}$  6 $^{\prime \prime \prime}$ . Schwanzlänge zu 10 $^{\prime \prime \prime}$ . Vorderarm 1 $^{\prime \prime}$  11 $^{\prime \prime \prime}$ .

Aus der Familie der Blatt- oder Ziernasen finden sich in Nordost-Afrika noch folgende Arten:

Megaderma frons, Geoffr. — Im oberen Nilgebiet, südlich vom 15. Grad n. Br., längs Flüssen und Bächen, in dichtem Gebüsch und in den Kronen der Bäume. Sieht bei Tage ganz gut und fliegt nicht selten bei grossem Sonnenchein. Ein abessinisches Exemplar des Stuttgarter Museums ist etwas grösser als andere von Senar und vom Weissen Nil, namentlich die Ohren noch breiter und grösser, der Daumen länger. Ohrhöhe 1 $^{\prime \prime}$  6 $\frac{3}{4}$  $^{\prime \prime \prime}$ . Vorderarm 2 $^{\prime \prime}$  2 $^{\prime \prime \prime}$ .

Im Leben sind die Ohren blaß braungelb, Nasenblatt und Lippen etwas heller; Tragus, Ohrwinkel und Flughäute sehr lebhaft orangegelb; Pelz grünlichgrau, die Haare mit gelb-grünlicher (fast ölgrüner) Spitze; Nägel rein schwarz. Ich nahm folgende Maße an einem Exemplar im Fleisch: Körperlänge von der Ohrspitze  $3''\ 2\frac{1}{4}'''$ . Ohrhöhe  $1''\ 5\frac{1}{2}'''$ . Tragushöhe gegen  $1''$ . Nasenblatt  $9'''$ . Vorderarm  $2''$ . Auge verhältnismäßig groß; im Ohr 11 bis 12, im Gaumen 12 Querfalten.

*Rhinopoma microphyllum*, Brünn. — Findet sich in Egypten.

Von dieser Art verschieden scheint mir:

*Rhinopoma cordofanicum*, Heugl. — Häufig um das Araschkol-Gebirge. Größer als *Rh. microphyllum*.

Tragus sickelförmig, in der Mitte concav, auf der Außenseite am Hinterrand mit kleinem rundlichem Ausschnitt oder Ansatz; Ohren auf der Stirn verbunden; vor denselben eine tiefe, große, herzförmige Grube, die nach oben rechts und links, also in der Richtung der Ohren durch einen häutigen Aufsatz eingefasst ist; die Nase weit hinter den Lippen zurückstehend, aufgedunsen; Nasenöffnungen durch zwei Membrane verschließbar; zwischen Oberlippe und Nase eine dreiseitige Vertiefung.

*Rhinop. microphyllum.*    *Rh. cordofanicum.*

Körperlänge . . .	$2''\ —'''$	$2''\ 9'''$
Schwanz . . . fast	$2''\ —'''$	$2''\ 8'''$
Flugweite . . .	$7''\ 4'''$	$12''\ —'''$
Vorderarm . . .	$—''\ —'''$	$2''\ 5\frac{1}{2}'''$

Fitzinger zählt noch zwei hierher gehörige Arten auf:

*Rhinopoma senaarense* (*potius Rh. senarense*), Fitz. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 11. Aus Senar und Fazogl.

*Rhinopoma longicaudatum*, Fitz. — Fitz u. Heugl, Säugeth. l. c. Aus Senar.

## Fam. Nactischwirrer (Gymnorhina).

9. Der haarbäuchige Grabflatterer, *Taphozous perforatus* (Geoffr.).

Descr. de l'Eg. p. 126. t. 3. 1. — Rüpp. Atl. p. 70. t. 27. f. 4—6. (Schädel). — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 684. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 9.

Dieser Grabflatterer war bisher bloß aus dem unteren Nilgebiet bekannt. In Bezug auf Größe stimmt ziemlich damit überein eine vorläufig von mir als *Taphozous maritimus* bezeichnete Form von den Küsten des Rothen Meeres; nur scheint die Färbung etwas abweichend. Ich gebe hier die ausführliche Beschreibung.

Nase und Wangen fast nackt, braunschwarzlich; Spitzhälfte ges. Ohres ebenfalls kaum behaart, rauchbraunschwarzlich durchscheinend, wie die Flughäute; Pelz sonst ziemlich lang, die Haare an der Basis weißlich, sonst rauchbraun, etwas ins Chocoladefarbige, am dunkelsten um Kinn und Wangen; Hinterleib sehr hell braunschwarzgrau, ebenso die Behaarung auf der Innenseite der Flughaut, unmittelbar unter dem Oberarm; die Flughaut zwischen den Füßen sehr weit herab behaart und die Haare hier von der Färbung derjenigen des Rückens; Rand der Spannhaut zwischen dem kleinen Finger und der Außenzehe des Hinterfußes weißlich; die Flughaut um den Schwanz zwischen den Sporen der Hinterfüße kreisförmig eingeschnitten; die Wurzelhälfte des Schwanzes von der Flughaut umschlossen; Spitze des Schwanzes (3 Glieder) frei; Innenseite der Arme hell fleischröhlich. Körperlänge 3" 7"". Kopf von der Nasenspitze 10 $\frac{1}{2}$ "". Entfernung des Auges von der Nasenspitze fast 5"". Höhe des Ohres 8"".  
Oberarm gegen 1" 6"". Vorderarm 2" 3"" bis 2" 4"". Daumen mit Nagel 5 $\frac{1}{3}$ "". Mittelfinger 3" 8"" bis 3" 9"".  
Schwanz 11 $\frac{1}{2}$ "".

Der Schwanz, sowie die Zehen der Hinterfüße mit vereinzelten längeren Härchen. Flughaut zwischen den Hinterfüßen auf ihrer Innenseite graulich.

Findet sich in Menge auf der Insel Sauakin, gesellschaftlich unter Dachsparren lebend. Fliegt sehr leicht und gewandt, häufig die ganze Nacht über.

Numerierung. Hierher gehören noch folgende nordostafrikanische Arten.

*Taphozous nudiventris*, Rüpp. — Zu Egypten und Nubien, meist gesellschaftlich in Grabgewölben.

*Taphozous senegalensis*, Geoffr. — Von mir bei Douqolah erbeutet. Soll auch in Nubien und Senar vorkommen.

*Taphozous leueopterus*, Temm. — Im Stuttgarter Museum befindet sich ein von mir auf dem oberen Weissen Nil eingesammeltes und von Dr. Peters der genannten Art zugehörigstes Exemplar dieser bisher nur aus Südafrika bekannten Form.

#### 10. Der Zwerggrämler, *Dyposes pumilus* (Rüpp.).

Rüpp. Atl. p. 69. t. 27. f. a. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 704. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 4. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 9.

In der Gegend von Masaua.

#### 11. Der hellbauchige Grämler, *Dyposes ventralis* (Heugl.).

Heugl. Verh. der L. Carol. Akad. 1861. p. 11. (*Nyctinomus ventralis*). — *Dyposes Cestonii*, Mus. Stuttg. (nee Savi). — Fitz. Chiropt. p. 13.

Der oben angeführten ausführlichen Beschreibung dieser Art habe ich nichts hinzuzufügen, als daß die von mir an das

Stuttgarter Museum eingesandten Exemplare als D. Cestonii bestimmt worden seien. Abgesehen von der ganz abweichenden Färbung sind auch die Maße beider Arten sehr verschieden, bei D. ventralis fehlen die 3 bis 4 tiefen Querfalten am unteren Theil des äusseren Ohrrandes, der überhaupt weniger umgeschlagen, als bei D. Cestonii; bei letzterem auch die Falten in der Ohrmuschel viel deutlicher und in viel grösserer Anzahl vorhanden, die Ohrmuschel selbst dünner, durchsichtiger.

	Dysopes Cestonii (nach Wagner und Henglin)	Dysopes ventralis
Körperlänge . . .	3" 4"	3" 3"
Schwanz . . .	1" 10"	1" 8"
Ohrhöhe . . .	1" —"	—" 10"
Vorderarm . . .	2" 3"	2" 2"
		2" 6"

Bei D. ventralis beträgt die Kopflänge 1" 1", die Flugweite 15" 6".

Das Ohr ist kürzer als bei D. Cestonii, mit der Spitze viel weiter nach vorwärts gerichtet und hier nicht nach einwärts umgeschlagen, die Lippen weniger gefaltet, die Unterlippe viel weniger hängend und weiter zurückstehend. Nicht selten zur Hochsommerzeit um den oberen Aufseba, unfern Keren.

## 12. Der zweistreifige Grämmler, *Dysopes bivittatus* (Heugl.).

Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. 1861. p. 13. u. 18.

Viell kleiner als die vorhergehende Art, mit stark wulstigen, aufgedunstenen und fältigen Oberlappen; der obere Theil des vorderen Ohrrandes nach innen umgeschlagen; Unterlippe nackt, fleischfarbig, mit einer runden Vertiefung in der Mitte; die meisten von uns eingesammelten Exemplare sind obenher satt rostig umbra-braun, mit je einem weißen Längsstreif hinter der Wurzel der

Ohren; Brust heller als der Rücken; Brustseiten, Schultern, sowie Gegend unter dem Ohr zart weiß gestrichelt.

Körperlänge 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Schwanz 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Ohrhöhe 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Vorderarm 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" bis 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Flugweite 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>".

Ziemlich häufig auf ebenen Flächen, die mit einzelnen Hochbäumen bestanden sind, um den Anseba bis nach Kerem heraus, ebenso am Bach von Atirba.

Anmerkung. Von Grämlern kommen noch folgende Arten in Nordost-Afrika vor.

*Dysopes Cestonii*, Savi. (D. Rüppellii, Temm.) — Im mittleren und unteren Egypten, jedoch nach meinen Erfahrungen nicht häufig und nur an gewisse Vorlieben gebunden.

*Dysopes Mydas*, Hedenb. — In Senar. Möglicherweise nur Varietät der vorigen Art.

*Dysopes Geoffroyi*, Temm. — In Egypten.

Das Stuttgarter Museum besitzt einen von mir im Gebiet des oberen Abiad eingesammelten Grämler, der als *D. Geoffroyi* bestimmt wurde, sich jedoch, was die Färbung betrifft, eher an *D. brachypterus*, Pet., anschließt, aber beträchtlich größer ist. Ich benenne dieses Thier

*Dysopes talpinus*, Heugl. Behaarung dicht, ganz sammetartig, satt und lebhaft rostig Kaffeebraun, Unterseite heller, Brust und Schultergegend mehr otterbraun, Unterleib ins Graubraune; Ohren fast nackt, braunschwarz. Körperlänge gegen 4". Schwanz 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Ohrhöhe 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Vorderarme 2". Daumen mit Nagel 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Wurzelglied des Zeigefingers 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Zweites Glied des Zeigefingers fast 1".

Vom Gebiet der Kidj-Neger am westlichen Ufer des Nîr oder Baher el Djebel.

*Dysopes hepaticus*, Heugl. — Heugl. Verh. d. L. Carol. Akad. V. XXX. Sep.-Abdr. p. 14. — Fitz. Chiropt. III. p. 17.

Sehr ausgezeichnete Form. Ziemlich klein; Lippen wulstig,

Oberlippe bogig nach aufwärts verlaufend mit 7 bis 8 Falten. Ohren nicht groß, trapezoidförmig, ebenfalls mit 7 bis 8 Falten, auf der Stirn durch eine wulstige, halbmondförmig nach vorn verlaufende Hautwulst verbunden; die besondere Kappe an der Basis des Vorderrautes des Ohres bis gegen den Mundwinkel hin reichend; Tragus aufgerichtet, spitzig; Auge klein, in einer tiefen Falte liegend; Extremitäten kurz, kräftig, ebenso die sickelförmigen, scharf zugespitzten Nägel; letztere am Hinterfuß fast gleich lang, an der Außen- und Innenzehe mit langen, hörstigen weißlichen Kammhaaren. Die Flughäute mittelgroß; Patagium anale gefaltet, ein Drittel des Schwanzes umfassend; Schwanz dick, etwa von halber Körperlänge; die oberen Schneidezähne kräftig, mit den Spitzen etwas convergirend, die unteren sehr wenig entwickelt und kaum über das Zahnsfleisch vorragend; die oberen Reißzähne vorn eingeschnitten, die unteren ziemlich lang, ihre Spitzen aus einander nach auf- und auswärts gerichtet; Zunge faltig, warzig. Obenher braungrau; Mitte des Unterleibes schmutzig graubraun, die übrige Behaarung lebhaft lebabraun bis kastanienbraun; Weichen mehr aschgrau; Kinn und Kehle fast nackt, hell fleischfarbig; Ohren, Gesicht und Nägel rauchbraun. Schwanz schwärzlich; Flughäute hell rauchfarbig, durchscheinend, unten längs der Körperseiten mehr blaugraulich. Körperlänge 2" 10"". Schwanz 1" 5"". Flugweite gegen 13". Vorderarm 1" 9"".  
Dies die Maße eines alten Weibchens; die Männchen durchschnittlich etwas kleiner.

Kinn in der Mitte etwas eingedrückt; Lippen ungespalten; Bartborsten rauh und dick; auch am Daumen des Vorderfußes einige verlängerte bürstenartige Haare; Flughäute fast ganz haarlos; Nasengegend in der Mitte etwas vorspringend, so daß die fast röhrligen Nasenlöcher seitwärts zu stehen kommen.

Lebt in größeren Gesellschaften unter dichten, dünnen herabhängenden Blätterbüscheln von Doleb-Palmen.

13. Das schwarz und weiße Hestohr, *Synotus leucomelas*  
(Rüpp.).

Rüpp. Atl. p. 73. t. 28. f. b. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 719. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 9. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 5.

An den Küsten des Rothen Meeres südwärts bis Massaua.

Ummerkung. Aus der Gattung der Löffelschwirrer (*Plecotus*) habe ich keine Art in unserem Beobachtungsgebiet gefunden; in den Nilländern dagegen erscheinen verschiedene hierher gehörige Formen.

*Plecotus aegyptiacus*, Geoffr. — *Pl. auritus* var. *aegyptiacus*, Geoffr. Ann. du Mus. V. 8. p. 197. — *Pl. Christii*, Gray, Mag. of Zool. & Bot. V. 2. p. 495. — *Pl. Perronii*, Geoffr. (?). — *Pl. auritus*, Geoffr. Descr de l'Ég. p. 118. t. 2. f. 3.

In Egypten, Abessinien, nach Rüppell auch in Schowa.

*Plecotus ustus*, Heugl. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 10. Groß, hell isabell ins Grauliche; Unterleib lichter; Ohr verhältnismäßig nicht sehr groß, im oberen Drittel des Außenrandes etwas eingebuchtet, im unteren Drittel des Innenrandes stark stumpfseitig ausgeschnitten, so daß sich hier beide Ohren bis auf 1<sup>mm</sup> nähern. Körperlänge stark 3". Schwanz 1" 9,5"". Kopflänge 1" 8"". Ohrhöhe 1" 2,7"". Der etwas ausgeschweifte, schmale, lanzenförmige, oben aber schräg abgeschnittene Tragus 7"" hoch. Borderarm 2" 1"". Das Wurzelglied des Mittelfingers 1" 11,7"". Das erste Glied des zweiten und fünften Fingers gleich und 2" 3,3"" lang; das erste Glied des vierten Fingers 1" 9,5"".

Sehr ausgezeichnete Art, von welcher ich jedoch nur ein einziges Exemplar erlangte, und zwar unfern Wadi Halsah im Baten el Hadjar. Es flog mit einigen anderen Fledermäusen

in später Nacht bei Mondenschein rasch über unserem Lagerplatz hin und her.

Die Originaltype gelangte an das kaiserliche Museum zu Wien.

Fitzinger (Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 10) unterscheidet noch einen

Plecotus aethiopicus, Heugl. — Ein Exemplar dieser neuen Art wurde von uns am oberen Baher el abiad erlangt und befindet sich ebenfalls im Wiener Museum.

#### 14. Die weißrandige Fledermaus, Vesperugo Kuhlii (Natt.).

Kuhl, Wetterau. Annal. IV. p. 58. — Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 729. — *Vespertilio marginatus*, Cretschn. Rüpp. Atl. p. 74. t. 29. f. a. — *V. albo-limbatus*, Küst. Heugl. Fauna R. M. Nr. 6. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 10.

Ich glaube diese in Egypten, Nubien und auf der Sinaitischen Halbinsel vorkommende Art auch an der abessinischen Küste gesehen zu haben.

#### 15. Die Rautenfledermaus, Miniopterus Hesperida (Temm.).

Temm. Monogr. II. p. 211. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 748. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 11. — Fitz. Chiropt. IV. p. 69.

An der abessinischen Küste. Von mir nicht beobachtet.

A n m e r k u n g. Von eigentlichen Fledermäusen (*Vespertilio*) mit den Untergattungen *Vespertilio*, *Blas.* et *Keyserl.*, *Vesperugo*, *Bl. et K.*, *Vesperus*, *Bl. et K.* und *Miniopterus*, *Bp.*, werden noch folgende Arten, im nordöstlichen Afrika beobachtet, erwähnt.

*Vesperus Savii*, *Bp.* — Von Rüppell bei Tunes eingesammelt.

*Vesperugo pipistrellus*, Schreb. — Durch mich bei Theben erlangt.

*Vesperugo ursula*, Wagn. — In Egypten und Abessinien.

*Vesperugo Noctula*, Schreb. — Nach unzuverlässigen Angaben auch in Egypten vorkommend.

*Vesperugo Rüppellii*, Fisch. (V. Temminckii, Rüpp. Atl. p. 17. t. 6.) — In Nubien, Senar und Dabalat.

*Vesperugo senarensis*, Heugl. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 10. — In der Umgegend von Chartum.

*Vesperugo hypoleucus*, Heugl. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 10. — Am unteren und mittleren Blauen Nil, nordwärts bis gegen Verber. Ausgezeichnet durch die rein-weiße Färbung des Bauches. Diese, wie die vorhergehende Art konnte ich nicht näher mit verwandten Formen vergleichen. Die Originaltypen beider befinden sich im kaiserlichen Museum zu Wien.

*Miniopterus Schreibersii*, Natt. — Die Varietät *M. dasythrrix*, Temm., wurde von mir in den Höhlen von Dorgora am Tsana-See eingesammelt. Bestimmung von Dr. Peters.

Scheint etwas größer als *M. Schreibersii*; auch das Ohr länger und breiter; obenher dunkler braun, ebenso auf Borderhals und Brust, die fast ebenso satt graubraun gefärbt sind, wie der Rücken. Das erste Glied des Zeigefingers misst 24,2'', das zweite und dritte Glied zusammen 16,3''. Daumen mit Nagel 4''.

#### 16. Die gelbbäuchige Schwirrmans, *Nycticejus borbonicus* (Geoffr.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 768. — *Nycticejus flavigaster*, Heugl. Verh. L. Carol. Akad. 1861. Separ.-Abdr. p. 14. — ? *N. murino-flavus*, Heugl. Ibid. p. 15.

Nach der Bestimmung von Professor Dr. Peters gehört

mein *N. flavigaster* zu *N. borbonicus*. Doch scheint die mir bekannte Beschreibung des letzteren durchaus nicht auf mein Thier zu passen.

Wagner giebt von *N. borbonicus* folgende Diagnose und Maße: rufus, subtus albus; trago elongato, lanceolato. — long. corp. 2" 11". — caud. 1" 7". — Antribach. 1" 9".

*N. flavigaster* hat ein ziemlich großes Ohr, mit zwei bis drei Längsfalten und 5 bis 6 undeutlichen Querrippen; der sickelförmige Tragus spitz, nach vorwärts gerichtet, mit halbkreisförmigem Ausschnitt oder Klappe unten an der Öffnung des Gehörgangs. Ohrmuschel fast nackt, schwärzlichbraun, an der Basis des Außenrandes mit sehr feinen olivengrünen Haaren; Rippen schwärzlich fleischfarben; Flughaut fast schwarz, an der Innenseite des Oberarmes stärker als auf den übrigen Innentheilen dieses Organs mit zarten, grünlichgelben Haaren; Oberseite glänzend bräunlich olivenfarben; Gesicht mehr olivengrünlich; Unterleib und Behaarung des Oberarmes schwefelgelb; die feinen Nägel grünlich, mit leicht grüngelber Spitze. Diese eigenthümlich gefärbte Schwirrmans fand ich im August und September ziemlich häufig in der Umgegend von Keren im Bogos-Gebiet.

Ihr sehr ähnlich, aber kleiner und etwas anders gefärbt ist *Nycticejus murino-flavus*, Heugl., von welcher Form ich nur ein einziges Exemplar in den Gärten von Mekulu bei Masaua erlangte. Die Ohren sind schwärzlich, außen an der Basis, innen weniger stark und zarter grüngelblich behaart; ebenso die Innenseite des Schenkels; Oberseite mausgrau ins Olivenfarbige; Unterleib lebhast hell bräunlichgelb, nach oben zu mehr graugelb; Kehle und Behaarung unter dem Oberarm intensiver gelb; Reißzähne violett angehaucht. Die letztgenannte Form kommt auch in der Nähe von Gondar in Amchara vor. Wahrscheinlich gehört *N. murino-flavus* als eigene Varietät zu *N. flavigaster*.

	<i>Nycticejus borbonicus</i> nach Wagner.	<i>N. flavigaster.</i>	<i>N. murino-flavus.</i>
Körperlänge	2" 11""	2" 10""	2" 6""
Schwanz	1" 7""	1" 9""	2" —"
Vorderarm	1" 9""	—	—
Flugweite	—	13" —"	11" 6""
Ohrhöhe	—	—" 7""	—" 6½""
Tragus	—	—" 3¾""	—

A n m e r k u n g. Von nordost-afrikanischen Schwirrmäusen kennen wir noch folgende Arten:

*Nycticejus leucogaster*, Rüpp. — Rüpp. Atl. p. 71. t. 28.

In Kordofan, wo diese Art in hohlen Adansonien häufig.

*Nycticejus eriophorus*, Heugl. — Fitz. u. Heugl. Säuge-thiere p. 11.

Klein; die Ohrspitze scharf; der äußere Ohrrand bis tief unter den Mundwinkel herablaufend und hier eine scharfe Ecke bildend; Tragus schmal, lanzettförmig, fast so hoch als die Ohrspitze; 8 bis 9 Gaumenfalten. Behaarung reichlich, lang, eigenthümlich gekräuselt; Oberseite hell erdgrau mit weißlichen Haarspitzen; Unterseite schmutzig weiß, Weichen mehr ins Braungrauliche; Flughaut braunschwarzlich. Körperlänge 1" 6"". Kopflänge gegen 7"". Außenrand des Ohres 6"" hoch. Schwanz 1" 3"". Vorderarm 13"". Mittelfinger 2" 4½"". Der vierte Finger 1" 11½"". Der fünfte Finger 1" 10"".

Von dieser Art sammelte ich drei Exemplare im Belegaz-Thal zwischen Semién und Wogara in Abessinien ein. Sie befanden sich im Hängenest einer Sperlings- oder Webervogelart.

*Nycticejus Schlieffenii*, Pet. Pet. Berl. Monatsber. 1859. p. 224. — *N. Adovanus*, Heugl. M. S.

Die Originaltype von *N. Adovanus* des Stuttgarter Museums gehört nach Professor Peters zu *N. Schlieffenii*, der, wie es scheint, in Kordofan heimisch ist.

Ich gebe hier die nach dem Thiere im Fleisch von mir entworfene Beschreibung wörtlich aus meinem Notizbuch.

Im Oberkiefer  $\frac{2}{3}$  eckzahnartige Schneidezähne, unten  $\frac{3}{3}$ , deren jeder oben dreispitzig; der obere, dem Eckzahn zunächst stehende, sehr klein, wohl abortiv. Ohren stark von halber Kopflänge, ihre Außenseite ziemlich gradlinig; Tragus schmal, gegen die Augen zu nach vorwärts geneigt; Nasenlöcher etwas röhlig, auswärts und vorwärts gerichtet; Wangen vor den Augen wulstig aufgetrieben; Schwanz bis zum sehr rudimentären Spitzglied von der Schenkelhaut eingeschlossen; der lange Sporn trägt einen äußeren Hantlappen; die Schenkelflughaut reicht bis zum Fersengelenk, die Bauchflughaut dagegen noch weiter am Fuß herab; Oberseite der Füße, Ohren und Flughäute schwärzlich, die letztere mit deutlichem, aber feinem, weißem Saum; Gesicht und Oberseite bräunlich mäusefarben; Unterseite graulichweiß; Patagium interfemorale mit regelmäßigen Querreihen von weißen Haaren auf der Unterseite, ist aber auch äußerlich spärlich behaart; Nägel weißlich. Körperlänge bis zum After 1" 7". Schwanz vom After bis zur Spitze 1" 2 $\frac{1}{2}$ ". Vorderarm 1" 1".

Das beschriebene, den Zahnverhältnissen nach jüngere Thier wurde von uns im November am Assam-Fluß bei Adowa in Tigré erbuntet.

*Nycticejus serratus*, Heugl. — Ziemlich groß; Kopf schmal und etwas zugespitzt. Nasenlöcher klein, durch einen schwachen Spalt getrennt, der oben und unten sich erweitert und in seiner Mitte eine kleine aufgedunsene Membran zeigt; Unterlippe einfach gespalten, jederseits dieser Spalte in ein spitziges Läppchen herabgezogen; unter dem Kinn eine nackte, dreiseitige Vertiefung; Ohr klein, nach hinten und aufwärts gerichtet, dreiseitig mit abgerundeten Ecken, innen, der Außenrand mit 5 bis 7 Querfalten, am Borderrand 6 bis 7 kerbenartige Einschnitte; die Lappe an der Wurzel des äußeren Ohrflügels bogig bis gegen den

Mundwinkel hin verlaufend; Tragus kurz, platt, oben mit einer rundlichen, blattförmig ausgebreiteten Spitze, Außenrand doppelt, Innenrand einfach eingekerbt; auf der Kehlmitte ein kahler Fleck.

Im Oberkiefer 2 kleine, im Unterkiefer 2 + 2 ebenfalls kleine und dreizackige Schneidezähne; die Eckzähne mit deutlichem Höcker an der Basis, also zweittheilig. Der kurze Schwanz theilweise vom Patagium interfemorale eingehüllt, jedoch seine Spitze frei. Zeigefinger eingeschiedrig, die drei folgenden dreigliedrig.

Olivenbräunlich ins Graue; Unterseite heller olivenbraun-grau; die Behaarung an der Spitze gelblich; Schnauze und äußere Fläche der Flughäute rufbraun, die unteren Theile der Spannhaut um die Schenkelgegend sowie der etwas aufgedunstene Seitenrand des Patagium gelblich ins Fleischröhliche; die ganze Innenseite der Spannhaut bläulichgrau bis graugrünlich, nach der Unterhälfte hin mehr ockergelblich genetzt; Ohr sehr wenig behaart; von einer Ohrbasis zur anderen führt ein etwas obsoletes Halsband über die Kehle, dasselbe ist olivenbräunlich, wie der Rücken. Körperlänge stark 3<sup>II</sup> 5<sup>III</sup>. Schwanz 1<sup>II</sup> 2<sup>III</sup>. Vorderarm 2<sup>II</sup> 6<sup>III</sup> bis 2<sup>II</sup> 7<sup>III</sup>. Flugweite fast 16<sup>II</sup>. Ohrhöhe 8<sup>III</sup>. Tragus 2<sup>1/2</sup><sup>III</sup>. Sporn 9<sup>III</sup>.

Ein jüngeres, kleineres Exemplar ist obenher dunkler umbra-braun ins Graue, am Unterleib mausgrau; im Ohr 10 bis 11 Falten.

Häufig im sogenannten Scherq el Aqabah, am Araschkol und den benachbarten Granitgebirgen.

### Ord. Raubthiere (Rapacia).

#### Fam. Igel (Aculeata).

Aus dieser Familie kennt unser Beobachtungsgebiet wahrscheinlich mehrere Arten. Doch gebricht es mir am nötigen Material, um dieselben mit Sicherheit bestimmen zu können.

Namentlich im Küstenland unsern Aqiq und bei Masaua fanden wir mehrfach tote Exemplare, mit sehr falschem Stachelkleid, welche zu *Erinaceus brachydactylus*, Wagn., zu gehören scheinen. Mit der genannten Art fällt wohl auch *E. aethiopicus*, Ehr. Symb. phys. II. k. zusammen.

Fitzinger zählt (Sitz.-Ber. der k. k. Akad. Wien LVI. 1. 1867) folgende nordost-afrikanische Igel-Arten auf:

*Erinaceus diadematus*, Pr. Württ.

*Peroechinus Pruneri*, Wagn.

*Hemiechinus pectoralis*, Heugl.

*Hemiechinus platyotis*, Sund.

*Hemiechinus brachydactylus*, Wagn.

*Hemiechinus pallidus*, Fitz. & Heugl.

*Hemiechinus libycus*, Ehr.

*Hemiechinus aegyptius*, Sund.

Der Igel im Allgemeinen heißt bei den Arabern Qonfed und Qonfed.

### Fam. Spizmäuse (Soricina).

#### 17. Die dachchwänzige Spizmaus, *Pachyura crassicaudata* (Ehr.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. V. p. 554. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 7.

In den Hafenstädten des Rothen Meeres, namentlich in Magazinen, altem Mauerwerk und um Aborte findet sich eine große Spizmaus, welche Rüppell zu *Crocidura indica*, Geoffr., rechnet. Ehrenberg (Symb. phys. II. fol. k.) beschreibt dieselbe als besondere Art (*Suncus sacer*), Lichtenstein (Darstell. Säugeth. t. XL) als *Sorex crassicaudus*. Die arabische Benennung ist nach Ehrenberg Far Sunki, meine eingeborenen Jäger nannten alle Spizmäuse Om Sisi oder Zizi.

Die ditschwänzige Spitzmaus zeichnet sich durch einen penetranteren Moschusgeruch aus, der ihre Anwesenheit sofort verrät. Sie scheint sich auch auf Schiffen einzubürgern.

In Senar bis gegen Takah herüber, sowie in Dalabat zeigt sich in Strohhütten nicht eben selten eine zweite sehr stattliche Art, *Crocidura Hedenborgii*, Sund., ausgezeichnet durch ihre schöne umberbraune Färbung.

#### Fam. Bären (Ursina).

Nach Ehrenberg käme am Ostabhang der abessinischen Gebirge eine Bären-Art vor, welche die Eingeborenen Kerrai nennen (Hempr. Ehr. Symb. phys. I. fol. e.). Trotz meines längeren Aufenthaltes in jenen Gegenden habe ich niemals eine Bestätigung dieser Angabe erlangen können. Wahrscheinlich zieht sie sich auf die schwarze Varietät des Leopard. Unter Kerai verstehen die Tigrianer übrigens stets die gefleckte Hyäne.

#### Fam. Marder (Mustelina).

##### 18. Der Honig-Dachs, *Ratelus capensis* (Schreb.).

*Viverra capensis*, Schreb. Säugeth. III. p. 456. t. 125.  
 — *Meles mellivora*, Thunb. — Ratel, Sparrm. K. Vetensk. Ak. Handl. 1777. p. 49. t. 4. — Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. 1861. XXIX. Sep.-Abdr. p. 19. c. tab. — Brehm, Habeschi, p. 61. — Heugl. u. Fitz. Säugeth. p. 27.

Amh. und tigr. Faro, tigr. auch Magaza und Hofar. Arab. Abu djaka und Leslüs, in Dongola Abu-Kem.

Der Ratel scheint nicht gar selten im Gebiet des Anseba und in Menja vorzukommen. Doch bekommt man ihn, da er

eine fast ausschließlich nächtliche Lebensweise führt, nur selten zu Gesicht.

Namentlich während der Paarzeit ist den Männchen ein äußerst penetranter Geruch eigen.

Die Nahrung besteht vorzüglich in Insectenlarven und Mäusen, welche das Thier mit großer Fertigkeit auszugraben versteht. Auch plündert er Bienenschwärme und soll sogar Nas anschneiden und Gräber aufwühlen. Er haust den Tag über in Erdhöhlen.

#### 19. Der Band-Otter, *Rhabdogale mustelina* (Wagn.).

*Mustela zorilla*, Cuv. — *Mephitis zorilla*, Licht., Darst. t. XLVIII. — *M. africana*, Licht. — *Viverra striata*, Shaw. Zool. I. 2. t. 94.

Arab. Abu Wusiz und 'Afen. Amch. und tigr. Ts'etgi.

Nicht häufig im Vorland der Hochgebirge. Bewohnt familiweise Höhlen im Sand, die er nur zur Nachtzeit verläßt. Bei grellem Sonnenlicht sehen diese Thiere nicht.

Anmerkung. Aus der Gattung der Ottern (*Lutrina*) gibt es an den Flüssen von Tigrié und Amchara, sowie am Tsana-See wohl eine oder zwei Arten. Sie heißen auf Tigrisch Daqosta, auf Amcharisch Agosta. Beide erreichen kaum die Größe der Genet-Katze, die eine ist mardergelb mit vorherrschend glänzend schwarzen Haarspitzen und schwarzen Grannenhaaren, die andere einfach mardergelb ohne Beimischung von Schwarz. Eine dritte Art lebt am Fabus und Tumat-Fluß. Sie heißt dort Sabora, erreicht eine Länge von 3 bis 4 Fuß, ist schön lebendbraun, mit schimmeligem Anflug und großen, falbgelben Kehlfleck.

## Fam. Genetten (Viverrina).

20. Die abessinische Genette, *Viverra habessinica* (Heugl. e Rüpp.).

Rüpp. N. W. p. 33. t. 11. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 23. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 289. — *Viverra tigrina*, Blanf. Abyss. p. 233.?

Amch. Aner.

Nach meinem Dafürhalten und nach Vergleichung von mindestens 15 von uns im Bogos-Gebiet und in Central-Abessinien eingefärmelten Exemplare, welche alle die charakteristischen Merkmale von *V. habessinica* tragen, wohlberechtigte, selbständige Art.

Nicht selten in waldigen Gegenden, Ruinen, Klüften und hohlen Bäumen, um Dörfer und Gehöfte, nordwärts bis in das Gebiet des Anseba. Besucht zur Nachtzeit gerne die Niederschlüsse, um Eier und Geflügel zu räuben.

Ich bezweifle das Vorkommen von *V. genetta* und *V. civetta* in unserem Beobachtungsgebiet. Letztere Art erhielt ich aus den Gala-Ländern und vom oberen Blauen Nil.

21. Die gestreifte Manguiste, *Herpestes fasciatus* (Desmar.).

Desm. Dict. Scienc. nat. XXIX. p. 58. — *Ichneumon taenionotus*, A. Smith, S.-Afr. Zool. p. 114. — *Herpestes zebra*, Rüpp. N. W. p. 30. t. 9. fig. 2. — *H. leucostethicus*, Heugl. u. Fitz. Säugeth. p. 25. — *H. zebra* u. *H. gothneb*, Heugl. u. Fitz. ibid. p. 24. — Brehm, Habesch, p. 61. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 12.

Arab. Qotneh. Tigr. Tedha oder Tetha.

Allgemein im Bogos-Gebiet nordwärts bis zu den Bergen der Beni Amer, wohl auch in Takah, sowie im ganzen gemäßigt und wärmeren Abessinien, in Senar, Süd-Nordofau und am Weissen Nil.

Lebt gewöhnlich in Klüften auf 1000 bis 6000 Fuß Meereshöhe, häufig in Gesellschaft von Klippschliefern und Stellionen und kommt zur Nachtzeit in Geflügelställe und auf Küchenabfall.

Setzt gegen Ende der Regenzeit 4 bis 5 Jungen, die ziemlich lange blind sind. Letztere werden von der Mutter bei herannahender Gefahr im Munde weggetragen und in Sicherheit gebracht.

Besucht auch Bäume, um Vogelnester zu plündern, und lebt nebenbei von Insecten und deren Larven, vorzüglich aber von Mäusen, jungem Geflügel und von Eiern. Letztere öffnet das Thier durch Zerschellen an Steinen oder durch Zerdrücken, indem es sich mit den Schnäuzern auf dieselben wirft.

Ich maß ein ganz ausgewachsenes Männchen wie folgt: Länge des Körpers bis zur Schwanzwurzel 11" 6"". Schwanz 9" 6"".

Auf der Brust zwischen den Vorderfüßen befindet sich gewöhnlich ein deutlicher weißer Fleck von 3" Länge und 1" Breite. Die rostgelbe Farbe der Oberlippe sehr scharf vom Grau des Oberkopfes geschieden; Nasenlippe lebhaft fleischfarbig; Iris bräunlichgelb. Die Haare der ganz schwach entwickelten Schwanzquaste kurz.

Wird ungemein zahm und zutraulich und ergötzt durch ihre lebhaften und drolligen Bewegungen.

## 22. Die Mutschiltschela, Herpestes Mutscheltschela (Heugl. e Rüpp.).

*H. Mutgigella*, Rüpp. N. W. p. 29. t. 9. f. 1. — Blanf. Abyss. p. 234. — Fitz. n. Heugl. Säugeth. p. 24.

Amh. Mutsheltsha, nicht Mutgigella, wie Rüppell angiebt. Tigr. Seloch lochod oder Seloh' lochh'od.

Selten im Bogos-Gebiet, häufiger im abessinischen Tief-

land bis zur Woina-Dega heraus; kommt auch auf den vereinzelten Felsgebirgen der Steppen von Ost-Senar vor. Hält sich wie ihre Verwandten hauptsächlich in Felsklüften auf, aber ähnlich unseren Wieseln in Steinhaufen, Mauern und Ruinen.

### 23. Die zierliche Manguste, *Herpestes gracilis* (Rüpp.).

Rüpp. N. W. p. 29. t. 8. f. 2. — Brehm, Habesch, p. 61. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 10. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 304. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 26.

Heißt nach Rüppell bei Masaua Sakie, nach Brehm in Tigrié Mudjidjella.

Nicht häufig im Tiefland des Samhar und den benachbarten Vorbergen. Nach Rüppell in Erdhöhlen lebend.

### 24. Die rohstielige Manguste, *Herpestes jodoprymnus* (Heugl.).

In Färbung und Größe ähnlich dem *H. gracilis*, mit auffallend kastanienbraunem Hinterrücken und oberer Schwanzwurzelgegend; Wurzeldrittel des Schwanzes seitlich mit sehr langen mähnenartigen Haaren wie bei *H. Pharaonis*; Schwanzquaste nicht sehr lang, schwärzlich. Nasenkuppe und kahle Stelle ums Auge schwarz; Vorderfüße und Kopf olivengrau, jedes Haar mit weißlicher Spitze; Oberkörper heller grünlichgrau, jedes Haar sehr fein schwärzlich geringelt, wodurch eine Querstreifung des Rückens und der Seiten entsteht; Schwanzmitte grünlichgrau, weißlich und schwärzlich mischt; Schwanzspitze schwarz; ein Längsstreif auf der Unterseite des Schwanzes einfarbig gelbbraun, wie der ganze Bauch; Iris hellbraun; Sohlenballen schwärzlich. Ganze Körperlänge bis zur Schwanzwurzel 11". Schwanz mit Quaste 12". Ohrbreite 1". Länge der schwarzen Schwanzspitze 4". Kopf 2" 7"".

Um Keren und am Anseba, sowohl unter Gebüsch und in Regenstrombetten, als auf niedrigen Bäumen, wo er sich dicht auf die Astte zu drücken vermag. Scheint mir eine von *H. gracilis* wohl unterschiedene Art zu sein.

**N**umerung. Im centralen und östlichen Habesch habe ich noch angetroffen: *Herpestes Pharaonis* (?), *H. leucurus* und *H. sanguineus*; im Adel-Gebiet *H. adailensis*, Heugl., und in den Gala-Ländern wohl eine weitere neue Art, *H. ruficauda*, Heugl. — *Ichneumia abu Wudān*, Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 25 dürfte wohl nur als Varietät von *H. leucurus* zu betrachten sein. *H. Lefeburei* Des Murs & Prév. aus Abessinien ist mir nicht aus eigener Aufschauung bekannt. Ein bei Adowa in Tigrié erlegter *H. Pharaonis* scheint größer als egyptische Exemplare, der Körper im Fleisch misst 22", ebenso der Schwanz mit Spitze, Kopf  $4\frac{1}{2}$ ". Höhe des Ohres 1" 7"". Hand 2" 3"". Das Schwarz der Schwanzquaste ist 6" lang. Schwimmhäute ziemlich entwickelt; Iris hellbraun mit gespalterner Pupille; Nase schwärzlich, wie die Gegend vor dem Auge; Kinn schwarz; Halshaare sehr lang und dicht. Lebt von Käfern, Mäden, kleinen Vögeln und Säugethieren, geht aber auch auf Ras. Heißt in Tigrié Surdo.

Eine Mängste, gleichfalls in Adowa eingesammelt, die ich zu *Herpestes leucurus* zähle, misst: Körperlänge 19". Schwanz 20". Höhe des Ohres 2". Hand 2"  $4\frac{1}{2}$ "". Nasenkuppe und Lippen fleischfarbig, Iris braun. Der Schwanz scheint beträchtlich länger als bei nubischen Exemplaren.

Eine weitere Art, die wir im Hochlande der Wolo-Gala auf etwa 12 000 Fuß Meereshöhe erlangten, scheint dem *H. Lefeburei* nächst verwandt. Ich beschreibe dieselbe nachstehend unter der Benennung:

*Herpestes ruficauda*. Klein, schlank, Kopf sehr spitz; der Schwanz lang behaart, aber ohne Endquaste; Ohren ziemlich kurz,

breit, mit zwei deutlich ausgesprochenen Ecken, innen sehr fein behaart; in der Ohrmuschel nach vorn und oben befinden sich zwei quergestellte gerundete Lappen (Tragus); Oberkopf, Zügelgegend, nackte Nasenlippe und Außenseite der Ohren glänzend granschwärzlich; Wangen und Vorderhals schwärzlich graubraun, erstere sehr fein ockergelblich gesprengt; Körperbehaarung glänzend röthlich oder gelblich, Rückenmitte mehr ins Braune, Unterseite dagegen ins Graue spielend; mit Ausnahme des Bauches alle Haare mit schwärzlichen Ringen, wodurch eine undeutliche Queränderung des Rückens, der Körperseiten und der Schenkelgegend entsteht; Schwanz ähnlich gezeichnet, alle Haare jedoch mit sehr langen rostfarbigen Spitzen, welche die übrige Zeichnung fast gänzlich verdecken; ein kleiner Theil der Spitze und die Unterseite der Spitzhälfte des Schwanzes 6" lang glänzend schwarz; Schnurren schwärzlich; Iris röthlichbraun. Körperlänge 11½". Schwanz mit Behaarung 14" 3"". Ohrhöhe fast 6"". Ohrbreite 1" 2"". Kopflänge 2" 4"".

Lebt in Felsklüften, ist sehr munter und zänkisch, und nimmt häufig eine höchst originelle Stellung an; der Körper wird nämlich zusammengezogen und vorn etwas in die Höhe gerichtet, während der vollkommen gerade Schwanz in einem Winkel von etwa 45 Grad aufgerichtet ist, so daß das Thier mich öfter an hüpfende Elstern erinnerte.

Den Abu Wusieh (*Herpestes sanguineus*, Rüpp.) fand ich nur sehr einzeln im östlichen Kordofan.

Die Körperlänge eines Exemplares dieser reizenden Mäuse beträgt 9". Kopf 2" 1½"". Schwanz mit Pincel 9½". Nase und Augenring sind fleischfarbig, die Oberlippe röthlich isabell angeflogen; Iris ockergelb; Sohlenballen fleischfarbig; Schnurren in drei Reihen geordnet, kurz, bräunlich-schwarz; Ohrmuschel mittelgroß, fast länglich vieredig, die Öffnung ganz durch Haarbüschel verschlossen; Oberseite ockergelblich, Unterseite weißlich; die Haare der Oberseite mit zarten, schwärzlichen Ringen, die

derart vertheilt sind, daß der ganze Oberkörper sein gestreift erscheint; Oberkopf und Wangen mehr ins Graubraune; Ohr auf der Hinterseite olivengelblich mit deutlichem schwärzlichen Fleck an der oberen Ecke; Schwanzspitze einfarbig röthlich isabell ins Rosstahle; Pfoten obenher hell graulich isabell; die kurzen Nägel schwärzlich mit weissem Punkt auf der Spitze. Der Gaumen und die Zunge mit rückwärtsstehenden Papillen besetzt; letztere groß, weich, fleischig; im Gaumen ungefähr 10 Querspalten. Die Leber scheint sechslappig; Gallenblase groß, dunkelbläulich; Lungen auffallend hell fleischfarbig, fast weißlich, jederseits vierlappig. Im Magen fand ich nur Heuschrecken. Lebt in den Niederungen um Regenstrombetten und geht gern auf Bäume.

Wüppell (N. Wirbelth. p. 28) giebt bedeutend größere Maße, wahrscheinlich sind letztere nicht dem Thier im Fleisch entnommen, sondern dem Balg.

### Fam. Hunde (Canina).

In unserem Beobachtungsgebiet finden sich hauptsächlich zwei Rassen von Haushunden, nämlich eine schlanke Varietät des egyptischen und ein Windhund. Letzterer wird von den Beduinen häufig zur Jagd auf Gazellen, Büffel &c. &c. abgerichtet. Er ist von unterseitzer Statur mit etwas gedrungenem Kopf und Körper und ausgezeichnet durch starke Läuse und dicke Pfoten. Seine Farbe wechselt zwischen salb, graugelb und weißlich. Die afrikanischen Haushunde im Allgemeinen sind weniger an den Menschen attachirt als ihre europäischen Verwandten, man sorgt, so zu sagen, nicht für ihren Unterhalt, daher halten sie sich in den meisten Fällen mehr an ihre Gehöfte als an den Herrn selbst. Sie dienen übrigens jeder Niederlassung als Wächter und alle Hunde-Innsassen der letzteren vereinigen sich gegen nächtliche Einfälle von Hyänen und anderen Raubthieren.

Der Hund heißt bei den Arabern Kelb, in Amchara Wuša, bei den Galas Serjé, bei den Barabra Welqi, im Bedjah-Land Jaz, im Alt-Aethiopischen Kalebe, in Tigrié Kelbi.

Was die wilden Hunde Nordost-Afrika's anbelangt, so bin ich weit entfernt, ein endgültiges Urtheil über die Arthelbständigkeit der verschiedenen Formen fällen zu wollen. Hierzu mangelt es mir namentlich am nöthigen osteologischen Material. Bei Thieren, welche an und für sich schon viele individuelle Unterschiede zeigen, die nach Alter, Jahreszeit, Geschlecht, Nahrung und Wohnbezirk ungemein variiren und die sich wohl nicht selten mit verwandten Formen mischen, unterliegt eine scharfe Charakterisirung der einzelnen Arten oder Rassen großen Schwierigkeiten.

Ich folge hier im Allgemeinen der Ansicht von A. Wagner, der namentlich bei Fuchs und Schakal verschiedene geographische Formen annimmt.

#### 25. Der Dib, *Canis variegatus* (Cretschn.).

Rüpp. Atl. p. 31. t. 10. — Blanf. Abyss. p. 238. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 13. — *C. Anthus*, Brehm, Habesch, p. 60. — *C. lupaster*, Ehr. Symb. phys. II. p. ff. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 393.

Arab. Dib und Abu Schöm.

Allgemein und zuweilen in größeren Familien im Küstenland und den benachbarten Bergen.

#### 26. Der bunte Schakal, *Canis mesomelas* (Schreb.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 396. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 14. — Brehm, Habesch, p. 60. — Blanf. Abyss. p. 237. — Rüpp. Wirbelth. p. 39.

Arab. Abu el h'oseïn, auch T'aleb und 9'aleb. Tigr. Quontsal, Qaberu, auch Boh'aria.

Nicht selten im Gebiet des Anseba und in den benachbarten Gebirgsländern.

Ich gebe nachstehend noch die Messung eines alten ♂ dieser schön gezeichneten Art, das wir im Anseba-Thal erlegten. Körperlänge im Fleisch 25''. Schwanz mit Pimzel 13''. Kopf 6''. Höhe des Ohres 4''. Die Iris ist gelbbräunlich.

Ich habe den bunten Schakal auch in den Gebirgen bei Asuan angetroffen. — Stimmt ganz mit südafrikanischen Exemplaren überein.

#### 27. Der Küsten-Fuchs, *Canis vulpes niloticus* (Geoffr.).

*C. niloticus*, Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 412. — *C. vulpecula et C. Anubis*, Hempr. & Ehr. Symb. phys. II. p. ff. — ? *C. riparius*, H. & Ehr. l. cit.

Wir haben an den Küsten und auf einigen Inseln des Nothen Meeres im Gebüsch von Avicennia öfter Füchse angetroffen, welche nach meiner Ansicht zur afrikanischen Rasse des gemeinen Fuchses gehören.

Blanford (Abyss. p. 240) erwähnt eines kleinen Schakal mit hohen Läufen, länglichen Ohren und von heller Sandfarbe, vielleicht *C. pallidus* Rüpp.?

#### 28. Der fahle Fuchs, *Canis famelicus* (Cretschn.).

Rüpp. Atl. p. 15. t. 5. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 419. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 16. — Brehm, Habesch, p. 60. — *C. corsac*, Gieb. Säugeth. p. 830. (part.) — *C. dorsalis*, Gray.

Arab. Sabera (d. i. der Höhlengräber).

Nicht selten im Sahel und den benachbarten Vorbergen längs der afrikanischen Küste des Nothen Meeres zwischen Nofsiat und dem Golf von Adulis; lebt paarweise und in Familien, gräbt weitläufige Höhlen im Sande, hält sich aber auch in Klüften mit Trümmergestein auf.

Durch glänzend rostbraunen Rückenstreif, lange, etwas spitze, dicht behaarte Ohren, schmalen, sehr verlängerten Schädel und kleines Auge ausgezeichnete Art.

Ich gebe hier noch das Maß eines alten Männchens:

Körperlänge 21" 1". Schwanz mit Haaren 14". Kopf 5" 1". Ohrhöhe 3" 8". Schwanzspitze weiß.

An specifische Vereinigung von *C. famelicus* mit *C. corsac*, wie sie Giebel vornimmt, ist gar nicht zu denken. Ersterer hat viel längere Ohren und ist beträchtlich kleiner als *C. corsac*, auch der Schädel zeigt erhebliche Abweichungen, vorzüglich die Gestalt des Scheitelbeines.

**A**u<sup>m</sup>erku<sup>r</sup>ung. Für eine selbständige Form halte ich *Canis semiensis*, Heugl (*C. simensis*, Rüpp. — *C. Walgié*, Heugl.), der in den Hochgebirgen Abessiniens, so in Semien, Wogara und Begemeder, südwärts bis in das Gebiet der Wolo-Gala paar- und familienweise gefunden wird. Er heißt in Amchara Walgié, bei den Galas aber Serendida. Eine ausführliche Beschreibung desselben gab ich in den Verhandlungen der Leop. Carol. Akad. der Wissensch. XXX. p. 3.

Sein Vorkommen im nördlichsten Abessinien bezweifle ich.

#### 29. Der Hyänenhund, *Lycaon pictus* (Tem.).

*Canis pictus*, Cretschn. Rüpp. Atl. t. 12. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 17. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 17. — Blanf. Abyss. p. 236 (not.). — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 139.

Amch. Takuila. Bedj. Manob. Arab. Sem'a und Semā.

In Familien und größeren Rudeln stellenweise recht häufig zwischen Aqiq und Mensa, übrigens auch in den Steppen von Takah bis nach dem südlichen Rubien hinüber.<sup>1)</sup>

Unfern des Berges Deqderā, kaum eine Meile vom Meerestrand entfernt, beobachtete ich im Januar 1875 ein altes Weibchen mit einem stark halbwachsenen Fungen; beide näherten sich im Gestrüpp und zwischen sparrigen Grashüschen am hellen Mittag schnüffelnd unserem Lagerplatz bis auf eine Entfernung von 50 Schritten.

Die Hyänenhunde führen ein herumschweifendes Leben und ziehen gern den wandernden Viehpärken nach. Sie jagen zuweilen gesellschaftlich, sowohl bei Tag als während der Nacht, und richten nicht selten unter den Schafen und Ziegen, die zur Weide gehen, großen Schaden an. Doch verschmähen diese Thiere keineswegs auch Alas und sind im Stande, die stärksten Knochen zu zermalmten. Nur der Hunger macht sie übrigens kühn, aber sie sind stets von heimtückischem Wesen, im höchsten Grade schmutzig und mit sehr widerlichem Geruch behaftet, wie auch der Urin, dessen der Hyänenhund sich sehr häufig entledigt, einen fuchsartigen Gestank verbreitet.

Ihr Geschrei besteht in einem hohen ätzenden Heulen, Bellen und Gilfen, dabei schauuben sie in eigenthümlicher Weise, schnüffeln viel und beißen und rauschen unter sich bei jeder Gelegenheit. Beim Beschleichen anderer Thiere windet der Hyänenhund ganz wie der Fuchs und der Jagdhund, werden erstere aber flüchtig, so verfolgt er sie mit unglaublicher Ausdauer und Gewandtheit.

Nach Aussage der Habab theilen sich die Rudel, welche zuweilen gegen hundert Stück zählen sollen, in verschiedene Partien, deren eine das Wild heißt, während sich die andere in der Nähe der Wechsel in Hinterhalt legt. Auch erzählte man mir,

daz sowohl einzelne dieser Thiere, als ganze Gesellschaften, tagelang Heerden oder Karawanen folgen, um eine günstige Gelegenheit abzuwarten, über ein Maulthier oder einen Dachsen herzufallen.

### Fam. Hyänen (Hyaenina).

#### 30. Die gestreifte Hyäne, *Hyaena striata* (Zimmerm.).

Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 447. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 18. — Blanf. Abyss. p. 236 (not.).

Arab. Dab'a. Verb. Atigi.

Geht im Küstenland des Rothen Meeres und längs des Nil südwärts bis zum 15. Grad nördl. Br. Nicht im Gebirge. Hält sich den Tag über in Klüften verborgen.

#### 31. Die gefleckte Hyäne, *Hyaena crocuta* (Zimmerm.).

Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 451. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 19. — Blanf. Abyss. p. 235. — Brehm, Habesch, p. 60.

Arab. Mar'afil. Geez Zeēb. Tigr. Zebi und Kerai. Besen Wag'a. Gala Worabeza. Denk. Jengula. Som. Worrābeh. Bedj. Keraio. Verb. Dibki. Sudan-Arab. Ab G'imah.

Eines der häufigsten Raubthiere im Gebiet der Habab, am Anseba, Barkah und in Abessinien, wo die gefleckte Hyäne noch auf einer Meereshöhe von 12000 Fuß vorkommt. Den Tag über hält sie sich im dichten Gebüsch und in Klüften verborgen und schweift Abends gern um Gehöfte, Städte und Lagerplätze, hin und wieder ihr teuflisches Geheul ausstoßend und dadurch Hausthiere und Hunde beunruhigend. Fehlt es nicht an Fleisch, so hält sich die gefleckte Hyäne an solches, der Hunger treibt sie

aber auch zum Angriff auf Pferde, Maulthiere und Schafe; ja sie dringt mit unglaublicher Frechheit in Umzäunungen, Zelte und Wohnungen ein und raubt hier Fleischvorräthe, frische und gegerbte Häute, Ledersäcke, wie man sagt sogar Butter und Milch. Mir sind einige Fälle bekannt, die beweisen, daß sie selbst Menschen anfallen.

Anmerkung. Im abessinischen Küstenland und in der Gegend von Adowa sollen sich noch zwei weitere hierher gehörige Arten finden, eine kleine, gestreifte (ob *Proteles Lalandei*?) und eine sehr große, dicht und lang behaarte (*Hyaena fusca*?). *Proteles Lalandei* findet sich auch am Weißen Nil.

### Fam. Käzzen (Felina).

#### 32. Der Löwe, *Felis Leo* (Linn.).

Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 460. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 26. — Brehm, Habesch, p. 58. — Blanf. Abyss. p. 230.

Arab. Asad, Sabu'a und Lebuah. Schōho Labak. Gala Alati und Lendša. Bes. Gamana. Amch. und Geez Anbasa. Tigr. Of, Aiet und Hajet. Bedj. Haldāb und Hadāb. Danač. Löbak. Som. Liba oder Liwa.

Die Verbreitung des Löwen erstreckt sich nordwärts bis in die Berge der Beni Amer. Im Tsalat, Barkah und am unteren Anseba soll er sehr häufig vorkommen; zahlreich fand ich ihn vor 10 bis 15 Jahren noch am Ost-Abhang der abessinischen Gebirge und im Lebka, einzelner im Bogos-Gebiet.

Im eigentlichen Hochland scheint er zu fehlen.

Der Löwe von Ost-Sudan trägt nach meinen vielen Erfahrungen nur eine sehr wenig stattliche und stets falber gefärbte Mähne, während der Löwe von Habesch, namentlich im Winter,

eine sehr entwickelte, dunkle, wallende Mähne um Kopf, Schultern und Unterleib erhält. Die Form des Tieflands erscheint überdies stets etwas schwächer und falber gefärbt, als der Gebirgslöwe, doch richtet sich die Färbung und Entwicklung der Haare nach Jahreszeit, Alter und Localität, denn alte, mähnenlose Männerchen, welche ich nach Europa brachte, legten hier im Winter ebenfalls ein Prachtkleid an. In Abessinien soll sich eine schwarze Varietät finden, die mir jedoch niemals zu Gesicht kam.

Lebt meist paarweise und den Tag über im dichtesten Gebüsch verborgen, wo er seine permanenten Lager aufschlägt, aber während der Nacht weit im Land umher schleift.

### 33. Der Leopard, *Felis pardus* (Linn.).

Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 479. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 21. — Brehm, Habesch, p. 59.

Arab. Nimer. Amh. und Geez Newer. Tigr. Neweri und Homhom. Bel. Dšilba. Gala Kerensa. Som. Šebel. Denk. Kabai. Bedj. Eh'ām und Šeh'edo. Die schwarze Varietät heißt in Abessinien Gesela (Eduard schreibt Geſala).

Einzelne im Barakah, nicht selten in den Gebirgen um den Falkat und Anseba, sowie in Mensa, wo der Leopard oft förmlich zur Landplage wird und hin und wieder selbst Menschen anfällt. Der Abessinier fürchtet den Leoparden weit mehr als den Löwen. Diese Thiere leben meist vereinzelt, führen den Tag über eine weniger verborgene Lebensweise als ihre Verwandten und rauben auch nicht ausschließlich zur Nachtzeit. Der Gebirgsleopard sonnt sich nach kalten Nächten ganz gemüthlich auf Felsgesimsen. Unter nimmt er jedoch Streifereien während des lichten Tages, so geschieht dies meist im dichten Buschwerk und in Klüften, wo er namentlich dem Klippdachs auslauert. Werden Raben, Nashornvögel, Honigfukule und Rallen seiner ansichtig,

so verfolgen sie lärmend und auf ihn stoßend seine Spur. Abends findet sich derselbe zuweilen schon rechtzeitig bei Brunnengruben ein, um Beute an Antilopen zu machen. Namentlich in dunklen Nächten brechen die Leoparden häufig in Verhause und Dornhecken ein, ja, ich habe sie mehrmals auf Dächern und Mauern gesehen. Während unserer Unwesenheit im Bogosz-Gebiet setzte eine dieser Bestien über einen Dornzaun und grub sich einen Weg theils unter der Erde weg bis zu einem Ziegenstall; mehrere fingen wir in großen Schlagfallen, in welche eine Ziege als Köder gesetzt wurde, noch andere wurden auf dem Anstand geschossen.

In Abessinien findet man hin und wieder auch eine schwarze Varietät des Leopard, die dort Gesela genannt wird. Das glänzende Fell ist braunschwarzlich, und in gewisssem Licht erscheint darauf die dem Leopard eigenthümliche Fleckenzeichnung. Ein Gesela-Balg ist bei den abessinischen Kriegern hoch geschäzt. Sie versetzen daran eine Art von Pelzkragen (auch Lembd), der bei feierlichen Gelegenheiten und im Felde um die Schultern getragen wird.

#### 34. Der Gepard, *Felis (Cynailurus) guttata* (Herm.).

Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 501. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 22. — Brchm, Habesch, p. 59.

Arab. Fahad und Fah'ad. Amq. Newer Golgol und Newer arär. Som. Hermād.

Nicht selten, aber stets vereinzelt am Ost-Abhang der abessinischen Gebirge, in Mensa, im Gebiet des Anseba und im südl. Takah. Scheint nicht hoch in das Gebirge aufzusteigen. Der Gepard gehört zu den harmlosesten Katzen, die einen hohen Grad von Zähmung und Liebenswürdigkeit annehmen und sich sogar bald mit Hunden und Pferden befrennen. Ein von uns in einer Falle gefangenes altes Männchen hatte sich schon nach

wenigen Wochen derart an sein Schicksal gewöhnt, daß es Nahrung aus der Hand annahm und ich dasselbe mit mehreren anderen gezähmten Wildkatzen meist frei im Haus und Hof umherwandeln lassen konnte. Oft lag es bei den Pferden in der Raufe, mit Vorliebe aber in meinen Zimmern auf Divan und Betten. Während der Frühstunden aber beging es Hof- und Gartenmauer, äugte in niedergedrückter Stellung alle Vorübergehenden, Menschen, Esel und Hunde und erwartete den um jene Zeit sich mit Futter einstellenden Fleischer. War ich krank, so verließ der Gepard nur gezwungen mein Lager und leckte mir unter beständigem Spinnen Gesicht und Hände.

Der Gepard jagt auch gern bei Tag und unter Umständen mit erstaunlicher Frechheit. Auf Hochbäumen habe ich ihn niemals angetroffen, aber einmal auf einem etwa mannshohen überhängenden Stamm in einem Regenstrombett. Dort hatte sich das Thier platt niedergedrückt und würde ich dasselbe ohne den mich begleitenden Hund wohl gar nicht bemerkt haben.

Brehm irrt sich, wenn er sagt, Rüppell führe den Gepard nicht als nordost-afrikanisches Säugethier auf. Letzterannter Forscher begeht (N. Wirbelth. p. 40) nur den Fehler, daß er *Felis chalybaeata*, Herm., statt *F. guttata* schreibt.

Vom Baher el abiad erhielt ich das Fell einer offenbar zu *Cynailurus* gehörigen Katze, das jedoch sehr wesentlich von *C. guttatus* abweicht. Dieses Fell kommt (ob vielleicht durch künstliche Streckung?) in Größe mindestens dem eines ausgewachsenen Leoparden gleich, das Thier scheint viel kürzere und kräftigere Füße zu haben, ebenso kürzeren Schwanz und derselbe weicht auch in der Färbung und Behaarung von allen mir bekannten Geparden ab. Eine Rückenmähne ist nicht vorhanden; der ganze Balg obenher viel lebhafter und dunkler rostig zimtblau mit weit größeren, deutlicheren schwarzen Flecken; die ungespeckten Sohlen rostfarbig. Die Länge des Felles von der

Schnauze bis zur Schwanzwurzel beträgt 4', die des (vielleicht etwas verstümmelten) Schwanzes nur 1' 6 $\frac{1}{2}$ ". Ich habe das Thier vorläufig *Felis (Cynailurus) megabalia* genannt.

Fitzinger (Heugl. u. Fitz. Säugeth. p. 21. — Fitz. Sitzungs-Ber. der k. k. Akad. d. Wiss. Wien. XVII. Heft VII. p. 245) beschreibt noch eine F. (*Cynailurus*) Soemmeringii nach einem von mir lebend nach Wien gebrachten Exemplar. Doch scheinen mir die Unterschiede zwischen F. guttata und F. Soemmeringii nicht zu spezifischer Sonderung beider Formen ausreichend.

### 35. Der Serval, *Felis (Galeopardus, Heugl.) Serval* (Schreb.).

Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 505. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 21.

Arab. Badj. Amq. Newer golgol.

Kommt nach Werne in Tafah vor. Auch sah ich ihn in Thiersammlungen aus dem Hornan und erlangte ihn öfter vom Weissen Nil, nordwärts bis zum Djebel Dinka. Scheint auch im gemäßigten Abessinien vorzukommen.

Anmerkung. In Abessinien sah ich mehrmals Felle einer Luchsart, welche in Größe, dichter Behaarung, Färbung und Fleckung vollkommen mit unserer F. *Lynx* übereinstimmen. Einen Schädel dieses Thieres sandte ich seiner Zeit an Professor Dr. Hyrtl in Wien ein, das Ergebniß der Vergleichung desselben mit dem Schädel des gemeinen Luchses ist mir indeß nicht bekannt geworden. Das in Rede stehende Thier heißt *Tsoz Anbasa*, d. i. des Löwen Sohn, auch *Derq Anbasa*.

### 36. Der schwarzohrige Luchs, *Felis (Lynx) caracal* (Güldenst.).

Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 526. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 21. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 23.

Arab. Om riṣād. Am̄. 'Afen und T̄soz Anbasa. — Bel. 'Anak.

In Ṭakah, im Bogos-Gebiet und den benachbarten Gebirgen einzeln vorkommend.

### 37. Der gestiefelte Luchs, *Felis (Lynx) caligata* (Tem.).

Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 530. — Bruce, Trav. Abyss. V. p. 146. c. tab. — Blanf. Abyss. p. 228. — *Felis caffra*, Desm. — *F. lybicus*, Oliv. Voy. Egypte t. 41.

Tigr. Okul Dumo. Am̄. Hachla Demat und Ja-dur Demat.

Wir sammelten im Bogos-Gebiet und in der Nähe von Gafat in Begemeder eine Wildkatze ein, welche ich nur auf *Felis caligata* beziehen kann.

Die Iris ist gelb; Pupille gerundet; der schwarze Pinsel am oberen Ohrrand nur sehr kurz; im Schwanz zählte ich 21 Wirbel. Körper bis zur Schwanzspitze 35". Schwanz besonders gemessen 14 $\frac{1}{2}$ ". Kopf 4 $\frac{1}{2}$ ". Ohrlänge 2" 8"". Schulterhöhe 13" 9"". Vom äußeren Augenwinkel bis zur Nasenspitze 1" 4"".

### 38. Die kleinpfötige Katze, *Felis maniculata* (Rüpp.).

Rüpp. Atl. t. 1. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 22. — Schreb. Säugeth. Suppl. II. p. 237.

Arab. Qot el zala.

Einzelne in Ṭakah und den Gebirgen der Beni Amer. Auf dem Ohr nur eine Spur von schwarzem Haarbüschen; Iris grünlichgelb; Pupille rund. Im inneren Augenwinkel findet sich eine Nippföhre, die nach außen und oben beweglich ist.

Länge bis zur Schwanzwurzel 17 $\frac{1}{2}$ ". Schwanz 9" 9"". Ohrhöhe 2". Schulterhöhe 10 $\frac{1}{2}$ ".

Anmerkung. Jeder Abessinier weiß von einem höchst gefährlichen Raubthier zu erzählen, das in Amchara Wobo, in Tigrié Mendelit genannt wird. Es soll größer sein als der Leopard, ja selbst als der Löwe. Die Färbung wird nicht übereinstimmend beschrieben, aber nach den meisten Berichten ist das Thier gelblichbraun oder braungraulich mit schwarzen Längsstreifen.

Ein ähnliches Raubthier dürfte auf den Felsgebirgen in der Nähe des Dender und Rahadflusses vorkommen. Daselbe heißt dort Abu Sotān. Die Araber schreiben demselben einen auffallend langen Hals und helle Behaarung mit großen schwarzen Flecken oder Längsstreifen zu. Vielleicht gehört der Wobo und der Abu Sotān zu einer und derselben Art. An der Existenz dieses Raubthieres ist kaum zu zweifeln. In Abessinien zeigt sich der Wobo angeblich nur im heißenen Tiefland und wird selten erlegt. Ein Fell dieser Katzenart wurde lange Zeit in der Hauptkirche von Eifag aufbewahrt, und versicherten mich verschiedene Personen, namentlich auch König Theodoros, dasselbe noch dort gesehen zu haben.

### Ord. Nager (Rodentia).

#### Fam. Eichhörnchen (Sciurina).

39. Das vielfarbige Eichhorn, *Sciurus multieolor* (Rüpp.).

Rüpp. N. W. p. 38. t. 13. — Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 115. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 24. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 31. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 210. — *Sciurus annulatus*, Desm. Mammal. p. 338 (?). — Brehm, Habesch, p. 62. — Blanf. Abyss. p. 278.

Heißt im Samhar Sakie (Rüpp.).

Nicht selten in den Vorbergen um Masaua, sowie im Ge-

biet des Anseba; ohne Zweifel auch im Barkah bis zum Albarah westwärts. Lebt ausschließlich auf Gebüsch und Hochbäumen und hat die Fähigkeit, sich bei herannahender Gefahr derart platt auf horizontale Aste anzudrücken, daß das Thier nur für ein sehr geübtes Auge bemerkbar wird.

40. Das kurzohrige Eichhorn, *Sciurus rutilus* (Cretschm.).

Cretschm. Rüpp. Atl. p. 59. t. 24. — *Xerus brachyotus*, Hempr. & Ehr. Symb. phys. t. 9. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 32. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 26. — Brehm, Habesch, p. 63. — Blanf. Abyss. p. 278.

Arab. Saberah. — In der Gegend von Maṣāna Šilu (Rüpp.).

Von uns nur sehr einzeln in buschigen Thälern und Regenstrombetten im abessinischen Küstenland beobachtet. Nach Brehm häufig im benachbarten Gebirge, wo ich nur *Sc. multicolor* und *Sc. leuco-umbrinus* begegnet bin.

41. Das weißstreifige Erd-Eichhorn, *Sciurus leuco-umbrinus* (Rüpp.).

Rüpp. Atl. p. 60. — Rüpp. N. W. p. 37. — Rüpp. Mus. Senk. III. p. 115. — *Sc. setosus*, Wagn. Schreb. Säugeth. IV. t. 218. A. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 31. — Wagn. Schreb. Suppl. III. p. 213. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 25. — Blanf. Abyss. p. 279.

Arab. Saberah. Bei Maṣāna Šilu (Rüpp.). Amch. Dšedšera.

Paar- und familienweise im Gebüsch, in Erdlöchern des Flachlandes und in alten Gräberu; sowohl im Samhar als im Gebiet des Anseba und Naqfa allgemein. Treibt sich nur auf der Erde herum, und verbirgt sich gewandt und flüchtig in Höhlen

und unter Steinen. Beim Spielen und im Affekt werden die Schwanzhaare aufgestellt und der Schweif selbst hochgetragen.

**Ummerkung.** Sciurus abyssinicus, Des Murs et Prév. Lefeb. Abyss. Zool. Mammif. p. 23, kenne ich nicht. Sc. gambianus, Ogilby, kommt nach Rüppell in Schoa vor. Eine weitere Art, Sc. Dabagala, fand ich an der Somalküste, Speke eine vierte, Sc. ornatus, Gray, im östlicheren Central-Afrika. Wagner beschreibt einen Sc. superciliaris aus Senar und Mozambique.

Im Gebiet des Gazellenflusses traf ich häufig ein Baum-eichhorn mit rundem, buschigem, nicht zweizeiligem Schweif, ähnlich dem Sc. rutilus, aber von kleineren Dimensionen, etwas abweichender Färbung und kürzeren Ohren. Ich nenne die Art, falls sie noch unbekannt sein sollte,

**Sciurus bongensis.** Behaarung etwas ranh, die des Schwanzes nicht auffallend lang und nicht dicht; Ohr sehr kurz, breit-oval, etwas wulstig, am oberen Rand umgeschlagen, fast 6<sup>mm</sup> breit und 5<sup>mm</sup> hoch, an den Seiten stark behaart; die kurzen, starken, scharfgekrümmten Nägel, namentlich auf ihrer Ansen Seite, mit langen, büxtenartigen Kammlhaaren; die breiten Schneidezähne bräunlichgelb; 5 bis 6 Reihen weicher, fast bis zum Ohr reichender Schnurren. Oberseite ziemlich lebhaft pfirsichröthlich ins Ockerfarbene; alle Haare mit breiten weißen Spitzen und 1 oder 2 schwarzbraunlichen Ringen; Flanken, Ansen Seite der Füze und Ohrengegend bläß granbräunlich, weiß meliert; ein großer Ring um das Auge, Unterseite und Lippen weiß; Schwanz cylindrisch, sehr licht ockerfarbig, nach der Spitze zu heller, nach der Basis mehr roströthlich, alle Haare mit schwärzlichen Ringen und namentlich nach dem äußereren Ende zu breit weißgespietzt, so daß hier zahlreiche, regelmäßige Ringe von derselben Farbe entstehen. Länge des Körpers 6<sup>1/2</sup> 7<sup>1/2</sup>. Schwanz mit Behaarung kaum kürzer. Lanf bis zur Spitze der Nägel 1<sup>1/2</sup> 6<sup>1/2</sup>.

Lebt beständig auf Bäumen und nährt sich von Früch-

ten, grünen Knospen und Rinde, nimmt aber gelegentlich auch Büschelmaiskörner.

In der Nähe der Sciurinen, wohl aber einer besonderen Familie zuzutheilen, steht

#### 42. Das Schopfhörnchen, *Lophiomys Imhousii* (Milne Edwards).

Heugl. Reise in das Gebiet des Weissen Nil, p. 281.

Dr. Schweinfurth fand einen Schädel dieses eigenthümlichen Nagers in einem Grabe bei Mamam. Ein lebendes Exemplar von unbekannter Herkunft gelangte über Aden nach Europa. Der Marchese Antinori schreibt mir, daß es ihm gelungen sei, diese Art während seiner Reise in das Bogos-Gebiet und das Barkah einzusammeln.

Ueber die Lebensweise kann ich nichts berichten, doch scheint das Schopfhörnchen ähnlich dem *Sciurus leuco-umbrinus* Erdhöhlen zu bewohnen.

Anmerkung. Aus der Familie der Schläfer oder Bilche (*Myoxina*) scheint kein Glied in unserem Beobachtungsgebiet vorzukommen. *Elliomys melanurus* (Wagn.) wurde am Sinai beobachtet; *Graphiurus murinus*, Des Murs & Prév. in Abyssinien; die jetztgenannte Form soll mit *G. erythrobranchus*, Smith, und *Myoxus cinerasceus*, Rüpp., zusammenfallen. Wagner beschreibt endlich (in Wieg. Arch. 1848. p. 182) einen *Elliomys orobinus*, Wagn., aus Senar.

#### Fam. Särotmäuse (Psammoryctina).

##### 43. Das Steinhörnchen, *Pectinator Spekei* (Blyth.).

Blyth. Journ. As. Soc. Bengal. 1855. XXIV. p. 294.  
— Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. 1861. XXVIII. t. 2.

f. 1. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 33. u. p. 17. — Blanf. Abyss. p. 281. — *Genus Petrobates*, Heugl. (M. S).

Ich kannte dieses niedliche Thierchen bisher nur aus dem nordwestlichen Somal-Gebiet und der Gegend von Tedjurah. Neuerdings wurde es von Blanford und Jesse auch unfern der Bucht von Adulis aufgefunden.

Das Steinhörnchen lebt in Geröll und an Felsgehängen, die mit Gebüsch bestanden sind. Ueber die heiße Tageszeit ruhen sie in ihren Schlupflöchern, Abends, namentlich aber in der Frühe und Vormittags sah ich sie entweder auf Gestrüpp herumlaufen, ähnlich wie Haselmäuse, oder auf Steinblöcken, auf die sie sich, wenn sie erschreckt werden, ganz platt anzudrücken verstehen. Der buntgezeichnete, sehr buschige Schweif wird beim Laufen meist horizontal getragen; während des Sitzens auf den Hinterbeinen, beim Reinigen des Pelzes und beim Fressen, ja selbst zuweilen in liegender Stellung schlägt das Thierchen die Nuthe dagegen ganz auf den Rücken.

Die Nahrung besteht in Knospen, Blättern und Rinde, wahrscheinlich auch in Früchten. Im September und October wirft das Weibchen zwei oder drei Junge.

#### Fam. Wurfmäuse (Cunicularia).

##### 44. Der Fülfel, Rhizomys splendens (Rüpp.).

*Bathyergus splendens*, Rüpp. N. W. p. 36. t. 12. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 368. — Blanf. Abyss. p. 279. — Brehm, Habesch, p. 63. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 32. — Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 97.

Nach Brehm in Mensa.

Ich habe den Fülfel in großer Anzahl im centralen Abyssinien, namentlich um Semien und Wogara, bei Gondar und

unfern Debra Tabor gefunden. Blanford beobachtete ihn in der Nähe des Ashangi-Sees. In ganz Tigrié ist er mir niemals vorgekommen, und da Brehm das Thier, welches er als Rh. splendens aufführt, nicht eingesammelt hat, sondern nur flüchtig unter Büschchen umherlaufen sah, mag seine Angabe wohl auf einem Irrthum beruhen.

Der Fülfel lebt in selbstgegrabenen Gängen in der Dammerde von Viehtriften, natürliche unter Nasen. Diese Gänge sind sehr lang, oft unregelmäßig gewunden, jedoch nicht tief unter der Erdoberfläche. Schon von Weitem erkennt man die betreffenden Stellen an Reihen von Erdauwürfen, die denen des Maulwurfs gleichen. In den Höhlen findet man hier und da keffelartige Erweiterungen. Niemals verlassen diese Thiere ihre Bane freiwillig. Sie sehen offenbar nur sehr schwach. Das kleine, halb durchsichtige, rosenrothe Auge leuchtet wie ein blaffer, halbfugelförmig geschlissener Rubin. Brachte ich einige dieser Thiere in einen geschlossenen Raum, so fielen sie sich sofort unter Knurren und wüthendem Beißen an.

Sehr eigenthümlich ist die Art, wie die kräftigen, meißelförmigen Schneidezähne die Oberlippe hoch über der kleinen Mundöffnung durchsetzen. Die Nase ist sehr unsehlös und beweglich und können die Nasenlöcher durch Herabdrücken der breiten vorstehenden Nasentuppe gänzlich geschlossen werden. Nase und Lippen sind bräunlich fleischfarbig. Das Ohr ist nackt, nur am Rand mit wenigen feinen, langen, schwärzlichen Haaren eingefaßt, ebenfalls beweglich und verschließbar. Die Zunge sehr weich, fleischig, ziemlich lang und dick.

Die vier Zehen des Vorderfußes ungefähr gleich lang, die kleinste aber weit zurückstehend; Daumenrudiment klein, aber mit kräftigem Nagel versehen. Der Schwanz mäßig dick, ungefähr um  $\frac{2}{3}$  kürzer als der Rumpf (ohne Kopf).

Das Weibchen hat drei Zitzenpaare, deren vorderes Paar

sehr weit vorgerückt ist; die zwei hinteren Paare stehen weit nach rückwärts und nahe beisammen.

Scheint nur ein Junges zu werfen, und zwar fällt die Setzzeit in den December bis März.

Die Leber ist nach meinen Notizen links zweitlappig, der rechte Lungenflügel viertheilig, der linke ungetheilt; die Lunge viel kleiner als die Leber und weit nach oben gedrängt; die Nieren dreieckig, mit etwas eingedrückten Seitenflächen; die Gallenblase transparent, pistaziengrün, etwa 4<sup>1/2</sup> lang. Der einfach eingeschnürte Magen erscheint etwas breitgedrückt, sehr dehnbar und weich, mit dünnen Wänden, innen ohne Falten; der Blinddarm manigfölt 6 bis 8<sup>1/2</sup> dick, 4<sup>1/2</sup> lang mit 7 oder 8 spiralförmigen Einschnürungen; der Dickdarm nach oben zu schräg gerippt.

Der Fülfel nährt sich von Wurzeln und Gräsern.

Ein von mir im Fleisch gemessenes Weibchen hatte folgende Dimensionen: Kopf 1<sup>1/2</sup> 8<sup>1/2</sup>. Körper 6<sup>1/2</sup> 4<sup>1/2</sup>. Schwanz 2<sup>1/2</sup> 3<sup>1/2</sup>. Breite des Ohres 5<sup>1/2</sup>.

Die Abbildung, welche Rüppell vom Fülfel giebt, ist sehr ungenügend und eigentlich unkennlich, sowohl was Stellung als Färbung anbelangt. Es fehlen die buschigen Barthaare, die nackten Augenlider, die Ohrform wird unrichtig wiedergegeben und ist die tiefe Hautfalte am Unterkiefer gar nicht berücksichtigt.

Es scheint, daß der abessinische wilde Hund (*Canis semienensis*) den Wurfmäusen gerne nachstellt, indem wir an Orten, wo letztere hauptsächlich wohnen, die Erde häufig aufgegraben fanden. Andere Raubthiere werden ihnen dagegen nichts anhaben können, weil der Fülfel seine unterirdischen Behausungen fast niemals verläßt.

Diese Art wird von Rüppell und Blanford der Gattung *Bathyergus* zugetheilt; auch mit *Rhizomys* stimmt sie nicht

recht überein und es dürfte gerathen sein, die afrikanische Wurzelmäuse als besondere Untergattung (*Tachyoryctes*, Wagn.) von den asiatischen Formen zu trennen.

**A n m e r k u n g.** Aus der Familie der Wurfmäuse kommen noch folgende Arten in Nordost-Afrika vor:

*Rhizomys* (*Tachyoryctes*) *macrocephalus*, Rüpp. — In Schoa.

*Heterocephalus glaber*, Rüpp. — Ebenfalls in Schoa.

*Georychus ochracco-cinereus*, Ilcogl. — Im Gebiet des Gazellenflusses.

*Georychus albifrons*, Gray, Proc. L. Z. S. 1864. p. 123. — Von Speke wohl im Gebiet des Nilquellenlandes erlangt.

*Helioscophus pallidus*, Gray, l. c. p. 124. — Eben daher. Ob *G. albifrons* mit *G. ochracco-cinereus* zusammenfalle, kann ich nicht angeben, bezweifle es jedoch. Das von mir beschriebene Thier ist glänzend silbergrau-bräunlich, mit großem, rhombischem, weißem Nackenfleck, während dem *G. albifrons* ein weißer Stirnfleck zugeschrieben wird.

#### Fam. Springmäuse (Dipoda).

Ich habe öfter Springmäuse und ihre Fährten im Tiefland unseres Beobachtungsgebietes gesehen, kann jedoch nicht angeben, welcher Art dieselben angehörten. Blanford lässt „*Dipus gerbillus*, Oliv.“ an der Küste von Adulis vorkommen, doch gehört dieses Thier nicht zu *Dipus*, sondern zu *Meriones*.

**A n m e r k u n g.** In Nordost-Afrika, auf der Sinaitischen Halbinsel und längs der Ostküste des Roten Meeres sollen sich folgende hierher gehörige Arten finden:

*Dipus* (*Haltomys*) *aegyptius*, Hasselq. (*Dipus Gerboa*, Oliv. — *D. bipes*, Licht.)

*Dipus (Haltomys) hirtipes*, Licht. (*Dipus macromystax*, H. & Ehr.)

*Dipus (Haltomys) macrotarsus*, Wagn.

*Scirtetes aulaeotis*, Wagn.

*Scirtetes tetradaetylus*, Licht. (*Dipus abissinicus*, Meier.)

Zu *Scirtetes* (Gen. *Alactaga*, Cuv.) rechne ich noch eine Art aus dem Gebiet des Gazellenflusses, welche jedoch in einiger Beziehung nicht unerhebliche Abweichungen zeigt.

Die Springmäuse heißen auf Arabisch G'erbu'a, auch Abu Nauār und Far el G'ebel.

#### Fam. Mäuse (Murina).

Die Mäuse im Allgemeinen heißen bei den Arabern Fär. Zu Amhara Ajet. In Tigrié Aintzowa, Endzowa. Wedjäh Sida.

#### 45. Die Dachratte, *Mus tectorum* (Savi).

Bonap. Fauna Ital. fasc. III. u. XVI. — *Mus alexandrinus*, Geoffr. Deser. de Pégl. t. 5. f. 1. — Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 106. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 405. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 34. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 34.

Längs den Küsten des Roten Meeres, in den meisten Hafenstädten.

#### 46. Die Wanderratte, *Mus decumanus* (Pall.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 404. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 34. — Brchm. Habeseh, p. 63.

Durch Schiffe auf Hafenplätze und Inseln des Roten Meeres verschleppt.

47. Die gelbbäuchige Ratte, *Mus flaviventris* (Licht.).

Brants, Muiz. p. 108. Nr. 32. — *Mus flaviventris*, Heugl. Fauna R. M. Nr. 39 u. p. 18. — Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. XXVIII. t. II. f. 2. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 34.

Von Ehrenberg in Arabien, von mir auf verschiedenen Inseln längs der afrikanischen Küste zwischen Massaua und Bab el Mandeb aufgefunden. Lebt im Gebüsch von Salzpflanzen und springt sehr gewandt und hoch.

48. Die weißbrüstige Ratte, *Mus leucosternum* (Rüpp.).

Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 108. t. 7. f. 2. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 427. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 38. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 34.

In Massaua in Wohnungen und Magazinen.

49. Die weißfüßige Ratte, *Mus albipes* (Rüpp.).

Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 107. t. 6. f. 2. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 35. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 37. — Brehm, Habesch, p. 33. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 426. (part.)

Hausratte in Massaua und den benachbarten Ortschaften.

50. Die dunkelhäufige Ratte, *Mus fuscirostris* (Wagn.).

*M. albipes*, Rüpp. var. minor. — Wagn. Wieg. Arch. 1845. p. 149. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 35.

Von Rüppell im Modat-Thal und in Nubien gefunden. Kommt auch in Schowa vor.

Ich gebe nachstehend aus meinen Tagebüchern noch die Be-

schreibung einiger Rattenarten unseres Beobachtungsgebietes, die vielleicht mit bereits bekannten Arten zusammenfallen, deren Originaltypen mir jedoch derzeit zu genauer Vergleichung nicht vorliegen.

51. Die Samhar-Ratte, *Mus samharensis* (Heugl.).

Kopf ziemlich lang und spitz; Daumenrudiment des Vorderfußes sehr schwach; Ohr außen fein behaart, innen nackt; die Nagelgegend der Hinterfüße mit lammartigen gebogenen Haaren bedeckt; kahle Theile der Füße hell fleischfarbig; Wollhaare grau, der übrige Pelz sehr weich, gelblich rauchbraun, am Unterleib graulich weiß, etwas ins Ockergelb; Grannenhaare des Rückens lang, schwarz mit gelblichen Spitzen; die über 1 Zoll langen Barthaare dicht und von schwärzlicher Farbe; Schwanz dunkel rauchbraun, sehr fein geringelt und fein behaart, die Haare jedoch die einzelnen Ringe an Länge weit übertreffend. Körperlänge 4" 9". Schwanz 6" 3". Ohrhöhe 9". Ohrbreite 7½". Länge des Kopfes 1½". Länge des Hinterfußes längs der Sohlen 1" 2".

Hausratte in Meknū.

52. Die Hansmaus von Kerens, *Mus Kerensis* (Heugl.).

Pelz sehr weich; Ohren mittelgroß, beiderseits fein behaart, Schwanz um 1/3 bis 1/4 kürzer als der Körper, mit kurzen und steifen Haaren, die an der Wurzel der Ringe entspringen, weißlich gefärbt sind und die Ringe wenig an Länge übertreffen. Oberseite ohne Grannenhaare, röthlichgrau, braungrau meliert; Wurzel der Haare dunkel aschfarbig; Unterseite und Lippen weißlich, die Basis der einzelnen Haare grauweißlich. Vorder- und Hinterfüße nach unten (Handgegend) rein weiß; Bart fein,

mittellang, schwärzlich mit hellen Haarspitzen; gegen die Trennung der Färbung der Oberseite und Unterseite, welche sehr scharf abgegrenzt ist, spielt erstere (die Oberseite) mehr ins Däfersalbe. Körperlänge 6". Schwanz 4" 1"". Ohrhöhe 7".

In Keren im Bogos-Lande in Wohnungen.

### 53. Die falsbfüßige Feldmaus, *Mus ochropus* (Heugl.).

Fast von der Größe der vorigen Art; Ohr kürzer und breiter, Schwanz stärker, Behaarung dichter.

Der ganze Pelz rauh- und langhaarig, etwas borstig; die Haare der Oberseite auf der Wurzel schwärzlich, die Spitzhälfte rostbräunlich, wodurch der Rücken ein melirtes Aussehen erhält; Grammenhaare ganz schwärzlich bis braunschwarz; Schurren braunschwarz mit rostig weißlichen Spitzen; Unterseite grauweiß; Außen- und Vorderseite der Hände und Vorderfüße, rostig gelblich, Lippen ebenso, aber etwas dunkler gefärbt; Schwanz oben schwärzlich, seitlich rostbräunlich, unten grauweißlich behaart. Ganze Körperlänge 5" 6"". Schwanz 4" bis 4½". Ohr 6" hoch.

Feldmaus im Bogos-Gebiet.

### 54. Die morgenländische Maus, *Mus orientalis* (Cretschm.).

Cretschm. Rüpp. Atl. p. 76. t. 30. — Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 116. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 40.

Hausmans in den Küstenstädten des Rothen Meeres.

### 55. Die gescheckte Feldmaus, *Mus (Isomys) variegatus* (Licht.).

Brants, Muiz. p. 102. Nr. 29. — Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 112. 115. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 36. — Fitz.

u. Heugl. Säugeth. p. 36. — Brehm, Habesch, p. 64. — Lichtenst. Dubl. Cat. p. 2. — *Mus discolor*, Wagn. — Descr. de l'Ég. t. 5. f. 2. (?) — *Mus niloticus*, Geoffr. (?) — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 423.

Im Samhar und den benachbarten Gebirgsabfällen.

56. Die egyptische Stachelmaus, *Acomys cahirinus* (I. Geoffr.).

*Mus cahirinus*, Desm. Mammif. p. 309. — Lichtenst. Darstell. t. 37. f. 1. — Rüpp. Atl. t. 13. f. 6. — Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 116. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 440. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 36. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 41.

Hausmaus im Nilgebiet südlich bis Chartum, aber auch in Sues und Sauakin von mir beobachtet.

57. Die weißwangige Stachelmaus, *Acomys albigena* (Heugl.).

Obenher rauhgrau, an den Seiten mehr ins Falbe spie-  
lend; Schnauzengegend satt bräunlichgrau; die scharf von der  
Farbe der Oberseite geschiedene weiße Färbung des Unterleibes  
und der Füße reicht jedersseits als  $2^{1/2}$  breites Feld in die Wangen-  
gegend herein und zeichnet sich scharf von der dunklen Behaarung  
der Lippen und Schnauze ab. Schnurren lang, zum größten  
Theil weißlich; die Ohren sind fein behaart, rauhgrau, innen  
weißlich; Schwanz dünn, von Körperlänge, seitlich etwas zusam-  
mengedrückt und weißlich, oben nach der Spitze zu mit längeren  
Haaren und dunkel graubräunlich; hinter und unter dem Auge,  
ebenso hinter und unter der Ohrbasis ein aufgelöster, blaß ocker-  
farbiger Fleck; die Rückenfarbe verläuft auf der Außenseite der  
Füße als deutlicher, aber sich nach abwärts mehr und mehr  
verschmälernder Streif; Zehen unten hell fleischfarbig; die Borsten

der Oberseite namenlich rauh, plattgedrückt, mit Längsfurchen, an der Wurzel weißlich, an der Spitze schwärzlichgrau oder ockerfarbig, dazwischen wenige weiße Wollhaare.

Länge des Körpers 3" 3". Schwanz 3" 7". Höhe des Ohres 7". Länge des Kopfes 1" 3".

Lebt im Bogos-Gebiet in Erdhöhlen der Uferböschungen.

### 58. Die aschgrane Stachelmans, *Acomys cinerascens* (Heugl.).

Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 37.

Obenher hell und unter gewissem Licht glänzend bläulich aschgrau, ebenso Außenseite der Füße; Schnauzengegend bis zur Nasenkuppe, Kehle, übrige Unterseite, Innenseite der Füße und Zehen rein weiß; beide Farben scharf von einander geschieden; Innenseite des Ohres bläulich fleischfarben, unbehaart, Außenseite mit sehr feinen grauen Härchen. Schnurren sehr lang, dunkel; Schwanz kurz, ziemlich dick, nur mit dünnem, feinem Haar spärlich besleidet, die nackten Theile desselben graulich fleischfarben. Körperlänge bis zur Schwanzwurzel 3" 3". Schwanz 2" 6". Höhe des Ohres 6".

In Ost-Senar und Dalabat um und in Wohnungen, unter dürrem Holz und in den Wurzeln von Palmbäumen.

*Anmerkung.* Eine ähnlich gefärbte, aber obenher mehr falbbraune und größere Art kommt in Nubien längs des Nils vor. Leider habe ich nur die Maße notirt und keine nähere Beschreibung. Körperlänge 4" 1". Schwanz 4" 4". Ohrhöhe 9,5". Kopflänge 1" 3". Schneidezähne wachsgelb. *Acomys nubicus*, Heugl.

Ich beschreibe nachstehend nach meinen Tagebüchern noch folgende Mäuse:

*Mus (?) rufidorsalis.* — Nasenkuppe nackt; Kopf klein, ziemlich spitz; Ohren gerundet, innen und außen behaart, außen

an der Wurzel mit langen, weißen Haaren besetzt; Schwanz wenig kürzer als der Körper, geringelt,namenlich nach der Spitze zu stark behaart; Daumen sehr wenig entwickelt, mit Nagelrudiment; Vorderpfoten kurz und dick; an der Hinterpfote ist der Daumen ungefähr so lang als die kleine Zehe, die drei Mittelzehen ungefähr gleich lang. Nagenzähne auf der Außenfläche hellgelb; die feinen, weißen Barthaare schwärzlich; mausgrau bis röthlichgrau, auf der Oberseite die Haare mit hell ockerfarbenen Spitzen, daher hier der Pelz gescheckt; Unterseite heller, die Haare mit längeren falben Spitzen, weshalb die Gesamtfärbung hier schmutzig gelblich-weißlich; Hinterrücken und dessen Seiten mit rostbraunen Haaren, welche meist heller rostig gespitzt sind; auch die Hinterfüße nach außen und hinten rostfarbig angehaucht; Schwanzhaare oben und an der Spitze schwärzlich, seitlich rost-röthlich, unten weißlich; Augenring schwärzlich, unmittelbar unter demselben ein kleiner hellerer Fleck; Ohr gerundet, 7<sup>mm</sup> hoch, ausgebreitet eben so breit. Körperlänge 5<sup>mm</sup> 6<sup>mm</sup> bis 5<sup>mm</sup> 9<sup>mm</sup>. Schwanz 3<sup>mm</sup> 9<sup>mm</sup>.

Bei einem Exemplar erscheint der Hinterrücken hoch purpurrostbraun, die Schwanzwurzel rostgelb.

Häufig in Gesellschaft von *Mus habessinicus* (*M. abyssinicus*, Rüpp.) auf grasigen Hochflächen in Semien und Wogara.

*Mus lateralis*, Heugl. — Behaarung kurz, dicht, sammetartig; Ohren und der lange Schwanz fast nackt; Pfoten sehr fein behaart. Obenher glänzend graubraun, schwärzlich und ockerfarbig gesprenkelt; untenher weißlichgrau; die beiden genannten Farben sind durch einen deutlichen hell ockerfarbigen, von den Wangen ausgehenden, längs der Körperseiten hinführenden Längsstreif von einander geschieden; Füße und Nägel weißlich; Schnurrren lang, schwärzlich, mit weißen Spitzen; Lippen und Unterseite der Zehen fleischfarbig; Ohren bräunlichgrün ins Fleischfarbige; die schwärzlichen Grannenhaare lang und zart;

die Gegend der Wangen, wo die Schurren entspringen, dunkler als die übrige Oberseite; Rückenseiten stark ins Graue spielend. Im Hintergaumen 6, in der Gegend des Zwischenkiefers 3 Gaumensalten, deren vorderste sehr hoch, unzulös und beweglich. Die Querwülste der Backenzähne neigen sich in ihrer Mitte bogig nach vorn, zu beiden Seiten nach rückwärts. Körperlänge 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>". Schwanz 4". Ohrhöhe fast 10".

Um Wohnungen in der Provinz Dembeja. Mangirt ihrer Größe und ihres nackten Schwanzes wegen zu den eigentlichen Ratten.

*Mus tacaziena*. — Obenher graubräunlich, der Rücken zart schwärzlich gesprenkelt; Unterseite weiß ins Ockerfarbige; Füße und Nägel reiner weiß; Schurren lang, sehr zart, graubraun, weiß gespitzt; Ohren ziemlich groß, gerundet; der lange Schwanz fein geringelt, mit dichten kurzen Haaren besetzt, obenher bräunlich, unten weißlich. Körperlänge 3" 4". Schwanz 3" 9". Ohrhöhe 7 1/2".

Pelz sehr zart; die Rückenhaare an der Wurzel und an den Spitzen grau, daher die gesprenkelte Gesamtfärbung dieses Körpertheils.

Au den Ufern des Tafazié-Flusses.

Scheint sich von *Mus Vignaudii*, Prév. et Des Murs, durch beträchtlichere Größe und die mehrte Rückenzeichnung zu unterscheiden.

*Mus pallesceus*, Heugl. — Haarkleid weich, obenher an der Wurzel dunkelgrau mit röthlichgelblichen Spitzen, wodurch die Oberseite auf letzterer Farbe eine zarte graue Sprengelung erhält; Unterseite, Lippengegend und Füße weiß; Schwanz lang, dünn, mit feinen aber ziemlich straffen Haaren besetzt, untenher weißlich, oben durch dunkle Flecken zwischen den einzelnen Schilden der Ringelchen dünner bräunlich; Augengegend ockerfarbig; ein Haarbüsche hinter dem grangelblichen Ohr weißlich-

isabell; Schnurren lang, die höher gelegenen schwärzlich, die seitlichen weiß; Nasenspitze fleischfarbig; Zehenballen fast fleischfarbig ins Weißliche; Nägel rauchgrau; obere Schneidezähne auf der Außenfläche wachsgelb, die unteren gelblichweiß. Körperlänge 3". Schwanz 2" 9"". Ohrhöhe 6"".

#### Hausmaus im nördlichen Senar.

Mus sp.? — Klein, schlank, mit langem, dünnem Schweif; Oberseite glänzend rauchbraun, mit Grangelb gesprengt; Unterleib graulichweiß; längs der Rumpfseiten von den Wangen ab ein isabellgelber Streif; Seiten der Anus-Gegend ebenfalls isabell; Gelenke der Pfoten weißlich; Schnurren mittellang, theils braunschwarz, theils weißlich; Ohr sehr fein behaart; Schwanz ebenso und mit zahlreichen Ringelchen; Außenfläche der Schneidezähne oben wachsgelb, die der unteren, welche sehr lang sind, weißlich. Körperlänge 2" 10"". Schwanz 2". Ohr stark 4"" hoch.

Lebt auf 10 000 Fuß Meereshöhe im Lande der Wolo-Gala am Abhang waldiger Hügel und in Bananengebüsch.

Eine äußerst zierliche Maus ist Mus zebra, Heugl., vom Gebiet des Gazellenflusses. — *Golunda pulchella*, Gray (?). — Gray, Proc. L. Z. S. 1864. p. 57. pl. 13 (?).

Obenher hell oderfarbig mit 12 bis 16 dunkelbraunen, etwas farbgesprengten und scharfbegrenzten Längsstreifen. Lippengegend, Schnauzenseiten, Unterseite des ganzen Körpers und Innenseite der Füße rein weiß; Hinterrücken in der Gegend der Schwanzwurzel rostig oderfarben; Schwanz dünn, lang, geringelt, verwaschen rostbräunlich, auf dem Rücken mit schwärzlichem Längsstreif; Ohren breit, gerundet, roströthlich; Schnurren theils schwärzlich, theils weißlich. Körperlänge 3" 3"". Schwanz 4"". Ohrhöhe 6"".

Auge groß, mit einem falschen Ring eingefaßt. dunkelbraun.


Lebt in Erdlöchern in der Nähe von Viehparken und Ge-

höften und kommt bei Tage nur selten zum Vorschein. Bei *Golunda pulchella* scheint das Ohr kleiner, demselben fehlt der Abbildung nach der Haarbüschel am vorderen Ohrrand; der Kopf scheint stumpfer, die Oberseite zählt einige dunkle Längsstreifen mehr und diese sind in ihrer Mitte einfarbig fahlbräunlich, seitlich gleichförmig braunschwarzlich; der Schwanz dicker und kürzer.

*Golunda pulchella* kommt im Küstenland von Zanzibar und in Uniamuezi vor.

Bisher kannte man nur südafrikanische Vertreter der Gattung der Baumhörnse (Dendromys). Mir ist es gelungen, mehrere hierher gehörige Arten in Nordost-Afrika aufzufinden. Leider sind mehrere der gesammelten Exemplare in Verlust gerathen, namentlich einige, welche wir in Vogelnestern auf der Insel Argo bei Dongolah erbauten, andere aus dem Belegasthal. Ich beschreibe hier kurz noch folgende Arten:

*Dendromys pallidus*, Heugl. — Ohren gerundet, ziemlich groß und breit, außen und innwendig behaart; die Außenzehe der Vorderpfote sehr rudimentär; der Daumen durch einen wilffigen Hautballen vertreten; der ebenfalls kurze Daumen am Hinterfuße fast frei, mit sehr verkümmertem Nagel; der sehr fein geringelte Schwanz dicht, fein und kurz behaart (die Schwanzspitze wird beim vorliegenden Exemplar wohl fehlen, indem das letzte Glied etwas verdickt erscheint). Nasenkuppe fleischfarbig; äußerer Gehörgang nackt, weißlich; die Basis der Ohrmuschel außen mit weißen Haaren; Schneidezähne auf der Außenfläche wachsgelb; obethier graulich mardergelb; Lippengegend und Unterseite rein weiß; Augenlider schwärzlich; ein verwischener weißlicher Fleck über dem Auge; Schnurren an der Wurzelfläche braunschwarzlich, Spitzhälfte weiß; Vorderpfoten weiß; Nägel und Zehenballen ins Röthliche; längs des ganzen Rückens ein deutlicher und breiter glänzend schwarzer Streif. Körperlänge 2" 7"". Schwanz (dem, wie gesagt, wahrscheinlich einige Glieder fehlen) 3" 3".



zu Saugethiere № 72 Anmerkung



Die langhörnige Gazelle Antilope leptoceros. Cuv.

Altos Weibchen

„P. A. G. v. G. Westermarck“ ist ausgeschlossen

Im mittleren Tigrié, auf 6000 Fuß Meereshöhe in Webervogelnestern.

*Dendromys mystacalis*, Heugl. — Heugl. Verhandl. Leop. Carol. Akad. 1863. Sep.-Abdr. p. 5.

Oberseite und Außenseite der Füße zart rostig oderfarben; Unterseite, ein eckig nach den Bügeln einspringendes Feld, das von den Halsseiten ausgeht und bis unter und vor das Auge reicht, sowie Innentheile der Behaarung der Füße rein weiß; beide genannte Farben streng von einander geschieden; auf der Rückenmitte schwache Andeutung eines graulichen Längsstreifes. Schnurren schwärzlich; hinter der Ohrbasis ein hell oderfarbiger Fleck; Schwanz lang, schlauk, mit sehr zarten Härchen ziemlich dicht besetzt; Nasenlippe, Nägel und Zehenballen fleischfarbig. Auge mittelgroß, hervorstehend, braun; längs der Außenseite der oberen Schneidezähne eine starke Furche. Körperlänge 2" 5"". Schwanzlänge 3". Ohrhöhe stark 5"". Das Ohr zu beiden Seiten etwas um- und eingebogen; ausgebrettert so breit als hoch.

Wir erbeuteten nur ein einziges Exemplar dieser zierlichen Art, und zwar im Horst eines Raubadlers, wo das Thierchen, wohl 40 Fuß über dem Boden, seine Behausung aufgeschlagen hatte. Im Magen fand sich ein grüner Pflanzen schleim.

Vorkommen in der Ebene von Gifag in Central-Abessinien, auf 6000 Fuß Meereshöhe.

Noch muß ich hier einer Maus erwähnen, welche wir im Gebiet der Wolo-Gala auf steinigen Viehweiden nicht selten angetroffen haben, deren Gebiß ich übrigens nicht mit dem verwandter Formen vergleichen konnte und welche wohl nicht zur Gattung *Mus* im engeren Sinne zu rechnen sein dürfte:

*Mus (?) galanus*, Heugl. — Obere Nagezähne kurz und stark, von weißlicher Farbe, mit drei ziemlich deutlichen Längsfalten; die unteren Schneidezähne viel länger und glatt; die Backenzähne zeigen im Oberkiefer drei, im Unterkiefer zwei Reihen

von Höckern; die mittlere Reihe im Oberkiefer besteht aus sieben, beide seitliche Reihen aus je sechs Höckern, die zwei Höckerreihen des Unterkiefers aus je sieben solcher Hervorragungen; Schnauze ganz behaart, Oberlippe tief eingeschnitten; die fein behaarten Ohren ziemlich groß und rund; an den Vorderpfoten ein sehr rudimentärer Daumen mit verkümmertem Nagel; Vorderpfoten nebst Arm kurz, Hinterfuß dagegen auffallend verlängert und kräftig; hier die drei Mittelzehen etwa gleich lang; Schwanz fast von der Länge des Körpers. Oberseite graubräunlich, namentlich dem Rücken zu schwärzlich meliert; Unterseite schmutzig weißlich. Auge groß; vor der Ohrmuschel ein dichter, langer Haarbüsche; Schwanzspitze mit etwas längeren, braunschwarzlichen Haaren. Körperlänge 5". Schwanzlänge 4" 9"". Hinterfuß-Pfote 1" 1"". Ohrbreite 7"".

Eine neue Gattung, *Oreomys*, Heugl., entdeckte ich in den Hochländern von Semien. Dieselbe gehört in die Nähe von *Euryotis* und unterscheidet sich von dieser namentlich dadurch, daß sowohl die oberen als auch die unteren Nagezähne mit drei sehr scharfen und tiefen Längsfurchen versehen sind. Die Zahntypus ist  $\frac{1}{1} \frac{0}{0} \frac{4}{3}$ . Im Oberkiefer zeigt der erste Backenzahn 3, der zweite 2, der dritte 3, der vierte 5 Querlamellen, im Unterkiefer der erste 4, die zwei folgenden je 2 Lamellen. Die Nagezähne sind sehr breit, ihre Schneidekante nicht horizontal, sondern am Oberkiefer nach außen schräg und stäfflig verlängert, im Unterkiefer ebenso nach auswärts verkürzt. Am Daumenrudiment der Vorderpfote kein Nagel, sondern nur Spuren einer Hornwarze; auf der Innenseite der Hand 5, auf der des Fußes 6 Zehenballen; Krallen schwach, wenig gebogen, etwas seitlich zusammengedrückt, an der Hinterpfote mit Kammhaaren. Oberlippe gespalten; Nasenkuppe behaart; Ohr groß, gerundet, durch einen langen, dichten, an der vorderen Ohrwurzel entspringenden Haarschopf vollkommen verschließbar; Auge groß; Schnurren

mittellang, weich; Behaarung dicht, lang und ziemlich zart; Schwanz kurz, ziemlich dick, auffallend stark geringelt, oben nur wenig und fein behaart. Die einzige von mir erlangte Art ist:

*Oreomys typus*, Heugl. — Mausgrau ins Rostbräunliche und Olivenfarbige, mit Spuren eines violetten Metallglanzes; untenher, sowie die Pfoten heller; Rücken mit starken Grammenhaaren gemengt und schwärzlich gesprengt. Körperlänge fast 6", davon gehen auf den Kopf 1" 10". Schwanz 2" 10". Höhe des Ohres 8" bis 9". Ohrbreite 9" bis 10".

Lebt in Erdhöhlen auf Viehweiden auf 10000 bis 12000 Fuß Meereshöhe.

#### 59. Die falsche Rennmaus, *Meriones gerbillus* (Oliv.).

Oliv. Voy. III. t. 28. p. 157. f. A, B & C. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 175 (*M. pygargus*, Licht.). — *M. aegyptius*, Desm. — *M. gerbillus*, Rüpp. Atl. p. 77. t. 30. f. 1. (?) — *M. quadrimaculatus*, Ehr. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 38. Nr. 27. — *M. pygargus*, Cuv. Transact. Lond. Zool. Soc. II. p. 142. t. 25. f. 10—14. (?) — *Dipus gerbillus*, Blanf. Abyss. p. 284.

Heißt wie ihre Verwandten bei den Arabern G'erbu'a und Fär gebeli.

Nach Blanford sehr allgemein im Küstenland von Adulis.

Anmerkung. Als nordost-afrikanische Rennmäuse werden noch folgende Arten aufgeführt:

- Meriones (?) robustus, Rüpp. — Aus Nordanat.
- Meriones pyramidum, Geoffr. — Aus Egypten und Nubien.
- Meriones longicaudus, Wagn. — Aus Egypten.
- Meriones Burtonii, Fr. Cuv. — Aus Darfor.
- Meriones pygargus, Fr. Cuv. — Aus Egypten und Nubien. Vielleicht mit *M. gerbillus* zu vereinigen.

*Meriones dasyurus*, Wagn. — Von der arabischen Küste des Roten Meeres.

*Rhombomys melanurus*, Rüpp. — In Unter-Egypten und im peträischen Arabien.

*Rhombomys lacernatus*, Rüpp. — Aus der Dembea-Ebene.

Mit *Meriones longicaudus*, Wagn., könnte vielleicht zusammenfallen:

*Meriones stigmonyx*, Heugl. — Schneidezähne wachsgelb, die oberen mit einer Längsfurche. Daumennagel an der Vorderpfote sehr rudimentär; die dritte und vierte Vorderzehe, ebenso die zweite und fünfte unter sich etwa gleich lang. Am Hinterfuße die fünfte Zehe viel länger als der Daumen, aber beträchtlich kürzer als die zweite Zehe. Klein, sehr langschwänzig. Oberhaut lebhaft und gleichmäßig roströthlich-ockergelb, nur Scheitel und Rückenmitte satter gefärbt; Basis der Haare mausgrau; ein großer Fleck hinter dem Auge und ein solcher vorn und nach hinten an der Ohrwurzel, Lippen, Unterwangen, ganze Unterseite und Füße rein weiß; Schnurrren in drei Reihen geordnet, lang und weich, theils weiß, theils braunschwarzlich. Schwanz geringelt, dicht mit feinen Härchen bekleidet, die sich nach der Spitze zu pinselartig verlängern; die Schwanzfärbung oben braungelblich, Spitze dunkler, unten weißlich. Ohrseiten am Rande mit weißlichen Haaren, das Ohr übrigens sonst fast nackt, fleischröthlich, nach den Rändern zu dunkler; die Nägel sehr licht fleischröthlich, auf der Oberkante mit deutlichem purpbraunen Fleck. Auge groß, schwarzbraun, mit einem schmalen schwärzlichen Ring umgeben. Körperlänge 2<sup>11</sup>/9<sup>11</sup> bis 3<sup>11</sup>. Schwanz 4<sup>11</sup> bis 4<sup>11</sup> 7<sup>11</sup>. Ohrhöhe 5<sup>11</sup> bis 6<sup>11</sup>. Sohle des Hinterfußes 9<sup>11</sup>.

Nicht selten bei Chartum in sandigen Flächen.

Nicht auf die mir bekannten Beschreibungen paßt ein hierher gehöriges Thier von Dongolah:

*Meriones dongolanus*, Heugl. — Kopfmitte von der Nasen-  
kuppe an satt graugelblich; übrige Oberseite fahlgrau, seitlich  
mehr und mehr ins Ockerfarbige. Nase, Wangen, Lippen, ein  
Streif über dem Auge, Gegend zwischen Auge und Ohr und  
Unterseite weiß; Mitte der Halsseiten fahl; Schnurrren meist  
weiß; die Gegend, wo letztere entspringen, bräunlichgrau; Schwanz  
obenher ockerfarbig, nach dem Pinsel zu schwärzlich, unten weiß-  
lich; Ohr sehr fein behaart, weißlich ins Fasbe. Auge sehr groß  
und braunschwarz. Körperlänge  $3'' 7\frac{1}{2}'''$ . Schwanz  $5'' 7'''$ .  
Ohrhöhe  $6,4'''$ . Kopflänge  $1'' 1'''$ . Sohle am Hinterfuß  $9,5'''$ .

Wieder abweichend scheint ferner:

*Meriones macropus*, Heugl. — Schneidezähne braungelb,  
die oberen mit tiefer Längsfurche; der vordere obere Backzahn  
der größte, oben 3 lang-ovalen Querlamellen bildend, der zweite  
mit 2, der dritte mit einfacher Raufäche und einem kleinen  
warzigen Ansatz nach hinten, welch letzterer dem entsprechenden  
Zahn des Unterkiefers fehlt. Der sehr verkümmerte Daumen  
der Vorderpfote mit klauenartigem Nagel; Nagel gelblichweiß,  
die des Hinterfußes auf ihrem Rücken dunkel rostbraun. Schwanz  
deutlich geringelt, ziemlich dicht, aber fein behaart, obenher mehr  
als auf den Seiten und unten, mit pinselartiger Spitze, die auch  
unterher schwärzlich gefärbt ist. Drei große vordere und sechs  
schmälere hintere Gaumenfalten. Nasenkuppe behaart. Oberlippe  
wenig eingeschnitten. Bartborsten sehr lang, einige bis hinter  
die Ohren reichend, weißlich mit wenigen braunen Haaren ge-  
mischt. Auge mittelgroß, etwas vorstehend. Ohren lang-oval,  
innen spärlich, fein und kurz, außen dichter behaart.

Oberseite graubraun ins Roströhliche; Körperseiten mehr  
ockerfarbig; Lippen und Unterseite weiß; die Behaarung im All-  
gemeinen fein, seidenartig; die konisch zulaufende Körperverlänge-  
rung der Hodengegend theilweise nackt und fleischfarbig; Augen  
tief schwärzbraun, mit feinem, schwärzlichem, kahlem Ring und

schwarzbraunen Augenlidern; Pfoten untenher nackt und schwärzlich. Körperlänge bis zur Schwanzwurzel 5" 8", Körperlänge bis zur Spitze des sackförmigen Ansatzes der Hodengegend 6" 7", Schwanzlänge 6". Ohrhöhe 8". Kopflänge 1" 9". Tarsus 1" 4" bis 1" 5". Carpus 9".

Nicht selten in buschigen und mit Hochgras bestandenen Flächen in Bongo im Gebiet des Gazellenflusses.

#### 60. Die Sandratte, *Psammomys elegans* (Heugl.).

?*Ps. obesus*, Cretschn. Rüpp. Atl. p. 58. t. 22 u. 23. (Variet.) — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. III. p. 495? — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 39?

Ich stelle vorläufig eine Sandratte, von welcher ich mehrere Exemplare bei Sauakin erlangt habe, als *Ps. elegans* auf, die mir in einigen Stücken von *Ps. obesus* abzuweichen scheint.

Meine Exemplare sind beträchtlich kleiner, d. h. der Körper kürzer, der Schwanz verhältnismäßig länger, auch scheint die Färbung etwas abweichend.

Das Auge ist sehr groß; die Lippen wenig gespalten; Nase mit Ausnahme der Gegend der Nasenlöcher ganz behaart; Ohr kurz, rautenförmig, beiderseits behaart; Schneidezähne wachsgelb, ungeschärft; der Schwanz wenig kürzer als der Körper, ganz behaart, jedoch unter der kurzen straffen Bedeckung deutliche Schuppenringelchen; am Vorderfuß nur das Innere der Hand nackt; die Sohlen des Hintersufzes vom Fersengelenk ab unbehaart, aber das Innere der Zehen und Zehenwurzeln mit einzeln straffen Haaren besetzt; Nägel spitz, gekrümmmt, unten ausgehöhlt; Daumennagel des Vorderfußes rudimentär, wie der Daumen selbst, ersterer platter und gerundeter als die übrigen Nägel, die alle schwärzlich gefärbt sind; Pelz seidenartig glän-

zend, lang und weich; Bartborsten sehr lang, dicht, jedoch weich, zumeist weiß, einzelne derselben auch tiefschwarz.

Stirnmitte und Scheitel rostfarbig, die Stirnplatte seitwärts scharf abgegrenzt gegen den breiten gelblichweißlichen Wangentreif, der noch das ganze Auge umfaßt; sonstige Färbung ähnlich wie bei Ps. obesus, nur lebhafter wüstengelb ins Rostgelbliche, Rückengegend durch die dunklen Grannenhaare deutlicher gesprengelt; das Enddrittel des Schwanzes fuchsig schwärzlich, die Haare hier etwas pinsel förmig verlängert. Körperlänge 6". Schwanz mit Haarpinsel 5" 1 $\frac{1}{2}$ ". Kopf 1" 10 $\frac{1}{2}$ ". Schnurrren 2". Ohrhöhe 5 $\frac{1}{2}$ ". Vorderarm 11"". Tarsus 1" 7"". Hand bis zur Krallen spitze 7 $\frac{1}{2}$ ". Fuß von der Ferse bis zur Krallen spitze 1" 3,3"". Ein zweites Exemplar ist etwas kleiner: Körperlänge 5" 9"". Schwanz 5". Wagner giebt für Psammomys obesus folgende Maße: Körperlänge 7" 4"". Schwanz mit Haaren 4" 8"". Ohrhöhe 6,5"". Hinterfuß bis zur Krallen spitze 1" 4"".

Die von mir bei Sauakin gefundene Fettratte, deren Gebiß und Schädel ich im Augenblick nicht näher mit denen von Ps. obesus zu vergleichen vermug, lebt ziemlich zahlreich im Geröll, in alten Gräbern und Rissen des Madreporenkaltes auf der Insel Schech Abdallah bei Sauakin. Sie kommt hauptsächlich nur früh Morgens und Abends aus ihren unterirdischen Behausungen, die sie nur mit Vorsicht verläßt. Zuerst erscheint der Kopf, das Thier lanscht und äugt, zieht sich auch wohl nochmals in seinen Bau zurück, bis es ganz ins Freie tritt. Ist die Gegend unsicher, so wippt es mit Kopf und Schultern und verschwindet unter Umständen wieder. Selten laufen die Thiere von einer Höhle zur anderen. Dann ist die Stellung rattenartig, aber der Schweif berührt den Boden nicht, sondern wird leicht gekrümmt in einem Doppelsbogen (~) getragen. Viele der Bäume befinden sich unter Büschen von Dickblatt (Zygophyllum

simplex), deren saftiges Laub diese Ratten fressen. Sie setzen sich übrigens auch gern auf die Hinterfüße, jedoch ohne den Vorderkörper hoch aufzurichten. Ihre Bewegungen schienen mir sehr gewandt, der Lauf unter Umständen ungemein rasch und schnurrend.

Verglichen mit der Abbildung von Cretschmar ist das Geviß von Ps. elegans vollkommen typisch, aber der Schädel namhaft kleiner, namentlich zwischen Stirn- und Hinterhauptsbein fürzer.

#### Fam. Stachelschweine (Hystricina).

##### 61. Das gemeine Stachelschwein, *Hystrix cristata* (Linn.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 17. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 45. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 41.

Arab. Abu Šök, in der Gegend von Doseier El Nis, bei Sauakin Hanhan. Aeth. Qonfez. Amh. Zert und Qeratsa. Schoho Endet. Somal Ano-gob und Hedek.

Das Stachelschwein lebt familienweise in unserem ganzen Beobachtungsgebiet. Zahlreiche Höhlen dieser Thiere fanden wir im Küstenland bei Aqiq, auch in den Regenbetten um Naqfa, bei Keren und im Barkah erscheint es an geeigneten Localitäten. Im mittleren Abessinien fand ich diese Thiere bis auf 6000 bis 7000 Fuß über dem Meeresspiegel.

Sie führen eine vollkommen nächtliche Lebensweise und kommen über Tag nicht ins Freie. Ihre Höhlen werden sowohl auf dem ebenen Boden angelegt, als an Böschungen von Regenbetten, im Allgemeinen in der Dammerde und im Alluvialschutt, doch bewohnt das Stachelschwein auch hin und wieder felsige Gegenden.

Um seine Höhlen finden sich nicht selten bedeutende Massen

von Erde aufgehäuft, welche die Thiere auszcharren. Die Baue sind oft weit verzweigt, und gräbt sich ein darin besindliches Thier mit großer Schnelligkeit weiter in die Erde ein, wenn man die Höhlen öffnet. Die Röhren haben ungefähr den Durchmesser der Dachshöhlen und es führen meist mehrere Eingänge in den Hauptkessel. Geängstigt stoßen die Stachelschweine einen eigenthümlichen trommelnden Ton aus; sie klappern mit ihrem Stachelleid, beißen wüthend um sich, schlagen mit den Pfoten und können durch eine heftige Bewegung nach rückwärts mit den langen, dann etwas aufgerichteten Stacheln sehr schmerzhafte Wunden verursachen. Dabei fällt hier und da eine Stachel aus, und behaupten die Eingeborenen, das Thier habe die Fähigkeit, solche nach seinem Verfolger zu schleudern.

Es ist mir nicht bekannt, ob das Stachelschwein der sinaitischen Halbinsel zu *H. cristata* oder zu *H. hirsutirostris* gehöre.

Dr. Peters hat die südost-afrikanische Form ebenfalls als besondere Art (*H. Africæ australis*) getrennt.

*Anmerkung.* Im Gebiet des Gazellenflusses, in Unianuezi und in den Niamnam-Ländern findet sich ein Borstenferkel. Ich glaubte, daß diese nördliche Form von der süd-afrikanischen specifisch abweiche, doch fehlte es mir bisher an Gelegenheit, beide genauer zu vergleichen. Den Far el Būs der Elsenbeinhändler habe ich als *Aulacodus semipalmatus* beschrieben. Das Thier soll nach Aussage der Eingeborenen mit Vorliebe Elsenbein anschneiden.

#### Fam. Hasen (Leporina).

Die Hasen unseres Beobachtungsgebietes sind noch lange nicht genügend untersucht. Dieselben bieten je nach ihren Aufenthaltsorten und theilsweise auch nach der Jahreszeit in ihrer äußerer Erscheinung vielfältige Verschiedenheiten. Nur durch

genauere Prüfung der inneren Theile lässt sich daher ermitteln, ob einige dieser Formen wirklich specifisch zu unterscheiden seien. Ehrenberg unterscheidet neben *Lepus aegyptius* einen *L. arabicus*, *L. sinaiticus*, *L. libycus* und *L. habessinicus*; dazu kamen noch *L. isabellinus*, Rüpp., *L. berberanus* und *L. somalensis*, Heugl., endlich *L. tigrensis* (*potius tigriensis*), Blanf. Letzterer soll sich mehr der südafrikanischen Form nähern und größer sein als der egyptische Hase.

Der Hase heißt bei den Arabern Arneb. Aeth. Mentelié. Amh. Tsentsel. Denk. Bakela. Som. Bakeila. Verb. Utlang. Bedj. Helei.

Ich zähle hier die verschiedenen an der afrikanischen Küste des Roten Meeres heimischen Rassen auf.

### 62. Der egyptische Hase, *Lepus aegyptius* (I. Geoffr.).

Geoffr. Descr. de l'Ég. t. 6. — Hempr. & Ehr. Symb. phys. t. 15. f. 1. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 90. — Fitz. & Heugl. Säugeth. p. 42. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 46. — Blanf. Abyss. p. 273. — *L. habessinicus*, Brehm, Habesch, p. 64.

An der egyptischen Küste und bei Sauakin. Hierher rechnet Blanford noch den Hasen des abessinischen Küstenlandes.

### 63. Der abessinische Hase, *Lepus habessinicus* (Ehr.).

Hempr. & Ehr. Symb. phys. t. 15. f. 2. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 94. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 49. — Blanf. Abyss. p. 274. — *L. isabellinus*, Rüpp. (var.)?

In den Gebirgen der abessinischen Ost-Küste. Von Blanford nicht gefunden. Nach diesem Forscher von *L. aegyptius* verschieden durch kleinere Ohren und etwas beträchtlichere Größe.

64. Der tigrische Hase, *Lepus tigriensis* (Heugl. & Blanf.).

*Lepus tigrensis*, Blanf. Abyss. p. 275. — *L. abyssinicus*, Lefeb. Abyss. Atl. pl. V. f. 1.

„*L. saxatili* persimilis, minor, cauda breviori, plantarum pilis ferrugineis, haud umbrinis.“

Von Blanford in der Gegend von Senafié bis Antalo gefunden.

Der von diesem Reisenden beschriebene und ausführlich gemessene Hase stimmt so ziemlich überein mit der in den Gebirgen der Bogos, Habab und Beni Amer vorkommenden Form. Sie ist an einzelnen Stellen zeitweise ungemein häufig, namentlich an buschigen, felsigen Gehängen, aber auch in den Niederrungen und hier hauptsächlich in Dicichten von Nd-Akazien, geht übrigens bis auf mehr als 8000 Fuß Meereshöhe. In ihrem Benehmen haben diese kleinen, flinken Hasen viele Ähnlichkeit mit den Kaninchen, nur machen sie im Aufgehen meist höhere Sprünge, wobei der Vorderkörper hoch aufgeschnellt wird, und schurren dann ein kurzes Stück weit über die Erde hin bis zu einem Punkt, der ihnen etwas Deckung gewährt. Zuweilen begegnete ich denselben auch in Steinhalde und glaube, daß sie sich gelegentlich in die Erde verkriechen; angeschossene thun dies sicher.

Beim egyptischen Hasen fiel mir auf, daß derselbe Getreidefelder meiden und mehr auf Wüstenboden und zwischen Trümmergestein zu finden sei. Er zieht übrigens während der Winterzeit vom Nilthal in die Berge und erscheint in der Nähe des Culturlandes hauptsächlich zur trockenen Jahreszeit in größerer Anzahl.

Bei heftiger Hitze liegen die afrikanischen Hasen alle ungemein fest, Morgens und Abends sind sie dagegen flüchtiger.

Im Gebiet des oberen Weißen Nil traf ich äußerst selten

Haben an und erhielt von dort überhaupt nur ein einziges, jüngeres, durch ungemein kurze Ohren ausgezeichnetes Exemplar, die Type von *Lepus microtis*, Heugl.

### Ord. Zahnlückter (Edentata).

#### Fam. Scharrthiere (Edentata).

##### 65. Das Erdferkel, *Orycterus aethiopicus* (Sund.).

Sund. Stokh. Vetensk. Akad. Handl. 1842. p. 236. t. 3. f. 1—5. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 52. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 43. — Heugl. Reise in das Gebiet des Weissen Nil, p. 325. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 195.

Arab. Abu Zelaf oder Abu Dulāf, Abu Diqen oder Diken und A'anak el ard. Tigr. Hofār und Dārō Meraz.

Nicht eben selten im Gebiet des Anseba, in Ost-Senar und Kordofan, ohne Zweifel auch in Takah und in den Bißharin-Ländern, namentlich in Gegenden, wo viele Ameisen vorkommen.

Ich habe mehrfach ausführlich über dieses merkwürdige Thier berichtet und kanu somit hier einen Bericht über dessen Lebensweise übergehen. Das Erdferkel lebt in Höhlen, die es selbst gräbt und nur zur Nachtzeit verläßt, um seiner Nahrung nachzugehen, welche zumeist in Insecten und deren Larven besteht.

In Abessinien scheint noch eine zweite hierher gehörige Art vorzukommen, welche viel kleiner sein soll und der ein langer, niedergedrückter oder breitgedrückter Schwanz zugeschrieben wird. Dieses Thier lebt gleichfalls in Höhlen und heißt in Tigré Tselli'era, in Amchara dagegen Afer genait. Ob wirklich ein *Orycterus*?

Ob das breitschwänzige Schuppenthier (*Phatages Temminckii*) in unserem Beobachtungsgebiete zu finden, konnte ich nicht mit Sicherheit erfahren. Das Thier heißt in Kordofan Om qirfah, im Gebiet des oberen Mareb aber Būdu.

### Ord. Einhufer (*Solidungula*).

Das gezähmte Pferd wird in Takah und in den abessinischen Gebirgsgegenden in ziemlich großer Anzahl gezüchtet, Pferde und Maulthiere führt man von Habesch sowohl über Masaua als über Qalabat in Menge aus. Die Beni Amer des oberen Barkah halten zumeist die größere, krummnasige Dongolah-Rasse, mit langer Mähne und tief ange setztem, sehr dichten und langem Schweif. Trotz seiner schmalen Brust ist das Dongolah-Pferd ausdauernd, rasch und namentlich gewandt im Nehmen von Hindernissen.

Das abessinische Pferd stammt wohl vom arabischen ab, es zeigt gedrungene Formen und eignet sich vorzüglich für die Hochländer seiner Heimath. Etwas größer und noch weit eleganter gebaut sind die Pferde der Gala-Gebiete. In Takah sieht man auch hin und wieder die Gharbaui-Rasse, welche in Darfur und West-Kordofan ihre ursprüngliche Heimath hat. Dieses vortreffliche, namentlich auch zur Jagd sehr brauchbare Wüstenpferd scheint einer Kreuzung des arabischen und Berberpferdes entsprungen zu sein.

Das Pferd heißt auf Arabisch H'osān, die Stute Faras. Aeth. und amch. Faras, in Amhara der Hengst Korma, die Stute Bazra, der Wallach Sanga. Berberisch der Hengst Kadjnundi, die Stute Kadj-keri. Gala Ferda oder Farda. Bedj. Hadai. Somal Fares.

Noch beliebter als Reithier und auch zum Lasttragen sehr

geeignet ist das abessinische Maulthier. Die Araber nennen dasselbe Bžael, die Bewohner von Tigrié Baqli, die von Amhara Baqlo, die Somalen Berēt.

Der gezähmte Esel wird ebenfalls in Abessinien allgemein gehalten, sowohl behufs der Maulthierzucht als zum Lasttragen. Auch in Takah und bei den Beni Amer findet man zum Theil recht gute, kräftige Thiere dieser Art. Man kreuzt sie gern mit Wildeseln. Die Bisscharin und Bedjah verwenden sie namentlich zum Wassertransport, und ihre Esel sind meist abgerichtet, sich beim Beladen niederzulegen, ähnlich wie die Kameele.

Der Esel heißt auf Arabisch H'omar. Aeth. Adgi. Amh. Aheja. Gala Harjé. Schoho Ekoleti. Verb. Hanu. Bedj. Mēq oder Mēk. Som. Damer oder Demer. Denf. Dēbu.

Unter den Wildeseln unseres Beobachtungsgebietes gibt es zwei charakteristische Formen, die artlich vielleicht nicht zu trennen sind, sich aber wenigstens als klimatische Rassen streng unterscheiden und wohl mit *Equus asinus*, Linn., zusammenfallen.

#### 66. Der Steppen-Esel, *Asinus africanus* (Fitz.).

*Equus asinus*, Heugl. Fauna R. M. Nr. 53. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 52.

Arab. H'omār el Wādi. Bedj. H'alai Mēq.

Der afrikanische färbegraue Wildesel findet sich in den Steppeflächen des südlichen Nubiens zwischen Abu Hamed, Berber und dem Blauen Nil, ebenso in Takah östlich bis zum Barkah und in den Gebirgen der Bisscharin. In den Wänderstreichen westlich vom Nil habe ich denselben dagegen nicht angetroffen.

Er lebt meist gesellschaftlich, ja selbst in Truppen von 20 bis 30 Stück beisammen und ist ungemein scheu und flüchtig, auch deshalb nicht gerade leicht zu erlegen, weil diese Thiere

sich zumeist nur in ganz offenem Terrain aufzuhalten und namentlich solche Stellen bevorzugen, welche eine weite Rundsicht gestatten.

Die Araber und Beni Amer hetzen den Wildesel zuweilen mit Pferden und Hunden und suchen ihn nach Gewässern zu treiben, wo er wohl mit Leichtigkeit schwimmt, jedoch in Booten eingeholt werden kann. Man hat es namentlich auf die Tüllen abgesehen, die bald einen gewissen Grad von Zähmung annehmen und welche man gern zur Kreuzung mit Hauseseln verwendet.

Nach der Regenzeit ist der Homär el Wādi besonders wohl genährt und sein Wildpferd sehr fastig und wohlschmeckend.

Der afrikanische fahlgraue Wildesel gleicht wohl im Allgemeinen der gezähmten Rasse, doch zeigt er schlankere Formen, derselbe ist etwas höher gestellt und zeichnet sich durch seine fein gebildeten Ohren und durch die zarten, elastischen Extremitäten und Hufe aus, sowie durch sein lebhaftes Temperament.

In der Gefangenschaft bezeugt er sich übrigens wenig fügsam und bleibt stets eigenständig, verschlagen und hinterlistig.

Das Winterkleid unterscheidet sich vom Sommerkleid durch seine zart hell mausgraue Färbung, während letzteres einen mehr fleischröhlich fahlen Ton zeigt.

Die ganze Maulgegend, die Behaarung im Innern des Ohres, die Kehle bis zu den hinteren Kiefercken, Brustmitte und Bauch sind weiß; diese Farbe scharf von derjenigen der Oberseite geschieden; Innenseite der Füße nach oben zu ebenfalls weiß, jedoch verwaschener; über und unter dem Auge ein schmaler, obsoleter weißlicher Streif; nackte Augengegend und Wimpern schwärzlich; Ohr außen fahlgrau, in der Mitte mit großem weißlichen Fleck; Ohrspitze schwärzlich, diese Farbe jederseits am Rand herab rostbräunlich abshattirt; über der Wurzel des Ohres auf dem Ohrenrücken ein größerer, nach unten scharf begrenzter, nach oben aber verwaschener rostbräunlicher Längsfleck; Mähne

stehend, schwärzlich, theils etwas mit grauweißlichen Haaren gemischt; Rückenstreif bis zur Schwanzspitze fortsetzend, schmal, aus glatten Haaren bestehend und von braunschwarzhelcher Farbe, wie auch das Schulterkreuz; Schwanzpinsel und Unterseite des Schwanzes schwarz; Füße gewöhnlich ohne alle schwärzliche Querzeichnung mit Ausnahme eines verwaschenen bräunlichen Fleckes hinter und über den Fesseln; hinten unmittelbar über dem dunklen Huf ein weißer Fleck. Nasen- und Lippengegend schwärzlich; Schlauch des Hengstes schwarz, wie auch die nackte Stelle auf der Innenseite des Oberfußes schwarz; Auge groß, lebhaft, mit dunkler Iris.

#### 67. Der streiffüßige Steppen-Esel, *Asinus taeniopus* (Heugl.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 54 u. p. 19 (Beschreibung). — Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. XXVIII. t. 1. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 52.

Arab. H'omär el Wadi, wie die vorhergehende Form. Geez Adgi gédam. Amh. Jabada Aheja. Tigr. Adgi Baraha. Denk. Dēbu Kolo. Som. Damer Debadeh.

Von der Größe der vorhergehenden Form oder etwas stärker, aber weit gedrungener, Kopf und Hals weniger schlank; röthlich isabell bis rostbräunlich; Maul, Rüstergegend, Brustmitte, Unterleib, theils auch Vorder- und Innenseite der Füße und Kronenhaare unmittelbar über den schwärzlichen Hüsen weißlich bis rein weiß; Außenseite des Ohres isabell, nach oben rostbraun, Spitze und Außenrand schwarz, Innenseite weißlich; vom oberen, vorderen Ende der Mähne bis zur Ohrbasis jederseits ein kurzer, schwarzbrauner Streif; Mähne kurz, stehend, seitlich an der Wurzel weißlich, in der Mitte schwärzlich; der sehr dunkle und breite Rückenstreif setzt über den isabellfarbigen Schweif obenher bis zur schwarzen Quaste fort; das Kreuz auf

den Schultern breit, scharf begrenzt, dunkelschwarz; Innen- und Außenseite der Füße mit zahlreichen, sehr deutlichen, unregelmäßigen schwarzen, theils rostig abgeschattirten Querbinden. Fesseln rostbraun, ins Schwärzliche; Genitalien und Hornwarze auf der Innenseite des Vorderfußes schwarz; Auge dunkelbraun.

Diese in ihrer Färbung etwas an das Tigerpferd erinnernde Rasse findet sich in den Salzebenen des Danakil- und Adel-Landes bis zum Hawasch-Fluß, wahrscheinlich auch im ganzen Gebiet der nördlichen Somaliküste.

Den Wildesel von Dahlak und Soqotra habe ich nicht zu untersuchen Gelegenheit gehabt, derselbe dürfte aber ebenfalls zu *A. taeniopus* gehören.

Auf den Tafelländern und in den Savannen von Schoa und am oberen Kitsch findet sich das Zebra; dasselbe verbreitet sich ohne Zweifel auch über das Somaligebiet; in der Gegend von Qalabat erscheint es nach Angabe der Eingeborenen gleichfalls hin und wieder. Es heißt auf Amh. Bazera.

### Ord. Dickhäuter (Pachydermata).

#### Fam. Elefanten (Anisodactyla).

68. Der afrikanische Elephant, *Elephas africanus* (Blum.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 284. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 46. — Blanf. Abyss. p. 258. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 55. — Brehm, Habesch, p. 67.

Arab. Fil. Sudan-Arab. Abu Nebeqah. Bedj. Kurub. Som. Merode. Denk. Dékan. Gala Arba. Belsen Dschana. Geez Negié. Amh. Zahon und Zehon (nach Rudolf Zažon). Tigr. H'armaz.


Nicht selten und meist familienweise in den Wildnissen des Barkah, Dasch, Mareb und Anseba; zur Winter- und Frühjahrszeit in großen Gesellschaften nach dem Küstenland wandernd, ostwärts bis nach dem Niedem, während der Regenperiode aber in das Gebirgsland, ins Tafkat, Naqfa, Maro, Debra Salié und Mensa, hier 6000 bis 8000 Fuß hoch ansteigend und stets bestimmte Wechsel einhaltend. Werden die Thiere hier öfter beunruhigt, so verlassen sie ihre alten Wege und bahnen sich neue, die häufig an den steilsten Gehängen und Felsgesimsen hinführen. Es ist erstaunlich, mit welcher Ruhe und Geschicklichkeit die höchsten Pässe von ihnen überstiegen werden, wo sie oft genöthigt sind, von Stufe zu Stufe über gewaltige Steinmassen wegzulettern. Dabei setzt jeder Einzelne stets den Fuß auf die Fährte seines Vorgängers, wodurch mit der Zeit diese Eindrücke in den härtesten Granit gegraben werden.

Man jagt den Elephanten sowohl im Tiefland als im Gebirge, sowohl um die Orte wo sie trinken und sich zu baden pflegen, als in den Buschwäldern der Niederungen, im Homran wie in Takah meist zu Pferde mittelst des Schwerts, in Habesch und im Gebiet der Habab mit großkalibrigen Feuergewehren. Der Abessinier schießt heute noch viel mit eisernen Augeln.

#### 69. Das Keitloa, Rhinoceros Keitloa (Smith).

A. Smith, Ill. Afr. Zool. t. 1. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 291. — *Rh. africanus*, Heugl. Fauna R. M. Nr. 56. — *Opsiceros Keitloa et bicornis*, Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 47. — *Rh. Keitola, var. bicornis*, Blanf. Abyss. p. 43. — Gray, Ann. and Mag. Nat. Hist. 1869. p. 201. — Ludolf, Hist. Aethiop. I. X. 78.

Arab. Om Qarn, 'Anazah, H'arīš, Kerkend und





Հրանիպեշ Քաշիոռ (Rh. Keithoa).

II. Էջե 93.

H'ardid. Geez Arwié-χaris. Amich. Awraris. Tigr. Āris.<sup>1</sup>  
Belen Gedangik. Somal Wuil. Bedj. Endit und Haris.<sup>1</sup>

Es ist sehr wahrscheinlich, daß das Nashorn von Abyssinien und von Takah als Varietät zur zweihörnigen afrikanischen Art (*Rh. africanus*, Camp. — *Rh. bicornis*, Smith) zu rechnen sei. Die Größe, Färbung, Horngestaltung, Faltung der Haut, Form der Oberlippe und des Kopfes überhaupt wechseln individuell und nach Aufenthaltsort, Geschlecht und Alter so sehr, daß keine strengen Grenzen zwischen beiden Formen gezogen werden können. Ob *Rh. simus* eine eigene Art bilde, kann ich aus eigener Vergleichung nicht ermitteln. Am oberen Weissen Nil kommt eine Form vor, welche ich der ungeheuren Verlängerung des vorderen Hornes (bis zu  $3\frac{1}{2}$  Fuß und noch mehr) wegen zu letzterer Art rechnen möchte. Von dem in Takah, Honran, Dalabat und am Anseba vorkommenden afrikanischen Nashorn erhielt ich nur jüngere Exemplare, die ganz mit dem von Blanford beschriebenen übereinstimmen, auch sah ich mehrfach scheinbar vollkommen alte Thiere, bei denen das vordere Horn das hintere höchstens um 6 Zoll überragte. Das erstere hat einen fast runden Querschnitt, ist auf- und rückwärts gebogen, vorn mit einem Kiel oder einer Kante versehen und scharf zugespitzt, während das hintere einen mehr länglich ovalen Querschnitt zeigt, seitlich stärker comprimirt, nach der Spitze zu zweikantig und nicht gebogen erscheint. Die Farbe wechselt zwischen fleischröhlich fast bis schmutzig dunkel braungrau, jedoch immer mit einem Stich ins Hornröhliche. Da sich die Thiere gern im Schlamm zuhßen, nimmt die Haut oftmals die Färbung der an derselben klebenden und auf ihr festtrocknenden Erde an.

Das Nashorn lebt paar- und familienweise am Ost-, Nord-

---

<sup>1</sup> Die Bischarin nennen ein Thier, welches sie ähnlich dem fabelhaften Einhorn beschreiben, Soh'ot.

und West-Abhang der abessinischen Gebirge und ihren Verzweigungen, im Barkah nordwärts bis gegen To-Kar. Ebenso in Ost-Senar und am oberen Albarah und seinen Zuflüssen, jedoch stets in der Nähe von fließendem Wasser oder tiefen Löchern und Lachen. Während der trockenen Jahreszeit zieht es sich deshalb in die Gebirge zurück, in die Region des Bambus und selbst noch höher. Es führt im Allgemeinen eine mehr nächtliche Lebensweise, doch haben wir es auch zuweilen über Tag, namentlich bei Regenwetter im Buschwald steiler Gehänge, seiner Nahrung nachgehend angetroffen. Neberrascht man dasselbe bei solchen Gelegenheiten im Freien plötzlich, so kommt es vor, daß es — offenbar in einer Anwandlung von Wuth und Schrecken — auf den Menschen gesenkten Kopfes und schaukend losstürzt, jedoch ohne seinen Angriff zu wiederholen. So wurden zwei meiner Jäger von drei Rhinoeronten chargirt, die, eines dem anderen auf der Ferse folgend, mit unglaublicher Schnelligkeit bergabwärts gegen die Leute anstürmten, welch letztere kaum Zeit und Raum fanden, sich in das benachbarte Dornengestrüpp zu werfen. Doch hatten die Bestien einen so heftigen Anlauf genommen, daß sie durch ihre eigene Wucht vollends in die Tiefe gerissen wurden.

Am Anseba bewohnt das Nashorn hauptsächlich die flacheren Uferstellen, welche dicht mit Schilf, Dornbusch und Schlingpflanzen-Gewinden bewachsen sind. Dort haben sie höttenartige schattige und feuchte Lager im undurchdringlichen Eissus, nach welchen sowohl von der Wasser- als von der Bergseite enge, gewundene Pfade führen. Werden die Thiere hier in ihrer Mittagsruhe gestört, so brechen sie nicht auf der entgegengesetzten Seite, sondern dort hervor, woher der Feind einzudringen versucht, und eine Begegnung mit den wütenden Insassen auf ihren Wechseln ist stets lebensgefährlich.

Ein altes, von einem unserer Leute verwundetes Rhinoeros

verfolgte seinen Feind, der eben noch Zeit gewann, den ziemlich starken Stamm einer Akazie zu erreichen, auf die er sich flüchtete. Darauf stürmte das Thier gegen den Baum an, suchte denselben umzurrennen und die Wurzeln anzugraben, bis es durch mehrfache von einem zweiten Jäger aus sehr bescheidener Entfernung aus einem Hinterhalte abgefeuerte Kugelschüsse endlich zur Flucht gezwungen wurde.

Junge Rhinoceronten gewöhnen sich übrigens bald an die Gefangenschaft und sind höchst drollig in ihren Bewegungen.

Die Nahrung besteht mehr in Rinde und holzigen Theilen, als in Gras, aber das Nashorn weidet gelegentlich auch ganz ähnlich dem Rindvieh und verschmäht namentlich nicht Steinfrüchte und Büschelmais. Beim Aufnehmen von Nahrung kommt ihm die eigenthümlich muskulöse, etwas rüsselartige Oberlippe sehr zu statten.

In der Aufregung wekt das Thier das vordere Horn an Bäumen, Wurzeln und Steinen oder es pflügt damit große Halbkreise in die Erde.

Lefebvre berichtet, daß man in Abessinien Rhinoceronten finde, welche 3 und 4 Hörner besitzen, und daß das Thier im Stande sei, diese Waffe nach Willkür zu bewegen. Da das Horn nicht auf der knöchernen Schädelmasse durch einen Stirnzapfen aussicht, sondern nur auf der Haut, so scheint wohl die Möglichkeit einer selbständigen Bewegung nicht ganz ausgeschlossen. Aber ich habe beim getöteten alten Nashorn eben so wenig als bei gezähmten Jungen durch gewaltsames Rütteln das Horn von der Stelle zu rücken vermocht.

Noch ist immer die Frage nicht gelöst, ob das Nashorn von Central-Abessinien und Schoa einer zweiten und zwar einer gepanzerten Art angehöre, nämlich dem *Rh. cucullatus*, Wagn. (Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 287).

70. Das Nilpferd, *Hippopotamus amphibius* (Linn.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 293. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 46. — Brehm, Habesch, p. 67. (Not.)

Arab. G'amūs el Bah'er. Geez Biꝝat. Am̄ch. Gomāri. Gala Robi. Sudan=Arab. Asint. Berberin. Jasinti, Eretk und Qelōbeh.

Nach unzuverlässigen Angaben soll das Nilpferd im unteren Anſeba vorkommen. Nun trocknen aber alljährlich alle Regenströme, welche dem Barkah zueilen, wie letzterer selbst zur heißen Jahreszeit vollkommen aus, ebenso der untere Dafsch. Der Albarah und einige seiner Zuflüsse sind dagegen von diesen Thieren bevölkert, auch im oberen Dafsch könnten sie sich aufhalten, oder wenigstens hin und wieder zur Zeit der Hochwasser, wo das Nilpferd überhaupt gerne Wanderungen unternimmt, dahin gelangen. Sehr häufig ist dasselbe im Tsana=See sowie im Hawasch.

## Fam. Paarzeher (Zygodactyla.)

71. Das abessinische Larvenschwein, *Phacochoerus Alliani* (Rüpp.).

Rüpp. Atl. t. 25. — *Ph. Haroja*, H. & Ehr. Symb. phys. II. t. 20. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 57. — Brehm, Habesch, p. 67. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 50. — Blanf. Abyss. p. 241.

Arab. H'aluf Abu Qarnēn. Geez H'arawea haqel (Dudolf). Am̄ch. H'areja, auch Mefles. Tigr. Ereja. Denk. H'araja. Somal Dofar. Bedj. O-jak.

Das Larvenschwein lebt in kleineren und stärkeren Rudeln in den Gebirgen der Beni Amer, Habab, im Anſeba=Gebiet, in den Regenstrombetten bei Ailet und um die Bai von Abulis,

endlich im oberen Barkah und in ganz Habesch, hier jedoch kaum über 7000 Fuß ansteigend.

In einigen Gegenden werden diese Thiere, wegen der Verwüstungen, die sie in Feldern anrichten, zur Landplage. Im dichten Buschwerk der Torrenten und unter überhängenden Ufern graben sie sich tiefe Löcher, führen übrigens im Allgemeinen einen mehr verborgenen Lebenswandel, obgleich man in den Vormittags- und Abendstunden hin und wieder auch Rudeln im Freien, auf Grasflächen und Viehweiden begegnet. Doch geht das Larvenschwein hauptsächlich Nachts seiner Nahrung nach. Wasser ist ihm stets Bedürfniß, vielleicht mehr um sich darin zu fühlen als zur Befriedigung des Durstes. Ihre meist geraden Wechsel führen oft mehrere Stunden weit bis zu Lachen oder Brunnengruben.

Die Nahrung besteht in Grünzeug, Zweigen und Wurzeln, Zwiebelgewächsen, wildem Steinobst und anderen Früchten, Leguminosen, Büschelmais, Larven von Käfern, Heuschrecken, wohl auch in Eidechsen, Fröschen und kleinen warmblütigen Thieren. Wenigstens sind die Larvenschweine sehr gierig auf Nas.

Die Setzzeit muß in den Anfang der Sommerregen fallen.

Anmerkung. Im wärmeren Abessinien, zwischen 5000 und 9000 Fuß Meereshöhe lebt noch eine zweite Wildschweinart, die ich *Nyctichoerus Hassama* genannt habe. Das Thier heißt tigr. Asama, in Amchara aber Hasama. Vergl. Verh. der Leop. Carol. Akad. XXX. p. 7. — Fitz. u. Heugl. Säugethiere p. 50.

### Fam. Nagelhufer (Lamnungua).

#### 72. Der Klippschliefer, *Hyrax habessinicus* (H. & Ehr.).

H. & Ehr. Symb. phys. t. II. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 59. et p. 19. — Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 316

v. Heuglin, Reise in Nordost-Afrika, II.

(*H. capensis*). Brehm, Habesch, p. 67. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 49. — Blanf. Abyss. p. 249.

Geez und tigr. Gehié. Amh. Askoko. Denk. Ikeio. Som. Djir-ad. Arab. Waber, žanem Beni Isræl; in Berber Qeqo und Qleidom (H. & Ehr.). Bedj. Qeqéh.

Ich bin nicht in der Lage nachzuweisen zu können, ob der Klippschliefer des Anseba-Gebietes und der Beni Amer-Berge mit der südafrikanischen Form, sowie mit den verschiedenen abessinischen „Arten“ (H. Brucei, Gray, H. Alpini, Gray, H. spec. nova, Blanf. Abyss. p. 257. und Euhyrax abyssinicus, Gray), endlich mit H. ruficeps, Ehr., H. Burtoni, Gray, und H. syriacus zusammengeworfen werden müsse, oder welche der genannten als eigene Species oder Rasse zu betrachten seien.

Im Schädelbau fand ich einige immerhin bemerkenswerthe Unterschiede zwischen *H. abessinicus* und *H. capensis* (Fauna R. M. p. 19). Die von mir in den Gala-Ländern gesammelten Exemplare scheinen mit *Hyrax spec. nova*, Blanf., einerseits, andererseits mit *H. syriacus* übereinzustimmen.

Zedenfalls steht fest, daß je nach den verschiedenen Aufenthaltsorten, nach Alter, Jahreszeit und Geschlecht die Klippschliefer namhafte äußerliche Verschiedenheiten bieten. Auch habe ich früher schon die Ansicht ausgesprochen, daß diese Thiere ein sehr langsames Wachsthum haben müssen und sich erst nach einer Reihe von Jahren vollkommen entwickeln. Ferner mache ich darauf aufmerksam, daß der Askoko gerne in Gesellschaft von Zebra-Mangusten und einer großen Eidechse (*Stellio cyano-gaster*) lebt.<sup>1</sup>

Man findet ihn gar nicht selten in den Gebirgen der Bischarin, Beni Amer und Habab, im Gebiet des Anseba, im Barkah und in ganz Habesch und Schoa, südwärts bis Tedjurah

<sup>1</sup> Brehm, Thierleben, II. p. 723.

und den Somal-Plateaux, auf 1500 bis 12000 Fuß Meereshöhe, sowohl in Felsklüften und Trümmergestein, als in Kirchen, Ruinen und Mauern. Hier haust er jahraus jahrein, zuweilen in größeren Familien, oft bis zu 20 Stück beisammen. Morgens und Abends verläßt er seine Schlupfwinkel, die fuftief mit Unrat angefüllt sind, und begiebt sich in das Geestrüpp und auf überhängende Bäume, um ungeheure Mengen von Blättern und jungen, grünen Zweigen zu verzehren. Ueber die heißeste Tageszeit ruht der Aschföto dagegen in seinen Höhlen verborgen. Sonst treibt er sich auf Gesimsen, Mauerzinnen und Balken herum, wo er gewandt klettert und sich gerne sonnt, oder in drolliger Weise seinen Pelz reinigt. Ueberrascht man diese harmlosen Thiere, so flüchten sie mit großer Gewandtheit in Felslöcher, sonst sind ihre Bewegungen meist gemessen, ihr Gang vollkommen bärenartig. Auf steilen Felsplatten und schräg gewachsenen Baumstämmen sah ich oft einen Klippschleifer mit Sicherheit abwärts schreiten, d. h. mit dem Kopfe voran. Die Stimme besteht in einem eigenthümlichen Knurren und Wellen.

Das Fleisch wird von manchen Eingeborenen gegeßen und ich fand dasselbe ziemlich schmackhaft.

### Ord. Wiederkäuer (Ruminantia).

#### Fam. Höhlhörner (Cavicornia).

##### 73. Die gemeine Gazelle, Antilope Dorcas (Licht.).

*Gazella isabella*, Gray. — Lichtenst. Darstell. t. 5. — *Antilope dorcas*, var. *A. Isidis*, Sund. — Wagn. Schreb. Suppl. V. p. 403. — Blanf. Abyss. p. 261. pl. 1. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 60. — Brehm, Habesch, p. 65. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 55.

Arab. *żazaleh*, auch *Dábi*. *Maf.* und *tigr.* Schoquen.  
Bedj. *Qanai*. *Danak*. *Woir-ari*. *Som.* Dero. *Berb.* Qel.

Einzeln, paar- und familienweise im Flachland und der Steppe, fehlt jedoch im Gebirg gänzlich.

Sehr häufig namentlich um *Masaua* und die Bucht von *Adulis*, besonders während der Winterregenzeit.

Anmerkung. Die arabischē Gazelle, *Antilope arabica*, Licht. — *Antilope Cora*, H. Smith. — *Gazella Dorcas*, Gray. — *Antilope doreas*, var. *arabica*, Sund. — Licht. Darst. t. 6. — Wagn. Schreb. Suppl. V. p. 403. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 61.

Arab. wie die vorhergehende *żazāleh*, wie es scheint auch Ariel.

Ich kann nicht mit Bestimmtheit angeben, ob diese Form oder Art unser Beobachtungsgebiet berührt.

Eine weitere hierher gehörige Form oder Art ist *Antilope Spekei*, Blyth. (Journ. As. Soc. of Beng. 1865. XXIV. p. 269. — Blanf. Abyss. p. 261. pl. I. f. 5 u. 5a) von der Sauahel-Küste.

#### 74. Die glattfüßige Gazelle, *Antilope laevipes* (Sundev.).

*Gazella rufifrons*, Gray. — *Antilope Corinna et A. Kevella*, Pall. — *A. leptoceros*, Heugl. (nec Wagn.) Verh. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 6.

Arab. *Abu el H'arabat*.

Paar- und familienweise in Nubien, Kordofan, Senar, Takah; ferner bei Sauakin und in den Ebenen und Vorbergen der Beni Amer bis auf 1500 Fuß Meereshöhe ansteigend.

Durch Mangel der Kniebüschel, sehr zierliches, wenig gebogenes Geweih und auffallend breiten schwärzlichen Flankenstreif ausgezeichnete Art.

75. Die schwarzschwänzige Gazelle, *Antilope tilonura* (Heugl.).

*Antilope melanura*, Heugl. (nec Bechst.) Verh. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 6.

Tigr. Telbadu.

Rudelweise in buschreichen Ebenen des Afiseba-Gebietes auf 2500 bis 5000 Fuß Meereshöhe, wo ich der Dorcas-Antilope niemals begegnet bin. Starke Böcke erreichen fast die Größe von *Antilope Soemmeringii*, auch das Gehörn der Böcke hat viel Ähnlichkeit mit demjenigen der letztgenannten Art. Färbung ähnlich wie *A. laevipes*. Die Hufe sind weit stärker als bei *A. Dorcas* und ohne die schwarze Zeichnung an der Wurzel des Hufrückens. Die Färbung der Oberseite verläuft noch etwas in die Basis des Schwanzes; der übrige Theil des langen Schwanzes kohlschwarz, dieser mit Pinsel  $9\frac{1}{2}$ " bis 10" lang.

Anmerkung. Zu den eigentlichen Gazellen gehört noch eine weitere ganz charakteristische Art, nämlich die langhörnige Gazelle, *Antilope leptoceros*, Cuv. — *A. leucotis*, Wagn. *A. Abu Haráb*, Heugl. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. p. 422 u. V. p. 407. — *Leptoceros Cuvieri*, Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 56.

Etwas größer als *A. Dorcas*, von fahl weißlicher bis isabeller Färbung, untenher nebst einem Theil der Außenseite des Ohrs, Nasenegend und ein Streif von der Nase über das Auge weg weißlich; Stirnmitte und Zügel (Rängstreif längs des oberen Theils der Wangen) roströthlich; Geweih sehr lang und dünn, fast gerade aufsteigend, mit sehr langer scharfer Spitze, die meist etwas wenig nach vorn gebogen; die einzelnen Stangen von der Wurzel ab fast parallel, in der Mitte bei einem vorliegenden Exemplar etwas divergirend, mit gegen einander gerichteten Spitzen, bei einem zweiten mit unregelmäßig aus einander gebogenen Spitzen. Die ungeringelte, ziemlich glatte

Spitze nimmt ein Drittheil der Länge ein, auf den übrigen zwei Drittheilen zähle ich 18 bis 20 Knoten, deren 2 oder 3 unterste am wenigsten scharf ausgeprägt sind.

Das Gehörn der Weibchen ist 11 bis 12 Zoll lang, das der Männchen wahrscheinlich beträchtlich länger.

Meines Wissens existirt noch keine Abbildung dieser reizenden und seltenen Art, weshalb ich eine solche hier befüge.

Heißt bei den Arabern Abu Haráb und findet sich in der libyschen Wüste in der Nähe der Matronseen und des Fajum; angeblich auch in Senar. Ich glaube sie wenigstens in der Nähe von Dongolah gesehen zu haben.

#### 76. Die Arab-Gazelle, Antilope Soemmeringii (Rüpp.).

*Gazella Soemmeringii*, Gray. — Cretschn. Rüpp. Atl. t. 19. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. p. 415. u. V. p. 405. — Blanf. Abyss. p. 260. — Brehm, Habesch, p. 145. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 62. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 55.

Arab. Om S'abah, auch Ariel. Maſ. Arab oder Hārab. Danaf. Bus-Adu. Som. Aul oder Awul.

Die Arab-Antilope bewohnt vorzüglich den Sahel, das Strandgebiet der afrikanischen Küste des Rothen Meeres südwärts vom 20. Grad n. Br. bis zum Danafil- und Somal-Land herab. Sie kommt jedoch auch im Barkah und am Atbarah bis gegen Berber hinüber vor, im Binnenland jedoch nicht in solch ungeheurer Menge wie in der Nähe der See. An der Mündung des Lebka-Thales in die Ebene und bis zum Fuß der Berge bei Allet, sowie namentlich um den Golf von Adulis trafen wir dieses schöne Thier noch allgemein, einzelner in den Flächen des oberen Tafkat und Aqra, sowie bei Af Abed; endlich soll sie sich auf der großen Insel Dahlak finden, vielleicht auch auf Soqodrah.

Lebt sowohl im offenen Steppenland, als im Buschwald und steigt zeitweise bis hart zum Meere herab. Die Nahrung besteht hauptsächlich in Kraut-, Salzpflanzen und Akazien. Die Wahl der Zeitung ist übrigens natürlich von der Jahreszeit abhängig. Die einzelnen Rudel ziehen sich Abends an geschützte Orte des Binnenlandes und zum Fuß der Berge zurück.

Ist im Sahel viel Regen gefallen und sind die Ebenen mit einer leichten Grasdecke bestanden, so finden sich die Arab-Antilopen in ganz unglaublicher Menge dort ein und man kann dicht gedrängte Rudel von mehreren Hunderten beisammen sehen.

Die Setzzeit muß in unser Frühjahr, spätestens in den Monat Mai fallen.

Im Allgemeinen sind diese Thiere, wie alle Antilopen, schüchtern und vorsichtig, namentlich an Dertlichkeiten, wo man ihnen viel nachstellt. Im Buschwald ist ihnen aber leichter beizukommen, ebenso an Wasserplätzen, welche die Wüstenantilopen übrigens weniger regelmäßig besuchen. Sie können offenbar mehrere Tage lang Durst leiden.

Die Bewohner des Sahel jagen die Arab-Antilopen meist durch vorsichtiges Treiben nach Plätzen, auf welchen Fußschlingen angebracht sind und nach denen verlappte Wechsel führen.

Anmerkung. Im Gebiet zwischen Barkah und dem Roten Meer scheinen nachstehende den oberen Niländern angehörige Arten noch nicht nachgewiesen zu sein:

1) Antilope Dama, Licht.

Arab. 'Adrah, auch Ledra und Ariel oder El Riel.

In den Steppenlandschaften von Dongolah, Berber und Nord-Kordofan, nach Küppell auch in Senar. Meist paar- und familienweise lebend, oft gemischt unter die Rudel gemeiner Gazellen.

2) Antilope (Aepyceros, Sund.) melampus, Licht.

Arab. Om Š'abah.

Im südlichsten Kordofan. Sehr häufig im Gebiet des Djur-Flusses und hier in großen Rudeln heisannen lebend.

### 77. Der Fiéqo, *Calotragus montanus* (Rüpp.).

*Antilope montana*, Cretschm. Rüpp. Atl. t. 3. — *A. brevicaudata*, Rüpp. M. 5. — *Calotragus montanus*, Sund. — *Scopophorus montanus*, Gray. — Knowsl. Menag. t. 5. — Wagn. Schreb. Säugeth. V. p. 431. — Blanf. Abyss. p. Amh. Fiéqo. Geez Waital. Arab. H'amra, Atrob, Otrob und Mor (?).

Einzelni in den Gebirgen von Menja und südlich von Masaua. Häufiger im mittleren Abessinien. Die Standorte wechseln zwischen 4000 und 10 000 Fuß Meereshöhe.

### 78. Der Klippspringer, *Oreotragus saltatrix* (Tem.).

*Antilope oreotragus*, Forst. — Lefeb. Voy. Abyss. t. 4. — Blanf. Abyss. p. 265. — Brehm, Habesch, p. 162. — *Antilope saltatrixoides*, Temm. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 436. u. V. p. 421.

Amh. und Tigrinia Sasa. Bei Masaua Qobtu. Tigr. Embiraqa und Humberhaqa. Bedj. Mašokib.

Der Klippspringer verdient jedenfalls einer besonderen Gattung einverleist zu werden, indem er sich nicht nur durch Gestalt, Färbung und rauhes sparriges Haarkleid von den übrigen Antilopen unterscheidet, sondern namentlich auch durch die Klaubebildung und Gangart. Nur die Spitzen der Schalen berühren die Erde, niemals setzt das Thier die ganze Unterseite der Klaue auf, daher auch seine eigenthümliche Fährte. Sehr niedlich und

leicht zähmbar sind die Jungen mit ihren klugen, schwarzen Augen und den verhältnismäßig sehr großen, am ganzen Rand mit einem eigenthümlichen Kranz von verlängerten, licht gefärbten, fast wolligen Haaren umgebenen Ohren, die meist ganz aufgerichtet getragen werden. Die schwarze Zeichnung an der Außenseite des Ohres tritt auffallend deutlich hervor.

Der Klippspringer hat eine sehr weite Verbreitung, doch ist er auf gewisse Dertlichkeiten beschränkt und lebt nur einzeln und familienviweise, niemals sehen wir denselben in Truppen. Er findet sich nur im Hochland, wie es scheint auf der ganzen ostafrikanischen Küste, nordwärts bis in die Berge der Beni Amer, von 1500 bis 13000 Fuß Meereshöhe. Allgemein ist er namentlich im Bogos-Land, in ganz Tigré und Amhara, hier jedoch nicht westlich vom Tsana-See; auch im Woro-Heimano und im District der Belu-Gala habe ich ihn noch bemerkt und einen Bock auf dem Walia-Dant dicht unter Bänken von ewigem Schnee geschossen. Hauptfächlich sind es Klüfte mit zahlreichen Felsblöcken und niedrigem oder höherem Buschwerk, welche dem Klippspringer zusagen, auch trifft man ihn gerne an zerrissenen, mauerartigen Steilrändern der Plateaux und selbst auf den Hochebenen, vorausgesetzt daß es nicht an Geröll und einzelnen freistehenden Klippen fehlt. Hier haust er jahraus jahrein auf einem ziemlich beschränkten Bezirke und oft in nächster Nachbarschaft eines oder mehrerer anderer Paare. Nur wenn die Miecke gesetzt hat, und so lange das Junge ihrer besonderen Pflege und Ohut bedarf, geht erstere gesondert vom Bocke und hält sich etwas mehr verbreitet. Die Setzzeit fällt in Abessinien ungefähr in den August oder September. Das Gehörn der Kitzböcke kommt erst nach Verlauf von einem Jahre zur Entwicklung. Die Standorte der Sasa befinden sich meist auf steilen Felsgesimsen, welche die Thiere mit außerordentlicher Sicherheit erklettern. Dieselben sind im Stande, frei eine senk-

rechte Höhe von 4 bis 5 Fuß mit einem Sprunge zu erreichen. Noch viel beträchtlichere Wände erklettern sie ebenfalls so zu fagen in einem Satze, das heißtt, ohne zu einem neuen Sprung auszuholen, dabei giebt jeder Schlag der stahlhartten Schalen einen fast metallischen, kurzen Ton von sich.

Wittert der Bock Gefahr, so bläfft er unruhig und unwirsch, setzt auf den höchsten Felsgrat und äugt. Gedenfalls ist übrigens auch der Gehörs- und Geruchssinn sehr ausgebildet. Von plötzlich überraschten Männchen hörte ich öfter einen scharfen pfeifenden Laut, ähnlich dem Warnungsruf der Gemse.

Die Haltung gleicht derjenigen des Rehbocks, nur wird der kurze, kräftige Hals meist noch aufrechter getragen. In den Vormittagsstunden äßt das Paar womöglich in mit Felstrümmern bedeckten Hochhälern und Klüften. Die Nahrung besteht nach meinen Erfahrungen mehr in Gräsern und anderen Krautpflanzen, als in Laub und Knospen von Büschchen oder Bäumen. Erst nach Sonnenuntergang, wenn die Dämmerung bereits herein gebrochen, kehren die Thiere zu ihren Standorten, wo sie die Nacht zubringen, zurück.

Gerne hält eines derselben auf irgend einem vorragenden Punkte Wache, während das andere ruhig weidet. Auf der Tränke habe ich den Klippspringer niemals beobachtet.

Geht man ihn plötzlich auf, so sucht er womöglich mit einigen enormen Sägen einen Felsblock zu erreichen, auf dessen Gipfel er anhält und sich nach seinem Feind umsieht, um schon nach wenigen Secunden im Gestein zu verschwinden. Meist flüchten die Tiere übrigens nicht weit, sind jedoch, wenn sie einmal beunruhigt würden, sehr vorsichtig. Das Wildpret fanden wir meist trocken und hat dasselbe einen eigenthümlichen Bisamgeruch.

Ich gebe hier noch die Maße des alten Bockes: Ganze Länge von der Schnauze zur Schwanzspitze 2' 6". Höhe im

Widerrist 1' 9". Kopf 5". Größte Stirnbreite 3" 3"". Ohr 2" 10"". Gehörn 3" 8""; Schwanz mit Haaren fast 5".

Das schwarze Geweih ist nur an der Wurzel geringelt; seine Spitzen etwas nach vorwärts gerichtet.

### 79. Die Windspiel-Antilope, *Nanotragus Hemprichianus* (Ehr.).

*Antilope saltiana*, Cretschn. Rüpp. Atl. t. 21. — Ehrenb. Symb. phys. I. t. 8. — Licht. Darstell. t. 16. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 452. u. V. 415. — Blanf. Abyss. p.

Heißt bei Masaua Beni Isr'aël. Tigr. Atro. Tigrenia Endšu. Bei Kasalah und am Setit Diqdiq. Danač. Séqéré. Som. Saqaro.

Sehr häufig trifft man diese niedliche kleine Antilope im Küstengebiet, nordwärts bis zu den Bergen der Beni Amer, westwärts bis Takah hinüber. Doch liebt sie weniger die kahlen Strandgegenden, als Buschwald und Vorberge, wo sie bis auf 5000 Fuß Höhe erscheint.

In Rudel vereinigt habe ich den Endschu nie beobachtet, doch ist er an geeigneten Orten allgemein und häufig, meist in Paaren oder kleinen Familien.

Sie sind von äußerst lebhaftem, beweglichem Wesen, ungemein flüchtig und gewandt, sowohl im Laufen als im Setzen und Klettern, dabei jedoch wenig schüchtern, daher ganz leicht zu erlegen.

Die Setzzeit fällt in den Juni und Juli, selbst im August sind ich noch trächtige Gaisen. Ihre Lieblingsaufenthaltorte sind dicht mit Büschen und Krautpflanzen bestandene Hänge, aber sie besuchen gerne auch die Betten der Regenströme und Wasserplätze. Zur heißesten Tageszeit ruht das Paar gemeinschaftlich mit eingeschlagenem Hals und Kopf unter überhängenden Wurzeln, im Gestrüpp und im Schatten von Felsblöcken.

Vom plötzlich aufgeschenchten Bock vernimmt man zuweilen einen eigenthümlichen feinen, hohen und etwas zirpenden Warungsruf, der wahrscheinlich durch Ausstoßen von Luft durch die Nasenlöcher hervorgebracht wird.

#### 80. Die Midaqua, *Cephalolophus Madoqua* (Rüpp.).

*Antilope Madoqua*, Rüpp. Wirbelth. t. 7. f. 2. — *Antilope Madoka*, H. Smith. — *Modoqua Antilope*, Bruce, Trav. VII. t. 56. — *Antilope Saltiana*, Blainv. — *Wagu*. Schreb. Säugeth. IV. p. 449. u. V. p. 422. — *Blanf*. Abyss. p. 267.

Geez Orna. Amh. Midáqua. Tigr. Qalbadu und Denanid, auch Mídaq. Maf. Danido. Sudan-Arab. Om odrud (??).

Angeblich in den Gebirgen des nördlichen Abessiniens, ohne Zweifel auch im östlichen Täfah.

#### 81. Der Bohor oder Nagyr, *Cervicapra redunca* (Pall.).

*Antilope redunca*, Pall. — *Antilope Bohor*, Rüpp. — *A. redunca*, Rüpp. Abyss. Wirbelth. t. 7. — *Antilope redunca et Bohor*, Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 425. u. V. p. 431. u. 432. — *Eleotragus redunca*, Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 11. — *Redunca Bohor*, Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 58. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 64. Amh. Bohor.

Soll an den Gehängen des Ostatfalls der abessinischen Gebirge vorkommen; wohl auch im südöstlichen Täfah. Ich bin dieser stattlichen Art hauptsächlich in den buschigen Ebenen um den Tsana-See, sowie in Begemeder begegnet.

In meinen Tagebüchern finde ich noch eine Notiz über eine zweite wohl zu dieser Gruppe gehörige Art von Setit und führe dieselbe vorläufig hier auf als

82. Der Odrob, *Cervicapra* (?) Odrob.

Arab. Odrob oder Ozrob.

Totalfärbung hirschbräunlich bis gelbbraun. Nur das Männchen gehörnt. Die Hörner in der Richtung der Stirn gerade aufwärts steigend, von ihrer Mitte an etwas vorwärts gerichtet, die Spitze selbst nur wenig nach hinten sich neigend; Geweih ungeringelt, schwärzlich. Größe des Bockes nicht ganz die der Antilope *Dorcas* erreichend.

83. Die Defasa, *Kobus Defassa* (Rüpp.).

*Antilope Defassa*, Rüpp. Abyss. Wirbelth. t. 3. — Wagn. Schreb. Säugeth. IV. p. 423. u. V. p. 435. — *Cervicapra Defassa*, Sund.

Ämth. Defasa (nicht Defassa, wie Rüppell fälschlich schreibt). Arab. Om hetéhet. In Kordofan nach Rüppell Bura und Chora.

Diese stattliche Antilope lebt in kleinen Rudeln in den buschigen und waldigen Niederungen um Qasabat, am Mareb, ostwärts bis zum Abfall der Berge von Dembelas. Ich fand sie im Allgemeinen weniger schüchtern als ihre Gattungsverwandten, doch ist sie schwierig zum Schnß zu bringen, wenn sie einmal flüchtig wird. Auf der Morgen- und Abendpürsch im Hochgras der Waldgürtel und Regenströme haben wir mehrere dieser Thiere zu erlegen Gelegenheit gehabt.

Anmerkung. Von der Defasa wenigstens als Local-Rasse zu unterscheiden ist wohl *Kobus Singsing*, Gray. — *C. ellipsiprymnus*, Heugl. (nec Ogilby) vom Baher el abiad. — Vergl. Heugl. Verh. der Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 15. Nr. 20. — Slat. Proc. L. Z. S. 1864. p. 102. c. fig.

84. Baker-Antilope, *Hippotragus Bakeri* (Heugl.).

*Aegoceros Bakeri*, Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 61. — *Hippotragus Bakeri*, Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 16. Nr. 22. t. 2. f. 6a u. b. — Sclat. Proc. L. Z. S. 1868. p. 214. pl. XVI.

Arab. Abu Maäref. Amich. wahrscheinlich Woadembi (?).

Diese stattliche Antilope, welche möglicher Weise mit Antilope equina oder A. leucophaea zusammenfallen könnte, findet sich familienweise im Buschwald und Hügelland des oberen Barkah, am Setit, Baher Salam, Atbarah, namentlich häufig um den oberen Nahad und Dender, im Wolkait und Ermatshöho, wohl auch in der Ebene des Tana-Sees und im nördlichen Godscham. Endlich beobachtete ich am unteren Weißen Nil im Gebiet der Baqarah eine Pferd-Antilope von graugelblicher Farbe.

Die von mir früher gegebene Diagnose von *Hippotragus Bakeri* (Verh. Leop. Carol. Akad.) ist insofern unrichtig, als ich dem alten Bock drei dunkle Schulterstreifen zuschreibe. Diese Angabe beruhte auf den Aussagen eines arabischen Jägers; auch glaubte Sir S. Baker sich zu erinnern, daß er eine ähnliche Zeichnung mit dem Fernglas beobachtet habe. Doch scheint selbst das ganz ausgefärbte alte Männchen nur einen schwärzlichen Rückenstreif zu haben.

Ich lasse nachstehend die ausführliche Beschreibung eines jüngeren männlichen Exemplars folgen und füge zugleich die Abbildung des Kopfes bei.

Totalfärbung licht röthlichgrau mit einem Stich ins Choco-ladefarbige; Hals und Widerrist bemähnt; Mähne steif, aufwärts gerichtet, rostbraun; über den ganzen Rücken ein rostbräunlicher Streif; Stirn und Außenseite des Ohres isabellröthlich; Ohrenspitzen schwärzlich; die sehr kräftigen Läufe rostbraun, Hinterseite der Fesseln bis über die Afterklauen circumscript schwarz; Gegend



§ ferd.-Kuduope (Hippotragus Bakeri).

II. Seite 110.



über dem Knie des Vorderfußes schwärzlich; auch Rückseite des Hinterfußes längs des ganzen Laufes verwaschen schwärzlich; Schwanz ziemlich lang und buschig, schwarz; nackte Aftergegend fleischfarbig; Maulgegend und Nasenkuppe weiß, ziemlich dicht und lang behaart; nackte Nasenspitze warzig, stets feucht, schwarz; über dem Auge und vor demselben sich nach der Oberseite der Wangen herabziehend ein deutlicher breiter weißer Streif; Nasenrücken rostbraunschwarzlich; zwischen Auge und Nase (vor dem weißen Supereiliastreif) ein aufgelöster schwarzer Fleck; Kinn und Kehle weißlich; Auge ziemlich groß, klar, braun; das Weisse des Augapfels violett-fleischfarbig überlaufen; Brust und Unterleib schmutzig weißlich, ebenso Innenseite der Hinterbeine; Gehörn horngrau-schwärzlich, wenig nach rückwärts gebogen, bei dem beschriebenen Bock erst 6 bis 7 Zoll hoch. Der Kopf klein, zierlich, ziemlich spitz zulaufend, vor der Nase etwas eingedrückt; Ohren sehr groß, nicht eben breit, werden meist horizontal getragen und etwas sickelförmig nach hinten gebogen; Körper und Hals kurz, kräftig; der letztere an der Basis sehr hoch; Beine lang, stark; Klauen sehr breit.

Beim Liegen werden die Extremitäten, namentlich die vorderen, weit ausgestreckt. Trifft zuweilen auf den Vorderfüßen kneidend.

Die etwas schlappen Ohren werden viel bewegt. Stößt gern spielend vor- und seitwärts mit tief gesenktem Kopfe und gischt dabei wie ein wimmernder Hund; zuweilen stößt das Thier schnaubend Luft aus der Nase.

Die Fährte, welche dieses Thier macht, ist außerordentlich groß und breit.

#### 85. Die Beida-Antilope, Oryx Beisa (Rüpp.).

*Antilope Beisa*, Rüpp. Abyss. Wirbelth. t. 5. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 477. u. V. p. 436. — Blanf.

Abyss. p. 263. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 68. — Brehm, Habesch, p. 66.

Arab. Beida. Danač. 'Ari. Som. Beid. In Kordofan nach Rüppell Damma, doch bezieht sich diese Benennung wahrscheinlich auf eine andere Art.

Lebt paarweise und in Gesellschaften längs der afrikanischen Küste des Roten Meeres, etwa vom Wendekreis an südwärts. Nach Rüppell auch in Kordofan (?); endlich im Danakil-Land und im nördlichen Somal-Gebiet, wo ich selbst großen Herden einer Spez-Antilope begegnet bin. Liebt offene, mit niedrigen Büschchen (namentlich mit Salvadoria) bestandene Flächen und verirrt sich vom Sahel aus nur bis in die Vorberge. So sahen wir die Beida noch bei Af Abed. Da diese Thiere meist von dürrtem, trockenem Wüstengras leben, so sind dieselben genötigt, häufiger auf die Tränke zu kommen; sie nehmen aber nach Ansage meiner Jäger im Nothfall auch mit Brackwasser vorlieb.

Im Allgemeinen gehört die Beida nicht zu den schüchternen Antilopen, sie wird selten flüchtig und begnügt sich, wenn sie sich verfolgt sieht, eine gewisse Distanz zwischen sich und ihrem Feind einzuhalten.

Beim Laufen ist der Schweif in beständiger Bewegung, ebenso die Ohren, wohl der lästigen Fliegen wegen. Selbst der Hörner bedienen sich diese streitbaren Thiere viel zum Kratzen der Haut und zum Abwehren der Insecten.

Aus der Ferne gesehen, scheinen die Alten im Sommer fast milchweiß, die Kälber sind dagegen rehfarbig (grau-rostbraunlich) mit dunkler rostbrauner schrägem Streif durch das Auge und eben solchem Fleck auf dem Nasenrücken und an der Außenseite des Vorderfußes; Kopf, Hinterhals und Rückenmitte etwas bemähnt.

Das Winterkleid der alten Thiere zeigt ebenfalls stets einen mehr oder weniger intensiven rostiggrauen Ton.

Aus den fast ganz geraden und sehr scharfspitzen Hörnern verfertigen die Somalen Stoßwaffen.

Anmerkung. Ich halte es kaum für wahrscheinlich, daß die Säbel-Antilope, Oryx ensicornis, Ehr. (*Antilope leucoryx*, Licht. nec Pall. Abh. der Berl. Akad. 1824. t. 1. — Licht. Darstell. t. 1. — Hempr. & Ehr. Symb. phys. I. t. 3. — *Antilope Algazella*, Rüpp. — *Antilope Tao*, H. Smith. — *Antilope (Oryx) ensicornis*, Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 479. u. V. p. 437) den Atbarah ostwärts überschreite. Sie ist allgemein im nördlichen Senar und Kordofan, in der Baiuda-Steppe und im südlichen Nubien. Diese Art fällt wahrscheinlich mit der westafrikanischen Antilope Gazella, Pall. (*A. bezoartica*, H. Smith) zusammen, wohl auch mit der asiatischen *A. leucoryx*, Pall. — Heißt auf Arabisch Wah's el Baqer.

Ebenfalls mehr auf das Nil-Gebiet und die libysche Wüste beschränkt, dort aber bis gegen die Mittelmeerküste nordwärts sich verbreitend, den Meridian von Berber oder Chartum südwärts jedoch nicht überschreitend ist die Mendes-Antilope, Addax nasomaculatus, Blainv. (*Antilope Addax*, Licht. Berl. Abhandl. 1824. t. 2. — Licht. Darstell. t. 2. — Rüpp. Zool. Atl. t. 7. — *Oryx Addax*, H. Smith. — *Oryx suturosa*, Otto. — *Oryx nasomaculata*, Blainv. — *Antilope mytilopus*, H. Smith. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 486. u. V. p. 437. — *Addax nasomaculatus*, Gray. Knowsley, Menag. t. 18.)

Der arabische Name dieses schönen Thieres ist Baqer el wah's. In Nubien heißt dasselbe 'Akaš. (Nach Ehrenberg Abu 'Akaš) Koptisch Ti-Dachsi, daher der 'Addax des Plinius.

#### 86. Der Kubu, *Tragelaphus strepsiceros* (Pall.).

*Antilope strepsiceros*, Pall. — *Damalis strepsiceros*, H. Smith. — Wagn. Schreb. Säugeth. IV. p. 445. u. V. p. 440.

— Peters, Mozamb. Säugeth. p. 190. — *Strepsiceros capensis*, Harr. Portr. t. 20. — Smith, Ill. S. Afr. Zool. I. t. 42. 43. — *Strepsiceros excelsus*, Sund. — Heugl. Fauna R. M. p. 16. — *Strepsiceros Kudu*, Gray. — Knowsley, Menag. t. 24. f. 2. — Rüpp. N. Wirbelth. p. 26. — Brehm, Thierl. II. p. 539. — Brehm, Habesch, p. 167. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 61. — Heugl. Verh. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 19. — Blanf. Abyss. p. 270.

Arab. Nelet, Jeled und Miremreh. Im Ḥomran Ungutir. Amchar. Agazén. Tigr. und Maṣ. Garua, auch Nelet.

Wohl keine Antilope dürfte einen so ausgedehnten Verbreitungsbezirk innhaben als der Kudu; denn derselbe fehlt nur der Wüsten-, Sumpf- und der subalpinen Region Afrika's.

In unserem Beobachtungsgebiet erscheint er in den Districten der Habab nordwärts bis zu den Beni Amer, am Setit und oberen Atbarah, in Qalabat, Sarago, Ermetschoho, in ganz Abessinien, vom Samhar über Mensa und das Bogos-Land südwärts bis Schoa, im südlichen und östlichen Senar, Süd-Kordofan, am oberen Sobat und in den höher gelegenen Regionen um den Baher el abiad. Speke und Grant fanden ihn noch in Ugogo; ich sah seine Hörner in Tedjurah und im Somal-Lande. Wahrscheinlich gehört auch Denham's Antilope cervicapra aus dem centralen Afrika zu dieser Art.

Vorzugsweise bewohnt der Kudu Hügel- und Gebirgsland mit Buschwald und Hochgras, zwischen 1000 und 8000 Fuß Meereshöhe. Auch felsiger Grund mit Wildbächen und Höchbäumen sagt ihm zu, nicht aber die flache Steppe. Er lebt gern gesellschaftlich und findet sich in manchen Gegenden wirklich ungemein häufig. So mögen auf dem kleinen Plateau von Naqfa wohl mehr als 200 Stück stehen, noch zahlreicher trafen wir diese statlichen Thiere im oberen Lebka, an einzelnen Stellen um den Anseba, an der Gandoa und Schimfa. An geeigne-

ten Dertlichkeiten findet man sie jahraus, jahrein; andere verlassen sie jedoch während der Zeit der großen Trockenheit und Hitze. Auf Gehängen, welche mit Nabaq (*Zizyphus*) und Akazien (*Acacia spirocarpa*, *A. Ehrenbergii*, *A. ferruginea*, *A. arabica*, *A. mellifera*, *A. etbaica* etc.) bestanden sind, scheinen sich die Kudus besonders zu gefallen; aber auch Bambus-Dickichte, die Nachbarschaft von Euphorbien (*E. habessinica* und *E. Schimperii*), Aloe, Sansevieria, Dracänen, Delbäumen, Adansonien, Nigellien, Balanites, Weihrauch, Sterculien, Balsomodendron und Combreten verschmähen sie keineswegs. Ihre Lieblingsnahrung besteht in Zweigen, Knospen und Blättern von Akazien und Dattelpflaumen, in Gramineen und Krautpflanzen. Selbst die kahlen Zweige des Balsambaumes scheinen sie nicht zu verachten.

Alte Böcke, welche sich durch ihre ehrwürdig dunkelgraue, der eines morschen Baumstammes gleichende Färbung auszeichnen, halten sich, die Brumftzeit ausgenommen, gewöhnlich getrennt von den Rudeln der Weibchen und Kälber; wir trafen zwar hin und wieder mehrere Männchen in unmittelbarer Nähe, doch ging jedes derselben besonders seiner Wege und hielt sich nicht zu seinen Nachbarn. Jüngere Böcke aber gesellen sich in Trupps von 4 bis 6 Stück zusammen.

Die Gebirge und Hügel, welche der Kudu vorzüglich bewohnt, dienen auch zahlreichen Biehherden zeitweise als Weidegründe. Durch diese wird eine unglaubliche Menge von Fliegen herbeigelockt, welche mit den Kühen von Park zu Park wandern und auch den Antilopen sehr lästig fallen, weshalb letztere am frühen Morgen die tiefer gelegenen Dertlichkeiten meiden. Die Nacht bringt der Kudu stets auf den Hochflächen zu. Während der Vormittagsstunden bemerk't man die Truppe der Weibchen und Jungen, sowie vereinzelte alte Böcke am oberen Rand der Thalkessel, in welche die Thiere, stets äzend, gemächlich herab-

steigen, während die Männchen, welchen überhaupt ein ruhigeres, mehr mürrisches Wesen eigen ist, sich noch weniger beeilen. Offene Thalgründe behagten ihnen weit mehr als engere Schluchten. Ich bin der Überzeugung, daß wenigstens zur Winterszeit die Böcke überhaupt zum großen Theil höhere Standorte einnehmen als die Thiere.

Bei den täglichen Wanderungen nach den Futterplänen werden keine regelmäßigen Wechsel eingehalten. Nur in Folge von Nachstellungen, oder wenn sie am Abend bergwärts ziehen, folgen diese Antilopen ihren bestimmten festen Wegen, welche häufig durch Felsrisse, Pässe und Klüste nach den Höhen führen, am Rande der letzteren aber in der Regel noch um Hügelköpfe herum und über schmale Felsgrate hin.

Auf der Weide benehmen sich die Altthiere und die Kälber ähnlich wie Rothwild, nur mit dem Unterschied, daß der Anden sich mehr an niederes Gestrüpp hält oder an der Erde grafft. Dies geschieht meist stehend oder im Vorwärtsschreiten. Dabei zeigen sich die Kuh weniger vorsichtig als der Bock. Letzterer hält sich, während er auf Nahrung ausgeht, am liebsten an etwas gedeckten Stellen und zwischen höheren Baumstämmen, und zwar oft stundenlang, ohne viel den Platz zu wechseln und scheinbar ohne sich besonders um seine Sicherheit zu kümmern.

Gesicht, Gehör und Geruchssinn sind in hohem Grade ausgebildet. Ueberrascht man den Bock plötzlich, so bleibt er einige Sekunden unbeweglich stehen. Wittert er einen Feind auf eine Entfernung von mehreren Hundert Schritten, so dreht er den gehobenen Kopf nach der betreffenden Richtung und äugt dann im Falle lange Zeit hindurch, ohne nur die mindeste Bewegung zu machen. Glaubt er beschlichen zu werden, so stiehlt er sich in größter Stille ab und birgt sich offenbar, ohne eigentlich flüchtig zu werden.

Wähnt er sich nicht sicher, ohne jedoch seinen Verfolger ins

Auge fassen zu können, so stößt er ein rauhes „Bah“ aus, welches in Zwischenräumen mehrfach wiederholt wird. Endlich sah ich öfter, wie diese Antilopen auf den Flug und das Geschrei der Vögel achteten. Lag ich mit dem Fernglase in der Hand auf überhängenden, verschiedenen benachbarte Gehänge beherrschenden Felsgesimsen auf der Lauer, so kam es vor, daß kurzschwänzige Raben über mich hinzogen, deren scharfes Auge kein auffallender oder fremder Gegenstand entgeht. Diese umkreisten dann schreiend mehrmals mein Versteck, und gleichzeitig konnte ich wahrnehmen, daß die Köpfe aller unter mir bisher in Ruhe ihrer Nahrung nachgehenden Kudus derselben Orte sich zuwandten und die Thiere sich dann lange nicht beruhigen wollten.

Aufgescheucht machen die Kudus einige Fluchten und trollen dann ein Stück weit in die Büsche, womöglich nach höher gelegenen Plätzen, von welchen aus sie sich nach ihrem Verfolger umsehen, um dann ihren Weg in die Berge fortzusetzen. Staubnenswerth ist ihre Kraft und Geschicklichkeit im Sezen über hohe Büsche weg, sowie die Fähigkeit, die steilsten Höhen mit Leichtigkeit zu erklimmen, während sie in den engen, dornigen Wechseln des Buschwaldes mit Gewalt sich Bahn brechen, ohne die Haut zu verletzen. Hierbei scheint dem Bock das mächtige Geweih sehr zu statthen zu kommen, indem er sich mittelst desselben offene Straße fegt.

Nach meinen Erfahrungen fällt die Brumftzeit auf das Ende der Sommerregen, etwa in den Anfang des September. Dann vernimmt man sowohl in den frühen Morgenstunden als gegen Abend das fürchterliche Gebrüll der Böcke, das mit dem Schreien des Rothhirsch's einige Ähnlichkeit hat, aber auch an dasjenige des Löwen erinnert. Das Thier setzt durchschnittlich im Juni.

Bei den Eingeborenen gilt das Wildpret als Leckerbissen. Dasjenige der Böcke fand ich aber stets trocken und sehnig,

schmacthafter das der Thiere und der Kälber. Nicht zu verachten sind namentlich Zunge und Mark.

Die Haltung der alten Männchen gleicht ebenfalls im Allgemeinen derjenigen des Hirsches, doch geht ihr ein gewisser Ausdruck von Kühnheit und Adel ab. Der meist wohlgenährte Körper erscheint, da er etwas mehr gestreckt ist, niedriger, auch werden Kopf und Hals gewöhnlich nicht so hoch getragen, sondern länger und waghäufiger ausgereckt. Ersterer hat vorn eine Art von Wamme, während beim Aehen das Widerrist buckelartig hervortritt. Der buschige Schwanz ist viel in Bewegung.

Man betreibt die Jagd auf den Kudu in mannigfaltiger Weise. Die Takarir (angesiedelte Neger aus dem Inneren Afrika's) von Dalabat und Sarago hetzen ihn mit arabischen Windhunden oder sie legen Fußschlingen. Die arabischen und abessinischen Jäger schießen ihn dagegen meist auf dem Anstand. Im südlichen Kordofan treibt man die Thiere in eingestellten Bahnen nach Fallgruben.

Während des Marishes sind wir nicht selten zufällig Rudus auf schußmäßige Entfernung nahe am Wege begegnet, namentlich zur Nachmittagszeit, wo die Thiere zuweilen auf offene Stellen heraustreten, um zu trinken oder um sich zu fühlen.

Die Jagd mit dem Schießgewehr erfordert natürlich ein gutes Auge und Erfahrung. In Gegenden, wo diese Thiere nicht selten sind, gelingt es einem geübten Beobachter in Kürzem, die Lebensweise und jeweiligen Aufenthaltsorte derselben kennen zu lernen.

In den Vormittagsstunden wird er dann am oberen Rand der Berge eine Stelle aussändig machen, welche zum Anstehen tauglich ist. Während der heißeren Tageszeit kann man die Bürsche im Tiefland versuchen, Abends die Rückwechsel besetzen. Ein anderer als Hinterhalt geeigneter Platz sind die Trinkstellen, deren Besuch die Antilopen regelmäßig einzuhalten pflegen.

Vorsicht und Ruhe ist namentlich beim Pirschgang erforderlich. Derselbe wird übrigens in den meisten Fällen wesentlich erleichtert durch die Bodenverhältnisse, indem der Kudu, wie schon gesagt, hauptsächlich coupirtes Terrain und Buschwald zu seinem Aufenthaltsort wählt; aber auf der anderen Seite kommt man hier viel mit Dornbüschchen in allzu intime Berührung, namentlich aber mit Gestrüpp und hartem Geröll, wo einiges Geräusch kaum vermieden werden kann. Auf solchen Jagdpartien bediente ich mich womöglich nicht selber, mit Näheln besetzter Stiefel, sondern weichsohliger arabischer Schuhe.

Die Aussicht auf Erfolg wird noch vermehrt, wenn der Schütze einen eingeborenen Jäger zum Führer wählt. Diese Leute verstehen auch trefflich, ein Thier zu umgehen und es dem Schützen durch Gängeln zuzutreiben.

Der Schech Atlan von Merdiba (am oberen Nahad) veranstaltete einst eine förmliche Treibjagd, an welcher sich vielleicht dreißig mit Lanzen bewaffnete und mit einigen Hezhunden versehene Schwarze betheilgten. Den Hauptwechsel besetzte ich. Meine Stellung dort war insofern eine höchst ungünstige, als der Platz, auf dem sich eine Anzahl von Wildpfaden kreuzte, sowohl mit Buschwerk als namentlich mit dichtem und hohem Steppengras bestanden war, so daß ich mit wenig Ausnahmen meist nur die Köpfe der gehetzten Antilopen zu Gesicht bekam.

Das ganze Treiben währte wohl kaum eine halbe Stunde, während welcher Zeit ich sieben Mal auf Kudus zu Schuß langte, von welchen allerdings nur zwei Stück auf dem Platze blieben. Bemerken muß ich noch, daß ich bei dieser Gelegenheit nur ein einziges Borderladergewehr, und zwar eine Schrotflinte, bei mir führte.

Aus den Häuten verfertigen die Eingeborenen Decken; die Hörner verwenden sie als Gefäße, um Pulver, Salz und Pfeffer aufzubewahren.

Inng eingefangen und bei angemessener Nahrung und Behandlung nimmt der Kudu bald einen hohen Grad von Zähmung an; auch verträgt er sich im Allgemeinen gut mit anderen Thieren.

### 87. Die Decula, *Tragelaphus Decula* (Rüpp.).

*Antilope Decula*, Rüpp. Abyss. Wirbelth. t. 11. — *Antilope (Tragelaphus) Decula*, Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 442. u. V. p. 443. — Heugl. Verhandl. Leop. Carol. Akad. XXX. II. Sep.-Abdr. p. 20. Nr. 30. t. 1. fig. 5. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 59.

Arab. Dokula (nicht Deeula). Arab. H'us. Im Ḥomrān Saqal.

Im oberen Barkah, namentlich aber am Setit und Baher Salam findet sich eine Busch-Antilope, welche ich für gleichhartig mit Antilope Decula, Rüpp., halte, welch letztere Art ich namentlich häufig um die Gehänge der Dembea-Ebene in Central-Abessinien angetroffen habe. Doch stimmen auch die von mir hier eingesammelten Bälge sowohl in Form als in Färbung nicht mit Rüppell's Beschreibung und Abbildung seiner Decula oder besser Dokula (vergl. meine Notizen in den Verhandl. der Leop. Carol. Akademie XXX. II. p. 20). Exemplare aus dem Ḥomrān sind noch heller olivengelblich und scheinen durchgängig kleiner als abessinische; die weiße Sattelzeichnung und Fleckung der Keulen variirt individuell ungemein und fehlt bei einzelnen Thieren fast gänzlich. Möglich, daß die Decula ein vom Sommerkleid abweichendes Winterkleid anlegt.

Anmerkung. Nach Petterick, Selater und de Bruyffenaere fäme *Tragelaphus sylvaticus*, Sparrm., im Gebiet des Weißen Nil vor (Selat. Proeceed. Lond. Zool. Soc. 1864. p. 105). Ich hatte Gelegenheit, in der Nähe des Ncq-Sumpfes und in Bongo eine ähnliche Form zu beobachten, die übrigens doch

wiederum einer anderen Art angehören dürfte. Leider konnte ich die damals präparirten Bälge aus Mangel an Transportmitteln nicht mit mir nehmen und gebe ich nachstehend die Beschreibung derselben nach meinen Tagebuchnotizen und nach einer nach einem alten Bock im Fleisch gefertigten Abbildung.

Thränengruben und Klauendrüsen fehlen. Inguinaldrüsen stark entwickelt. Hörner schwärzlich, fast 9" lang, in der Richtung der Stirn nach hinten aufsteigend, mit den Spitzen etwas vorwärts gebogen, dreikantig, mit einem spiralförmig gewundenen Kiel auf der Wurzelhälfte der Innen- und Vorderseite; ebenso auf der Wurzelhälfte deutlich, aber nicht tief geringelt. Ganze Länge bis zur Spize des buschigen Schwanzes 4' 8". Höhe des Widerristes 2' 6". Kopflänge gegen 10". Ohrhöhe 6"; Ohrbreite 3". Schwanz mit Quaste 10". Ueber den ganzen Rücken hin eine aufrechte Mähne von dunklen Haaren; Totalfärbung glänzend olivenbräunlichgelb, Kopf und Hals mehr bräunlichgelb; Nase schwarz; von der Mitte der Nasenkuppe führt ein schwärzlicher Streif auf dem Nasenrücken hin bis vor die Augengegend, wo er breiter wird und dann scharf dreieckig absetzt; Kinn, ein runder Fleck unter dem Auge, innere Behaarung des Ohres und Außenfläche der Ohrwurzel sowie Vorderhalsmitte weißlich; Ohren außen fast kahl, rauchbräunlich, innen nur am Vorderrande dicht und lang behaart, mit 2 bis 3 sehr deutlichen schräg gestellten Längshälften. An der Vorderhalsbasis ein weißes Querband von der Form zweier mit der Spize an einander gelegter Halbmonde, darunter ein schwärzlicher Längsstreif bis zum Brustbein. Quer über den Rücken 5 weiße Binden, die 2 vordersten kürzer als die übrigen und jederseits durch eine Längsbinde zu einem Sattel verbunden; an den Flanken zwischen den Vorder- und Hinterkeulen eine deutliche weiße Längsbinde; ein oder mehrere runde weiße Flecken vorn auf der Schulterblattgegend, eine grössere Anzahl solcher Flecken auf dem ganzen Hinterschlegel,

ein einzelner unter der Mitte zwischen der vierten und fünften (hintersten) Rückenquerbinde; Schwanz oben von der Farbe des Rückens, seitlich weiß, Unterseite und breite Spitze schwärzlich; vordere Hälfte des Unterleibes rauchfarbig; hintere trüb weißlich; Läuse innen weiß, außen fahl, an den Vorderfüßen außen und innen ein schwarzer, in der Mitte breiter, nach oben gabelter, nach unten weit hin sich zusätzender schwärzlicher Streif; Fesseln weit heraus schwarz, über der Mitte der Klauen und jederseits der Knöchel ein weißer Fleck; Klauen braunschwarz, zierlich geschnitten; Iris braun; Weibchen ungehörnt.

Dieses Thier heißt in der Djeng-Sprache Bor, in Bongo Towa, bei den Djur Búrah. Es lebt meist paarweise in Genden, wo viel Hochgras gedeiht, und im dichten Gebüsch von Bauhinien und Akazien, wo sich der Bor gern drückt und aufgescheucht in ungeheuren Sägen davoneilt. Der Kopf und Hals werden selten aufrecht getragen, der massive Hinterrücken sehr hoch. Das Wildpret fand ich ziemlich trocken und zäh.

Sollte sich diese Antilope als neue Art herausstellen, so schlage ich die Benennung *Tragelaphus Bor* vor.

Eine durch ihre eigenthümliche Klauenbildung ausgezeichnete Form vom Quellgebiet des Baher el abiad ist *Tragelaphus Spekei*, Sclat. (Proceed. Lond. Zool. Soc. 1864. p. 183. pl. XII.)

#### 88. Die Kuh-Antilope, *Aeronotus bubalis* (Cuv.).

*Antilope bubalis*, Cuv. — *A. (Bubalus) bubalis*, Wagn. Schreb. Säugeth. IV. p. 469. u. V. p. 444. — *Bubalis manitanica*, Sund. — *Boselaphus bubalis*, Gray. — Knowsley, Menag. t. 20. f. 1. — Heugl. Abhandl. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 21.

Amh. Tóra. Tigrenia Tori und Totel. Bel. Qaraqua. Im Senar Tétel.

Die Kuh-Antilope findet sich familien- undrudelweise in den Niederungen und an dem Fuß der Gebirge von Takah, im Gebiet der Beni Amer, im oberen Barkah, am Anseba, Albarah und seinen Zuflüssen und in den Tiefländern des nördlichen Abessinien, vielleicht auch in Senar und Süd-Kordofan. Sehr häufig trafen wir sie namentlich im Quellgebiet des Dender und Rahad und um Qalabat. Sie lebt gern in sumpfigem Terrain mit viel Hochgras und Unterholz, ist nicht besonders schüchtern, ja oft dummdreist, und besucht regelmäßig, namentlich in den Nachmittags- und Abendstunden, die einmal angenommenen Weide- und Trinkplätze.

Die Araber hetzen die Kuh-Antilope mit Windhunden und tödten sie mittelst Wurfslanzen. Auch mit der Büchse ist ihr nicht schwer beizukommen, besonders wenn der Jäger einigermaßen mit ihren Standorten und Wechseln bekannt ist.

Nach Aussage arabischer Jäger käme diese Art auch in der Gegend des Fajum und der Natron-Seen vor, nach Loche (Cat. des Mammif. Algér. p. 14) bewohnt sie die südlichen Provinzen von Algier.

Der Thierhändler G. Schmitzer, mit welchem ich auf der Rückreise von Massaua nach Sues zusammentraf, versicherte mich, er habe vor wenigen Jahren an den zoologischen Garten zu Berlin eine noch unbekannte Art von Kuh-Antilope eingeliefert, welche in der Gegend von Dokah in Ost-Senar erbeutet wurde. Meine Anfrage beim Director des zoologischen Gartens, Dr. Bodinus, über diese mathematisch neue Art ist nicht beantwortet worden.

Es leben übrigens außer den genannten noch mehrere Acronotus-Arten im Gebiet des Weißen Nil. Eine derselben, namentlich am Kir und Sobat heimisch, scheint mit A. Caama zusammenzufallen, die zweite hielt ich früher für letztergenannte Form, doch scheint sie wiederum abweichend, namentlich in Bezug

auf die Gestalt des Gehörns, das etwas an A. Liechtensteinii erinnert, aber krotiger und weniger gewunden ist. Letztere Art ist sehr gemein in den Ebenen der Neg-Neger bis zum Djur und Rosange hinüber, sie heißt bei den Djeng Lelwel, bei den Djur Burrah, bei den Dor Karjá. Das Thier mag vorläufig A. Lelwel benannt werden.

Ich gebe hier die Seiten-Ausicht des Gehörns von A. Caama und A. Lelwel.

Von einer dritten Species (?), die ebenfalls Lelwel benannt ist, besitze ich kein Horn mehr. Dasselbe gleicht ungefähr dem des Aeronotus bubalis, während die Färbung des Thieres mit A. Caama übereinzukommen scheint, indem ein deutlicher breiter, schwärzlicher Stirnstreif vorhanden ist, ebenso braunschwarze Zeichnung auf der Außenseite der Läufe. Erinnere ich mich recht, so divergiren die Hörner von der Basis ab sehr nach außen und hinten, die kurze Spitze knorrig nach vorn und oben.

Mehrere Arten einer nächstverwandten Gruppe, zur Untergattung Damalis gehörig, finden sich in Senar, Süd-Kordofan und längs des Baher el abiad, so Damalis senegalensis, H. Smith, Damalis Tiang, Heugl., und Damalis Tiaugriel, Heugl.<sup>1</sup>

Glieder einer zweiten sehr ausgezeichneten Gruppe bewohnen vorzüglich die Schilf- und Papyrus-Region des Sobat, Saraf und Baher Ghazal, nämlich Adenota Kul, Hengl.; Adenota leueotis, Licht. & Pet.; Adenota Wuil, Heugl.; Adenota Leche, Gray, und Adenota megaceros, Heugl.<sup>2</sup> Bei allen mir bekannten Arten dieser Untergattung ist das Männchen auffallend größer und hünter, theilweise schwarz gefärbt, das Weibchen ungehörnt, einfarbig hirschartigbraunlich.

Die Steppenländer des Kır- und Ghazalflusses beherbergen


<sup>1</sup> Vergl. Abh. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 22. t. 1 u. 2.

<sup>2</sup> Vergl. Abh. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 12 bis 14. t. 2.




Gehörn von Antilope Acronotus Lelwel.

II. Seite 124.



Gehörn von Antilope Acronotus Caama.

II. Seite 124.



endlich eine oder zwei Arten von Elen-Antilopen, Taurotragus Livingstonii, Slat., und Taurotragus gigas, Heugl., vielleicht auch Taurotragus orcas.<sup>1</sup> In den Bergen des südlichen Senar soll ein Gnu (wohl Catoblepas gorgon) auftreten.

Unbestimmte Nachrichten wurden mir über folgende Antilopen Nordost-Afrika's:

1) Cervicapra eleotragus, Schreb. Angeblich am Sabat und Kir.

2) Eleotragus sp.? Arab. el Chondiéh. In Ost-Kordofan.

3) Cephalologus mergens, Blainv. Am Baher Ghazal.

4) Eine sehr kleine, in den abessinischen Hochländern heimische Art, die Rüppell in Semien, ich wahrscheinlich bei Gondar beobachtet. Ersterer hält sie für Cephalolophus pygmaeus, Pall. Das von mir gesehene Thier hat eine graublauliche Färbung, trägt den Kopf immer tief gesenkt, das starke Hinterbeil dagegen hoch, ganz wie ein Moschusthier.

5) Acronotus sp.? Amchar. Soada. Im nordwestlichen Abessinien.

6) Hippotragus sp.? Amq. Worobo. Hirschfarbig mit schwarzer Mähne, starkem aber kurzem Gehörn. Gesellschaftlich am Tana-See, in Godscham und Agad vorkommend.

7) Calotragus sp.? Arab. Mor, Morr. In den Bergen westlich von Fazoql.

8) Antilope sp.? Arab. Om zat. Ähnlich der Antilope Dorcas, jedoch kleiner.

9) Antilope sp.? Arab. el Hamrah. Baiuda-Wüste, Kordofan.

10) und 11) Adenota oder Cephalolophus, zwei Arten,

<sup>1</sup> Abb. Leop. Carol. Akad. XXX. II. p. 16. — Henglin, Reise in das Gebiet des Weißen Nil, p. 318. — Slat. Proceed. Lond. Zool. Soc. 1864. p. 105.

bei den Djeng Amok benannt, von sehr dunkler Färbung. Baher el abiad.

Dr. Schweinfurth hat nach gefälliger schriftlicher Mittheilung im Gebiet westwärts vom oberen Nil noch mehrere neue Antilopen angetroffen, deren Beschreibung noch nicht veröffentlicht ist.

#### 89. Der arabische Steinbock, *Aegoceros Beden* (Forsk.).

*Capra Ilex Baeden*, Forsk. — *Capra arabica*, Mus. Vindob. — *Capra muliana*, Fischer. — *Capra sinaitica*, Ehr. Symb. phys. II. t. 18. — *Aegoceros Beden*, Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 494. — Rüpp. N. W. Abyss. p. 26. — Heugl. Fauna R. M. p. 16. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 66.

Arab. Beden. In Syrien Wa'el; in Egypten auch Tetal; im nördlichen Nubien Kebsch el djebel und Neqer; bei den Bedjäh E'u<sup>1</sup> oder E'o.

Der Verbreitungsbezirk des arabischen Steinbockes beschränkt sich nicht nur auf Syrien und Klein-Affien, das nordwestliche Arabien, die sinaitische Halbinsel und die Gebirge zwischen Sues und Berenice troglodytica (Nas Benas). Er findet sich weiter südwärts in den Bergen der Ababdeh und Bischarin, in der Wüste von Korosko, zwischen Sauakin und Berber, bis zum Barkah hinaüber und vielleicht noch jenseits desselben, namentlich um das Thal von Langheb. Selbst auf dem Djebel Haraza im nördlichen Kordofan soll ein hierher gehöriges Thier vorkommen.

<sup>1</sup> Nach Lepsius (Standard-Alphabet p. 61) würde in den Bedjäh-Sprachen der Buchstabe ?Win gänzlich fehlen. Die Bewohner des unteren Barkah und der Gegend von Sauakin, deren Dialekt allerdings nicht unbedeutend von dem der Bischarin abweicht, bedienen sich jedoch eines ähnlichen explosiven Consonanten.

Nach der Ansicht mancher Gelehrten ist Aegoceros Beden gleichartig mit Aeg. Walie, Rüpp.; Wagner (Schreb. Säugethiere, Suppl. IV. p. 193) sagt dagegen, der Walie sei größer, lang- und rauhhaariger und der Bart kürzer.

Die Verschiedenheit in der Structur der Haare mag vom Standort abhängig sein, wie denn auch das Winterkleid des Beden sowohl in Bezug auf Färbung als Dichtigkeit und Länge der Haare sehr von dem Sommerkleid abweicht. Die Gehörne der Walie-Böcke schienen mir massiver als diejenigen des Beden, sie stehen ihnen aber auch zuweilen an Länge nicht nach. Dagegen ist die Form des Hornes etwas abweichend und zeichnet sich der Schädel der Walie durch eine höhlerartige Aufreibung auf dem Scheitel unmittelbar vor der Basis des Geweihes aus. Die eigenthümliche bunte Zeichnung der Füße ist bei beiden Formen dieselbe.

Das Gehörn des Beden erreicht zuweilen eine Länge von mehr als 3 Fuß (im Bogen gemessen), es ist von dunkel- und trüb graugrüner Farbe; bei alten Böcken stehen die Knoten zumeist paarweise. Je länger das Horn, um so mehr comprimirt sind die Seitenflächen, die innere sogar häufig eingedrückt (concav). Bei sehr alten Männchen weicht die Form der einzelnen Stangen insofern ab, als sich dieselben von der Wurzel an nicht gleichförmig in einem Halbkreis nach hinten abbiegen, sondern ein gutes Stück weit gerade aufsteigen.

Ich vermuthe nach den durch mehrere Jahre an einem gezählten Bock gemachten Beobachtungen, daß am Geweih alljährlich, bis zu einem gewissen Alter wenigstens, ein neuer Doppelknoten ansetzt.

Der Beden lebt zumeist gesellschaftlich. Zuweilen schaaren sich Rudel von mehr als zwanzig Stück unter Leitung eines alten Bockes zusammen. Sie sind im Allgemeinen Gebirgsbewohner und ziehen sich namentlich zur Abendzeit auf die steil-

sten Felsgesimse zurück, die sie nicht sehr früh zu verlassen scheinen. Gegen 10 Uhr Vormittags begegnet man ihnen in den weiten, offenen und grasreicherem Hochthälern. Zur Zeit der Winterregen rücken diese Thiere aber noch mehr in die Tiefe herab. Ihre Standorte wechseln zwischen 3000 und 6000 Fuß Meereshöhe. Das Wildpret der Alten, vorzüglich der Böcke, ist zäh, hart, schwarz und von höchst penetrantem Geruch, den es selbst durch Auslaugen nicht verliert.

Dort, wo dieses Wild der Verfolgung nicht ausgesetzt ist, fand ich dasselbe nicht gerade auffallend schüchtern. Vorzüglich die Gaisen, welche auch stets beim Neßen vorangehen, kümmern sich wenig um einen fremden Gegenstand oder um ein zufälliges Geräusch, während der Bock fleißiger äugt.

Jede Familie oder jedes Rudel hat seine bestimmten festen Wechsel, die jedoch selten durch Klüfte führen, sondern meist an den steileren Hängen und treppenartigen Kanten der Felsen hin. Mit Vorliebe besuchen sie diejenigen Stellen der Hochhäuser, wo viele Felsblöcke zerstreut liegen. An solchen Plätzen ruhen die Thiere während der Nachmittagsstunden, um zu käuen. Im Frühjahr findet man um die Lager ganze Polster von Winterhaaren, die nicht selten auch an Felskanten hängen, wo sich das Wild gern reibt.

Die Araber behaupten, daß die einzelnen Gesellschaften stets Wachen aussetzen. Dies habe ich nie zu bemerken Gelegenheit gehabt, dagegen häufig gesehen, daß die Böcke, wenn die Herde flüchtig geworden, auf hervorragenden Punkten Umschau halten, während die Gaisen Schutz und Deckung im Gestein suchen.

Die Flucht findet immer bergwärts statt, sie ist jedoch nur im ersten Augenblick der Überraschung eine hastige und ungeordnete und der durch das Klappern der Schalen am Gestein, durch das in Masse los werdende und herabfallende Geröll bewirkte Lärm ein gewaltiger.

Die Gezeit muß in den Mai oder Juni fallen. Die Jungen mäckern wie Zicklein, sind drollig in ihren Bewegungen und spielen gern, auf Felsblöcken sich herumtummelnd, aber das große Auge mit gespalterner Pupille verleiht ihnen einen etwas stupiden Ausdruck.

Vom Bock vernimmt man zuweilen einen sonderbaren, etwas gezogenen Laut, der durch Ausblasen von Luft aus den möglichst zusammengepreßten Nasenlöchern zu entstehen scheint und entfernte Nehnlichkeit mit dem Lachen der Neßligen hat.

Die Bischarin erzählen, daß die Kobolde und Berggeister, welche die Schäze der alten Goldminen ihrer Heimat hütten, auf Steinböcken reiten; auch ist unter den eingeborenen Jägern der Glaube allgemein verbreitet, daß Böcke, welche bis zu den höchsten Gebirgsgraten verfolgt und dort in die Enge getrieben werden, sich auf die Hörner in die Tiefe stürzen, ohne Schaden zu nehmen.

In Klein-Afien sah ich mächtige Gehörne eines Steinbockes, welche angeblich aus der Gegend von Brusa gebracht wurden. Sie waren von schwärzlicher Farbe, breiter und noch mehr plattgedrückt als diejenigen des Beden.

Wie der europäische Steinbock, so paart sich der Beden gern mit Ziegen, wie denn auch der zahme Bock die Gaisen von dieser Art beschlägt. Die erzielten Bastarde sind fortpflanzungsfähig und sie gleichen stets mehr dem Beden als den genannten Hausthieren, sowohl in Gestalt, als in der Zeichnung und in der Form des Gehörnes und in ihrem Wesen.

Der arabische Steinbock läßt sich überhaupt leicht zähmen und hält in der Gefangenschaft selbst ohne besondere Pflege lange aus. Heufütterung und etwas Getreide sagt ihnen mehr zu als grüner Klee, auch bedürfen sie von Zeit zu Zeit Salz, auf das sie so gierig sind wie auf Zucker. Selbst den Salpeter lecken sie von den Wänden der Stallungen. Der Bock wird übrigens

gern streitsüchtig und geht dann Menschen und Hunden mit dem Gehörn zu Leibe.

**Ummerkung.** Als Hausthiere werden im Gebiete der Beni Amer und Habab allgemein Ziegen und Schafe gehalten, erstere in überwiegender Anzahl und zwar in verschiedenen Rassen, die ich nicht näher zu beschreiben vermag. Doch fehlen die glatthaarigen, buckelnaigen egyptischen Formen (*Hircus aegyptiacus* und *Hircus thebaicus*). Auf der Insel Dahlak züchtet man eine äußerst kleine und höchst niedliche und lebhafte Ziege, die ein sehr wohlschmeckendes Fleisch liefert. Sie hat glatte, kurze Haare und im Allgemeinen eine glänzend hell kaffeebraune Färbung. Im Gebirge begegneten wir auch sehr stattlichen schwarzen, langhaarigen Ziegen, welche einige Ähnlichkeit mit *Hircus mambrieus* haben.

Die Schafe des Bedjah-Landes gehören meistens der Form *Ovis steatopyga* oder *Ovis platyeeros* an. Sie sind gewöhnlich ungehörnt, häufig rein weiß mit schwarzem Kopfe.

Die Ziege in genere heißt auf Arab. Ghanem; der Buckel, die weibliche Ziege M'ezah, auch 'Anz. Amh. Fijel. Tigr. Del. Belsen Fintira. Bedj. Tó-Naï.

Die Araber benennen das Schaf zaruf, den Schafbock Kebş; auf Amharisch heißt es Bag, Geez Bag'e; auf Bedjanisch Tirfem und Argeno.

Das Mähnen schaf (*Ovis tragelaphus*, Desm.), in den egyptischen und nubischen Bergen heimisch, ist unserem Beobachtungsgebiete nicht eigen.

Nach Mittheilung des verstorbenen P. Stella in Keren soll im Gebiet des Ariseba und in Mensa ein wildes Schaf von weißlicher Farbe und mit spiralförmig gewundenen Hörnern leben. Dr. W. Schimper versicherte mich, es komme ebenfalls in Mensa ein hirschartiges Thier (ein ächter *Cervus*) von der Größe des Rehbockes vor. Eine Verwechslung mit *Oreotragus*

saltatrix kann bei dieser Angabe nicht wohl vorliegen, da mein Berichterstatter den Klippspringer sehr wohl kannte.

### 90. Der Wildbüffel, *Bos* (*Bubalus*) *pumilus* (Turton).

Turt. Translat. of the Syst. Nat. p. 121. — *B. brachyceros*, Heugl. Verh. der Leop. Carol. Ak. 1863. Sep.-Abdr. p. 25. Antil. u. Büff. pl. 3. f. 12. — *B. caffer*, var. *aequinoctialis*, Blyth, Proc. L. Z. S. 1866. p. 371. f. 1 and 1a. — *B. centralis*, Gray, Cat. Rum. Brit. Mus. p. 11. — *B. pumilus Stirps orientalis*, Brooke, Proc. L. Z. S. 1873. p. 403.

Arab. G'amūs el zāla. Antch. Goš, Tigr. und Bedj. Agaba. Gala Gefersa. Geez Dasekano (nach Ludolf).

Ich habe in einem ausführlichen Artikel (Ant. u. Büffel, Verh. Leop. Carol. Akad. 1863) auf die Unterschiede der in Nordost-Afrika vorkommenden Wildbüffel aufmerksam gemacht und dieselben durch Abbildung der Gehörne zu veranschaulichen gesucht. Sir Brooke hält die von mir für *Bos brachyceros*, Gray, angeprochene Form für *B. pumilus*, var. *orientalis*, doch soll nach Aussage der Hornwan-Araber nicht nur eine platthörnige, sondern auch eine dichhörnige Rasse oder Art am Setit vorkommen. In wie weit *Bos pumilus* von den übrigen afrikanischen Wildbüffeln sich unterscheide, kann ich wegen Mangels an umfassendem Material nicht nachweisen. Am Weißen Nil traf ich nur die groß- und dichhörnige Form, aber nach der Abbildung, welche Brooke von einem angeblich nubischen (!!) Exemplar des zoologischen Gartens in Berlin giebt, das wohl von Takah stammt, scheint ein Zwischenglied zwischen den von mir als *B. brachyceros* und *B. caffer* abgebildeten Thieren zu bestehen. Wiederum abweichend ist das Gehörn einer Kuh, welches Claperton vom Tschad-See nach England sandte. Hier erscheinen die

Hörner weit mehr noch mit den Spitzen nach hinten und einwärts gebogen, ähnlich wie bei dem Gerreid'schen Exemplar des Britischen Museums (Vergl. Brooke l. c. p. 475 u. 478. fig. 1. 2. u. 3.)

Nach alle dem möchte ich vorläufig nur eine einzige Art annehmen, nämlich *Bos caffer*, Sparrm., die füglich in drei oder vier Rassen zerfallen dürfte. Uebrigens variiren wenigstens die Hörne der einzelnen Individuen ebenfalls nicht unbeträchtlich.

Die platthörnige Form findet sich rudelweise am Homran und am oberen Atbarah, bei Qalabat, am oberen Rahad und Dender, am Blauen Nil südlich vom 13. Grad n. Br., endlich in Kordofan, und ohne Zweifel ist es dieselbe, welche im Tiefland des Mareb, in Quola Wogara, am Goang und von da südwärts bis Godscham oder Gozam und in die Gala-Gebiete sich verbreitet.

Der Wildbüffel lebt in sumpfigen Gegenden, namentlich in der Region des Bambus, sowie im dichten Buschwald. Zur Zeit der Sommerregen breitet er sich mehr nach dem Steppenland hin aus.

Ueber seine Lebensweise habe ich früher bereits meine Erfahrungen und Beobachtungen mitgetheilt. (Büffel und Antilopen l. c. — Reise in das Gebiet des Weissen Nil p. 307. etc.)

Anmerkung. Den zahmen Büffel (*Bos bubalus*, Briss.) hält man häufig in Egypten und hat auch versucht, denselben nach dem Sudan zu verpflanzen. In Abessinien und dem Barkah-Gebiet kommt er nicht vor. Derselbe heißt bei den Arabern G'amūs.

In Tigrié, namentlich am Ufer des Mareb und an der Sibda soll ein wildes Kind vorkommen, das dort Anha Bih' oder Biž benannt wird. Man sagt, daß sich dasselbe mit den gezähmten Hornvieh-Rassen der Gegend paare.

Im Barkah, dem Habab- und dem Anseba-Gebiet, sowie

in Habsch halten die Eingeborenen große Heerden von Kindvieh, das übrigens verschiedenen Rassen angehört. In einigen Hafenstädten am Roten Meer ist der Zebu eingeführt. Die Rasse der Gala-Länder zeichnet sich durch ihr ungemein starkes und langes Gehörn aus, aus dem man Trinkbecher und Gefäße zur Aufbewahrung des Honigweines anfertigt. Im Bogos-Gebiet und Habsch verwendet man den Stier auch zum Ackerbau.

Halbwilde Kinderheerden sah ich bei Qalabat, am oberen Albarah und am Fuß der Berge von Goara. Die dortige Rasse ist sehr gleichförmig gezeichnet, hellgrau, mit hoch aufgesetzten Hörnern, von mittlerer Größe, mit kleinem Kopf, schlankem Hals und Füßen. — Das Steppenvieh ist durchschnittlich kleiner. Der Preis einer wohlgenährten verschnittenen Kuh, deren Fleisch demjenigen der Ochsen vorgezogen wird, wechselt in Ost-Afrika zwischen 1 und 5 Thalern. Die Haut gilt im Binnenland durchschnittlich einen halben Thaler.

Der Ochse heißt auf Arabisch Tör, die Kuh Baqer, das Kalb 'Igel. Auch das Kindvieh im Allgemeinen Kabt, der Ochse Berié, der Farren Wojefan, die Kuh Lam, das Kalb Tedsa und Enbasa. Der Ochse Tigrisch Berai, die Kuh Wot und Lami. Geez der Ochse Lahem. Berberin. der Ochse Gurki, die Kuh Ti-Keri. Bedj. der Ochse Laga (nach Munzinger O-jo), die Kuh O-sä. Belen der Stier Bile (Munzinger). Som. der Ochse Dibi, die Kuh Lö. Gala der Ochse Kotijo, die Kuh Sää.

### Fam. Hirshartige Thiere (Cervina).

#### 91. Die Giraffe, Camelopardalis Giraffa (Linn.).

Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 400. — Rüpp. Atlas t. 8. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 73. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 53.

Arab. Žerāfah und Žerīfah. Gecz Zerat. Amch. Žerata Qatsin. Som. Hal Gēri. Tigr. Zeōta und Zerāfa. Bedj. Serāf.

Familienweise kommt die Giraffe noch in den Steppen des Albarah, Daſch und Barkah vor, nordwärts mindestens bis zum 18. Grad n. Br.; ebenso im Homran und am abessinischen Mareb und im Somal-Gebiet. Auch um den unteren Aufseba soll sie häufig sein.

Zurweilen begegneten wir diesen Thieren in der vollkommen baumlosen Steppe, mit Vorliebe halten sie sich jedoch im Buschwald und in Gegenden, die wenigstens hin und wieder mit höheren Bäumen bestanden sind. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Blättern, Knospen und Schossen von Akazien und Dattelpflaumen, die Giraffe fällt jedoch auch in Büschelmaisfeldern ein.

#### Fam. Schwiezenthiere (Tylopoda).

Das einhöckrige Kameel (*Camelus dromedarius*) wird allgemein im Tiefland unseres Beobachtungsgebietes als Hausthier gehalten. Verwildert findet man dasselbe hin und wieder an der Küste von Berenice. Es reicht übrigens auch in die Bergregion bis auf 5000 bis 6000 Fuß Meereshöhe.

Die Araber nennen das Kameel im Allgemeinen G'emel, das Reitkameel H'egin, die Kameelstute Naqah, den jungen Hengst Q'aud. Auf Geez heißt es Gemle. Amch. Gemale. Sudan-Arab. Kalkeh. Verb. der Hengst Qam-nudi, die Stute Kim-gi. Im Barkah Kambaro. Belsen Gedem (nach Münzinger Gimmile). Gala Gala. Som. Geil oder Gel. Denk. Rekiba. Bedj. O-qam. Bazen Arkoba.

Wird hauptsächlich im Tiefland und in den Vorbergen gezüchtet, namentlich in ungeheuerer Anzahl in Takah und den benachbarten Steppen der Dabeina, Schufereih bis Berber und Kordofan,

endlich in den Bedjah-Gebieten. Hier finden sich zuweilen Kameele in verwildertem Zustande. Die Rasse der Habab und östlichen Beni Amer gehört zu den weniger geschätzten Faustthieren. Hier fehlt es denselben an der gehörigen Pflege und Nahrung. Ihrer Ausdauer wegen sind namentlich die Bischarin-Kameele gesucht, die sich theilweise auch zum Reiten eignen.

### Ord. See-Säugethiere (Pinnata).

#### Fam. Sirenen (Sirenia).

##### 92. Der Dugong, *Halicore cetacea* (Ill.).

Wagn. Schreb. Säugeth. VII. p. 145. t. 382. — *Halicore tabernaculi*, Rüpp. Mus. Senkenb. I. p. 95. t. 6. — Brehm, Habesch, p. 200. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 73. — Heugl. Fauna R. M. p. 74. — *Halicore Hemprichii et H. Lottum*, H. & Ehr. Symb. phys. II. fol. k. — v. Krauss, Reiehert's u. du Bois-Reymond's Archiv 1870. p. 525.

Arab. Tauileh, G'ilid und Naqah el Bah'er; nach Ehrenberg auch Lot<sup>em</sup>. Denk. Ürum. Som. Qelbadeh. Hebr. Tachasch (?).

Der Dugong oder Dujong kommt nicht selten im Rothen Meere vor und war schon den Juden und den alten Geographen bekannt (Diod. I. 1. — Strabo XVI).

Nach freundlicher Mittheilung von Dr. Klunzinger erscheint dieses Thier übrigens nördlich vom Wendekreis nur während des Hochwasserstandes, d. h. zur Winterszeit, und dringt dann wohl selbst bis zum Golf von Sues und Aqabah vor und wandert im Sommer wahrscheinlich südwärts, weil man dasselbe dann wenigstens in der Nähe des Festlandes nicht bemerkt.

Auch die Brumftzeit und Wurfzeit fällt in den Winter.

Zu einem Männchen gesellen sich mehrere Weibchen. Die letzteren werfen nur ein einziges Junges, welches etwa ein Jahr lang bei der Mutter bleibt und gefäugt wird. Bei dieser Art der Ernährung wird das Kalb von der Alten mittelst des Armes gehalten. Ersteres reitet wohl auch auf dem Rücken der Mutter, die ihren Sprößling selbst bei äußerster Gefahr nicht verläßt.

Die Araber glauben, daß das Weibchen auf dem Wasser gebäre. Es lege sich zu diesem Zweck auf den Rücken. Das eben zur Welt gekommene Kalb misst bereits über drei Fuß.

Der Djilid führt vorzugsweise eine nächtliche Lebensart, indem man ihn bei Tag selten bemerkt, während diese Thiere erst nach Sonnenuntergang regelmäßig auf Nahrung ausgehen. Letztere besteht in Algen und Rajaden, welche der Dugong auf den Untiefen, auf den unterseeischen Wiesen und von den Felsen abweidet. Er kommt etwa alle 10 Minuten an die Oberfläche, um Atem zu holen. Dies geschieht unter großem Geräusch und in wenigen Zügen.

Die Stelle, wo diese Thiere schwimmen, ist am Leuchten des Meeres zu erkennen. Es hält sich hauptsächlich in der Nähe der Felsen und Klippen und kommt in tiefe Buchten herein. Nie habe ich aber vernommen, daß es auch ans Land steige. Die arabischen Fischer stellen dem Dugong gerne nach. Sie genießen sein Fleisch und Thran, Haut und Zahne haben keinen unbeträchtlichen Werth. Die gewöhnliche Fangart ist die mittelst starker, langer Netze, welche vor die kleinen Einbuchtungen der Madreporen-Klippen gelegt werden, in denen die Thiere im ruhigen Wasser ihrer Nahrung nachgehen. Diese verwickeln sich in den Maschen und werden dann mittelst Stangen in der Tiefe ertränkt. Im Süden des Rothen Meeres und an der Somaliküste ist auch die Jagd mit der Harpune üblich. In den Hafensplätzen des Rothen Meeres beläuft sich der Werth einer großen, dicken Haut auf 6 bis 10 Maria-Theresia-Thaler. Man ver-

wendet sie namentlich zur Anfertigung von Sandalen, und viele solcher Häute werden zu diesem Zweck nach Palästina ausgeführt. Aus den Zähnen fertigt man Messerhefte, Ringe und vorzüglich Perlen für Rosenkränze. Der polirte Zahn nimmt eine graue Farbe an und zeigt einen herrlichen Perlmuttenglanz, sowie ein eigenthümliches Irisiren.

Anmerkung. Im See von Dembeja (Tsana) soll ein hierher gehöriges Thier vorkommen, das Aila, Auli und Ja Bal' er Ted̄sa genannt wird (wohl ein Manatus?). Auch in den Flüssen, welche aus dem Niamniam-Gebiet nach Westen zu abfließen, findet sich ein ähnliches Thier, das bei den Elfenbeinhändlern Om Zebeibeh heißt (wohl Manatus Vogelii?).

Seehunde fehlen dem Rothen Meer gänzlich.

### Fam. Delphine (Cete dentigera).

An der Somalküste findet man nicht selten größere Mengen von Ambra, welche das Meer auswirft. Auch in den südlischen Gegenden des Rothen Meeres soll dieses Product hin und wieder vorkommen. Die mutmaßlichen ursprünglichen Eigenthümer dieser Masse, Pottwale, sind meines Wissens dagegen niemals an jenen Küsten gesehen worden. Wahrscheinlich wird die leichte Ambra durch die Monsune dahin getrieben. Nach Mittheilung Dr. Klunzinger's versichern übrigens die eingeborenen Fischer, daß auch gezähnte Wale, also ohne Zweifel Physeter, ins Rothe Meer gelangen. Ein Exemplar, das mein Berichterstatter hierher rechnet, hielt sich etwa 8 Tage lang zwischen Klippen in der Nähe von Doseier auf. Dasselbe war beständig von Möven und Seeschwalben begleitet, welche Schmarotzerthiere vom Rücken des Ungethüms abzunehmen versuchten. Es kam stets — jedoch ohne die Stelle viel zu ändern — nur auf kurze Zeit an die Oberfläche und zeigte dann hauptsächlich nur den

Kopf. Die Bewohner der Hafenstadt, obgleich größtentheils Fischart und Seeleute, belästigten den Wal nicht, aus Furcht, er möchte ihre Fahrzeuge angreifen.

Sie nannten denselben Betan, wie die Finnwale ebenfalls heißen. Unser „Aurora“ kommt vom arabischen 'Anber, was gleichzeitig auch Räucherwerk und zuweilen selbst Bernstein bedeutet.

### 93. Der Abu Salam, Delphinus (Tursio) Abu Salam (Rüpp.).

Rüpp. Mus. Senkenb. III. p. 140. t. 12. — *D. hamatus*, H. & Ehr. Mus. Berol. (?) Schleg. Abhandl. I. p. 25. — Wagn. Schreb. Säugeth. Suppl. IV. p. 324. — *D. aduncus*, H. & Ehr. Symb. phys. II. fol. k. (??). — Heugl. Fauna R. M. Nr. 76. — Brehm, Habesch, p. 68. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 74.

Arab. Abu Salam. Deut. Hoberi. Som. Hombaro.

Nicht selten sphaerenweise im ganzen Rothen Meer.

Nach Rüppell finden sich noch mehrere hierher gehörige Arten, vielleicht *Phocaena capensis* und *Delphinus longirostris*. Verschieden von *D. Abu Salam* scheint wohl *D. aduncus*, H. u. Ehr. Symb. phys. II. fol. k.

### Fam. Wale (Cete edentata).

#### 94. Der Bitan, Balaenoptera Bitan (H. & Ehr.)

H. & Ehr. Symb. phys. II. fol. k. — *B. Forskali*, Heugl. — Fitz. u. Heugl. Säugeth. p. 75. — Heugl. Sitzungs-Ber. der k. k. Akad. Wien 1852 mit Taf. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 75.

Arab. Betān. Geez የአሳ Anberi (d. i. Umbra-Fisch). Denk. Betāneh. Som. Neberi.

Es ist mir nicht gelungen, ein vollständiges Skelett des Betan zu erlangen. Die Thiere sind nicht häufig auf dem Nothen Meer und wird von Seiten der eingeborenen Fischer keine Jagd auf sie gemacht. Hin und wieder strandet einer und dann benutzt man den Thran und das übrige Fett, namentlich das des Kopfes und der Zunge zum Kalfatern von Schiffen, wohl auch zur Seifenbereitung.

Ein anderes Product dieses Wale ist der Sah'am el Betan, Concretionen aus einer theils weißen theils grauen talkartigen Masse von eigenthümlichem Geruch, die sich wohl ähnlich der Umbra in den Eingeweiden ausscheidet und mit dem Auswurf abgeht. Diese Massen haben eine unregelmäßig lang-ovale Gestalt, schwimmen auf der Oberfläche des Meeres und werden da und dort durch Wellenschlag ans Ufer geworfen. Man sammelt sie und benutzt sie ähnlich dem Waltheran. Auch werden ihnen heilkärfige Eigenschaften zugeschrieben.

Der Betan ist ein Wal, der höchstens 40 Fuß Länge erreicht, wovon der Kopf wohl ein Viertheil bis ein Drittheil einnimmt. Der Oberkiefer hat die Form des umgekehrten Vordertheils einer Schaluppe mit tiefem Kiel und scharsem Schnabel. Die Unterkiefer wohl mit den Spangen nicht verwachsen; alle Kieferäste zahllos; auch besitzt das Thier eine Finne, die mir jedoch nicht hoch schien. Die Färbung ist obenher dunkel-grau schwärzlich. Nie sah ich diese Wale „blasen“, überhaupt beobachtete ich sie nur auf den südlischeren Theilen des Nothen Meeres, gewöhnlich zwischen inselreichen Buchten und zwar stets bei stürmischer Witterung. Man sieht sie einzeln und in Gesellschaften von 3 bis 6 Stück.

Auf Heiligengräbern und an Betplätzen, wo die Einwohner gern Schildkrötenköhlen, Sägen von Sägfischen, Dugong-

schädel und andere Produkte des Meeres aufstellen, fand ich häufig auch die mächtigen Rippen und andere Theile des Knochengerüstes von gestrandeten Walen.

Die Nahrung besteht offenbar in Fischbrut und Schleimthieren, welche der Betan auf sehr bequeme Weise erlangen soll, indem er erstere in den weit geöffneten Rachen treiben lässt.

Auf dem Rothen Meere findet man hin und wieder schwärzliche Klumpen von verhärtetem Petroleum. Auch diese werden da und dort durch die Trift ans Ufer geführt. Sie heißen bei den eingeborenen Schiffssleuten *zarat el Betān*, d. i. Wal-Excremente.

B. Vögel.


---

### Bemerkung.

Alle Maße in alfranzösischem Fuß.

Die citirten ornithologischen Schriften sind folgende:

- H. et Ehr. Symb. phys.: Hemprich et Ehrenberg, Symbolae physicae.  
Heugl. Fauna R. M.: Henglin, Fauna des Rothen Meeres und der  
Somali-Küste. Peterm. Geogr. Mittb. 1861, p. 11 bis 32.  
Brehm, Habesch: Brehm, Ergebnisse einer Reise nach Habesch 1863.  
Finsch, Coll. Jesse: On a collection of Birds from N. Eastern Abyssinia and the Bogos-Country. — Transact. Zoolog. Soc. Lond. VII. Part. IV. — May 1870.  
Blanf. Abyss.: Blanford, Observations on the Geology and Zoology of Abyssinia. London 1870.  
Antin. M. R.: Antinori e Salvadori, Catalogo degli Uccelli. Genova 1873.  
Heugl. O. N.-O.-Afr.: Henglin, Ornithologie Nordost-Afrika's.  
Heugl. Ber. XXI. Vers. der deutsch. O. Ges. Henglin, Bericht über die  
XXI. Versammlung der deutschen Ornithologen 1875.
-





Refugee, Sternwarte, Straße 1, Kassel.

1

Verlag von Theodor Engel

Philothamna minor, Hgl.

## Orā. I. Raubvögel (**Accipitres**).

Subord. I. Tag-Raubvögel (**Accipitres diurni**).

Fam. Geieradler (**Gypaetidae**).

1. Der südliche Bartgeier, *Gypaetus nudipes* (Brehm).

*G. meridionalis*, Bl. & Kays. — *G. barbatus*, Auct. part. — *G. barbatus meridionalis*, Brehm, Blas. etc. — Rüpp. Syst. Uebers. t. 1. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 425. — Blanf. Abyss. p. 298. — Finsch, Coll. Jesse, p. 200. Gold. Eegle, Bruce, Abyss. V. p. 155. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 6.

Arab. Big. Aethiop. Qilqil Agafi, Fijel Aqafi und Tšowita.

Erscheint im Gebiet von Menja und Bogos auf seinen Wanderungen mit Truppen. Besucht namentlich die Nachbarschaft von Dörfchen und Lagern, wo viel Vieh geschlachtet wird, und lebt fast ausschließlich von Asas und Resten von Schlachtvieh, fängt aber auch kleine Säugetiere und zwar nicht stoßend, sondern auf der Erde lauernd. Sehr allgemein in den abessinischen Hochländern.

Fam. Geier (**Vulturidae**).

2. Der weiße Nasgeier, *Neophron percnopterus* (Linn.).

Rachama, Bruce, Abyss. V. p. 163. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 2. — Brehm, Habesch, p. 205. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 425. — Blanf. Abyss. p. 287.

Arab. Rachām, Tigr. Setei Hakan.

Allgemein auf Dahlaß, auch im Strandgebiet und den Vorbergen. Seltener hoch im Gebirgsland. Namentlich um Ortschaften und Hafenplätze, aber seltener als der folgende und nur zufällig in dessen Gesellschaft.

### 3. Der Mönchsgeier, *Neophron monachus* (Tem.).

*N. pileatus*, Auct. nec Burch. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 1. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 425. — Brehm, Habesch, p. 205 — Blanf. Abyss. p. 287. — Finsch, Coll. Jesse, p. 200. — Antin. M. R. p. 15.

Amchar. Tenb Amora. Tigr. Bela zāri.

In den Gebirgen der Habab und Beni Amer nordwärts bis Ajiq. Brütet einzeln im Falcat auf Akazien im Februar; in ungeheurer Menge auf Alcennien und Rhizophoren im Golf von Masaua zwischen Februar und Juni. Oft stehen zahlreiche Nester auf einem und demselben Baum, andere einzeln oder gemeinschaftlich mit Reiher und Schmarotzer-Milanen. Die Horste stehen in Astgabeln, gewöhnlich nahe am Stamm; sie sind nicht gar groß, aber solid aus dünnen Reisern zusammengefügt. Gewöhnlich nur ein Ei, nach Antinori zwei bis drei enthaltend. Das Ei 2" 7" bis 2" 10" lang und 1" 11" bis 2" 1" dick, lichtgrünlich durchscheinend und mit eigenthümlichem Moschusgeruch; rauhschalig, lichtgrünlich, graulich oder lehmigelblich, selten purpurweiß; Flecken im Allgemeinen lehmbräunlich, aber zuweilen auch satt purpurbraun, jedoch nie so dicht wie bei *N. percnopterus*; einzelne Eier sind auch fast ungesleckt, andere mit Exrementen überzogen.

Im Horst finden sich auch Algen, Baumwollstoffe, Hautstücke und Thierhaare.

Die Flaumjungen graubraun mit bläulichgrauen Weich-

theilen; piepen wie junge Hühner und brauchen sehr lange Zeit, bis sie flugfähig werden.

Der Mönchgeier geht auch hoch ins Gebirge und lebt meist in größeren Gesellschaften, ist gar nicht scheu und lässt sich zuweilen auf Hausdächern und Grabkuppen nieder.

#### 4. Der marmorirte Geier, *Vultur (Gyps) Rüppellii* (Natt.).

*Vultur Kolbei*, Rüpp. Atl. t. 32. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 424. u. 1862. p. 39. — Brehm, Habesch, p. 206. — Antin. M. R. p. 14.

Arab. und äthiop. Niser, tigr. auch Bela-Qambi.

Nordwärts bis zum Lebka beobachtet. Lebt mehr auf Bäumen als auf Felsen und führt ein herumschweifendes Leben, sich dort sammelnd, wo er gerade viel Nahrung findet. Scheint höhere Gebirgslandschaften zu meiden; auch habe ich ihn nicht am Meerestrand gesehen. — Nistet sicherlich auf dem Tschad Amba.

#### 5. Der fahle Geier, *Vultur (Gyps) fulvus* (Linn.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 199. — Blanf. Abyss. p. 286. (not.) — Heugl. Fauna R. M. Nr. 4. — Antin. M. R. p. 13.

Arab. Niser.

Nur zufällig im Samhar und am Ostabhang der Küstengebirge. In Abessinien von uns bis auf 12000 Fuß Meereshöhe beobachtet. Häufig im Barlaah.

#### 6. Der Schopfgeier, *Vultur occipitalis* (Burch.).

*V. chincon*, Daud. ? — Brehm, Habesch, p. 206. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 425. — Antin. M. R. p. 12. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 3.

Belen Qab. Tigr. Amora. Arab. Niser.

Vereinzelt und in größeren Gesellschaften im Anseba und Barkah. Führt wie seine Verwandten ein ungestes Leben. Von mir stets nur auf Bäumen, nicht aber auf Felsen beobachtet. Lebestréit nordwärts wohl kaum den 17. Breitegrad.

#### 7. Der Ohrengeier, *Vultur (Otogyps) auricularis* (Daud.).

*V. nubicus*, H. Smith. — *V. aegyptius*, Tem. — *V. imperialis*, Tem. — Brehm, Habesch, p. 206. — Blanf. Abyss. p. 286. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 5.

Arab. Niser.

Verstreicht sich zuweilen ins Samhar. Auch in den abessinischen Gebirgen allgemein, ebenso im Barkah. — Mein Begleiter, Herr Bieweg, erlegte ein Exemplar im März bei Sauakin.

Anmerkung. Den im östlichen Senar, in einzelnen Gegenden von Habesch und am Baher el abiad häufigen weißrücken Geier (*Vultur bengalensis*, Lath. — *V. moschatus*, Pr. Württ. — *V. africanus*, Salvad. — *V. leuconotus africanus*, Heugl.) habe ich im Barkah und Samhar nicht gefunden.

#### Fam. Falken (Falconidae).

##### 8. Der Augur-Bussard, *Buteo Augur* (Rüpp.).

Rüpp. N. W. t. 16. u. 17. — *B. hydrophilus*, Rüpp. — *B. eximius*, Brehm. — *B. auguralis* (p.), F. & Hartl. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 32. — Brehm, Habesch, p. 206. p. — Blanf. Abyss. p. 297. — Finsch, Jesse, p. 202. — Antin. M. R. p. 23. — Salt. App. p. XLII.

Arab. Getegete oder Giétegiéte.

Paarweise, jedoch nicht häufig in Maqfa, am Tsch Amba, in Mensa. — Häufig in ganz Abessinien.

#### 9. Der kleine Augur-Bussard, *Buteo anceps* (Brehm.).

*Buteo auguralis*, Salvad. — *Buteo augur* (p.), F. & Hartl. — Antin. M. R. p. 24. t. 1.

Von Antinori bis Kasaleh angetroffen. Nicht gar selten auf den vereinzelten Felsbergen der Steppen um den Dsch und Atbarah, westwärts bei Kordofan; ebenso in Senar.

Wahrscheinlich verstreichen sich auch *Buteo desertorum* und *B. ferox* in unser Beobachtungsgebiet.

#### 10. Der Kaiser-Adler, *Aquila imperialis* (Bechst.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 201.

Von Jesse im März bei Zula erlegt. Auch von mir als Wintergast in Abessinien angetroffen; als solcher nicht selten im Delta und längs des unteren Nil.

#### 11. Der Schrei-Adler, *Aquila naevia* (Gm.).

Antin. M. R. p. 18.

Von Antinori unfern Kerem im Barkah-Thal im Juli eingezammt. Von mir niemals zur heißen Jahreszeit in Nordost-Afrika beobachtet.

#### 12. Der Raub-Adler, *Aquila rapax* (Tem.).

*A. albiceps*, Rüpp. N. W. t. 13. — *A. naeviooides*, Cuv. — Finsch, Coll. Jesse, p. 201. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 426. — Blanf. Abyss. p. 295. — Brehm, Habesch, p. 206. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 7.

Amch. Nezer und Nesar.

Sehr allgemein vom Tafkat-Thal an südwärts, jedoch häufiger im Gebirg als im Tiefland. Namentlich in der Waldregion und auf Hochbäumen um Dörfer und Kirchen. Nistet zur Regenzeit gesellschaftlich auf Nabaq- und Juniperus-Bäumen. Standvogel.

Aufführung. Brehm glaubt auch *Aquila Wahlbergii* (A. Brehmii, v. Müll.) in Mensa gesehen zu haben. Ohne Zweifel verstreicht sich wohl *A. pennata* in das Gebiet des Barkah und Anseba.

### 13. Der Flüß-Adler, *Pandion haliaetus* (Linn.).

Brehm, Habesch, p. 207. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 426. — Antin. M. R. p. 21. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 11.

Arab. Mansür und Ketaf.

Sehr häufig auf Inseln und Klippen des Rothen Meeres, namentlich auf Dahlak; südwärts bis zum Golf von Aden.

Ist Standvogel und nistet je nach der Dertlichkeit auf hervorragenden Fels spitzen, auf Bäumen, Büschen, Eisternen, ja auf verlassenen Fischerhütten.

Wahrscheinlich verstreicht sich auch *Pandion vocifer*, den ich am Albarah und an manchen Flüssen von Abessinien gefunden habe, in das Barkah.

### 14. Der weißrückige oder Kaffer-Adler, *Pteroaëtus vulturinus* (Daud.).

*Aquila Verreauxii*, Less. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 426.

Amchar. Nezer Worka.

Von mir nur ein einziges Mal in den Gebirgen bei Keren beobachtet. Weniger selten im centralen und südlichen Abessinien.

15. Der Gaukler, *Helotarsus ecaudatus* (Daud.).

Brehm, Habesch, p. 206. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 426. — Blanf. Abyss. p. 296. — Antin. M. R. p. 19. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 12.

Arab. Saqer el h'akim und Saqer el Arnab. Tigr. Hewei Semei. Som. Nabodi.

Nicht sehr häufig, doch allgemein in den Gebirgen und Vorbergen am Nord-Abhang von Abessinien, nordwärts bis zum Falkat; ebenso im Barkah. Standvogel, der sich meist hoch in den Lüsten herumtreibt, aber nicht selten auch aufbäumt.

Antinori hält die Form mit grauen Cubitalschwingen für Weibchen, die schwarzschwingige für Männer.

16. Der Riesen-Habichts-Adler, *Spizaëtus bellicosus* (Daud.).

Antin. M. R. p. 28. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 427. Nr. 17.

Sehr einzeln im Bogos-Land und im oberen Barkah, wohl als Standvogel.

17. Der gehäubte Habichts-Adler, *Spizaëtus occipitalis* (Daud.).

Antin. M. R. p. 29. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 427.

Von uns im August und September bei Keren, von Antinori, wie es scheint, das ganze Jahr über im Bogos-Gebiet und am oberen Barkah angetroffen. Ich beobachtete ein Exemplar im Februar 1875 bei To-Kar.

18. Der gestrichelte Habichts-Adler, *Spizaëtus spilogaster* (Dubus.).

Antin. M. R. p. 30. — *Sp. leucostigma*, Brehm, Habesch, p. 206. (?)

Von Brehm angeblich in Menfa erlegt. Antinori sammelte mehrere Exemplare im Samhar und am Anseba; ich erlegte diese Art mehrfach am oberen Mareb, bei Wohni, am oberen Atbarah und in den Steppen von Ost-Senar.

19. Der europäische Schlangen-Adler, *Circaetus gallicus*  
(Gm.).

Antin. M. R. p. 23. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 39. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 10.

Antinori erhielt ein Exemplar aus dem Samhar; ich erlegte diesen, wohl nur als Zugvogel in Nordost-Afrika vorkommenden Adler im September unfern Keren, im October am oberen Mareb.

20. Der nubische Lanner-Falke, *Falco lanarius nubicus* (Schleg.).

*Falco tanypterus*, Licht. — *F. cervicalis*, Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 427. — Finsch, Coll. Jesse, p. 203. — Blanf. Abyss. p. 289. — Brehm, Habesch, p. 207. — Antin. M. R. p. 25.

Arab. Saqer el h'or.

Vereinzelt im Lebka- und Anseba-Thal auf Maqṣa. Auch auf Dahlak und einigen anderen Inseln des Roten Meeres gesehen.

21. Der kleine Würgfalke, *Falco barbarus* (Linn. Schleg.).

Antin. M. R. p. 25. — Blanf. Abyss. p. 288. — Finsch, Coll. Jesse, p. 204.

Von Antinori bei Kasalah erlegt. Nicht eben selten in Mittel- und Obergypten, sowie in Nubien. Blanford will ein

Exemplar im Anseba-Thal gefunden haben, Jesse ein solches bei Ain im Lebka. Beide letztgenannten Forscher beobachteten und erlegten aber nur junge Vögel, deren Maße nicht mit denen der zahlreichen von mir gemessenen *F. barbarus* übereinstimmen.

22. Der Gazellen-Jagdfalke, *Falco Sacer* (Heugl.).

*Falco sacer et F. saker*, Auct. — Subgen. *Dorcadothera*, Heugl. Blanf. Abyss. p. 289.

Arab. *Saqer schähin*.

Von Blanford wurde ein Exemplar im Lebka erlegt, andere bei Aden gesehen. Kommt nur als Wintergast ins nordöstliche Afrika.

23. Der schiefgräne Baumfalke, *Falco* (*Lithofalco?*) *ardosiacus* (Vieill.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 427.

Sehr einzeln im Sommer und Herbst in waldigen Gegend des oberen Anseba, häufiger am oberen Mareb.

24. Der einfarbige Felsenfalke, *Falco* (*Dissodectes*) *concolor* (Tem.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 427. — Antin. M. R. p. 26. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 13.

Nur zufällig im Binnenland unsern Masaua. Antinori traf diese Art im Iuni und Juli in größeren Scharen im Bogos-Gebiet, auf geflügelte Ameisen Jagd machend; ich sah einige Exemplare zu derselben Jahreszeit im Lebka, im Februar einen Flug von 30 bis 40 Stück bei später Abendzeit in der Ebene von Af Abed.

Bewohnt paar- und familienweise viele Klippen und Inseln längs der Küsten des Rothen Meeres als Standvogel. Eier und Junge fand ich im Juli und August im Archipel von Daha-  
la, in Felsküsten.

25. Der Fuchsfalke, Falco (Tinnunculus) Alopec (Heugl.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 427. — Antin. M. R. p. 28.

Im Juli einzeln von mir bei Dalamet in Lebka beobachtet.  
Wahrscheinlich auch in den Bergen der Beni Amer und Habab.

Nach Antinori nicht selten am Barkah und bei Sabderat.

26. Der gemeine Thurinfalke, Falco (Tinnunculus) alaudarius  
(Gm. Briss.).

*F. tinnunculus*, L. — Blanf. Abyss. p. 290. — Finsch,  
Coll. Jesse, p. 205, — Antin. M. R. p. 227. — Heugl. Cab.  
Journ. 1862. p. 39. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 14.

Als Zugvogel im Herbst, Winter und Frühjahr sehr häufig  
im Binnenland unseres ganzen Beobachtungsgebietes, seltener am  
Meeresstrand. Wir fanden Hunderte dieser Falken um Hen-  
schreckenschwärme in den Gebirgen der Beni Amer und Habab.

27. Der Nöthelfalke, Falco (Tichornis) cenchris (Naum.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 39. — Blanf. Abyss. p. 290.

Wie der vorhergehende. Im October sehr allgemein auf  
den Flächen um Kerem. Wandert zuweilen gesellschaftlich.

28. Der schwarze Gabelweih, Milvus migrans (Bodd.).

Blanf. Abyss. p. 300. — Finsch, Coll. Jesse, p. 203.

Nach Blanford und Jesse häufig in Abessinien, im Küsten-

land Samhar und im Bogos-Gebiet. Diese Art ist von mir nicht in jenen Gegenden eingesammelt worden.

29. Der Schmarotzer-Gabelweiß, *Milvus aegyptius* (Gm.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 426. — Blanf. Abyss. p. 300. — Brehm, Habesch, p. 267. — Finsch, Coll. Jesse, p. 203. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 16.

Arab. H'edāieh. Ȣimāh. Tselat.

Nicht selten in unserem ganzen Beobachtungsgebiet, zwischen Masaua und Sauakin; auch hin und wieder im Gebirg, namentlich um Ortschaften. Brütet im Februar und März auf Avisennien der Insel Schech Said bei Masaua. Es gibt sowohl gelb- als schwarzschänlige Vögel dieser Art, welche möglicher Weise mit der vorhergehenden zusammenfällt.

30. Der schwarzflügige Milau, *Elanus melanopterus* (Daud.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 426.

Arab. Saqer Abu Šer'aqeh.

Im Januar einzeln zwischen Aqiq und To-Kar. — Im August und September paarweise bei Keren, wohl auf der Wanderung begriffen.

31. Der feilschwänzige Sperber, *Micronisus badius* (Gm.).

*Nisus sphenurus*, Rüpp. Syst. Uebers. t. 2. — Brehm, Habesch, p. 207. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 429. — Antin. Cat. p. 31. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 20 u. 22. — Finsch, Coll. Jesse, p. 205. — *Accipiter polioparejus*, Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 428. — Blanf. Abyss. p. 294. — *M. guttatus*, Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 430 ( $\sigma$  jun.)

Nicht selten in der Waldregion um den Lebka und Anseba, westwärts bis Dalabat. Standorte gewöhnlich auf 1500 bis 4500 Fuß Meereshöhe. Von Rüppell auf Dahlak, von mir in Naqfa und im oberen Tafkat beobachtet.

### 32. Der Gabar, *Micronisus Gabar* (Daud.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 428. — Antin. M. R. p. 33. — Finsch, Coll. Jesse, p. 207. — *M. niloticus*, Blanf. Abyss. p. 292. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 21.

Nicht gerade häufig im Samhar und im Barkah. Scheint nicht hoch ins Gebirge zu gehen.

### 33. Der schwarze Sperber, *Micronisus niger* (Vieill.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 428. — Antin. M. R. p. 33. — Blanf. Abyss. p. 293. — Finsch, Coll. Jesse, p. 207. — *Micronisus miltopus*, Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 429. u. 1862. p. 31.

Vereinzelt in der Waldregion um den Lebka, Anseba und oberen Mareb, wohl auch im Barkah.

Ohne Zweifel findet sich im Anseba-Gebiet auch Nisus Tachiro, den ich vom Mareb-Thal und von Central-Affessinien erlangte, Blanford bei Senafie.

### 34. Der Sing-Habicht, *Melierax polyzonus* (Rüpp.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 430. — Antin. M. R. p. 34. — Finsch, Coll. Jesse, p. 208. — Blanf. Abyss. p. 291. — Brehm, Habesch, p. 207. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 18.

Allgemein, jedoch nicht gerade sehr häufig in unserem Beobachtungsgebiet, mit Ausnahme der Strandgegenden. Geht

nordwärts bis zum 19. Grad nördl. Br. — Auch in Naqfa. — Stößt nicht nur auf Reptilien, sondern auch auf Vögel von der Größe einer Taube.

35. Die Rohrweihe, *Circus aeruginosus* (Linn.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 39. — Blanf. Abyss. p. 301.  
Sinn und wieder als Zugvogel im Herbst und Winter im  
Bogos-Land, wahrscheinlich auch im Küstengebiet und Barkah.

36. Die Steppenweihe, *Circus pallidus* (Sykes).

Finsch, Coll. Jesse, p. 208. — Brehm, Habesch, p. 208.  
— Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 39. — Blanf. Abyss. p. 301.  
— Antin. M. R. p. 36. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 23.

Nicht selten im Herbst, Winter und Frühjahr auf Weideland  
und im Küstengebiet.

37. Die graue Weihe, *Circus cineraceus* (Mont.).

Blanf. Abyss. p. 301. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p.  
39. — Antin. M. R. p. 37.  
Wie die vorhergehende.

Fam. Stelzengreif (Serpentariidae).

38. Der Sekretär, *Serpentarius reptilivorus* (Cuv.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 426. — Blanf. Abyss. p.  
297. — Antin. M. R. p. 35. — Brehm, Habesch, p. 208.  
Arab. Ter el Nesib. Aethiop. Faras seitān.

Vom Juni bis December im Bogos-Gebiet. Im Juli von uns auch bei Ain eingesammelt, im oberen Barkah im September.

Subord. II. Nachtrahnbögel (Accipitres nocturni).

Fam. Eulen (Strigidae).<sup>1</sup>

39. Der gestrichelte Kauz, *Athene spilogaster* (Heugl.).

Heugl. Cab. Journ. 1863. p. 15. — Heugl. Orn. N.-O.-Afr. I. p. 119. t. IV. — Finsch, Coll. Jesse, p. 209. (not.)

In den Flächen zwischen Melulu und Arifko in tief eingerissenen Regenstrombetten entdeckt.

40. Der Perlkauz, *Athene perlata* (Vieill.).

Antin. M. R. p. 37. — Blanf. Abyss. p. 303. — Finsch, Coll. Jesse, p. 209. — Heugl. Cab. Journ. 1863. p. 14.

Nicht eben selten in waldigen Gegenden des Lebka- und Anseba-Gebietes. Fliegt auch zuweilen bei grellem Sonnenlicht und nährt sich sowohl von Käfern, Heuschrecken, als von Eidechsen und kleinen Nagern.

41. Der graue Uhu, *Bubo lacteus* (Tem.).

Heugl. Cab. Journ. 1863. p. 13. — Brehm, Habesch, p. 208. (*B. cinerascens*). — Blanf. Abyss. p. 302. — Antin. M. R. p. 38. — Finsch, Coll. Jesse, p. 210. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 24.

---

<sup>1</sup> Die Eulen heißen auf Arabisch Būh, Būmah, B'afah, Maṣāṣah und Om-Quēq. — Aethiop. Gutgut, Goqit, Quqa und Qobqa, auch Qān.

In den Thälern am Ostabfall des abessinischen Hochlandes nach Massaua zu, ebenso im Anseba-Gebiet nicht selten. Wohl nordwärts bis Maqfa.

42. Der südafrikanische Uhu, *Bubo capensis* (Daud.).

*Bubo ascalaphus*, Finsch (neu Sav.), Coll. Jesse, p. 210.

Von Jesse am Ostabhang der abessinischen Gebirge, bei Senafé eingesammelt.

43. Der gefleckte Uhu, *Bubo maculosus* (Vieill.).

*Bubo cinerascens*, Guér. — Brehm, Habesch, p. 208.

— Blanf. Abyss. p. 302. — Heugl. Cab. Journ. 1863. p. 13.

— Antin. M. R. p. 39. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 25.

Im Anseba-Gebiet und den Gebirgen westlich von Massaua.

44. Der weißohrige Zwerg-Uhu, *Ptilopsis leucotis* (Tem.).

Heugl. Cab. Journ. 1868. p. 13. — Antin. M. R. p. 39.

Einzeln am oberen Anseba.

45. Die afrikanische Zwerg-Ohreule, *Scops capensis* (Smith).

*Scops senegalensis*, Antin. M. R. p. 40. — Blanf. Abyss. p. 303. — Heugl. Cab. Journ. 1863. p. 14. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 26. (*Scops vulgaris*).

Nicht eben selten im Gebiet des oberen Anseba; auch im Modat-Thal beobachtet.

46. Die Sumpf-Ohreule, *Otus brachyotus* (Linn.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 211. — Heugl. Cab. Journ. 1863. p. 14.

Im Winter im abessinischen Küstenland (Samhar).

47. Die Schleiereule, *Strix flammea* (Linn.).

Heugl. Cab. Journ. 1863. p. 14. — Finsch, Coll. Jesse, p. 211.

Nicht selten bei Kerem. Von Jesse auch in der Bai von Adulis gefunden.

## Ord. II. Singvögel (Passeres).

## I. Sperrschnäbel (Fissirostres).

## Fam. Ziegenmelfer (Caprimulgidae).

84. Der einfache Ziegenmelfer, *Caprimulgus inornatus* (Heugl.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 211. t. XXIV. — Blanf, Abyss. p. 337.

Häufig im Gebiet des Anseba und Lebka.

49. Der nubische Ziegenmelfer, *Caprimulgus nubiens* (Licht.).

Blanf. Abyss. p. 336. — Antin. M. R. p. 69. — Heugl. Orn. N.-O.-Afr. I. p. 129. — ? *Caprimulgus tristigma*, Brehm, Habesch, p. 208.

In den Regenbetten des Samhar und bei Sauakin, wohl Standvogel.

Eine weitere, größere hierher gehörige Art beobachtete ich in der Nähe von Alqiq, konnte jedoch kein Exemplar derselben einsammeln. Wohl C. tristigma oder C. tamaricis. Auch C. europaeus, den ich auf der Wanderung bis ins Land der Danakil und Somal antraf, dürfte in unserem Gebiet erscheinen.

## Fam. Segler (Cypselidae).

50. Der Mauersegler, *Cypselus apus* (Linn.).

Blanf. Abyss. p. 335. — Finsch, Coll. Jesse, p. 213. — *Cypselus?* Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 422. sp. 11.

Als Zugvogel vom Juli bis ins Frühjahr im Küstenland sowie im Gebirg.

51. Der Alpensegler, *Cypselus melba* (Linn.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 421.

Im August im Gebiet des oberen Anseba. Brutvogel in den Hochgebirgen Abessiniens.

52. Der Rüppell'sche Segler, *Cypselus aequatorialis* (v. Müll.).

*C. Rüppellii*, Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 421. — Antin. M. R. p. 69. — Blanf. Abyss. p. 334.

Von Blanford im Februar und März bei Senafié, von Antinori und mir im Juni, Juli und August bei Keren eingefangen. Dürfte in Hochabessinien Standvogel sein.

(?) 53. Der einfarbige Segler, *Cypselus unicolor* (Jard.).

Heugl. Ornith. N.-O.-Afr. App. p. LIII. — *Cypselus sp.*, Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 422.

An der abessinischen Küste mehrfach gesehen.

54. Der abessinische Segler, *Cypselus affinis* (Gr.).

*C. abyssinicus*, Streub. — *C. galileensis*, Antin. — Antin. M. R. p. 70. — Blanf. Abyss. p. 335. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 31.

Im Monat Mai im Lebka und im Hügelland am Ostabfall der abessinischen Gebirge.

55. Der Käffersegler, *Cypselus caffer* (Licht.).

,, *C. habessinicus* (?) „ Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 422. — *C. habessinicus*, Brehm, Habesch, p. 209 u. 274. — Finsch, Coll. Jesse, p. 216.

Im Mai, Juli und August im Bogos-Gebiet beobachtet.

Der Zwergsegler (*Cypselus parvus*, Licht.) bewohnt ohne Zweifel auch das Tiefland von Samhar, Dahlak und das Danakil-Gebiet, doch habe ich diese Art nicht in genannten Gegenenden eingesammelt, glaube sie aber mit Bestimmtheit unterschieden zu haben.

Fam. Schwalben (Hirundinidae).<sup>1</sup>

56. Die Seglerschwalbe, *Psalidoprocne albiscapulata* (Boie).

*Hirundo pristoptera*, Rüpp. N. W. t. 29. f. 2. — Blanf. Abyss. p. 349. — Brehm, Habesch, p. 209. — Finsch, Coll. Jesse, p. 217. — Heugl. Cab. Journ. p. 420.

Während der Sommerregenzeit im Bogos-Gebiet nistend. Von Antinori im Mai bei Keren, von Brehm im April in Menja angetroffen. Scheint in Habesch Zug- oder Strichvogel, der zur Zeit der Dürre wohl südlich wandert.

57. Die Rauchschwalbe, *Hirundo rustica* (Linn.).

*H. rusticae similis*, Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 420. — Brehm, Habesch, p. 209. — Blanf. Abyss. p. 347. — Antin. M. R. p. 72. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 32.

<sup>1</sup> Die Schwalben heißen auf Arabisch *zotāf* und *'Asfür el g'enah*. Amh. *Ladšut*. Tigr. *Loh'aheidu*.

Den ganzen Sommer über an den Küsten des Rothen Meeres vereinzelt. Im Februar bei Aqiq. Im August nicht selten bei Keren.

58. Die gestrichelte Schwalbe, *Hirundo puella* (Tem.).

*H. abyssinica*, Guér. — *H. striolata*, Rüpp. Syst. Ueb. t. 6. — Finsch, Coll. Jesse, p. 218. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 420. — Brehm, Habesch, p. 209. — Antim. M. R. p. 73.

Scheint Standvogel in Mensa und am oberen Auseba.

Brehm führt auch *H. melanocrissus* als in Mensa gesehen in seiner Uebersicht der Vögel von Ost-Abyssinien auf, doch scheint hier eine Verwechslung mit einer anderen Art (vielleicht mit *H. senegalensis*) obzuwalten.

59. Die afrikanische rothstirnige Schwalbe, *Hirundo aethiopica* (Blanf.).

Blanf. Abyss. p. 347. t. 2. — *H. rufifrons*, Auct. ex Afr. orient. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 420. — Brehm, Habesch, p. 209. — Antim. M. R. p. 72. — Finsch, Coll. Jesse, p. 218.

Haussschwalbe und Standvogel im Bogos-Gebiet und in Mensa.

60. Die Alpenschwalbe, *Hirundo alpestris* (Pall.).

Blanf. Abyss. p. 346.

Von Planford im Februar bei Koniali an der Bai von Adulis eingefangen.

61. Die schwarzsteirige Schwalbe, *Hirundo melanocrissus* (Rüpp.).

Rüpp. Syst. Uebers. t. 5. — Blanf. Abyss. p. 346 u.  
349. Nr. 103. not.

Zurweilen im Tiefland bei Adulis nach Blansford.

Von mir wurde ein ähnlicher Vogel in den Bergen der Beni Amer öfter gesehen, jedoch nicht erlegt. — Nicht selten im abessinischen Hochland.

62. Die faden schwänzige Schwalbe, *Hirundo filifera* (Steph.).

Blanf. Abyss. p. 343. (*H. ruficeps*). — Brehm, Habesch,  
p. 209.

Nach Brehm im Tiefland von Samhar. Von mir in den abessinischen Thälern bis auf 7000 Fuß Höhe angetroffen, aber auch im oberen Nilgebiet zwischen Dongolah und Senar nicht selten.

63. Die falbe Felsen schwälbe, *Cotile obsoleta* (Cab.).

*Cotyle fuligula*, Finsch, Coll. Jesse, p. 219. (nec Licht.).  
— Brehm, Habesch, p. 209. — Heugl. Fauna R. M. Nr.  
35. (*C. rupestris*).

Im Januar und März in den Bergen der Beni Amer und im Lebka, im Februar wahrscheinlich in Nagfa beobachtet. Auch in Central-Abessinien nicht selten und zuweilen hoch in die Berge verstreichen.

64. Die Felsen schwälbe, *Cotile rupestris* (Scop.).

Blanf. Abyss. p. 350.

In großer Menge im abessinischen Hochland, aber auch bei Senafé: Blansford.

65. Die Uferschwalbe, *Cotile riparia* (Linn.).

Antin. M. R. p. 72. — Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 423.

Von Antinori im April bei Maṣaua, von mir im September bei Keren eingefangen.

Auch *C. minor*, falls sie sich als eigene Art bestätigt, dürfte in unserem Beobachtungsgebiet erscheinen, vielleicht selbst *C. cineta*.

66. Die Mehlschwalbe, *Chelidon urbica* (Linn.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 419. — Blanf. Abyss. p. 349.

Im Frühjahr in Samhar, im August auf der Wanderung bei Keren beobachtet.

67. Die weißbartige Mehlschwalbe, *Chelidon albigena* (Heugl.).

Heugl. Cab. Journ. 1861. p. 419.

Im August bei Keren Schaarenweise in Hochhäusern.

## Fam. N a c e n (Coraciidae).

68. Die Mandelkrähe, *Coracias garrula* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 36.

Auf der Wanderung längs des Küstenlandes. Am 29. Juli 1857 erlegte ich einen jungen Vogel auf der Insel Eri, im October traf ich ungeheure Scharen von Mandelkrähen an der Somal-Küste auf *Acacia*-Bäumen.

69. Die abessinische Mandelkrähe, *Coracias habessinica* (Bodd.).

Blanf. Abyss. p. 319. — Brehm, Habesch, p. 210. — Antin. M. R. p. 62. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 37. — Finsch, Coll. Jesse, p. 220.

Allgemein im Küstenland und im Bogos-Gebiet, sowie im südlichen Barkah. Auch im südlichen Arabien vorkommend.

70. Die gestrichelte Mandelkrähe, *Coracias pilosa* (Lath.).

Blanf. Abyss. p. 319. — Antin. M. R. p. 63. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 38. — Finsch, Coll. Jesse, p. 221.

Allgemein in der Waldregion des Samhar, im Anseba-Thal und oberen Barkah; nordwärts bis Maro und dem Hedai-Thal.

71. Die Rachenracke, *Eurystomus afer* (Lath.).

Blanf. Abyss. p. 320. — Finsch, Coll. Jesse, p. 220.

Nicht selten im Lebka und oberen Anseba, hauptsächlich während und nach der Regenzeit.

Fam. T r o g o n i d e n (Trogonidae).

72. Die Narina, *Hapaloderma Narina* (Vieill.).

Brehm, Habesch, p. 210. — Finsch, Coll. Jesse, p. 219.  
— Antin. M. R. p. 61. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 39.

Selten und eine sehr zurückgezogene Lebensweise führend im dichten Hochwald der Ost-Abfälle der Gebirge von Habesch, namentlich im Modat-Thal und in den Schluchten von Mensa. Wahrscheinlich Standvogel.

Fam. E i s v ö g e l (Alcedinidae).<sup>1</sup>

73. Der grünliche Eisvogel, *Sauropatis chloris* (Bodd.).

Antin. M. R. p. 68. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 21.  
— Finsch, Coll. Jesse, p. 222.

<sup>1</sup> Die Eisvögel heißen Arab. Abu Raqes und Saiād el Samak. Tigr. Bela 'Asa. Amgh. 'Asau Dšin, d. i. der böse Geist der Fische.

In mit Avicennien und Rhizophoren bestandenen Buchten des abessinischen Küstenlandes paarweise als Standvogel. Nistet im April und Mai in hohlen Bäumen.

74. Der gestrichelte Eisvogel, *Halcyon tschelicutensis*  
(Heugl. ex Stanl.).

Heugl. Fauna R. M.

Nicht selten in den nach dem Samhar mündenden Thalbüschten und im Anseba-Gebiet. Meist auf Lichtungen in der Waldregion.

75. Der senegalische Eisvogel, *Halcyon senegalensis* (Linn.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 221. — Blanf. Abyss. p. 323.  
Im Suli, wohl als Strichvogel, im Bogos-Gebiet.

76. Der rostbäuchige Eisvogel, *Halcyon semioerulea* (Forsk.).

*H. leucocephala*, Müll.? — Blanf. Abyss. p. 322. —  
Finsch, Coll. Jesse, p. 222. — Antin. M. R. p. 68. — Heugl.  
Fauna R. M. Nr. 41.

Scheint Strichvogel, der zur Regenzeit im Küstenland und  
im Gebiet des Anseba nicht selten auftritt.

77. Der bunte Zwerg-Eisvogel, *Alcedo picta* (Bodd.).

Blanf. Abyss. p. 323. — Antin. M. R. p. 67. — Finsch,  
Coll. Jesse, p. 323. — ? *Ispidina cyanotis*, Brehm, Habesch,  
p. 210.

Häufig vom Mai bis September im Gebiet des oberen  
Anseba, namentlich um trockene Regenstrom-Thäler. Lebt fast  
ausschließlich von Insecten.

Fam. **Bienenfresser** (Meropidae).<sup>1</sup>

78. Der **gemeine Bienenwölf**, *Merops apiaster* (Linn.).

Blanf. Abyss. p. 321. — Finsch, Coll. Jesse, p. 223. — Antin. M. R. p. 65. — Brehm, Habesch, p. 210. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 44.

Häufig schaarenweise im Frühjahr und Herbst in unserem ganzen Beobachtungsgebiet.

79. Der **egyptische Bienenwölf**, *Merops superciliosus* (Linn.).

Blanf. Abyss. p. 321. — Antin. M. R. p. 65. — Finsch, Coll. Jesse, p. 223. — Brehm, Habesch, p. 210. Nr. 34. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 46.

Wie der vorhergehende als Zugvogel allgemein.

80. Der **firschrothe Bienenwölf**, *Merops nubicus* (Gm.).

Blanf. Abyss. p. 321.

Von Blanford im Küstenland an der Zula-Bai wohl im Hochsommer schaarenweise beobachtet.

81. Der **grüne Bienenwölf**, *Merops viridissimus* (Swains.).

Blanf. Abyss. p. 320. — Finsch, Coll. Jesse, p. 224. — Antin. M. R. p. 66.

<sup>1</sup> Die Bienenfresser heißen Arab. Scheqāq. Tigr. Bela Nebhi (d. i. Bienenfresser).

Wahrscheinlich Standvogel im Anjeba-Gebiet und in der Waldgegend des Samhar. Geht am Nil nordwärts bis Mittel-egypten, wo selbst ebenfalls sedentär.

82. Der weißhalsige Bienenwolf, *Merops albicollis* (Vieill.).

Antin. M. R. p. 66. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 45. — Finsch, Coll. Jesse, p. 224. — Blanf. Abyss. p. 321.

Im April, Juni, Juli und August in zahlreichen Schaaren im Samhar, Lebka- und Anjeba-Thal.

83. Der blankbindige Bienenwolf, *Merops Lafresnayi* (Guér.).

*M. Lefeburei*, Desm. & Prév. — Blanf. Abyss. p. 322. — Brehm, Habesch, p. 211. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 48. — Finsch, Coll. Jesse, p. 225.

Geht in den Gebirgen der Beni Amer nordwärts bis auf den Breitenparallel von Aqiq. Auch im Tafkat, Hedai und in Maqfa im Februar und März paar- und familienweise auf Büschchen und Bäumen zwischen Schluchten. Während der Regenzeit nicht gar selten um Herren und im Modat-Thal; im Mai von Jesse bei Senafé beobachtet. Lebt vorzüglich von großen Fliegen und Heuschrecken.

82. Der rothflügelige Bienenwolf, *Merops pusillus* (Müll.).

*M. erythropterus*, Gm. — Blanf. Abyss. p. 322. — Antin. M. R. p. 67. — Finsch, Coll. Jesse, p. 225. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 47.

Scheint Standvogel im Samhar und oberen Anjeba. Meist nur paarweise lebend.

## II. Dünnchnäbler (Tenuirostres).

## Fam. Wiedehöfe (Upupidae).

85. Der gemeine Wiedehöpf, *Upupa epops* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 49. — Blanf. Abyss. p. 332.  
 — Finsch, Coll. Jesse, p. 220. — Brehm, Habesch, p. 211.  
 — Finsch, Coll. Jesse, p. 226.

Arab. Hudhud.

Sowohl als Stand-, wie als Zugvogel in unserem ganzen Beobachtungsgebiet. Im Februar locken die Männchen schon eifrig (Aqra-Thal).

86. Der senegalische Wiedehöpf, *Upupa senegalensis* (Sw.).

Antin. M. R. p. 220.

Von Antinori im Juli im Bogos-Gebiet eingesammelt. Eben daselbst erlegte ich einen wohl zu dieser Art oder Rasse gehörigen Vogel, welchem die weißen Spitzen der Haubenfedern fehlten; letztere waren nur durch einen weißen Rand vertreten. Ich bin übrigens geneigt, *U. senegalensis* nur für eine Local-Rasse von *U. epops* zu halten.

87. Der Spottlhöpf, *Irrisor erythrorhynchus* (Lath.).

Antin. M. R. p. 60. — Blanf. Abyss. p. 332. — Finsch, Coll. Jesse, p. 220. — Brehm, Habesch, p. 211. — *I. spec.* Heugl. Fauna R. M. Nr. 51.

Nicht selten im Gebiet des Auseba, Lebka, Barkah und im Modat-Thal. Nistet im August in Baumhöhlen.

88. Der kleine Spotthopf, *Irrisor aterrimus* (Steph.).

Blanf. Abyss. p. 334. — Finsch, Coll. Jesse, p. 227.  
— Antin. M. R. p. 62.

Meist paarweise im Anseba- und oberen Barkah-Thal.  
Im Februar beobachtete ich eine Schaar von etwa 25 Stück,  
offenbar auf dem Strich begriffen, im Hochland von Naqfa.

## Fam. Honigsauger (Promeropidae).

89. Die rothkehlige Suimanga, *Nectarinia cruentata* (Rüpp.).

Rüpp. Syst. Uebers. t. 9. — Blanf. Abyss. p. 352. —  
Antin. M. R. p. 87. — Finsch, Coll. Jesse, p. 229. —  
Brehm, Habesch, p. 211.

Ziemlich häufig am oberen Anseba, wo sie zu nisten scheint;  
auch in den Schluchten von Mensa gefunden. Standorte zwischen  
3000 und 8000 Fuß Meereshöhe. Ohne Zweifel in Naqfa.  
Dürfte nicht wandern.

90. Der abessinische Honigsauger, *Nectarinia habessinica* (Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 53. — Antin. M. R. p. 88.  
Blanf. Abyss. p. 351. — Brehm, Habesch, p. 211. — Finsch,  
Coll. Jesse, p. 228.

Im Küstenland und den benachbarten Gebirgen nordwärts  
bis zum Breitenparallel von Sauakin (hier aber nur im Hoch-  
land), südlich bis ins Somal-Gebiet. Ebenso in Naqfa und am  
Anseba. Standvogel und recht häufig an geeigneten Dertlich-  
keiten. Die Männchen trugen im Februar und März bereits  
ihr buntes Hochzeitskleid und bekämpften sich unter großem Lärm  
und Gezwitscher.

91. Der Jardins-Honigsänger, *Nectarinia Jardinei* (Verr.).

Blanf. Abyss. p. 252. — Finsch, Coll. Jesse, p. 230.

In der Gegend von Senafié im Monat Mai. Wahrscheinlich nordwärts bis in die Berge von Sauafin.

92. Der metallschimmernde Honigsänger, *Nectarinia metallica* (Licht.).

Heugl. & Ehr. Symb. phys. pl. I. — Blanf. Abyss. p. 353. — Antin. M. R. p. 90. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 52. — Finsch, Coll. Jesse, p. 228. — Brehm, Habesch, p. 211.

Nicht selten im Samhar. Wohl als Standvogel.

93. Der broncefarbige Honigsänger, *Nectarinia tacaziana* (Heugl. e Stanl.).

Blanf. Abyss. p. 352. — Finsch, Coll. Jesse, p. 227. Antin. M. R. p. 89.

Ziemlich einzeln um Kereu. Häufiger im benachbarten Hochland.

94. Der metallgrüne Honigsänger, *Nectarinia pulchella* (Linn.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 227. — Blanf. Abyss. p. 354. — Antin. M. R. p. 90.

Ziemlich einzeln um Keren und im Zebka.

95. Der ähnliche Honigsänger, *Nectarina affinis* (Rüpp.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 229. — Blanf. Abyss. p. 351. — Brehm, Habesch, p. 211. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 55.

Ziemlich allgemein im Samhar, ebenso im oberen Auseba und in Maqfa; geht nordwärts bis zum Thal von Aferai und Darova. Im Februar traf ich dort schön ausgefärbte Männchen.

### III. Zahnschnäbler (Dentirostres).

#### Fam. (Luscinidae).

96. Der rothwimpige Fächerschwanz, *Urorhipes rufigrons* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 62. — Antin. M. R. p. 109. — Blanf. Abyss. p. 374. — Finsch, Coll. Jesse, p. 231. — ? Brehm, Habesch, p. 212.

Im Küstengebiet vom Breitenparallel von Aqiq südwärts bis zum Land der Gifa-Somaleu. Meist paarweise auf felsigem oder sandigem, spärlich mit Akazien bewachsenem Grunde. Geht gegen meine früheren Beobachtungen auch etwas landeinwärts bis auf 1500 bis 2000 Fuß Meereshöhe (z. B. am Fuß des Hedarbeh, um Wold Dan, bei Af Abed), hin und wieder selbst auf Inseln.

97. Der zierliche Buschschlüpfer, *Drymoeca gracilis* (Rüpp.).

Antin. M. R. p. 108. — Blanf. Abyss. p. 373. — Heugl. Fauna R. M. p. 61. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 39.

Nicht gar selten zwischen Sanafin und dem Golf von Adulis. Meist paarweise in Akazienestrüpp und Dickblatt-Büschen, sowohl auf Inseln als in der Strandgegend. Der Lautton besteht in einem schallenden Höied, worauf ein lebhaft und heftig klingendes Priiii folgt.

Der Oberschnabel ist rauchbräunlich, Unterschnabel und Schneiden des ersten fleischfarbig; Füße hell fleischrötlich; Iris

licht gelbbräunlich; Augenlid nackt, rauchgraulich, nach dem vorderen Winkel zu hellgrau. Ganze Länge 4<sup>11</sup>/<sub>12</sub> 3<sup>11</sup>/<sub>12</sub>. Schnabel 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1<sup>11</sup>/<sub>12</sub>. Flügel 1<sup>11</sup>/<sub>12</sub> 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Längste Steuerfeder 2<sup>11</sup>/<sub>12</sub>, kürzeste 1<sup>11</sup>/<sub>12</sub>.

Ich habe meine am Rothen Meer eingesammelten Vögel, die ich zu Dr. gracilis stelle, nicht mit egyptischen vergleichen können. Sie scheinen indeß in mancher Beziehung abzuweichen.

98. Der mausfarbige Buschschlüpfer, *Drymoeca murina* (Heugl.).

Antin. M. R. p. 109. — Heugl. O. N.-O.-Afr. I. p. 241.

Nach der Regenzeit in der Umgegend von Keren in mit Hochgras durchwachsenem Gestrüpp.

99. Der grünliche Buschschlüpfer, *Drymoeca pulchella* (Rüpp.).

Blanf. Abyss. p. 374. — Antin. M. R. p. 109.

Diese in Zeichnung und Schnabelform sehr aberrante Art wurde von Blanford im Gebiet des Anseba, von Antinori bei Azuz im Küstenlande eingesammelt.

100. Der rostköpfige Staffelschwanz, *Cisticola ruficeps* (Rüpp.).

Antin. M. R. p. 108.

Von Antinori in Dambelaß eingesammelt. Nicht selten in Takah.

101. Der einfarbige Staffelschwanz, *Cisticola semitorques* (Heugl.).

*Drymoeca semitorques* (Heugl.) Cab. Journ. 1862. p.

40. (part.) — Heugl. O. N.-O.-Afr. t. 9.

Im Herbst unfern Keren in dichtem Gebüsch und Gestrüpp.

102. Der Eistenſänger, *Cisticola cursitans* (Frankl.).

Antin. M. R. p. 108.

Nach Antinori um Kerem und im Barkah.

*Cisticola brunneonucha* (Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 39), wohl mit *C. lugubris*, Rüpp., zusammenfallend, erhielt ich unter einer Vogelsammlung aus Ost-Abessinien, vermuthe aber, daß das betreffende Exemplar nicht in unserem Beobachtungsgebiet heimisch sei, eben so wenig als *Cisticola erythrogenys*, Rüpp., *Cisticola Le Vaillantii*, Smith. (= *C. cantans*, Heugl.), *Cisticola robusta*, Rüpp., und *Cisticola Ayresii*, Luyard (= *C. habessinica*, Heugl.), welche Arten Jesse und Blanford südlich von Senafé erlangt haben.

103. Die Baumnachtigall, *Aëdon galactodes* (Tem.).

*Aëdon minor*, Cab. — Brehm, Habeseh, p. 212. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 67. — Finsch, Coll. Jesse, p. 233. — Blanf. Abyss. p. 380. — Antin. M. R. p. 107.

Im Küstenland bei Masaua und in den benachbarten Bergen, wahrscheinlich als Standvogel.

104. Der Schweifdroßling, *Cercotrichas erythropytera* (Gm.).

Antin. M. R. p. 107. — Blanf. Abyss. p. 360. — Brehm, Habeseh, p. 214. — Finsch, Coll. Jesse, p. 234.

Im Gebüsch des Küstenlandes von Squalin südwärts, sowie in den benachbarten Thälern und im Gebiet des Anseba.

105. Der Iña, *Camaroptera brevicaudata* (Rüpp.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 231. — Blanf. Abyss. p. 376. — Brehm, Habeseh, p. 212. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 41. — Antin. M. R. p. 105.

Paarweise in den Vorbergen des Sanhar, am Anseba und an den Bächen von Naqfa, gewöhnlich im dichten Gebüsch und Wurzelwerk der Uferböschungen.

106. Der Stutzschwanz, *Oligocercus microurus* (Rüpp.).

Blanf. Abyss. p. 276. — Finsch, Coll. Jesse, p. 230. (*O. rufescens*). — Heugl. Fauna R. M. Nr. 50. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 41.

Im Küstenland, den Vorbergen, dem Anseba- und Barkah-Gebiet. Nordwärts bis in die Berge der Beni Amer angetroffen.

107. Der graugelbe Steppensänger, *Eremomela griseo-flava* (Heugl.).

Blanf. Abyss. p. 355. t. 3. f. 1. — Heugl. O. N.-O.-Afr. I. t. 12. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 40.

Im Gebiet des oberen Anseba paarweise im Gebüsch.

108. Der Stentorsänger, *Calamomyia stentorea* (Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 64. — *Acrocephalus sp.*, Antin. M. R. p. 105. (?)

Wir begegneten diesem ausgezeichneten Rohrsänger auf mehreren mit *Avicennia*-Gebüsch bestandenen Inseln des Rothen Meeres, so auf Eri und bei Masaua. Er lebt dort paarweise und dürfte nicht wandern. Nistet im Gebüsch und auf überhängenden Nesten im Mai, Juni und Juli.

Ein am 4. März bei Masaua erlegter Vogel hat ein ziemlich abgetragenes Gefieder.

Obenher ziemlich hell graubräunlich, fast ohne Stich ins Olivenfarbige; Oberkopf am dunkelsten, Bürzel am hellsten;

unterher schmutzig weißlich, Kehle fast rein weiß; Kopfseiten, Weichen und Außenseite der Tibial-Befiederung graubräunlich getrübt; Unterflügeldeckfedern weißlich, graugelblich angehaucht; Unterschwanzdeckfedern schmutzig weißlich, die längsten in ihrer Mitte deutlich bräunlichgrau getrübt; der weiße Superciliarstreif nicht hinter das Auge hinausreichend, scharf begrenzt und vorn am breitesten; Augensider deutlich weißlich; auf der Zügelgegend zahlreiche, nach der Schnabelbasis hin an Länge zunehmende schwärzliche Bartborsten, die unmittelbar vor dem Auge einen kleinen schwärzlichen Büschel bilden; auch Mystakal-Gegend mit schwarzen Börstchen gestrichelt, am Kinn einzelne weiße Borsten; Schwinger rauchfarbig, innen, nach der Basis zu breit und verwaschen weißlich gerandet; Primarschwingen an der Spitze und Außenfahne fein und undeutlich heller gerandet; Secundarschwingen ebenso, aber intensiver; Tertiarschwingen und Flügeldeckfedern von der Farbe der Oberseite, erstere an der Spitze und Außenfahne, letztere allein an der Spitze verwaschen heller; Afterflügel und große Deckfedern der Primarschwingen rauchfarbig, außen verwaschen graubräunlich gerandet; Steuerfedern hell graubräunlich, die mittleren mit dunkleren Schäften, die zunächst folgenden, namentlich auf der Innenfahne, mehr rauchfarbig, die 3 bis 4 äußeren Paare an der Spitze, vorzüglich aber auf der Innenfahne mit ziemlich breitem, verwaschenem, aber doch deutlichem graubräunlich-weißem Saum; Schwanz ziemlich stark gestuft, die äußerste Steuerfeder stark  $6^{1/2}$  länger als die mittleren; die erste, verkümmerte Schwinge erreicht nicht die Spitze der ersten Serie der Primar-Deckfedern, ist jedoch beträchtlich länger als der Afterflügel, die dritte und vierte Schwinge die längste, die zweite etwa gleich der sechsten.

Der Schnabel ist bläulich hornbräunlich, Oberschnabel dunkler, fast schwärzlich mit röthlichen Schneiden, Unterschnabel nach der Basis zu fleischroth (im Hochzeitskleid wahrscheinlich orangefarbig),

an der Spitze mehr bläulich; Schnabelwinkel und Zunge orange- bis morgenroth; Füße und Krallen hornbräunlich, Sohlen heller. Die Spitze des zusammengelegten Flügels steht um 1" 7"" hinter der Schwanzspitze zurück.

Ganze Länge 6" 8"". Schnabelfirste 9"". Mundpalte fast 1". Schnabelbreite in der Nasengegend 2½"". Flügel 3". Schwanz 2" 9"". Tarsus 1" 1"". Mittelzehe mit Nagel 7"".

Die Originaltypen des Berliner Museums messen nach ge- fälliger Mittheilung Reichenow's: Mundpalte 10½"" bis gegen 11"". Firste 7"". Breite am Nasenloch 2"". Flügel 2" 11"" bis 3" 2"". Lauf 10½"" bis 12"". Hinterzehe mit Nagel 8,5"".

Diese Vögel halten sich gerne im Gebüsch von Avicennia, Rhizophora, zuweilen auch in Dickblatt (Suaeda) verborgen, doch singen die Männchen häufig auf Gipfeln oder hervorragenden Zweigen mit geschrägten Kopffedern. Man trifft sie namentlich an Stellen, wo viel schwarzer Schlamm liegt. Der Sten-torsänger kommt übrigens nicht selten auf den Boden, wo er nach Art von Aëdon mit gehobenem Schweif rasch hin und her läuft, um Insecten zu fangen. Morgens und Abends hört man beide Gatten beständig locken. Ihr Lautton besteht in einem sehr tiefen und lauten Garr oder Graa, der Gesang dagegen ist drosselartig, dazwischen schmazt und schält das Männchen mit aufgeblasener Kehle ganz wie der Drossel-Rohrsänger.

#### 109. Der große Buschläufer, Hypolais languida (Ehr.).

Blanf. Abyss. p. 379. — ? *H. olivetorum*, Finsch, Coll. Jesse, p. 233.

Von Blanford im Lebka und Samhar eingefasst. Vielleicht gehört der von Finsch als *H. olivetorum* der Jeffer'schen

Sammlung bezeichnete Vogel hierher, obgleich er größere Verhältnisse zeigt, als die von mir (O. N.-O. Afr. I. p. 296) gemessene Originaltype.

110. Der Olivenläufer, Hypolais olivetorum (Strickl.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 233.

Nach Finsch von Jesse im August am Torrent von Amba eingefangen.

111. Der griechische Buschläufer, Hypolais elaeica (Linderm.).

Blanf. Abyss. p. 380. — Finsch, Coll. Jesse, p. 232. — (*H. ambigua*, Schleg. — *H. pallida*, Gerbe. — *H. cinerascens*, Selys. — *H. Pregelii*, Frauenf. — *H. Arigonis*, A. Brehm: teste Finsch.)

Nach Blanford und Jesse im Lebka (August).

Finsch (in lit.) erklärt *H. elaeica* für identisch mit *H. pallida*, Ehr. — Letztere ist aber offenbar noch kleiner (ich messe die Originaltypen: Flügel 2" 4 $\frac{1}{2}$ " bis 5 $\frac{1}{2}$ ").

112. Der fahle Buschläufer, Hypolais pallida (Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 63.

Im August und den Herbst und Winter über in Dahlaq und dem abessinischen Küstenland.

113. Der lichte Laubläufer, Phyllopseustes umbrino-virens (Rüpp.).

Blanf. Abyss. p. 378. — Finsch, Coll. Jesse, p. 232.

Nach Jesse bei den Undel-Quellen im Tiefland um die Bucht von Adulis. Von mir nur im abessinischen Hochland beobachtet.

114. Der Fitis-Laubſänger, *Phyllopeuste trochilus* (Linn.).

Im Winter im Lebka und in Naqfa.

115. Der Weiden-Laubsänger, *Phyllopeuste rufa* (Gm.).

Wie der vorhergehende.

116. Der abessinische Laubſänger, *Phyllopeuste habessinica* (Blanf.).

*Ph. abyssinica* (!), Blanf. Abyss. p. 378. t. 3. f. 2.

Bei den Umdel-Quellen und um Senafé von Blanford erlangt.

117. Der südliche Schwarzkopf, *Sylvia (Thamnodus) melanopephala* (Gm.).

Blanf. Abyss. p. 379.

Im Habab-Gebiet von Blanford erlangt. Sicherlich hier nur Zugvogel.

Die egyptische Nasse oder Art (*S. momus*, Ehr. — *Melizophilus nigricapillus*, Cab.) habe ich zur Winterzeit in ganz Arabien südwärts bis gegen Aden beobachtet, nicht aber im Samhar-Gebiet.

118. Der rostkehlige Sänger, *Sylvia (Melizophilus) undata* (Bodd.).

Häufig im Winter zwischen Sanaän und Wold Dan, in niedrigem Afaziengestrüpp. Mansert zu Anfang März.

119. Der gemeine Schwarzkopf, *Sylvia (Monachus) atricapilla*  
(Linn.).

Antin. M. R. p. 104. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 76.  
Von Antinori im Mai und Juni im Bogos-Gebiet gefunden.

120. Die Rüppell-Grasmücke, *Sylvia (Corytholaea) Rüppellii*  
(Tem.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 77.  
Zugvogel im Herbst und Frühjahr im Samhar.

121. Die graue Grasmücke, *Sylvia (Sterparola) cinerea*  
(Briss.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 71. — Finsch, Coll. Jesse,  
p. 233. — Blanf. Abyss. p. 379. — Heugl. Cab. Journ.  
1862. p. 40.

Im August und September im Samhar und auf Dahla.

122. Die Dorn-Grasmücke, *Sylvia (Sterparola) curruca*  
(Lath.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 73. — Heugl. Cab. Journ.  
1862. p. 41.

Auf der Wanderung im Samhar und Lebla.

123. Die Garten-Grasmücke, *Sylvia (Epilais) hortensis* (Gün.).

Antin. M. R. p. 105.  
Im Mai im Bogos-Gebiet: Antinori.

124. Die Trauer-Grasmücke, *Sylvia* (Subgen.?) *lugens*  
(Rüpp.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 41.

Anmerkung. Ehrenberg (Symb. phys. Av. fol. cc.) beschreibt eine *Currucæ leucomelaena* aus Arabien und dem abessinischen Küstenland, die wirklich einer besonderen guten Art anzugehören scheint.

125. Die Sprosser-Nächtigall, *Luscinia philomela*  
(Bechst.).

*Lusciola luscinia*, Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 41.

Zu Anfang September von uns bei Keren eingefangen.

126. Der Garten-Rothschwanz, *Ruticilla phoenicurus*  
(Linn.).

Brehm, Habesch, p. 213. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 78.  
— Antin. M. R. p. 93. — Finsch, Coll. Jesse, p. 237. —  
Blanf. Abyss. p. 358.

Den Winter über im Hochland und den Vorbergen allgemein. Von Antinori noch im Mai bei Keren angetroffen.

127. Der kleine Rothschwanz, *Ruticilla mesoleuca*  
(Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 79.

Im Bogos-Gebiet und den benachbarten Tiefländern.  
Vielleicht Standvogel.

128. Das Blaukehlchen, *Cyanecula suecica* (Linn.).

Antin. M. R. p. 93. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 80.

Von Antinori im September im Anseba-Gebiet, von mir zu derselben Jahreszeit in den Bergen bei Sauakin angetroffen.

129. Der Strauchschmäher, *Pratincola rubicola* (Linn.).

Im Januar und Februar bei To-Nar, Aqiq und in den Bergen der Beni Amer.

130. Der Trift-Strauchschmäher, *Pratincola pastor* (Strickl.).

Blanf. Abyss. p. 364. — Antin. M. R. p. 103.

In Raqfa, im Ḥedai-Thal, Bogos-Gebiet und Lebka den Winter über.

131. Der Hemprich-Strauchschmäher, *Pratincola Hemprichii* (Ehr.).

Blanf. Abyss. p. 164. — Antin. M. R. p. 104. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 92. — Brehm, Habesch, p. 213.

In Raqfa, im Lebka, im Bogos-Gebiet und im Küstenland von Masaua über die Winterzeit.

132. Der Wiesen-Schmäher, *Pratincola rubetra* (Linn.).

Blanf. Abyss. p. 364. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 93.

Im August wurde von Blanford ein junger Vogel in den Bergen der Ḥabab erlegt.

133. Der große Braunschwanz, *Philothamna scotocerca* (Heugl.).

*Ruticilla fuscicaudata*, Blanf., Abyss. p. 359. t. 4. — Heugl. O. N.-O.-Afr. I. t. 14. p. 363. (Sept. 1869.) — Antin. M. R. p. 103.

Von mir während der Regenzeit des Jahres 1861, von Blanford im Jahre 1868, von Antinori im Jahre 1870 im Gebiet des oberen Anseba eingesammelt.

134. Der kleine Braunschwanz, *Philothamna minor* (Heugl.).

Siehe beigegebene Tafel. — Heugl. Ber. der XXI. Vers. deutsch. Ornith. (1875) p. 93.

Sehr ähnlich der Ph. modesta, Heugl. (O. N.-O.-Afr. I. p. 362), aber um ein Namhaftes kleiner; Oberschwanzdeckfedern färbbraun (nicht rostfarb). Supra sordide fusco-cineraceens; infra pallidior, pectore et hypochondriis saturatius tinctis; abdomine postico subcaudalibusque subalbicantibus; subalaribus fumosis, in apice conspicue albido-limbatis; caudae tectoribus superioribus, remigibus et rectricibus tergaco fuscioribus, extus sordide et dilute pallide marginatis; rectricibus intus, basin versus, pallidius limbatis; tibialibus fuscescensibus, conspicue albido-marginatis; periophthalmiis sordide et dilute albescensibus; loris fuscescensibus; rostro ex incarnato corneo-fuscescente; pedibus fuscis; iride fusca; long. tot. 5" 9"". rostr. a fr. 5,2"". al. 2" 5½"". caud. 1" 11"". tars. 9" 2"". alae apice 4,5"".

Schnabel ziemlich kräftig, an den Nasenlöchern etwas eingedrückt, Gulmen gerundet; Schneidengegend etwas eingezogen. Tarsen ungeschildert.

Schwingenverhältnisse ganz wie bei Ph. modesta; erste Schwinge etwas weniger als halb so lang als die zweite —

dritte, vierte und fünfte die längsten und unter sich ungefähr gleich lang; die sechste wenig kürzer. Schwanz etwas ausgerandet; die dritte Steuerfeder die längste. Vor dem Auge ein kleiner Büschel schwärzlicher Borstenhaare.

Nur ein Exemplar im Hedai-Thal eingesammelt. Dasselbe flatterte etwas fliegenfängerartig von Busch zu Busch.

Die nahe verwandte Ph. modesta habe ich in mehreren Exemplaren im Tiefland von Tigrié bei Adet im Monat December eingesammelt. Die Originaltypen befinden sich jetzt im Museum zu Leyden.

### 135. Der Schwarzschwanz, *Cercomela melanura* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 90. — Finsch, Coll. Jesse, p. 237. — Brehm, Habesch, p. 213. — Antin. M. R. p. 297.

Namentlich im Küstenland und in den in dasselbe mündenden Thälern nordwärts bis zum Falkat, sowohl auf Felsen als im Gestrüpp, auf Steinen und auf der Erde sich anhaltend.

Lebt meist paarweise und hat in der Art der Bewegung manche Ähnlichkeit mit den Fliegenfängern. Trägt den langen Schwanz nicht hoch aufgeschlagen, dagegen zweilen horizontal und breitet denselben dann von Zeit zu Zeit fächerförmig ans. Lädt wirbelnd Ziriwitt. Während der Paarungszeit singen die Männchen recht fleißig und lieblich, sonst führen diese zarten Vögelchen eine stille und zurückgezogene Lebensweise.

### 136. Der Trauer-Steinschmäher, *Saxicola lugubris* (Rüpp.).

Antin. M. R. p. 97. — Blanf. Abyss. p. 363. — Brehm, Habesch, p. 212. — Finsch, Coll. Jesse, p. 237.

In Mensa, Maqfa bis Aqra sowie in Dembelas. Wohl Standvogel.

137. Der weiß-schwarze Steinschmäher, *Saxicola leucolaema*  
(Ant. & Salv.).

Antin. M. R. p. 101. t. 2.

Von Antinori im Monat December bei Xeren eingefangen.

138. Der Brehm's-Steinschmäher, *Saxicola Brehmii* (Salvad.).

*Saxicola lugubris*, Brehm, Habesch, p. 290 (part.). —  
Heugl. O. N.-O.-Afr. App. p. XCIX.

In den Gebirgen von Mlenfa.

139. Der Weißschwanz, *Saxicola oenanthe* (Linn.).

Blanf. Abyss. p. 361. — Brehm, Habesch, p. 212. —  
Antin. M. R. p. 90. — Finsch, Coll. Jesse, p. 236. — Heugl.  
Fauna R. M. Nr. 84.

Zugvogel, den Winter über im Küstenland, seltener im  
Gebirge.

140. Der Wüsten-Steinschmäher, *Saxicola deserti* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 85. — Blanf. Abyss. p. 362.  
— Antin. M. R. p. 102.

Nicht selten im Küstengebiet; geht jedoch auch landeinwärts  
in die Gebirge. Wohl Staudvogel.

141. Der gelb-schwarze Steinschmäher, *Saxicola xanthomelaena*  
(Ehr.).

Antin. M. R. p. 100. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 86.  
Im Küstengebiet und den benachbarten Bergen; nordwärts

bis Sauakin. Ob Standvogel, kann ich nicht angeben. Von mir nur über die kältere Jahreszeit beobachtet.

142. Der Ohren-Steinschmäher, *Saxicola albicollis* (Vieill.).

*S. aurita*, Tem. — Antin. M. R. p. 100.

Im Winter bei Keren: Antinori.

143. Der Passas-Steinschmäher, *Saxicola leucomela* (Pall.).

Antin. M. R. p. 102. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 87.

Im Winter im Küstenland und im Gebiet des Anseba.  
Auch wohl in Naqfa.

144. Der Lemminde-Steinschmäher, *Saxicola lugens* (Licht.).

*S. leucomela*, Tem. (nec Pall.). — Heugl. Fauna R. M. Nr. 88. — Blanf. Abyss. p. 363 (nec Synon.).

Bei Sauakin im Herbst; im Winter im abessinischen Hochland. Standvogel in Egypten und Nord-Arabien.

145. Der sandfarbige Steinschmäher, *Saxicola isabellina* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 89. — Brehm, Habesch, p. 212. — Blanf. Abyss. p. 361. — Antin. M. R. p. 98.

Scheint im Tiefland Strich- oder Zugvogel. Brütet jedoch im Hochgebirge von Habesch. Den Winter über auch um Keren nicht selten.

146. Der gezäumte Steinschmäher, *Saxicola frenata* (Heugl.).

Heugl. O. N.-O.-Afr. I. t. 13. — Blanf. Abyss. p. 362.

Zu den Gebirgen von Menfa, sowie im ganzen abessinischen Hochland. Scheint Standvogel.

147. Der Kappen-Steinschmäher, *Dromolaea leucocephala* (Brehm).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 82.

In Egypten und Nord-Arabien, südwärts bis zum Barkah-Thal; auch in den Schluchten der Vorberge bei Sanaakin. Wahrscheinlich überall sedentär.

148. Der weißschultrige Buschschmäher, *Thamnolaea albiscapulata* (Rüpp.).

*Thamnolaea caesiogastra*, Bp. — Brehm, Habesch, p. 213. — Blanf. Abyss. p. 361. — Antin. M. R. p. 95. — Finsch, Coll. Jesse, p. 235.

Im oberen Anseba-Gebiet, Mensa und Lebka.

Kein Zweifel, daß Th. caesiogastra das Weibchen dieser Art. Die Weibchen sind übrigens namhaft kleiner als die Männchen. Ich messe ein von uns am 28. Februar erlegtes Exemplar: Schnabel 7<sup>mm</sup> schwach. Flügel 3<sup>mm</sup> 8<sup>mm</sup>. Schwanz 2<sup>mm</sup> 10<sup>mm</sup>. Tarsus 12<sup>1/2</sup><sup>mm</sup>. Flügelspitze stark 6<sup>mm</sup>.

Lebt im Gegensatz zu Th. semirufa mehr in Felsen und Gebüsch; doch habe ich auch diese Art in Mauern und unter Dächern gefunden.

149. Der rothgraue Buschschmäher, *Thamnolaea rufo-cinerea* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 91. — *Ruticilla rufo-cinerea*, Blanf. Abyss. p. 358. — Brehm, Habesch, p. 213.

Nicht selten im oberen Naro, in Naqfa, im Hedai, bei Kerem, in Mensa, im Lebka und bei Aisat. Auf Gebüsch und auch auf der Erde zwischen Steinen.

Bei frisch verfärbten Männchen sind Stirn, Superciliarstreif, Kinn und Halsseiten schön blaugrau, die Brust dunkler aschblau. Ist eine wahre Thamnolaea und keine Ruticilla. Ich sah noch einen ähnlichen Vogel mit weißlichem Unterleib in Naqfa.

150. Der Trauer-Buschschmäher, *Pentholaea albifrons* (Rüpp.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 237. — Antin. M. R. p. 96.

Nicht gar selten um Keran und am oberen Anseba.

Fam. Drosseln (Turdidae).

151. Der rostbänchige Schluchten schmäher, *Cossypha semirufa* (Rüpp.).

Antin. M. R. p. 94. — Blanf. Abyss. p. 360. — Finsch, Coll. Jesse, p. 242.

Nicht häufig im Gebiet des oberen Anseba in buschigen Thälern.

152. Der weißkehlige Schluchten schmäher, *Cossypha gutturalis* (Guér.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 343.

Von Jesse im April und August im Samhar-Gebiet eingefangen. Wohl Zugvogel.

153. Die Blaudrossel, *Monticola cyanea* (Linn.).

Blanf. Abyss. p. 357. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 109.

Als Zugvogel im Tiefland und im Gebirge. Im Februar von uns im Hedai-Thal erlegt.

154. Die *Steindrossel*, *Monticola saxatilis* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 108. — Brehm, Habesch, p. 214. — Blanf. Abyss. p. 357. — Antin. M. R. p. 93.  
Wie die vorhergehende; Zugvogel. Dembelas: Antinori.

155. Die abessinische *Singdrossel*, *Turdus semiensis*  
(Heugl. e Rüpp.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 241. — Blanf. Abyss. p. 357.  
— Antin. Cat. p. 91. — Brehm, Habesch, p. 214.

In Mensa, Hamesien, am Taranta- und Senafié-Paß.  
Wohl nicht unter 5000 bis 6000 Fuß Meereshöhe.

156. Die *Singdrossel*, *Turdus musicus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 107.  
Nach Hemprich und Ehrenberg an der abessinischen Küste.  
Von uns nicht südwärts von Egypten beobachtet (?).

157. Die gelbschnäbige Drossel, *Turdus icterorhynchus*  
(Pr. Würt.).

*T. pelios*, Auct. (part.) — Antin. M. R. p. 92. —  
Finsch, Coll. Jesse, p. 242.  
Häufig im Buschwerk des oberen Anjeba-Gebietes.

Fam. *Pelzrücken-Vögel* (*Pyconotidae*).158. Der Grauvogel, *Pyconotus Arsinoe* (Licht.).

Antin. M. R. p. 91. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 114.  
— Brehm, Habesch, p. 214. — Finsch, Coll. Jesse, p. 245.

Allgemein vom 20. Grad nördl. Breite an südwärts, im Küstenland wie im Gebirge.

159. Der isabellfarbige Keilschwanz, *Argia acaciae* (Rüpp.).

Antin. M. R. p. 106. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 110.

Von uns nur im Küstenland zwischen Sauakin und Masaua beobachtet. Bewohnt familienweise Dornbuschwald umt Brunnengruben. Nährt sich von allerhand Insecten, vorzüglich von Käfern. Ich sah ihn zollange Bupresten fressend.

160. Der weißköpfige Droßling, *Crateropus leucocephalus* (Rüpp.).

Antin. M. R. p. 106. — Finsch, Coll. Jesse, p. 244. — Blanf. Abyss. p. 272.

Im Lebka-Thal und Anseba-Gebiet.

161. Der weißbürtige Droßling, *Crateropus leucopygius* (Rüpp.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 243. — Blanf. Abyss. p. 271. — *Cr. limbatus*, Finsch, Coll. Jesse, p. 244. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 112. — Brehm, Habesch, p. 214.

Im Küstenland des Samhar und in Tafah. Wohl nicht nördlich vom 17. Grad nördl. Br.

Fam. Bachstelzen (Motacillidae).

162. Die weiße Bachstelze, *Motacilla alba* (Linn.).

Blanf. Abyss. p. 380. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 96. — Brehm, Habesch, p. 213. — Blanf. Abyss. p. 381.

Den Winter über ungemein häufig am Meerestrond, um Brunnengruben und auf Viehweiden, doch nicht hoch ins Gebirg ansteigend.

163. Die Schäffelze, *Motacilla (Budytus) flava* (Linn.).

- a) *Motacilla melanocephala*, Licht.
- b) *Motacilla cinereo-capilla*, Savi.
- c) *Motacilla Rayi*, Bp.
- d) *Motacilla flava vera*.

Blanf. Abyss. p. 381. Nr. 167, 168 u. 169. — Antin. M. R. p. 110. — Finsch, Coll. Jesse, p. 239. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 97. — Brehm, Habesch, p. 213 u. 214. — Antin. M. R. p. 110 (*B. nigricapillus*).

Wie die vorhergehende im Herbst, Winter und Frühjahr bis Ende April um Viehpärke, Brunnengruben u. s. w. — Auch im Anseba-Gebiet.

*M. ophthalmica*, Des Murs vom Schoho-Land gehört vielleicht zur folgenden Art.

164. Die langschwänzige Bachstelze, *Motacilla (Calobates) boarula* (Penn.).

Blanf. Abyss. p. 381. — Brehm, Habesch, p. 213.

Im Sommer im Anseba-Gebiet, im März an den Regenströmen von Mensa und am Lebka. Wahrscheinlich Standvogel.

165. Der Brach-Pieper, *Anthus campestris* (Bechst.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 101. — ? Blanf. Abyss. p. 383.

Auf der Wanderung im Herbst und Frühjahr nicht selten in unserem ganzen Beobachtungsgebiet.

166. Der rothföhlige Pieper, *Anthus pratensis* var. *rufignularis*  
(Heugl.).

*A. rufignularis*, Brehm. — Blanf. Abyss. p. 382. —  
*A. pratensis*, Finsch, Coll. Jesse, p. 240. — Heugl. Fauna  
R. M. Nr. 100.

Auf Biehweiden im Tiefland und im Gebirg. Wohl nur  
auf dem Durchzug.

167. Der abessinische Pieper, *Anthus sordidus*  
(Rüpp.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 240. — Blanf. Abyss. p. 382.  
— Antin. M. R. p. 110.

Im Bogos-Gebiet und Mensa, wohl auch in Maqfa. Scheint  
nicht zu wandern.

168. (?) *Anthus* sp.?

Antin. M. R. p. 110.

Antinori sammelte in Dembelas im Tannar einen Pieper  
ein, welcher dem *A. malayensis* sehr ähnlich ist. Welcher Art  
derselbe angehöre, kann ich nicht angeben.

Annmerkung. Was ist Corydalla Vierthaleri, Brehm,  
von Mensa? — Röthlicher als *A. sordidus*, Flügel etwas  
kürzer, Schwanz länger. Wohl = *A. campestris*. Leider ist  
von Brehm (Habesch, p. 298) keine Beschreibung dieses Vogels  
veröffentlicht und nur die Maße; bei letzteren fehlt aber die  
Angabe der Länge des Sporns, die vielleicht hier entschei-  
dend wäre.

## Fam. Meisen (Paridae).

169. Die weißflügelige Trauermeise, *Parus (Melaniparus) leuconotus* (Guér.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 238.

An den Gehängen von Menja, bei Senafé und am Taranta.  
Auf 5500 bis 11000 Fuß Meereshöhe.

170. Die weißflügelige Trauermeise, *Parus (Melaniparus) leucopterus* (Swains.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 238. — Antin. M. R. p. 87.

Nordwärts bis nach den Bergen der Beni Amer. Nicht selten im Lebka und im oberen Anseba, sowie in Aqra.

## Fam. Pinstenzüngler (Meliphagidae).

171. Der große Brillensänger, *Zosterops poliocephala* (Heugl.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 42. — Blanf. Abyss. p. 354.

Bei Keren, am Tschad Alimba und Debra Sina. Im zentralen Abessinien noch auf 12000 Fuß Höhe beobachtet. Lebt stets paarweise und besucht gerne wilde Feigen und Kronleuchter-Euphorbien.

172. Der abessinische Brillensänger, *Zosterops habessinica* (Guér.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 42. — Finsch, Coll. Jesse, p. 239. — Blanf. Abyss. p. 355.

Wie die vorhergehende Art.

173. Der gelbstirnige Brisenfänger, *Zosterops senegalensis* (Bp.).

*Z. aurifrons*, Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 41.  
Infern Keren im lichten Buschwald sehr einzeln.

Fam. Fliegenfänger (Muscicapidae).

174. Der graue Fliegenfänger, *Muscicapa grisola* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 117. — Brehm, Habesch, p. 215. — Finsch, Coll. Jesse, p. 245.

Wintergäst in unserem Beobachtungsgebiet. Von Jesse übrigens auch im Juni und August eingefüllt.

175. Der Zwerg-Fliegenfänger, *Muscicapa planirostris* (Heugl.).

*M. fuscula*, Sund. ?? — Heugl. O. N.-O.-Afr. App. p. CXIV. — Finsch, Coll. Jesse, p. 245.

Paarweise in Felsenthälern mit Gebüsch, Hochbäumen und fließenden Gewässern auf 2500 bis 7000 Fuß Meereshöhe. Nicht nordwärts vom 16. Grad nördl. Br.

176. Der Paradies-Fliegenfänger, *Terpsiphone melanogastra* (Swains.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 246. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 116. — Brehm, Habesch, p. 215. — Blanf. Abyss. p. 344. — Antin. M. R. p. 74.

In den Thälern von Mensa, um den Aïseba, in Naqfa und um die Mündungen der Gebirgschluchten bei Milet und Ain. Auch im oberen Barkah beobachtet.

177. Der ostafrikanische Feldschuäpper, *Batis orientalis* Heugl.).

*Platystira senegalensis* et *Pl. pririt*, Finsch, Coll. Jesse, p. 247. — *Pl. pririt*, Heugl. Fauna R. M. Nr. 129. — Blanf. Abyss. p. 345. — Antin. M. R. p. 75.

Ich gebe hier noch die nach dem Vogel im Fleisch entworfene Beschreibung nebst Abbildung.

Altes Männchen: Scheitel grau, nach der Stirn zu mehr schwärzlich schieferfarbig. Vom Nasenloch über das Auge weg ein weißlicher Streif; Bügel, Augen- und Ohrengegend, Wangen bis zum Nacken stahlschwarz; im Nacken selbst ein weißlicher Fleck. Halsseiten und Unterleib weiß; über die Oberbrust führt ein breites stahlschwarzes Band; Mantel aschgrau bis dunkel bläulich-grau; Bürzel weiß, schwärzlich geschruppt; Oberschwanzdeckfedern und Tibialien schwarz; Schwingen und ihre Deckfedern schwarz mit schmalen weißem Spiegel, der quer über den Flügel läuft; die letzten Secundärschwingen außen weiß gesäumt; Unterflügeldecken schwarz, die äußersten derselben aber weißlich; alle Schwingen innen nach der Basis zu weißlich gesäumt; die zehn Steuerfedern schwarz, die  $\frac{1}{4}$ . äußersten mit breiter weißer Spitze und solchem Außenrand, die  $\frac{2}{3}$ . auf der Außenfahne weiß gesäumt, die  $\frac{3}{3}$ . mit Spur von weißem Spitzfleck; am Flügelbug einige weiße Federchen; Schnabel schwarz; Füße schwärzlich; Iris lebhaft gelb. Ganze Länge 4". Schnabel 4,7"" bis 5,5"". Flügel 2" 1"". Schwanz 1" 6"" bis 1" 7"". Tarsus 6,5"" bis 7,5"".

Das Weibchen kaum kleiner, mit breitem, lebhaft kastanienrostbraunem Band über die Oberbrust. Bei einigen Exemplaren sind die Weibchen schwarz gescheckt.

Ziemlich allgemein im Buschwald, nordwärts bis zu den Bergen der Beni Amer, im Tafkat, Aqra, am Fuß von Naqfa, bei Af Abed, im Lebka und im Vorland des Samhar.

Immer nur paarweise vorkommend und sich flüchtig von Baum zu Baum treibend. Während der Monate Februar und März habe ich dort den eigenthümlichen Paarungslaut der Männchen nie vernommen, sondern nur ein schwaches Lachen das etwas rätschend, wie di-di-dlü und gi-wi-we-gab-gab klingt.

Die Haltung des Körpers ist horizontaler als bei den eigentlichen Fliegenfängern, mit denen Batis aber das geräuschlose Flattern und Wippen mit Flügeln und Schweif gemein hat. Auch fangen diese zarten Vögelchen gewandt kleine Insecten im Flug; sie scheinen übrigens auch Raupen und Schmetterlingseier zu fressen.

Nach meinen Beobachtungen kommt im ganzen tropischen und subtropischen Nordost-Afrika nur diese einzige Art vor.

#### Fam. Drongos (Dicrouridae).

##### 178. Der gemeine Drongo, Dicrurus divaricatus (Licht.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 121. — Brehm, Habesch, p. 215. — Finsch, Coll. Jesse, p. 249. — Blanf. Abyss. p. 344. — Antin. M. R. p. 77.

Allgemein vom 19. Grad n. Br. an, sowohl im Gebirg als im Küstenland. Frisst neben Fliegen auch kleinere Heuschrecken.

##### 179. Der östliche Trägvogel, Bradyornis pallida (v. Müll.).

Im Anseba-Gebiet, wohl ostwärts bis Tafah.

Anmerkung. Jesse hat in der Nähe von Senafié auch *Bradyornis chocolatina*, Rüpp., aufgefunden (Finsch, Coll. Jesse, p. 284).

Die höchst eigenthümliche Form *Hypocolius ampelinus* (Bp.) habe ich unter einer Sammlung von Vögeln aus dem Samhar und aus Tigrié erhalten.

Fam. *Pirole* (Oriolidae).

180. Der gemeine *Pirol*, *Oriolus galbula* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 115.

Auf der Wanderung im August und September, sowie im Frühjahr nicht selten im Küstenland.

Fam. *Raupenfresser* (Campophagidae).

181. Der rothschultrige *Raupenfresser*, *Campophaga phoenicea* (Lath.).

Antin. M. R. p. 75. — Finsch, Coll. Jesse, p. 248.

Selten im Anseba-Gebiet und in den Thalschlüchten nach dem Samhar zu. Nach Antinori nur auf der Wanderung im Juli. Von Jesse im April bei Senafié eingesammelt. Liebt dichtes Buschwerk und führt eine sehr stille Lebensweise.

182. Der gelbschultrige *Raupenfresser*, *Campophaga* sp.?

Antin. M. R. p. 76.

Gleichzeitig mit der vorhergehenden Art von Antinori am Anseba beobachtet. Vielleicht nur gelbschultrige Varietät von *C. phoenicea*.

## Fam. Würger (Laniidae).

183. Der Brüllen-Würger *Prionops poliocephalus* (Stanl.).

Antin. M. R. p. 81.

Von Antinori im April bei Azuz ein altes Weibchen und ein halbflüggess Junges eingefasst. Wir fanden diese eigenthümliche Art zur Regenzeit im oberen Barkah und um den Anseba, und zwar stets in kleinen auf der Wanderung begriffenen Gesellschaften.

184. Der Baumspäher, *Dryoscopus gambiensis* (Licht.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 255. — Blanf. Abyss. p. 342.  
Antin. M. R. p. 82.

Scheint Standvogel in den Gebirgen der Habab und Beni Amer. Um Naqfa und am oberen Anseba, in dichtem Gebüsch längs Wildbächen und Strombetten.

185. Der äthiopische Baumspäher, *Dryoscopus aethiopicus* (Gm.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 134. — Brehm, Habesch, p. 215. — Finsch, Coll. Jesse, p. 255. — Blanf. Abyss. p. 340. — Antin. M. R. p. 82.

Noch häufiger als der vorhergehende im Keren, im oberen Barkah, in Naqfa, Alqra und im Tafkat nordwärts bis zum 18. Grad.

186. Der Rosenwürger, *Rhodophoreus cruentus* (Hempr. & Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 135. — Brehm, Habesch, p. 215. — Finsch, Coll. Jesse, p. 256. — Blanf. Abyss. p. 342. — Antin. M. R. p. 85.

Wahrscheinlich sind beide Geschlechter dieser reizenden Würgerart gleich gefärbt. Ich untersuchte im März 1874 ein am Torrent von Schakat qaih erlegtes Weibchen mit schwarz eingefasstem Vorderhals, während ich (jüngere?) Männchen untersucht habe, welchen diese Zeichnung fehlte, wobei jedoch die Brust und der Vorderhals bis gegen die Kehle ganz pfirsichroth gefärbt waren.

Lebt an Regenstrombetten und in deren Nähe vom Samhar südwärts bis nach der Eishah-Küste, zumeist in Paaren und Familien und zwar auf Tundub und verschiedenen Akazienarten. Weiter nordwärts nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen. Kommt zuweilen auf die Erde herab, um Käfer zu fangen. Beide Geschlechter locken wie diridi und diquir—diquir. Zur Paarungszeit vernimmt man von den Männchen einen sehr lieblichen Gesang.

Der Schnabel und Nacken sind schwarz; die Iris grausich-violett; Füße hellgrau; Bügel untenher weißlich; Weibchen falbgelblich angehaucht. Manche Exemplare zeigen auf Scheitel und Nacken einen pfirsichrothen Aufslug.

Ich habe diese Form in eine besondere Untergattung (*Rhodophoneus*) versetzt. Sie ist ausgezeichnet durch großen Schnabel und Kopf, den langen, ziemlich breiten, sehr stark gestuften Schwanz, auffallend kräftige Ständer und kurze Schwingen; die erste Schwinge ziemlich lang, 12<sup>11/12</sup> mm kürzer als die Flügelspitze; die vierte die längste, die dritte, fünfte, sechste und siebente wenig kürzer, die zweite ungefähr so lang als die längsten SecundärSchwingen; die äußerste Steuerfeder um mehr als einen Zoll kürzer als die mittleren. Wahrscheinlich tragen die Vögel mit einfach rosenrother Brust (bis zur Kehle herauf), denen das schwarze Brustband abgeht, das Jugendkleid.

187. Der bluthäutige Baumspäher, *Malaconotus erythrogaster* (Rüpp.).

Antin. M. R. p. 84.

Von Antinori im Anseba-Gebiet und am oberen Barkah eingesammelt; von uns in abessinischen Tiefland und am oberen Atbarah, ebenso am Blauen und Weißen Nil.

188. Der rothflüglige Würger, *Telephonus erythrocpterus* (Shaw).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 133. — Brehm, Habesch, p. 215. — Finsch, Coll. Jesse, p. 250. — Blanf. Abyss. p. 342. — Antin. M. R. p. 86.

In unserem ganzen Beobachtungsgebiet, nordwärts bis gegen Sauakin. Gewöhnlich paar- und familienweise im dichten Gebüsch um Brunnengruben und in Torrenten. Kommt auch viel auf die Erde herab und läuft äußerst gewandt im undurchdringlichsten Gestrüpp umher.

189. Der Brubru, *Nilaus Brubru* (Lath.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 122. — Finsch, Coll. Jesse, p. 254. — Blanf. Abyss. p. 344. — Antin. M. R. p. 86.

Nicht gar häufig im Gebirg und in den Thalschlüchten nordwärts bis Agra. Auch auf Naqsa, im Hedai-Thal, um Keren, im Lebka und an den Bächen bei Aiset.

Der Vokton besteht in einem gurgelnden Rätschen. Meist paarweise im Buschwald und auf höheren Bäumen.

190. Der Lahtora, *Lanius Lahtora* (Sykes).

*Lanius fallax*, Finsch, Coll. Jesse, p. 249. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 123. — Blanf. Abyss. p. 337. — Antin. M. R. p. 77.

Im Küstenland und auf Inseln des Rothen Meeres, nordwärts bis Sauakin. Nistet im Juni auf Schirm-Alfazien. Ein Nest fand ich im Unterbau des Horstes vom Fischadler. Selten im Lebka, einzeln im Thal des Anseba.

191. Der kleine Grauwürger, *Lanius minor* (Gm.).

Antin. M. R. p. 78.

Von Antinori und mir im August und September im Gebiet des oberen Anseba begegnet. Wohl auf der Wanderung begriffene Exemplare, die noch das Sommerkleid trugen, aber ein sehr abgeschrägtes Gefieder zeigten.

192. Der weißrückige Grauwürger, *Lanius leucopygus*  
(Hempr. & Ehr.).

Im Gebiet des Anseba und Barkah allgemein.

193. Der fahl schnäbelige Grauwürger, *Lanius pallidirostris*  
(Cass.).

Wie der vorhergehende.

194. Der nordafrikanische Fiscal, *Lanius (Fiscus) humeralis*  
(Stanl.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 128. — Brehm, Habesch, p. 215. (*L. cubla et Collurio Smithii?*) — Finsch, Coll. Jesse, p. 253. (*L. fiscus*). — Blanf. Abyss. p. 338. — Antin. M. R. p. 80.

Nicht selten um Kerem, auch im Lebka, Hedai-Thal und in Naqfa beobachtet.

195. Der nubische Maskenwürger, *Lanius (Leucometopon) nubicus*  
(Lieht.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 253. — Blanf. Abyss. p. 346.

In unserem ganzen Beobachtungsgebiet mit Ausnahme der höheren Gebirge. Vorzüglich um Wüstenbrunnen und in Torrenten. Wohl Standvogel.

196. Der isabellfarbige Würger, *Lanius (Enneocotonus) isabellinus*  
(Hempr. & Ehr.).

*L. arenarius*, Blyth? — Heugl. Fauna R. M. Nr. 132.  
— Blanf. Abyss. p. 339. — Antin. M. R. p. 70.

Bei Aqiq, im Falkat, am Lebka und im Samhar. Ziemlich einzeln um Torrenten.

Der Schnabel ist schwärzlich, an der Wurzel ins Fleischfarbene; Füße bräunlichgrau. Ein deutlicher schwarzer Streif durch das Auge; Kehle und Seiten des Rumpfes weingelb angehaucht; Würzel und obere Schwanzdecken rostfahl; Scheitel, Nacken und Mantel schmutzig erdgrau; Primär- und Secundärschwingen schwärzlich, ebenso die Flügeldeckfedern erster Ordnung; die letzteren auf Außenfahne und Spitze weiß gesäumt. Auf der 3. bis 8. Schwinge befindet sich ein weißer Spiegel an der Außenfahne; die  $\frac{3}{3}$  mittleren Steuerfedern wie die übrigen rostfarbig, aber nach der Spitze zu schwärzlich angehaucht, letztere breit hell rostbraunsch. Ganze Länge 6" 6"". Firste 6,5"". Flügel 3" 8"". Schwanz 3". Tarsus 11"".

Mitte Februar in der Mauser. Läßt sich gerne im Gipfel von Büschen nieder und bewegt den Schweif viel hin und her.

197. Der rothnackige Würger, *Lanius (Enneoctonus) auriculatus* (Mäll.).

*L. rufus*, Briss. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 131. — Finsch, Coll. Jesse, p. 251. — Blanf. Abyss. p. 340. — Antin. M. R. p. 79.

Auf der Wanderung im Frühherbst und im Februar, März und April nicht selten. Möglicherweise auf Dahlat und im Küstenland auch brütend.

198. Der Dornndreher, *Lanius (Enneoctonus) collurio* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 130. — Finsch, Coll. Jesse, p. 251. — Blanf. Abyss. p. 340. — Antin. M. R. p. 79.

Im Herbst und Frühjahr, seltener den Sommer über im Bogos-Gebiet und im Samhar, sowie auf den Dahlat-Inseln. Durfte hin und wieder selbst dort brüten.

### Ord. Regelschnäbler (Conirostres).

Fam. Raben (Corvidae).<sup>1</sup>

199. Der kurzschwänzige Rabe, *Corvus affinis* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 142. — Brehm, Habesch, p. 216. — Finsch, Coll. Jesse, p. 256. — Blanf. Abyss. p. 393. — Antin. M. R. p. 128.

Sehr allgemein in den Gebirgen der Beni Amer und Habab, in Maqfa und um den Anseba; zufälliger im Samhar.

---

<sup>1</sup> Die Raben heißen arabisch *X'urab*. Tigrisch *Qoah'*. Amchārisch *Qura*.

Berfolgt mit verschiedenen Raubvögeln zusammen die Henschrecken-  
züge. Kreist oft hoch und schön. Stimme ähnlich der von  
*Corvus corax*, aber weniger schnalzend.

200. Der Wüstenrabe, *Corvus umbrinus* (Hedenb.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 141. — Brehm, Habesch,  
p. 216.

Nach Brehm auf den Inseln des Rothen Meeres. Von  
uns nicht daselbst bemerkt.

201. Der Schildrabe, *Corvus scapulatus* (Daud.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 137. — Brehm, Habesch, p.  
216. — Finsch, Coll. Jesse, p. 256. — Blanf. Abyss. p. 393.  
— Antin. M. R. p. 128.

Im Tiefland und den Vorbergen als Standvogel, nord-  
wärts bis Sauakin. Auch auf Inseln des Rothen Meeres, um  
Fischerhütten, Barken und Dörfer. Nicht in Naqfa und im  
oberen Lebka, dagegen häufig im Barkah.

Anmerkung. Ich bezweifle das Vorkommen des Geier-  
raben (*Archicorax crassirostris*) in unserem Beobachtungsgebiet,  
obwohl ich diesem Gebirgsvogel bereits in der Gegend der Mareb-  
Quellen begegnet bin und aus Erfahrung weiß, daß derselbe  
sich gerne den militärischen Expeditionen anschließt und mit den-  
selben größere Wanderungen unternimmt.

In der Gegend von To-Kar traf ich mehrmals einen ein-  
farbig schwarzen Haben von der Größe unserer Saatkrähe, von  
schlankem Bau und mit verhältnismäßig langen Flugwerkzeugen.  
Leider konnte ich die betreffende Art nicht bestimmen. Nachdem  
ich übrigens die Saatkrähe zur Winterszeit schaarenweise bei

Sues geschen, wäre es nicht ganz unmöglich, daß sich dieselbe längs den Küsten des Rothen Meeres auch weiter südwärts verstriche.

Fam. Staarenvögel (Sturnidae).

202. Der purpurflügige Glanzstaar, *Lamprotornis porphyroptera* (Cab.).

*L. aeneus*, Brehm, Habesch, p. 216. — *L. purpuroptera*, Rüpp. Heugl. Fauna R. M. Not. Nr. 2 u. 3. — Finsch, Coll. Jesse, p. 258. — Blanf. Abyss. p. 397. — Antin. M. R. p. 127.

Nicht selten das ganze Jahr über um Keren. Nistet während der Regenzeit auf Hochbäumen, kommt aber auch bis in die Dörfer, auf Hecken und in Viehparke.

203. Der stahlblaue Glanzstaar, *Lamprocolius chalybaeus* (Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 146. — Brehm, Habesch, p. 216. — Finsch, Coll. Jesse, p. 259. — Blanf. Abyss. p. 395. — Antin. M. R. p. 126.

Amharisch Wordit.

Sehr allgemein und meist schaarenweise im Tiefland nordwärts bis Sauafin, ebenso in den Torrenten, im Anseba- und Barkah-Thal bis auf 5000 Fuß Meereshöhe. Nistet colonienweise zur Regenzeit.

204. Der grünflügige Glanzstaar, *Lamprocolius chloropterus* (Swains.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 147.

Besucht hier und da auf der Wanderung in kleinen Gesellschaften das Bogos-Gebiet.

205. Der roßbäuchige Glanzstaar, *Notauges chrysogaster* (Gm.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 148. — Brehm, Habesch, p. 216. — Finsch, Coll. Jesse, p. 258. — Blanf. Abyss. p. 397. — Antin. M. R. p. 126.

Hat ungefähr die gleichen Wohnbezirke inne, wie *Lamprocolius chalybaeus*. Meist schaarenweise im Buschwald und längs der Torrenten.

206. Der Schuppen-Glanzstaar, *Pholidauges leucogaster* (Gm.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 151. — Brehm, Habesch, p. 217. — Finsch, Coll. Jesse, p. 257. — Antin. M. R. p. 124.

Von Mai bis August sehr häufig im Gebiet des Afseba; im Frühjahr im Küstenland zwischen Ain und der Bucht von Adulis. Sind die Jungen ausgeslogen, so ziehen diese herrlichen Vögel schaarenweise weiter im Land herum.

207. Der Rüppell'sche Berg-Glanzvogel, *Amydrus Rüppellii* (Verx.).

Heugl. Fauna R. M. Not. Nr. 6. — ? *Ptilonorhynchus albirostris*, Brehm, Habesch, p. 216. — Finsch, Coll. Jesse, p. 259. — Blanf. Abyss. p. 398. — Antin. M. R. p. 127.

Ein Paar im Thal von Aqra eingesammelt. Um Kerem und in den Bergen um die Bucht von Adulis im Juli bis September in kleinen Familien, meist auf Hochbäumen, in waldigen Schlüchten.

208. Der Blyth'sche Berg-Glanzvogel, *Amydrus Blythii* (Hartl.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 152. — Blanf. Abyss. p. 399. Von mir im November im Somal-Gebiet, von Blanford

im Januar und Februar am Fuß des Senafié-Passes in größeren Gesellschaften beobachtet.

209. Der Fels-Glanzstaar, *Pilorhinus albirostris* (Rüpp.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 260. — Brehm, Habesch, p. 225. — Blanf. Abyss. p. 401.

Nach Brehm in Mensa. Häufig an den Berggehängen bei Senafié; ebenso im ganzen südlichen Tigrié und in Amchara.

Anmerkung. Ich glaube den Lappen-Staar, *Dilophus carunculatus*, am Ost-Abhang der abessinischen Gebirge gesehen zu haben, führe diese Art jedoch hier nicht als wirklich vorkommend auf, weil ich sie nicht einzusammeln vermochte.

Fam. Webervögel (Ploceidae).

210. Der Büffel-Webervogel, *Textor alecto* (Tem.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 25. — Brehm, Habesch, p. 217. — Finsch, Coll. Jesse, p. 261. — Blanf. Abyss. p. 402. — Antin. M. R. p. 123.

Tigrisch Wudserek.

Wahrscheinlich Zugvogel. Schaarenweise zur Regenzeit im Innern des Samhar und im Bogos-Gebiet. Nistet gesellschaftlich in einem ungeheuren Haufwerk von dünnen Zweigen, welche die Vögel auf den Astgabeln von Hochbäumen zusammentragen.

211. Der gelbliche Webervogel, *Hyphantornis galbula* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 156. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 26. — Brehm, Habesch, p. 217. — Finsch, Coll. Jesse, p. 262. — Blanf. Abyss. p. 404. — Antin. M. R. p. 121.

Alle Webervögel heißen auf Amharisch Ombala.

Scheint Staudvogel im Samhar, nordwärts bis gegen Sanaakin, in den Gebirgstälern der Habab und Beni Amer, sowie im Anseba-Gebiet; südlich bis an die Eisa-Küste gesehen. Nicht in Naqfa. Im Anfang März begannen die Männchen bei Ain und am Lawa bereits mit Nestbau.

212. Der weißaugige Webervogel, *Hyphantornis Guerinii* (Gray).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 26. (*Textor melanotis*). — Blanf. Abyss. p. 403. — Antin. M. R. p. 122.

Im Bogos-Gebiet, in Naqfa und in den Thälern von Menfa. Scheint nicht zu wandern. Nistet zu Ende der Regenzeit, jedoch nicht in großen Gesellschaften wie *H. galbula*.

213. Der abessinische Webervogel, *Hyphantornis habessinica*  
(Heugl. e Gmel.).

*Textor flavo-viridis*, Rüpp. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 159. — ? Brehm, Habesch, p. 217. (part.) — Finsch, Coll. Jesse, p. 261. — Blanf. Abyss. p. 403.

Wie es scheint, besucht dieser stattliche Webervogel nur auf seinen Streifzügen die Vorberge des abessinischen Küstenlandes. Während der Fortpflanzungszeit habe ich ihn niemals hier angetroffen. In Naqfa im Februar in kleinen Flügen.

214. Der Antinori'sche Webervogel, *Hyphantornis dimidiata*  
(Ant. & Salv.).

*H. badia*, Cass. ? — *Textor rubiginosus*, Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 27. — Antin. M. R. p. 120. t. III.  
Vielleicht nur intensiver gefärbte Form von *H. badia*.

Von Antinori im September ein Männchen im Hochzeitskleid bei Kasalah erlangt, von uns während der Regenzeit im oberen Barkah beobachtet.

215. Der Zeifig-Webervogel, *Hyphantornis luteola* (Licht.).

*H. chrysomelas*, Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 25. — Finsch, Coll. Jesse, p. 262. — Blanf. Abyss. p. 404. — Antin. M. R. p. 122.

Im Gebiet des oberen Anseba nicht selten von Mai bis October. Die Männchen verfärbten im Juni, die Nistzeit fällt in den Juli und August. Lebt meist nur paarweise im Buschwald und scheint im Spätherbst zu verstreichen.

216. Der gelbstirnige Weber, *Hyphantornis olivacea* (Hahn).

*H. aurifrons*, Tem. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 158. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 26.

Im Frühjahr in kleinen Gesellschaften in den Thälern westlich von Masana.

217. Der Feuerfink, *Euplectes franciscana* (Isert).

Antin. M. R. p. 118.

Arab. Sersur ah'mar. Kinh. Maskal oder Ja Maskal Wof.

In den Büschelmanisprägungen des Barkah. Im benachbarten Gebirgsland nicht angetroffen.

218. Der abessinische Weberfink, *Euplectes habessinica* (Heugl. c Gmel.).

Antin. M. R. p. 118.

Allgemein im centralen Abessinien. Von Antinori im September bei Kasalah eingesammelt.

Anmerkung. Keine Art aus der Familie der Trauer-Wilda's (Penthetria, Coliuspasser) wurde bis jetzt in unserem Beobachtungsgebiet gefunden. Sie werden in Tigrié 'Elet genannt.

219. Die rothschnäbelige Witwe, *Vidua prineipalis* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 169. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 28. — Brehm, Habesch, p. 217. — Finsch, Coll. Jesse, p. 265. — Blanf. Abyss. p. 408. — Antin. M. R. p. 117.

Nicht selten im Gebiet des oberen Anseba und Barkah; ob Standvogel, kann ich nicht mit Sicherheit angeben. Die Männchen legen zur Regenzeit ihr Prachtkleid an.

220. Die östliche Paradies-Witwe, *Steganura Verreauxii* (Cass.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 170. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 28. — Brehm, Habesch, p. 217. — Finsch, Coll. Jesse, p. 265. — Blanf. Abyss. p. 407. — Antin. M. R. p. 117.

Scheint Standvogel in den Thälern und Flächen des Samhar, im Lebka, Bogos-Gebiet und Barkah. Unfern Alin bemerkte ich zu Ende Februar alte Männchen im Prachtkleid.

221. Der Ultramarin-Schaf, *Hypochera nitens* (Vieill.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 167. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 28. — Brehm, Habesch, p. 218.

Nicht häufig in der Waldregion am Abhang der abessinischen Gebirge, im Lebka und um Serein, in den genannten Gegendien jedoch nur im Frühjahr und Hochsommer beobachtet, und

zwar die Form mit grünlichem Metallglanz, während die im Flachland von Nubien und Senar vorkommende gesellschaftlich lebt und ihre Wohnung in Dörfern und Gehöften aufschlägt, und zur stahlblauen Rasse gehört.

222. Der äthiopische Blutschnabel, *Hyphantica aethiopica*  
(Sund.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 27. (*Quelea orientalis*). — Finsch, Coll. Jesse, p. 263. — Blanf. Abyss. p. 405. — Antin. M. R. p. 119.

Langt scheinbarweise im Juni und Juli im Gebiet des Anseba und am Ost-Abhang der abessinischen Gebirge an, verfärbt im August vom Winter- zum Hochzeitskleid und scheint dann weiter westlich zu wandern.

223. Der Sperlings-Webervogel, *Philagrus superciliosus*  
(Rüpp.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 27. — Antin. M. R. p. 119.

Scheint Standvogel im Bogos-Gebiet und oberen Barfah bis Dalabat und Senar hinüber. Nistet während der Regenzeit in großen, überdachten Nestern, die im Gipfel von Dornbäumen angelegt werden.

224. Das Schuppenköpfchen, *Sporopipes frontalis* (Licht.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 27. — Antin. M. R. p. 118.

Paar- und familienweise im Bogos-Land, sowie am Ost-Abfall der abessinischen Gebirge. Von uns nur während der Regenzeit bemerkt, dürfte jedoch Standvogel sein. Nistet sowohl unter Strohdächern, als in vereinzelten Dornbüschchen.

225. Das Lanzen Schwänzchen, *Uroloncha cantans* (Gm.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 164. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 28. — Finsch, Coll. Jesse, p. 268. — Blanf. Abyss. p. 408. — Antin. M. R. p. 116.

Allgemein im Samhar, an den Gehängen von Mensa, im Bogos-Land und oberen Barkah, bis Takah hinüber. Auch an der nördlichen Somal-Küste und im südlichen Arabien. Dürfte nicht wandern; endlich an den Brunnen von To-Kar.

226. Die Band-Almadine, *Sporothlastes fasciatus* (Cab.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 163. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 28. — Antin. M. R. p. 116.

Häufig während der Sommerregen unfern Ailat und bei Keren. Von Antinori im Januar in Dembelas beobachtet, ebenso im Barkah.

227. Der rothzüglige Astrild, *Habropyga rhodopyga*  
(Sund.).

*Estrelida leucotis*, Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 29. — Finsch, Coll. Jesse, p. 266. — Blanf. Abyss. p. 408.

Selten im Afseba-Gebiet. Von Blanford in Flügen in der Gegend von Zula gesündert.

228. Der rothbärtige Astrild, *Habropyga rufibarba*  
(Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 168.

Im Modat-Thal und dessen Umgebung. Wie es scheint, nicht sedentär.

229. Der Nothbürzel, *Coccoxyga Ernesti* (Heugl.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 29. — *Estrilda Quartinia*, Blanf. Abyss. p. 409.

Zwischen August und September im Gebiet des oberen Unseba und am Nord-Abfall der Berge von Mensa; paarweise und in kleinen Gesellschaften an Bächen und buschigen Hügeln.

230. Der Zwerg-Blutfink, *Lagonosticta minima* (Vieill.).

Heugl. Fauna R. M. p. 165. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 29. — Brehm, Habesch, p. 217. — Finsch, Coll. Jesse, p. 267. — Blanf. Abyss. p. 409. — Antin. M. R. p. 115.

Nicht selten im Samhar, an den Abhängen der benachbarten Gebirge und um Keren. Ebenso im südlicheren Barkah. Ob Standvogel, kann ich nicht angeben. Bewohnt meist Gehöfte und Dörfer.

231. Der rothwangige Blutfink, *Lagonosticta rubricata* (Licht.).

*Habropyga larvata*, Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 29.

Während der Regenzeit von mir öfter in der Gegend von Keren eingesammelt, wo er paarweise im Buschwald des Hügellandes vorkommt, aber nirgends häufig ist. Wahrscheinlich auch im Frühjahr an den Gehängen des oberen Lebka.

Anmerkung. Der Wachtfink (*Ortygospiza polyzona*), von Blanford bei Senasté erlangt, könnte möglicher Weise auch in unser Gebiet herüberreichen.

232. Der Granat-Astrild, *Uraeginthus phoenicotis* (Swains.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 166. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 28. — Finsch, Coll. Jesse, p. 266. — Blanf. Abyss. p. 409.

Nicht selten, gewöhnlich paar- und familienweise am Ostabfall der abessinischen Gebirge, um den oberen Auseba und im südlichen Barkah. Wohl sedentär. Nistet während der Regenzeit.

233. Die gelbe Pytelie, *Zonogastris citerior*  
(Strickl.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 162. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 29. — Finsch, Coll. Jesse, p. 267. — Blanf. Abyss. p. 410. — Antin. M. R. p. 115.

Nur vereinzelt im Samhar, bei Keren und im oberen Barkah, unter Buschwerk auf heißen, sandigen Flächen.

Fam. *Ti n k e n* (Tingillidae).

234. Der kurzzehige Steinsperling, *Carpospiza brachydaactyla*  
(H. & Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 175. — Heugl. Cab. Journ. 1852. p. 31.

Im Tiefland des Samhar und den benachbarten Gehängen. Meist auf kahleren, mit Rollsteinen bedeckten Flächen und in Truppen von 6 bis 12 Stück zusammenlebend. Scheint nur auf der Wanderung vorzukommen. Von Ehrenberg in den Gebirgen von Donfudah in Arabien, von uns am Mareb und in Ost-Kordofan eingesammelt.

235. Der gemeine Rehspatz, *Gymnorhis dentata* (Sund.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 268. — ? *Passer canicapillus*, Blanf. Abyss. p. 412. — ? *Passer sp.*, Antin. M. R. p. 114. Dürfte Standvogel sein. Im Bogos-Gebiet, Lebka und

am Ost-Abfall der abessinischen Gebirge, paar- und familienweise im Buschwald.

Blanford's Passer canicapillus aus dem Lebka dürfte ebenfalls zu Gymnorhis dentata gehören.

236. Der falsche Kehlspatz, *Gymnorhis pyrgita* (Heugl.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 30. — Finsch, Coll. Jesse, p. 269. — Blanf. Abyss. p. 413.

Sehr einzeln in den Schluchten, welche von Kerem nach dem Barkah führen, im Lebka und im Schoho-Gebiet. Wohl sedentär.

Anmerkung. Brehm führt einen rothrückigen Hausspatz, *Passer rufodorsalis* (Brehm), der jedoch nirgends beschrieben ist, als Bewohner von Meuſa auf (Habesch, p. 218), während er denselben (*ibid.* p. 342) in Mocha und Aden vorkommen lässt.

237. Der Swainson'sche Sperling, *Passer Swainsonii* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 169. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 30. — Brehm, Habesch, p. 218. — Finsch, Coll. Jesse, p. 269. — Blanf. Abyss. p. 411. — Antin. M. R. p. 111.

Allgemein im Samhar, an den Gehängen von Meuſa, im Bogos-Land und oberen Barkah, sowohl in Dörfern als im Buschwald.

238. Der östliche Goldspatz, *Chrysospiza eucnora* (Licht.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 172.

Zufällig auf der Wanderung im Samhar. Kommt auch in den gegenüberliegenden arabischen Gebirgen vor.

Anmerkung. Ich beobachtete im Januar bei To-Kar einige Flüge von Goldspatzen. Doch kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob diese Vögel zu Chr. euchlora oder zu Chr. lutea gehörten.

239. Der gelbsteirige Grauspaß, *Poliospiza xanthopygia* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 174. — Finsch, Coll. Jesse, p. 270. — Blanf. Abyss. p. 413.

Am Ost-Abhang der abessinischen Gebirge und im Anseba-Gebiet.

240. Der dreistreifige Grauspaß, *Poliospiza tristriata* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 173. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 31. — Blanf. Abyss. p. 413.

In Naqfa, am Ost-Abhang der abessinischen Gebirge und im Bogos-Land.

241. Der weißbürtige Zeisig, *Crithagra leucopygia* (Sund.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 31.

Einzelne unfern Keren und im oberen Barkah. Häufiger um den oberen Albarah bis zum Blauen Nil hinüber.

242. Der gestrichelte Zeisig, *Crithagra striolata* (Rüpp.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 31. — Brehm, Habesch, p. 219. — Finsch, Coll. Jesse, p. 270. — Blanf. Abyss. p. 413.

In Naqfa schaarenweise, ebenso allgemein im Modat-Thal, um das Qedem-Gebirge, sowie im Lebka, an den Nord-Abfällen von Mensa und im Bogos-Land.

**A n m e r k u n g.** In den Bergen der Beni Amer bemerkte ich öfter einen gimpelartigen Vogel, von röthlich-isabellgelber Färbung. Er zeigte sich gesellschaftlich auf buschlosem Terrain, zwischen Rollsteinen und zarten, dürrrem Gras, war ziemlich schüchtern und ließ im Aufstiegen einen kurzen, etwas flötenden声 von Carpodacus oder Bucanetes?

Fam. **A m m e r n** (Emberizidae).

243. Die graue Ammer, *Emberiza cinerea* (Strickl.).

Dieser in Kleinasien heimische Vogel besucht auf seinen Flügen das Bogos-Gebiet, wo wir im Herbst 1861 ein Exemplar einsammelten, das jetzt im Museum zu Braunschweig aufbewahrt wird. Es ist ein junges Männchen.

244. Die Garten-Ammer, *Emberiza hortulana* (Linn.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 30.

Wohl nur den Winter über, stellenweise recht häufig in unserem ganzen Beobachtungsgebiet; namentlich um Torrenten, sowohl im Gebirg als im Flachland.

245. Die rothbärtige Ammer, *Emberiza caesia* (Cretschm.).

Wie die vorhergehende Art. Ohne Zweifel auch nur als Zugvogel im Herbst, Winter und Frühjahr.

246. Die gelbbäuchige Ammer, *Fringillaria flaviventris* (Vieill.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 270. — Blanf. Abyss. p. 411. — Antin. M. R. p. 113. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 30.

Wahrscheinlich nur Sommergäst in den Bergen am oberen Anseba und im südlichen Barkah. Nach Antinori im Djerd im Süden von Tunis vorkommend.

247. Die siebenstreifige Ammer, *Fringillaria septemstriata* (Rüpp.).

Brehm, Habesch, p. 218. — Blanf. Abyss. p. 410. — Antin. M. R. p. 113. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 176. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 30.

Häufig am Abfall der Berge von Mensa, im Modat-Thal, um Kerken und im oberen Barkah, sowohl im Buschwald und an Regenstrombetten, als um Gärten und Wohnungen. Dürfte nicht wandern.

*Anmerkung.* Ich beobachtete die gestrichelte Ammer (*Fringillaria striolata*) hin und wieder im Gebiet der Bischarin, auch in den Bergen der Beni Amer und Habab glaube ich diese Art gesehen zu haben. *C. striolata* wurde von Jesse auch in der Gegend von Senafié erlangt (Finsch, Coll. Jesse, p. 270).

Fam. Lerchen (Alaudidae).<sup>1</sup>

248. Die gemeine Haubenlerche, *Galerita cristata* (Linn.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 272. — Blanf. Abyss. p. 387. (c. syn. *G. lutea*, Brehm). — Heugl. Fauna R. M. Nr. 179.

Allgemein im Küstenland und den benachbarten Vorbergen; weniger häufig im Gebirg. Scheint zum großen Theil Standvogel. Auf den Inseln bei Sauakin sangen die Männchen schon recht fleißig im Monat Januar. Auch auf Dahlak, wo diese Art im Mai und Juni nistet.

<sup>1</sup> Die Lerchen heißen auf Arabisch Qonbar oder Qumber.

249. Die abessinische Haubenlerche, Galerita habessinica (Rüpp.).

? *G. abyssinica*, Brehm, Habesch, p. 218.

Nach Brehm in Menja und den benachbarten Gebirgsabfällen.

250. Die gelbliche Haubenlerche, Galerita flava (Brehm).

? *G. lutea*, Brehm, Habesch, p. 218.

Nach Brehm im Samhar.

251. Die Blanford'sche Haubenlerche, Galerita praetermissa (Blanf.).

Blanf. Abyss. p. 388. t. IV. — Antin. M. R. p. 111.

Nach Blanford allgemein um Senafié. Von Antinori in Dembelas eingesammelt.

252. Die kurzzehige Lerche, Calandritis brachydaactyla (Leisl.).

Brehm, Habesch, p. 219. — Blanf. Abyss. p. 389. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 180.

Auf der Wanderung im Herbst, Winter und Frühjahr schaarenweise im Tiefland. Wahrscheinlich kommt hier auch Calandritis maeroptera vor, welche Art Dr. Klunzinger bei Noseier erlangte.

253. Die rostköpfige Lerche, Calandritis cinerea (Lath.).

Antin. M. R. p. 111. — *A. ruficeps*, Rüpp.

Häufig auf den Gebirgen von Menja, am Taranta und in ganz Habesch. Von Antinori in Dembelas eingesammelt.

254. Die Andersson's-Lerche, Calandritis Anderssonii (Tristr.).

Blanf. Abyss. p. 389.

Von Blanford schaarenweise in der Gegend von Senafé beobachtet.

255. Die Wüstenlerche, Ammomanes lusitana (Gmel.).

Brehm, Habesch, p. 218. (*A. deserti*). — Finsch, Coll. Jesse, p. 272. — Blanf. Abyss. p. 390. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 178.

Vereinzelt im Sahel zwischen Sauakin und Massaua. Wohl Standvogel.

Möglich, daß auch *A. pallida* sich hier finde.

256. Die zweibindige Wüstenlerche, Alaemon desertorum (Stanl.).

Blanf. Abyss. p. 385. — *A. Jessei*, Finsch, Coll. Jesse, p. 273. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 183.

Nicht häufig längs des ganzen Küstenlandes südwärts bis zum Golf von Aden. Auch auf einigen Inseln des Roten Meeres habe ich diese Art gesehen.

257. Die schwanznaßige Gimpellerche, Coraphites melonauchen (Cab.).

*Pyrrhullauda crucigera*, Brehm, Habesch, p. 219. — Finsch, Coll. Jesse, p. 275. t. XXVI. — Blanf. Abyss. p. 390. — *C. nigriceps*, Heugl. Fauna R. M. Nr. 185. — Antin. M. R. p. 112.

Schaarenweise im Küstenland und auf Inseln von Sauakin südwärts bis zum Bab el Mandeb.

258. Die weißstirnige Gimpellerche, *Coraphites albifrons* (Sund.).

*C. frontalis*, Licht. — Blanf. Abyss. p. 391.

Nach Antinori und Blanford im Küstenland von Massaua und in der Bucht von Adulis. Nicht selten in Kordofan.

259. Die weißohrige Gimpellerche, *Coraphites leucotis* (Stanl.).

Blanf. Abyss. p. 292. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 184.

Seltener als die vorhergehenden Arten im Küstenland, allgemein aber in Tafah und Ost-Senar, westwärts bis Dongola.

### Fam. Pi sangfresser (Musophagidae).

260. Der weißohrige Helmvogel, *Turacus leucotis* (Rüpp.).

Brehm, Habesch, p. 219. — Finsch, Coll. Jesse, p.

276. — Blanf. Abyss. p. 316. — Antin. M. R. p. 51.

Amch. Sōrit. Tigr. Saqen.

Im ganzen abessinischen Tiefland; ebenso im Thal des Anseba und in den Schluchten des oberen Barkah. Besucht mit Vorliebe Sykomoren-Bäume. Ist wohl Standvogel und lebt familienweise, gewöhnlich auf 2500 bis 6000 Fuß Meereshöhe.

261. Die Guguka, *Schizorhis zonoura* (Rüpp.).

Brehm, Habesch, p. 219. — Finsch, Coll. Jesse, p.

277. — Blanf. Abyss. p. 316. — Antin. M. R. p. 52.

Aethiopisch Guguka.

In den Thälern am Ost- und Nord-Abfall von Menfa, nordwärts bis in den Lebka, ebenso im oberen Anseba und oberen Barkah allgemein. Scheint nicht zu wandern.

## Fam. Mäusevögel (Coliidae).

262. Der weißohrige Mäusevogel, *Colius leuotis* (Rüpp.).

Brehm, Habesch, p. 219. — Finsch, Coll. Jesse, p. 276.  
— Blanf. Abyss. p. 317. — Antin. M. R. p. 53.

Tigrisch Bela Šebti.

An den Bergen von Mensa und um Keren sehr häufig, auf Feigenbäumen, im Tundab- und Afaziengebüsch meist in kleinen Gesellschaften. Wohl Standvogel.

263. Der langschwänzige Mäusevogel, *Colius maerourus* (Linn.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 275. — Blanf. Abyss. p. 318.  
— Antin. M. R. p. 53.

Mehr im Tiefland als die vorhergehende Art; nordwärts bis in die Berge der Beni Amer; auch bei Keren und in der Umgegend von Massaua. Lebt in kleinen Flügen beisammen und wandert nicht.

## Fam. Ochsenhacker (Buphagidae).

264. Der rothschnäbige Ochsenhacker, *Buphaga erythroryncha* (Stanl.).

Amich. Arets. Tigrisch Tšernā.

Heugl. Fauna R. M. Nr. 154. — Brehm, Habesch, p. 217. — Blanf. Abyss. p. 301. — Antin. M. R. p. 124.

Sehr häufig im Tiefland Scheb und in den benachbarten Thälern, nordwärts bis an den Süd-Abhang von Naqfa beobachtet. Namentlich um Dörfchen und Viehparks. Gesellt sich sowohl zu Kinderherden, als zu Kameelen, Pferden und Maul-

thieren. Wandert nicht, zieht jedoch mit den Herden, welche je nach dem Mangel oder Überfluß von Futter ihre Weideplätze wechseln, im Land herum.

Fam. Nashornvögel (Bucerotidae).<sup>1</sup>

265. Der rothschnäbige Töpf, *Buceros crythrorychynchus* (Tem.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 190. — Brehm, Habesch, p. 220. — Finsch, Coll. Jesse, p. 278. — Blanf. Abyss. p. 328. — Antin. M. R. p. 154.

Familienweise in buschigen und waldigen Thälern nordwärts bis zu den Bergen der Beni Amer. Sehr häufig in den Schluchten um Masaua und der Bucht von Adulis, im Lebka, bei Keren und im oberen Barkah, jedoch nicht hoch in die Gebirge ansteigend.

266. Der gelbschnäbige Töpf, *Buceros flavirostris* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 191. — Finsch, Coll. Jesse, p. 278. — Blanf. Abyss. p. 327.

In Familien um Brunnen und kleine Bäche im Schoho-Gebiet und in den Thälern um das Niedem-Gebirg.

267. Der Nasen-Töpf, *Buceros nasutus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 189. — Brehm, Habesch, p. 219. — Finsch, Coll. Jesse, p. 277. — Blanf. Abyss. p. 329. — Antin. M. R. p. 55.

---

<sup>1</sup> Die Nashornvögel heißen arabisch Abu Tök, tigrisch Kutu.

Nicht selten und oft gemeinschaftlich mit *B. erythrorhynchus* im oberen Barkah, um den Anseba und in den Thälern des Samhar.

268. Der Hemprich'sz-Lod, *Bueeros Hemprichii* (Ehr.).

Brehm, Habesch, p. 220. (*B. limbatus*). — Finsch, Coll. Jesse, p. 279. — Blanf. Abyss. p. 326.

An den Gehängen von Mensa und um den Taranta-Paß. Nicht unter 5000 bis 6000 Fuß Meereshöhe.

269. Der Hornrabe, *Bucorvus habessinicus* (Heugl. e Gmel.).

Brehm, Habesch, p. 220. — Finsch, Coll. Jesse, p. 279. — Blanf. Abyss. p. 330. — Antin. M. R. p. 57.

Auch. Aba Gamba und Erkum oder Herkum. Arab. Abu Qarn, auch Abu Turtür.

Im Modat-Thal, am oberen Anseba und im oberen Barkah meist paarweise auf Weihweiden und Ackerfeldern. Die Paarungszeit scheint in den September zu fallen. Dann vernimmt man häufig den eigenhümlichen dumpfen Ruf dieses Nashornvogels.

Ord. Klettervögel (Scansores).

Fam. Papageien (Psittacidae).<sup>1</sup>

270. Der Halsband-Sittich, *Palaeornis torquata* (Bodd.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 192. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 37. — Brehm, Habesch, p. 220. — Finsch, Coll.

<sup>1</sup> Die Papageien heißen auf Arab. Babażān und Dūrah. Tigr. Hansai. Auch. Donkoro oder Donqoro.

Jesse, p. 280. — Blanf. Abyss. p. 305. — Antin. M. R. p. 41.

Nicht selten paarweise und in kleinen Gesellschaften in den Thälern um Milat, bei Keren und im oberen Barkah, auf 1500 bis 4500 Fuß Meereshöhe. Nistet während der Regenzeit,rottet sich später zusammen und verstreicht da und dorthin, je nachdem eine Dertlichkeit reichlichere Nahrung, namentlich an Baumfrüchten bietet.

271. Der Meyer's-Papagei, *Pionias Meyerii*  
(Cretschn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 193. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 37. — Finsch, Coll. Jesse, p. 280. — Blanf. Abyss. p. 304. — Antin. M. R. p. 40.

Bewohnt ungefähr dieselben Localitäten, wie der Halsbandsittich. Häufig im Lebka und den Thälern von Mensa, ebenso am oberen Anseba, meist in kleinen Flügen beisammenlebend und von sehr lärmendem Wesen. Frisst auch sehr gerne das Mark der Früchte von *Adansonia digitata*, sowie die Samen von *Cassia*.

272. Der Taranta, *Agapornis Tarantae* (Staln.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 195. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 37. — Finsch, Coll. Jesse, p. 281. — Blanf. Abyss. p. 304.

Dieser Zwergpapagei ist Gebirgsvogel und kommt meist zwischen 5000 und 9000 Fuß Meereshöhe vor, so am Taranta-Paß, an den Pässen von Mensa, um den Thad Amba. Auch in Naqfa habe ich ihn gefunden. Lebt paarweise und in kleinen Gesellschaften, namentlich auf Kronleuchter-Euphorbien und Del-

bäumen. Seine Stimme gleicht sehr derjenigen von *Agapornis pullaria*. Die Nahrung besteht vorzüglich in Gesäme, doch frisst der Vogel auch Beeren, selbst die von *Juniperus*.

Fam. Bartvögel (Capitonidae).

273. Der Salf'sche Bartvogel, *Pogonorhynchus habessinicus* (Heugl. e Lath.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 36. (*P. Saltii*). — Brehm, Habesch, p. 220. — Finsch, Coll. Jesse, p. 281. — Blanf. Abyss. p. 309. — Antin. M. R. p. 42.

Nicht selten im Modat-Thal und an den benachbarten Gehängen, sowie im Gebiet des oberen Anseba. Sowohl im Gebüsch als auf Hohnbäumen und meist paarweise vorkommend.

274. Der gewellte Bartvogel, *Pogonorhynchus undatus* (Rüpp.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 36. — Finsch, Coll. Jesse, p. 282. — Blanf. Abyss. p. 310. — Antin. M. R. p. 43.

Im Bogos-Gebiet und an den Ost-Abfällen des abessinischen Hochlandes auf 4000 bis 7000 Fuß Meereshöhe. Ziemlich vereinzelt im Buschwald und in Gebirgsschluchten.

275. Der gelbe Bartvogel, *Pogonorhynchus Vieilloti* (Leach).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 36. — Antin. M. R. p. 42.

Einzelne im Anseba-Thal. Häufiger im benachbarten Barakah und im Tiefland von Takah.

276. Der schwarzköpfige Bartvogel, *Pogonorhynchus melancephalus* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 196. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 36. — Blanf. Abyss. p. 310. — Antin. M. R. p. 43.

Nur auf das Küstengebiet des Nothen Meeres zwischen dem 17. und 14. Grad nördl. Br. beschränkt, zeigt sich übrigens seltener im Flachland als in den Vorbergen und den benachbarten Gebirgschluchten. Von Antinori am oberen Anseba und bei Kerem eingesammelt, von mir noch im Falkat.

277. Der rothürzlige Zwerg-Bartvogel, *Barbatula uropygialis* (Heugl.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 37. — Antin. M. R. p. 43.  
Abessinisch Raaria: Antinori.

Paarweise in vereinzelten Buschgruppen im Bogos-Gebiet. Meist paarweise. Lässt im Juli und August auf niedrigen Gipfeln seinen ungemein lauten Paarungsruf vernehmen und scheint in selbstgegrabenen Baumhöhlen zu nisten.

278. Der Dumont'sche Zwerg-Bartvogel, *Barbatula pusilla* (Dumont).

Finsch, Coll. Jesse, p. 282. — Blanf. Abyss. p. 311.

Jesse und Blanford haben diese Art im Lebka-Thal, im Anseba-Gebiet und um Senafié allgemein gefunden. Der Flügel und Schnabel der nordöstlichen Rasse oder Form ist kürzer, auch in der Färbung zeigen sich einige, wenn auch unbedeutende, so doch constante Abweichungen, so daß wir die nordöstliche Form wohl wenigstens als bestimmte locale Varietät (*B. pusilla orientalis*) trennen müssen.

279. Der Perlvogel, *Trachyphonus margaritatus* (Cretschn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 197. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 37. (bis). — Brehm, Habesch, p. 221. — Finsch, Coll. Jesse, p. 281. — Blanf. Abyss. p. 311. — Antin. M. R. p. 44.

Sehr allgemein im Samhar, Bogos-Gebiet und Barkah, auch in Naqfa (5500 Fuß Meereshöhe) noch beobachtet. Nistet in tiefen Erdhöhlen in den Böschungen der Torrenten und legt 4 bis 5 glänzend weiße Eier. Die Brutzeit fällt in den Juni bis August. Lebt meist in kleinen Familien, die wohl etwas schwefällig von Zweig zu Zweig der Gebüsche schlüpfen, aber namentlich zur Paarungszeit ihren lauten und eigenthümlichen Ruf weithin erschallen lassen.

## Fam. Külfuke (Cuculidae).

280. Der graue Külfuk, *Cuculus canorus* (Linn.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 35. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 205. — Finsch, Coll. Jesse, p. 286. — Blanf. Abyss. p. 312.

Namentlich während der Herbstwanderung in unserem Beobachtungsgebiet, und zwar von Mitte August an. Auch auf die Inseln des Rothen Meeres sich verstreichend.

281. Der erzgrüne Külfuk, *Cuculus clamosus* (Lath.).

*C. chalybaeus*, Heugl. p. 34. — Antin. M. R. p. 48.

Im Anseba-Thal unsern Reisen im Juli, August und September nicht eben selten auf Hochbäumen; Stimme höchst eigenthümlich pfeifend und vielsilbig. Scheint zu wandern.

282. Der weißbäuchige Goldkuif, *Chrysoecoccyx cupreus* (Bodd.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 207. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 36. — Finsch, Coll. Jesse, p. 286. — Blanf. Abyss. p. 313. — Antin. M. R. p. 46.

Ziemlich häufig im Gebiet des oberen Anseba zwischen den Monaten Juni und September. Halbschüsse Junge sahen wir im August auf Büschchen; Hecken und Bäumen in der Nähe von Keren. Einzeln auch im Modat-Thal.

283. Der Klaas'sche Goldkuif, *Chrysococcyx Claasii* (Cuv., Steph.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 206. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 36. — Blanf. Abyss. p. 314. — Antin. M. R. p. 47.

Wie der vorhergehende, doch weniger häufig. Zu Ende Februar im Lebka und Hedai-Thal. Im Magen eines der Erlegten fand ich ausschließlich Käfer.

284. Der Smaragdkuif, *Chrysococcyx smaragdineus* (Strickl.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 35.

Tigrisch Hasama Heremundai (d. i. der Vogel der Regenzeit).

Nicht häufig während der Sommerregenzeit im oberen Anseba-Thal und seiner Umgebung, im Buschwald und auf Hochbäumen, aus deren Laubdach die Männchen ihren flötenden Läden und Paarungsruf hören lassen.

285. Der Hohlerkuif, *Coccytes glandarius* (Linn.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 34. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 204. — Antin. M. R. p. 48.

Sehr einzeln im Bogos-Land und im Samhar beobachtet, namentlich während und nach der Regenzeit. Scheint demnach nicht sedentär.

286. Der Edolis, *Oxylophus atei* (Licht.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 34. — Finsch, Coll. Jesse, p. 285. — Blanf. Abyss. p. 312. — Antin. M. R. p. 49.

Im Hügelland des Samhar und im Gebiet des oberen Anseba, zwischen Juni und October. Im August gab es halbgewachsene Junge. Ziemlich allgemein, namentlich auf Hochbäumen um die Ufer der Wildbäche.

287. Der Elsterfuß, *Oxylophus jacobinus* (Bodd.).

*O. serratus*, Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 34. — Finsch, Coll. Jesse, p. 286. — Blanf. Abyss. p. 313. — Antin. M. R. p. 49.

Wie der vorhergehende, nach meinen Beobachtungen übrigens weniger häufig.

288. Der kleine Spornfuß, *Centropus superciliosus* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 203. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 33. — Brehm, Habesch, p. 221. — Finsch, Coll. Jesse, p. 284. (part.) — Blanf. Abyss. p. 315. — Antin. M. R. p. 50.

Ziemlich allgemein im Samhar, Lebka und im oberen Anseba-Gebiet, niemals in Gesellschaft mit *C. monachus*, mit dem der kleine Spornfuß öfter verwechselt worden ist. Lebt namentlich im hohen, mit Schlingpflanzen dicht durchwobenen Gebüsch

der Ufer von Torrenten, zumeist paarweise und in kleinen Familien. Wahrscheinlich auch in Takah. In Nubien nordwärts bis Amibukol.

289. Der Mönchs-Spornkuif, *Centropus monachus* (Rüpp.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 33. — Finsch, Coll. Jesse, p. 284. (part.)

Arab. Abu-Burbür. Tigr. Dadié.

In Mensa unsfern Debra-Sina. Allgemein im abessinischen Hochland zwischen 3000 und 8000 Fuß Meereshöhe, sowie an den Torrenten um den oberen Atbarah, doch mehr auf Hohenbäumen und im Schilf, als im dichten Gebüsch. Klettert sehr gewandt, oft kopfabwärts an Stämmen hinunter, kommt aber auch viel auf die Erde, wo der Mönchskuif gern unter Gestrüpp und zwischen Wurzeln umherläuft.

290. Der weißschnäbelige Honigkuif, *Indicator Sparrmannii* (Steph.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 33. — Finsch, Coll. Jesse, p. 286. — Blanf. Abyss. p. 307. — Antin. M. R. p. 46.

Während der Regenzeit sehr einzeln im Modat-Thal und seiner Umgebung, im Lebka und um den oberen Anseba. Auch in der Nähe des Tjad Aliba noch zu Ende Septembers gesehen. Alle Honigkuife führen ein stilles, zigeunerartiges Leben im dichten Gebüsch und in den Kronen der höheren Bäume. Ihre unscheinbare Größe und Farbe verrät sie selten, aber das zischende Geschrei macht bald auf ihre Anwesenheit in einer Gegend aufmerksam. Die Nahrung besteht bekanntlich in Bienenlarven, Honig und Wachs, doch nehmen sie im Nothfall auch mit anderen Insecten vorlieb.

291. Der kleine Honigfink, *Indicator minor* (Steph.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 202. — Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 33. — Brehm, Habesch, p. 221. — Finsch, Coll. Jesse, p. 287. — Blanf. Abyss. p. 307.

Selten zur Regenzeit. Von Jesse in Walto am Anseba im Juli eingesammelt.

Die Honigfinken heißen tigrisch Kerkere und H'arh'arēt.

## Fam. Spechte (Picidae.)

292. Der nubische Specht, *Picus (Campothera) nubicus* (Gm.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 37. (*P. aethiopicus*). — Finsch, Coll. Jesse, p. 283. — Blanf. Abyss. p. 305. — Antin. M. R. p. 45.

Im Samhar, Bogos-Gebiet und an den Gehängen von Mensa. Nordwärts bis in das Hedai-Thal und Naro beobachtet.

Anmerkung. In den Bogos-Ländern sammelte ich einen weiblichen Specht ein, welcher dem *P. nubicus* sehr ähnlich, aber kleiner und doch etwas verschieden gezeichnet ist. Vielleicht eine noch unbeschriebene Art. Das Männchen kenne ich leider nicht. Vergl. Heugl. Orn. N.-O.-Afr. I. 2. p. 812.

293. Der Heinrich's-Specht, *Picus (Dendrobates) Heinrichii* (Rüpp.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 37. — Brehm, Habesch, p. 221. — Finsch, Coll. Jesse, p. 284. — Blanf. Abyss. p. 306.

Meist paarweise am Ost-Abfall der abessinischen Gebirge, im Lebka und Anseba-Thal sowie im Bogos-Land.

294. Der Maus-Specht, *Picus (Ipophilus) murinus*  
(Sund.).

Sehr einzeln von uns im Bogos-Gebiet aufgefunden und zwar während der Sommerregenzeit. Ich halte diese Form für spezifisch verschieden von *Picus obsoletus*, den ich häufig im Gebiet des oberen Weißen Nil zu beobachteten Gelegenheit hatte, während *P. murinus* weiter nordöstlich wohnt. Beide Arten kommen nicht gemeinschaftlich vor.

295. Der Wendehals, *Junx torquilla* (Linn.).

Heugl. Cab. Journ. 1862. p. 38. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 201. — Antin. M. R. p. 45.

Besucht einzeln auf seinen Wanderungen das Küstenland und das Bogos-Gebiet, sowie Abessinien.

Ord. Tauben (*Columbae*).

Fam. Columbidae.

296. Die Papagei-Taube, *Treron habessinica* (Heugl. e Lath.).

Brehm, Habeseh, p. 221. — Finsch, Coll. Jesse, p. 288. — Blanf. Abyss. p. 418. — Antin. M. R. p. 129.

Tigr. Hamhamo. Amch. Walié. Die Tauben im Allgemeinen arab. H'amām.

Schaarenweise auf dicht belaubten Hochbäumen, namentlich auf Feigen und Sykomoren, in der Waldregion auf 1000 bis 7000 Fuß Meereshöhe. Nährt sich vorzüglich von Früchten und führt keine sehr sedentäre Lebensweise. Den 16. Grad nördl. Br. wohl nicht überschreitend.

297. Die Guinea-Taube, *Columba guineensis* (Briss.).

Brehm, Habesch, p. 222. — Finsch, Coll. Jesse, p. 288.  
— Blanf. Abyss. p. 415. — Antin. M. R. p. 130.

Tigr. Erqui. Amq. <sup>3</sup>Ergeb.

Nicht selten um den oberen Auseba und im Lebka, sowie auf den Bergen von Mensa, wohl auch im Barkah, sowohl auf Hochbäumen in der Waldregion, als auf Felsen, in Ruinen und abessinischen Kirchen.

Anmerkung. Brehm (Habesch, p. 221) führt die Felsentaube (*C. livia*, var. *glauconotus*) als in Mensa vorkommend auf. Doch wurde der betreffende Vogel nicht erlegt und konnte somit nicht mit Sicherheit die Art bestimmt werden. Möglicher Weise erscheint dagegen die abessinische Rasse der Schnarrtaube (*C. arquatrix*), welche in der Gegend von Halai und Difsan heimisch ist, in den Bergen von Mensa. *C. albitorques* fand ich noch im nördlichen Tigré, Jesse bei Senafié.

298. Die Halsband-Lachtaube, *Turtur semitorquatus* (Rüpp.).

Brehm, Habesch, p. 222. — Blanf. Abyss. p. 416. — Antin. M. R. p. 131.

Die Turteltauben heißen auf Arabisch G'imir und Qimri.

Ungemein zahlreich längs der Wildbäche von Naqfa, am Auseba und im unteren Lebka, stets in der Nähe von fließenden Gewässern. Die Stimme der Männchen klingt ungemein rauh und schrillend. Nistet während der Regenzeit.

299. Die klasse Lachtaube, *Turtur decipiens* (Finsch & Hartl.).

*T. semitorquatus*, Heugl. Fauna R. M. Nr. 208. (part.)  
Viel seltener als die vorhergehende und ausschließlich mehr

auf trockenem, sandigem Boden des Tieflandes bis auf 3000 Fuß Meereshöhe. So im Falfat und Alqra und im Buschwald der Flächen von Scheb. Meist nur paarweise vorkommend.

300. Die weißbänchige Lachtaube, *Turtur albiventris* (Gray).

Brehm, Habesch, p. 222. (*T. risorius*). — Finsch, Coll. Jessc, p. 289. — Blanf. Abyss. p. 417. — Antin. M. R. p. 131. (*Streptopelia barbaru*).

Nicht gerade häufig im Samhar, Lebka und bei Keren, ohne Zweifel auch im oberen Barkah. Sehr gemein dagegen in den Steppen von Ost-Senar.

301. Die egyptische Lachtaube, *Turtur senegalensis* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 209. — Brehm, Habesch, p. 222. — Finsch, Coll. Jesse, p. 290. — Blanf. Abyss. p. 417. — Antin. M. R. p. 131.

Um Sauakin und To-Kar um Brunnengruben. Nicht selten im Samhar in den Gärten von Mefulu, in Naqfa, Naro und bei Keren, ebenso im Barkah.

302. Die gemeine Turteltaube, *Turtur auritus* (Ray).

Antin. M. R. p. 130.

Zur Zugzeit im Küstenland des Roten Meeres.

303. Die metallfleckige Lachtaube, *Chalcophleia afra* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 211. — Brehm, Habesch, p. 222. — Finsch, Coll. Jesse, p. 290. — Blanf. Abyss. p. 417. Vom Thal von Naro an südwärts im Tiefland sowie an

den Gehängen von Mensa und um den oberen Anseba. Meist paarweise im Buschwald. Treibt sich auch viel auf der Erde herum.

304. Die Kap-Zwergtaube, *Oena capensis* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 212. — Brehm, Habesch, p. 222. — Finsch, Coll. Jesse, p. 290. — Blanf. Abyss. p. 418. — Antin. M. R. p. 132.

Arab. Om Bel'meh.

Im Tiefland und zwischen den Vorbergen vom 16. Grad nördl. Br. südwärts. Auch nicht selten um Keren. Sehr zahlreich um Mekunu und bei Arisko. Von Antinori auch in der Gegend von Aben aufgefunden.

Ord. Hühnervögel (Gallinae).

Fam. Sandhühner (Pteroclidae).<sup>1</sup>

305. Das ägyptische Sandhuhn, *Pterocles exustus* (Tem.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 222. — Finsch, Coll. Jesse, p. 291. — Blanf. Abyss. p. 419. — Antin. M. R. p. 132.

In den Niederungen der Gegend von Masaua, namentlich um Torrenten; ebenso im unteren Lebka. Gewöhnlich in Flügen von 3 bis 8 Stück beisammenlebend.

306. Das gestreifte Sandhuhn, *Pterocles Lichtensteinii* (Tem.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 224. — Brehm, Habesch, p. 223. — (*Pt. quadricinctus*). — Finsch, Coll. Jesse, p. 291. — Blanf. Abyss. p. 419. — Antin. M. R. p. 133.

---

<sup>1</sup> Die Sandhühner heißen arab. Qatā. Tigr. Boqbq und Bōbō.

An Regenstrombetten, so im Tafkat, in Naro, am Anseba und Barkah und in den Niederungen der Küste südwärts bis ins Somal-Gebiet. Abends und Morgens in ungeheuren Scharen an Wasserplätzen einschallend und oft noch bis in die späte Nacht in Bewegung. Ueber Tag mehr im Wüstenland und an Gehängen, wo vieles Geröll liegt, sich herumtreibend.

307. Das Busch-Sandhuhn, *Pterocles tricinctus* (Swains.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 224. (not.)

Nur in der Waldregion, stets einzeln und in kleinen Gruppen zwischen Rollsteinen, Gras und Buschwerk. Auf 1000 bis 4000 Fuß Meereshöhe. Nirgends häufig, aber hin und wieder im oberen Barkah und am Anseba vorkommend.

308. Das große Sandhuhn, *Pterocles gutturalis* (Smith).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 224. (not.) — Blanf. Abyss. p. 421.

In kleinen Flügen auf Stoppelfeldern um die Quellen des Anseba. Standorte in Abessinien zwischen 5000 und 7000 Fuß Meereshöhe.

Fam. Perlhühner (Meleagridae).

309. Das nubische Perlhuhn, *Nūmida ptilorhyncha* (Licht.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 213. — Brehm, Habesch, p. 222. — Finsch, Coll. Jesse, p. 291. — Blanf. Abyss. p. 421. — Antin. M. R. p. 137.

Arab. Didjādj el Wādi. Amīd. Zegra. Tigr. H'agul. Belen Jegranié.

Ungemein häufig in den Gebirgen und deren Verzweigungen, ja selbst an mit Büschen bestandenen Regenströmen des Sahel. Von Säuafin südwärts. Im Gebirg bis 8000 Fuß hoch ansteigend. Meist in Ketten von 6 bis 10 Stück, die sich jedoch im Herbst und Winter in ungeheure Flüge zusammenschaaren.

Fam. Waldhühner (Tetraonidae).

310. Das afrikanische Felshuhn, *Ptilopachys ventralis*.

Antin. M. R. p. 136.

Tigr. Derh'o Moqua.

In kleinen Gesellschaften in der Waldregion zwischen 1500 und 10 000 Fuß Höhe. Vorzugsweise an felsigen Plätzen, so an den Gehängen von Mensa, bei Keren, am Tsad-Amba und in den Schluchten um den Taranta.

Die Falzzeit fällt in die Monate Juli, August und September. Dann kämpfen die Hähne unter heftigem Geschrei auf besonderen kleinen Plätzen zwischen Gebüsch und Felsen.

Das afrikanische Felshuhn hält sich, wenn die Ketten nicht auf Aehzung ausgehen, beständig zwischen Trümmergestein auf, in welchem die einzelnen Vögel sich ungemein rasch und gewandt zu verstecken wissen; dieselben fliegen nur, wenn man sie auf offenen Stellen überrascht, auf, fallen aber sogleich wieder ein und suchen durch Laufen und Niederdrücken der Gefahr zu entgehen.

Nur bei sehr heftigem Thau oder nach starken Regengüssen häumen sie auch zuweilen; ein Ähnliches findet hier und da statt, wenn vereinzelte Glieder der Kette vom Vorstehhund aufgestöhrt werden

311. Das Erkel'sche Frankolin, *Francolinus Erkelii* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 215. — Brehm, Habesch, p. 223. — Finsch, Coll. Jesse, p. 293. — Blanf. Abyss. p. 423. — Antin. M. R. p. 134.

Tigr. Qoqah Badi. Amch. Qoq.

Nicht selten im Gebirg um den oberen Anseba und Lebka, nordwärts bis Naqfa und die höheren Gelände von Agra. Wohl nicht unter 3500 Fuß herabsteigend. Auch über einen großen Theil von Ost- und Central-Abessinien verbreitet. Paarweise und in kleinen Ketten im Buschwald, an Regenstrombetten und am Rand von Gerstefeldlungen.

312. Das Clapperton-Frankolin, *Francolinus Clappertonii* (Child.).

Brehm, Habesch, p. 223. (*Fr. Rüppellii*). — Finsch, Coll. Jesse, p. 292. — Blanf. Abyss. p. 425. — Antin. M. R. p. 134.

Tigr. Berhié.

Kettenweise im Buschwald im oberen Anseba-Gebiet und Barkah, ebenso im Hügelland um den Taranta und Senafié-Paß.

313. Das isabellkählige Frankolin, *Francolinus gutturalis* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. p. 214. — Finsch, Coll. Jesse, p. 293. — Brehm, Habesch, p. 223. — Blanf. Abyss. p. 425. — Antin. M. R. p. 135.

Tigr. Zerenié.

In kleinen Gesellschaften im Gebiet des oberen Anseba und an den Gehängen der Schoho-Berge bis nach Senafié, durchschnittlich auf 4000 bis 8000 Fuß Höhe. Einzelner in Naqfa.

314. Das buntfleckige Frankolin, *Francolinus leucoscepus*  
(Gray).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 216. (*Pternistes rubricollis*).  
— Brehm, Habesch, p. 223. — Finsch, Coll. Jesse, p. 292.  
— Blanf. Abyss. p. 426. — Antin. M. R. p. 136.  
Tigr. Beit Abrehi.

Kettenweise im Sahel und den Vorbergen, auch im unteren Lebka, am Hodset und bei Af Abed. Sehr häufig namentlich um die Regenströme der Gegend von Ailet, Masaua und Abdulis, südwärts längs der ganzen Denkeli-Küste. Niemals in Gesellschaft mit den vorhergehenden Arten.

315. Die gemeine Wachtel, *Coturnix communis* (Bonn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 221. — Brehm, Habesch, p. 223.

Arab. Semān (d. i. der Fette, Wohlbeleibte). Amich. Dertset.  
Tigr. Bernié-Higo.

Im Herbst und Frühjahr nicht selten auf der Wanderung in unserem ganzen Beobachtungsgebiet, sowohl im Sahel, als im Gebirg. Im Februar traf ich eine große Menge von Wachteln im Hochland von Naqfa und hörte ihren Paarungsruß im Land der Wolo-Gala im April und zwar auf den Gehängen des Djimba-Gebirges, wohl 13 000 Fuß über dem Meeresspiegel.

316. Das Zwerg-Steinhuhn, *Ammoperdix Hayi* (Tem.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 220. — *Perdix Israelitarum*, Hasselq. (?)

Arab. H'agel und Šeian.

Dieses liebliche Steinhuhn, das namentlich im peträischen Arabien nordwärts bis zum Todten Meere heimisch ist, findet sich nach meinen Erfahrungen noch in den Gebirgen bei Sanaafin.

### Ord. Strauß-Vögel (Struthiones).

#### Fam. Struthionidae.

317. Der afrikanische Strauß, *Struthio camelus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 225. — Brehm, Habesch, p. 224. — Antin. M. R. p. 138.

Arab. N'aāmeh. Am̄ch. Sagon. Geez Qaqano. Tigr. Seguani. Belen Saqan. Bedjah Guire oder Qurēb.

Der Strauß kommt nur im flachen Lande und in den benachbarten Hügeln vor, sowohl im Sahel nordwärts bis jenseits der Ruinen von Berenice, südwärts durch das ganze Denkeli- und Somal-Gebiet, als auch in den Steppen des Binnenlandes. Stellen- und zeitweise zeigt er sich in Truppen von Hunderten. Zur heißen Jahreszeit sieht man diese Riesenvögel selbst im Meer, wo sie gern zu baden scheinen. Nach Antinori legen die jüngeren Weibchen kleinere, glattere Eier als die älteren. Ein Ei, das wir zu Anfang März aus dem Sahel erhielten, wog 480 Drachmen, also  $3\frac{1}{3}$  egyptische Pfunde; aber es gibt welche, deren Gewicht 4 Pfund noch überschreitet.

### Ord. Laufvögel (Grallae).

#### Fam. Trappen (Otidae).

318. Die Arabs-Trappe, *Otis arabs* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 226. — Brehm, Habesch, p. 224. — Finsch, Coll. Jesse, p. 294. — Blanf. Abyss. p. 427.

Arab. Hubarah. Masauan. Daha. Tigr. Taqadat-Harasdai.

Ziemlich allgemein im Sahel zwischen Suaakin und dem Golf von Adulis, hauptsächlich auf Dertlichkeiten, wo Wüstenras und vereinzelte Akazienbüsché stehen. Oft begegnete ich Arab-Trappen hart am Meeressufer, ja sie sollen auch auf der Insel Dahlak vorkommen. Leben meist paarweise und in kleinen etwas zerstreuten Familien, laufen, wenn sie verfolgt werden, rasch und weit und suchen sich dann in die Büsché abzustehlen. Auch ihr Flug ist übrigens hoch, majestätisch und unter Umständen sehr ausdauernd.

319. Die Senegal-Trappe, *Otis senegalensis* (Vieill.).

Antin. M. R. p. 140.

Von Antinori im oberen Barkah eingesammelt. Vereinzelt kommt sie auch im südlichen Kordofan, am unteren Weißen Nil, am Westabfall der abessinischen Gebirge und im Niederland von Schoa vor, meist im Hochgras und in Büschelmais-Pflanzungen.

Fam. Regenpfeifer (Charadriidae).

320. Der gemeine Dickfuß, *Oedicnemus crepitans* (Tem.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 229. — Brehm, Habesch, p. 224. (*O. affinis*). — Finsch, Coll. Jesse, p. 294. — Blanf. Abyss. p. 428. — Antin. M. R. p. 142.

Arab. Keruān.

Nicht selten im Sahel zwischen Suaakin und Masana. Ob Standvogel, kann ich nicht angeben.

321. Der ähnliche Dickfuß, *Oedienemus affinis* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 230. — Finsch, Coll. Jesse, p. 294. — Blanf. Abyss. p. 428. — Antin. M. R. p. 142.

In den sandigen Ebenen um Massaua, südwärts bis an die Somaliküste. Wandert wohl. Von mir auch in Kordofan, am oberen Weißen Nil und unfern des Gazellenflusses angetroffen.

322. Der Steppenkiebitz, *Sarciphorus tectus* (Bodd.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 235. (*S. pileatus*). — Brehm, Habesch, p. 224. — Finsch, Coll. Jesse, p. 296. — Blanf. Abyss. p. 430. — Antin. M. R. p. 144.

In kleinen Gesellschaften im Tief- und Steppenland, nordwärts bis in die Thäler um Aqiq. Hält sich mit Vorliebe in der Gegend von Viehweiden und verlassenen Ansiedlungen auf, und ist ein schlauer, munterer und mutwilliger Gefell.

323. Der schwarzflügige Kiebitz, *Stephanibyx melanopterus* (Rüpp.).

Blanf. Abyss. p. 429. — Antin. M. R. p. 144.

Sehr allgemein in Abessinien, gewöhnlich auf Viehweiden und Wiesenland zwischen 6000 und 12 000 Fuß Höhe. Von Antinori im Monat April bei Azuz, zwischen Alet und Mefulu angetroffen. Soll auch an der arabischen Küste vorkommen.

324. Der Lappenkiebitz, *Hoplopterus senegalensis* (Müll.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 296. (*H. albicapillus*). — Blanf. Abyss. p. 431. — Antin. M. R. p. 143.

Im Mai und August und September von Antinori und

mir im oberen Anseba-Gebiet aufgefunden. Lebt mehr paarweise als seine Verwandten und ist weniger lebhaft und lärmend.

325. Der Spornkiebitz, *Hoplopterus spinosus* (Linn.).

Brehm, Habesch, p. 224. — Finsch, Coll. Jesse, p. 295. — Blanf. Abyss. p. 431.

Paarweise an den Regenstrombetten und Wildbächen des Samhar.

326. Der Kiebitz-Regenpfeifer, *Squatarola varia* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 236.

Vereinzelt im Januar und Februar an seichten Stellen des Meeres bei Sauakin und Aqiq eingesammelt. Es fiel mir an, daß alle von uns dort gesuchten Kiebitz-Regenpfeifer sich nur wenig schüchtern zeigten. Ich maß einige Exemplare im Fleisch, wie folgt: Gauze Länge 11" 8". Schnabelfirste 12,5" bis 15". Flügel 7". Tarsus 1" 8". Schwanz 2" 9½" bis 2" 10".

327. Der rostkehlige Regenpfeifer, *Charadrius asiaticus* (Pall.).

(?) Brehm, Habesch, p. 225. — Blanf. Abyss. p. 429. — *Ch. damarensis*, Strickl.

Hin und wieder zur Zeit der Wanderung an den Ufern des Rothen Meeres. Von Blanford im August auf grasigen Flächen nordwärts vom Lebka beobachtet und eingesammelt.

328. Der Geoffroy-Regenpfeifer, *Charadrius Geoffroyi* (Wagl.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 241 u. 243. — Finsch, Coll. Jesse, p. 297. — Blanf. Abyss. p. 429. — Antin. M. R. p. 143.

Gemein das ganze Jahr über an den Ufern und auf den Inseln und Sandbänken des Rothen Meeres. Nicht im Binnenland angetroffen.

329. Der mongolische Regenpfeifer, *Charadrius mongolicus* (Pall.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 240.

Von mir in kleinen Flügen zur Herbst- und Winterzeit an den Gestaden des Rothen Meeres, südwärts bis zum Golf von Aiden aufgefunden.

330. Der hundschnäbige Regenpfeifer, *Charadrius hiaticula* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 239. — Brehm, Habesch, p. 224.

Nicht selten an den Ufern des Rothen Meeres. Im Herbst in zahlreichen Flügen, oft gemischt mit anderen Regenpfeifern und Strandläufern, den Sommer über dagegen vereinzelt und paarweise.

331. Der Flüß-Regenpfeifer, *Charadrius fluviatilis* (Bechst.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 238. — Finsch, Coll. Jesse, p. 296.

Im Herbst und Winter sehr häufig an der Meeresküste, seltener an Wildbächen des Samhar.

332. Der dreibindige Regenpfeifer, *Charadrius tricollaris* (Vieill.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 242. (*Ch. cinereicollis*). — Finsch, Coll. Jesse, p. 296. — Blanf. Abyss. p. 429,

Paarweise und wohl als Standvogel an Wildbächen und Wasserlachen im Samhar, bei Adulis, Azuz und Alet, ebenso um den oberen Anseba.

333. Der Hirten-Regenpfeifer, *Charadrius pecuarius* (Tem.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 297.

Nicht selten im Nil-Thal. Von Jesse auch in der Gegend von Adulis erlangt. Ich habe diese Art niemals am Rothen Meer gesehen.

334. Der blaße Regenpfeifer, *Charadrius marginatus* (Vieill.).

Blanf. Abyss. p. 429.

Nicht häufig im Juni, Juli und August, bei Djedah, auf Dahlak, bei Massaua und im Golf von Adulis. Die von mir erlegten Vögel trugen ihr Winterkleid.

335. Der See-Regenpfeifer, *Charadrius cantianus* (Lath.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 237. — Brehm, Habesch, p. 225.

Ungemein häufig längs den Küsten des ganzen Rothen Meeres, theilweise als Standvogel.

Fam. Brachschwalben (Glareolidae).

336. Die gemeine Brachschwalbe, *Glareola pratincola* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 232 u. 233. — Finsch, Coll. Jesse, p. 295. — Blanf. Abyss. p. 431. — Antin. M. R. p. 141. Im August und September in zahllosen Flügen in Buchten

und um Inseln mit seichtem, schlammigem Ufergrund im Golf von Massaua.

Auch Glareola melanoptera kommt am Roten Meere vor, doch kann ich nicht angeben, ob sie ihre Wanderungen bis über den Wendekreis hinaus ausdehnt.

337. Der Krokodilwächter, *Pluvianus aegyptius* (Hasselq.).

Antin. M. R. p. 141.

Arab. Tér el Temsah<sup>c</sup>.

Allgemein am Nil und Atbarah. Von Antinori auch in der Gegend von Kasalah erbeutet.

338. Der Wüstenläufer, *Cursorius gallicus* (Gm.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 231.

Arab. Keruān gebeli.

Im Sahel in kleinen Gesellschaften bei Sanakin und im Samhar. Ob Standvogel, weiß ich nicht anzugeben.

339. Der metallflügige Wüstenläufer, *Cursorius chalcopterus* (Tem.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 295.

Von Jesse im August in Waliko, im Thal des oberen Anseba eingesammelt. Überhaupt von seltenem Vorkommen im ganzen östlichen tropischen Afrika.

Fam. Reiherläufer (Dromadidae).

340. Der Reiherläufer, *Dromas ardeola* (Paykull).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 261. — Heugl. Cab. Journ. 1866. p. 285. — Brehm, Habesch, p. 226. — Finsch, Coll.

Jesse, p. 295. — Blanf. Abyss. p. 433. — Antin. M. R. p. 142.

**Krab. Hankōr.**

Allgemein am Rothen Meer, meist auf sandigen Uferstellen und Inseln. Lebt paarweise und gesellschaftlich, nährt sich von kleinen Fischen, Fischbrut und Weichtieren und führt zum Theil eine nächtliche Lebensweise. Die Bruststätten sind ich im Juni und Juli auf flachen Korallen-Inseln. Legt wohl nur ein einziges Ei und zwar in tiefe Höhlen im Sand. Scheint im Winter mehr nach Süden zu verstreichen. Nach Antinori im März nicht auf der Südhälfte des Rothen Meeres.

**Fam. Austersfischer (Haematopodidae).**

341. Der europäische Austersfischer, *Haematopus ostralegus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 245. — Brehm, Habesch, p. 225.

Einzelnd und in kleinen Flügen das ganze Jahr über am Rothen Meer, doch wie es scheint, häufiger im Winter als im Hochsommer.

342. Der schwarze Austersfischer, *Haematopus Moquinii* (Bp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 246.

Von Dr. Rüppell auf Dahlak eingesammelt.dürfte nur zufällig in unser Beobachtungsgebiet verschlagen werden.

343. Der Steinwälzer, *Cinclus interpres* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 244. — Brehm, Habesch, p. 225. Sehr häufig am Strand und auf Inseln des Rothen

Meeres, namentlich in der Nähe von Korallenbänken. Im Winter vermehrt sich die Zahl der Steinwälzer noch durch nordische Ankömmlinge.

Fam. Reiher-Vögel (Ardeidae).

344. Der graue Reiher, *Ardea cinera* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 248.

Dürfte Standvogel an den Küsten zwischen Sauakin und Masaua sein.

345. Der Purpur-Reiher, *Ardea purpurea* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 249. — Brehm, Habesch, p. 225. — Antin. M. R. p. 147.

Vereinzelt das ganze Jahr über auf den Inseln des Nothen Meeres, namentlich an Stellen, die mit Büschen bestanden sind.

346. Der Riesen-Reiher, *Ardea Goliath* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 247. — Antin. M. R. p. 147.

Nicht eben selten zwischen Sauakin und Masaua, ebenso auf Dahlak. Ruht über Nacht auf Büschen und Bäumen der Korallen-Inseln.

347. Der große Silber-Reiher, *Ardea alba* (Linn.).

Scheint in größerer Anzahl auf der Insel Schech Said bei Masaua im März zu rasten. Auch während des Hochsommers dort nicht selten. Eier, welche ich dieser Art zuschreibe,

erhielt ich am 4. März. Dieselben waren noch nicht bebrütet, zwei an der Zahl, und messen im Längendurchmesser 2" 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" bis 2" 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>". Größte Dicke 1" 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

348. Der kleine Silber-Reiher, *Ardea garzetta*  
(Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 250. — Blanf. Abyss. p. 435.

Nicht gar allgemein an den Küsten des Rothen Meeres, sowohl im Sommer, als im Winter.

349. Der See-Reiher, *Ardea Gularis* (Bosc.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 251. — Heugl. Cab. Journ. 1867. p. 283. — Brehm, Habesch, p. 255. — Finsch, Coll. Jesse, p. 297. — Blanf. Abyss. p. 435. — Antin. M. R. p. 147.

Einer der häufigsten Reiher unseres Beobachtungsgebietes, jedoch nur an der Meerestüste und auf Inseln heimisch. Es gibt sowohl graue als rein weiße Individuen jedes Alters und Geschlechts; auch findet man nicht selten Junge, die auf weißem Grund dunkelgrau gescheckt sind, und umgekehrt auf grauem Grund weiße Flecken zeigen. Nistet auf Alvenen von März bis Juni. In seinen Bewegungen ist der See-Reiher sehr gewandt. Er fischt häufig auch in raschem Lauf, zuweilen selbst im Flug. Auch fand ich ihn im Allgemeinen weniger schüchtern, als seine Gattungsverwandten, und er lässt sich zuweilen auf Hafendämmen, ja selbst auf Giebeln von Mattenhäusern nieder.

Um 4. März nahm ich drei Eier aus einem Horste. Das kleinste derselben misst 1" 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" in der Länge und ist 1" 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" dick. Das größte 1" 9<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" Länge bei 1" 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Dicke.

350. Der Kuh-Reiher, *Ardea Ibis* (Hasselq.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 252. — Antin. M. R. p. 149.

Zur Herbstzeit in Flügen längs der Meerestümfen und der Torrenten.

351. Der Schopf-Reiher, *Ardea comata* (Pall.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 253. — Blanf. Abyss. p. 435.

Hauptsächlich erscheint der Schopf-Reiher zur Zugzeit an den Küsten des Rothen Meeres und den abessiniischen Gewässern, einzeln traf ich ihn jedoch auch den Sommer über. Wandert zuweilen in Gesellschaften von 10 bis 20 Stück, die dicht zusammenhalten.

352. Der Zwerg-Reiher, *Ardea minuta* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 255.

Wohl nur während der Wanderung im Herbst und Frühjahr ziemlich vereinzelt am Ufer des Rothen Meeres und an Lagunen.

353. Der kurzfüßige Zwerg-Reiher, *Ardea brevipes*  
(H. & Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 254. — Heugl. Cab. Journ. 1866. p. 283. — Finsch, Coll. Jesse, p. 297. — Blanf. Abyss. p. 435. — Antin. M. R. p. 149. (*Butorides atricapilla*).

Standvogel am Rothen Meer, namentlich häufig auf Korallenbänken und auf Inseln, die mit Gebüsch bestanden und von Kanälen durchschnitten sind. Nistet im Mai, Juni und Juli in

hohen, konisch geformten Ständen, die auf der Erde, auf Klippen, Wurzelwerk, ja selbst auf Büschchen und Bäumen angelegt werden.

354. Der Nacht-Reiher, *Scotaeus nycticora* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 257.

Auf der Wanderung im Juni, Juli, August und September hin und wieder an der Küste des Nothen Meeres und zwar in ungeheuer zahlreichen Flügen, die sich den Tag über im Laubdach der Dondel-Bäume (Rhizophora) niederlassen.

355. Der Schattenvogel, *Scopus umbretta* (Gm.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 262. — Brehm, Habesch, p. 226. — Finsch, Coll. Jesse, p. 298. — Blanf. Abyss. p. 436. — Antin. M. R. p. 150.

Paarweise an Wildbächen und Wasserplätzen in stillen Gebirgstälchen, sowohl am Ost-Abhang der abessinischen Gebirge, als im Gebiet des Anseba. Auch in Naqfa beobachtet. Lebt von Würmern, Insecten, Dipteren-Larven, Fröschen und kleinen Fischen.

Fam. Störche (Ciconiidae).

356. Der Abdims-Storch, *Ciconia (Sphenorrhynchus) Abdimii* (Licht.).

Brehm, Habesch, p. 226. — Finsch, Coll. Jesse, p. 298. — Blanf. Abyss. p. 436. — Antin. M. R. p. 150.

Arab. Sinbilah.

Anfangs März in großer Menge auf der Insel Schech

Said bei Masana, ebendaselbst im Juni beobachtet. Im August und September auf Dahsak und bei Tedjurah. Bringt den Tag gewöhnlich im Binnenland zu, wo er Heuschrecken nachstellt. Morgens und Abends sieht man ihn im seichten Wasser am Strand oder längs der Sandbänke und Korallenriffe; Nachts hänt er mit Pelsikanen, Geiern und Reihern auf den Gipfeln der Alcennien. Nach Antinori im Juni bei Keren.

357. Der weiße Storch, *Ciconia alba* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 260. — Antin. M. R. p. 151.  
Nr. 215. not.

Arab. Belarig und Bagah.

Im Winter in grösseren Gesellschaften in den Steppen von Takah, namentlich gerne Büschelmaisfelder besuchend.

Bereinzelte Paare auch den Sommer über im Thal des Anseba beobacht. Nach Antinori im September flugweise im oberen Barkah.

358. Der weißhalsige Storch, *Ciconia (Dissoura) episcopus* (Bodd.).

Antin. M. R. p. 151.

Von Antinori während der Regenzeit im Anseba-Thal eingefämmelt. Derselbe Reisende begegnete Mitte Septembers im Barkah-Thal einem großen Flug dieser Vögel, welche südwärts zogen.

359. Der Marabu, *Leptoptilus crumenifer* (Cuv.).

Antin. M. R. p. 151.

Arab. Abu Sēn oder Abu Zēn.

Zur Herbstzeit im Barkah.

? 360. Der Sattel-Storch, *Mycteria senegalensis* (Shaw).

Arab. Abu Mijeh und Abu Milieh. Amch. Rāza.

Ich glaube den Sattel-Storch im Monat Juni öfter in Dahlak gesehen zu haben. Um oberen Albarah kommt er zuweilen vor, auch um Qalabat, seine eigentlichen Standorte in Nordost-Afrika sind die Sumpfe und Altächen des Blauen und Weißen Nil.

#### Fam. Löffler (Plataleidae).

361. Der europäische Löffler, *Platalea leucorodia* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 258. — Heugl. Cab. Journ. 1867. p. 282. — Brehm, Habesch, p. 226 (*Pl. tenuirostris*)?

Arab. Abu M'alaqa und Dauás.

Scheint das ganze Jahr über am Rothen Meer vorzukommen. Im Januar und März in Flügen bei Masaua und Sanaakin beobachtet; brütet im Juni in zahlreichen Colonien auf den Inseln des Archipels von Dahlak und der gegenüberliegenden arabischen Küste. Die Stände befinden sich auf Bäumen, Büschen, Grashöpfen, ja zuweilen auf der bloßen Erde.

#### Fam. Nimmersatt-Vögel (Tantalidae).

362. Der afrikanische Nimmersatt, *Tantalus Ibis* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 263.

Arab. N'ageh.

Berirrt sich selten und vereinzelt während der Regenzeit (Juli und August) an die Wildbäche des Sanhar. So habe ich Anfangs August ein Exemplar am Torrent von Amba geschossen.

363. Der europäische Sichler, *Ibis falcinillus* (Linn.).

Antin. M. R. p. 152.

Von Antinori im August am Nusba beobachtet.

364. Der Schopf-Ibis, *Geronticus comatus* (Ehr.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 266. — Blanf. Abyss. p. 436.  
Tigr. Gomarēt.

Ende Januar trafen wir einige Flüge dieses sonderbaren Vogels um die Brunnen von To-Kar. Häufiger waren sie Anfangs Februar im Sahel zwischen Aqiq und Wold Nan, sowie im unteren Tassat. Scheint das Küstenland und die Hochplateaux von Abessinien nur zur Winterzeit zu besuchen. Hemprich und Ehrenberg fanden diese Art auch in den arabischen Gebirgen. Bekanntlich ist sie im Innern von Algerien.

Lebt stets gesellschaftlich und besucht die Gegenden, wo Viehherden ausgetrieben werden, deren Dünger der Vogel nach Käferlarven durchstöbert. Doch nährt er sich auch von Heuschrecken. Die Iris ist feuerrot. Die Stirnregion und der Kamm am Hinterkopf fleischfarbig; Oberkopf blauschwärzlich; Schnabel und kahle Halshaut fleisch- bis purpurbraunroth; Ring um das Auge hochroth; Füße blaß und schmutzig purpur- bis fleischroth, Zehen dunkler; Sohlen der Zehen aschgrau. Ganze Länge 2" 8"". Schnabel vom Mundwinkel 4" 10"". Flügel 15" 6"". Tarsus 3". Mittelzeh mit Nagel 2" 10 $\frac{1}{2}$ "". Schwanz 7" 8"". Die Flügel erreichen fast die Schwanzspitze.

Die von uns untersuchten Schopf-Ibisse waren ungemein fett, das Wildpret schwärzlich und mit einem höchst widerlichen und penetranten Geruch behaftet.

365. Der Kropf-Ibis, *Geronticus carunculatus* (Rüpp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 265. — Finsch, Coll. Jesse, p. 298. — Blanf. Abyss. p. 437.

Tigr. Ba oder B'ah.

Allgemein als Standvogel in den abessinischen Hochländern. Besucht nur die Grenzen unseres Beobachtungsgebietes, nämlich die Hochflächen von Mensa, wo er sich meist auf Wiesen und Hochmooren herumtreibt.

366. Der heilige Ibis, *Geronticus aethiopicus* (Lath.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 264. — Antin. M. R. p. 152.

Im Spätherbst an den Küsten und auf den Inseln unseres Masaua; nur zufällig am Anseba mit Beginn der Regenzeit. Häufig von Ende Mai ab bis Januar im Barkah und am oberen Atbarah.

## Fam. Schneepfeil-Vögel Scolopacidae.

367. Der große Brachvogel, *Numenius arquata* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 267. — Brehm, Habesch, p. 226. — Blanf. Abyss. p. 432. — Antin. M. R. p. 145.

Einzelns jahraus jahraus, häufig aber zur Winterszeit auf Sandbänken und Korallenriffen des ganzen Rothen Meeres; besucht auch hin und wieder die benachbarten Dünens und Weideplätze.

368. Der Regen-Brachvogel, *Numenius phaeopus* (Linn.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 299. — Blanf. Abyss. p. 432. — Antin. M. R. p. 145.

Seltener als der vorige und wie es scheint nur zur Winterszeit, längs den Ufern des Nothen Meeres.

Bei Sauakin schoss ich im Januar einen kleinen Brachvogel, welcher nicht speciell gemessen, beschrieben und präparirt werden konnte. Derselbe hatte blaugrauliche Ränder und fleischfarbige Wurzelhälfte des Unter schnabels.

369. Die rostfarbige Pfuhls-Schnepfe, *Limosa lapponica* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 268. — Brehm, Habesch, p. 227.

Den Winter über einzeln und gesellschaftlich längs dem Gestade des Nothen Meeres.

370. Die Terek-Schnepfe, *Terekia cinerea* (Güldenst.).

Blanf. Abyss. p. 433. — Antin. M. R. p. 145.

Sehr einzeln und wohl nicht alljährlich am Nothen Meer auf der Wanderung. Blansford sammelte ein Exemplar im Januar bei Adulis, Antinori ein anderes im September unfern Massaua ein.

371. Der Teich-Uferläufer, *Totanus stagnalis* (Bechst.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 299.

Im Frühjahr und Herbst einzeln am Nothen Meer und an den Wildbächen des Westabfalls der abessinischen Gebirge. Hier von uns noch im Monat Mai Exemplare im vollkommenen Sommerkleid erlegt.

372. Der getupfste Wasserläufer, *Totanus ochropus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 271. — Brehm, Habesch, p. 227. — Finsch, Coll. Jesse, p. 299. — Blanf. Abyss. p. 433.

Am Rothen Meer vereinzelt. Paarweise den Herbst und Winter über an Gebirgsbächen. Auch in Nagfa beobachtet.

373. Der Rothschenk, *Totanus calidris* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 270. — Brehm, Habesch, p. 227. — Finsch, Coll. Jesse, p. 299. — Blanf. Abyss. p. 433. — Antin. M. R. p. 145.

Von August an den Winter über, zuweilen in großen Flügen, an den Gestaden des Rothen Meeres, uamöglich an sumpfigen Stellen und auf Korallenriffen.

374. Der schwärzliche Wasserläufer, *Totanus fuscens* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 271. (not.)

Selten. Im Januar einige Stück bei Sanafin gesehen, welche sich in Lachen herumtrieben, die durch Zurücktreten des Meeres entstanden waren.

375. Die Straußschnecke, *Totanus glottis* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 269. — Brehm, Habesch, p. 227.

Allgemein am Rothen Meer, viel häufiger zur Winterzeit als im Hochsommer. Jedoch niemals in größeren Flügen, sondern einzeln unter Gesellschaften von anderen Strandläufern und Regenpfeifern.

376. Der Fluß-Uferläufer, *Tringoides hypoleucus*  
(Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 272. — Brehm, Habesch, p. 227. — Finsch, Coll. Jesse, p. 299. — Blanf. Abyss. p. 433.

Das ganze Jahr über am Rothen Meer, jedoch immer nur vereinzelt und paarweise. Namentlich gerne in Hafenplätzen, auf Ankerstanen, Schiffen, Bojen, ja selbst auf Dächern sich niederlassend.

377. Der Stelzfuß, *Himantopus autumnalis* (Hasselq.).

Finsch, Coll. Jesse, p. 300.

Jesse beobachtete diese Art unsern Senasié. Sie mag wohl auf ihren Wanderungen hin und wieder im Barkah erscheinen.

378. Der Kampf-Strandläufer, *Philomachus pugnax*  
(Linn.).

Brehm, Habesch, p. 227. — Antin. M. R. p. 146.

Im August und September in kleineren und größeren Flügen an den Küsten des Rothen Meeres, wie es scheint von Brehm auch im Frühjahr dort beobachtet. Antinori erlangte im September mehrere Jungen in der Nähe von Keren.

379. Der Alpen-Schlamm läufer, *Tringa cinclus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 276. — Blanf. Abyss. p. 433.

Sehr allgemein in Flügen am Rothen Meer, vorzüglich zur Herbst- und Winterzeit; treibt sich um die Brandung, um Lachen, welche vom Fluthwasser zurückbleiben, und auf Korallenbänken herum.

380. Der Zwerg-Schlammiläufer, *Tringa minuta* (Leisl.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 275. — Brehm, Habesch, p. 227. — Blanf. Abyss. p. 433.

In kleinen Flügen den Winter über auf Korallenbänken und in den Lagunen.

381. Der Temminck's-Schlammiläufer, *Tringa Temminckii* (Leisl.).

Brehm, Habesch, p. 227.

Wie der vorhergehende, doch, wie es scheint, weniger allgemein und sogar selten.

382. Der bogenschnäbige Schlammiläufer, *Tringa subarquata* (Güldenst.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 274. — Brehm, Habesch, p. 227.

Das ganze Jahr über am Rothen Meer. Sehr häufig und flugweise im Herbst und Winter.

*N*umerung. Ohne Zweifel findet sich auch der platt-schnäbige Schlammiläufer (*Tringa platyrhyncha*) hin und wieder im Küstenland von Mysana, denn ich habe denselben aus der Gegend von Sues erhalten und bei Nas Belul gesehen.

383. Der Sandläufer, *Calidris arenaria* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 277.

Ungemein häufig in großen, meist aber etwas aufgelösten Flügen im Herbst und Winter auf Sandbänken und in Lagunen des Rothen Meeres und Golfs von Aden.

384. Die Goldschneepfe, *Rhynchaea capensis* (Linn.).

Blanf. Abyss. p. 432. — Antin. M. R. p. 146.

Von Antinori im September in Mensa, von Blanford am fließenden Wasser bei Alin und Ailet erlangt.

Im Monat Mai begegnete ich der Goldschneepfe auch in Torrenten am West-Abhang der abessinischen Gebirge.

Anmerkung: Auch die Sumpfschneepfe (*Gallinago scolopacina*), welche in Abessinien und an der Somal-Küste von uns als Zugvogel öfter gesehen und erlegt worden ist, dürfte das Küstengebiet des Roten Meeres, das Barkah- und das Afarthal zuweilen besuchen.

## Fam. Rallen (Rallidae).

385. Das marmorirte Teichhuhn, *Ortygometra porzana* (Linn.).

Auf der Wanderung im Herbst in Lagunen um das Rothe Meer. Im October 1864 erlegte ich diese Art im Hafen von Sanakin. Hemprich und Ehrenberg saudten dieselbe an der arabischen Küste.

Anmerkung. Möglicher, daß noch verschiedene Rallen (*Crex pratensis*) und Wasserkühner (*Gallinula* und *Fulica*) hin und wieder auf ihren Wanderzügen unser Beobachtungsgebiet berühren.

## Fam. Krähiche (Gruidae).

386. Der graue Krauhuhn, *Grus cinerea* (Linn.).

Arab. Kurq.

Im Januar und Februar im Sahel in kleinen Gesellschaften, so unseru To-Kar, bei Alqiq und Darova.

387. Der Jungfern-Kranich, *Anthropoides virgo* (Linn.).

Arab. Rahō.

Im März in großen Flügen auf sandigen Uferstellen im Hafen von Sanakin.

### Ord. Schwimmvögel (*Natatores*).

Fam. Flamingos (Phoenicopteridae).

388. Der europäische Flaming, *Phoenicopterus antiquorum* (Tem.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 282. (*Ph. erythraeus*). — Brehm, Habesch, p. 228.

Arab. Bāsa roš.

Ich beobachtete den Flamingo das ganze Jahr über am Roten Meer, im Frühjahr mehr paar- und familienweise, im September in zahllosen Flügen. Hält sich zumeist auf Sandbänken und im ruhigen seichten Wasser.

Im Magen fand ich neben Sand und schwärzlicher Erde zahlreiche kleine ein- und zweischalige Muscheln.

Anmerkung. Küppell lässt auch den Zwerg-Flaming (*Ph. minor*) am Roten Meer vorkommen, doch fehlen bis jetzt alle bestimmten Nachweise über diese Angabe.

Fam. Enten-Vögel (Anatidae).

389. Die Fuchs-Gans, *Chenalopex aegyptiacus* (Gm.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 285. — Brehm, Habesch, p. 228. — Finsch, Coll. Jesse, p. 300. — Blanf. Abyss. p. 438.

Arab. Wuz. Amchar. und Tigr. Jebra.

Hin und wieder paar- und familienweise auf Sandbänken der Hafenplätze des Rothen Meeres. Auch an den Torrenten des Samhar und am Auseba.

390. Die weißstirnige Gans, *Anser albifrons* (Gm.)

Im Januar 1874 fand ich mehrere tochte Exemplare in der Nähe der Brunnen von To-Kar. Häufig flugweise zur Winterzeit in Egypten, auf Sandbänken und in Getreidefeldern in der Nähe des Nil.

391. Die Kriegsente, *Querquedula creeca* (Linn.).<sup>1</sup>

Blanf. Abyss. p. 438.

In kleinen Flügen wohl das ganze Jahr über am Rothen Meer, jedoch nicht häufig.

392. Die Pfeif-Ente, *Mareca penelope* (Linn.).

Im October und November bei Sanafin erlegt.

393. Die Löffel-Ente, *Spatula clypeata* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 289. — Finsch, Coll. Jesse, p. 301.

Hin und wieder, auch zur Sommerzeit in Paaren und kleinen Gesellschaften am Rothen Meer.

<sup>1</sup> Die Enten im Allgemeinen heißen auf Arabisch Bat. Amq. Ja woh'a döro. Tigr. Döro Maï.

394. Die Schnatterente, *Chaulelasmus streperus*  
(Briss.).

Im October fand ich ein sehr abgemagertes Exemplar in einer Lagune bei Sanafin.

Fam. Tautcher (Podicipidae).

395. Der Zwerg-Stießfuß, *Podiceps minor* (Lath.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 292. — Finsch, Coll. Jesse,  
p. 301. — Blanf. Abyss. p. 440.

Arab. *χτεῖς*.

Hin und wieder zur Winterszeit in Lagunen des Rothen Meeres.

Anmerkung. Aus der Familie der Sturmvögel ist uns keine Art in der Nähe der Küsten des Samhar vorgekommen. Einen oder mehrere Sturmtaucher sahen wir an der Somaliküste, Zwergsturmvögel aber in Bab el Mandeb.

Fam. Möven (Laridae).

396. Die Härings-Möve, *Larus fuscus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 295. — Blanf. Abyss. p. 440.  
— Antin. M. R. p. 155.

Arab. *Dajābah*.

Standvogel am Rothen Meer und hier im Allgemeinen ziemlich häufig. Die Brntstätten habe ich niemals finden können, erlegte aber hin und wieder auch junge Vögel.

397. Die Lach-Silbermöve, *Larus Heuglinii* (Bree).

*Larus cachinnans*, Pall. (part.) — *L. leucophaeus*, Hartl., Finsch, Heugl. nec Licht. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 296 u. 298. — Finsch, Coll. Jesse, p. 302.

Scheint im centralen und westlichen Asien heimisch und besteht nach meinen Erfahrungen ziemlich vereinzelt zur Winterzeit die Küsten des Roten Meeres und des Golfs von Aden. Im Januar traf ich einige Paare im Golf von Saurakin. Dieselben waren eben im Begriff, das Gefieder zu wechseln.

Nach Finsch wurde ein Exemplar im Juni im Golf von Adulis eingesammelt.

398. Die weißwimprige Möve, *Larus leucophthalmus* (Licht.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 300. — Brehm, Habesch, p. 228. — Finsch, Coll. Jesse, p. 302. — Blanf. Abyss. p. 441. — Antin. M. R. p. 155.

Arab. 'Agameh.

Sehr häufig und zwar als Standvogel an den Küsten und auf den Inseln des Roten Meeres. Nistet im Juli bis September.

399. Die Hemprich's-Möve, *Larus Hemprichii* (Bp.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 299. — Brehm, Habesch, p. 228. — Finsch, Coll. Jesse, p. 302. — Blanf. Abyss. p. 441. — Antin. M. R. p. 156.

Arab. wie die vorhergehende.

Eben so häufig wie die vorhergehende Art, jedoch selten mit

derselben in Flüge vereinigt. Brütet viel früher, und zwar im Juni und Juli auf Inseln und Sandbänken.

400. Die Raub-Seeschwalbe, *Sterna caspia* (Pall.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 305. — Brehm, Habesch, p. 229.

Arab. Abu G'irah.

Fahrtauß, jahrein von uns am Rothen Meere geschen. Nistet ohne Zweifel daselbst.

401. Die Berg'sche Seeschwalbe, *Sterna Bergii* (Licht.).

*Sterna affinis*, Rüpp. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 309. — Brehm, Habesch, p. 229. — Blanf. Abyss. p. 441. — Antin. M. R. p. 154.

Arab. El H'eqt.

Häufig, namentlich auf den südlicheren Theilen des Rothen Meeres, wo diese Art im Juni und Juli in großen Colonien auf Felsinseln ihre Bruststätten ausschlägt.

402. Die mittlere Seeschwalbe, *Sterna media* (Horsf.).

*St. velox*, Rüpp. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 308. — Brehm, Habesch, p. 228. — Finsch, Coll. Jesse, p. 303. — Antin. M. R. p. 154.

Arab. Abu Qesēš.

Wohl in noch größerer Anzahl als die Berg'sche Seeschwalbe am Rothen Meere; einzeln, sowie in zahlreiche Flüge vereinigt, zuweilen gemischt mit anderen Arten. Nistet im Juni und Juli auf Madreporen-Inseln.

403. Die großflügige Seeschwalbe, *Sterna macroptera*  
(Blas.).

Blas. Cab. Journ. 1866. p. 76. — Finsch, Coll. Jesse,  
p. 303.

Ein Exemplar dieser bisher nur aus dem Süden und Südwesten von Afria bekannten Art wurde von Jesse in der Bucht von Abusis im August erlangt.

404. Die Lach-Seeschwalbe, *Sterna anglica* (Mont.).

*St. meridionalis* et *St. anglica*, Heugl. Fauna R. M. Nr.  
310 u. 311.

Arab. El Weq.

Im Herbst von mir in Flügen bei Massaua beobachtet.

405. Die Zwerg-Seeschwalbe, *Sternula minuta* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 316. — Finsch, Coll. Jesse,  
p. 304.

Arab. Diżēz.

Einzelnd und in kleinen Gesellschaften wohl das ganze Jahr über am Roten Meere. Jesse und ich fanden sie daselbst im Juni und Juli. Scheint hier zu nisten, was auch in Unter-Egypten der Fall ist.

406. Die schwarze Seeschwalbe, *Hydrochelidon fissipes*  
(Linn.).

*St. nigra*, Heugl. Fauna R. M. Nr. 315. — ? Brehm,  
Habesch, p. 229. — Finsch, Coll. Jesse, p. 305. — Antin.  
M. R. p. 155.

Nicht häufig am Rothen Meere. Von Jesse im Juni in der Bucht von Adulis, von Antinori im September im Bogoz-Gebiet erlegt.

407. Die weißwangige Meerschwalbe, *Hydrochelidon albigena* (Licht.).

Heugl. Cab. Journ. 1867. p. 285. — Heugl. Fauna R. M. Nr. 307. — Brehm, Habesch, p. 229.

Arab. Abu Baten.

Sehr häufig im Sommer und Herbst am Gestade des Rothen Meeres und auf Korallen-Inseln. Hält gern flugweise zusammen, brütet im Juni und Juli auf Klippen und scheint im December südwärts zu streichen.

Anmerkung. Noch einige hierher gehörige Arten finden sich wenigstens auf der nördlichen Hälfte des Rothen Meeres, so *Sterna fluviatilis*, wahrscheinlich auch *Hydrochelidon hybrida*. Dr. Finsch berichtet über eine sehr kleine, von Jesse gesammelte Form, die nicht bestimmt werden konnte.

408. Die dunkle Meerschwalbe, *Hydrochelion infuscata* (Licht.).

*St. infuscata*, Heugl. Fauna R. M. Nr. 312. — Finsch, Coll. Jesse, p. 305. (*St. panaya*) — Blanf. Abyss. p. 441.

Nicht selten am Rothen Meer und Golf von Aden. Nistet im Juni auf Felsklippen und verstreicht wohl im December weiter südwärts.

409. Der Noddy, *Anous stolidus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 317.

Häufig und meist in größere Flüge vereinigt auf der Süd-

hälfte des Rothen Meeres. Nistet in großen Colonien während der Sommerregenzeit auf den Guano-Bergeu in der Gegend von Ed und auf dem Bur da Rebschi unsern Med an der Somal-Küste.

410. Der Scheereischnabel, *Rhynechops flavirostris* (Vieill.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 318.

Von mir nur einmal unsern Sanakiu bemerkt. Eine Gesellschaft von 6 bis 8 Stück, die am späten Abend fischtend über seichtes Wasser zogen. Häufig auf dem ganzen Nil.

Fam. Tropik-Vögel (Phaethontidae).

411. Der rothschußige Tropik-Vogel, *Phaethon aethereus* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 319. — Heugl. Cab. Journ. 1867. p. 283. — Brehm, Habesch, p. 229.

Paar- und familienweise namentlich im Archipel von Daklak, wo der Tropik-Vogel im Mai und Juni in Felslöchern nistet.

412. Der rotschwänzige Tropik-Vogel, *Phaethon rubricauda* (Bodd.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 320. — Brehm, Habesch, p. 229. — Blanf. Abyss. p. 441.

Ich habe diese Art nie selbst eingefämmelt. Von Blanford wurde ein junger Vogel dieser Art im Golf von Adulis erlangt. Brehm versichert, der Hamburger Capitän Rodatz habe auf einer Insel im Süden des Rothen Meeres den rotschwänzigen Tropik-Vogel in Menge brütend gefunden.

**Anmerkung.** Zu Anfang März 1874 beobachtete ich einen Tropik-Vogel auf See unfern der Harat-Insel. Derjelbe flog über die Masten unseres Dampfers hinweg, hatte zwei lange weiße Schwanzfedern und, wie ich deutlich zu sehen glaubte, einen vollkommen schwarzen Schnabel.

Fam. Pelikane (Pelecanidae).

413. Der braune Tölpel, *Sula fiber* (Linn.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 321. — Brehm, Habesch, p. 229. — Antin. M. R. p. 153.

Arab. Šomet oder Šometah.

Sehr häufig in großen Colonien auf Klippen und Inseln des Roten Meeres. Die Küste besuchen diese Vögel nur höchst selten, nicht einmal in tiefen Buchten habe ich sie angetroffen. Scheint Standvogel.

**Anmerkung.** Nach Brehm käme auch *Sula cyanops* auf der Südhälfte des Roten Meeres vor. Ich fand sie dagegen nicht nordwärts von Bab el Mandeb.

414. Der afrikanische Kormoran, *Graculus africanus* (Gün.).

Blanf. Abyss. p. 441. — Antin. M. R. p. 152.

Arab. 'Aqaq.

An den Wildbächen des Küstenlandes von Maṣāna, sowie am Aḥfeba. Scheint nicht eigentlich zu wandern.

415. Die Trauer-Scharbe, *Graculus lucidus* (Licht.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 324. — *Gr. lugubris*, Rüpp. Syst. Uebers. t. 50.

Von Rüppell an den Regenströmen des Ost-Abfalls der abessinischen Gebirge gefunden. Dürfte nicht Standvogel sein.

416. Der rosenrückige Pelikan, *Pelecanus rufescens* (Gm.).

Heugl. Fauna R. M. Nr. 325. — Brehm, Habesch, p. 230. — Blanf. Abyss. p. 442. — Antin. M. R. p. 153.  
Arab. Abu G'urāb.

Blanford führt *Pelecanus rufescens* und *Pelecanus philippensis* als in der Umgegend von Maſaua und Zula vor kommend auf. Ersterer giebt zu, daß sich beide weder in Größe, noch in Form der Stirnſchneppe und Haube unterscheiden. Bei ersterer Art sei der Kehlsack fleischfarbig, mit feinen gelben Querlinien, bei der letzteren einfarbig faßt (livid).

Andere Forscher wollen die ostasiatische Form wegen der regelmäßigen schwarzen Flecken längs des Oberschnabels als besondere Art ansprechen. Aber ähnliche Flecken, wenn auch nicht so zahlreich und regelmäßig verteilt, kommen auch bei alten afrikanischen Vögeln vor, so daß wohl beide Formen specificisch vereinigt werden können.

Häufig zwischen Sauakin, Maſaua und der Ajab-Bai, theils vereinzelt, theils in großen Flügen, die sich zur Abendzeit auf den mit Büschen und Bäumen bestandenen Inseln sammeln. Ist wenig scheu und füßt oft in der Nähe der Fahrzeuge mitten in Hafenplätzen.

## Verzeichniß

der im nordöstlichen Afrika gebräuchlichen Benennungen  
der Säugetiere und Vögel.

### A. Säugetiere.\*

Ord. Affen (Simiae).

*Colobus Quereza* — Amh. Guériéza, Aethiop. Fonges.

*Cercopithecus griseoviridis* — Amh. Toṭa, Aethiop. Xalestejo (Ludolf), Arab. Abū Leng u. Abeleng, Tigr. Wāg u. Woāg. *Cercopithecus ruber* — Arab. Abū Leng ah'mar, in Kordofan Nango (Müppell).

*Inuus ecaudatus* — Arab. Nisnās, in Algerien Šādi und Qird. *Theropithecus Gelada* — Amh. Tselada.

*Theropithecus obscurus* — Amh. Toqur Zendšero.

*Theropithecus spec.?* — Amh. Unquolāl.

*Theropithecus spec.?* — Amh. Taneš Zendšero.

*Cynocephalus Hamadryas* — Amh. Zendšero, Aethiop. Hebej, Arab. Qird und Robāh, Belsen \*Djogura, Darfur und Kordofan Farkale (Müpp.), Danaf. Domātu, Maſaua \*Kombai, Ḥalenga Hawōleh, Somal. Dajer, Tigr. H'obej.

*Cynocephalus Netscho* — Amh. Netšo und Netš-Zendšero.

*Cynocephalus Babuin* — Arab. Qird, Türf. Maimūn, in Syrien S'adān, Ṣenar Bedir (Müpp.).

*Cynocephalus porcarius* — Amh. \*Dokerié oder \*Doquerié.

*Otolienus galago* — Sudan-Arab. \*Ten oder \*Teng.

\* Die Orthographie der mit einem Stern (\*) bezeichneten Namen ist dem Verfasser nicht mit Sicherheit bekannt.

## Ord. Fledermäuse (Chiroptera).

Die Chiropteren im Allgemeinen heißen Arab. Wut-wāt und Abu Ružāa, Amh. \*Jeflet und Ja Liít 'Of, Tigr. 'Of-Liéti und \*Aura, Belen \*Qerka 'areb, Danaf. \*Hari-Kunbaro, Somal. Fi-Mer.

## Ord. Raubthiere (Rapacia).

*Erinaceus* in genere — Arab. Qonfəd.

*Sorex* in genere — Arab. Om Sisi oder Zizi, auch Sunki (Ehrenb.).

*Ratetus capensis* — Amh. Fāro, Tigr. \*Mogoza und H'ofur, Arab. \*Abū G'aka und \*Leslūs, in Dongolah Abū Kem. *Rhabdogale mustelina* — Arab. Abū Wusiz und Abū 'Afēn, Aethiop. \*T'setgi.

*Lutra spec.* — Amh. \*Aquesta, Tigr. Dauesta, in Senar Saborah und Kelb oder Kebš el Mā.

*Viverra habessinica* — Amh. Aner.

*Viverra genetta* — Arab. Qot-Zobad.

*Viverra civetta* — Arab. Qot-Zobad und Muskieh, Amh. \*Dēri Zebad und Teren, Tigr. \*Hazel Muzu, Danaf. Domed Zobada.

*Herpestes fasciatus* — Arab. Qotneh, Tigr. \*Tedha oder \*T'setha.

*Herpestes Mutscheltschela* — Amh. Mutsheltšela, Tigr. \*Seloz-Lozod.

*Herpestes gracilis* — Amh. Mutsheltšela, Maṣananiyeh Sākieh (Rüpp.).

*Herpestes Pharaonis* — Arab. Nems, Tigr. \*Surda, auch \*Tedha.

*Herpestes sanguineus* — Arab. Abū Wusiz.

*Herpestes leueurus* — Arab. Abū Wuṭān und Om Sisi, nach Rüppell Abu Turbān, Tigr. \*Surdoh.

*Canis variegatus* — Arab. Dib und Abū Šōm (Bašōm).

*Canis mesomeles* — Arab. Abū el H'oseīn, auch T'aleb und O'aleb, Tigr. Quontsal; andere Benennungen für Vulpes in genere sind H'ašil und Bejh'o. Abbadie führt auch einen Wad H'ašil auf. Amchār. Qabero und \*Boh'aria.

*Canis vulpes var. nilotica* — Arab. Abū el Hoseīn.

*Canis famelicus* — Arab. Sabora (d. i. Höhlengräber) und O'aleb.

*Canis semiensis* — Amchār. Walgié, Gala \*Serendida.

*Canis zerda* — Arab. Abū Ŝuf, auch Fenēk.

*Canis familiaris* — Arab. Kelb, Amch. Wuša, Gala Serié, Tigr. Kelbi, Belen Giding, Bedj. O-Jas, Verb. Wel-gi.

*Lykaon pictus* — Amchār. Takuila, Tigr. Tokla, Bedjaueh Manōb, Arab. \*Sem'a oder \*Simir.

*Hyaena striata* — Arab. Dab'a oder Daba'a, Berberiniß \*Atigi oder Ati-gi.

*Hyaena crocata* — Arab. Mar'afil, Aethiop. Zeēb, Tigr. Kerai, Kereds und Zeb, Belen Wag'a, Gala Warabēza, Denfel. Jengula, Somal. Warabeh, Bedj. Keraio, Verb. Dib-gi, Sudan-Arab. Ab G'imah.

*Felis Leo* — Arab. Asad, Sabū'a und Lebūah, Schōho Lābak, Gala Alāti und Lentša, Belen Gamana, Amchār. Anbasa, Tigr. 'Of oder Of, Aiet und H'ajet, Bedj. Hal-dab und Hadab, Danaf. Lōbak, Somal. Lāba und Līwa.

*Felis pardus* — Arab. Nimer, Amch. Newer, Tigr. Neweri und H'omom (H'uml'um?), Bel. Dšilba, Somal. Šebel, Danaf. Kabai, Bedj. Eh'am und Šeh'edo, Gala Kerensa. Die schwarze Varietät Aethiopisch Gesela und Gesela.

*Felis guttata* — Arab. Fahad und Fah'ad, Amch. \*Newer-quolquol, auch \*Newer arār, Somal. \*Hermād.

*Felis Serval* — Arab. Bag, Amch. \*Newer quolquol.

*Felis Lynx(?)* — Amch. Tšoč Anbasa, auch Derq-Anbasa.

- Felis caracal* — Arab. Om-Risād und Om Risād, Am̄d. 'Afen und Afen, Belsen \*Anaq.
- Felis caligata* — Am̄d. Hazla Demat und Ja-dūr Demat, Tigr. \*Okul Dumo.
- Felis maniculata* — Arab. Qot el-Xala; nach Brehm in Massaua Miur.
- Felis chaus* — Arab. Tifa und Tifah, Tſaus: Brehm.
- Felis spec.* — Am̄d. Wobo, Tigr. Mendelit.
- Felis spec.* — Arab. Abū Sotan.
- Felis domestica* — Arab. Qot, Qotah, \*Bis und \*Bisah, auch \*Kadis, in Syrien Hir, Am̄d. Demat, Tigr. Demu, Gaſa Adūri, Belsen Dimo, Bedj. Dšimo und Noliš, Verb. Sab-gi.

## Ord. Nagethiere (Rodentia).

- Sciurus multicolor* — Maſauanij̄ \*Sakie (Rüpp.).
- Sciurus rutilus* — Arab. Saborah, Maſauan. Šilu (Rüpp.).
- Sciurus leuco-unbrinus* — Saborah, Am̄d. Dſedſera.
- Rhizomys splendens* — Am̄d. Filfel und Felfal.
- Dipus* in genere — Arab. G'erbu'a, auch Abū Nauār und Fär el G'ebel.
- Mus* in genere — Arab. Fär, Am̄d. Ajet, Tigr. 'Antšowa, 'Aintšowa und Entsej, Bedj. Sida und Gōwo.
- Meriones* in genere — Arab. Far el G'ebel, Far gebeli, auch G'erbu'a.
- Hystrix cristata* — Arab. Abū Šök, bei Ḫoſeier el Nis, um Sauafin Hanhan, Aethiop. Qonfez, Am̄d. Zert und \*Gerađsa, Tigr. Geraša, Shoho Endet, Somal. Ano-gob.
- Lepus* in genere — Arab. Arneb, Aeth. Mentelié, Am̄d. Tsentſel und Tentſel, Danaf. Bakēla, Somal. Bakeila, Bedj. Helei, Verb. Utlang und Wendlai-gi, Gaſa Hilesa.

## Ord. Zahnsünder (Edentata).

*Orycteropus aethiopicus* — Arab. Abū Zelāf, \*Abū Dīqēn, auch 'Ānak el Ard, Tigr. H'otār (nach Munzinger Xofar) und Daro Meraż.

*Orycteropus (?) spec.* — Tigr. \*Tsehera, Am̄d. \*Afer genait. *Manis Temminckii* — Arab. Om Qirfah, am oberen Mareb Butu.

## Ord. Einhufer (Solidangula).

*Equus caballus* — Arab. Ḥengst und Pferd im Allgemeinen H'osān, Stute Fares, Wallach Tawāši, Fohlen Moher; Aeth. und Am̄d. Faras, in Am̄d. der Ḥengst Korma, die Stute Bazra, der Wallach \*Sanga, Verb. Ḥengst Kadjnundi, Stute Kadj-keri; Gala Ferda und Farda, Bedj. Hadai, Somal. Feres, Sudan-Arab. Q'aud.

*Equus hybridus* — Arab. Bżal und Bażlah, Am̄d. Baqelo, Aeth. Baqeli, Somal. Beret.

*Equus asinus* — Arab. H'omār, Aeth. Adgi, Am̄d. Ahija, Tigr. Edig, Gala Hare und Harje, Schōho Ekoleti, Belsen Dogħara, Bedj. O-Meq, Verb. Hanū.

*Equus (Asinus) africanus* — Arab. H'omār el Wādi, Bedj. Halai-Meq.

*Equus (Asinus) taeniopus* — Arab. H'omar el Wādi, Aeth. Adgi gedam, nach Ludolf Jabada Ażaja, Am̄d. Jabada Aheja, Tigr. Adgi Barażza, Danaf. Debu Kolo, Somal. Damer Debadeh.

## Ord. Dicthänter (Pachidermata).

*Elephas africanus* — Arab. Fil, Sudan-Arab. Abū Nebe-

qah, Bedj. Kurūb, Somal. Merōde, Danaf. Dekan, Gala  
 Arba, Belsen Dšana, nach Münzinger Gane, Aeth. Negié,  
 Amh. Zohon, nach Rudolf Zožon, Tigr. H'armaz, (H'armas: Münz.), das junge Thier Aual, das Weibchen Jéruct.  
*Rhinoceros Keitloa* — Arab. Om Qarn, 'Anazah, H'ariš  
 Kerkend und H'ardid, Aeth. Arwié-xaris, Amh. Awraris,  
 Tigr. Ariš (Xaris: Münzinger), Belsen Gedangik, Somal.  
 Wuil, Bedj. Endit und Haris, auch Šohot (i. e. Einhorn).  
*Hippopotamus amphibius* — Arab. G'amüs el Bah'er (auch  
 \*Azint), Aeth. Bizat, Amh. Gomāri und Gomarié, Gala  
 Robi, Verb. Jasinti, Eretk und Gelöbeh.  
*Phacochoerus Ailiani* — Arab. H'aluf Abū Qarnēn, Aeth.  
 H'arawea haqel (Rudolf), Amh. H'areja, auch Mołłos,  
 Tigr. Ereja (H'arawije: Münz.), Danaf. H'araja, Somal.  
 Dofar, Bedj. O-Jak.  
*Nyctichoerus Hasama* — Tigr. Asama, Amh. Hasama.  
*Sus scrofa domestica* — Arab. H'anzir, auch Qedrük.  
*Hyrax* in genere — Aeth. und Tigr. Geh'ié, Amh. Aškoko,  
 Danaf. Ekeio, Arab. Waber, X'anem Beni Isräil und  
 \*Qeqo, nach Ḥemp̄. und Chr. auch Qleidom, Bedj. Qégé,  
 Mašauau. Geh'ej.

## Ord. Wiederkäuer (Ruminantia).

*Antilope dorcus* — Arab. X'azāleh, auch \*Dabi, Mašauau.  
 und Tigr. Šoquen, Bedj. Ganai, Danaf. Woir-ari, Somal.  
 Dēro, Verb. Gel.  
*Antilope lacripes* — Arab. Abū H'arabāt.  
*Antilope tilonura* — Tigr. \*Telbadu oder Tel-badu.  
*Antilope leptoceros* — Arab. Abū H'arāb.  
*Antilope Soemmerringii* — Arab. Om Š'abah, auch \*Ariel, Tigr.  
 Arab und H'arab, Danaf. Bus-ādu, Somal. Auēl oder Awul.

- Antilope Dama* — Arab. 'Adra, Lēdra, el R̄el und 'Ariel.  
*Antilope montana* — Am̄ch. Fiéqo, Aeth. Waital, Arab.  
 H̄amra, \*Atrob, \*Odrob und Mor (?).  
*Antilope (Orcotragus) saltatrix* — Am̄ch. Sasā, bei Maſaua  
 \*Qobtu, Tigr. \*Embiraga und Humber-h̄aqa, Bedj.  
 Maſokib.  
*Antilope Hemprichiana* — bei Maſaua Beni Isr̄ael, Tigr.  
 'Atro, Tigrenj. Endšu, am Setit \*Diq-diq, Danač. Séqéré,  
 Somal. Saqaro.  
*Antilope Madoqua* — Aethiop. Orna, Am̄ch. Midāqua, auch  
 Miédaqua (Abbadie), Tigr. \*Qalbadu ('Atro?), Denanid  
 und Midaq, Maſauan. Danido, Sudan-Arab. \*Om 'Otrud (?).  
*Antilope redunca* — Am̄ch. Bohor.  
*Antilope Defasa* — Am̄ch. Defasa, Arab. \*Om 'Hetehet, in  
 Kordofan Bura und Xora (Rüpp.).  
*Antilope Bakrii* — Arab. Abū M'aaref, Am̄ch. Woadembi (?).  
*Antilope Beisa* — Arab. Bēidah, Danač. 'Ari, Somal. Beid,  
 in Kordofan Dama (Rüpp.)?, Tigr. B'ezā.  
*Antilope leucoryx* — Arab. Wah's el Baqr.  
*Antilope nasomaculata* — Arab. Baqr el Wah's und 'Akaš  
 und 'Aqaš.  
*Antilope strepsiceros* — Arab. Nelet und Jeled, im Ḥomrāu  
 \*Unquṭir (Om Qutir) und Miremreh, Am̄ch. Agazēn,  
 Tigr. Garua (wohl vom semitischen G'ari), auch Dšauen.  
*Antilope Decula* — Am̄ch. Dokula, Arab. H̄uš.  
*Antilope bubalis* — Am̄ch. Tóra, Tigr. Tōri und Tōtel, Be-  
 len \*Qaraqua, in Senar Tētel.  
*Antilope (Eleotragus?) spec.* — Arab. \*Xondieh.  
*Antilope (Acronotus?) spec.* — Am̄ch. \*Soāda.  
*Antilope (Hippotragus?) spec.* — Am̄ch. Worobo.  
*Antilope (Calotragus?) spec.* — Arab. Mor.  
*Antilope spec.* — Arab. \*Om Xat.

*Antilope spec.* — Arab. H'amrah.

*Aegoceros Beden* — Arab. Beden und W'ael oder Wa'el, in Egypten Tētal, im nördlichen Nubien Kebš el G'ebel und Neqer, Bedj. 'Eu oder E'o.

*Capra hircus* in genere — Arab. X'anem, der Bock Tes, die weibliche Ziege M'ezah und 'Anz, Amich. Fijel, Tigr. \*Del, Negel, Madef und Mefred, Belsen Fintira, Bedj. Te-Naï, Berber. Berti.

*Ovis aries* in genere — Arab. Xaruf, der Bock Kebš, Amich. Bag oder Bag'e, Bedj. Tirfem und Argeno, Verb. Kariu.

*Bos pumilus* — Arab. G'amūs el Xalā, Amich. Goš, Gala Gefersa, Tigr. und Bedj. Agaba, Aethiop. Dasekano (Rudolf).

*Bos taurus domest.* — Arab. der Ochse Oör, die Küh Baqer, das Kalb 'Igel, Kindvich im Allgemeinen Beheim; Amich. der Ochse Berié, der Farren Wojefan, die Küh Lam, Kalb Tedša und Embasa, Kindvich Kabt; Tigr. der Ochse Beriéj, die Küh Wot oder Lami, Stier Walhar; Aethiop. Ochse Lahem; Verb. Ochse Gurki, Küh Ti-keri; Bedj. Ochse Laga (nach Minzinger O-Jo), Küh O'-Šā; Belsen Stier Bile (Minzinger); Somal. der Ochse Dibi, die Küh Lō; Gala der Ochse Kotijo, die Küh Sāa.

*Bos bubalus domest.* — Arab. G'amūs.

*Camelus Dromedarius* — Arab. G'emel, das Reitkameel Hegín, Stute Nāqali; das junge Kameel Q'aud; Aethiop. Gemle, Stute Aneb; Amich. Gemale, Sudan-Arab. Kalqeli, Verb. der Hengst Kam-nudi, die Stute Kim-gi; Barkah Kam-baro, Belsen Gedem (nach Minzinger Gimile), Gala Gāla, Somal Geil und Gel, Danak. Rekiba, Bedj. O-Qam oder O-Kam, Bazen Ārkoba, Schoho Galati.

*Camelopardalis Giraffa* — Arab. Zerāfah und Zerifah, Aethiop. Zerat, Amich. G'erata-Qatsin, Tigr. Zeōta und Zerafa, Somal. Hal-Gēri, Bedj. Serāf.

## Ord. See-Sängethiere (Pinnata).

*Halicore cetacea* — Arab. *Tauileh*, *G'ilid* und *Naqah el Bah'er*, nach Ehrenberg *Lotem*, *Danaf.* *Urum*, *Somal.* *Gel-Bade*, *Hebr.* *Tazaš(?)*.

*Manatus spec.* — Arab. *Om Zebeibeh*, *Am̄q.* \**Auli*, *'Aila* und *Ja-Bah'er Tedša*.

*Delphinus Abu Salam* — Arab. *Abu Salam*, *Danaf.* *Hoheri*, *Somal.* *Hombaro*.

*Phocaena spec.* — Arab. *Bumah*.

*Balaenoptera Bitan* — Arab. *Betan*, *Aethiop.* *'Asa-Anberi*, *Danaf.* *Betanch*, *Somal.* *Neberi*.

## B. Vögel.

Der Naber hat keinen Collectivnamen für Vögel, die größeren Formen nennt er *Ter*, (Plur. *Tür*), die kleineren *'Asfur* (Plur. *'Asafir*). Amharisch heißt der Vogel *'Of*, *Tigrisch* \**Wof*.

## Ord. Raubvögel (Accipitres).

*Gypaetus meridionalis* — Arab. *Big*, *Aethiop.* \**Qilqil-Agafi*, *Am̄q.* \**Fijel* *'Aqasi* und \**Tšowita*.

*Neophron percnopterus* — Arab. *Razam*, *Tigr.* \**Setei Ilakan* und *Gam*.

*Neophron pileatus* — *Am̄q.* \**Tenb Amora*, *Tigr.* *Bel'a Xari*. *Vultur* in genere — Arab. *Niser*, *Am̄q.* *Neser* und \**Amora*, *Tigr.* *Bel'a Qambi*, auch *Guma*, *Belen Qab*.

*Buteo Augur* — *Am̄q.* *Gidigidi*, *Tigr.* \**Tsugedim*.

*Aquila* in genere — Arab. *Saqer el Arnab*, *Am̄q.* *Neser* und *Nezer*, *Tigr.* \**Gambi*.

*Pandion haliaetus* — Arab. *Mansūr* und *Ketaf*.

*Pteroaetus vulturinus* — *Am̄q.* *Neser Worka*.

*Helotarsus ecaudatus* — Arab. Saqer el H'akim und Saqer el Arnab, Tigr. Hebej-Semaj, Somal. Nabodi.

*Falco* in genere — Arab. Saqer, Amh. Gidigidi.

*Falco saquer* — Arab. Saqer šahīn.

*Falco tinnunculus* — Arab. Saqer Abū Šerageh und Saqer Abū G'erād.

*Milvus aegyptius* — Arab. H'edaieh, Amh. Tselat, Tigr. \*Lito.

*Elanus melanopterus* — Arab. Abū Hauām und Hauān.

*Melierax polyzomus* — Arab. Abū Šikl (Hartm.), Somal. Hatkaadak (Speke).

Anmerkung. Munzinger und d'Abbadie erwähnen noch nachstehender tigrifischer Benennungen für einige Raubvögel: Lilo (aigle: Munz. = épervier: d'Abbadie); Nahil (aigle: Munz.), Gam (vautour blane à eou long: Munz.), Gan (esp. de voutour très grand: Munz.), Alets (épervier: d'Abbadie).

*Serpentarius reptilivorus* — Arab. Tēr el Nesib, Tigr. \*Fares Seitan.

*Strigidae* in genere — Arab. Bumah, Tigr. und Amh. Gugut, Gobqa, Gugit, Gugua, nach d'Abbadie Gān.

#### Ord. Singvögel (Passeres.)

*Caprimulgus* in genere — Arab. \*X'ureh \*Qurreh.

*Hirundo* in genere — Arab. 'Asfur el G'eneh, Sunūnū, Xotāf, 'Asfur el Amāneh, Amh. \*Ladsud, Tigr. \*Loha h'eidu und Gedo.

*Coracias habessinica* — Tigr. \*Wade-Gimèle (Lefeb.), wohl besser Wad Gimet, d. i. Kind der Wolken.

*Alcedo* in genere — Arab. Saīād el Samak und Abū Reqe'a, Tigr. Bel'a 'Asa, Amh. 'Asau Dšin.

*Merops* in genere — Arab. Šaqā' und Šaqāq, Tigr. Bel'a Nehbi.

*Upupa epops* — Arab. Hudhud, Tigr. Endearmamito (Lefeb.), Amh. Endermamiti: Antinori, Belen. Abukihi: Antinori.

- Irrisor erythrorhynchos* — Tigr. \*Berza Wibo, Am̄d. \*Berkok-Akoas: ዲቃብ.
- Nectarinia* — Arab. Abū Riš.
- Camaroptera brevicaudata* — Belen Isa.
- Aēdon galactodes* — Arab. Bulbul.
- Sylvia* — Am̄d. und Tigr. \*Tomba und \*Thembit.
- Ruticilla* — Am̄d. \*Kola-beit: ዲቃብ.
- Saxicola* — Am̄d. \*Dekula: ዲቃብ.
- Turdus scmiensis* — Am̄d. Zagra-godef: ዲቃብ.
- Pycnonotus Arsinoë* — Arab. Bulbul.
- Oriolus* — Arab. Sufer, Tigr. \*Ambala oder Ombala.
- Dicrourus divaricatus* — Belen Bolia: Antinori.
- Terpsiphone melanogastra* — Tigr. \*Wof Weber, Am̄d.  
‘Of-Aubasa: Antinori.
- Lanius humeralis* — Am̄d. \*Gura-majale (mēale): ዲቃብ,  
Gruamakli: Antinori.
- Malaeonotus erythrogaster* — Am̄d. \*Osaïtsabo oder \*Wai-nabo: ዲቃብ.
- Dryoscopus aethiopicus* — Tigr. \*Gura-mele: Antinori.
- Telephonus erythropterus* — Am̄d. \*Kenefe-Kola (Quola?): ዲቃብ.
- Corvus* in genere — Arab. X'urāb, Tigr. \*Goali, nach Munz.  
Kuwā, Am̄d. Qura.
- Corvus umbrinus* — Arab. X'urāb el Noh'i.
- Archicorax crassirostris* — Am̄d. Baqāq, Netše-Ras-Qora: ዲቃብ.
- Fregilus graculus* — Tigr. \*Dšadšadié (\*Hora: ዲቃብvre),  
Am̄d. \*Wof Thaga: ዲቃብ.
- Lamprocolius* — Am̄d. \*Wordit, Tigr. \*Wōri und \*Wāro,  
nach ዲቃብvre Tigr. und Am̄d. \*Suhali oder Wohali.
- Pholidauges superbus* — Somal. Šimber-Load: Spefe.
- Notauges albicapillus* — Somal. Planagür.
- Pilorhinus albirostris* — Tigr. und Am̄d. Warda.
- Amydrus Rüppellii* — Tigr. und Am̄d. Warda.

*Textor alecto* — Tigr. Wudserek, Bel. Bokurdumū: Antin.  
(Toqur Demu?)

*Hypphantornis* in genere — Am̄d. Ombala.

*Hypphantornis galbula* — Tigr. \*Keraje: የዕቆብ, Am̄d. \*Sebenié: የዕቆብ.

*Euplectes franciscana* — Arab. ሳሬሱር አክማር, Am̄d. Masqal oder Ja Masqal-'Of, Tigr. Wof-Masqale.

*Penthetria* in genere — Tigr. 'Elet. -

*Steganura Verreauxii* — Am̄d. \*Deme, Diéme.

*Hypochera niteus* — Tigr. Tito.

*Habropyga* in genere — Tigr. Tito, Am̄d. \*Tembit.

*Passer Swainsonii* — Tigr. \*Boqluadi: የዕቆብ.

*Poliospiza tristriata* — Tigr. \*Ainō-Kolo: የዕቆብ.

*Chrithagra striolata* — Am̄d. \*Santārita: የዕቆብ.

*Critrinella nigriceps* — Am̄d. \*Tšelo, Tšiolo.

*Alauda* in genere — Arab. Qonbar, Am̄d. \*Derdset: የዕቆብ.

*Turacus leucotis* — Am̄d. \*Sōrit, Tigr. \*Saqen oder Saganié.

*Schizorhis zonura* — Am̄d. Guguqa, nach Antinori \*Duldulo.

*Colius leucotis* — Tigr. Bel'a Šebti.

*Colius macrourus* — Arab. Abū Denūb, Abu Qarn: Brehm.

*Buphaga erythroryncha* — Am̄d. Aretš, Tigr. Tserna, n. የዕቆብ.

Tsernahai, nach d'Abbadie Kumbéret, Arab. 'Asfar el Baqr.

*Buceros* in genere — Arab. Abu Tōk, Tigr. Kutu, Am̄d.

Macidū: Antinori, Bel. Katuro.

*Buceros flavirostris* — Somal. Kudun-Kutu.

*Bucorvus habessinicus* — Arab. Tēr Abū Qarn, nach Brehm

Om Tortor, Am̄d. Erkum und Herkum, Tigr. Aba Ganba, Masauan. Gumguma.

#### Ord. Skettervögel (Scansores.)

*Psittacus* in genere — Arab. Babażan und \*Dūrah, Tigr.

\*H'ansai, Am̄d. Donkoro.

*Palaeornis torquata* — Am̄d. Girta: Antinori, Bel. Karura.

*Pionias Meyeri* — Tigr. \*Ensa: Antinori, (potius \*H̄ansai), Bel. Dalala: Antinori.

*Agapornis Tarantae* — Tigr. Dura: Lefeb.

*Pogonorhynchus habessinicus* — Tigr. \*Onhali: Lefeb.

*Trachyphonus margaritatus* — Tigr. \*Trunqo, nach Lefeb.

Selchek, Am̄d. Gindogurgur: Antinori.

*Chrysococcyx smaragdineus* — Tigr. \*Hasama xcreintei.

*Centropus monachus* — Arab. Abū-Burbūr, Tigr. Dēdié ob. Diéde.

*Indicator* in genere — Tigr. H̄arli'ariét oder Arariét, Am̄d.

Kerkérié.

*Picus* in genere — Arab. Naqar el h̄asab, auch Negār.

#### Ord. Tauben (Columbae).

*Treron habessinica* — Tigr. \*Hamhamio, Am̄d. Walié.

*Columnba guineensis* — Tigr. 'Ergui, Am̄d. 'Ergeb.

*Columnba* in genere — Arab. H̄amāmeh.

*Turtur* in genere — Arab. Ḡimri mid Qemri, Tigr. \*Wanez, Am̄d. Dabo.

*Oena capensis* — Arab. Om Belémah.

Ummerlung. Münzinger und d'Abbadie erwähnen auch einiger tigrischen Benennungen für Taube, nämlich: Bedalié, Tukor-šah'ar mid Gududalié.

#### Ord. Hühnervögel (Gallinae).

*Pterocles* in genere — Arab. Qata, Tigr. \*Bobo und \*Boq-boq, nach Lefebvre \*Berhié.

*Numida ptilorhyncha* — Arab. Digāg el Wadi, Tigr. D̄sgra mid H̄aqal, Am̄d. Zegra, Bel. \*Jegranié.

*Ptilopachys ventralis* — Arab. Digāg el H̄agar, Tigr. Dirho-

Moqua, nach Antinori Mai-Daro (wohl besser Mai Doro), in Ḫordofan \*Quera.

*Francolinus Erkelii* — Tigr. \*Qōqah'-Bādi, nach Ṭefebvre

\*Qoquh'a, Amh. Qoq, nach Ṭefebvre \*Qaqhe, Bel. Koia.

*Francolinus Clappertonii* — Arab. Digāg el Qeš, Tigr. \*Berhié.

*Francolinus gutturalis* — Tigr. \*Zerenié, nach Ṭefebvre \*Suruh'ej.

*Francolinus leucoscepus* — Tigr. \*Biét Abrēzi.\*

*Coturnix communis* — Arab. Semān, Amh. Dertset, Tigr.

\*Bernié-h'iyo (Bernigo: Ṭefeb., Kok'aj: d'Abbadie).

*Anumoperdix Hayi* — Arab. Hagel und Šeiān.

*Gallus domesticus*. Der Hahn. — Arab. Dik, die Henne

Ferzah und Digāgah, Hühner im Allgemeinen Digāg, Tigr.

Dirho, Amh. der Hahn Aura-Doro, die Henne Dorō, Berb. Dermadi-gi.

#### Ord. Straußvögel (Struthiones).

*Struthio camelus* — Arab. N'aāmch, Amh. Sagon, Aeth. Qoqano, Tigr. \*Seguani (Segen: Munz.), Buraj, Belen Sagan, Bedj. Quire oder Gurēb, Somal. Goroio, Danaf. Goroja.

#### Ord. Lautsvögel (Grallae.)

*Otis arabs* — Arab. Ḥubārah, Maṣauan. \*Dah'a, Tigr. \*Ta-gadat-H'arasdai.

*Oedicnemus crepitans* — Arab. Keruān, Tigr. \*Ja Liélit Wof.

*Oedicnemus affinis* — Somal. Kedinhitu, Maṣauan. \*Gara-Ali (Brehm).

*Hoplopterus spinosus* — Arab. Siqsāq.

---

\* Wahrscheinlich von berzé, kahl werden, vielleicht auch von barh'a, glänzen; dann Biét abrehi zu schreiben.

- Squatarola varia* — Arab. Abū H'aḡar.  
*Carsorius gallicus* — Arab. Keruān ḡebeli und Durēg.  
*Pluvianus aegyptius* — Arab. Trēl Temsāh'.  
*Dromas ardeola* — Arab. H'ankōr.  
*Ardea cinerea* — Arab. Balasān und Balazān, auch Abu 'Anqā, Tigr. \*Waa-teiméise: ɻefeb., ɻmđ. \*Watamiéne.  
*Ardea Goliath* — Arab. El-Mirah und El-Waq.  
*Ardea gularis* — Arab. X'arnūq, Abu Sarāh' und Anaz'a.  
*Ardea alba* — Arab. \*X'edi und Waq el abiād.  
*Ardea garzetta* — Arab. Bejādi.  
*Ardea ibis* — Arab. \*Abū Qerdān.  
*Ardea comata* — Arab. \*Sabīsah.  
*Scotacus nycticorax* — Arab. Waq.  
*Scopus umbretta* — ɻmđ. Ja-Woza Qāra.  
*Ciconia Abdumii* — Arab. Sinbileh, ɻmđ. und Tigr. Šumala: ɻefeb., und Wangu: Münz(?)  
*Ciconia alba* — Arab. Belārīg und Baḡah.  
*Leptoptilus crumenifer* — Arab. Abu Sēn und Abu Zēn.  
*Mycteria senegalensis* — Arab. Abū Mēieh und Abū Milieh, ɻmđ. Rāza.  
*Platalea leucorodia* — Arab. Abu M'alaqah und \*Dauās.  
*Tantalus ibis* — Arab. Na'egāh.  
*Ibis falcinellus* — Arab. H'erēz, ɻmđ. \*Ti-hanhia: ɻefeb.  
*Geronticus comatus* — Tigr. \*Gomarēt.  
*Geronticus carunculatus* — Tigr. \*Bā, \*Ba'ah (Ha-ha: ɻefeb.).  
*Geronticus aethiopicus* — Arab. Na'egeh, Abū-Mingel und Abu Qadūm, ɻmđ. Gagano.  
*Numenius arquata* — Arab. Karuān-ȝēti.  
*Gallinago scolopacea* — Arab. \*Xoseh und Bekatśin.  
*Rhynchosaea capensis* — Arab. \*Xōseh-hindi.  
*Himantopus autumnalis* — Arab. Biġi und \*Suqdah.  
*Fulica atra* — Arab. X'ur und X'urah.

*Gallinula chloropus* — Arab. Digāg el-Mā, Am̄q. Ja-Woza Doro.

*Grus cinerea* — Arab. Kurq.

*Anthropoides virgo* — Arab. Rahō.

Überleitung. Der Pfauenfranich wie seine Verwandten heißen in Am̄qara Šimel.

Ord. Schwimmvögel (Natatones).

*Phoenicopterus antiquorum* — Arab. Nihāf und Bāschā Roš.

*Anseres* in genere — Arab. Wuz, Am̄q. Jebra.

*Anates* in genere — Arab. Bat, Am̄q. Ja Woza Doro.

*Podiceps* — Arab. X'utēs.

*Larus fuscus* — Arab. Daŷābah.

*Larus leucophthalmus* — Arab. 'Aḡāmeh.

*Larus Hemprichii* — Arab. 'Aḡāmeh.\*

*Sterna caspia* — Arab. Abū G'irah und Abū Belalī.

*Sterna media* — Arab. Abū Qešēš.

*Sterna Bergii* — Arab. \*El Il'eqt.

*Sterna anglica* — Arab. \*El Uēq.

*Sterna minuta* — Arab. \*Diŷēz.

*Sterna albigena* — Arab. Abū Batēn.

*Rhynchos flavirostris* — Arab. Abū Moqas.

*Sula fiber* — Arab. Šmet und Šometah.

*Graculus* in genere — Arab. 'Aqaq.

*Pelecanus* in genere — Arab. G'emel el-Bah'er, Abū Šilbah und Baḡā.

*Pelecanus rufescens* — Arab. Abū G'irbeh und Abu G'urab, Danaf. Antele: Brehm.

---

\* In Egypten heißen die Möven im Allgemeinen Nurs und Tilit, in Algrien Bū 'Omeīrah.

**Nachträge und Berichtigungen**  
zur Aufzählung der Säugethiere und Vögel des Gebietes  
der Beni Amer und Habab.

pag. 6, Zeile 10 von unten statt arab. zu setzen amchar.

pag. 7, Zeile 4 von oben statt Damo zu setzen Damo.

pag. 12, Zeile 1 von oben statt Guola zu setzen Quola.

pag. 12, Zeile 11 von unten statt Otolienus zu setzen Otolienus.

pag. 13, Zeile 3 und 4 von oben statt Otolienus zu setzen Otolienus.

pag. 13, Zeile 11 von unten statt Schweifen zu setzen unternehmen.

pag. 14, Zeile 7 von oben statt der zu setzen des.

pag. 15, Zeile 2 von oben statt Ob diese Art zu setzen Ob Pteropus palmarum.

pag. 15, Zeile 18 von oben zu Pteropus Geoffroyi einzuhalten:

Im Januar und Februar 1876 besuchten allabendlich kleine Flüge dieses Flederhundes den Garten des Hotel du Nil in Cairo. Es waren zumeist einzelne Paare, die dicht zusammenhielten, nebst je zwei bis vier noch nicht vollständig ausgewachsenen Jung- gen, welche die halbreisen Früchte der Nabaq-Bäume (*Zizyphus*) plünderten. Die Thiere hingen sich, nachdem sie die betreffenden Bäume mehrfach schnellen, niedrigen und geräuschlosen Fluges umkreist, an die äußeren Zweige an, fleischten die ein-

zulnen Pflaumen ab und ließen den sauber abgeschälten Kern zur Erde fallen. Beim Aufliegen und Abstehen, sowie bei plötzlichen Wendungen im Flug vernimmt man ein Geräusch, ähnlich demjenigen, welches ein in der Luft geschlagenes seidenes Taschentuch hervorbringt. Ende Februars zeigten sich die Männchen sehr rauschstädtig; sie verfolgten sich gegenseitig, stießen wie kämpfende Raubvögel aufeinander und ließen dabei zuweilen eine durchdringend quietschende Stimme hören. Bei Mondschein flogen die Flederhunde die ganze Nacht über, sie erschienen übrigens auf ihren Futterplätzen erst etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang, als die meisten insectenfressenden Arten sich schon längst zurückgezogen hatten.

Ich maß ein altes Männchen wie folgt: Körper von der Schnauzenspitze zum Schwanzende 6' 4"; Flugweite 1' 6" 9"; Kopflänge 1" 8,8"; Ohrhöhe 1" 2"; Länge des fast nackten Schwanzes, soweit derselbe über die Haut herausreicht 3,7"; Borderarm 3" 6"; zweiter Finger fast 6"; Daumen mit Nagel fast 1" 3,5". — Die Nase vorn sehr tief gespalten. — Das große Auge hell erdbraun.

pag. 18, Zeile 1 von oben statt (Heugl. et Rüpp.) zu setzen (Heugl. e Rüpp.).

pag. 26, Zeile 9 von oben:

Maße von *Taphozous nudiventris*. Körperlänge 3" 7"; Kopflänge gegen 1" 2"; Entfernung des Auges von der Nasenlippe 6"; Ohrhöhe 6,7"; Borderarm 2" 8"; Daumen mit Nagel gegen 4"; Mittelfinger 4" 4"; Schwanz 1" 0,5".

pag. 30, Zeile 1 von oben statt *Heftohr* zu lesen *Haftohr*.

pag. 33, Zeile 6 von oben statt *Antibrach* zu lesen *antibrach*.

pag. 46, Zeile 5 von unten:

*Canis variegatus* ist eine durch beträchtliche Größe, gedrungene Gestalt, straffere buschige Behaarung mit viel Bei-

mischnung von Schwarz und mäßig kurze, außen auffallend lebhaft rostfarbige Ohren ausgezeichnete Form. Schwanzspitze schwärzlich. Iris hell bräunlichgelb.

pag. 47, Zeile 10 von unten:

*Canis vulpes niloticus*. Unterseite von der Oberbrust ab gewöhnlich schwärzlich; Außenseite des Ohres tief schwarz, an der Basis abrupt röthlich weiß; Schwanzspitze weißlich, dahinter auf der Oberseite meist ein verwaschener schwärzlicher Fleck, ein zweiter ähnlicher etwa auf dem ersten Drittheil des Rückens der Rute. Iris hell rostigbraun. — Körperlänge mit Schwanz durchschnittlich 3' bis 3' 1"; Schwanz mit Haarspitze 1' 3" bis 1' 4"; Kopflänge gegen 6"; Ohrhöhe 3" 3""; Schulterhöhe 1' 2".

Außer der beschriebenen Form findet sich in Egypten noch eine etwas schmächtigere, weit fahlere, mit eigenthümlich fleischröhlicher Unterseite und breiter, weißer Schwanzspitze.

pag. 27, Zeile 1 von unten:

*Canis famelicus* heißt in Egypten allgemein T'aleb oder O'aleb; in Sudan dagegen Sabera, wie *Canis pallidus*.

In unserem Beobachtungsgebiet nicht vorzukommen scheint *C. pallidus* und *C. Zerda*. Letztere Art, der Fennel, ist nicht selten in einzelnen Gegenden Egyptens bis ins peträische Arabien hinüber, besonders häufig im Fayum und in den benachbarten Däsen; südwärts bis zur Baudah-Wüste auftretend. Er lebt familienweise in selbstgegrabenen Höhlen im Wüstenland. Weite Stellen sind oft derart von den Ohrenfuchsen unterminirt, daß es gefährlich ist, über solche Flächen zu reiten, indem Pferde und Kamelle bei jedem Tritt einbrechen.

Nach gefälliger Mittheilung von Dr. Schweinfurth nährt sich *Canis Zerda* im Freileben fast ausschließlich von Eidechsen, besonders von *Uromastyx*, die mit Haut und Hornstacheln verzehrt werden. Eigenthümlich organisiert ist das Ohr des Fennel. Dasselbe wird beim Graben im Sande vor- und abwärts ge-

schlagen und legt sich dann in regelmäßigen Falten über die Öffnung des Gehörganges.

pag. 83, nach Zeile 6 von unten:

Im Reiche Monbutu muß ein Quasten-Stachler nicht selten vorkommen. Ich verdanke der Freundlichkeit Dr. Schweinfurth's das Schwanzstück einer Atherura, das mit anderen ähnlichen als Zierde an Schilden und Lanzten der Eingeborenen angebracht war. Die Borsten und Haare der Quaste stimmen ganz mit denjenigen von Atherura africana aus Fernando Po und Sierra Leone überein. Leider kennen wir nur wenige Arten vgn Sängethieren und Vögeln aus dem Quellgebiet der im Niamniam-Lande entspringenden und von dort nach Westen abfließenden Ströme, aber diese schon liefern den Beweis, daß die Fauna des Central-Continents westwärts von 25 Grad Ost von Greenwich bereits ein entschieden westafrikanisches Gepräge trägt.

pag. 98: Die Klippschließer sind weit über Nordost-Afrika verbreitet. In Egypten habe ich dieselben zwar nicht angetroffen, aber in den Felsgebirgen Nubiens, auf den Bergen von Ost- und Süd-Senar und in Kordofan, wo sie südlich bis in das Nubah-Gebiet stellenweise recht häufig auftreten.

pag. 96, Zeile 11 von unten statt Alliani zu setzen Aliliani.

pag. 125, Zeile 12 von oben statt Cephalologus zu setzen Cephalophorus.

pag. 125, Zeile 11 von unten statt Agad zu setzen Agaw.

pag. 126, Zeile 8 von oben statt Baeden zu setzen Beden.

pag. 132, Zeile 2 von oben statt Gerreid'schen zu setzen Gerrerd'schen.

pag. 132, Zeile 9 von oben statt am zu setzen im.

pag. 150, Zeile 8 von oben nach Anseba-Thal zu lesen sowie im Hochland von.

pag. 151, nach Zeile 4 von oben einzuschalten:

Ich gebe nachstehend einige Maße von Falco barbarus.

	I. ♀ Hengstlin.	II. ♂ Altinori.	III. ♀ Blanford.	IV. ? Finjch.
Länge ca. . . . .	16" —"	—	—	ca. 15" —"
Firste . . . . .	—" 10,5"	—	—	—" 8"
Flugweite . . . . .	11" 6"	10" 1"	12" 2"	12" —"
Schwanz . . . . .	5" 1"	5" 2"	6" 1"	6" 6"
Tarsus . . . . .	1" 8"	1" 6"	1" 10"	1" 10"
Mittelzehe m. Nagel	2" 6"	—	—	—

Nr. III. von Blanford im Anseba-Thal gesammelt und Nr. IV. von Jesse in der Gegend von Aün erlangt, dürften eher zu Falco tanypterus zu rechnen sein, worauf namentlich der längere Schwanz hindeutet.

pag. 178, Zeile 3° von unten, zu Sylvia undata:

Ich bin über die Bestimmung der von mir eingesammelten Exemplare nicht ganz im Reinen. Es waren alte Vögel im Winterkleid und Jährlinge. Die Flügelbildung stimmt mit Sylvia undata, während beim Männchen eine Spur von braun-röthlicher Kropfzeichnung und weißem Bart auftritt, ähnlich wie bei Sylvia provincialis. Auch zeigt ersteres schwärzliche Zügel mit sehr schmalem nacktem röthlichem Augenlid, während dieser Rand bei den jungen Thieren kaum bemerklich und grau gefärbt ist.

pag. 180, nach Zeile 11 von oben:

Anmerkung. An der arabischen Küste des Roten Meeres und bei Sues erlangte ich einen eigenthümlichen Drosselrohrsänger, Calamodyta arabica, Heugl. Bei Noseier fand Dr. Klunzinger im Monat März Calamodyta (Pseudoluscinia) luscinoides, Savi. — Neu für die Fauna Europa's dürfte sein Calamodyta agricola, Jerd.; ein Exemplar dieser in Centralasien und In-

dien heimischen Art fand ich unter Bälgen, welche Herr Hencke aus der unteren Wolga-Gegend und vom Caspiischen Meere einzufandte.

pag. 180, Zeile 5 von unten (zu *Ruticilla phoenicurus*): Wurde von mir noch am 25. April 1876 bei Cairo eingesammelt.

pag. 188, Zeile 11 von oben (*Monticola saxatilis*): Am 11. April 1876 bei Cairo auf dem Durchzug ziemlich häufig.

pag. 190, Zeile 5 von unten (zu *Motacilla boarola*): Ich beobachtete ein Pärchen dieser Bachstelzen-Art zwischen December 1875 und Mitte Februar 1876 im Garten des Hotel du Nil in Cairo.

pag. 193, Zeile 9 von oben (zu *Muscicapa grisola*): Wie bei vielen Zugvögeln scheinen die Weibchen später zu wandern als die Männchen. *M. grisola* dürfte wohl in Untergypten brüten. Am 25. April 1876 erlangten wir dort ein Paar. Das Weibchen zeigte Brutflecken.

, pag. 194, Zeile 4 von unten statt Weibchen zu setzen Weichen.

pag. 196, Zeile 7 von oben (*Oriolus galbula*): Gegen Ende Aprils 1876 waren die Pirole in der Nähe von Cairo recht häufig auf dem Durchzug. Die alten Männchen trugen ihr Prachtkleid noch nicht vollständig.

pag. 197, Zeile 4 von unten statt *Rhodophoreus* zu setzen *Rhodophoneus*.

pag. 211, Zeile 8 von oben. Der Satz „endlich an den Brunnen von To-Kar“ auf Zeile 6 nach „hinüber“ zu verlegen.

pag. 216, Zeile 12 von oben statt wider zu setzen wird.

pag. 217, Zeile 12 von unten statt *C. striolata* zu setzen *F. striolata*.

pag. 227, nach Zeile 6 von unten (*Cuculus canorus*):

Mitte Aprils 1876 ziemlich allgemein bei Cairo auf der Wandlung nach Norden.

pag. 228, Zeile 3 von unten statt *Coeeytus* zu setzen *Coccystes*.

pag. 229, Zeile 4 von oben statt *atei* zu setzen *eafer*.

pag. 239, nach Zeile 5 von unten (*Coturnix communis*): Im Frühjahr 1876 begann der Durchzug der Wachteln in Unteregypten bereits Mitte Februars. Am 1. April vernahm ich den Schlag der Hähne und fand am 15. April in der Nähe von Djizeh ein Nest mit 8 unreiften Eiern.

pag. 243, Zeile 9 von unten zu *Charadrius asiaticus*: In meiner „Ornithologie Nordost-Afrika's“ habe ich diese Art fälschlich als *Ch. Damarensis* aufgeführt und *Ch. veredus* als *Ch. asiaticus* behandelt.

pag. 247, nach Zeile 11 von oben: Auch nach meinen neueren Beobachtungen zwischen Januar und Anfang März nicht in genannter Gegend, obgleich mir in Mafrou ein angeblich dieser Art zugehöriges Ei am 4. März überbracht wurde.

pag. 249, Zeile 9 von oben statt *Ardea Gularis* zu setzen *Ardea gularis*.

pag. 251, Zeile 4 von oben statt *Seotaeus nycticora* zu setzen *Scotaeus nycticorax*.

pag. 256, Zeile 5 von oben statt *Ränder* zu setzen *Ständer*.

#### Berichtigung zu den Illustrationen.

Auf Tafel „*Philothamna minor*, Hgl.“ ist zu lesen: zu Vögel Nr. 134, statt zu Vögel Nr. 143.

Auf Tafel „*Batis orientalis*, Hgl.“ ist zu lesen: zu Vögel Nr. 177, statt zu Vögel Nr. 186.

Nachträge  
zum Verzeichniß der Fremdwörter,  
Th. I. p. 266 sc.

pag. 268. Atabah. Ich leitete diese sowohl im Arabischen als im Tigrischen übliche Benennung für Gebirgspaß von der Wurzel t'ab = ermüden ab. Münzinger übersetzt das tigrische Wort 'At̄eba mit fatiguer, also vielleicht besser 'At̄eba statt 'Atabah oder At'abah zu schreiben.

In der Nähe von Sanaakin liegt ein kleiner Gebirgsstock, der Waratab heißt, welche Benennung, wenn sie überhaupt arabischen Ursprungs ist, wohl mit Warā T'ab, d. i. das Ende der Arbeit oder Ermüdung (des Weges) zu umschreiben.

pag. 268. Athara. — Vielleicht vom äthiopischen Xare, sich brennen, dann Atxara.

pag. 268, nach Atharah einzuhalten Aualid Eret. — Paß im Lebkhathale. — Nach Münzinger zu schreiben Aualid oder Awalid Eret.

pag. 269, §. 13 von oben nach Bāde zu setzen: (Bād)e.)

pag. 272, §. 3 von oben zu lesen Xartūm statt Xartum.

pag. 272, §. 5 von unten zu lesen Dedsch-Alzmatsh (nicht Dedsh = Alzmatsh).

pag. 272, am Schluß der Seite einschalten:

Denkeli und Dan kāli, plur. Danākil. — Arabisch Danākil und Danakil, aber auch Danāqil und Danaqil. — Völkerstaat, welche das Tiefland und einige Inselgruppen zwischen

der Bai von Adulis und dem Golf von Tedjurah inne hat und theilweise dem Chediv von Egypten unterworfen ist. Die Bezeichnung Danakil ist wohl arabischen oder äthiopischen Ursprungs (nach Rüppell von Donak abstammend, was in der Tigrié-Sprache Schiff bedeuten soll), die Völkerschaft selbst nennt sich Afer, 'Afer oder 'Alar, Sing. Aferi, und nur ein Zweig derselben Dankali. Ihre Sprache hat nichts gemein mit der arabischen und äthiopischen, sie bildet mit derjenigen der Gala und Somalen einen besonderen afrikanischen Sprachstamm. Die Abessinier bezeichnen das Danakil-Gebiet mit der Benennung Adäl (vergl. Th. I. pag. 266), nach einer Familie (Eial) des Afer-Stammes, welche in der Nähe am Tedjurah ansässig ist.

Ich bereiste im Jahre 1857 das ganze Küstengebiet der Danakil. Nach den mir damals gemachten Angaben zerfallen die Afer in zwei Hauptstämme, nämlich Asahian-Mara und Adolian-Mara; erstere wiederum in die Zweige Debenek Wuēma, zu welchem die Adäl gehören, und H'edarem. Die Adolian-Mara teilen sich in die Familien Domhoito, Dahimēla, Hamfila und Modeido oder Modeitu. Letzgenannte Dabileh scheint den übrigen numerisch weit überlegen. Sie ist in den Ebenen um den Hawasch-Fluß (Hawaš oder Auas) bis an den Fuß der Gebirge von Schowa ansässig und erstreckt sich ostwärts bis zum Ufer des Nothen Meeres zwischen Michita (Rizeita) und Ed ('Ed). Ihr Sultan Mohamed el Aferi hat seinen Sitz in der Stadt Aosa oder Haosa unsfern des Bada-Sees, in welchen sich der Hawasch ergießt. Die Gegend besteht in einer sehr weitläufigen Bodeneinsenkung, die vielleicht tiefer gelegen ist als der Meeresspiegel, denn man kennt mit Sicherheit keine Verbindung des Stromes mit der See; obgleich der Hawasch, namentlich während der Regenzeit, eine ganz enorme Wassermenge führt. Seine periodischen Überschwemmungen setzen, im Verein mit zahlreichen anderen Regenströmen, einen unzähligen

Theil der Depression von Haosa unter Wasser und bedecken die Ebene mit fruchtbaren Niederschlägen von Dammerde. Die derart genügend befruchteten und gedüngten Flächen liefern den Umliehnern einen reichlichen Ertrag an Büschelmais. Die Felder erhalten übrigens nicht allein und unmittelbar durch den Sommerregen die nötige Bodenfeuchtigkeit. Sie sind durch Canäle mit dem Seebecken in Verbindung und es kann die Bewässerung mittelst Schutzbäumen geregelt werden. Neberdies fallen hin und wieder im Tiefland während der Winterzeit, von October bis Februar, feuchte Niederschläge.

Das Bassin, in welches der Hawasch mündet, enthält mehrere Seen, die das ganze Jahr über nicht austrocknen. Das Wasser des südliecheren ist salzig.\*

Die meisten Damakil des Binnenlandes treiben Viehzucht und sie besitzen eine nähmliche Anzahl von Kameelen, Hornviech, Ziegen und Schafen, seltener Esel und Pferde, welche letztere aus den nahen Gebirgen eingeschafft werden. Die Küsten- und Inselbewohner befassen sich dagegen mit Seegewerbe, besonders mit dem Fang von Fischen, Schildkröten, Dugong, Perl- und Münzmuscheln, Einfassungen von Vogelvögeln (Guano, arabisch Rehs) und etwas Handel mit Masana, Zela und den arabischen Küstenstädten, während die in der Umgegend der natürlichen Salinen hausenden Stämme sich auf Salz- und Schwefelgewinnung verlegen. (Vergleiche Th. I. pag. 168.)

\* Am östlichen Ufer des Bada fand (wahrscheinlich am 14. November 1875) der Überfall der Modeitu, Döda, Azöbo, Woëta und Taltal auf die ägyptische Truppen-Altheimung statt, welche Munzinger-Bek begleitete. Kurz nach Ausbruch des ägyptisch-abessinischen Krieges wurde Munzinger seiner Stelle als Generalgouverneur von Takah entthoben und mit einer Mission nach Efat (Amchar, Elfat und Ifat) und Schowa beauftragt. Ras Burn, der Gesandte des Königs Menelik von Schowa, schloß sich ihm an. Eine Escorte von 350 Mann mit zwei Feldgeschützen unter dem Befehl Ismaël Efendi's bildete die Bedeckung. Die Truppe bestand theils aus Egyptern

Alle Afer, die Somalen und die meisten Gala bekennen sich zum Islam. Viele Zweige der Danakil leben in vollkommener Unabhängigkeit, sie werden zum Theil von Stammesältesten, zum Theil von erblichen Fürsten regiert, die trotz ihres geringen Ein-

theils aus Negersoldaten. Diese militärische Expedition landete nur mit wenigen Lebensmitteln ausgerüstet in Ghubet Harab (Xubet l'arab). Auch die Anzahl der indes dorthin bestellten Lastthiere genügte nicht. Als Führer diente ein Verwandter des Sultan von Asoa, Mohamed el Chetah, der vorher von Munzinger im Namen des Chedim als Schech eingekleidet worden war. Dieser Schech Mohamed schlug nicht den geraden und nächsten Weg nach dem See ein, sondern nahm Anfangs eine mehr südliche Richtung, durch glühende, wasserlose Wüsten. Ein Theil der Kameele erlag schon in der ersten Woche dem Durst und der Ermüdung, andere mussten wegen Nahrungsmanget geschlachtet werden. Nach sechzehntägigem Marsche erreichte die Karawane am späten Abend endlich die Niederung von Asoa und lagerte nahe am Gewässer, auf einer engen, einerseits vom See, andererseits von felsigen Hügeln umschlossenen Fläche.

Unter dem Vorwand, einiges Schlachtwiech zu beschaffen, verließ Mohamed el Cheta die Gesellschaft. Nur wenige Wachtposten wurden ausgestellt und auch diese überließen sich, von Müdigkeit und Hunger überwältigt, dem Schlafe. Ungefähr zwei Stunden nach Mitternacht, nachdem der Mond untergegangen, erfolgte plötzlich von allen Seiten her der Angriff der Eingeborenen auf das dicht gedräugte Lager. Eine große Anzahl der egyptischen Truppen wurde, ehe sie sich sammeln konnten, in der ersten Bewirrung niedergemacht, Munzinger selbst und dessen Frau tödlich verwundet, der Rest aber in den feichten See geworfen. Von hier aus war die Verteidigung leichter und nach sechsstündigem Kampfe zogen sich die Modeitu mit grossem Verlust zurück. Die Egypter hatten etwa 170 Tote, der Rest flüchtete in äusserster Bewirrung in der Richtung nach Tedjurah zu, vier Tage lang beständig verfolgt von den Eingeborenen. Munzinger verschied in Folge seiner Wunden schon am Mittag nach dem Ueberfall, von seinen Leuten gingen noch etwa sechzig Mann während des Rückmarsches zu Grunde und nur fünfzig Verwundeten und siebzig Unverletzten gelang es, nach achttagigem Marsche Tedjurah zu erreichen. Munzinger's Landsmann Haggenmacher erlag, obgleich unverletzt durch die Waffen der Feinde, den Anstrengungen und Entbehrungen in der Nähe des Asal-Sees, also ganz nahe an der Küste. Versuche, dessen Tagebücher zu retten, scheinen nicht gemacht worden zu sein. Ebenso dürfte eine Züchtigung der verrätherischen Modeitu für alle Zeiten unerbleiben.

flusses den Titel Sultan führen, wie z. B. der Schech von Anfila (oder 'Anfila, Hamfila) und derjenige von Tedjurah.

Außer den oben schon erwähnten Stämmen wurden mir noch folgende namhaft gemacht: Herto, um die Halbinsel Buri, Taltal, die Bewohner der Salzseen von 'Asaleh, Bar-Azuli, in der Gegend von Ras Nachamah (13 Grad 40 Min. nördl. Br.), Saroita, neben Modeidos um die Bucht von Belul (13 Grad 12 Min. nördl. Br.), und Haisomali, bei der Asab-Bai (12 Grad 50 Min. nördl. Br.) ansässig. Letztere Qabileh soll gleichfalls zu den Danakil gehören, mit denen sie übrigens in keinem Verkehr steht. Die Bewohner von Anfila und Ed nordwärts bis Buri sind Domhoito, diejenigen von Tedjurah Debeneft-Wuema, und Adalu oder Aldal.

Die obengenannten Herto zählt man zu den Saho oder Schoho (Soho), einem ziemlich mächtigen Stamm, dessen Wohnsitze sich westwärts von der Bai von Adulis, um den Nederu bis zum Taranta-Gebirge hin erstrecken. Die Saho bedienen sich der Afer-Sprache, Viele unter ihnen verstehen übrigens den Dialekt von Massaua. Mehrere meiner Gewährsmänner rechnen diese Volkschaft aber nicht zu den wirklichen Danakil und versichern, sie sei eingewandert. Mir wurde gesagt, daß die Saho früher Asaorta oder Hasaurta hießen und jetzt in zwei Hauptzweige Asaorta und Taroa (Tero'a?) zerfallen. Erstere theilen sich wiederum in die Familien der Asalisān, 'Asakari, Faqarātu, Bēd Faqi und Bēd Lelisch (Lehs), die Taroa in Bed Mūscheh (Mūsēh) und Bed Sarah (Saraz).

Nach freundschaftlicher Mittheilung des Philologen Dr. Reijnijk weisen die Sprachen der Saho und Danakil nur leichte dialektische Verschiedenheiten auf.

Die Schoho, in ihrer Sprache Sahoita, d. i. ein Mann des Saho-Volkes, Plur. Saho, zerfallen, von Nord nach Süd gerechnet, in folgende Stämme:

Asaurta, Taru'a, Dasmu, Ga'aso, Haso, Debrimēla und Herto.

Von den Danafil-Stämmen erhielt mein Gewährsmann zwei Listen, die eine durch einen unterrichteten Schohö, die andere durch einen Denkeli aus Makassili. Sie lauten wie folgt:

I. 1) Hertó; 2) Ankálá; 3) Dankáli; 4) Balúsú'a; 5) Wadó; 6) Dad-wadó; 7) Asá-wadó; 8) Bubá; 9) Dahiméla; 10) Goba'ado; 11) Alá; 12) Amulé.

II. 1) Hertó; 2) Ankálá; 3) Dankáli; 4) Bal'o-súwa; 5) Bala'o; 6) Wadó; 7) Datá-wado; 8) Asówado; 9) Bubát; 10) Hadarmó; 11) Ás-mumintó; 12) Gobadó; 13) Ow; 14) Dahiméla; 15) Henoná; 16) Ga'asó; 17) Ás-háker; 18) Bala'a; 19) Ganintó; 20) We'aitá; 21) Aluluté; 22) Digibót; 23) Asála; 24) Dulúma; 25) Aboná; 26) Ironába; 27) Dúna; 28) Alkradó; 29) Nagartó; 30) Aratá.

Diesen Stammelisten schließt sich noch ein Verzeichniß der Districte des Denkeli-Gebetes an:

III. 1) Bori, Buri; 2) Bairré; 3) Galatá; 4) Bardóle; 5) Dohála; 6) Ederadin; 7) Galalu; 8) Bidarré; 9) Kataré; 10) Ga'asela; 11) Dímo; 12) Data-dímo; 13) Adódímo; 14) Meserre; 15) Dalé; 16) Yalu'a; 17) Gadírri; 18) Harena; 19) Hawáki; 20) Ende'; 21) Beká'; 22) Sarabáí; 23) Dalgámann; 24) Awán.

Die hier aufgezählten Stämme und Bezirke beziehen sich nach meiner Ansicht nur auf den nördlichen Theil des Denkeli-Gebetes.

Bela'o (II. Nr. 5) könnte mit Belaw (das auf Aethiopisch edel, adelig bedeutet), einer im Samhar anfassigen Qabileh, zusammenhängen; dort haust ein anderer Stamm 'At's 'Asker

(II. 17). Buri (III. 1) ist der Name der Halbinsel östlich vom Golf von Adulis. Auf der Ostküste von Buri liegt eine Niedersiedlung Arena oder Harena (III. 18), an der Nordspitze der Halbinsel ein Dorf und Hafen Dolāma (II. 24). Der District Hawáki wird um die Hauafil- oder H'auāqil-Bucht unter 15 Grad 10 Min. nördl. Breite zu suchen sein. Bakā<sup>3</sup> (III. 21) ist sicher identisch mit der Insel Bak'a im gleichnamigen Golf. Eine Bucht westlich von Ras Nachamah unter 13 Grad 10 Min. nördl. Br. wurde mir Auān oder Awān (III. 24) benannt. Etwas südöstlich von Afisla liegt ein Vorgebirge 'Erata, dessen Name an Arata (II. 30) erinnert. — Asāla (II. 23) könnte sich auf die Bewohner der Salzebene 'Asaleh (Th. I. p. 168 Anmerkung) beziehen.

Aus einem Bericht, welchen mir mein Reisegefährte, Graf W. Zichy, kurz vor seinem Tode einbandte, entnehme ich noch nachstehende weitere Notizen über die Danafil.

Das ganze Denfeli-Gebiet soll früher von Abessiniern bewohnt gewesen sein.\* Die Adali, Domhoito, Dahimela und Modeito stammten aus Arabien, die Hedarem (wie ihr Name schon besagt) aus Hadramaut (Hadramaut). Die Adali und Domhoito ließen sich in Tedjurah und Dechita, die Modeito in Belul nieder. Die Eial (Stämme, Qabileh) der Hedarem, Modeito und Dahimela stellten sich unter den Befehl des Damho und drangen weiter nordwärts vor. Ueber ähnliche Einwanderungen aus Arabien kurz nach den Kriegszügen des Sultan Selim, der sich die Küstenländer des Nothen Meeres zinsbar mache (im Jahre 1516?), berichten auch ältere arabische Schriftsteller.

Der gemeinschaftliche Stamm der Afer zerfällt erstens in Hirten oder Bewohner des Binnenlandes und zweitens in Küstenbewohner.

\* Dies ist sehr wahrscheinlich, indem sich das äthiopische Reich bis zu Anfang des 7. Jahrhunderts selbst über einen großen Theil von Süd-Arabien ausdehnte.

Es giebt freie Adelige, welche „Rotha Männer“, und Unterthanen, die „Weiße Männer“ (wohl besser Schwarze Männer) genannt werden.

### I. Die Hirtenvölker sind:

- 1) Domhoito\* (Ausſprache etwas abweichend; ich hörte Domhoido und Damhoitu); 2) Dahimela (I. 9 und II. 14. Reinisch); 4) Hadarem (II. 10. Reinisch).

### II. Die Küstenbewohner:

- 1) Scheika (wahrscheinlich Seiza, kein Aſer-Name, sondern ein arabischer, der Freie, Adelige bezeichnet); 2) Adola (unsere Adal?); 3) Hado (Wado; Reinisch I. 5, 6, 7 und II. 6, 7, 8?) 4) Nagarto (II. 29. Reinisch); 5) Dulam, (II. 29. Reinisch); 6) Somal, wohuhäft auf der Insel Baka und in Harena. (Sind nach meinen Erfundigungen wahrscheinlich wirkliche, eingewanderte Somalen); 7) Danakil (I. 3. und II. 3. Reinisch).

III. Zählt Graf Zichy einige Stämme auf, über deren Herkunft und verwandtschaftliche Beziehungen zu den übrigen Danaik er keine eingehende Kenntniß erhalten konnte.

- 1) Mandeito, um Belul wohnend (wohl meine Modeito); 2) As-Subura, (wahrscheinlich 'At's-Subura); sind vielleicht identisch mit den Belasua; 3) Asanato (wohl 'At's-Anato?); 4) Woyaita, in der Salzebene ansäſsig (II. 20. Reinisch); 5) Geninto, Dahimela(?) in Buri (II. 19. Reinisch); 6) Asamela oder Assimominto, Abkömmlinge des Damho (wohl 'At's-Muminto; II. 11. Reinisch); 7) Wuema (meine Debenek Wuema); 8) Ironabo (II. 26. Reinisch); 9) Belasoa oder Belasua, mächtiger Stamm nördlich von der Salzebene (I. 4. und II. 4. Reinisch); 10) Mochto, in Mader; 11) Abua, in Ed; 12) Hadaru, 13) Lakena, südlich von der Salzebene.

Die Domhoito bewohnen nach Zichy folgende Orte und

\* Ich behalte die Schreibweise meiner beiden Gewährsmänner bei.

Bezirke: Dagara südlich von Abulis; Alé bei Doka; Doda zwei Tagereisen westlich von Doka; Guyah sechs Tagereisen nördlich von den Azoba-Gala; Yelota zwei Tagereisen von Ed; Bidu vier Tagereisen von Ed; Alab zwei Tagereisen von Bidu; Ad-Gaban eine halbe Tagereise von Aldari Durra unfern Mader (bei Anfila); Ed und Elal am Fuße des Berges Muselali.

Die Dahimela: Aithos 8 Stunden von Mader bei Lasule; Aldari-Durra eine halbe Tagereise von Mader; Doka westlich von der Salzebene, Rocheita südlich von Ed; Ed selbst und Tirasiru 4 Stunden von Ed.

Die Hadarem: Mabra eine halbe Tagereise von Ed; Sah-Sima vier Tagereisen südlich von Ed; Merayo drei Tagereisen nordwestlich von Ed; den Fuß des Berges Falollo; Serali am Fuße der beiden Berge Mogoo; Ed und Kurumi.

Die Scheika: Darufile vier Tagereisen von Ed, jenseits des Berges Kamun; Arafle; Rocheita; Tedjura; Buri; Doka.

Die Adola: Belul; Djebel Abu Aly zwischen Belul und Mir Gabra, eine halbe Tagereise von Asab; Messauah.

Die Hado: Belul; Wengabo.

Die Negarto: Mader; Djezireh Hauafil; Djezireh Aguja (ist G'eziret 'ag'uzeh im Hauafil-Golf); unter den Azoba-Gala.

Somal vom Eial Abd ur rahim ('Abd el Rah'im): Insel Baka; Harena.

Die Dankali: Belul; Mader; Dolza und Buri.

pag. 274, nach Zeile 3 von oben einschalten:

Doläm — Bah'er Zolam I. 269. — Mit der semitischen Wurzel zolm hängt wohl auch das tigrische t'selme, sich verdunkeln, und t'selim, schwarz, zusammen.

pag. 274, Zeile 14 von oben — zu Ela:

Münzinger (Voc. Tigr. p. 42) schreibt Ele oder Jéle. — Nach meinem Gehör ist der Anfangsbuchstabe unbedingt ein

'Ain, also 'Ele. Damit steht wohl auch im Zusammenhang der Eigennamen eines Dorfes mit thermalischen Quellen in der Nähe von Maṣaua, das 'Ajelat heißt. — Vergl. Ailet I. p. 267.

pag. 264, Zeile 9 von unten einzuschalten:

Falkat, Regenstrom, welcher das Gebiet der Habab nach Norden begrenzt. Wohl vom äthiopischen Felq, d. i. Felsen, Gabel, Bifurcation oder Zusammenfluß von Bächen. — Daher zu schreiben Falqat.

pag. 275, vor Zeile 1 von oben:

Qaleb, Hauptort der Provinz Menja, ebenso der Regenstrom Qaleb ተሳqla vom äthiop. Geleb, d. i. Schild. Also Galeb oder Geleb.

pag. 276, Zeile 12 von unten zu lesen Mundarten statt Mundart.

pag. 276, nach Zeile 12 von unten einzuschalten:

Hader, arab. = bereit, zu Diensten, fertig. — h'ader.

pag. 278, Zeile 13 von oben zu setzen Hegin statt H'egin.

pag. 278, Zeile 12 von unten He<sup>t</sup> statt Hēt.

pag. 278, Zeile 11 von unten:

Die Benennung Hotset wahrscheinlich vom tigrischen H'ot'sa, d. i. Sand eines Flussbettes, daher richtige Schreibart H'ot'set.

pag. 279, Zeile 2 von oben statt Lanzeb soll stehen Lanx'eb.

pag. 279, Zeile 10 von unten Minah statt Minah.

pag. 280, Zeile 3 von oben: Mohaber vom äthiopischen zabra, d. i. vereinigen, daher Mozaber.

pag. 280, Zeile 2 von unten roth statt Noth.

pag. 281, Dan — Wold Dan. — Nach d'Abbadie und Munzinger Gān, daher Wold Gān. Munzinger übersetzt Gān mit großer Geier (Voc. Tigr. p. 67), d'Abbadie dagegen richtiger mit Eule.

pag. 281, vor Zeile 7 von oben:

**Rahib, Rehib** — Name eines Torrenten im Gebiet der Habab. — Wahrscheinlich vom äthiopischen rah'be, breit werden, daher Rehib.

pag. 282, nach Zeile 9 von oben einzuschalten:

**Sambuk** (Th. I. p. 20). Besser wohl Sambūq. Diese Benennung für gewisse Fahrzeuge des Rothen Meeres scheint äthiopischen Ursprungs. Vergl. Isenberg, Dict. of the Amharic Language II. p. 29.

pag. 282, Zeile 9 von unten:

**Šchakat-qaih.** — Ohne Zweifel ist Šchakat vom äthiopischen Šaqiéti abzuleiten, was nach d'Abbadie einen vegetationsreichen, grünen Platz bedeutet. — Also Šaqat 'qajeh'.

pag. 284, nach Zeile 13 von oben einzuschalten:

**Tsaga**, Dorf in der Nähe von Mafaua, ebenso Benennung einer Niederlassung der Beni Amer um Barkah. — Munzinger schreibt Zaga, ich hörte Tsaga oder Tsaq'a, der Aufangsbuchstabe ausgesprochen wie das arabische T. — Vielleicht vom äthiopischen Tsaga, d. i. als Stütze, als Zufluchtsort dienen, also gleichbedeutend mit fester Platz. Erinnere ich mich recht, so brauchen die Tigrianer den gleichen Ausdruck auch für eine Umzäunung, in welcher die Heerden untergebracht werden, ebenso für feste, ständige Niederlassung im Gegensatz zu den ambulanten Zeltlagern der Hirtenvölker. Nach Munzinger hieße Deq'i in der Tigri-Sprache Dorf.

pag. 284, nach Zeile 11 von unten einzuschalten:

**Soqotra, Sokotra** — Große Insel gegenüber der östlichsten Spitze Afrika's. Arabisch gewöhnlich daher Soqotrah.

pag. 284, Zeile 14 von unten:

**Tſha u, Amhar. Salz** — Tſew, Tſewe. — Tigr. nach Munzinger Tsiéwa.

---



Verlag der Buchhandlung des Waisenhäuses  
in Halle.

BEURMANN, Moritz von, Vocabulary of the Tigré language written down, published with a grammatical sketch by Dr. A. Merx of the university of Jena. 1868. 6 Bogen. gr. 8. geh. 2 Mk. 50 Pf.

CASPARI, C. P., Grammatik der Arabischen Sprache. Vierte Auflage nach Wright's zweiter englischer Ausgabe bearbeitet von Dr. August Müller, ausserordentlicher Professor der orientalischen Sprachen an der Universität Halle. 1876. 30 Bogen. gr. 8. geh. Preis etwa 15 Mk.

NÖLDEKE, Dr. Th., Professor der orientalischen Sprachen zu Strassburg. Mandaesische Grammatik. Mit einer lithograph. Tafel der Mandaesischen Schriftzeichen. 1875. gr. 8. 33 Bogen. geh. 15 Mk.

PRAETORIUS, Dr. F., Grammatik der Tigrīña-Sprache in Abessinien hauptsächlich in der Gegend von Aksum und Adoa. Mit einer Textbeilage. 1872. 46 Bogen. hoch. 4. geh. 13 Mk. 50 Pf.

MERX, Dr. Adalb., Grammatica Syriaca, quam post opus Hoffmanni refecit. Particula prima. 1867. 17 Bogen. 4. geh. 6 Mk.

MERX, Dr. Adalb., Grammatica Syriaca, quam post opus Hoffmanni refecit. Particula secunda. 1870. 32 Bogen. 4. geh. 9 Mk.

SCHRÖDER, Dr. Paul, Grammatische Untersuchungen über die Phönizische Sprache nebst Sprach- und Schriftproben. 1869. 22 Bogen. Lex.-8. Nebst 23 lithograph. und autograph. Tafeln. geh. 12 Mk.