



Atragene alpina L. -- Alpenrebe.

Alpenkette, Gebüsch, 800—1400 M. Juni, Juli.



Thalictrum alpinum L. — Alpen-Wiesenraute.

Centralalpenkette, Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen, 1800—2300 M. Jun. August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Anemone narcissiflora L. — Narzissenblüthiges Windröschen.

Alpenkette, auf Triften, bes. auf Kalkboden, 1300—1900 M. Juni—Juli.



Anemone Baudensis L. -- Monte Baudo's Windröschen.

Alpenkette auf Trifur. erste 1800—2400 M. Juni—Juli.



Anemone trifolia L. — Dreiblättriges Windröschen.

Südliche Alpenkette, Süd-Tirol bis Krain, bis 1600 M. April—Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Anemone vernalis L. — Frühlings-Windröschen.
Alpenkette bis Steiermark, 1200—2300 M. Mai—Juli.



Anemone alpina L. — Alpen-Windröschen.

Nördliche und südliche Alpenkette, Wiesen, 1600—2200 M. Juni—August.



Anemone Burseriana Scop. = *grandiflora* Hoppe. — Bursers
Windröschen.

Centralalpenkette, Wiesen, 1600—2300 M., Juni, August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Anemone sulfurea L. — Schwefelgelbes Windröschen.
Alpenkette, auf Schiefer u. Kalkboden, bei 1000—2300 M. Juni—August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Ranunculus rutaefolius L. — Rautenblättriger Hahnenfuss.
Alpenkette, auf Urgestein und Kalk, 1900—2500 M. Juli—August.



Ranunculus anemonoides Zahlb. — Windröschenartiger
Hahnenfuss.

Südtirol, Nied.-Öesterreich u. Steiermark, feuchte Stellen, 1500 — 2200 M., bes. auf Kalk, März — April.



Ranunculus Pyrenaeus L. — Pyrenäischer Hahnenfuss

Schweiz bis Kärnthen, 1800—2400 M Juri—Juli



Ranunculus parnassifolius L. — Parnassienblättriger Hahnenfuss.

Alpenkette, trockene Stellen, 2500—3100 M. Juli, August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Ranunculus glacialis L. — Gletscher-Hahnenfuss.
Alpenkette, feuchte Stellen, auf Urgestein, 2200—2500 M. Juli, August.



Ranunculus Seguieri Vill. — Seguier's Hahnenfuss.

Südtirol und Krain, auf Kalk, 1900—2300 M. Juli—August.



Ranunculus alpestris L. — Alpen-Hahnenfuss.

Alpenkette, auf Kiesstellen, 700—2000 M. Mai—August



Ranunculus Traunfellneri Hoppe. — Traunfellner's Hahnenfuss.

Ostalpen (Tirol bis Krain), auf Kalkboden, ca. 1500 M Juni, Juli



Ranunculus crenatus Waldst. & Kit. — Kerbblättriger Hahnenfuss.

Alpenritsten in Obersteiermark, auf Urgestein, 1100—2000 M. Juli, August



Ranunculus bilobus Bertol. = Bertolonii Haussm. — Zweilappiger Hahnenfuss.

Kalkfelsen in Südtirol, 1500—1800 M Juli, August



Ranunculus aconitifolius L. — Eisenhutblättriger Hahnenfuss.
Alpenkette, feuchte Stellen, 600—1800 M., auf Urgestein und Kalk. Juni—August.



Ranunculus Pythora Crantz (1769) — hybridus Bir (1811) —
Tödtlicher Hahnenfuss.

Alpenkette, auf Gerölle, 1500—2200 M. Juni—Juli.



Ranunculus Thora L. — Giftiger Hahnenfuss.
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 1600—1900 M., Mai, Juni.



Ranunculus pygmaeus Wahlb. = Tappeineri Bamb. — Zwergiger Hahnenfuss.

Tirol, Salzburg u. Kärnten, feuchte Stellen, 2200—2500 M. auf Urgestein. Juli, August.



Ranunculus Breyninus Crntz. (1769) = Villarsii Koch et aut.
germ. nec de Cand. — Breyn- (Rax) Alpen-Hahnenfuss.
Alpenkette, tyockene Stellen, bis 2500 M., Mai — Juli.



Ranunculus montanus, Willd. — Berg-Hahnenfuss.
Alpenkette, bes. auf Kalk, 1500—2500 M. Juni—August.





Ranunculus Carinthiacus Hoppe = gracilis Schleich. 1815. —
Kärntnerischer Hahnenfuss.

Östliche Alpenkette, trockene Stellen, bis 2300 M., Juni—August.



Trollius Europaeus L. — Europäische Trollblume
Alpenkette. feuchte Stellen bis 2400 M. Mai—August.



Eranthis hiemalis (L.) Salisb. — Gemeine Winterblume.

Alpenkette, bis in die subalpine Region verbr., doch selten. Februar, März.



Helleborus niger L. — Schwarze Niesswurz

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 800—1800 M. März Mai.



Aquilegia atrata Koch. — Schwärzlicher Akelei.

Alpenkette, Gebüsch bis 1800 M. Juni, Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Delphinium Tiroliense Kern. i. Sch. — Tirolischer Rittersporn.

Nordtirol, bei 1600 M. Juli, August.



Aconitum Anthora L. — Giftheil-Eisenhut.

Schweiz bis Oesterreich und Krain, trockene Stellen, bis 1800 M., Juli—August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Papaver alpinum L. — Alpen-Mohn
Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M. Juli, August.



Papaver pyrenaicum (L.) Willd. — Pyrenäischer Mohn.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 2100—2700 M. Juli, August.



Arabis alpina L. — Alpen-Gänsekresse.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M. bes. auf Kalk. Mai—August

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodigizee>



Arabis caerulea (All.) Haenke. — Blaue Gänsekresse.

Alpenkette, bes. auf Kalkgerölle 1900 — 2500 M. Juli — August



Arabis alpestris Schleich. = *ciliata* Koch nec R. Br. — Vor-alpen-Gänsekresse.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—1900 M., auf Kalk, Mai—Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Arabis pumila Jacq. — Niedrige Gänsekresse.
Alpenkette, trockene Stellen, bes. auf Kalk, 1600—2000 M. Juni, Juli.



Arabis bellidifolia (L.) Jacq. — Massliebblättrige Gänsekresse.
Alpenkette, feuchte Stellen, 1600—2000 M. April—Juli.



Arabis Halleri L. — Haller's Gänsekresse.
Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, bis 2000 M. Juni, Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Cardamine asarifolia L. — Haselwurzblättriges Schaumkraut.
Südl. Schweiz und Südtirol, feuchte Stellen, bis 1500 M., Juni, Juli.



Cardamine alpina L. — Alpen-Schaumkraut.

Alpenkette, feuchte und trockene Stellen, 1200—2500 M., bes. auf Urgestein. Juni, Juli.



Cardamine trifolia L. — Dreiblättriges Schaumkraut.

Tirol bis Kärnten, bes. auf Kalk, bis 1500 M. Mai—Juni.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Cardamine resedifolia L. — Resedenblättriges Schaumkraut.
Alpenkette, auf Urgestein, 1600—2300 M. Juni, Juli.



Dentaria enneaphyllos L. — Neunblättrige Zahnwurz.

Tirol bis Oesterreich, feuchte Stellen, bis 1800 M., April—Mai.



Braya alpina Sternb. & Hoppe. — Alpen-Braye, Knotenschötchen.
Tirol und Kärnten, trockene Stellen, 1900—2300 M., Juli, August.



Braya dentata (All. 1785) = pinnatifida, Lam. (1789 sub Sisymbri.)
— Gezähnte Braye, Knotenschötchen.

Schweiz: Waadt, Wallis bis zum Umbrail, auf Urgestein. Juli, August.



Erysimum pumilum Gaud. = alpinum Hegetschw. — Niedrige
Schottendotter.

Alpenkette, trockene Stellen, 1200—2000 M. Mai, Juni.


Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Alyssum Wulfenianum Bernh. = alpestre Wulf. nec L. —
Wulfen's Steinkraut.

Schweiz, Tirol bis Krain, trockene Stellen, um 1700 M., auf Urgestein, Juli—August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>




Petrocallis Pyrenaica (L.) R. Brown. — Pyrenäisches Stein-schmückel.

Alpenkette, auf Kalk, 2200—2800 M. Juni—Juli



Draba Hoppeana Reichb. (1828) nec Rud. = *Zahlbrückneri*
Host. 1831. — Hoppe's Hungerblümchen.

Centralalpenkette, Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 2200—2500 M., auf Urgestein,
bes. Granit, Mai—Juli.



Draba aizoides L. ... Immergrünes Hungerblümchen.
Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1600—1900 M. Mai—Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Draba tomentosa Wahlb. — Filziges Hungerblümchen.
Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M., auf Kalk. Juni, Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Draba dubia Sut. (1802) = frigida Saut. 1825. — Zweifelhaftes
Hungerblümchen.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2200 M., Juni, Juli.



Draba stellata Jacq. — Sternhaariges Hungerblümchen.
Ostalpen bis zur Salza, trockene Stellen, über 1800 M. auf Kalk, Juni, Juli.



Draba nivea Saut. — Schneeweisses Hungerblümchen.
Tirol, Kärnten, trockene Stellen, um 1800 M., Juli, August.



Draba Traunsteineri Hoppe = *frigida* × *Johannis*. — Traunsteiner's
Hungerblümchen.

Schweiz? Tirol und Oberbayern, trockene Stellen, 1600—2200 M., Juni, Juli.



Draba Johannis Host. — Johann's Hungerblümchen.
Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 2200—2500 M. Juni—Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Draba Fladnitzensis Wulf. = Wahlenbergi var. α homotricha
Lindb. — Fladnitz'sches Hungerblümchen.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2500 M., besonders auf Schiefer. Juni—Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary.org>



Draba incana L. — Weissgraues Hungerblümchen.
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 1300—1700 M., Mai—Juli.




Draba Thomasii Koch — Thoma's Hungerblümchen.
Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1200--2000 M. Mai, Juni.





Cochlearia saxatilis L. = Kerneria sax. Reich. — Stein-Löffelkraut.
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M., auf Kalk. Mai, Juni.



Cochlearia alpina (Tausch) = brevicaulis Facch. — Alpen-Löffelkraut.

Gerölle der Kalkalpen in Südtirol, bis 2000 M. Juli, August.

Scanned from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityheritagelibrary>



Thlaspi cepeaefolium (Wulf) Koch. — Fetthennenblättriges
Täschelkraut.

Kärnten, Raiblthal, auf Kalkgerölle bis 2000 M. Mai, Juni.



Thlaspi alpinum Crntz. — Alpen-Täschelkraut.

Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M. Juni, Juli.




Thlaspi rotundifolium (L.) Gaud. — Rundblättriges Täschelkraut.
Alpenkette, auf Kalkgerölle, 1900—2700 M. Juli—August.



Biscutella laevigata L. — Glattfrüchtiges Brillenschötchen.

Alpenkette, Triften, bes. auf Kalk. bis 2000 M. Juli, August



Hutchinsia alpina (L.) R. Br. — Alpen-Hutchinsie. Felsenkresse.
Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1700—2700 M. Juni—August.





Hutschinsia brevicaulis (Hoppe) R. Br. — Kurzstengelige Hutschinsie, Felsenkresse.

Alpenkette, feuchte Stellen, 2000—3000 M. auf Urgestein, Juli, August.



Aethionema saxatile (L.) R. Brown. — Steinkresse

Alpenkette, auf Kalkboden, 1000 - 1000 M. Mai - Jun.



Helianthemum alpestre (Scop.) Reichb. = *Olandicum* Wahlb.
var. β *hirtum* Koch. — Voralpen-Sommerröschen.
Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1300—2600 M. Juli—August.



Helianthemum serpyllitolum (Crantz.) Reichb. = *vulg*. Gärtn.
var. γ *glabrum* Koch. — Thymianblättriges Sonnenröschen.

Alpenkette trockene Stellen, 1600—2500 M Juni—August.



Viola pinnata L. — Fiederblättriges Veilchen.
Schweiz bis Krain, auf Triften, 1300—1800 M. Juni—Juli.



Viola Thomasiana Perr. & Song. = *ambigua* Koch et aut., nec
Waldst. & Kit. — Thomas - Veilchen.

Schweiz und Tirol: Pusterthal, trockene Stellen, 900 - 2500 M. Mai - Juni.



— *Viola biflora* L. — Zweiblüthiges Veilchen.
Alpenkette, Gebüsch, 1000—2100 M. Mai—August.



Viola alpina L. — Alpen-Veilchen.

Oestliche Alpen bis zur Enns, Triften, 1600—1900 M. Juni, Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Viola Cenisia L. — Mont Cenis' Veilchen.
Schweiz und Südtirol, trockene Stellen, über 1800 M., Juli, August.



Viola calcarata L. — Langsporniges Veilchen.
Kalkalpenkette, Wiesen, 1800—2700 M., Juni—August.



Viola heterophylla Bertol. = *Valderia*, aut. nec All. — Verschiedenblättriges Veilchen.

Südtirol, trockene Stellen, 1600—2200 M., auf Kalk, Juli, August.



Polygala Chamaebuxus L. — Immergrüne Kreuzblume.
Alpenkette, trockene Stellen, Gebüsche, bis 2000 M. Mai—August.



Polygala alpestris Reichenb. — *amara* L. var. aut. pl. — Voralpen-Kreuzblume.

Alpenkette, bes. auf Kalkböden, bis 1700 M. April—Juli.



Gypsophila repens L. — Kriechendes Gypsraut.
Kalkalpenkette, auf Gerölle, 1300—2400 M. Juli—August.



Dianthus alpinus L. — Alpen-Nelke.
Ostalpen, auf Kalkboden, 1000—2000 M. Juni—August.



Dianthus glacialis Hänke. — Gletscher-Nelke.
Alpenkette, auf Urgestein, 1900—2500 M. Juli—August.



Dianthus speciosus Reichb. = superbus L. var. — Ansehnliche
Nelke.

Süd-Schweiz und Südtirol, Wiesen, 1600—2400 M., Juli, August.



Dianthus alpestris, Sternb. & Hoppe = Monspessulanus L. var.
Z. alpicola Koch. — Voralpen-Nelke.
Südtirol bis Krain, Wiesen, 1600—2400 M., auf Kalk und Urgestein, Juli, August.



Saponaria ocymoides L. — Basilicumartiges Seifenkraut.
Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, bis 2300 M., besonders auf Kalk. Mai—August.




Silene Pumilio (L.) Wulf. — Zwergiges Leinkraut
Centralalpenkette, östlich vom Schlern, 1900 - 2700 M. Juli - August



Silene quadrifida (L.) — Vierspaltiges Leimkraut.
Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—2000 M. auf Kalk. Juli—August.



Silene saxifraga L. — Steinbrechendes Leimkraut.
Südl. Alpenkette, Schweiz bis Krain, Gebüsche bis 2000 M., Juli, August.



Silene acaulis L. — Stengelloses Leimkraut,
Alpenkette, bes. auf Kalkboden. 1600—3000 M. Juni—August.






Lychnis alpina L. — Alpen-Lichtnelke.

Schweiz bis Kärnten, bes. auf Granit, 2500—3000 M. Juli, August.




Sagina glabra (Willd.) Koch = repens Burn. --- Kahles Mastkraut.
Schweiz, Südtirol und Salzburg, feuchte Stellen, 1600—2000 M., Juli, August.

Scanned from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversityse>



Sagina saginoides (L.) = Linnaei Presl. 1819; *saxatilis* Wimm.
1840. — Linné's Mastkraut.
Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., Juni—August.





Alsine rupestris (Scop. 1772). = *lanceolata* All. 1785 sub *Aren.*
Mert. & Koch. — Felsen-Miere.

Alpenkette bis Krain, trockene Stellen, 1900—2500 M., Juli, August.



Alsine laricifolia (L.) Wahlenb. — Lärchenblättrige Miere.
Centralalpenkette, trockene Stellen, 1700—2100 M., Juli, August.




Alsine recurvata (All.) Wahlenb. — Krummblättrige Miere.
Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, 1700—2700 M. Juli—August.



Alsine Austriaca (Jacq.) Mert. & Koch. — Oesterreich. Miere.
Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1700—2300 M. Juli—August.





**Cherleria sedoides L. = Alsine Cherleri Fenzl. — Fettblatt-
artige Cherlerie, Zvergmiere.**

Alpenkette, trockene Stellen, 1300–3000 M. bes. auf Kalk, Juli–September.



Möhringia glaucovirens Bert. (1844) = *glaуca* Leyb. (1853)
— Blaugrüne Möhringie.

Südliches Tirol, feuchte Stellen, bis 1800 M., auf Dolomit, Juli—August.

Scanned from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversitylibrary.org>



Möhringia muscosa L. — Moosartige Möhringie, Moosmiere.
Alpenkette, feuchte Stellen, bis 2000 M. bes. auf Kalk, Juni—September.






Möhringia ciliata (Scop. 1772). = *polygonoides* Wulf. 1786 sub *Arenar.* = *obtusa* All. 1785 sub *Arenar.* — Wimperige Möhringie,
Moosmiere.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1700—2300 M., bes. auf Urgestein, Juni, August.



Arenaria biflora L. — Zweiblüthiges Sandkraut.
Alpenkette, feuchte Stellen, 2200—3200 M. auf Urgestein, Juli, August



Arenaria ciliata L. — Gewimpertes Sandkraut

Alpenkette, auf Triften, bis 2700 M. Juli – August





Arenaria grandiflora L. — Grossblüthiges Sandkraut.
Westl. Schweiz, Tirol bis Oesterreich u. Krain, trockene Stellen, 1200—2000 M., Mai—Juli,



Stellaria cerastioides L. = *Cerastium trigonum* Vill. --
Hornkrautartige Sternmiere.

Centralalpenkette, feuchte Stellen, 1600—2200 M., Juli—August.



Cerastium latifolium L. — Breitblättriges Hornkraut.
Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1900—2800 M. Juli, August.





Cerastium uniflorum Murr. (1810) = latifolium L. var. δ glaciale
Koch — glaciale Gaud. 1824. — Einblüthiges Hornkraut.
Alpenkette, trockene Stellen, 2100 - 3300 M., auf Urgestein, August, September.



Cerastium alpinum L. — Alpen-Hornkraut.
Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2000 M., Mai—August.



Cerastium Carinthiacum Vest. (1810) = ovatum Hoppe 1818.
— Kärntnerisches Hornkraut.

Oestl. Alpenkette, Tirol bis Oesterreich, trockene Stellen, 1000–1900 M., Juni – August.



sta



sc



sei.



pi



Linum alpinum Jacq. — Alpen-Lein.
Oestliche Alpenkette, Wiesen. 1500—2000 M. Juni, Juli.



Geranium argenteum L. — Silberweisser Storhschnabel

Südtirol und Krain, auf Kalkfelsen, 1600—2000 M. Juli—August.



Geranium macrorrhizum L. — Grosswurzeliger Storchschnabel.
Südl. Alpenkette, Tirol bis Krain, Gebüsch bis 1600 M. Juli—August.

Scanned from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Rhamnus pumila L. — Niedriger Kreuzdorn.
Alpenkette, trockne Stellen, 1300—1900 M. auf Kalk. Juni—August.



Cytisus radiatus (L.) Koch. — Strahlblättriger Bohnenbaum.
Südtirol und Kärnten, trockene Stellen, bis 1600 M. Mai—Juni.





Ononis rotundifolia L. — Rundblättrige Hauhechel.
Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, bis 1600 M., Mai—Juli.



Anthyllis alpestris Hegetschw. — Voralpen-Wundklee.
Schweiz und Salzburg, Wiesen, 1300—2200 M., Mai—Juli.



Trifolium alpinum L. — Alpenklee.
Schweiz und Tirol, Wiesen, 1600—2200 M. Juni—August.



Trifolium pallescens Schreb. — Weisslicher Klee.

Schweiz bis Salzburg und Krain, Wiesen, 1900—2500 M. bes. auf Granit, Juli-September.



Trifolium Thalii Vill. (1786) = *caespitosum* aut. (false Reyn.
1787) — Thal's Klee.

Schweiz und Tirol, Wiesen, 1600—2200 M., Juli, August.



Trifolium saxatile All. — Felsenkiee.
Schweiz und Tirol, Gletscher, 1600—2500 M. Juli—August.



Trifolium Noricum Wulf. — Norischer Klee.
Südtirol bis Steiermark und Krain, trockene Stellen, 2000—2600 M., Juli, August.



Trifolium agrarium L. = badium Schreb. — Feldklee.
Alpenkette, Wiesen, 1300—2300 M., besonders auf Kalk. Juli—August.



Phaca frigida L. — Kälteliebende Berglinse.
Alpenkette, Wiesen, 1700—2000 M. bes. auf Urgestein, Juli—August.



Phaca alpina Jacq. --- Alpen-Berglinse.
Schweiz bis Salzburg und Krain, 1300—1900 M. Juli—August.



Oxytropis Halleri Bunge. — Hallers Spitzkiel.
Schweiz, Tirol, Salzburg u. Kärnten, trockene Stellen, 1900—2400 M. Juli, August.