



Aug 7 - 1923

Oxytropis campestris (L.) de Cand. — Feld-Spitzkiel.  
Alpenkette, Wiesen, 1300–2200 M., auf Urgestein. Juni—August.





*Oxytropis Lapponica* (Wahlenb.) Gaud. — Lappländ. Spitzkiel  
Schweiz, Südtirol, Salzburg u. Kärnten, trockene Stellen, 2000—2500 M. auf Urgestein.  
Juli—August.





Oxytropis Jacquinii Bunge == *montana* Jacq. — Jacquins Spitzkiel

Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2200 M. bes. auf Kalk, Juli, August.





Oxytropis neglecta Gay (1850) = cyanea Gaud., Koch et aut.  
nec M. Bieb. = Gaudini Bunge 1851. — Vernachlässigter Spitzkiel.

Schweiz, Tirol bis Kärnten, trockene Stellen, 1900—2500 M., Juli, August.





*Astragalus australis* (L.) Peterm. = *Phaca australis* L. Koch. —  
Südlicher Tragant.

Schweiz bis Salzburg und Kärnten, trockene Stellen, 1700—2300 M., Juli, August.





Astragalus alpinus L. == Phaca astragalina De Cand. -  
Alpen-Tragant.

Schweiz bis Steiermark, besonders auf Urgestein, 1600—2200 M. Juli—August.





Hippocrepis comosa L. — Schopfiger Hufeisenklee.  
Alpenkette, trockene Stellen, bis 1800 M., besonders auf Kalk. Juni—August.





*Hedysarum obscurum* L. — Dunkler Süssklee.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2200 M. bes. auf Kalk. Juli, August.





Orobis Styriacus Gremlini (1882). — Steierische Walderbse.  
Oestliche Alpenkette, Steiermark, Gebüsch, Mai, Juni.





*Dryas octopetala* L. — Achtblättrige Dryade, Silberwurz.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300–2200 M. auf Kalk, Juni–August,





*Geum montanum* L. — Berg-Benediktenkraut.

Alpenkette, auf Alpenwiesen, 1200—2300 M. Juni, Juli.





Geum reptans L. — Kriechendes Benediktenkraut.

Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M. bes. auf Urgestein. Juni, Juli.





*Comarum palustre* L. — Sumpf-Blutauge.

Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1600 M. Juni—August





Potentilla nitida L. — Schönes Fingerkraut.  
Südliche Alpenkette, 2000—3000 M. Juli, August.





Potentilla Clusiana Jacq. — Clusius' Fingerkraut.  
Tirol, Salzburg, Ober-Baiern, Steiermark und Nieder-Österreich, trockene Stellen,  
1500—2000 M., auf Kalk, Juli, August.





*Potentilla caulescens* L. — Vielstängeliges Fingerkraut.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 1600 M. auf Kalk, Juni, Juli.





Potentilla nivea L. — Schneeweisses Fingerkraut.

Schweiz, Tirol und Salzburg, trockene Stellen, 1900—2200 M., auf Schiefergestein,  
Juli, August.





*Potentilla aurea* L. — Goldgelbes Fingerkraut.  
Alpenkette, Wiesen, 1300—2400 M., besonders auf Kalk. Mai—Juli





Potentilla villosa (Crntz. 1769) = maculata Pourr. 1788 =  
salisburgensis Hänke 1788 = rubens Vill. 1789 = crocea Hall.  
Schleicher. 1807 = alpestris Hall. Fil. 1823. - Zottiges Fingerkraut.

Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M., auf Urgest., selten auf Kalk, Juli, August.





Potentilla grandiflora L. — Grossblüthiges Fingerkraut.  
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, über 1600 Meter. Juli – August.





Potentilla minima Hall. fil. (1794) = Brauneana Hoppe 1800.  
— Kleinstes Fingerkraut.


Alpenkette, Wiesen, 1300—2400 M. bes. auf Kalk, Juni, Juli.





Potentilla frigida Vill. — Kälteliebendes Fingerkraut.  
Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 2200—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.





*Sibbaldia procumbens* L. — Niederliegende Sibbaldie, Gelbling.  
Alpenkette, Wiesen, 1600—2200 M., besonders auf Urgestein, Juni, Juli.





*Rosa alpina* L. — Alpine (Alpen-) Rose.

Alpenkette, Gebüsch, bis 1800 M. Mai, Juni.





*Alchemilla pubescens* M. Bieb. — Flaumhaariger Frauenmantel.

Alpenkette, Wiesen, 1900—2200 M., auf Kalk, Juni—Juli.





Alchemilla fissa Schum. = Pyrenaica Garke et aut., nec Duf.

— Spaltblättriger Frauenmantel.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1900—2300 M., auf Urgestein, Juni, Juli.





*Alchemilla alpina* L. — Alpen-Frauenmantel.

Alpenkette, auf Triften, bis 1800 M. Juni—August.





Alchemilla pentaphyllea L. — Fünfblättriger Frauenmantel.  
Schweiz u. Tirol, Gletscher, 1860—2500 M. Juli, August.





Aronia rotundifolia Pers. — Rundblättrige Felsenbirne.  
Alpenkette, trockene Stellen, bis 1600 M. Mai, Juni,





**Sorbus Chamaemespilus (L.) Crantz. — Zwerp-Vogelbeere.**  
Alpenkette, Gebüsch, 1500—1800 M. auf Kalk. Juni—Juli.





*Epilobium rosmarinifolium* Haenke — Dodonaei Koch nec Vill. —  
Rosmarinblättriges Weidenröschen.

Alpenkette, auf Kalkgerölle, bis 1600 M. Juli—August.





*Epilobium alsinefolium* Vill. (1779) = *organifolium* Lam. 1786.

— Mierenblättriges Weidenröschen.

Alpenkette. feuchte Stellen, 1300—1900 M., Juli, August.





*Epilobium anagallidifolium* Lam. = *alpinum* Koch et aut. nec L.

— *Gauchheilblättriges Weidenröschen.*

*Alpenkette, feuchte Stellen, 1300—2100 M., Juli, August.*





*Herniaria alpina* L. — Alpen-Bruchkraut.

Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1600—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.





Rhodiola rosea L. — Gemeine Rosenwurz.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M., auf Urgestein, Juni, Juli.





Sedum Anacampseros L. — Rundblättriges Fettblatt.  
Schweiz und Südtirol, trockene Stellen, 1500—1900 M., Juli, August.





Sedum atratum L. = rubens Wulf. — Schwärzliches Fettblatt.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2000 M., Juli, August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Sedum annuum L. — Einjähriges Fettblatt.  
Alpenkette, trockene Stellen, bis 2000 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.





*Sedum alpestre* Vill. (1789) = *repens* Schleich. 1805 et aut. nec L. = *rubens* Hänke 1788 nec L. — Voralpen-Fettblatt.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1600–2300 M., Juli, August.

from The Bridgeman Library <http://www.bridgemanlibrary.org/www.bridgemanlibrary.org>



Sempervivum Wulfeni Hoppe. — Wulfen's Hauswurz.  
Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 2000—2600 M., auf Urgestein, Juni—August.





Sempervivum arachnoideum L. — Spinnwebige Hauswurz.

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1300—2000 M. Juli, August.



*pi**pi**sta**st**fr**se**se*

**Sempervivum montanum L. — Berg-Hauswurz.**

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2100 M. Juli, August





Sempervivum Braunii Funk. — Braun's Hauswurz.  
Tirol und Kärnten, trockene Stellen, 1800—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.





Senipervivum Funkii, Braune. — Funk's Hauswurz.

Ostdepen, n. f. Geroll. 1700—2100 M. Juli—August





*Sempervivum histum* L. — Kurzhaarige Hauswurz.

Tirol bis Oesterreich, trockene Stellen, um 1500 M., Juli—September.





Ribes alpinum L. — Alpen-Johannisbeerstrauch.  
Alpenkette, Gebüsch, 1300—1800 M., auf Urgestein, Juni, Juli.





*Saxifraga hieraciifolia* Waldst. & Kit. — Habichtskrautblättriger Steinbrech.

Ober-Steiermark, feuchte Stellen, bei 1600 M., Juni, Juli.





Saxifraga arachnoidea Sternb. --- Spinnenwebiger Steinbrech.  
Südtirol, an feuchten Stellen, 300—2000 M. auf Dolomit. Juli, August.





Saxifraga cernua L. — Nickender Steinbrech.  
Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen, 1300—1800 M., Juli, August.





*Saxifraga rotundifolia* L. — Rundblättriger Steinbrech.

Alpenkette, feuchte Stellen, 600—1600 M., bes. auf Kalk, Juni—August.





Saxifraga controversa Sternb. = adscendens Koch et aut. nec  
L. — Streitiger Steinbrech.  
Alpenkette, fenchte Stellen, 1000—2000 M., Juni, Juli.





Saxifraga stellaris L. — Sternblüthiger Steinbrech.

Alpenkette, bes. feuchte Stellen, 1400—2000 M. Juli, August.





Saxifraga Engleri D. T. = Clusii Koch et aut. germ. nec  
Gouan! stellaris L. var. robusta Engl. — Engler's Steinbrech.  
Schweiz, Tirol und Salzburg, feuchte Stellen, 1300—1900 M., Juni—August.





Saxifraga cuneifolia L. — Keilblättriger Steinbrech.  
Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—2000 M., Juni, Juli.





st

sta



st

fl.



S+H

fr



*Saxifraga muscoides* Wulf. (1779) nec. All. (1785). — Moosartiger Steinbrech.

Alpenkette, bes. im nördlichen Zuge, trockene Stellen, 1200—2500 M. bes. auf Kalk. Juli, August.





Saxifraga exarata Vill. = exarata var.  $\alpha$  compacta Koch. —  
Gefurchter Steinbrech.

Schweiz, Tirol, Kärnten bis Krain, trockene Stellen, 1800—2700 M., Juni, Juli.





Saxifraga Seguieri Spreng. — Seguier's Steinbrech.  
Schweiz und Tirol, Gletscher, 2700—3200 M., Juli, August.





Saxifraga androsacea L. — Mannsschildartiger Steinbrech.  
Alpenkette, feuchte Stellen, 1800—3200 M., Juni, Juli.





*Saxifraga aphylla* Sternb. (1810) = *stenopetala* Gaud. 1818. —  
Blattloser Steinbrech.

Alpenkette, trockene Stellen, 2200—3000 M., Juni, Juli.





*Saxifraga sedoides* L. — Fettblattartiger Steinbrech.  
Alpenkette, trockene und feuchte Stellen, 1900—2500 M., auf Kalk, Juli, August.





Saxifraga aizoides L. — Immergrüner Steinbrech.  
Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—2000 M. Juni—August.





Saxifraga tenella Wulf. — Zarter Steinbrech.  
Steiermark und Julische Alpen, trockene Stellen, 1000—1800 M., Juni, Juli.





Saxifraga aspera L. — Rauher Steinbrech.

Alpenkette, 1300—2000 M. Juli, August.





Saxifraga bryoides L. — Bryumartiger Steinbrech.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M. auf Urgestein, Juli, August.





Saxifraga crustata Vest. — Krustiger Steinbrech.

Tirol bis Krain. 900—2200 M auf Kalk. Juli, August.





*Saxifraga mutata* L. — Veränderlicher Steinbrech.  
Alpenkette, auf Kalkboden, 800—2000 M. Juli—August.





*Saxifraga brevisolia* Sternb. = *Aizoon* Jacq. — Kurzblättriger  
Steinbrech.

Alpenkette, auf Kaikboden 1200—2000 M. Juni—August.





*Saxifraga caesia* L. — Meergrauer Steinbrech.

Schweiz bis Oesterr. u. Steierm., trockene Stellen, 1300—2700 M. auf Kalk und Dolomit,  
Juni, Juli.





*Saxifraga squarrosa* L. — Sporriger Steinbrech.

Südl. Alpenkette, Tirol bis Krain, trockene Stellen, 1500—2300 M., auf Kalk und Dolom  
Juli, August.





Saxifraga Burseriana L. — Burser's Steinbrech.  
Alpenkette, auf Kalk und Dolomit, 1900—2400 M. Juni, Juli.





*Saxifraga Vandellii* Sternb. — Vandelli's Steinbrech.  
Schweiz, Tirol und Steiermark, Mai, Juni.





*Saxifraga oppositifolia* L. — Gegenblättriger Steinbrech.

Nördliche Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M., bes. auf Kalk. Juni—August.





**Saxifraga biflora All. — Zweiblütiger Steinbrech.**  
**Alpenkette, trockene Stellen, 2300 – 3300 M., Juni, Juli.**





Zahlbrücknera paradoxa (Sternb.) Reichenb. — Wundersame Zahlbrücknere.

Kärnten u. Steiermark, selt. 1050—1200 M. Juni, Juli.





*Hacquetia Epipactis* (L.) de Cand. — Gelbgrüne Hacquetie,  
Schaftdolde.

Kärnten bis Krain, Gebüsche, bis 1500 M., April, Mai.





*Astrantia minor* L. — Kleiner Thalstern.

Schweiz und Tirol, Wiesen, 1800—2300 M. auf Urgestein. Juli, August.





*Eryngium alpinum* L. — Alpen-Mannstreue.

Schweiz, Kärnten und Krain, auf Triften, 1500—1900 M. Juli—August.





Bupleurum petraeum L. = graminifolium Vahl. — Felsen-  
Hasenohr.

Südtirol bis Krain, trockene Stellen, 1600—2300 M., Juli, August.





Bupleurum ranunculoides L. — Hahnenfussartiges Hasenohr.  
Schweiz, Tirol und Krain, trockene Stellen, 1500—2200 M., Juli, August,





Athamanta Cretensis L. — Kretische Augenwurz.  
Alpenkette, 1300—2300 M., auf Kalk, Juni—August.





*Meum athamanticum* Jacq. — Augenwurzartige Bärwurz.  
Alpenkette, besonders östl. Alpen, Wiesen, 1000–2100 M. auf Kalk, Juli-August.





**Meum mutellina (L.) Gärtn. — Rauten-Bärwurz.**

Alpenkette, Wiesen, 1300—2200 M. Juli, August.





Pachypleurum simplex (L.) Reichb. = Gaya Gaud. 1828 nec  
Kunth. — Einfache Dickrippe.

Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.





*Laserpitium hirsutum* Lam. — Behaartes Laserkraut.

Südl. Schweiz bis Krain, Gebüsche, trock. Stellen, 1300—2100 M., bes. a. Urgestein, Juli—August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



*Lonicera coerulea* L. — Blaue Lonicere, Heckenkirsche.  
Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M., bes. auf Kalk, Mai, Juni.






Lonicera alpigena L. — Alpen-Lonizere, Heckenkirsche.  
Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M., bes. auf Kalk, Mai, Juni.





*Linnaea borealis* L. — Nordische Linnäe, Erdkrönchen.  
Schweiz bis Kärnten, Gebüsche, bis 1800 M. Juli, August.





**Galium Helveticum Weig.** = *rupicolum* Bertol. — Schweizerisches Labkraut.

Nördliche Alpenkette, Schweiz bis Oester., Gebüsch, trockene Stellen, 1900—2500 M. auf Kalk, Juli, August.





Galium Austriacum Jacq. = silvestre Poll. 1776 var.  $\alpha$  glabrum  
Koch = commutatum Jord. 1846 — Oesterreichisches Labkraut.  
Südtirol bis Oesterreich und Steiermark, trockene Stellen, bis 1600 M., Juni—September.





Valeriana supina L. — Niedriger Baldrian.

Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen, 1900—2600 M., bes. a. Kalk, Juli—August.

Attributed to The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversitylibrary.org>



*Valeriana saliunca* All. — Weidenblättriger Baldrian.

Westl. Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1900—2800 M., auf Urgestein, Juli, August.





*Valeriana Celtica* L. — *Celtischer Baldrian.*

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1900—2500 M., auf Urgestein; nördl. Alpenkette, östl. der Salza, 1600—2000 M., Juni—August.





Valeriana saxatilis L. — Felsen-Baldrian.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2100 M. auf Kalk. Juni, Juli.





Valeriana elongata L. — Verlängerter Baldrian.

Tirol bis Oesterreich und Krain, trockene Stellen, 1600—2000 M., auf Kalk, Juli, August.





*Valeriana montana* L. — Berg-Baldrian.  
Alpenkette. feuchte Stellen, 1000—1800 M., Juni—August.

Digitized from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversitylibrary.org>



*Knautia longifolia* (Waldst. & Kit.) Koch — Langblättrige  
Knautie, Witwenblume.

Tirol bis Steiermark und Oesterreich, Wiesen, 1300—1600 M., Juli, August.





*Scabiosa lucida* Vill. — Glänzendes Krätenkraut.  
Alpenkette, Wiesen, 1500—2100 M., bes. auf Kalk, Juni — September.

Digitized by The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversitylibrary.org>



*Adenostyles alpina* (L.) Bl. & Fing. — Alpen-Drüsengriffel.

Alpenkette, auf Kalkboden, 1000—1600 M. Juli, August.





Homogyne discolor (Jacq.) Cass. — Zweifarbig Alplattich.  
Tirol bis Oesterreich und Kärnten, Wiesen, 1600—2000 M., auf Kalk, Juni, Juli.





*Homogyne alpina* (L.) Cass. — Gemeiner Alplattich.  
Alpenkette, Wälder u. trockene Stellen, 1000—1600 M. Mai—Juli.





*Petasites niveus* (Vill) Baumg. — Schneeweisse Pestwurz.

Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1500 M. bes. auf Kalk. März—Mai.





*Aster alpinus* L. — Alpen-Sternblume.

Alpenkette, auf Kalkgerölle, 1560—1900 M. Juli, August.





*Bellidiastrum Michelii* (L.) Cass. — Michel's Alpenmassliebchen.

Alpenkette, Triften, bis 1900 M. bes. auf Kalk. Mai—Juli.





*Erigeron uniflorus* L. — Einblüthiges Berufskraut.

Alpenkette, auf Urgestein, 1900—2500 M. Juli, August.





Erigeron Villarsii Bell. — Villars' Berufskraut.  
Schweiz, Tirol und Kärnten, Wiesen, 1500—1900 M., Juli, August.





*Erigeron alpinus* L. — Alpen-Berufskraut.

Alpenkette, auf Gerölle, 1200—1860 M. Juli, August.





*Solidago alpestris* Waldst. & Kit. = *virgaurea* L. var.  $\delta$  Koch  
Voralpen Goldruthé.

Alpenkette, trockene Stellen, Wiesen, 1200–2200 M., Juni, Juli.





*Buphthalmum salicifolium* L. — Weidenblättrige Rindszunge.  
Alpenkette, auf Kalkboden, bis 1800 M. Juli—August.





Gnaphalium Leontopodium (L.) Scop. — Strahliges  
Ruhrkraut, Edelweiss.

Alpenkeute, trockene Stellen, 1300—1900 M.. bes auf Kalk, Juli—September.

Digitized from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversitylibrary.org>



*Gnaphalium supinum* L. — Niedriges Ruhrkraut

Alpenkette, auf Gerölle, 1580—2300 M. Juni—August.





*Gnaphalium Norvegicum* Gunn. — Norwegisches Ruhrkraut.  
Alpenkette, trockene Stellen, 1300–1900 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.





Gnaphalium Hoppeanum Koch. — Hoppe's Ruhrkraut.  
Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1900—2500 M., Juli, August.





Gnaphalium Carpathicum Wahlenb. — Karpathisches Ruhrkraut.  
Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.





Artemisia nitida Bertol. = lanata Koch & aut., nec Willd. —  
Glänzender Beifuss.

Südtirol, trockene Stellen, 1600—2000 M., auf Kalk, Juli, August.

Digitized by The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversitylibrary.org>



*Artemisia glacialis* L. — Gletscher-Beifuss.  
Schweiz, über 1800 M., Juli, August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



*Artemisia mutellina* Vill. — Edelraute

Central-Alpenkette, 2000—2700 M. July, August





*Artemisia spicata*. Wulf. — Aehriger Beifuss.

Südl. Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1800—2500 M. auf Urgestein. Juli, August.

Digitized by The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Artemisia nana Gaud. — Zwerger Beifuss.  
Schweiz und Tirol, Juli, August.





Achillea moschata L. — Bisam-Schafgarbe.

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1900—2200 M., auf Urgestein, Juli, 4 August.





Achillea atrata L. — Geschwärzte Schafgarbe.  
Alpenkette, Wiesen, feuchte Stellen, 1600—2200 M., bes. auf Kalk, Juli, August.





Achillea Clusiana Tausch. — Clusius-Schafgarbe.  
Ostalpen, 1600—2000 M. Juli + August.





Achillea Clavenae L. — Chiavena's Schafgarbe.  
Alpenkette, auf Kalkboden, 1700—2200 M. Juni—September.





Achillea nana Gaud. — Zwerp-Schafgarbe.

Schweiz und westl. Tirol, trockene Stellen, über 1860 M., auf Urgestein, Juli, August.





Anthemis Styriaca Vest = montana Koch et aut pp. —  
Steirische Hundskamille.

Steiermark, am hohen Zinken, u. s. w. — August—September.





*Anthemis alpina* L. — Alpenhundskamille.

Tirol bis Steiermark, trockene Stellen, 1800--2200 M., bes. auf Kalk, Juli, August.





*Leucanthemum alpinum* (L.) — Alpen-Wucherblume.  
Schweiz bis Oesterreich, Wiesen, 1700—2500 M. Juli, August.