



Leucanthemum coronopifolium (Vill.) — Krähenfussblättrige
Wucherblume.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500—2200 Meter, besonders auf Kalk. Juli—August.



Doronicum cordatum (Wulf. 1805) Kern. = cordifolium Sternb.
1818. — Herzblättrige Gemswurz.

Tirol bis Oesterreich. Wälder, 1000–1600 M., bes. auf Kalk, Juli, August.



Doronicum Austriacum Jacq. — Oesterreichische Gemswurz.
Tirol bis Oesterreich und Krain, feuchte Stellen, 1300—1900 M., bes. auf Kalk, Juli, August.



Aronicum scorpioides (L.) Reichenb. — Scorpionartige Krebswurz
Schweiz bis Kärnthen, auf Geröll, 1600—1900 M. Ju. — August



Aronicum glaciale (Wulf.) Reichb. — Gletscher-Schwindelkraut.
Alpenkette, Gletscher, 1900—2600 M., auf Urgestein. Juli—August.



Arnica montana L. — Berg-Wohlverleih, Arnika.
Alpenkette, auf Tristen, 1000—2000 M. Mai J.



Senecio abrotanifolius L. — Staubwurzblättriges Kreuzkraut.
Alpenkette, bes. auf Kalk, 1200—1600 M. Juni—August.



Senecio incanus L. — Weissgraues Kreuzkraut.
Schweiz bis Steiermark, 1900—2500 M. Juli—August.



Senecio carniolicus Willd. -- Krainisches Kreuzkraut
Ostalpen, bes. auf Urgestein, 1200—2000 M. Juli, August

Digitized from The Biodiversity Heritage Library by http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversitylibrary.org/2029

Senecio cordifolius Gouan (1773) = cordatus Koch. — Herzblättriges Kreuzkraut.

Alpenkette, trockene Stellen. Sennhütten, 1300—1600 M. Juli, August.





Senecio Doronicum L. — Gemswurz-Kreuzkraut.
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2300 M., bes. auf Kalk, Juli, August.



Cirsium spinosissimum (L.) Scop. — Vielstachelige Kratzdistel.
Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., Juli, August.



Carduus defloratus L. — Abgeblühte Distel.

Alpenkette, auf Kalkboden, bis 1700 M. Juh.—August.



Saussurea pygmaea (L.) Spreng — Zwergige Saussuree
Alpenscharte

Ostalpen, auf Kalkboden, 2000—2700 M J. J., August



Saussurea discolor (Willd.) De Cand. — Zweifarbiges Saussuree,
Alpenscharte.

Schweiz bis Krain u. Niederösterr., trockene Stellen, 2000—2700 M., auf Kalk, Juli, August.



Saussurea alpina (L.) De Cand. — Alpen-Saussuree.
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 2000—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.



Saussurea macrophylla Saut. — Grossblättrige Saussuree.
Tirol und Salzburg, Juli, August.



Serratula helenifolium Gren. & Godr. — Allantblättrige Scharte.
Schweiz bis Krain, auf Tristen, 1600—2200 M. Juli, August.



Centaurea montana L. — Berg-Flockenblume.
Alpenkette, unter Gebüsch, bis 1600 M. Juli—August.



Centaurea plumosa Lam. (1793) = Phrygia Reichb. nec Koch
nec L. = nervosa Willd. 1809. — Federige Flockenblume.
Schweiz bis Krain, Wiesen, 1600—2200 M., Juli, August.



Centaurea Phrygia L. — Phrygische Flockenblume.

Alpenkette, auf Wiesen, bis 1600 M Juli—September.



Aposeris foetida (L.) Less. — Stinkender Hainlattich.
Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M. Juli—August.



Leontodon saxatilis All. = Taraxaci All. 1785 sub Picris; Lois,
Koch nec. L. — Felsen-Löwenzahn.
Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2600 M., besonders auf Kalk, August-September.



Leontodon Pyrenaicus Gouan. — Pyrenäischer Löwenzahn.
Alpenkette, Wiesen, 1200—1900 M., Juli, August.



Scorzonera rosea Waldst. & Kit. — Rosenrothe Schwarzwurz.
Kärnten und Krain, Wiesen, bei 1600 M., Mai, Juni.



Hypochaeris uniflora L. — Einköpfiges Ferkelkraut.


Schweiz bis Steiermark, auf Triften, 1300—1900 M. Juli—August.



Willemetia stipitata (Jacq. 1775) = *hieracioides* Monn. (1825).

= *apargioides* (Willd 1796) — Gestielte Willemetie.

Alpenkette, auf Tristen, bis 2000 M. Juni—August.



Taraxacum nigricans Kitaib. = *officinale* Wigg. var. τ *alpinum*
Koch. — Schwärzliche Kuhblume.
Alpenkette, Wiesen, 1500—2200 M., Juni—September.



Taraxacum Pacheri Schultz. Bip. — Pacher's Kuhblume.
Kärnten: Salmshöhe, Juni, Juli.



Mulgedium alpinum (L.) Less. — Alpen-Milchlattich.

Alpenkette, Gebüsch bis 1600 M. Juh—August



Crepis aurea (L.) Cass. — Goldener Pippau.
Alpenkette, auf Wiesen, bes. Kalkboden, 1600—2500 M. Juni—August.



Crepis pygmaea L. — Kleiner Pippau.
Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1600—2500 M., Juli, August.



Crepis jubata Koch = chrysantha Koch nec Fröl. — Bemährter
Pippau.

Schweiz und Tirol, auf Gerölle, 1800—2700 M. Juli—August.



Crepis Terglouensis (Hacq. 1782) Kern. = *Soyeria hyoseridifolia* Vill. 1807 sub *Hierac.* Koch. — Terglou'scher Pippau.

Kalk-Alpenkette, trockene Stellen, 2200—2600 M. Juli—August.



Crepis pontana (L.) = *Soyeria montana* Jacq. 1774 sub *Hierac.*;
Moun. — Linne's Pippau.

Alpenkette, Wiesen, 1600—1900 M., Juli, August.



Crepis alpestris (Jacq.) Tausch. — Voralpen Pippau.
Alpenkette, trockene Stellen, bis 1600 M., auf Kalk. Mai-August.



Crepis chondrilloides (L.) nec Jacq. = Jacquinii Tausch. —
Knorpelsalatartiger Pippau.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500—2000 M. auf Kalk, Juli, August,



Hieracium staticefolium Vill. — Widerstossblättriges Habichtskraut.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 1800 M., bes. auf Kalk. Juli, August.



Hieracium aurantiacum L. — Orangeroth. Flockenblattkraut.
Alpenkette, auf Wieshoden, zw. 1300—1600 M. häufig. Juni—



Hieracium intybaceum Wulf. = albidum Vill. — Wegwarteartiges
Habichtskraut.

Centralalpen, im Gerölle, 1400—2000 M. Juli—August



Hieracium alpinum L. = pilosum Schleich. Griseb. — Alpen-Habichtskraut.

Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 1500—2200 M., Juli, August.



Hieracium villosum L. — Zottiges Habichtskraut

Alpenkette, trockene Stellen, 1200—2000 M. auf Kalk. Juni—August.



Phyteuma comosum L. — Schopfige Rapunzel

Kalkfelsen in Südtirol und Krain, 600—1500 M Juni—August



Phyteuma Scheuchzeri Ali. — Scheuchzers Rapunzel.
Tirol bis Krain, trockene Stellen, 1300—2200 M., Juli, August.



Phyteuma Sieberi Spreng. — Sieber's Rapunzel.

Ostalpen (Tirol bis Krain), 1500—2200 M. Juli, August



Phyteuma pauciflorum L. — Armblüthige Rapunzel.
Schweiz bis Steiermark, 1850—2800 M. Juli—August.



Phyteuma humile Schleich. — Niedrige Rapunzel.
Schweiz bis Salzburg und Kärnten, trockene Stellen, 2000—2700 M., auf Urgestein,
Juli, August.



Phyteuma hemisphaericum L. — Halbkugelige Rapunzel.
Schweiz bis Steiermark, Wiesen, 1500—2200 M., auf Urgestein, Juli, August.



Phyteuma latifolium (Heuff. v. 1858) = *confusum* Kern. 1870.
— Breitblättrige Rapunzel.

Kärnten u. Steiermark, Wiesen 1500–2200 M. auf Urgestein, Juli, August.



Phyteuma betonicaefolium Vill. = Michelii Bert. var. α Koch.

— Betonienblättrige Rapunzel.

Alpenkette, Wiesen, bis 2000 M., Mai—Juli.



Campanula barbata L. — Bartige Glockenblume.

Alpenkette, auf Triften, 800—1800 M. Juni—Aug.



Campanula alpina L. — Alpen-Glockenblume.

Tirol bis Oesterreich u. Steiermark, trockene Stellen, 1600—2100 M., auf Kalk. Juli, August.



Campanula thyrsoidea L. — Straussblühige Glockenblume.

Alpenkette, 1600—2100 M. Juli, August



Campanula Cenisia L. — Cenis'sche Glockenblume.

Rhaeticon-Gebiet, Gerölle über 1800 M. Juli—August.



Campanula Morettiana Reichenb. — Moretti's Glockenblume

Fassa- und Fleinserthal, Südtirol, um 1300 M. Juli-August





Campanula Zoysii Wulf. — Zois' Glockenblume.
Ost-Alpen, Kärnten, Steiermark und Krain, trockene Stellen, 2000—2700 M., auf Kalk,
Juli, August.



Campanula pulla L. — Dunkelblaue Glockenblume.
Salzburg bis Krain, trockene Stellen, 1300—1900 M. Juli, August.



Campanula linifolia Scop. (1772) = Carnica Schiede 1812. —
Linienblättrige Glockenblume.
Krain, trockene Stellen, über 1600 M., Juni, Juli.



Campanula Scheuchzeri Vill. — Scheuchzer's Glockenblume.
Alpenkette, trockene Stellen, bis 2000 M. Juli—September



Edraianthus Croaticus Kern. = *Kitaibelii* Koch et aut. nec de Cand. — Kroatische Krugglocke.

Krain, Wiesen, um 1300 M., Juli.



Vaccinium uliginosum L. — Moosbeere.
Alpenkette, Gebüsch, 1300—2000 M., Mai—Juli.



Arctostaphylos alpina (L.) Spreng. — Alpen-Bärentraube.
Alpenkette, trockene Stellen, 1500—2000 M., bes. auf Kalk, Mai—Juli.



Arctostaphylos Uva ursi (L.) Spreng. = *officinalis* Wimm. &
Grab. — Gemeine Bärentraube.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500—2000 M., bes. auf Kalk, Mai—Juli.





Caluna vulgaris (L.) Salisb. — Gemeine Besenheide.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 2000 M., bes. auf Schieferböden, August—October.



Erica carnea L. — Fleischrothe Heide.

Alpenkette, auf Mergelhoden, 370—2200 M. Marz—Mai.



sta



ov



st



fr



fr.



se



sel

Azalea procumbens L. — Niederliegende Alpenheide.
Alpenkette, trockene Steilten 1500—2000 M., bes. auf Schieferböden, Mai—August.



Rhododendron Chamaecistus L. — Zwerp-Alpenrose.
Tirol bis Krain, trockene Stellen, 1200—1900 M., auf Kalk. Mai—Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Rhododendron hirsutum. L. — Rauhaarige Alpenrose.

Alpengebiet, bes. auf Kalkboden, 1400—2300 M. Mai—Juli.



ca



Rhododendron ferrugineum L. — Rostrothe Alpenrose.

Alpenkette, bes. auf Urgestein, 1300—2000 M. Juni—August.





Pirola uniflora L. — Einblüthiges Birnkraut.

Alpenkette, auf Humusboden, 550—1600 M. Juni—August.



Pirola secunda L. — Einseitwendiges Birnkraut.

Alpenkette, unter Gebusch, bis 1700 M. Juni—Juli.



Ilex Aquifolium L. — Immergrüne Stechpalme.
Schweiz bis Oesterreich, Wälder, Gebüsch, bis 1500 M., Mai—Juli




Sweertia perennis L. — Ausdauernde Swertie Tarant.
Alpenkette, feuchte Stellen, 1500—2300 M. Juli—August.




sta



pi



pt



fr



fr -



Lomatogonium Carinthiacum (Wulf.) A. Br. — Kärntnerische Saumnarbe.

Schweiz, Tirol, Salzburg und Kärnten, trockene Stellen, 1500—2300 M. bes. auf Kalk. August, September.



Gentiana lutea L. — Gelber Enzian

Alpenkette, auf Triften, 1100—1600 M. Juli August.



Gentiana purpurea L. — Purpurrother Enzian.
Schweiz, Vorarlberg und Tirol, Wiesen um 1600 M., Juli, August.



Gentiana punctata L. — Punktirter Enzian.

Ostalpen, auf Alpenwiesen 1,00—1,50 M. Juli—August.



Gentiana Pannonica Scop. — Pannischer Enzian.
Schweiz bis Oesterreich, Wiesen, 1300—2000 M., auf Kalk. Juli, August.



Gentiana tenella Rottb. — Zarter Enzian.
Schweiz bis Kärnten, Gletscher, 1900—2600 M. August—September.



Gentiana nana Wulf. — Zwerp-Enzian.
Salzburg und Kärnten, Gletscher, 2200 – 2900 M. Juli – Scptember.



Gentiana asclepiadea L. — Schwalbenwurzartiger Enzian.

1 Geb. se. bis 1700 M., bes. auf Kalk; auch auf Urgestein. August, September.



Gentiana Clusii Song. u. Perr. = acaulis aut.; Linn. var. β . —
Clusius' Enzian.

Alpenkette, auf Kalkboden, 500—2400 M. Juni—August.



Gentiana acaulis (L. v.) nec aut. = excisa Presl. 1828; Kochiana Perr & Song. 1855. — Stengelloser Enzian.

Alpenkette, Wiesen, 1400–2000 M. bes. auf Urgestein, Juni, Juli.





Gentiana Frölichii Jan. — Fröhlich's Enzian.
Kärnten und Krain, trockene Stellen, über 1800 M., August, September



Gentiana frigida Hänke. — Kälteliebender Enzian.
Steiermark, trockene Stellen, über 1800 M., auf Granit. Juli—September.



Gentiana Bavarica L. — Baierischer Enzian.
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2500 M. auf Kalk, Juli, August.



Gentiana imbricata Frol — Dachblättriger Enzian

Ostalpen von Tirol bis Krain, 2100—3000 M Juli, August.



Gentiana pumila Jacq. — Niedriger Enzian.

Tirol bis Oesterreich und Krain, Wiesen, 1600—2000 M. Juli, August.



Gentiana brachyphylla Vill. — Kurzblättriger Enzian.
Schweiz bis Steiermark, Wiesen, 1900—2800 M., auf Urgestein, Juli, August.



Gentiana angulosa M. Bieb. = aestiva R. u. Sch. -- Geflügelter Enzian.

Alpenkette, auf Trifler, bis 2200 M. Juni, Juli





Gentiana utriculosa L. — Blasiger Enzian.
Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1700 M., Juni—August.



Gentiana nivalis L. — Schnee-Enzian.

Alpenkette, auf Trift, 1500 – 2000 M. Juli – August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Gentiana prostrata Hänke — Niedergestreckter Enzian.
Tirol bis Oesterreich und Krain, Wiesen, 2000—2800 M., Juli, August



Polemonium coeruleum L. — Blaues Sperrkraut.
Schweiz bis Krain, Gebüsche, bis 1500 M., Mai, Juni.




Cerinthe alpina Kit. — Alpen-Wachsblume.
Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, bis 1680 M., Juni—August.



Myosotis alpestris Schmidt = *silvatica* Hoffm. var. β Koch et aut.
— Alpen-Vergissmeinnicht.

Alpenkette, auf Wiesen und Gerölle, 1200—2000 M Jun., July



Eritrichium Terglouense (Hacq.) Kern = nanum (All) Schrad. —
Terglou'scher Himmelsherold.

Schweiz bis Krain, auf Urgebirge, 1800—2300 M. Juli, August.



Linaria alpina L. — Alpen-Leinkraut.

Alpenkette, bes. auf Kalk. 1600 — 2000 M. Juni — September.



Erinus alpinus L. — Alpen-Leberbalsam.

Schweiz und Tirol, trockene Stellen, Wiesen, 1300—2400 M., Mai—Juli.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Veronica fruticosa L. — Kleinstrauchiger Ehrenpreis.
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M. auf Urgestein, Juli, August.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Veronica saxatilis Scop. — Feisen-Ehrenpreis

Alpenketten, auf Gerölle, 1500—2400 M Juni Juli



Veronica alpina L. — Alpen-Ehrenpreis.
Alpenkette, auf Triften, 1200—2500 M. Juni—August.



Veronica bellidioides L. — Massliebchenartiger Ehrenpreis.
Alpenkette, auf Gerölle, 1500—1850 M. Juli—August.



Veronica latifolia L. (1753) = *urticaefolia* Jacq. 1773 — Breit-blättriger Ehrenpreis.

Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M., Juni, Juli.



Veronica aphylla L. — Blattloser Ehrenpreis.
Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1200 — 2300 M. Juni — August.



Paederota Bonarota L. — Blaue Paederote, Mänderle.
Südtirol bis Krain, trockene Stellen, über 1500 M., Juni—August.



Paederota Ageria L. — Gelbe Päderote, Mänderle.
Süd-Tirol bis Krain, trockene Stellen, über 1500 M., Juni -- August.



Wulfenia Carinthiaca Jacq. — Kärntnerische Wulfenie, Kuhtritt.

Oberkärnten: Kühweger- und Watschigeralpe im Gaikhal, über 1500 M., Juli, August.



Tozzia alpina L. — Alpen-Tozzie.

Alpenkette, bes. auf Kalk, 1300—2300 M. Juni, Juli.



Melampyrum laricetorum Kern i. sched. (1870). — Lärchen-Wachtelweizen.

Tirol, Central-Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., auf Schiefer, Juli, August.



Pedicularis acaulis Scop. — Stängelloses Läusekraut.

Südtirol bis Krain, auf Triften, 1300—2000 M. April—Mai.

Downloaded from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org>



Pedicularis verticillata L. — Quirlblättriges Läusekraut
Alpenkette, bes. auf Kalk, Triften, 1200—2100 M. Juni—August.

Digitized from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/www.biodiversitylibrary.org>



Pedicularis incarnata Jacq. — Fleischrothes Läusekraut.
Alpenkette, Wiesen, 1200—2000 M., Juli, August.




Pedicularis asplenifolia Flörke. — Farrenblättriges Läusekraut.
Schweiz bis Salzburg und Steiermark, feuchte Stellen, 2000—2500 M., bes. auf Urgestein.
Juli, August





Pedicularis rostrata L. — Jacquin Koch et aut. — Geschnabeltes
Läusekraut.

Schweiz bis Oesterreich, Triften auf Kalk, 1200—2200 M. Juli—August





Pedicularis Kernerii D. T. non Huter. = rostrata Koch et aut.
nec L. = Rhaetica Kern. — Kerner's Läusekraut.

Schweiz bis Salzburg und Krain, feuchte Stellen, 1500—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.



Pedicularis geminata Portenschl. (1821) = Portenschlagii Saut.
— Gezweites Läusekraut.

Tirol bis Salzburg und Steiermark, Wiesen, 2000—2600 M., auf Granit und Urgestein.
Juli—August.



Pedicularis rosea Wulf. — Rosenrothes Läusekraut.
Tirol bis Krain, Wiesen, 1600—2200 M., bes. auf Kalk, Juli, August.



Pedicularis recutita L. — Beschnittenes Läusekraut.

Schweiz bis Ob.-Oesterreich und Steiermark, feuchte Stellen, 1200—2200 M., Juni—August.



Pedicularis tuberosa L. — Knölliges Läusekraut.
Schweiz bis Salzburg und Krain, feuchte Stellen, 1300—2200 M., Juli, August.



Pedicularis versicolor Wahlenb. = *Oederi* aut. nec Vahl. —
Buntes Läusekraut.

Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen, 1600—2200 M., Juni—August.



Pedicularis foliosa L. - Blattreiches Läusekraut.

Alpenketten Triften auf Kalkböden 1000-2000 M Juni-August



Rhinanthus aristatus Čelak. = *alpinus* Koch & aut. p. p. nec
Baumg. — Begrannter Klappertopf.

Alpenkette, Wiesen, 1300—2200 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.



Bartsia alpina L. — Alpen-Bartsie.

Alpenkette, 1300—1700 M. Juni—August



Euphrasia Salisburgensis Funke. — Salzburgischer Augentrost.
Alpenkette, Wiesen, bis 1900 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.



Euphrasia minima Jacq. = officinalis var. β Lam.; pratensis
var. α Reichb.; nemorosa var. ζ Soy. — Kleinster Augentrost.
Alpenkette, Wiesen, 1800–2400 M.; besonders auf Schiefer, Juli–August.