

A


0
0
0
2
8
4
6
3
5
3
3



ATLAS
DE LA
FLORE ALPINE.

Tome. I.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT LOS ANGELES






ATLAS

DE LA

FLORE ALPINE

*Publié par le Club alpin allemand
et autrichien.*

Vol. I (Planches 1 à 100).



GENÈVE & BALE
LIBRAIRIE GEORG & C^o

Lyon, même maison.

1899

Tous droits réservés.

Index des planches du tome I.

(Planche 1 — 100.)

Les plantes dont les noms sont accompagnés d'un * sont photographiées d'après nature.

1. *Atrageus alpina* L.*
 2. *Thalictrum aquilegifolium* L.*
 3. » *alpinum* L.*
 4. *Anemone narcissiflora* L.*
 5. » *baldensis* L.*
 6. » *trifolia* L.*
 7. » *vernalis* L.*
 8. » *alpina* L.*
 9. *Callianthemum rutaeifolium* C.A.M.
 10. *Callianthemum anemonoides* Sch.
 11. *Ranunculus pyrenaëus* L.*
 12. » *parnassifolius* L.
 13. » *glacialis* L.*
 14. » *Segneri* Vill.
 15. » *alpestris* L.*
 16. » *aconitifolius* L.*
 17. » *Thora* L.*
 18. » *Pythora* Crantz.
 19. » *pygmaeus* Wahl.
 20. » *montanus* Willd.*
 21. *Trollius europæus* L.*
 22. *Eranthis hiemalis* Salisb.
 23. *Helleborus niger* L.*
 24. *Aquilegia atrata* Koch.*
 25. *Delphinium elatum* L.*
 26. *Aconitum Napellus* L.*
 27. » *Anthora* L.*
 28. *Paeonia peregrina* Mill.*
 29. *Papaver alpinum* L.*
 30. » *pyrenaicum* Willd.
 31. *Arabis alpina* L.*
 32. » *coerulea* (All.) Hænke.*
 33. » *pumila* Wulf.*
 34. » *bellidifolia* Jacq.*
 35. » *arenosa* Scop.*
 36. » *Halleri* L.*
 37. *Cardamine arifolia* L.
 38. » *alpina* Willd.*
 39. » *trifolia* L.*
 40. » *resedifolia* L.*
 41. *Dentaria enneaphyllos* L.*
 42. » *digitata* Lam.*
 43. *Alyssum Wulfenianum* Bernh.
 44. *Draba aizoides* L.
 45. » *Sauteri* Hoppe.*
 46. » *tomentosa* Wahl.*
 47. » *frigida* Saut.
 48. » *stellata* Jacq.
 49. » *carinthiaca* Hoppe.*
 50. » *Fladnizensis* Wulf.
 51. *Draba confusa* Ehr.
 52. » *pyrenaica* L.
 53. *Kernera saxatilis* Reich.*
 54. » *alpina* Prantl.
 55. *Braya alpina* Sterub.
 56. *Erysimum lanceolatum* B. Br.*
 57. *Aethionema saxatilis* R. Br.*
 58. *Biscutella laevigata* L.*
 59. *Thlaspi alpinum* Crantz.*
 60. » *cepæfolium* Moritz.*
 61. » *rotundifolium* Gaud.*
 62. *Hutchinsia alpina* R. Br.*
 63. » *brevicaulis* Hoppe.*
 64. *Helianthemum alpestre* DuRoi.*
 65. » *hirsutum* A. Kern.*
 66. *Viola pinnata* L.*
 67. » *biflora* L.*
 68. » *alpina* Jacq.*
 69. » *cenisia* L.*
 70. » *calcarata* L.*
 71. *Polygala Chamæbuxus* L.*
 72. » *microcarpa* Gaud.*
 73. *Dianthus monspessulanus* L.*
 74. » *Sternbergii* Sieb.*
 75. » *alpinus* L.*
 76. » *glacialis* Hænke.
 77. *Gypsophila repens* L.
 78. *Saponaria ocynoides* L.
 79. *Silene Pumilo* Wulf.
 80. » *alpestris* Jacq.*
 81. » *rupestris* L.
 82. » *Saxifraga* L.*
 83. » *acaulis* L.*
 84. *Lycniscus alpina* L.
 85. *Cerastium trigynum* Vill.
 86. » *glaciale* Gaud.*
 87. » *carinthiacum* Vest.*
 88. *Arenaria biflora* L.
 89. » *ciliata* L.*
 90. » *grandiflora* L.
 91. *Mœhringia muscosa* L.
 92. » *Ponæ* Fenzl.*
 93. *Alsine sedoides* Kit. (Cherl. sed.)*
 94. » *lanceolata* M. K.
 95. » *laricifolia* Crantz.
 96. » *recurva* Wahl.
 97. » *austriaca* M. K.
 98. *Sagina glabra* Koch.
 99. *Myricaria germanica* Desv.*
 100. *Linum alpinum* L.*



1. *Atragene alpina*, L. — Alpenrebe.

Atragène des Alpes. — Alpine Clematis.

Chaîne des Alpes, Tyrol, Grisons, Alpes françaises et piémontaises. Mai - Juin.



2. *Thalictrum aquilegifolium*, L. — Akeleiblättrige Wiesenraute.
Pigamon. — Meadowrue.
Lieux frais des montagnes. Avril — Juin.



3. *Thalictrum alpinum*, L. — Alpen-Wiesenraute.
Pigamon alpin. — Alpine Meadowrue.

Alpes centrales, dans les lieux frais. Juin — Août.



4. *Anemone narcissiflora*, L. — Narcissen-Windröschen.
 Anémone à fleurs de narcisse. — Narcisse flowered Windflower.

Alpen- und Gebirgsflora. I. Teil. I. Aufl.



5 *Anemone baldensis*, L. — Monte Baldo-Windröschen.
Anémone du Mont Baldo. — Monte Baldo Windflower.

Disseminée dans les pâturages rocheux de la région alpine.



6 *Anemone trifolia*, L. — Dreiblättriges Windröschen.
Sylvie alpine. — Alpine Woodanemone.

Regions montagneuses et boisées des Alpes orientales, occidentales et méridionales



7. *Anemone vernalis*, L. — Frühlings-Küchenschelle.
Anémone des neiges. — Vernal Windflower.

Pâturages élevés des Alpes granitiques. Avril — Juin.



8. *Anemone alpina*, L. — Alpen-Küchenschelle.

Anémone des Alpes. — Alpine Windflower.

Pâturages et lieux frais des régions sous alpines et montagneuses dans les alpes calcaires. Mai — Juillet.



9. *Callianthemum rutaefolium*, C. A. Mey. — Rautenblättrige Schmuckblume.

Calianthème à feuilles de Rue. — Rue leaved crowfoot.



10. *Callianthemum anemonoides*, Schott. — Windröschen ähnliche Schmuckblume.

Calianthème à fleurs d'Anémone. Anemone flowered crowfoot.



11 *Ranunculus pyrenaeus*, L. — Pyrenäischer Hahnenfuss.
 Renoncule des Pyrénées. — Pyrenean crowfoot.
 Pâturages élevés de la chaîne alpine Mai — Juillet



12. *Ranunculus parnassifolius*, L. — Studenröschenblättriger
Hahnenfuss.

Renoncule à feuilles de Parnassie. — Parnassileaved crowfoot.

Eboulis calcaires des Alpes. — Juni — Août.



13 *Ranunculus glacialis*, L. — Gletscher-Hahnenfuss.

Renoncule des glaciers. — Glacier's crowfoot.

Haute région des Alpes, dans les lieux frais et ombrés. Juillet - Août.



14. *Ranunculus Seguieri*, Vill. — Seguiet's Hahnenfuss.

Renoncule de Seguiet. — Seguiet's crowfoot.

Alpes calcaires du Dauphiné, du Midi de la France, du Tyrol meridional. Juillet — Août.



15. *Ranunculus alpestris*, L. — Alpen-Hahnenfuss
Renoncule alpestre. — Alpine crowfoot.

lieux élevés et frais des Alpes calcaires. Juin - Août.



16. *Ranunculus aconitifolius*, L. — Eisenhutblättriger Hahnenfuss.

Bouton d'argent. — Single fair Maid of France.

Régions montagneuses de la chaîne alpine, dans les lieux frais. Mai — Septembre.



17. *Ranunculus Thora*, L. — Giftiger Hahnenfuss.

Renoncule vénéneuse. — Poisonous crowfoot.

Régions montagneuses des Alpes calcaires méridionales. Juin -- Juillet.



18 *Ranunculus Pythora*, Crantz — Tödlicher Hahnenfuss.
Renoncule hybride — Hybrid crowfoot

Agrostis pythorae (L.) Link. et Schreb. — *Agrostis pythorae* (L.) Link. et Schreb.



19 *Ranunculus pygmaeus*, Wahlbg. — Zwerghahnenfuss.

Renoncule pygmée. — Minute crowfoot.

Alpe granitica de Tyrol; de Heuss (Alpes de la région alpine) — J. G. et — A. et



20. *Ranunculus montanus*, Willd. — Berg-Hahnenfuss.
Renoncule des montagnes. — Mountain crowfoot.

Pâturages de régions montagneuses et alpines. Juin — Septembre.



21. *Trollius europaeus*, L. — Trollblume.

Trolle. — Globeflower.

Prairies humides de la zone subalpine et montagnaise. Mai — juillet.



22. *Eranthis hiemalis*, Salisb. — Winterblume.
Hellébore jaune. — Winter-Aconite.

Alpes del'Autriche méridionale, dans les taillis de la région montagnieuse. Février Mars



23. *Helleborus niger*, L. — Schwarze Niesswurz.
Rose de Noël. — Christmas Rose.

Alpes orientales et italiennes, dans les taillis rocheux, janvier — Mars.



24. *Aquilegia atrata*, Koch.— Dunkelblumiger Akelei.
Ancolie sombre. — Dark Columbine.

Lieux frais des régions montagneuses. Mai—Juin.



25. *Delphinium elatum*, L. — Hoher Rittersporn.

Dauphinelle alpine. — Alpine larkspur.

Lieux frais et pierreux de la région subalpine. Juillet — Août.



26. *Aconitum Napellus*, L. — Gemeiner Eisenhut.
Char de Vénus, Casque de Jupiter. — Monkshood.

Régions montagneuses de la chaîne alpine. Juillet — Septembre



27. *Aconitum Anthora*, L. — Giftheil Eisenhut.

Aconit vénéneux. — Yellow Monkshood.

Pâturages rocailleux des Alpes calcaires. Juillet — Octobre



28. *Paeonia peregrina*, Mill. — Pfingstrose.

Pivoine. — Paeony.

Pentes meridionales des Alpes du Tyrol et d'Italie, dans les lieux rocheux et les taillis de la région montagnaise. Mai - Juin.



29 *Papaver alpinum*, L. — Alpenmohn.

Pavot des Alpes. — Alpine poppy.

Froulis rocheux de la chaîne alpine. Juin — Septembre.



30. *Papaver pyrenaicum*, Willd. — Pyrenäen Mohn.

Pavot des Pyrénées. — Pyrenean poppy.

Rochers et éboulis des Alpes orientales et occidentales. Juin — Août.



31. *Arabis alpina*, L. — Alpen-Gänsekresse.

Arabette des Alpes. — Alpine Rock cress.

Lieux frais et rocailleux des Alpes, surtout calcaires. — Avril — Août



32 *Arabis coerulea*, Hänke — Blaue Ganseläusche
 Arabette bleue. — Blue Rock cress

Prodesioles (s. 206) et *celastri* prodesioles (s. 206) — Arabis. A. 10



33. *Arabis pumila*, Jacq. — Zwerg-Gänsekresse.

Arabette naine. — Zwerg-Rock cress.

Chaine alpine, fissures des rochers et éboulis. Juin — Août.



34. *Arabis bellidifolia*, Jacq. — Maassliebchenblättrige Gänsekresse.
Arabette à feuilles de Pâquerettes. — Daisyleaved Rock cress.

Lieux frais et humides des Alpes, pierriers, etc. Juin — Août.



35 *Arabis arenosa*, Scop. — Sand-Gänsekresse.

Arabette des sables. — Sand Rock cress.

Lieux rocailleux et frais des Alpes calcaires. Avril—Septembre.



36. *Arabis Halleri*, L. — Haller's Gänsekresse.
 Arabette de Haller. — Haller's Rock cress.

Lieux frais de montagne, es alpestres. — Mai — juillet.



397111

37. *Cardamine asarifolia*, L. — Haselwurzblättriges Schaumkraut.
Cresson à feuilles d'Asarum. — Asaraleaved Lady's Smock.

Alpes d'Italie et du Tyrol méridional. Juin — Juillet.



38. *Cardamine alpina*, Willd. — Alpen-Schaumkraut.
Cresson des Alpes. — Alpine Lady's Smock.

Talbes de régions alpines et subalpines. Juin - Août



39. *Cardamine trifolia*, L. — Dreiblättriges Schaumkraut.
Cresson trifolié. — Threeleaves Lady's Smock.

Taillis rocheux des Alpes orientales calcaires. Avril — Juin.



40. *Cardamine resedifolia*, L. — Resedenblättriges Schaumkraut.
 Cresson à feuilles de Réséda. — Mignonette leaved Lady's Smock
 Lieux humides et pierreux des régions alpines. Juin - Septembre.



41. *Dentaria enneaphyllos*, L. — Neunblättrige Zahnwurz.
Dentaire à neuf feuilles. — Nineleaves Toothwort.

Alpes d'Australie, dans les bois de la région inférieure. Avril. 1841.



42. *Dentaria digitata*, Lam. — Gefingertblättrige Zahnwurz.
Dentaire digitée. — Purple Toothwort.

Régions montagneuses et boisées des Alpes calcaires. Avril — Juin



43. *Alyssum Wulfenianum*, Bernh. — Wulfen's Steinkraut
Alysse de Wulfen. — Wulfen's Madwort.

Pentes sèches et pierreuses des Alpes orientales et méridionales. Juillet — Août.



44. *Draba aizoides*, L. — Immergrünes Hungerblümchen.

Drave des rochers. — Whitlowgrass.

Feutes des rochers des régions alpines et montagneuses. Mai - Juillet.



45. *Draba Sauteri*, Hoppe. — Sauter's Hungerblümchen.
 Drave de Sauter. — Sauter's Whitlowgrass.
 Alpes orientales valaisannes. — Ferriers et toute des rochers. Juin — Juillet.



46. *Draba tomentosa*, Wlbg. — Filziges Hungerblümchen.
Draba tomenteux. — Silverleaved Whitlowgrass.

Fentes des rochers calcaires dans la région alpine. Juin — Août.



47. *Draba frigida*, Saut. — Kälteliebendes Hungerblümchen.
Drave des glaciers. — Glacier's Whitlowgrass.
Rochers et pierriers des hautes régions alpines. Juillet — Août.



48. *Draba stellata*, Jacq. -- Sternhaariges Hungerblümchen.
Drave étoilée. — Starleaved Whitlowgrass.

Rochers calcaires de la région alpine. Juillet — Août.




49. *Draba carinthiaca*, Hoppe. — Kärtner Hungerblümchen.
Drave de Carinthie. — Carinthian Whitlowgrass.

Fentes des rochers de la région alpine. Juin — Août



50. *Draba fladnizensis*, Wulf — Fladnizer Hungerblümchen
 Drave de Fladnizer. — Fladnizer's Whilowgrass.
Roches granitiques des Alpes dans la vallée de l'Isère. Alpes.



51 *Draba confusa*, Ehrh. — Verkanntes Hungerblümchen.

Drave duveteuse. — Woolly Whitlowgrass.

Pechers de la région montagneuse. Mai — Juin



52. *Draba pyrenaica*, L. — Steinschnücker.

Drave rose. — Pyrenean Whitlowgrass.

Rochers et pierriers des Alpes calcaires dans la région alpine. Juin — Juillet.



53. *Kerneria saxatilis* (L.), Rchb. — Felsen-Kugelschötchen.
Cranson. — Cranson.

Fissures des rochers calcaires dans la région montagneuse Mai – Août



54. *Kerneria alpina*, Prantl. — Alpen-Kugelschötchen.

Cranson autrichien. — Austrian cranson.

Rochers des Alpes tyroliennes méridionales, dans la région alpine. Juillet—Août



55. *Braya alpina*, Sternb. — Alpen-Kugelschötchen.

Rochers et pierriers de la région alpine dans le massif du Glockner et du Solstein (rare).
Juillet — Août.



56 *Erysimum lanceolatum*, R. Fr. — *Gedächtnis-Hederich*.
Velar jaune. — Mountain Wallflower.

Pl. alps et ennob. de la région alpine. — *Ann. Bot. Soc. Lond.* — M. & J. 1860.



57. *Aethionema saxatile*, R. Br. — Steintäschel.

Aethionème des rochers. — Rock's *Aethionema*.

Petites pierreses des Alpes, ici et là, dans la région méridionale et sous-alpine.



58. *Biscutella laevigata*, L. — Brillenschötchen.
Lunetière. — Biscutelle.

Pâturages rocailloux de la chaîne alpine. Mai — Août.



59. *Thlaspi alpinum*, Crantz. — Alpen-Täschelkraut.

Tabouret des Alpes. — Alpine Bastard cress.

Pâurages et rocaïlles de la région montagnaise et sous alpine Juin — Août.



60. *Thlaspi cepeaefolium*, Koch. — Fetthennblättriges Täschelkraut.
Tabouret violet. — Purple Bastard cress.

Pierriers des Alpes granitiques centrales, meridionales et orientales. Mai – Juillet.



61. *Thlaspi rotundifolium*, Gaud. — Rundblättniges Fäschelkraut
Tabouret à feuilles rondes. — Roundleaved bastard cress.

Fig. 1. — 2. Adult plant with flowers. — 3. Root. — 4. Seedling.



62. *Hutchinsia alpina*, R. Br. — Alpen-Felsenkresse.

Hutschinsie des Alpes. — Alpine Hutschinsie.

Lieux frais des rochers calcaires dans la région alpine et montagneuse. Juin — Août.



63. *Hutchinsia brevicaulis*, Hoppe. = Kurzstenglige Felsenkresse.
Hutschinsia à courte tige. — Shortstemmed Hutschinsie.

* Rochers frais des Alpes granitiques. Juillet — Août.



64. *Helianthemum alpestre*, Dun. — Alpen-Sonnenröschen.
Hélianthème des Alpes. — Alpine Rockrose.
Rochers de la zone sous alpine et montagnaise. Juin — Août.



65. *Helianthemum hirsutum*, A. Kern. — Rauhhaariges Sonnenröschen.

Hélianthème velu. — Hairy Rockrose.

Pâturages et coteaux de la région méditerranéenne. — Alpes, Pyrénées.



66. *Viola pinnata* L. — Fingerblättrige Veilchen.
Violette pennée. — Pinnate violet.

Flora austriaca illustrata von C. Dapper. Mit 1000 Abbildungen. Wien, 1768. Tafel 10.



67. *Viola biflora*, L. — Zweiblüthiges Veilchen.

Violette jaune. — Yellow Violet.

Lieux frais et ombragés de la chaîne alpine. Mai — Août.



68. *Viola alpina*, Jacq. — Alpenveilchen.

Pensée tyrolienne. — Tyrolian Pansy.

Alpes calcaires de l'Autriche dans les pâturages rocheux de la région alpine et sous alpine,
Juin — Août.



69. *Viola cenisia*, L. — Mont Cenis-Veilchen

Pensée du Mt. Cenis. — Pansy of the Mt. Cenis.

Ebenfalls des Alpes, allwärts vorkommend und verbreitet, in der alpinen Zone. — Juillet — Août.



70 *Viola calcarata*, L. — Gesporntes Veilchen.
Pensée des Alpes. — Alpine pansy.

Pâturages de la région alpine. Juin — Août.



71. *Polygala Chamaebuxus*, L. — Buchsbaumblättrige Kreuzblume.
Faux-Buis. — Boxleaved milkwort.

Région boisée montagneuse des Alpes. Décembre — Avril.



72 *Polygala microcarpa* Gaud. — Kleinfrüchtige Kreuzblume.

Polygale à petit fruit. — Blue milkwort.

Polygala microcarpa Gaud. — Kleinfrüchtige Kreuzblume. — et sous Alpine. Mai — Août.



73. *Dianthus monspessulanus*, L. — Montpellier'sche Nelke.
Oeillet de Montpellier. — Pink of Montpellier.

Region montagnarde et sub-alpine des Alpes occidentales et méridionales. Juillet — Août.



74. *Dianthus Sternbergii*, Sieb. — Sternberg's Nelke.

Oeillet de Sternberg. — Pink of Sternberg.

Pât. racés cailloux et pierriers de la zone alpine dans les Alpes méridionales et orientales.
Juillet — Août.



75 *Dianthus alpinus*, L. Alpennelke.

Coillet des Alpes. Alpine pink.

1900. *Ann. de l'Académie des sciences*. Juin. Août.



76. *Dianthus glacialis*, Hänke. — Gletschernelke.

Oeillet des glaciers. — Glaciers' Pink.

Pâturages élevés des Alpes grésiennes orientales. Juillet — Août.



77. *Gypsophila repens*, L. — Kriechendes Gypskraut.

Gypsophile alpine. — Alpine gypsophile.

Lieux rocheux des Alpes calcaires de la région alpine jusque dans les plaines. Mai — Octobre.



78. *Saponaria ocymoides*, L. — Kleines Seifenkraut.
Saponaire faux basilic. — Trailing Soapwort.

Pentes, encorbillées et rasées, et les fleurs sont petites et de couleur rose.



79. *Silene Pumilio*, Wulf. — Zwergnelke.

Silène du Tyrol. — Dwarf Catchfly.

Alpes orientales, dans les pierriers et rochers de la région alpine. Juillet - Août.



80. *Silene alpestris*, Jacq. — Alpen-Strahlensame.

Silène alpestre. — Alpine Catchfly.

Alpes orientales; lieux humides des rochers. Juin — Septembre.



81. *Silene rupestris*, L. — Felsen-Steinkraut
Silene des rochers — Rock Catchfly



82. *Silene Saxifraga*, L. — Steinbrech-Leimkraut
Silene Saxifraga. — Saxifrage Catchfly.

Roots (see above) merula. — Identical. July — Aug.



83. *Silene acaulis*, L. — Stengelloses Liniengewächs

Silène acaule ou Mousse rose — Cushion Pink

Illustrations nach *Flora alpina* — Juss. — V. 11.



84. *Lychnis alpina*, L. — Lichtnelke.

Lychnide des Alpes. — Alpine Campion.

Pâturages élevés de la chaîne alpine (surtout granitique). Juin — Août.



85 *Cerastium trigynum*, Vill. — Dreigrifteliges Hornkraut.
Céraiste à trois styles. — Threestyled Mouse-ear Chickweed
Lieux frais et humides de la région montagneuse. — Juillet - Août.



86. *Cerastium glaciale*, Gaud. — Einblüthiges Hornkraut.
Céraiste des glaciers. — Glaciers' Mouse-ear.


Moraines et pierriers des zones élevées. Juillet—Septembre.



87. *Cerastium carinthiacum*, Vest. — Kärntner Hornkraut.

Céraiste de Carinthie. — Carinthian' Mouse-ear.

Pierriers et rochers de la région alpine dans les Alpes orientales. — Juin — Août



88. *Arenaria biflora*, L. — Zweiblütiges Sandkraut.
Sabline à deux fleurs. — Twofloved Sabline.
Rochers humides et pierriers frais de la région alpine. Juillet — Août.



89. *Arenaria ciliata*, L. — Gewimpertes Sandkraut.
Sabline ciliée. — Ciliate Sabline.

Rochers et pierriers des alpes calcaires dans la région alpine. Juillet — Août.




90. *Arenaria grandiflora*, All. — Grossblüthiges Sandkraut.
Sabline à grandes fleurs. — Largeflowered Sabline.

Pâturages rocheux et rocailles de la région subalpine. Juillet — Août.



91. *Möhringia muscosa*, L. — Moosartige Nabelmiere.
Méringie. — Moerengy.

Rocailles et fentes rocheuses à l'ombre et au frais dans la région montagneuse. Mars — Septembre.



92 Mochringia Ponaë, Fenzl. — Pona's Nabelmiere.
Méringie de Pona. — Pona's Moerengy.

Vp. — alpine, in Tyrol et de la Styrie dans les rochers de la région montagneuse. (Herb. Fenzl.)



93. *Alsine sedoides*, Kitt. — Mauerpfeffer-Miere.
Charlérie. — Cherlery.

Pâturages rocheux des hautes altitudes, surtout sur le granit. Juillet — Août



94. *Alsine lanceolata*, M. K. — Lanzettblättrige Miere.

Alsine lancéolée. — Lanceolate Alsine.

Alpes orientales et occidentales dans les rochers de la région montagneuse et alpine. Juillet—Août.



95. *Alsine laricifolia*, Crantz. — Lärchenblättrige Miere.
Alsine à feuilles de Mélèze. — Larchleaved Alsine.

Rochers et pierriers de la zone montagneuse. Juillet — Septembre.



96. *Alsine recurva*, Wahl. — Krummblättrige Miere.

Alsine à feuilles recurvées. — Recurvateleaved *Alsine*.

Rocailles de la région alpine et montagnaise dans les Alpes orientales, méridionales et occidentales.



97. *Alsine austriaca*, M. K. — Österreichische Miere.

Alsine d'Autriche. — Austrian *Alsine*.

Rochers et pierriers des Alpes (alpines orientales). Juin — Août.



98. *Sagina glabra*, Koch. — Kriechendes Mastkraut.
Sagine glabre. — Glabrous Sagine.

Lieux frais et humides des régions élevées et montagneuses. Juillet — Août.



99. *Myricaria germanica*, Desv. — Deutsche Tamariske.

Tamarix des rivières. — Rivers' Tamarisc.

Riviers M. Knappeux dans les Vallées des Alpes. Mai—Août.



100. *Linum alpinum*, L. — Alpenlein.

Lin des Alpes. — Alpine Flax.

Pentes herbeuses et ensoleillées des Alpes dans la région montagneuse et alpine. Juin — Août.