

S C H Ö N B R U N N' S

F L O R A,

O D E R

SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICH-
NISS DER IM KAIIS. KÖNIGL. HOLLÄNDISCH-
BOTANISCHEN HOFGARTEN ZU SCHÖN-
BRUNN CULTIVIRTEN GEWÄCHSE

V O N

J O S. B O O S ,

k. k. Hofgartenassistenten.

WIEN und TRIEST,

im Verlag der Geistingerschen Buchhandlung.

1816.

QK
73
S32
B66
1816
SCHURB

Seiner Fürstlichen Gnaden
dem hochgeborenen Fürsten
und Herrn

Ferdinand Fürsten zu Trauttmansdorff - Weinsberg und Neustadt am Kocher, gefürsteten Gräfen von Umffenbach, Freyherrn auf Gleichenberg, Negau, Burgau etc. etc. Ritter des goldenen Vlieses, Grofskreuze des königl. Ungarischen St. Stephan - Ordens, der königl. Französischen Ehrenlegion, und des königl. Bayrischen Hubertus - Ordens, k. k. wirklichen geheimen Rathe, Kämmerer, Staats- und Conferenzminister, Obersten sämmtlicher kais.

königl. Leibgarden, und Seiner kais.

königl. apost. Majestät

Erstem Obersthofmeister,

dem hohen Beförderer und Beschützer der Künste
und Wissenschaften

seinem erhabenen Chef und Gönner
in dankbarster Ehrfurcht

gewidmet

vom

Verfasser.

Jan 1975
168.02

Kurze Vorerinnerung.

Es sind nun bereits zwey und sechzig Jahre verflossen, seit welchen der k. k. Holländisch - botanische Hofgarten gegründet ist. Jeder Botaniker und Kunstverständige weiss nur zu genau, als dass ich hier erst Erwähnung davon machen dürfte, wie derselbe von jener Zeit an bis auf heutigen Tag durch die besondere Aufmerksamkeit und Gnade unserer höchstseeligen Beherscher, und wie ganz vorzüglich derselbe durch den so allgemein bekannten Schutz und die

Unterstützung unseres jetztregierenden gnädigsten Kaisers, deren sich das Fach der Gartenkunst und Botanik erfreuet, mit den auserlesensten Pflanzenschäften Indiens und Amerikas sowohl, als jenen vom Cap und den Inseln des Indischen Oceans bereichert wurde; wie er sich später durch Tausch mit den vorzüglichsten Gärten Deutschlands und anderer Länder immer mehr vervollkommen und erhob; und was für eine Auswahl an höchst seltenen und schönen Vegatabilien aller Art und aus allen Zonen und Ländern derselbe jetzt einschliesst.

Doch wozu nützt dieser Reichthum diese Vollkommenheit eines Gartens, wenn die Kenntniß desselben nicht allgemein ist, wenn nicht Jedem, dem an ihr gelegen ist, ein Weg geöffnet wird ihr zu huldigen und seine Wissbegierde zu befriedigen?

Um zu diesem Zwecke leichter gelangen zu können, habe ich gegenwärtiges Verzeichniß aller mir bekannten im hiesigen k. k. Hofgarten befindlichen inn- und ausländischen Gartenge-

wächse (in soferne jene nicht gar zu gemein sind) verfasst, und habe das frohe Bewusstseyn, den Verehrern dieses Hofgartens einen nicht ganz unbedeutenden Dienst geleistet zu haben.

In Rücksicht des Leitfadens bey Bearbeitung meines Verzeichnisses, bin ich dem Linneischen Systeme nach der Ausgabe C. H. Persoon's gefolgt; theils, weil es das neueste botanische Universalwerk ist, welches die meisten Berichtigungen enthält; theils, weil es sich doch jeder nur einigermassen bemittelte Kräuterkenner anschaffen, und die im Verzeichnisse enthaltenen Gewächse wenigstens in Persoon's Synopsis, in so ferne sie in dieser enthalten sind, aufsuchen und nachlesen kann. Aus diesen Gründen, und um das Aufsuchen zu erleichtern, habe ich bey jeder Pflanze den Band, und die Seite worin sie in erstgenanntem Werke beschrieben ist, angeführt. Nur solche bey welchen Persoon's Benennung offenbar irrig ist, benannte ich nach jenen Autoren die diese Irrungen zuerst berichtiget haben, und setzte, Per-

VIII

soon's Benennung als Synonym darunter. Ganz neue Arten aber benannte ich nach jenen Autoren, die sie zuerst bekannt machten. — Sonst habe ich auch noch die vorzüglichsten Synonymen angegeben.

Was die Deutschen Benennungen der Gewächse, welche ich beygesetzt habe, anbelangt, bin ich grösstentheils der Willdenow'schen Uebersetzung gefolgt. Bey den neuen aber, und solchen, die ich nirgends verdeutschet fand, war mein Bestreben immer dahin gerichtet, durch eine genaue und wörtliche Deutsche Uibersetzung die Herleitung des Lateinischen oder Griechischen Nahmens so viel als möglich auffallend zu machen.

Um das Volumen dieses Verzeichnisses sowohl, als dessen Preis, so viel es nur immer thunlich war, zu verringern, habe ich keine Beschreibungen beygefügt, (dieß wäre auch nicht der Zweck eines Verzeichnisses) sondern nur kleine für Jeden interessante Angaben: der Deutschen Benennung, des

Vaterlandes, der Blüthezeit, des Standortes im hiesigen Hofgarten, und der Ausdauer.

Die Dauer und den Standort, welchen die Gewächse im k. k. Hofgarten einnehmen, habe ich durch folgende gewöhnliche Zeichen und Buchstaben ausgedrückt:

○ Für jährige Gewächse.

-♂ — zweyjährige —

2 — perennirende —

ḥ — holzige —

W. H. Warmes Haus. Bey solchen, die über Winter beyläufig 10 — 15 Grade ober Null nach Reaumur's Thermometer erfordern und auch den Sommer über im Gewächshause stehen bleiben.

Ch. Caphaus. Bey jenen, die über Winter 5 — 10 Grade ober Null erfordern und den Sommer über im Freyen stehen.

K. H. Kaltes Haus. Bey solchen die in Winter 1 — 5 Grade ober Null verlangen und den

X

Sommer über gleichfalls im Freyen stehen.

Im F. Im Freyen. Bey jenen endlich welche das ganze Jahr hindurch im Freyen verbleiben.

Es befinden sich im hiesigen k. k. Hofgarten freylich noch viele, zum Theil sehr seltene Gewächse, die ich, da sie noch nicht geblüht haben, als noch unbeschriebene und gänzlich unbekannte leider nicht in mein Verzeichniß aufnehmen konnte; ich behalte mir es aber vor, selbe zu einer anderen Zeit, wenn sie schon benennet seyn werden, im Nachtrage zu liefern, den ich über die bisher noch unbeschriebenen sobald als möglich heraus zu geben gedenke. Jene aber, von denen bloß die Species noch nicht benennet ist, setzte ich mit der Angabe ihres Vaterlandes an's Ende jener Gattung, zu welcher sie gehören, oder zu gehören doch scheinen.

Schönbrunn am 20. Aprill 1816.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. Canna, Blumenrohr.

1. *C. variabilis*. Willd. im Magaz. der Gesell. naturf. Fr. zu Berlin. 1808. p. 169. Veränderliches Blumenrohr. In Carolina u. Florida. May — Jul. W. H. 24.

C. indica. Pers. syn. pl. 1. p. 1.

— — *a. rubra*. Ait. hort. kew. 1. p. 1.

2. *C. lutea*, Pers. l. c. Gelbblühendes Blumenrohr. Zwischen den Wendezirkeln. May — Jul. W. H. 24.

C. indica β *lutea*. Ait. l. c.

3. *C. rubra*. Willd. l. c. Rothblühendes Blumenrohr. In Westindien. May — Jul. W. H. 24.

C. coccinea. Pers. l. c.

— *indica* γ *coccinea*. Ait. l. c.

4. *C. chinensis*. Willd. l. c. p. 170. Chinesisches Blumenrohr. In Ostindien. May — Jul. W. H. 24.

C. indica. Pers. l. c.

— — *patens*. Ait. l. c.

5. *C. glauca*. Pers. l. c. Graugrünes Blumenrohr. In Sümpfen v. Carolina. May — July. W. H. 2*½*.

2. Renealmia, Renealmie.

1. *R. nutans*. Willd. enum. 1. p. 3. Ueberhängende Renealmie. In China. Jun. Jul. W. H. 2*½*.

2. *R. erecta*, (*Globba erecta*. Redouté plantes liliac. 3. t. 173.) Aufrechtstehende Renealmie. In Ostindien. — W. H. 2*½*.

3. *R. calcarata*. Andrew. bot. reposit. t. 421. Gespornte Renealmie. In Ostindien. Septemb. W. H. 2*½*.
R. angustifolia. Hortulan.

3. Amomum, Ingwer.

1. *A. Zingiber*. Pers. l. c. 1. p. 2. Aechter Ingwer. In Ostindien und Jamaica. Sept. Oct. W. H. 2*½*.

2. *A. Zerumbet*. Pers. l. c. Block-Ingwer. In Ostindien. Sept. Oct. W. H. 2*½*.

4. Hedychium, Kranzblume.

1. *H. coronarium*. Pers. l. c. Schöne Kranzblume. In Ostindien u. Java. Jul. — Sept. W. H. 2*½*.

5. Costus, Costwurz.

1. *C. speciosus*. Pers. l. c. 1. p. 3. Schöne Costwurz. In Ostindien. Jun. Jul. W. H. 2*½*.

C. arabicus. Jacq. ic. rar. 1. t. 1.

Coll. i/p 142.

DSI

6. Alpinia, Alpinie.

1. *A. spiralis*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 1.
t. 1. Spiralförmige Alpinie. Zu Caracas. Jul.,
Aug. VV. H. 2*f*.

7. Maranta, Marante.

1. *M. arundinacea*. Pers. l. c. Rohrartige
Marante. In Jamaica u. Brasilien. May — Jul.
VV. H. 2*f*.

2. *M. lutea*. Jacq. ic. rar, 2. t. 201. Gelb-
blühende Marante. Zu Caracas in feuchten Wäl-
dern. May — Sept. VV. H. 2*f*.

8. Curcuma, Cureume.

1. *C. longa*. Pers. l. c. 1. p. 4. Lange Cur-
cume. In Ostindien. May, Jun. VV. H. 2*f*.

9. Kaempferia, Kaempferie.

1. *K. Gulanga*. Pers. l. c. Sitzende Käm-
pferie. In Ostindien. May. VV. H. 2*f*.

2. *K. angustifolia*. Donn catalog. cantabrig.
p. 1. Schmalblättrige Kämpferie. In Ostindien.
— VV. H. 2*f*.

3. *K. rotunda*. Pers. l. c. Gestielte Kämpfe-
rie. In Ostindien. May, Jun. VV. H. 2*f*.
K. longa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 37. t.
317.

10. Thalia, Thalie.

1. *Th. cannaeformis*. Pers. l. c. Rohrartige
Thalie. In Ostindien u. Südamerica. May —
Jul. VV. H. 2*f*.

— 4 —

11. Lopezia, Lopezie.

1. *L. mexicana*. Willd. sp. pl. 1. p. 18.
Mexicanische Lopezie. In Mexico. May — Jul.
VV. H. 24.

L. racemosa. Pers. l. c.

2. *L. hirsuta*. Jacq. collect. suppl. p. 3. t.
15. f. 4. Rauhhaarige Lopezie. In Mexico. May
— Jul. VV. H. 24.

L. racemosa β *hirsuta*. Pers. l. c.

3. *L. fruticosa*. Catalog. monach. p. 31.
Strauchartige Lopezie. In Mexico? Jun. Jul. VV.
H. 5.

12. Salicornia, Glasschmalz.

1. *S. herbacea*. Pers. l. c. 1. p. 5. Krautartiges Glasschmalz. Am Meerstrande in Eur. u.
Virginien. Jun. Jul. Im F. ☽.

2. *S. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartiges
Glasschmalz. Am Meerstrande in Eur. Jun. Jul.
K. H. 5.

D I G Y N I A.

13. Blitum, Erdbeerspinat.

1. *B. capitatum*. Pers. l. c. 1. p. 6. Aehrentragender Erdbeerspinat. In Eur. besonders in
Tyrol u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ☽.

2. *B. virgatum*. Pers. l. c. Gemeiner Erdbeerspinat. In Deutschl. Spanien, Frankr., u. der
Tartarey. Jun. Jul. Im F. ☽.

CLASSIS. II.
DIANDRIA.

MONOGYNIA.

14. Jasminum, Jasmin.

1. *J. Sambac*. Pers. l. c. 1. p. 7. Arabischer Jasmin. In Ostindien. Blüht das ganze Jahr hindurch. W. H. ♂.

β. fl. pleno. Mit gefüllter Blüthe.

γ. undulatum. Willd. enum. 1. p. 9. Mit wellenförmigen Blättern.

J. undulatum. Pers. l. ♂.

2. *J. pubescens*. Pers. l. c. Weichhaariger Jasmin. Zu Calcutta. —. W. H. ♂.

3. *J. gracile*. Andrews bot. reposit. t. 127. Schlanker Jasmin. Auf der Insel Nordfolk. Jun. — Aug. W. H. ♂.

J. volubile. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 39. t. 321.

4. *J. glaucum*. Pers. l. c. Graugrüner Jasmin. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

5. *J. tortuosum*. Willd. enum. 1. p. 10. Gedrehter Jasmin. In Ostindien. Jul. W. H. ♂.

J. flexile. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 46. t. 490.

6. *J. flexile*. Pers. l. c. 1. p. 8. Biegsamer Jasmin. In Ostindien. Jul. Aug. W. H. ♂.

7. *J. azoricum*. Pers. l. c. Azorischer Jasmin. Auf den Azorischen Inseln. May — Jul. Ch. ♂.

8. *J. fruticans*. Pers. l. c. Strauchartiger Jasmin. In Südeur. u. im Orient. May, Jun. Im F. ♂.

9. *J. humile*. Pers. l. c. Niedriger Jasmin.
— May, Jun. Im F. ♂.

10. *J. odoratissimum*. Pers. l. c. Wohlriechender Jasmin. Auf Madera. May — Aug. K. H. ♂.

11. *J. officinale*. Pers. l. c. Gemeiner Jasmin. In Südeur. u. Ostindien. May — Aug. Im F. ♂.

12. *J. grandiflorum*. Pers. l. c. Grossblühender Jasmin. In Ostindien. May — Aug. Ch. ♂.

15. *Ligustrum*, Rainweide.

1. *L. vulgare*. Pers. l. c. Gemeine Rainweide. Auf sandigen Hügeln in Eur. Jun. Im F. ♂.

6. *Phillyrea*, Steinlinde.

1. *Ph. media*. Pers. l. c. Mittlere Steinlinde. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *Ph. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Steinlinde. In Portugall, Spanien u. Italien. Jun. Jul. K. H. ♂.

3. *Ph. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättrige Steinlinde. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♂.

4. *Ph. laevis*. Willd. enum. 1. p. 12. Glatte Steinlinde. In Südeur. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. ♂.

17. *Olea*, Oelbaum.

1. *O. europaea*. Pers. l. c. Gemeiner Oelbaum. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. ♂.

2. *O. exasperata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 1. t. 251. Warziger Oelbaum. Am Cap. Apr. May. Ch. ♂.

3. *O. capensis*. Pers. l. c. Capischer Oelbaum. Am Cap. —. Ch. ♂.

4. *O. undulata*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 1. t. 2. Wollenblättriger Oelbaum. Am Cap. Apr. May. Ch. ♂.

5. *O. americana*. Pers. l. c. 1. p. 9. Americanischer Oelbaum. In Carolina. Jun. Jul. K. H. ♂.

6. *O. excelsa*. Pers. l. c. Hoher Oelbaum. Auf Madera. —. Ch. ♂.

7. *O. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechender Oelbaum. In Cochinchina, China u. Japan. Jun. Jul. Ch. ♂.

8. Eine noch unbeschriebene Art.

18. *Chionanthus*, Schneeblume.

1. *Ch. virginica*. Pers. l. c. Virginische Schneeblume. Von Pensylvan. bis Carolina. Jun. Jul. Im F. ♂.

19. *Syringa*, Flieder.

1. *S. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeiner Flieder. In Persien. May. Im F. ♂.

2. *S. chinensis*. Willd. arb. berol. p. 378. Chinesischer Flieder. In China. May. Im F. ♂. *S. dubia*. Pers. l. c.

3. *S. persica*. Pers. l. c. Persischer Flieder. In Persien. May. Im F. ♂.

β. *laciniata*. Mit zerschlitzten Blättern.

20. *Fontanesia*, Fontanesie.

1. *F. phillyreoides*. Pers. l. c. 1. p. 10. Stein-

Lindenartige Fontanesie. Am Caspischen Meere.
— K. H. ḫ.

21. *Veronica*, Ehrenpreis.

1. *V. virginica*. Pers. l. c. Virginischer Ehrenpreis. In Virginien u. Japan. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

2. *V. spuria*. Pers. l. c. Mittlerer Ehrenpreis. In Südeur. Thüringen u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

3. *V. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Ehrenpreis. Am Meerstrande in Eur. Jul. Im F. 2*f*.

4. *V. longifolia*. Pers. l. c. Langblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. Schweden u. der Tartary. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

5. *V. inoana*. Pers. l. c. Grauer Ehrenpreis. In der Ukrain. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

6. *V. spicata*. Pers. l. c. Aehrentragender Ehrenpreis. In Europ. Hainen. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

7. *V. orchidea*. Crantz stirp. austr. p. 333. Ragwurzartiger Ehrenpreis. In Oesterr. Jul. Aug. Im F. 2*f*.

8. *V. pinnata*. Pers. l. c. 1. p. 11. Gefiederter Ehrenpreis. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

9. *V. officinalis*. Pers. l. c. Aechter Ehrenpreis. In Europ. Wäldern. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

10. *V. decussata*. Pers. l. c. Buxblättriger Ehrenpreis. Im Magellanischen Sunde. — K. H. ḫ.

11. *V. gentianoides*. Pers. l. c. Entzianartiger Ehrenpreis. Am Caucasus, in Cappadocien u. Armenien. May, Jun. Im F. 2*f*.

12. *V. fruticulosa*. Pers. l. c. Stauden - Ehrenpreis. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun, Jul. Im F. 5.

13. *V. saxatilis*. Pers. l. c. Stein - Ehrenpreis. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 5.

14. *V. prostrata*. Pers. l. c. 1. p. 12. Gestreckter Ehrenpreis. Auf Hügeln in Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

15. *V. Chamaedrys*. Pers. l. c. Wald - Ehrenpreis. Auf Triefsten in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

16. *V. austriaca*. Pers. l. c. Oesterreichischer Ehrenpreis. In Mähren, Schlesien u. Krain. Jun. Jul. Im F. 24.

17. *V. urticaefolia*. Pers. l. c. Nesselblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. Krain u. Schlesien, auf Niederalpen. May, Jun. Im F. 24.

18. *V. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättriger Ehrenpreis. In Oesterr. u. Deutschl. auf sonnigen Hügeln. May. Jun. Im F. 24.

V. Pseudo — chamaedrys. Jacq. fl. austr. 1. p. 37. t. 60.

19. *V. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthiger Ehrenpreis. In Böhmen u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

V. dentata. Schmidt bohem. 1. n. 31.

22. Wulfenia, Wulfenie.

1. *W. carinthiaca*. Pers. l. c. 1. p. 14. Kärnthnerische Wulfenie. In Kärnthen auf der Kibeggeralpe. Jun. Jul. Im F. 24.

23. Utricularia, Wasserschlauch.

1. *U. vulgaris*, Pers. l. c. 1. p. 18. Gemeiner Wasserschlauch. In stehenden Wassern v. Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 2.

24. Justicia, Justicie.

1. *J. assurgens*. Pers. l. c. 1. p. 19. Aufsteigende Justicie. In Jamaica u. St. Crux. May — Aug. W. H. ♂.

2. *J. Ecbolium*. Pers. l. c. 1. p. 20. Grünblühende Justicie. In Arabien, Malabar u. Ceylon. Jun. Jul. W. H. ♂.

3. *J. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothe Justicie. Zu Cayenne. Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *J. pulcherrima*. Pers. l. c. Prächtige Justicie. Im wärmeren Amer. Jun. — Aug. W. H. ♂.

5. *J. cristata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 38. t. 320. Gekämmte Justicie. Zu Caracas. Aug. Sept. W. H. ♂.

6. *J. lucida*. Vahl. enum. 2. p. 400. Glänzende Justicie. In Westindien. Aug. W. H. ♂.

7. *J. formosa*. Jacq. eclog. ineditae. Schöne Justicie. — Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♂.

8. *J. Gendarussa*. Pers. l. c. Weidenblättrige Justicie. Auf Ceylon, Java u. Malabar. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♂.

9. *J. nasuta*. Pers. l. c. Schnabelförmige Justicie. In Ostindien. Jun. — Aug. W. H. ♂.

10. *J. ciliaris*. Pers. l. c. 1. p. 21. Gefranzte Justicie. In Peru. Jun. Jul. W. H. ○.

11. *J. bracteolata*. Pers. l. c. Mennigrothe Justicie. Zu Caracas. Jun. Jul. VV. H. ♂.

12. *J. lithospermifolia*. Pers. l. c. Steinsamenblättrige Justicie. —. Jun. — Aug. VV. H. ♂.

13. *J. Adhatoda*. Pers. l. c. 1. p. 22. Treibende Justicie. Auf Ceylon u. Malabar. Jun. Jul. K. H. ♂.

14. *J. furcata*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 2. t. 3. Zweyzackige Justicie. Zu Lima. Jun. Jul. VV. H. ♂.

J. peruviana. Pers. l. c. 1. p. 22.

15. *J. orchoides*. Pers. l. c. Ragwurzartige Justicie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

16. *J. microphylla*. Pers. l. c. Kleinblättrige Justicie. Auf St. Crux. Jul. Aug. VV. H. ♂.

17. *J. quadrifida*. Vahl. enum. 1. p. 12. Vierheilige Justicie. In Mexico. Jun. Jul. VV. H. ♂.

J. superba Hortulan.

25. *Stachytarpheta*, Fettähre.

1. *St. jamaicensis*. Pers. l. c. 2. p. 139. Jamaikische Fettähre. Auf den Caraibischen Inseln u. zu Jamaica. Jul. Aug. VV. H. ♀.

Verbena jamaicensis. Jacq. obs. 4. t. 85.

2. *St. mutabilis*. Pers. l. c. 2. p. 140. Veränderliche Fettähre. In Südamer. Jul. Aug. ♂. *Verbena mutabilis*. Jacq. ic. rar. 2. t. 207. Collect. 2. p. 334.

26. *Lycopus*, Zigeunerkraut.

1. *L. europaeus*. Lin. sp. pl. p. 30. Ge-

meines Zigeunerkraut. An feuchten Stellen in Eur. u. Amer. Jun. Jul. Im F. 24.
L. vulgaris. Pers. l. c. 1. p. 24.

27. Monarda, Monarde.

1. *M. fistulosa.* Pers. l. c. Purpurfarbige Monarde. In Canada. Jul. Im F. 24.

2. *M. oblongata.* Pers. l. c. Langblättrige Monarde. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *M. didyma.* Pers. l. c. Scharlachrothe Monarde. In Pensylvanien u. Florida. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *M. rugosa.* Pers. l. c. Weisse Monarde In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *M. clinopodia.* Pers. l. c. Fleischfarbige Monarde. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.

28. Rosmarinus, Rosmarin.

1. *R. officinalis.* Pers. l. c. Gemeiner Rosmarin. Auf Hügeln in Südeur. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. 5.

29. Ziziphora, Zizikraut.

1. *Z. dasyantha* Bieberst. flor. taur. caucas. 1. p. 18, Rauhblumiges Zizikraut. Am Caucasus auf Bergen. Jun. Jul. Im F. 5.

30. Salvia, Salbey.

1. *S. officinalis.* Pers. l. c. 1. p. 25. Gemeine Salbey. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *S. triloba.* Lin. suppl. 88. Dreylappige

Salbey. Im Griechischen Archipelagus. Jun. Jul.
K. H. ♂.
S. Clusii. Pers. l. c.

3. *S. Chamaedrys*. Willd. hort. berolin. 1. p. 29. t. 29. Gamanderblättrige Salbey. In Mexico. Sept. Oct. Ch. ♂.
S. chamaedryoides. Pers. l. c.

4. *S. Horminum*. Pers. l. c. 1. p. 26. Scharlach-Salbey. In Griechenland u. Apulien. Jun. Jul. K. H. ○.

5. *S. oblongata*. Vahl. enum. 1. p. 256. Längliche Salbey. —. May. Im F. 24.
S. micrantha. Desfont. hort. paris. p. 57.

6. *S. austriaca*. Pers. l. c. Oesterreichische Salbey. In Oesterr. Ungarn u. der Moldau auf trockenen Heiden. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *S. disermas*. Pers. l. c. Zottige Salbey. In Syrien. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *S. mexicana*. Pers. l. c. 1. p. 27. Mexicanische Salbey. An feuchten Stellen in Mexico. Jun. Jul. Ch. ♂.

9. *S. Boosiana*. Jacq. eclog. pl. rar. fasc. 5. p. 69. n. 47. Boosische Salbey. In Peru auf Niederwalpen. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. ♂.
S. Boosii. Trattinnick. observ. bot. fasc. 2. p. 58. n. 92.

10. *S. amarissima*. Vahl enum. 1. p. 241. Bittere Salbey. In Mexico. Sept. — Dec. Ch. ♂.

11. *S. reptans*. Jacq. hort. schoenbr. 3 p. 38. t. 319. Auslaufende Salbey. In Mexico. Nov. Dec. Ch. 24.

S. angustifolia. Vahl enum. 1. p. 253.
— *virgata*. Ortega. dec. 3.

12. *S. formosa*. Willd. sp. pl. 1. p. 140.
Prächtige Salbey. In Peru. Jul. Aug. Ch. ♂.
S. nodosa. Pers. l. c.

13. *S. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothe
Salbey. Neben Flüssen in Florida. Jul. Aug. Ch. ♂.

14. *S. hispanica*. Pers. l. c. Spanische Sal-
bey. In Span. u. Ital. Jul. Aug. Im F. ♂.

15. *S. glutinosa*. Pers. l. c. 1. p. 28. Gelbe
Salbey. Auf lehmigem Grunde in Eur. Jul. Aug.
Im F. 24.

16. *S. canariensis*. Pers. l. c. Canarische
Salbey. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul.
Ch. ♂.

17. *S. aurea*. Pers. l. c. Goldfarbige Salbey.
Neben Flüssen am Cap. Jun. Ch. ♂.

18. *S. Sclarea*. Pers. l. c. Muscateller Sal-
bey. In Italien u. Syrien. Jun. — Aug. Im F. ♂.
S. caucasica. Muscateller Salbey vom Caucasus.

19. *S. Aethiopis*. Pers. l. c. Ungarische Sal-
bey. In Oesterr. Illyrien, Frankr. u. Africa auf
Heiden. Jun. Jul. Im F. ♂.

20. *S. bicolor*. Pers. l. c. 1. p. 29. Zwey-
farbige Salbey. Bey Tanger in Africa. Jun. Jul.
Ch. ♂.

21. *S. habliziana*. Pers. l. c. Hablizelsche
Salbey. In Taurien. Jun. Jul. Ch. 24.
S. scabiosacolia. Lam. in diar. hist. nat. 2, p.
44. t. 27.

22. *S. interrupta*. Pers. l. c. Unterbrochen-
gesiederte Salbey. In der Barbarey. Jun. Jul.
K. H. ♂.

23. *S. ceratophylla*. Pers. l. c. Schlitzblättrige Salbey. In Syrien u. Persien. Jun. Jul. K. H. ♂.

S. exasperata. Cav. ic. 6. p. 38 — 39. t. 558.

24. *S. ceratophylloides*. Pers. l. c. Halbgefiederte Salbey. In Sizilien u. Aegypten. Jan. Jul. K. H. ♂.

25. *S. Forskalei*. Pers. l. c. Forskälische Salbey. Im Orient. Jun. — Aug. K. H. 24.

26. *S. nutans*. Pers. l. c. Hängende Salbey. In Ungarn u. Russland. Jul. Aug. Im F. 24.

31. Collinsonia, Collinsonie.

1. *C. canadensis*. Pers. l. c. Canadische Collinsonie. In schattigen Wäldern Virginien u. Canadas. Jun. Jul. Im F. 24.

T R I G Y N I A.

32. Piper, Pfeffer.

1. *P. nigrum?* Pers. l. c. 1. p. 31. Schwarzer Pfeffer. In Ostindien. Jul. Aug. VV. H. 5.

2. *P. medium*. Pers. l. c. Mittlerer Pfeffer. Auf den Caraibischen Inseln. Jun. Jul. VV. H. 5.

3. *P. decumanum*. Pers. l. c. Herzblättriger Pfeffer. Auf Martinique u. zu Caracas. Jul. Aug. VV. H. 5.

P. marginatum. Jacq. collect. 4. p. 128. Jc. rar. 2. t. 215.

4. *P. prunifolium*. Jacq. eclog. ined. Pflaumenblättriger Pfeffer. Zu Caracas Jul. Aug. VV. H. 5.

5. *P. flexuosum*. Jacq. eclog. ined. - Gebogener Pfeffer. Zu Caracas Jul. Aug. VV. H. ḫ.

6. *P. aduncum*. Pers. l. c. 1. p. 32. Krummer Pfeffer. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. ḫ.

7. *P. Bredemeyeri*. Jacq. eclog. ined. Bredemeyerscher Pfeffer. In Caracas. Jun. — Aug. VV. H. ḫ.

P. rugosum. Bredemeyer mscrpt.

8. *P. glaucescens*. Jacq. eclog. fasc. 8. p. 112. n. 76. Graugrüner Pfeffer —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. VV. H. ḫ.

9. *P. verrucosum*. Pers. l. c. Warziger Pfeffer. In Jamaica u. Guiana. Jun. Jul. VV. H. ḫ.

10. *P. blandum*. Pers. l. c. 1. p. 33. Geschmackloser Pfeffer. Zu Caracas. Aug. — Oct. VV. H. 24.

11. *P. magnoliaefolium*. Jacq. ic. rar. 2. t. 213. Collect. 3. p. 210. Magnoliengattung Pfeffer. Auf Felsen zu Caracas. Jun. — Aug. VV. H. ḫ.

12. *P. obtusifolium*. Pers. l. c. Stumpfblättriger Pfeffer. In Westindien. Jun. Jul. VV. H. ḫ.
P. clusiaeefolium. Jacq. collect. 3. p. 209. Icon. rar. 2. t. 212.

13. *P. cuneifolium*. Jacq. ic. rar. 2. t. 214. Collect. 4. p. 127. Keilblättriger Pfeffer. Zu Caracas. Jun. Jul. VV. H. ḫ.

14. *P. umbellatum* Pers. l. c. 1. p. 34 Dol- denblüthiger Pfeffer. In Westindien. Jul. Aug. VV. H. ḫ.

15. *P. pereskiaeefolium* Pers. l. c. Pereskien-

blättriger Pfeffer. Auf Venezuela. Jul. Aug. Ww.
H. 24.

16. *P. polystachyon* Pers. l. c. Vielähriger
Pfeffer. Auf Jamaika. Jun. — Aug. Ww. H. 24.

17. *P. verticillatum* Pers. l. c. Quirlblättriger
Pfeffer. In Jamaica. Jul. Aug. Ww. H. 24.

18. *P. pulchellum* Pers. l. c. Schöner Pfeffer.
Auf Jamaica. Jun. — Aug. Ww. H. 24.

19. *P. inaequalifolium* Pers. l. c. Ungleich-
blättriger Pfeffer. Zu Lima. — Ww. H. 24.
P. anisatum. Hort. paris.

C L A S S I S. III.

T R I A N D R I A,

M O N O G Y N I A.

33. Boerhaavia, Boerhaavie.

1. *B. diffusa* Pers. l. c. 1. p. 36. Verwirrt-
ästige Boerhaavie. In Jamaica u. Veracruz. Jun.
Jul. Ww. H. ○.

2. *B. hirsuta*. Willd. phytog. 1. n. 3. Haar-
rige Boerhaavie. In Jamaica. Jun. Jul. Ww. H. ♂.
B. diffusa β *hirsuta*. Pers. l. c.

3. *B. scandens* Pers. l. c. Kletternde Boer-
haavie. In Westindien. Jun. Jul. Ww. H. ♂.

4. *B. excelsa* Pers. l. c. Hohe Boerhaavie.
— May — Sept. Ww. H. ♂.

34. Valeriana, Baldrian.

1. *V. rubra* Pers. l. c. 1. p. 37. Rother Baldrian. In Südtirol, Italien, der Schweiz, Frankreich, der Barbarey u. im Orient. May — Sept. Im F. 24.

2. *V. Phu* Pers. l. c. Grosser Baldrian. In Schlesien, Schwaben, Elsaß. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *V. officinalis* Pers. l. c. Offizineller Baldrian. In sumpfigen Hainen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *V. repens*. Host mscrpt. Kriechender Baldrian. In Oesterr. in Donausümpfen. Jun. Jul. Im F. 24.

V. exaltata? Mikan jun.

5. *V. sambucifolia*. Mikan jun. Hollunderblättriger Baldrian. In Böhmen. Jun. — Aug. Im F. 24.

6. *V. tripteris*. Pers. l. c. Dreyblättriger Baldrian. Auf Niederalpen in Oesterr. u. d. Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *V. montana*. Pers. l. c. 1. p. 38. Berg-Baldrian. Auf Alpen in Oesterr. Salzh. der Schweiz und den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 24.

35. Cneorum, Zeyland.

1. *C. tricoccum* Pers. l. c. 1. p. 39. Spanischer Zeyland. In Spanien u. Südfrankreich. Jun. Jul. K. H. b.

36. Crocus, Safran.

1. *C. sativus* Lin. sp. pl. p. 50. Aechter Safran. Im Orient. Oct. Nov. Im F. 24.
C. officinalis. Pers. l. c. 1. p. 41.

2. *C. moesiacus*. Curt. bot. mag. n. 652. Griechischer Safran. In Griechenland. März. im F. 24.

3. *C. vernus*. Pers. l. c. Frühlings-Safran. Auf südeuropäischen Alpen. März. Im F. 24.

37. Antholyza, Rachenlilie.

1. *A. Cunonia*. Pers. l. c. 1. p. 42. Schönrote Rachenlilie. Am Cap. Jän. Febr. Ch. 24.

2. *A. aethiopica*. Pers. l. c. Aethiopische Rachenlilie. Am Cap. Jän. Febr. Ch. 24.

38. Watsonia, Watsonie.

1. *W. revoluta*. Pers. l. c. Schöne Watsonie. Am Cap wie die folgende Apr. May. Ch. 24.
Gladiolus Watsonius. Thunb. diss. n. 10.

2. *W. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Watsonie. May. Ch. 24.

Gladiolus Merianellus. Thunb. diss. n. 11.

39. Gladiolus, Siegwurz.

1. *G. punctatus* Pers. l. c. Punktirte Siegwurz. Ist wie alle folgenden, bey welchen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap zu Hause. März, Apr. Ch. 24.

2. *G. communis*. Pers. l. c. Gemeine Siegwurz. In Südeur. und d. Barbarey. May, Jun. Im F. 24.

3. *G. cardinalis*. Curt. bot. mag. 135. prächtige Siegwurz. —. Ch. 24.

4. *G. carneus*. Pers. l. c. Fleischfarbige Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.

5. *G. Merianus*. Thunb. diss. n. 12. Große Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.
Watson. Meriana. Pers. l. c. 1. p. 42.

6. *G. roseus*. Jacq. icon. rar. 2. t. 261 Collect. suppl. p. 22. Rosenrothe Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.

Watsonia amoenae. Pers. l. c. 1. p. 43.

7. *G. tenellus*. Pers. l. c. 1 p. 44. Zarte Siegwurz. May. Jun. Ch. 24.

8. *G. plicatus*. Pers. l. c. Gefaltene Siegwurz. Apr. May. Ch. 24.

9. *G. albidus*. Pers. l. c. 1. p. 45. Weissliche Siegwurz. Apr. — Jun. Ch. 24.

10. *G. cuspidatus*. Pers. l. c. Zugespitzte Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

11. *G. crispus*. Pers. l. c. Krause Siegwurz. May. Jun. Ch. 24.

12. *G. tubiflorus*. Pers. l. c. Langröhrlige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

13. *G. longiflorus*. Pers. l. c. 1. p. 46. Langblühige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.
Ixia longiflora Ait. hort. kew 1. p. 58.

14. *G. gramineus* Pers. l. c. Grasartige Siegwurz. May, Jun. Ch. 24.

40. Ixia, Ixie.

1. *I. ochroleuca*. Pers. l. c. Grünlichweisse Ixie. Wächst sammt den meisten übrigen am Cap. Apr. May. Ch. 24.

2. *I. Bulbocodium*. Pers. l. c. Europäische Ixie. Am Mittelländischen Meere. Apr. K. H. 24.

3. *I. cruciata*. Pers. l. c. 1. p. 47. Kreuzblättrige Ixie. May. Ch. 24.

4. *I. heterophylla*. Pers. l. c. Verschiedenblättrige Ixie. May. Jun. Ch. 24.

Galaxia plicata. Jacq. ic. rar. 2. t. 291. Collect. suppl. 30.

5. *I. incarnata*. Pers. l. c. Fleischfarbige Ixie. May, Jun. Ch. 24.

6. *I. angusta*. Pers. l. c. Schmale Ixie. May, Jun. Ch. 24.

7. *I. leucantha*. Pers. l. c. 1. p. 48. Weisse Ixie. May, Jun. Ch. 24.

8. *I. erecta*. Thunb. diss. n. 18. Aufrechte Ixie. May, Jun. Ch. 24.

I. polystachya. Pers. l. c.

9. *I. maculata*. Pers. l. c. Gefleckte Ixie. May, Jun. Ch. 24.

10. *I. crocata* Thunb. diss. n. 20 Safranfarbige Ixie. May, Jun. Ch. 24.
Gladiol. crocatus. Pers. l. c. 1. p. 44.

11. *I. deusta* Pers. l. c. Verbrannte Ixie. May, Jun. Ch. 24.

12. *I. miniata*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 10 t. 24. Mennigrothe Ixie. May, Jun. Ch. 24.

13. *I. hyalina*. Lin. suppl. 91. Durchscheinende Ixie. Apr. May. Ch. 24.

Gladiolus hyalinus. Pers. l. c. 1. p. 44.

Ixia fenestrata. Jacq. ic. rar. 2. t. 289. Collect. 3. p. 270.

14. *I. coerulescens*. Pers. l. c. 1. p. 48 Weißblaue Ixie. May, Jun. Ch. 24.

Ixia villosa. Ait. hort. kw. 1. p. 58.

15. *I. rubro-cyanea*. Jacq. ic. rar. 2. t. 285. Collect. 3. p. 268. Bunte Ixie. Apr. May. Ch. 24. *J. cyanea* Pers. l. c.

16. *I. punicea*. Pers. l. c. Dunkelrote Ixie. Apr. May. Ch. 24.

17. *I. bulbifera*. Pers. l. c. 1. p. 49. Zwiebeltragende Ixie. Apr. Jun. Ch. 24.

41. Moraea, Morää.

1. *M. longifolia*. Pers. l. c. Langblättrige Morää. Am Cap. May, Jun. Ch. 24.

Moraea flexuosa. Lin. suppl. 100.

Ixia longifolia. Jacq. hort. vind. 3. p. 47. t. 90.

2. *M. elegans*. Pers. l. c. Schöne Morää. Am Cap. May, Jun. Ch. 24.

Sisyrinchium elegans. Jacq. hort. schönbr. 1. p. 6. t. 12.

3. *M. Northiana*. Schneev. ic. t. 41 — 42. Nordische Morää. In Brasilien. May — Jul. W. H. 24. *Iris Northiana*. Pers. l. c. 1. p. 52.

4. *M. iridioides*. Lin. mant. 28. Schwertlartige Morää. Im Orient. Apr. — Aug. Ch. 24.

Iris orientalis. Pers. l. c.

5. *M. chinensis*. Thunb. jap. 34. Bunte Mo-
räa. In China, Japan u. Ostindien. Jun. — Aug.
Ch. 24.

Ixia chinensis. Pers. l. c. 1. p. 48.

42. Iris, Schwertel.

1. *I. pumila*. Pers. l. c. 1. p. 50. Niedriger
Schwertel. Auf Hügeln in Oesterr. Deutschl. Frank-
reich. März, Apr. Im F. 24.

2. *I. susiana*. Pers. l. c. 1. p. 51. Prächtiger
Schwertel. Im Orient. May. K. H. 24.

3. *I. florentina*. Pers. l. c. Florentinischer
Schwertel. In Südeur. May. Im F. 24.

4. *I. squalens*. Pers. l. c. Gelbbunter Schwer-
tel. In Südeur. May. Im F. 24.

5. *I. Swertiae*. Pers. l. c. Schwertischer Schwer-
tel. — Jun. Im F. 24.

6. *I. hungarica* Waldstein et Kitaib. pl. rar.
hung. 3. p. 251 t. 226. Ungarischer Schwertel.
In Ungarn. May. Im F. 24.

I. bohemica. Schmidt fl. bohem. cent. 4.

7. *I. sambucina*. Pers. l. c. Hollunder-Schwer-
tel. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

8. *I. germanica*. Pers. l. c. Deutscher Schwer-
tel. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

9. *I. pallida*. Lam. encycl. 3. p. 282. Blas-
blauer Schwertel. Im Orient? Jun. Jul. Im F. 24.

I. pallide coerulea. Pers. l. c.

I. odoratissima. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 5. t. 2.

10. *I. Xiphium*. Pers. l. c. 1. p. 52. Spanischer

Schwertel. In Spanien, Portug. u. Sibirien. May, Jun. Im F. 24.

1. *variabilis*. Jacq. collect. 2. p. 321.

11. *I. Pseud-Acorus*. Pers. l. c. Wasser-Schwertel. In Sümpfen v. Eur. May, Jun. Im F. 24.

12. *I. foetida*. Pers. l. c. Stinkender Schwertel. In Engl. Toscan. u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

13. *I. virginica*. Pers. l. c. Virginischer Schwertel. In Virgin. May — Jul. Im F. 24.

14. *I. halophila*. Pers. l. c. Salz-Schwertel. Auf salzigem Boden in Sibirien. May, Jun. Im F. 24.

15. *I. ochroleuca*. Pers. l. c. Weißgelber Schwertel. Im Orient. May, Jun. Im F. 24.

16. *I. persica*. Pers. l. c. 1. p. 53. Persischer Schwertel. In Persien. Apr. K. H. 24.

17. *I. graminea*. Pers. l. c. Grasblättriger Schwertel. In Oesterr. auf sumpfigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

18. *I. spuria*. Pers. l. c. Bastard-Schwertel. In Ungarn, Deutschl. Frankr. u. Sibir. auf sumpfigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

19. *I. Guldenstaedtii*. Lepech. act. petrop. 1781. 1. p. 292. t. 8. Güldenstädter Schwertel. In Sibirien. May. Im F. 24.

20. *I. sibirica*. Lin. sp. pl. 57. Wald-Schwertel. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Sibir. auf sumpfigen Wiesen. May — Jul. Im F. 24.

1. *pratensis*. Pers. l. c.

43. Commelina, Commeline.

1. *C. erecta*. Pers. l. c. 1. p. 55. Aufrechte Commeline. In Virgin. Jun. Jul. K. H. 24.
2. *C. africana*. Pers. l. c. Africanische Commeline. In Aethiopien. Jun. Jul. K. H. 24.
3. *C. tuberosa*. Lin. sp. pl. 61. Knollige Commeline. In Mexico. Jul. Aug. K. H. 24.
4. *C. coelestis*, Willd. enum. 1. p. 69. Himmelsche Commeline. —. Jul. Aug. VV. H. 24.

44. Killingia, Killingie.

1. *K. triceps*. Lin. suppl. 104. Dreyköpfige Killingie. An feuchten Stellen in Ostind. u. Amer. Jun. Jul. VV. H. 24.
- K. nivea*. Pers. l. c. 1. p. 57.

45. Cyperus, Cyperngras.

1. *C. articulatus*. Pers. l. c. 1. p. 60. Gegliedertes Cyperngras. Im wärmer. Amer. —. VV. H. 24.
2. *C. esculentus*. Pers. l. c. 1. p. 63. Eßbares Cyperngras. (Erdmandel). In Ital. Südfrankr. Span. u. im Orient. Jul. Aug. Im F. 24.
3. *C. Papyrus*. Pers. l. c. 1. p. 64. Papier-Cyperngras. In Flüssen v. Calabrien, Sicil. Syrien u. Aegypt. Jun. Jul. K. H. 24.
4. *C. alternifolius*. Pers. l. c. 1. p. 65. Wechselblättriges Cyperngras. Auf Madagascar. Jun. Jul. VV. H. 24.
5. Eine noch unbeschriebene Art, welche am Cap zu Hause ist.

D I G Y N I A.

46. Phalaris, Glanzgras.

1. *Ph. arundinacea*. Pers. l. c. 1. p. 78. Rohrartiges Glanzgras. Am Wasser in Eur. Bl. den ganzen Sommer hindurch. Im F. 2*f*.

Arundo colorata. Ait. hort. kew. 1. p. 116.

2. *Ph. canariensis*. Pers. l. c. Canarisches Glanzgras. Auf den Canarischen Ins. Aug. Im F. Ø.

47. Panicum, Fennich.

1. *P. plicatum*. Pers. l. c. 1. p. 82. Gefalteter Fennich. Auf der St. Moritzinsel. May — Jul. VV. H. 2*f*.

2. *P. maximum*. Pers. l. c. 1. p. 83. Grosser Fennich. Auf der Ins. Guadeloupe. —. VV. H. 2*f*.

48. Ceresia, Ceresie.

1. *C. elegans*. Pers. l. c. 1. p. 85. Schöne Ceresie. In Peru. —. VV. H. 2*f*.
Paspalum membranaceum. Lamarck ill. gen. p. 177.
t. 43. f. 2.

49. Eleusine, Eleusine.

1. *E. domingensis*. Pers. l. c. 1. p. 87. Domingische Eleusine. In St. Domingo. Jun. — Aug. VV. H. 2*f*.

Cynosurus domingensis. Jacq. ic. rar. 1. t. 22.
Mise. 2. p. 363.

50. Chloris, Chloris.

1. *Ch. petraea*. Pers. l. c. Felsen Chloris. Auf

Kalkfelsen in Georgien, Florida, Jamaica u. am Cap. Sept. — März. Ch. 24.

2. *Ch. radiata*. Pers. l. c. 1. p. 88. Gestrahlte Chloris. In Westind. Jun. — Aug. W. H. ⊖.

51. Arundo, Rohr.

1. *A. Donax*. Pers. l. c. 1. p. 102. Breithäufiges Rohr. In Span. Frankr. der Schweiz, Krain u. Siebenbürg. — Im F. 24.

β *versicolor*. Mit bunten Blättern.

2. *A. Phragmites*. Pers. l. c. Gemeines Rohr. In Seen u. Flüssen v. Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 24.

3. *A. speciosa*. Schrad. fl. germ. 1. p. 219. Schönes Rohr. Auf Alpen in der Schweiz, Krain u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

A. Calamagrostis. Pers. l. c.

52. Saccharum, Zuckerrohr.

1. *S. officinarum*. Pers. l. c. Aechtes Zuckerrohr. In beyden Indien. — W. H. 24.

2. *S. Ravennae*. Pers. l. c. 1. p. 103. Ravenna-Zuckerrohr. In Ital. — K. H. 24.

53. Erianthus, Wollblume,

1. *E. saccharoides*. Mich. fl. amer. bor. 1. p. 55. Zuckerrohrartige Wollblume. An feuchten Stellen in Carolina. Jun. Jul. K. H. 24.

Saccharum giganteum. Pers. l. c.
— *argenteum*. Bronss.

54. *Andropogon*, Bartgras.

1. *A. Schoenanthus*. Pers. l. c. 1. p. 104.
Wohlriechendes Bartgras. In Arab. u. Ostind.
—. W. H. 24.
A. citriodorum Hortulan.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

55. *Protea*, Silberbaum.

1. *P. rosacea*. Pers. l. c. 1. p. 114. Rosenartiger Silberbaum. Am Cap wie alle folgenden.
—. Ch. ȳ.
P. nana. Thunb. prod. 26.

2. *P. torta*. Pers. l. c. Gedrehter Silberbaum. Jul. Ch. ȳ.

3. *P. vinerea*. Pers. l. c. 1. p. 115. Grauer Silberbaum. —. Ch. ȳ.

4. *P. emarginata* Hort. paris. Ausgerandeter Silberbaum. —. Ch. ȳ.

5. *P. mellifera*. Pers. l. c. Zucker-Silberbaum. —. Ch. ȳ.

6. *P. conifera*. Pers. l. c. Zapfentragender Silberbaum. Jul. Aug. Ch. ȳ.

7. *P. Levisanus*. Pers. l. c. Quendelblättriger Silberbaum. Aug. Sept. Ch. ȳ.

8. *P. sericea*. Pers. l. c. Seidenartiger Silberbaum. —. Ch. ♂.

9. *P. saligna*. Pers. l. c. Weidenblättriger Silberbaum. Jul. — Sept. Ch. ♂.

10. *P. argentea*. Pers. l. c. Aechter Silberbaum. —. Ch. ♂.

11. *P. speciosa* β nigra. Pers. l. c. Prächtiger Silberbaum m. schwarzen Kelchschuppen. —. Ch. ♂.

12. *P. cynaroides*. Pers. l. c. 1. p. 116. Großköpfiger Silberbaum. —. Ch. ♂.

56. Banksia, Banksie.

1. *B. serrata*. Pers. l. c. Sägeblättrige Banksie. Wächst in Neuholland, wie alle übrigen Arten dieser Gattung. —. Ch. ♂.

2. *B. præmorsa*. Pers. l. c. Abgebissene Banksie. —. Ch. ♂.

3. *B. microstachya*. Pers. l. c. Kleinährige Banksie. —. Ch. ♂.

4. *B. heterophylla*. Catal. hort. carlsruhan. p. 36. Verschiedenblättrige Banksie. —. Ch. ♂.

57. Hakea, Hakea.

1. *H. linifolia*. Hort. paris. Linienblättrige Hakea. Wächst wie alle folgenden Arten dieser Gattung in der Botany - Bay in Neuholland. —. Ch. ♂.

2. *H. dactyloides*. Pers. l. c. 1. p. 117. Fingerartige Hakea. —. Ch. ♂.

3. *H. heterophylla*. Hort. paris. Verschiedenblättrige Hakea, —. Ch. ♂.

4. *H. suaveolens*. Brown. in linnean soc. transact. 10. p. 182. Wohlriechende Hakea. —. Ch. 5.

58. *Embothryum*, Prachtstrauch.

1. *E. salicifolium*. Vent. hort. cels. 8. t. 8. Weidenblättriger Prachtstrauch. In Neuholland. —. Ch. 5.

59. *Globularia*, Kugelblume.

1. *G. longifolia*. Pers. l. c. 1. p. 118. Langblättrige Kugelblume. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. 5.

2. *G. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeine Kugelblume. In Eur. May. Jun. Im F. 24.

3. *G. cordifolia*. Pers. l. c. Herzblättrige Kugelblume. In Oesterr. Ungarn, der Schweiz und den Pyrenäen auf sonnigen Hügeln. May. Jun. Im F. 24.

60. *Cephalanthus*, Kopfblume.

1. *C. occidentalis*. Pers. l. c. 1. p. 119. Abendländische Kopfblume. In Nordamer. Jul. (Aug.) Im F. 5.

61. *Scabiosa*, Scabiose.

1. *Sc. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Scabiose. Auf den Schweizeralpen und den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Sc. transylvanica*. Pers. l. c. Siebenbürgische Scabiose. In Siebenb. u. Ung. zwischen Getreide. Jun. Jul. Im F. ①.

3. *Sc. leucantha*. Pers. l. c. Weißblühende Scabiose. Auf Hügeln in Krain u. Languedoc März, Apr. K. H. 24.

4. *Sc. uralensis*. Pers. l. c. 1. p. 120. Uralische Scabiose. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. ⊖.

5. *Sc. sylvatica*. Pers. l. c. Wald-Scabiose. Auf Bergwiesen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

6. *Sc. stellata*. Pers. l. c. Sternförmige Scabiose. In Span. Jun. Jul. Im F. ⊖.

7. *Sc. atropurpurea*. Pers. l. c. 1. p. 121. Schwarzrothe Scabiose. In Ostind.? Jun. Jul. Im F. ⊖.

8. *Sc. africana*. Pers. l. c. Africanische Scabiose. In Africa u. im Orient. Jun. Jul. Ch. ȏ.

9. *Sc. cretica*. Pers. l. c. Candische Scabiose. In Candien. Jun. Jul. K. H. ȏ.

10. *Sc. bannatica*. Pers. l. c. Barnatische Scabiose. Im Bannate. Jun. Jul. Im F. ⊖.

62. Knautia, Knautie.

1. *K. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische Knautie. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ⊖.

63. Spermacoce, Zahnwirbel.

1. *Sp. suffrutescens*. Jacq. hort. schönbr. 3. p. 40. t. 322. Staudenartiger Zahnwirbel. —. Bl. den ganzen Sommer hindurch. VV. H. 24.

2. *Sp. rubra*. Jacq. hort. schönbr. 3. p. 3. t. 256. Rothblühender Zahnwirbel. —. Sept. — Decemb. VV. H. ⊖.

64. Houstonia, Houstonie.

1. *H. coccinea*. Pers. l. c. 1. p. 125. Scharlachrothe Houstonie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. ȏ.

65. Rubia, Röthe.

1. *R. tinctorum*. Pers. l. c. 1. p. 129. Färber-Röthe. In Südeur. Jul. Aug. Im F. 2.

66. Ixora, Ixore.

1. *I. coccinea*. Pers. l. c. 1. p. 130. Scharlachrothe Ixore. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ḫ.

67. Aegiphila, Ziegenstrauch.

1. *Ae. martinicensis*. Pers. l. c. 1. p. 132. Martinikischer Ziegenstrauch. An den Waldrändern zu Martinique. Jun. Jul. W. H. ḫ.

68. Callicarpa, Schönbeere.

1. *C. americana*. Pers. l. c. 1. p. 133. Americanische Schönbeere. In Carol. u. Virgin. Jun. Jul. K. H. ḫ.

2. *C. macrophylla*. Pers. l. c. Grossblättrige Schönbeere. In Ostind. —. W. H. ḫ.

69. Buddleja, Buddleje.

1. *B. globosa*. Pers. l. c. 1. p. 135. Kopftragende Buddleje. An feuchten Stellen in Chili. Jun. Jul. Ch. ḫ.

B. capitata. Jacq. ic. rar. 2. t. 307. Collect. 2. p. 332.

2. *B. salvifolia*. Pers. l. c. 1. p. 136. Salbeiblättrige Buddleje. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ḫ.

3. *B. salicifolia*. Pers. l. c. Weidenblättrige Buddleje. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. ḫ.

70. Exacum, Bitterblatt.

1. *E. viscosum*. Pers. l. c. Klebriges Bitterblatt. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Dec. Ch. ♂.

71. Plantago, Wegetritt.

1. *P. hirsuta*. Pers. l. c. 1. p. 139. Haariger Wegetritt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

2. *P. Cynops*. Pers. l. c. 1. p. 140. Strauchartiger Wegetritt. In der Provence, Ital. u. Sibir. Jun. Jul. K. H. ♂.

72. Spielmannia, Spielmannie.

1. *Sp. africana*. Pers. l. c. 1. p. 141. Africanische Spielmannie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

73. Sanguisorba, Wiesenknopf.

1. *S. officinalis*. Pers. l. c. Gemeiner Wiesenknopf. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

74. Cissus, Klimme.

1. *C. Ampelopsis*. Pers. l. c. 1. p. 142. Weinverwandte Klimme. In Nordamer. — K. H. ♂.

2. *C. vitiginea*. Pers. l. c. Weinartige Klimme. In Ostind. — W. H. ♂.

3. *C. antarctica*. Vent. choix. p. 21. t. 21. Neuholländische Klimme. In Neuholl. — Ch. ♂.

4. *C. sicyoides*. Pers. l. c. Stichlingartige Klimme. In Jamaica. — W. H. ♂.

5. *C. smilacina*. Willd. enum. 1. p. 163.
Stechwindenartige Klimme. In Jamaica. —. W.
H. ᄁ.

6. *C. quadrangularis*. Pers. l. c. Viereckige
Klimme. In Arabien u. Ostind. —. W. H. ᄁ. 2.

7. *C. acida*. Pers. l. c. Saure Klimme. In
Westind. Jun. Jul. W. H. 2. 5.

8. *C. orientalis*. Pers. l. c. 1. p. 143. Morgen-
ländische Klimme. Im Orient. Jul. Aug. K. H. ᄁ.

75. Epimedium, Sockenblume.

1. *E. alpinum*. Pers. l. c. Alpen-Socken-
blume. Auf Alpen in Südeur. Apr. May. Im F. 2.

76. Cornus, Hartriegel.

1. *C. florida*. Pers. l. c. Schönblühender
Hartriegel. In Pensylvan. Virgin. u. Carol. May,
Jun. Im F. ᄁ.

2. *C. mascula*. Pers. l. c. Gelber Hartrie-
gel. (Dürlizen). An Zäunen in Eur. Apr. Im F. ᄁ.

3. *C. sanguinea*. Pers. l. c. Rother Hart-
riegel. An Hecken in Eur. Asien u. Nordamer.
May, Jun. Im F. ᄁ.

4. *C. alba*. Pers. l. c. Weisser Hartriegel.
In Sibir. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

5. *C. sericea*. Pers. l. c. Rostfarbiger Hartrie-
gel. In Südcarol. u. Pensylv. May. Jun. Im F. ᄁ.

6. *C. circinata*. Pers. l. c. Rundblättriger
Hartriegel. In Pensylv. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

7. *C. stricta*. Pers. l. c. 1. p. 144. Steifer
Hartriegel. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

8. *C. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthiger Hartriegel. In Nordamer. Jun. Im F. ½.

9. *C. alternifolia*. Pers. l. c. Wechselblättriger Hartriegel. In Nordamer. Jun. Im F. ½.

77. Fagara, Fagare.

1. *F. Pterota*. Pers. l. c. Geflügelte Fagare. In Jamaica. May. W. H. ½.

78. Monetia, Monetie.

1. *M. barlerioides*. L' Herit. stirp. 1. p. 1. t. 1. Vierdornige Monetie. In Ostind. u. am Cap. Jul. Aug. W. H. ½.

Azima tetracantha. Pers. l. c. 1. p. 145.

79. Ptelea, Lederblume.

1. *Pt. trifoliata*. Pers. l. c. Dreyblättrige Lederblume. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ½.

80. Pothos, Pothos.

1. *P. lanceolata*. Pers. l. c. 1. p. 147. Lanzettblättriger Pothos. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 2½.

2. *P. crassinervia*. Pers. l. c. Dicknerviger Pothos. Auf waldigen Bergen zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 2½.

3. *P. macrophylla*. Pers. l. c. Großblättriger Pothos. In Westind. Jun. Jul. W. H. 2½.

P. grandifolia. Jacq. ic. rar. 3. t. 610. Collect. 4. p. 121.

4. *P. digitata*. Pers. l. c. Fingerblättriger Pothos. Auf waldigen Bergen zu Caracas. Jänn. Febr. W. H. ½.

81. Chloranthus, Grünblume.

1. *Ch. inconspicuus*. Pers. l. c. 1. p. 148.
Kleinblättrige Grünblume. In China u. Japan.
Jän. Febr. Ch. ♂.

82. Elaeagnus, Oleaster.

1. *E. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättriger Oleaster. In Böhmen, Ungarn, Span. Syrien u. Cappadocien. May. Jun. Im F. ♂.

2. *E. orientalis*. Pers. l. c. Levantischer Oleaster. Im Orient. — K. H. ♂.

83. Rivina, Rivine.

1. *R. humilis*. Pers. l. c. 1. p. 149. Niedrige Rivine. Auf den Caraibischen Inseln, Jamaica u. Barbados. Jun. Jul. W. H. ♂.

2. *R. laevis*. Pers. l. c. Glatte Rivine. In America. Jun. Jul. W. H. ♂.

3. *R. brasiliensis*. Pers. l. c. Brasilische Rivine. In Südamer. Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *R. octandra*. Pers. l. c. Achtfädige Rivine. Im wärmer. Amer. — W. H. ♂.

84. Camphorosma, Kampferkraut.

1. *C. monspeliacæ*. Pers. l. c. Haariges Kampferkraut. Auf sandigem Grunde in Span. Languedoc u. in der Tartarey. Jul. Aug. K. H. ♂.

D I G Y N I A.

85. Hamamelis, Zaubernuss.

1. *H. virginica*. Pers. l. c. 1. p. 150. Virginische Zaubernuss. In Virgin. Sept. Oct. Im F. ♀.

T E T R A G Y N I A.

86. Ilex, Hülsen.

1. *I. Aquifolium*. Pers. l. c. 1. p. 151. Gemeine Hülsen. In Südeur. Japan u. Virgin. May. Im F. ♀.

β. albo variegata. Mit weissgestreiften Blättern.

γ. aureo — — gelbgestreiften —.

δ. luteo macula . — gelbfleckten —.

ε. ferox. — auf der Oberfläche stachlichen Blättern.

2. *J. opaca*. Pers. l. c. Dunkelblättrige Hülsen. In Carol. —. K. H. ♀.

3. *J. balearica*. Desf. catal. hort. paris. p. 201. Balearische Hülsen. Auf den Balearischen Inseln. —. Ch. ♀.

4. *J. Perado*. Pers. l. c. Madera'sche Hülsen. Zu Madera. —. Ch. ♀.

J. maderiensis. Lam. encycl. 3. p. 146.

5. *J. aestivalis*. Pers. l. c. Sommer-Hülsen. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♀.

6. *J. Cassine*. Pers. l. c. Lorbeerblättrige Hülsen. In Carol. May, Jun. K. H. ♀.

7. *J. vomitoria*. Pers. l. c. Brech-Hülsen.
In Südearol. May, Jun. K. H. ♂.

8. *J. salicifolia*. Pers. l. c. Weidenblättrige
Hülsen. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W.
H. ♂.

9. *J. canadensis*. Michaux fl. amer. boreal.
229. Canadische Hülsen. In Canada. —. K. H. ♂.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

87. *Heliotropium*, Scorpionschwanz.

1. *H. peruvianum*. Pers. l. c. 1. p. 155.
Wohlriechender Scorpionschwanz. In Peru. Bl.
den ganzen Sommer hindurch. W. H. ♂.

2. *H. grandiflorum*. Hort. paris. Grossblü-
thiger Scorpionschwanz. —. Bl. den ganzen Som-
mer hindurch. W. H. ♂.

3. *H. indicum*. Pers. l. c. Indischer Scorpi-
onschwanz. In beyd. Ind. Jun. W. H. ☽.

4. *H. curassavicum*. Pers. l. c. 1. p. 156.
Curassavischer Scorpionschwanz. In Westindien.
Jun. Jul. W. H. ☽.

88. *Myosotis*, Mauseohr.

1. *M. scorpioides*. Pers. l. c. Sumpf-Mau-
seohr. An Bächen u. feuchten Stellen in Eur.
May — Aug. Im F. 24.

M. palustris. Roth germ. L. 87. II. 221.

89. *Lithospermum*, Steinsame.

1. *L. officinale*. Pers. l. c. 1. p. 157. Ge-meiner Steinsame. In Eur. May — Jul. Im F. 2f.

2. *L. purpureo-coeruleum*. Pers. l. c. 1. p. 158. Rother Steinsame. In Hainen v. Ungarn, England. Deutschl. Frankr. u. Ital. May — Jul. Im F. 2f.

90. *Anchusa*, Ochsenzunge.

1. *A. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 159. Ge-meine Ochsenzunge. In Deutschl. May, Jun. Im F. 2f.

2. *A. italicica*. Pers. l. c. Italienische Ochsen-zunge. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

91. *Cynoglossum*, Hundszunge.

1. *C. officinale*. Pers. l. c. Gem eine Hunds-zunge. In Eur. May, Jun. Im F. ♂.

2. *C. pictum*. Pers. l. c. Bunte Hundszun-ge. In Südeur. der Barbar. u. zu Madera. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *C. umbellatum*. Waldst. et Kitaib. pl. tar. hung. 2. p. 158. t. 148. Doldenblütige Hundszunge. Im Bannate. Jun. Jul. Im F. 2f.

4. *C. linifolium*. Pers. l. c. 1. p. 160. Flachs-blättrige Hundszunge. In Span. u. Portug. Jun. Jul. Im F. ☽.

5. *C. Omphalodes*. Pers. l. c. Frühlings-Hundszunge. In Wäldern zu Piemont u. Kraim März, Apr. Im F. 2f.

92. Pulmonaria, Lungenkraut.

1. *P. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 161. Gemeines Lungenkraut. In Ungarn, Deutschl. der Schweiz u. Schweden. May, Jun. Im F. 24.

93. Symphytum, Schwarzwurz.

1. *S. officinale*. Pers. l. c. Gemeine Schwarzwurz. In Eur. May, Jun. Im F. 24.

β. *purpureum*. Mit purpurrothen Blüthen.

2. *S. tuberosum*. Pers. l. c. Knollige Schwarzwurz. In Süddeutschl. Montpell. u. Span. May — Jul. Im F. 24.

3. *S. tauricum*. Pers. l. c. Taurische Schwarzwurz. In Taur. May. Im F. 24.
S. orientale. Bieberst. fl. taurico-caucas. p. 129.

94. Cerinthe, Wachsblume.

1. *C. maior*. Pers. l. c. Grossse Wachsblume. In Sibir. u. der Schweiz Jun. Jul. Im F. ⊙.

2. *C. aspera*. Mill. dict. n. 1. Scharfblättrige Wachsblume. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

C. maior β *aspera*. Pers. l. c.

3. *C. minor*. Pers. l. c. Kleine Wachsblume. In Oesterr. Steyerm. und Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

95. Onosma, Lotwurz.

1. *O. echiooides*. Pers. l. c. Natterkopfähnliche Lotwurz. In Oesterr. Böhmm. u. Ungarn auf trocknen Haiden. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

96. Borago, Boretsche.

1. *B. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 162. Gemeine Boretsche. In der Normandie. Jul. Aug. Im F. ④.

2. *B. laxiflora*. Loiseleur fl. gall. p. 106. Schlaffblütige Boretsche. In Corsica. Jul. Aug. K. H. 2*f*.

97. Lycopsis, Krummhals.

1. *L. pulla*. Pers. l. c. Kleiner Krummhals. Im südlicheren Eur. auf sonnigen Hügeln. May. Im F. 2*f*.

98. Echium, Natterkopf.

1. *E. bifrons*. Decand. catal. hort. monspel. p. 107. Zweyförmiger Natterkopf. —. —. Ch. Ȑ.

2. *E. candicans*. Pers. l. c. 1. p. 163. Weißlicher Natterkopf. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. — Aug. Ch. Ȑ.

3. *E. giganteum*. Pers. l. c. Höchster Natterkopf. Auf Felsen zu Teneriffa. Jun. Ch. Ȑ.

4. *E. fastuosum*. Jacq. eclog. fasc. 5. p. 61. t. 41. Prächtiger Natterkopf. —. Jun. Ch. Ȑ.

99. Messerschmidia, Messerschmidie.

1. *M. fruticosa*. Pers. l. c. 1. p. 164. Strauchartige Messerschmidie. Zu Teneriffa u. den Canarischen Inseln. Jul. Aug. Ch. Ȑ.

100. *Tournefortia*, Tournefortie.

1. *T. hirsutissima*. Pers. l. c. 1. p. 165. Haarige Tournefortie. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. VV. H. ♂.

2. *T. volubilis*. Pers. l. c. Windende Tournefortie. In Jamaica, Mexico u. Peru. Jul. VV. H. ♂.

3. *T. cymosa*. Lin. sp. pl. 202. Doldentraubige Tournefortie. In Jamaica. May — Jul. VV. H. ♂.
T. macrophylla. Pers. l. c.

4. *T. foetidissima*. Pers. l. c. Stinkende Tournefortie. In Mexico u. Jamaica. Jun. Jul. VV. H. ♂.

101. *Cordia*, Cordie.

1. *C. Sebestena*. Pers. l. c. 1. p. 166. Sebesten-Cordie. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

102. *Ehretia*, Ehretie.

1. *E. tinifolia*. Pers. l. c. Lorbeerblättrige Ehretie. In Jamaica. Jul. Aug. VV. H. ♂.

2. *E. Beurreria*. Pers. l. c. 1. p. 167. Ovale Ehretie. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. ♂.

3. *E. laxa*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 18. t. 41. Schlaffe Ehretie. Auf Bourbon. Jun. Jul. VV. H. ♂.

103. *Varronia*, Varronie.

1. *V. bullata*. Pers. l. c. Aufgeblasene Varronie. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. ♂.

2. *V. alba*. Pers. l. c. Weisse Varronie. In Amer. —. VV. H. ♂

3. *V. monosperma*. Pers. l. c. Einsamige Varronie. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♀.

4. *V. alnifolia*. Cavan. Ellerblättrige Varro-
nie. — Jänn. — Apr. W. H. ♀.

104. *Hydrophyllum*, Rinnenblume.

1. *H. magellanicum*. Pers. l. c. 1. p. 168.
Magellanische Rinnenblume. Auf der Magellani-
schen Landenge. Jun. Jul. K. H. 24.

2. *H. canadense*. Pers. l. c. Canadische Rin-
nenblume. In feuchten Wäldern v. Canada. Jun.
Jul. Im F. 24.

105. *Ellisia*, Ellisie.

1. *E. Nyctelea*. Pers. l. c. Virginische Elli-
sie. In Virgin. Jul. Aug. Im F. ○.

106. *Nolana*, Nolane.

1. *N. prostrata*. Pers. l. c. Liegende Nola-
ne. In Peru. Jul. Aug. Im F. ○.

107. *Androsace*, Mannsschild.

1. *A. villosa*. Pers. l. c. 1. p. 169. Rauher
Mannsschild. Auf Oesterreichisch. u. Schwei-
zeralpen. May, Jun. Im F. 24.

2. *A. lactea*. Pers. l. c. Milchweisser Manns-
schild. Auf Oesterreichisch. u. Schweizeralpen.
Jun. Jul. Im F. 24.

108. *Primula*, Primel.

1. *P. veris*. Pers. l. c. Frühlings-Primel.
In Eur. May. Im F. 24.

2. *P. elatior*. Pers. l. c. Garten-Primel. In Eur. May. Im F. 24.

3. *P. vulgaris*. Smith brit. 1. p. 222. Gemeine Primel. In Deutschl. Engl. u. Frankr. Apr. May. Im F. 24.

P. acaulis. Pers. l. c.

β. flore pleno violaceo. Mit gefülltvioletter Blüthe.

4. *P. farinosa*. Pers. l. c. Mehlblättrige Primel. Auf Alpen u. feuchten Wiesen in Eur. May. Im F. 24.

5. *P. cortusoides*. Pers. l. c. 1. p. 170. Schönste Primel. In Sibir. May, Jul. K. H. 24.

6. *P. marginata*. Pers. l. c. Gerandete Primel. Auf den Schweizeralpen. May — Jul. Im F. 24.

7. *P. Auricula*. Pers. l. c. Aurikel-Primel. Auf Bergfelsen in Eur. Apr. May. Im F. 24.

8. *P. Palinuri*. Petagna instit. bot. 2. p. 332. Palinurische Primel. Auf Felsen des Vorgebirges Palinuro im Königreiche Neapel. Apr. May. K. H. 24.

9. *P. minima*. Pers. l. c. Kleinste Primel. Auf Alpen in Oester. Kärnthen, Krain u. der Schweiz. Jun. Aug. Im F. 24.

10. *P. integrifolia*. Pers. l. c. Ganzblättrige Primel. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Krain u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

109. *Cortusa*, *Cortuse*.

1. *C. Mathioli*. Pers. l. c. Europäische Cortuse. Auf Alpen in Oesterr. Schles. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

110. Soldanella, Alpenglöckchen.

1. *S. alpina*. Willd. en 1. p. 192. Gemeines Alpenglöckchen. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.
S. alpina β Clusii. Pers. l. c.

2. *S. montana*. Willd. l. c. Berg-Alpenglöckchen. Auf sehr feuchten Bergwiesen in Oesterr. Böhmen u. Passau. May, Jun. Im F. 24.
S. alpina. Pers. l. c.

111. Dodecatheon, Göttergabe.

1. *D. Meadia*. Pers. l. c. Virginische Göttergabe. In Virgin. May, Jun. Im F. 24.

112. Cyclamen, Erdscheibe.

1. *C. coum*. Pers. l. c. 1. p. 171. Rundblättrige Erdscheibe. In Südeur. Jun. K. H. 24.

2. *C. europaeum*. Pers. l. c. Europäische Erdscheibe. In schattigen Wäldern v. Oesterr. Böh. Schles. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *C. persicum*. Pers. l. c. Persische Erdscheibe. Auf der Insel Cypern. Jun. Jul. K. H. 24.

4. *C. hederifolium*. Pers. l. c. Epheublättrige Erdscheibe. In Ital. Jun. Jul. K. H. 24.

5. *C. autumnale*. Cujus? Herbstliche Erdscheibe. — Bl. im Herbste. K. H. 24.

113. Menyanthes, Zottenblume.

1. *M. nymphoides*. Pers. l. c. Seeblumenartige Zottenblume. In stehendem Gewässer des südlie-
ren Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter 24.
Valdschmidtia nymphoides. Wiggers primit. II.
holst. p. 20.

2. *M. trifoliata*, Pers. l. c. Dreyblättrige Zottenblume. In Sümpfen v. Eur. u. Nordamer. May. Im freyen Wasserbehälter 24.

114. Lysimachia, Lysimachie.

1. *L. vulgaris*. Pers. l. c. 1. p. 172. Gemeine Lysimacie. In schattigen Hainen an Bächen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *L. Ephemerum*. Pers. l. c. Weidenblättrige Lysimacie. In Span. Medien u. Sibir. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *L. dubia*. Pers. l. c. Hellrothe Lysimacie. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *L. hirsuta*. Michaux. flor. amer. 1. p. 127 Vierblättrige Lysimacie. In Carol. u. Pensylv. Jun. Jul. Im F. 24.

L. quadrifolia. Pers. l. c.

5. *L. ciliata*. Pers. l. c. Gefranzte Lysimacie. In Neujork. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *L. punctata*. Pers. l. c. Punktirte Lysimacie. In Krain, der Schweiz, Holland u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

115. Anagallis, Gauchheil.

1. *A. grandiflora*. Hort. monachiens. Großblüthiges Gauchheil. —. Jun. — Aug. Ch. ½.

116. Styphelia, Styphelie.

1. *St. daphnoides*. Pers. l. c. 1. p. 174. Seidelbastartige Styphelie. In Australien. —. Ch. ½.

2. *St. Gnydium*. Pers. l. c. Gniedienartige Styphelie. In Australien. —. Ch. ½. May.

117. *Gremastostemon*, Hängfaden.

1. *C. capensis*. Jacq. fragm. p. 68. n. 216. r.
103. f. 1. Capischer Hängfaden. Am Cap. Jun.
Jul. Ch. ♂.

118. *Itea*, Itea.

1. *I. virginica*. Pers. l. c. 1. p. 175. Virginische Itea. In Virgin. — K. H. ♂.

119. *Plumbago*, Bleywurz,

1. *P. europaea*. Pers. l. c. Europäische Bleywurz. In Südeur. u. Peru. Sept. Oct. Im F. 24.

2. *P. zeylanica*. Pers. l. c. Zeylonische Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

3. *P. rosea*. Pers. l. c. Rosenrothe Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *P. scandens*. Pers. l. c. Klimmende Bleywurz. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

120. *Mirabilis*, Jalape.

1. *M. dichotoma*. Pers. l. c. 1. p. 176. Gabelförmige Jalape. In Mexico. Jun. — Aug. K. H. 24.

2. *M. Jalapa*. Pers. l. c. Gemeine Jalape. In beyden Ind. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *M. longiflora*. Pers. l. c. Langblumige Jalape. Auf kalten Bergen in Mexico. Jun. Jul. Im F. 24.

121. *Convolvulus*, Winde.

1. *C. Batatas*. Pers. l. c. 1. p. 178. Bataten-Winde. In beyden Ind. Jul. Aug. W. H. 24.

2. *C. canariensis*. Pers. l. c. 1. p. 179. Canarische Winde. Auf den Canarischen Inseln. —. Ch. ♂.

3. *C. siculus*. Pers. l. c. 1. p. 180. Siciliane Winde. In Sicilien. Jun. Jul. Im F. ⊕.

4. *C. lineatus*. Pers. l. c. Gestrichelte Winde. Am Meerstrande in Südeur. Jun. Jul. K. H. 24.

5. *C. Cneorum*. Pers. l. c. 1. p. 181. Candische Winde. In Span. Cand. und Syrien. Jun. Jul. K. H. ♂.

6. *C. Cantabrica*. Pers. l. c. Cantabrische Winde. In Südeur. Taurien und Africa. Jun. Im F. 24..

7. *C. tricolor*. Pers. l. c. 1. p. 182. Dreyfarbige Winde. In Sicil. Span. und Nordafr. Jun. Jul. Im F. ⊕.

8. *C. ? monospermus*. Cujus ? Einsamige Winde. —. W. H. ♂.

122. *Ipomoea*, Trichterwinde.

1. *J. Quamoclit*. Pers. l. c. 1. p. 182. Gefiederte Trichterwinde. In Ostind. Jul. August. W. H. ⊕.

2. *J. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothe Trichterwinde. In Westind. Jun. Jul. W. H. ⊕.

3. *J. bona nox*. Pers. l. c. 1. p. 183. Stachlige Trichterwinde. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ⊕.

4. *J. violacea*. Pers. l. c. Violetter Trichterwinde. In Südamer. Jun. Jul. W. H. ⊕.

5. *J. purpurea*. Pers. l. c. Purpurrothe Trichterwinde. In Amer. Jun. Jul. W. H. ⊕.

6. *J. discolor*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 6.
t. 261. Zweyfarbige Trichterwinde — Jul. Aug.
VV. H. ⊖.

7. *J. Nil*. Pers. l. c. 1. p. 184. Blaue Trichterwinde. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. ⊖.

8. *J. ternata*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 16.
t. 37. Dreyblättrige Trichterwinde. In Südamer.
Jul. Aug. VV. H. ♂.

9. *J. heterophylla*. Pers. l. c. 1. p. 185. Verschiedenblättrige Trichterwinde. In Mexico u. auf der Insel Cuba. Jul. Aug. VV. H. ♂.

123. Cobaea, Cobää.

1. *C. scandens*. Pers. l. c. Klimmende Cobää.
In Mexico. Jun. — Oct. VV. H. ♂.

124. Polemonium, Sperrkraut.

1. *P. coeruleum*. Pers. l. c. Blaues Sperrkraut. Im nördlicheren Eur. Oesterr. Böhm. Ungarn und in Asien. Jun. Jul. Im F. 24.

125. Phlox, Flammenblume.

1. *Ph. paniculata*. Pers. l. c. 1. p. 186. Rispenblüthige Flammenblume. In Nordamer. Jun. — Sept. Im F. 24.

2. *Ph. aristata*. Pers. l. c. Gegrannte Flammenblume. In Carolina. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Ph. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende Flammenblume. In Nordamer. Jun. — Aug. Im F. 24.

4. *Ph. maculata*. Pers. l. c. Gefleckte Flammenblume. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Ph. glaberrima*. Pers. l. c. Glatte Flammenblume. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Ph. divaricata*. Pers. l. c. Ausgebreitete Flammenblume. Auf Bergen in Virgin. May. Im F. 24.

7. *Ph. reptans*. Pers. l. c. Kriechende Flammenblume. Auf Bergen in Carol. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *Ph. subulata*. Pers. l. c. Pfriemenartige Flammenblume. In Virgin. Jan. Jul. Im F. 24.

9. *Ph. setacea*. Pers. l. c. Borstenblättrige Flammenblume. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

126. *Vestia*, Vestie.

1. *V. lycooides*. Willd. enum. 1. p. 208. Bocks-

dornartige Vestie. In Chili. Jun. Jul. Ch. 5.

Cantua foetida. Pers. l. c. 1. p. 187.

Periphragmos foetidus. Ruiz et Pavou fl. peruv. 2.
p. 17. t. 132.

127. *Caldasia*, Caldasie.

1. *C. heterophylla*. Willd. hort. herol. 1. p.
71. t. 71. Verschiedenblättrige Caldasie. In Me-
xico. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. 24.

Bonplandia geminiflora. Pers. l. c.

128. *Campanula*, Glockenblume.

1. *C. pulla*. Pers. l. c. 1. p. 188. Dunkel-
blaue Glockenblume. Auf Alpen in Oesterr. und
Steyerm. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *C. rotundifolia*. Pers. l. c. Rundblättrige
Glockenblume. In Hainen und an Zäunen in
Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *C. persicifolia*. Pers. l. c. 1. p. 189. Pfirsich-

blättrige Glockenblume. In Wäldern v. Eur. Jun.
Jul. Im F. ♀.

♂ flore pleno albo. Mit weissgefüllter Blüthe.

4. *C. pyramidalis*. Pers. l. c. Pyramidenar-
tige Glockenblume. In Ital. Jun. Jul. Im F. ♀.

5. *C. rapunculoides*. Pers. l. c. 1. p. 190.
Rapunzelartige Glockenblume. In Oesterreich,
Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug.
Im F. ♀.

6. *C. Trachelium*. Pers. l. c. Gemeine Glo-
ckenblume. An Zäunen u. Hainen von Eur. Jun.
Jul. Im F. ♀.

7. *C. glomerata*. Pers. l. c. Knaulblumige
Glockenblume. Auf Wiesen u. Kalkhügeln in Eur.
Jun. — Aug. Im F. ♀.

8. *C. peregrina*. Lin. mant. 2. p. 204. Frem-
de Glockenblume. Am Cap? Jun. Jul. Ch. ♀.

9. *C. Medium*. Pers. l. c. 1. p. 191. Grofs-
blumige Glockenblume. In Krain u. Ital. Jun
Jul. Im F. ♂.

10. *C. divergens*. Waldst. et Kitaib. Ausge-
breitete Glockenblume. In Ungarn. May, Jun.
Im F. ♂.

11. *C. lingulata*. Pers. l. c. Zungenblättrige Glo-
ckenblume. In Ungarn. May, Jun. Im F. ♂.

12. *C. alpina*. Pers. l. c. 1. p. 192. Alpen-Glo-
ckenblume. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz.
Jun. — Aug. Im F. ♀.

13. *C. mollis*. Pers. l. c. Weiche Glocken-
blume. In Syr. Sicil. u. Span. Jun. — Aug. K. H. ☽.

14. *C. sibirica*. Pers. l. c. Sibirische Glöckchenblume. In Sibir. u. Oesterr. May, Jun. Im F. ♂.

15. *C. aurea*. Pers. l. c. Goldfarbige Glöckchenblume. Auf Felsen zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♂.

129. Phyteuma, Rapwurzel.

1. *Ph. hemisphaericum*. Pers. l. c. 1. p. 194. Halbrunde Rapwurzel. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. Ital. May, Jun. Im F. 24.

2. *Ph. orbiculare*. Pers. l. c. Kugelförmige Rapwurzel. Auf Bergwiesen in Deutschland, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Ph. spicatum*. Pers. l. c. Aehrentragende Rapwurzel. Auf waldigen Bergen in Deutschland, der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

130. Trachelium, Halskraut.

1. *T. coeruleum*. Pers. l. c. 1. p. 195. Blaues Halskraut. An schattigen Oertern in Ital. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 24.

131. Goodenia, Goodenie.

1. *G. ovata*. Pers. l. c. Eyförmige Goodenie. In Neuholl. May, Jun. Ch. ♂.

2. *G. grandiflora*. Curt. bot. mag. 890. Grossblüthige Goodenie. In Neuholl. May — Jul. Ch. 24. *G. appendiculata*. Jacq. fragm. bot. p. 62. n. 200. t. 92.

3. *G. calendulacea*. Pers. l. c. Ringelblumenartige Goodenie. In Neuholl. — Ch. ♂.

132. Gardenia, Gardenie.

1. *G. radicans*. Pers. l. c. 1. p. 198. Wurzelnde Gardenie. In Japan. —. Ch. ♂.
2. *G. florida*. Pers. l. c. Vollblüthige Gardenie. In Ostind. Amboina u. am Cap. Nov. Dec. W. H. ♂.
3. *G. Thunbergia*. Pers. l. c. Thunbergische Gardenie. Am Cap u. zu Manilla. —. W. H. ♂.
4. *G. Randia* β mitis. Swartz' fl. ind. occident. 1. p. 528. Zahme Gardenie. Auf den Antill. u. zu Jamaica. —. W. H. ♂.
Randia latifolia β? mitis. Pers. l. c. 1. p. 199.

133. Hamelia, Hamelie.

1. *H. patens*. Pers. l. c. 1. p. 203. Abstehende Hamelie. An Bergzäunen in Hispaniola u. Peru. May — Sept. W. H. ♂.
2. *H. chrysantha*. Pers. l. c. Goldfarbige Hamelie. An Bergzäunen von Jamaica u. Caracas. May — Sept. W. H. ♂.

134. Rondeletia, Rondeletie.

1. *R. racemosa*. Pers. l. c. 1. p. 204. Traubenträgnde Rondeletie. Auf waldigen Bergen zu Jamaica. Jun. — Aug. W. H. ♂.

135. Macrocnemum, Stengelblume.

1. *M. speciosum*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 19. t. 43. Schöne Stengelblume. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♂.

136. Serissä, Serisse.

1. *S. foetida*. Pers. l. c. 1. p. 205. Stinkende Serisse. In Ind. u. Japan. May — Jul. Ch. ৎ. *Lycium japonicum*, Thunb. t. 17.

137. Psychotria, Psychotrie.

1. *Ps. undata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 5. f. 260. Wogenblättrige Psychotrie. Auf den Bahamainseln. Jul. — Oct. W. H. ৎ.

138. Coffea, Coffee.

1. *C. arabica*. Pers. l. c. 1. p. 208. Arabischer Coffee. Im glücklichen Arab. u. Aethiop. May — Oct. W. H. ৎ.

139. Paederia, Knackbeere.

1. *P. foetida*. Pers. l. c. 1. p. 210. Stinkende Knackbeere. In Ostind. — W. H. ৎ.

140. Azalea, Azalea.

1. *A. procumbens*. Pers. l. c. 1. p. 212. Liegende Azalea. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. ৎ.

2. *A. pontica*. Pers. l. c. Pontische Azalea. Am schwarzen Meere u. in Gallicien. Jun. Jul. K. H. ৎ.

3. *A. viscosa*. Pers. l. c. 1. p. 213. Klebrige Azalea. In Virgin. Jun. — Aug. K. H. ৎ.

4. *A. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Azalea. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. K. H. ৎ.

141. Lonicera, Lonicere.

1. *L. Caprifolium*. Pers. l. c. Durchwachsende Lonicere. (Greisblatt). In Südeur. May — Jul. Im F. ♂.

2. *L. Periclymenum*. Pers. l. c. Deutsche Lonicere. In Mitteleur. May, Jun. Im F. ♂.

3. *L. dioica*. Lin. syst. veg. p. 181. Graue Lonicere. In Nordamer. Jun. Im F. ♂.

L. parviflora. Pers. l. c.

4. *L. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüne Lonicere. In Wältern v. Carol. u. Mexico. May — Jul. Im F. ♂.

5. *L. grata*. Pers. l. c. Schöne Lonicere. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♂.

6. *L. japonica*. Pers. l. c. Japanische Lonicere. In Japan. —. Ch. ♂.

7. *L. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Lonicere. In Oesterr. der Schweiz u. Frankr. auf Niederalpen. Jun. Jul. Im F. ♂.

8. *L. Xylosteum*. Pers. l. c. Gemeine Lonicere. (Beinholz). An Zäunen in Eur. May — Jul. Im F. ♂.

9. *L. tatarica*. Pers. l. c. Tartarische Lonicere. In der Tartarey. May, Jun. Im F. ♂.

β. *sibirica*. Mit schönrothen Blüthen.

10. *L. alpigena*. Pers. l. c. Alpen-Lonicere. Auf Alpen im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. ♂.

11. *L. coerulea*. Pers. l. c. Blaue Lonicere. In Oesterr. u. der Schweiz auf Alpen Jun. Jul. Im F. ♂.

142. Symphoricarpos, Zwillingsfrucht.

1. *S. vulgaris*, Michaux, fl. amer. 1. p. 106.

Gemeine Zwillingsfrucht. In Virgin. u. Carolina.
Jul. Aug. Im F. ♂.

Lonicera Symphoricarpos. Pers. l. c. 1. p. 214.

143. *Diervilla*, Dierville.

1. *D. canadensis*. Willd. enum. 1. p. 222.
Canadische Dierville. In Canada, Neujork und
Carolina. Jun. Jul. Im F. ♂.

Diervilla humilis. Pers. l. c.

Lonicera Diervilla. Lin. sp. pl. p. 249.

144. *Verbascum*, Königskerze.

1. *V. condensatum*. Schrad. monog. Verhasc.
sect. 1. p. 31. t. 3. Dichtbewachsene Königsker-
ze. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *V. speciosum*. Schrad. hor t. goetting. fasc.
2. p. 22. t. 16. Schöne Königskerze. In Oesterr.
Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *V. phlomoides*. Pers. l. c. 1. p. 215. Phlo-
misartige Königskerze. In Deutschl. u. Ital. Jun.
Jul. Im F. ♂.

4. *V. pyramidatum*. Bieberst. fl. taur. cau-
cas. 1. p. 161. Pyramidenartige Königskerze. Am
Caucasus. —. Im F. ♂.

5. *V. Lychnitis*. Pers. l. c. Lychnisartige Kö-
nigskerze. Auf kalkigem Boden in Eur. Jun. Jul.
Im F. ♀.

6. *V. nigrum*. Pers. l. c. Schwarze Königs-
kerze. In Waldgegenden v. Eur. Jun. Jul. Im
F. ♀.

7. *V. austriacum*. Schrad. fl. germ. ined.
Oesterreichische Königskerze. In Oesterr. Jun.
Jul. Im F. ♂.

8. *V. phoeniceum.* Pers. l. c. Violete Königsckerze. Im östlichen Eur. Krain u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *V. Blattaria.* Pers. l. c. Veränderliche Königsckerze. Im südlicheren Eur. Jul. Aug. Im F. ♂.

145. *Datura*, Stechapfel.

1. *D. Tutula.* Pers. l. c. 1. p. 216. Blaßblauer Stechapfel. Am Cap. Jun. Jul. Im F. ⊖.

2. *D. fastuosa.* Pers. l. c. Schöner Stechapfel. In Aegypt. May, Jun. Im F. ⊖.

3. *D. Metel.* Pers. l. c. Weisser Stechapfel. In Asien, Afr. u. den Canar. Inseln. Jun. — Aug. W. H. ⊖.

4. *D. ceratocaula.* Pers. l. c. Gabelstieler Stechapfel. Auf Cuba. Jul. Aug. W. H. ⊖.

5. *D. suaveolens.* Humboldt et Bonpl. Wohlriechender Stechapfel. In Mexico. Jun. — Sept. W. H. ♂.

D. arborea Hortulan.

146. *Hyoscyamus*, Bilsenkraut.

1. *H. aureus.* Pers. l. c. 1. p. 217. Goldfarbiges Bilsenkraut. In Candien und im Orient. May — Aug. K. H. 24.

2. *H. Scopolia.* Pers. l. c. Glockenförmiges Bilsenkraut. In Wäldern bey Idria u. im Banat. May, Jun. Im F. 24.

147. *Nicotiana*, Taback.

1. *N. Tabacum.* Pers. l. c. Gemeiner Taback. In Amer. Jun. — Aug. Im F. ⊖.

2. *N. macrophylla*. Spreng. ind. hort. halens. 1807. p. 45. Grossblättriger Taback. In Amer. Jul. Aug. Im F. Ⓢ.

3. *N. rustica*. Pers. l. c. Bauern-Taback. In Amer. Jun. Jul. Im F. Ⓢ.

4. *N. paniculata*. Pers. l. c. Jungfern-Taback. In Peru. Jun. Jul. Im F. Ⓢ.

5. *N. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättriger Taback. Bey der Stadt Jackson in Neuholl. Jun. Jul. Ch. 24.

148. Solandra, Solandre.

1. *S. grandiflora*. Pers. l. c. 1. p. 218. Grossblumige Solandre. Auf den höchsten Bäumen in Jamaika. Jun. Jul. W. H. 5.

β foliis glabris. Mit glatten Blättern.

149. Mandragora, Alraun.

1. *M. officinalis*. Decand. fl. franc. 3. p. 610. Officineller Alraun. Auf sonnigen Oertern in Krain, Span. der Schweiz, Sibir. Ital. Cand. u. den Cycladischen Inseln. May. Im F. 24.
Atropa Mandragora. Pers. l. c.

150. Atropa, Tollkraut.

1. *A. Belladonna*. Pers. l. c. Gemeines Tollkraut. Auf waldigen Bergen in Oesterr. Deutschl. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. frutescens*. Pers. l. c. 1. p. 219. Stranchartiges Tollkraut. In Span. Jun. Jul. K. H. 24.

151. Nicandra, Nicandre.

1. *N. physaloides*. Pers. l. c. Schluttenartige Nicandre. In Peru. Jul. Aug. Im F. ⊖.
Atropa physaloides. Lin. sp. pl. 260.

152. Physalis, Schlutte.

1. *Ph. somnifera*. Pers. l. c. 1. p. 220. Schlaf-machende Schlutte. In Mexico und Span. Jul. Aug. Ch. ♂.

2. *Ph. flexuosa*. Pers. l. c. Gebogene Schlutte. In Ostind. Jun. — Aug. Ch. ♂.

3. *Ph. viscosa*. Pers. l. c. Klebrige Schlutte. In Virgin. u. zu Buenos Ayres. Jun. — Aug. Ch. 24.

4. *Ph. Alkekengt*. Pers. l. c. Gemeine Schlutte. An Gräben v. Deutschl. Ital. u. Japan. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Ph. peruviana*. Pers. l. c. Peruvianische Schlutte. (Ananaskirsche). Zu Lima. Jun. Jul. Ch. ♂.

6. *Ph. prostrata*. Pers. l. c. Liegende Schlutte. In Peru. Jun. Jul. W. H. ⊖.

153. Solanum, Nachtschatten.

1. *S. auriculatum*. Pers. l. c. 1. p. 221. Geührter Nachtschatten. Auf den Inseln Madagascar, St. Moritz u. Bourbon. May, Jun. W. H. ♂.

2. *S. Melongena*. Pers. l. c. Eytragender Nachtschatten. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ⊖.

3. *S. ovigera*. Mit weisser eyförmiger Frucht.

3. *S. diphyllum*. Pers. l. c. 1. p. 222. Zwey-blättriger Nachtschatten. Im wärmeren Amer. Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *S. fugax.* Pers. l. c. Hinfälliger Nachtschatten. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♂.

5. *S. stellatum.* Pers. l. c. Sternförmiger Nachtschatten. —. May — Aug. W. H. ♂.

6. *S. nodiflorum.* Pers. l. c. 1. p. 223. Knotenblüthiger Nachtschatten. Auf der St. Moritzinsel. Jul. Aug. W. H. ♂.

7. *S. Pseudo - capsicum.* Pers. l. c. Beifußbeerenartiger Nachtschatten. Zu Madera. Jun. — Aug. Ch. ♂.

8. *S. Dulcamara.* Pers. l. c. 1. p. 224. Kletternder Nachtschatten. (Bittersüß). An feuchten Stellen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

9. *S. aggregatum.* Jacq. ic. rar. 2. t. 323. Coll. 4. p. 124. Gehäufter Nachtschatten. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. ♂.
Atropa solanacea. Pers. l. c. 1. p. 219.

10. *S. bombense.* Jacq. stirp. amer. 49. Bombascher Nachtschatten. Auf der Insel Bomba bey Carthagena. Jun. — Sept. Ch. ♂.

11. *S. betaceum.* Pers. l. c. Mangoldblättriger Nachtschatten. In Mexico. —. Ch. ♂.

12. *S. bonariense.* Pers. l. c. 1. p. 225. Bonärischer Nachtschatten. Zu Buenos-Ayres. Aug. — Oct. K. H. ♂.

13. *S. macrocarpon.* Pers. l. c. Grossfrüchtiger Nachtschatten. In Peru. Jun. — Aug. W. H. ♂.

14. *S. radicans.* Pers. l. c. Wurzelnder Nachtschatten. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 2/.

15. *S. reclinatum*. Pers. l. c. Niedergebogen-
ner Nachtschatten. — Jun. — Aug. Ch. ♂.

16. *S. Lycopersicum*. Pers. l. c. 1. p. 226.
Liebesapfel - Nachtschatten. Im wärmer. Amer.
Jun. — Aug. Im F. ☽.

17. *L. Pseudo - Lycopersicum*. Pers. l. c.
Falscher Liebesapfel - Nachtschatten. — Jun. Jul.
Im F. ☽.

18. *S. carolinense*. Pers. l. c. 1. p. 227. Ca-
rolinischer Nachtschatten. In Carolina. — K. H. ☽.

19. *S. sodomaeum*. Pers. l. c. 1. p. 228. So-
doms - Nachtschatten. In Africa, besonders am Cap.
Jul. Aug. Ch. ♂.

20. *S. marginatum*. Pers. l. c. Gerändeter
Nachtschatten. In Abyssinien. Jun. — Aug. Ch. ♂.

21. *S. stramonifolium*. Pers. l. c. Stechapfel-
blättriger Nachtschatten. In Westind. Jul. Aug.
W. H. ♂.

22. *S. ferrugineum*. Jacq. hort. schoenbr. 3.
p. 46. t. 334. Rostfarbener Nachtschatten. — Jun.
— Aug. W. H. ♂.

23. *S. tomentosum* Pers. l. c. Filziger Nacht-
schatten. In Aethiop. Jun. Jul. W. H. ♂.

β. *coccineum*. Mit scharlachrothen Früchten.

24. *S. giganteum*. Pers. l. c. Riesenartiger
Nachtschatten. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

25. *S. igneum*. Pers. l. c. Feuriger Nacht-
schatten. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. W. H. ♂.

26. *S. Pyracanthos*. Pers. l. c. Rothstachli-
ger Nachtschatten. Zu Madagascar. Jun. Jul.
W. H. ♂.

27. *S. violaceum*. Ort. decas 5. p. 56. Vio-
lenter Nachtschatten. In Mexico. Apr. — Jul. VV.
H. ♂.

154. Capsicum, Beissbeere.

1. *C. annum*. Pers. l. c. Jährige Beissbeere.
In Südamer. Jun. Jul. Im F. ⊖.

2. *C. baccatum*. Pers. l. c. Kleinfrüchtige
Beissbeere. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

3. *C. sinense*. Pers. l. c. Chinesische Beiss-
beere. In China. Jun. Jul. Ch. ♂.

4. *C. grossum*. Pers. l. c. 1. p. 230. Gross-
früchtige Beissbeere. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ⊖.

5. *C. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Beiss-
beere. In beyden Ind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

6. *C. cerasiforme*. Pers. l. c. Rundfrüchtige
Beissbeere. — Jun. Jul. VV. H. ♂.

155. Cestrum, Hammerstrauch.

1. *C. laurifolium*. Pers. l. c. Lorbeerblättri-
ger Hammerstrauch. Im wärmer. Amer. Nov. —
Febr. VV. H. ♂.

2. *C. macrophyllum*. Pers. l. c. Grossblättri-
ger Hammerstrauch. Auf den Antillen u. zu Por-
toricco. März. VV. H. ♂.

3. *C. Parqui*. Pers. l. c. Chilischer Hammer-
strauch. An feuchten Stellen zu Chili. Jun. — Aug.
K. H. ♂.

4. *C. salicifolium*. Jacq. hort. schoenbr. 3.
p. 42. t. 329. Weidenblättriger Hammerstrauch.
Zu Caracas. Nov. Dec. VV. H. ♂.

5. *C. hirsutum*. Jacq. l. c. 3. p. 41. t. 324.
Rauhaariger Hammerstrauch. — Apr. May. VV.
H. ♂.

6. *C. vespertinum*. Pers. l. c. Abend-Ham-
merstrauch, Auf den Antillen. Jun. — Aug. VV.
H. ♂.

7. *C. pendulinum*. Jacq. l. c. 3. p. 42. t. 327.
Hängender Hammerstrauch. Zu Caracas. Jun. —
Aug. VV. H. ♂.

8. *C. tinctorium*. Jacq. l. c. 3. p. 45. t. 332.
Färber-Hammerstrauch. Zu Caracas. May —
Sept. VV. H. ♂.

9. *C. foetidissimum*. Jacq. l. c. 3. p. 43. t.
329. Stinkender Hammerstrauch. In Westind.
März, Apr. u. Sept. Oct. VV. H. ♂.

10. *C. cauliflorum*. Jacq. l. c. 3. p. 41. t. 325.
Stammblüthiger Hammerstrauch. — Apr. May.
VV. H. ♂.

11. *C. odontospermum*. Jacq. l. c. 3. p. 44.
t. 331. Zahnfrüchtiger Hammerstrauch. — Sept.
Oct. VV. H. ♂.

12. *C. fastigiatum*. Jacq. l. c. 3. p. 44. t.
330. Gleichhochästiger Hammerstrauch. Auf Cuba.
Jun. — Aug. VV. H. ♂.

156. *Lycium*, Bocksdorn.

1. *L. afrum*. Pers. l. c. 1. p. 231. Africani-
scher Bocksdorn. Im nördlichen Africa. Jun. Jul.
K. H. ♂.

2. *L. tenue*. Willd. enum. 1. p. 245. Zarter
Bocksdorn. — Jun. Jul. Ch. ♂.

3. *L. ruthenicum*. Pers. l. c. Russischer Bocks-dorn. In Sibir. an der Wolga. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

4. *L. barbarum*. Pers. l. c. Gemeiner Bocks-dorn. In Eur. Asien u. Africa. Jun. — Aug. Im F. ᄁ.

5. *L. cinereum*. Pers. l. c. 1. p. 232. Grauer Bocksdorn. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ᄁ.

6. *L. boerhaavifolium*. Pers. l. c. Graublät-tiger Bocksdorn. In Peru. —. W. H. ᄁ.

157. Pogonia, Pogonie.

1. *P. debilis*. Pers. l. c. Schwache Pogonie. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ᄁ.

Andrewsia debilis. Vent. jard. de la Malmais. 2. p. et t. 108.

2. *P. glabra*. Andrews bot. reposit. t. 283. Glatte Pogonie. In Neuholl. Apr. Ch. ᄁ.
Andrewsia glabra Vent. l. c.

158. Ardisia, Ardisie.

1. *A. coriacea*. Pers. l. c. Lederartige Ardi-sie. Auf den Antillen. —. W. H. ᄁ.

2. *A. crenulata*. Pers. l. c. 1. p. 233. Feinge-kerbte Ardisie. Auf den Antillen. —. W. H. ᄁ.

159. Myrsine, Myrsine.

1. *M. africana*. Pers. l. c. Africanische Myr-sine. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ᄁ.

2. *M. retusa*. Pers. l. c. Zurückgebogene Myr-sine. Auf den Azorisch. Inseln. Jun. Jul. Ch. ᄁ.

160. Leea, Leea.

1. *L. crispa*. Pers. l. c. Krause Leea. Am Cap. —. Ch. 24.

161. Jacquinia, Jacquinie.

2. *J. arborea*. Pers. l. c. 1. p. 234. Baumartige Jacquinie. Auf der Insel Montserrat. —. W. H. Ȣ.

2. *J. aristata*. Jacq. fragm. bot. p. 64. t. 95. f. 1. Gegrante Jacquinie. In Westind. Jul. Aug. u. Nov. Dec. W. H. Ȣ.

3. *J. revoluta*. Jacq. l. c. p. 64. t. 95. f. 1. Zurückgerollte Jacquinie. Zu Caracas. —. W. H. Ȣ.

162. Sickingia, Sickingie.

1. *S. Erythroxylon*. Pers. l. c. Rothholzige Sickingie. Auf waldigen Bergen zu Caracas. —. W. H. Ȣ.

163. Chrysophyllum, Goldblatt.

1. *Ch. Cainito*. Pers. l. c. 1. p. 236. Cainito-Goldblatt. Auf Martinique. May, Jun. W. H. Ȣ.

2. *Ch. argenteum*. Pers. l. c. Silberfarbiges Goldblatt. Auf Martinique. —. W. H. Ȣ.

3. *Ch. glabrum*. Pers. l. c. Glattes Goldblatt. In Wäldern zu Martinique. —. W. H. Ȣ.

164. Sideroxylon, Eisenholz.

1. *S. inerme*. Pers. l. c. Dornenloses Eisenholz. In Aethiop. Jul. — Sept. W. H. Ȣ.

165. *Bumelia*, Hochstamm.

1. *B. salicifolia*. Pers. l. c. 1. p. 237. Weidenblättriger Hochstamm. Auf trockenen Hügeln in Jamaika, St. Crux u. den Bahamainseln. Jun. Jul. W. H. ♂.
Sideroxylon Mastichodendron. Jacq. collect. 2. p. 253. t. 17. f. 5.

2. *B. lycioides*. Pers. l. c. Bocksdornartiger Hochstamm. In Canada u. Carolina. Jul. Aug. K. H. ♂.

Sideroxylon lycioides. Duham. arb. 2. p. 260. t. 68.

3. *B. tenax*. Pers. l. c. Zäher Hochstamm. An Meereshecken in Carolina. Sept. Oct. K. H. ♂.
Sideroxylon tenax. Lin. mant. 48.

166. *Scleroxylon*, Schwerholz.

1. *Sc. mite*. Willd. enum. 1. p. 249. Wehrloses Schwerholz. Am Cap. —. Ch. ♂.
Manglilla Milleriana. Pers. l. c.
Sideroxylon mite. Liu. syst. veg. 193.

2. *S. melanophleum*. Willd. enum. l. c. Schwarzkindiges Schwerholz. Am Cap. Aug. Sept. Ch. ♂.

Manglilla melanophleos. Pers. l. c.

Sideroxylon melanophleum. Lin. mant. 48.

167. *Rhamnus*, Wegdorn.

1. *Rh. catharticus*. Pers. l. c. 1. p. 238. Gemeiner Wegdorn. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *R. saxatilis*. Pers. l. c. Stein-Wegdorn. Auf Bergen in Oesterr. Ungarn, Siebenbürg. Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May. Im F. ♂.

3. *R. Frangula*. Pers. l. c. 1. p. 239. Glatter Wegdorn. (Pulverholz). In feuchten Hainen von Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

4. *R. hybridus*. Pers. l. c. Bastard-Wegdorn. Kommt nur in Gärten vor. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *R. Alaternus*. Pers. l. c. Immergrüner Wegdorn. In Südeur. May, Jun. Im F. ♂.

β. foliis luteo varieg. Mit gelbfleckten Blätt.

γ. — albo — — weißgefleckten —.

168. *Zizyphus*, Judendorn.

1. *Z. Ignaneus*. Lam. encycl. 3. p. 318. Eidechsen-Wegdorn. Auf den Antill. u. zu Curassao. —. W. H. ♂.

Rh. *Ignaneus*. Pers. l. c. 1. p. 240.

2. *Z. vulgaris*. Willd. sp. pl. 1. p. 1105. Gemeiner Judendorn. In Südeur. May, Jun. Im F. ♂. Rh. *Zizyphus*. Pers. l. c.

3. *Z. volubilis*. Willd. arb. 415. Windender Judendorn. In Carolina. Jun. — Aug. K. H. ♂.
Rh. *volubilis*. Pers. l. c.

4. *Z. Paliurus*. Willd. l. c. Geflügelter Judendorn. In Südeur. u. im Orient. Jun. Jul. K. H. ♂.

Rh. *Paliurus*. Pers. l. c. 1. p. 241.

169. *Condalia*, Condalie.

1. *C. microphylla*. Pers. l. c. Kleinblättrige Condalie. Zu Chili —. Ch. ♂.

170. *Elaeodendrum*, Oelstrauch.

1. *E. orientale*. Pers. l. c. Orientalischer

Oelstrauch. Auf der St. Moritzinsel. — W.
H. h.

171. *Celastrus*, Celaster.

1. *C. scandens*. Pers. l. c. 1. p. 242. Klimmender Celaster. In Canada. May, Jun. Im F. h.

2. *C. buxifolius*. Pers. l. c. 1. p. 243. Buchsblättriger Celaster. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. h.

3. *C. pyracanthus*. Pers. l. c. Birnenblättriger Celaster. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. h.

172. *Evonymus*, Spindelbaum.

1. *E. japonicus*. Pers. l. c. Japanischer Spindelbaum. In Japan. Oct. Nov. Ch. h.

2. *E. europaeus*. Pers. l. c. Gemeiner Spindelbaum. An Hecken in Eur. May, Jun. Im F. h.

3. *E. verrucosus*. Pers. l. c. Warziger Spindelbaum. Auf Bergen in Oesterr. Krain u. Pohlen. Jun. Jul. Im F. h.

4. *E. latifolius*. Pers. l. c. Breithlättriger Spindelbaum. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. Böhmen u. Schlesien. Jun. Jul. Im F. h.

5. *E. atropurpureus*. Pers. l. c. Dunkelrother Spindelbaum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. h.

6. *E. americanus*. Pers. l. c. Americanischer Spindelbaum. In Virgin. u. Carol. Im F. h.

173. *Ceanothus*, Ceanothus.

1. *C. americanus*. Pers. l. c. 1. p. 244. Americanischer Ceanothus. In Virgin. u. Carol. — K. H. h.

2. *C. microphyllus*. Pers. l. c. Kleinblättriger Ceanothus. In Georgien u. Florida. — K. H. Ქ.

3. *C. colubrinus*. Pers. l. c. Schlangen-Ceanothus. In Amer. May, Jun. W. H. Ქ.
Rhamnus colubrinus Lin. syst. veg. 195.

4. *C. africanus*. Pers. l. c. Africanischer Ceanothus. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. Ქ.

5. *C. discolor*. Venten. [jardin. de] la Malmaison. l. t. 58. Zweyfarbiger Ceanothus. Auf den Südseeinseln. Aug. Ch. Ქ.

174. Phylica, Phylica.

1. *Ph. ericoides*. Pers. l. c. 1. p. 245. Heidenartige Phylica. Am Cap u. in Aethiop. Jun. — Dec. Ch. Ქ.

2. *Ph. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbige Phylica. Am Cap. —. Ch. Ქ.

3. *Ph. plumosa*. Pers. l. c. Fedrige Phylica. In Aethiop. —. Ch. Ქ.

4. *Ph. buxifolia*. Pers. l. c. Buchsblättrige Phylica. Am Cap u. in Aethiop. Jän. Febr. u. Jun. Jul. Ch. Ქ.

5. *Ph. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthige. Phylica. Am Cap. —. May — Jul. Ch. Ქ.

175. Brunia, Brunie.

1. *B. abrotanoides*. Pers. l. c. 1. p. 246. Stabwurzartige Brunie. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. Ქ.

176. Diosma, Buccostrauch.

1. *D. album*. Pers. l. c. 1. p. 247. Weisser Buccostrauch. Am Cap. —. Ch. Ქ.

2. *D. ericoides*, Pers. l. c. Heidenartiger Buccostrauch. In Aethiop. Nov. Dec. Ch. ♂.

3. *D. ciliatum*. Pers. l. c. Gefranzter Buccostrauch. Am Cap. Apr. May. Ch. ♂.

177. *Agathosma*, Agathosma.

1. *A. imbricatum*. Willd. enum. 1. p. 259. Dachziegelblättrige Agathosma. Am Cap. —. Ch. ♂. *Diosma imbricatum*. Pers. l. c.

178. *Gouania*, Gouanie.

1. *G? mauritiana*. Hort. schönbrunnens. Moritzische Gouanie. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♂.

179. *Pittosporum*, Klebsame.

1. *P. undulatum*. Pers. l. c. 1. p. 248. Wellenblättriger Klebsame. Auf den Canarischen Inseln. März — May. Ch. ♂.

2. *P. sinense*. Hort. paris. Chinesischer Klebsame. In China. —. Ch. ♂.

180. *Cedrela*, Cedrele.

1. *C. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechende Cedrele. In Südamer. —. W. H. ♂.

181. *Billardiera*, Billardiere.

1. *B. scandens*. Pers. l. c. 1. p. 249. Rankende Billardiere. In Neuholl. Jän. Febr. Ch. ♂.

182. *Ribes*, Johannisbeere.

1. *R. rubrum*. Pers. l. c. 1. p. 251. Gemei-

ne Johannisbeere. In den nördlichen Gegenden Schwedens u. Englands. May. Im F. ᄁ.

2. *R. petraeum*. Pers. l. c. Rothblühende Johannisbeere. Auf den Steyerschen u. Kärnthen-schen Alpen, dann auf Bergen in Schles. u. Böh-men. May. Im F. ᄁ.

3. *R. prostratum*. Pers. l. c. Niedergestreck-te Johannisbeere. Auf der Ins. Neufundland. May. Im F. ᄁ.

4. *R. alpinum*. Pers. l. c. Alpen-Johannis-beere. Auf Alpen in Eur. May. Im F. ᄁ.

5. *R. nigrum*. Pers. l. c. Schwarze Johan-nisbeere. An den Ufern der Flüsse u. an Zäunen des nördlicheren Eur. u. in Nordamer. May. Im F. ᄁ.

6. *R. floridum*. L'Herit. stirp. nov. 1. p. 4. Pensylvanische Johannisbeere. In Pensylvan. May. Im F. ᄁ.

R. pensylvanicum. Pers. l. c.

7. *R. Diacantha*. Pers. l. c. 1. p. 252. Zwey-stachlige Johannisbeere. In Davurien. May. Im F. ᄁ.

8. *R. Grossularia*. Pers. l. c. Stachlige Jo-hannisbeere. In Wäldern u. Hecken v. Eur. May. Im F. ᄁ.

9. *R. Cynosbati*. Pers. l. c. Stachelfrüchtige Johannisbeere. In Canada. May. Im F. ᄁ.

183. *Hedera*, Epheu.

1. *H. Helix*. Pers. l. c. Gemeiner Epheu. In Eur. an alten Mauern u. Bäumen. Sept. Oct. Im F. ᄁ.

184. Vitis, Wein.

1. *V. vinifera*. Pers. l. c. Gemeiner Wein. Im gemässigten Asien. May, Jun. Im F. h.

2. *V. incisa*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 14. t. 410. Eingeschnittener Wein. In Nordamer.? May. Im F. h.

3. *V. Labrusca*. Pers. l. c. 1. p. 253. Filziger Wein. In Pensylvan. u. Carolina. May. Jun. Im F. h.

4. *V. vulpina*. Pers. l. c. Fuchs-Wein. In Virgin. May, Jan. Im F. h.

5. *V. laciniosa*. Pers. l. c. Petersilien-Wein. — May, Jun. Im F. h.

6. *V. hederacea*. Willd. arb. 410. Epheuartiger Wein. In Canada. May. Jun. Im F. h.

Cissus hederacea. Pers. l. c. 1. p. 143.
Hedera quinquefolia. Lin. sp. pl. 292.

7. *V. arborea*. Lin. sp. pl. p. 294. Baumartiger Wein. In Carol. u. Virgin. May, Jun. K. H. h.

185. Claytonia, Claytonie.

1. *Cl. perfoliata*. Pers. l. c. Durchwachsene Claytonie. In Nordamer. u. auf Cuba. Jul. Aug. Im F. O.

Cl. cubensis. Humboldt et Bonpl. pl. aequin. 1. p. 91. t. 26.

186. Viola, Veilchen.

1. *V. palmata*. Pers. l. c. 1. p. 254. Handförmiges Veilchen. In Virgin. May. K. H. 24.

2. *V. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechendes Veilchen. In Hainen v. Eur. März, Apr. Im F. 24.
β. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.

3. *V. montana*. Pers. l. c. Berg-Veilchen. In Oesterr. u. Deutschlands Auen. May. Im F. 24.

4. *V. lactea*. Pers. l. c. Milchweisses Veilchen. In Oesterr. u. England. May. Im F. 24.

5. *V. mirabilis*. Pers. l. c. 1. p. 255. Verschiedenblüthiges Veilchen. In Deutschl. u. Schwedens Hainen. May. Im F. 24.

6. *V. biflora*. Pers. l. c. Zweyblüthiges Veilchen. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *V. tricolor*. Pers. l. c. Dreyfarbiges Veilchen. Auf bebaute Stellen in Eur. May, Jun. Im F. ⊖.

8. *V. rothomagensis*. Pers. l. c. Normandisches Veilchen. Auf Bergen bey Rouen in Frankr. Jun. — Aug. Im. F. 24.

187. Impatiens, Balsamine.

1. *I. Balsamina*. Pers. l. c. 1. p. 257. Gemeine Balsamine. In Ostind. Jun. — Oct. Im F. ⊖.

2. *I. Nolitangere*. Pers. l. c. Wilde Balsamine. In Hainen v. Eur. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ⊖.

188. Gomphrena. Winterblume.

1. *G. globosa*. Pers. l. c. Kugelrunde Winterblume. In Ostind. Jun. Jul. Im F. ⊖.

2. *G. brasiliensis*. Pers. l. c. Brasilische Winterblume. In Brasilien. Sept. Oct. W. H. ȏ.

3. *G. interrupta*. Pers. l. c. Unterbrochenährige Winterblume. In Jamaica u. Hispaniola. Jul. Aug. W. H. ♂.

189. *Achyranthes*, Spreublume.

1. *A. argentea*. Pers. l. c. 1. p. 258. Weissliche Spreublume. In Sicil. u. am Cap. May — Jul. Ch. 24.

2. *A. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Spreublume. In Ostind. May, Jun. W. H. ♂.

3. *A. lappacea*. Pers. l. c. Klettenartige Spreublume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *A. porrigens*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 54. t. 350. Ausgebreitete Spreublume. In Peru. Jun. — Oct. W. H. ♂.

5. *A. axillaris*. Hornemann. Achselblühige Spreublume. —. Apr. — Aug. W. H. ♂.

190. *Celosia*, Hahnenkamm.

1. *C. cristata*. Pers. l. c. Gemeiner Hahnenkamm. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

2. *C. coccinea*. Pers. l. c. 1. p. 260. Scharlachroter Hahnenkamm. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

3. *C. virgata*. Pers. l. c. Ruthenförmiger Hahnenkamm. —. May — Oct. W. H. ♂.

191. *Illecebrum*, Knorpelblume.

1. *I. lanatum*. Ait. hort. kew. 1. p. 289. Wollige Knorpelblume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

Achyranthes lanata. Pers. l. c. 1. p. 259.

192. Buttneria, Buttnerie.

1. *B. cordata*. Pers. l. c. 1. p. 262. Herzblättrige Buttnerie. In Peru. Apr. — Oct. WV. H. ½.

193. Heliconia, Heliconie.

1. *H. Bihai*. Pers. l. c. 1. p. 263. Spitzblättrige Heliconie. Im wärmer. Amer. an feuchten Stellen. —. WV. H. 2½.

2. *H. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Heliconie. Zu Caracas u. Guiana. —. WV. H. 2½.

3. *H. psittacorum*. Pers. l. c. Papageyen-Heliconie. In Surinam u. Jamaica. —. WV. H. 2½.

194. Strelitzia, Strelitzie.

1. *St. Reginae*. Pers. l. c. Prächtige Strelitzie. Am Cap. Apr. May. WV. H. 2½.

195. Theophrasta, Theophraste.

1. *Th. longifolia*. Pers. l. c. 1. p. 265. Langblättrige Theophraste. Zu Caracas. Jun. — Aug. WV. H. ½.

2. *Th. pinnata*. Jacq. fragm. bot. p. 49. n. 168. t. 64 — 65 — 66. f. 2. Zu Caracas. —. WV. H. ½.

196. Rauwolfia, Rauwolfie.

1. *R. canescens*. Pers. l. c. Graue Rauwolfie. In Jamaica u. den Caraib. Ins. Jun. Jul. WV. H. ½.

197. Ochrosia, Ochrosie.

1. *O. maculata*. Juss. gen. p. 144. Gefleckte Ochrosie. Auf Bourbon u. den Inseln des stillen Meeres. Jun. — Aug. WV. H. ½.

- Ophioxylon Ochrosia*. Pers. l. c. 1. p. 266.

198. Arduina, Arduine.

1. *A. bispinosa*. Mill. ic. t. 300. Zweystachlige Arduine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ᄁ. Carissa Arduina. Pers. l. c.

199. Cerbera, Schellenbaum.

1. *C. Manghas*. Pers. l. c. Ostindischer Schellenbaum. In Ostind. am Wasser. —. W. H. ᄁ.

200. Allamanda, Allamanda.

1. *A. cathartica*. Pers. l. c. 1. p. 524. Purigrende Allamanda. An Flüssen zu Guiana u. Surinam. W. H. ᄁ.

201. Vinca, Sinngrün.

1. *V. minor*. Pers. l. c. 1. p. 267. Kleines Sinngrün. In Wäldern v. Deutschl. Frankr. u. Engl. Jun. Jul. Im. F. ᄁ.

2. *V. herbacea*. Pers. l. c. Krautartiges Sinngrün. In Ungarn. May — Aug. Im F. 24.

3. *V. major*. Pers. l. c. Grosses Sinngrün. Zu Languedoc, Span. u. in der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

4. *V. rosea*, Pers. l. c. Rosenfarbiges Sinngrün. Zu Madagascar, Ceylon u. Java. May — Oct. W. H. ᄁ.

β. flore albo. Mit weisser Blüthe.

γ. — — fauce luteo. Mit weisser Blüthe u. gelben Schlunde.

202. Plumeria, Plumerie.

1. *Pl. rubra*. Pers. l. c. Rothblühende Plumerie. In Jamaica u. Surinam. Jun. VV. H. ♂.
2. *Pl. alba*. Pers. l. c. Weissblühende Plumerie. In Jamaica. —. VV. H. ♂.

203. Tabernaemontana, Tabernae-montane.

1. *T. citrifolia*. Pers. l. c. 1. p. 268. Citronenblättrige Tabernämontane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. ♂.
2. *T. coronaria*. Willd. enum. 1. p. 275. Oleanderartige Tabernämontane. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.
Nerium. coronarium. Pers. l. c. 1. p. 269.
3. *T.*? Von der St. Moritzinsel.

204. Nerium, Oleander.

1. *N. Oleander*. Pers. l. c. 1. p. 269. Ge-meiner Oleander. An den Ufern der Flüsse in Nordafr. u. Ostind. Jun. — Sept. K. H. ♂.
β. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.
γ. — — flavescenti. Mit gelblichgefüllter Blüthe.
2. *N. odorum*. Pers. l. c. Wohlriechender Oleander. In Ostind. Jun. — Aug. VV. H. ♂.

205. Echites, Klammerstrauch.

1. *E. succulenta*. Pers. l. c. 1. p. 271. Saf-tiger Klammerstrauch, Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

2. *E. diffiformis*. Walter fl. carolin. 98. Un-
gestalteter Klammerstrauch. In Carolina. —.
K. H. ♂.

206. *Periploca*, Schlinge.

1. *P. graeca*. Pers. l. c. Griechische Schlinge.
In Syrien u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. ♂.

2. *P. africana*. Pers. l. c. 1. p. 272. Capische
Schlinge. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

207. *Cynanchum*, Hundswürger.

1. *C. viminale*. Pers. l. c. Blattloser Hund-
würger. In Africa u. Ostind. —. VV. H. ♂.

2. *C. crispum*. Pers. l. c. Krauser Hund-
würger. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

3. *C. acutum*. Pers. l. c. 1. p. 273. Spitziger
Hundswürger. In Sicil. Span. u. Astrachan. Jun.
Jul. K. H. ♂.

4. *C. erectum*. Pers. l. c. Aufrechter Hund-
würger. In Syrien. Jun. — Aug. K. H. ♂.

208. *Apocynum*, Apocynum.

1. *A. androsaemifolium*. Pers. l. c. 1. p.
274. Fliegenfangendes Apocynum. In Virgin. u.
Carol. Jun. Jul. Im F. ♀.

209. *Asclepias*, Schwalbenwurz.

1. *A. syriaca*. Pers. l. c. 1. p. 275. Syrische
Schwalbenwurz. Im Orient u. Nordamer. Jul.
Aug. Im F. ♀.

2. *A. curassavica*. Pers. l. c. 1. p. 276. Orangefarbige Schwalbenwurz. In Curassao. Jun. — Aug. W. H. 5.

3. *A. nivea*. Pers. l. c. Weissblüthige Schwalbenwurz. In Virgin. u. dem wärmer. Amer. Jun. Jul. K. H. 24.

4. *A. angustifolia*. Willd. enum. suppl. p. 13. Schmalblättrige Schwalbenwurz. — Jul. Aug. K. H. 24.

5. *A. fuscata*. Willd. l. c. Braune Schwalbenwurz. — — K. H. 24.

6. *A. incarnata*. Pers. l. c. Rothblühende Schwalbenwurz. In Canada u. Virgin. Jul. Aug. Im F. 24.

7. *A. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Schwalbenwurz. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

8. *A. Vincetoxicum*. Lin. sp. pl. p. 314. Gemeine Schwalbenwurz. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

Cynanchum Vincetoxicum. Pers. l. c. 1. p. 274.

9. *A. nigra*. Lin. sp. pl. p. 315. Schwarze Schwalbenwurz. Auf Hügeln zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. 24.

Cynanch. nigrum. Pers. l. c.

10. *A. tuberosa*. Pers. l. c. 1. p. 277. Knollige Schwalbenwurz. In Carol. Jun. — Aug. K. H. 24.

210. Schollia, Schollie.

1. *Sch. crassifolia*. Jacq. eclog. plant. fasc.
1. p. 5. t. 2. Dickblättrige Schollie. An der
Meerenge von Sunda zwischen Sumatra u. Java
u. in China. Jun. — Aug. VV. H. ♂.
Asclepias carnosa. Pers. l. c. 1. p. 275.

211. Stapelia, Stapelie.

1. *St. glauca*. Jacq. Stap. monog. Graugrüne
Stapelie. Am Cap auf sehr trocknen Stellen
wie alle folgende. Jul. Aug. VV. H. ♂.
St. revoluta. Pers. l. c. 1. p. 278.

2. *St. hirsuta*. Pers. l. c. Haarige Stapelie.
Jul. — Sept. VV. H. ♂.

3. *St. patula*. Willd enum. 1. p. 231. Ab-
stehende Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. ♂.
St. sororia. Pers. l. c.

4. *St. sororia*. Willd. l. c. Verschwesterte
Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. ♂.
St. sororia varietas. Jacq. l. c.

5. *St. grandiflora*. Pers. l. c. Grossblühen-
de Stapelie. Jul. Aug. VV. H. ♂.

6. *St. ambigua*. Pers. l. c. Vielblüthige Sta-
pelie. Jul. — Sept. VV. H. ♂.

7. *St. maculosa*. Jacq. l. c. Fleckige Stapelie.
Jul. — Sept. VV. H. ♂.

8. *St. Asterias*. Pers. l. c. Sternförmige Sta-
pelie. Jul. Aug. VV. H. ♂.

9. *St. deflexa*. Jacq. l. c. Herabgebogene Sta-
pelie. Jul. — Oct. VV. H. ♂.

10. *St. bufonia*. Jacq. l. c. Krötten-Stapelie.
Jul. — Sept. VV. H. ♂.
11. *St. trisulca*. Jacq. l. c. Dreyfurchige
Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. ♂.
12. *St. gemmiflora*. Pers. l. c. Knospenblüthi-
ge Stapelie. Jul. Aug. VV. H. ♂.
13. *St. replicata*. Jacq. l. c. Zurückgebogene
Stapelie. Jul. Aug. VV. H. ♂.
14. *St. divaricata*. Pers. l. c. Ausgebreitete
Stapelie. Aug. — Oct. VV. H. ♂.
15. *St. caespitosa*. Pers. l. c. Rasen-Stape-
lie. Jul. Aug. VV. H. ♂.
16. *St. concinna*? Pers. l. c. 1. p. 279. Zier-
liche Stapelie. — VV. H. ♂.
17. *St. glandulifera*. Pers. l. c. Drüsenträg-
ige Stapelie. Jul. Aug. VV. H. ♂.
18. *St. hirtella*. Jacq. l. c. Rauhaarige Sta-
pelie. Jun. Jul. VV. H. ♂.
19. *St. pedunculata*. Pers. l. c. Langstiellige
Stapelie. Jul. Aug. VV. H. ♂.
20. *St. vetula*. Pers. l. c. 1. p. 280. Dunkle
Stapelie. Jul. — Sept. VV. H. ♂.
21. *St. planiflora*. Jacq. l. c. Flachblüthige
Stapelie. Jul. Aug. VV. H. ♂.
22. *St. variegata*. Pers. l. c. Bunte Stapelie.
Jul. — Oct. VV. H. ♂.
23. *St. reticulata*. Pers. l. c. Netzförmige
Stapelie. Jul. Aug. VV. H. ♂.
24. *St. marmorata*. Jacq. l. c. Marmorirte
Stapelie. Aug. Sept. VV. H. ♂.

25. *St. tubata*. Jacq. l. c. Röhrlige Stapelie. Jul.
Aug. VV. H. ᄁ.

26. *St. clavata*, Pers. l. c. Keilenartige Stapelie.
Jul. Aug. Ch. ᄁ.

212. Spigelia, Spigelie.

1. *Sp. marilandica*, Pers. l. c. 1. p. 281.
Marilandische Spigelie. In Virgin. Mariland u.
Carol. May — Jul. K. H. 24.

213. Chironia, Chironie.

1. *Ch. baccifera*. Pers. l. c. 1. p. 282. Bee-
rentragende Chironie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ᄁ.

2. *Ch. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige
Chironie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ᄁ.

DIGYNIA.

214. Gentiana, Entzian.

1. *G. pannonica*. Pers. l. c. 1. p. 284. Pan-
nonischer Entzian. In Oesterr. und Steyerm.
auf Alpen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *G. asclepiadea*. Pers. l. c. Schwalben-
wurzartiger Entzian. Auf Bergen in Oesterr. der
Schweiz, Ital. u. Spanien. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *G. cruciata*. Pers. l. c. Kreuz - Entzian.
Auf sonnigen Hügeln in Oesterr. der Schweiz u.
Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *G. Pneumonanthe*. Pers. l. c. Gemeiner
Entzian. Auf feuchten Wiesen in Eur. u. Amer.
Jun. Jul. Im F. 24.

5. *G. acaulis*. Lin. sp. pl. p. 330. Stengellose Entzian. Auf Alpen im südlichen Eur. Jun. — Jul. Im F. 24.

G. grandiflora. Pers. l. c. 1. p. 285.

6. *G. verna*. Pers. l. c. Frühlings-Entzian. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. der Schweiz u. den Pyrenäen. May — Jul. Im F. 24.

7. *G. Amarella*. Pers. l. c. 1. p. 286. Deutscher Entzian. Auf Bergen in Eur. Jul. — Oct. Im F. 24.

G. germanica. Willd. sp. pl. 1. p. 1346.

8. *G. ciliata*. Pers. l. c. 1. p. 287. Gefranzter Entzian. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Frankr. u. Italien auf Bergen. Jul. — Oct. Im F. 24.

215. *Dichondra*, Zweykorn.

1. *D. sericea*. Pers. l. c. 1. p. 288. Seidenartiges Zweykorn. In Jamaica, Peru u. auf der St. Moritzinsel. Jun. — Aug. W. H. 24.

2. *D. argentea*. Humboldt et Bonpland. Silberblättriges Zweykorn. Im wärmer. Amer. — W. H. 24.

216. *Heuchera*, Heuchere.

1. *H. americana*. Pers. l. c. 1. p. 290. Americanische Heuchere. In Pensylvan. u. Carol. Jun. — Aug. Im F. 24.

217. *Ulmus*, Rüster.

1. *U. campestris*. Pers. l. c. 1. p. 291. Gemeiner Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. 24.

2. *U. suberosa*. Pers. l. c. Kork-Rüster. In Eur. Apr. May. Im F. 24.

3. *U. effusa*. Pers. l. c. Langstieler Rüster.
In Eur. Apr. May. Im F. Ქ.

4. *U. americana*. Pers. l. c. Americanischer
Rüster. In Nordamer. Apr. Im F. Ქ.

5. *U. parvifolia*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p.
6. t. 262. Kleinblättriger Rüster. Am Caspischen
Meere. Sept. Oct. K. H. Ქ.
Planera Richardi. Pers. l. c.

218. Planera, Planere.

1. *Pl. aquatica*. Pers. l. c. Wasserliebende
Planere. An den Ufern der Flüsse Ohio u. Mis-
sisipi. Apr. May. Im F. Ქ.

219. Celtis, Zürgelbaum.

1. *C. australis*. Pers. l. c. Gemeiner Zürgel-
baum. In Südeur. dem Banat u. Nordafr. May.
K. H. Ქ.

2. *C. occidentalis*. Pers. l. c. 1. p. 292.
Americanischer Zürgelbaum. In Virgin. u. Pensyl-
van. May, Jun. Im F. Ქ.

3. *C. Tournefortii*. Pers. l. c. Tourneforti-
scher Zürgelbaum. In Armenien. —. K. H. Ქ.

4. Eine noch unbeschriebene Art aus Luisiana.

220. Atriplex, Melde.

1. *A. Halimus*. Pers. l. c. Strauchartige Mel-
de. Am Meerstrande in Span. Portug. England,
der Barbarey u. Sibir. Jun. Jul. K. H. Ქ.

2. *A. odorata*. Pers. l. c. 1. p. 293. Wohl-
riechende Melde. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. Ქ.
A. albicans. Ait hort. kew. 3. p. 430.

3. *A. portulacoides*. Pers. l. c. Portalak-Melde. An den Europ. Meeresküsten. Jun. Jul. K. H. ♂.

221. Chenopodium, Gaensefuss.

1. *Ch. Botrys*. Pers. l. c. 1. p. 294. Eichenblättriger Gänsefuss. In Südeur. Jun. — Aug. Im F. ○.

2. *Ch. suffruticosum*. Willd. enum. 1. p. 290. Staudenartiger Gänsefuss. In Mexico u. Pennsylvan. Jul. Aug. K. H. ♂.

3. *Ch. pauciflorum*. Von Portenschlag Ledermeyr. Armlühender Gänsefuss. —. May — Jul. K. H. ♂.

4. *Ch. scoparium*. Pers. l. c. 1. p. 295. Besenartiger Gänsefuss. In Krain, Griechenland, China, u. Japan. Aug. Im F. ○.

222. Beta, Mangold.

1. *B. trygina*. Pers. l. c. Dreyweibiger Mangold. In Sirmien u. im Banat. Jan. Im F. 24.

223. Salsola, Salzkraut.

1. *S. Kali*. Pers. l. c. Gemeines Salzkraut. An den Meeresküsten v. Eur. Jun. — Jul. Im F. ○.

2. *S. Soda*. Pers. l. c. Glattes Salzkraut. (Sode). Auf salzigem Boden in Südeur. Jan. Jul. Im F. ○.

3. *S. sericea*. Ait. hort. kew. 1. p. 317. Seidenartiges Salzkraut. Am Cap. —. Ch. ♂.
S. diffusa. Pers. l. c. 1. p. 296.
Chenolea diffusa. Thunb. nov. gen. p. 10.

4. *S. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartiges Salzkraut. Am Meerstrande in Südeur. Jun. Jul. K. H. h.

224. Anredera, Anredere.

1. *A. spicata*. Pers. l. c. 1. p. 297. Aehrentragende Anredere. In Peru. Jun. Jul. VV. H. 24. *Basella vesicaria*. Lámark encycl. 1. p. 382.

225. Bosea, Goldruthenbaum.

1. *B. Yervamora*. Pers. l. c. Canarischer Goldruthenbaum. Auf den Canarisch. Ins. —. Ch. h.

226. Phyllis, Phyllis.

1. *Ph. Nobla*. Pers. l. c. 1. p. 298. Schöne Phyllis. Auf den Canarischen Ins. Jun. Jul. Ch. h.

227. Panax, Kraftwurz.

1. *P. aculeatum*. Ait. hort. kew. 3. p. 448. Stachlige Kraftwurz. In Chiná. Jun. Jul. Ch. h.

228. Cussonia, Cussonie.

1. *C. thyrsiflora*. Lin. suppl. 182. Keilblättrige Cussonie. Am Cap. Jul. Ch. h.
C. thyrsoidea. Per. l. c.

229. Eryngium, Mannstreu.

1. *E. Bourgatti*. Pers. l. c. 1. p. 299. Weißstachlige Mannstreu. In Südfrankr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *E. planum*. Pers. l. c. Flachblättrige Mannstreu. In Oesterr. Südfrankr. Pohlen u. Russland. Jun. Jul. Im F. 24.

230. ASTRANTIA, Astrantie.

1. *A. Epipactis*. Pers. l. c. 1. p. 304. Grüne Astrantie. Auf waldigen Bergen in Innerösterr. Ungarn u. Croatién. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *A. major*. Pers. l. c. Grosse Astrantie. Auf südeurop. Bergen. Jun. — Aug. Im F. ♀.

3. *A. minor*. Pers. l. c. Kleine Astrantie. Auf den Kärnthnerischen, den Schweizeralpen u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. ♀.

231. Bupleurum, Hasenöhrlein.

1. *B. falcatum*. Pers. l. c. Sichelblättriges Hasenöhrlein. Auf Kalkhügeln in Deutschl. u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. ♀.

2. *B. fruticosum*. Pers. l. c. 1. p. 305. Strauchartiges Hasenöhrlein. In Südfrankr. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♂.

3. *B. difforme*. Pers. l. c. Zweyförmiges Hasenöhrlein. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♂.

232. Caucalis, Haftdolde.

1. *C. pulcherrima*. Willd. enum. 1. p. 303. Schönste Haftdolde. Am Caucasus u. in Iberien. Jun. Im F. ♂.
Caucalis orientalis. Pers. l. c. 1. p. 306.

233. Conium, Schierling.

1. *C. maculatum*. Pers. l. c. 1. p. 308. Geleckter Schierling. In Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

234. Athamanta, Hirschwurz.

1. *A. cretensis*. Pers. l. c. 1. p. 310. Gebirgs-Hirschwurz. In Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2^f.

235. Crithmum, Bacille.

1. *C. maritimum*. Pers. l. c. 1. p. 311. See-Bacille. Am Meerstrande. In Eur. Jun. Jul. K. H. 5.

236. Ferula, Seckenkraut.

1. *F. glauca*. Pers. l. c. Graugrünes Seckenkraut. In Sicil. u. Ital. Jul. K. H. 2^f.

237. Laserpitium, Laserkraut.

1. *L. aquilegifolium*. Pers. l. c. 1. p. 312. Ackeleyblättriges Laserkraut. Auf steinigen Hügeln in Oesterr. Jun. Jul. Im F. 2^f.

2. *L. hispidum*. Bieberst. fl. taurico-caucasica 1. p. 221. Borstiges Laserkraut. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 2^f.

238. Heracleum, Heilkraut.

1. *H. angustifolium*. Pers. l. c. 1. p. 314. Schmalblättriges Heilkraut. In Deutschl. Schwaben u. England. Jun. Jul. Im F. 2^f.

2. *H. austriacum*. Pers. l. c. Oesterreichisches Heilkraut. Auf Alpen in Oesterr. Jul. Aug. Im F. 2^f.

239. Ligusticum, Liebstöckel.

1. *L. Levisticum*. Pers. l. c. Gewöhnliches Liebstöckel. Auf den Genuesischen Apenninen. Jun. Jul. Im F. 2^f.

240. Angelica, Engelwurz.

1. *A. Archangelica*. Pers. l. c. 1. p. 315.
Garten-Engelwurz. Auf Alpen in Kärnthen, Lappl.
u. den Carpathen. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *A. sylvestris*. Pers. l. c. Wald-Engelwurz.
Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

241. Sison, Sison.

1. *S. canadense*. Lin. sp. pl. p. 363. Cana-
disches Sison. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. ♀.
Chaerophyllum canadense. Pers. l. c. 1. p. 320.

242. Bubon, Bubon.

1. *B. macedonicum*. Pers. l. c. 1. p. 317.
Macedonisches Bubon. In Macedon. u. Mauritan.
Jan. Jul. K. H. ♂.

2. *B. Galbanum*. Pers. l. c. Galban-Bubon.
Am Cap. Jun. —. Aug. Ch. ♂.

3. *B. laevigatum*. Pers. l. c. Glattes Bubon.
Am Cap. —. Ch. ♂.

243. Aethusa, Gleiss.

1. *Ae. Meum*. Lin. syst. veg. p. 237. Bär-
wurz-Gleiss. Auf Alpenwiesen in Deutschl. der
Schweiz, Ital. u. Spanien. May, Jun. Im F. ♀.
Meum Athamanta. Pers. l. c. 1. p. 319.

* 244. Scandix, Kerbel.

1. *Sc. Cerefolium*. Lin. sp. pl. p. 368. Gemei-
ner Kerbel. Im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.
Chaerophyllum sativum. Pers. l. c. 1. p. 320.

245. **Chaerophyllum**, Kälberkropf.

1. *Ch. aromaticum*. Pers. l. c. Gewürzhafter Kälberkropf. In Oesterr. der Lausitz, Meissen u. Schlesien. Jul. Aug. Im F. 24.

246. **Imperatoria**, Meisterwurz.

1. *J. Ostruthium*. Pers. l. c. 1. p. 321. Gemeine Meisterwurz. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz u. zu Auvergne in Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

247. **Pastinaca**, Pastinak.

1. *P. sativa*. Pers. l. c. 1. p. 322. Gemeiner Pastinak. Auf Wiesen im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *P. Opopanax*. Pers. l. c. Gummiger Pastinak. In Ital. u. Sicil. Jun. Jul. Im F. 24.

248. **Smyrnium**, Smyrnium.

1. *S. perfoliatum*. Pers. l. c. Durchwachsenes Smyrnium. In Ungarn auf dem Kobelberge an der March, Ital. Candien u. Span. May, Jun. Im F. ♂.

2. *S. aureum*. Pers. l. c. Goldfarbiges Smyrnium. Auf Bergen in Carol. —. Im F. 24.

3. *S. integrifolium*. Pers. l. c. Ganzblättriges Smyrnium. In Virgin. Jun. Im F. 24.

249. **Anethum**, Dill.

1. *A. graveolens*. Pers. l. c. 1. p. 323. Gemeiner Dill. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

2. *A. Foeniculum*. Pers. l. c. Fenchel-Dill.
Auf Felsen zu Languedoc, Gasconien u. Made-
ra. Jun. Jul. Im F. 2.

250. *Carum*, Kümmel.

1. *C. Carvi*. Pers. l. c. Gemeiner Kümmel.
Auf Wiesen im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

251. *Apium*, Eppich.

1. *A. Petroselinum*. Pers. l. c. 1. p. 324.
Petersilien-Eppich. In Sardinien an Quellen. Jun.
Jul. Im F. ♂.

2. *A. graveolens*. Pers. l. c. Sellerie-Eppich.
Auf feuchtem salzigen Boden in Eur. Jul. Aug.
Im F. ♂.

252. *Aegopodium*, Giersch.

1. *A. Podagraria*. Pers. l. c. Gemeiner Giersch.
An Zäunen in Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

TRIGYNIA.

253. *Rhus*, Sumach.

1. *Rh. Coriaria*. Pers. l. c. Gerber-Sumach.
In Südeur. Dalmatien, Syrien u. Palästina. Jun.
Jul. K. H. ♂.

2. *Rh. typhinum*. Pers. l. c. Virginischer Su-
mach. (Essigbaum). In Virgin. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *Rh. glabrum*. Pers. l. c. Glatter Sumach.
In Nordamer. Jul. Aug. Im F. ♂.

4. *Rh. Vernix*. Pers. l. c. Firnis-Sumach. In
Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *Rh. succedaneum*. Pers. l. c. Japanischer Sumach. In Japan u. China. Jun. Jul. Ch. ♂.
6. *Rh. Copallinum*. Pers. l. c. Copall-Sumach. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. ♂.
7. *Rh. radicans*. Pers. l. c. 1. p. 325. Wurzeld-der Sumach. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ♂.
- β. *Toxicodendrum*. Mit buchtigen Blättern.
8. *Rh. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende? Sumach. In Nordamer. —. K. H. ♂.
9. *Rh. tomentosum*. Pers. l. c. Filziger Sumach. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.
10. *Rh. villosum*. Pers. l. c. Haariger Sumach. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
11. *Rh. atomarium*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 51. t. 343. Kleingetupfter Sumach. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.
12. *Rh. viminalis*. Pers. l. c. Weidenblättriger Sumach. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
13. *Rh. pendulinum*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 24. t. 449. Hängender Sumach. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.
14. *Rh. Thezera*. Pers. l. c. Fünfblättriger Sumach. In Sicil. u. der Barbarey. —. K. H. ♂.
15. *Rh. Oxyacanthoides*. Pers. l. c. Weiß-dornartiger Sumach. In Africa. —. Ch. ♂.
16. *Rh. laevigatum*. Pers. l. c. 1. p. 326. Un-behaarter Sumach. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♂.
Rh. elongata. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 52. t. 345.

17. *Rh. lucidum*. Pers. l. c. Glänzender Sumach. Am Cap u. in Mexico. Jun. Jul. Ch. ᄁ.

18. *Rh. undulatum*. Pers. l. c. Weilenblättriger Sumach. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. ᄁ.

19. *Rh. Cotinus*. Pers. l. c. Perücken-Sumach. In Oesterr. Ungarn., Südeur. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

20.)

21.) Drey noch unbeschriebene Arten vom Cap.

22.)

254. Viburnum, Schneeball.

1. *V. Tinus*. Pers. l. c. Lorbeerartiger Schneeball. In Portug. Span. Ital. u. der Barba-rey. Jul. Aug. K. H. ᄁ.

β. *lucidum*. Ait. hort. kew. p. 370. Mit glän-zenden Blättern.

Viburn. lucidum. Pers. l. c.

2. *V. rugosum*. Pers. l. c. Runzlicher Schneeball. Auf den Canarischen Ins. —. Ch. ᄁ.

β. *strictum*. Hortulan. Mit geradelienigen Aesten.

3. *V. prunifolium*. Pers. l. c. Pfauenblättriger Schneeball. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

4. *V. dentatum*. Pers. l. c. Gezähnter Schnee-ball. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

5. *V. Lantana*. Pers. l. c. 1. p. 327. Wolliger Schneeball. (Schlingbaum). In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

6. *V. Opulus*. Pers. l. c. Gemeiner Schneeball. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

β. *roseum* Mit durchgehends unfruchtbaren Blüthen.

γ. *foliis variegatis*. Mit gestreiften Blättern.

7. *V. Lentago*. Pers. l. c. Birnenblättriger Schneeball. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♂.

8. *V. cassinoides*. Pers. l. c. Dickblättriger Schneeball. In Nordamer. Jun. Jul. K. H. ♂.

9. *V. punicaefolium*. Catalog. hort. carlsru. han. p. 280. Granatapfelartiger Schneeball. In Nordamer. —. K. H. ♂.

255. Cassine, Cassine.

1. *C. capensis*. Pers. l. c. Capische Cassine. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

2. *C. Maurocenia*. Pers. l. c. Lederblättrige Cassine. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. ♂.

256. Sambucus, Hollunder.

1. *S. Ebulus*. Pers. l. c. 1. p. 328. Zwerg-Hollunder. Attich. Im südlicher. Eur. u. der Barba-rey. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *S. nigra*. Pers. l. c. Gemeiner Hollunder. In Eur. u. Japan. Jun. Jul. Im F. ♂.

β. *foliis variegatis*. Mit gestreiften Blättern.

γ. — *laciniatis*. Mit zerschlitzten Blättern.

3. *S. canadensis*. Pers. l. c. Canadischer Hollunder. In Canada u. Carol. Jun. Jul. Im F. ♂.

4. *S. racemosa*. Pers. l. c. Trauben-Hollunder. Auf waldigen Bergen in Südeur. ^{ap} Jun. Jul. Mai. Im F. ♀.

257. *Staphylea*, Pimpernuss.

1. *St. pinnata*. Pers. l. c. Gemeine Pimpernuss. Im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. ♀.

2. *St. trifolia*. Pers. l. c. Virginische Pimpernuss. In Virgin. Jun. Jul. Im F. ♀.

258. *Tamarix*, Tamariske.

1. *T. gallica*. Pers. l. c. Französische Tamariske. In Südeur. u. Nordasien. Aug. — Ost. Im F. ♀.

2. *T. germanica*. Pers. l. c. Deutsche Tamariske. An Ufern der Flüsse in Deutschl. Jun. Jul. Im F. ♀.

259. *Turnera*, Turnere.

1. *T. ulmifolia*. Pers. l. c. ⁺ p. 329. Rüsterblättrige Turnere. In Jamaika u. anderen Gegen-
den des wärmeren Amer. Jün. — Aug. W. H. ♀.

260. *Modecca*, Modecca.

1. *M. lobata*. Jacq. fragm. bot. p. 82. n. 255. t.
^{331.} Lappige Modecca. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♀.

261. *Basella*, Beerblume.

1. *B. rubra*. Pers. l. c. ^{1.} p. 331. Rothe Beerblume. In Ostind. Jun. W. H. ⊖.

2. *B. alba*. Pers. l. c. Weisse Beerblume. In China u. Amboina. Jun. W. H. ⊖.

3. *B. cordifolia*. Pers. l. c. Herzblättrige Beerblume. In Ostind. Jun. VV. H. ♂.

262. Portulacaria, Portulacbaum.

1. *P. afra*. Pers. l. c. Africanischer Portulacbaum. In Africa. — . Ch. ♂.
Claytonia Portulacaria. Lin. mant. 211.

TETRAGYNIA.

463. Parnassia, Parnassie.

1. *P. palustris*. Pers. l. c. Weisse Parnassie. An sumpfigen Stellen in Eur. Sept. Oct. Im F. 24.

PENTAGYNIA.

264. Aralia, Aralie.

1. *A. arborea*. Pers. l. c. Baumartige Aralie. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. ♂.

2. *A. capitata*. Pers. l. c. Kopfblüthige Aralie. Auf Bergen zu Jamaica u. den Antill. Jul. VV. H. ♂.

3. *A. spinosa*. Pers. l. c. 1. p. 332. Stachlige Aralie. In Virgin. u. Carol. Aug. Im F. ♂.

4. *A. racemosa*. Pers. l. c. Traubige Aralie. In Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

265. Armeria, Grasnelke.

1. *A. vulgaris*. Willd. enum. 1. p. 333. Gemeine Armerie. Auf sandigem Boden in Eur. Jun — Aug. Im F. 24.

Statice Armeria. Pers. l. c.

2. *A. denticulata*. Bertoloni cent. pl. siccil. p. 4. Gezähnelte Grasnelke. In Ital. u. Sicilien. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *A. fasciculata*. Willd. l. c. 1. p. 334. Buschige Grasnelke. Zu Corsica u. Portug. Jun. — Aug. K. H. 24. St. *fasciculata*. Pers. l. c.

4. *A. plantaginea*. Willd. l. c. Wegetrittartige Grasnelke. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *A. latifolia*. Willd. l. c. Breitblättrige Grasnelke. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24. *Statice cephalotes*. Pers. l. c.

266. tatice, Statice.

1. *St. Limonium*. Pers. l. c. 1. p. 333. Meerstrands-Statice. Am Meerstrande in Eur. u. Virgin. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *St. Gmelini*. Pers. l. c. Gmelinsche Statice. In Ungarn u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *St. scoparia*. Pers. l. c. Besen-Statice. In Sibir. Jun. — Aug. Im F. 24.

4. *St. spathulata*. Pers. l. c. Spatelblättrige Statice. Zu Montpellier u. in der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. 24.

5. *St. virgata*. Willd. enum. 1. p. 336. Rutenförmige Statice. In Spanien. Jun. Jul. K. H. 24.

6. *St. tatarica*. Pers. l. c. Tartarische Statice. In der Tartarey. Jun. — Aug. Im F. 24.

7. *St. purpurata*. Pers. l. c. 1. p. 334. Purpurfarbige Statice. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

8. *St. monopetala*. Pers. l. c. Dickblättrige Statice. In Sicil. Jun. — Aug. K. H. ♂. ♂ maior, foliis latioribus. Mit stärkerem Wuchse und breiteren Blättern.

9. *St. sinuata*. Pers. l. c. Leyerblättrige Statice. In Sicil. Palästina u. Africa. Jun. — Aug. K. H. 24.

10. *St. mucronata*. Pers. l. c. Krausblättrige Statice. In der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. ♂.

267. Linum, Flachs.

1. *L. perenne*. Pers. l. c. Ausdauernder Flachs. In Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *L. tenuifolium*. Pers. l. c. 1. p. 335. Feinblättriger Flachs. Auf dünnen Hügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *L. maritimum*. Pers. l. c. Meerstrands-Flachs. In Oesterr. bey Baden, zu Montpellier, im Orient u. in Italien. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *L. austriacum*. Pers. l. c. Oesterreichischer Flachs. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *L. flavum*. Pers. l. c. 1. p. 336. Gelber Flachs. In Oesterr. Deutschl. u. Russland. Jun. — Aug. Im F. 24.

6. *L. trigynum*. Smith. exotic. bot. 1. p. 31.
t. 17. Dreystieliger Flachs. In Ostindien. Jun.
Jul. VV. H. ♂.

268. Crassula, Dickblatt.

1. *Cr. coccinea*. Lin. sp. pl. p. 404. Schar-
lachrothes Dickblatt. Ist wie die meisten fol-
genden am Cap u. in Aethiop. zu Hause. Jun.
Jul. Ch. ♂.

Larochea coccinea. Pers. l. c. 1. p. 337.

2. *Cr. dejecta*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 16
t. 433. Liegendes Dickblatt. Jul. — Sept. Ch. ♂.

3. *Cr. alba*. Hort. carlsruhan. Weisses Dickblatt.
—. —. Ch. ♂.

4. *Cr. falcata*. Wendl. obs. 44. Sichelblättri-
ges Dickblatt. Jul. — Sept. Ch. ♂.

Larochea falcata. Pers. l. c.

β. major. Mit stärkerem Wuchse.

5. *Cr. perfoliata*. Pers. l. c. 1. p. 338. Durch-
wachsenes Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♂.

6. *Cr. perforata*. Pers. l. c. Durchstochenes
Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♂.

Cr. perfosa. Decand. pl. succ. t. 25.

Cr. perfoliata. Scop. del. fl. et faun. insub. 3. p.
12. t. 6.

7. *Cr. mollis*. Pers. l. c. Weiches Dickblatt.
Jun. Jul. Ch. ♂.

8. *Cr. tetragona*. Pers. l. c. Viereckiges Dick-
blatt. Jun. Jul. Ch. ♂.

9. *Cr. imbricata*. Pers. l. c. Schuppenblättri-
ges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. ♂.

10. *Cr. oviflora*. Pers. l. c. Messerrücken förmiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. 5.
11. *Cr. capitata*. Dum. Cours. botaniste cultivateur 5. p. 272. Kopfförmiges Dickblatt. —. Ch. 5.
12. *Cr. cultrata*. Pers. l. c. Messerförmiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. 5.
13. *Cr. portulacacea*. Pers. l. c. Portulacartiges Dickblatt. Jän. Fehr. Ch. 5.
14. *Cr. spathulata*. Pers. l. c. Spatelblättriges Dickblatt. May — Aug. Ch. 5.
15. *Cr. marginalis*. Pers. l. c. Punktirträdiges Dickblatt. May — Decemb. Ch. 5.
16. *Cr. cordata*. Pers. l. c. Herzblättriges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. 5.
17. *Cr. lactea*. Pers. l. c. Milchfarbiges Dickblatt. Jän. — März. Ch. 5.
18. *Cr. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiges Dickblatt. Jun. Jul. Ch. 5.
C. Cotyledon. Jacq. misc. 2. p. 295. t. 19.
19. *Cr. acutifolia*. Pers. l. c. 1. p. 339. Spitzblättriges Dickblatt. —. —. Ch. 5.
20. *Cr. orbicularis*. Pers. l. c. 1. p. 340. Sternblättriges Dickblatt. Jul. Aug. Ch. 24.
21. *Cr. pellucida*. Pers. l. c. Durchscheinendes Dickblatt. Jul. Aug. Ch. 24.
22. *Cr. Umbella*. Jacq. collect. 4. p. [172. Icon. pl. rar. 2 t. 352. Dolden-Dickblatt. Am Cap. Jänn. Febr. Ch. 24.]

POLYGYNIA.

269. Zanthorhiza, Gelbwurz.

1. *Z. apiifolia*. Pers. l. c. 1. p. 341. Selle-
rieblättrige Gelbwurz. In Neugeorgien u. Carol.
März, Apr. K. H. ½.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

270. Musa, Pisang.

1. *M. paradisiaca*. Pers. l. c. 1. p. 343. Ge-
meiner Pisang. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. 24.

2. *M. maculata*. Jacq. hort. schönbr. 4. p.
23. t. 446. Gefleckter Pisang. Auf der St. Mo-
ritzinsel. Jun. — Aug. W. H. 24.

3. *M. rosacea*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 22.
t. 445. Rosenartiger Pisang. Auf der St. Mo-
ritzinsel. Novemb. — Apr. W. H. 24.

4. *M. sapientium*. Pers. l. c. Bananen-Pi-
sang. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. 24.

5. *M. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrother
Pisang. In China. Jun. — Aug. W. H. 24.

271. Bromelia, Ananas.

1. *Br. Ananas*. Pers. l. c. Gemeine Ananas.
Im wärmer. Amer. May, Jun. W. H. ½.

2. *Br. Karatas.* Pers. l. c. 1. p. 344. Wilde Ananas. In Südamer. May, Jun. W. H. ½.

3. *Br. chrysanthæ.* Pers. l. c. Goldfarbige Ananas. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ½.

4. *Br. humilis.* Pers. l. c. Niedrige Ananas. —. May, Jun. W. H. ½.

272. Pitcairnia, Pitcairnie.

1. *P. bromeliaefolia.* Pers. l. c. Ananasblättrige Pitcairnie. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. 2.

2. *P. latifolia.* Pers. l. c. Breithblättrige Pitcairnie. In Westind. Jun. Jul. W. H. 2.

273. Tillandsia, Tillandsie.

1. *T. lingulata.* Pers. l. c. 1. p. 345. Zungenblättrige Tillandsie. In Südamerica schmarotzend auf alten Bäumen. —. W. H. ½.

274. Tradescantia, Tradescantie.

1. *Tr. virginica.* Pers. l. c. 1. p. 346. Virginische Tradescantie. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *Tr. discolor.* Pers. l. c. 1. p. 347. Violettblättrige Tradescantie. Am Mexicanisch. Meerbussen. Jun. Jul. W. H. 2.

3. *Tr. Zanonia.* Pers. l. c. Scheidenblüthige Tradescantie. In Jamaica u. Guiana. Jun. Jul. W. H. ½.

275. Pontederia, Pontederie.

1. *P. cordata.* Pers. l. c. 1. p. 348. Herzblättrige Pontederie. In Wässern v. Virgin. Jun. Jul. K. H. 2.

276. Haemanthus, Blutblume.

1. *H. coccineus*. Pers. l. c. Scharlachrothe Blutblume. Am Cap sammt den folgenden. Jul. Aug. Ch. 24.
2. *H. coarctatus*. Pers. l. c. Gedrängtblüthige Blutblume. Aug. Ch. 24.
3. *H. hyalocarpus*. Jacq. hort schoenbr. 4. p. 5. t. 409. Glasfrüchtige Blutblume. Am Cap. Sept. Ch. 24.
4. *H. puniceus*. Pers. l. c. Dunkelrothe Blutblume. Jul. Aug. Ch. 24.
5. *H. tigrinus*. Pers. l. c. Getiegerte Blutblume. Jun. Jul. Ch. 24.
6. *H. quadrivalvis*. Pers. l. c. Vierklappige Blutblume. Jun. Jul. Ch. 24.
7. *H. albiflos*. Pers. l. c. Weisse Blutblume. Jun. — Aug. Ch. 24.
8. *H. moschatus*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 6. t. 410. Bisamduftende Blutblume. Jul. Aug. Ch. 24.

277. Massonia, Massonie.

1. *M. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättrige Massonie. Am Cap, wie alle folgende. Aug. Sept. Ch. 24.
2. *M. pustulata*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 27. t. 454. Blasige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.
3. *M. angustifolia*. Pers. l. c. 1. p. 349. Schmalblättrige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.

4. *M. longifolia*. Pers. l. c. Langblättrige Massonie. Aug. Sept. Ch. 24.

278. *Galanthus*, Schneeglöckchen.

1. *G. nivalis*. Pers. l. c. Gemeines Schneeglöckchen. Auf Wiesen in Österr. Deutschl. u. Ital. Febr. März. Im F. 24.

279. *Leucoium*, Knotenblume.

1. *L. vernum*. Pers. l. c. Frühlings-Knotenblume. In Auen von Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Ital. Apr. May. Im F. 24.

2. *L. aestivum*. Pers. l. c. Sommer-Knotenblume. In Oesterreich. u. Südeur. auf Sumpfwiesen. May, Jun. Im F. 24.

280. *Strumaria*, Kropflilie.

1. *St. linguaefolia*. Pers. l. c. Zungenblättrige Kropflilie. Am Cap. Aug. — Oct. Ch. 24.

2. *St. filifolia*. Pers. l. c. Fadenblättrige Kropflilie. Am Cap. Sept. Oct. Ch. 24.

281. *Tulbagia*, Tulbagie.

1. *T. alliacea*. Pers. l. c. Knoblauchartige Tulbagie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

282. *Narcissus*, Narzisse.

1. *N. poëticus*. Pers. l. c. Rothrandige Narzisse. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz Ital. u. Languedoc. May, Jun. Im F. 24.

2. *N. Pseudo-Narcissus*. Pers. l. c. 1. p.

350. Gemeine Narzisse. In Deutschl. Ital. Span. Engl. u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

3. *N. odorus*. Pers. l. c. Wohlriechende Narzisse. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

4. *N. Tazetta*. Pers l. c. Tazetten-Narzisse. Am Meerstrande in Südeur. May, Jun. Im F. 24.

5. *N. Jonquilla*. Pers. l. c. Jonquillen-Narzisse. In Span. u. im Orient. May, Jun. Im F. 24.

283. Pancratium, Gilgen.

1. *P. curibaeum*. Pers. l. 1. p. 351. Caraibische Gilgen. In Jamaika u. den Caraibisch. Ins. May — Oct. W. H. 24.

2. *P. maritimum*. Pers. l. c. Meerstrands-Gilgen. Am Meerstr. in Span. u. Südfrankr. Jun., Jul. K. H. 24.

3. *P. littorale*. Pers. l. c. Ufer-Gilgen. Auf der Insel Terrabomba im wärmeren Amer. Jul. Aug. W. H. 24.

4. *P. declinatum*. Pers. l. c. Niedergebogene Gilgen. Anf den Antillen. —. W. H. 24.

5. *P. illyricum*. Pers. l. c. Illyrische Gilgen. Am Meerstrande in Frankr. Jun. Jul. K. H. 24.

6. *P. amboinense*. Pers. l. c. Amboinische Gilgen. Auf Amboina. —. W. H. 24.

284. Crinum, Hackenlilie.

1. *Cr. asiaticum*. Pers. l. c. 1. p. 352. Asiatische Hackenlilie. In Malabar, Zeylon u. Amer. Jul. Aug. W. H. 24.

2. *Cr. americanum*. Pers. l. c. Americanische Hackenlilie. Im wärmer Amer. Jun. Jul. W. H. 24.

3. *latifolium*. Mit breiteren Blättern.

3. *Cr. Commelinii*. Jacq. hort. schönbr. 2. p. 40. t. 202. Commelinische Hackenlilie. Im wärmer. Amer. May — Aug. W. H. 24.

4. *Cr. bracteatum*. Pers. l. c. Beblätterte Hackenlilie. —. Aug. Sept. W. H. 24.

285. *Agapanthus*, Schmucklilie.

1. *A. umbellatus*. Pers. l. c. Doldenblüthige Schmucklilie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *A. praecox*. Willd. enum. 1. p. 353. Frühe Schmucklilie. Am Cap. Apr. May. Ch. 24.

286. *Anigosanthos*, Anigosanthos.

1. *A. flava*. Redouté pl. liliac. 3. n. 176 Gelblicher Anigosanthos. In Neuholl. Jul. Aug. Ch. 24.

287. *Cyrtanthus*, Bogenlilie.

1. *C. ventricosus*. Pers. l. c. Bauchige Bogenlilie. Am Cap. Dec. — Febr. Ch. 24.
C. angustifolius. Jacq. hort schoenbr. 1. p. 40. t. 76.

2. *C. obliquus*. Pers. l. c. Grossblüthige Bogenlilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

288. *Amaryllis*, Amaryllis.

1. *A. lutea*. Pers. l. c. Gelbe Amaryllis. In Span. Ital. u. der Tartarey. Sept. Oct. Im F. 24.

2. *A. formosissima*. Pers. l. c. 1. p. 353. Schönste Amaryllis. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. W. H. 24.

3. *A. reginae*. Pers. l. c. Königliche Amaryllis. Auf den Caraibisch. Ins. Apr. May W. H. 24.

4. *A. Belladonna*. Pers. l. c. Westindische Amaryllis. Auf den Caraibischen Ins. u. in Surinam. Aug. Sept. VV. H. 24.

5. *A. vittata*. Pers. l. c. Gebänderte Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

6. *A. ornata*. Pers. l. c. 1. p. 354. Zierliche Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

7. *A. longifolia*. Pers. l. c. Langblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

8. *A. aurea*. Pers. l. c. Goldne Amaryllis. In China. Jul. Aug. Ch. 24.

9. *A. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische. Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

10. *A. Josephinia*. Red. plant. liliac. 7. n. 370. Josephinische Amaryllis. In Mittelafrica. Jun. Jul. VV. H. 24.

11. *A. sarniensis*. Pers. l. c. Japanische Amaryllis. In Japan u. auf der Ins. Guernsey. Jul. — Sept. Ch. 24.

β. flore pallido. Mit bläfsrother Blüthe.

γ. capensis. Japanische Amaryllis vom Cap.

12. *A. curvifolia*. Pers. l. c. Krummblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

13. *A. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättrige Amaryllis. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. 24.

14. *A. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Amaryllis. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24.

15. *A. flexuosa*. Pers. l. c. Gebogene Amaryllis. Am Cap. Sept. — Decemb. Ch. 24.

16. *A. Radula*. Pers. l. c. Raspelblättrige Amaryllis. Am Cap. Novemb. Decemb. Ch. 24.

17. *A. crispa*. Pers. l. c. 1. p. 355. Krause Amaryllis. Am Cap. Novemb. Decemb. Ch. 24.

289. Allium, Lauch.

1. *A. flavum*. Pers. l. c. 1. p. 356. Gelbes Lauch. In Oesterr. u. zu Montpellier auf Kalkgebirge. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. angulosum*. Pers. l. c. 1. p. 357. Eckiges Lauch. In Deutschl. u. Sibir. an feuchten Stellen. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *A. striatum*. Pers. l. c. Gestreiftes Lauch. Am Cap. Blüht im Herbste u. Winter. Ch. 24.

4. *A. nigrum*. Pers. l. c. Schwarzes Lauch. Im Oesterreichischen Litorale, zu Algier u. in der Provence. Jun. Jul. Im F. 24.

A. multibulbosum. Jacq. fl. austr. 1. p. 9. t. 10.

5. *A. ursinum*. Pers. l. c. Bären-Lauch. In feuchten Hainen des nördlicher. Eur. May. Im F. 24.

6. *A. clusianum*. Pers. l. c. Clusisches Lauch. In Südeur. Istrien, Dalm. May, Jun. Im F. 24.

7. *A. fistulosum*. Pers. l. c. 1. p. 358. Röhrenstieliges Lauch. —. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *A. sibiricum*. Pers. l. c. Sibirisches Lauch. Auf den Alpen Steyermarkts u. Schlesiens. Jul. Aug. Im F. 24. *Sibirien*

290. Bonapartea, Bonapartea.

1. *B. juncea*. Ruiz et Pavon flora peruv. 3. p. 38. t. 262. Simsenartige Bonapartea. In Peru.
— W. H. t.

291. Lilium, Lilie.

1. *L. candidum*. Pers. l. c. Weisse Lilie. In Palästina, Syrien u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *L. bulbiferum*. Pers. l. c. Feuer-Lilie. Im südlicher. Eur. Oesterreich u. Sibirien auf Felsen. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *L. chalcedonicum*. Pers. l. c. 1. p. 359. Chalcedonische Lilie. In Persien u. Krain. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *L. Martagon*. Pers. l. c. Gelbwurzlige Lilie. In Wäldern v. Deutschl. der Schweiz, Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *L. tigrinum*. Ait. hort. kew. ed. 2. p. 241. Getiegerte Lilie. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 24.

292. Fritillaria, Schachblume.

1. *Fr. pyrenaica*. Pers. l. c. Pyrenäische Schachblume. Auf den Pyrenäen u. in Russland. Jun. Im F. 24.

2. *Fr. imperialis*. Pers. l. c. Buschige Schachblume. In Persien. May — Jul. Im F. 24.

3. *latea*. Mit gelben Blüthen.

293. Eucomis, Schopflilie.

1. *E. nana*. Pers. l. c. 1. p. 360. Zwerg-Schopflilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

2. *E. regia*. Pers. l. c. Königliche Schopf-lilie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 2*f*.

3. *E. punctata*. Pers. l. c. Punktirte Schopf-lilie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 2*f*.

294. Gloriosa, Prachtlilie.

1. *Gl. superba*. Pers. l. c. Rankenblättrige Prachtlilie. Auf Malabar. Jun. Jul. VV. H. 2*f*.

295. Tulipa, Tulpe.

1. *T. sylvestris*. Pers. l. c. Willde Tulpe. In Südeur. Sibir. u. im Orient. May, Jun. Im F. 2*f*.

2. *T. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende Tulpe. In Südeur. May, Jun. Im F. 2*f*.

3. *T. Gesneriana*. Pers. l. c. 1. p. 361. Gemeine Tulpe. In der Krim, am Caspischen Meere u. im Orient. Apr. May. Im F. 2*f*,

296. Albuca, Stiftblume.

1. *A. altissima*. Pers. l. c. Höchste Stiftblume. Am Cap wie alle folgende. Jul. Aug. Ch. 2*f*.

2. *A. major*. Pers. l. c. Große Stiftblume. Apr. — Jun. Ch. 2*f*.

3. *A. setosa*. Pers. l. c. Borstige Stiftblume. Apr. May. Ch. 2*f*.

4. *A. aurea*. Pers. l. c. Goldfarbige Stiftblume. May, Jun. Ch. 2*f*.

5. *A. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechende Stiftblume. May, Jun. Ch. 2*f*.

6. *A. viscosa*. Pers. l. c. Klebrige Stiftblume May — Jul. Ch. 2*f*.

7. *A. spiralis*. Pers. l. c. Spiralblättrige Stiftblume. May — Jul. Ch. 24.

297. *Hypoxis*, Härtling,

1. *H. sobolifera*. Pers. l. c. 1. p. 363. Wuchernder Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

2. *H. obliqua*. Pers. l. c. Gedrehtblättriger Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *H. alba*. Pers. l. c. Weisser Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

4. *H. verratrifolia*. Pers. l. c. Germerblättriger Härtling. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

H. plicata. Jacq. ic. rar. 2. t. 367. Collect. suppl. 55.

298. *Eriospermum*, Wollensame.

1. *E. latifolium*. Pers. l. c. 1. p. 363. Breitblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.

2. *E. lanuginosum*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 7. t. 264. Wollblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.

3. *E. lanceaefolium*. Pers. l. c. Lanzenblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.

4. *E. parvifolium*. Pers. l. c. Kleinblättriger Wollensame. Am Cap. Aug. Ch. 24.

299. *Ornithogalum*, Vogelmilch.

1. *O. umbellatum*. Pers. l. c. 1. p. 364. Doldenblüthige Vogelmilch. In Deutschl. Frankr. u. im Orient. May. Im F. 24.

2. *O. lacteum*. Pers. l. c. Milchweisse Vogelmilch. Am Cap. Aug. Ch. 24.

3. *O. altissimum.* Pers. l. c. Höchste Vogelmilch. Am Cap. —. Ch. 24.
O. giganteum. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 45. t. 87.

4. *O. arabicum.* Pers. l. c. 1. p. 365. Arabische Vogelmilch. Bey Alexandrien in Aegypt. u. zu Madera. —. Ch. 24.

5. *O. thrysoides.* Pers. l. c. Straußartige Vogelmilch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

6. *O. aureum.* Pers. l. c. Goldne Vogelmilch. Am Cap. Apr. May. Ch. 24.

7. *O. caudatum.* Pers. l. c. Geschwänzte Vogelmilch. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

8. *O. nutans.* Pers. l. c. Hängendblüthige Vogelmilch. In Deutschl. Ital. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

300. *Scilla*, Meerzwiebel.

1. *Sc. maritima.* Pers. l. c. Gemeine Meerzwiebel. In Span. Portug. Sicilien u. Syrien. May, Jun. K. H. 24.

2. *Sc. peruviana.* Pers. l. c. 1. p. 366. Peruvianische Meerzwiebel. In Portug. u. der Barbarey. Jän. Febr. K. H. 24.

3. *Sc. aquatica.* Pers. l. c. Schöne Meerzwiebel. In Oester. Deutschl. u. Russland. May, Jun. Im F. 24.

4. *Sc. campanulata.* Pers. l. c. Glockenblüthige Meerzwiebel. In Span. u. Portug. May, Jun. K. H. 24.

5. *Sc. bifolia.* Pers. l. c. Zweyblättrige Meerzwiebel. In Auen v. Deutschl. u. Frankr. März. Apr. Im F. 24.

301. Asphodelus, Affodil.

1. *A. luteus*. Pers. I. c. 1. p. 357. Gelber Affodil. In Sicil. u. im Orient. Jun. Im F. 2 $\frac{1}{2}$.

2. *A. fistulosus*. Pers. I. c. Röhriger Affodil. In Span. der Provence u. in Candien. May, Jun. Im F. 2 $\frac{1}{2}$.

302. Anthericum, Zaunblume.

1. *A. revolutum*. Lin. sp. pl. p. 445. Zurückgebogene Zaunblume. Am Cap. May, Jun. Ch. 2 $\frac{1}{2}$. Phalangium revolutum. Pers. I. c. 1. p. 368.
A. divaricatum. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 7. t. 414.

2. *A. ramosum*. Lin. I. c. Aestige Zaunblume. Auf Kalkhügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. 2 $\frac{1}{2}$. Phalang. ramosum. Pers. I. c.

3. *A. pendulum*. Hornem. catalog. hort. hafniens p. 4. Hängende Zaunblume. In Neuholl. Jun. Ch. 2 $\frac{1}{2}$.

4. *A. Liliago*. Lin. I. c. Gemeine Zaunblume. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 2 $\frac{1}{2}$. Phalang. Liliago. Pers. I. c. 1. p. 369.

5. *A. pusillum*. Jacq. ic. rar. 3. t. 417. Collect. suppl. 95. Kleinste Zaunblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 2 $\frac{1}{2}$. Phalang. pusillum. Pers. I. c.

303. Bulbine, Bulbine.

1. *B. frutescens*. Willd. enum. I. p. 372. Strauchartige Bulbine. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 2 $\frac{1}{2}$. Antheric. frutescens. Pers. I. c.

2. *B. rostrata*. Willd. l. c. Schnabelbättrige
Bulbine. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.
Antheric. rostratum. Pers. l. c.

3. *B. alooides*. Willd. l. c. Aloeblättrige
Bulbine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♀.
Antheric. Aloides. Pers. l. c.

4. *B. longiscapa*. Willd. l. c. Langschaftige
Bulbine. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
Antheric. longiscapum. Pers. l. c.

304. Asparagus , Spargel.

1. *A. officinalis*. Pers. l. c. 1. p. 370. Gemeiner
Spargel. Auf sandigem Boden in Eur. Jun. Im F. 24.

2. *A. decumbens*. Pers. l. c. Liegender Spar-
gel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

3. *A. flexuosus*. Pers. l. c. Bogiger Spargel
Am Cap. — . Ch. 24.

4. *A. scandens*. Pers. l. c. Kletternder Spar-
gel. Am Cap. — . Ch. 24.

5. *A. falcatus*. Pers. l. c. Sichelblättriger
Spargel. In Ceylon. — . Ch. ♂.

6. *A. retrofractus*. Pers. l. c. 1. p. 371. Ler-
chenbaumblättriger Spargel. In Africa. — . Ch. ♂.

7. *A. aethiopicus*. Pers. l. c. Aethiopischer
Spargel. Am Cap. — . Ch. 24.

8. *A. asiaticus*. Pers. l. c. Asiatischer Spar-
gel. In Asien. — . Ch. ♂.

9. *A. capensis*. Pers. l. c. Capischer Spar-
gel. Am Cap. — . Ch. ♂.

305. Dracaena, Drachenbaum.

1. *Dr. Draco*. Pers. l. c. Gemeiner Drachenbaum. In Ostind. u. den Canarisch. Ins. —. W. H. ♂.

2. *Dr. tessellata*. Willd. enum. 1. p. 374. Ge-würfelter Drachenbaum. Auf Madagascar. —. W. H. ♂.

D. marginata. Pers. l. c.

3. *Dr. umbraculifera*. Pers. l. c. Schatten-reicher Drachenbaum. Das eigentliche Vaterland dieser Pflanze ist unbekannt; cultivirt findet man sie aber auf der St. Moritzinsel. Jän. Febr. W. H. ♂.

4. *Dr. terminalis*. Pers. l. c. 1. p. 372. Grän-zendrachenbaum. In Ostind. u. China. Jän. — März. W. H. ♂.

5. *D. reflexa*. Pers. l. c. Zurückgebogener Drachenbaum. Auf der St. Moritzinsel. W. H. ♂.

6. Eine noch unbeschriebene Art von der Insel Bourbon.

306. Dianella, Dianelle.

1. *D. nemorosa*. Pers. l. c. Hain-Dianelle. In Ostind. Apr. — Sept. W. H. ♀.
Dracaena ensifolia. Lin. syst. veg. 275.

2. *D. coerulea*. Willd. enum. 1. p. 375. Blaublühende Dianelle. In Mexico. März, Apr. W. H. ♀.

307. Sansevieria, Sanseviere.

1. *S. guinensis*. Pers. l. c. Guineensische Sanseviere. Zu Guinea. Jun. Jul. VV. H. 24.
2. *S. zeylanica*. Pers. l. c. Zeylonische Sanseviere. In Zeylon u. Ostind. Jun. Jul. VV. H. 24.
3. *S. pumila*. Decand. catal. hort. bot. monspel. p. 58. Niedrige Sanseviere. —. —. VV. H. 24.

308. Convallaria, Mayblümchen.

1. *C. mayalis*. Pers. l. c. Gemeines Mayblümchen. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. Apr. — Jun. Im F. 24.
2. *C. japonica*. Pers. l. c. Japanisches Mayblümchen. Japan. Jul. Aug. Ch. 24.
3. *C. Polygonatum*. Pers. l. c. 1. p. 373. Weißwurziges Mayblümchen. In Hainen des nördlicher Eur. Jun. Jul. Im F. 24.
4. *C. multiflora*. Pers. l. c. Vielblüthiges Mayblümchen. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. u. Amer. Jun. Jul. Im F. 24.
5. *C. latifolia*. Pers. l. c. Breitblättriges Mayblümchen. In Wäldern v. Österr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.
6. *C. bifolia*. Pers. l. c. Zweyblättriges Mayblümchen. In Wäldern v. Eur. u. Nordamer. Jan. Jul. Im F. 24.

309. Polyanthes, Tuberose.

1. *P. tuberosa*. Pers. l. c. 1. p. 374. Gemeine Tuberose. In Java u. Ceylon. Aug. Sept. VV. H. 24..

2. *P. pygmaea*. Pers. l. c. Zwerp-Tuberos. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

310. *Drimia*, Giftlilie.

1. *Dr. ciliaris*. Pers. l. c. Gefranzte Giftlie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

2. *Dr. pusilla*. Pers. l. c. Niedrige Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

3. *Dr. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättrige Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

4. *Dr. media*. Pers. l. c. Mittlere Giftlilie. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

311. *Hyacinthus*, Hyacinthe.

1. *H. non scriptus*. Pers. l. c. Englische Hyacinthe. In Engl. Frankr. Span. u. Ital. Jun. Im F. 24.

2. *H. orientalis*. Pers. l. c. 1. p. 375. Gemeine Hyacinthe. In Asien u. Africa. May, Jun. Im F. 24.

3. *H. corymbosus*. Pers. l. c. Doldentraubige Hyacinthe. Am Cap. Aug. Sept. Ch. 24.

312. *Muscari*, Muscathyacinthe.

1. *M. moschatum*. Willd. enum. 1. p. 378. Bisamduftende Muscathyacinthe. In Asien jenseits des Bosphorus. May, Jun. Im F. 24. Hyacinth. Muscari. Pers. l. c.

2. *M. comosum*. Willd. l. c. Schopfblüthige Muscathyacinthe. In Frankr. dem östlich. Eur. u. Persien. Jun. Jul. Im F. 24.

Hyacinth. comosus. Pers. l. c.

3. *M. racemosum*. Willd. l. c. Trauben-Muscathyacinthe. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24. *Hyacinth. racemosus*. Pers. l. c.

313. Phormium, Flachslielie.

1. *Ph. tenax*. Pers. l. c. Zähe Flachslielie. In Neuseeland. —. Ch. 24.

314. Zuccagnia, Zuccagnie.

1. *Z. viridis*. Thunb. prodr. 192. Grüne Zuccagnie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24. *Hyacinth. viridis*. Pers. l. c.
Lachenalia — Ait. hort. kew. 1.p. 462.

315. Lachenalia, Lachenalie.

1. *L. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Lachenalie. Am Cap mit den folgenden Arten dieser Gattung. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *L. pallida*. Pers. l. c. 1.p. 376. Bleiche Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *L. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

4. *L. pusilla*. Pers. l. c. Kleinste Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

5. *L. lanceaefolia*. Pers. l. c. Lanzenblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

6. *L. unifolia*. Pers. l. c. Einblättrige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

7. *L. tricolor*. Pers. l. c. 1.p. 377. Dreyfarbige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

β *luteola*. Mit gelblicher Blüthe.

8. *L. pendula*. Pers. l. c. Hängende Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

9. *L. quadricolor*. Pers. l. c. Vierfarbige Lachenalie. Jul. Aug. Ch. 24.

Nebst einigen anderen noch unbeschriebenen Arten.

316. *Veltheimia*, Veltheimie.

1. *V. viridifolia*. Pers. l. c. Grünblättrige Veltheimie. Am Cap. Jän. — März. Ch. 24.

2. *V. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Veltheimie. Am Cap. Dec. — Febr. Ch. 24.

3. *V. sarmentosa*. Pers. l. c. Wurzeltreibende Veltheimie. Am Cap. Febr. März. Ch. 24. *Aletris sarmentosa*. Andrew. bot. reposit. p. 54. t. 54.

4. *V. Uvaria*. Pers. l. c. Traubenblüthige Veltheimie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24. *Aletris Uvaria*. Lin. syst. veg. 277.

317. *Aletris*, Aletris.

1. *A. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechende Aletris. In Africa. May — Aug. W. H. h.

2. A? *virginica*. Cuius?

318. *Yucca*, Yucce.

1. *Y. gloriosa*. Pers. l. c. 1. p. 378. Prächtige Yucca. In Carolina. Jul. — Sept. K. H. h.

2. *Y. aloifolia*. Pers. l. c. Aloeblättrige Yucca. In Carolina, Florida u. Mexico. Jul. Aug. W. H. h.

3. *Y. Draconis*. Pers. l. c. Drachenbaumartige Yucca. Im wärmer. Amer. — W. H. h.

4. *Y. filamentosa*. Pers. l. c. Fadige Yucca. In Virgin. u. Carol. —. Ch. 5.

319. *Rhipidodendrum*, Fächerbaum.

1. *Rh. distichum*. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin. 1811. p. 5. Zweizeiliger Fächerbaum. In Africa. Jun. — Aug. Ch. 5.

Aloë plicatilis. Pers. l. c. 1. p. 379.

2. Eine noch unbeschriebene Art.

320. *Lomatophyllum*, Saumblatt.

1. *L. borbonicum*. Willd. l. c. Bourbonisches Saumblatt. Auf Bourbon. —. VV. H. 5.

Aloë marginalis. Decand. pl. succ. p. 31. t. 31,

321. *Apicra*, Apicre,

1. *A. arachnoides*. Willd. l. c. Weichstachlige Apicre. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

Aloë arachnoid. Pers. l. c.

2. *A. atrovirens*. Willd. l.c. 1. p. 8. Schwarze Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.
Aloë atrovir. Pers. l. c.

3. *A. mirabilis*. Willd. l. c. 1. p. 9. Wunderbare Apicre. Am Cap. Aug. Ch. 24.

Aloë mirabilis. Haworth act. soc. lin. lond. 7. p. 9.

4. *A. margaritifera* β major. Willd. l. c. Grossperlige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

Aloë margaritif. Pers. l. c.

γ . minor. Mit kleineren Perlen.

5. *A. attenuata*. Willd. l. c. p. 10. Verdünnte Apicre. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.
Aloë attenuata. Haw. l. c. 7. p. 11.

6. *A. radula*. Willd. l. c. Raspelblättrige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.
Aloë radula. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 11. t. 422.

7. *A. retusa*. Willd. l. c. p. 11. Abgestutzte Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.
Aloë retusa. Pers. l. c.

8. *A. cymbaeformis*. Willd. l. c. Kahnförmige Apicre. Am Cap. May — Jul. Ch. 24.
Aloë cymbaeform. Jacq. fragm. bot. p. 72. n. 228. t. 12. f. 1.

9. *A. pumilio*. Willd. l. c. Niedrige Apicre. Am Cap. Febr. März. Ch. 24.
Aloë pumilio. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 11. t. 421.

10. *A. expansa*. Willd. l. c. p. 12. Ausgespannte Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë expansa β major. Haw. l. c. 7. p. 8.
β maior. Mit größerem Wuchse.

11. *A. rigida*, Willd. l. c. Steife Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë rigida. Jacq. fragm. bot. p. 71. n. 224. t. 108.

12. *A. imbricata*. Willd. l. c. p. 13. Dachziegelblättrige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë imbricata. Haw. l. c. 7. p. 7.

13. *A. pentagona*. Willd. l. c. Fünfeckige Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.
Aloë pentagona. Haw. l. c.

14. *A. bullata*. Willd. l. c. Blasige Apicre.
Am Cap. May, Jun. Ch. ♂.
Aloë bullulata. Jacq. fragm. bot. p. 72. n. 225.
t. 109.

15. *A. viscosa*. Willd. l. c. p. 14. Klebrige
Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
Aloë viscosa. Pers. l. c. 1. p. 379.

β. major. Mit gröfserem Wuchse.

16. *A. tortuosa*. Willd. l. c. Gedrehte
Apicre. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
Aloë tortuosa. Haw. l. c.

17.)
18.) Noch unbeschriebene Arten.

319. Aloë, Aloe.

1. *A. obscura*. Willd. l. c. p. 15. Dunkel-
fleckige Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

2. *A. angulata* β *unilateralis*. Willd. l. c.
p. 16. Eckige Aloe mit einseitigen Blättern. Am
Cap. — . Ch. ♂.

γ. *truncata*. Mit abgestutzten Blättern.

δ. *striata*. Mit gestreiften Blättern.

3. *A. excavata*. Willd. l. c. Ausgehöhlte
Aloe. Am Cap. May — Jul. Ch. ♂.

4. *A. trigona*. Hort. bot. vindobon. Dreye-
ckige Aloe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

5. *A. Lingua*. Thunb. dis. n. 11. Zungen-
blättrige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
Aloë linguaeformis. Pers. l. c.

β. *verrucosa*. Mit warzigen Blättern.

6. *A. bifaria*. Hort. bot. vindobon. Zweyseitige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
Aloë obliqua. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 9. t. 418.

7. *A. intermedia*. Willd. l. c. p. 17. Mittlere Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

8. *A. verrucosa*. Ait. hort. kew. 1. p. 468.
Warzige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
Aloë Serra β? verrucosa. Pers. l. c.

9. *A. pseudo-verrucosa*. Hort. dyckens. Unächtwarzige Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

10. *A. conspurcata*. Hort. dyckens. Beschmutzte Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

11. *A. carinata*. Pers. l. c. 1. p. 379. Hohlblättrige Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

β. subglabra. Mit fast glatten Blättern.

12. *A. echinata*. Willd. enum. 1. p. 385.
Weichstachlige Aloe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 2f.
Aloë humilis. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 10. t. 420.

β. divaricata. Mit ausgespernten Blättern.

γ. alia varietas. Eine andere Abart.

13. *A. obliqua*. Haw. l. c. 7. p. 14. Schießblättrige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
Aloë maculata. Pers. l. c.

14. *A. pulchra*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 10. t. 419. Schöne Aloe. Am Cap. März — May. Ch. ♂.

15. *A. variegata*. Pers. l. c. Bunte Aloe. Am Cap. May, Jun. Ch. ♂.

16. *A. tenuifolia*. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin. 1811. p. 19.
Dünlblättrige Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

17. *A. virens*. Willd. l. c. Grüne Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

18. *A. picta*. Pers. l. c. 1. p. 378. Bemahlte Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
A. obscura. Haw. miscell.

19. *A. umbellata*. Decand. pl. succ. p. 98. Doldenblüthige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
A. saponaria. Haw. miscell.

β. foliis variegatis. Mit bunten Blättern.

20. *A. saponaria* Hortulan. Seifen-Aloe.
Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
A. latifolia. Haw. miscell.

21. *A. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeine Aloe.
Zu Barbados, Jamaica, am Cap u. in Ostindien.
— . Ch. ♂.
A. barbadensis. Haw. l. c. 7. p. 19.

22. *A. glauca*. Willd. l. c. p. 20. Graugrüne Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

23. *A. rhodacantha*. Pers. l. c. Rosendornige Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

24. *A. paniculata*. Jacq. fragm. bot. p. 48.
n. 162. t. 62. Rispenblüthige Aloe. Am Cap.
Jun. — Aug. Ch. 2¹/₂.
Aloë striata. Haw. l. c. 7. p. 18.

25. *A. succotrina*. Decand. pl. succ. p. et.
t. 85. Offizinelle Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.
A. sinuata. Pers. l. c.

26. *A. guttata*. Hort. schoenbr. Betropfte Aloe. Am Cap. — . Ch. ♂.

27. *A. arborescens*. Decand. pl. succ. p. et
t. 38. Baumartige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♂.
A. fruticosa. Pers. l. c.

β. foliis angustioribus. Mit schmäleren Blättern.

28. *A. Commelinii*. Willd. l. c. p. 22. Com-
melinische Aloe. Am Cap. —. Ch. ♂.
A. supralaevis. Haw. l. c. 2. p. 186.

29. *A. mitraeformis*. Willd. l. c. Mützen-
förmige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.
β. spinosior. Mit mehreren Stacheln.

30. *A. albi-spina*. Haw. miscell. Weißstach-
lige Aloe. Am Cap. —. Ch. ♂.

31. *A. Serra*. Pers. l. c. 1. p. 379. Sägeblät-
trige Aloe. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

32. *A. africana*. Haw. miscell ? Africanische
Aloe. In Africa. —. Ch. ♂.

33. *A. brevifolia*. Pers. l. c. Kurzblättrige
Aloe. Am Cap. —. Ch. ♂.

34. *A. depressa*. Haw. miscell ? Niedergedrückte Aloe. Am Cap. —. Ch. ♂.

35. Eine noch unbeschriebene Art.

320. Agave, Agave.

1. *A. americana*. Pers. l. c. Americanische
Agave. Im wärmer. Amer. nun auch an den südl. Meeresküsten Europens. Jul. Aug. W. H. ♂.

β. foliorum margine luteo. Mit gelbgeränderten
Blättern.

γ. foliis luteo striatis. Mit gelbgestreiften Blät-
tern.

2. *A. vivipara*. Pers. l. c. 1. p. 130. Leben-
diggebährende Agave. In Amer. —. W. H. ♂.

3. *A. lurida*. Pers. l. c. Dunkle Agave. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 5.

4. *A. foetida*. Pers. l. c. Stinkende Agave. Zu Curassao. —. W. H. 5.

5. Eine noch unbeschriebene Art von St. Domingo.

6. Eine andere noch unbeschriebene Art v. Caracas.

321. Alstroemeria, Alströmerie.

1. *A. Pelegrina*. Lin. sp. pl. p. 461. Bunte Alströmerie. Auf Hügeln in Peru u. Lima. Jul. Ch. 2.

A. peregrina. Pers. l. c. 1. p. 380.

2. *A. Ligula*. Pers. l. c. Rachenförmige Alströmerie. Zu Lima. Jul. Ch. 2.

322. Hemerocallis, Tagblume.

1. *H. flava*. Pers. l. c. 1. p. 381. Gelbblühende Tagblume. Auf Feldern der Schweiz, Ungarns u. Sibiriens. Jun. Jul. Im F. 2.

2. *H. fulva*. Pers. l. c. 1. p. 382. Braunrote Tagblume. In China. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *H. alba*. Pers. l. c. Weißblühende Tagblume. In Japan. Jun. Jul. Ch. 2.

H. japonica. Thunb. act. societ. linn. lond. 2. p. 335.

Hosta japonica, Trattinnick observat. bot. fasc. 2. p. 55. n. 89.

4. *H. coerulea*. Pers. l. c. Blaublühende Tagblume. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 2.

H. japonica β *coerulea*. Andrews repos. bot. t. 6.

Hosta coerulea. Tratt. l. c.

323. *Acorus*, Calmus.

1. *A. Calamus*. Pers. l. c. Gemeiner Calmus. In Teichen und Sümpfen von Eur. Aug. Im freyen Wasserbehälter. 24.

324. *Orontium*, Wasserähre.

1. *O. japonicum*. Pers. l. c. Japanische Wasserähre. In Japan. Aug. — Oct. Ch. 24.

325. *Corypha*, Schirmpalme.

1. *C. umbraculifera*. Pers. l. c. Grossblättrige Schirmpalme. In Ostind. — . W. H. 5.

326. *Thrinax*, Schilfpalme.

1. *Th. parviflora*. Pers. l. c. 1. p. 383. Kleinblüthige Schilfpalme. Am Meerstrande in Jamaïca u. Hispaniola. — . W. H. 5.

327. *Berberis*, Berberitze.

1. *B. vulgaris*. Pers. l. c. 1. p. 387. Gemeine Berberitze. In Europäisch. u. Nordamerikanischen Wäldern. May, Jun. Im F. 5.

2. *B. canadensis*. Gemeine Berberitze aus Nordamerica.

3. *B. sibirica*. Pers. l. c. Sibirische Berberitze. In Sibirien. May, Jun. Im F. 5.

4. *B. sinensis*. Desfont. cat. hort. paris. p. 150. Chinesische Berberitze. In China. — . Ch. 5.

328. Prinos, Winterbeere.

1. *Pr. verticillatus*. Pers. l. c. Virginische Winterbeere. In Sümpfen v. Virgin. u. Pensylv. May, Jun. K. H. ♂.

2. *Pr. glaber*. Pers. l. c. 1. p. 388. Canadische Winterbeere. In Canada u. Florida. May, Jun. K. H. ♂.

329. Cleome, Cleome.

1. *Cl. pentaphylla*. Pers. l. c. 1. p. 390. Fünfblättrige Cleome. In Ostind. Aug. Sept. W. H. ○.

2. *Cl. dodecandra*. Pers. l. c. 1. p. 391. Zwölfäigige Cleome. In beyden Ind. Aug. W. H. ○.

3. *Cl. uniglandulosa*. Pers. l. c. Eindrüsige Cleome. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 24.

4. *Cl. gigantea*. Pers. l. c. Riesenartige Cleome. In Guinea. Aug. W. H. ♂.

330. Stephania, Stephanie.

1. *St. Cleomoides*. Pers. l. c. Cleomeartige Stephanie. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♂. *Capparis paradoxa*. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 58. t. 111.

331. Canarina, Canarina.

1. *C. Campanula*. Pers. l. c. 1. p. 392. Glockenblüthige Canarina. Auf den Canarischen Inseln. Decemb. — Febr. Ch. 24.

332. Frankenia, Frankenie.

1. *Fr. laevis*. Pers. l. c. Glatte Frankenie.
Am Meerstrande in Südeur. Jul. — Sept. K. H. 24.

2. *Fr. thymifolia*. Pers. l. c. 1. p. 393. Thymianblättrige Frankenie. In Span. u. der Barba-rey. — K. H. ½.

333. Bambusa, Bambos.

1. *B. arundinacea*. Willd. sp. pl. 2. p. 245.
Gemeiner Bambos. In beyden Ind. — W. H. ½.
Bambos arundinacea. Pers. l. c.

β. *latifolia*. Mit breiteren, weichhaarigen
Blättern.

334. Lomandra, Lomandra.

1. *L. latifolia*. Labillardiere. Breitblättri-
ge Lomandra. In Neuholl. May, Jun. Ch. 24.

2. *L. angustifolia*. Labill. Schmalblättrige
Lomandra. In Neuholl. May, Jun. Ch. 24.]

DIGYNIA.

335. Oryza, Reis.

1. *O. sativa*. Pers. l. c. 1. p. 394. Gemei-
ner Reis. In Ostind. Jun. Im F. Ø.

β. *mutica*. Mit grannenlosen Spelzen.

336. Atraphaxis, Atraphaxis.

1. *A. spinosa*. Pers. l. c. Stachlige Atrapha-
xis. In Medien u. Sibirien. Jul. Aug. Im F. ½.

2. *A. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättrige Atrapaxis. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

TRIGYNIA.

337. Rumex, Ampfer.

1. *R. Patientia*. Pers. l. c. Gemüse-Ampfer. In Deutschl. u. Ital. May, Jun. Im F. 2*4*.

2. *R. sanguineus*. Pers. l. c. Blutadrigter Ampfer. In Nordamer. May, Jun. Im F. 2*4*.

3. *R. Lunaria*. Pers. l. c. 1. p. 395. Baumartiger Ampfer. Auf den Canarisch. Ins. Jun. — Aug. K. H. ♂.

4. *R. scutatus*. Pers. l. c. Grauer Ampfer. In Südeur. Jun. Im F. 2*4*.

5. *R. cordatus*. Desfont. catal. hort. paris. p. 40. Herzblättriger Ampfer. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 2*4*.

6. *R. Acetosa*. Pers. l. c. Gemeiner Ampfer. Auf sandigen Triesten in Eur. May, Jun. Im F. 2*4*.

338. Veratrum, Germerkraut.

1. *V. nigrum*. Pers. l. c. 1. p. 397. Schwarzes Germerkraut. Auf trockenen Hügeln in Oester. Ungarn u. Sibirien. (Jun. Jul. Im F. 2*4*.)

2. *V. album*. Pers. l. c. Weisses Germerkraut. An Bächen u. auf feuchten Waldwiesen in Eur. u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 2*4*.

339. *Myrsiphyllum*, Myrtenblatt.

1. *M. asparagoides*. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berlin. 1808. p. 25. Spar-gelartiges Myrtenblatt. Am Cap u. in Aethiopien. Jun. Ch. ৎ.
Medeola asparagoides. Pers. I. c. 1. p. 398.

340. *Colchicum*, Zeitlose.

1. *C. autumnale*. Pers. I. c. Herbst - Zeitlose.
Auf Wiesen in Eur. Sept. Oct. Im F. 24.

2. flore pleno. Mit gefüllter Blüthe.

341. *Chamaerops*, Zwergpalme.

1. *Ch. humilis*. Pers. I. c. 1. p. 400. Niedrige Zwergpalme. In Dalmatien, Span. u. der Barbarey. Blüht zu verschiedenen Zeiten im Jahre. K. H. ৎ.

2. arborescens. Mit sehr hohem Stämme.

342. *Aponogeton*, Aponogeton.

1. *A. distachyon*. Pers. I. c. Zweyzeyliger Aponogeton. In Bächen am Cap. Jul. — Oct. Im freyen Wasserbehälter. 24.

CLASSIS VII.

H E P T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

343. *Disandra*, *Disandra*.

1. *D. prostrata*. Pers. l. c. 1. p. 402. Liegende Disandra. Im Orient u. zu Madera. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. 24.

344. *Pisonia*, *Pisonie*.

1. *P. aculeata*. Pers. l. c. Stachlige Pisonie. In Südamer. —. W. H. 5.

2. *P. fragrans*. Desfont. catal. hort. paris. p. 46. Wohlriechende Pisonie. In Südamer. —. W. H. 5.

3. *P. nitida*, Desfont. l. c. Glänzende Pisonie. In Südamer. —. W. H. 5.

4. *P. obtusata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 35. t. 314. Stumpfblättrige Pisonie. Auf der Insel Providenz. May, Jun. W. H. 5.

345. *Petiveria*, *Petiverie*.

1. *P. alliacea*. Pers. l. c. Knoblauchartige Petiverie. In Hainen v. Jamaica. May — Sept. W. H. 5.

346. Aesculus, Rosskastanie.

1. *Ae. Hippocastanum*. Pers. l. c. 1. p. 403.
Gemeine Rosskastanie. Im nördlicher. Asien.
May. Im F. ♂.

2. *Ae. Pavia*. Pers. l. c. Rothe Rosskastanie.
In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *Ae. flava*. Ait. hort. kew. 1. p. 494. Gelbe
Rosskastanie. In Nordcarolina. Jun. Jul. Im F. ♂.
Ae. lutea. Pers. l. c.

4. *Ae. macrostachia*. Pers. l. c. Langährige
Rosskastanie. In Georgien u. am Savannah. Jun.
Jul. Im F. ♂.

347. Dracontium, Zehrwurz.

1. *Dr. lanceaefolium*. Jacq. ic. var. 3. t. 612.
Collect. 4 p. 118. Lanzenblättrige Zehrwurz. Zu
Caracas auf Bäumen schmarozend. Jun. — Aug.
VV. H. 24.

2. *Dr. pertusum*. Mill. dict. v. 1. ic. t. 296.
Durchlöcherte Zehrwurz. In Südamer. Jun. —
Aug. VV. H. ♂.

348. Calla, Schlangenkraut.

1. *C. aethiopica*. Lin. sp. pl. p. 1373. Capisches
Schlangenkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

TETRAGYNIA.

349. Saururus, Eidechenschwanz.

1. *S. cernuus*. Pers l. c. Hängender Eidechsen-
schwanz. In Virgin. Jul. Aug. K. H. 24.

2. *S. lucidus.* Donn catal. hort. cantabrig. p.
 66. Glänzender Eidechenschwanz. In Nordamer.
 Jul. Aug. K. H. 24.

CLASSIS VIII.

O C T A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

350. *Tropaeolum*, Kapuzinerkresse.

1. *Tr. minus.* Pers. l. c. 1. p. 405. Kleine Kapuzinerkresse. In Peru. Jun. — Aug. Im F. ⊖.

2. *Tr. maius.* Pers. l. c. Grosse Kapuzinerkresse. In Peru. Jun. — Aug. Im F. ⊖.

331. *Oenothera*, Nachtkerze.

1. *Oe. biennis.* Pers. l. c. 1. p. 407. Gemeine Nachtkerze. In Virgin. jetzt auch in Eur. an Flüssen u. Bächen. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *Oe. muricata.* Pers. l. c. 1. p. 408. Weichstachlige Nachtkerze. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *Oe. molissima.* Pers. l. c. Weichblättrige Nachtkerze. Zu Buenos Ayres. Jul. Aug. Im F. ⊖.

4. *Oe. odorata.* Pers. l. c. Wohlriechende Nachtkerze. In Patagonien. Aug. Im F. 24.

5. *Oe. rosea.* Pers. l. c. 1. p. 409. Rosenrote Nachtkerze. In Peru. Jun. — Aug. K. H. 24.

332. Gaura, Prachtkerze.

1. *G. mutabilis*. Pers. l. c. Veränderliche Prachtkerze. In Mexico. May, Jun. Ch. ♂.

333. Epilobium, Weidenröslein.

1. *E. angustifolium*. Lin. sp. pl. p. 493. Schmalblättriges Weidenröslein. In Nordeur. Jun. Jul. Im F. 24.
E. spicatum. Pers. l. c.

2. *E. angustissimum*. Web. dec. pl. minus cognit. p. 3. Rosmarinblättriges Weidenröslein. In Gebirgsholzsäulen in Oesterreich, Grönland u. Südeur. Jun. Jul. Im F. 24.
E. angustifolium. Pers. l. c.

3. *E. hirsutum*. Pers. l. c. 1. p. 410. Großblüthiges Weidenröslein. An Bächen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

334. Fuchsia, Fuchsie.

1. *F. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothe Fuchsie. In Chili bis zur Magellanischen Landenge. May — Aug. Ch. ♂.

335. Melicocca, Honigfrucht.

1. *M. bijuga*. Pers. l. c. 1. p. 413. Gefiederter Honigfrucht. In Südamer. — VV. H. ♂.

2. Eine noch unbeschriebene Art von Caracas.

336. Koelreuteria, Kölreuterie.

1. *K. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthige Kölreuterie. In China. Jul. Aug. Im F. ♂.

337. Amyris, Balsamstrauch.

1. *A. polygama*. Pers. l. c. 1. p. 414. Geschlechterändernder Balsamstrauch. In Chili. — Ch. ♂.

2. *A. maritima*. Pers. l. c. Meerstands-Balsamstrauch. Auf Meeresfelsen in Amer. Jul. Aug. VV. H. ♂.

858. Dodonaea, Dodonää.

1. *D. triquetra*. Pers. l. c. 1. p. 415. Dreikantige Dodonää. In Neuholl. Aug. Cn. ♂.

359. Acer, Ahorn.

1. *A. tataricum*. Pers. l. c. 1. p. 417. Tatarischer Ahorn. In der Tartarey. May, Jun. Im F. ♂.

2. *A. Pseudo-Platanus*. Pers. l. c. Weisser Ahorn. In Deutschl. der Schweiz, Engl. u. Frankr. May. Im F. ♂.

3. *A. obtusatum*. Waldstein et Kitaib. mscr. Stumpfblättriger Ahorn. In Ungarn u. Croation. May. Im F. ♂.

4. *A. platanoides*. Pers. l. c. Spitz-Ahorn. Im nördlichen Eur. u. auf Bergen in Steyerm. u. Savoyen. May, Jun. Im F. ♂.

β . *laciniatum* Hortulan. Mit zerschlitzten Blättern.

γ . *palmatum* Hortulan. Mit handförmigen Blättern.

5. *A. rubrum*. Pers. l. c. Rother Ahorn. In Pensylv. u. Carol. März, Apr. Im F. ♂.

β . *floribus flavescentibus*. Mit gelölichen Blüthen.

6. *A. dasycarpum*. Pers. l. c. Silberblättriger Ahorn. In Pensylv. u. Carol. May. Im F. ḥ.

7. *A. saccharinum*. Pers. l. c. Zucker-Ahorn. Von der Hudsonsbay bis Carol. May. Im F. ḥ.

8. *A. pensylvanicum*. Lin. sp. pl. p. 1496. Ge-
streifter Ahorn. In Canada, seltner in Carol. u.
Florida. May. Im F. ḥ.

A. striatum. Pers. l. c.

9. *A. montanum*. Ait. hort. kew. 3. p. 435.
Berg - Ahorn. In Canada u. auf dem hohen Alleghanischen
Gebirge bis gegen Florida. May.
Im F. ḥ.

A. spicatum. Pers. l. c.

10. *A. campestre*. Pers. l. c. Feld - Ahorn.
Im südlicher Eur. May. Im F. ḥ.

11. *A. Opalus*. Pers. l. c. Italienischer Ahorn.
In der Schweiz, Frankr. u. Ital. — Im F. ḥ.

12. *A. monspessulanum*. Pers. l. c. Franzö-
sischer Ahorn. In Krain, Ital. u. Frankr. May.
Im F. ḥ.

13. *A. creticum*. Pers. l. c. Candischer
Ahorn. Im Orient. May. Im F. ḥ.

14. *A. Negundo*. Pers. l. c. 1. p. 418. Eschen-
blättriger Ahorn. In Pensylv. u. Carol. May. Im
F. ḥ.

360. Correa, Correa.

1. *C. alba*. Pers. l. c. 1. p. 419. Weisse Cor-
rea. In Neuhol. Jän. — Aug. Ch. ḥ.

361. Erica, Heide.

1. *E. urceolaris*. Pers. l. c. 1. p. 420. Becherförmige Heide. Am Cap wie die meisten folgenden Arten dieser Gattung. — . Ch. ♂.
2. *E. aggregata*. Donn. cat. cantabrig. p. 110. Gehäuftblühige Heide. — . Ch. ♂.
3. *E. arborea*. Pers. l. c. 1. p. 421. Baumartige Heide. In Südeur. May. Ch. ♂.
4. *E. stricta*. Pers. l. c. Steife Heide. May, Jun. Ch. ♂.
5. *E. Tetralix* β alba. Pers. l. c. 1. p. 422. Weisse Sumpf - Heide. In Sümpfen des nördlicheren Eur. — . Im F. ♂.
6. *E. mammosa*. Pers. l. c. Zitzenförmige Heide. May. Ch. ♂.
7. *E. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeine Heide. Auf dürren Hügeln u. in Wäldera v. Eur. May, Jun. Im F. ♂.
8. *E. scoparia*. Pers. l. c. 1. p. 423. Besenförmige Heide. In Südeur. May, Jun. K. H. ♂.
E. fucata. Thunb. diss. n. 9.
9. *E. australis*. Pers. l. c. Südliche Heide. In Spanien. — . K. H. ♂.
E. pistillaris. Salish. linnaean. transact. 6. p. 368.
10. *E. pedunculata*. Donn. cat. cantabr. p. 111. Gestielte Heide. Jul. Aug. Ch. ♂.
11. *E. baccans*. Pers. l. c. Beerenförmige Heide. May, Jun. Ch. ♂.
12. *E. arbutiflora*. Donn. catal. cantabrig. p. 112. Sandbeerenblühige Heide. — . Ch. ♂.

13. *E. hispida*. Andrew. Ericae 2. n. 100.
Borstige Heide. — . Ch. ♂.

14. *E. versicolor*. Pers. l. c. 1. p. 426. Bunte
Heide. — . Ch. ♂.

15. *E. grandiflora*. Pers. l. c. 1. p. 427.
Großblüthige Heide. — . Ch. ♂.

16. *E. curviflora*. Pers. l. c. Krummblüthige
Heide. Aug. Ch. ♂.

17. *E. simpliciflora*. Pers. l. c. Einfachblü-
thige Heide. Ch. ♂.

18. *E. mediterranea*. Pers. l. c. 1. p. 428.
Mittelländische Heide. In Südeur. Apr. May. K.
H. ♂.

19. *E. multiflora*. Pers. l. c. Vielblüthige
Heide. In Engl. Südfrankr. u. im Orient. März
— May. K. H. ♂.

20. *E. herbacea*. Pers. l. c. Krautartige Hei-
de. Im südlicher. Eur. Apr. May. Im F. ♂.

21. *E. purpurascens*. Per. l. c. Italienische
Heide. In Südeur. Apr. May. K. H. ♂.

22. *E. longiflora*. Pers. l. c. 1. p. 432. Lang-
blüthige Heide. Jun. Jul. Ch. ♂.
E. elata Hortulan.

362. Daphne, Seidelbast.

1. *D. Mezereum*. Pers. l. c. 1. p. 434. Ge-
meiner Seidelbast. In Wäldern v. Eur. März.
Apr. Im F. ♂.

2. *D. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Seidelbast.
Auf Alpen in Tyrol, der Schweiz u. Ital. Jun., Jul.
K. H. ♂.

3. *D. Laureola*. Pers. l. c. 1. p. 435. Immergrüner Seidelbast. In Wäldern des südlicher. Eur. März, Apr. Im F. ♂.

4. *D. pontica*. Pers. l. c. Pontischer Seidelbast. Im Pontus. May, Jun. K. H. ♂.

5. *D. Gnidium*. Pers. l. c. Rispenblüthiger Seidelbast. In Span. Ital. u. Languedoc. May. K. H. ♂.

6. *D. odora*. Pers. l. c. Wohlriechender Seidelbast. In China u. Japan. Jän. — März. Ch. ♂.

7. *D. Cneorum*. Pers. l. c. Niedriger Seidelbast. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. auf sonnigen Hügeln. May, Jun. Im F. ♂.

8. *D. oleoides*. Pers. l. c. Oelbaumblättriger Seidelbast. In Candien. Jun. — Aug. K. H. ♂.

9. *D. collina*. Pers. l. c. Stumpfblättriger Seidelbast. Auf Hügeln in Südtal. u. Candien. März, Apr. K. H. ♂.

10. *D?* Von Caracas.

364. *Gnidia*, Gnidie.

1. *G. simplex*. Pers. l. c. 1. p. 436. Einfache Gnidie. Am Cap. Apr. — Aug. Ch. ♂.

364. *Passerina*, Vogelkopf.

1. *P. filiformis*. Pers. l. c. Fadenförmiger Vogelkopf. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

365. *Lachnaea*, Lachnaea.

1. *L. conglomerata*. Pers. l. c. 1. p. 438. Knaulblüthige Lachnäa. Am Cap. — Ch. ♂.

DIGYNIA.

366. Moehringia, Möhringie.

1. *M. muscosa*. Pers. l. c. Moosige Möhringie. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Ital. u. Montpellier an Bächen u. Quellen. Jun. Jul. Im F. 24.

TRIGYNIA.

367. Polygonum, Knöterig.

1. *P. Bistorta*. Pers. l. c. 1. p. 439. Wiesen-Knöterig. Auf Wiesen u. Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Frankr. May, Jun. Im F. 24.

2. *P. viviparum*. Pers. l. c. Zwiebeltragen-der Knöterig. Auf Bergen u. trockenen Triesten in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *P. amphibium*. Pers. l. c. 1. p. 440. Wasser-Knöterig. In Wässern v. Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

4. *P. orientale*. Pers. l. c. Tabacksblättriger Knöterig. Im Orient. May — Jul. Im F. Ø.

5. *P. divaricatum*. Pers. l. c. 1. p. 441. Ausgebreiteter Knöterig. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

368. Cocoloba, Seetraube.

1. *C. uvifera*. Pers. l. c. 1. p. 442. Gemeine Seetraube, In Amer. —. W. H. ½.

2. *C. excoriata*. Pers. l. c. Rindenlose See-traube. In Westind. —. W. H. ½.

3. *C. punctata*. Pers. l. c. Punctirte Seetraube. In Jamaica. März, Apr. W. H. ♂.

4. *C. laurifolia*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 9. t. 267. Lorbeerblättrige Seetraube. Zu Caracas. May — Jul. W. H. ♂.

5. *C. fagifolia*. Jacq. l. c. 3. p. 55. t. 352. Buchenblättrige Seetraube. Zu Caracas. Apr. May. W. H. ♂.

6. Eine noch unbeschriebene Art, welche in Caracas zu Hause ist.

369. Paullinia, Paullinie.

1. *P. cauliflora*. Pers. l. c. 1. p. 443. Stammblüthige Paullinie. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♂.

2. *P. hispida*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 9. t. 268. Borstige Paullinie. Zu Caracas. Nov. Dec. W. H. ♂.

370. Seriana, Seriane.

1. *S. caracasana*. Pers. l. c. 1. p. 444. Weit-zähnige Seriane. Zu Caracas. Jun. W. H. ♂. Paullin. caracasana. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 52 t. 99.

2. *S. mexicana*. Pers. l. c. Mexicanische Seriane. In Mexico. Jun. Jul. W. H. ♂. Paullin. mexicana. Lin. sp. pl. p. 525.

3. *S. triternata*. Pers. l. c. Dreymalgedreyte Seriane. In St. Domingo. — W. H. ♂. Paullin. triternata. Jacq. stirp. amer. 110. t. 180. f. 32.

371. *Sapindus*, Seifenbaum.

1. *S. rigidus*. Pers. l. c. 1. p. 445. Eschenblättriger Seifenbaum. Im wärmer. Amer. — . W. H. h.

2. *S. indicus*. Desfont. catal. hort. paris. p. 135. Indischer Seifenbaum. In Ostind. — . W. H. h.

TETRAGYNIA.

372. *Calanchoë*, *Calanchoe*.

1. *C. aegyptiaca*. Pers. l. c. 1. p. 446. Aegyptische Calanchoe. In Aegypten. — . K. H. h. Cotyledon nudicaulis. Murr. syst. veget. 14. p. 429.

2. *C. Verea*. Pers. l. c. Gekerbte Calanchoe. In Siera Leone. Jun. — . Aug. W. H. h. Verea crenata Andrew. bot. repos. p. et. t. 21.

373. *Halloragis*, Meerträublein.

1. *H. prostrata*. Pers. l. c. Liegendes Meerträublein. In Neuseeland u. der Botanybay. Jun. Jul. Ch. h.

CLASSIS. IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

374. *Laurus*, Lorbeer.

1. *L. Cassia*. Pers. l. c. 1. p. 448. Cassien-Lorbeer. In Malabar, Sumatra u. Java. — . W. H. h.

2. *L. Camphora*. Pers. l. c. Kampfer - Lorbeer. In Japan. Jan. Jul. Ch. Ȣ.

3. *L. nobilis*. Pers. l. c. Gemeiner Lorbeer. In Ital. u. Griechenl. May, Jun. K. H. Ȣ.

4. *L. indica*. Pers. l. c. Indischer Lorbeer. Zu Madera u. den Canarischen Ins. Jul. Aug. Ch. Ȣ.

5. *L. foetens*. Pers. l. c. Stinkender Lorbeer. Zu Madera u. den Canarisch. Ins. — . Ch. Ȣ.

6. *L. Borbonia*. Pers. l. c. 1. p. 449. Rother Lorbeer. In Carol. u. Virgin. — . K. H. Ȣ.

7. *L. carolinensis*. Pers. l. c. Carolinischer Lorbeer. In Carol. — . Ch. Ȣ.

8. *L. Diospyrus*. Pers. l. c. 1. p. 450. Persimonenartiger Lorbeer. In Nordamer. — . K. H. Ȣ.
L. melissaeifolia. Walt. fl. carolin. p. 134.

9. *L. Benzoin*. Pers. l. c. Benzoin - Lorbeer. In Virgin. — . K. H. Ȣ.

10. *L. Sassafras*. Pers. l. c. Sassafras - Lorbeer. In Virgin. Carol. u. Florida. — . K. H. Ȣ.

375. Rheum. Rhabarber.

1. *Rh. Rhaponticum*. Pers. l. c. 1. p. 451. Stumpfblättrige Rhabarber. In Servien, Pohlen u. Russland. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Rh. undulatum*. Pers. l. c. Wellenblättrige Rhabarber. In China u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Rh. palmatum*. Pers. l. c. Schlitzblättrige Rhabarber. In China. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *Rh. compactum*. Pers. l. c. Dichte Rhabarber. In der Tartarey u. China. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Rh. hybridum*. Pers. l. c. Bastard-Rhabarber. In Nordasien. Jun. Jul. Im F. 24.

376. Butomus, Wasserlisch.

1. *B. umbellatus*. Pers. l. c. Doldenblütiger Wasserlisch. In Pfützen u. Teichen v. Eur. Jun. Jul. Im freyen Wasserbehälter. 24.

CLASSIS X.

D E C A N D R I A.

MONOGYNIA.

377. Sophora, Sophore.

1. *S. tetraptera*. Pers. l. c. 1. p. 442. Flügelfruchtige Sophore. In Neuseeland. Apr. May. K. H. ♂.

2. *S. microphylla*. Pers. l. c. Kleinblättrige Sophore. In Neuseeland. Apr. May. K. H. ♂.

3. *S. alopecuroides*. Pers. l. c. Fuchsschwanzartige Sophore. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *S. tomentosa*. Pers. l. c. Filzige Sophore. In Neuseeland. — . K. H. ♂.

5. *S. japonica*. Pers. l. c. Japanische Sophore. In Japan. Aug. Sept. Im F. ♂.

378. Podalyria, Podalyrie.

1. *P. australis*. Pers. l. c. 1. p. 453. Südliche Podalyrie. In Carolina. Jun. Jul. Im F. 2.
2. *P. genistoides*. Willd. sp. pl. 2. p. 502. Ginsterartige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. ȳ.
3. *P. myrtillifolia*. Pers. l. c. Heidelbeerblättrige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. ȳ.
4. *P. biflora*. Pers. l. c. Zweyblütige Podalyrie. Am Cap. —. Ch. ȳ.

379. Anagyris, Anagyris.

1. *A. foetida*. Pers. l. c. 1. p. 454. Stinkende Anagyris. Auf Bergen in Span. Ital. u. Sizilien. May. K. H. ȳ.

380. Cercis, Judasbaum.

1. *C. Siliquastrum*. Pers. l. c. Europäischer Judasbaum. In Südeur. May, Jun. Im F. ȳ.

2. *C. canadensis*. Pers. l. c. Canadischer Judasbaum. In Pensylv. Virgin. u. Carolina. May, Jun. Im F. ȳ.

381. Bauhinia, Bauhinie.

1. *B. aculeata*. Pers. l. c. Stachlige Bauhinie. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ȳ.

2. *B. porrecta*. Pers. l. c. Spitzblättrige Bauhinie. In Jamaica u. Hispaniola. —. W. H. ȳ.

382. Hymenaea, Locustbaum.

1. *H. Courbaril*. Pers. l. c. 1. p. 455. Ge-
meiner Locustbaum. In Südamer. — . W. H. ♂.

383. Cassia, Cassie.

1. *C. Absus*. Pers. l. c. 1. p. 456. Aegypti-
sche Cassie. In Ostind. Jan. Jul. W. H. ☽.

2. *C. bicapsularis*. Pers. l. c. Zweyfächige
Cassie. In Ostind. May, Jun. W. H. ♂.

3. *C. acuminata*. Pers. l. c. Langspitzige
Cassie. In Wäldern von Guiana. — . W. H. ♂.

4. *C. corymbosa*. Pers. l. c. Doldentraubige
Cassie. Zu Buenos Ayres. Jun. W. H. ♂.

5. *C. occidentalis*. Pers. l. c. 1. p. 457. West-
indische Cassie. In Jamaica. May — Jul. W. H. ♂.

6. *C. atomaria*. Pers. l. c. Punktirte Cassie.
In Amer. — . W. H. ♂.

7. *C. chinensis*. Pers. l. c. Chinesische Cas-
sie. Bey Pecking in China. Apr. May. W. H. ♂.

8. *C. tomentosa*. Pers. l. c. 1. p. 458. Fil-
zige Cassie. In Südamer. — . W. H. ♂.

9. *C. alata*. Pers. l. c. Geflügelte Cassie. Im
wärmer. Amer. — . W. H. ♂.

10. *C. marilandica*. Pers. l. c. Marilandische
Cassie. In Virgin. u. Mariland. Jul. Aug. Im F. 24.

384. *Bactyrilobium*, Rohrcassie.

1. *B. Fistula*. Willd. enum. 1. p. 439. Röhrenfrüchtige Rohrcassie. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. h.
Cathartocarpus Fistula. Pers. l. c. 1. p. 459.
Cassia Fistula. Lin. sp. pl. p. 540.

385. *Parkinsonia*, Parkinsonie.

1. *P. aculeata*. Pers. l. c. Stachlige Parkinsonie. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. h.

386. *Caesalpinia*, Caesalpinie.

1. *C. vesicaria*. Pers. l. c. 1. p. 460. Ausgerandetblättrige Cäsalpinie. In Jamaika. —. W. H. h.
C. bijuga. Swarz observ. 166.

2. *C. Sappan*. Pers. l. c. Brasilienholz - Cäsalpinie. In b yden Ind. —. W. H. h.

3. *C. Crista*. Pers. l. c. Vielstachlige Cäsalpinie. In Jamaika. —. W. H. h.

387. Hoffmanseggia, Hoffmanseggie.

1. *H. falcaria*. Pers. l. c. Sichelfrüchtige Hoffmanseggie. Auf hohen Bergen in Südamer. —. W. H. h.

388. *Moringa*, Behennuß.

1. *M. zeylanica*. Pers. l. c. 1. p. 461. Zeylonische Behennuß. In Zeylon, Amer. u. Aegypt. auf sandigem Boden. Jun. W. H. h.
Hyperantha Moringa. Vahl symbol. 1. p. 30.
Guilandina. Moringa. Lin. sp. pl. p. 546.

389. Adenanthera, Drüsenblume.

1. *A. pavonina*. Pers. l. c. Pfauenartige Drüsenblume. In Ostind. — . W. H. ♂.

390. Schotia, Schotie.

1. *Sch. speciosa*. Pers. l. c. 1. p. 462. Prächtige Schotie. In Senegall u. am Cap. Aug. Sept. W. H. ♂.

2. *Sch. latifolia*. Jacq. fragm. bot. p. 23. n. 80. t. 15. f. 4. Breitblättrige Schotie. Am Cap. Aug. W. H. ♂.

391. Guaiacum, Franzosenholz.

1. *G. officinale*. Pers. l. c. 1. p. 463. Vierblättriges Franzosenholz. In Hispaniola u. Jamaica. Jun. — Aug. W. H. ♂.

392. Zygophyllum, Doppelblatt.

1. *Z. Fabago*. Pers. l. c. Gemeines Doppelblatt. In Syrien, Mauritanien u. am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Z. foetidum*. Pers. l. c. Stinkendes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

3. *Z. Morgiana*. Pers. l. c. Kurzgestieltes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

4. *Z. sessilifolium*. Pers. l. c. Ungestieltes Doppelblatt. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

393. Dictamnus, Diptam.

1. *D. albus*. Lin. sp. pl. p. 548. Weißwurzlicher Diptam. In Süddeutschl. Ital. u. Frankr. auf Kalkgebirge. May, Jun. Im F. 24.
D. Fraxinella. Pers. l. c. 1. p. 464.
 β. *floribus albis*. Mit weißen Blüthen.

394. Ruta, Raute.

1. *R. graveolens*. Pers. l. c. Gemeine Raute. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *R. montana*. Pers. l. c. Berg-Raute. Auf Hügeln in Südeur. Jun. Jul. K. H. 5.
R. legitima. Jacq. ic. rar. 1. t. 76. Collect. 1. p. 74.

3. *R. chalepensis*. Pers. l. c. Aleppische Raute. In Anatolien. Jun. Jul. K. H. 5.

395. Limonia, Limonie.

1. *L. trifoliata*. Pers. l. c. 1. p. 466. Dreiblättrige Limonie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.

396. Murraya, Murraye.

1. *M. exotica*. Pers. l. c. Indische Murraye. In Ostind. May, Jun. W. H. 5.

397. Kookia, Kookie.

1. *K. punctata*. Pers. l. c. Punktirte Kookie. In China. Jun. Jul. W. H. 5.

398. Trichilia, Trichilie.

1. *Tr. spondiodes*. Pers. l. c. 1. p. 468. Mirobalanenartige Trichilie. Auf waldigen Bergen im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. 5.

2. *Tr. capensis*. Pers. l. c. Capische Trichilie. Am Cap in Wäldern. Jun. W. H. ḫ.
Ekebergia capensis. Sparmann act. holm. 1779 p. 252. t. 9.

399. Melia, Zedrach.

1. *M. Azedarach*. Pers. l. c. 1. p. 469. Glatte Zedrach. In Syrien, Zeylon u. Südeur. Jun. Jul. K. H. ḫ.

2. *M. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüner Zedrach. An Hecken in Jamaika. Jun. — Aug. W. H. ḫ.

400. Melastoma, Schwarzschlund.

1. *M. cymosum*, Pers. l. c. 1. p. 471. Afterdoldiger Schwarzschlund. In Südamer. — W. H. ḫ.

401. Kalmia, Kalmie.

1. *K. latifolia*. Pers. l. c. 1. p. 477. Breitblättrige Kalmie. In Nordamer. May. K. H. ḫ.

2. *K. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Kalmie. In Nordamer. May. K. H. ḫ.

3. *K. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Kalmie. Zu Terra Nova. May. K. H. ḫ.

402. Ledum, Porst.

1. *L. palustre*. Pers. l. c. Sumpf-Porst. In Sumpfen v. Nordeur. Apr. May. K. H. ḫ.

2. *L. latifolium*. Pers. l. c. Breitblättriger Porst. In Sumpfen v. Grönland u. Amer. Apr. May. K. H. ḫ.

403. Rhododendron, Alpbalsam.

1. *Rh. ferrugineum*. Pers. l. c. 1. p. 478.
Rostfärbiger Alpbalsam. Auf Alpen in Oesterr.
der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. K.
H. ♂.

2. *Rh. hirsutum*. Pers. l. c. Gefranzter Alp-
balsam. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Salzb.
u. der Schweiz. Jun. — Aug. K. H. ♂.

3. *Rh. Chamaecistus*. Pers. l. c. Drüsiger
Alpbalsam. Auf den Oesterr. Krainerischen u.
Salzburgeralpen. Jun. Jul. K. H. ♂.

4. *Rh. ponticum*. Pers. l. c. Pontischer Alp-
balsam. Im Orient u. bey Gibraltar. May —
Jul. K. H. ♂.

β. foliis undulatis. Mit wellenförmigen Blättern.

γ. — variegatis — gestreiften —

δ. — obtusis. — stumpfen —

ε. — angustis — schmalen —

5. *Rh. maximum*. Pers. l. c. Grosser Alp-
balsam. In Nordamer. Jun. Jul. K. H. ♂.

404. Vaccinium, Heidelbeere.

1. *V. Myrtillus*. Pers. l. c. Gemeine Hei-
delbeere. In schattigen Wäldern v. Eur. May,
Jun. Im F. ♂.

2. *V. orboreum*. Pers. l. c. 1. p. 479. Baum-
artige Heidelbeere. In Nordamericanischen Wäl-
dern. — K. H. ♂.

3. *V. pensylvanicum*. Pers. l.c. Pensylvanische
Heidelbeere. In Pensylv. May. K. H. ♂.

405. *Andromeda*, Andromede.

1. *A. polifolia*. Pers. l. c. 1. p. 481. Poleylätrige Andromede. Auf Torfboden in Oesterr. Nordeur. u. Amer. Jan. Jul. K. H. h.

β. *latifolia*. Mit breiteren Blättern.

2. *A. repens*. Hort. paris. Kriechende Andromede. —. Jun. Jul. K. H. h.

3. *A. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthige Andromede. In Virgin. —. K. H. h.

4. *A. axillaris*. Pers. l. c. Winkelblättrige Andromede. In Virgin. Carol. u. Georgien. — K. H. h.

5. *A. acuminata*. Pers. l. c. Zugespitzte Andromede. In Nordamer. —. K. H. h.
A. lucida. Jacq. ic. rar. 1. t. 79. Collect. 1. p. 95.

6. *A. serratifolia*. Catal. hort. carlsruh. 1. p. 18. Sägeblättrige Andromede. —. K. H. h.

7. *A. calyculata*. Pers. l. c. Gekelchte Andromede. In Eur. Asien u. Nordamer. —. K. H. h.

8. *A. crispa*. Hort. paris. Krause Andromede. —. —. K. H. h.

406. *Arbutus*, Sandbeere.

1. *A. Unedo*. Pers. l. c. 1. p. 482. Erdbeerartige Sandbeere. In Südeur. Croatia u. im Orient. Nov. — Jänn. K. H. h.

2. *A. Andrachne*. Pers. l. c. Candische Sandbeere. Im Orient. Nov. — Febr. K. H. h.

β. *foliis serratis*. Mit gesägten Blättern.

3. *A. Uva-ursi*. Pers. l. c. 1. p. 483. Ge-
meine Sandbeere. Im nördlichen u. auf Alpen in
Südeur. Jun. Jul. K. H. Ქ.

407. Clethra, Clethra.

1. *Cl. alnifolia*. Pers. l. c. Ellerblättrige Cle-
thra. In Pensylv. Jun. Jul. Ch. Ქ.

2. *Cl. pubescens*. Willd. enum. 1. p. 455.
Weichhaarige Clethra. In Carolina. Jun. Jul. K.
H. Ქ.

Cl. incana. Pers. l. c.

3. *Cl. arborea*. Pers. l. c. Baumartige Clethra.
Zu Madera. Jun. Jul. Ch. Ქ.

408. Pyrola, Wintergrün.

1. *P. rotundifolia*. Pers. l. c. Rundblättri-
ges Wintergrün. In Waldungen v. Eur. Jun.
Jul. Im F. 24.

2. *P. secunda*. Pers. l. c. Einseitiges Winter-
grün. In Wäldern v. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

409. Styrax, Storax.

1. *St. officinale*. Pers. l. c. Aechter Storax.
In Syrien, Judäa u. Italien. — . K. H. Ქ.

410. Terminalia, Catappenbaum.

1. *T. Benzoë*. Pers. l. c. 1. p. 485. Schmal-
blättriger Catappenbaum. In Ostind. Jun. W. H. Ქ.
T. angustifolia. Jacq. hort. vind. 3. p. 51. t. 100.

DIGYNIA.

411. Royena, Royene.

1. *R. lucida*. Pers. l. c. 1. p. 486. Glänzende Royene. Am Cap. Jul. Ch. ♂.

2. *R. glabra*. Pers. l. c. Glatte Royene. Am Cap. —. Ch. ♂.

3. *R. pubescens*. Willd. enum. 1. p. 457. Weichhaarige Royene. Am Cap. —. Ch. ♂.
R. hirsuta. Pers. l. c.

4. *R. hirsuta*. Willd. l. c. Haarige Royene. Am Cap. —. Ch. ♂.

5. *R. polyandra*. Pers. l. c. Vielfädige Royene. Am Cap. —. Ch. ♂.

6. Eine noch unbeschriebene der vorhergehenden ähnliche Art, die ebenfalls am Cap zu Hause ist.

412. Hydrangea, Hydrangea.

1. *H. arborescens*. Lin. sp. pl. p. 568. Baumartige Hydrangea. Auf Bergen in Virginien u. Carol. May. K. H. ♂.
H. vulgaris. Pers. l. c.

2. *H. hortensis*, Smith ic. pict. 1. p. 12. t. 12. Garten-Hydrangea. in China u. Japan. Jun. — Aug. Ch. ♂.
Hortensia speciosa. Pers. l. c. 1. p. 505.

— *opuloides*. Lam encycl. 3. p. 136.

3. *H. radiata*. Lam. illustr. gen. t. 370. f.
2. Herzblättrige Hydrangea. In Nordamer. Jul. Aug. K. H. ♂.
H. nivea. Pers. l. c.

4. *H. quercifolia*. Bartram itin. ed. germ. p. 366. t. 7. Eichenblättrige Hydrangea. In Florida. Jul. Aug. K. H. h.

413. *Saxifraga*, Steinbrech.

1. *S. intacta*. Willd. hort. berol. 2. p. 75. t. 75. Unversehrter Steinbrech. Auf Tyroleralpen. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

2. *S. crassifolia*. Pers. l. c. 1. p. 488. Dickblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Sibirien. Apr. May. Im F. 2*f*.

3. *S. sarmentosa*. Pers. l. c. Wuchernder Steinbrech. In China u. Japan. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

4. *S. umbrosa*. Pers. l. c. Schattenliebender Steinbrech. Auf Bergen in England. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

5. *S. cuneifolia*. Pers. l. c. Keilblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

6. *S. oppositifolia*. Lin. sp. pl. p. 575. Paarblättriger Steinbrech. Auf Alpen in der Schweiz, Lappland, den Spitzbergen u. den Pyrenäen. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

S. coerulea Pers. l. c.

7. *S. Geum*. Pers. l. c. Nierenblättriger Steinbrech. Auf europ. Alpen Jun. Jul. Im F. 2*f*.

8. *S. rotundifolia*. Pers. l. c. 1. p. 489. Rundblättriger Steinbrech. Auf Alpen in Oesterr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

9. *S. decipiens*. Pers. l. c. 1. p. 490. Trüglicher Steinbrech. Auf Niederalpen in Deutschland u. England. Jun. Jul. Im F. 2*f*.

414. *Gypsophila*, Gyps-kraut.

1. *G. repens*. Pers. l. c. 1. p. 492. Kriechendes Gyps-kraut. Auf Bergen in Oesterr. der Schweiz u. den Pyrenäen. May, Jun. Im F. 24.

2. *G. paniculata*. Pers l. c. Rispenblüthiges Gyps-kraut. In Sibir. u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *G. Saxifraga*. Pers. l. c. Steinbrechartiges Gyps-kraut. In Oesterr. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

415. *Saponaria*, Seifenkraut.

1. *S. officinalis*. Pers. l. c. Gemeines Seifenkraut. In Mitteleur. an Bächen. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *S. Ocymoides*. Pers. l. c. Rundblättriges Seifenkraut. In der Schweiz, Ital. u. Montpellier. Jun. — Aug. K. H. 24.

416. *Dianthus*, Nelke.

1. *D. barbatus*. Pers. l. c. 1. p. 493. Bart-Nelke. In Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *D. asper*. Willd. Enam. 1. p. 466. Rauhe Nelke. In Tyrol u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *D. carthusianorum*. Pers. l. c. Feld-Nelke. Auf sonnigen Stellen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *D. Armeria*. Pers. l. c. Büschel-Nelke. Auf dürrem Boden in Eur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

5. *D. prolifer*. Pers. l. c. Sprossende Nelke. Auf Hügeln im südlicher. Eur. u. den Linienwällen Wiens. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *D. Caryophyllus*. Pers. l. c. Garten-Nelke. In Ital. Jul. Aug. K. H. 24.

7. *D. sylvestris*. Pers. l. c. Wilde Nelke. In der Schweiz, Krain u. Kärnthen. Jun Jul. Im F. 24.

8. *D. fruticosus*. Pers. l. c. Strauchartige Nelke. In Griechenl. Jul. — Sept. K. H. 24.

9. *D. chinensis*. Pers. l. c. 1. p. 494. Chinesische Nelke. In China. Jun. — Aug. Im F. 24.

10. *D. deltoides*. Pers. l. c. Deltafleckige Nelke. In Eur. Jul. Im F. 24.

11. *D. plumarius*. Pers. l. c. Feder-Nelke. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

12. *D. superbus*. Pers. l. c. 1. p. 495. Stolze Nelke. Auf feuchten Waldwiesen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

13. *D. alpinus*. Pers. l. c. Alpen-Nelke. In Oesterr. Steyerm. u. Sibir. Jun. Jul. K. H. 24.

TRIGYNIA.

417. Cucubalus, Taubenkropf.

1. *C. Behen*. Pers. l. c. Aufgeblasener Taubenkropf. Auf Wiesen im nördlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *C. maritimus*. Pers. l. c. 1. p. 496. Meerstrands-Taubenkropf. In Südfrankr. am Meerstrande, Jun. Jul. Im F. 24.

3. *C. italicus*. Jacq. obs. bot. 4. p. 12. t. 79. Italienischer Taubenkropf. In Italien. Jun. — Aug.
Im F. 24.
Silene italica. Pers. l. c. 1. p. 498.

418. *Silene*, *Silene*.

1. *S. quinquevulnera*. Pers. l. c. Fünffleckige Silene. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *S. nutans*. Pers. l. c. Hängende Silene. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *S. fruticosa*. Pers. l. c. 1. p. 497. Strauchartige Silene. In Sicil. Jun. Jul. K. H. ♂.

4. *S. viridiflora*. Pers. l. c. Grünblühige Silene. In Ungarn, Portugall. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *S. gigantea*. Pers. l. c. Hohe Silene. In Africa. Jun. — Aug. K. H. ♂.

6. *S. ornata*. Pers. l. c. 1. p. 498. Dunkelfarbige Silene. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

7. *S. bipartita*. Pers. l. c. 1. p. 499. Zweytheilige Silene. In Sibir. Jun. — Aug. K. H. ♂.

8. *S. Armeria*. Pers. l. c. Garten-Silene. In Engl. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. ♂.

9. *S. alpestris*. Pers. l. c. 1. p. 500. Alpen-Silene. Auf den Oesterr. Alpen. Jun. — Aug. K. H. 24.

10. *S. acaulis*. Pers. l. c. Stiellose Silene. Auf Europ. Alpen. Jun. — Aug. K. H. 24.

419. *Stellaria*, Sternmiere.

1. *St. graminea*. Pers. l. c. 1. p. 501. Grasartige Sternmiere. Auf trockenen Triesten in Eur. May. Im F. 24.

420. *Arenaria*, Sandkraut.

1. *A. glandulosa*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 56. t. 355. Drüsiges Sandkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 24.

2. *A. graminifolia*. Willd. enum. 1. p. 481. Grasblättriges Sandkraut. In Sibir. der Ukrain u. Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

421. *Malpighia*, Malpighie.

1. *M. glabra*. Pers. l. c. 1. p. 505. Glatte Malpighie. In Jamaica, Curassao, Surinam u. Brasilien. May, Jun. VV. H. ½.

2. *M. glandulifera*. Jacq. collect. 4. p. 207. Ic. rar. 3. t. 469. Drüsenträgende Malpighie. In Wäldern zu Caracas. Jun. Jul. VV. H. ½.
M. glandulosa β *glandulifera*. Pers. l. c.

3. *M. argentea*. Jacq. fragm. bot. p. 57. n. 186. t. 83. Silberne Malpighie. Zu Caracas. Jul. Aug. VV. H. ½.

4. *M. tuberculata*. Pers. l. c. VWarzige Malpighie. Zu Caracas. Jun. Jul. VV. H. ½.

5. *M. urens*. Pers. l. c. 1. p. 506. Brennende Malpighie. Im wärmer. America. —. VV. H. ½.

6. *M. coccifera*. Pers. l. c. Stachelblättrige Malpighie. Im wärmer. Amer. —. VV. H. ½.

7. M.? Von der Insel Providenz.

422. Banisteria, Banisterie.

1. *B. angulosa*. Pers. l. c. Eckige Banisterie. Im wärmer. Amer. Jun. W. H. ♂.
2. *B. ciliata*. Pers. l. c. 1. p. 507. Gefranzte Banisterie. In Brasilien. Jun. Jul. W. H. ♂.
3. *B. chrysophylla*. Pers. l. c. Goldblättrige Banisterie. In Brasilien u. zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. ♂.
4. *B. tomentosa*. Desfont. cat. hort. paris. p. 136. Filzige Banisterie. In Südamer. —. W. H. ♂.
5. *B. laurifolia*. Pers. l. c. Lorbeerblättrige Banisterie. In Hispaniola u. Jamaica. —. W. H. ♂.
6. Eine noch unbeschriebene Art v. Caracas.

PENTAGYNIA.

423. Cotyledon, Nabelkraut.

1. *C. orbiculata*. Pers. l. c. 1. p. 510. Kreisblättriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♂.
2. *C. paniculata*? Pers. l. c. Rispenblüthiges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♂.
3. *C. fascicularis*. Pers. l. c. Büschelblättriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♂.
4. *C. Umbilicus*. Pers. l. c. Gemeines Nabelkraut. In Portugall, Span. u. Engl. May, Jun. K. H. 24.
5. *C. hemisphaerica*. Pers. l. c. Halbkugelförmiges Nabelkraut. In Aethiop. Jul. Aug. Ch. ♂.
6. *C. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrothes Nabelkraut. —. Febr. Ch. ♂.

7. *C. spuria*. Pers. l. c. Bastard-Nabelkraut.
Am Cap. —. Ch. ♂.

8. *C. tuberculosa*. Pers. l. c. 1. p. 511. Höckeriges Nabelkraut. Am Cap. —. Ch. ♂.

9. *C. unguis*. Pers. l. c. Hufförmiges Nabelkraut. In Africa. —. Ch. ♂.

424. *Sedum*, Mauerpfeffer.

1. *S. Telephium*. Pers. l. c. 1. p. 511. Knolliger Mauerpfeffer. Auf trockenen Hügeln v. Eur. Aug. Sept. Im F. 24.

2. *S. Anacampseros*. Pers. l. c. Rundblättriger Mauerpfeffer. Auf Felsen in der Provence u. Ital. May, Jun. Im F. 24.

3. *S. Cotyledon*. Jacq. eclog. fasc. 2. p. 27. t. 17. Nabelkraut-Mauerpfeffer. —. Jun. Jul. Ch. 24.

4. *S. Alzoon*. Pers. l. c. Gelber Mauerpfeffer. Sibir. May, Jun. Im F. 24.

5. *S. hybridum*. Pers. l. c. Gamanderblättriger Mauerpfeffer. In der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *S. populifolium*. Pers. l. c. Pappelblättriger Mauerpfeffer. Auf Alpen in Sibir. Jun. Jul. Im F. ♂.

7. *S. Rhodiola*. Decand. pl. succ. p. 143. t. 143. Rosenwurzartiger Mauerpfeffer. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien, Lappland u. England. Jun. Jul. Im F. 24.
Rhodiola rosea. Pers. l. c. 2. p. 625.

8. *S. spinosum*. Willd. enum. 1. p. 485.
Stachliger Mauerpfeffer. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

Crassula spinosa. Pers. l. c. 1. p. 339.

9. *S. dasypHYLLUM*. Pers. l. c. 1. p. 512. Be-reifter Mauerpfeffer. Auf Felsen in Südeur. beson-ders der Schweiz. Jun. Jul. K. H. 24.

10. *S. reflexum*. Pers. l. c. Zurückgebogener Mauerpfeffer. Am Fusse der Berge in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *S. rupestre*. Pers. l. c. Felsen-Mauerpfe-fer. Auf Felsen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

425. Oxalis, Sauerklee.

1. *O. monophylla*. Pers. l. c. 1. p. 514. Ein-blättriger Sauerklee. Ist, wie alle folgende, bey welchen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap zu Hause. Nov. Dec. Ch. 24.

2. *O. lepida*. Pers. l. c. Niedlicher Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.

3. *O. rostrata*. Pers. l. c. Schnabelförmiger Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.

4. *O. asinina*. Pers. l. c. Eselsohrblättriger Sauerklee. Nov. Ch. 24.

5. *O. leporina*. Pers. l. c. Hasenohrblättriger Sauerklee. Nov. Ch. 24.

6. *O. crispia*. Pers. l. c. Krauser Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 24.

7. *O. fabaefolia*. Pers. l. Bohnenblättriger Sauerklee. Oct. Ch. 24.

8. *O. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättriger Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 24.
9. *O. virginea*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 13. t. 275. Blasfer Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.
10. *O. fuscata*. Pers. l. c. Braunfleckiger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.
11. *O. exaltata*. Pers. l. c. Steifshaftiger Sauerklee. Dec. Ch. 24.
12. *O. grandiflora*. Pers. l. c. 1. p. 515. Grossblüthiger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.
13. *O. purpurea*. Pers. l. c. Purpurblüthiger Sauerklee Sept. Oct. Ch. 24.
14. *O. laxula*. Pers. l. c. Schlaffer Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.
- β. *floribus rubris*. Mit rothen Blüthen.
15. *O. speciosa*. Pers. l. c. Schönster Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.
- β. *suggillata*. Mit blaurothen Blattstielen.
γ. *rigidula*. Mit steifen Blattstielen.
16. *O. Acetosella*. Pers. l. c. Gemeiner Sauerklee. In schattigen Hainen v. ganz Eur. u. Japan. Apr. — Jun. Im F. 24.
17. *O. marginata*. Pers. l. c. Randblättriger Sauerklee. Oct. Ch. 24.
18. *O. pulchella*. Pers. l. c. Schöner Sauerklee. Oct. Ch. 24.
19. *O. punctata*. Pers. l. c. Punktirter Sauerklee. Oct. Ch. 24.
20. *O. pusilla*. Pers. l. c. 1. p. 516. Niedriger Sauerklee. Dec. Ch. 24.

— 165 —

21. *O. cruentata*. Jacq. eclog. fasc. 5. p. 66.
t. 45. Blathfleckiger Sauerklee. Apr. May. Ch. 24.
22. *O. compressa*. Pers. l. c. Flachstieliger
Sauerklee. Jän. Febr. Ch. 24.
23. *O. tetraphylla*. Pers. l. c. Vierblättriger
Sauerklee In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.
24. *O. violacea*. Pers. l. c. Violetter Sauer-
klee. In Virgin. u. Canada. Bl. den ganzen Sommer
hindurch. Ch. 24.
25. *O. cernua*. Pers. l. c. Hängender Sauer-
klee. Oct. — Febr. Ch. 24.
26. *O. dentata*. Pers. l. c. Gezähnter Sauer-
klee. Nov. Ch. 24.
27. *O. livida*. Pers. l. c. Blaublättriger Sauer-
klee. Nov. Dec. Ch. 24.
28. *O. purpurata*. Jacq. hort. schoenbr. 3.
p. 57. t. 35^b. Purpurblättriger Sauerklee. Nov.
Dec. Ch. 24.
29. *O. convexula*. Pers. l. c. 1. p. 517. Bo-
gigblättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.
30. *O. versicolor*. Pers. l. c. Bunter Sauer-
klee. Sept. Oct. Ch. 24.
31. *O. elongata*. Pers. l. c. Langstieliger
Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.
32. *O. polyphylla*. Pers. l. c. Vielblättriger
Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.
33. *O. hirta*. Pers. l. c. Rauher Sauerklee.
Sept. Oct. Ch. 24.
34. *O. multiflora*. Pers. l. c. 1. p. 518.
Vielblütiger Sauerklee. Oct. Nov. Ch. 24.

35. *O. rubella*. Pers. l. c. Röthlicher Sauerklee. Oct. — Dec. Ch. 24.

36. *O. reptatrix*. Pers. l. c. Wuchernder Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

37. *O. incarnata*. Pers. l. c. Fleischfarbig-blättriger Sauerklee. Nov. Dec. Ch. 24.

38. *O. stricta*. Pers. l. c. Steifer Sauerklee. In Virgin. u. Jamaica. May — Aug. Im F. 24.

39. *O. pectinata*. Pers. l. c. 1. p. 519. Langblättriger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

β. *floribus plenis*. Mit gefüllten Blüthen.

40. *O. flabellifolia*. Pers. l. c. Fächerblättriger Sauerklee. Sept. Oct. Ch. 24.

41. *O. flava*. Pers. l. c. Gelber Sauerklee. Sept. Ch. 24.

42. *O. corniculata*. Pers. l. c. Gehörnter Sauerklee. In Südeur. u. Japan. Jun. — Aug. Im F. 24.

43.)

44.)

45.) Noch unbeschriebene Capische Arten.

46.)

47.)

426. Agrostemma, Raden.

1. *A. Coronaria*. Pers. l. c. Garten-Raden. In Ungarn, Ital. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ♂.

β. *floribus plenis*. Mit gefüllten Blüthen.

2. *A. Flos jovis*. Pers. l. c. 1. p. 520. Doldentraubiger Raden. In der Schweiz, der Pfalz u. Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *A. Coeli rosa.* Pers. l. c. Glattblättriger Raden. In Sicilien u. im Orient. Jun. Jul. Im F. ☽.

427. **Lychnis, Lichtröslein.**

1. *L. chalcedonica.* Pers. l. c. Scharlachrothes Lichtröslein. In ganz Russland. Jun. Im F. 24.

2. *L. Flos cuculi.* Pers. l. c. Kuckucks-Lichtröslein. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *L. coronata.* Pers. l. c. Grossblüthiges Lichtröslein. In China u. Japan. Jul. Ch. 24.
L. grandiflora. Jacq. ic. rar. 1. t. 84. Collect. 1. p. 149.

4. *L. Viscaria.* Pers. l. c. Klebriges Lichtröslein. Auf trockenen Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *L. dioica.* Pers. l. c. Gemeines Lichtröslein. Zwischen den Saaten in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *L. laeta.* Pers. l. c. Angenehmes Lichtröslein. In Portugall. Jun. Jul. Im F. ☽.

D E C A G Y N I A.

428. **Phytolacca, Kermesbeere.**

1. *Ph. octandra.* Pers. l. c. 1. p. 522. Achtfädige Kermesbeere. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.

2. *Ph. abyssinica.* Pers. l. c. 1. p. 523. Abyssinische Kermesbeere. In Abyssinien.—. W. H. h.

3. *Ph. decandra*. Pers. l. c. Zehnfädige Kermesbeere. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

429. *Asarum*, Haselwurz.

1. *A. europaeum*. Pers. l. c. 2. p. 1. Europäische Haselwurz. In Hainen v. Eur. Apr. Im F. 24.

430. *Bocconia*, Bocconie.

1. *B. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Bocconie. In Westind. Dec. — Febr. W. H. 5.

2. *B. cordata*. Pers. l. c. Herzblättrige Bocconie. In China. Jul. Aug. K. H. 24.

431. *Halesia*, Halesie.

1. *H. tetraptera*. Pers. l. c. 2. p. 4. Vierflügelige Halesie. In schattigen Wäldern zu Carolina. Jun. K. H. 5.

432. *Decumaria*, Decumarie.

1. *D. barbara*. Pers. l. c. Gemeine Decumarie. In Carol. Jun. K. H. 5.

433. *Canella*, Canellbaum.

1. *C. alba*. Pers. l. c. Weisser Canellbaum. In den innern Wäldern v. Ostind. Jun. Jul. W. H. 5.

434. Triumfetta , Triumfette.

1. *Tr. Lappula*. Pers. l. c. 2. p. 5. Kelchfö-
se Triumfette. In Jamaika , Brasilien u. den Ber-
mudischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ♂.

2. *Tr. semitriloba*. Pers. l. c. Dreylappige
Triumfette. Im wärmer. Amer. Dec. — März.
W. H. ♂.

435. Portulaca , Portulak.

1. *P. pilosa*. Pers. l. c. 2. p. 6. Haariger
Portulak. In Südamer. Jun. Jul. Ch. ○.

436. Talinum , Talinum.

1. *T. Anacampseros*. Pers. l. c. Nabelkraut-
artiges Talinum. Am Cap. —. Ch. ♂.

2. *T. filamentosum*. Curt. bot. mag. t. 1367.
Vielfädiges Talinum. Am Cap. —. Ch. ♂.

437. Lythrum , Weiderich.

1. *L. Salicaria*. Pers. l. c. 2. p. 7. Gemei-
ner Weiderich. An Bächen in Eur. Jun. Jul. Im
F. 2.

2. *L. virgatum*. Pers. l. c. Ruthenförmiger
Weiderich. In Oesterr. Sibirien u. der Tartarey
auf trockenen Heiden. Jun. Jul. Im F. 2.

DIGYNIA.

438. Heliocarpus , Sonnenfrucht.

1. *H. americana*. Pers. l. c. 2. p. 9. Ame-
ricanische Sonnenfrucht. Auf Veracruz. Febr.
März. W. H. ♂.

2. *H?* Von Caracas.
Heliocarpus americana. Jacq. Hort. schoenbr.
 4. p. 26. t. 453.

439. Agrimonia, Odermennig.

1. *A. Eupatoria.* Pers. l. c. Gemeiner Odermennig. In Europ. Wäldern. Jul. Aug. Im F. 24.

2. *A. odorata.* Pers. l. c. Wohlriechender Odermennig. In Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

TRIGYNIA.

440. Reseda, Resede.

1. *R. lutea.* Pers. l. c. 2. p. 10. Gelbe Resede. (Wau). In Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. ①.

2. *R. odorata.* Pers. l. c. Wohlriechende Resede. In Aegypten. Blüht den ganzen Sommer hindurch. K. H. ♂.

441. Aristotelia, Aristotelie.

1. *A. Macqui.* Pers. l. c. Chilische Aristotele. In Chili. May, Jun. Ch. ♂.

442. Euphorbia, Wolfsmilch.

1. *E. antiquorum.* Pers. l. c. Wahre Wolfsmilch. In Ind. u. Aegypt. — . W. H. ♂.

2. *E. trigona.* Mill. dict. n. 2. Dreyeckige Wolfsmilch. In Westind. — . W. H. ♂.

3. *E. canariensis.* Pers. l. c. Canarische Wolfsmilch. Auf den Canarisch. Inseln. — . Ch. ♂.

4. *E. cereiformis*. Pers. l. c. Fackeldistelartige Wolfsmilch. In Aethiop. —. Ch. ♂.

5. *E. officinarum*. Pers. l. c. Harzbringende Wolfsmilch. Im wärmer. Africa. —. W. H. ♂.

6. *E. nereifolia*. Pers. l. c. 2. p. 11. Oleanderblättrige Wolfsmilch. In Ostind. —. W. H. ♂.

7. *E. loricata*. Pers. l. c. Vieldornige Wolfsmilch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

E. Histrix. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 43. t. 207.

8. *E. Caput medusae*. Pérs. l. c. Medusenhaupt-Wolfsmilch. Am Cap u. in Aethiop. —. Ch. ♂.

9. *E. Ornithopus*. Jacq. fragm. bot. p. 76. n. 238. t. 120. f. 2. Vogelfußartige Wolfsmilch. Am Cap? Jun. Jul. Ch. ♂.

10. *E. bupleurifolia*. Pers. l. c. Hasenöhrlein-Wolfsmilch. Am Cap. März, Apr. Ch. ♂.

11. *E. mauritanica*. Pers. l. c. Mauritanische Wolfsmilch. In Africa. Jul. Aug. W. H. ♂.

12. *E. bracteata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 14. t. 276. Beblätterte Wolfsmilch. —. Apr. — Aug. W. H. ♂.

13. *E. atropurpurea*. Willd. enum. 1. p. 501. Dunkelrothe Wolfsmilch. Zu Teneriffa. —. W. H. ♂.

14. *E. piscatoria*. Pers. l. c. Fischer-Wolfsmilch. Auf Madera u. den Canarischen Inseln. —. Ch. ♂.

15. *E. biglandulosa*. Willd. enum. suppl. p. 27. Zweydrüsige Wolfsmilch. —. —. W. H. ♂.

16. *E. Tithymaloides*. Pers. l. c. Saftige Wolfsmilch. Im wärmer Amer. —. VV. H. ♂.

17. *E. cyatophora*. Pers. l. c. 2. p. 12. Geigenblättrige Wolfsmilch. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. VV. H. ♂.

18. *E. nudiflora*. Pers. l. c. Nacktblühige Wolfsmilch. —. Jun. Jul. VV. H. ♂.

19. *E. mellifera*. Pers. l. c. Honigbringende Wolfsmilch. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. ♂.

20. *E. linariifolia*. Pers. l. c. Löwenmaulblättrige Wolfsmilch. —. Aug. — Oct. Ch. ♂.

21. *E. picta*. Pers. l. c. 2. p. 13. Bemahlte Wolfsmilch. Auf Venezuela. —. VV. H. ♀.

22. *E. spartoides*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 44. t. 486. Pfriemenartige Wolfsmilch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

23. *E. Lathyris*. Pers. l. c. 2. p. 15. Kreuzblättrige Wolfsmilch. In Deutschl. Ital. Frankr. u. der Schweiz. Aug. Im F. ♂.

24. *E. laeta*. Pers. l. c. Seidelbastblättrige Wolfsmilch. —. Jun. Jul. Ch. ♂.

E. divaricata. Jacq. ic. rar. t. 87. Collect. 1. p. 58.

25. *E. nummulariaefolia*. Willd. enum. 1. p. 503. Pfennigkrautblättrige Wolfsmilch. —. —. Ch. ♂.

26. *E. dulcis*. Lin. sp. pl. p. 656. Süsse Wolfsmilch. In Waldungen v. Oesterr. Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ○.

E. purpurata. Pers. l. c. 2. p. 16.

27. *E. portlandica*. Pers. l. c. Englische Wolfsmilch. In England. Jun. Jul. K. H. ♂.

28. *E. palustris*. Pers. l. c. 2. p. 18. Sumpf-Wolfsmilch. In Deutschl. Niederland. u. Südschweden. Jul. Aug. Im F. 24.

29. *E. Characias*. Pers. l. c. 2. p. 19. Thal-Wolfsmilch. In Frankr. Span. u. Ital. Jun. — Dec. K. H. ½.

30. *E. veneta*. Willd. enum. 1. p. 507. Venetianische Wolfsmilch. Im Venetianischen am Meerestrande. Jul. Aug. K. H. ½.

31. Eine noch unbeschriebene Art.

443. Visnea, Visnea.

1. *V. Mocanera*. Pers. l. c. Canarische Visnea. Auf waldigen Bergen der Canarisch. Inseln. — Ch. ½.

DODECAGYNIA.

444. Sempervivum, Hauswurz.

1. *S. arboreum*. Pers. l. c. 2. p. 20. Baumartige Hauswurz. In Portugal, Candien, Corfu u. Zante. May, Jun. K. H. ½.

2. *S. foliis luteo-marginatis*. Mit gelbgeränderten Blättern.

2. *S. canariense*. Pers. l. c. Canarische Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. May, Jun. K. H. ½.

3. *S. glutinosum*. Pers. l. c. Klebrige Hauswurz. Zu Madera. Febr. — May. Ch. ½.

4. *S. globiferum*. Pers. l. c. Kugelknospige Hauswurz. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. u. Russland. Jun. Jul. Im. F. 24.

5. *S. tortuosum*. Pers. l. c. Gedrehte Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. — K. H. ♂.

6. *S. stellatum*. Pers. l. c. Sternförmige Hauswurz. Auf dem Monte Baldo. Jun. Jul. K. H. ♂.

7. *S. arachnoideum*. Pers. l. c. Spinnenwebenartige Hauswurz. Auf Alpen in Tyrol, Ital. der Schweiz u. den Pyrenäen. Jul. Aug. K. H. ♀.

8. *S. sediforme*. Jacq. hort. vindob. 1. p. 35. t. 31. Mauerpfefferartige Hauswurz. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♀.

Sedum altissimum. Pers. l. c. 1. p. 512.

9. *S. monanthos*. Pers. l. c. Einblüthige Hauswurz. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. K. H. ♀.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

445. *Cactus*, Fackeldistel.

1. *C. mamillaris*. Pers. l. c. 2. p. 22. Watzentragende Fackeldistel. Auf Felsen im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. ♂.

2. *C. coronatus*. Willd. enum. suppl. p. 30. Gekrönte Fackeldistel. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. VV. H. ♂.

3. *C. stellatus*. Willd. l. c. Gesternte Fackeldistel. Im wärmer. Amer. März, Jul. VV. H. ♂.

4. *C. abnormis*. Willd. l. c. p. 31. Abweichende Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. VV. H. ♂.
C. monstrosus. Hort. paris.

5. *C. cylindricus*. Pers. l. c. Walzenförmige Fackeldistel. In Peru. —. W. H. ♂.

6. *C. serpentinus*. Willd. l. c. Schlangenförmige Fackeldistel. —. —. W. H. ♂.

7. *C. speciosus*. Willd. l. c. Schöne Fackeldistel. —. Jun. Jul. W. H. ♂.

8. *C. tetragonus*. Pers. l. c. Viereckige Fackeldistel. Zu Curassao. —. W. H. ♂.

9. *C. pentagonus*. Pers. l. c. Fünfeckige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♂.

10. *C. hexagonus*. Pers. l. c. Sechseckige Fackeldistel. Zu Surinam. Jul. W. H. ♂.

11. *C. peruvianus*. Pers. l. c. Peruvianische Fackeldistel. In Peru. —. W. H. ♂.

12. *C. repandus*. Pers. l. c. Ausgeschweifte Fackeldistel. Im wärmer Amer. Jun. —. Aug. W. H. ♂.

13. *C. niger*. Hort. dyckensis. Schwarze Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♂.

14. *C. flavispinus*. Hort. dyck. Gelbstachlige Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♂.

15. *C. Royeni*. Pers. l. c. 2. p. 23. Royensche Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♂.
C. crenulatus. Hort. dyck.

16. *C. eburneus*. Hort. dyck. Elfenbeinstachlige Fackeldistel. In Curassao. —. W. H. ♂.

17. *C. multangularis*. Willd. l. c. p. 33. Vieleckige Fackeldistel. —. —. W. H. ♂.

18. *C. grandiflorus*. Pers. l. c. Grossblumige Fackeldistel. In Jamaica u. Veracruz. Jun. Jul. W. H. ♂.

19. *C. reptans*. Willd. l. c. Kriechende Fackeldistel. In Südamer. — . W. H. Ქ.

20. *C. flagelliformis*. Pers. l. e. Peitschenförmige Fackeldistel. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. Ქ.

21. *C. pendulus*. Pers. l. c. Hängende Fackeldistel. Zu Jamaica u. Hispaniola. Bl. den ganzen Sommer hindurch. W. H. Ქ.
Rhipsalis Cassuta, Gaertn. de sem. 1. p. 137. t. 28. f. 1.

22. *C. parasiticus*. Pers. l. c. Schmarozende Fackeldistel. In Westind. u. Südamer. — . W. H. Ქ.

23. *C. triangularis*. Pers. l. c. Dreyeckige Fackeldistel. In Brasilien, Jamaica u. Martinique. — . W. H. Ქ.

24. *C. triqueter*. Willd. l. c. Dreyseitige Fackeldistel. In Westind. u. Südamer. — . W. H. Ქ.

25. *C. brasiliensis*. Willd. l. c. Brasilianische Fackeldistel. In Brasilien. — . W. H. Ქ..

26. *C. monacanthos*. Willd. l. c. Einstachlige Fackeldistel. In Südamer. — . W. H. Ქ.

27. *C. Opuntia*. Pers. l. c. Gemeine Fackeldistel. In Peru. u. Virgin. jetzt auch in Südtirol, der Südschweiz, Ital. Minorca, Spanien u. Portugal. May, Jun. K. H. Ქ.

28. *C. polyanthos*. Decand. pl. succul. fasc. 24. n. 138. Vielblumige Fackeldistel. In Südamer. — . W. H. Ქ.

C. Opuntia β *polyanthos*. Pers. l. c.

29. *C. setaceus*. Hort. dyck. Borstige Fackeldistel. In Südamer. — . W. H. Ქ.

30. *C. Ficus indica*. Pers. l. c. Indische Fackeldistel. Im wärmer. Amer. — . W. H. Ქ.

31. *C. decumanus*. Willd. l. c. p. 34. Große Fackeldistel. —. —. W. H. ♂.

32. *C. elongatus*. Willd. l. c. Verlängerte Fackeldistel. —. —. W. H. ♂.

33. *C. Tuna*. Pers. l. c. Breite Fackeldistel. Im wärmer. Amer. u. Jamaica. —. W. H. ♂.

34. *C. elatior*. Willd. l. c. Hohe Fackeldistel. Auf der Insel St. Eustach. —. W. H. ♂.
C. Tuna β. elatior. Pers. l. c.

35. *C. triacanthos*. Willd. l. c. Dreystachlige Fackeldistel. In Westind. —. W. H. ♂.

36. *C. inermis*. Hort. dyck. Wehrlose Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♂.

37. *C. curassaricus*. Pers. l. c. Curassavische Fackeldistel. In Curassao. —. W. H. ♂.

38. *C. spinosissimus*. Pers. l. c. Vielstachlige Fackeldistel. In Jamaica. —. W. H. ♂.

39. *C. foliosus*. Willd. l. c. p. 35. Beblätterte Fackeldistel. —. —. W. H. ♂.

40. *C. pusillus*. Hort. dyck. Kleine Fackeldistel. In Südamer. —. W. H. ♂.

41. *C. alatus*. Pers. l. c. Geflügelte Fackeldistel. In Jamaica. —. W. H. ♂.

42. *C. Phyllanthus*. Pers. l. c. Dünngliedrige Fackeldistel. In Brasilien u. Surinam. Jun. — Aug. W. H. ♂.

43. *C. Pereskia*. Pers. l. c. Grossblättrige Fackeldistel. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♂.

44.) Eine noch unbeschriebene Art.

446. *Philadelphus*, Pfeifenstrauch.

1. *Ph. coronarius*. Pers. l. c. 2. p. 24. Wohlriechender Pfeifenstrauch. In Südeur. May, Jun.
Im F. ♂.

♂. nanus. Mit zwergartigem Wuchse.

2. *Ph. grandiflorus*. Willd. enum. 1. p. 511. Großblüthiger Pfeifenstrauch. In Nordamer. Jun.
Im F. ♂.

Ph. inodorus. Hortulan.

447. *Leptospermum*, Südseemyrthe.

1. *L. scoparium*. Pers. l. c. Besenartige Südseemyrthe. Wächst wie die folgenden in Australien. —. Ch. ♂.

L. squarrosum. Gaert. de sem. 1. p. 174. t. 35.

2. *L. lanigerum*. Pers. l. c. Wollige Südseemyrthe. —. Ch. ♂.

3. *L. pubescens*. Pers. l. c. Weichbehaarte Südseemyrthe. Jul. Aug. Ch. ♂.

4. *L. juniperinum*. Pers. l. c. Wachholderblättrige Südseemyrthe. —. Ch. ♂.

5. *L. ambiguum*. Pers. l. c. Zweifelhafte Südseemyrthe. —. Ch. ♂.

Metrosideros corifolia. Vent. hort. malmais. p. 46. t. 46.

6. *L. ? rubricaulis*. Hort. paris. Rothstielige Südseemyrthe. —. Ch. ♂.

448. *Fabricia*, Fabricie.

1. *F. laevigata*. Pers. l. c. 2. p. 25. Glatte Fabricie. In Neuholl. —. Ch. ♂.

449. Metrosideros, Eisenmass.

1. *M. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättriges Eisenmass. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

2. *M. laurifolia*. Desfont. catalog. hort. paris. p. 171. In Neuholl. — . Ch. ♂.

3. *M. marginata*. Pers. l. c. Gerändertes Eisenmass. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♂.

4. *M. linearis*. Pers. l. c. 2. p. 26. Linienblättriges Eisenmass. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♂.

5. *M. lanceolata*. Pers. l. c. Lanzenblättriges Eisenmass. In Neuholl. Jun. Jul. Ch. ♂.

M. lophantha. Vent. hort. cels. p. 69. t. 69.
— *citrina*. Curt. bot. mag. t. 260.

6. *M. saligna*. Pers. l. c. Weidenartiges Eisenmass. In Neuholl. — . Ch. ♂.

7. *M. pubescens*. Donn catalog. hort. cantabr. p. 145. Weichhaariges Eisenmass. In Neuholl. — . Ch. ♂.

8. *M. myrtifolia*. Hort. paris. Myrthenblättriges Eisenmass. In Neuholl. — . Ch. ♂.

9. *M. rigida*. Donn catalog. hort. cantabr. p. 145. Steifes Eisenmass. In Neuholl. — Ch. ♂.

10. Eine noch unbeschriebene Art.

450. Melaleuca, Melaleuca.

1. *M. squarrosa*. Pers. l. c. Sparrige Melaleuca. Ist sammt den folgenden in Neuholland zu Hause. — Ch. ♂.

M. myrtifolia, Vent. hort. malmais. p. et t. 47.

2. *M. stypheleoides*. Pers. l. c. Styphelienartige Melaleuca. — . Ch. ♂.
M. obliqua. Hortulan.

3. *M. ericaefolia*. Pers. l. c. Heidenartige Melaleuca. Jun. Jul. Ch. ♂.
M. alba. Hortulan.

4. *M. nodosa*. Pers. l. c. Knotige Melaleuca.
— . Ch. ♂.

5. *M. thymifolia*. Pers. l. c. Quendelblättrige Melaleuca. — . Ch. ♂.

6. *M. hypericifolia*. Pers. l. c. 2. p. 27. Johanniskrautartige Melaleuca. — . Ch. ♂.

551. Psidium, Gujavabaum.

1. *Ps. pomiferum*. Pers. l. c. Aepfeltragen der Gujavabaum. In beyden Ind. Jun. VV. H. ♂.

2. *Ps. guineense*. Pers. l. c. Africanischer Gujavabaum. Auf der Prinzeninsel bey Guinea.
— . VV. H. ♂.

3. *Ps. montanum*. Pers. l. c. Berg-Gujavabaum. Auf Bergen in Jamaica. — . VV. H. ♂.

452. Eugenia, Jambusenbaum.

1. *E. Jambos*. Pers. l. c. Gemeiner Jambusenbaum. In Ostind. Jul. Aug. VV. H. ♂.

2. *E. baruensis*. Pers. l. c. Baruscher Jambusenbaum. Auf der Insel Baru bey Carthagena in Amer. Jul. Aug. VV. H. ♂.

3. *E. balsamica*. Jacq. fragm. bot. p. 41. n. 138. t. 45. f. 2. Balsamischer Jambusenbaum. In Jamaica, May, Jun. VV. H. ♂.

4. *E. uniflora*. Pers. l. c. 2. p. 29. Einblütiger Jambusenbaum. In Brasil. Apr. — Jun. VV.
H. h.

Plinia pedunculata. Lin. suppl. 253.

453. Myrtus, Myrthe.

1. *M. communis*. Pers. l. c. 2. p. 30. Gemeine Myrthe. In Südeur. Asien u. Africa. Jun. — Aug. K. H. h.

β. *tarentina*. Mit Buchsblättern.

γ. *italica*. — scharfgespitzten Blättern u. aufrechten Zweigen.

δ. *baetica*. Mit Pomeranzenblättern.

2. *M. Pimenta*. Pers. l. c. 2. p. 31. Pfefferartige Myrthe. In Westind. —. VV. H. h.

454. Eucalyptus, Schönmütze.

1. *E. resinifera*. Pers. l. c. 2. p. 32. Harzbringende Schönmütze. In Neuholl. wie alle folgende. —. Ch. h.

2. *E. saligna*. Pers. l. c. Weidenblättrige Schönmütze. —. Ch. h.

3. *E. obliqua*. Pers. l. c. Schiefblättrige Schönmütze. —. Ch. h.

4. *E. glauca*. Donn cat. hort. cantabr. p. 146. Graugrüne Schönmütze. —. Ch. h.

5. *E. hypericifolia*. Hort. paris. Hartheublättrige Schönmütze. —. Ch. h.

455. *Punica*, Granate.

1. *P. granatum*. Pers. l. c. 2. p. 33. Gemeine Granate. In Südeur. u. Persien. Jul. Aug. K. H. ♂.

β. floribus plenis rubris. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. floribus plenis albis. — Weifsgefüllten Blüthen.

456. *Amygdalus*, Mandel.

1. *A. Persica*. Pers. l. c. Persische Mandel. (Pürschig). In Persien. Apr. Im F. ♂.

2. *A. communis*. Pers. l. c. 2. p. 34. Gemeine Mandel. In Mauritanien u. der Schweiz. Apr. Im F. ♂.

β. amara. Mit bittern Früchten.

3. *A. pumila*. Willd. 1. p. 516. Niedrige Mandel. In Africa. Apr. Im F. ♂.

4. *A. nana*. Pers. l. c. Zwerg-Mandel. In Ungarn, Croatiens, Sibirien u. der Tartarey. Apr. Im F. ♂.

5. *A. orientalis*. Pers. l. c. Silberblättrige Mandel. Im Orient. May. Im F. ♂.

A. argentea. Lam. encycl. 1. p. 103.

457. *Prunus*, Pflaume.

1. *Pr. Padus*. Pers. l. c. Vogel-Pflaume. (Elexe). In Eur. Apr. Im F. ♂.

2. *Pr. rubra*. Willd. arb. berol. p. 299. Rothfrüchtige Pflaume. — May. Im F. ♂.

P. Padus β *rubra*. Pers. l. c.

3. *Pr. virginiana*. Pers. l. c. Virginische Pflaume. In Virgin. May, Jun. Im F. ᄁ.
4. *Pr. serotina*. Pers. l. c. Späthblühende Pflaume. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ᄁ.
5. *Pr. canadensis*. Pers. l. c. Canadische Pflaume. In Nordamer. Apr. Im F. ᄁ.
6. *Pr. lusitanica*. Pers. l. c. Portugisische Pflaume. In Portug. u. Pensylvan. Jun. Im F. ᄁ.
7. *Pr. caroliniana*. Pers. l. c. Carolinische Pflaume. In Südcarolina. Apr. May. K. H. ᄁ.
8. *Pr. Lauro-Cerasus*. Pers. l. c. Lorbeer-blättrige Pflaume. (Kirschlorbeer). Zu Trapezunt. May. K. H. ᄁ.
9. *Pr. Mahaleb*. Pers. l. c. Mahaleb-Pflaume. In Deutschl. u. der Schweiz. Apr. Im F. ᄁ.
10. *Pr. Armeniaca*. Lin. sp. pl. p. 679. Apricosen-Pflaume. (Apricose). Im Orient. Apr. Im F. ᄁ.
Armeniaca vulgaris. Pers. l. c. 2. p. 36.
- β. *praecox*. Mit kleinen gelben Früchten.
- γ. *persicoides*. Mit etwas zusammengedrückten grossen Früchten.
11. *Pr. dasycarpa*. Ehrh. Beytr. 6. p. 90. Rauhe Pflaume. (Schwarze Apricose). Im Orient? Apr. Im F. ᄁ.
Armeniaca sibirica β *dasycarpa*. Pers. l. c.
12. *Pr. pumila*. Pers. l. c. 2. p. 34. Zwerg-Pflaume. In Canada. May. Im F. ᄁ.
13. *Pr. Chamaecerasus*. Pers. l. c. Strauch-artige Pflaume Auf Oesterr. Alpen. May. Im F. ᄁ.
14. *Pr. Cerasus*. Pers. l. c. Saure Pflaume. (Weichsel). In Eur. May. Im F. ᄁ.

15. *Pr. avium*. Pers. l. c. 2. p. 35. Süsse Pflaume. (Kirsche). Im nördlicher. Eur. Apr. May. Im F. ♂.

16. *Pr. semperflorens*. Pers. l. c. Immerblühende Pflaume. — Bl. den ganzen Sommer hindurch. Im F. ♂.

17. *Pr. pensylvanica*. Pers. l. c. Pensylvanische Pflaume. In Nordamer. May. Im F. ♂.

18. *Pr. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Pflaume. In Nordamer. May. Im F. ♂.

19. *Pr. domestica*. Pers. l. c. Gemeine Pflaume. Auf Höhen in Eur. May, Jun. Im F. ♂.

20. *Pr. cerasifera*. Pers. l. c. Runde Pflaume. In Nordamer. May. Im F. ♂.

21. *Pr. insiticia*. Pers. l. c. Krichen-Pflaume. In Deutschl. der Schweiz u. England. May, Jun. Im F. ♂.

22. *Pr. spinosa*. Pers. l. c. Schlehen-Pflaume. Auf sonnigen Hügeln in Eur. May, Jun. Im F. ♂.

23. Eine noch unbeschriebene Art, mit ausgerandeten Kelchblättern.

DIGYNIA.

458. Waldsteinia, Waldsteinie,

1. *W. geoides*. Pers. l. c. 2. p. 36. Geumartige Waldsteinie. In Ungarns schattigen Wäldern. Apr. Im F. 24.

459. Sorbus, Eberesche.

1. *S. aucuparia*. Pers. l. c. 2. p. 38. Gemeine Eberesche. (Vogelbeere). In kalten Gegen-
den v. Eur. Jun. Jul. Im F. ᄁ.

2. *S. hybrida*. Pers. l. c. Bastard-Eberesche.
In Gothland u. Thüringen. Jun. Im F. ᄁ.

3. *S. domestica*. Pers. l. c. 2. p. 39. Zahme
Eberesche. (Speyerling). Im wärmer. Eur. Jun.
Im F. ᄁ.

PENTAGYNIA.

460. Mespilus, Mispel.

1. *M. germanica*. Pers. l. c. Gemeine Mispel.
In Wäldern v. Eur. Jul. Im F. ᄁ.

2. *M. japonica*. Pers. l. c. Japanische Mis-
pel. In Japan. Nov. Ch. ᄁ.

3. *M. Pyracantha*. Lin. sp. pl. p. 685. Im-
mergrüne Mispel. In Südfrankr. u. Italien. Jun.
Im F. ᄁ.
Crataegus pyracantha. Pers. l. c. 2. p. 37.

4. *M. Cotoneaster*. Pers. l. c. Quitten-
Mispel. Auf sonnigen Berghügeln im kälter.
Eur. May, Jun. Im F. ᄁ.

5. *M. Chamae-Mespilus*. Lin. l. c. Niedri-
ge Mispel. Auf Alpen in Oesterr. u. den Pyre-
näen. Jun. Im F. ᄁ.
Aronia Chamae-Mespilus. Pers. l. c. 2. p. 39.

6. *M. Crus galli*. Willd. enum. 1. p. 522.
Glänzende Mispel. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♂.

Crataeg. Crus galli. Pers. l. c. 2. p. 37.

7. *M. coccinea*. Willd. l. c. 1. p. 523. Scharlachrothe Mispel. In Virgin. Pensylvan. u. Canada. Apr. May. Im F. ♂.

Crataeg. coccinea. Pers. l. c. 2. p. 36.

8. *M. cordata*. Willd. l. c. Ahornblättrige Mispel. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♂.

Crataeg. cordata. Pers. l. c.

9. *M. pyrifolia*. Willd. l. c. Birnenblättrige Mispel. In Nordamer. May. Im F. ♂.

Crataeg. pyrifolia. Pers. l. c.

10. *M. glandulosa*. Willd. l. c. Drüsige Mispel. In Nordamer. Jun. Im F. ♂.

Crataeg. glandulosa. Pers. l. c. 2. p. 37.

11. *M. punctata*. Willd. l. c. 1. p. 524. Punktirte Mispel. In Nordamer. Jun. Im F. ♂.

Crataegus punctata. Pers. l. c.

— *cuneifolia*. Ehrh. Beytr. 3. p. 21.

12. *M. nigra*. Willd. l. c. Schwarze Mispel. In Ungarn. Jun. Im F. ♂.

Crataegus nigra. Waldst. et Kitaih. pl. rar. hung. 1. p. 62. t. 61.

13. *M. Oxyacantha*. Willd. l. c. Weißdorn-Mispel. Auf trockenen Hügeln in Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

Crataeg. Oxyacantha. Pers. l. c. 2. p. 38.

14. *M. monogyna*. Willd. l. c. Einsamige Mispel. An Hecken in Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.
Crataeg. monogyna. Pers. l. c.

β. floribus rubris. Mit rothen Blüthen.

γ. — plenis. Mit rothgefüllten Blüthen.

15. *M. Azarolus*. Willd. l. c. 1. p. 525.
Azarol-Mispel. In Krain, bey Florenz, u. Montpelier. May. Im F. ♂.
Crataeg. Azarolus. Pers. l. c.

16. *M. pentagyna*. Willd. l. c. Fünfsamige Mispel. In der Syrmier Gespannschaft in Sclavonien u. im Banat. Jun. Im F. ♂.
Crataeg. pentagyna. Pers. l. c.

461. *Pyrus*, Birne.

1. *P. arbutifolia*. Lin. suppl. 256. Sandbeerblättrige Birne. In Virgin. Jun. Im F. ♂.
Aronia arbutifolia. Pers. l. c. 2. p. 39.
Mespilus arbutifolia. Lin. sp. pl. p. 685.

2. *P. Botryapium*. Lin. suppl. 255. Traubebirne. In Virgin. u. Canada. Jun. Im F. ♂.
Aronia Botryapium. Pers. l. c.
Mespil. canadensis. Lin. sp. pl. l. c.

3. *P. Amelanchier*. Lin. suppl. 256. Felsenbirne. Auf Felsen in Oesterr. Deutschl. u. Frankr. May, Jun. Im F. ♂.
Aronia rotundifolia. Pers. l. c.
Mespil. Amelanchier. Lin. sp. pl. l. c.

4. *P. communis*. Pers. l. c. 2. p. 40. Gemeine Birne. In Eur. Jun. Im F. ♂.

5. *P. Pollveria*. Pers. l. c. Hanbutten-Birne. In Deutschl. Jun. Im F. ♂.

6. *P. salicifolia*. Pers. l. c. Weidenblättrige Birne. In Sibirien u. Armenien. Jun. Im F. ᄁ.
7. *P. nivalis*. Pers. l. c. Schnee-Birne. Auf Oesterreichischen Alpen. Apr. May. Im F. ᄁ.
8. *P. Malus*. Pers. l. c. Aepfel-Birne. (Apfel). In Eur. Jun. Im F. ᄁ.
9. *P. spectabilis*. Pers. l. c. Prächtige Birne. In China. Jun. Im F. ᄁ.
10. *P. prunifolia*. Pers. l. c. Pflaumenblättrige Birne. In Sibirien. Jun. Im F. ᄁ.
11. *P. coronaria*. Pers. l. c. Wohlriechende Birne. In Virgin. Jun. Im F. ᄁ.
12. *P. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Birne. In Nordamer. —. Im F. ᄁ.
P. sempervirens. Hortulan.
13. *P. alpina*. Willd. enum. 1. p. 527. Alpen-Birne. —. Jun. Im F. ᄁ.
Crataeg. alpina. Hortulan.
14. *P. Aria*. Ehrh. Beitr. 4. p. 20. Mehl-Birne In Europ. Wäldern. Jun. Im F. ᄁ.
Sorbus Aria. Pers. l. c. 2. p. 38.
Crataeg. Aria. Lin. sp. pl. p. 681.
15. *P. intermedia*. Ehrh. Beitr. 4. p. 20. Oxel-Birne. In Schweden u. Russland. Jun. Im F. ᄁ.
Sorbus intermedia. Pers. l. c.
Crataeg. Aria β suecica. Lin. sp. pl. p. 681.
16. *P. torminalis*. Ehrh. Beitr. 6. p. 92. Elzbeer-Birne. In Oesterr. Ungarn, Deutschl. u. im Orient in Wäldern. Jun. Im F. ᄁ.
Sorbus torminalis. Pers. l. c.
Crataeg. — — Lin. l. c.

462. Cydonia, Quitte.

1. *C. vulgaris*. Willd. enum. 1. p. 528. Gemeine Quitte. In Deutschl. an steinigen Ufern. Jun. Im F. ☰.

Cydonia Cydonia. Pers. l. c.

Pyrus Cydonia. Lin. l. c. p. 687.

463. Tetragonia, Vierecksfrucht.

1. *T. fruticosa*. Pers. l. c. 2. p. 41. Strauchartige Vierecksfrucht. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ☰.

2. *T. decumbens*. Pers. l. c. Liegende Vierecksfrucht. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ☰.

3. *T. expansa*. Pers. l. c. Ausgebreitete Vierecksfrucht. In Neuseeland u. Japan. Jul. Aug. Im F. ⊙.

464. Mesembrianthemum, Zaserblume. (Mittagsblume).

1. *M. fissum*. Haworth dissert. Mesembrianth. ed. 2. n. 11. Spaltblättrige Zaserblume. Wächst, wie alle folgende, bey denen das Vaterland nicht angegeben ist, am Cap. —. Ch 24.

2. *M. scalpratum*. Haw. l. c. n. 34. Messerförmige Zaserblume. Jul. — Oct. Ch. 24.

M. linguiforme & *scalpratum*. Pers. l. c.

M. linguiforme Lin. sp. pl. p. 699.

3. *M. linguiforme*. Haw. l. c. n. 38. Zungenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.
M. obliquum. Pers. l. c.

4. *M. latum*. Pers. l. c. Breitblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 24.

5. *M. longum*. Pers. l. c. Langblättrige Za-
serblume. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

6. *M. cruciatum*. Haw. l. c. n. 41. Kreuz-
blättrige Zaserblume. — . Ch. 2*f*.

7. *M. rostratum*. Pers. l. c. Schnabelförmige
Zaserblume. Jul. Aug. Ch. 2*f*.

8. *M. ramulosum*. Haw. l. c. n. 27. Aestige
Zaserblume. — . Ch. 2*f*.

M. rostratoides. Haw. Mesembr. ed. 1. n. 30.
M. subrostratum. Willd. enum. 1. p. 529.

9. *M. caninum*. Pers. l. c. Hunderachenarti-
ge Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

10. *M. felinum*. Pers. l. c. Katzenrachenar-
tige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

11. *M. tigrinum*. Pers. l. c. 2. p. 42. Tie-
gerrachenartige Zaserblume. — . Ch. 2*f*.

12. *M. murinum*. Pers. l. c. Mäuserachen-
artige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

13. *M. obcordellum*. Haw. diss. ed. 2. n. 3.
Verkehrtherzförmige Zaserblume. — . Ch. 2*f*.

14. *M. albidum*. Pers. l. c. Weißblättrige
Zaserblume. — . Ch. 2*f*.

15. *M. bellidiflorum*. Pers. l. c. Maßlieben-
artige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

β. *caulescens*. Mit einem Stengel versehen.

16. *M. acutum*. Haw. l. c. n. 16. Spitzige
Zaserblume. — . Ch. 2*f*.

17. *M. articulatum*. Thunb. prod. p. 88. Ge-
gliederte Zaserblume. — . Ch. 2*f*.

18. *M. dolabriforme*. Pers. l. c. Hebelblättrige Zaserblume. May — Aug. Ch. ♂.
19. *M. difforme*. Pers. l. c. Ungestaltete Zaserblume. Aug. Sept. Ch. ♂.
20. *M. calamiforme*. Pers. l. c. Federkielartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
21. *M. canum*. Haw. l. c. n. 14. Graue Zaserblume. — . Ch. ♂.
22. *M. minimum*. Pers. l. c. Kleinste Zaserblume. Am Cap ? — . Ch. ♂.
23. *M. pinnatifidum*. Pers. l. c. Gefiederte Zaserblume. Jun. Jul. Ch. ○.
24. *M. cordifolium*. Pers. l. c. Herzblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
25. *M. crystallinum*. Pers. l. c. Beeiste Zaserblume. In Griechenland bey Athen. Jun. — Sept. Im F. ○.
26. *M. pallens*. Pers. l. c. 2. p. 43. Blasse Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
27. *M. expansum*. Pers. l. c. Ausgebreitete Zaserblume Jun. — Aug. Ch. ♂.
28. *M. tortuosum*. Pers. l. c. Gedrehte Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
29. *M. canaliculatum*. Haw. l. c. n. 60. Rinnenblättrige Zaserblume. — . Ch. 24.
30. *M. geniculiflorum*. Pers. l. c. Winkelblüthige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
31. *M. junceum*. Haw. l. c. n. 103. Binsenartige Zaserblume. — . Ch. ♂.

32. *M. clavatum*. Pers. l. c. Keulenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

33. *M. noctiflorum*. Pers. l. c. Nächtliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

34. *M. umbellatum*. Pers. l. c. Doldentragende Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♂.

35. *M. tuberosum*. Pers. l. c. Knollige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♂.

36. *M. bicolorum*. Pers. l. c. Zweyfarbige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♂.

37. *M. tenuifolium*. Pers. l. c. Dünnblättrige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♂.

38. *M. aduncum*. Haw. l. c. n. 177. Krummblättrige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♂.

39. *M. filicaule*. Haw. l. c. n. 176. Fadenstiellige Zaserblume. —. Ch. ♂.

40. *M. stipulaceum*. Pers. l. c. Steifstiellige Zaserblume. —. Ch. ♂.

41. *M. corniculatum*. Pers. l. c. Hornförmige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

42. *M. loereum*. Pers. l. c. 2. p. 44. Riemenartige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. 24.

43. *M. veruculatum*. Pers. l. c. Bogigblättrige Zaserblume. May — Jul. Ch. ♂.

44. *M. croceum* Jacq. fragm. bot. p. 17.t. 11. f. 2. Safranfarbige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

M. insititium. Willd. enum. 1. p. 536.

45. *M. echinatum*. Pers. l. o. Weichstachlige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♂.
β. floribus luteis. Mit gelben Blüthen.
46. *M. viridiflorum*. Pers. l. o. Grünblühige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
47. *M. spinuliferum*. Haw. l. c. n. 97. Stacheltragende Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
48. *M. splendens*. Pers. l. c. Glänzende Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
49. *M. villosum*. Pers. l. c. Zottige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
50. *M. micans*. Pers. l. c. Schimmernde Zaserblume May — Aug. Ch. ♂.
51. *M. speciosum*. Haw. l. c. n. 199. Prächtige Zaserblume. —. Ch. ♂.
52. *M. pulverulentum*. Haw. l. c. n. 201. Bestäubte Zaserblume. —. Ch. ♂.
53. *M. Haworthi*. Donn. cat. horti. cantabr. p. 66. Haworthische Zaserblume. —. Ch. ♂.
54. *M. tricolorum*. Haw. l. c. n. 53. Dreyfarbige Zaserblume. Jun. Jul. Ch. ♂.
M. stramineum. Willd. enum. 1. p. 533.
55. *M. grossum*. Pers. l. c. Dickstiellige Zaserblume. Jun. — Sept. Ch. ♂.
56. *M. brachiatum*. Pers. l. c. Weitästige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. ♂.
57. *M. brevifolium*. Pers. l. c. Kurzblättrige Zaserblume. —. Ch. ♂.

58. *M. erigeriflorum*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 39. t. 477. Berufungskrautartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

β. floribus pallidioribus. Mit blaßrothen Blüthen.

59. *M. hispidum*. Pers. l. c. Borstige Zaserblume. Jun. — Oct. Ch. ♂.

60. *M. striatum*. Haw. l. c. n. 89. Gestreifte Zaserblume. — . Ch. ♂.

61. *M. barbatum*. Pers. l. c. Bartige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

62. *M. hirsutum*. Haw. l. c. n. 93. Rauhe Zaserblume. Jun. — [Aug. Ch. ♂.

M. barbatum β *hirsutum*. Pers. l. c.

M. stellatum. Decand. pl. succ. fasc. 5.

63. *M. densum*. Haw. l. c. n. 94. Dichte Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

M. barbatum γ *densem*. Pers. l. c.

64. *M. falcatum*. Pers. l. c. Sichelblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

65. *M. glomeratum*. Pers. l. c. Knaulblättrige Zaserblume. Jul. Aug. Ch. ♂.

66. *M. roseum*. Willd. enum. 1. p. 535. Rosenrothe Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

67. *M. carneum*. Haw. Mesembr. ed. 1. n. 55. Fleischfarbige Zaserblume. — . Ch. ♂.

68. *M. pulchellum*. Haw. diss. ed. 2. n. 138. Hübsche Zaserblume. — . Ch. ♂.

69. *M. reptans*. Pers. l. c. Kriechende Zaserblume. Jul. Aug. Ch. ♂.

— 195 —

70. *M. elegans*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 18. t. 436. Schöne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

71. *M. australe*. Pers. l. c. Südliche Zaserblume. — . Ch. ♂.

72. *M. laxum*. Willd. enum. 1. p. 536. Schlafse Zaserblume. — . Ch. ♂.

73. *M. spinosum*. Pers. l. c. 2. p. 45. Stachlige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

74. *M. crassifolium*. Pers. l. c. Dickblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

75. *M. heteropetalum*. Haw. l. c. n. 123. Verschiedenblumenblättrige Zaserblume. — . Ch. ♂.

76. *M. molle*. Pers. l. c. Weiche Zaserblume. Jun. Jul. Ch. ♂.

77. *M. Schollii*. Hort. bot. vindob. Schollische Zaserblume. — . — Aug. Ch. ♂.

M. aduncum. Jacq. fragm. bot. p. 43. n. 148. t. 51. f. 2.

78. *M. glaucum*. Pers. l. c. Graugrüne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

79. *M. spectabile*. Pers. l. c. Ansehnliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

80. *M. emarginatum*. Pers. l. c. Ausgerandete Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

81. *M. virgatum*. Haw. l. c. n. 180. Ruthenförmige Zaserblume. — . Ch. ♂.

82. *M. aureum*. Pers. l. c. Goldfarbige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

83. *M. aurantium*. Haw. l. c. n. 169. Orangenfarbige Zaserblume. — . Ch. ♂.

84. *M. scabrum*. Pers. l. c. Scharfblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

85. *M. bracteatum*. Pers. l. c. Dickblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

86. *M. uncinatum*. Pers. l. c. Hackenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

87. *M. perfoliatum*. Haw. l. c. n. 187. Durchwachsene Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
M. uncinatum β perfoliat. Pers. l. c.

88. *M. capitatum*. Haw. l. c. n. 56. Kopfförmige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
M. pugioniforme. Pers. l. c.

89. *M. pugioniforme*. Haw. l. c. n. 57. Dolchförmige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

90. *M. viride*. Haw. l. c. n. 189. Grüne Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

β. foliis dentatis. Mit gezähnten Blättern.

91. *M. tenellum*. Haw. l. c. n. 190. Zarte Zaserblume. — . Ch. ♂.

92. *M. aequilaterale*. Pers. l. c. Gleichseitige Zaserblume. — . Ch. ♂.

93. *M. filamentosum*. Pers. l. c. Fädige Zaserblume. — . Ch. ♂.

94. *M. acinaciforme*. Pers. l. c. Säbelförmige Zaserblume. — . Ch. ♂.

95. *M. lacerum*. Haw. l. c. n. 122. Zerrissenblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.

M. gladiatum, Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 19. t. 438.

96. *M. rubricaulis*. Haw. l. c. n. 152. Roth-
stiellige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
 $\beta.$ foliis. angustioribus. Mit schmäleren Blät-
tern.
97. *M. maximum*. Haw. l. c. n. 121. Größ-
te Zaserblume. — . Ch. ♂.
98. *M. forficatum*. Pers. l. c. Scheerenförmig-
e Zaserblume. — . Ch. ♂.
99. *M. edule*. Pers. l. c. Genießbare Zaser-
blume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
100. *M. subalatum*. Haw. l. c. n. 148. Flie-
gelstiellige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
101. *M. laevigatum*. Haw. l. c. n. 147. Glat-
te Zaserblume. — . Ch. ♂.
102. *M. includens*. Andrews bot. reposit. t.
388. Offenblühige Zaserblume. Jun. — Sept.
Ch. ♂.
103. *M. mutabile*. Haw. l. c. n. 142. Ver-
änderliche Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
M. tricolor. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 20. t. 40.
104. *M. lunatum*. Willd. enum. 1. p. 538.
Mondblättrige Zaserblume. Jun. — Aug. Ch. ♂.
105. *M. deltoides*. Pers. l. c. Deltablättrige
Zaserblume. May — Sept. Ch. ♂.
106. *M. caulescens*. Haw. l. c. n. 121. Hohe
Zaserblume. — . Ch. ♂.
M. deltoides β *caulescens*. Pers. l. c.
- 107.)
108.) Noch unbeschriebene Arten.
109.)

465. Spiraea, Spierstaude.

1. *Sp. laevigata*. Pers. l. c. 2. p. 46. Glatte Spierstaude. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Im F. ♂.

2. *Sp. salicifolia*. Pers. l. c. Weidenblättrige Spierstaude. In Oesterr. Böhmen, Sibir. u. Nordamer. an Bächen. Jun. Im F. ♂.

3. *Sp. hypericifolia*. Pers. l. c. Hartheublättrige Spierstaude. In Canada u. Pensylvanien. Jun. Im F. ♂.

4. *Sp. chamaedrifolia*. Pers. l. c. Gamanderblättrige Spierstaude. In Ungarn u. Sibirien. Jun. Im F. ♂.

5. *Sp. ulmifolia*. Pers. l. c. Rüsterblättrige Spierstaude. In Krain. u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♂.

Sp. chamaedrifolia. Jacq. hort. vind. 2. p. 66. t. 140.

6. *Sp. crenata*. Pers. l. c. Gekerhte Spierstaude. In Ungarn u. Sibirien. Jun. Im F. ♂.

7. *Sp. obovata*. Waldst. et Kitaib. mscrip. Verkehrteyförmige Spierstaude. In Ungarn. Jun. Im F. ♂.

8. *Sp. triloba*. Pers. l. c. Dreylappige Spierstaude. Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Im F. ♂.

9. *Sp. opulifolia*. Pers. l. c. Schneeballblättrige Spierstaude. In Nordamer. Jun. Im F. ♂.

10. *Sp. sorbifolia*. Pers. l. c. Ebereschenblättrige Spierstaude. In Sümpfen v. Sibirien u. Kamtschatka. Jun. Jul. Im F. ♂.

11. *Sp. Aruncus.* Pers. l. c. Geißbart - Spierstaude. In Oesterr. Deutschl. u. den Pyrenäen. Jun. Im F. 24.

12. *Sp. Filipendula.* Pers. l. c. Knollige Spierstaude. Auf Wiesen in Eur. Jun. Im F. 24.

13. *Sp. Ulmaria.* Pers. l. c. 2. p. 47. Sumpf-Spierstaude. Auf feuchten Wiesen in Eur. May - Jul. Im F. 24.

14. *Sp. lobata.* Pers. l. c. Lappige Spierstaude. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

15. *Sp. trifoliata.* Pers. l. c. Dreyblättrige Spierstaude. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 24..

POLYGYNIA.

466. Rosa, Rose.

1. *R. lutea.* Ait. hort. kew. 2. p. 200. Gelbe Rose. In Deutschl. u. Engl. May, Jun. Im F. ♂. *R. eglanteria.* Pers. l. c.

R. bicolor. Jacq. hort. vind. 1. p. 1. t. 1. et 3.
p. 1. Mit zweyfarbigen Blüthen.
— *R. punicea.* Pers. l. c.

2. *R. sulphurea.* Pers. l. c. Schwefelgelbe Rose. Im Orient. May, Jun. Im F. ♂.

3. *R. blanda.* Pers. l. c. Hudsonsbay-Rose. An der Hudsonsbay. May, Jun. Im F. ♂.

4. *R. cinnamomea.* Pers. l. c. Zimmt-Rose. In Südeur. May. Im F. ♂.

5. *R. kamtschatica.* Pers. l. c. Kamtschatka-Rose. Zu Kamtschatka. May, Jun. Im F. ♂.

6. *R. pimpinellifolia*. Pers. l. c. Pimpinellenblättrige Rose. In Südeur. May — Jul. Im F. ♂.
7. *R. spinosissima*. Pers. l. c. 2. p. 48. Vielstachlige Rose. Auf Hügeln in Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. ♂.
8. *R. ferox*. Biberst. cent. pl. rar. Taur. et Cauc. p. et t. 37. Langstachlige Rose. Am Taurus u. Caucasus. Jul. Im F. ♂.
9. *R. lucida*. Pers. l. c. Glänzende Rose. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♂.
10. *R. carolina*. Pers. l. c. Carolinische Rose. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♂.
11. *R. villosa*. Pers. l. c. Weichhaarige Rose. In Eur. Jun. Im F. ♂.
12. *R. provincialis*. Pers. l. c. Provencer Rose. In Böhmen, Ital. Span. u. Frankr. May, Jun. Im F. ♂.
13. *R. centifolia*. Pers. l. c. Garten-Rose. —. May, Jun. Im F. ♂.
14. *R. gallica*. Pers. l. c. Zucker-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. ♂.
15. *R. alba*. Pers. l. c. 2. p. 49. Weisse Rose. In Südeur. May, Jun. Im F. ♂.
16. *R. pumila*. Pers. l. c. Niedrige Rose. In Oesterr. u. Ital. Jun. Im F. ♂.
17. *R. turbinata*. Pers. l. c. Kreiselförmige Rose. In Eur. May, Jun. Im F. ♂.

18. *R. rubiginosa*. Pers. l. c. Wein-Rose.
Auf sonnigen Hügeln in Eur. Jun. Im F. ♂.

19. *R. muscosa*. Pers. l. c. Moos-Rose. —.
Jun. Im F. ♂.

20. *R. moschata*. Pers. l. c. Bisam-Rose.
In der Barbarey. Aug. Sept. K. H. ♂.

β. caule altiore. Mit höherem Wuchse.

21. *R. rubrifolia*. Pers. l. c. Rothblättrige Rose. In Oesterr. der Schweiz u. Dauphine auf Bergen. Jun. Im F. ♂.

22. *R. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Rose. Auf Alpen in Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

23. *R. pendulina*. Pers. l. c. Hängende Rose.
In Eur. May. Im F. ♂.

24. *R. pyrenaica*. Pers. l. c. Pyrenäische Rose. Auf den Pyrenäischen, den Schweizer- u. Schlesieralpen. May. Im F. ♂.

25. *R. multiflora*. Pers. l. c. 2. p. 50. Vielblühige Rose. In Japan. May, Jun. Ch. ♂.

26. *R. canina*. Pers. l. c. Hecken-Rose. In Eur. May, Jun. Im F. ♂.

27. *R. repens*. Scop. fl. carn. n. 610.
Kriechende Rose. In Oesterr. Ungarn, Sclavon. u. Krain. May, Jun. Im F. ♂.

R. arvensis. Pers. l. c. 2. p. 47.

28. *R. collina*. Pers. l. c. 2. p. 50. Hügel-Rose. Auf Hügeln in Oesterr. May, Jun. Im F. ♂.

29. *R. parvifolia*. Pers. l. c. Burgunder-Rose.
In Eur. May, Jun. Im F. ♂.

30. *R. semperflorens*. Curt. bot. mag. t. 284.
Immerblühende Rose. In China. Blüht das ganze Jahr hindurch. Ch. ♂.

R. bengalensis. Pers. l. c.

— *sinica*. Lin. syst. veg. 394.

β. *punicea*. Willd. enum. 1. p. 547. Mit dunkelrother Blüthe.

— *chinensis* Pers. l. c.

γ. *pallida*. Willd. l. c. Mit blässrother Blüthe.

31. *R. bracteata*. Pers. l. c. Deckblättrige Rose. In China. Jul. Aug. Ch. ♂.

467. Rubus, Himbeere.

1. *R. rosaefolius*. Pers. l. c. Rosenblättrige Himbeere. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. ♂.

2. *R. Idaeus*. Pers. l. c. 2. p. 51. Gemeine Himbeere. Auf steinigen Hügeln in Eur. May. Im F. ♂.

3. *R. occidentalis*. Pers. l. c. Schwarze Himbeere. In Canada. May. Im F. ♂.

4. *R. caesius*. Pers. l. c. Kriechende Himbeere. An Hecken in Eur. May. Im F. ♂.

5. *R. fruticosus*. Pers. l. c. Strauchartige Himbeere. In Eur. May. Im F. ♂.

β. *fructibus albis*. Mit weissen Früchten.

γ. *floribus plenis albis*. Mit weissgefüllten Bläthen.

6. *R. laciniatus*. Willd. hort. berol. 2. p. 82. t. 82. Schlitzblättrige Himbeere. —. May. Im F. ♂.

7. *R. canadensis*. Pers. l. c. Canadische Himbeere. In Canada. May. Im F. ♂.

3. *R. odoratus*. Pers. l. c. 2. p. 52. Wohlriechende Himbeere. In Canada. Jun. Jul. Im F. 5.

468. *Fragaria*, Erdbeere.

1. *Fr. vesca*. Pers. l. c. 2. p. 53. Wilde Erdbeere. In Europ. Wäldern. Apr. May. Im F. 2.

2. *Fr. collina*. Pers. l. c. Harte Erdbeere. Auf dünnen Hügeln in Deutschl. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. 2.

3. *Fr. elatior*. Pers. l. c. Garten-Erdbeere. In Amer. ? Apr. May. Im F. 2.

4. *Fr. grandiflora*. Ananas-Erdbeere. Zu Surinam. Apr. May. Im F. 2.

5. *Fr. chiloensis*. Pers. l. c. Chilische Erdbeere. In Südamer. Apr. May. Im F. 2.

469. *Potentilla*, Fingerkraut.

1. *P. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartiges Fingerkraut. In Engl. u. Sibir. Jun. Im F. 5.

2. *P. bifurca*. Pers. l. c. 2. p. 54. Spalteleiblättriges Fingerkraut. In Sibir. u. Armenien. May, Jun. Im F. 2.

3. *P. pensylvanica*. Pers. l. c. Pensylvaniisches Fingerkraut. In Canada u. Sibir. Jun. — Aug. Im F. 2.

4. *P. recta*. Pers. l. c. Gerades Fingerkraut. Im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. 2.

5. *P. argentea*. Pers. l. c. Silberblättriges Fingerkraut. In Eur. May. — Jul. Im F. 2.

6. *P. opaca*. Pers. l. c. Dunkelblättriges Fingerkraut. In Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

7. *P. aurea*. Pers. l. c. 2. p. 55. Goldfarbiges Fingerkraut. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien u. Dänemark. May, Jun. Im F. 24.

8. *P. alba*. Pers. l. c. Weißes Fingerkraut. Auf Bergen in Oesterr. Steyermark, Ungarn u. Deutschl. May, Jun. Im F. 24.

9. *P. clusiana*. Pers. l. c. Clusisches Fingerkraut. Auf Oesterreichischen Alpen. Jun. — Aug. Im F. 24.

470. *Tormentilla*, Tormentill.

1. *T. erecta*. Pers. l. c. 2. p. 56. Aufrechte Tormentille. In Eur. May, Jun. Im F. 24.

471. *Geum*, Geum.

1. *G. virginianum*. Pers. l. c. Weißes Geum. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *G. urbanum*. Pers. l. c. 2. p. 57. Gemeines Geum. In Eur. May, Jun. Im F. 24.

3. *G. rivale*. Pers. l. c. Wasser-Geum. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *G. montanum*. Pers. l. c. Berg-Geum. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Schlesien u. Dauphine. Jun. Jul. Im F. 24.

472. *Dryas*, Dryade.

1. *Dr. octopetala*. Pers. l. c. Alpen-Dryade. Auf den Europ. Alpen. Jun. Jul. Im F. 24.

473. Calycanthus, Kelchblume.

1. *C. floridus*. Pers. l. c. 2. p. 58. Carolini-sche Kelchblume. In Carol. Jun. Jul. K. H. ♂.
2. *C. laevigatus*. Willd. hort. berol. 1. p. 50. t. 80. Virginische Kelchblume. Auf hohen Bergen in Carol. u. Virgin. Jun. Jul. K. H. ♂. *C. ferax*. Pers. l. c.
3. *C. praecox*. Pers. l. c. Japanische Kelch-blume. In Japan. Jän. Febr. Ch. ♂.

CLASSIS. XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

474. Capparis, Capper.

1. *C. spinosa*. Pers. l. c. 2. p. 59. Gemeine Capper. In Südeur. im Orient u. Africa. Jun. Jul. K. H. ♂.
2. *C. mariana*. Pers. l. c. 2. p. 60. Mariani-sche Capper. Auf den Marianischen Inseln. —. W. H. ♂.
3. *C. frondosa*. Pers. l. c. Buschige Capper. In Wäldern zu Carthagena u. St. Domingo. Jän. Febr. W. H. ♂.
4. *C. odoratissima*. Pers. l. c. Wohlriechen-de Capper. Zu Caracas. —. W. H. ♂.
5. *C. Cynophallophora*. Pers. l. c. Langschot-tige Capper. Im wärmer. Amer. —. W. H. ♂.

6. *C. saligna*. Pers. l. c. Weidenartige Capper. Auf St. Crax. — W. H. 5.

7. *C. tenuisiliqua*. Pers. l. c. Dünnerfrüchtige Capper. Zu Carthagena in Amer. Jun. Jul. W.H. 5.

8. *C. Breynia*. Pers. l. c. Breynische Capper. Am Meerstrande in Jamaica. Jun. — Aug. W.H. 5.

475. *Actaea*, Christophskraut.

1. *A. spicata*. Pers. l. c. 2. p. 61. Aehriges Christophskraut. In Europäischen Hainen. May, Jun. Im F. 24.

2. *A. racemosa*. Pers. l. c. Traubiges Christophskraut. In Florida, Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

476. *Chelidonium*, Schöllkraut.

1. *Ch. laciniatum*. Mill. dict. n. 2. ic. t. 9². Schlitzblättriges Schöllkraut. In Südeur. Apr. — Jun. Im E. 24.

Ch. majus β *laciniatum*. Pers. l. c.

477. *Glaucium*, Glaucium.

1. *Gl. luteum*. Pers. l. c. Grossblüthiges Glaucium. In der Schweiz, Ital. Frankr. u. Engl. May — Jul. Im F. 24.

Chelid. Glaucium. Lin. sp. pl. p. 724.

2. *Gl. fulvum*. Smith. exot. bot. 1. p. 11. t. 7. Dunkelgelbes Glaucium. In Südeur. May, Jun. Im F. 24.

Chelid. Glauc. rubrum. Hortulan.

3. *Gl. phoenicum*. Smith brit. 2. p. 564.
Purpurrothes Glaucium. In Oesterr. Böh. Ungarn u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. ⊖.
Glaucium corniculatum. Pers. l. c.
Chelid. corniculat. Lin. l. c.

4. *Gl. violaceum*. Pers. l. c. Violettes Glaucium. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ⊖.
Chelid. hybridum. Lin. l. c.

478. Papaver, Mohn.

1. *P. alpinum*. Pers. l. c. 2. p. 62. Alpen-Mohn.
Auf den Oesterreich. Schweizer. u. den Pyrenäischen Alpen. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *P. dubium*. Pers. l. c. Saat-Mohn. Zwischen den Saaten des nördlicher. Eur. May, Jun. Im F. ⊖.

3. *P. somniferum*. Pers. l. c. Garten-Mohn.
Im südlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ⊖.

β. *cristatum*, florib. et seminib. albis. Mit krausen Blättern, weissen Blüthen u. Samen.

4. *P. orientale*. Pers. l. c. Orientalischer Mohn. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

479. Argemone, Argemone.

1. *A. mexicana*. Pers. l. c. Mexicanische Argemone. In Mexico u. Jamaica. Jun. Jul. Im F. ⊖.

480. Nymphaea, Seerose.

1. *N. lutea*. Pers. l. c. 2. p. 63. Gelbe Seerose. In süßen Wässern v. Eur. May — Aug. Im freyen Wasserbehälter. 24.

2. *N. alba*. Pers. l. c. Weisse Seerose. In süßen Wässern v. Eur. May — Aug. Im freyen Wasserbehälter. 24.

3. *N. Lotus*. Pers. l. c. Aegyptische Seerose. In Wässern v. Ostind. u. Aegypt. dann in warmen Bädern Ungarns. Jun. — Aug. K. H. 2.

4. *N. coerulea*. Pers. l. c. Blaublühende Seerose. In Wässern v. Aegypten. Jun. — Aug. K. H. 2.

481. *Bixa*, Orleanbaum.

1. *B. Orellana*. Pers. l. c. Gemeiner Orleanbaum. Im wärmer. Amer. an Gräben u. Quellen. Jun. Jul. VV. H. 3.

482. *Sparmannia*, Sparmannie.

1. *Sp. africana*. Pers. l. c. 2. p. 64. Africaneische Sparmannie. In Wäldern am Cap. May, Jun. Ch. 3.

483. *Grewia*, Grewie.

1. *Gr. occidentalis*. Pers. l. c. 2. p. 65. Abendländische Grewie. Am Cap u. in Aethiop. Jun. Jul. Ch. 2.

484. *Tilia*, Linde.

1. *T. europaea*. Lin. sp. pl. p. 733. Großblättrige Linde. In Böhmen u. Krain. May, Jun. Im F. 3.

T. europ. β grandifolia. Pers. l. c. 2. p. 66.

2. *T. microphylla*. Willd. enum. 1. p. 565. Kleinblättrige Linde. In Wäldern v. Eur. May, Jun. Im F. 3.

T. europea. Pers. l. c.

3. *T. argentea*. Decand. cat. horti bot. mons pel. p. 150. Silberblättrige Linde. In Ungarn u. im Orient. Jun. Im F. ♂.

T. alba. Pers. l. c.

4. *T. alba*. Ait. hort. kew. 2. p. 230. Weisse Linde. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *T. americana*. Pers. l. c. Schwarze Linde. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♂.

6. *T. pubescens*. Pers. l. c. Feinbehaarte Linde. In Carolina. —. Im F. ♂.

485. *Corchorus*, Sattkraut.

1. *C. olitorius*. Pers. l. c. 2. p. 67. Gemüse-Sattkraut. In Asien, Africa u. Amer. Jun. K. H. ☽.

2. *C. japonicus*. Pers. l. c. Japanisches Sattkraut. In Japan. März — Jul. Ch. ♂.

3. *C. siliquosus*. Pers. l. c. Schottiges Sattkraut. In Südamer. Apr. W. H. ♂.

486. *Clusia*, Clusie.

1. *Cl. alba*. Pers. l. c. 2. p. 68. Weisse Clusie. Auf Martinique. —. W. H. ♂.

2. *Cl. flava*. Pers. l. c. Gelbe Clusie. Zu Jamaika. —. W. H. ♂.

487. *Mentzelia*, Mentzelie.

1. *M. hispida*. Pers. l. c. 2. p. 71. Rauhe Mentzelie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 24.

488. Lagerstroemia, Lagerströmie.

1. *L. indica*. Pers. l. c. Chinesische Lagerströmie. In China, Cochinchina u. Japan. Jun. Jul. Ch. ȳ.

489. Trilix, Trilix.

1. *Tr. lutea*. Pers. l. c. 2. p. 72. Gelbe Trilix. Zu Carthagena in Amer. May. Jun. W.H. ȳ.

490. Ludia, Aenderling.

1. *L. sessiliflora*. Pers. l. c. Stiellosbläthiger Aenderling. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. ȳ.

L. tuberculata. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 59. t. 112.

491. Thea, Thee.

1. *Th. Bohea*. Pers. l. c. 2. p. 73. Brauner Thee. In China u. Japan. —. Ch. ȳ.

2. *Th. viridis*. Pers. l. c. Grüner Thee. In China. —. Ch. ȳ.

492. Ternstroemia, Ternströmie.

1. *T. meridionalis*. Pers. l. c. Mittägige Ternströmie. In Südamer. —. W. H. ȳ.

493. Citrus, Citrone.

1. *C. medica*. Pers. l. c. Saure Citrone. (Limonie). Im Orient. Jun. Jul. K. H. ȳ.

2. *C. Aurantium.* Pers. l. c. 2, p. 74. Süsser Citrone. (Pomeranze). In Ostind. Jun. Jul. K. H. ♂.
3. *C. decumana.* Pers. l. c. Pompelmuß-Citrone. In Ostind. Jun. Jul. K. H. ♂.
4. *C. trifoliata.* Pers. l. c. Dreyblättrige Citrone. In Ostind. —. W. H. ♂.
5. *C. Hystrix.* Decand. cat. horti bot. monspel. p. 97. Vieldornige Citrone. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♂.

494. *Cistus*, Cistenrose.

1. *C. villosus.* Pers. l. c. Rauhe Cistenrose. In Ital. Span. u. Nordafrica. Jun. Jul. K. H. ♂.
2. *C. laurifolius.* Pers. l. c. Lorbeerblättrige Cistenrose. In Span. Jun. Jul. K. H. ♂.
3. *C. vaginatus.* Pers. l. c. 2, p. 75. Scheidentragende Cistenrose. Auf Teneriffa. Jun. Jul. K. H. ♂.
4. *C. ladaniferus.* Pers. l. c. Ladanumgebende Cistenrose. Auf Hügeln in Span. u. Portug. May, Jun. K. H. ♂.
5. *C. monspeliensis.* Pers. l. c. Französische Cistenrose. Zu Montpellier u. Dauphine. Jul. K. H. ♂.
6. *C. salvifolius.* Pers. l. c. Salveyblättrige Cistenrose. In Krain, der Schweiz, Ital. Südfrankr. u. Sicilien. Jun. Jul. K. H. ♂.
7. *C. incanus.* Pers. l. c. Bestäubte Cistenrose. In Narbonne u. Span. May, Jun. K. H. ♂.

8. *C. creticus.* Pers. l. c. Candische Cistenrose. In Candien u. Sirien. Jun. K. H. ᄁ.

9. *C. purpureus.* Pers. l. c. Purpurfarbige Cistenrose. —. May, Jun. K. H. ᄁ.

10. *C. albidus.* Pers. l. c. Weissliche Cistenrose. Zu Narbone u. Span. Jun. K. H. ᄁ.

11. *C. crispus.* Pers. l. c. Krause Cistenrose. Zu Portug. Aug. K. H. ᄁ.

495. *Helianthemum*, Sonnenröschen.

1. *H. laevipes.* Pers. l. c. 2. p. 76. Glattstieliges Sonnenröschen. Zu Montpellier. Jun. K. H. ᄁ.

2. *H. Fumana.* Pers. l. c. Dünnes Sonnenröschen. In Oesterreich, der Schweiz, Frankr. u. Gothland auf trockenen Hügeln. Jun. Jul. K. H. ᄁ.

3. *H. marifolium.* Pers. l. c. Marumblättriges Sonnenröschen. Auf Meeresfelsen zu Massilien, Verona u. in Span. Jun. K. H. ᄁ.

4. *H. ledifolium.* Pers. l. c. 2. p. 77. Porstblättriges Sonnenröschen. Zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. ○.

5. *H. angustifolium.* Pers. l. c. 2. p. 79. Schmalblättriges Sonnenröschen. —. Jun. Jul. K. H. ᄁ.

6. *H. vulgare.* Pers. l. c. Gemeines Sonnenröschen. Auf trockenen Tiefen in Eur. May, Jun. Im F. ᄁ.

7. *H. mutabile.* Pers. l. c. Veränderliches Sonnenröschen. In Südfrankreich. Jun. Jul. K. H. ᄁ.

8. *H. apenninum*. Pers. l. c. 2. p. 80. Apenninisches Sonnenröschen. Auf den Apenninen. Jun. Jul. K. H. ȳ.

9. *H. polifolium*. Pers. l. c. Poleyblättriges Sonnenröschen. In England. Jan. Jul. K. H. ȳ.

DIGYNIA.

496. *Paeonia*, Päonie.

1. *P. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 81. Gemeine Päonie. Auf Bergen im Banat, der Schweiz u. am Ida in Candien. May, Jun. Im F. 24.

β. *floribus plenis rubris*. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. *floribus plenis albido rubris*. Mit blässrothgefüllten Blüthen.

2. *P. humilis*. Pers. l. c. Niedrige Päonie. In Spanien. May, Jun. Im F. 24.

3. *P. albiflora*. Pers. l. c. Weißblühende Päonie. In Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *P. Moutan*. Curt. bot. magaz. t. 1154. Moutan-Päonie, In China. Apr. May. Ch. ȳ.
P. fruticosa, Willd. enum. suppl. p. 39.
P. suffruticosa. Andrews bot. reposit. 6. n. 373.

5. *P. tenuifolia*. Pers. l. c. Feinblättrige Päonie. Im Banat, der Ukraine u. Sibir. May, Jun. Im F. 24.

497. *Forthergilla*, Fothergille.

1. *F. alnifolia*. Pers. l. c. Ellerblättrige Fothergille. In Carolina. —, K. H. ȳ.

TRIGYNIA.

498. Homalium, Glattstrauch.

1. *H. racemosum*. Pers. l. c. 2. p. 82. Traubiger Glattstrauch. Auf Martinique u. Jamaica.
—. W. H. h.

499. Delphinium, Rittersporn.

1. *D. Ajacis*. Pers. l. c. Garten-Rittersporn. In der Schweiz. May — Jul. Im F. ⊖. Sammt mehreren Abarten.

2. *D. grandiflorum*, Pers. l. c. Grossblüthiger Rittersporn. In Sibir. Jun. Jul. Im F. h.

β. *floribus plenis*. Mit gefüllten Blüthen.

3. *D. intermedium*. Pers. l. c. Mittlerer Rittersporn. Auf Bergen in Ungarn u. Schlesien. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *D. elatum*. Pers. l. c. Hoher Rittersporn. In Sibir. u. der Schweiz. May — Jul. Im F. 24.

5. *D. exaltatum*. Pers. l. c. Americanischer Rittersporn. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *D. urceolatum*. Pers. l. c. Hohlblättriger Rittersporn. —. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *D. pictum*. Willd. enum. 1. p. 574. Beinharter Rittersporn. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♂.

500. Aconitum, Eisenhut.

1. *A. Lycocotonum*. Pers. l. c. 2. p. 83. Wolfs-Eisenhut. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. pyrenaicum*. Pers. l. c. Pyrenäischer Eisenhut. In Sibir. der Tartarey u. den Pyrenäen. Jul. Im F. 24.

3. *A. neomontanum*. Pers. l. c. Neubergischer Eisenhut. Auf Oesterreichischen, Steyer-schen, u. Kärnthenschen Alpen. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *A. Cammarum*. Pers. l. c. Langhelmiger Eisenhut. In Oesterr. u. Steyerm. auf Niederalpen. Jun. Jul. Im F. 24.

PENTAGYNYA.

501. Aquilegia, Ackeley.

1. *A. vulgaris*. Pers. l. c. 2. p. 85. Gemeine Ackeley. In steinigen Hainen v. Eur. May, Jun. Im F. 24.

Sammt mehreren, sich durch die Blüthenfarbe unterscheidende Abarten.

2. *A. canadensis*. Pers. l. c. Canadische Ackeley. In Virgin. u. Canada. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *A. atropurpurea*. Willd. enum. 1. p. 577. Dunkelpurpurrothe Ackeley. In Sibir. Jun. Im F. 24.

4. *A. viridiflora*. Pers. l. c. Grünblüthige Ackeley. In Sibir. Jun. Im F. 24.

502. Nigella, Schwarzkümmel.

1. *N. damascena*. Pers. l. c. Garten-Schwarzkümmel. Zwischen den Saaten in Südeur. Jun. Jul. Im F. ⊙.

2. *N. sativa*. Pers. l. c. Gemeiner Schwarzkümmel. Erdbarsame. In Aegypt. u. Cand. Jun. Jul. Im F. ◎.

3. *N. hispanica*. Pers. l. c. Spanischer Schwarzkümmel. In Span. u. bey Montpellier. Jun. Jul. Im F. ◎.

4. *N. orientalis*. Pers. l. c. Orientalischer Schwarzkümmel. Bey Aleppo. Jun. Jul. Im F. ◎.

503. Hypericum, Hartheu.

1. *H. balearicum*. Pers. l. c. 2. p. 86. Balearisches Hartheu. Auf Hügeln zu Majorca. Jul. Aug. K. H. ♂.

2. *H. monogynum*. Pers. l. c. 2. p. 87. Indisches Hartheu. In China, Japan u. Ostind. Jul. Aug. Ch. ♂.

3. *H. calycinum*. Pers. l. c. Grossblumiges Hartheu. In Griechenland. Jun. — Oct. Im F. ♂.

4. *H. Androsaemum*. Pers. l. c. Englisches Hartheu. In England, Ital. u. Languedoc. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *H. canariense*. Pers. l. c. Canarisches Hartheu. Auf den Canarischen Inseln. Jul. — Oct. K. H. ♂.

6. *H. elatum*. Pers. l. c. 2. p. 88. Hohes Hartheu. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ♂.

7. *H. hircinum*. Pers. l. c. Stinkendes Hartheu. In Sicilien, Calabrien u. Candien. Jun. Jul. Im F. ♂.

8. *H. quadrangulare*. Pers. l. c. 2. p. 89. Vierkantiges Hartheu. Auf Wiesen in Eur. May, — Jul. Im F. 24.

9. *H. dubium*. Pers. l. c. Zweifelhaftes Hartheu. Auf Niederalpen in Deutschl. Ital. u. England. Jun. Aug. Im F. 24.

10. *H. perforatum*. Pers. l. c. Gemeines Hartheu. In Eur. May, — Aug. Im F. 24.

11. *H. barbatum*. Pers. l. c. 2. p. 90. Bartiges Hartheu. In Oesterr. bey Mauerbach auf Bergwiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

12. *H. hirsutum*. Pers. l. c. Haariges Hartheu. Auf Hügeln, Bergen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

POLYGYNIA.

504. Dillenia, Dillenie.

1. *D. scandens*. Pers. l. c. 2. p. 92. Rankende Dillenie. In Neuholl. Aug. Ch. ȳ.

505. Liriodendron, Tulpenbaum.

1. *L. Tulipifera*. Pers. l. c. 2. p. 93. Virginischer Tulpenbaum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. ȳ.

506. Magnolia, Magnolie.

1. *M. grandiflora*. Pers. l. c. Grossblühige Magnolie. In Carol. u. Florida. Jul. Aug. K. H. ȳ.

2. *M. glauca*. Pers. l. c. Graugrüne Magnolie. In Pensylvan. Virgin. u. Carol. Jun. Jul. K. H. ȳ.

3. *M. obovata*. Pers. l. c. Rothe Magnolie. In Japan u. China. — Ch. ȳ.

M. purpurea. Curt. bot. mag. t. 390.

K

4. *M. tripetala*. Pers. l. c. Dreyblättrige Magnolie. In Virgin. u. Carol. Jun. Jul. K. H. ♂.

5. *M. fuscata*. Pers. l. c. Braune Magnolie. In China. — . Ch. ♂.

6. *M. auriculata*. Pers. l. c. Geöhrte Magnolie. Auf den höchsten Bergen in Carol. — K. H. ♂.

507. *Annona*, Flaschenbaum.

1. *A. muricata*. Pers. l. c. 2. p. 95. Stachlicher Flaschenbaum. Im wärmer. Amer. — . VV. H. ♂.

2. *A. glabra*. Pers. l. c. Glatter Flaschenbaum. In Carol. May. K. H. ♂.

3. *A. triloba*. Ait. hort. kew. 2. p. 254. Dreylappiger Flaschenbaum. In Carol. K. H. ♂. *Porcellia triloba*. Pers. l. c.

508. *Hepatica*, Leberkraut.

1. *H. triloba*. Decand. fl. Franc. 4. p. 885. Dreylappiges Leberkraut. In Europ. Hainen. März, Apr. Im F. ♂. *Anemone hepatica*. Pers. l. c. 2. p. 96.

509. *Pulsatilla*, Küchenschelle.

1. *P. patens*. Mill. dict. n. 4. Ausgebreitete Küchenschelle. Auf Alpen in Böhmen, Schlesien, der Lausitz u. in Sibirien. May. Jun. F. 24. *Anemone patens*. Pers. l. c.

2. *P. vernalis*. Mill. dict. n. 3. Frühlings Küchenschelle. In Wäldern v. Deutschl. der Schweiz u. Schweden. März. Im F. 24. *Anemone vernalis*. Pers. l. c.

3. *P. vulgaris*. Mill. dict. n. 1. Gemeine Küchenschelle. Auf dürren Hügeln in Eur. März, Apr. Im F. 24.
Anemone Pulsatilla. Pers. l. c.

2. *P. pratensis*. Mill. dict. n. 2. Wiesen-Küchenschelle. In Deutschl. auf trockenen Wiesen u. Hügeln. Apr. Im F. 24.
Anemone pratensis. Pers. l. c. p. 97.

510. Anemone, Anemone.

1. *A. coronaria*. Pers. l. c. Gemeine Anemone. Im Orient. May. Im F. 24.

2. *A. hortensis*. Pers. l. c. Garten-Anemone. In Südtirol, Ital. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. 24.

3. *A. sylvestris*. Pers. l. c. Wald-Anemone. In Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

4. *A. virginiana*. Pers. l. c. Virginische Anemone. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *A. nemorosa*. Pers. l. c. 2. p. 98. Busch-Anemone. In Europ. Hainen. May. Jun. Im F. 24.

6. *A. ranunculoides*. Pers. l. c. Ranunkelartige Anemone. Auf schattigen Wiesen im nördlicher. Eur. May. Im F. 24.

9. *A. narcissiflora*. pers. l. c. Narzissenblütige Anemone. Auf Alpen in Oesterr. Schlesien, Schweiz, Frankr. u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

511. Atragene, Atragene.

1. *A. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Atragene. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

512. Clematis, Waldrebe.

1. *C. cirrhosa*. Lin. sp. pl. p. 769. Einfachblättrige Waldrebe. In Andalusien u. der Barba-rey. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.
Atragene cirrhosa. Pers. l. c.

2. *C. florida*. Thunb. jap. 240. Grossblüthi-ge Waldrebe. In Japan. Jun. Jul. Ch. $\frac{1}{2}$.
Atrag. florida. Pers. l. c.

3. *C. Viticella*. Pers. l. c. 2. p. 99. Italieni-sche Waldrebe. In Span. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 2.

β. floribus plenis. Mit gefüllten Blüthen.

4. *C. crispa*. Pers. l. c. Krausblüthige Wald-rebe. In Carolina. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.

5. *C. calycina*. Ait. hort. kew. 2. p. 259. Gekelchte Waldrebe. Zu Minorca. Jun. Jul. K. H. $\frac{1}{2}$.
Atrag. balearica. Pers. l. c. 2. p. 96.

6. *C. glauca*. Pers. l. c. 5. p. 99. Meergrüne Waldrebe. In Sibir. u. im Orient. Aug. Im F.

7. *C. virginiana*. Pers. l. c. Virginische Wald-rebe. In Nordamer. — Sept. Im F. $\frac{1}{2}$.

8. *C. Vitalba*. Pers. l. c. 2. p. 100. Gemei-ne Waldrebe. In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. $\frac{1}{2}$.

9. *C. Flammula*. Pers. l. c. Scharfe Wald-rebe. Zu Montpellier u. in Graubündten. Jun. Jul. Im F. $\frac{1}{2}$.

10. *C. erecta*. Pers. l. c. Aufrechte Waldre-be. Auf Hügeln in Oesterr. Ungarn, der Schweiz zu Montpellier u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 2.

11. *C. integrifolia*. Pers. l. c. Einfache Waldrebe. In Ungarn u. der Tartarey. Jun. — Aug. Im F. 24.

513. Thalictrum, Thalictrum.

1. *Th. foetidum*. Pers. l. c. Stinkendes Thalictrum. In der Schweiz. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Th. majus*. Pers. l. c. Grosses Thalictrum. In Oesterr. und Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *Th. minus*. Pers. l. c. Kleines Thalictrum. Auf Kalkgebirge in Eur. Jan. Jul. Im F. 24.

4. *Th. purpurascens*. Pers. l. c. Röthliches Thalictrum. In Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *Th. angustifolium*. Pers. l. c. 2. p. 101. Schmalblättriges Thalictrum. In Oesterr. u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Th. flavum*. Pers. l. c. Gemeines Thalictrum. Auf sumpfigen Wiesen in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *Th. speciosum*. Pers. l. c. Schönes Thalictrum. In Südfrankr. u. Span. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *Th. rugosum*. Pers. l. c. Runzliges Thalictrum. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *Th. nigricans*. Pers. l. c. Schwärzliges Thalictrum. In Oesterr. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *Th. aquilegifolium*. Pers. l. c. Ackeley-blättriges Thalictrum. In Deutschl. d. Schweiz u. Schweden. Jun. Jul. Im F. 24.

514. Adonis, Adonis.

1. *A. vernalis*, Pers. l. c. 2. p. 102. Frühlings-Adonis. Auf sonnigen Hügeln im mittler. Europa. Apr. May. Im F. W.

515. Ranunculus, Ranunkel. (Hahnenfuss.)

1. *R. Flammula*, Pers. l. c. Beissender Ranunkel. An Wassergräben in Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *R. gramineus*, Pers. l. c. Grasblättriger Ranunkel. Auf feuchten Wiesen in Frankreich. May, Jun. Im F. 24.

3. *R. Thora*, Pers. l. c. 2. p. 103. Giftiger Ranunkel. Auf Alpen in Oesterr. der Schweiz, Dauphine u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. K. H. 24.

4. *R. auricomus*, Pers. l. c. Verschiedenblättriger Ranunkel. In feuchten Hainen v. Eur. un. Jul. Im F. 24.

5. *R. illyricus*, Pers. l. c. Illyrischer Ranunkel. In Oesterr. Ungarn, Ital. u. Languedo. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *R. asiaticus*, Pers. l. c. 2. p. 104. Garten-Ranunkel. In Asien u. Mauritanien. May, Jun. Im F. 24.

7. *R. montanus*, Pers. l. c. Berg - Ranunkel. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. der Schweiz u. in der Dauphine. Jun. — Aug. Im F. ♂.

8. *R. bulbosus*, Pers. l. c. Knolliger Ranunkel. Auf Wiesen in Eur. May, — Jul. Im F. 24.

9. *R. repens*. Pers. l. c. 2. p. 205. Kriechender Ranunkel. In ausgetrockneten Wassergräben v. Europa. Jul. Aug. Im F. 2.

10. *R. lanuginosus*. Pers. l. c. Wolliger Ranunkel. Auf Bergwiesen in Eur. Jun. — Aug. Im F. 2.

516. *Trollius*, Trollblume.

1. *T. europaeus*. Pers. l. c. 2. p. 106. Europäische Trollblume. Auf Bergwiesen in Deutschl. Engl. u. Schweden. Jun. — Aug. Im F. 2.

2. *T. asiaticus*. Pers. l. c. Asiatische Trollblume. In Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 2.

517. *Isopyrum*, Isopyrum.

1. *I. thalictroides*, Pers. l. 2. c. p. 107 Thalictrumartiges Isopyrum. In schattigen Hainen v. Oesterr. Krain, Ungarn u. Ital. May. Im F. 2.

518. *Helleborus*, Christwurz.

1. *H. hyemalis*. Pers. l. c. 2. Winter-Christwurz. In Oesterr. der Schweiz u. Italien. Febr. März. Im F. 2.

2. *H. niger*. Pers. l. c. Schwarze Christwurz. In Oesterr. u. Toscana. Jän. — Apr. Im F. 2.

3. *H. viridis*. Pers. l. c. Grüne Christwurz. Auf Bergen in Oesterr. Krain u. Ital. März, Apr. Im F. 2.

4. *H. foetidus*. Pers. l. c. Stinkende Christwurz. In Deutschl. d. Schweiz u. Frankr. März, Apr. Im F. 2.

5. *H. lividus*. Pers. l. c. Schmutzigweisse Christwurz. In Corsica. Apr. May. Im F. 24.

519. *Caltha*, Kuhblume.

1. *C. palustris*. Pers. l. c. Gemeine Kuhblume. Auf feuchtem Boden in Eur. Asien u. Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

CLASSIS XIV.

D I D Y N A M I A.

G Y M N O S P E R M I A.

520. *Teucrium*, Gamander.

1. *T. fruticans*. Pers. l. c. 2. p. 110. Strauchartiger Gamander. In Ital. Span. Sicil. u. der Barbarey. Jul. Aug. K. H. ½.

2. *T. Marum*. pers. l. c. Katzen-Gamander. Zu Valenzia in Span. Jul. Aug. K. H. ½.

3. *T. multiflorum*. Pers. l. c. Vielblüthiger Gamander. In Span. Aug. Ch. ½.

4. *T. Laxmanni*. Pers. l. c. Laxmannischer Gamander. Auf trockenen Plätzén in Ungarn, Sclavonien u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 24.

5. *T. virginicum*. Pers. l. c. 2. p. 111. Virginischer Gamander. In Virgin. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *T. hyrcanicum*. Pers. l. c. Hyrcanischer Gamander. In Hyrcanien. Jun. Jul. K. H. 24.

7. *T. abutiloides*. Pers. l. c. Grossblättriger Gamander. Zu Madera. May — Jul. Ch. ½.

8. *T. Scorodonia*. Pers. l. c. Scorodonien-Gamander. Auf Sandhügeln in Deutschl. der Schweiz, Frankr. Engl. u. Niederland. Jun. — Aug. Im F. 24.

9. *T. betonicum*. Pers. l. c. Betonienartiger Gamander. An Flüssen zu Madera. Jul. Aug. Ch. 5.

10. *T. massiliense*. Pers. l. c. Französischer Gamander. In Candien u. in Südfrankr. Jun. — Aug. K. H. 5.

11. *T. flavum*, Pérs. l. c. 2, p. 112. Gelber Gamander. In Ital. Span. Frankr. u. der Barba-rey. Jun. — Aug. K. H. 5.

12. *T. montanum*. Pers. l. c. Berg-Gaman-der. In Deutschl. d. Schweiz u. Frankr. Jun. — Aug. Im F. 24.

521. Satureia, Pfefferkraut.

(Saturey.)

1. *S. Thymbra*. Pers. l. c. 2, p. 113. Can-disches Pfefferkraut. In Candien u. Tripoli. Jun. — Aug. K. H. 5.

2. *S. montana*. Pers. l. c. Berg-Pfefferkraut. In Krain, Croatiens, Ital. Span. u. Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 5.

3. *S. hortensis*. Pers. l. c. Gemeines Pfeffer-kraut. In Ital. u. Languedoc. Jun. — Aug. Im F. 0.

522. Hyssopus, Isopp.

1. *H. officinalis*. Pers. l. c. 2, p. 114. Ge-meiner Isopp. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *H. orientalis*. Willd. enum. 2. p. 599.
Orientalischer Isopp. Am Caucasus. Jul. — Oct.
K. H. ♂.

3. *H. scrophularifolius*. Pers. l. c. Lang-
rüslicher Isopp. In Canada. Jun. Jul. Im F. ♂.

423. Nepeta, Katzenmünze.

1. *N. Cataria*. Pers. l. c. Gemeine Katzen-
münze. Im Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *N. violacea*. Pers. l. c. 2. p. 115. Violete
Katzenmünze. In Span. Sibir. u. Krain. Jan. Jul.
Im F. ♀.

3. *N. Nepetella*. Pers. l. c. Kleine Katzen-
münze. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♀.

4. *N. colorata*. Willd. enum. 2. p. 601. Be-
mahlte Katzenmünze. Am Caucasus. Jun. Jul. Im
F. ♀.

N. melissaeifolia. Pers. l. c.

522. Lavandula, Lavendel.

1. *L. Spica*. Pers. l. c. 2. p. 116. Gemeiner
Lavendel. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *L. Stoechas*. Pers. l. c. Schopf-Laven-
del. In Südfrankr. Span. u. Nordafr. Jun. Jul.
K. H. ♂.

3. *L. dentata*. Pers. l. c. Gezähnter Laven-
del. In Span. Nordafr. u. im Orient. May — Sept.
Ch. ♂.

4. *L. pinnata*. Pers. l. c. Gefiederter Laven-
del. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. ♂.

5. *L. multifida*. Pers. l. c. Vielspaltiger Lavendel. In Africa u. Span. Jun. Jul. Ch. ♂.

6. *L. abrotanoides*. Pers. l. c. Stabwurzartiger Lavendel. Auf den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. ♂.

525. Sideritis, Gliedkraut.

1. *S. canariensis*. Pers. l. c. Canarisches Gliedkraut. Auf Madera u. den Canarischen Inseln. Jun. Jul. Ch. ♂.

2. *S. candicans*. Pers. l. c. Weissliches Gliedkraut. Zu Madera. Jun. Jul. Ch. ♂.

3. *S. cretica*. Pers. l. c. Candisches Gliedkraut. In Candien. Jul. K. H. ♂.

4. *S. syriaca*. Pers. l. c. p. 117. Syrisches Gliedkraut. In Ital. Candien u. im Orient. Jun. Jul. K. H. ♂.

526. Bistropogon, Kelchbart.

1. *B. punctatum*. Pers. l. c. 2. p. 118. Punktirter Kelchbart. Auf Madera. —. Ch. ♂.

527. Mentha, Münze,

1. *M. sylvestris*. Pers. l. c. 2. p. 119. Wald-Münze. In Deutschl. Engl. u. Frankr. an Bächen. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *M. viridis*. Pers. l. c. Grüne Münze. In Deutschl. Engl. Frankr. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *M. piperita*. Pers. l. c. Pfeffer-Münze. In Engl. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *M. rotundifolia* Pers. l. c. Rundblättrige Münze. An feuchten Stellen in Deutschl. u. Engl. Jun. Jul. Im F. 24.

β. foliis variegatis. Mit bunten Blättern.

5. *M. crispa*. Pers. l. c. Krause Münze. In Deutschl. d. Schweiz u. Sibirien. May, — Jul. Im F. 24.

6. *M. aquatica*. Pers. l. c. Pferde-Münze. Am Wasser in Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *M. austriaca*. Pers. l. c. 2. p. 120. Oesterreichische Münze. In Oesterr. Deutschl. u. Frankreichs Sümpfen. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *M. pulegium*. Pers. l. c. Poley-Münze In Deutschl. d. Schweiz, Engl. u. Frankr. in lehmigen Boden. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *M. cervina*. Pers. l. c. Hirsch-Münze. In Südfrankr. Jun. Jul. Im F. 24.

528. Perilla, Perille.

1. *P. ocymoides*. Pers. l. c. Basilicumartige Perille. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ⊖.

529. Lamium, Bienensaug.

1. *L. orvala*. Pers. l. c. 2.p. 121. Grossblüthiger Bienensaug. In Pannonien, Istrien, Ital. u. Croatia. May — Jul. Im F. 24.

2. *L. garganicum*. Pers. l. c. Italienischer. Bienensaug. Auf dem Bergen Gargano in Apulien. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *L. album*. Pers. l. c. 2. p. 122. Weisser Bienensaug. In Eur. May, — Jul. Im F. 24.

530. Betonica, Betonie.

1. *B. officinalis*. Pers. l. c. Gemeine Betonie.
In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *B. stricta*. Pers. l. c. 2. p. 123. Steife
Betonie. In Deutschl. u. Frankr. Jun. — Aug. Im
F. 5.

3. *B. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische
Betonie. Im Orient. May — Jul. Im F. 24.

531. Stachys, Ziest.

1. *St. circinata*. Pers. l. c. Stumpfblättriger
Ziest. In Africa. Sept. Oct. Ch. 24.

2. *St. coccinea*. Pers. l. c. Scharlachrother
Ziest. In Mexico u. Chili. Jun. Jul. Ch. 24.

3. *St. alpina*. Pers. l. c. Gebirgs-Ziest. In
Deutschl. u. d. Schweiz auf Bergen, May — Jul.
Im F. 24.

4. *St. germanica*. Pers. l. c. Deutscher Ziest.
In Deutschl. Engl. Frankr. u. Sibir. May, Jun.
Im F. 5.

5. *St. lanata*. Pers. l. c. Wolliger Ziest. In
Sibirien. May, — Jul. Im F. 24.

6. *St. rugosa*. Pers. l. c. 2. p. 124. Runzlicher
Ziest. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 5.

532. Marrubium, Andorn.

1. *M. peregrinum*. Pers. l. c. 2. p. 125.
Fremder Andorn. Auf trockenen Boden in Oesterr.
Sicil. u. Candien. May — Aug. Im F. 24.

2. *M. crispum.* Pers. l. c. Krauseblättriger Andorn. In Ital. u. Span. Jun. Jul. K. H. 2.

3. *M. hispanicum.* Pers. l. Spanischer Andorn. In Spanien. Jun. Jul. K. H. 2.

4. *M. Pseudo-Dictamnus.* Pers. l. c. Dostartiger Andorn. In Candien. Jun. Jul. K. H. 3.

533. Phlomis, Fackelblume.

1. *Ph. fruticosa.* Pers. l. c. 2. p. 126. Strauchartige Fackelblume. In Sicilien u. Span. Jul. Aug. K. H. 3.

2. *Ph. salviaefolia.* Pers. l. c. Salveyblättrige Fackelblume. —. May, Jun. Ch. 3.

3. *Ph. tuberosa.* Pers. l. c. 2. p. 127. Knollige Fackelblume. In Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 2.

4. *Ph. nepetifolia.* Pers. l. c. Katzenmünzblättrige Fackelblume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. 3.

5. *Ph. Leonurus.* Pers. l. c. Goldfarbige Fackelblume. Am Cap. Oct. Nov. Ch. 3.

534. Moluccella, Trichterkelch.

1. *M. spinosa.* Pers. l. c. Stachliger Trichterkelch. Auf den Mollucken. Jun. Jul. Im F. 3.

2. *M. laevis.* Pers. l. c. 2. p. 128. Glatter Trichterkelch. In Syrien. Jun. Jul. Im F. 3.

535. Origanum, Dosten.

1. *O. Dictamnus.* Pers. l. c. Diptam-Dosten. Auf dem Berge Ida in Candien. Sept. Oct. K.H. 3.

2. *O. heracleoticum*. Pers. l. c. 2. p. 129.
Griechischer Dosten. Steyerm. bey Grätz u. Südeur. besonders in Griechenl. May — Jul. Im F. 2.

3. *O. vulgare*. Pers l. c. Gemeiner Dosten.
In Eur. u. Canada. May — Jul. Im F. 2.

4. *O. Majorana*. Pers. l. c. Majoran-Dosten.
In Portug. u. Palästina. Jun. Jul. Im F. ○.

536. Westeringia, Westeringie.

1. *W. rosmariniformis*. Smith, in act. holm. 1797. p. 175. t. 8. Rosmarinartige Westeringie.
In Neuholl. May, — Aug. Ch. ♂.
W. rosmarinacea. Pers. l. c.
Cunila fruticosa. Dönn. catal. horti cantabr. p. 5.

537. Thymus, Thymian.

1. *Th. Serpyllum*. Pers. l. c. 2. p. 130. Feld-Thymian. In Eur. May — Aug. Im F. ♂.

2. *Th. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeiner Thymian. In Südeur. May — Jul. Im F. ♂.

3. *Th. Calamintha*. Willd. enum. 2. p. 624.
Calmünzen-Thymian. In Oesterr. d. Schweiz.
Ital. Span. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 2.
Mellissa Calamintha. Pers. l. c. 2. p. 132.

4. *Th. Acinos*. Lin. sp. pl. p. 826. Acker-Thymian. In Eur. Jun. Jul. Im F. ○.
Acynos vulgaris. Pers. l. c. 2. p. 131.

5. *Th. alpinus*. Lin. l. c. Alpen Thymian.
Auf Bergen in Oesterr. Salzb. d. Schweiz u. zu Montpellier. May, Jun. Im F. 2.
Acynos alpinus. Pers. l. c. 2. p. 131.

6. *Th. montanus*. Pers. l. c. 2. p. 130. Berg-Thymian. In Ungarn. Jun. Jul. Im F. 2.

538. *Melissa*, Melisse.

1. *M. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 132. Citronen-Melisse. Auf Bergen in Ungarn d. Schweiz u. Ital. Jun. — Aug. Im F. 2.

539. *Horminum*, Horminum.

1. *H. pyrenaicum*. Pers. l. c. Pyrenäisches Horminum. Auf den Pyrenäen, den Tyrolier u. Krainer Alpen, Jun. Jul. Im F. 2.
Melissa pyrenaica. Jacq. hort. vind. 2. p. 86. t. 183.

540. *Melittis*, Bienenblume.

1. *M. Melissophyllum*. Pers. l. c. Melissenblättrige Bienenblume. Auf Bergen in Oesterr. d. Schweiz, Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. 2.

541. *Dracocephalum*, Drachenkopf.

1. *D. virginianum*. Pers. l. c. 2. p. 133. Virginischer Drachenkopf. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. Im F. 2.

2. *D. canariense*. Pers. l. c. Canarischer Drachenkopf. Auf den Canarischen Inseln. Jul. K. H. 2.

3. *D. austriacum*. Pers. l. c. Oesterreichischer Drachenkopf. Auf dem Geisberge in Oesterr. dann auf Bergen in Ungarn, Siebenbürgen u. Portugall. Jun. Jul. Im F. 2.

4. *D. Ruyschiana*. Pers. l. c. Schwedischer Drachenkopf. In Schweden, Dänemark, Sibirien u. d. Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 24.

5. *D. Sibiricum*. Pers. l. c. Sibirischer Drachenkopf. In Sibir. May — Aug. Im F. 24.

6. *D. Moldavica*. Pers. l. c. Türkischer Drachenkopf. In der Moldau u. Sibir. Jun. Jul. Im F. 24.

542. *Ocymum*, *Basilicum*,

1. *O. monachorum*. Pers. l. c. 2. p. 134. Zimtduftendes Basilicum. In Ostind. Jun. — Aug. VV. H. ♂.

2. *O. gratissimum*. Pers. l. c. Angenehmes Basilicum. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

3. *O. suave*. Willd. enum. 2. p. 629. Lieblichduftendes Basilicum. —. May — Oct. VV. H. ♂.

4. *O. Basilicum*. Pers. l. c. Gemeines Basilicum. In Ostind. u. Persien. May — Aug. VV. H. ♂.

β . *fimbriatum*. Mit verbrämtten Blättern.

γ . *bullatum*. — blasigen —

5. *O. minimum*. Pers. l. c. Kleinstes Basilicum. Auf Ceylon. May — Aug. VV. H. ♂.

6. *O. polystachyon*. Pers. l. c. Vielähriges Basilicum. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

543. *Plectranthus*, *Hahnensporn*.

1. *P. fruticosus*. Pers. l. c. 2. p. 135. Strauchartiger Hahnensporn. Am Cap, Jun. — Nov. Ch. ♂.

2. *P. parviflorus.* Willd. hort. berol. 1. p.
65. Kleinblüthiger Hähnensporn. In Peru? May
— Aug. Ch. ♂.

544. *Scutellaria*, Helmkraut.

1. *Sc. alpina.* Pers. l. c. 2. p. 136. Alpen-
Helmkraut. Auf Alpen in d. Schweiz. Jul. Aug.
Im F. 24.

2. *Sc. galericulata.* Pers. l. c. Gemeines
Helmkraut. An Wässern in Eur. Jun. Jul. Im
F. 24.

545. *Prunella*, Prunelle.

1. *P. grandiflora.* Pers. l. c. 2. p. 137. Gross-
blüthige Prunelle. In Eur. May — Jul. Im F. 24.

2. *P. laciniata.* Pers. l. c. Schlitzblättrige
Prunelle. In Europ. Waldungen. May — Jul.
Im F. 24.

546. *Prasium*, Niccoline.

1. *P. majus.* Pers. l. c. Grosse Niccoline.
In Dalmatien, Sicil. zu Rom. u. bey Tanger. Jun.
Jul. K. H. ♂.

ANGIOSPERMA.

547. *Verbena*, Eisenhart.

1. *V. Aubletia.* Pers. l. c. 2. p. 138. Schön-
blühender Eisenhart. In Carol. u. Georg. Jun.
Jul. Im F. ⊙.

2. *V. bonariensis*. Pers. l. c. Sädamerikanischer Eisenhart. Zu Buenos Ayres. Jun. Jul. Ch. 24.

3. *V. hastata*. Pers. l. c. Spiefsblättriger Eisenhart. In Nordamer. Jun. — Im F. W.

4. *V. triphylla*. l'Herit. styrp. 1. p. 21. t. 11. Dreyblättriger Eisenhart. Zu Buenos Ayres u. Chili. Jul. Jul. Ch. h.

Aloisia citriodora. Pers. l. c. 2. p. 139.

548. Priva, Prive.

1. *P. mexicana*. Pers. l. c. Mexicanische Prive. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 24.
Verbena mexicana. Mill. dict. n. 16.

449. Lantana, Lantane.

1. *L. mista*. Pers. l. c. 2. p. 140. Bunte Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. h.

2. *L. trifolia*. Pers. l. c. Dreyblättrige Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. h.

3. *L. Cammara*. Pers. l. c. Veränderliche Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. — Sept. W. H. h.

4. *L. crocea*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 37. t. 47. Safranfarbige Lantane. In Jamaica. Apr. May. W. H. h.

5. *L. involucrata*. Pers. l. c. Andornblättrige Lantane. Im wärmer. Amer. Bl. das ganze Jahr hindurch. W. H. h.

6. *L. recta*. Pers. l. c. Kleinblättrige Lantane. In Jamaica. Jun. — Aug. W. H. h.

7. *L. lavandulacea*. Pers. l. c. Lavendelblättrige Lantane. — Jun. — Aug. VV. H. Ქ.

8. *L. salvifolia*. Pers. l. c. Salveyblättrige Lantane. Am Cap. Jun. — Aug. VV. H. Ქ.

9. *L. melissaeifolia*. Pers. l. c. Melissenblättrige Lantane. In Westindien. Jun. — Aug. VV. H. Ქ.

10. *L. scabrida*. Pers. l. c. Scharfblättrige Lantane. In Westind. Jun. — Aug. VV. H. Ქ.

11. *L. nivea*. Pers. l. c. Weissblühende Lantane. In Ostind. Jun. — Aug. VV. H. Ქ.

12. *L. aculeata*. Pers. l. c. Stachlige Lantane. Im wärmer. Amer. Jun. — Aug. VV. H. Ქ.

550. Duranta, Durante.

1. *D. Plumieri*. Pers. l. c. Plumierische Durante. In Südamer. — VV. H. Ქ.

2. *D. Ellisia*. Pers. l. c. Ellisische Durante. In Jamaica. — VV. H. Ქ.

3. *D?* Frutex an novi generis? Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 51. t. 500. Ist in Patagonien zu Hause.

551. Citharexylum, Geigenholz.

1. *C. cynereum*. Pers. l. e. 2. p. 142. Graues Geigenholz. In Jamaica. — VV. H. Ქ.

2. *C. caudatum*. Pers. l. c. Ausgerandetes Geigenholz. In Jamaica. — VV. H. Ქ.

3. *C. villosum*. Pers. l. c. Haariges Geigenholz. In St. Domingo. Aug. — Oct. VV. H. Ქ.

4. *C. molle*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 9.
t. 417. Weiches Geigenholz. — . Apr. — Jul.
W. H. ♂.

5. *C. quadrangulare*. Pers. l. c. Vierkantiges Geigenholz. Zu Martinique. Jun. — Aug.
W. H. ♂.

6. Eine noch unbeschriebene Art, dem *C. cinereo* sehr ähnlich, dessen Vaterland mir unbekannt ist.

552. *Cornutia*, *Cornutie*.

1. *C. punctata*. Willd. sp. pl. 3. p. 322. Punktirte Cornutie. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♂.
Hostana coerulea. Pers. l. c. 2. p. 143.
Hosta coerulea. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 60.
t. 114.

553. *Vitex*, Müllein.

1. *V. Agnus castus*. Pers. l. c. Gemeine Müllen. In Sümpfen v. Neapel. u. Sicilien. Jul.
Aug. K. H. ♂.

2. *V. incisa*. Pers. l. c. Eingeschnittene Müllen. In China. Aug. Sept. Ch. ♂.

554. *Volkameria*, *Volkamerie*.

1. *V. aculeata*. Pers. l. c. 2. p. 144. Stachlige Volkamerie. In Jamaica u. Barbados. — W.
H. ♂.

2. *V. ligustrina*. Pers. l. c. Ligusterartige Volkamerie. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul.
W. H. ♂.

3. *V. inermis*. Pers. l. c. Wehrlose Volkamerie. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

4. *V. buxifolia*. Willd. enum. 2. p. 658. Buchsblättrige Volkamerie. — . — . VV. H. ♂.

555. Clerodendrum, Loosbaum.

1. *C. viscosum*. Pers. l. c. 2. p. 145. Klebriger Loosbaum. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

2. *C. purpureum*. Hort. parisiens. Purpurrother Loosbaum. — . — . VV. H. ♂.

3. *C. fortunatum*. Pers. l. c. Glücklicher Loosbaum. In Ostind. — . VV. H. ♂.

4. *C. fragrans*. Willd. enum. 2. p. 659. Wohlriechender Loosbaum. In Japan. Jun. — Aug. VV. H. ♂.

Volkameria fragrans. Pers. l. c.

Volkmannia japonica. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 48. t. 338.

556. Selago, Selago.

1. *S. corymbosa*. Pers. l. e. Doldentraubige Selago. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. ♂.

557. Hebenstreitia, Hebenstreitie.

1. *H. dentata*. Pers. l. c. 2. p. 146. Gezähnte Hebenstreitie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

558. Manulea, Handblume.

1. *M. alternifolia*. Pers. l. c. 2. p. 148. Wechselblättrige Handblume. In Neuhol. Jun. Jul. Ch. ♂.

2. *M. viscosa*. Willd. enum. 2. p. 653. Klebrige Handblume. Am Cap. Jun. — Sept. Ch. ♀.
Buchnera viscosa. Pers. l. c. 2. p. 149.

3. *M. oppositifolia*. Pers. l. c. 2. p. 148. Gegenüberstehendblättrige Handblume. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♀.

559. Bartsia, Bartsie.

1. *B. alpina*. Pers. l. c. 2. p. 150. Alpen-Bartsie. Auf Alpen in Oesterr. d. Schweiz, Savoyen u. Lappland. Jul. Aug. Im F. 24.

560. Linaria, Leinkraut.

1. *L. Cymbalaria*. Willd. enum. 2. p. 639. Eckiges Leinkraut. Auf Felsen in Eur. May — Aug. Im F. 24.
Antirrhinum Cymbalaria. Pers. l. c. 2. p. 155.

2. *L. latifolia*. Willd. l. c. Breitblättriges Leinkraut. In Nordafrica. Jun. Jul. Im F. ♂.
Antirrhin. latif. Pers. l. c.

3. *L. purpurea*. Willd. l. c. Purpurfarbiges Leinkraut. Am Vesuv. Jun. Jul. K. H. 24.
Antirrhin. pürp. Pers. l. c. 2. p. 156.

4. *L. versicolor*. Willd. l. c. 2. p. 640. Buntes Leinkraut. In Südfrankr. Jun. Jul. Im F. ♂.
Antirrhin. versic. Pers. l. c.

5. *L. repens*. Willd. l. c. Kriechendes Leinkraut. In Engl. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 24.
Antirrhin. rep. Pers. l. c.

6. *L. bipartita*. Willd. l. c. Zweytheiliges Leinkraut. Zu Mogador. Jun. Jul. Im F. ♂.
Antirrhin. bipartit. Pers. l. c. 2. p. 155.

— 240 —

7. *L. alpina*. Willd. l. c. 2. p. 641. Alpen-Leinkraut. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. d. Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. 24. Antirrhin. alp. Pers. l. c. 2. p. 157.

8. *L. genistifolia*. Willd. l. c. Ginsterblättriges Leinkraut. Auf trockenen Hügeln in Oesterr. d. Schweiz u. Sibirien. May — Jul. Im F. 24. Antirrhin. genistif. Pers. l. c. 2. p. 158.

9. *L. vulgaris*. Willd. l. c. Gemeines Leinkraut. In trockenen Hainen u. auf Wiesen in Eur. May — Jul. Im F. 24. Antirrhin. Linaria. Pers. l. c.

B. Peloria. Mit monströser Blüthe.

10. *L. chalepensis*. Willd. l. c. 2. q. 642. Aleppisches Leinkraut. In Ital. u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. 24. Antirrhin. chalep. Pers. l. c.

561. Antirrhinum.

1. *A. majus*. Lin. sp. pl. p. 859. Garten-Löwenmaul. In Südtirol, u. den noch südlicheren Eur. May — Jul. Im F. 24. Orontium majus. Pers. l. c.

2. *A. siculum*. Ucria. apud Roem. arch. 1. p. 69. Sicilianisches Löwenmaul. In Sicilien. Jun. Jul. K. H. 24. Oront. sicul. Pers. l. c.

562. Nemesia, Nemesie.

1. *N. foetens*. Pers. l. c. 2. p. 159. Stinkende Nemesie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. 24.

563. Maurandia, Maurandie.

1. *M. semperflorens*. Jacq. hort. schoenbr.
3. p. 20. t. 288. Immerblühende Maurandie. In
Mexico. Jun. — Sept. W. H. 24.
M. scandens. Pers. l. c. 2. p. 160.

2. *M. antirrhiniflora*. Humboldt et Bonpland.
Löwenmaulblättrige Maurandie. In Mexico. Jul.
— Sept. W. H. 24.

564. Scrophularia, Braunwurz.

1. *Sc. aquatica*. Pers. l. c. Wasser-Braun-
wurz. An feuchten Stellen in Eur. May — Jul.
Im F. ♂.

2. *Sc. betonicaefolia*. Pers. l. c. Betonien-
blättrige Braunwurz. In Portugall. Jun. Jul. K.
H. 24.

3. *Sc. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische
Braunwurz. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *Sc. altaica*. Pers. l. c. Altaische Braunwurz.
Auf den Altaischen Alpen in Sibirien. Jun. Jul.
Im F. 24.

5. *Sc. vernalis*. Pers. l. c. Frühlings-Braun-
wurz. In Oesterr. Ungarn, Deutschl. der Schweiz
u. Ital. May, Jun. Im F. ♂.

6. *Sc. sambucifolia*. Pers. l. c. 2. p. 161.
Hollunderblättrige Braunwurz. In Span. Portug.
u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. 24.

7. *Sc. canina*. Pers. l. c. Hunds-Braunwurz.
In Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im
F. ♀.

8. *Sc. lucida*. Pers. l. c. Glänzende Braunwurz. In Ital. Candien u. im Orient. Jul. Aug. K. H. ♀.

9. *Sc. peregrina*, Pers. l. c. Fremde Braunwurz. In Italien. Jun. Jul. Im F. ♂.

565. Celsia, Celsie.

1. *C. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische Celsie. In Dalmatien, Cappadocien u. Armenien. Sept. Oct. Im F. ♂.

2. *C. Arcturus*. Pers. l. c. Gestielte Celsie. In Candien. Jun. — Oct. K. H. ♂.

3. *C. cretica*. Pers. l. c. Candische Celsie. In Candien u. Nordafr. Jun. — Aug. K. H. ♂.

566. Hemimeris, Halbblume.

1. *H. urticifolia*. Pers. l. c. 2, p. 162. Nesselblättrige Halbblume. In Südamer. Jul. — Oct. Ch. ♀.

2. *H. coccinea*. Willd. sp. pl. 3, p. 283. Scharlachfarbige Halbblume. In Südamer. Jul. — Oct. Ch. ♀.

Hemimeris linearis. Pers. l. c.

Celsia — Jacq. ic. rar. 3, t. 497. Collect. 2, p. 270.

567. Digitalis, Fingerhut.

1. *D. purpurea*. Pers. l. c. Rother Fingerhut. Anf Bergen in Deutschl. der Schweiz u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *D. ambigua*. Lin. suppl. 280. Blasgelber Fingerhut. In Wäldern v. Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 2 $\frac{1}{2}$.
D. ochroleuca. Pers. l. c.

3. *D. lutea*. Pers. l. c. Gelber Fingerhut. In Frankr. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 2 $\frac{1}{2}$.

4. *D. ferruginea*. Pers. l. c. Rostfarbiger Fingerhut. In Ital. Jun. Jul. Im F. 2 $\frac{1}{2}$.

5. *D. lanata*. Pers. l. c. 2. p. 163. Wolliger Fingerhut. Auf sonnigen Hügeln in Ungarn u. Griechenland. Jun. Jul. Im F. 2 $\frac{1}{2}$.

6. *D. laevigata*. Pers. l. c. Glatter Fingerhut. Auf Kalkfelsen in Croatia. Jun. Jul. Im F. 2 $\frac{1}{2}$.

7. *D. obscura*. Pers. l. c. Dunkler Fingerhut. In Spanien. Jun. Jul. Im F. 2 $\frac{1}{2}$.

568. *Mimulus*, Gauklerblume.

1. *M. glutinosus*. Pers. l. c. Klebrige Gauklerblume. —. Jun. Jul. Ch. ♂.

2. *M. luteus*. Pers. l. c. Gelbe Gauklerblume. In Peru. Jun. Jul. Ch. ⊙.

569. *Halleria*, Hallerie.

1. *H. lucida*. Pers. l. c. Glänzende Hallerie. In Wäldern am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

— 244 —

570. Trevirana, Trevirane.

1. *Tr. coccinea*. Willd. enum. 2. p. 638.
Scharlachrothe Treyirane. Auf Bergen in Jamai-
ca. Aug. Sept. W. H. 24.
Achimenes cocc. Pers. l. c. 2. p. 165.
Cyrilla pulchella. L'Heritier stirp. nov. 1. p. 147,
t. 71.

571. Besleria, Beslerie.

1. *B. serrulata*. Pers. l. c. Gezähnelte Bes-
lerie. In Westind. May, Jun. W. H. ♂.

572. Capraria, Herzblume.

1. *C. lucida*. Ait. hort. kew. 2. p. 353. Glän-
zende Herzblume. Am Cap. —. Ch. ♂.
Teedia lucida. Pers. l. c. 2. p. 166.

2. *C. undulata*. Pers. l. c. Wellenblättrige
Herzblume. Auf Hügeln am Cap. —. Ch. ♂.

573. Browallia, Browallie.

1. *Br. demissa*. Pers. l. c. Niedrige Bro-
wallie. In Südamer. Jun. W. H. ○.

2. *Br. elata*. Pers. l. c. Hohe Browallie. In
Peru. Aug. W. H. ○.

574. Bontia, Bontie.

1. *B. daphnoides*. Pers. l. c. 2. p. 168. Sei-
delbastartige Bontie. Auf den Antillen. Jun. W.
H. ♂.

575. Brunsfelsia, Brunsfelsie.

1. *Br. americana*. Pers. l. c. Americanische Brunsfelsie. Im wärmer. Amer. — . W. H. h.

576. Crescentia, Kürbisbaum.

1. *Cr. Cujete*. Pers. l. c. Grossfrüchtiger Kürbisbaum. Auf den Caraibischen Ins. Jun. Jul. W. H. h.

2. *Cr. pinnata*. Jacq. collect. 3. p. 203. t. 18. (flos). Fragm. bot. p. 30. t. 33. f. 4. (folium et fructus). Gefiederter Kürbisbaum. Zu Mozambique. — . W. H. h.

577. Chelone, Schildblume.

1. *Ch. obliqua*. Pers. l. c. 2. p. 169. Schiefe Schildblume. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Ch. barbata*. Pers. l. c. Bartige Schildblume. In Mexico. May — Aug. Im F. 24.

578. Pentstemon, Bartfaden.

1. *P. campanulata*. Willd. sp. pl. 3. p. 228. Glockenförmiger Bartfaden. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24.

Chelone campanul. Pers. l. c.

579. Bignonia, Trompetenblume.

1. *B. Catalpa*. Pers. l. c. 2. p. 170. Gemeine Trompetenblume. In Carol. u. Florida. Jul. Aug. Im F. h.

2. *B. longissima*. Pers. l. c. Langfrüchtige Trompetenblume. In Westind. Jul. Aug. VV. H. ♂.
3. *B. aequinoctialis*. Pers. l. c. Cajennische Trompetenblume. Zu Cajenne. Jun. Jul. VV. H. ♂.
4. *B. rigescens*. Pers. l. c. 2. p. 171. Steifblättrige Trompetenblume. Zu Caracas. Jul. VV. H. ♂.
5. *B. paniculata*. Pers. l. c. Rispenblüthige Trompetenblume. Im wärmer. Amer. Jul. VV. H. ♂.
6. *B. grandifolia*. Pers. l. c. Grossblättrige Trompetenblume. Zu Caracas. Aug. Sept. VV. H. ♂.
7. *B. capreolata*. Pers. l. c. Rankende Trompetenblume. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♂.
8. *B. echinata*. Pers. l. c. Weichstachlige Trompetenblume. In Carthagena. —. VV. H. ♂.
9. *B. chrysanthia*. Pers. l. c. Goldfarbige Trompetenblume. Zu Caracas. May. VV. H. ♂.
10. *B. Leucoxylon*. Pers. l. c. Weißholzige Trompetenblume. In Jamaica an den Ufer. der Flüsse. Jul. Aug. VV. H. ♂.
11. *B. radicans*. Pers. l. c. Wurzelnde Trompetenblume. In Pensylvan. u. Florida. Jun. Jul. Im F. ♂.
12. *B. grandiflora*. Pers. l. c. Grossblumige Trompetenblume. In China u. Japan. —. Ch. ♂.
13. *B. stans*. Pers. l. c. Eschenblättrige Trompetenblume. Im wärmer. Amer. —. VV. H. ♂.
14. *B. pandorana*. Pers. l. c. Geigenblättrige Trompetenblume. In Neuholl. Apr. May. Ch. ♂.

15. Eine noch unbeschriebene Art aus dem
jardin des plantes v. Paris.

580. *Xenopoma*, Fremdlingstrank.

1. *X. obovatum*. Willd. enum. suppl. p. 43.
Gewürzhafter Fremdlingstrank. In China. Jul. —
Sept. Ch. ৎ.
Frutex innominatus. Jacq. hort. schoenbr. 4.
p. 50. t. 498.

581. *Gloxinia*, Gloxinie.

1. *Gl. maculata*. Pers. l. c. 2. p. 174. Ge-
fleckte Gloxinie. Zu Carthagena in Amer. Jul.
Aug. W. H. 24.

582. *Gesneria*, Gesnerie.

1. *G. tomentosa*. Pers. l. c. 2. p. 175. Fil-
zige Gesnerie. An Flüssen in Südamer. Jul. Aug.
W. H. ৎ.

583. *Ruellia*, Ruellie.

1. *R. patula*. Pers. l. c. 2. p. 176. Ausge-
breitete Ruellie. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ⓠ.

2. *R. lactea*. Pers. l. c. Milchfarbige Ruel-
lie. In Mexico. Jun. Jul. W. H. 24.

3. *R. clandestina*. Pers. l. c. Heimliche Ru-
ellie. Auf den Ins. Barbados u. St. Crux. Jan.
Jul. W. H. 24.

4. *R. varians*. Pers. l. c. Veränderliche Ru-
ellie. Zu Coromandel. Nov. — März. W. H. ৎ.
Eranthemum pulchellum. Andrews bot. repos. p.
et. t. 80.

— 248 —

5. *R. macrophylla*. Pers. l. c. 2. p. 177.
Großblättrige Ruellie. Zu St. Martha in Amer.
Jun. — Aug. W. H. ½.

6. *R. tuberosa*. Pers. l. c. Knollige Ruellie.
In Jamaica. Jul. Aug. W. H. 2.

584. *Barleria*, Barlerie.

1. *B. Prionitis*. Pers. l. c. 2. p. 178. Fuß-
angelförmige Barlerie. In Ostind. Jul. Aug. W.
H. ½.

2. *B. flava*. Jacq. eclog. fasc. 5. p. 67. t. 46.
Gelbe Barlerie. In Aegypten. Bl. das ganze Jahr
hindurch. Ch. 24.
Justicia flava. Pers. l. c. 1. p. 21.

585. *Harrachia*, Harrachie.

1. *H. speciosa*. Jacq. eclog. fasc. 3. p. 33. t. 21.
Schöne Harrachie. In Ostind. May — Jul. W. H. ½.
Justicia infundibuliformis. Pers. l. c. 1. p. 22.

586. *Acanthus*, Bärenklaue.

1. *A. mollis*. Pers. l. c. 2. p. 179. Aechte
Bärenklaue. In Sicilien. Jul. Aug. K. H. 2.

2. *A. spinosus*. Pers. l. c. Stachlige Bären-
klaue. In Ital. Jun. Jul. K. H. 2.

587. *Melianthus*, Honigblume.

1. *M. major*. Pers. l. c. 2. p. 182. Große
Honigblume. Am Cap. Apr. — Jul. Ch. ½.

2. *M. comosus*. Pers. l. c. Schopfartige Ho-
nigblume. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ½.

CLASSIS XV.

TETRADYNA MIA,
SILICULOSAE.

588. Crambe, Meerkohl.

1. *Cr. maritima*. Pers. l. c. 2. p. 184. Gemeiner Meerkohl. An den nördlichen Meeresküsten. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *Cr. hispanica*. Pers. l. c. Spanischer Meerkohl. In Span. Jun. Jul. Im F. ○.

3. *Cr. filiformis*. Pers. l. c. Fadenförmiger Meerkohl. In Patagonien. Jul. — Oct. Ch. 24.

589. Iberis, Bauernsenf.

1. *I. semperflorens*. Pers. l. c. 2. p. 186. Immerblühender Bauernsenf. In Sicilien u. Persien. Bl. das ganze Jahr hindurch. K. H. ♂.

2. *I. gibraltarica*. Pers. l. c. Gibraltarischer Bauernsenf. Zu Gibraltar. Jul. — Oct. K. H. ♂.

3. *I. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüner Bauernsenf. In Candien u. Italien. May — Jul. K. H. ♂.

4. *I. umbellata*. Pers. l. c. 2. p. 187. Doldentragender Bauernsenf. In Istrien, Dalmatien, Toscana, Spanien u. Candien. Jun. Jul. Im F. ○.

5. *I. anara*. Pers. l. c. Bitterer Bauernsenf. In der Schweiz u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. ○.

6. *I. linifolia*. Pers. l. c. Leinblättriger Bauernsenf. In Spanien, Portugall, u. Montpellier. Jun. Jul. K. H. ♂.

590. *Alyssum*, Steinkraut.

1. *A. saxatile*. Pers. l. c. 2. p. 191. Gebirgs-Steinkraut. In Oesterr. u. Candien auf Felsen. Jun. — Aug. Im F. ♂.

2. *A. montanum*. Pers. l. c. 2. p. 192. Berg-Steinkraut. In Deutschl. u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ♀.

591. *Peltaria*, Scheibenkraut.

1. *P. alliacea*. Pers. l. c. 2. p. 193. Knoblauchduftendes Scheibenkraut. Bey Stixenstein in Oesterr. dann auf Alpen in Istrien u. Croatiens. Jun. Jul. Im F. ♀.

592. *Biscutella*, Brillenschote.

1. *B. apula*. Pers. l. c. Apulische Brillenschote. In Ital. Jun. Jul. Im F. ☽.

2. *B. laevigata*. Pers. l. c. Glatte Brillenschote. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz. Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♀.

593. *Isatis*, Waid.

1. *I. tinctoria*. Pers. l. c. Färber-Waid. In Oesterr. u. an den Meeresküsten v. Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

594. *Lunaria*, Mondviole.

1. *L. rediviva*. Pers. l. c. 2. p. 194. Spitzfrüchtige Mondviole. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *L. annua*. Pers. l. c. Stumpffrüchtige Mondviole. In schattigen Wäldern Deutschlands u. Schwedens. Jun. Jul. Im F. ♂.

SILICOUSA E.

595. *Dentaria*, Zahnwurz.

1. *D. enneaphylla*. Pers. l. c. Neunblättrige Zahnwurz. Auf waldigen Bergen in Oesterr. u. Ital. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *D. bulbifera*. Pers. l. c. Zwiebeltragende Zahnwurz. Auf waldigen Bergen v. Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

596. *Cheiranthus*, Levkoy.

1. *Ch. Cheiri*. Pers. l. c. 2. p. 200. Lack-Levkoy. In Dalmatien, der Schweiz, Frankr. Span. u. Engl. auf Mauern. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *Ch. maritimus*. Lin. sp. pl. p. 924. Meerstrands-Levkoy. An den mittelländischen Meeresküsten. May — Aug. Im F. ♂.
Hesperis maritima. Pers. l. c. 2. p. 203.

3. *Ch. incanus*. Pers. l. c. 2. p. 201. Winter-Levkoy. Am Meerstrande in Span. Febr. März. K. H. ♂.

4. *Ch. fenestratis*. Pers. l. c. Zwerg-Levkoy. — Jun. Jul. K. H. ♂.

5. *Ch. annuus*. Pers. l. c. Sommer - Levkoy.
Am Meerestrande in Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

597. *Hesperis*, Nachtviole.

1. *H. tristis*. Pers. l. c. 2. p. 202. Eigentliche Nachtviole. In Oesterr. u. Ungarn auf trockenen Haiden. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *H. matronalis*. Pers. l. c. Rothe Nachtviole. In Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *H. hortensis*, flore pleno albo. Mit weissgefüllter Blüthe.

3. *H. inodora*. Pers. l. c. Fleischfarbige Nachtviole. Bey Wien u. Montpellier. Jun. Jul. Im F. ♂.

C L A S S I S XVI.

M O N A D E L P H I A.

T R I A N D R I A.

598. *Tamarindus*, Tamarinden.

1. *T. indica*. Pers. l. c. 2. p. 211. Indische Tamarinden. In Ind. Aegypt. Arab. u. Amer. May, Jun. VV. H. 5.

599. *Sisyrinchium*, Schweinsrüssel.

1. *S. racemosum*. Pers. l. c. 1. p. 49. Traubenträgender Schweinsrüssel. In Brasilien. May, Jun. VV. H. 24.

S. palmifolium, Lin. mant. 122.

Moraea palmifolia, Thunb. disser. de Moraea p. 8. n. 6.

— 253 —

2. *S. striatum*. Pers. l.c. 1. p. 50. Gestreifter Schweinsrüssel In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.
Moraea sertata. Jacq. hort. schoenbr. 1. p. 6. t. 11.

3. *S. Bermudiana*. Pers. l. c. Bermudischer Schweinsrüssel. Auf den Bermudischen Ins. Jun. Jul. Ch. 24.

4. *S. tenuifolium*. Humboldt et Bonpland. Zartblättriger Schweinsrüssel. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24.

600. Ferraria, Ferrarie.

1. *F. Pavonia*. Cavan. diss. 6. p. 342. t. 189.
 1. 1. Pfauenartige Ferrarie. In Mexico u. Peru.
 Jul. Aug. W. H. 24.
Tigridia Pavonia. Pers. l. c. 1. p. 50.

2. *F. undulata*. Lin. sp. pl. p. 1353. Wellenförmige Ferrarie. Am Cap. May, Jun. Ch. 24.
Ferraria punctata. Pers. l. c.

3. *F. minor*. Pers. l. c. Punktirte Ferrarie.
 Am Cap. May — Jul. Ch. 24.
Ferraria Ferrariola. Willd. sp. pl. 3. p. 581.
Moraea — Jacq. collect. 4. p. 141.

PENTANDRIA.

601. Lobelia, Lobelie.

1. *L. longiflora*. Pers. l. c. 2. p. 213. Langblühige Lobelie. In Jamaica. Jun. — Aug. W. H. 24.

2. *L. cardinalis*. Pers. l. c. Cardinals-Lobelie. In Virgin. u. Carol. Jun. — Aug. K. H. 24.

3. *L. fulgens.* Willd. hort. berol. 2. p. 85.
Glänzende Lobelie. In Mexico. Jun. — Aug. Ch. 24.

4. *L. splendens.* Willd. l. c. p. et t. 86.
Schimmernde Lobelie. In Mexico. Jun. — Aug. Ch. 24.

5. *L. siphilitica.* Pers. l. c. Gemeine Lobelie. In Wäldern v. Virgin. Jul. Aug. K. H. 24.

6. *L. surinamensis.* Pers. l. c. Surinamische Lobelie. Zu Surinam. Sept. Oct. W. H. 24.

7. *L. Erinus.* Pers. l. c. 2. p. 214. Langgestielte Lobelie. Am Cap. May — Oct. Ch. 24.

8. *L. pubescens.* Pers. l. c. Weichhaarige Lobelie. Am Cap. May — Aug. Ch. 24.

9. *L. coronopifolia.* Pers. l. c. Schlitzblättrige Lobelie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 24.

602. Hermannia, Hermannie.

1. *H. althaeifolia.* Pers. l. c. 2. p. 216. Eibischblättrige Hermannie. Am Cap, wie alle folgende. Apr. — Jul. Ch. 24.

H. aurea. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 46. t. 214.

2. *H. plicata.* Pers. l. c. Gefaltene Hermannie. Apr. — Jul. Ch. 24.

H. althaeifolia. Jacq. l. c. 2. p. 46. t. 213.

3. *H. candicans.* Pers. l. c. Weissblättrige Hermannie. May, Jun. Ch. 24.

4. *H. disticha.* Pers. l. c. Zweyzeilige Hermannie. Apr. — Jun. Ch. 24.

H. rotundifolia. Jacq. l. c. 1. p. 63. t. 118.

— 255 —

5. *H. micans.* Pers. l. c. Glänzende Hermannie. Apr. — Aug. Ch. ♂.
H. latifolia. Jacq. l. c. 1. p. 64. t. 119.
6. *H. scordifolia.* Pers. l. c. Gamanderblättrige Hermannie. Apr. — Jun. Ch. ♂.
7. *H. denudata.* Pers. l. c. Glatte Hermannie. Apr. — Aug. Ch. ♂.
8. *H. disermaefolia.* Pers. l. c. Wellenblättrige Hermannie. May — Aug. Ch. ♂.
9. *H. alnifolia.* Pers. l. c. 2. p. 217. Erlenblättrige Hermannie. May — Jul. Ch. ♂.
10. *H. cuneifolia.* Pers. l. c. Keilblättrige Hermannie. Apr. May. Ch. ♂.
11. *H. holosericea.* Pers. l. c. Sammetblättrige Hermannie. Nov. Dec. u. May — Jul. Ch. ♂.
12. *H. hirsuta.* Pers. l. c. Behaarte Hermannie. May, Jun. Ch. ♂.
13. *H. scabra.* Pers. l. c. Scharfblättrige Hermannie. Apr. — Aug. Ch. ♂.
14. *H. multiflora.* Pers. l. c. Vielblühige Hermannie. Apr. — Aug. Ch. ♂.
15. *H. flammea.* Pers. l. c. Feuerfarbige Hermannie. May — Jul. Ch. ♂.
16. *H. hyssopifolia.* Pers. l. c. Isopblättrige Hermannie. May — Aug. Ch. ♂.
17. *H. lavandulaefolia.* Pers. l. c. Lavandelblättrige Hermannie. May — Jul. Ch. ♂.
18. *H. procumbens.* Pers. l. c. Liegende Hermannie. —. Ch. ♂.

- 19.)
20.) Noch unbeschriebene Arten.

603. Mahernia, Mahernie.

1. *M. pinnata*. Pers. l. c. 2. p. 218. Gefiederte Mahernie. Am Cap. May — Aug. Ch. Ქ.
2. *M. diffusa*. Pers. l. c. Ausgebreitete Mahernie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. Ქ.
3. *M. incisa*. Pers. l. c. Eingeschnittene Mahernie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. Ქ.
4. *M. odorata*. Pers. l. c. Wohlriechende Mahernie. Am Cap. May — Jul. Ch. Ქ.

604. Melochia, Melochie.

1. *M. pyramidata*. Pers. l. c. Pyramiden-Melochie. In Brasilien u. auf den Caraibisch. Ins. —. W. H. Ქ.
2. *M. caracasana*. Pers. l. c. 2. p. 219. Caracassche Melochie. Zu Caracas. Jan. Jul. W. H. Ქ.

605. Passiflora, Passionsblume.

1. *P. serratifolia*. Pers. l. c. Sägeblättrige Passionsblume. Zu Surinam. Jun. Jul. W. H. Ქ.
2. *P. cuprea*. Pers. l. c. Kupferfarbige Passionsblume. Auf Providence. Jul. Aug. W. H. Ქ.
3. *P. maliformis*. Pers. l. c. Äpfeltragende Passionsblume. Auf St. Domingo, Martinique, Jamaica u. Cajenne. Jun. W. H. Ქ.

4. *P. quadrangularis*. Pers. l. c. Viereckige Passionsblume. In Wäldern v. Jamaica. Dec. Jän. u. Jun. Jul. VV. H. ♂.

5. *P. alata*. Pers. l. c. 2. p. 220. Geflügelte Passionsblume. In Westind. Jänn. — März. Jul. Aug. VV. H. ♂.

6. *P. perfoliata*. Pers. l. c. Durchstochene Passionsblume. In Südjamaica am Meeresstrande. Jun. — Aug. VV. H. ♂.

7. *P. rubra*. Pers. l. c. Rothe Passionsblume. In Jamaica, St. Domingo, Martinique u. Cajenne. Jun. Jul. VV. H. ♂.

8. *P. lunata*. Pers. l. c. Mondförmige Passionsblume. In Jamaica u. Mexico. Jun. Jul. VV. H. ♂.

9. *P. tuberosa*. Jacq. hort. schoenbr. 4. p. 49. t. 496. In Westind. Oct. Nov. VV. H. ♂.

10. *P. Vespertilio*? Pers. l. c. Fledermausartige Passionsblume. In Amer. Jun. Jul. VV. H. ♂.

11. *P. punctata*. Pers. l. c. 2. p. 221. Punktirte Passionsblume. In Peru. — . VV. H. ♂.

12. *P. lutea*. Pers. l. c. Gelbe Passionsblume. In Virgin. u. Jamaica. Jun. Jul. VV. H. ♀.

13. *P. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättrige Passionsblume. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. ♂. *P. heterophylla*. Ait. hort. kew. 3. p. 309.

14. *P. minima*. Pers. l. c. Kleinste Passionsblume. Zu Curassao. Jun. Jul. VV. H. ♂.

15. *P. suberosa*. Pers. l. c. Korkstämmige Passionsblume. Auf St. Domingo u. den Antillen. Jul. Aug. VV. H. ♂.

16. *P. peltata*. Pers. l. c. Schildblättrige Passionsblume. Auf den Antillen. Jul. Aug. W. H. ♂.

17. *P. glauca*. Pers. l. c. Grangrüne Passionsblume. Zu Cajenne. Jun. Jul. W. H. ♂.

18. *P. caracasana*. Willd. enum. 2. p. 697. Caracassch. Passionsblume. Zu Caracas. —. W. H. ♂.

19. *P. holosericea*. Pers. l. c. Sammetartige Passionsblume. Auf Veracruz. Jun. Jul. W. H. ♂.

20. *P. foetida*. Pers. l. c. 2. p. 222. Stinkende Passionsblume. Zu St. Domingo, Martinique u. Curassao. Jul. Aug. W. H. ♂.

21. *P. ciliata*. Pers. l. c. Gefranzte Passionsblume. Zu Jamaika. —. W. H. ♂.

22. *P. incarnata*. Pers. l. c. Fleischfarbige Passionsblume. In Virgin. Brasilien u. Peru. Jun. — Aug. K. H. ♂.

23. *P. coerulea*. Pers. l. c. Gemeine Passionsblume. In Brasilien. Jun. — Aug. K. H. ♂.

P. angustifolia. Mit schmäleren Blatteinschnitten.

P. pedata. Hortulan.

24. *P. Adiantum*. Willd. enum. 2. p. 698. Krullfarn-Passionsblume. —. Jul. W. H. ♂.

606. Erodium, Reiherschnabel.

1. *E. ciconium*. Pers. l. c. 2. p. 224. Langer Reiherschnabel. In Span. Ital. Montpellier u. im Walliserland. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *E. moschatum*. Pers. l. c. Bisamduftender Reiherschnabel. In Südeur. Sibir. der Barbarey, Brasilien, Peru u. am Cap. Jun. — Oct. Im F. ♂.

3. *E. hirtum*. Pers. l. c. Rauher Reiherschnabel. In Aegypt. Jun. Jul. Im F. ⊗.

4. *E. gruinum*. Pers. l. c. Candischer Reiherschnabel. In Candien, Nordafr. Ital. u. Span. Jun. — Aug. Im F. ⊗.

5. *E. hymenodes*. Pers. l. c. 2. p. 225. Dreytheiliger Reiherschnabel. In Felsenritzen des Berges Atlas. Jun. — Aug. K. H. 24.

E. trilobatum. Jacq. ic. rar. 3. t. 508. Collect. 4. p. 200.

6. *E. malacoides*. Pers. l. c. Malvenartiger Reiherschnabel. In Südeur. u. den Canarischen Ins. Jun. — Aug. Im F. ⊗.

7. *E. chamaedryoides*. Pers. l. c. Niedriger Reiherschnabel. Auf Minorca u. zu Corsica am St. Michaelsberge. Jun. — Sept. K. H. 5. Geranium Reichardi. Murr. n. comment. goett. 1780. p. 11. t. 3.

HEPTANDRIA.

607. Pelargonium, Kranichschnabel.

1. *P. astragalifolium*. Pers. l. c. 2. p. 227. Traganthblättriger Kranichschnabel. Ist sammt den meisten folgenden am Cap zu Hause. Jul. Aug. Ch. 24.

P. pinnatum. Ait. hort. kew. 2. p. 417.

2. *P. barbatum*. Pers. l. c. Bartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 24.

3. *P. melanthon*. Pers. l. c. Schwarzblüthiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 24.

4. *P. rapaceum*. Pers. l. c. 2.p. 228. Rübenartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 24.

— 260 —

5. *P. lobatum*. Pers. l. c. Lappiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

6. *P. apiifolium*. Jacq. eclog. fasc. 2. p. 45. t. 27. Epichblättriger Kranichschnabel. Am Cap? Jun. — Aug. Ch. \ddot{h} .

7. *P. triste*. Pers. l. c. Trauernder Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 2*f*.

8. *P. sanguineum*. Wendl. collect. pl. 2. p. 43. t. 53. Blutiger Kranichschnabel. Am Cap? Jun. Ch. \ddot{h} .

9. *P. flavum*. Pers. l. c. Gelber Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. 2*f*.

β. *daucoïdes*. Mit möhrenartigen Blättern.

10. *P. blattarium*. Pers. l. c. Königskerzenartiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

11. *P. tabulare*. Pers. l. c. 2. p. 229. Tafelbergs-Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. 2*f*.

12. *P. alchemilloides*. Pers. l. c. Löwenfußblättriger Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. 2*f*.

13. *P. odoratissimum*. Pers. l. c. Wohlriechender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

14. *P. fragrans*. Willd. hort. berol. 2. p. 77. t. 77. Duftender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. \ddot{h} .

15. *P. grossularioides*. Pers. l. c. Stachelbeerblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

16. *P. anceps*. Pers. l. c. Zweykantiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 2*f*.

17. *P. columbinum*. Pers. l. c. Tauben-Kranichschnabel. Jun. — Aug. Im F. \odot .

18. *P. tricolor.* Curt. bot. mag. 240. Dreyfarbiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. 24.
Pelarg. violarium. Pers. l. c.

19. *P. lacerum.* Pers. l. c. 2. p. 230. Schlitzblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 24.
β. longicaule. Mit höherem Wuchse.

20. *P. coriandrifolium.* Pers. l.c. Corianderblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. 24.

21. *P. glaucum.* Pers. l. c. Lanzethblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ½.

22. *P. diversifolium.* Pers. l. c. Verschiedenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ½.

23. *P. betulinum.* Pers. l. c. Birkenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ½.

24. *P. acetosum.* Pers. l. c. Saurer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ½.

25. *P. pumilum.* Willd. enum. 2. p. 704.
Niedriger Kranichschnabel. May — Aug. Ch. ½.

26. *P. stenopetalum.* Pers. l. c. Schmalblüthiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ½.

27. *P. hybridum.* Pers. l. c. Bastardartiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ½.

28. *P. malvaefolium.* Jacq. eclog. ined. Malvenblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ½.
β. lateritium. Mit ziegelrothen Blüthen.
Pelarg. lateritium. Willd. enum. suppl. p. 47.

29. *P. zonale.* Pers. l. c. 2. p. 231. Schwarz bemahlter Kranichschnabel. Jun. — Sept. Ch. ½.
β. marginatum. Mit bemahltm Blattrande.
γ. floribus albis. Mit weissen Blüthen.

30. *P. inquinans*. Pers. l. c. Beschmutzender Kranichschnabel. Jul. — Sept. Ch. ♂.

31. *P. heterogamum*. Pers. l. c. Rother Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

32. *P. monstrum*. Pers. l. c. Ungestalteter Kranichschnabel. — . Jun. — Aug. Ch. ♂.

33. *P. peltatum*. Pers. l. c. Schildblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

β. foliis aldo marginatis. Mit weissgeränderten Blättern.

34. *P. lateripes*. Pers. l. c. Seitenstieler Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

35. *P. tetragonum*. Pers. l. c. Vierkantiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

36. *P. cordatum*. Pers. l. c. Herzblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

37. *P. penicillatum*. Willd. hort. berol. 1.p. et t. 37. Büschlicher Kranichschnabel. — . Ch. ♂.

38. *P. conduplicatum*. Willd. enum. 2. p. 705. Doppeltgezähnter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

P. cordifolium. Hortulan.

39. *P. cucullatum*. Pers. l. c. Kappenförmiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

40. *P. Barringtonii*. Willd. enum. 2. p. 706. Barrington'scher Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

41. *P. angulosum*. Pers. l. c. Eckiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

42. *P. sidaefolium*. Willd. l. c. Sidablättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

43. *P. speciosum*. Willd. l. c. Schöner Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

44. *P. acerifolium*. Pers. l. c. Ahornblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

45. *P. beaufortianum*. Pers. l. c. Beaufortischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

46. *P. papilionaceum*. Pers. l. c. Schmetterlingartiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

47. *P. grandiflorum*. Pers. l. c. Großblüthiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

48. *P. Cotyledonis*. Pers. l. c. Nabelkrantartiger Kranichschnabel. Auf der Ins. St. Helena u. am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

49. *P. cuspidatum*. Willd. enum. suppl. p. 47. Zugespitzter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

50. *P. amplissimum*. Willd. l. c. p. 48. Anscheinlicher Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

51. *P. sororium*. Willd. l. c. Verschwisterter Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

52. *P. echinatum*. Pers. l. c. p. 232. Stachliger Kranichschnabel. Apr. May. Ch. ♂.
Pelarg. hamatum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 7. t. 138.

53. *P. australe*. Pers. l. c. Südlicher Kranichschnabel. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. ♂.

54. *P. vitifolium*. Pers. l. c. Weinblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

55. *P. capitatum*. Pers. l. c. Kopfförmiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

56. *P. glutinosum*. Pers. l. c. Klebriger Kranichschnabel. Jun. — Oct. Ch. ♂.

57. *P. hispidum*. Pers. l. c. Rispenblüthiger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

58. *P. tomentosum*. Pers. l. c. Filziger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

59. *P. ribifolium*. Pers. l. c. Johannisbeerblättriger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

60. *P. quercifolium*. Pers. l. c. Eichenblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

61. *P. balsameum*. Pers. l. c. Balsamischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

62. *P. delphinifolium*. Willd. enum. 2. p. 708. Ritterspornblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

63. *P. Radula*. Pers. l. c. Raspelblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

β. *roseum* Hortulan. Mit rosenduftenden Blättern.

64. *P. denticulatum*. Pers. l. c. Gezähnelter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

65. *P. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

66. *P. quinquevulnerum*. Pers. l. c. Fünfleckiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

67. *P. canariense*. Pers. l. c. Canarischer Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

68. *P. tricuspidatum*. Pers. l. c. 2. p. 233. Dreyspitziger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

69. *P. seabrum*. Pers. l. c. Scharfblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

70. *P. rigidum*. Pers. l. c. Steifblättriger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

71. *P. crispum*. Pers. l. c. Krauser Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

72. *P. hermannifolium*. Pers. l. c. Hermannienblättriger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

73. *P. gratum*. Willd. enum. 2. p. 710. Citronenduftender Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.
P. citriodorum. Hortulan.

74. *P. adulterinum*. Pers. l. c. Verschwägerter Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.

75. *P. semitrilobum*. Pers. l. c. Halbdreylappiger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

76. *P. tripartitum*. Pers. l. c. Dreytheiliger Kranichschnabel. Jul. Aug. Ch. ♂.
P. trifidum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 5. t. 133.

77. *P. fulgidum*. Pers. l. c. Schimmender Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

78. *P. gibbosum*. Pers. l. c. Höckeriger Kranichschnabel. Sept. Oct. Ch. ♂.

79. *P. extipulatum*. Pers. l. c. Nacktwinkliger Kranichschnabel. Jun. Jul. Ch. ♂.

89. *P. ternatum*. Pers. l. c. Gedreyter Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

91. *P. incisum*. Pers. l. c. Eingeschnittener Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

82. *P. carnosum*. Pers. l. c. Fleischiger Kranichschnabel. Jun. — Aug. Ch. ♂.

83. *P. crithmifolium*. Pers. l. c. 2. p. 234. Bacillenblättriger Kranichschnabel. Febr. März. Ch. ♂.

P. paniculatum. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 6. t. 137.

84. *P. hirtum*. Pers. l. c. Behaarter Kranichschnabel. März, Apr. Ch. ♂.

Nebst mehreren andern noch unbeschriebenen Arten.

DECANDRIA.

608. Geranium, Storzschnabel.

1. *G. sibiricum*. Pers. l. c. Sibirischer Storzschnabel. In Sibirien u. China. Jun. Jul. K. H. 24.

2. *G. sanguineum*. Pers. l. c. Bluthrother Storzschnabel. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *G. anemonifolium*. Pers. l. c. Anemonenblättriger Storzschnabel. Auf Madera. Jun. — Aug. K. H. ♂.

4. *G. macrorrhizum*. Pers. l. c. 2. p. 235. Langwurziger Storzschnabel. In Ital. u. Kärthen. May, Jun. Im F. 24.

5. *G. phaeum*. Pers. l. c. Rothbrauner Storzschnabel. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

6. *G. lividum*. Pers. l. c. Bläulicher Storchschnabel. In Oesterr. der Schweiz. u. Frankr. May, Jun. Im F. 2.

7. *G. reflexum*. Pers. l. c. Zurückgebogener Storchschnabel. In Ital. Jun. Jul. K. H. 2.

8. *G. striatum*. Pers. l. c. Gestreifter Storchschnabel. In Ital. Jun. Jul. K. H. 2.

9. *G. sylvaticum*. Pers. l. c. Wald - Storchschnabel. Auf Niederalpen an Quellen im nördlicher. Eur. Jun. — Aug. Im F. 2.

10. *G. pratense*. Pers. l. c. Wiesen - Storchschnabel. Auf Bergwiesen des nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

11. *G. canescens*. Pers. l. c. Grauer Storchschnabel. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 2.

12. *G. incanum*. Pers. l. c. Bestäubter Storchschnabel. Am Cap.-Jun. Jul. Ch. 2.

13. *G. pyrenaicum*. Pers. l. c. 2. p. 236. Pyrenäischer Storchschnabel. Auf Wiesen in Engl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. 2.

14. *G. umbrosum*. Pers. l. c. Schattenliebender Storchschnabel. In Oesterr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 2.

15. *G. divaricatum*. Pers. l. c. Ausgebreiter Storchschnabel. In Ungarn, Böhmen u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 2.

16. *G. lucidum*. Pers. l. c. Glänzender Storchschnabel. An schattigen Oertern in Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

609. Brownea, Brownea.

1. *Br. leucantha*. Jacq. fragm. bot. p. 26. n. 88. t. 20. et 21. Weifsblüthige Brownea. Zu Caracas? — . W. H. ḥ.

DODECANDRIA.

610. Guazuma, Guazuma.

1. *G. ulmifolia*. Pers. l. c. 2. p. 238. Rüsterblättrige Guazuma. Auf Südamericanischen Feldern. — . W. H. ḥ.

Bubroma Guazuma. Willd. sp. pl. 3. p. 1423.
Theobroma Guazuma. Lin. sp. pl. p. 1100.

611. Abroma, Abroma.

1. *A. augusta*. Pers. l. c. Prächtige Abroma. In Ostind. Aug. Sept. W. H. ḥ.

612. Monsonia, Monsonie.

1. *M. lobata*. Pers. l. c. Gelappte Monsonie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ḥ.

613. Helicteris, Schraubenbaum.

1. *H. jamaicensis*. Pers. l. c. Westindischer Schraubenbaum. Am Meerestrande zu Jamaica. Jun. Jul. W. H. ḥ.

2. *H. baruensis*. Pers. l. c. 2. p. 239. Baruensischer Schraubenbaum. Auf der Insel Baru u. zu Panama. — . W. H. ḥ.

614. Sterculia, Stinkbaum.

1. *St. Balanghas*. Pers. l. c. Eyförmiger Stinkbaum. In Ostind. — . W. H. ḥ.

2. *St. platanifolia*. Pers. l. c. 2. p. 240. Platanenblättriger Stinkbaum. In Japan u. China. —. Ch. ♂.

615. *Dombeya*, Dombeye.

1. *D. ferruginea*. Pers. l. c. Braune Dombeye. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. ♂.

2. *D. nivea*. Cat. hort. carlsruhan. p. 95. Weisse Dombeye. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♂.

616. *Pentapetes*, Pentapetes.

1. *P. phoenicea*. Pers. l. c. 2. p. 241. Scharlachrother Pentapetes. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♀.

POLYANDRIA.

617. *Carolinea*, Carolinea.

1. *C. insignis*. Pers. l. c. Ansehnliche Carolinea. In Südamer. zu Veracruz, u. den Inseln Tabago u. Martinique. —. W. H. ♂.

618. *Bombax*, Wollbaum.

1. *B. pentandrum*. Pers. l. c. Fünffädiger Wollbaum. In beyden Ind. —. W. H. ♂.

2. *B. Ceiba*. Pers. l. c. 2. p. 242. Starker Wollbaum. In Amer. —. W. H. ♂.

619. Sida, Side.

1. *S. carpinifolia*. Pers. l. c. Hainbuchenblättrige Side. Zu Madera u. den Canarischen Ins. Jun. — Aug. Ch. ♂.

2. *S. rhombifolia*. Pers. l. c. 2. p. 243. Rautenförmige Side. In Ostind. u. Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♂.

3. *S. mauritiana*. Pers. l. c. 2. p. 245. Flachsblüthige Side. Auf der St. Moritzinsel. Jul. Aug. W. H. ♂.

4. *S. Abutilon*. Pers. l. c. Gemeine Side. In beyd. Ind. der Schweiz u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ⊖.

5. *S. molissima*. Pers. l. c. Weichste Side. In Peruvianischen Wäldern. Jun. Jul. W. H. ♂.

6. *S. cordifolia*. Pers. l. c. 2. p. 246. Herzblättrige Side. In Ostind. u. am Cap. Jun. Jul. W. H. ⊖.

7. *S. umbellata*. Pers. l. c. Doldenblüthige Side. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♂.

8. *S. vesicaria*. Pers. l. c. 2. p. 247. Aufblasene Side. In Mexico. Apr. — Aug. W. H. ♂.

9. *S. gigantea*. Pers. l. c. Riesenartige Side. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♂.

10. *S. hastata*. Pers. l. c. Spontonblättrige Side. An feuchten Stellen zu Lima u. Mexico. May — Aug. Im F. ⊖.

11. *S. parviflora*. Pers. l. c. Kleinblüthige Side. In Mexico. Jun. — Aug. W. H. ⊖.

12. *S. triloba*. Pers. l. c. Dreylappige Side. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

13. *S. Napaea*. Cavan. diss. 5. p. 277. t. 132.
f. 1. Virginische Side. In Virgin. Jun. Jul. Im
F. 2.

Napaea laevis. Pers. l. c. 2. p. 242.

620. Malachra, Malachre.

1. *M. alceaefolia*. Pers. l. c. 2. p. 248. Stock-
malvenblättrige Malachre. Zu Caracas. Aug. VV.
H. ⊖.

621. Althaea, Eibisch.

1. *A. officinalis*. Pers. l. c. Gemeiner Eibisch.
In Ungarn, Holland, Engl. Frankr. Sibirien. Jun.
— Aug. Im F. 2.

2. *A. cannabina*. Pers. l. c. 2. p. 249. Hanf-
blättriger Eibisch. An Waldrändern in Oesterr.
Ungarn, Languedoc. u. Ital. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *A. rosea*. Pers. l. c. Stockrosen-Eibisch.
Im Orient. Jun. — Aug. Im F. 2.
Alcea rosea. Lin. sp. pl. p. 966.

4. *A. pallida*. Pers. l. c. Blaslblüthiger Ei-
bisch. In Ungarn. Jul. Aug. Im F. ♂.
Alcea pallida. Waldst. et Kitaib. 1. p. 46. t. 47.

622. Malva, Malve.

1. *M. scabra*. Pers. l. c. 2. p. 250. Scharfästi-
ge Malve. In Peru. Jun. Jul. Ch. ♂.

2. *M. peruviana*. Pers. l. c. Peruvianische
Malve. In Peru. Jun. Im F. ⊖.

3. *M. umbellata*. Pers. l. c. Doldenblüthige Mal-
ve. In Mexico. — . VV. H. ♂.

4. *M. abutiloides*. Pers. l. c. Sidenartige Mal-
ve. Auf den Bahamainseln. Jun. Jul. VV. H. ♂.

5. *M. lactea*. Pers. l. c. Milchweisse Malve. In Mexico. Jul. Aug. Ch. ♂.

6. *M. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechende Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ♂.

7. *M. capensis*. Pers. l. c. Capische Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ♂.

8. *M. virgata*. Pers. l. c. Ruthenförmige Malve. Am Cap. Jul. — Oct. Ch. ♂.

9. *M. miniata*. Pers. l. c. 2. p. 251. Menigrothe Malve. In Mexico? Jun. — Aug. Ch. ♂.

10. *M. asperima*. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 7. t. 139. Rauhe Malye. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

11. *M. nicaeensis*. Pers. l. c. Nicäensische Malve. In Ital. Jun. Jul. Im F. ♂.

12. *M. mauritiana*. Pers. l. c. Mauritanische Malve. In Ital. Portug. u. Span. Jun. Jul. Im F. ♂.

13. *M. crispa*. Pers. l. c. Krausblättrige Malve. In Syrien. Jun. Jul. Im F. ♂.

14. *M. Alcea*. Pers. l. c. 2. p. 252. Schlitzblättrige Malve. In Ungarn, Deutschl. Engl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♀.

623. Lavatera, Lavatere.

1. *L. arborea*. Pers. l. c. Baumartige Lavatera. In Ital. Engl. Span. u. Nordafr. Jun. Jul. K. H. ♂.

2. *L. micans*. Pers. l. c. Schimmernde Lavatera. In Span. u. Portug. Jun. Jul. K. H. ♂.

3. *L. Olbia*. Pers. l. c. Olbische Lavatere. Auf der Insel Olbia. Jun. Jul. K. H. ♂.

4. *L. unguiculata*. Pers. l. c. Langnägelige Lavatere. —. Jul. Aug. K. H. ♂.

5. *L. hispida*. Pers. l. c. Büschelhaarige Lavatere. In Nordafr. Jun. — Aug. K. H. ♂.

6. *L. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Lavatere. Am Meerstrande in Span. u. Frankr. Jun. Jul. K. H. ♂.

7. *L. thuringiaca*. Pers. l. c. Thüringische Lavatere. In Oesterr. Ungarn, Thüringen u. Schweden. Jul. Aug. Im F. ♀.

8. *L. cretica*. Pers. l. c. Candische Lavatere. In Candien. Jun. Jul. Im F. ○.

9. *L. trimestris*. Pers. l. c. 2. p. 253. Garten-Lavatere. In Syrien, Span. u. der Provence. Jun. Jul. Im F. ○.

624. Ruizia, Ruizie.

1. *R. variabilis*. Pers. l. c. Veränderliche Ruizie. Auf der Insel Bourbon. Jun. Jul. W, H. ♂.

625. Kitaibelia, Kitaibelie.

1. *K. vitifolia*. Pers. l. c. Weinblättrige Kitaibelie. In der Syrmier Gespannschaft in Slavonien. Apr. — Jun. Im F. ♀.

626. Urena, Urene.

1. *U. lobata*. Pers. l. c. Lappige Urene. In China. Jul. Aug. Ch. ♂.

627. *Gossypium*, Baumwolle.

1. *G. herbaceum*. Pers. l. c. 2. p. 254. Krautartige Baumwolle. In Ostind. Syrien u. Africa. Jun. Jul. W. H. ♂.

2. *G. religiosum*. Pers. l. c. Gelbe Baumwolle. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

3. *G. barbadense*. Pers. l. c. Westindische Baumwolle. In Barbados. Jun. Jul. W. H. ♂.

628. *Hibiscus*, Hibiscus.

1. *H. Moscheutos*. Pers. l. c. Blattstiellüthiger Hibiscus. In Canada u. Virgin. Jul. Aug. K. H. ♀.

2. *H. heterophyllus*. Pers. l. c. Neuholländischer Hibiscus. In Neuholl. Apr. May. Ch. ♂.

3. *H. palustris*. Pers. l. c. Sumpf-Hibiscus. In Virgin. u. Canada. May — Jul. Im F. ♀.

4. *H. populneus*. Pers. l. c. 2. p. 255. Papelblättriger Hibiscus. In Ostind. u. den Freundschaftsinseln. Jun. Jul. W. H. ♂.

5. *H. tiliaceus*. Pers. l. c. Lindenblättriger Hibiscus. An Bächen in Ostind. —. W. H. ♂.

6. *H. abutiloides*. Willd. enum. 2. p. 736. Großblättriger Hibiscus. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♂.

7. *H. Lampus*. Pers. l. c. Philippinischer Hibiscus. Auf den Philippinischen Inseln. Jul. Aug. W. H. ♂.

8. *H. Rosa-sinensis*. Pers. l. c. Rosenartiger Hibiscus. In Ostind. May — Sept. VV. H. ♂.

β. floribus plenis rhabris. Mit rothgefüllten Blüthen.

γ. floribus plenis rubro flavescentibus. Mit rothgelbgefüllten Blüthen.

9. *H. phoeniceus*. Pers. l. c. Schönrother Hibiscus. In Ostind. Jul. VV. H. ♂.

10. *H. mutabilis*. Pers. l. c. 2. p. 256. Veränderlicher Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

11. *H. syriacus*. Pers. l. c. Syrischer Hibiscus. In Südeur. u. Syrien. Aug. Sept. Im F. ♂.

β. floribus albis plenis. Mit weissgefüllten Blüthen.

12. *H. acerifolius*? Hoocker in parad. londin. n. 33. Ahornblättriger Hibiscus. Das Vaterland ist unbekannt, cultivirt findet man ihn in China. Jun. Jul. VV. H. ♂.

13. *H. Sabdariffa*. Pers. l. c. Dreytheiliger Hibiscus. In beyden Indien. Jul. Aug. VV. H. ♂.

14. *H. diversifolius*. Pers. l. c. Verschiedenblättriger Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.
H. ferculneus. Cavan. diss. 3. p. 148. t. 51. f. 2.

15. *H. speciosus*. Pers. l. c. Ansehnlicher Hibiscus. In Südcarolina. Jun. Jul. VV. H. ♀.

16. *H. cannabinus*. Pers. l. c. Hanfartiger Hibiscus. In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

17. *H. Manihot*. Pers. l. c. 2. p. 257. Schweißelfarbiger Hibiscus. In beyden Ind. Jul. Aug. VV. H. ♂.

18. *H. Abelmoschus.* Pers. l. c. Bisam-Hibiscus. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. ♂.

19. *H. esculentus.* Pers. l. c. Esbacher Hibiscus. In beyden Indien. Jun. Jul. W. H. ♂.

20. *H. vesicarius.* Pers. l. c. 2. p. 258. Aufgeblasener Hibiscus. In Africa. Jun. Jul. Im F. ♂.

21. *H. Trionum.* Pers. l. c. Stunden-Hibiscus. In Krain, Ital. u. Africa. Jun. Jul. Im F. ♂.

629. Pavonia, Pavonie.

1. *P. praemorsa.* Willd. sp. pl. 3. p. 833. Abgebissene Pavonie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.
P. cuneifolia. Pers. l. c.

2. *P. spinifex.* Pers. l. c. Vielstachlige Pavonie. In Südamer. May, Jun. W. H. ♂.

3. *P. Columella.* Pers. l. c. 2. p. 259. Fünfeckige Pavonie. Auf der Insel Bourbon. Jul. Aug. W. H. ♂.

630. Achania, Tuttenmalve.

1. *A. Malvaviscus.* Pers. l. c. Baumartige Tuttenmalve. Auf Kalkfelsen in Jamaica u. Mexico. Jun. Jul. W. H. ♂.

2. *A. mollis.* Pers. l. c. Weiche Tuttenmalve. In Amer. Jul. — Sept. W. H. ♂.

631. Lagunea, Lagunea.

1. *L. Patersonia.* Pers. l. c. Patersonische Lagunea. Auf der Insel Nordfolk. Jul. Aug. Ch. ♂.
Hibiscus Patersonius. Andrews bot. repos. t. 286.

632. *Camellia*, Camellie.

1. *C. japonica*. Pers. l. c. 2. p. 260. Japanische Camellie. In Japan u. China. Jun. Jul. Ch. Ȑ.
2. *floribus rubris plenis*. Mit rothgefüllten Blüthen.
3. *floribus albis* — · Mit weifsgefüllten Blüthen
4. *floribus variegatis*. Mit bunten Blüthen.

633. *Inga*, Inge.

1. *I. dulcis*. Willd. sp. pl. 4. p. 1005. Süsser Inge. Auf den Philippinischen Inseln u. zu Coronadel. — . VV. H. Ȑ.
Mimosa dulcis. Pers. l. c. 2. p. 262.

2. *I. Unguis-cati*. Willd. l. c. 4. p. 1006. Katzenklauen - Inge. In Jamaica u. den Caraibischen Inseln. Jun. Jul. VV. H. Ȑ.
M. Unguis Cati. Pers. l. c.

3. *I. foetida*. Willd. l. c. 4. p. 1008. Stinkende Inge. In Westind. Jun. Jul. VV. H. Ȑ.
M. foetida. Pers. l. c.

4. *I. alba*. Willd. l. c. 4. p. 1013. Weisse Inge. Zu Cajenne. Jun. — Sept. VV. H. Ȑ.
M. alba. Pers. l. c. 2. p. 261.

5. *I. latifolia*. Willd. l. c. 4. p. 1020. Breitblättrige Inge. In Westind. — . VV. H. Ȑ.
M. latifolia. Pers. l. c. 2. p. 262.

6. *I. Saman*. Willd. l. c. 4. p. 1024. Saman-Inge. Zu Caracas. — . VV. H. Ȑ.
M. Saman Jacq. fragm. bot. p. 5. t. 6.

634. Mimosa, Sinnpflanze.

1. *M. sensitiva*. Pers. l. c. 2. p. 262. Empfindliche Sinnpflanze. In Brasilien. Jul. — Sept. VV. H. ♂.

2. *M. pudica*. Pers. l. c. Gemeine Sinnpflanze. In Brasilien. Jul. Aug. VV. H. ♂.

635. Desmanthus, Büschelzopf.

1. *D. plenus*. Willd. sp. pl. 4. p. 1045. Gefüllter Büschelzopf. Auf Veracruz. Jul. Aug. VV. H. ♂.

Mimosa plena. Pers. l. c. 2. p. 263.

2. *D. virgatus*. Willd. l. c. 4. p. 11047. Rutenförmiger Büschelzopf. In Ostind. Jan. — Aug. VV. H. ♂.

M. virgata. Pers. l. c.

636. Acacia, Acacie.

1. *A. verticillata*. Willd. sp. pl. 4. p. 1049. Wirtelblättrige Acacie. In Neuholl. Jän. — März. Ch. ♂.

Mimosa verticillata. Pers. l. c. 2. p. 261.

2. *A. juniperina*. Willd. l. c. Wachholderblättrige Acacie. In Neuholl. Jän. — März. Ch. ♂.
M. juniperina. Pers. l. c.

3. *A. suaveolens*. Willd. l. c. 4. p. 1050. Wohlriechende Acacie. In Neuholl. — Ch. ♂.
M. suaveolens. Smith act. societ. lin. lond. 1.p.253.

4. *A. floribunda*. Willd. l. c. 4. p. 1051. Vielblumige Acacie. In Neuholl. März, Apr. Ch. ♂.
M. floribunda. Pers. l. c.

5. *A. dodonaeifolia*. Decand. cat. hort. bot. monspel. p. 1. Klebrige Acacie. In Neuhol. — . Ch. ♂.

M. Dodonaeifol. Pers. l. c.

6. *A. stricta*. Willd. I. c. 4. p. 1052. Steife Acacie. In Neuhol. — . Ch. ♂.

M. stricta. Pers. l. c.

7. *A. longifolia*. Willd. I. c. Langblättrige Acacie. In Neuhol. März — May. Ch. ♂.

M. longif. Pers. l. c.

8. *A. falcata*. Willd. I. c. 4. p. 1053. Sichelblättrige Acacie. In Neuhol. — . Ch. ♂.

M. ogliuia? Pers. l. c.

9. *A. paradoxa*. Decand. cat. hort. bot. monsp. p. 1. Wunderbare Acacie. In Neuhol. — . Ch. ♂.

Mimosa parad. Hortulan.

10. *A. heterophylla*. Willd. I. c. 4. p. 1054. Verschiedenblättrige Acacie. Auf der St. Moritzinsel. — . Ch. ♂.

M. heteroph. Pers. l. c.

11. *A. diptera*. Humboldt et Bonpland. Willd. enum. 2. p. 1051. Zweygetheilte Acacie. In Südamer. — . W. H. ♂

12. *A. Julibrissin*. Willd. sp. pl. 4. p. 1065. Orientalische Acacie. Im Orient. — . W. H. ♂.

M. Jullibrissin. Pers. l. c. 2. p. 264.

M. arborea. Hortulan.

13. *A. speciosa*. Willd. I. c. 4. p. 1066. Ansehnliche Acacie. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♂.

M. speciosa. Pers. l. c.

14. *A. caracasana*. Willd. l. c. 4. p. 1068.
Caracasanische Acacie. Zu Caracas. Jul. Aug. VV.
H. ♂.
M. caracas. Pers. l. c.
15. *A. portoricensis*. Willd. l. c. 4. p. 1069.
Portorico'sche Acacie. Auf der Insel Portorico.
—. VV. H. ♂.
M. portoric. Pers. l. c.
16. *A. divaricata*. Willd. l. c. 4. p. 1070.
Ausgebreitete Acacie. In VWestind. —. VV. H. ♂.
M. divaric. Pers. l. c.
17. *A. lophantha*. Willd. l. c. Büschelblü-
thige Acacie. In Neuhol. März. Apr. Ch. ♂.
M. lophantha. Pers. l. c.
18. *A. filicina*. Willd. l. c. 4. p. 1072. Far-
renkrautartige Acacie. In Mexico. —. VV. H. ♂.
A. filicoides. Pers. l. c. 2. p. 264.
19. *A. grandiflora*. Willd. l. c. 4. p. 1074.
Grossblumige Acacie. In Ostindien. —. VV. H. ♂.
M. grandiflora. Pers. l. c. 2. p. 263.
20. *A. glauca*. Willd. l. c. 4. p. 1075. Ei-
sengraue Acacie. Im wärmer. Amer. Jun. — Sept.
VV. H. ♂.
M. glauca. Pers. l. c. 2. p. 265.
21. *A. cornigera*. Willd. l. c. 4. p. 1080.
Hörnertragende Acacie. In Mexico u. Cuba. —.
W. H. ♂.
M. cornig. Pers. l. c.
22. *A. eburnea*. Willd. l. c. 4. p. 1081. El-
fenbeinerne Acacie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.
M. eburnea. Pers. l. c.

23. *A. horrida*. Willd. l. c. 4. p. 1082. Stark-dornige Acacie. In Africa. Jun. — Aug. W. H. h. M. horrida. Pers. l. c. M. leucacantha. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 75 t. 393.

24. *A. tortuosa*. Willd. l. c. 4. p. 1083. Gedrehte Acacie. Auf Sandfeldern in Jamaica. Jun. — Sept. W. H. h. M. tortuosa. Pers. l. c.

25. *A. farnesiana*. Willd. l. c. Farnesische Acacie. In St. Domingo. Jun. — Sept. W. H. h. M. farnesiana. Pers. l. c.

26. *A. vera*. Willd. l. c. 4. p. 1085. Aechte Acacie. In Aegypten. — W. H. h. M. nilotica. Pers. l. c.

27. *A. acanthocarpa*. Willd. enum. 2. p. 1057. Stachelfrüchtige Acacie. — — W. H. h. M. aculeaticarpa. Pers. l. c. 2. p. 266.

28. *A. pennata*. Willd. sp. pl. 4. p. 1090. Federförmige Acacie. Auf Ceylon. — W. H. h. M. pennata. Pers. l. c.

29. *A. tamarindifolia*. Willd. l. c. 4. p. 1092. Tamarindenblättrige Acacie. Zu Martinique u. Caracas. Jul. Aug. W. H. h. M. tamarindifolia. Pers. l. c. 2. p. 267.

30. *A? quadrangularis*. Cujus? Aus dem jardin des plantes von Paris.

31. *A? undulata*. Cujus? Aus dem jardin des plantes von Paris.

32. *A?* Aus dem Fürstlich Esterhazyschen Garten von Eisenstadt.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

637. *Corydalis*, Helmblume.

1. *C. nobilis*. Pers. l. c. 2. p. 269. Schöne Helmblume. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.
Fumaria nobilis. Lin. syst. veg. p. 529.

2. *C. bulbosa*. Pers. l. c. Knollige Helmblume. In Eur. Sibirien u. Kamtschatka. May — Jul. Im F. 24.
Fumaria bulbosa. Lin. mat. med. 168.

3. *C. Capnoides*. Pers. l. c. 2. p. 270. Weisse Helmblume. In der Schweiz, Frankr. Ital. u. Krain. May, Jun. Im F. 24.
Fumaria Capnoides. Lin. sp. pl. p. 984.

OCTANDRIA.

638. *Polygala*, Polygale.

1. *P. myrtifolia*. Pers. l. c. 2. p. 273. Myrtenblättrige Polygale. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

2. *P. spinosa*. Pers. l. c. Stachlige Polygale. Am Cap. Jun. Ch. 5.

3. *P. Chamaebuxus*. Pers. l. c. Oesterreichische Polygale. Auf Bergen in Oesterr. Deutschl. u. der Schweiz. Apr. May. Im F. 5.

DECANDRIA.

639. Nissolia, Nissolie.

1. *N. fruticosa*. Pers. l. c. 2. p. 276. Strauchartige Nissolie. In Wäldern zu Carthagena in Amer. Jul. W. H. ♂.

640. Erythrina, Corallenbaum.

1. *E. herbacea*. Pers. l. c. 2. p. 279. Krautartiger Corallenbaum. In Carolina u. Florida. Jun-Ch. 24.

2. *E. Corallodendrum*. Pers. l. c. Gemeiner Corallenbaum. Auf den Antillen. Jun-Jul. W. H. ♂.

3. *E. velutina*. Pers. l. c. Sammtartiger Corallenbaum. Zu Terra firma. —. W. H. ♂.

4. *E. mitis*. Pers. l. c. Wehrloser Corallenbaum. Zu Caracas. May. W. H. ♂.

5. Eine noch unbeschriebene Art aus dem jardin des plantes von Paris.

641. Rafnia, Rafnie.

1. *R. retusa*. Pers. l. c. 2. p. 280. Zurückgebogene Rafnie. In Neuholl. —. Ch. ♂.

642. Crotalaria, Klapperschote.

1. *Cr. verrucosa*. Pers. l. c. 2. p. 284. Vierkantige Klapperschote. Zu Malabar, Zeylon, Java u. den Philippinischen Inseln. Jun. Jul. W. H. ⊖.

2. *Cr. incanescens*. Ait. hort. kew. 3. p. 20. Grau-ästige Klapperschote. Am Cap, auf der St. Moritz- u. Bourboninsel. Jun. — Oct. Ch. ♂.

C. arborescens. Pers. l. c. 2. p. 285.

3. *Cr. purpurascens*. Pers. l. c. Purpurrothe Klapperschote. Auf den Inseln Madagascar u. St. Moritz. Jun. — Aug. W. H. ♂.

643. *Spartium*, Pfriemen.

1. *Sp. junceum*. Pers. l. c. 2. p. 286. Binsenartige Pfriemen. In Südeur. May, Jun. Im F. ♂.

2. *Sp. sphaerocarpon*. Pers. l. c. Rundfrüchtige Pfriemen. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ♂.

3. *Sp. cinereum*. Pers. l. c. Graue Pfriemen. Zu Dauphine. May — Jul. Im F. ♂.

4. *Sp. Scorpius*. Pers. l. c. Dornige Pfriemen. In Spanien u. Languedoc. May — Jul. K. H. ♂.

5. *Sp. linifolium*. Pers. l. c. 2. p. 287. Flachsblättrige Pfriemen. In Südfrankr. Spanien, der Barbarey u. dem Orient. May — Jul. K. H. ♂. *Genista linifolia*. Lin. sp. pl. p. 405.

6. *Sp. scoparium*. Pers. l. c. Gemeine Pfriemen. In Deutschl. der Schweiz u. in Frankr. Jun. Jul. Im F. ♂.

7. *Sp. radiatum*. Pers. l. c. Gestrahlte Pfriemen. In Krain, Ital. u. Carolina. Jun. Jul. Im F. ♂.

8. *Sp. ferox*. Pers. l. c. Wilde Pfriemen. In der Barbarey. März, Apr. K. H. ♂.

9. *Sp. spinosum*. Pers. l. c. Starkdornige Pfriemen. In Span. Ital. u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. ♂.

644. Genista, Ginster.

1. *G. candicans*. Pers. l. c. Weißlicher Ginster. In Ital. u. Montpeliter. Jul. Aug. K. H. ♂.
2. *G. sagittalis*. Pers. l. c. Geflügelter Ginster. In dünnen Waldgegenden v. Oesterr. Deutschl. u. Frankreich. Jun. Im F. ♂.
3. *G. tinctoria*. Pers. l. c. Färbender Ginster. In Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. ♂.
4. *G. sibirica*. Pers. l. c. 2. p. 288. Sibirischer Ginster. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♂.
5. *G. florida*. Pers. l. c. Vielblühender Ginster. In Spanien. Jun. — Aug. K. H. ♂.
6. *G. pilosa*. Pers. l. c. Haariger Ginster. In Deutschl. u. Languedoc auf sonnigen Bergen. May. Jun. Im F. ♂.
7. *G. anglica*. Pers. l. c. Englischer Ginster. In Wäldern v. Deutschl. u. England. Jun. Jul. Im F. ♂.
8. *G. germanica*. Pers. l. c. Deutscher Ginster. In Wäldern v. Deutschl. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♂.

645. Ulex, Hecksame.

1. *U. europaeus*. Pers. l. c. 2. p. 289. Europäischer Hecksame. In Deutschl. England, Frankr. Dänemark u. Brabant. May, Jun. K. H. ♂.

646. Ononis, Hauhechel.

1. *O. fruticosa*. Pers. l.c 2. p. 292. Strauchartige Hauhechel. In der Dauphine. Jun. Jul. K. H. ♂.

647. Anthyllis, Wollblume.

1. *A. tetraphylla*. Pers. l. c. Vierblättrige Wollblume. In Ital. u. Sicilien. Jun. Jul. Im F. ⊖.

2. *A. Vulneraria*. Pers. l. c. Gemeine Wollblume. Auf Wiesen im Mitteuer. May, Jun. Im F. 24.

3. *A. montana*. Pers. l. c. Berg-Wollblume. In Oesterr. Krain, der Schweiz, Languedoc u. der Provence. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *A. Barba Jovis*. Pers. l. c. 2. p. 293. Silberblättrige Wollblume. In Italien, Span. u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♂.

5. *A. Hermanniae*. Pers. l. c. Flachsblättrige Wollblume. In Griechenland, Candien u. Palästina Jun. Jul. K. H. ♂.

648. Lupinus, Feigbohne.

1. *L. varius*. Pers. l. c. 2. p. 294. Bunte Feigbohne. Zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. ⊖.

2. *L. hirsutus*. Pers. l. c. Rauhe Feigbohne. In der Barbarey, den Archipelagischen Inseln u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ⊖.

3. *L. luteus*. Pers. l. c. Gelbe Feigbohne. In Sicilien. May — Jul. Im F. ⊖.

4. *L. arboreus*. Pers. l. c. Baumartige Feigbohne. Jun. Jul. Ch. ♂.

649. Amorpha, Unform.

1. *A. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Unform. In Carolina. Jul. Im F. ♂.

2. *A. pubescens*. Pers. l. c. Haarige Uniform.
In Carolina. Jul. Im F. ♀.

650. Abrus, Paternostererbse.

1. *A. precatorius*. Pers. l. c. 2. p. 295. Ge-
meine Paternostererbse. In Ostind. Jun. Jul. W.
H. ♂.

651. Dolichos, Faseln.

1. *D. Lablab*. Pers. l. c. 2. p. 296. Aegyp-
tische Faseln. In Aegypten u. Ostind. Jul. Aug.
Im F. ☽.

2. *D. sinensis*. Pers. l. c. Chinesische Fä-
seln. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ☽.

3. *D. lignosus*. Pers. l. c. 2. p. 298. Holzi-
ge Faseln. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

652. Glycine, Glycine.

1. *Gl. clandestina*. Pers. l. c. 2. p. 299.
Heimlichblühende Glycine. In Neuhol. Jul. Aug.
Ch. ♂.

2. *Gl. precatoria*. Willd. enum. 2. p. 755.
Paternosterartige Glycine. Im wärmer. Amer.
Jun. Jul. W. H. ♂.
Gl. tomentosa. Hortulan.

3. *Gl. caribaea*. Pers. l. c. 2. p. 301. Cara-
bische Glycine. Auf den Caraibischen Inseln.
Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *Gl. rubicunda*. Curt. bot. mag. 268. Dun-
kelrothe Glycine. In Neuhol. Jul. Aug. Ch. ♂.
Kennedia rubicunda. Pers. l. c. 2. p. 302.

5. *Gl. coccinea*. Curt. bot. mag. 270. Scharlachrothe Glycine. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. 5.
Kennedia coccinea. Pers. l. c.

6. *Gl. Apios*. Pers. l. c. 2. p. 301. Knollige Glycine. In Virgin. Aug. Im F. 24.

7. *Gl. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Glycine. In Carolina. Aug. Im F. 5.

8. *Gl. bimaculata*. Curt. bot. mag. 263. Zweifleckige Glycine. In Neuholl. Jun. — Aug. Ch. 5.
Kennedia monophylla. Pers. l. c. 2. p. 302.

653. Orobus, Walderbse.

1. *O. lathyroides*. Pers. l. c. 2. p. 303. Sibirische Walderbse. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *O. vernus*. Pers. l. c. Frühlings-Walderbse. In Hainen des nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *O. albus*. Pers. l. c. Weisse Walderbse. In Oesterr. Ungarn u. Sibirien. Jun. — Aug. Im F. 24.

654. Lathyrus, Platterbse.

1. *L. odoratus*. Pers. l. c. 2. p. 304. Wohlriechende Platterbse. In Sicilien u. Ceylon. Jun. Jul. Im F. 0.

2. *L. tingitanus*. Pers. l. c. Africanische Platterbse. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. Im F. 0.

3. *L. tuberosus*. Pers. l. c. 2. p. 305. Knollige Platterbse. In Deutschl. u. der Schweiz. May, Jun. Im F. 24.

4. *L. latifolius*. Pers. l. c. Breitblättrige Platterbse. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

5. *L. heterophyllus*. Pers. l. c. Verschiedenblättrige Platterbse. Am Fusse der Berge in Eur. Jun. — Aug. Im F. ♀.

655. *Cytisus*, Bohnenbaum.

1. *C. Laburnum*. Pers. l. c. 2. p. 309. Gemeiner Bohnenbaum. In der Schweiz, Savoyen u. Frankr. May, Jun. Im F. ♂.

2. *C. alpinus*. Willd. enum. 2. p. 767. Alpen-Bohnenbaum. In Schottland, Savoyen u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. ♂.

Cytis. Laburnum β *latifolium*. Pers. l. c.

3. *C. nigricans*. Pers. l. c. Schwärzlicher Bohnenbaum. In Oesterr. Ungarn, Böhmen u. Deutschl. Jun. Jul. Im F. ♂.

4. *C. sessilifolius*. Pers. l. c. 2. p. 310. Italienischer Bohnenbaum. In Italien u. der Provence. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *C. wolgaricus*. Pers. l. c. Wolgarischer Bohnenbaum. Auf trockenen Hügeln an der Wolga. Jun. Jul. Im F. ♂.

6. *C. Cajan*. Pers. l. c. Indischer Bohnenbaum. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ♂.

7. *C. capitatus*. Pers. l. c. Kopfförmiger Bohnenbaum. In Oesterr. Sicil. u. der Provence. Jun. Jul. Im F. ♂.

8. *C. austriacus*. Pers. l. c. Oesterreichischer Bohnenbaum. In Oesterr. Ital. u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♂.

9. *C. purpureus*. Pers. l. c. Purpurrother Bohnenbaum. In Krain, Kroatien u. Friuli auf sonnigen Höhen. Jun. Jul. Im F. ♂.

10. *C. elongatus*. Waldst. et Kitaib. pl. rar.
hung. 2. p. 200. t. 183. Banatischer Bohnenbaum.
In Wäldern der Beregher Gespannschaft u. im
Banat. Apr. May. Im F. ♂.

11. *C. supinus*. Pers. l. c. Niedriger Bohnen-
baum. Auf sonnigen Hügeln in Oesterr. Ungarn
u. Sibirien. Jul. Im F. ♂.

12. *C. biflorus*. Pers. l. c. Zweyblumiger Boh-
nenbaum. In Ungarn. Apr. May. Im F. ♂.

656. *Robinia*, Robinie.

1. *R. Pseudacacia*. Pers. l. c. 2. p. 311. Gemeine
Robinie. (Acacie). In Nordamer. May, Jun. Im F. ♂.

2. *R. inermis*. Mit stachellosen Aesten.

2. *R. umbraculifera*. Dumont Cours. le bot.
cultiv. 6. p. 140. Schattenbringende Robinie. — .
— . Im F. ♂.

3. *R. viscosa*. Pers. l. c. Klebrige Robinie.
Auf den höchsten Bergen in Südcarolina. Jun.
Im F. ♂.

4. *R. hispida*. Pers. l. c. Borstige Robinie.
In Carolina, Florida, Virgin. u. Pensylvan. Jun.
Jul. Im F. ♂.

5. *R. Caragana*. Pers. l. c. 2. p. 312. Sibi-
rische Robinie. In Sibirien. May, Jun. Im F. ♂.

6. *R. Altagana*. Pers. l. c. Sand-Robinie.
Auf sandigem Boden in Davurien. — . Im F. ♂.

7. *R. jubata*. Pers. l. c. Mähnenartige Robi-
nie. In Sibirien am See Baical. — . Im F. ♂.

8. *R. spinosa*. Pers. l. c. Dornige Robinie.
In Sibirien. Jun. Jul. Im F. ♂.

9. *R. Halodendron*. Pers. l. c. Graue Robinie. In Sibirien. May. Im F. ♂.

10. *R. Chamlagu*. Pers. l. c. Glänzende Robinie. In China. —. Ch. ♂.

11. *R. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Robinie. In Sibirien u. der Tartarey. May, Jun. Im F. ♂.

12. *R. pygmaea*. Pers. l. c. Niedrige Robinie. In Sibirien. May, Jun. Im F. ♂.

13. *R. sophorifolia*. Cujus? Stammt aus Französischen Baumschulen.

657. Colutea, Blasenstrauch.

1. *C. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiger Blasenstrauch. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ♂.

2. *C. cruenta*. Ait. hort. kew. 3. p. 55. Rother Blasenstrauch. In Süddeutschl., Ital. Taurien u. im Orient. Jun. Im F. ♂.
C. orientalis. Pers. l. c.

3. *C. Pocockii*. Pers. l. c. Aleppischer Blasenstrauch. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ♂.
C. halepica. Lam. encycl. 1. p. 349.

4. *C. frutescens*. Pers. l. c. Grauer Blasenstrauch. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

5. *C. herbacea*. Pers. l. c. 2. p. 313. Krautartiger Blasenstrauch. Am Cap. Jun. — Aug. Im F. ♂.

658. Glycyrrhiza, Süßholz.

1. *Gl. echinata*. Pers. l. c. Stachliges Süßholz. In Ungarn an der Theiss, Apulien auf dem Berge Gargano u. der Tartarey. Jul. Im F. 24.

2. *Gl. foetida*. Pers. l. c. Stinkendes Süßholz. Auf dem Berge Atlas u. den Heiden bey Mayenne. in Frankr. Jul. Im F. 2.

3. *Gl. glabra*. Lin. sp. pl. p. 1046. Gemeines Süßholz. In Frankr. Ital. u. Spanien. Jul. Im F. 2. *Liquiritia officinalis*. Pers. l. c.

659. Coronilla, Peitschen.

1. *C. aculeata*. Willd. sp. pl. 3. p. 1147. Stachlige Peitschen. Auf Ceylon u. Malabar. Jun. VV. H. ♂.

Seshania aculeata. Pers. l. c. 2. p. 316.

Aeschynomene bispinosa. Jacq. ic. rar. 3. t. 564.

2. *C. Emerus*. Pers. l. c. 2. p. 315. Scorpions-Peitschen. In Oesterr. Krain, Ital. u. Frankr. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *C. valentina*. Pers. l. c. 2. p. 316. Valentinsche Peitschen. In Spanien u. Italien. Jun. — Aug. K. H. ♂.

4. *C. cretica*. Pers. l. c. Candische Peitschen. In Candien. Jun. Jul. Im F. ♂.

5. *C. securidaca*. Pers. l. c. Beilkrautartige Peitschen. In Dalmat. Ital. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. ♂.

660. Hippocrepis, Pferdehufschote.

1. *H. balearica*. Pers. l. c. 2. p. 315. Strauchartige Pferdehufschote. Zu Minorca. Jul. Aug. K. H. ♂.

661. Aeschynomene, Schampflanze.

1. *A. aristata*. Pers. l. c. 2. p. 316. Gegrannnte Schampflanze. Auf den Inseln St. Domingo u. St. Crux. Jän. — März u. Aug. Sept. W. H. ♂.

662. Hédysarum, Hahnenkopf.

1. *H. triquetrum*? Pers. l. c. 2. p. 319. Dreikantiger Hahnenkopf. In Ostind. — W. H. ♂.

2. *H. Vespertilionis*. Pers. l. c. Zweylappiger Hahnenkopf. In Cochinchina. Jun. Jul. W. H. ♂.

3. *H. gyrans*. Pers. l. c. 2. p. 321. Beweglicher Hahnenkopf. In Bengalen am Ganges. Jul. W. H. ♂.

4. *H. frutescens*. Lin. sp. pl. p. 1055. Strauchartiger Hahnenkopf. In Virgin. u. Carolina. — K. n. ♂.

Leopedea fruticosa. Pers. l. c. 2. p. 318.

5. *H. uncinatum*. Pers. l. c. 2. p. 323. Hakenförmiger Hahnenkopf. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♂.

6. *H. coronarium*. Pers. l. c. Italienischer Hahnenkopf. Auf Wiesen in Italien. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *H. Onobrychis*. Pers. l. c. 2. p. 324. Futter-Hahnenkopf. (Esparsette). Auf Hügeln in Deutschl. Böhmen, England u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

663. Indigofera, Indigo.

1. *I. psoraloides*. Pers. l. c. 2. p. 326. Psoraliensartiger Indigo. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

2. *I. cytisoides*. Pers. l. c. 2. p. 327. Bohnenbaumartiger Indigo. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

3. *I. Anil*. Pers. l. c. 2. p. 328. Sichelfrüchtiger Indigo. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *I. tinctoria*. Pers. l. c. Färber-Indigo.
In Ostind. Jun. Jul. VV. H. ḥ.

664. Galega, Geisraute.

1. *G. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 330. Gemeine Geisraute. In Deutschl. der Schweiz, Italien, Spanien u. Nordafrica. Jun. — Aug. Im F. ḥ.

2. *G. orientalis*. Pers. l. c. Orientalische Geisraute. Im Orient. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *G. caribaea*. Pers. l. c. Westindische Geisraute. Auf den Caraibischen Inseln. Jul. Aug. VV. H. ḥ.

665. Astragalus, Traganth.

1. *A. Onobrychis*. Pers. l. c. 2. p. 336. Langfahniger Traganth. In Oesterreich, Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. Jun. — Sept. Im F. 2.

2. *A. glycyphyllos*. Pers. l. c. 2. p. 338. Süßblättriger Traganth. In Hainen v. Eur. Jun. Jul. Im F. 2.

3. *A. Cicer*. Pers. l. c. Kichernartiger Traganth. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Italien u. Russland. Jun. Jul. Im F. 2.

4. *A. galegiformis*. Pers. l. c. Geisrautenartiger Traganth. In Sibirien u. im Orient. Jun. Im F. 2.

5. *A. virescens*. Ait. hort. kew. 3. p. 73. Grünlicher Traganth. In Sibirien, Armen. u. Nordafr. May, Jun. Im F. 2.

A. falcatus β *virescens*. Pers. l. c. 2. p. 339.

6. *A. alopecuroides*. Pers. l. c. 2. p. 340.
Fuehsschwanzartiger Traganth. In Sibirien. Jun.
Jul. Im F. 24.

7. *A. Tragacantha*. Pers. l. c. 2. p. 341. Ge-
meiner Traganth. In Istrien, Dalmatien, Arra-
gonien, Südfrankr. Sicilien u. der Barbarey. Aug.
— Oct. K. H. 24.

666. Psoralea, Psoralea.

1. *Ps. pinnata*. Pers. l. c. 2. p. 346. Gefie-
derete Psoralea. An Bächen am Cap. Jul. Aug.
Ch. 5.

2. *Ps. odoratissima*. Pers. l. c. Wohlriechen-
de Psoralea. Am Cap. May, Jun. Ch. 5.

3. *Ps. verrucosa*. Pers. l. c. Warzige Psora-
lea. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. 5.
Ps. angustifolia. Jacq. hort. schoenbr. 2.p.53.t.226.

4. *Ps. bracteata*. Pers. l. c. Punktirte Psora-
lea. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

5. *Ps. aphylla*. Pers. l. c. Blattlose Psoralea.
Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

6. *Ps. hirta*. Pers. l. c. Rauhe Psoralea. Am
Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

7. *Ps. bituminosa*. Pers. l. c. 2. p. 347. Har-
zige Psoralea. Auf Hügeln am Meere in Ital. Si-
cilién u. Languedoc. Jun. Jul. K. H. 5.

8. *Ps. glandulosa*. Pers. l. c. Drüsige Psora-
lea. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 5.

9. *Ps. palaestina*. Pers. l. c. Palästinische
Psoralea. In Palästina. Jul. Aug. Ch. 5.

10. *Ps. americana*. Pers. l. c. Maderische Psoralea. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. ♂.

667. *Lotus*, Schotenklee.

1. *L. tetragonolobus*. Pers. l. c. 2. p. 355. Spargel-Schotenklee. Auf Hügeln in Sicilien. Jun. — Aug. Im F. ☽.

2. *L. edulis*. Pers. l. c. Genießbarer Schotenklee. In Ital. Sicilien, Span. u. Candien. Jun. — Aug. Im F. ☽.

3. *L. jacobaeus*. Pers. l. c. Schwarzer Schotenklee. Auf der St. Jacobsinsel. Jul. Aug. Ch. 2.

4. *L. hirsutus*. Pers. l. c. 2. p. 354. Zottiger Schotenklee. In Ital. Languedoc. u. im Orient. Jun. Jul. K. H. ♂.

668. *Medicago*, Schneckenklee.

1. *M. arborea*. Pers. l. c. 2. p. 356. Baumartiger Schneckenklee. Zu Rhodos u. Neapel. Jun. — Sept. K. H. ♂.

C L A S S I S XVIII.

S Y N G E N E S I A.

A E Q U A L I S.

669. *Arnopogon*, Schafsbart.

1. *A. Dalechampii*. Pers. l. c. 2. p. 360. Dalechampischer Schafsbart. In Dalmatien, Italien. u. Span. May, Jun. K. H. 2.

670. Sonchus, Gänsedistel.

1. *S. fruticosus*, Pers. l. c. 2. p. 363. Strauchartige Gänsedistel. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. Jul. K. H. 18.

2. *S. hispanicus*. Pers. l. c. Spanische Gänsedistel. In Spanien bey Malaga. Jun. Jul. Im F. ⊙.

3. *S. tingitanus*, Lam. encycl. 3. p. 383. Tunetanische Gänsedistel. Auf Felsen am Meere in der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ⊙.
Pieridium tingitanum. Pers. l. c. 2. p. 362.

4. *S. macrophyllus*. Willd. sp. pl. 3. p. 1519. Grossblättrige Gänsedistel. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

S. canadensis. Pers. l. c. 2. p. 363.

5. *S. alpinus*. Pers. l. c. Alpen-Gänsedistel. Auf Alpen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz, Krain, Italien, Frankr. England, Schweden, Norwegen u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

671. Prenanthes, Hasenlattich.

1. *Pr. purpurea*. Pers. l. c. 2. p. 365. Purpurrother Hasenlattich. Auf Bergbäumen in Deutschl. der Schweiz u. Italien. Jun. Jul. Im F. 24.

672. Hieracium, Habichtskraut.

1. *H. alpinum*. Pers. l. c. 2. p. 370. Alpen-Habichtskraut. Auf Alpen in Oesterr. Lappland, England, der Schweiz u. auf dem Berge Brocken. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *H. aurantiacum*. Pers. l. c. 2. p. 371.
Pomeranzenfarbiges Habichtskraut. In Oesterr.
Steyerm. Schlesien, der Schweiz, Ital. u. Frankr.
Jun. Jul. Im F. 24.

3. *H. fruticosum*. Pers. l. c. 2. p. 375. Strauch-
artiges Habichtskraut. Zu Madera? Jun. Jul. Ch. 5.

673. Crepis, Pippau.

1. *Cr. rubra*. Pers. l. c. Rother Pippau. In
Dalmatien u. Apulien. Jul. Im F. 5.

674. Andryala, Wolldistel.

1. *A. lanata*. Lin. sp. pl. p. 1137. Weiß-
haarige Wolldistel. In Südeur. Jun. Jul. K. H. 24.
Hieracium verbascifolium. Pers. l. c. 2. p. 374.

675. Catananche, Zwangkraut.

1. *C. coerulea*. Pers. l. c. 2. p. 379. Blaues
Zwangkraut. Zu Languedoc u. Nordafrica. Jun.
Jul. Im F. 5.

676. Scolymus, Golddistel.

1. *Sc. maculatus*. Pers. l. c. 2. p. 380. Ge-
fleckte Golddistel. In Ital. zu Languedoc u.
in Nordafrica. Jun. Jul. Im F. 5.

677. Carthamus, Saflor.

1. *C. tinctorius*. Pers. l. c. Gemeiner Saflor.
In Aegypten u. Ostind. Jun. Jul. Im F. 5.

2. *C. lanatus*. Pers. l. c. Wolliger Saflor.
In Oesterr. Ungarn, Krain, der Schweiz, Ital.
Frankr. u. Candien auf Heiden. Jun. Jul. Im F. ⊕.

678. Carlovizia, Carlovizie.

1. *C. salicifolia*. Moench. method. pl. suppl.
p. 225. Weidenblättrige Carlowizie. Zu Madera.
Jul. Aug. Ch. ♂.
Cartham? salicifol. Pers. l. c. 2. p. 381.

679. Carduus, Distel.

1. *C. Marianus*. Pers. l. c. 2. p. 386. Mari-
en-Distel. In Eur. Jul. Aug. Im F. ⊕.

2. *C. mollis*. Pers. l. c. Weiche Distel. Auf
Bergen in Oesterr. u. bey Montpellier. May, Jun.
Im F. ♀.

680. Cnicus, Kratzkraut.

1. *Cn. rivularis*. Willd. sp. pl. 3. p. 1676. Bach-
Kratzkraut: Auf feuchten Wiesen in Oesterr. u.
Ungarn. Jun. Im F. ♀.
Carduus rivul. Pers. l. c. 2. p. 388.

2. *Cn. afer*. Willd. l. c. 3. p. 1682. Africa-
nisches Kratzkraut. In Nordafrica u. Syrien. Jun.
Jul. K. H. ♂.
Carduus diacanthus. Pers. l. c. 2. p. 389.

681. Serratula, Scharte.

1. *S. tinctoria*. Pers. l. c. 2.. p. 390. Färber-
Scharte. Im nördlicher. Eur. Jun. Jul. Im F. ♀.

2. *S. alata*. Willd. enum. suppl. p. 56. Ge-
flügelte Scharte. —. Jul. Aug. Im F. ♀.

682. Staehelina, Stäheline.

1. *St. Chamaepeuce*. Pers. l. c. 2. p. 391.
Fichtenblättrige Stäheline. In Candien. Sept.
Oct. K. H. ♂.

683. Spilanthes, Fleckblume.

1. *Sp. Acmella*. Pers. l. c. 2. p. 393. Wah-
re Fleckblume. In Ceylon. Jun. Jul. W. H. ⊖.

2. *Sp. oleraceus*. Pers. l. c. Krautartige Fleck-
blume. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ⊖.

684. Bidens, Zweyzahn.

1. *B. heterophylla*. Pers. l. c. 2. p. 394.
Versehedenblättriger Zweyzahn. In Mexico. Jun.
Jul. Ch. ♂.

2. *B. luxurians*. Willd. enum. 2. p. 847.
Wuchernder Zweyzahn. In Mexico. Jun. Jul. Ch. ♀.

685. Cacalia, Pestwurz.

1. *C. papillaris*. Pers. l. c. 2. p. 395. War-
zige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. ♂.

2. *C. Anteuphorbium*. Pers. l. c. Wolfs-
milchartige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. ♂.

3. *C. Kleinia*. Pers. l. c. Canarische Pest-
wurz. Auf den Canarischen Inseln. Sept. Oct.
Ch. ♂.

4. *C. Ficoides*. Pers. l. c. Zaserblumenartige
Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♂.

5. *C. repens*. Pers. l. c. Kriechende Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♂.

6. *C. canescens*. Donn. catalog. cantabrig. p. 251. Graublättrige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. ♂.

7. *C. carnosa*. Pers. l. c. Fleischige Pestwurz. Am Cap. —. Ch. ♂.

8. *C. articulata*. Pers. l. c. Dreyblättrige Pestwurz. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♂.

C. laciniata. Jacq. ic. rar. 1. t. 168. Coll. 1. p. 77.

9. *C. cylindrica*. Pers. l. c. Cylindrische Pestwurz. In Africa. —. Ch. ♂.

10. *C. sagittata*. Pers. l. c. Pfeilblättrige Pestwurz. Zu Java. Jun. Jul. Im F. ♂.

11. *C. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende Pestwurz. In Virgin. u. Canada. Jun. — Aug. Im F. ♀.

12. *C. alpina*. Pers. l. c. 2. p. 397. Alpen-Pestwurz. Auf Alpen in Oesterr. Salzburg, Schlesien, der Schweiz u. den Pyrenäen. Jun. — Aug. Im F. ♀.

13. Eine noch unbeschriebene Art vom Cap.

686. Humea, Humea.

1. *H. elegans*. Smith exot. bot. 1. p. 1. t. 1. Schöne Humea. In Australien. Jul. Aug. Ch. ♂. *Calomeria amaranthoides*. Pers. l. c. 2. p. 406.

687. Piqueria, Pquierie.

1. *P. trinervia*. Pers. l. c. 2. p. 397. Drey-nervige Pquierie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. ♀.

688. Mikania, Mikanie.

1. *M. scandens*. Pers. l. c. 2. p. 398. Kletternde Mikanie. In Wässern v. Virginien. Jul. Aug. K. H. ♂.

689. Eupatorium, Wasserdost.

1. *E. Dalea*. Pers. l. c. 2. p. 399. Weidenblättriger Wasserdost. In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♂.

2. *E. cannabinum*. Pers. l. c. 2. p. 400. Hanfartiger Wasserdost. In Wässern v. Eur. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *E. purpureum*. Pers. l. c. Purpurfarbiger Wasserdost. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *E. perfoliatum*. Pers. l. c. Durchwachsender Wasserdost. In Virginien u. Pensylvanien am Wasser. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *E. ageratoides*. Pers. l. c. 2. p. 401. Ageratumartiger Wasserdost. In Canada u. Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *E. deltoideum*. Pers. l. c. Deltablättriger Wasserdost. —. Jul. Aug. Im F. 24.

690. Ageratum, Ageratum.

1. *A. conyzoides*. Pers. l. c. 2. p. 402. Dürrwurzelartiges Ageratum. Im wärmer. Amer. Jun. Jul. W. H. ☽.

18
691. Stevia, Stevie.

1. *St. Eupatoria*. Willd. im Magaz. der Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. 1807. p. 138. Wasser-
erdostartige Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24.
St. purpurea. Pers. l. c.

2. *St. purpurea*. Willd. enum. 2. p. 855.
Purpurfarbige Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24.
St. purpurea. Pers. l. c.

3. *St. serrata*. Pers. l. c. 2. p. 403. Gesägte
Stevie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 24.
Ageratum punctatum. Jacq. hort. schoenbr. 3. p.
28. t. 300.

692. Vernonia, Vernonie.

1. *V. noveboracensis*. Pers. l. c. 2. p. 404.
Neujorkische Vernonie. Zu Neujork, Virginien,
Carolina u. Pensylvanien. Jun. Jul. Im F. 24.
Serratula noveborac. Lin. sp. pl. p. 146.

2. *V. praealta*. Pers. l. c. Hohe Vernonie. In
Carolina, Virgin. u. Pensylvan. Jun. Jul. Im F. 24.
Serratula praealta. Lin. l. c.

3. *V. anthelmintica*. Pers. l. c. Wurmtreibende
Vernonie. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ○.
Conyza anthelm. Lin. sp. pl. p. 1207.

693. Chrysocoma, Goldhaar.

1. *Ch. Coma aurea*. Pers. l. c. Gemeines Goldhaar.
Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

2. *Ch. cernua*. Pers. l. c. Hängendes Goldhaar.
Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

3. *Ch. denticulata*. Pers. l. c. 2. p. 405. Gezähneltes Goldhaar. —. Jul. Aug. Ch. 5.

4. *Ch. Linosyris*. Pers. l. c. Deutsches Goldhaar. In Mitteleur. Jun. Jul. Im F. 2.

694. *Tarchonanthus*, Pelzsame.

1. *T. camphoratus*. Pers. l. c. Kampferartiger Pelzsame. Am Cap. Oct. — Dec. Ch. ♂.

695. *Santolina*, Heiligenpflanze.

1. *S. Chamaecyparissus*. Pers. l. c. 2. p. 406. Cypressenartige Heiligenpflanze. In Südeur. Jul. Aug. K. H. ♂.

2. *S. rosmarinifolia*. Pers. l. c. Rosmarinartige Heiligenpflanze. In Spanien Jun. — Aug. K. H. ♂.

3. *S. viridis*. Pers. l. c. Grüne Heiligenpflanze. In Span. u. Südfrankr. Jun. — Aug. K. H. ♂.

4. *S. alpina*. Lin. sp. pl. p. 1180. Berg-Heiligenpflanze. In Italien. Jun. Jul. K. H. 2.
S. erecta. Pers. l. c. 2. p. 407.

696. *Athanasia*, Athanasie.

1. *A. virgata*. Pers. l. c. 2. p. 407. Ruthenförmige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

2. *A. annua*. Pers. l. c. Jährige Athanasie. In der Barbarey. Jun. Jul. Im F. ☽.

3. *A. crithmifolia*. Pers. l. c. Bacillenblättrige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

4. *A. parviflora*. Pers. l. c. Kleinblumige Athanasie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

697. Balsamita, Frauenmünze.

1. *B. vulgaris*. Willd. sp. pl. 3. p. 1802. Gemeine Frauenmünze. In Toscana, Languedoc. u. der Schweiz. Jul. Aug. Im F. 24.
Balsam. suaveolens. Pers. l. c. 2. p. 408.
Tanacetum Balsamita. Lin. sp. pl. p. 1184.

698. Pentzia, Pentzie.

1. *P. flabelliformis*. Willd. sp. pl. 3. p. 1808. Fächerförmige Pentzie. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.
Balsamita flabelliform. Pers. l. c.

SUPERFLUA.

699. Tanacetum, Wurmkraut.

1. *T. vulgare*. Pers. l. c. 2. p. 409. Gemeines Wurmkraut. (Rainfarrn). Auf Bergen in Eur. Jun. — Oct. Im F. 24.

2. foliis crispis. Mit krausen Blättern.

700. Artemisia, Beyfuss.

1. *A. Abrotanum*. Pers. l. c. Stahwurz-Beyfuss. Im Orient. u. Südfrankr. Jun. — Aug. Im F. 5.

2. *A. afra*. Pers. l. c. Africanischer Beyfuss. Am Cap? Jul. — Oct. Ch. 5.

3. *A. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiger Beyfuss. In Ital. im Orient. u. in der Barbarey. Jul. Aug. K. H. 5.

4. *A. argentea*. Pers. l. c. Silberfarbiger Beyfuss. Zu Madera. Sept. Oct. K. H. 5.

5. *A. scoparia*. Pers. l. c. 2. p. 410. Besen-Beyfuss. In Ungarn, Taurien u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. ○.

6. *A. crithmifolia*. Pers. l. c. 2. p. 411. Bacillenblättriger Beyfuss. In Portugall u. Frankr. am Meerestrande. — . K. H. 24.

7. *A. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Beyfuss. Am Meerestrande in Norvegen, Schweden, Pommern, Niederland u. England. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *A. austriaca*. Pers. l. c. 2. p. 412. Oesterreichischer Beyfuss. In Oesterr. u. Ungarn. Jun. Jul. Im F. 24.

9. *A. pontica*. Pers. l. c. Römischer Beyfuss. Auf trockenen Bergen in Deutschl. der Schweiz u. Ital. Jul. Aug. Im F. 24.

10. *A. Absinthium*. Pers. l. c. 2. p. 413. Bitterer Beyfuss. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

11. *A. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeiner Beyfuss. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

12. *A. Dracunculus*. Pers. l. c. Drachen-Beyfuss. (Bertram). In Südeur. Sibirien u. der Tartarey. Jun. Jul. Im F. 24.

701. Xeranthemum, Papierblume.

1. *X. annuum*. Pers. l. c. Gemeine Papierblume. In Oesterr. Ital. Frankr. Jul. Aug. Im F. ○.

2. *X. inapertum*. Pers. l. c. Geschlossene Papierblume. In Oesterr. Ungarn, der Schweiz u. Ital. Jun. Jul. Im F. ○.

702. Elichrysum, Strohblume.

1. *E. bracteatum*. Willd. enum. 2. p. 869.
Goldfarbige Strohblume. In Neuholl. Jun. Jul.
Ch. ♂.

Helichrysum chrysanthum. Pers. l. c. 2. p. 414.
Xeranthemum bracteatum. Vent.hort. malmais.2.t.2.

703. Gnaphalium, Ruhrkraut.

1. *Gn. ericoides*. Pers. l. c. 2. p. 417. Heiden-
artiges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

2. *Gn. Stoechas*. Pers. l. c. Buschiges Ruhr-
kraut. In Ungarn, Frankr. Span. dem Oesterrei-
chischen Littorale u. im Orient. Jul. Aug. K.H. ♂.

3. *Gn. angustifolium*. Pers. l. c. Schmalblät-
triges Ruhrkraut. In Span. u. in Ital. bey Nea-
pel. Jul. Aug. K. H. ♂.

4. *Gn. foetidum*. Pers. l. c. 2. p. 418. Stin-
kendes Ruhrkraut. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

5. *Gn. orientale*. Pers. l. c. Levantisches
Ruhrkraut. In Africa. Jun. — Aug. K. H. ♂.

6. *Gn. helianthemifolium*. Pers. l. c. 2. p.
419. Graublättriges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug.
Ch. ♂.

7. *Gn. squarrosum*. Pers. l. c. Sparrkelchi-
ges Ruhrkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24.

8. *Gn. divaricatum*. Thunb. prod. 151. Weit-
ästiges Ruhrkraut. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.
Gn. auriculatum. Pers. l. c. 2. p. 420.

9. *Gn. margaritaceum*. Pers. l. c. 2. p. 420.
Perlenartiges Ruhrkraut. In Krain, Südtirol,
der Schweiz, in Schlesien, Sibirien, Nordamer. u.
Kamtschatka auf Bergen. Jul. — Sept. Im F. 2.

704. *Baccharis*, *Baccharis*.

1. *B. ivaefolia*. Pers. l. c. 2. p. 423. Ivalätzige Baccharis. In Virgin. u. Peru. Jul. Aug. K. H. ♂.

2. *B. nereifolia*. Pers. l. c. Oleanderblättrige Baccharis. Am Cap. —. Ch. ♂.

3. *B. halimifolia*. Pers. l. c. Meldenblättrige Baccharis. In Virgin. u. Florida. Jul. Aug. K. H. ♂.

4. *B. adnata*. Willd. enum. 2. p. 870. Angewachsene Baccharis. In Südamer. Jun. W.-H. ♂.

5. *B. Dioscoridis*. Pers. l. c. 2. p. 424. Levantische Baccharis. In Syrien u. Aegypt. Jun. Jul. Ch. ♂.

6. *B. parviflora*. Pers. l. c. 2. p. 425. Kleinblühige Baccharis. An Flüssen in Peru. —. Ch. ♂.

705. *Conyzæ*, Dürrewurz.

1. *C. saxatilis*. Pers. l. c. 2. p. 428. Stein-Dürrewurz. In Südeur. Palästina u. der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. ♂.

2. *C. candida*. Pers. l. c. 2. p. 429. Weisse Dürrewurz. In Dalmatien u. Candien. Jun. Jul. K. H. ♂.

3. *C. incisa*. Pers. l. c. Eingeschnittene Dürrewurz. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

4. *C. thapsoides* Pers. l. c. Königskerzenartige Dürrwurz. Am Caspischen Meere. Jul. Aug. K. H. 24.

706. *Psiadia*, Tropfenpflanze.

1. *Ps. glutinosa*. Pers. l. c. Klebrige Tropfenpflanze. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. Ch. h.

707. *Madia*, Madie.

1. *M. viscosa*. Pers. l. c. 2. p. 430. Klebrige Madie. In Chili. Aug. Sept. W. H. O.
M. mellosa. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 29. t. 302.

708. *Erigeron*, Berufungskraut.

1. *E. alpinum*. Pers. l. c. p. 2. 431. Alpen-Berufungskraut. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Krain u. der Schweiz. Jun. — Aug. Im F. 24.

709. *Senecio*, Kreuzkraut.

1. *S. purpureus*. Pers. l. c. 2. p. 432. Purpurfarbiges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 24. *Cacalia villosa*. Jacq. ic. rar. 3. t. 580. Collect. 2. p. 347.

2. *S. haematophyllus*. Willd. enum. 2. p. 875. Bluthälftiges Kreuzkraut. —. —. W. H. h.

3. *S. elegans*. Pers. l. c. 2. p. 434. Schönes Kreuzkraut. Am Cap. Jul. — Sept. Im F. h.

β . *floribus plenis*. Mit gefüllten Blüthen.

4. *S. rosmarinifolius*. Pers. l. c. 2. p. 436. Rosmarinblättriges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Ch. h.

5. *S. nemorensis*. Pers. l. c. 2. p. 437. Hain-Kreuzkraut. In Deutschl. Jul. Im F. 2⁴.

6. *S. saracenicus*. Pers. l. c. Heidnisches Kreuzkrant. In Deutschl. der Schweiz, Frankr. u. Engl. Jul. Im F. 2⁴.

7. *S. coriaceus*. Pers. l. c. Lederblättriges Kreuzkraut. Im Orient. Jul. Im F. 2⁴.

8. *S. Doria*. Pers. l. c. Hohes Kreuzkraut. In Oesterr. Deutschl. u. dem Orient. Jul. Im F. 2⁴.

9. *S. rigidus*. Pers. l. c. 2. p. 438. Steifes Kreuzkraut. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ½.

10. *S. solidaginoides*. Pers. l. c. Goldruthenartiges Kreuzkraut. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ½.

710. Cineraria, Aschenpflanze.

1. *C. geifolia*. Pers. l. c. 2. p. 439. Steinbrechblättrige Aschenpflanze. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ½.

2. *C. aurita*. Pers. l. c. Geöhrte Aschenpflanze. Auf Madera. Jun. Jul. Ch. ½.

3. *C. hybrida*. Willd. enum. 2. p. 893. Bastard-Aschenpflanze. —. Apr. — Jul. Ch. ½.

4. *C. cruenta*. Pers. l. c. Rothblättrige Aschenpflanze. Auf den Canarisch. Inseln. März — Jul. Ch. 2⁴.

5. *C. cordifolia*. Pers. l. c. 2. p. 440. Herzblättrige Aschenpflanze. Auf Alpen in Oesterr. Salzburg, der Schweiz u. Frankr. Jul. Aug. Im F. 2⁴.

— 311 —

6. *C. alpina*. Pers. l. c. Alpen-Aschenpflanze.
Auf Europ. Alpen. Jul. Aug. Im F. 24.

7. *C. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-
Aschenpflanze. Am Meeresstrande in Südeur. Jul.
Aug. K. H. 24.

8. *C. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbige Aschen-
pflanze. — . Jul. Aug. K. H. 5.

9. *C. linifolia*. Pers. l. c. Leinblättrige Aschen-
pflanze. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

10. *C. lanata*. Pers. l. c. Wollige Aschen-
pflanze. Auf den Canarischen Inseln. Jun. — Aug.
Ch. 5.

11. *C. amelloides*. Pers. l. c. 2. p. 441. Blaue
Aschenpflanze. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

711. Aster, Sternblume.

1. *A. tomentosus*. Pers. l. c. Filzige Stern-
blume. In Neuholland. Jul. Aug. Ch. 5.

A. dentatus. Andrews bot. repos. 1. p. 61. t. 61.

2. *A. argophyllus*. Pers. l. c. Silberblättri-
ge Sternblume. In Neuholl. — . Ch. 5.

3. *A. Cymbalariae*. Pers. l. c. Fünfzähnige
Sternblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. 5.

4. *A. angustifolius*. Pers. l. c. Schmalblät-
trige Sternblume. Am Cap. Jun. — Oct. Ch. 5.

5. *A. fruticulosus*. Pers. l. c. Strauchartige
Sternblume. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5.

6. *A. alpinus*. Pers. l. c. 2. p. 442. Alpen-
Sternblume. Auf Europäischen Alpen. Jul. Aug.
Im F. 24.

7. *A. tenellus.* Pers. l. c. Zarte Sternblume. Am Cap. Jul. Aug. Ch. ☽.
8. *A. nemoralis.* Pers. l. c. Wald-Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 24.
9. *A. hyssopifolius.* Pers. l. c. Ysopblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
10. *A. punctatus.* Pers. l. c. Punktirte Sternblume. In Ungarn. Aug. Sept. Im F. 24.
11. *A. acris.* Pers. l. c. Scharfe Sternblume. In Ungarn, zu Montpellier u. auf den Pyrenäen. Jul. — Sept. Im F. 24.
12. *A. canus.* Pers. l. c. Graue Sternblume. Im Banat. Aug. Sept. Im F. 24.
13. *A. linifolius.* Pers. l. c. 2. p. 443. Leinblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
14. *A. linariifolius.* Pers. l. c. Frauenflachsblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
15. *A. tenuifolius.* Pers. l. c. Dünnblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
16. *A. dumosus.* Pers. l. c. Buschige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
17. *A. multiflorus.* Pers. l. c. Vielblumige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
18. *A. umbellatus.* Ait. hort. kew. 3. p. 106. Doldenblütige Sternblume. In Pensylvanien. Aug. Sept. Im F. 24.
19. *A. vernus.* Pers. l. c. Frühlings-Sternblume. In Virginien. Jun. Jul. Im F. 24.

20. *A. salicifolius*. Pers. l. c. 2. p. 444. Weidenblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

21. *A. Amellus*. Pers. l. c. Virgils-Sternblume. Auf Hügeln im südlicher. Eur. Jul. Aug. Im F. 24.

22. *A. Novae Angliae*. Pers. l. c. Neuenglische Sternblume. In Neuengland. Aug. Sept. Im F. 24.

23. *A. undulatus*. Pers. l. c. Wellenblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

24. *A. sagittifolius*. Pers. l. c. Pfeilblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

25. *A. paniculatus*. Pers. l. c. 2. p. 445. Rispenästige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

26. *A. corymbosus*. Pers. l. c. Doldentraubige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

27. *A. cordifolius*. Pers. l. c. Herzblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

28. *A. macrophyllus*. Pers. l. c. Großblättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

29. *A. chinensis*. Pers. l. c. Chinesische Sternblume. In Ostind. China u. Japan. Jul. Aug. Im F. ○.

30. *A. Tripolium*. Pers. l. c. Meerstrands-Sternblume. Am Meeresstrande in Südeuf. u. auf salzigem Boden in Deutschl. u. Sibirien. Aug. Sept. Im F. 24.

31. *A. puniceus.* Pers. l. c. Blaustielige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
32. *A. annuus.* Ait. hort kew. 3. p. 209. Jährige Sternblume. In Deutschl. Dänemark. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.
Erigeron heterophyllum. Pers. l. c. 2. p. 431.
33. *A. sibiricus.* Pers. l. c. Sibirische Sternblume. In Sibirien. Jul. Im F. 24.
34. *A. laevis.* Pers. l. c. 2, p. 446. Glatte Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
35. *A. mutabilis.* Pers. l. c. Veränderliche Sternblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.
36. *A. longifolius.* Pers. l. c. Langlättrige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
37. *A. vimineus.* Pers. l. c. Ruthenförmige Sternblume. In Canada. Aug. Sept. Im F. 24.
38. *A. Tradescanti.* Pers. l. c. Tradescantische Sternblume. In Virginien. Aug. Sept. Im F. 24.
39. *A. recurvatus.* Pers. l. c. Zurückgebogene Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
40. *A. floribundus.* Pers. l. c. Blumenreiche Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.
41. *A. Novi Belgii.* Pers. l. c. Pensylvanische Sternblume. In Pensylv. u. Virgin. Aug. Sept. Im F. 24.
42. *A. serotinus.* Pers. l. c. 2. p. 447. Späte Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 24.
43. *A. tardiflorus.* Pers. l. c. Herbst-Sternblume. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 24.

44. *A. junceus*. Pers. l. c. Einsenartige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

45. *A. fragilis*. Pers. l. c. Zerbprechliche Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

46. *A. miser*. Pers. l. c. Kurzstrahlige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

47. *A. pendulus*. Pers. l. c. Hängende Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

48. *A. diffusus*. Pers. l. c. Weitästige Sternblume. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

Nebst einigen noch nicht bestimmten Arten.

712. Solidago, Goldruthe.

1. *S. canadensis*. Pers. l. c. 2. p. 448. Canadische Goldruthe. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

2. *S. altissima*. Pers. l. c. Höchste Goldruthe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

3. *S. elliptica*. Pers. l. c. Elliptische Goldruthe. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *S. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüne Goldruthe. In Neujork u. Canada. Oct. — Dec. Im F. 24..

5. *S. odora*. Pers. l. c. 2. p. 440. Wohlriechende Goldruthe. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *S. lanceolata*. Pers. l. c. Schmalblättrige Goldruthe. In Nordamer. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *S. caesia*. Pers. l. c. Blaustielige Goldruthe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24..

8. *S. mexicana*. Pers. l. c. Mexicanische Goldrathe. In Nordamer. Aug. Sept. Im F. 24.

9. *S. flexicaulis*. Pers. l. c. Gebogene Goldrathe. In Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

β. *latifolia*. Mit breiteren Blättern.

10. *S. alpestris*. Pers. l. c. Alpen-Goldruth. Auf Alpen in Oesterr. Böhmen u. den Carpathen. Aug. Sept. Im F. 24.

11. *S. Virga aurea*. Pers. l. c. Gemeine Goldruth. In Eur. auf trockenen Triesten. Aug. Sept. Im F. 24.

12. *S. rigida*. Pers. l. c. 2. p. 450. Steife Goldruth. In Pensylvanien. Jun. Jul. Im F. 24.

713. *Inula*, Alant.

1. *I. Helenium*. Pers. l. c. Wahrer Alant. In England, Niederl. Deutschl. u. Ungarn. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *I. Oculus Christi*. Pers. l. c. Weißblättriger Alant. In Oesterr. u. um Tübingen. Jun. — Aug. Im F. 24.

3. *I. britannica*. Pers. l. c. Wiesen-Alant. Auf feuchten Wiesen in Eur. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *I. dysenterica*. Pers. l. c. Ruhr-Alant. In Eur. an Gräben. Jul. Aug. Im F. 24.

5. *I. squarrosa*. Pers. l. c. 2. p. 451. Sparriger Alant. In Italien u. zu Montpellier. Jul. Aug. Im F. 24.

6. *I. salicina*. Pers. l. c. Weidenblättriger Alant. In Eur. Jun. — Aug. Im F. 24.

7. *I. Bubonium*. Pers. l. c. Knorplicher Alant. Im Oesterreichischen Littorale, Krain, in der Krim u. am Flusse Donec. Jun. Jul. Im F. 24.

8. *I. hirta*. Pers. l. c. Steifhaariger Alant. In Deutschl. Frankr. u. Sibirien. Jun Jul. Im F. 24.

9. *I. germanica*. Pers. l. c. Deutscher Alant. In Deutschl. Ungarn u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *I. ensifolia*. Pers. l. c. Nervigter Alant. In Oesterr. auf Steingerölle u. am Caspischen Meere. Jul. Aug. Im F. 24.

714. Arnica, Wohlverley.

1. *A. montana*. Pers. l. c. Wahrer Wohlverley. (Engelstrank). Auf Bergwiesen im kälteren Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *A. Doronicum*. Pers. l. c. Alpen-Wohlverley. Auf Alpen in Oesterr. Steyerm. Ital. u. zu Dauphine. Jun. Jul. Im F. 24.

715. Doronicum, Gemswurzel.

1. *D. Pardalianches*. Pers. l. c. 2. p. 454. Gemeine Gemswurzel. Auf waldigen Bergen in Oesterr. der Schweiz, Deutschl. Ital. u. Frankr. Jun. Im F. 24.

2. *D. orientale*. Willd. enum. 2. p. 898. Caucäische Gemswurzel. Am Caucasus. März, Apr. Im F. 24.

D. caucasicum. Bieberst. fl. taurico-caucas. 2.p.321.

716. *Tussilago*, Huflattig.

1. *T. alpina*. Pers. l. c. 2. p. 455. Alpen-Huflattig. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Schlesien, Böhmen u. der Schweiz. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *T. discolor*. Pers. l. c. Zweyfarbiger Huflattig. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. u. Krain. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *T. fragrans*. Pers. l. c. Wohlriechender Huflattig. In Ital. bey Neapel. Nov. Dec. u. Apr. Im F. 24.

4. *T. Petasites*. Pers. l. c. Grossblättriger Huflattig. In Eur. an Flüssen u. Bächen. May, Jun. Im F. 24.

717. *Georgina*, Georgine.

1. *G. variabilis*. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 93. Veränderliche Georgine. In Mexico. Jun. Jul. K. H. 24.

Dahlia pinnata. Pers. l. c. 2. p. 458.

Georgina purpurea. Willd. sp. pl. 3. p. 2124.

β. *lilacina*. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 94.
Mit lila farbiger Blüthe.

Dahlia rosea. Pers. l. c.

Georgina rosea. Willd. sp. pl. l. c. n.

γ. *pallida*. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 95.
Mit blaßrother Blüthe.

Sammt mehreren andern sich durch die Blüthenfarbe unterscheidenden Abarten.

2. *G. coccinea*. Willd. hort. berol. 2. p. et t. 96. Scharlachfarbige Georgine. In Mexico. Jun. Jul. K. H. 24.

Dahlia coccinea. Pers. l. c.

β . *crocea*. Willd. enum. 2. p. 900. Mit safranfarbiger Blüthe.

γ . *flava*. Willd. l. c. 2. p. 909. Mit gelber Blüthe.

718. Zinnia, Zinnie.

1. *Z. multiflora*. Pers. l. c. Vielblühende Zinnie. In Luisiana. Jun. Jul. Im F. \odot .

2. *Z. verticillata*. Pers. l. c. Wirtelblättrige Zinnie. In Mexico. Jun. Jul. Im F. \odot .

3. *Z. elegans*. Jacq. ic. rar. 3. t. 589. Collect. 5. p. 152. Schöne Zinnie. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. \odot .

Z. violacea. Pers. l. c.

4. *Z. tenuiflora*. Jacq. ic. rar. 3. t. 590. Collect. 5. p. 153. Schmalblütige Zinnie. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. \odot .

Z. revoluta. Pers. l. c.

719. Tagetes, Todtenblume.

1. *T. lucida*. Pers. l. c. Ganzblättrige Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *T. patula*. Pers. l. c. Gemeine Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. \odot .

3. *T. erecta*. Pers. l. c. Grossblumige Todtenblume. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. \odot .

4. *T. tenuifolia*. Pers. l. c. 2. p. 459. Feinblättrige Todtenblume. In Peru. Jun. — Aug. Im F. \odot .

720. Bellis, Massliebe.

1. *B. perennis* β hortensis fl. pleno albo.
Pers. l. c. 2. p. 459. Garten-Massliebe mit weiss-
gefüllter Blume. Kömmt in Gärten vor. May —
Aug. Im F. 24.

γ. hortensis fl. pl. rubro. Mit rothgefüllter
Blüthe.

721. Chrysanthemum, Wucher-
blume.

1. *Ch. carinatum*. Pers. l. c. 2. p. 462. Drey-
farbige Wucherblume. In der Barbarey. Jun. Jul.
Im F. ○.

2. *Ch. coronarium*. Pers. l. c. 2. p. 463.
Garten - Wucherblume. In Candien, Sicilien u.
der Schweiz. Jun. Jul. Im F. ○.

722. Pyrethrum, Bertramwurz.

1. *P. frutescens*. Willd. sp. pl. 2. p. 2150.
Strauchartige Bertramwurz. Auf den Canarischen
Inseln. Jan. — Aug. Ch. ½.

Chrysanthem. frutesc. Pers. l. c. 2. p. 461.

2. *P. serotinum*. Willd. l. c. 3. p. 2151.
Späte Bertramwurz. In Nordamer. Aug. Sept. Im
F. 24.

Chrysanthem. serot. Pers. l. c. 2. p. 460.

3. *P. uliginosum*. Willd. l. c. 3. p. 2152.
Schlamm-Bertramwurz. In Ungarn's u. Spanien's
Sümpfen. Jul. Aug. Im F. 24.

Chrysanthem. uliginos. Pers. l. c.

4. *P. alpinum*. Willd. l. c. 3. p. 2153. Alpen-Bertramwurz. Auf den höchsten Alpen im südlicher. Europa. Jul. Aug. Im F. 2.

Chrysanthem. alpin. Pers. l. c. 2. p. 461.

5. *P. pinnatifidum*. Willd. l. c. 3. p. 2154. Schlitzblättrige Bertramwurz. Auf hohen Felsen zu Madera. Jun. — Aug. K. H. 2.

Chrysanthem. pinnatif. Pers. l. c.

6. *P. macrophyllum*. Willd. l. c. Grofsblättrige Bertramwurz. In Wäldern v. Croatiens, auf Bergen in Sclavon. dann im Banat u. an den Gränzen der Walachey. Jul. Im F. 2.

Chrysanth. macroph. Pers. l. c.

7. *P. corymbosum*. Willd. l. c. 3. p. 2155. Doldentraubige Bertramwurz. In Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Sibirien. May — Jul. Im F. 2.

Chrysanthem. corymb. Pers. l. c.

8. *P. Parthenium*. Willd. l. c. Mutterkraut-Bertramwurz. In Eur. an bebauten Stellen. Jun. — Aug. Im F. 2.

Chrysanthem. Parthen. Pers. l. c. 2. p. 462.

Matricaria Parthen. Lin. sp. pl. p. 1255.

723. *Matricaria*, Mutterkraut.

1. *M. Chamomilla*. Pers. l. c. 2. p. 463. Chamillen-Mutterkraut. In Eur. an bebauten Stellen. Jun. — Aug. Im F. ②.

724. *Lidbeckia*, Lidbeckie.

1. *L. pectinata*. Thunb. prod. 161. Eingeschnittene Lidbeckie. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. 5. *Lancisia pectinata*. Pers. l. c.

Cotula stricta. Lin. mant. 287.

725. *Boltonia*, Boltonie.

1. *B. glastifolia*. Pers. l. c. 2. p. 464. Graublättrige Boltonie. In Pensylvan. u. Virgin. Sept. Oct. Im F. 24.

726. *Anthemis*, Chamille.

1. *A. Cota*. Pers. l. c. 2. p. 465. Stechende Chamille. In Ital. Jun. Jul. Im F. ○.

2. *A. nobilis*. Pers. l. c. 2. p. 466. Römische Chamille. Im südlichen Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

3. *A. austriaca*. Pers. l. c. Oesterreichische Chamille. In Oesterr. Ungarn, Steyerm. u. Italien. Jun. Jul. Im F. ○.

4. *A. artemisiaefolia*. Willd. nov. act. soc. nat. scrut. berol. 3.p. 431. Beyfussblättrige Chamille. In China. Sept. — Decemb. K. H. ♂. Chrysanthem. indicum. Pers. l. c. 2. p. 461.

5. *A. floribus luteis*. Mit gelben Blüthen.

5. *A. trilobata*. Orteg. 6. p. 72. Dreylapptige Chamille. In Mexico. Jul. Aug. Ch. ♂.

6. *A. tinctoria*. Pers. l. c. 2. p. 466. Färber-Chamille. In Deutschl. u. Schweden auf trockenen, sonnigen Wiesen. Jun. Jul. Im F. 24.

727. *Achillea*, Schafgarbe.

1. *A. grandiflora*. Bieberst. fl. taurico-caucas. 2. p. 335. Grossblüthige Schafgarbe. Am Caucasus. Jun. Jul. Im F. 24.

Chrysanth. ptarmicaefol. Pers. l. c. 2. p. 460.

2. *A. Ptarmica.* Pers. l. c. Sumpf-Schafgarbe. An feuchten Stellen in Nordasien u. Amerika. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *A. Ageratum.* Pers l. c. 2. p. 467. Gewürzhafe Schafgarbe. In Ital. Frankr. u. Spanien. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *A. alpina.* Pers. l. c. Alpen-Schafgarbe. Auf Alpen in der Schweiz, Savoyen u. Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *A. Clavennae.* Pers. l. c. Bittere Schafgarbe. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Krain, Kärnthen u. der Schweiz. Jul. Aug. Im F. 24.

6. *A. atrata.* Pers. l. c. 2. p. 468. Schwarzelchige Schafgarbe. Auf Alpen in Oesterr. Salzb. Krain, der Schweiz u. Italien. Jun. — Aug. Im F. 24.

7. *A. aegyptiaca.* Pers. l. c. Aegyptische Schafgarbe. In Aegypten, im Orient u. bey Astrachan. Jun. Jul. K. H. 24.

8. *A. Eupatorium.* Pers. l. c. Caspische Schafgarbe. Am Caspischen Meere. Jul. Aug. Im F. 24.

9. *A. magna.* Pers. l. c. 2. p. 469. Grosse Schafgarbe. In Südeur. Jun. Jul. Im F. 24.

10. *A. Millefolium* β flore purpureo. Pers. l. c. Gemeine Schafgarbe mit purpurrother Blüthe. In Eur. Asien u. Nordamer. May — Aug. Im F. 24.

11. *A. ligustica.* Pers. l. c. Ligurische Schafgarbe. Auf Hügeln in Italien. Jun. Jul. Im F. 24.

728. Verbesina, Verbesine.

1. *V. alata*. Pers. l. c. 2. p. 471. Geflügelte Verbesine. Zu Curassao u. Surinam. Jun. — Aug. W. H. 24.

2. *V. gigantea*. Pers. l. c. Riesenartige Verbesine. In Westind. Jun. Jul. W. H. ♂.

3. *V. pinnatifida*. Pers. l. c. 2. p. 472. Schlitzblättrige Verbesine. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. ♂.

4. *V. serrata*. Pers. l. c. Gesägte Verbesine. In Mexico. Jul. — Sept. W. H. 24.

729. Pascalia, Pascalie.

1. *P. glauca*. Pers. l. c. 2. p. 473. Graugrüne Pascalie. In Chili. — K. H. ♂.

730. Ximenesia, Ximenesie.

1. *X. enceloides*. Pers. l. c. Geöhrte Ximenesie. In Mexico. Jun. Jul. Ch. 24.

731. Buphthalmum, Rindsauge,

1. *B. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartiges Rindsauge. In Jamaica u. Virginien. Jun. — Oct. K. H. ♂.

2. *B. sericeum*. Pers. l. c. 2. p. 474. Seidenartiges Rindsauge. Auf Teneriffa. Jun. — Aug. Ch. ♂.

3. *B. spinosum*. Pers. l. c. Stachelkelchiges Rindsauge. In Ital. Span. Languedoc u. im Orient. Jun. — Aug. K. H. ♂.

4. *B. maritimum*. Pers. l. c. Meerstrands-Rindsauge. Am Mittelländischen Meere. Jul. — Oct. K. H. 24.

5. *B. salicifolium*. Pers. l. c. Weidenblättriges Rindsauge. Auf Alpen in Oester.. Ital. u. zu Montpellier. Jun. — Aug. Im F. 24.

6. *B. grandiflorum*. Pers. l. c. Grossblüthiges Rindsauge. Auf Bergen in Oesterr. Ital. u. zu Montpellier. Jun. Jul. Im F. 24.

7. *B. cordifolium*. Pers. l. c. Herzblättriges Rindsauge. In Wäldern im Banaf u. in Croatiens. Jun. — Aug. Im F. 24.

8. *B. helianthoides*. Lin. sp. pl. p. 1275. Sonnenblumenartiges Rindsauge. In Nordamer. Sept. Oct. Im F. 24.

Heliopsis laevis. Pers. l. c. 2. p. 473.

Helianthus — Lin. l. c. p. 1278.

Rudbeckia oppositifolia. Lin. l. c. p. 1280.

Silphium solidaginoides. Lin. l. c. p. 1302.

732. *Helenium*, Helenie.

1. *H. autumnale*. Pers. l. c. Herbst-Helenie. In Nordamer. Jun. — Aug. Im F. 24.

2. *H. quadridentatum*. Pers. l. c. 2. p. 475. Vierzähnige Helenie. In Portugall. Jun. — Aug. K. H. 24.

Rudbeckia alata. Jacq. ic. rar. 3. t. 593. Collect. 5. p. 154.

FRUSTRANEA.

733. *Helianthus*, Sonnenblume.

1. *H. annuus*. Pers. l. c. Gemeine Sonnenblume. In Peru u. Mexico. Jun. — Aug. Im F. O.

— 326 —

2. *H. multiflorus*. Pers. l. c. Vielblumige Sonnenblume. In Virgin. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *H. tuberosus*. Pers. l. c. Knollige Sonnenblume. In Brasilien. Jul. — Oct. Im F. 24.

4. *H. mollis*. Pers. l. c. Weichblättrige Sonnenblume. In Nordamer. Jul. — Sept. Im F. 24.

5. *H. prostratus*. Pers. l. c. Gestreckte Sonnenblume. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

6. *H. giganteus*. Pers. l. c. Riesen-Sonnenblume. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

7. *H. altissimus*. Pers. l. c. 2. p. 476. Höchste Sonnenblume. In Pensylvan. Jul. Aug. Im F. 24.

734. *Rudbeckia*, Rudbeckie.

1. *R. laciniata*. Pers. l.c. Schlitzblättrige Rudbeckie. In Virgin. u. Canada. Jul. Aug. Im F. 24.

2. *R. pinnata*. Pers. l. c. Gefiederte Rudbeckie. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 24.

R. odorata. Hortulan.

3. *R. hirta*. Pers. l. c. Rauhe Rudbeckie. In Virgin. u. Florida, Jul. Aug. Im F. 24.

4. *R. purpurea*. Pers. l. c. 2. p. 477. Purpurrothe Rudbeckie. In Virgin. Carolina u. Florida auf Bergen. Jul. Aug. Im F. 24.

5. *R. amplexicaulis*. Pers. l. c. Stengelumfassende Rudbeckie. In Luisiana u. Mexico. Jun. Jul. Im F. ⊙.

735. *Cosmea*, Cosmea.

1. *C. bipinnata*. Willd. sp. pl. 3. p. 2250. Doppeltgefiederte Cosmea. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

Cosmus bipinnatus. Pers. l. c.

2. *C. parviflora*. Willd. l. c. 3. p. 2251. Kleinblumige Cosmea. In Mexico. Jun. — Aug. Im F. ○.
Cosmus parviflor. Pers. l. c.
Coreopsis parviflora. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 65. t. 374.

736. *Coreopsis*, Wanzenblume.

1. *C. ferulaefolia*. Pers. l. c. Peitschenkrautblättrige Wanzenblume. In Mexico. Nov. Dec. Ch. 24.

2. *C. verticillata*. Pers. l. c. Wirtelblättrige Wanzenblume. In Virgin. Jul. Aug. Im F. 24.

3. *C. tenuifolia*. Pers. l. c. Feinblättrige Wanzenblume. In Carolina. Jul. Aug. Im F. 24.

4. *C. tripteris*. Pers. l. c. 2. p. 478. Dreyblättrige Wanzenblume. Auf hohen Bergen in Virgin. u. Carolina. Jul. Aug. Im F. 24.

5. *C. auriculata*. Pers. l. c. Geöhrte Wanzenblume. Auf Bergen in Virginien u. Carolina. Jun. — Aug. Im F. 24.

737. *Pallasia*, Pallasie.

1. *P. grandiflora*. Willd. sp. pl. 3. p. 2261. Grossblumige Pallasie. In Mexico. Jul. Aug. Ch. 5.
Encelia halimifolia. Pers. l. c. 2. p. 479.

738. *Gorteria*, Gorterie.

1. *G. rigens*. Pers. l. c. 2. p. 480. Liegende Gorterie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 5.

2. *G. pectinata*. Pers. l. c. Kammförmige Gorterie. Am Cap. Jul. Ch. 24.

739. Berckheya, Berckhey.

1. *B. incana*. Pers. l. c. Graue Berckhey. In den innern Gegenden am Cap. Jun. — Oct. Ch. ♂.

Gorteria asteroides. Lin. suppl. 381.

2. *B. grandiflora*. Pers. l. c. Grossblumige Berckhey. Auf Bergen am Cap. Aug. — Oct. Ch. ♂.

Atractylis oppositifolia. Lin. mant. 477.

3. *B. squarrosa*. Pers. l. c. 2. sp. 481. Sparige Berckhey. An den Meeresküsten am Cap. Novemb. Decemb. Ch. ♂.

Gorteria squarrosa, Lin. sp. pl. p. 1284.

740. Centaurea, Flockenblume.

1. *C. moschata*. Pers. l. c. Bisamduftende Flockenblume. In Griechenland. Jun. Jul. Im F. ○.

2. *C. suaveolens*. Pers. l. c. Wohlriechende Flockenblume. Im Orient. Jun. Jul. Im F. ○.

3. *C. ruthenica*. Pers. l. c. 2. p. 482. Russische Flockenblume. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 24.

4. *C. phrygia*. Pers. l. c. Phrygische Flockenblume. Auf waldigen Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz u. Finnland. Jun. Jul. Im F. 24.

5. *C. axillaris*. Wild. sp. pl. 3. p. 2290. Seitenblühige Flockenblume. Auf Bergen in Oesterr. Ungarn, der Schweiz u. Südfrankr. May — Jul. Im F. 24..

C. seusana. Pers. l. c. 2. p. 483.

6. *C. montana*. Pers. l. c. Berg-Flockenblume.
Auf Bergen in Oesterr. Deutschl. der Schweiz. Jun.
Jul. Im F. 2.

7. *C. ragusina*. Pers. l. c. Ragusische Flocken-
blume. In Candien u. zu Epidaurus. Jun. Jul. K.H. 2.

8. *C. Cineraria*. Pers. l. c. Aschenfarbige Flo-
ckenblume. In Ital. Jun. Jul. K. H. 2.

9. *C. glastifolia*. Pers. l. c. 2. p. 485. Spreu-
kelchige Flockenblume. Im Orient u. in Sibirien.
Jun. Jul. Im F. 2.

10. *C. sonchifolia*. Pers. l. c. Gänsedistelblät-
trige Flockenblume. Am Mittelländischen Meer-
esstrande. Jun. — Aug. K. H. 2.

11. *C. ferox*. Pers. l. c. Vielstachlige Flo-
ckenblume. In der Barbarey. Jun. — Aug. K. H. 2.

12. *C. Calcitrapa*. Pers. l. c. 2. p. 486. Cal-
citrapen-Flockenblume. Im südlicher. Eur. Jun.
— Aug. Im F. ◎.

13. *C. napifolia*. Pers. l. c. Rübenblättrige
Flockenblume. In Candien u. der Barbarey. Jun.
Jul. Im F. ◎.

NECESSARIA.

741. *Silphium*, *Silphium*.

1. *S. therebinthinaceum*. Pers. l. c. 2. p. 489.
Therebinthenartiges Silphium. In Nordamer.
Jul. Aug. Im F. 2.

2 *S. perfoliatum*. Pers. l. c. Durchwachse-
nes Silphium. In Nordamer. Jul. Aug. Im F. 2.

3. *S. connatum*. Pers. l. c. Verwachsenes
Silphium. In Nordamer. Jul. Ang. Im F. 2.

742. Polymnia, Polymnie.

1. *P. Uvedalia*. Pers. l. c. 2. p. 491. Carolinische Polymnie. In Virgin. Carolin. u. Mexico. Aug. Sept. K. H. 24.

743. Calendula, Ringelblume.

1. *C. officinalis*. Pers. l. c. 2. p. 492. Gemeine Ringelblume. In Südeur. Jun. — Oct. Im F. ⊙.

2. *C. pluvialis*. Pers. l. c. Regen-Ringelblume. Am Cap. Jun. — Aug. Im F. ⊙.

3. *C. hybrida*. Pers. l. c. Bastard-Ringelblume. Am Cap. Jun. Jul. Im F. ⊙.

4. *C. graminifolia*. Pers. l. c. Grasblättrige Ringelblume. Am Cap. März — Sept. Ch. ℥.

5. *C. Tragus β flaccida*. Pers. l. c. Grossblättrige Ringelblume mit schlaffen Blättern. Am Cap. May — Aug. Ch. ℥.

6. *C. chrysanthemifolia*. Pers. l. c. Wucherblumenblättrige Ringelblume. März — Jun. Ch. ℥.

7. *C. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Ringelblume. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ℥.

744. Arctotis, Bährenohr.

1. *A. acaulis*. Pers. l. c. 2. p. 493. Stengelloses Bährenohr. Am Cap wie alle folgende. Jan. Jul. Ch. ℥.

2. *A. tricolor*. Pers. l. c. Dreyfarbiges Bährenohr. Jun. Jul. Ch. ℥.

- 18
3. *A. glaucophylla*. Pers. l. c. Graublättriges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 24.
 4. *A. rosea*. Pers. l. c. Rosenfarbiges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 25.
 5. *A. decumbens*. Pers. l. c. Liegendes Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 24.
 6. *A. angustifolia*. Pers. l. c. Schmalblättriges Bärenohr. Apr. — Jun. Ch. 25.
 7. *A. flammea*. Jacq. fragm. bot. p. 41. n. 141. t. 47. f. 1. Feuerrothes Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 25.
 8. *A. decurrents*. Pers. l. c. Ablaufendes Bärenohr. März — Jun. Ch. 25.
 9. *A. auriculata*. Pers. l. c. Geöhrtes Bärenohr. Jun. — Aug. 25.
 10. *A. melanocycla*. Willd. enum. 2. p. 937. Schwarzzirkliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 25.
 11. *A. chrysocycla*. Hort. bot. vindob. Gelbzirkliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 25.
 12. *A. aenea*. Jacq. eclog. fasc. 6. p. 77. t. 52. Erzfärbiges Bärenohr. May, Jun. Ch. 25.
 13. *A. aspera*. Pers. l. c. 2. p. 494. Scharfblättriges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 25.
 14. *A. elatior*. Pers. l. c. Hochstieliges Bärenohr. Jun. Jul. Ch. 25.
 15. *A. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiges Bärenohr. Jun. — Aug. Ch. 25.
 16. *A. cuprea*. Pers. l. c. Kupferfarbiges Bärenohr. May — Jul. Ch. 25.

17. *A. squarrosa*. Pers. l. c. Sparriges Eärenohr. May — Jul. Ch. ♂.

β. floribus pallidioribus. Mit blässeren Blüthen.

745. Arctotheca, Bärenbüchse.

1. *A. repens*. Pers. l. c. 2. p. 495. Kriechende Bärenbüchse. Am Cap. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Ch. 24.

Arctotis repens. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 31. t. 306.

746. Osteospermum, Beinsame.

1. *O. spinosum*. Pers. l. c. Dorniger Beinsame. Am Cap. Sept. Oct. Ch. ♂.

2. *O. pisiferum*. Pers. l. c. Erbsentragender Beinsame. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

3. *O. moniliferum*. Pers. l. c. Halsbandförmiger Beinsame. Am Cap. Apr. — Jul. Ch. ♂.

4. *O. coeruleum*. Pers. l. c. Blauer Beinsame. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ♂.

O. pinnatifidum. L'Herit. stirp. nov. 11. t. 6.

747. Othonna, Othonne.

1. *O. crassifolia*. Pers. l. c. 2. p. 496. Dickblättrige Othonne. In Africa. Jul. Aug. Ch. ♂.

2. *O. Lingua*. Pers. l. c. Zungenförmige Othonne. Am Cap. Jänn. — März. Ch. 24.

748. Hippia, Hippie.

1. *H. frutescens*. Pers. l. c. 2. p. 497. Strauchartige Hippie. Am Cap. Jun. Jul. Ch. ♂.

— 333 —

749. *Eriocephalus*, Wollenkopf.

1. *E. africanus*. Pers. l. c. Africanischer
Wollenkopf Am Cap. Jul. Aug. Ch. ♂.

750. *Iva*, Ive.

1. *I. frutescens*. Pers. l. c. Strauchartige Ive.
In Nordamer. u. Peru. Sept. Oct. Ch. ♂.

S E G R E G A T A.

751. *Elephantopus*, Elephantenfuß.

1. *E. scaber*. Pers. l. c. 2. p. 498. Rauer
Elephantenfuß. In Ostindien. Jun. Jul. W. H. 24.

752. *Echinops*, Kugeldistel.

1. *E. sphaerocephalus*. Pers. l. c. 2. p. 499.
Gemeine Kugeldistel. In Oesterr. Deutschl. u.
Ital. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *E. Ritro*. Pers. l. c. Glattblättrige Kugel-
distel. Auf Hügeln in Krain, Ital. u. Frankr. Jun.
Jul. Im F. 24.

— 334 —

CLASSIS XIX.

G Y N A N D R I A.

D I A N D R I A.

753. *Cymbidium*, Kahnlippe.

1. *C. aloifolium*. Pers. l. c. 2. p. 515. Aloe-blättrige Kahnlippe. In Malabar. Apr. — Aug. W. H. 24.

Epidendrum aloifolium. Lin. sp. pl. p. 1350.

2. *C. verecundum*. Pers. l. c. 2. p. 516. Fal-tige Kahnlippe. Auf den Bahamainseln. Jun. — Aug. W. H. 24.

Limodorum verecundum. Salish. prod. 9.

Limodorum altum. Jacq. ic. rar. 3. t. 602.

3. *C. altum*. Pers. l. c. Hohe Kahnlippe. In Westind. Jun. — Aug. W. H. 24.

Limodorum altum. Lin. syst. veg. p. 680.

4. *C. ensifolium*. Pers. l. c. 2. p. 517. Schwert-blättrige Kahnlippe. In China u. Japan. Jun. Jul. Ch. 24.

Epidendrum ensifolium. Lin. sp. pl. p. 1352.

754. *Epidendrum*, Baumwurzler.

1. *E. cochleatum*. Pers. l. c. 2. p. 518. Schneckenförmiger Baumwurzler. Auf den Bahamainseln. In Jamaica, Martinique u. Guiana. Nov. Decemb. W. H. 24.

2. *E. ciliare*. Pers. l. c. 2. p. 519. Gefranzter Baumwurzler. In Wäldern zu Martinique. Jun. — Sept. W. H. 24.

3. *E. elongatum*. Pers. l. c. Verlängerter Baumwurzler. In Caracas. Jun. Jul. VV. H. 24.

755. Vanilla, Vanille.

1. *V. aromatica*. Pers. l. c. 2. p. 520. Gewürzhafte Vanille. Im wärmeren Amer. —. VV. H. ½. Epidendrum Vanilla. Lin. sp. pl. p. 1347.

2. Eine noch unbeschriebene Art. v. Caracas.

756. Limodorum, Dingel.

1. *L. Tankervilliae*. Ait. hort. kew 3. p. 302. t. 12. Chinesischer Dingel. In China. Jun. Jul. VV. H. 24.

Limodor. Incarvillei. Pers. l. c..

757. Cypripedium, Frauenschuh.

1. *C. Calceolus*. Pers. l. c. 2. p. 525. Europäischer Frauenschuh. In schattigen Wäldern v. Europa. May. Im F. 24.

HEXANDRIA.

758. Aristolochia, Osterluzey.

1. *A. trilobata*. Pers. l. c. 2. p. 526. Dreylappige Osterluzey. In Jamaica. Jun. Jul. VV. H. ½.

2. *A. panduriformis*. Pers. l. c. Geigenblättrige Osterluzey. In Caracas. —. VV. H. ½.

3. *A. Siphœ*. Pers. l. c. Grossblättrige Osterluzey. Auf den Alleghanischen Bergen von Carolina gegen Florida. May. Im F. ½.

4. *A. glauca*. Pers. l. c. 2. p. 527. Graublättrige Osterluzey. In Portugall u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. ½.

5. *A. oblongata*. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 29. t. 183. Verlängerte Osterluzey. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. 5.

6. *A. sempervirens*. Pers. l. c. Immergrüne Osterluzey. In Candien. Jun. — Aug. K. H. 5.

7. *A. Serpentaria*. Pers. l. c. Arzeneykräftige Osterluzey. In Virginien. Jul. — Sept. K. H. 24.

8. *A. rotunda*. Pers. l. c. Runde Osterluzey. In Ital. Südfrankr. u. Spanien. Jun. Jul. K. H. 24.

9. *A. Clematitis*. Pers. l. c. Gemeine Osterluzey. In Oesterr. Frankr. u. der Tartarey. Jul. Im F. 24.

CLASSIS XX.

M O N O E C I A.

MONANDRIA.

759. Casuarina, Streitkolbenbaum.

1. *C. equisetifolia*. Pers. l. c. 2. p. 531. Indischer Streitkolbenbaum. In Ostind. u. den Inseln des stillen Meeres. März, Apr. W. H. 5.

TRIANDRIA.

760. Tripsacum, Löchergras.

1. *Tr. monostachyon*. Pers. l. c. 2. p. 533. Einähriges Löchergras. In Südcarolina. Jun. Jul. W. H. 24.

761. *Coix*, Thränengras.

1. *C. Lachryma*. Pers. l. c. Hiobs-Thränen-gras. In Ostind. Jul. Aug. W. H. 24.

762. *Comptonia*, Comptonie.

1. *C. asplenifolia*. Pers. l. c. 2. p. 549. Streifenfarrenblättrige Comptonie. In Virginien u. auf hohen Bergen in Carolina. — Ch. 5.
Liquidambar asplenifol. Lin. sp. pl. p. 1418.

763. *Tragia*, Tragie.

1. *Tr. volubilis*. Pers. l. c. Windende Tragie. In Westind. auf Kalkboden. Apr. May. u. Aug.. Sept. W. H. 5.

764. *Hernandia*, Hernandie.

1. *H. sonora*. Pers. l. c. 2. p. 550. Tönen-de Hernandie. In beyden Indien. — W. H. 5.

2. *H. ovigera*. Pers. l. c. Eyertragende Her-nandie. In Ostind. — W. H. 5.

TETRANDRIA.

765. *Aucuba*, Aucube.

1. *A. japonica*. Pers. l. c. Japanische Aucu-be. In Japan. Apr. — Jun. Ch. 5.

766. *Alnus*, Erle.

1. *A. glutinosa*. Pers. l. c. Gemeine Erle. Am Wasser in den nördlichen Theilen von Eur. Asien, Africa u. America. Apr. Im F. ᄁ. *Betula Alnus*. Lin. sp. pl. p. 1394.

β. *laciniata*. Mit zerschlitzten Blättern.

2. *A. incana*. Pers. l. c. Graue Erle. Auf Bergen in Oesterr. Steyerm. Tyrol, Salzb. der Schweiz u. Nordamer. dann in Sandgegenden Preussens u. Lapplands. März. Im F. ᄁ. *Betula incana*. Lin. suppl. 417.

3. *A. serrulata*. Pers. l. c. Hasel-Erle. Von Pensylvan. gegen Carolina zu. Apr. Im F. ᄁ. *Betula serrulata*. Ait. hort kew. 3. p. 338.

767. *Cicca*, Cicca.

1. *C. disticha*. Pers. l. c. 2. p. 451. Zweizeilige Cicca. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ᄁ. *Averrhoa acida*. Lin. sp. pl. p. 613. *Phyllanthus longifolius*. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 36. t. 194.

2. *C.?* Von Madagascar.

768. *Buxus*, Buchsbaum.

1. *B. sempervirens*. Pers. l. c. Gemeiner Buchsbaum. In Südeur. May, Jun. Im F. ᄁ.

β. *arborescens*. Mit baumartigem Wuchse.

γ. — *foliis variegatis*. Mit fleckigen-Blättern.

2. *B. balearica*. Pers. l. c. Balearischer Buchsbäum. Auf den Balearischen Inseln. Jun. K. H. ᄁ.

769. *Pachysandra*, Dickfaden.

1. *P. procumbens*. Pers. l. c. Liegender Dickfaden. Auf den Alleghanischen Bergen in Nordamer. März. Im F. 2.

770. *Diotis*, Doppelohr.

1. *D. ceratoides*. Willd. sp. pl. 4. p. 368. Orientalisches Doppelohr. In Mähren, der Tarta-rey, Armenien u. dem glücklichen Arabien. Jul. Aug. Im F. 5.

Ceratospermum papposum. Pers. l. c.

Axyris Ceratoides. Lin. sp. pl. p. 1389.

771. *Urtica*, Nessel.

1. *U. pilulifera*. Pers. l. c. 2. p. 552. Rö-mische Nessel. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ④.

2. *U. crassifolia*. Pers. l. c. Dickblättrige Nessel. Im wärmer. Amer. ? May — Jul. W. H. 5.

3. *U. cannabina*. Pers. l. c. 2. p. 553. Hanf-blättrige Nessel. In Sibirien. Jun. Jul. Im F. 2.

4. *U. canadensis*. Pers. l. c. 2. p. 554. Ca-nadische Nessel. In Canada u. Sibirien. Jul. Aug. Im F. 2.

5. *U. nivea*. Pers. l. c. 2. p. 555. Schneeweisse Nessel. In China auf Mauern. Jul. Ch. 2.

6. *U. caracasana*. Pers. l. c. Caracasanische Nessel. Zu Caracas. Jun. — Aug. W. H. 5.

7. *U. baccifera*. Pers. l. c. Beerentragende Nessel. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. W. H. 5.

— 340 —

772. Parietaria, Glaskraut.

1. *P. officinalis*. Pers. l. c. Gemeines Glas-kraut. In Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

2. *P. cretica*. Pers. l. c. Candisches Glas-kraut. In Candien u. am Caspischen Meere. Jun. Jul. Im F. ⊗.

773. Boehmeria, Böhmerie.

1. *B. cylindrica*. Pers. l. c. 2. p. 556. Walzen-ährige Böhmerie. In Nordamer. an feuchten Plätzen u. in Jamaica. Sept. — Dec. Ch. 24.
Urtica cylindrica. Lin. sp. pl. p. 1396.

2. *B. ramiflora*. Pers. l. c. Astblüthige Böhmerie. Zu Jamaica u. Martinique. May, Jun. W.H. ½.
Caturus ramillorus. Lin. mant. 127.

3. *B. rubescens*. Jacq. fragm. bot. p. 8. n. 30. t. 5. f. 1. Röthliche Böhmerie. Zu Teneriffa auf waldigen feuchten Bergen. Jun. Jul. K. H. ½.
Boehmeria arborea. Pers. l. c.
Parietaria arborea. Ait. hort. kew. 3. p. 429.

774. Dorstenia, Dorstenie.

1. *D. Contrajerva*. Pers. l. c. 2. p. 557. Warmtreibende Dorstenie. In Südamer. Jul. Aug. W. H. 24.

775. Morus, Maulbeere.

1. *M. alba*. Pers. l. c. Weisse Maulbeere. In China u. Persien. May. Im F. ½.

2. *M. tartarica*. Pers. l. c. Tartarische Maulbeere. An der Wolga. May. Im F. ♂.

3. *M. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Maulbeere. In Südeuropa u. Persien. May. Im F. ♂.

4. *M. rubra*. Pers. l. c. 2. p. 558. Rothe Maulbeere. In Canada u. Florida. May. Im F. ♂.

5. *M. mauritiana*. Pers. l. c. Scharfblättrige Maulbeere. Auf der St. Moritzinsel. Jun. Jul. W. H. ♂.

PENTANDRIA.

776. Ambrosia, Ambrosie.

1. *A. peruviana*. Pers. l. c. 2. p. 559. Peruvianische Ambrosie. In Peru. Jun. — Aug. Ch. 24.

777. Amaranthus, Amaranth.

1. *A. tricolor*. Pers. l. c. Dreyfarbiger Amaranth. In Ostind. China. Jul. Aug. Im F. ☽.

2. *A. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbiger Amaranth. In China? Jul. Aug. Im F. ☽.

3. *A. tristis*. Pers. l. c. 2. p. 560. Trauriger Amaranth. In Ostind. u. China. Jun. — Aug. Im F. ☽.

4. *A. lividus*. Pers. l. c. Braunblättriger Amaranth. In Virgin. Jul. Aug. Im F. ☽.

5. *A. viridis*. Pers. l. c. Grüner Amaranth. In Jamaika u. Brasilien. Jun. — Aug. Im F. ☽.

6. *A. sanguineus*. Pers. l. c. Blutfarbiger Amaranth. Auf den Bahamainseln. Jul. Aug. Im F. ☽.

7. *A. caudatus*. Pers. l. c. Geschwänzter Amaranth. In Peru, Persien u. Russland, Jun. Jul. Im F. ◎.

POLYANDRIA.

778. Begonia, Begonie.

1. *B. nitida*. Pers. l. c. 2. p. 564. Glänzende Begonie. Auf Bergen zu Jamaica. Sept. W. H. ℥.

2. *B. odorata*. Willd. enum. suppl. p. 64. Wohlriechende Begonie. —. Jul. Aug. W. H. ℥.

3. *B. dichotoma*. Pers. l. c. Gabelästige Begonie. In sumpfigen Wäldern zu Caracas. Apr. — Aug. W. H. ℥.

4. *B. stipulacea*. Pers. l. c. Afterblättrige Begonie. —. März, Apr. W. H. ℥.

5. *B. acuminata*. Pers. l. c. Zugespitzte Begonie. Auf Bergen in Jamaica. Apr. — Aug. W. H. ℥.

6. *B. hirsuta*. Pers. l. c. Rauhe Begonie. Auf Felsen zu Guiana. März. — Aug. W. H. 24.

7. *B. discolor*. Hort. parisiensis. Zweyfarbige Begonie. —. Jun. — Sept. W. H. 24.

779. Amirola, Amirole.

1. *A. nitida*. Pers. l. c. 2. p. 565. Glänzende Amirole. In Peru. Jul. Ch. ℥.

780. Ailanthus, Götterbaum.

1. *A. glandulosa*. Pers. l. c. Drüsiger- Götterbaum. In China. Jul. Im F. ♂.

781. Juglans, Wallnuss.

1. *J. regia*. Pers. l. c. 2. p. 566. Gemeine Wallnuss. In Persien. Apr. May. Im F. ♂.

2. *J. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Wallnuss. In Pensylvan. u. Florida. May. Im F. ♂.

3. *J. cinerea*. Pers. l. c. Graue Wallnuss. Am Meeresstrande in Canada, Pensylvan. u. den Alleghanischen Bergen. May. Im F. ♂.

4. *J. alba*. Pers. l. c. Weisse Wallnuss. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. May, Im F. ♂.

782. Quercus, Eiche.

1. *Q. Phellos*. Pers. l. c. 2. p. 567. Weiden-Eiche. In Nordamer. —. Im F. ♂.

2. *Q. maritima*. Pers. l. c. Meeresstrands-Eiche. Am Meeresstrande in Carolina. —. K. H. ♂.

3. *Q. virens*. Pers. l. c. Grünende Eiche. In Virgin. am Meeresstrande u. gegen Florida zu. May. Im F. ♂.

4. *Q. Ilex*. Pers. l. c. 2. p. 568. Stein-Eiche. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. ♂.

5. *Q. Suber*. Pers. l. c. Kork-Eiche. In Südeur. u. Nordafr. May. K. H. ♂.

6. *Q. coccifera*. Pers. l. c. Kermes-Eiche. In Südeur. u. im Orient. —. K. H. ♂.

7. *Q. Prinus.* Pers. l. c. Castanienblättrige Eiche. In Pensylv. Carol. Virgin. u. Florida. —. Im F. ♀.

8. *Q. tinctoria.* Pers. l. c. Quercitronen-Eiche. In Pensylvan. u. auf hohen Bergen in Carolina u. Florida. —. Im F. ♀.

9. *Q. rubra.* Pers. l. c. Rothe Eiche. In Canada u. Carolina. —. Im F. ♀.

10. *Q. coccinea.* Pers. l. c. Scharlach-Eiche. In Virgin. u. Carol. —. Im F. ♀.

11. *Q. Aegilops.* Pers. l. c. 2. p. 570. Knopf-Eiche. In Span. u. im Orient. —. Im F. ♀.

12. *Q. alba.* Pers. l. c. Weisse Eiche. In Canada bis gegen Florida. —. Im F. ♀.

13. *Q. Robur.* Pers. l. c. Gemeine Eiche. In Eur. May. Im F. ♀.

14. *Q. pedunculata.* Pers. l. c. Stiel-Eiche. In Eur. May. Im F. ♀.

15. *Q. pubescens.* Pers. l. c. Weichhaarige Eiche. In Oesterr. Ungarn, der Krimm, in Frankr. u. England. May. Im F. ♀.

16. *Q. austriaca.* Pers. l. c. Oesterreichische Eiche. (Cerr-Eiche). In Oesterr. Ungarn. u. Krain. May. Im F. ♀.

783. *Corylus*, Haselnuss.

1. *C. Avellana.* Pers. l. c. Gemeine Haselnuss. In Eur. u. Asien. März. Im F. ♀.

2. *C. tubulosa.* Pers. l. c. Lamberts-Haselnuss. In Südeur. März. Im F. ♀.

— 345 —

3. *C. rostrata*. Pers. l. c. Geöhrte Haselnuß.
In Canada u. Florida. März, Apr. Im F. ♂.

4. *C. columna*. Pers. l. c. Byzantinische Hasel-
nuß. Bey Constantinopel. März. Im F. ♂.

784. *Fagus*, Buche.

1. *F. sylvatica*. Pers. l. c. Roth-Buche. In
Eur. May. Im F. ♂.

β. *sanguinea*. Mit blutrothen Blättern.

γ. *asplenifolia*. Mit Streifenfarn Blättern.

785. *Castanea*, Castanie.

1. *C. vesca*. Pers. l. c. Aechte Castanie. In
Südeur. Jun. Im F. ♂.

Fagus Castanea. Lin. sp. pl. 1416.

786. *Betula*, Birke.

1. *B. alba*. Pers. l. c. 2. p. 572. Weisse Bir-
ke. Im nördlicher. Eur. u. Asien. März, Apr. Im F. ♂.

β. *pendula*. Mit hängenden Aesten.

2. *B. populifolia*. Pers. l. c. Pappel-Birke.
In Nordamer. Apr. Im F. ♂.

3. *B. davurica*. Pers. l. c. Davurische Birke.
In Ostsibirien u. Canada. Apr. Im F. ♂.

4. *B. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Birke. In
Canada u. Virgin. Apr. Im F. ♂.

5. *B. papyracea*. Pers. l. c. Papier-Birke.
In Nordamer. Apr. Im F. ♂.

6. *B. lenta*. Pers. l. c. Zähe Birke. In Nord-
amer. Apr. Im F. ♂.

7. *B. nana*. Pers. l. c. Zwerp-Birke. Auf Alpen in Eur. May. Im F. ♂.

8. *B. fruticosa*. Pers. l. c. Strauchartige Birke. In Ostsibirien u. auf den Oesterreich. u. Bay-er'schen Alpen. Apr. May. Im F. ♂.

9. *B. pumila*. Pers. l. c. Niedrige Birke. In Nordamer. Apr. May. Im F. ♂.

787. *Carpinus*, Hainbuche.

1. *C. Betulus*. Pers. l. c. Gemeine Hainbu-
che. In Hainen v. Eur. May. Im F. ♂.

2. *C. orientalis*. Pers. l. c. 2 p. 573. Orienta-
lische Hainbuche. In Krain, Sclavon. dem Banat
u. in Armenien. May. Im F. ♂.

788. *Ostrya*, Hopfenbuche.

1. *O. vulgaris*. Pers. l. c. Gemeine Hopfen-
buche. In Südeur. May. Im F. ♂.

Carpinus Ostrya. Lin. sp. pl. p. 1417.

2. *O. virginica*. Pers. l. c. Virginische Ho-
pfenbuche. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. May.
Im F. ♂.

Carpinus virginiana. Ait. hort. kew. 3. p. 363.

789. *Platanus*, Platanus.

1. *Pl. orientalis*. Pers. l. c. Morgenländi-
scher Platanus. Im Orient. May, Jun. Im F. ♂.

2. *Pl. acerifolia*. Pers. l. c. Ahornblättriger
Platanus. Im Orient. May, Jun. Im F. ♂.

3. *Pl. occidentalis*. Pers. l. c. Abendländi-
scher Platanus. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♂.

790. Liquidambar, Amberbaum.

1. *L. Styaciflua*. Pers. l. c. Fließender Amberbaum. In Nordamer. März. Apr. Im F. h.

791. Salisburia, Salisburie.

1. *S. adianthifolia*. Smith act. soc. lin. lond.
3. p. 330. Krullfarrenblättrige Salisburie. In Japan. — . Im F. h.
Ginkgo biloba. Pers. l. c.

792. Arum, Aron.

1. *A. Dracunculus*. Pers. l. c. 2. p. 574.
Punctirter Aron. In Südeur. May, Jun. Im F. 2f.
2. *A. Dracontium*. Pers. l. c. Vielblättriger Aron. In Nordamer. May, Jun. Im F. h.
3. *A. Colocasia*. Pers. l. c. Aegyptischer Aron. In Candien, Cypern, Syrien u. Aegypten. May, Jun. Ch. 2f.
4. *A. divaricatum*. Pers. l. c. Ausgebreiteter Aron. In Ostind. Apr. — Aug. W. H. 2f.
5. *A. maculatum*. Pers. l. c. Gemeiner Aron. Im südlicher. Eur. Apr. May. Im F. 2f.
6. *A. Arisarum*. Pers. l. c. Kappenförmiger Aron. In Ital. Portug. Span. u. der Provence. Jun. K. H. 2f.
7. *A. pinnatum*. Hort. paris.

793. Caladium, Caladium.

1. *C. helleborifolium*: Pers. l. c. 2. p. 575.
Christwurzblättriges Caladium. In Wäldern zu Martinique u. Caracas. Jun. Jul. W. H. 2f.
Arum helleborifol. Jacq. ic. rar. 3. t. 613. Collect.
3. p. 217.

2. *C. pinnatifidum*. Pers. l. c. Halbgesieder tes Caladium. In schattigen Wäldern zu Caracas. März — Aug. VV. H. ♂.

Arum pinnatifid. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 31.t.187.

3. *C. bicolor*. Pers. l. c. Zweyfarbiges Cala dium. in Brasilien. Jun. Jul. W. H. ♂.

Arum bicolor. Ait. hort. kew. 3. p. 316.

4. *C. sagittifolium*. Pers. l. c. Pfeilblättri gies Caladium. In Brasilien, Jamaïca u. zu Bar bados. Jun. Jul. VV. H. ♀.

Arum sagittifol. Lin. sp. pl. p. 1369.

5. *C. belophyllum*. Willd. enum. 2. p. 987. Wurfspießblättriges Caladium. — . — . VV. H. ♂.

6. *C. sequinum*. Pers. l. c. Giftiges Caladi um. Auf den Caraibischen Inseln an feuchten Stel len. Jun. Jul. VV. H. ♂.

Arum sequinum. Lin. sp. pl. p. 1371.

7. *C. xanthorrhizon*. Pers. l. c. Gelbwurz liges Caladium. — . Apr. VV. H. ♂.

Arum xanthorrh. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 32.t.188.

8. *C. arborescens*. Pers. l. c. Baumartiges Caladium. In Westind. Jun. Jul. VV. H. ♂.

Arum arboresc. Lin. sp. pl. p. 1371.

9. *C. grandifolium*. Pers. l. c. Grossblättri gies Caladium. Zu Caracas. Bl. den ganzen Sommer hindurch. VV. H. ♂.

Arum grandifol. Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 34.t.189.

10. *C. lacerum*. Pers. l. c. Zerschlitztes Caladium. Zu Caracas u. Jamaïca ? Jan. Jul. VV. H. ♂.

Arum lacerum. Jacq. hort. schoenbr. 4.p.35.t.468.

11. *C. tripartitum*. Pers. l. c. Dreytheiliges Caladium. Zu Caracas. May — Jul. VV. H. ♂.

Arum tripartitum. Jacq. hort. schoenbr. 2.p.33.t.190.

12. *C. auritum*. Pers. l. c. Geöhrtes Caladium. In Jamaica, Hispaniola u. Caracas. Aug. — Oct. W. H. \ddagger .

Arum auritum. Lin. sp. pl. p. 1371.

794. *Caryota*, Brennpalme.

1. *C. urens*. Pers. l. c. 2. p. 576. Ostindische Brennpalme. In Ostind. — . W. H. \ddagger .

MONADELPHIA.

795. *Pinus*, Fichte.

1. *P. sylvestris*. Pers. l. c. 2. p. 578. Gemeine Fichte. (Weifs - Föhre). Im nördlicher. Eur. May. Im F. \ddagger .

2. *P. Pumilio*. Pers. l. c. Krummholz-Fichte. Auf den Oesterr. Salzh. Krainer sch. Schlesischen Alpen u. den Carpathen. May, Jun. Im F. \ddagger .

3. *P. Laricio*. Pers. l. c. Korsische Fichte. In Corsica auf Bergen. — . K. H. \ddagger .

4. *P. Pinaster*. Pers. l. c. Italiänische Fichte. (Schwarz. Föhre). In Oesterr. u. Südeur. May, Jun. Im F. \ddagger .

5. *P. maritima*. Pers. l. c. Meerstrands-Fichte. Am Meerstrande in Südeur. May. K. H. \ddagger .

6. *P. Pinea*. Pers. l. c. Genießbare Fichte. (Pignole). In Ital. Südfrankr. u. Span. May. K.H. \ddagger .

7. *P. Taeda*. Pers. l. c. Dreynadlige Fichte. In Virgin. u. Carol. May, Jun. Im F. \ddagger .

8. *P. Cembra*. Pers. l. c. Zirbel-Fichte. Auf Alpen in Südeur. u. Sibir. May. K. H. \ddagger .

9. *P. Strobus.* Pers. l. c. 2. p. 579. Weymouths-Fichte. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♂.

10. *P. Cedrus.* Pers. l. c. Ceder-Fichte. Auf dem Libanon, Taurus, u. Amanus. May, Jun. K.H. ♂.

11. *P. microcarpa.* Pers. l. c. Kleinfrüchtige Fichte. An der Hudsondsbay. May, Jun. Im F. ♂.
P. laricina. Du Roi harbk. 2. p. 83.

12. *P. Larix.* Pers. l. c. Lerchen-Fichte. Auf Alpen im südlicher. Eur. May, Jun. Im F. ♂.

13. *P. Picea.* Pers. l. c. Tannen-Fichte. (Gemeine Tanne). Auf Alpen u. Bergen in Eur. May, Jun. Im F. ♂.

14. *P. Balsamea.* Pers. l. c. Balsam-Fichte. In Virgin. u. Canada. May, Jun. Im F. ♂.

15. *P. alba.* Pers. l. c. Weisse Fichte. In Nordamer. May, Jun. Im F. ♂.
Pinus canadensis. Du Roi harbk. 2. p. 124.

16. *P. taxifolia.* Pers. l. c. Nootka-Fichte. An den östlichen Meeresküsten v. Nordamer. —. Im F. ♂.

17. *P. canadensis.* Pers. l. c. Hemlocks-Fichte. In Nordamer. May, Jan. Im F. ♂.
P. americana. Du Roi harbk. 2. p. 107.

18. *P. Abies.* Pers. l. c. Edel-Fichte. (Weiss-Tanne). Im nördlichen Eur. u. Asien. May, Jun. Im F. ♂.

796. *Thuja*, Lebensbaum.

1. *Th. occidentalis.* Pers. l. c. 2. p. 580. Gemeiner Lebensbaum. In Canada u. Sibirien. Apr. Jan F. ♂.

2. *Th. orientalis*. Pers. l. c. Morgenländischer Lebensbaum. In China u. Japan. Apr. May. Im F. ♂.

797. *Cupressus*, Cypresse.

1. *C. sempervirens*. Pers. l. c. Gemeine Cypresse. In Candien, Ital. u. Span. Apr. K. H. ♂.

2. *C. horizontalis*. Mit wagerechten Aesten.

2. *C. disticha*. Pers. l. c. Zweyzellige Cypresse. In Virgin. u. Carol. —. Im F. ♂.

3. *C. thyoides*. Pers. l. c. Weisse Cypresse. In Canada. —. Im F. ♂.

798. *Podocarpus*, Fußfrucht.

1. *P. elongata*. Pers. l. c. Capische Fußfrucht. Am Cap. —. Ch. ♂.
Taxus elongata. Ait. hort. kew. 3. p. 415.

799. *Acalypha*, Brennkraut.

1. *A. caroliniana*. Pers. l. c. Carolinisches Brennkraut. In Virgin. Florida u. Canada an Flüssen. Jun. Jul. im F. ♂.

2. *A. cuspidata*. Pers. l. c. 2. p. 582. Zugespitztes Brennkraut. Zu Caracas. Aug. — Oct. W. H. ♂.

3. *A. diversifolia*. Pers. l. c. Verschiedenblättriges Brennkraut. Zu Caracas. Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *A. virgata*. Pers. l. c. Ruthenförmiges Brennkraut. Im westlichen Jamaica. Jun. Jul. W. H. ♂.

5. *A. macrostachya*. Pers. l. c. Langähriges Brennkraut. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♂.

6. *A. polystachya*. Pers. l. c. 2. p. 583. Vielähriges Brennkraut. Aug. Sept. W. H. ♂.

7. *A. scabrosa*. Pers. l. c. Scharfes Brennkraut. Auf Kalkfelsen zu Jamaica. Jul. Aug. W. H. ♂.

800. Croton, Croton.

1. *Cr. pungens*. Pers. l. c. 2. p. 585. Stechendes Croton. Zu Caracas. Jul. Aug. W. H. ♂.

2. *Cr. pennicillatum*. Pers. l. c. Pinseldrüsiges Croton. Auf Cuba. Jul. — Oct. W. H. ♂.

3. *Cr. tomentosum*. Hort. paris. Filziges Croton. —. —. W. H. ♂.

4. *Cr. palmatum*. Hort. paris. Handförmiges Croton. —. —. W. H. ♂.

801. Aleurites, Aleurites.

1. *A. moluccana*. Pers. l. c. 2. p. 587. Moluckische Aleurites. Auf den Moluckischen Inseln u. auf Ceylon. —. W. H. ♂.

Jatropha moluccana. Lin. sp. pl. p. 1428.

802. Jatropha, Brechnuss.

1. *J. panduraefolia*. Pers. l. c. Geigenblättrige Brechnuss. Auf Cuba. Apr. — Aug. W. H. ♂.

2. *J. Curcas*. Pers. l. c. Schwarze Brechnuss. Im wärmeren Amer. —. W. H. ♂.

3. *J. multifida*. Pers. l. c. Vieltheilige Brechnuss. Im wärmeren Amer. Jun., Jul. W. H. ♂.

4. *J. napaeifolia*. Pers. l. c. Zerschlitztblättrige Brechnuß. Auf den Antillen. Jun. Jul. W. H. ♂.

803. *Ricinus*, Wunderbaum.

1. *R. communis*. Pers. l. c. Gemeiner Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. Im F. ☽.

2. *R. viridis*. Pers. l. c. Grüner Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. Im F. ☽.

3. *R. africanus*. Pers. l. c. Africanischer Wunderbaum. In Nordafr. Jul. Aug. Ch. ♂.

4. *R. inermis*. Pers. l. c. 2. p. 588. Glattfrüchtiger Wunderbaum. In Ostind. Jul. Aug. W. H. ♂.

804. *Hura*, Sandbüchsenbaum.

1. *H. crepitans*. Pers. l. c. Gemeiner Sandbüchsenbaum. In Mexico, Guiana u. Jamaica. Jul. Aug. W. H. ♂.

805. *Hippomane*, Mancinellenbaum.

1. *H. Mancinella*. Pers. l. c. 2. p. 589. Gemeiner Mancinellenbaum. März, Apr. W. H. ♂.

2. *H. biglandulosa*. Hort. paris. Zweydrüsiger Mancinellenbaum. —. —. W. H. ♂.

806. *Phyllanthus*, Blattblume.

1. *Ph. nutans*. Pers. l. c. 2. p. 590. Hängende Blattblume. An Flüssen in Südamer. May — Aug. W. H. ♂.

2. *Ph. acuminatus*. Pers. l. c. Zugespitzte Blattblume. Zu Cayenne. Apr. May. W. H. ♂.

3. *Ph. Niruri*. Pers. l. c. Weisse Blattblume. In Ostind. u. Südamer. Jun. — Aug. W. H. ♂.

4. *Ph. falcatus*. Pers. l. c. 2. p. 591. Sichelblättrige Blattblume. Auf den Bahamainseln. Jun. — Oct. W. H. ♂.
Xylophylla falcata. Swartz prodr. 28.

5. *Ph. Arbuscula*. Willd. enum. 2. p. 996. Baumartige Blattblume. In Jamaica. May — Aug. W. H. ♂.

Phyllanthus speciosus. Pers. l. c.

6. *Ph. Epiphyllanthus*. Lin. sp.pl. p. n. 1392. Schmalblättrige Blattblume. In Jamaica. Apr. — Oct. W. H. ♂.

Phyllanthus angustifolius. Pers. l. c.

Xylophylla angustifolia Swartz prodr. 28.

807. *Xylophylla*, Holzblatt.

1. *X. elongata*. Jacq. hort. schoenbr. 3. p. 53. t. 348. Langblättriges Holzblatt. In Westind. Apr. — Oct. W. H. ♂.

2. *X. ramiflora*. Ait hort. kew. 1.p. 376. Winkelblättriges Holzblatt. In Sibirien. May — Jul. K. H. ♂.
Phyllanthus ramiflor. Pers. l. c.

3. *X. obovata*. Willd. enum. 2. p. 329. Verkehrtey förmiges Holzblatt. —. —. W. H. ♂.
Phyllanthus obovatus. Pers. l. c. 2. p. 589.

808. Heritiera, Heritiere.

1. *H. littoralis*. Pers. l. c. Ufer-Heritiere.
Auf Ceylon. —. VV. H. ♂.

809. Momordica, Balsamapfel.

1. *M. Balsamina*. Pers. l. c. 2. p. 592.
Gemeiner Balsamapfel. In Ostind. Jun. VV. H. ○.

2. *M. Charantia*. Pers. l. c. Gurkenartiger
Balsamapfel. In Ostind. Jun. VV. H. ○.

3. *M. cylindrica*. Pers. l. c. 2. p. 593. Wal-
zenförmiger Balsamapfel. Auf Ceylon u. zu Chi-
na. Jun. W. H. ○.

4. *M. Elaterium*. Pers. l. c. Esels-Balsam-
apfel. In Südeur. Jun. Im F. ○.

810. Cucurbita, Kürbis.

1. *C. lagenaria*. Pers. l. c. Flaschen-Kürbis.
Im wärmer. Amer. an feuchten Stellen. Jun. Jul.
Im F. ○.

2. *C. Pepo*. Pers. l. c. Garten-Kürbis. Im
Orient. Jun. Jul. Im F. ○.

3. *C. verrucosa*. Pers. l. c. Warzen-Kürbis.
—. Jun. Jul. Im F. ○.

4. *C. Melopepo*. Pers. l. c. Turban-Kürbis.
—. Jun. Jul. Im F. ○.

5. *C. Citrullus*. Pers. l. c. Wassermelonen-
Kürbis. In Apulien, Calabrien u. Sicilien. Jun.
Jul. Im F. ○.

811. Cucumis, Gurke.

1. *C. prophetarum*. Pers. l. c. 2. p. 594.
Propheten-Kürbis. In Arabien u. Africa. Jun.
Jul. Im F. ◎.
2. *C. Anguria*. Pers. l. c. Eyzörmige Gurke.
In Jamaica. Jun. Jul. W. H. ◎.
3. *C. Melo*. Pers. l. c. Melonen-Gurke. In
der Kalmückey. Jun. Jul. W. H. ◎.
4. *C. Chate*. Pers. l. c. Arabische Gurke.
In Arabien u. Aegypten. Jun. Jul. W. H. ◎.
5. *C. anguinus*. Pers. l. c. Schlangen-Kür-
bis. In Ostind. Jun. Jul. W. H. ◎.
6. *C. sativus*. Pers. l. c. Gemeine Gurke. In
der Tartarey u. Ostind. Jun. — Aug. Im F. ◎.

812. Bryonia, Zaunrübe.

1. *Br. alba*. Pers. l. c. 2. p. 595. Schwarzbee-
rige Zaunrübe. In Eur. Jun. Jul. Im F. 2.
2. *Br. dioica*. Pers. l. c. Rothbeerige Zaun-
rübe. In Eur. Jun. Jul. Im F. 2.
3. *Br. dissecta*. Pers. l. c. Feinblättrige Zaun-
rübe. Am Cap. Jun. Jul. Ch. 2.
Bryonia africana. Lin. sp. pl. p. 1438.

813. Sicyos, Haargurke.

1. *S. angulata*. Pers. l. c. Eckige Haargurke.
In Canada u. Pensylvan. Jul. Im F. ◎.

CLASSIS XXI.

DIOECIA.

MONANDRIA.

814. Pandanus, Pandanus.

1. *P. utilis*. Bory de St. Vincent itin. 2. p.
3. Nutzbarer Pandanus. Auf den Inseln Bourbon,
Madagascar u. St. Moritz. —. W. H. h.
P. odoratissima. Jacq. fragm. bot. p. 21. n. 74.
t. 13. et 14. f. 1.

2. *P. humilis*. Pers. l. c. 2. p. 597. Kleiner
Pandanus. Auf der St. Moritzinsel u. den Molu-
cken. —. W. H. h.

DIANDRIA.

815. Vallisneria, Vallisnerie.

1. *V. spiralis*. Pers. l. c. 2. p. 598. Spir-
förmige Vallisnerie. In Wassergräben der Schweiz
Italiens u. Südfrankreichs. Jul. Aug. K. H. 2.

816. Cecropia, Trompetenbaum.

1. *C. peltata*. Pers. l. c. Schildförmiger Trom-
petenbaum. In Wäldern des wärmer. Jamaica u.
Surinam. —. W. H. h.

817. *Fraxinus*, Esche.

1. *Fr. excelsior*. Pers. l. c. 2. p. 604. Gemeine Esche. In Eur. May. Im F. ♂.
 - β. *pendula*. Mit hängenden Aesten.
 - γ. *crispa*. Mit krausen Blättern.
2. *Fr. aurea*. Willd. enum. 2. p. 1059. Goldfarbige Esche. —. May. Im F. ♂.
Fr. excelsior aurea. Pers. l. c.
3. *Fr. simplicifolia*. Willd. arb. 121. Einblättrige Esche. —. May. Im F. ♂.
Fr. excelsior simplicifolia. Pers. l. c.
4. *Fr. parvifolia*. Pers. l. c. Kleinblättrige Esche. Im Orient? May, Im F. ♂.
5. *Fr. americana*. Pers. l. c. Americanische Esche. May. Im F. ♂.
6. *Fr. juglandifolia*. Pers. l. c. Wallnussblättrige Esche. In Nordamer. May, Im F. ♂.
7. *Fr. pubescens*. Pers. l. c. Weichhaarige Esche. In Pensylvan. May. Im F. ♂.
Fr. nigra. Du Roi harbk. ed. 2. t. p. 398.
8. *Fr. sambucifolia*. Pers. l. c. 2. p. 605. Holzunderblättrige Esche. In Canada u. Pensylvanien. May. Im F. ♂.
9. *Fr. caroliniana*. Pers. l. c. Carolinische Esche. In Carolina. May. Im F. ♂.
10. *Fr. rotundifolia*. Pers. l. c. Rundblättrige Esche. In Calabrien u. der Syrmier Gespannschaft in Sclavonien. May. Im F. ♂.

11. *Fr. Ornus*. Lin. sp. pl. p. 1510. Blühende Esche. In Südeur. May. Im F. ḥ.
Ornus europaea. Pers. l. c. 1. p. 9.

818. *Borya*, *Borya*.

1. *B. acuminata*. Pers. l. c. Zugespitzte Borya. In Carolina u. Georgien. — . K. H. ḥ.
Adelia acuminata. Mich. amer. 2. p. 225. t. 48.

TRIANDRIA.

819. *Empetrum*, *Rauschbeere*.

1. *E. nigrum*. Pers. l. c. Schwarze Rauschbeere. Auf Bergen in den kältesten Theilen Europa's. — . Im F. ḥ.

820. *Osyris*, *Osyris*.

1. *O. alba*. Pers. l. c. 2. p. 606. Weisse Osyris. In Südeur. Jun. Jul. K. H. ḥ.

821. *Ficus*, *Feige*.

1. *F. Carica*. Pers. l. c. 2. p. 608. Gemeine Feige. In Südeur. Asien u. Africa. Aug. — Oct. K. H. ḥ.

2. *F. nympaeifolia*. Pers. l. c. Seerosenblättrige Feige. Zu Caracas. — . W. H. ḥ.

3. *F. populifolia*. Pers. l. c. Pappelblättrige Feige. Im glücklichen Arabien. — . W. H. ḥ.

4. *F. religiosa*. Pers. l. c. Heilige Feige. In Ostind. März. Apr. W. H. ḥ.

5. *F. bengalensis*. Pers. l. c. 2. p. 609. Bengalische Feige. In Ostind. Jun. — Aug. W. H. ḫ.

6. *F. venosa*. Pers. l. c. Aderige Feige. In Ostind. ? Jul. — Sept. W. H. ḫ.

7. *F. citrifolia*. Pers. l. c. Citronenblättrige Feige. In Ostind. —. W. H. ḫ.

8. *F. martinicensis*. Pers. l. c. Martinikische Feige. In Westind. —. W. H. ḫ.

9. *F. cordata*. Pers. l. c. Herzblättrige Feige. Am Cap. —. Ch. ḫ.
F. capensis. Hortulan.

10. *F. glandulosa*. Hort. carlsruh. Drüsige Feige. —. Jul. Aug. W. H. ḫ.

11. *F. australis*. Willd. sp. pl. 4. p. 1138. Südliche Feige. In Neuhol. —. Ch. ḫ.
F. rubiginosa. Pers. l. c.

12. *F. stipulata*. Thunb. diss. de Ficub. n. 7. Kletternde Feige. In China u. Japan. Nov. Dec. W. H. ḫ.
F. scandens. Pers. l. c..

13. *F. glaucophylla*. Pers. l. c. 2. p. 610. Graublättrige Feige. —. —. W. H. ḫ.

14. *F. benjamina*. Pers. l. c. Benjamin-Feige. In Ostind. —. W. H. ḫ.

15. *F. pertusa*. Pers. l. c. Durchlöcherte Feige. In Surinam. —. W. H. ḫ.

16. *F. terebrata*. Pers. l. c. Durchbohrte Feige. Auf der St. Moritzinsel. u. in Ostind. —. W. H. ḫ..

17. *F. nitida*. Pers. l. c. Glänzende Feige. In Ostind. —. W. H. ḫ..

— 361 —

18. *F. racemosa*. Pers. l. c. Traubige Feige.
In Ostind. — . W. H. ȳ.

19. *F. mauritiana*. Pers. l. c. 2. p. 611. Erd-
Feige. Auf der St. Moritzinsel u. Bourbon. — .
W. H. ȳ.

F. terragena. Bory de St. Vincent itin. 2. p. 143.

20. *F. oppositifolia*. Roxb. fl. corom. 2. p.
14. t. 124. Paarblättrige Feige. In Ostind. Jun.
— Aug. W. H. ȳ.

F. scabra. Pers. l. c.

TETRANDRIA.

822. Broussonetia, Broussonetie.

1. *Br. papyrifera*. Pers. l. c. 2. p. 612. Pa-
piergebende Broussonetie. In Japan u. den Inseln
des stillen Meeres. May. Im F. ȳ.
Morus papyrifera. Lin. sp. pl. p. 1399.

823. Anthospermum, Amberstrauch.

1. *A. aethiopicum*. Pers. l. c. Gewöhnlicher
Amberstrauch. Am Cap. — . Ch. ȳ.

824. Viscum, Mistel.

1. *V. album*. Pers. l. c. 2. p. 613. Weisse
Mistel. In Eur. schmarotzend auf Bäumen. März,
Apr. Im F. ȳ.

825. Brucea, Brucea.

1. *Br. ferruginea*. Pers. l. c. 2. p. 614. Brau-
ne Brucea. In Abyssinien. Febr. März. W. H. ȳ.

826. Hippophaë, Sanddorn.

1. *H. Rhamnoides*. Pers. l. c. Weidenblättriger Sanddorn. Am Meerestrande in Nord- u. auf Felsen in Südeuropa. May, Jun. Im F. ♂.

2. *H. canadensis*. Pers. l. c. Canadischer Sanddorn. In Canada. Jun. Im F. ♂.

827. Myrica, Gagel.

1. *M. Gale*. Pers. l. c. Gemeiner Gagel. In Südeur. u. Nordamer. May. Im F. ♂.

2. *M. cerifera*. Pers. l. c. Wachsgebender Gagel. In Pensylvan. u. Carolina. Jul. — Sept. K. H. ♂.

3. *M. carolinensis*. Pers. l. c. Carolinischer Gagel. Am Meerestrande in Pensylvan. u. Florida. —. K. H. ♂.

M. pensylvanica. Duham. arb. 2. p. 190. t. 52.

4. *M. Faya*. Pers. l. c. Azorischer Gagel. In Portugall, Madera u. den Azorischen Inseln. Jun. — Aug. K. H. ♂.

5. *M. segregata*. Pers. l. c. Lanzettblättriger Gagel. Im wärmer. Amer. Jul. Aug. Ch. ♂.

6. *M. serrata*. Pers. l. c. Gesägter Gagel. Am Cap. —. Ch. ♂.

M. banksiaefolia. Wendl. collect. pl. 1. p. 70. t. 24.

7. *M. laciniata*. Willd. enum. 2. p. 1012. Schlitzblättriger Gagel. Am Cap. —. Ch. ♂.
M. quercifolia. Jacq. fragm. bot. p. 2. n. 7. t. 1.f.4.

8. *M. quercifolia*. Pers. l. c. Eichenblättriger Gagel. Am Cap. Apr. May. Ch. ♂.

9. *M. cordifolia*. Pers. l. c. (Herzblättriger Gagel. Am Cap. —. Ch. ᄁ.

PENTANDRIA.

828. Pistacia, Pistacie.

1. *P. vera*. Pers. l. c. 2. p. 615. Aechte Pistacie. In Persien, Arabien, Syrien u. Indien. Jun. Jul. K. H. ᄁ.

2. *P. Terebinthus*. Pers. l. c. Terpentin-Pistacie. In Südeur. u. Nordasien. May, Jun. K.H. ᄁ.

3. *P. Lentiscus*. Pers. l. c. Mastix-Pistacie. In Portugall, Spanien, Ital. u. Persien. May, Jun. K. H. ᄁ.

829. Zanthoxylum, Zahnwehholz.

1. *Z. fraxineum*. Pers. l. c. Eschenblättriges Zahnwehholz. In Canada, Pensylvan. u. Virgin. May. Im F. ᄁ.

830. Picramnia, Bitterstrauch.

1. *P. Antidesma*. Pers. l. c. 2. p. 617. Langtraubiger Bitterstrauch. In Jamaica u. Hispaniola. —. W. H. ᄁ.

831. Antidesma, Giftstiller.

1. *A. alexiteria*. Pers. l. c. Glänzender Giftstiller. In Ostind. —. W. H. ᄁ.

832. *Humulus*, Hopfen.

1. *H. Lupulus*. Pers. l. c. 2. p. 618. Gemeiner Hopfen. In Eur. u. Nordamer. May. Im F. 24.

833. *Ceratonia*, Johannisbrodbaum.

1. *C. Siligua*. Pers. l. c. Gemeiner Johannisbrodbaum. In Apulien, Sicilien, Candien, Cypern, Syrien, Palästina u. im ganzen Orient. Jul. Aug. K. H. ȳ.

HEXANDRIA.

834. *Smilax*, Smilax.

1. *Sm. aspera*. Pers. l. c. Stachelblättriger Smilax. In Ital. Span. Palästina u. Virginien. Aug. Sept. K. H. ȳ.

2. *Sm. Sarsaparilla*. Pers. l. c. 2. p. 619. Sarsaparillen-Smilax. In Virgin. —. K. H. ȳ.

3. *Sm. rotundifolia*. Pers. l. c. Rundblättriger Smilax. In Canada u. Pensylvan. März, Apr. K. H. ȳ.

4. *Sm. tamnoides*. Pers. l. c. Schmeerwurziger Smilax. In Carolina, Virgin. u. Pensylvan. Jul. Aug. K. H. ȳ.

835. *Dioscorea*, Yamswurzel.

1. *D. bulbifera*. Pers. l. c. 2. p. 621. Knollenträgende Yamswurzel. In Ostind. Jun. VV. H. 24.

2. *D. villosa*. Pers. l. c. Feinbeharzte Yamswurzel. In Virgin. Florida u. Canada. Jul. Aug. K. H. 24.

835. *Phoenix*, Dattelpalme.

1. *Ph. dactylifera*. Pers. l. c. 2. p. 622. Gemeine Dattelpalme. In der Barbarey, Aegypt. Syrien, Persien u. Ostind. Jul. Aug. W. H. ♂.

2. *Ph. reclinata*. Pers. l. c. Schlaffe Dattelpalme. In den inneren Gegenden am Cap. —. W. H. ♂.

837. *Gleditschia*, Gleditschie.

1. *Gl. triacanthos*. Pers. l. c. 2. p. 623. Dreydornige Gleditschie. Auf den Alleghanischen Bergen in Nordamerica. Jun. Jul. Im F. ♂.

β inermis. Mit stachellosem Stamme.

2. *Gl. monosperma*. Pers. l. c. Einsamige Gleditschie. In Carolina, Georgien u. Florida. Jun. Jul. Im F. ♂.

3. *Gl. horrida*. Pers. l. c. Langdornige Gleditschie. In China. Jun. Jul. Im F. ♂.

O C T A N D R I A.

838. *Populus*, Pappel.

1. *P. alba*. Pers. l. c. Silber-Pappel. In Schweden, England, Frankr, Deutschl. u. Italien. März. Apr. Im F. ♂.

2. *P. tremula*. Pers. l. c. Zitter-Pappel. In Eur. März. Apr. Im F. ♂.

3. *P. laevigata*. Pers. l. c. Glatte Pappel. In Nordamer. März. Apr. Im F. ♂.

4. *P. graeca*. Pers. l. c. Griechische Pappel. Auf den Archipelagischen Inseln. März. Apr. Im F. ᄁ.

5. *P. nigra*. Pers. l. c. Schwarze Pappel. In Mitteleur. März. Apr. Im F. ᄁ.

6. *P. dilatata*. Ait. hort. kew. 3. p. 406. Lombardische Pappel. In Italien. —. Im F. ᄁ.
P. fastigiata. Pers. l. c.

7. *P. monilifera*. Pers. l. c. Canadische Pappel. In Canada u. Pensylvan. —. Im F. ᄁ.

8. *P. angulata*. Pers. l. c. 2. p. 624. Eckige Pappel. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. —. Im F. ᄁ.

9. *P. balsamifera*. Pers. l. c. Balsam-Pappel. In Nordamer. u. Sibirien. —. Im F. ᄁ.
P. Tacamahaca. Mill. dict. n. 6.

839. *Diospyros*, Dattelpflaume.

1. *D. Lotus*. Pers. l. c. Italienische Dattelpflaume. In Languedoc Ital. u. Mauritanien. May, Jun. K. H. ᄁ.

2. *D. virginiana*. Pers. l. c. Virginische Dattelpflaume. In Nordamer. May, Jun. Im F. ᄁ.

3. *D. Ebenum*. Pers. l. c. Ebenholz-Dattelpflaume. In Wäldern auf Ceylon. —. W. H. ᄁ.

4. *D. Kaki*. Pers. l. c. Japanische Dattelpflaume. In Japan. —. Ch. ᄁ.

ENNEANDRIA.

840. *Triplaris*, Dreyling.

1. *Tr. americana*. Pers. l. c. 2. p. 626. Americanischer Dreyling. In Wäldern zu Carthagena u. Gujana. —. W. H. ᄁ.

DODECANDRIA.

841. Carica, Melonenbaum.

1. *C. Papaya*. Pers. l. c. Gemeiner Melonenbaum. In Ostind. May — Aug. VV. H. ♂.
2. *C. cauliflora*. Pers. l. c. Stammlüthiger Melonenbaum. Zu Caracas. Apr. — Oct. VV. H. ♂.
3. *C. microcarpa*. Pers. l. c. Kleinfrächtiger Melonenbaum. Zu Caracas u. Chili. Apr. — Oct. VV. H. ♂.
4. *C. citriformis*. Jacq. eclog. fasc. 7. p. 101. n. 68. 69. Citronenartiger Melonenbaum. In Guinea. Jul. Aug. VV. H. ♂.
5. *C. monoica*. Pers. l. c. Einhäusiger Melonenbaum. — Febr. März. VV. H. ♂.

842. Gymnocladus, Chicot.

1. *G. canadensis*. Pers. l. c. Canadischer Chicot. In Canada. May, Jun. Im F. ♂.
Guilandina dioica. Lin. sp pl. p. 546.

843. Kiggellaria, Kigellarie.

1. *K. africana*. Pers. l. c. Gesägte Kiggellarie. Am Cap. Jul. — Sept. Ch. ♂.

844. Schinus, Molle.

1. *Sch. Molle*. Pers. l. c. Hängender Molle. In Brasilien u. Peru. — Ch. ♂.

845. *Coriaria*, Gerberstrauch.

1. *C. myrtifolia*. Pers. l. c. Myrthenblättriger Gerberstrauch. In Südfrankr. Spanien u. der Barbarey. Jul. Aug. Im F. 24.

DODECANDRIA.

846. *Stratiotes*, Siggel.

1. *St. Aloides*. Pers. l. c. 2. p. 627. Aloe-artige Siggel. In reinen stillen Wässern des nördlicheren Eur. Jun. Jul. Im F. 24.

847. *Euclea*, Euclea.

1. *E. racemosa*. Pers. l. c. Traubenförmige Euclea. Am Cap. Jun. — Aug. Ch. ½.

848. *Datisca*, Strickkraut.

1. *D. cannabina*. Pers. l. c. Hanfartiges Strickkraut. In Candien. Jun. Jul. Im F. 24.

849. *Menispermum*, Mondsame.

1. *M. canadense*. Pers. l. c. Canadischer Mondsame. In Virgin. u. Canada. Jun. Jul. Im F. ½.

2. *M. carolinum*. Pers. l. c. Carolinischer Mondsame. In Nordamer. — K. H. ½.

ICOSANDRIA.

850. *Flacourtie*, Flacourtie.

1. *Fl. Ramontchi*. Pers. l. c. 1. p. 628. Genießbare Flacourtie. Zu Madagascar. — W. H. ½.

POLYANDRIA.

851. Cliffortia, Cliffortie.

1. *Cl. ilicifolia*. Pers. l. c. 2. p. 629. Hülsenblättrige Cliffortie. Am Cap. May — Aug. Ch. ♂.

852. Cycas, Sagopalme.

1. *C. circinalis*. Pers. l. c. 2. p. 631. Gemeine Sagopalme. In Ostind. — . W. H. ♂.

2. *C. revoluta*. Pers. l. c. Zurückgerollte Sagopalme. In Japan u. China. — . W. H. ♂.

853. Zamia, Keulpalme.

1. *Z. media*. Pers. l. c. Mittlere Keulpalme. In Westind. Febr. — May. W. H. ♂.

2. *Z. integrifolia*. Pers. l. c. Ganzblättrige Keulpalme. In St. Domingo u. Ostflorida. Apr. May. W. H. ♂.

3. *Z. longifolia*. Pers. l. c. Langblättrige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. Jun. Jul. W. H. ♂.

4. *Z. lanuginosa*. Pers. l. c. Wollige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. — . W. H. ♂.

5. *Z. horrida*. Pers. l. c. Graublättrige Keulpalme. In den innern Gegenden am Cap. — . W. H. ♂.

MONADELPHIA.

854. Latania, Sammetpalme.

1. *L. rubra*. Pers. l. c. Rothe Sammetpalme. Auf der St. Moritzinsel. — . W. H. ♂.

2. *L. chinensis*. Jacq. fragm. bot. 1. p. 16.
n. 58. t. 11. f. 1. Chinesische Sammetpalme. In
China; cultivirt auf den Inseln Bourbon u. St.
Moritz. —. VV. H. ♂.

L. borbonica. Pers. l. c.

855. Juniperus, Wachholder.

1. *J. Sabina*. Pers. l. c. 2. p. 632. Stinken-
der Wachholder. In Portugall, Ital. u. Sibirien.
May, Jun. Im F. ♂.

2. *J. prostrata*. Pers. l. c. Niederliegender
Wachholder. In Nordamer. —. K. H. ♂.

3. *J. virginiana*. Pers. l. c. Virginischer
Wachholder. In Virgin. u. Carolina. Apr. May.
Im F. ♂.

4. *J. communis*. Pers. l. c. Gemeiner Wach-
holder. In Wäldern des nördlicher. Eur. Apr.
Im F. ♂.

5. *J. Oxycedrus*. Pers. l. c. Spanischer Wach-
holder. In Span. Languedoc u. Griechenland.
May. Im F. ♂.

6. *J. tamariscifolia*. Cat. hort. bot. monachi-
ens. p. 28. Tamariskenblättriger Wachholder. —
—. K. H. ♂.

7. *J. phoenicea*. Pers. l. c. Dichtnädlicher
Wachholder. In Südeur. u. im Orient. —. K. H. ♂.

856. Taxus, Taxus.

1. *T. baccata*, Pers. l. c. Gemeiner Taxus.
In Eur. u. Sibirien. März. Im F. ♂.

β. foliis variegatis. Mit gefleckten Blättern.

857. Ephedra, Meerträubel.

1. *E. distachya*. Pers. l. c. 2. p. 683. Europäischer Meerträubel. In Südfrankr. Span. u. der Barbarey. Jun. Jul. K. H. ȳ.

2. *E. monostachya*. Pers. l. c. Sibirischer Meerträubel. In Sibirien u. Ungarn auf trockenen sonnigen Bergen. Jun. Jul. K. H. ȳ.

858. Cissampelos, Grieswurz.

1. *C. smilacina*. Pers. l. c. 2. p. 634. Ecke Grieswurz. In Carolina. —. K. H. ȳ.

859. Adelia, Adelie.

1. *A. Acidoton*. Pers. l. c. 2. p. 635. Dornige Adelie. In Jamaica. —. W. H. ȳ.

2. *A. ovata*. Pers. l. c. Eyförmige Adelie. In Nordamer. —. K. H. ȳ.

3. *A. myrtifolia*. Catal. hort. carlsruhan. p. 5. Myrthenblättrige Adelie. In Nordamer. —. K. H. ȳ.

860. Ruscus, Mäusedorn.

1. *R. aculeatus*. Pers. l. c. 2. p. 636. Stechender Mäusedorn. In Südeur. Jun. Jul. Im F. ȳ.

2. *R. Hypophyllum*. Pers. l. c. Breithblättriger Mäusedorn. An den Rändern der Hügel in Italien. Jun. Jul. K. H. 24.

3. *Hypoglossum*. Pers. l. c. Zungen-Mäusedorn. Auf Bergen in Ungarn u. dem Genuesischen. Jun. Jul. K. H. 24.



4. *R. racemosus.* Pers. l. c. Trauben-Mäusedorf. Auf den Archipelagischen Inseln. Jun. Jul. K. H. ♂.

G Y N A N D R I A.

861. Cluytia, Cluytie.

1. *Cl. daphnoides.* Pers. l. c. Seidelbastblättrige Cluytie. Am Cap. —. Ch. ♂.

2. *Cl. polifolia.* Pers. l. c. Poleyblättrige Cluytie. Am Cap. März — Aug. Ch. ♂.

3. *Cl. pulchella.* Pers. l. c. Gemeine Cluytie. Am Cap. Febr. — Aug. Ch. ♂.

C L A S S I S XXII.

C R Y P T O G A M I A.

F I L I C E S.

862. Acrostichum, Staubfarrn.

1. *A. calomelanos.* Liu. sp. pl. p. 1529. Schwarzstrunkiger Staubfarrn. Zu Jamaica, Hispaniola u. Guiana. W. H. 24.

863. Hemionitis, Netzfarrn.

1. *H. dealbata.* Willd. hort. berol. 1. p. 40. t. 40. Weissblättriger Netzfarrn. In Südamer. Jamaica, Peru u. Chili. W. H. 24.

864. Polypodium, Engelsüfs.

1. *P. crassifolium*. Lin. sp. pl. p. 1543. Dickblättriger Engelsüfs. In Jamaica, Hispaniola u. zu Lima. W. H. 24.

2. *P. phymatodes*. Lin. mant. 306. Warziger Engelsüfs. In Ostind. W. H. 24.

3. *P. aureum*. Lin. sp. pl. p. 1546. Goldner Engelsüfs. In Westind. W. H. 24.

4. *P. vulgare*. Lin. sp. pl. p. 1544. Gemeiner Engelsüfs. In Eur. u. Nordamer. zwischen Felssenritzen u. auf Bäumen. Im F. 24.

β . *cambricum*. Mit geschlitzten Lappen.

5. *P. Phegopteris*. Lin. sp. pl. p. 1550. Buchen-Engelsüfs. In Wäldern v. Eur. Im F. 24.

865. Aspidium, Wurmfarrn.

1. *A. trifoliatum*. Swartz synops. filic. 43. Gedreiter Wurmfarrn. In Hispaniola, Jamaica u. Martinique. W. H. 24.

Polypodium trifoliatum. Lin. sp. pl. p. 1547.

2. *A. Lonchitis*. Swartz l. c. Buchtensarrn-artiger Wurmfarrn. Auf Alpen u. Bergen in Schweden, Norwegen, der Schweiz, Ital. England u. Frankr. Im F. 24.

Polypodium Lonchitis. Lin. sp. pl. p. 1548.

3. *A. molle*. Swartz l. c. 49. Weicher Wurmfarrn. In Caracas. W. H. 24.

Polypodium molle. Jacq. ic. rar. 3. t. 640. Collect. 3. p. 188.

4. *A. aculeatum*. Swartz l. c. 53. Stachlinger Wurmfarrn. Auf Bergen v. Eur. Nordafr. u. am Cap. Im F. 24.

Polypodium aculeat. Lin. sp. pl. p. 1552.

5. *A. Filix* mas. Swartz l. c. 55. Gebräuchlicher Wurmfarrn. In Eur. Nordasien u. Nordafr. Im F. 24.

Polypodium Filix mas. Lin. sp. pl. p. 1551.

6. *A. bulbiferum*. Swartz l. c. 29. Zwiebeltragender Wurmfarrn. In Canada. K. H. 24.

Polypodium bulbiferum. Lin. sp. pl. p. 1553.

7. *A. Filix* femina. Swartz l. c. 59. Falscher Wurmfarrn. In Eur. Im F. 24.

Polypodium Filix femina. Lin. sp. pl. p. 1551.

8. *A. fragile*. Swartz l. c. 58. Zerbrechlicher Wurmfarrn. In Eur. K. H. 24.

Polypodium fragile. Lin. sp. pl. p. 1553.

Nebst einer noch unbestimmten Wurmfarrnart.

866. *Struthiopteris*, Straußfarrn.

1. *St. germanica*. Willd. enum. 2. p. 1071. Deutscher Straußfarrn. In Deutschl. Ungarn, der Schweiz, Russland u. der Insel Seeland bey Norwegen. Im F. 24.

Osmunda Struthiopt. Lin. sp. pl. p. 1522.

Onoclea Struthiopt. Swartz synops. filic. 111.

867. *Asplenium*, Streifenfarrn.

1. *A. septentrionale*. Swartz l. c. 75. Nördlicher Streifenfarrn. In Felsenritzen v. Eur. Im F. 24.

2. *A. marinum*. Lin. sp. pl. p. 1540. Meerstrands-Streifenfarrn. Auf Meeresfelsen in England, Spanien, der Barbarey u. den Canarischen Inseln. K. H. 24.

3. *A. Trichomanes*. Lin. l. c. Wiederthon-Streifenfarrn. In Felsenritzen v. Eur. u. dem Orient. Im F. 24.

4. *A. viride*. Swartz l. c. 80. Grünstrunkiger Streifenfarrn. Auf Felsen in Deutschl. Oesterr. Salzb. der Schweiz, England. u. Frankr. Im F. 24.

5. *A. praemorsum*. Swartz prod. 13. Abgebissener Streifenfarrn. Auf waldigen Bergen in Jamaica u. Caracas. W. H. 24.

6. *A. Ruta muraria*. Lin. sp. pl. p. 1541. Mauer-Streifenfarrn. Auf Mauern u. Felsen in Eur. Im F. 24.

7. *A. Adiantum nigrum*. Lin. sp. pl. p. 1541. Schwarzer Streifenfarrn. In Felsenritzen v. Deutschl. der Schweiz, Ital. Frankr. Engl. u. Spanien. Im F. 24.

868. *Scolopendrium*, Hirschzunge.

1. *Sc. officinarum*. Swartz synops. filic. 89. Gemeine Hirschzunge. An schattigen Oertern in Eur. Im F. 24.

Asplenium Scolopendrium. Lin. sp. pl. p. 1537.

2. *dedaleum*. Mit verworrenen Blättern.

869. *Pteris*, Saumfarrn.

1. *Pt. longifolia*. Lin. sp. pl. p. 1531. Langblättriger Saumfarrn. In Jamaica u. Hispaniola. W. H. 24.

2. *Pt. serrulata*. Lin. suppl. 443. Gesägter Saumfarrn. In Japan, China u. Ceylon. W. H. 24.

3. *Pt. cretica*. Lin. mant. 130. Candischer Saumfarrn. In der Schweiz, Ital. Corsica, Can-djen u. Arabien. K. H. 24.

4. *Pt. atropurpurea*. Lin. sp. pl. p. 1534. Schwarzrother Saumfarrn. In Pensylvan. Virgin. u. Carolina. K. H. 24.

5. *Pt. aquilina*. Lin. sp. pl. p. 1533. Adler-Saumfarrn. Auf waldigen Bergen im nördlicher. Eur. Asien u. America. Jun. Jul. Im F. 24.

6. *Pt. elegans*. Jacq. fragm. bot. p. 74. n. 233. t. 116. Schöner Saumfarrn. Am Cap. Ch. 24.

870. Blechnum, Ruppenfarrn.

1. *Bl. boreale*. Swartz synops. filic. 115. Nördlicher Rippenfarrn. An feuchten Stellen in Nord- u. auf Alpen im südlicher. Eur. ingleichen auf den Canarischen Inseln. Im F. 24.

Osmunda Spicant. Lin. sp. pl. 1522.

2. *Bl. occidentale*. Lin. l. c. 1534. Westli-cher Rippenfarrn. In Westind. u. andern Gegen-den des wärmer. Amer. W. H. 24.

871. Woodwardia, Woodwardie.

1. *W. radicans*. Swartz synops. filic. 117. Wurzelnde Woodwardie. In Ital. Portugall, zu Madera u. Teneriffa K. H. 24.
Blechnum radicans. Lin. mant. 307.

872. Adiantum, Krullfarrn.

1. *A. reniforme*. Lin. sp. pl. p. 1556. Nierenförmiger Krullfarrn. Zu Madera u. Teneriffa. K. H. 24.

2. *A. pedatum*. Lin. sp. pl. p. 1557. Fußförmiger Krullfarrn. In Canada, Virgin. u. Pensylvan. K. H. 24.

3. *A. Capillus veneris*. Lin. sp. pl. p. 1558. Frauenhaar-Krullfarrn. Auf Felsen in Oesterr. Bayern, der Schweiz, Ital. Engl. Span. Frankr. Teneriffa, Jamaica, Südamer. u. Bourbon. K.H. 24.

873. Davallia, Davallie.

1. *D. canariensis*. Swartz synops. filic. 134. Canarische Davallie. Auf den Canarischen Inseln u. in Portugall. K. H. 24.

Trichomanes canariense. Lin. sp. pl. p. 1562.

R E G I S T E R.

A.

	Seite		Seite
<i>Abroma</i>	268	• <i>Aesculus</i>	133
<i>Abrus</i>	287	• <i>Aethusa</i>	89
<i>Acacia</i>	278	• <i>Agapanthus</i>	106
<i>Acalypha</i>	351	• <i>Agathosma</i>	70
<i>Acanthus</i>	248	• <i>Agave</i>	125
<i>Acer</i>	136	• <i>Ageratum</i>	302
<i>Achania</i>	276	• <i>Agrimonia</i>	170
<i>Achillea</i>	322	• <i>Agrostemma</i>	166
<i>Achimenes</i> sieh Tre- virana		• <i>Ailanthus</i>	343
<i>Achyranthes</i>	74	• <i>Albuca</i>	110
<i>Aconitum</i>	214	• <i>Aletris</i>	119
<i>Acorus</i>	127	• <i>Aleurites</i>	352
<i>Acrostichum</i>	372	• <i>Allamanda</i>	76
<i>Actaea</i>	206	• <i>Allium</i>	103
<i>Acynos</i> sieh Thymus		• <i>Alnus</i>	338
<i>Adelia</i>	371	• <i>Aloë</i>	122
<i>Adenanthera</i>	149	• <i>Aloisia</i> sieh Verbena	
<i>Adiantum</i>	377	• <i>Alpinia</i>	3
<i>Adonis</i>	222	• <i>Alstroemeria</i>	126
<i>Aegiphila</i>	32	• <i>Althaea</i>	271
<i>Aegopodium</i>	91	• <i>Alyssum</i>	250
<i>Aeschynomene</i>	292	• <i>Amaranthus</i>	341
		• <i>Amaryllis</i>	106
		• <i>Ambrosia</i>	341

	Seite		Seite
Amirola	342	Arduina	76
Amomum	2	Arenaria	160
Amorpha	286	Argemone	207
Amygdalus	182	Arischia	335
Amyris	136	Aristotelia	170
Anagallis	46	<i>Armeniaca</i> sieh Prunus	
Anagyris	146		
Anchusa	39	Armeria	96
<i>Andrewsia</i> sieh Pogonia	153	Arnica	317
Andromeda	28	Arnopogon	296
Andropogon	43	<i>Aronia</i> sieh Mespilus et Pyrus	
Androsace	298	Artemisia	305
Andryala	219	Arum	347
Anemone	90	Ariundo	27
Anethum	89	Asarum	168
Angelica	106	Asclepias	78
Anigosanthos	218	Asparagus	114
Annona	86	Asphodelus	113
Anredera	322	Aspidium	373
Anthemis	113	Asplenium	374
Anthericum	19	Aster	311
Antholyza	361	Astragalus	294
Anthospermum	286	Astrantia	87
Anthyllis	363	Athamanta	88
Antidesma	240	Athanasia	304
Antirrhinum	120	<i>Atractylis</i> sieh Berckheya	
Apicra	91	Atragene	219
Apium	78	Atraphaxis	129
Apocynum	131	Atriplex	84
Aponogeton	215	Atropa	58
Aquilegia	96	Aucuba	337
Aralia	153	<i>Averhoa</i> sieh Cicca	
Arbutus	332	Axyris — Diotis	
Arctotheca	330	Azalea	54
Arctotis	64	<i>Azima</i> sieh Monetia	
Ardisia			

Seite

Bion

B.

Bonapartea

109

Bonplandia sieh Cal-
dasia

Seite

Baccharis	308	Bontia	244
Bactyrilobium	148	Borago	41
Balsamita	305	Borya	359
• <i>Bambos</i> sieh Bambu- sa		Bosea	86
• Bambusa	129	Bromelia	101
Banisteria	161	Broussonetia	361
Banksia	29	Browallia	244
Barleria	248	Brownea	268
Bartsia	239	Brucea	361
Basella	95	Brunia	69
Bauhinia	146	Brunsfelsia	245
Begonia	342	Bryonia	356
Bellis	320	Bubon	89
Berberis	127	<i>Bubroma</i> sieh Gua- zumá	
Berckheya	328	<i>Buchnera</i> sieh Ma- nulea	
Besleria	244	Buddleja	32
Beta	85	Bulbine	113
Betonica	229	Bumelia	66
Betula	345	Buphthalmum	324
Bidens	300	Bupleurum	87
Bignonia	245	Butomus	145
Billardiera	70	Buttneria	75
Biscutella	250	Buxus	338
Bistropogon	227		
Bixa	208		
Blechnum	376		
Blitum	4		
Bocconia	168	Cacalia	300
Boehmeria	340	Cactus	174
Boerhaavia	17	Caesalpinia	148
Boltonia	322	Caladium	347
Bombax	269	Calanchoë	143

C.

	Seite		Seite
Caldasia	50	Cedrela	70
Calendula	330	Celastrus	68
Calla	133	Celosia	74
Callicarpa	32	Celsia	242
<i>Calomeria</i> sieh Hu- mea		Celtis	84
Caltha	224	Centaurea	328
Calycanthus	205	Cephalanthus	30
Camellia	277	Ceratonia	364
Campanula	50	<i>Ceratospermum</i> sieh	
Camphorosma	36	Diotis	
Canarina	128	Cerbera	76
Canella	168	Cercis	146
Canna	1	Ceresia	26
<i>Cantua</i> sieh Vestia		Cerinthe	40
Capparis	205	Cestrum	62
Capraria	244	Chaerophyllum	90
Capsicum	62	Chamaerops	131
Carduus	299	Cheiranthus	251
Carica	367	Chelidonium	206
<i>Carissa</i> sieh Arduina		Chelone	245
Carlowizia	299	Chenopodium	85
Carolinea	269	Chionanthus	7
Carpinus	346	Chironia	82
Carthamus	298	Chloranthus	36
Carum	91	Chloris	26
Caryota	349	Chrysanthemum	320
Cassia	147	Chrysocoma	303
Cassine	94	Chrysophyllum	65
Castanea	345	Cicca	338
Casuarina	336	Cinneraria	310
Catananche	298	Cissampelos	371
<i>Cathartocarpus</i> sieh Bactryllobium		Cissus	33
Caucalis	87	Cistus	211
Ceanothus	68	Citharexylum	236
Cecropia	357	Citrus	210
		Claytonia	72
		Clematis	220

Seite		Seite
Cleome	128	<i>Cotula</i> sieh Lidbeckia
Clerodendrum	238	<i>Cotyledon</i> 161
Clethra	154	<i>Crambe</i> 249
Cliffortia	369	<i>Crassula</i> 99
Clusia	209	<i>Crataegus</i> sieh Mes-
Cluytia	372	<i>pilus</i>
Cneorum	18	<i>Cremastostemon</i> 47
Cnicus	299	<i>Crepis</i> 298
Cobaea	49	<i>Crescentia</i> 245
Coccoloba	141	<i>Crinum</i> 105
Coffea	54	<i>Crithmum</i> 88
Coix	337	<i>Crocus</i> 19
Colchicum	131	<i>Crotalaria</i> 283
Collinsonia	15	<i>Croton</i> 352
Colutea	291	<i>Cucubalus</i> 158
Commelina	25	<i>Cucumis</i> 356
Comptonia	337	<i>Cucurbita</i> 355
Condalia	67	<i>Cunila</i> sieh Weste-
Conium	87	<i>ringia</i>
Convallaria	116	<i>Cupressus</i> 351
Convolvulus	47	<i>Curcuma</i> 3
Conyza	308	<i>Cussonia</i> 86
Corchorus	209	<i>Cycas</i> 369
Cordia	42	<i>Cyclamen</i> 45
Coreopsis	327	<i>Cydonia</i> 189
Coriaria	368	<i>Cymbidium</i> 334
Cornus	34	<i>Cynanchum</i> 78
Cornutia	237	<i>Cynoglossum</i> 39
Coronilla	292	<i>Cynosurus</i> sieh Eleu-
Correa	137	<i>sine</i>
Cortusa	44	<i>Cyperas</i> 25
Corydalis	282	<i>Cypripedium</i> 335
Corylus	344	<i>Cyrilla</i> sieh Trevi-
Corypha	127	<i>rana</i>
Cosmea	326	<i>Cyrtanthus</i> 106
<i>Cosmus</i> sieh Cosmea		<i>Cytisus</i> 289
Costus	2	

D

E

	Seite		Seite
<i>Dahlia</i> sieh <i>Georgina</i>		<i>Echinops</i>	333
<i>Daphne</i>	139	<i>Echites</i>	77
<i>Datisca</i>	368	<i>Echium</i>	41
<i>Datura</i>	57	<i>Eckebergia</i> sieh <i>Trichilia</i>	
<i>Davallia</i>	377	<i>Ehretia</i>	42
<i>Decumaria</i>	168	<i>Elaeagnus</i>	36
<i>Delphinium</i>	214	<i>Elaeodendrum</i>	67
<i>Dentaria</i>	251	<i>Elephantopus</i>	333
<i>Desmanthus</i>	278	<i>Eleusine</i>	26
<i>Dianella</i>	115	<i>Elichrysum</i>	307
<i>Dianthus</i>	157	<i>Ellisia</i>	43
<i>Dichondra</i>	83	<i>Embothrium</i>	30
<i>Dictamnus</i>	150	<i>Empetrum</i>	359
<i>Diervilla</i>	56	<i>Encelia</i> sieh <i>Pallasia</i>	
<i>Digitalis</i>	242	<i>Ephedra</i>	371
<i>Dillenia</i>	217	<i>Epidendrum</i>	334
<i>Dioscorea</i>	364	<i>Epilobium</i>	135
<i>Diosma</i>	69	<i>Epimedium</i>	34
<i>Diospyros</i>	366	<i>Eranthemum</i> sieh <i>Ruellia</i>	
<i>Diotis</i>	339	<i>Erianthus</i>	27
<i>Disandra</i>	132	<i>Erica</i>	138
<i>Dodecatheon</i>	45	<i>Erigeron</i>	309
<i>Dodonaea</i>	136	<i>Eriocaulus</i>	333
<i>Dolichos</i>	287	<i>Eriogonum</i>	111
<i>Dombeya</i>	269	<i>Erodium</i>	258
<i>Doronicum</i>	317	<i>Eryngium</i>	86
<i>Dorstenia</i>	340	<i>Erythrina</i>	283
<i>Dracaena</i>	115	<i>Eucalyptus</i>	181
<i>Dracocephalum</i>	232	<i>Euclea</i>	368
<i>Dracontium</i>	133	<i>Eucomis</i>	109
<i>Drimia</i>	117	<i>Eugenia</i>	180
<i>Dryas</i>	204		
<i>Duranta</i>	236		

	Seite		Seite
Eupatorium	302	Geum	204
Euphorbia	170	Ginkgo sieh Salis-	
Evonymus	68	buria	347
Exacum	33	Gladiolus	19
F.		Glaucium	206
Fabricia	178	Gleditschia	365
Fagara	35	Globularia	30
Fagus	340	Gloriosa	110
Ferraria	253	Gloxinia	247
Ferrula	88	Glycine	287
Ficus	359	Glycirrhiza	291
Flacourtia	6 8	Gnaphalium	307
Fontanesia	7	Gnidia	140
Fothergilla	213	Gomphrena	73
Fragaria	203	Goodenia	52
Frankenia	129	Gorteria	327
Fraxinus	358	Gossypium	274
Fritillaria	109	Gouania	70
Fuchsia	135	Grewia	208
Fumaria sieh Cory-		Guajacum	149
dalis		Guazuma	268
G.		Guilandina sieh	
		Moringa et Gym-	
		nocladus	
		Gypsophila	157
H.			
Galanthus	104		
Galaxia sieh Ixia	294	Haemanthus	103
Galega	53	Hakea	29
Gardenia	135	Halesia	168
Gaura	285	Halleria	243
Genista	82	Haloragis	143
Gentiana	318	Hamamelis	37
Georgina	266	Hamellia	53
Geranium	247	Harrachia	248
Gesneria			

	Seite		Seite
<i>Hebenstreitia</i>	238	<i>Hostana</i> sieh <i>Cor-</i>	
<i>Hedera</i>	71	<i>nutia</i>	
<i>Hedychium</i>	2	<i>Houstonia</i>	31
<i>Hedysarum</i>	293	<i>Humea</i>	301
<i>Helenium</i>	325	<i>Humulus</i>	364
<i>Helianthemum</i>	212	<i>Hura</i>	353
<i>Helianthus</i>	325	<i>Hyacinthus</i>	117
<i>Helichrysum</i> sieh		<i>Hydrangea</i>	155
<i>Elichrysum</i>		<i>Hydrophyllum</i>	43
<i>Heliconia</i>	75	<i>Hymenaea</i>	147
<i>Helicteris</i>	268	<i>Hyosciamus</i>	57
<i>Heliocarpus</i>	169	<i>Hyperanthera</i> sieh	
<i>Heliotropium</i>	38	<i>Moringa</i>	
<i>Helleborus</i>	223	<i>Hypericum</i>	216
<i>Hemerocallis</i>	126	<i>Hypoxis</i>	111
<i>Hemimeris</i>	242	<i>Hyssopus</i>	225
<i>Hemionitis</i>	372		
<i>Hepatica</i>	218		I.
<i>Heracleum</i>	88		
<i>Heritiera</i>	355		
<i>Hermannia</i>	254	<i>Jacquinia</i>	65
<i>Hernandia</i>	337	<i>Jasminum</i>	5
<i>Hesperis</i>	252	<i>Jatropha</i>	352
<i>Heuchera</i>	83	<i>Iberis</i>	249
<i>Hibiscus</i>	274	<i>Ilex</i>	37
<i>Hieracium</i>	297	<i>Illecebrum</i>	74
<i>Hippia</i>	332	<i>Impatiens</i>	73
<i>Hippocratea</i>	292	<i>Imperatoria</i>	90
<i>Hippomane</i>	353	<i>Indigofera</i>	293
<i>Hippophaë</i>	362	<i>Inga</i>	277
<i>Hoffmannseggia</i>	148	<i>Inula</i>	316
<i>Homaliam</i>	214	<i>Ipomoea</i>	48
<i>Horminum</i>	232	<i>Iris</i>	23
<i>Hortensia</i> sieh <i>Hy-</i>		<i>Isatis</i>	250
<i>drangea</i>		<i>Isopyrum</i>	223
<i>Hosta</i> sieh <i>Heme-</i>		<i>Itea</i>	47
<i>rocallis et Cornutia</i>		<i>Juglans</i>	343

	Seite		Seite
Juniperus	370	Lavandula	226
Justicia	10	Lavatera	272
Iva	333	Ledum	151
Ixia	21	Leea	65
Ixora	32	Leptospermum	178
		<i>Lespedeza</i> sieh He-	
		dysarum	
Kaempferia	3	Leucoium	104
Kalmia	151	Lidbeckia	321
<i>Kennedia</i> sieh Gly-		Ligusticum	88
cine		Ligustrum	6
Kiggellaria	367	Lilium	109
Killingia	25	Limodorum	335
Kitaibelia	273	Limonia	150
Knautia	31	Linaria	239
Koelreuteria	135	Linum	98
Kookia	150	Liquidambar	346
		<i>Liquiritia</i> sieh Gly-	
		cirrhiza	
L.		Liriodendron	217
Lachenalia	118	Lithospermum	39
Lachnaea	140	Lobelia	253
Lagerstroemia	210	Lomandra	129
Lagunaea	276	Lomatophyllum	120
Lamium	228	Lonicera	55
<i>Lancisia</i> sieh Lid-		Lopezia	4
beckia		Lotus	296
Lantana	235	Ludia	210
<i>Lurochea</i> sieh Cras-		Lunaria	251
sula		Lupinus	286
Laserpijum	88	Lychnis	167
Latania	369	Lycium	63
Lathyrus	288	Lycopsis	41
Laurus	143	Lycopus	11
		Lysimachia	46
		Lythrum	169

Seite

Seite

M.

Macrocneum	53	Metrosideros	179
Madia	309	<i>Meum</i> sieh Aethusa	
Magnolia	217	Mikania	302
Mahernia	256	Mimosa	278
Malachra	271	Mimulus	243
Malpighia	160	Mirabilis	47
Malva	271	Modecca	95
Mandragora	58	Moehringia	141
<i>Mangilla</i> sieh Scler-		Moluccella	230
oxylon		Momordica	355
Manulea	238	Monarda	12
Maranta	3	Monetia	35
Marrubium	229	Monsonia	263
Massonia	103	Moraea	22
Matricaria	321	Moringa	148
Maurandia	241	Morus	340
<i>Medeola</i> sieh Myrsin-		Murraya	150
siphillum		Musa	101
Medicago	296	Muscaria	117
Melaleuca	179	Myosotis	38
Melastoma	151	Myrica	362
Melia	151	Myrsine	64
Melianthus	248	Myrsiphyllum	131
Melicocca	135	Myrtus	181
Melissa	232		N.
Melittis	232		
Melochia	256	<i>Napaea</i> sieh Sida	
Menispernum	368	Narcissus	104
Mentha	227	Nemesia	240
Mentzelia	209	Nepe ta	226
Menyanthes	45	Nerium	77
Mesembrianthemum	189	Nicandra	59
Mespilus	185	Nicotiana	57
Messerschmidia	41	Nigella	215

	Seite		Seite
Nissolia	283	Paeonia	213
Nolana	43	Pallasia	327
Nymphaea	207	Panax	86
O.		Pancratium	105
Ochrosia	75	Pandanus	357
Ocymum	233	Panicum	26
Oenothera	134	Papaver	207
Olea	6	Parietaria	340
<i>Onoclea</i> sieh Struthiopteris		Parkinsonia	148
Ononis	285	Parnassia	96
Onosma	41	Pascalia	324
<i>Ophi oxyylon</i> sieh O. chrosia		<i>Paspalum</i> sieh Ceresa	
Origanum	230	Passerina	140
Ornithogalum	111	Passiflora	256
<i>Ornus</i> sieh Fraxinus		Pastinaca	90
Orobus	288	Paullinia	142
Orentium	127	Pavonia	276
<i>Orontium</i> sieh Anthirrhinum		Pelargonium	259
Oryza	129	Peltaria	250
<i>Osmunda</i> sieh Struthiopteris et Blechnum		Pentapetes	269
Osteospermum	332	Pentstemon	245
Ostrya	346	Pentzia	305
Osyrис	359	Perilla	228
Othonna	332	<i>Periphragmos</i> sieh Vestia	
Oxalis	163	Periploca	78
P.		Petiveria	132
Pachysandra	339	<i>Phalangium</i> sieh Anthericum	
Paederia	54	Phalaris	26
		Philadelphus	178
		Phillyrea	6
		Phlomis	230
		Phlox	49
		Phoenix	365

	Seite		Seite
Phormium	118	Portulaca	169
Phylica	69	Portulacaria	96
Phyllanthus	353	Potentilla	203
Phyllis	86	Pothos	35
Physalis <i>Ananas</i>	59	Prasium	234
Phyteuma <i>Bieff.</i>	52	Prenanthes	297
Phytolacca	167	Primula	43
Picramnia	363	Prinos	128
<i>Picridium</i> sieh Son-		Priva	235
chus		Protea	28
Pinus	549	Prunella	234
Piper	15	Prunus	182
Piqueria	301	Psiadia	309
Pisonia	132	Psidium	180
Pistacia	363	Psoralea	295
Pitcairnia	102	Psychotria	54
Pittosporum	70	Ptelea	35
Planera	84	Pteris	375
Plantago	33	Pulmonaria	40
Platanus	346	Pulsatilla	218
Flectranthus	233	Punica	182
<i>Plinia</i> sieh Eugenia		Pyrola	154
Plumbago	47	Pyrethrum	320
Plumeria	77	Pyrus	187
Podalyria	146		
Podocarpus	351		
Pogonia	64		
Polemonium	49		
Polyanthes	116	Q.	
Polygala	282		
Polygonum	141		
Polymnia <i>grisea</i>	330	R.	
Polypodium	373		
Pontederia	102		
Populus	365		
<i>Porcelia</i> sieh Annona			
		Rafnia	283
		<i>Randia</i> sieh Gardenia	
		Ranunculus	222
		Rauwolfia	75
		Renealmia	2

	Seite		Seite
Reseda	170	Sapindus	143
Rhamnus	66	Saponaria	157
Rheum	144	Satureja	225
Rhipidodendrum	120	Saururus	133
Rhodiolasieh Sedum		Saxifraga	156
Rhododendrum	152	Scabiosa	30
Rhus	91	Scandix	89
Ribes	70	Schinus	367
Ricinus	353	Schollia	80
Riyina	36	Schotzia	149
Robinia	290	Scilla	112
Rondeletia	53	Scleroxylum	66
Rosa	199	Scolopendrium	375
Rosmarinus	12	Scolymus	298
Royena	155	Scrophularia	241
Rubia	32	Scutellaria	234
Rubus	202	Sedum	162
Rudbeckia	326	Selago	238
Ruellia	247	Sempervivum	173
Ruizia	273	Senecio	309
Rumex	130	Seriana	142
Buscus	371	Serissa	54
Ruta	150	Serratula	299
		Sesbania sieh Coro-	
		nilla	
		Sickingia	165
Saccharum	27	Sicyos	856
Salicornia	4	Sida	270
Salisburia	347	Sideritis	227
Salsola	85	Sideroxylum	65
Salvia	12	Silene	159
Sambucus	94	Silphium	329
Sanguisorba	33	Sison	89
Sansevieria	116	Sisyrinchium	252
Santolina	304	Smilax	364
		Smyrnium	90

Seite		Seite
Solandra	58	T.
Solanum	59	
Soldanella	45	Tabernaemontana 77
Solidago	315	Tagetes 319
Sonchus	297	Talinum 169
Sophora	145	Tamarindus 252
Sorbus	185	Tamarix 95
Sparmannia	208	Tanacetum 365
Spartium	284	Tarchonanthes 304
Spermacoce	31	Taxus 370
Spielmannia	33	<i>Teedia</i> sieh Capra- ria
Spigelia	82	
Spilanthes	300	Terminalia 154
Spiraea	198	Ternstroemia 210
Stachys	229	Tetragonia 189
Stachytarpheta	11	Teucrium 224
Staelhelina	300	Thalia 3
Stapelia	80	Thalictrum 221
Staphylea	95	Thea 210
Statice	97	<i>Theobroma</i> sieh Gua- zuma
Stellaria	160	
Stephania	128	Theophrasta 75
Sterculia	268	Thrinax 127
Stevia	303	Thuja 350
Stratiotes	368	Thymus 231
Strelitzia	75	<i>Tigridia</i> sieh Ferra- ria
Strumaria	104	
Struthiopteris	374	Tilia 208
Styphelia	46	Tillandsia 102
Styrax	154	Tomentilla 204
Syphoricarpos	55	Tournefortia 42
Syphytum	40	Trachelium 52
Syringa	7	Tradescantia 102
		Tragia 337
		Trevirana 244

	Seite		Seite
Trichilia	150	Verratum	130
Trichomanes sieh Da-		Vestia	50
vallia		Viburnum	93
Trilix	210	Vinca	76
Triplaris	366	Viola	72
Tripsacum	336	Viscum	361
Triumfetta	169	Visnea	173
Trollius	223	Vitex	237
Tropaeolum	134	Vitis	72
Tulbagia	104	" Volkameria	237
Tulipa	110	Volkmannia sieh	
Turnera	95	Clerodendron	
Tussilago.	318		

U.

Ulex	285
Ulmus	83
Urena	273
Urtica	339
Utricularia	10

V.

Vaccinium	152
Valeriana	18
Vallisneria	357
Vanilla	335
Varronia	42
Veltheimia	119
Verbascum	56
Verbena	234
Verbesina	324
Verea sieh Calanchoë	303
Vernonia	8

W.

Waldschmidtia sieh	
Menyanthes	
Waldsteinia	184
Watsonia	19
Westerlingia	231
Woodwardia	376
Wulfenia	9

X.

Xenopoma	247
Xeranthemum	306
Ximenesia	324
Xylophylla	354

Y.

Yucca	119
-------	-----

Z.	Seite		Seite
Zamia	369	Ziziphora	12
Zanthorrhiza	101	Zizyphus	67
Zanthoxylum	363	Zuccagnia	118
Zinnia	319	Zygophyllum	149

Z U S Ä T Z E.

Jasminum, Jasmin. (Diandr. Monogyn.)

1. *J. mauritianum.* Desfont. cat. horti bot. paris. p. 53. Moritzischer Jasmin. Auf der St. Moritzinsel. —. W. H. 5.

Justicia, Justicie.

1. *J. hyssopifolia.* Pers. syn. pl. 1. p. 22. Isoppblättrige Justicie. Auf den Canarischen Inseln. —. Ch. 5.

Salvia, Salbey.

1. *S. indica.* Pers. l. c. 1. p. 26. Indische Salbey. In Ostindien. Apr. May. W. H. 2.

Campanula, Glockenblume. (Pentandr. Monogyn.)

1. *C. versicolor.* Catal. horti bot. carlsruh. p. 51. Verschiedenfarbige Glockenblume. —. —. Ch. 2.

Ribes, Johannisbeere.

1. *R. Uva crispa.* Pers. l. c. 1. p. 252. Glatte Johannisbeere. Im nördlichen Europa. Apr. May. Im F. 5.

Pomaderis, Pomaderis.

1. *P. apetula.* Labillardière specim. Nov. Holl. 1. p. 62. t. 87. Blumenlose Pomaderis. Am Cap Van-Diemen in Neuholland. —. Ch. 5.

Statice, Statice. (Pentandr. Pentagyn.)

1. *St. graminifolia.* Pers. l. c. 1. p. 33². Grasblättrige Statice. An der Wolga. Jun. — Aug. Im F. 2.

— O —

2. *St. auriculaefolia*. Pers. l. c. Aurikelblättrige Statice. Am Meerstrande der Barbarey. Jun. — Aug. Im F. 24.

Lachenalia, Lachenalie. (Hexandr. Monogyn.)

1. *L. orchoides*. Pers. l. c. 1. p. 376. Ragwurzartige Lachenalie. Am Cap. März. Ch. 24.

Juncus, Simse.

1. *J. maximus*. Pers. l. c. 1. p. 385. Größte Simse. Auf waldigen Bergen in Eur. Apr. May. Im F. 24.

J. latifolius. Wulff. in Jacq. coll. 3. p. 59.

Melanthium, Schwarzblume. (Hexandr. Trigyn.)

1. *M. eucomoides*. Pers. l. c. 1. p. 397. Schopflilienartige Schwarzblume. Am Cap. — Ch. 24.

Rhipis, Rhipis.

1. *Rh. flabelliformis*. Ait. hort. kew. 3. p. 473. Fächerblättrige Rhipis. In China u. Japan. Jun. Jul. VV. H. ♂.

Chamaerops excelsa. Pers. l. c. 1. p. 400.

2. *Rh. acaulis*. Willd. sp. pl. 4. p. 1093. Stammlose Rhipis. In Carolina u. Georgien. Jun. Jul. VV. H. ♂.

Sabal minor. Pers. l. c. 1. p. 399.

Corypha — Jacq. hort. vind. 3. p. 8. t. 8.

Chamaerops acaulis. Michaux fl. amer. 2. p. 207.

Cardiospermum, Herzsame. (Octandr.

Trigyn.)

1. *C. Halicacabum*. Pers. l. c. 1. p. 444. Glatter Herzsame. In beyden Indien. Jun. — Aug. VV. H. ⊖.

Cassia, Caffie. (Decandr. Monogyn.)

1. *C. mexicana*. Pers. l. c. 1. p. 453. Mexicanische Cassie. In Mexico. Jun. Jul. VV. H. ♂.

— o —

Cadia, Cadie.

1. *C. purpurea*. Pers. l. c. 1. p. 461. Rothe
Cadie. Im glücklichen Arabien. —. W. H. h.
Clerodendrum, Losbaum. (Didynam.
Angiosp.)

1. *Cl. infortunatum*. Pers. l. c. 2. 145. Un-
glücklicher Losbaum. In Ostindien. —. W.H. h.

Ruellia, Ruellie.

1. *R. paniculata*. Pers. l. c. 2. p. 177. Ris-
penblättrige Ruellie. Auf Hügeln in Südjamaica.
Jun. — Aug. W.H. h.

- Pelargonium*, Kranichschnabel. (Mo-
nadelph. Heptandr.)

1. *P. Tormane*. Cat. horti carlsruh. p. 119.
Tormanescher Kranichschnabel. —. May, Jun.,
Ch. h.

2. *P. Burmanni*. Cujus? Burmann'scher Kra-
nichschnabel. —. May — Jul. Ch. 24.

3. *P. formosissimum*. Desfont. cat. horti pa-
ris. p. 141. Schönster Kranichschnabel. Am Cap.
May — Jul. Ch. h.

4. *P. formosum*. Cat. horti hot. carlsruh. p.
118. Anmuthiger Kranichschnabel. —. May —
Jul. Ch. h.

5. *P. superbum*. Cujus? Herrlicher Kranich-
schnabel. —. May — Jul. Ch. h.

- Hedysarum*, Hahnenkopf. (Diadelph.
Decandr.)

1. *H. canescens*. Pers. l. c. 2. p. 321. Grau-
licher Hahnenkopf. In Virginien. —. K. H. 24.

- Alnus*, Erle. (Monoecia Tetrandr.)

1. *A. undulata*. Pers. l. c. 2. p. 550. Wel-
lenblättrige Erle. In Canada. Apr. Im F. h.
Betula crispa. Ait hort. kew. 3. p. 339.

Verbesserungen.

Seite Zeile

- 2 letzte setze hinzu: Coll. 1. p. 143.
 ✕ 3 9 zu Jacq ic. etc. setze: Collect. 4. p. 117.
 4 5 von unten besonders statt hesonders.
 6 13 lies: 16 statt 6.
 9 5 von unten dentata st. dadata.
 19 6 von unten folgende st. folgenden.
 22 4 Nro. 4 ist überflüssig.
 23 15 Swertischer st. Schwertischer.
 28 11 folgende st. folgenden.
 29 13 übrige st. übrigen.
 29 7 von unten folgende st. folgenden.
 30 3 Embothrium st. Embothryum.
 33 letzte ȳ st. ȳ.
 34 5 ȳ st. ȳ.
 34 7 ȳ st. ȳ.
 44 7 gefülltvioletter st. gefüllvioletter.
 46 letzte setze hinzu: May.
 48 4 von unten violetter st. violetter.
 50 9 u. 11 Apr. st. Jun. Jul.
 50 letzte persicifolia st. versicifolia.
 51 10 von unten nach Kitaib. pl.rar. setze hin-
 zu: 2. p. 65. t. 64.
 53 13 Hamellia st. Hamelia.
 71 4 setze hinzu: Oesterreichischen.
 76 15 Apr. st. Jun. Jul.
 95 2 May st. Jun. Jul.
 96 3 von unten Grasnelke st. Armerie.
 97 9 tige st. lige.
 102 8 Ananasblättrige st. Ananasblätttrige.
 106 10 Bogenlilie st. Bonlilie.
 108 2 von unten Sibirienst. Steyermarks.
 110 9 wilde st. willde u. maialis st. mayalis.
 ✕ 120 13 lies: Nr. 322 st. 319 u. so fort bis an's Ende.
 124 8 A. saponaria st. Asaponaria.
 133 3 von unten Eidechsenschwanz st. Eide-
 chenschwanz.
 139 1 hispida st. hisvida.
 147 13 West-indische st. We-stindische.
 153 10 Winkelblüthige st. Winkelblättrige.

Seite Zeile

- 172 10 von unten nach Jacq. ic. rar. setze: 1.
 177 12 fa - ckeldistel st. fa - keldistel.
 197 11 flügelstielige st. fliegelstielige.
 203 11 grandiflora st. graodiflora.
 203 10 von unten Spaltblätt. st Spaltelblätt.
 203 6 — — Canada st. Cschnada.
 204 13 Tormentille st. Tormentill.
 207 1 phoeniceum st. phoenicum.
 207 6 violetes st. violettes.
 215 16 unterscheidenden st. unterscheidende.
 216 2 Erdbeersame st. Erdbarsame.
 217 statt 117.
 218 6 von unten zwischen Jun. u. F. setze Im.
 220 10 v. u. zwischen Nordamer. u. — setze: Jun.
 220 4 von unten 24 st. ½.
 221 4 24 st. VV.
 223 16 März — May st. May.
 226 4 langgriffliger st. langräfsliger.
 228 13 Pulegium st. pulegium.
 228 8 von unten Orvala st. onvala.
 228 4 Berge st. Bergen.
 231 2 vor Steyermarksetze : In.
 233 4 sibiricum st. Sibircum.
 234 5 von unten Angiospermia st. Angiosperma.
 235 4 Jun. Aug. st. Jun. — , und 24 st. VV.
 236 6 von unten cinereum st. cynereum.
 240 12 v.unten nach Antirrhinum setze: Löwen-
maul u. dem st. den.
 251 12 Apr. st. Jun. Jul.
 274 3 von unten Lampas st. Lampus.
 279 13 obliqua st. ogliqua.
 280 17 M. st. A.
 299 4 Carlowizia st. Carlovizia.
 312 5 Isopp st. Ysopp.
 331 15 nach Aug. lies. Ch.
 350 7 v. unt. Gemeine Fichte st. Weiss-Tanne.
 364 3 von unten fein behaarte st. feinbeharrte.
 373 10 In st. zwischen.
 379 4 von unten Averrhoa st. Averhoa.
 384 nach 9 v. unten setze : Gymnocladus Seite 367.

4
eineus



eaeius



prasinus



luteus



13

21. todorni f. inulae (urban)
22. pfauenfuchs
23. struppfaubau
24. kappensfarbig sturzal amung
25. soff rotf. wir Pomeran
26. blutrotf.
27. rosenrotf.



1. Schildhalber in Lebendfarben
2. Schildhalber in eingemengt
3. Schildhalber in lebendfarben
4. Schildhalber in eingemengt
5. Schildhalber in lebendfarben
6. eingemengt blaugrün
7. grüniggrün
8. gelbgrün in gelbgrünig
9. grüniggrün in grünig
10. rein grün
11. weißlich in Lumin
12. weißlich in Blau
13. grauweiß
14. weißlich in weiß
15. Lumin
16. Lumin in blau
17. grünlichblau
18. blauähnlich
19. weißlich
20. braunlich
21. lebendfarben
22. grau
23. hellgrau
24. hellgrau
25. rot weiß
26. hellrot
27. hellrot
28. hellrot
29. hellrot
30. hellrot
31. hellgrün
32. hellgrün
33. weiß
34. hellgrün
35. hellgrün
36. weiß