Bemerkungen

über

die Gattungen

Agave und Fourcroya

nebst

Beschreibung einiger neuen Arten

von

Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Salm-Dyck.

MH HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM.

40

Sa 3.5

~~THE GIFT OF~~

Bought.

Hannover.

Druck von August Grimpe.

1859.

LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM
HARVARD UNIVERSITY

1872, June 18.

\$0.25

Als ich im Jahre 1834, unter dem Titel Hortus Dyekensis, das Verzeichniss der Pflanzen, die sich in meinem Garten befanden, veröffentlichte, besass ich schon eine nicht unbedeutende Anzahl der zu den Gattungen Agave und Foureroya gehörigen Arten. Die meisten dieser Pflanzen waren aber zu jener Zeit noch zu jung, um richtig bestimmt werden zu können; und so haben sich einige Irrthümer in den angeführten Synonymien sowohl, als auch in den (pag. 301—310) gegebenen Diagnosen eingeschlichen, welche ich heute berichtigen will. Das Namenverzeichniss jedoch der in meinem Garten zu jener Zeit vorhandenen, so wie ein ähnliches der in dem Berliner Garten cultivirten Arten, welches in der Allg. Garten-Zeitung (1852 pag. 50) erschienen ist, werden mir, hinsichtlich der Priorität einiger Benennungen, zum Anhaltspunkte dienen müssen.

Was zuerst die Gattungen Foureroya und Agave im Allgemeinen betrifft, so hat Herr Dr. Zuccarini in einem sehr lehrreichen Aufsätze, der in dem XVI. Bande (1833) der Aeta Acad. Caes. Leopold. abgedruckt ist, die früher schon versuchte und wieder aufgegebene Trennung der beiden Gattungen endgültig festgestellt und alles angegeben, was über ihre Geschichte und ihre Stellung im natürlichen Systeme gesagt werden kann. Er giebt zwar, als zur Gattung Foureroya gehörig, nur seine *longaeva* und die frühere *Agave foetida* L. an, die bereits schon zur *F. gigantea* Vent. geworden war. Mit voller Gewissheit gehören aber auch zu dieser Gattung die *F. tuberosa*, deren Blume Aiton gesehen hat, und die *A. eubensis* von Jacquin, welche zwar in unsere Europäischen Gärten nie eingeführt worden ist; deren Blume jedoch abgebildet und bekannt ist. Haworth (ohne irgend eine Autorität anzugeben), und Schultes Syst.

Veg. Vol. 7 nach ihm, rechnen noch die *A. rigida* Mill. und drei neue, angeblich in Australien, Madagasear und China einheimische Pflanzen zur Gattung Foureroya.

Was nun die erste dieser Arten betrifft, so ergibt sich aus der Abbildung, welche der Marquis de Spin in dem Catalogue du jardin de St. Sebastien von der Blume der *A. rigida* gibt, dass sie nicht zur Gattung Foureroya gezogen werden kann, und dass sie ihre frühere Stelle in der Gattung Agave wieder einnehmen muss. Was ferner die *F. australis*, *madagaseariensis* und *Cantala* anbelangt, so ist zu bemerken, dass Haworth sie nur als junge einjährige Samenpflanzen gekannt, und die Blumen nicht gesehen hat; dass er auch nicht die Gründe angibt, welche ihn bewogen haben, sie für Foureroyen zu halten, und dass also diese drei Arten als zweifelhafte Pflanzen, die näher untersucht werden müssen, zu betrachten sind.

Diesem Allen gemäss würde gegenwärtig die Gattung Foureroya folgender Massen aufzustellen sein:

- F. longaeva* Zucc.
- „ *gigantea* Vent.
- „ *tuberosa* Ait.
- „ *eubensis* Jacq.

(Species dubiosae:)

- F. australis* Haw.
- „ *madagaseariensis* Haw.
- „ *Cantala* Haw.

Viel zahlreicher sind hingegen die Arten, welche zur Gattung Agave gehören. Man hat sie bis jetzt in **Caulescentes** et **Acaules**, und in **Glaucoscentes** et **Virescentes** getheilt; diese wenigen Merkmale sind aber zu einer richtigen Zusammenstellung der verwandten Arten nicht hinreichend, und ich schlage daher hier eine andere, auf umfassendere Merkmale ge-

gründete Unterabtheilung der Gattung vor, die ihrem Zwecke besser entspricht. Wir können leider hierzu weder die Blume, noch den uns unbekanntem Blüthenstand der meisten Arten benutzen; nach der Beschaffenheit der Blätter jedoch, und ihrer Randstacheln, lassen sich alle die Arten, welche wir besitzen, in **Macracanthae**, **Heteracanthae**, **Micracanthae**, **Inermes** und **Herbaceae** abtheilen. Zur leichtern Beurtheilung dieser neuen Unterabtheilungen werde ich das Verzeichniss der in meinem Garten vorhandenen Agaveen, nach obigen Merkmalen geordnet, hier angeben. Zugleich werde ich in beigefügten Noten die irrigen oder unvollständigen Synonymien der in dem 7. Bande des Syst. Veget. von Jos. und Jul. Schultes beschriebenen Arten berichtigen, und die Diagnosen der seit dem Jahre 1829 in andern Werken bestimmten Arten hinzufügen.

FOURCROYA.

- F. longaeva Zucc. (1.)
 „ gigantea Vent.
 „ tuberosa Ait. (2.)

AGAVE.

§. I. **Macracanthae.** Foliis plus minusve repando-dentatis, dentibus validis margine inter eos herbaeo.

* Foliis crassis rigidis, dentibus corneis spinaque terminali saepe validissimis.

- A. atrovirens Karw. (3.)
 „ americana L. (4.)
 „ „ β. Foliis viridibus ad margines luteis.
 „ „ γ. Foliis luteis ad margines viridibus.
 „ „ δ. Foliis plus minusve luteo striatis.
 „ pieta H. Paris. (5.)
 „ Milleri Haw. (6.)
 „ mexicana Lam. (7.)
 „ Salmiana Otto. (8.)
 „ Jacobiana Nob. (9.)
 „ tehucanensis Karw. (10.)
 „ scabra Hort. (11.)
 „ potatorum Zucc. — A. Scolymus Karw. (12.)
 „ vivipara L. (13.)
 „ lurida Ait. (14.)

- A. Ixtly Karw. (15.)
 „ macroacantha Zucc. (16.)
 „ flavescens Hort. Monac. (17.)
 „ rigida Mill. (18.)
 „ Karwinskii Zucc. (19.)
 „ laxa Karw. (20.)
 „ pugioniformis Zucc. (21.)

** Foliis tenuioribus, coriaceis, interdum flaccidis dentibus spinaque terminali inermibus.

- A. serrulata Karw. (22.)
 „ rubescens Nob. — A. punctata Nob. — A. flaccida H. Monac. (23.)
 „ bulbifera Nob. (24.)
 „ bromeliaefolia Nob. (25.)
 „ Commelyni Nob. (26.)
 „ sobolifera Herm. (27.)

§. II. **Heteracanthae.** Foliis margine cornea aut lignosa varie dentata cinctis.

- A. xylonacantha Nob. (28.)
 „ coerulescens Nob. (29.)
 „ univittata Haw. (30.)
 „ Poselgeri Nob. (31.)
 „ heteracantha Zucc. (32.)
 „ „ β. vittata Nob.

§. III. **Micracanthae.** Foliis integris, ad margines minutissime serrulatis, aut ciliato-dentatis.

* Foliis lanceolatis.

- A. Keratto Mill. (33.)
 „ chloracantha Nob. (34.)
 „ mitis H. Monac. (35.)
 „ micracantha Nob. (36.)
 „ „ β. albidior Nob.

** Foliis linearibus, canaliculatis.

- „ yuccaefolia Red. (37.)
 „ maculata Engelm. (38.)

§. IV. **Inermes.** Foliis integerrimis, ad margines nudis aut filiferis.

* Foliis lanceolatis.

- A. attenuata H. Berol. (an Agaves species?) (39.)
 „ filifera Nob. (40.)
 „ filamentosa Nob. (41.)

** Foliis subulatis.

- „ geminiflora Brande. (42.)
 „ stricta Nob. (43.)
 „ striata Zucc. (44.)

§. V. **Herbaceae.** Foliis herbaceis marcescentibus e rhizomate perenni.

- A. brachystachys Cav. (45.)
 „ revoluta Klotzsch. (46.)
 „ undulata Klotzsch. (47.)

(Species descriptae quae desunt in horto.)

Fourcroya.

- F. cubensis Haw. — A. eubensis Jacq.
 „ australis Haw. — A. australis Steud.
 „ madagascariensis Haw.
 „ Cantala Haw. — A. Cantala Roxb. *Fl. ind. II.* 167.

Agave.

- „ flaccida Haw.
 „ angustifolia Haw.
 „ polyacantha Haw.
 „ spicata Cav.
 „ virginica L.
 (Species dubiosae, amplius inquirendae.)

Agavae aut Fourcroyae.

- A. Jacquiniana Gawl. — A. lurida Jacq.
 „ aspera Jacq. — (an F. tuberosa Ait.?)
 „ Rumphii Hasskarl.
 „ lophantha Schiede.

Diagnosen und Berichtigungen.

1. **Fourcroya longaeva** Zucc. *Act. Acad. Caes. Leop. Nat. Cur. XVI. p. 666*; arborea, foliis e basi parum attenuata lineari-oblongis acuminatis inermibus margine tenuissime callosociliatis subtus scabris subglaucescentibus Zucc.

Herr von Karwinski fand diese herrliche Pflanze auf den Abhängen des hohen Berges Tanga, in der Mexikanischen Provinz Oaxaca, 10,000 Fuss über dem Meeresspiegel in einem so rauhen Klima, dass den ganzen Winter hindurch die Gewässer mit Eis bedeckt waren.

Sie bildet einen 40–50 Fuss hohen und 12–18 Zoll dicken Stamm, an seiner Spitze mit einer prächtigen Blätterkrone geziert, aus welcher sich endlich die mit unzählbaren Blumen bedeckte Rispe auch noch 30–40 Fuss hoch erhebt. Um zur Blüthe zu gelangen, bedarf die Pflanze nach der Tradition der Eingebornen eines Alters von 400 Jahren.

2. **F. tuberosa** Ait. — *Schult. Syst. Veg. 7. p. 730.*

Delenda est var. β, quae A. cubensis Jacq. esse videtur. Delendum quoque Synonymum Commelyni (H. Amst. II. Fig. 19. quod ad A. Commelyni Nob. pertinet.)

Die Blätter sind 2–3 Fuss lang, und nur 2–3 Zoll in ihrer Mitte breit; nach unten und nach oben verengt.

3. **Agave atrovirens** Karw. — *Nob. hort. Dyck. p. 302.* A. acaulis, foliis latis elongatis erassis rigidissimis nitidis atroviridibus, subtus onvexis supra coneaviseulis, ad margines

repando-dentatis, dentibus validissimis eorneis, aequae ac spina terminalis longe producta, aurantio-brunneis. *Nob.*

Herr von Karwinski fand diese Art auf dem Berge Tanga in Mexiko. Sie ist die grösste in der Gattung. Ihre Blätter sollen im Vaterlande eine Länge von 10–12 Fuss, und der Blüthenschaft eine Höhe von 30 Fuss erreichen. Die Blätter sind gegenwärtig bei mir 2½ Fuss lang und 6–7 Zoll breit, abwärts nur wenig verschmälert, und in einen 2 Zoll langen Endstachel auslaufend. Die Gestalt dieses Endstachels giebt zur Unterscheidung der Arten sehr wesentliche Merkmale an.

4. **A. americana** L. — *Schult. Syst. Veg. 7. p. 722.*

In dem Beitrage zur Natur- und Litterär-Geschichte der Agaveen, welchen Herr Professor von Martius in den Gelehrten Anzeigen vom Jahre 1855 hat abdrucken lassen, ist Alles erschöpft, was über die Geschichte, die Kultur und Benutzung dieser Art zu sagen ist.

5. **A. picta** H. Paris. A. acaulis, foliis valde elongatis utrinque attenuatis viridibus ad margines flavido-pictis, junioribus erectis senioribus patentissimis flaccido-recurvatis, repando-dentatis, dentibus rigidis aequae ac spina terminalis longe producta brunneis. *Nob.*

Diese Pflanze, welche der Pariser botanische Garten aus Amerika erhalten hat, ist höchst wahrscheinlich die panaschirte Varietät einer uns unbekanntes Art. Sie steht der A. americana sehr nahe; unterscheidet sich jedoch, beim ersten Anblicke, durch ihre schmälere, in einen langen Endstachel auslaufenden Blätter; durch ihre kleinere Statur, und überhaupt durch einen andern Habitus von jener Art, und besonders von der auf ganz ähnliche Weise gescheckten Spielart derselben. Ich wäre daher sehr geneigt, die A. picta für eine bunte Abart der A. Milleri zu halten.

6. **A. Milleri** Haw. *Synop. — Schult. l. c. p. 723.*

Die Pflanze, welche in unseren Gärten unter diesem Namen cultivirt wird, ist wahrscheinlich nicht die ächte, und scheint nur eine schmalblättrige Abart von A. americana zu sein. Sie soll von dieser Art durch einen einfachen Blüthenschaft abweichen, und durch schmalere Blätter. Da sie jedoch noch nirgends geblüht hat, so können wir von ihrem Blüthenstande nichts sagen, und die nur etwas schmälere Blätter sind übrigens denen der A. americana ganz ähnlich.

7. **A. mexicana** Lamk. *Encycl. 1. p. 52. (excl. var. β.) — Haw. Suppl. p. 41. — A. Maguai Desf. Tabl. de l'École ed. 2. p. 33. — A. Keratto Nob. H. Dyck. p. 304. (delend. caeteris synonym. ut dubiosis.)*

Die Pflanze, welcher Lamarck in der Encyclopädie diese Benennung beigelegt hat, ist bis heute eine zweifelhafte geblieben. Obwohl sie lange schon in dem Pariser botanischen Garten cultivirt war, so hatte

sie jedoch weder dort, noch in irgend einem andern Garten geblüht; und es ist nicht wohl möglich, die Gründe zu errathen, welche Lamarck bewogen haben, die *Agave* (jetzt *Fourcroya*) *cubensis* Jacq. mit seiner *A. mexicana* zu vereinigen, und als eine Abart derselben zu betrachten. Er verwechselt sogar beide Arten, indem er (Encycl. 1. p. 53) in der Adumbration der *A. mexicana*, einer Seits, den Wurzelstock und die Blätter nach der im Pariser Garten lebenden Pflanze beschreibt, und anderer Seits, dem Werke von Jacquin die Beschreibung entlehnt, welche dieser von der Blume und dem Blüthenstande seiner *A. cubensis* gegeben hat.

Diese so unrichtig bestimmte Art hatte ich Herrn Haworth mitgetheilt, und seine *A. mexicana* Suppl. p. 41 ist die ächte Lamarck'sche Pflanze. Späterhin jedoch war ich zufällig in den Besitz von zwei uralten Exemplaren dieser Art gekommen, welche seit Commelyns Zeiten, vielleicht, in einem Holländischen Garten gelebt hatten, und es schien mir fast unmöglich zu sein, dass Miller diese Art nicht sollte gekannt haben. Ich besass zur Zeit, wo ich in meinem Hortus Dyckensis das Verzeichniss der zur Gattung *Agave* gehörigen Arten gab, noch nicht die *A. Keratto*, und ich hielt irrtümlich die *A. mexicana* für diese Art. Alles, was ich von *A. Keratto* sage, gehört also zu *A. mexicana*, deren Diagnose folgende bleibt:

„*A. acaulis*, foliis lato-oblongis acutis confertis strictis planis pallide viridibus pruinosis, ad margines repando-dentatis tinctura rubedinis dentibusque instructis numerosis rigidis ineurvulis nigricantibus, spina terminali subulata brunnea.“ *Nob.*

Die Blätter sind 2—3 Fuss lang, und 5—6 Zoll breit, abwärts ein wenig verschmälert, zahlreich, nicht sehr fleischig, anfrechtstehend, steif, flach, blassgrün, mit einem dünnen Reife überzogen, und an ihrem Rande (besonders gegen die Spitze hin), röthlich gefärbt. Die Randstacheln sind zahlreich, gedrängt, etwas hakig gekrümmt, gelblich, im Alter schwarz; der Endstachel braun. Diese Pflanze hat nie geblüht.

8. *A. Salmiana* Otto *Allg. Garten-Zeitung* 1842. p. 51. *A. acaulis*, foliis perpaucais latis elongatis rigidissimis cinerascens-viridibus, inferne semicylindraceo-nerassatis repando-dentatis, dentibus corneis, superne sensim attenuatis ad margines laevibus, et in spinam gracilem longissime productis. *Nob.*

Die Blätter dieser ausgezeichneten Art sind gegenwärtig in meinem Garten 2½ Fuss lang, und in ihrer Mitte 6 Zoll breit. Sie sind abwärts nur wenig verschmälert, durch ihre Dicke jedoch von allen verwandten Arten unterschieden. Auch unterscheidet sich die *A. Salmiana* durch die geringe Anzahl ihrer sparrigen, unregelmässig vertheilten Blätter, deren kaum 6—7 gleichzeitig entwickelt sind.

9. *A. Jacobiana*; *aeaulis*, foliis late-oblongis, acutis erecto-patulis laevibus inferne inerassatis superne ineurvatis luride viridibus

supra concavis subtus convexis rigidissimis, ad margines inferne repando-grandidentatis, dentibus corneis valde remotis recurvulis basi latis subdecurrentibus brunneis, apicem versus integris in spinam terminalem longam attenuatis. *Nob.*

Der Herr Oberst Jacobi, der eine ausgezeichnete Sammlung *Agaveen* besitzt, hat die Gefälligkeit gehabt, mir diese bisjetzt unbekannte Art mitzutheilen. Sie stammt aus dem Carlsruher Garten her, wo sie aus Samen gezogen worden ist. Sie zeichnet sich aus durch ihre anrecht stehenden, an ihrer Spitze einwärts gekrümmten glatten Blätter, welche bisjetzt 1½ Fuss lang und 4½ Zoll breit sind. Sie sind abwärts nur wenig verschmälert und laufen spitz in einen 1½ Zoll langen Endstachel aus.

10. *A. tehuacanensis* Karw. Otto l. c. p. 51. *A. acaulis*, foliis patentibus lanceolato-oblongis valde angustatis concavis crassis glaucescenti-viridibus opacis asperis, ad margines excavato-grandidentatis, dentium parte inferiore carnosa, superiore cornea, retrorsum uncinata aequae ae spina terminalis longissime producta, brunneis. *Nob.*

Unter obigem Namen habe ich diese Pflanze von Herrn von Karwinski erhalten, der sie aus Amerika mitgebracht, und ebenfalls in den Berliner botanischen Garten eingeführt hat. Sie ist mir auch späterhin und, wenn ich nicht irre, aus dem Münchener Garten, unter einer anderen Benennung (der nämlich von *A. scabra*) zugeschickt worden. Sie steht durch ihre Stachelbildung der *A. potatorum* am nächsten; weicht aber vollständig von ihr ab durch längere, etwa 1½ Fuss lange, an der Basis 3 Zoll breite, und allmählig in den Endstachel anlaufende, weniger zahlreiche Blätter. Auch unterscheidet sie sich durch zahlreiche Wurzelansläufer.

11. *A. scabra* *aeaulis*, foliis rhombeo-oblongis junioribus suberecto-patulis senioribus recurvato-patentissimis cinerascens-viridibus supra plano-concaviuseulis basin versus convexis, ad margines inferne minute serrulatis, superne repando-dentatis, dentibus corneis recurvulis brunneis, apice in spinam validam exeuntibus. *Nob.*

Diese Pflanze, welche bei Chihuahua wächst und in unseren Gärten von Samen aufgegangen ist, welchen Dr. Wislizenus nach Deutschland geschickt hatte, ist oft mit *A. tehuacanensis* verwechselt worden. Sie unterscheidet sich jedoch durch ihre zahlreicheren, nach oben zu nicht verengten, sondern breiter werdenden Blätter, die nur 5 Zoll lang und 2—2½ Zoll breit (an ihrer breitesten Stelle) sind. Diese Art, die wir seit 11 bis 12 Jahren schon cultiviren, gehört offenbar zu den kleinsten in der Gattung.

12. *A. potatorum* Zucc. l. c. p. 674. et *A. Scolymus* Karw. — *Dietr. Allg. Garten-*

Zeit. 1843. p. 402. -- **A. elegans, latifolia, pulchra Hort.**

Zwischen diesen beiden, durch Herrn von Karwinsky als zwei verschiedene Arten in unsere Gärten eingeführten Pflanzen ist kein Unterschied zu finden. Ich habe sie von ihm selbst erhalten, und seit beinahe 30 Jahren, dass sie in meinem Garten stehen, habe ich sie nicht einmal als Spielarten von einander trennen können. Dr. Zuccarini hat in den *Act. Acad. Caes. Leop. Nat. Cur. Vol. XVI.* folgende Diagnose von der im Münchner Garten kultivirten **A. potatorum** gegeben:

„**A. acaulis**, foliis late oblongis planis glaucis margine spinoso-dentatis, dentium saepe inaequalium parte inferiore carnosae recta, superiore cornea acuminata retrorsum vel antrorsum uncinata, aequae ac spina terminalis longa subulata pallide fuscis.“

Und 10 Jahr später, wo in dem Berliner Garten eine unter dem Namen von **A. Scolymus** dort eingeführte Pflanze zur Blüthe kam, gab Dietrich in der Allg. Garten-Zeitung (1843. p. 402) eine vollständige Beschreibung derselben. Sie lautet wie folgt:

„**A. Scolymus**, acaulis; foliis humifusis obverse-lanceolatis vel subspathulatis, apice in spinam validam canaliculatam attenuatis, margine spinoso-dentatis, dentibus recurvatis deciduis, supra planis vel convexiusculis, subtus convexis; scapo stricto apice paniculato, pedunculis brevibus adscendentibus, floribus fasciculatis, perigonii laciniis linearibus, stylo staminibusque perigonio duplo longioribus.“

Der wesentliche Character dieser Art besteht in ihren kurzen, kaum einen Fuss langen, glatten, beiförmigen, verkehrt eiförmigen Blättern, die oben abgestumpft und 5 Zoll breit sind, und fast plötzlich in einen 2 Zoll langen Endstachel auslaufen.

13. **A. vivipara L.** — *Schult. l. c. p. 727.* *Delenda sunt synonyma Lamk. Encycl. et Milleri, quae ad A. soboliferam pertinent; delend. quoque synonymum Rumph. Amb. V. t. 94; sed addendum synonymum Dillenii „Aloë barbadensis mitior. H. Elth. 1. p. 23. tab. 19. Fig. 21.*

Diese Art unterscheidet sich von allen verwandten durch die hellgrüne Farbe ihrer Blätter. Auch sind die Randstacheln klein und stehen oft so gedrängt beisammen, dass beim ersten Anblick die Pflanze nicht zur *§. Macrocanthae* zu gehören scheint; höhere Affinitäten jedoch weisen ihr dort ihre richtige Stelle an.

14. **A. lurida Ait.** — *Zucc. l. c. p. 670.* — **A. Vera Crucis Nob. H. Dyck. p. 308.** — *Delend. synonym. Herm. et addend. Commel. H. Amst. II. t. 16.*

Dr. Zuccarini hat eine vortreffliche Abbildung

und folgende Diagnose dieser Art, welche in dem Münchener Garten geblüht hatte, gegeben:

„**A. caulescens**, foliis e basi parum dilatata late lineari-oblongis utrinque planis laxis glaucescentibus spinoso-dentatis, dentibus brevibus rectis corneis, margine inter eos herbaceo glabro, spina terminali valida; stipite paniculato, ramulis ultimis subcymoso-fasciculatis.“

Sie bildet einen kurzen Stamm; ihre zahlreichen, lederartigen, zurückgebogenen, grünlich-grünen Blätter sind 2–3 Fuss lang, in der Mitte 5 Zoll breit, nach unten stark verengt, am Rande mit kleinen, zahlreichen, schwarzen Stacheln besetzt, und in einen zolllangen braunen Endstachel spitz auslaufend.

Die von Jacquin in seinen *Collectaneis T. IV. p. 94.* beschriebene, und tab. I. abgebildete **A. lurida** ist eine andere von der obigen verschiedene Art. Der Schönbrunner Garten hat sie aus Holland erhalten, und spräche Jacquin nicht von ihrem einen Fuss hohen Stamme, so würde ich vielleicht geneigt sein, sie für **A. mexicana** zu halten.

15. **A. Ixtli Karw.** — *Nob. H. Dyck. p. 306.* **A. acaulis**, foliis erecto-patentibus strictis rigidissimis lanceolato-oblongis glaucescenti-viridibus inferne semicylindraco-incrassatis superne canaliculatis, ad margines repando-dentatis; dentibus remotis corneis latiusculis uncinatis nigricantibus, spina terminali valida subulata atropurpurea. *Nob.*

Die wenig zahlreichen, steif-aufrechtstehenden mehr faserig als fleischigen Blätter sind 1½–2 Fuss lang, in der Mitte 2½ Zoll breit, abwärts ein wenig verengt, und in einen pfriemenförmigen Endstachel auslaufend. Diese Art unterscheidet sich von **A. lurida** durch ihre viel kürzern, steifen, geraden Blätter und ihre stärkeren entfernter stehenden Randstacheln. Sie wächst in Yucatan, und wird als eine nützliche Faserstoff liefernde Pflanze dort angebauet.

16. **A. macrocantha Zucc. l. c. pag. 676.** — *Nob. H. Dyck. p. 305.* — **A. foliis lineari-lanceolatis subtrigono-incrassatis superne planis vel convexis valde carnosis glaucis spinoso-dentatis, dentibus remotiusculis latis corneis cuspidatis rectis vel uncinatis nigricanti-fuscis, margine inter dentes nudo herbaceo, spina terminali maxima (pollicari) robusta subulata nigricanti-fusca. Zucc.**

Diese Art gehört zu den kleineren in der Gattung. Ihre Blätter sind zahlreich, grünlich, aufrecht stehend, 8–9 Zoll lang, und 1½–2 Zoll breit. Die Randstacheln sind unregelmässig vertheilt und fehlen oft ganz an einigen Stellen. Der Endstachel ist 2 Zoll lang.

17. **A. flavescens H. Monac.** — *Nob. H. Dyck. p. 8.* **A. subcaulescens**, foliis lineari-

lanceolatis numerosis confertis ima basi supra convexiusculis superne concavis subtus convexis glaucis spinoso-dentatis; dentibus parvis remotis eorneis rectis vel uncinatis, spina terminali semipollicari subulata rufescente. *Nob.*

Ich habe diese Pflanze lange für eine schmalere Abart der *A. macroacantha* gehalten, jedoch je älter sie wird, desto mehr entfernt sie sich von dieser durch einen 3—4 Zoll hohen Stamm; durch zahlreichere, schmalere und etwas längere Blätter, die weniger fleischig und auf ihrer Fläche rinnenförmig ausgehöhlt sind.

18. *A. rigida* Mill. — *Fourcroya rigida* Haw. — *Schult. l. c. p. 731. addendum Comel. H. Amst. II. t. 17.*

A. subcaulescens, foliis erecto-patulis confertis anguste lineari-lanceolatis tenuibus rigidis subcanaliculatis incurvulis glaucescentibus, ad margines inferne dentatis, dentibus cartilagineis parvulis nigricantibus, superne integris et in spinam terminalem abbreviatam subulatam nigram exeuntibus. *Nob.*

Diese Art bildet einen kurzen Stamm; ihre zahlreichen Blätter sind 15—18 Zoll lang, und in der Mitte etwa 2 Zoll breit. Diese Blätter sind dünn, ziemlich steif, flach, oder abgeflacht-rinnenförmig. Der Blüthenschaft ist 9 Fuss hoch, und es ergiebt sich offenbar aus der Abbildung, welche de Spin von der Blume gegeben hat, dass die Pflanze zur Gattung *Agave* gehört.

19. *A. Karwinskii* Zucc. l. c. p. 677. — *Otto Allg. Garten-Zeit. 1842. p. 50.*

A. caulescens, foliis laete viridibus e basi orbiculariter dilatata late lorato-linearibus rigidis, superne eoneavis, remote spinoso-dentatis, dentibus rectis vel uncinatis cuspidatis totis corneis nigricantibus, margine inter dentes herbaceo, spina terminali valida recta nigricante, utrinque in marginem corneum plus minusve decurrente. *Zucc.*

Der Stamm ist 3—4 Zoll hoch und 2 Zoll dick. Die zahlreichen bei 2 Fuss langen, und nur 12—15 Linien breiten Blätter sind steif und gerade. Sie zeichnen sich durch ihre hellgrüne Farbe aus, und durch ihre schwarzen und breiten Stacheln, welche am Rande abwärts viel gedrängter beisammen stehen und kaum 3 Linien von einander entfernt sind. Sie vermehrt sich auch selten nur durch einige Wurzeltriebe.

20. *A. laxa* Karw. — *Otto Allg. Garten-Zeit. 1842. p. 51.*

A. aeaulis, foliis laxis anguste lineari-lanceolatis recurvato-patulis tenuibus supra canaliculatis incurvulis luteo-viridibus, ad margines spinoso-dentatis, dentibus subremotis corneis gracilibus antrorsum uncinatis aequae

ac spina terminalis subulata brevis atro-purpureascentibus. *Nob.*

Die Blätter dieser Pflanze sind wenig zahlreich, zuerst aufrecht stehend, die älteren abstehend zurückgebogen, gelblich grün, 2 Fuss lang und 1 Zoll breit, dünn, rinnenförmig einwärts gekrümmt, und in einen kurzen Stachel endigend. Die Randstacheln stehen ziemlich gedrängt, sind schmal und dunkelroth gefärbt.

21. *A. pugioniformis* Zucc. l. c. p. 676. — *Nob. H. Dyck. p. 306.*

A. aeaulis, foliis linearibus apice longe attenuatis pugioniformibus rigidis carnosis subtus convexis supra parum eoneavis glaucescentibus margine spinoso-denticulatis, dentibus remotis parvis corneis vel ima basi subcarnosis, margine inter eos herbaceo integerrimo, spina terminali valida subulata rigida aequae ac dentes purpureo-fusca. *Zucc.*

Die Blätter sind aufrechtstehend, zahlreich, grau-grün, 2 Fuss lang und kaum $\frac{3}{4}$ Zoll in ihrer ganzen Länge breit; halb-stielrund und in einen zolllangen Endstachel dolchförmig auslaufend. Die Randstacheln stehen entfernt, sind breit und dunkelbraun. Die Pflanze vermehrt sich leicht durch zahlreiche Wurzeltriebe.

22. *A. serrulata* Karw. — *Otto Allg. Garten-Zeit. 1842. p. 51.*

A. acaulis, foliis lineari-lanceolatis subrigidis tenuibus subcanaliculatis glaucescentibus, ad margines serrulato-dentatis, dentibus cartilagineis minutis confertis albidis, spina terminali basi herbacea imo apice cornea nigricante. *Nob.*

Diese Art zeichnet sich durch ihre bei 2 Fuss langen und nur 1 Zoll breiten rinnenförmigen, grünlich grünen Blätter aus, die am Rande sägeförmig gezähnt sind, und in eine weiche Stachelspitze auslaufen.

23. *A. rubescens* *Nob. H. Dyck. p. 306.* — *A. punctata* *Nob. l. c.* — *A. flaccida* *H. Monac.*

A. aeaulis, foliis laxis lineari-lanceolatis tenuibus subflaccide recurvatis supra canaliculatis incurvulis, glaucis (sole ardente purpureascentibus) ad margines undulatis spinoso-dentatis, dentibus cartilagineis parvulis approximatis albidis apice aurantio-brunneis, spina terminali gracili interdum subrigida. *Nob.*

Die Blätter sind wenig zahlreich, 2 Fuss lang und $1\frac{1}{2}$ Zoll breit, dünn, rinnenförmig einwärts gekrümmt, schlaff zurückgebogen, grünlich grün, den Sommer über jedoch und in freier Luft röthlich gefärbt. Diese Art weicht durch einen halbsteifen Endstachel, so wie die frühere (*A. serrulata*) durch ihre sägeförmigen Randstacheln ein wenig von dem Character der Unter-

abtheilung ab; alle übrigen Affinitäten aber weisen ihnen hier ihre Stelle an.

24. **A. bulbifera** Nob. *H. Dyck. p. 303.*

A. acaulis, foliis loriformiter longe lanceolatis recurvato-patentissimis flaccidis coriaceis glauco-viridibus, supra planis utrinque laevibus, ad margines undulatis repando-grandidentatis, dentibus herbaceis remotis apice uncinatim cartilagineis, et in mucronem herbaceum exeuntibus. *Nob.*

Diese Pflanze unterscheidet sich von allen übrigen Arten durch ihre schlaffen, dünnen, riemenförmigen, 2 Fuss langen und 2 Zoll breiten Blätter, die abwärts nur wenig verengt und in eine weiche Stachelspitze endigend, an ihrem wellenförmigen Rande mit weit ausgeschweiften krautartigen Zähnen besetzt sind.

25. **A. bromeliaefolia** Nob. *H. Dyck. p. 303.*

A. acaulis, foliis linearilanceolatis erecto-recurvulis acutis tenuibus subcanaliculatis laete viridibus, ad margines repando-dentatis, dentibus confertis rectis herbaceis apice flavo-brunneis, et in mucronem herbaceum productis. *Nob.*

Diese Art zeichnet sich durch ihre 3 Fuss langen und kaum $2\frac{1}{2}$ Zoll breiten, aufrecht stehenden Blätter aus. Sie sind am Rande ausgeschweift und bilden, wie bei *A. bulbifera*, krautartige Zähne, welche nur viel enger und gedrängter beisammen stehen. Diese Zähne sind an ihrer Spitze gelblich-braun; die Stachelspitze fehlt ganz.

26. **A. Commelyni** Nob. *H. Dyck. p. 301.*

A. acaulis, foliis oblongo-lanceolatis acutis erecto-patulis coriaceis planis lactissime viridibus supra laevibus subtus asperiusculis, ad margines undulatis, inferne repando-grandidentatis, dentibus herbaceis apice cartilagineis fulvidis, superne plus minusve integerrimis, et in mucronem inermem productis. *Nob.*

Die Pflanze hat grosse Ähnlichkeit mit *Foureroya gigantea*. Sie unterscheidet sich durch kürzere, nur 2 Fuss lange, Blätter, welche hingegen in ihrer Mitte bei 4–5 Zoll breit sind, am Rande wellenförmig gebogen, und an der untern Hälfte desselben grosszählig ausgeschweift. Ihre obere Hälfte ist meist ganzrandig, und läuft in eine weiche Stachelspitze aus.

27. **A. sobolifera** Herm. *Hort. Lugd. bat. 16, 17.* — *A. vivipara* Lamk. *Encycl. 1. p. 53.* — *A. vivipara* Mill. *Diet. n. 5.* — *Nob. H. Dyck. p. 307.*

A. acaulis, foliis late oblongis acutis, junioribus erectis senioribus patentissimis varie revolutis, basi crassis convexiusculis superne planis aut concaviusculis coriaceis, lactissime viridibus nitidis, ad margines repando-dentatis, dentibus herbaceis apice cartilagineis

aurantio-fulvis et in mucronem subrigidum productis; scapo paniculato. *Nob.*

Diese schöne Pflanze hat 3 Fuss lange, und in der Mitte 5–6 Zoll breite lederartige Blätter, welche sonderbar hin und her schlaff gebogen sind, und sich durch ihre hellgrüne Farbe auszeichnen. Die Stacheln am Rande der Blätter, so wie auch der Endstachel sind krautartig mit einer pomeranzengelben knorpeligen Spitze.

28. **A. xylonacantha** Nob. *A. acaulis*, foliis elongatis recurvato-deflexis squarrose divergentibus rigidis asperis cinereo-virescentibus, sensim attenuatis supra concaviusculis subtus convexis apicem versus carinulatis et triquetro-productis, margine cinctis lignosa repando-grandidentata; dentibus cinerascens-brunneis remotis compressis deltoideis magnitudine et directione variis, spina terminali subpollicari rigidissima brunnea; scapo simpliciter, floribus laxo racemosis. *Nob.*

Scapus gracilis basi diametro vix 9-linearari, et pedes 5–6 altus, simplex, viridis, glaber, inferne bracteis sterilibus acuminatis instructus. Flores in racemum laxum dispositi, erecti, breve pedicellati, saepe geminati et bractea basi lata, apice acuminata, pallide violacea suffulti. Perianthium sesquipollicem longum, perviride, inferne tubulosum, tubo supra germen parum constricto, apice sexpartitum, laciniis erectis, strictis, angustis, obtusiusculis, viridibus, 6–7 lineas longis. Stamina basi laciniarum inserta, et longe exserta; filamentis rubro-fuscis, erectis, filiformibus, sesquipollicem longis; antheris magnis, linearibus, flavis, versatilibus. Stylus filiformis, erectus, staminibus brevior; stigma trigono-globulosum. Capsula parvula, trigona. Flores inodori. *Nob.*

Ich habe diese sonderbare Art aus dem Pariser botanischen Garten, wo sie aus Samen gezogen worden ist, erhalten. Ihre Blätter sind $1\frac{1}{2}$ Fuss lang, an ihrer Basis $2\frac{1}{2}$ Zoll breit, und laufen allmählig in eine dreikantige Spitze, und einen starken Endstachel aus. Diese Blätter sind wenig zahlreich, steif, zurückgekrümmt, sparrig-divergirend, und an ihrem Rande mit einem breitzähligem Saume eingefasst, der aus einem Gewebe von Holzfasern besteht und von dem Blatt-rande ablösbar ist. Diese Pflanze hat in meinem Garten geblüht und ihre Samen zur Reife gebracht. Sie gehört zu den nur einmal blühenden Arten dieser Gattung, und ist nach der Blüthe abgestorben.

29. **A. coerulescens** Nob. *A. acaulis*, foliis elongatis angustis erecto-patulis rigidis strictis laevibus opacis utrinque glauco-coerulescentibus sensim attenuatis, supra plano-concavius-

culis subtus convexis, margine cinctis sublig-
nosa superne integerrima inferne dentata,
dentibus parvulis subremotis reetis vel unci-
natis albis, spina terminali subulata valida
fulvida. *Nob.*

Diese Art habe ich mit der vorigen aus dem
Pariser Garten erhalten. Sie gehört mit dieser und
der folgenden zu den kleinern Arten in der Gattung
Agave, und unterscheidet sich auf den ersten Anblick
durch die auffallend bläuliche Farbe ihrer 15 Zoll
langen, an der Basis $1\frac{1}{2}$ Zoll breiten Blätter, und ihre
weissen Randstacheln.

30. *A. univittata* Haw. — *Nob. H. Dyck.*
p. 308.

A. acaulis, foliis elongatis angustis erecto-
patentibus rigidis strictis nitidulis sensim at-
tenuatis, supra plano-concaviusculis perviridibus
cum linea media albida, subtus convexis pallide
viridibus, margine cinctis lignosa aut cornea su-
perne integerrima inferne dentata, dentibus
validis remotis uncinatis primo fuscis dein
cinereis, spina terminali subulata valida brun-
nea. *Nob.*

Diese Art kommt ursprünglich aus dem Berliner
botanischen Garten. Von dort hat sie Haworth im
Jahre 1830 erhalten, und er hat sie in dem 10. Bande
des Phil. Magaz. p. 414 sehr unvollkommen beschrieben.
Ihre Blätter sind $1\frac{1}{2}$ Fuss lang und $1\frac{1}{2}$ Zoll an der
Basis breit und zeichnen sich durch einen breiten
hellen Streifen auf der Oberfläche aus. Die Rand-
Stacheln sind denen der *A. heteracantha* ähnlich.

31. *A. Poselgeri*; acaulis, foliis confertis
anguste lanceolatis erecto-patulis rigidiusculis
parum carnosus, supra canaliculatis incurvatis
perviridibus cum linea media paulum palli-
diore, subtus convexis pallide viridibus lineo-
lisque saturatoribus longitudinaliter striatis,
margine tenui cinctis cornea fulvo-rubra su-
perne integra inferne dentata, dentibus re-
motis uncinatis rigidis acutissimis, et in spinam
subulatam brunneam attenuatis; scapo sim-
plici. *Nob.*

Der Herr Dr. Poselger hat diese Pflanze, die zu
den kleinsten in der Gattung Agave gehört, von seiner
Reise mitgebracht. Er fand sie häufig an dürrn und
steinigen Stellen auf der mexicanischen Hochebene,
wo sie Lechugilla genannt und zur Verfertigung
einer Art Bindfaden benutzt wird. Ihre zahlreichen,
kaum 8-9 Zoll langen und 8-9 Linien breiten Blätter
zeichnen sich durch ihre brennend rothen und scharfen
Randstacheln aus. Ihr Blüthenschaft wird etwa 8 Fuss
hoch und trägt blässröthliche Blumen in einer dicht-
gedrängten Blüthentraube oder Ähre.

32. *A. heteracantha* Zucc. l. c. p. 675. —
Nob. H. Dyck. p. 303.

A. acaulis, foliis late lanceolatis planis vi-
ridibus, margine castaneo corneo dentato
cinctis, dentibus valde approximatis compressis
deltoideis acuminatis magnitudine ac directione
variis rectis vel uncinatis, spina terminali va-
lida recta subulata. *Zucc.*

Adest in horto varietas forte paulo minor,
foliis (sicut in *A. univittata*) supra linea media
lata pallidiore notatis.

Die Blätter dieser schönen Art sind sehr zahlreich,
aufrecht-abstehend, flach, gerade, $1\frac{1}{2}$ Fuss lang und
 $2\frac{1}{2}$ Zoll in ihrer Mitte breit, abwärts ein wenig ver-
engt und aufwärts in einen $1\frac{1}{2}$ Zoll langen End-
stachel spitz auslaufend. Der gezähnte Rand der
Blätter scheint von einer härteren Consistenz zu sein,
und eher horn- als holzartig genannt werden zu
müssen.

33. *A. Keratto* Mill. — *Haw. — Schult.*
l. c. p. 727.

A. acaulis, foliis lanceolato-elongatis erecto-
patulis inferne semicylindraceis superne ap-
planatis crassiusculis subrigidis, apice at-
tenuatis canaliculatis in spinam terminalem
fuscam longe productis, prasinis nitidis in-
tegris, margine tenui serrulatis dentata, ser-
raturisque minutissimis fulvidis cinctis. *Nob.*

Obwohl Miller in den wenigen Worten »*A. foliis*
erectis, laete viridibus, margine fuscis, minime ser-
ratis« den Character dieser Art sehr richtig angegeben
hat, so scheint sie doch in England unbekannt ge-
blieben zu sein, da Aiton in den beiden Auflagen
des Hort. Kewensis sie mit einer der gescheckten Ab-
arten der *A. americana* verwechselt. In unseren
Gärten ist sie fast nicht zu finden. Ihre Blätter sind
gegenwärtig $1\frac{1}{2}$ Fuss lang, in der Mitte 2 Zoll breit,
und zeichnen sich durch ihre lebhalte smaragdgrüne
Farbe aus.

34. *A. chloracantha* *Nob.* — *Otto Allg.*
Gart. Zeit. 1842. p. 50.

A. subeaulense, foliis elongato-lanceo-
latis recurvato-patentissimis senioribus deflexis
basi semicylindraceis crassis superne coriaceis
subcanaliculatis apice in euspidem mollem
longe productis, viridibus nitidis, ad margines
integris serrulato-dentatis, dentibus subiner-
mibus minutis valde confertis primo albis dein
nigricantibus. Scapo simplice; floribus gemi-
natis dense racemosis.

Scapus graeilis, basi diametro vix 7-lineari,
et pedes 5 altus, simplex, viridis, glaber, in-
ferne bracteis sterilibus acuminatis instructus.
Flores in racemum densum dispositi, creeti,
brevissime pedicellati, geminati, et bractea
basi lata apice acuminata, violacea, suffulti.
Perianthium sesquipollicem longum, laete vi-

ride, tubuloso-campanulatum, sexpartitum, laciniis latiusculis, recurvulis, obtusiusculis, linea media saturatiore, et ad apicem margine tenui rubra notatis. Stamina basi laciniarum inserta, longissime exserta; filamentis rubro-fuscis, erectis, filiformibus, $2\frac{1}{2}$ poll. longis; antheris magnis, linearibus, flavis, versatilibus. Stylus filiformis, erectus, staminibus brevior. Stigma trigono-globulosum. Capsula oblonga, trigona. Flores inodori. *Nob.*

Alle zur §. *Micracanthae* gehörigen Arten weichen von denen der beiden vorigen Unterabtheilungen durch ihre ganzrandigen Blätter ab, die nur mit kleinen, flachen, biegsamen Sägezähnen, oder dünnen wimperartigen Stacheln besetzt sind, und unter diesen Arten ist die *A. chloracantha* besonders durch den Umstand merkwürdig, dass sie nach ihrer Blüthe nicht abgestorben ist. Sie hatte bereits einen 5 Zoll hohen und $1\frac{1}{2}$ Zoll dicken Stamm gebildet, als im Frühjahr 1853, aus dem Mittelpunkte des Kopfes, zahlreiche und schmälere Blätter hervorstiegen, welche ein nahes Blühen der Pflanze anzukündigen schienen. Es theilten sich jedoch die Blätter zuerst nur in zwei Köpfe, von welchen der eine den hier beschriebenen Blüthenschaft hervorbrachte, und der andere zu wachsen fortfuhr; so dass gegenwärtig die abgestorbenen Überreste desselben in dem Winkel eines der unteren Blätter stehen und den Anschein haben, als wäre der Blüthenschaft winkelständig gewesen. Die Blätter sind $1\frac{1}{2}$ Fuss lang und 2– $2\frac{1}{2}$ Zoll in der Mitte breit.

35. *A. mitis* *H. Monac.* *A. acaulis*, foliis late oblongo-lanceolatis patenti-incurvulis crassis utrinque laevissimis, inferne planis subtus convexis superne concavis apice canaliculatis acutis in cuspidem subspinescentem attenuatis, perviridibus nitidis integris, ad margines irregulariter serrulato-dentatis, dentibus subinermibus minutis confertissimis varie in vel recurvulis aut subconfluentibus albidis imo apice nigris. *Nob.*

Diese Pflanze habe ich aus dem botanischen Garten in München erhalten. Ihre Blätter sind 1 Fuss lang und über 3 Zoll breit, dunkelgrün, glatt und glänzend, und an ihrem Rande dicht mit kleinen, biegsamen, unregelmässig hin und hergebogenen, auch zusammenfliessenden Zähnen besetzt. Der Endstachel ist krautartig und an der äussersten Spitze nur steif, und bräunlich gefärbt.

36. *A. micracantha* *Nob.* *A. acaulis*, foliis late ovato-oblongis patenti-incurvulis crassis utrinque laevibus, basi supra convexiusculis subtus convexis superne plano-concavis apice canaliculatis acutis in cuspidem spinescentem attenuatis, subalbicansibus opacis integris, ad margines gracile dentatis, dentibus eiliacfor-

mibus subrigidis recurvulis, primo albidis dein rubris, et mortuis nigris. *Nob.*

Adest in horto varietas hujusce speciei foliis albidioribus, magis recurvatis, et ad margines ciliis brevioribus atque pallidioribus instructis.

Die Blätter sind 1 Fuss lang und volle 4 Zoll breit, und von allem Übrigen durch ihre bleich gelbgrünliche, fast ganz weissliche Farbe auffallend verschieden. Auch sind sie an ihrem Rande mit wimperförmigen Stacheln, statt Sägezähnen besetzt.

37. *A. yuccaefolia* *Redout.* — *Schult. l. c. p. 725.*

In der zu kurzen Diagnose dieser Art geschieht keine Meldung von den bräunlichen Flecken, welche auf der Oberfläche der Blätter sich befinden und die *Redouté* in seiner Abbildung (*Lil. t. 328*) sehr deutlich doch angegeben hat. Sie ist also folgendermassen zu berichtigen:

A. yuccaefolia; acaulis, foliis elongatis angustis a basi ad apicem longe attenuatis erecto-recurvatis canaliculato-concavis crassiusculis rigidis glaucis punctisque brunceis supra adpersis, ad margines serrulatis, serraturis minutissimis albis, spina terminali gracili brunnea. *Nob.*

38. *A. maculata* *Engelm.*

Von Herrn Dr. Engelmann habe ich im vorigen Jahre aus St. Louis in Missouri diese aus Samen eben gezogene *Agave* erhalten, deren richtige Diagnose noch nicht festgestellt werden kann. Ihre 4–5 Zoll langen, und 10–11 Linien breiten Blätter sind, wie die von *A. yuccaefolia*, „a basi ad apicem sensim attenuata, erecto-recurvata, canaliculato-concava“; sie sind aber von einer schönen smaragdgrünen Farbe, mit zahlreichern und breiteren Flecken, an ihrem Rande gröber gezähnt und, bis jetzt wenigstens, von einer weichern und krautartigen Consistenz.

39. *A. attenuata* *H. Berol.* — *Nob. II. Dyck. p. 303.*

A. caulescens, foliis late ellipticis junioribus erecto-patentibus senioribus patentissimis recurvulis, utrinque laevibus opacis albedo-virescentibus basin versus angustatis semicylindraceis crassis superne coriaceis concaviusculis, ad margines integerrimis, apice canaliculatis in cuspidem herbaceam productis. *Nob.*

Diese Pflanze bildet einen 3 Fuss hohen und $1\frac{1}{2}$ –2 Zoll dicken, wenig genarhten, fast holzigen Stamm, der an seiner Basis zahlreiche junge Triebe hervorbringt. Die Blätter sind $1\frac{3}{4}$ Fuss lang, 8–9 Zoll breit, nach unten sehr verengt; an ihrem Rande weder gekerbt noch gezähnt und laufen in eine krautartige Spitze aus. In dem ganzen Habitus dieser Pflanze liegt etwas, was den Zweifel erregt, ob sie wirklich zur Gattung *Agave* gehöre?

40. *A. filifera* Nob. *A. acaulis*, foliis a basi ad apicem sensim attenuatis erecto-patulis numerosis confertis striatis rigidissimis perviridibus, superne planis subtus convexiusculis apice canaliculatis, ad margines fibrosis, filis saepe solutis capillaceis albis, spina terminali valida fusca. Nob.

Diese Art und die folgende habe ich aus dem Pariser botanischen Garten erhalten. Beide waren ganz junge Pflanzen und schienen zuerst nur in der Zahl ihrer Blätter verschieden zu sein; es zeigten sich aber bald wesentliche Unterschiede, welche in den Diagnosen angegeben sind. Die Blätter der *A. filifera* sind sehr zahlreich, dunkelgrün, 9 Zoll lang, an ihrer Basis 1 Zoll breit und allmählig spitz auslaufend.

41. *A. filamentosa* Nob. — *A. filifera* β . *depauperata* Nob.

A. acaulis, foliis lineari-elongatis longe productis squaroso-patentibus flexuosis rigidis laete viridibus, supra canaliculatis subtus convexis, ad margines fibrosis, filis saepe solutis capillaceis albis, spina terminali valida fusca. Nob.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch ihre $1\frac{1}{2}$ –2 Fuss langen, nur 8–9 Linien breiten, hellgrünen Blätter, deren sparriger Wuchs von der regelmässigen Richtung jener der *A. filifera* ganz abweicht.

42. *A. geminiflora* Brande. — *Schult. l. c. p. 729.* — *Spreng. Syst. 2. p. 79.* — *Bot. Reg. 14. t. 1145.* — *Otto Allg. Gart. Zeit. 1834 p. 382.*

A. subaeulescens, foliis numerosissimis congestis longe linearibus subulatis subcylindraceo-ancipitibus flexilibus, junioribus erectis senioribus patenti-deflexis laete viridibus utrinque laevissimis nitidis, ad margines filiferis, spina terminali abbreviata brunnea; seapo simplicissimo, floribus geminatis, staminibus longe exsertis. Nob.

Die 18–20 Zoll langen und nur 2 Linien breiten Blätter sind an ihrer äussersten Basis verdickt und laufen an ihrer Spitze in einen kurzen schwärzlichen, 2–3 Linien langen Endstachel aus. Sie sind walzenförmig, auf beiden Flächen gewölbt, glatt, glänzend, hellgrün, und an ihrem zweischneidigen Rande, bei vorgerrücktem Alter, mit weissen haarförmigen Fäden besetzt.

43. *A. stricta* Nob. *A. subaeulescens*, foliis numerosissimis congestis longe linearibus subulatis rhombeco-ancipitibus rigidissimis, junioribus erectis senioribus patentissimis strictis subglaucescenti-viridibus, utrinque tenuissime striatulis asperulis, ad mar-

gines nudis, spina terminali elongata fulvidobrunnea. Nob.

Die eben so zahlreichen, und an Länge und Breite denen der vorigen fast ähnlichen Blätter dieser Art unterscheiden sich durch ihre Steifheit, ihren rautenförmigen Querdurchschnitt, und durch die feinen etwas scharfen Streifen, welche sie der Länge nach durchziehen. Auch sind diese Blätter an ihren Rändern nackt, und der Endstachel ist 8–10 Linien lang.

44. *A. stricta* Zucc. *l. c. p. 678.* — *Dietr. Allg. Gart. Zeit. 1844. p. 217.* — *Nob. H. Dyck. p. 307.*

A. acaulis; foliis linearibus ancipitibus pungentibus integerrimis rigidis glaucescentibus tenuissime albido-striatis; seapo stricto apice spicigero, spica densissima, perigonio tubuloso apice sexlobo, lobis erectis latis obtusissimis; stylo staminibusque perigonio duplo longioribus. *Dietr.*

A. foliis subrhombeco-ancipitibus linearibus rigidis margine nudis utrinque lineis tenuibus albidis plurimis parallelis striatis glaucescentibus seabriuseulis, spina terminali brevi. Zucc.

Die Blätter der *A. stricta* sind 18–20 Zoll lang, an ihrer Basis fast 1 Zoll breit, und laufen allmählig in einen dünnen und steifen Endstachel aus. Sie sind, bei ihrem rautenförmigen Querdurchschnitt, auf der Oberfläche eher gewölbt, als mit einer hervortretenden Leiste versehen, und auf beiden Flächen mit feinen vertieften Längsstreifen durchzogen. Diese Art unterscheidet sich von *A. stricta* durch weniger zahlreiche Blätter, die keinen so dichten Büschel bilden; auch stehen die ältern Blätter nicht steif und gerade, sondern sind bogenförmig zurückgekrümmt und an dem Rande scharf.

45. *A. brachystachys* Cav. — *Schult. l. c. p. 724.*

Zu der bereits angegebenen Übereinstimmung dieser Cavanille'schen Art mit der *A. spicata* von de Candolle und Redouté müssen auch noch die *A. Saponaria* Lindley und eine in den Münchner und Berliner botanischen Gärten unter dem Namen *A. polyanthoides* kultivirte Pflanze als Synonyme angeführt werden.

46. *A. revoluta* Klotzsch. *Allg. Gart. Zeit. 1844. p. 274.*

A. rhizomate brevi erasso, squamis vaginatis sicis membranaccis albidis vestito; foliis laneeolato-linearibus acuminatis planiusculis glaucescenti-viridibus laxiuseulis revolutis, apice teretibus marginibus integerrimis anguste albido-cartilagineis infra apicem in pagina superiore foliorum conjunctis, supra canaliculatis subtus costa inermi magis prominente notatis; seapo glaucescente proero

bracteato, floribus sessilibus dense spicatis.
Klotzsch.

Die krautartigen abwärts stark zurückgebogenen lanzett-linienförmigen Blätter sind flach; schlaff, oberhalb nur in der Mitte der Länge nach ausgehöhlt, unterhalb mit einer deutlich hervortretenden Rippe versehen, mattgrün, 6–8 Zoll lang und 9 Linien breit. Der Blumenschaft ist bei 4 Fuss hoch.

47. *A. undulata* *Klotzsch. Allg. Gart. Zeit.* 1844. p. 274.

A. rhizomate brevissimo subterraneo; foliis lanceolatis acuminatis membranaceis rigidiusculis patentibus fere conduplicatis undulatis, margine minutissime albido-dentatis, apice teretibus convolutis, subtus glaucescentibus, supra laeteviridibus. *Klotzsch.*

Die krautartigen Blätter sind an der Basis $1\frac{1}{2}$ Zoll breit, 6–8 Zoll lang, und rollen sich allmählig in eine Endspitze zusammen. Sie sind am Rande wellenförmig, und ihre beiden Hälften legen sich der Länge nach kahlförmig zusammen.

Zu diesem letzten §. der *Herbaceae* gehören auch noch die *A. virginica* *Lin.* und die *A. spicata* *Cav.*, die ich nicht besitze, welche aber sehr richtig in Schult. Syst. 7. p. 725 beschrieben sind und keinem Zweifel unterliegen.

Auders verhält es sich hingegen mit der *A. flaccida*, *angustifolia* und *polyacantha* von *Haworth*, über welche ich nur Vermuthungen aufzustellen vermag, so scheint mir die

A. flaccida (*foliis anguste lanceolatis, flaccido-recurvis, spinis marginalibus minutis* *Haw.*) identisch mit einer der beiden *A. serrulata*, oder *rubescens* zu sein. So vermuthete ich auch, dass

A. angustifolia (*caulescens, foliis anguste lanceolatis, dentato-serratis* *Haw.*)

identisch ist mit *A. rigida* *Mill.*, und was die letzte betrifft, von welcher *Haworth* folgende Diagnose giebt:

„*A. polyacantha*; foliis lorato-lanceolatis acuminatis concavo-convexiusculis perviridibus, spinis marginalibus brevibus subtriangularibus numerosissimis sursum subincurvantibus atropurpurascentibus,“

so weicht sie zwar nur durch die Worte:

(*spinis*) „subtriangularibus sursum subincurvantibus“ von der Diagnose der *A. chloracantha* ab, und eine solche Gestalt der Randstacheln würde eine wesentliche Abweichung von dem Charakter der Section *Mieracanthae* bilden. Auch bin ich geneigt, diese *A. polyacantha* *Haw.* für eine eigene Art zu halten, die, wenn sie übrigens richtig beschrieben ist? in die §. *Maeracanthae* zwischen die *A. vivipara* und die *A. lurida* gestellt werden muss.

Es bleibt mir nun noch übrig, einige Aufklärungen über die vier letzten Pflanzen zu geben, die ich nachträglich und als *Species dubiosae* in dem Namensverzeichnisse der heute bekannten *Agaveen* eingetragen habe.

Von der *A. Jacquinii* *Gaerl.* habe ich bereits schon gesagt, dass sie von *A. lurida* *Ait.* verschieden ist, und dass die einzig statthafte Vermuthung über ihre Identität mit irgend einer andern bekannten Art, die ist, dass sie wohl die *A. mexicana* *Lamk.* sein könne.

Mit grösserer Wahrscheinlichkeit hingegen kann man die *A. aspera* *Jacq.* für identisch mit *F. tuberosa* *Ait.* halten. Diese letzte Pflanze, welche *Miller* schon beschrieben hatte, ist späterhin ganz verkannt worden. Man hat sie mit *A. foetida* und *cubensis* verwechselt; auch belehrt uns *Lamarck*, dass sie, wegen ihrer schmalen (von denen der *A. foetida* nur durch einige Randstacheln verschiedenen) Blätter in dem Pariser botanischen Garten unter der Benennung von *A. angustifolia* aufgeführt war, und so hat auch *Jacquin* durch die Rauigkeit der untern Fläche dieser Blätter veranlasst werden können, sie *A. aspera* zu nennen.

Von *A. Rumphii* *Hassk.* und *A. lophanta* *Schiede* vermag ich nicht das Geringste zu sagen. Nach der Beschreibung und der Abbildung zu urtheilen, welche *Rumph* in dem *Herb. Amboinense* T. V. p. 273. t. 94. von der *Anassa sylvestris* giebt, gehört diese Pflanze nicht zur Gattung *Agave*, und die Gründe, die *Herrn Hassk.* bewogen haben, sie dennoch dieser Gattung zuzurechnen, sind leider mit allen gesammelten Nachweisungen, und mit dem Schiffe selbst, verloren gegangen, welches sie nach *Holland* bringen sollte. Es fehlt uns also nicht nur die Diagnose der *A. Rumphii* *Hassk.*, sondern auch noch der Beweis ihrer Identität mit der *Rumphischen Anassa sylvestris*. Übrigens besitzt der *Berliner Garten* eine Pflanze unter dem Namen von *A. Rumphii* und auch die *A. lophanta*, welche letztere für die ächte Art gehalten werden muss, indem sie von *Sendungen* herrührt, die *Schiede* selbst aus dem Vaterlande gemacht hat, und beide Pflanzen könnten zur Feststellung richtiger Diagnosen benutzt werden.

Es wäre sehr zu wünschen, dass nicht nur diese, sondern alle unbekanntes *Agaveen*, die in den Europäischen Gärten sich befinden, beschrieben würden, ohne dazu die Zeit ihres Blühens erst abzuwarten. Dieses gewöhnliche Verfahren scheint mir bei Pflanzen, welche zu dieser Gruppe gehören, unzumuthbar zu sein; indem man von ihrem Leben erst Nachricht erhält, wenn sie abgestorben sind. Auch sind sie an ihrem gesammten Habitus leicht zu erkennen, und die einzige zweifelhafte Frage, ob sie in die Gattung *Agave* oder *Fourcroya* gestellt werden müssen, kann ohne Nachtheil uerledigt bleiben. Auf alle Fälle habe ich den Versuch zu einer solchen *Enumeratio specierum* machen wollen, und ich veröffentliche ihn in der Hoffnung, dass er in andern Gärten eine Nachahmung finden wird.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Botanik Blütenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [0340](#)

Autor(en)/Author(s): Salm-Dyck Durchlaucht dem Fürsten zu

Artikel/Article: [Bemerkungen über die Gattungen Agave und Fourcroya nebst Beschreibung einiger neuer Arten 1-13](#)