

TASCHENWÖRTERBUCH
FÜR
BOTANIKER
UND
ALLE FREUNDE DER BOTANIK
ENTHALTEND DIE
BOTANISCHE NOMENKLATUR, TERMINOLOGIE UND LITTERATUR
NEBST
EINEM ALPHABETISCHEN VERZEICHNISSE
ALLER WICHTIGEN ZIER-, TREIBHAUS- UND KULTURPFLANZEN,
SOWIE DERJENIGEN DER HEIMISCHEN FLORA.
HERAUSGEGEBEN VON
PROFESSOR DR. L. GLASER.



LEIPZIG
T. O. W E I G E L.
1885.

Vorwort.

Das vorliegende Taschenwörterbuch sucht dem längst gefühlten Bedürfnis eines kurzen Ratgebers über die mancherlei, sich immer mehr steigernden Schwierigkeiten des botanischen Studiums entgegen zu kommen. — In dem ersten Teile will es das Verständnis lateinisch geschriebener Deskriptionstexte, lateinischer Büchertitel u. Druckorte und dasjenige der botanischen Terminologie vermitteln, indem es ein Wörterbuch der neulateinischen Kunstausdrücke vielfach griechischen Ursprungs und aller derjenigen wissenschaftlichen und geographischen Lateinworte giebt, welche gewöhnliche lateinische Wörterbücher für klassische Autoren nicht zu enthalten pflegen. — Im zweiten Teile wird die Nomenklatur der Pflanzengattungen nicht nur unserer einheimischen, sondern auch aller eingeführten Nutz- und Ziergewächse der Landwirtschaft und Gartenzucht, der Zimmer- und Gewächshausgärtnerie in möglichster Vollständigkeit etymologisch behandelt, um das Verständnis aller eingeführten Namen zu vermitteln und dadurch deren Behalten zu erleichtern, zugleich mit Andeutung richtig accentuierter Aussprache, in welcher Hinsicht in unzähligen Fällen so vielfach gefehlt wird. Von den Pflanzengattungen wird jedesmal ausser der Wörterklärung auch die übliche deutsche, sowie meist auch französische und englische Benennung angeführt, die wissenschaftliche Stellung in dem natürlichen, wie Linné'schen System ange deutet, die Synonyme und betreffenden Autoren angegeben und die wichtigsten Arten der Gattung mit Bezeichnung des Vaterlandes beispielsweise beigefügt. — Die dritte Ab-

teilung giebt sodann die populären und trivialen Deutschenamen der wichtigsten einheimischen und die volkstümlichen Fremdnamen der exotischen merkantil- und technisch-wichtigen Pflanzen oder ihrer Produkte nach ihrer wissenschaftlichen Benennung an, um über dergleichen Namen, wie sie uns in der Litteratur, in Reisebeschreibungen und Zeitschriften oder der Tageslitteratur begegnen, rasche Auskunft zu erteilen. — In dem vierten oder letzten Abschnitt wird sodann die Gesamtlitteratur der Botanik in kurzen und bündigen Anmerkungen über die wichtigsten Autoren und deren Werke mitgeteilt, so dass insbesondere ein Verständnis der den Pflanzennamen gewöhnlich beifügten Autorenabkürzungen vermittelt wird.

Wir glauben insbesondere Studierenden oder Anfängern, aber auch Lehrern der Botanik mit unserm kurzen Taschenbuche willkommen zu sein, sowie auch Freunden der Gewächse bei ihren Besuchen von Gärten, Gewächshäusern und Ausstellungen einen Dienst zu leisten, indem wir ihnen ein handliches, über alles Gewünschte schnell unterrichtendes Vademecum in die Hand geben, das denn auch namentlich praktischen Gärtnern zum Verstehen der Namen, wie zu richtiger Aussprache sowohl als Orthographie derselben verhelfen wird.

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichnis.

I. Terminologie und Pflanzenbeschreibung (Deskription)	1
II. Etymologische Nomenklatur (Worterklärung der Pflanzennamen).	
A. Lateinnamen	59
Übersicht der nicht näher ausgeführten Synonyme des Buches	371
B. Deutsch-, Trivial- und Fremdnamen der technischen, merkantilen und besonders wichtigen sonstigen Pflanzen und ihrer Produkte nach wissenschaftlicher Be- nennung	389
III. Botanische Litteratur.	
a. Die Autoren nebst Personalien und wichtigsten Werken	407
b. Geographische Botanik oder die Autoren und botani- schen Werke nach den Ländern alphabetisch zu- sammengestellt	435
c. Spezialbotanik oder botanische Monographien, Disser- tationen und andere Spezialschriften nach dem In- halt alphabetisch geordnet	458
d. Nomenklatur und Wörterbücher der Botanik	477
e. Botanische Litteratur und Geschichte	478
IV. Die wichtigsten essbaren und giftigen Schwämme.	
a. Essbare	479
b. Giftige	480
V. Übersicht des von Bartling und Bischoff verbesserten de Can- dolle'schen Systems (nach Leunis - Frank's Synopsis des Pflanzenreichs).	
A. Plantae vasculares, Gefäßpflanzen	481
A. Phanerogamae L., Phanerogamen oder Samen- pflanzen	481
I. Kl. Dicotyledonēae Juss.	481
II. Kl. Monocotyledonēae Juss.	484
B. Cryptogamae L. (Acotyledonēae Juss.) Krypto- gamen oder Sporenpflanzen	485
III. Kl. Cryptogamae vasculares, Gefäß- kryptogamen	485
B. Plantae cellulares, Zellenpflanzen	485
IV. Kl. Cryptogamae cellulares, Zellenkryp- togenen	485

Zeichen und Abkürzungen.

†	giftig.	
¶	perennirend oder ausdauernd.	3, 4, 5, 6 etc. März, April, Mai, Juni etc.
↳	Bäume, ↳ Sträucher, ↳ Halb- sträucher.	♀ Zwitter (Hermaphrodit).
(⊙)	zweijährig, ⊙ einjährig (an- nuell).	♂ mas (männlich), ♀ femina (weib- lich).

a int. = a intensivum, verstärken-
des (nicht verneinendes) a.
a priv. = a privativum, verneinen-
des a.
adj. = Adjectivum, adv. = Ad-
verbium.
a. e. = ad exemplum, zum Bei-
spiel.
aut. = autoris, eines Autoren (Ver-
fassers).
autt. = autorum, der Autoren (Ver-
fasser).
B. = Baum.
ben. = benannt.
betr. = betreffend.
Bstr. = Baumstrauch.
coll. = Collectivum od. Sammel-
namen (z. B. arborētum).
comp. = Compositum od. zusam-
mengesetztes Wort.
dem. od. dim. = Deminutivum
(Dimin.-), Verkleinerungsform.
det. = Deteriorativum, Verschlech-
terungs- od. Verringerungsform
(z. B. alsinastrum).
ds. = derselbe, dss. = dieselben.
e. g. = exempli gratia, zum Bei-
spiel.
eig. = eigentlich.
etc. = etcetera, und so weiter.
f. = filius, Sohn (L. f. = Linné
filius, Linné Sohn).
flor. = flores, Blüten (Thee).
fl. pl. = flore pleno, mit gefüllter
Blume.
fol. = folia, Blätter od. Thee.
foss. = fossil, als Versteinerung
(Petrefakt).
geb. = gebaut, d. i. angepflanzt,
auch gebildet!
gem. = gemein.
gr. = griechisch.
g. n. = genus novum, neues od.

neugebildetes Geschlechts- oder
Gattungswort.
herb. = herbarium, Pflanzen- od.
Kräutersammlung.
Hort. = Hortorum, der Gärten.
Hortul. = Hortulanorum, der Gärt-
ner.
Hstr. = Halbstrauch.
i. q. = id quod, dasselbe wie (od.
was).
j. = jetzt.
lat. = lateinisch, latin. = latini-
siert, d. i. in lateinische Form
gebracht.
loc. = locativum, Behälternamen
(z. B. pomarium).
m. = mit, m. v. v. = mit Varie-
täten.
n. = nach.
n. pr. = nomen proprium, Eigen-
namen.
obs. = obsoletus, obsolet, d. i. ab-
genutzt, nicht mehr gebräuchlich.
Off. = officinarum, der Offizinen
oder Apotheken.
s. = siehe, s. = seit, s. g. = so
genannt, s. eb. = siehe eben,
s. v. = siehe vorher, s. d. =
siehe diesen.
schr. = schrieb.
sc. = scilicet, nämlich.
st. = statt, anstatt.
Str. = Strauch.
syn. (od. nur s.) = synonym, d. i.
mitnamig, gleichbedeutend.
u. a. m. = und andere mehr.
v. od. var. = Varietät (Spielart).
v. v. = Varietäten.
v. = vorher, und v. = von.
vgl. = vergleiche.
w. = weiss.
z. B. = zum Beispiel.

I. Terminologie und Pflanzenbeschreibung (Deskription).

Der Bogen über den Vokalen kennzeichnet die Kürze, der Strich die Länge (Betonung) derselben.

- abbreviatus** abbreviert, abgekürzt.
abietinus tannenartig (v. *abies*, -ētis Tanne).
abortivus fehlgeschlagen, zu früh geboren.
abortus das Fehlenschlagen, die Verkümmern.
abrupte adv., -*tus* abgebrochen, unterbrochen.
abschasicus von Abschasi am Kaukasus.
absorptio die Aufsaugung, das „Absorbieren“.
absteminus enthaltsam, nüchtern.
acanthophyllus stachelblättrig, akanthusblättrig.
acarifer, -*fera* etc. milbenträgert (*acarus* M.).
acaulis stiel- od. stengellos.
accessorius hinzukommend (z. B. gemma Neben- od. Beiknospe).
accommadatio Anpassung, das „Accommodieren“.
aephalus kopflos (ἀ u. *κεφαλή*).
acerbus herb, bitter.
acerosus (a. e. *folium*) nadel- od. linienförmig, steif.
acervatus gehäuft, **acervus** Haufen.
acetabulum Bechergefäß.
Acetosa u. **Acetosella** L. Sauerampfer (v. *acētum* Essig).
acheniun Achene(Achäne), Schliessfrucht.
acicularis nadelförmig (*acus*, dem. *acicula*).
acidulus säuerlich, **acidus** sauer, **acidum** Säure.
acidum hydrocyanicum Blausäure.
acinaciformis säbelförmig (acinäces, -is kurzer Säbel).
acēnum od. -*us* Beere (v. Trauben u. a.).
- acladōdes** zweiglos (ἀ u. *κλαδώδης* zweigig).
Acotylēae (-ledones) Juss. Samenlappenlose.
Aeramphibryae Endl. Endumsprosser.
Aerantheae Endl. Spitzblüter. [ser. **Aeroblastae** Spitzkeimer (d. s. Monocotylen).
Aerobryae Endl. Endsprosser.
aerocarpus spitzfrüchtig.
acropetalus (z. B. Blütenentw. Frank) an der Spitze kronblättrig.
actinomorphus strahlig gebildet (ἀττικός, -ίνος Strahl, μορφή Gestalt).
aculeatus stachelig, **aculēus** Stachel.
acūmen, -*inis* Spitze, **acuminatus** zugespitzt.
acutifusculus etwas spitz, **acūtus** scharf, spitz.
adactus vermehrt.
adhaerens sich anhängend, anhangend.
adiposus fettig, fettartig (adeps, -īpis).
adligans anhaftend, -ntes (sc. radices) Klammerwurzeln.
adnascens anwachsend (v. *adnascor*).
adnatus angewachsen.
adossiert, mit d. Rücken angelehnt (fr. dos Rücken), z. B. adoss. Vorblatt b. Monocotylen, Schwender.
adpressus angedrückt.
adseendens aufsteigend.
adspersus bestreut, bespritzt.
adstringens zusammenziehend.
adulterinus unächt, auch: verschwägert.
adultus herangewachsen.
adumbratio Schattenriss, Skizze.
aduncus hakenförmig gekrümmmt.

- adustus** brandig, angebrannt.
adventitius (a. e. gemma) hinzugekommen, ungewöhnlich (z. B. Adventivknospe).
Adventiv- (in Zusammens.) s. eb., z. B. Spross, -Wurzel etc.
adversalis gegenübergestellt, gegenseitig.
adversaria, -orum Conceptbuch, Kladde od. sog. Schmierbuch.
adversarius Gegner.
aenēus ehern, kupferbroncig (Kummer).
aequalis, -ia gleichförmig, alle Blüten gleich (bei Compositen).
aequans gleichkommend, gleichgross.
aequidistans in gleichem Abstand.
aequivōcus zweideutig, z. B. generatio aequivōca Urzeugung, Urbildung.
aequorēus zum Meer gehörig.
Aērogāmae Jess. Luftblütler i. q. Phanerogāmae L.
aeruginēus(-nosus) spangrün(aerugo Grünspan).
aestivalis sommerlich, im Sommer.
aestivatio Knospenlage, i. q. prae-floratio, Art der Blume vor d. Aufbrechen (z. B. imbricata gefaltet, valvata klappig etc.).
aestuans lodernd, glühend, auch: schwankend.
affinis verwandt, **affinitas** Verwandtschaft.
affixus auf- od. angeheftet.
agāmus ehelos, ohne Blüten.
agathoeus(-oicus) guthäusig, schön wohnend ($\alpha\gamma\alpha\theta\omega\zeta$ u. $\omega\zeta\omega\zeta$).
Aggregation = Anhäufung, Zusammengesellung.
aggregatus gehäuft, zusammengestellt etc.
agrarius u. **agrestis** auf Äckern.
agrostographia Gräserkunde.
aīzoides dem ewiglebenden Aīzōon ähnlich.
alabastrum Blütenknospe.
alae Flügel(an Papilionaceenblüten).
alatus geflügelt (sc. caulis od. petiolus, mit Rand- od. Blathäuten versehen).
albellus weisslich (albus w.).
albensis an der Elbe (Albis) zu Hause.
albīdus weisslich, weiss (i. q. albus).
albūmen, -inis Eiweiss, d: Innere von Samen etc.
alburnum Splint, Jung- od. Neuholz.
aleicornis elennhörnig, wie ein Elenngeweih.
aleurites mehlartig ($\alpha\lambda\epsilon\nu\sigma\tau\eta\zeta$; v. $\alpha\lambda\epsilon\nu\sigma\sigma$ Mehl).
aleuron, -rum Kleber im Samen (s. eb.)
alexeterius ($\alpha\lambda\epsilon\varsigma\eta\tau\eta\zeta\omega\zeta$) zum Helfen od. Abwehren geschickt.
Algeria Algier, **algerensis** aus Algerien.
algīdus kalt.
alicastrum (det. v. **alīca**) Spelt- od. Kraftmehl.
alliacēus lauchartig(v.allium Lauch).
alnicōla Erlenwohner, an od. bei Erlen wachsend.
alpestris u. **alpīnus** auf den Alpen wohnend.
alpigēnus auf d. Alpen erzeugt.
alsaticus elsässer, im Elass zu Hause.
altaīeus vom Gebirg Altaï (Innerasien).
alternus abwechselnd, „alternierend“, folia alterna abwechselnd gestellte Blätter.
alternatim, adv. abwechselnd bez. der Stellung.
alternatio Abwechslung (s. eb.) z. B. im Stand der Blätter.
alternativa (sc. perforatio) Halbedeckung der Schuppenlage (im Durchschnitt einer Knospe).
alterniflōrus wechselblütig, d. Blüt. in abwechselnder Stellung.
alternifoliūs mit wechselständigen Blättern.
altilis gemästet, mastig.
aluminosus Alaun betreffend (alumen, -inis).
alutacēus sammtledern, ledergelb (alūta).
alutipes sammtlederfüssig, weichstielig.
alveolatus grubig, alveōlus Mulde, Trog etc.
amārus bitter.
ambianensis von Amiens (Ambianum).
ambiguus zweideutig, unbeständig.
amblyonēus stumpffadig ($\alpha\mu\beta\lambda\eta\zeta$ stumpf, $\nu\eta\mu\alpha$ Faden, Staubfaden).
amblypterus stumpfflügig (s. eb., $\pi\tau\epsilon\varrho\sigma\sigma$ Flügel).

- amboinensis** von Amboina (Molukken).
- amentacēus** kätzchentragend, kätzchenartig.
- amentum** (Bot.) Kätzchenblüte.
- amethystēus, -stīnus** amethystfarbig, veilchenblau.
- Amungno-Burejensis** am Amurfluss u. Burejagebirge zu Hause.
- amoeboides** amöboid i. q. amoebus.
- amoebus** gestaltwechselnd (z. B. Protoplasma).
- amoenitates** Annehmlichkeiten, Beleustigungen.
- amoenus** lieblich, angenehm.
- amorphozōa** Ohnformtiere ($\ddot{\alpha}$, $\mu\nu\sigma\varphi\dot{\eta}$, $\zeta\omega\sigma$ Tier).
- Amphibrya** Endl. Umsprosser.
- Amphicarpanthēae** Rchb. Ringsfruchtblüter (Compositen).
- amphigastria** „umbauchige“ kleine Nebenblätter der Jungermannien.
- amplexicaulis** stengelumfassend
- amplissimus** sehr beträchtlich, überaus gross etc.
- amplus** weitläufig, gross.
- ampulla** Flasche, Büchse, -ēus flaschenfruchtig.
- Amstelodānum, -sterodāma** Amsterdam.
- amygdalinus** mandelartig, wie d. Mandelbaum.
- amylum** Stärkemehl.
- anabioticus** (a. e. planta) wieder auflebend ($\ddot{\alpha}\rho\alpha\beta\iota\omega\omega$).
- anagramma** Anagramm d. i. Buchstabenversetzung eines Wortes.
- analecta, -orum** Auflese, Brosamen.
- analepticus** erfrischend ($\ddot{\alpha}\tau\alpha\lambda\eta\gamma\tau\iota\omega\dot{\sigma}$).
- analogia** Analogie, Ähnlichkeit, -lōgns „analog“ d. i. übereinstimmend etc.
- anaphyōsis** Pflanzen-Verjüngung.
- anastomōsis** „Anastomose“, Zusammennäzung zweier Gefäße.
- anatomia** „Anatomie“, Zergliederung etc., -mīeūs „anatomisch“, Zergliederung betr.
- anatrōpus** gegenläufig, z. B. ovulum anatrōpum rückläufige Samenknospe, mit Abwärtsrichtung der Mikropyle od. des Keimundes.
- anceps, -cipītis** (sc. caulis) zweischneidig.
- andicōla** die Anden bewohnend.
- androecium** Staubblatt - Inbegriff einer Blüte ($\alpha\tau\dot{\nu}\dot{\eta}\sigma$, $-r\dot{\nu}\dot{\sigma}\sigma\dot{\sigma}$ Mann, d. i. Staubgefäß, und $\sigma\dot{\nu}\dot{\iota}\sigma\dot{\sigma}$ Häuschen).
- androgynus** mannweibig (männl. u. weibl. Organe d. Blüte verwachs., s. eb. u. $\gamma\sigma\gamma\eta\dot{\eta}$ Weib).
- anfractuosus** mit Krümmungen versehen.
- anfractus** krummer Weg, Biegung, Umgang.
- angiocarpus** hüllfruchtig ($\alpha\gamma\gamma\epsilon\sigma\sigma$ Gefäß, u. $\tau\alpha\sigma\tau\dot{\sigma}\dot{\sigma}$ Frucht).
- Angiospermae** L. Hüllfrüchtige, Decksanige.
- Anglia** England, **anglicus** englisch.
- angulatus** eckig, kantig, **angulus** Ecke, Winkel.
- anguliger** Ecken führend.
- angulisans** Ecken od. Kanten bildend.
- angustifolius** schmalblättrig, **angustus** eng, schmal.
- annadversio** Bemerkung.
- anisolobus** ungleichlappig ($\ddot{\alpha}$, $\lambda\sigma\dot{\nu}\dot{\sigma}$ u. $\lambda\sigma\beta\dot{\nu}\dot{\sigma}$).
- annosus** hochbejährt.
- annotinus** vorjährig, sprossend.
- annulus** Ringschicht (an Mooskapseln, um Farnsporangien etc.).
- annūlus** einjährig, annuell.
- anomālus** ($\alpha\omega\mu\alpha\lambda\sigma$) ungleich, unregelmässig, „anomali“.
- Anophyta** Endl. Übererdigwachsende.
- antareticus** südpolarisch, „antarktisch“.
- anteēdens** vorhergehend.
- antennatus** führerförmig (antenna Fühlhorn d. Insekten).
- antennifer** Fühler führend.
- anthēla** ($\ddot{\alpha}\nu\dot{\theta}\dot{\iota}\lambda\eta$) Spirre der Binsen.
- anthelminthīeus** gegen Würmer gebraucht ($\ddot{\alpha}\nu\dot{\iota}\dot{\iota}$ u. $\ddot{\epsilon}\lambda\mu\dot{\nu}\dot{\sigma}$, $-r\dot{\nu}\dot{\sigma}\dot{\sigma}$ Wurm).
- anthēma** Blüte ($\ddot{\alpha}\nu\dot{\theta}\dot{\iota}\mu\dot{\alpha}$ i.q. $\ddot{\alpha}\nu\dot{\theta}\dot{\sigma}\dot{\sigma}$).
- anthēra** ($\ddot{\alpha}\nu\dot{\theta}\dot{\iota}\eta\dot{\alpha}$) Staubbeutel, „Anthere“.
- antheridium** männl. Organ, ähnlich Antheren (bei Algen etc.).
- anthēsis** Blütenbefruchtung.
- anthocēatum** Blattrot ($\chi\alpha\dot{\nu}\dot{\sigma}\dot{\sigma}$ eig. dunkelblau).
- anthodium** Blütenkorb, gemeins. Kelch der Compositen (v. $\ddot{\alpha}\nu\dot{\theta}\dot{\omega}\dot{\sigma}\dot{\sigma}$ blumengleich).

- anthologɪa** Blütensammlung, Blumenlese, „Anthologie“.
antholýsis Blütenauflösung (Krankheit od. Ausartung).
anthophýta Blütenpflanzen, i. q. Phanerogämae.
anthoplerósis (ἀνθηωσις) Blütenfüllung.
anthoxanthínum Blattgelb, i. q. xanthophyllum.
anthracophilus Kohlenliebhaber (ἀνθραξ, -οζ).
antiádes drüsens- od. mandelartig (ἀντιάζ, -όζ).
antieus vorderer.
antiklin, der Oberfläche entgegengesetzt od. rechtwinklig darauf (Sachs).
antidysepterícus gegen die Ruhr od. Dysenterie.
antipóda, fem. Antipodin od. Gegenfüsslerin, **Antipódes** Antipoden (in der Südsee).
antipyretíeus feuererstickend (ἀρτί, πυρ).
antiquior älter, der Ältere.
antiscorbutícus gegen den Skorbut wirksam.
antitrópus von einander gewendet, gegenüberläufig.
apertura Oeffnung, **apertus** offen. **apétalus** kronblattlos, ohne Blumenblätter (petálum, πέταλον Kron- od. Blumenbl.).
apex, -ícis Spitze, **apicélus** Spitzchen.
apháca (ἀφάνη i. q. φανή) Vogelwicke, Linse.
aphánes (ἀφανής) unsichtbar, übersehen etc.
aphrodisiácum Geschlechtsreizmittel (Aphrodite = Venus).
Aphyllae DC. (Cryptogämae) Blattlose Kryptogamen.
apicalis spitzig, spitzmützig.
apiculatus mit Spitzchen versehen.
apífer, -éra etc. bienentragend (apis u. fero).
apiifolius sellerieblättrig (v. Apium).
aponíus müsig, unthätig (ἄπορος).
apophýsis Schwellung od. Ansatz unter dem Moosbüchsen.
apothecia Keimfrüchte der Flechten, „Apothecien“, d. s. kugl. od. schüsself. Erhebungen, Sporen-lager.
appendix Anhang, Anhängsel.
applanatus geebnet, verflacht.
- approximatus** genähert, nahe zusammen.
apríeūs sonnig, sonnig stehend.
Apílus (Appulus) apulisch, aus Apulien (in Unteritalien).
Aquaticae Endl. Wasserkräuter (-quirle).
aquaticus, -tīlis in od. an Wasser wachsend.
aquigenus im Wasser erzeugt.
aquilegifolius ackeleiblättrig (Aquilegia).
aquílinus adlerartig (aquila Adler).
Aquisgrānum Aachen.
arachnoídēus spinnenähnlich.
aranífer, -éra etc. Spinnen tragend (aranea).
arborétum Baumpflanzung.
arboréns baumartig.
arbuseólus kleines Bäumchen.
arbustus Baumgarten.
arcānum Geheimnis, Geheimmittel.
archegonia Fruchtansätze, weibl. Organe der Moose etc. mit Eizellen.
archispermus nackt- od. ursamig (v. ἄρχομαι fange an, daher Erz- oder Ur-).
arête, adv. eng, dicht beisammen,
arctius enger etc.
arctíeus Polar-, **antareticus** Südpolar- (v. ἀρκτος Bären-Sternbild).
arctóus i. q. arcticus, s. eb.
arenatus gebogen, bogenförmig.
arduennensis in den Ardennen zu Hause.
Arelátm Arles, Arelat (Südfrankreich).
arenarius, -nosus im Sand wachsend.
areólae kleine Flächen zwischen den Rissen der Flechten etc. (dem. v. aréa Fläche, das „Areal“).
areolatus getäfelt, s. eb.
Argentoratum Strassburg.
argillaceus aus Thon od. Lehm, lehmgeb.
argunensis vom Fluss Argun (Nebenfluss d. Amur).
argüte, adv. scharf, spitz, -tus spitzig, zierlich, listig u. dgl.
argyraceus silberweiss.
argyrophyllos silberblättrig.
aridus trocken, dürr.
arietíinus widderartig (aries, -ëtis Widder).

- arillus** (oft fleischiger) Samenmantel.
Ariumnum Rimini (Italien).
arista Granne, **-atus** gegrannnt.
armeniæcus aprikosenartig.
aruillaris armbandartig, **-atus** mit Armband geschmückt.
armoricus aus Armorika (Bretagne).
Arovium Aarau.
arquatus, s. arcuatus.
arrhizus wurzellos ($\ddot{\alpha}$ u. $\ddot{\beta}\acute{t}\acute{u}$).
Artikulartegumente (Mikosch) = Knospenhüllen aus bleibenden Blattresten.
articulatus gegliedert, **-culus** Glied.
arundinacēns rohr- od. schilfartig.
arvensis auf Ackerfeld (arvum).
arvernus aus der Auvergne (Südfrankr.).
arvonius arvonisch (Arvonia das Land um Caernarvon im Fürstent. Wales).
ascalonicus aus Askalon (Palästina).
ascidinu Blattschlauch, **ascus** Schlauch, **asci** Schläuche der Pilzsporen.
asēuns zeichenlos ($\ddot{\alpha}$ u. $\sigma\dot{\eta}\mu\alpha$), auch : ohne Fahne (Papilionaceen).
asper, **-era** etc. rauh, scharf.
Asperifoliae L. Rauhblättrige.
asprellus rauhschuppig (Kummer).
assereūns Pfählchen (dem. v. asser Pfahl, Balken etc.).
assimilatio Verähnlichung, Aneignung.
assurgens aufsteigend, sich aufrichtend.
asthmaticus Asthma heilend, gegen Brustkrampf.
astragologia Monographie der Traganthe.
Astylae Jess. (sc. Apetälæ) Griffellose.
actaea botanica botanische Neuigkeiten, noch nicht Berührtes.
ater, **-tra** etc. schwarz, **atro-** in compos.
Atlas, **-ntis** Atlasgebirge (Nordafrika).
atomarius, **-atus** mit Atomen bestreut.
atraumentarius Dinte betr. (atra-mentum).
atrōpa (sc. ovula) geradläufige Samenbläschen i. q. orthotropa, vgl. anatropa.
atrophia Auszehrung aus Nahrungs-mangel, „Atrophie“.
- atropurpureus** schwarz- od. dunkel-purpurrot.
atrovirens schwarzgrün.
attenuatus verdünnt, verschmälert.
aucuparius zum Vogelfang dienend.
aurantiacus orange- od. pomeranzengelb od. rot.
aureliaanus aus Orleans.
aurēns golden, goldgelb.
auricōmus goldhaarig.
auricula Öhrchen (dem. v. auris Ohr).
auricularis, **-atus** Öhrchen führend, gehört.
auriscalpiuu Ohrlöffel.
ansterus herb., von scharfem Geschmack.
australasiens südasiatisch.
anstralis südlich.
anstriacus österreichisch, **Austria** Österreich.
austro- in comp. süd-, z. B. austro-occidentalis südwestlich.
autumnalis herbstlich, **autumnus** Herbst.
anxanometron (-um) Wachstums-messer ($\alpha\dot{\nu}\dot{\chi}\acute{a}rou\alpha\alpha$ u. $\mu\acute{e}t\acute{o}r$ Mass).
Auxosporeu (z. B. Diatomeen) Wachstumssporen od. = junge s. eb.
avenacēus haferartig.
Avenio Avignon.
avenerius aderlos (a u. vena Ader, „Vene“).
avernensis aus der Auvergne (Frankreich).
aversus abgewandt.
axilis zur Achse gehörig.
axilla Achsel, Blattachsel.
axillaris achselständig, in d. Blatt-achseln stehend.
axiomatics abschätzend, z. B. Forstbeschreibung.
axis Achse, Mittellinie.
azurēns himmelblau, azur- od. lasurblau.
bacea Beere, **-atus** Beeren tragend, zu Beeren geformt.
baceifer, **-era** etc. beerenträgend.
bacilli Fadenbakterien s. sogl.
bacteria Bakterie, freilebende, elliptische, bewegliche Zelle (*Bac-terioplā* Stab etc.).
bactriauus aus Baktrien (Turkestan).
badius kastanienbraun, schön braun.

- badípus** Braunfuss.
baeticus bältisch, vom Fluss Baetis
 = Guadalquivir in Andalusien.
baldensis von Baldo (in Südtirol).
Balsamiflúae Juss. Balsamfluss-
 bäume.
baltíens baltisch, vom baltischen
 Meer (Ostsee).
banaticus aus dem Banat (Süd-
 ungarn).
barbadensis von Barbados (An-
 tillen).
barbatus gebartet, bärtig.
barbulatus etwas bärtig, mit Bärts-
 chen.
basidia Sporenstützchen od. -Stiel-
 chen. Zellen, welche an der
 Spitze Sporen abschnüren.
Basila (-lea) Basel.
basipetal (z. B. Blütenentw. Frank)
 an der Blumenbasis stehendes
 Kronblatt.
basis (a. e. folii) Grund, Wurzel.
Batabis = Patavia Passau.
batávus holländisch, od. von Ba-
 tavia auf der Insel Java.
bavaricusbaierisch(BavariaBaier).
bellidiótorus, -folius masliebchen-
 blütig, -blättrig (Bellis, -idis).
berolinensis berliner, **Berolinum**
 Berlin.
betulifolius birkenblättrig.
Betulin = Birkenkorkzellenstoff
 (das Weisse etc.).
betulinus an Birken wachsend.
bicólor, -óris zweifarbig.
Bicornes Endl. Zweihörnige (An-
 therenzweihörn.).
bicornis zweihörnig.
bidens, -dentatus zweizähnig.
biennis zweijährig.
bifariam adv., **bifarius** zweifach,
 doppelt.
bifidus zweiteilig, -spaltig.
biflorus, -folius zweiblütig, -blättrig.
biforatus zweimal durchbohrt.
biformis doppelt gestaltet.
bifrons zweistirnig, Doppelgesicht.
bijeminus zweimal doppelt.
bijugus zweijochig, mit 2 Fieder-
 paaren.
bilabiatus zweilippig.
bilobus zweilappig.
bilocularis zweifächiger.
bina, -ni etc. zu zweien.
biovulatus mit zwei Eichen oder
 Samenknospen.
- bipartitus** in zwei Teile geteilt,
 zweiteilig.
bipinnatus doppelt gefiedert.
biplicatus doppelt gefaltet.
bipontinus von Zwei brücken.
bipunctatus doppelpunktirt.
bisaccatus mit zwei Säcken.
biseutatus mit zwei Buckelschilden.
bisellatus mit zwei Buckelschild-
 chen.
biserratus doppeltgesägt.
bistortus zweimal gedreht.
bisuleatus zweifurchig.
bituminosus asphaltartig, „bitu-
 minös“.
bivalvis zweiklappig.
bivélus zweisegelig (velum), ring-
 fransig (Kummer).
blandus gewinnend, sich einschmei-
 chelnd etc.
Blattspur-Stränge = Gefässbündel
 an der Basis der Blätter den
 Stamm hinab.
blesensis von Blois (an d. Loire).
Blust = Blütenstellung.
bogoriensis von Buitenzorg (auf
 Java).
bogotensis von Bogota(Südamerika).
bojicus bojisch, baierisch (Bojer =
 Baier, Bayer).
bolaris bolusartig (Bolus od. Bol =
 Thonerde).
boloniensis Boulogner.
bonariensis von Buenos-Ayres (Süd-
 amerika).
Bononia Bologna u. Boulogne.
bononiensis von Bologna od. Bou-
 logne.
boppardensis von Boppard (am
 Rhein).
borbonicus von der Insel Bourbon
 (j. Réunion).
boreali-orientalis nordöstlich.
borealis nördlich, nordisch (in comp.
 boreali- s. eb.).
Borstenkranz, zu Pappus werden-
 der Kelch der Einzelblüte bei
 Compositen.
borystheneus am Fluss Dnjepr
 (Borysthenes).
bostryx Schraubel, d. i. Trugdolde,
 deren Scheinachse immer auf
 derselben Seite ansetzt.
botanice, Gen. -es Botanik ($\beta\sigmaτα-$
 $\nuζη$ sc. $\tau\epsilon\gamma\eta$).
botaniens botanisch.
botanosophia Pflanzenkunde.

- botryapius** traubenbirnartig (*βότρως* und *ἄνθος*).
botryoides traubenähnlich.
botrytis (bess. -trytis) traubig.
bottniicus bottnisch, vom bottnischen Meerbusen.
brachiatus ästig, mit Ästen od. Armen.
brachium Ast, Arm (fr. branche).
brachypetalus mit kurzen Kronblättern.
bractea Bractee, d. i. Deck- od. Hochblatt um die Blumen herum.
bracteatus deckblätterig.
bracteola Deckblättchen.
bractescens Deckblätter treibend.
brigantiacus von Briançon od. auch von Bregenz am Bodensee (Brigantia).
britannicus britisch und Bretagner.
brunalis winterlich (v. bruna, contrahiert aus brevissima dies kürzester Tag).
brunneus braun, dunkelbraun.
Brutknospen, mehrzellige linsenförmige Organe der Fortpflanzung (z. B. bei Marchantia).
Brutzellen der Kryptogamen (vegetative Fortpfl.).
Brutzwiebeln (in den Blattachseln).
bryoides knotenmoosartig (Bryum, gr. *βρύον*).
bryologia Mooskunde, -logieus „bryologisch“.
bryophyta Moosgewächse.
bucca der Backen, die Backe.
bufonius die Kröten betr.
bulbifer, -föra etc. zwiebeltragend.
bulbiger zwiebel- od. knollenführend.
bulbillus Knospenzwiebel (in den Achseln etc.).
bulbosus zwiebelig, knollig.
bulbo-tuber Knollenzwiebel.
bulbus Zwiebel, „Bolle“.
bulla Buckel, Blase, -aeus u. -atus blasenförmig.
bumelia (*Βουργιζά*) eine Eschenart.
Burdegala (-digala) Bordeaux.
bursa Börse, Geldtasche.
bursarius börsen- od. taschenförmig.
butibacensis Butzbacher, v. Butzbach (Hess.-Darmst.).
butyraceus butterartig, butyrus Butter.
butyrosus butterig.
byssacaeus flachs- od. seidenfaserig.
- byssus** (*βύσσος*) Flachs, Seide, Baumwolle etc.
byssisēdus mit Byssus od. Fasern festsitzend.
byzantinus von Byzanz (Constantinopel).
- cabulicus** von Kabul in Afghanistan.
cacumen, -inis Gipfel, Spitze.
caducus hinfällig, leicht abfallend.
caelatus getäfelt (v. caelo ciseliere, caelum Meissel etc.).
caerulescens bläulich.
caeruleus himmelblau, blau.
caesius blaugrün, blaugrau.
caespites, -itis Rasen (auch cespites).
caespitosus in oder wie Rasen wachsend.
cajanensis von Cayenne.
Calamariae Endl. Schaffarne.
calamarius halmartig, Halm- (calamus betr.).
calaminaris auf Galmeiboden wachsend.
calamistra Kräuseleisen (hohl wie ein Halm, calamus).
calamitosus unheilbringend.
calamus Halm, Rohr.
calathidium Blütenkörbchen, Korbblütchen.
calathium (*καλάθιον*) Blütenkorb.
calathus (*καλάθος*) Korb.
calcar Sporn, -ratus gespornt, -reus spornig.
calceolus kleiner Schuh, -latus schuhförmig.
calceus Schuh, Halbstiefel (v. calx, -cis Ferse).
calceus kalkig, von Kalk (calx, -cis Kalkstein).
caliculaeus kelchförmig, beklebt (calix, -cis u. caliculus Kelch etc.).
callochrōns schönhäutig, -farbig, aber auch schwienenhäutig (calicum und *χούρα*).
callosus schwielig.
calophyllus schönblättrig.
calycanthēma in eine Krone verwandelter Kelch (z. B. Primel).
Calycantheae Rchb. Kelchblütige.
Calyciflorae Endl. Kelchblütler.
calycinus kelchartig, den Kelch betr. (calyx, -ycis Blumenkelch).
calycularis mit einem Hüllkelch versehen.
calyculatus mit Hüllkelch (kleinem Kelch) versehen.

- calyculus** Aussen- od. Hüllkelch, kleiner Kelch.
- calyptra** Haube od. Mütze der Moosblüten.
- calyptrogēnum** „*calyptrogene*“ d. i. haubenbildende Wurzelschicht (Janczewski¹⁾) (*χαλύπτρα* und *γέρων*).
- calystachys** Hülleähre (*χαλύπτω*, *στάχυς*).
- calyx**, -ycis Kelch, Blumenkelch.
- Cambiform** = Cambiumbildungsgewebe.
- cambium** Bildungssaft, Zellbildungsstoff unter der Rinde.
- cambricus** „*cambrisch*“ (Cambria oder Cumbria, das Fürstentum Wales und Cumberland).
- campylospermus** krummsamig, mit einwärts hohlem Endosperm (z. B. Doldenfrüchte).
- campylotropum** (sc. ovulum) krummläufiges Sameneichen.
- canaliculatus** mit Kanälchen versehen, gestreift.
- canalicus** (sc. hortus) gräfl. Canalscher Garten in Prag.
- cancellatus** gegittert, gitterartig.
- candicans** weisswerdend od. -aussehend.
- candidus** blendendweiss.
- canescens** ergrauend, grau aussehend.
- caninus** den Hund betr., Hunds-,
- cannabinus** hanfartig, -blättrig.
- cannobrunneus** zimmitbraun.
- cantrabrigiensis** von Cambridge (Cantabrigia).
- Cantium** Kent (engl. Grafschaft).
- canus** grau.
- capensis** vom Cap (der guten Hoffnung).
- caperatus** gekräuselt, gerunzelt (v. capero e. g. frontem).
- capillaris** haarartig, **capillus** Kopfhaar.
- capillitium** Fadengewebe.
- capitatus** kopfig, kopfförmig (caput, -ītis).
- capitulum** Köpfchen (dem. caput, -ītis).
- capreolatus** gestützt, rankend (s. sogl.).
- capreolus** Stiel- od. Astranke.
- capronianus** (fr. *capron*) wie Ananaserdbeere schmeckend od. riechend.
- capsella** Kapselchen (dem. capsula, Kapsel).
- cardiophyllus** herzblättrig.
- carentanus** kärnthisch, **Carentum** Kärnthen.
- caribaeus** caraibisch (Caraïben od. Cariben, die Eingeborenen des nördl. Südamerika's).
- caricinus** riet- od. seggenartig (von Carex, -īcis).
- carina** Kiel, Schiffchen, -atus gekeilt (bei Schmetterlingsblüten).
- carinthiacus** kärnthisch, i. q. carentanus.
- cariosus** morsch, faul, angefressen od. -gestossen.
- caripensis** von Caripe, dem Land der Caripunas in Nordbrasiliens.
- carnicus** und **carniolicus** aus Krain (Carniola).
- carnosus** fleischig (von caro, -rnis Fleisch).
- carolinianus** von Carolina (Nordamerika).
- carpellum** „*Carpell*“ od. Fruchtblatt.
- Carpiden** (Schwendener) Fruchtteile (z. B. Stellung ders.).
- Carpoboli** 'DC. Fruchtschneller (Pilze).
- carpologia** Fruchtkunde.
- carpophorum** Fruchträger oder -halter (z. B. der Doldenfrüchte).
- carpus** gerupft.
- cartilaginēus** knorpelig.
- carthusianus** Karthäuser.
- caruncula** Keimwulstchen, -atus damit versehen.
- carvifolius** kümmelblättrig.
- caryophyllēus** (*aceus*) nelkenbraun od. -rot.
- caryopsis** „*Caryopse*“, „*Nussgleiche*“, Schal-, Haut- od. Grasfrucht.
- caseolaris** käschchenfrüchtig.
- cassine** zimmetartige (*χασσία* Zimmetrinde).
- cassubicus** cassubisch, Cassuben, ein slavisches Volk in Pommern.
- Catalauni** Chalons.
- catalecta**, -orum Auswahl.
- catalepticus** starrsüchtig.
- catalögus** Katalog, Verzeichnis.

1) Dessen Spitzenwachstum d. Phanerogamen (in Annales d. Sciences nat.).

- cataphractus** gepanzert.
catenulatus in Kettchen geformt.
catharticus reinigend, abführend
(v. *zaθατώ*).
catinus Napf, Schüssel etc.
caudatus geschwänzt, schwanzartig
(cauda).
caudex, -īcis Stock, Schaft, Stamm.
caulialatus flügelstenglig, m. breit-
häutigem Stengel.
cauliculus Stengelchen der Keim-
linge.
cauliflorus am Stengel od. Stamm
blühend.
caulinus (v. *caulis*) am Stengel be-
findlich.
caulōma Stengelgebilde (z. B. -Sta-
cheln, Delbrouck).
cavus hohl.
cellula Zelle, **cellularis** aus Zellen
gebildet, z. B. *cellulares* Zellen-
kryptogamen.
cellulosis „Cellulose“, d. i. Zellen-
faserstoff.
cenius vom Mont Cenis.
Centifolia Hundertblättrige Rose.
Centraleyylinder, z. B. der Wurzel-
gefässe.
centralis „central“, den Mittel-
punkt bildend.
Centrospermiæ Jess. (sc. *Dianthi-*
floræ) Spornsamige.
centuria „Centurie“, das Hundert.
cepeaefolius (bess. *cepaefol.*-) sedum-
blättrig (v. *ζηπαῖα* Tripmadam).
ceracēus wachsartig, -gelb.
cerasifer, -ēra kirschentragend.
Cerealia „Cerealien“, Getreide (v.
Ceres, der Ackerbau-Göttin).
cerēus wachsern (v. *cēra* Wachs).
cerinus wachsgelb (s. eb.).
cerōdes (*ζηρωδῆς*) wachsartig, -gelb.
cernūs nickend, geneigt.
cerussatus bleiweiss.
cerussata das Bleiweiss.
Cervicaria Halskrautblume (*cervix*,
-īcis).
cespes, -ītis (caespes) Rasen.
cespitosus (caesp.-) wie Rasen od.
darin wachsend.
cestrius von Chester (Pennsyl-
vanien).
chalaza Knospengrund, s. g. Hagel-
fleck (im ovulum).
chaleedonius aus Chalcedon (Klein-
asien).
- chaleensis** von Haleb (Aleppo) in
Syrien.
chalybeiformis stahlhart (*χάλυψ*,
-*βος*).
chalybeius stählern (s. eb.).
chamae- in *compos.* (*χαμαι* adv.)
Erdf- (klein, niedrig).
chamaerēpes (*χειρίς*) auf der Erde
kriechend.
charta Papierblatt, Karte.
chiloënsis von der Insel Chiloë bei
Chili.
chionaeus (-nēus) schneig., -weiss
(*χιόνη* und *χιόνεος*).
chius, -ia „chiisch“, von der Insel
Chios.
chloraceras grünspitzig (*χλωρὸς* und
ἄξος).
chloranthia Verlaubung einer Blüte
(eine Ausartung).
chloranthus grünblumig.
Chloris, -īdis **protogaea** vorwelt-
liche Flora.
chlorophyllum „Chlorophyll“,
Blattgrün.
chlorosis „Chlorose“, d. i. Bleich-
sucht der Blätter.
chloroticus bleichsüchtig, kein
Blattgrün ausbildend.
chordorrhizus fadenwurzelig
(chorda Saite etc.).
chrysanthus goldgelbblüätig.
chrysenterus gelbfleischig (*χρυτέον*
Eingeweide).
chryso- in *compos.* Gold- (*χρυσός*).
chrysorrhoeus goldflüssig, -fliessen-
lassend.
chrysostictus (-os, -on) goldpunk-
tiert.
chthonoplastes von Thon bildend
(*χθὼν*. -*όρος* und *πλάστης*).
chymus (*χυμός*) Speisebrei, Flüs-
sigkeit, „Chymus“.
cibarius als Speise dienend, **cibus**
Speise.
cicatricula Närbchen, Keimmund
des Sameneis.
cicatrix, -īcis Blattnarbe (nach dem
Abfallen).
ciliaris wimperig, -atus gewimpert.
Cilien = Wimperchen der Schwärms-
sporen.
cimicinus wanzenartig (v. *cimex*,
-īcis).
cincinnus Wickel, d. i. Verzweigung,
deren Scheinachse bald links,
bald rechts ansetzt.

- cinctus** gegürtet, umzingelt.
cineréus aschgrau(cinis,-cris Asche).
cingens umgörtend, umzingelnd.
cinnabarinus zinnoberrot.
cinnamoméns zimmetfarbig.
circularis gitter- od. rostförmig
 (fr. grillé).
circinalis, -atus zirkelrund, schneckenförmig gerollt.
circinans in einen Zirkel sich run- dend.
Circinautia (sc. Chlorophýta) i. q.
 Filices, s. eb.
circinus Zirkel.
circumnutatio Umherbewegung der Vegetationsspitzen (Ch. Darwin).
circumseissus ringsumschnitten.
cirrhatus gerankt, **cirrhosus** rankig.
cirrus Ranke.
clandestinus heimlich, versteckt.
clarus mons Clermont (Frankreich).
clathratus gegittert, gitterartig.
claudatus schiessend, zudrückend.
Clandiopólis Klausenburg.
clava Keule, **-atus** keulig, keulenförmig.
claviger, -era keulenführend.
clavicula Ranke, Wickelgabel, **-atus** mit solchen Wickelgabeln vers.
clavipes nagelfüssig, keulenstielig (clava u. clavus u. pes Fuss, Stiel).
clavis Schlüssel.
clavus Nagel.
cleistogánius verschlossenblütig¹⁾
 (zλευστής u. γάμος Ehe etc.).
cliandrum Antherenschloss (z. B. b. Orchideen).
closterium Gespinnst (zλωστής, -ῆρος Spinner, Spindel).
clypéolus kleiner Schild, **-atus** damit versehen.
clypēns Schild, **-atus** schildförmig.
coadunatus vereinigt (z. B. an-thrae).
coaetanéus gleichzeitig (nämlich Blätter u. Blüten).
coalitus vereinigt.
coarctatus zusammengeengt, -gepresst.
coccifer, -era Scharlachbeeren od. Cochenillen tragend.
coccineus scharlachrot.
cochleatus muschelförmig gewunden.
- coelestinus** himmelblau.
coenanthium Blütenkuchen (*ζωνός* gemeinsam).
cognitus bekannt.
cohaerens zusammenhängend.
coiformis kunkel- od. spinnrockenförmig (cölus).
collectio „Collection“, Sammlung (ungleichartiger Pfl.).
collineola Hügelbewohner.
collinitus beschmiert.
collinus auf Hügeln wachsend.
column Wurzelhals.
coloniensis Kölner (Augusta Colonia Köln).
coloratus „coloriert“, gefärbt.
columbarius, -inus Tauben betr.
columella Mittelsäulchen (in Mooskapseln).
Columelliferae (sc. Dianthiflora) Jess. Säulenträger (zu Grui-nales).
columna „Columne“, d. i. Griffel od. Befruchtungssäule, in einer Mittelsäule mit dem Griffel verwachsene Staubfäden.
Columniferae Endl. „Columnen“- od. Säulenträger.
coma (gr. *ζόμη*) Haarschopf.
comédens aufzehrend (comēdo ver-zehre).
comestible fr. essbar.
comitialis „Comitien“ od. Wahlversammlungen betr., Reigen (Kummer).
commentarium(-us), „Commentar“, Tagebuch etc.
commentatio Überlegung, Tagebuchsverzeichnis.
commissura Naht, „Commissur“.
communis gemein, „commun“, gemeinsam.
communitatus vertauscht, verwechselt.
comosus schopfig, haarbuschartig.
compactus zusammengedrängt, „compakt“, derb (Kummer).
compilatio Zusammenplündierung, „Compilation“.
complanatus flach zusammengedrückt.
complectens umfassend, in sich begreifend.
completus vollständig, „complet“.
Compositae Adans. Vereins- od. Korbblütler.

1) Sich nicht öffnende Blüte!

- compressus** zusammengedrückt.
comptus (comitus) geschmückt, schmuck anzusehen.
concavus „concav“, hohl.
concentricus „concentrisch“, um einen gemeinsamen Mittelpunkt herum.
concepta Brutbecherchen (d. Lebermoose etc.).
conceptio Empfängnis (bei Blütenbefruchtung).
concinus gehörig gefügt, abgemessen, zierlich etc.
concolor gleichfarbig, einfarbig.
condensatus „condensiert“, verdichtet.
conduplicatus verdoppelt.
Conembryca Coimbra (Portugal).
confertus (e. g. flos) gefüllt (v. confocio).
confervoides wasserfadenartig.
confinis angrenzend, verwandt.
confluens zusammenfliessend.
Confluentes Coblenz.
confocal d. i. mit gleichem od. gemeins. Brennpunkt (z. B. Parabel, Sachs).
confragosus holperig, uneben.
confusus „confus“, verwirrt, verwechselt etc.
congēner, -ēra verwandt.
congestus zusammengestellt, gehäuft.
conglobatus zusammengeballt, -geknäult.
conglomeratus zusammengehäuft, „Conglomerat“.
conglutinatus zusammengeklebt (gluten, -inis).
congregatus zusammen gesellt, rasig (Kummer).
conicus „conisch“, kegelförmig (conus).
conidiae „Conidien“, d. s. sekundäre Sporen der Keimschlüche bei Kryptogamen.
conifer, -ēra zapfenträgend, „Conifere“. *Coniferae* DC., Coniferen od. Zapfenträger.
coni lupuli Hopfenzapfen (conus Kegel, Zapfen).
conigēnus zapfenartig, einen Zapfen bildend.
Coniomyctes Fr. Staubpilze (*zorūa u. μύζης, -ῆτος*).
- conjugatio** i. q. copulatio Vereinigung zweier Zellen od. Zweige zu einer od. einem.
conjugatus zusammengejocht, vereinigt.
connatus zusammengewachsen, verbunden.
connectivum „Connectiv“, d. i. Mittel- od. Zwischenband d. Anterofächer, eine Fortsetzung d. Staubfadens.
connivens zusammenneigend.
conocarpus kegelfruchtig.
conopēus (-opsēus) fliegenartig (v. Conops Stechfliege).
conopīlus Kegelhut (conus, pilus).
consistens sitzenbleibend.
consolidus sehr fest, hart, innen erfüllt (nicht hohl).
conspicetus Überblick.
conspicuus beträchtlich, ansehnlich.
constans beständig.
Constaute, sich gleichbleibende Zahl, z. B. der Temperatur od. Wärmegrade.
constrictus zusammengebunden, -gefesselt.
contigūus anstossend, angedrückt (Kummer).
contortus zusammengedreht, -gewunden.
contractus zusammengezogen.
contrayerva span. Gegengift.
controversus bestritten, streitig.
conus Kegel, Fruchtzapfen, Zapfenfrucht.
convallatus unwallt, umgeben.
convexus „convex“, erhaben, gewölbt.
convolutus zusammengewunden.
convolvulus sich zusammenwindend (Winde).
coprophilus kothliebend (*χόριος*).
copulatio Vereinigung zweier Zellen, Zweige etc.
coracanus Raben betr.? (corax), wahrsch. von Korakan (z. B. indisches Kammgras).
coraeensis aus Korāa (China).
coranicus koranisch, den Koran d. Muhamedaner betr.
coreolum Herzchen (dem. cor, -dis).
cordatus herzförmig.
coriacēus (-rius) lederartig (corium Leder).
coriifolius lederblättrig.

coriophorus Wanzen tragend (v. *κορός*, *-τος*).
Cormophytæ Endl. Stock- oder Achsenpflanzen (*κορός u. γυτόν*).
cornēus hörnern, hornartig.
corniculatus mit einem Hörnchen versehen.
cornucopiae Füllhorn (*cornu*, copia Fülle).
cornucopioïdes füllhornähnlich.
cornūtus gehörnt.
cornuviensis aus Cornwales.
corolla Blumenkrone.
Corolliflōræ DC. Kron- od. Ganzblumige.
corolliflōrus mit Krone blühend.
corona Kranz od. Nebenkrone innerhalb der Blumenkrone.
corona staminēa die Staubgefässe tragende Nebenkrone (z. B. bei Apocyneen, Asclepiaden etc.).
Coronariae Endl. Kronlilien.
coronarius eine Nebenkrone führend.
coronula i. q. paracorolla Nebenkrone.
corpuseūla Embryosäckchen der Gymnospermen.
corrugatus voller Runzeln, **corrūgis** dsgl.
cortex, *-īcis* Rinde.
corticalis auf Rinden wachsend.
corticēus (-cosus) rinden- od. korkartig.
cortīna Vorhang, Manchette am Strunk d. Pilze, auch Kessel.
coruscus schwankend, zitternd (-cans desgl.).
corvīnus Raben betr. (*corvus*).
Corymbiflōræ DC. Ebensträussler (Compositen).
corymbosus doldentraubig, ebensträussig.
corymbus Doldentraube, Ebenstrauss.
coryphaeus „Koryphäe“, Haupt (in Zusamm.).
costa Rippe, costa media Mittel- od. Hauptrippe.
cotylēdon Samenlappen, *-dōnes* Keimblätter.
cōus coisch, von der (griech.) Insel Kos (*Κῶς*).
eracoviensis Krakauer.
crassinervius dicknervig, -aderig.
crassipes Dickfuss, dickstielig.
erateriformis becherförmig.

cremocarpium Hängfrüchtchen (b. Dolden).
crenatus (-nulatus) gekerbt, fein gekerbt.
crepidifolius pippaublättrig (*Crepis Pippau*).
crepitans klappernd, rasselnd.
cresentia Wachstum, das Gewachsene, die „Crescenz“.
crinitus behaart, langhaarig (v. *cri-nis* Haupthaar).
crispatio Kräuselung, Kräuselkrankheit.
crispus kraus, *-pūlus* kräuselig, etwas kraus.
crista Kamm, *-atus* gekämmt, kammartig.
crithmifolius bacillenblättrig (s. *Crithmum*).
crocatus, *-ēens* safrangelb (v. *Crocus*).
cruciatus gekreuzt, kreuzförmig.
cruciblōum Tiegel (Kummer, Pilze).
crucifer u. **eruciger**, *-era* kreuztragend, -führend.
Cruciflōræ DC. (-flōræ Rchb.) Kreuzblütler.
eruentus blutig, blutrot.
erica stigmatis Narbenschenkel.
crypto, „Krypte“, Erdgruft (v. *κρύψι-τος* verborgen).
cryptogāmus verborgenblühend, „Kryptogame“ (s. eb. u. *γέμος* Ehe, d. h. Blüte).
Crystalloïde, Krystallkörperchen aus Proteinstoff in Zellen.
cubensis von Cuba (Westindien).
cucūli des Kukuks (sc. *flos*).
cucullatus kappenförmig (*cucullus* Kappe, Kapuze).
-culmis in compos. halmig (v. *culmus* Halm).
cultratus messerförmig (v. *cultrum* Messer).
Cumbria (Cambria) Cumberland, Fürst. Wales.
cuneatus keilförmig zugespitzt.
cuneifolius keilblättrig (*cunēus* Keil).
cuneiformis keilförmig.
euprarius kupferig, **euprēus** kupferfarbig.
cupula Becherchen, Schüsselchen (z. B. der Eichel).
Cupuliflōræ Rchb. Becherfrüchtler.
curassavicus aus Curaçao (holländ. Insel in Westindien).

euravit hat besorgt od. herausgegeben.

Curia Chur in Graubünden.

curtipendulus kurzherabhangend.

curlus kurz, gestutzt etc., **-tulus** etwas gestutzt.

curvatus gekrümmmt, **curvus** krumm.

cuspis gespitzt, spitzig.

cuticula Oberhäutchen (dem. cutis Haut) z. B. Pollenhaut, oberste Epidermhaut.

cuticularis häutig, rindig (Kummer).

-cyamus in compos. von **zīa** (Bohne).

cyathiformis becherförmig (**zīa-thos**).

Cybèle (Cybèle) Cybele od. Ceres, Naturgöttin.

cyclisch d. i. im Kreise geordnet (z. B. Blüten).

cyclosis Kreisbewegung (des Milchsafts).

cyclus (**zīzlos**) Blattwirbel, spiraler Blattumgang.

cyma Trugdolde, - globosa kugelige, - plana schirmartige, - unipara Wickel.

cymiger u. **cymosus** trugdoldig, m. seitensprossiger Verzweigung.

Cynarocephalae Juss. Distelköpfige.

cypelle fr. Becherchen (- des Lichens).

cystocarpia Blasenfruchtform (**zū-στη** u. **zāgros**).

cytoblastus „Cytoblast“ d. i. Zellkern (**zūtos** Hülle, **βλαστος** Keim).

Daboecius Daboek's (Namen eines irischen Heiligen).

Dacia Daciens (Rumänien, Wallachei u. Siebenbürgen).

dactylifer datteltragend, fingerführend.

dactylus Dattel, Finger.

daedalēus künstlich, schön (**δαιδάλεος**).

dahuriens daurisch, von d. daurischen Gebirge im östl. Nordasien.

danicus dänisch (Dania Dänemark).

dasycarpus rauhfrüchtig (**δυσίς** rauh, zottig).

dasycladus rauhästig, - zweigig (s. eb.).

dasiphyllo rauhblättrig (s. v.).

davuricus i. q. dahuricus.

dealbatus ausgewisst, überweisst.

debilis schwächlich.

decandrus zehnmännig, m. 10 Staubgefassen (**δέκα** u. **αριθό**, -**θοος**).

decapetalus m. zehn Kronblättern (**τέκτακον**).

decas, -ädis Zahl Zehn, ein Zehend, eine „Dekade“.

decidius abfällig, leicht abfallend.

decipliens täuschend, wie Rasen ausschend u. dgl.

declinatus gebeugt, geneigt.

decolörans abfärbend, abschiessend.

decoloratus entfärbt.

decompositus auseinandergestellt, getrennt.

decorus anständig, zierlich.

decumānus aus d. Zehntland, d. i. Südwestdeutschland, von d. Römmern agri Decumates gen.

decumbens niederliegend.

decurrens hinablaufend (z. B. Blätter am Stengel d. Disteln etc.).

decursivus herablaufend.

decussatus ins Kreuz gestellt od. abgeteilt, „decussiert“ (z.B. Blattpaare).

deflexus herabgebogen.

defloratus verblüht, abgeblüht.

deformatio Entstellung, Missbildung.

deformis entstellt, hässlich.

defossus eingegraben, vergraben (v. defodio).

degeneratio „Degeneration“, Ausartung.

deglyptus abgeschält (v. deglūbo).

dehiscentia das Aufspringen der Trockenfrüchte.

delicatus „delikat“, fein, köstlich, zärtlich.

delicia, -orūm (deliciae, -arum) Erogötzungen, Ergötzlichkeiten.

deliciosus köstlich, wohlgeschmeckend etc.

deliquescent zerfließlich.

deltoides deltaförmig, dreieckig (**Δέλτα** u. **ελδοναι** gleiche).

demersus untergetaucht, unter Wasser wachsend.

demissus herabhängend, niedrig etc.

demum endlich, zuletzt, später.

dendriticus „dendritisch“, wie Dendriten d. i. Bäumchenzeichnung.

dendrologia „Dendrologie“ d. i. Baumkunde.

dendrologieus Baumkunde betr.

- dendron in compos. -Baum (*δέρ-δον*).
deuigratus geschwärzt.
deusiflōrus dicht od. gedrängt blühend.
dentatus gezähnt, gezähnelt.
denticulatus mit Zähnchen, fein-gezähnelt.
denudatus entblösst, bloss, kahl.
depaneratus beraubt, armgemacht, armblütig.
dependens ab- od. herabhangend.
depluens abtröpfelnd.
depressus niedergedrückt, platt.
dermatogēnon „Dermatogen“, d. i. Oberhautstoff, die Epidermis erzeugender.
descendens „Descendent“, Abkömmling.
deserta, -orum Wüste.
destillatorius Tropfen sammelnd.
detitus beraubt, entbehrend.
determinatae entschieden, bestimmt, durchaus.
determinatio das Bestimmen (z. B. der Pflanzen).
detonsus beschoren.
deūstus angebrannt.
devonicus „devonisch“ (Gebirg in Cornwall u. Devonshire betr.).
Dextrin = Stärkeummi.
dextrorsum rechtsrum, rechtsherum.
diacanthus zweistachelig, -dornig.
diachenum zweisamiges Schliessfrüchtchen (b. Dolden).
diagramma Zeichnung, Durchschnittsbild, Grundriss.
Dialypetalae DC. Getrenntkronblättrige.
diamētrus „Diameter“, Durchmesser.
Diandria L. Zweimännige.
diaphānus durchscheinend, durchsichtig.
diaphoreticus (*διαφορητικός*) verteilend, schwitstreibend.
Diastase = stickstoffhalt. Zellenkörper, der das Zerfallen der Stärke in Weingeist u. Kohlensäure bewirkt.
diatrétns gedrechselt? (Kummer), durchbohrt (*τριτός*).
dichasialis „dichasial“, Halbierungs-(Wydler, z.B. Verzweigung).
dichasium dopp. Seitensprossung, üb. d. Gipfelsprosse hinaus (*δι-χάσιον* zerteile etc.).
dichogamae m. Wechsel- od. gegenseit. Zwitterbefruchtg.
Dichotomie = Gabelung eines Triebes (*διχώσ* dopp., *τομή* Schnitt).
dichotomus zweiteilig, gabelig.
dichroëns zweifarbig (*διχρόος*).
diclinus zweilagerig, getrennten Geschlechts (*ζλίνη* Bett), (die Blüten- geschlechter auf demselben Stock beisammen od. auf zweierlei auseinander, monöcisch od. diöcisch!).
dicocens zweikörnig od. -kernig.
dieranotrichus doppelspitz- od. gabelzahnhaarig (*διγυαρίς* zweiköfig, *γολές*, *τρίχως* Haar).
didymus (*διδύμος*) doppelt, Zwilling.
differenziert = unterschieden, in verschiedene Teile auseinander- gehend etc.
diffissus aufgeteilt, zerspaltet.
diffusio „Diffusion“ d. i. gleichmässige Verteilung von Flüssigkeiten in einander.
diffusus (e. g. *caulis*) ausgebreitet, auseinander-
digestus verteilt, durcheinander- gerührt, „digeriert“ (v. *digero*).
digitalis Fingerhut.
digitaliformis fingerhutförmig.
digitatus gefingert, in Finger geteilt (digitus).
digittulus wie Fingerchen geformt (dem. digitus).
Dignität = mathematischer Wert.
digynus zweiweibig, m. zwei Griffeln od. Narben (*δι* u. *γυνή* Weib, Bot. Griffel etc.).
dilatatus erweitert, ausgedehnt, (in d. Zeit) verspätet.
dilütus verwaschen, verdünnt, verblasst.
dimer = zweigliedrig, -reihig (*μέρος* Stück).
dinidiatus in zwei Teile get., halbiert.
dimorphismus Zweierleibbildung derselben Art; dimorphe Blüten d. s. mit grossen u. mit kleinen Griffeln.
dioecus (-oicus) (*διοίκος*) zweihäusig = d. Blüteneschlechter auf zweierlei Stöcken auseinander.
diosmōsis „Diosmose“, d. i. Durchschwitzen von Flüssigkeit durch trennende Haut (*διωσμός* v. *διω-θω*).

- dipetalus** zweikroublättrig (*τρίτα-*
λον Kron- od. Blumenblatt).
- diphyllus** zweiblättrig, m. 2 Laub-
blättern (*γρίλλον*).
- Diplecolobaeae** DC. Zweikuchen-
lappige (Cruciferen).
- discoidens** scheibenförmig (discus,
δίσκος u. *ειδοματικός* gleiche).
- Discanthae** Endl. Scheibenblüter.
- discolor** verschiedenfarbig, bunt.
- Discomycetes** Fr.(-phori DC.) Schei-
benpilze.
- discretus** (v. *discerno*) unterschieden,
discens (*διάζως*) Scheibe, z. B. bei
Radiaten, Rebenblütern od. Dis-
cauthae = Scheibenblütern.
- disepalus** (sc. calyx) zweizipflig.
- dispar** ungleich, unähnlich, ver-
schieden, ungleich gross.
- dispermus** zweisamig (*στέρεψα*
Samen).
- dispersus** zerstreut, ausgebreitet
(v. *dispergo*).
- dispositio** „Disposition“, Anord-
nung, Verteilung.
- dissectus** zerschnitten (v. *dissēco*).
- disseminatus** ausgesät, ausgestreut
(semen, -inis Samen).
- dissepimentum** Scheidewand (z. B.
im Fruchtknoten).
- dissertatio** „Dissertation“, Ab-
handlung.
- dissiliens** aufspringend.
- dissitiflōns** entferntblühend (dissi-
tus abgelegen etc.).
- distachyos** zweiährig (*στάχυς, -υος*
Ähre).
- distans** auseinanderstehend, ent-
fernt.
- distentus** ausgedehnt, auseinander-
gezerrt etc.
- distichos** (-us) zweizeilig (*στύχος*
Zeile, Reihe).
- distincte** (-us) deutlich getrennt,
unterschieden.
- diurnus** über Tag blühend (dies).
- ditio, -onis** Botmässigkeit, Gebiet.
- divaricatus** ausgespreizt.
- divergentia** „Divergenz“, Abstand
zweier aufeinanderfolgender Blät-
ter etc.
- diversidens** ungleichähnig, ver-
schieden-.
- Diviona** Dijon (in Burgund).
- divisionensis** von Dijon.
- divulns** auseinandergezerrt (di-
vello).
- Dodecandra** L. Zwölfnännige.
dodrantalis zu Dreiviertel.
- dolabratns** axtförmig.
- dolabriformis** axtförmig, -petalus
-kronblättrig.
- Donianus** Don's, des Botanikers,
nicht d. Flusses Don.
- Doppelachäne** (z. B. bei Dolden-
früchten).
- dorsalis** (v. *dorsum*) auf d. Rücken
befestigt, „dorsal“.
- drasticus** „drastisch“, wirksam,
kräftig (*δραστικός* v. *δράω* handle
etc.).
- drupa** Steinfrucht, -obst.
- Drupacaeae** DC. Steinfrüchtige
(-obst).
- drupacens** steinfrüchtig, steinobst-
artig.
- drymeins** (v. *δρυμός*) in Gehölz
wachsend.
- dryophilus** eichen- od. waldliebend
(*δρυς, -ίος* Eiche).
- Duānum** Douai (in Flandern).
- dubius** zweifelhaft, unbestimmt.
- duinensis** von Duino am Golf v.
Triest.
- dulcamarus** süßbitterlich, bitter-
süß.
- dumalis** in Gebüschen wachsend
(v. *dumus*).
- dumetum** Dorngebüsch, -hecke.
- dumosus** voller Gestrüpp.
- duplex, -icis** doppelt, *duplicatus*
verdoppelt.
- duramen** Kernholz.
- durius** hölzern (*δούρειος* od. -οιος).
- duriseñus** etwas hart (dem. *durus*).
- dysentericus** die Ruhr od. „Dysen-
terie“ betr.
- Eblana** Dublin.
- ebraeatus** ohne Deckblatt.
- Ebrodnnum** Yverdon (Schweiz).
- eburneus** von Elfenbein, elfenbein-
weiss.
- echinatus** stachelig (*ἰχιός* Igel).
- echinosporus** stachelsporig, -samig.
- eclöge**, Plur. -gae Auswahl, Aus-
lese.
- edentulus** zahnlos, ohne Zähnchen.
- Edina** Edinburg, **edinensis** Edin-
burger.
- editio** Ausgabe, **editus** herausge-
geben.
- eductio** Auferziehung, Überführung.
- edulis** essbar.

- efflorescentia** das Aufblühen, die Blütezeit, Ausblühung od. „Effloreszenz“ (v. Salzen).
- effusus** ausgebreitet, locker, auseinander.
- egen sis von Ega** (Stadt am Amazonenstrom).
- eläter** Schleuder, Spiralband (Schleuderzelle der Mooskapseln).
- elati or (v. elatus)** höher, etwas hoch.
- elegantior (-ius)** besonders elegant od. fein.
- elenchus** ($\xi\lambda\epsilon\gamma\gamma\sigma$) Beweisführung, Inhaltsverzeichnis.
- eleutherogynae** freiweibige, mit freiem Fruchtknoten.
- eleutheropetalae** mit freien (unverwachsenen) Kronblättern i. q. Dialypetalae DC.
- ellipticus** elliptisch, langrund.
- elôdes** ($\xi\lambda\omega\delta\eta\zeta$ von $\xi\lambda\omega\zeta$) sumpfig, in Sumpf wachsend.
- elongatus** verlängert, langgestreckt.
- elytroides** flügeldeckähnlich ($\xi\lambda\upsilon\tau\omega\eta\zeta$ Futteral, Flügeldecke d. Käfer etc.).
- emarcidus** welk, kraftlos.
- emarginatus** ausgerandet.
- embryon** der „Embryo“ od. Keimling, der Keim im Innern eines Eis od. Samens.
- emendatus** verbessert, „emendiert“.
- emergentia** (sc. folia) Hervorragungen i. q. Tentakeln, „Emergenzen“.
- emérus** zahm, gebaut.
- emetieus** ($\xi\mu\epsilon\tau\iota\zeta\sigma$) brechenerreminens hervorragend. [gend. **Emodus** (Imaus) **Mons** Himalaya-Gebirge.]
- emulsio** „Emulsion“, Auswaschung.
- enantioblastae** Endl. Gegensprosser ($\xi\varpi\alpha\tau\omega\eta\zeta$ gegenüber).
- encephalus** im Kopfe befindlich, hirnartig.
- enehiridion** Handbuch, Heft ($\xi\gamma\gamma\epsilon\iota\omega\eta\zeta$ von $\xi\iota$ in und $\chi\epsilon\iota\omega$ Hand).
- encyclopaedia** „Encyklopädie“, Inbegriff der Wissenschaften.
- endemius** (gr. $\xi\pi\delta\mu\iota\omega\zeta$) „endemisch“, einheimisch, einem Lande eigen.
- endocarpium** Beerenhaut, (oft verholzte) Innenfruchthaut.
- endodermis** Korkinnenhaut.
- endogénus** von innen wachsend, „Endogen“ DC.
- endophýta** Innenschmarotzer, „gewächse“.
- endorrhizae** (sc. Monocotylæ) scheidefußwurzlige Monocotylen.
- endomósis** „Endosmose“, das Eindringen von Flüssigkeit durch trennende Haut.
- endospermum** „Endosperm“, Eiweiß od. innere Kernmasse.
- endosporium** Innenhaut der Mikrosporen (Rhizocarpeen).
- endostomium** Mund od. Öffnung der inneren Eihaut.
- endothecium** innere Schicht der Antherenhaut.
- Energie** = Kraftanstrengung, z. B. des Auswachsens (Vöchting).
- enervius** nervenlos, ohne Adern od. Äderchen.
- enneaphyllus** neunblättrig, m. 9 Laubblättern.
- enòdis** knotenlos, astlos, glatt.
- Ensatae** Endl. etc. Schwertelgewächse (ensis Schwert).
- ensiformis** schwertförmig.
- entomología** „Entomologie“, d. i. Insektenkunde ($\xi\pi\tau\omega\eta\zeta$ Insekt).
- enumeratio** Aufzählung.
- ephémérus**, „ephemer“, nur einen Tag dauernd ($\xi\pi\iota$ auf, $\iota\mu\epsilon\gamma\alpha$ Tag).
- epiblastēma** = terminale (an der Spitze befindliche) Antheridien u. Archegonien, Celakowski.
- epibléma** Wurzeloberhaut ($\xi\pi\iota\beta\lambda\eta\mu\alpha$ Decke).
- epicarpium** Fruchtoberhaut (bei Gräsern etc.), Fruchtaufsat, öfter ablösbar.
- epichilum** Oberlippe ($\xi\pi\iota$ u. $\chi\epsilon\iota\omega\zeta$ Lippe, Lefze).
- epichnōüs** oberflächlich mit Wolle bedeckt ($\xi\pi\iota\chi\pi\omega\zeta$).
- epicrisis** Auswahl, Beurteilung, weitere Kritik.
- epidendron** (-um) auf Bäumen befindlich.
- epidermis** Oberhaut, oberste Hautschicht.
- epigaeus** (-eus) auf od. über d. Erde wachsend od. kriechend (z. B. Cottyledonen).
- epigyna** (sc. insertio) obenständige Einfügung od. Stellung d. Blütenenteile auf dem Stempel od. Fruchtknoten).
- Epilinum** auf Lein schmarotzend, s. g. Flachsseide.

epimeliae (ἐπιμέλεια) Studien.
epipetalus „epipetal“, auf der Blumenkrone stehend (z. B. Staubgefäße, Celakowski).
epiphyllus auf Laub wachsend (e. g. flos).
epiphytus auf Pflanzen schmarotzend.
epipsilus oben kahl od. nackt (ψιλὸς).
epiroticus „epirotisch“, aus Epirus (Nordwestgriechenland).
epistaminia Juss. mit oberständigen Staubfäden.
epithelium zarte Oberhaut (ohne Spaltöffn.), „Epithel“.
Epithymum auf Thymian schmarotzend.
epizoothia auf Tieren wachs. Pilze (ἐπι, ζῷον Tier u. ὡθέουμαι dränge mich auf).
equitans reitend, auf ein. Stengel gegenübergestellt (z. B. bractea).
erectiusculus ziemlich od. fast aufrechtus aufrecht. [recht].
ergoté fr. mit Sporen versehen (seigle = s. g. Mutterkorn).
ericaeus auf Heiden vorkommend.
ericetum Waldheideplatz.
erinacēus (herinac.) Igel, igelartig, stachlig.
eriocarpus wollfrüchtig (ἔρων)
eriophorus Wolle tragend. [Wolle].
erostemon saufsfadenwollig (στήνω lat. stamen Staubfaden).
ermineus hermelinartig (erminea Hermelin).
erosus ausgenagt.
erraticus umherirrend (z. B. erraticischer Block in d. Geologie).
eruciformis (bess. erucif. -) rauken- od. raupenförmig.
erythraeus am roten Meer wachsend (mare erythraeum, gr. ἥριον).
erythrocarpus rotfrüchtig.
erythrophillum Blattrot i. q. anthocyānum.
erythrophylus rotblättrig.
erythrōpus rotfüssig, -stielig.
escharoides (ἐσχαρώδης) schorfartig, grindig.
esculentus essbar.
eskīus (e. g. Festuca eskia) ausser Schatten wachsend (e od. ex, σκία Schatten).
esūlus (neulat. dem. esus gegessen) essbar.

esurientium der Hungernden od. Hungrigen.
étiolées (sc. feuilles) „etioliert“, bleichsüchtig.
Etiolin i. q. xanthophyllum „Blattgelb“, beim s. g. Vergießen der Bleichstoff.
etruscus etruskisch, aus Etrurien (Toskana).
etymologia „Etymologie“, d. i. Kunde von der Bedeutung der Wörter.
euganēns euganeisch (Gegend v. Padua in Venetien).
eumorphus wohlgestaltet, schöngebildet.
evernius gutwachsend, wohlgewachsen (εὐεορῆς von εὐεορέω gediehe etc.).
evolutio „Evolution“, Aufwicklung.
evolutus aufgewickelt, entwirrt.
evolvens aufwickelnd, eine s. g. „Evolvente“ bildend.
exalbuminosus ohne Eiweiss (Albumen).
exanthēma (ἐξάνθημα) „Exanthem“, d. i. Ausschlag, Aussatz.
exanthematicus wie Aussatz aussehend.
excelsior, -sus höher, hoch.
Excentrität d. i. Abstand der Ellipsenbrennpunkte von der Mitte.
excipuliformis trichterförmig.
excipulum Hülle (der Pilze etc.), Auffanggefäß, Trichter.
excisus ausgeschnitten.
excoriatus enthäutet, geschunden (corium Haut, Leder).
excorticatus entrindet (cortex, -icis).
excretio Ausscheidung.
excursorius zu Excursionen (Ausflügen) bestimmt.
exhibens darstellend, von sich gebend.
exigūus klein, winzig, gering.
exilis dünn, mager, niedlich.
exīne = äussere Haut des Pollenkorns.
exogenus aussen wachsend, „Exogen“ DC.
exoniensis von Exonia, d. i. Exeter (engl. Südküste).
exorrhīzæ (sc. Dicotyledones) nacktd. od. freiwurzlige D.

- exosmōsis**, „Exosmose“, d.i. Herausdringen von Flüssigkeit durch trennende Haut.
- exostomīnum** Mund od. Öffnung d. äusseren Eihaut.
- exothecīum** äussere Antherenhautschicht.
- exoticus**, „exotisch“, d. i. aus fremden Ländern stammend.
- Expansionskraft**. Ausdehnungs- od. Spannkraft (Pfeffer, periodische Reizbewegung).
- expansus** ausgedehnt, ausgebreitet.
- explanatus** ausgebreitet, deutlich.
- expositio** Auseinandersetzung, -*tus* auseinandergesetzt.
- exscāpus** schaft- od. stengellos.
- exsertus** herausgestreckt.
- exsiccatus** ausgetrocknet.
- extipulatus** ohne Nebenblatt, nacktachselig, -winklig.
- exsueens** saftlos, ausgetrocknet.
- extensus** ausgedehnt, weitläufig.
- exterior** äusserer, **extimus** äusserster, ganz aussen.
- extinctorius** auslöschend, zerstörend.
- extra-axillaris** ausserblattwinklig (z. B. Ranke, Warming).
- exuviatus** abgehäutet, als Balg abgestreift.
- Eystettensis** von Eichstädt(Bayern).
- fabacēus**, -*arius* bohnenartig.
- fagicōla** Buchenbewohner, an od. bei solchen wachsend.
- falcatus**, -*arius* sichelförmig (falk, -*cis* Sichel).
- falcifolius** sickelblättrig.
- fallax**, -*acus* trügerisch, täuschend.
- farcimentum** Füllsel, Wurst.
- faretus** (*fartus*) vollgestopft (v. *farcio*).
- farīna** Mehl, -*acēus*, -*osns* mehlig.
- farnesianus** farnesisch, v. Palast der Farnese in Florenz.
- fasciatio** Verbänderung, d. i. Verbreiterung der Stammgebilde.
- fasciatus** gebändert (fascia Band, Binde).
- fascicularis**, -*atus* bündelförmig.
- fascicūlus** Bündel, Büschel, „Fasikel“, i. q. glomerulus.
- fastibīlis** widerlich.
- fastidiosus** ekelregend, verdriesslich.
- fastigiatus** gegipfelt, flachgipflig, ebensträussig.
- fastuosus** prächtig, prachtvoll, stolz etc.
- fatiūs** weissagend, Wetter verkündigend, auch auffällig, albern (Kummer: fad).
- faux**, -*cis* Schlund.
- Faventia** Stadt Faenza (in der Romagna).
- febrīlis** fieberartig, -heilend (febris Fieber).
- febrifūgus** Fieber vertreibend.
- febrīnus** reinigend.
- fecundus** (foec.-) fruchtbar, ergiebig.
- Federgranne** = Schwanz auf Schliessfrüchten.
- Federkrone**, z. B. am Kelchrand der Baldrianfrüchte.
- femīna** Weib, -*nēus*, -*nīmus* weiblich.
- fenestratus** gefenstert, durchbrochen.
- fennicus** finnisch, aus Finnland.
- fenum** (foenum) Heu.
- ferax**, -*cis* fruchtragend, Ertrag liefernd.
- ferīnus** Wild betr. (ferīna Wildpret).
- fermentum**, „Ferment“, Gärungserreger, Hefe.
- ferox**, -*cis* wild, kriegerisch bewehrt, stark bestachelt.
- ferruginēus** rostfarbig, -gelb.
- ferrugo**, -*inis* Eisenrost.
- fertilis** fruchtbar.
- ferūs** wild.
- fibrillae** Wurzelfasern od. -zasern.
- fibrillosus** u. **fibrosus** faserig (fibra Faser).
- fibro-vasalis** Fasergefässer od. Gefäßbündel betr.
- ficarius** feigenknollig (*ficus* Feige).
- ficifolius** feigenblättrig.
- ficoidēns** feigenartig.
- filamentum** Faden, Staubfaden.
- filicaulis** fadenstengelig (filumFaden).
- filiculōsus** wie kleines Farnkraut (*filiculus* dem. v. *filix*, -*cis* Farn).
- filifolius** fadenblättrig.
- filiformis** fadenförmig.
- filipendūlus** an Fäden hängend (z. B. Knollen an Wurzelfäden).
- filipes** (st. *filipes*) fadenfüssig, -stiellig.
- Filtrationswiderstand** des Protoplasmas, wodurch der Wasser-

- druck oder Turgor der Zellen bewirkt wird.
- filtrum** „Filter“, fr. *filtre* Seihe, Durchschlag.
- fimbria** Franse, -atus gefraust.
- fimicöla** Dung - od. Mistbewohner (*fimum* od. -us Mist).
- fimiputris** dungfaul.
- fissus** gespalten.
- fistüla** „Fistel“, Röhre, -osus röhrenförmig.
- flabelliformis** fächer- od. fächerförmig.
- flabellum** Fächer, Wedel, *flabellus* fächelig.
- flaceidus** od. **flaceus** welk, schlapp, flatternd.
- fladnizensis** von den Fladnitzer Alpen (in Kärnthen).
- flagelliformis** peitschenförmig.
- flagellum** Geissel, Peitsche, Schössling od. Ausläufer.
- flammula** (dem. *flamma*) Flämmchen.
- flexilis** biegsam, gebogen.
- flexipes** schlangenfüssig (Kummer).
- flexuosus** him- und hergebogen.
- floccidus**, -cosus flockig, flockenfaserig.
- flocus** Flocke, Wollenfaser, Wolle.
- Flöra** eig. Göttin der Blumen u. Blüten, in d. Botanik = Pflanzeninbegriff.
- florescentia** „Florescenz“, d. i. Blütenbildung, das Aufblühen.
- florēus** blumig, blumenreich.
- floribundus**, -ridus blumig, reichblühend etc.
- florifer**, -ger, -era blütentragend.
- florilegium** Blumenlese.
- Florula** (dem. Flora) kleine Flora.
- flos**, -oris Blume, Blüte, **flores** = Thee.
- floscululus** Blümchen, -losus m. kleinen Blütchen vers.
- flos compositus** zusammengesetzte Blume, Blütenkorb.
- Flughaare**, z. B. Pappel- u. Weidenwolle.
- fluitans** flutend, auf fliess. Wasser aufliegend od. darin vorwärtsstrebend.
- Fluminensis** (sc. Flora, Fl. Flum.) von Rio-Janeiro.
- fluvialis**, -tilis, -atiens im Fluss wachsend.
- focus** Brennpunkt, z. B. der Ellipsen, Parabeln etc.
- foecundatio** Befruchtung.
- foecundus** (*fecundus*) fruchtbar.
- foeminēus** (fem.-) weiblich.
- foeniculacēus** fenchelartig.
- foenum** Heu, foenum graecum, s. d. Nomenklatur.
- foetens**, -tidus übelriechend, stinkend.
- foliacēus** blatt- od. laubartig.
- foliatus** beblättert, blattführend.
- foliolum** Teilblättchen eines zusammengesetzten (gefiederten etc.) Blatts.
- foliosus** blattreich, blättrig, **folium** (*φύλλον*) Laubblatt.
- folliculus** Balgrucht d. i. aus einem an d. Bauchnaht aufspringenden Fruchtblatt bestehend.
- follicularis** balgrächtig.
- fomentarius** Zunder liefernd.
- fongus** (fr.) lat. *fungus* Schwamm, Pilz.
- fontanus** in Quellen zu finden, aus solchen stammend (*fons*, -tis).
- fonticēnsis** in Quellen erzeugt.
- forceipatus** zangenförmig (*forceps*, -ipis).
- formatio** „Formation“, Bildung (Gesteinschicht etc.).
- formosianus** von d. Insel Formosa bei China).
- formosus** schöngeformt, stattlich etc., -issimus besonders stattlich.
- fornicatus** mit Bogenwölbungen od. Schüppchen.
- fornix**, -icis Bogen, Wölbung, -ices Schüppchen od. Klappen.
- fovēa** (dem. -veöla) Grube, Honiggrube (Grübchen).
- foveolatus** mit Grübchen versehen.
- foveosus** grubig, mit Honiggruben.
- fovilla** feuchter Polleninhalt, Befruchtungsstoff.
- fragifer**, -era Erdbeeren tragend (*fragum*).
- fragilis** zerbrechlich, gebrechlich.
- fragmentum** „Fragment“ d. i. Bruchstück.
- fragrans** (sc. *odor*) duftend, davon *Fragaria* Erdbeere.
- Francofurtum** Frankfurt.
- franeonēus** aus Franken.
- frangulus** zerbrechlich.
- fraternus** brüderlich, verwandt.
- fraxinēus** eschenartig, von Esche.
- fribergensis** von Freiberg (in Sachsen).

friburgensis von Freiburg.
frigidus kalt, im Kalten wachsend.
fritillarius brettspielartig.
fritillus Würfelbecher und Brettspiel (-um Schachbrett).
frondescentia Belaubung.
frondosus laubblättrig (frons, -dis Laub).
frons, -tis Stirne, „Fronte“.
fructescētia Fruchtbildung.
fructigēnus auf Früchten sich erzeugend.
fructus fr. fruit Frucht.
frugilegium Fruchtlese, Fruchtsammlung.
frustranēus vergeblich, umsonst (bei Compositen die unfruchtb. Strahlenblüten).
frustulatus zerstückelt (frustum Bissen, Bisschen).
frutescēns strauchartig, einen Strauch bildend.
frutex, -icis Strauch.
fruticēns strauchartig wachsend, strauchbildend.
fruticētum Gesträuch, Gebüsche.
fruticosus, -culosus strauch-, etwas strauchartig.
fucatophyllus schminkblättrig.
fucatus geschminkt, nnecht.
fuciflōrus hummelblütig, mit Blüten wie Hummeln.
fucōides (-dēus) tangartig, *fucus* (gr. φυκός) Meertang.
fulcrum Stütze, Stützblatt.
fulgens, -gīdus glänzend, leuchtend, strahlend.
fulliginēus russig, russfarbig (*fuligo*, -inis Russ.).
fulliginoides russähnlich, -artig.
fulliginosus russig, russfarbig.
fullōnum (Gen. Pl. v. *fullo*) der Walker od. Tuchbereiter.
fulvus rot- od. braungelb.
fumosus rauchig, rauchgrau.
funalis strickartig (*funis* Strick, Seil).
fundamentum „Fundament“, Grundlage.
fungosus schwammartig (*fungus* Schwamm, Pilz).
funicēlus (dem. *funis*) Strang, Nabelstrang, Träger des Samens.
funifer, -éra strickführend.
furax, -cis diebisch, verstohlen.
furca Gabel, -eatus gabelig.
furcellatus in Gabelchen geteilt.

furfūra Kleien, -acēus kleienartig.
furus finster, dunkel, schwarz.
fuscescēns braunwerdend.
fusco-ater braunschwarz.
fusēus dunkelbraun, braun.
fusiformis spindelförmig (fusus).
fusipes spindelfüßig, -stielig.
fusus, -i Spindel, -fusus, -a (in *compos.*) fließend, fliegend oder wallend, lagernd od. hingestreckt.

Gaada Gouda (Holland).
galbānus grüngelb, bräunlichgelb.
galbūlus Beerenzapfen (z. B. Wachholder-, Thuja- etc.).
galeatus behelm't, mit Helm versehen.
galericulatus mit e. Helmchen od. Häubchen versehen.
galērus Mütze, Kappe, Haube etc.
galioīdes labkrautähnlich (*Galium*).
galli (Gen. v. *gallus*) des Hahnen.
gamarēnsis von Gamala (am See Genezareth).
gambosus hufförmig (ital. *gamba*, fr. jambe, gr. καμπή).
gamopetālus ganzkrongig, m. verwachs. Krone.
Gandavum fr. Gand Gent, **gandensis** Genter.
garganicus vom Monte Gargano (Süditalien).
Gasteromyētes Fr. Bauchpilze (*γαστρίης* u. μύκης, -ήτος).
gazophylacium Schatzkammer (*γάζα* u. *φυλάκειον* od. -ίον Wacht).
Gebenna Cevennengebirge (Südfrankr.).
Gedānum Danzig.
Gegenfüsslerinnen = Zellen b. d. Embryobilbung, Gegensatz zu d. Synergiden (Strasburger).
Gelatin = Gallert, fr. gelée.
gelatinosus gallert- od. geléeartig.
gelidus eiskalt.
gelinum Tanggallert, Gelin (v. gelo erstarrte).
geminus doppelt, Zwilling.
gemma Auge, Knospe, -atus damit versehen.
gemīfer knospentragend, mit Augensprossen.
gemonensis glemanisch, von Gleman od. Gemona in Friaul.

- Genabūm** Orleans.
Genēva fr. Genève Genf, **-vensis** Genfer.
generatio „Generation“, Zeugung, Entstehung.
Generationswechsel (bei Pilzen z. B. Getreiderost, erst als Berberizienrost).
genianthus bartblütig (v. γένειος Kinnbart).
geniculatus gekniet, kniegelegenig.
genitale (Pl. -lia) Geschlechtsteil.
gentilis aus edlem Geschlecht, fein, verwandt (Kummer).
genuinus ein- od. angeboren, echt, natürlich.
genus, **-ēris** Geschlecht, Gattung, Sippe.
-ēnus, **-ēna** etc. adj. verb. in comp. erzeugt (v. γέρω).
Geotropismus = Streben d. Pfl. nach d. Erdmittelpunkt (positiver der Wurzeln, negativer des Stengels.)
germen, **-inis** Fruchtknoten.
germinans keimend.
germinatio Keimung, das Keimen.
gibbosus bucklig, höckerig (gibbus Buckel).
gigantēus riesenhaft, „gigantisch“ (γίγαντειος).
gigartinus mit Weinbeerkerne (F. W. Riemer, Lexik.), m. Weinbeeren versehen (γύαρητον).
gigno erzeuge, bringe hervor.
gilvus isabell- od. fahlgelb, hell-, erbsengelb.
Gissa Giessen (Univers.), **-ensis** Giessener.
glaber, **-bra** glatt, **-berrīmus** sehr glatt.
glabratus geklättet, kahl.
glacialis eisig, um Eis od. Gletscher herum wachsend.
glandūlae „Glandeln“, Drüsen.
glandulosus drüsig, drüsengeführnd.
glans, **-ndis** Eichel, Kernfrucht.
glastifolius glas- od. waidblättrig.
glaucescens blau- od. graugrünlich.
glaucopus blaugraufüssig, -gestielt.
glaucus (γλαυκός) blaugrün, graugrün.
Gliederhülse (-schote) lomentum, aus abgesetzten Gliedern gebildete.
Globoïd = rundliches Körperchen in den Proteinkörnern des Klebermeihs.
- globosus** kugelig (globus).
globulus Kugelchen.
globulifer, **-era** Kugelchen tragend.
-glochin od. **-chis** (Gen. -idis) Spitze (gr. γλωχίς od. -χίς).
glomeratus knäuelig, geknäuelt.
glomerulus kleiner Knäuel od. Büschel i. q. fasciculus.
glossoides (gr. γλωσσειδής od. -ώδης) zungenähnlich.
Glottia Glasgow, **-ttianus** von Glasgow.
gluma Spelze, Spreublatt, Kelchschuppe der Gräser.
glumaceus spreu- od. spelzartig, **-cēae** „Glumaceen“ d. s. Gräser u. Halbgräser.
glumella, Blütenspelzchen.
gluten, **-inis** Leim, Kleber.
glutinosus klebrig, schmierig(s.eb.).
glycicarȳus süßnüssig (γλυκύζυς u. ζέων).
- glycōsmus** süßduftend (όσμη) Duft.
glyciphyllus süssholzblättrig (abgk. v. Glycirrhiza u. φίλλον).
- Glykose** = Süß- od. Zuckerstoff.
gongylodes rübenrund, kohlrabenförmig (γογγύλος rund).
gonidia „Gonidien“, d. s. Grünenzellen der Thallus-Mittelschicht b. Algen u. Flechten (v. γονή Samen, εῖδομαι gleiche).
gracilentus u. **gracilis** dünn, schlank, zierlich.
gramen, **-inis** Gras, **graminēus** grasartig.
Graminēae DC. Grasgewächse.
graminifolius grasblättrig.
granatus mit Kernen gefüllt (gramum Korn etc.).
grandiceps grossköpfig.
grandiflorus grossblütig, **-folius** grossblättrig.
granifer korn- od. kerltragend.
granulatus gekörnelt, mit Körnchen versehen.
granulosis Stärkemehl (i. q. farinosis).
granūlūm (dem. granum) Körnchen.
gratissimus (Superl. v. gratus angenehm) äusserst angenehm.
graveōlens starkkriechend.
grosse, **-us** grob, dick u. stark.
grossificatio Schwangerung, das Dickwerden.
grossularius einer kleinen, unreifen Feige gleich.

Gruinales Endl. Storcheschnäbler (grus, -is Kranich etc.).
grumosus hügelig, klumpig, voller Knollen.
grundständige Blüte, z. B. Zeitlose.
Gryphia (Gryphiswalda) Greifsguestphalieus westfälisch. [walde.
gummifer, -éra gummitragend.
gummosus gummiartig.
guttatus getropfelt, gedüpfelt.
guttifer, -éra harzsafthaltig.
gymnoblastae (sc. Acotyledones) Nacktkheimer.
gymnocarpus nacktfrüchtig.
Gymnomycetes Rchb. Nacktpilze ($\mu\nu\chi\eta\varsigma$ Pilz).
gymnospermus nacktsamig.
gymnostomus nacktmündig.
gynaecéum Stempelgesamtheit ($\gamma\nu\rho\nu\zeta\epsilon\iota\sigma$ Weiberstube).
gynandrae, -dria L. Weibermännige ($\gamma\nu\rho\eta$, $\dot{\alpha}\nu\eta\rho$, - $\nu\delta\eta\varsigma$).
gynostemium Befruchtungssäule gynandrischer Pflanzen.
gyrans sich im Kreis herumtdrehend.
gyroflexus in einen Kreis herumgebogen.

habēna Riemen, Zügel.
habitūs Haltung, Aussehen, „Habitus“.
hadiensis aus Hedschas (Hedjas) in Arabien.
Hafnia (Haunia, Havnia) Kopenhagen.
hafniensis Kopenhagener.
HagaComitum Gravenhagen(Haag).
Hala Halle, -lensis von Halle, Hallenser.
Halbfächer (z. B. Mohnkapsel) mit Halbscheidewänden.
halepensis von Halep (Aleppo) in Syrien.
halicacäbus judenkirschartig.
halicensis galizisch, von Halicz (Galizien).
hamatus hakig, hakenförmig.
Hammonia Hamburg.
hamulatus hakenförmig.
hamulus (dem. hamus) Häckchen.
hercynianus vom Harzgebirge.
Hassia Hessen, — inferior Niederhassläeus hessisch. [hessen.
hastatus, -ilis spießförmig, -blättrig od. -früchtig.
hastifolius spießblättrig.

Haube (z. B. Wurzel-) = oberste Schicht etc.
Hauffrucht, z.B. Anona u. Magnolia. *huananensis* von Havannah.
Haunia (Havnia) Kopenhagen s. Hafnia.
haustellaris trinkgefäßartig.
haustoria Saugwarzen¹⁾ (z. B. der *hederacēus* epheuartig. [Cuscuta).
heleonastes Sumpfbewohner ($\xi\lambda\omega\varsigma$, - $\varepsilon\omega\varsigma$ u. $\nu\alpha\sigma\tau\gamma\varsigma$).
helicoidēa (sc. cyma unipāra) eine schneckenartig gekrümmte Schraubel.
helioscopius sonnenwendig, nach d. Sonne sehend ($\xi\lambda\omega\varsigma$ u. $\sigma\alpha\omega\tau\omega$).
heliotropismus (H. Müller) das Wenden nach der Sonne (positiver) und von d. Sonne weg (negativer).
helleborine die Niesswurzartige ($\xi\lambda\lambda\varepsilon\beta\omega\eta\omega\varsigma$, - $\iota\varsigma$).
helmstadiensis von Helmstädt (Prov. Hannover).
helobiae Endl. etc. Sumpfbewohner ($\xi\lambda\omega\varsigma$, - $\varepsilon\omega\varsigma$).
helveticus aus Helvetien, Schweizer.
helvölus (dem. helvus) bleichrot, rötlichschimmernd.
hemisphaericus halbkuglig ($\xi\mu\iota$ u. $\sigma\alpha\omega\iota\omega\alpha$).
hemitrichus zur Hälfte behaart.
hepaticologia Lebermooskunde.
Hepaticae Juss. (-ci Rchb.) Lebermoose.
hepatieus Leberbetr. ($\xi\tau\alpha\omega$ - $\alpha\tau\omega\varsigma$).
heptangulus siebeneckig, -kantig.
Heptandria L. Siebenmännige.
heptaphyllus siebenblättrig.
herbacēus krautartig (herba Kraut).
herbarium Kräuter- od. Pflanzensammlung.
hercogamia Hindernis- od. Zaunehe ($\xi\omega\omega\varsigma$ Zaun) d. i. durch Stellung der Geschlechtsteile gehinderte Selbstbefruchtung einer Blüte.
hercynianus vom hercynischen od. Harzwald.
hermaphroditus Zwitter (näml. zugl. m. männlichen u. weibl. Geschlechtsteilen).
 (Hermes = Mercur, Aphrodite = Venus.)

1) nicht Hausterien (z.B. Druckf. in Schillings Grundriss, 13. Ausg.).

hermeticus, „hermetisch“ (n. Hermes Trismegistus) gänzlich abgeschlossen.

herpeticus (*ἕρπητικός*) kriechend, zum Kriechen geschaffen.

herrenhusanus von Herrenhausen b. Hannover.

heterodrōmūs die Richtung od. Stellung wechselnd.

heteromallus auf einer Seite wollig (*ἐπεομάλλος*).

heteromerīci (sc. Lichenes) Flechten mit mehrschichtigem Lager.

heterophyllus verschiedenblättrig, mehrerelei Blätter führend.

heterospermus verschiedensamig.

heterospōrae verschieden - d. i. gross- u. kleinsporige (z. B. Bär-lappe).

heterostyia verschiedengrosse Grif fel u. Staubgefässe zur Verhütung der Selbstbestäubung.

hetruscus u. **Hetruria** s. etruscus u. Etruria (j. Toskana).

hexagynus sechsweibig, -griffig, -narbig.

Hexandria L. Kl. d. „Sechsmännigen“.

hexastichos (-us), -on (-um) sechszeilig, -reihig.

hians klaffend, aufgesperrt (hio klappe).

hibernaculum Winterquartier, Wintergestalt einjähriger Kräuter.

Hibernia Hibernien od. Irland, -nicus irisch.

hibernus winterlich.

hiemalis winterlich (v. hiems, -mis W.).

hieracioides habichtskrautähnlich (Hieracium).

herobotanīcon Buch der heiligen Kräuter (*Ἑροβοτάνη* d. heil. Kr.).

hierocheunticus (-tinus) aus Jericho (Palästina).

Hierosolyma Jerusalem.

hilum Nabel.

Hippocastānum Rosskastanie (*ἱπποκαστανός, καστανὸς*).

hireinus, -cosus bocksartig.

hireūlus (dem. hircus) Böckchen.

hirsūtus rauhhaarig, struppig.

hirtaeformis borstenförmig.

hirtus rauhhaarig.

hispanicus (-anus) spanisch, **Hispania** Spanien.

hispidus rauhhaarig.

hissatus aufgehisst (fr. hisser, ital. issare hissen, d. i. aufziehen, nöml. d. Flagge).

Holeracēae (Olerac.) L. Gemüsekräuter (olus, -ēris).

Holmia Stockholm.

hololeucus ganz weiss (*ὅλος, λευκός*).

holosericeūs ganz seiden, sammetartig (*σημικός*).

holosteūs ganz knöchern, knochenhart (*ὅστεος* knöchern).

Holsatia Holstein, -satius holsteinisch.

homodromia Gleichläufigkeit, die Richtung od. Seite beibehaltende Stellung (*ομοίς* u. *διαύμος* Lauf).

homoeomerīcius (sc. Lichen) mit einschichtigem Lager.

homonemēus im Wald zusammen wachsend, zusamm. weidend (*νέμως, -εος* Wald, Weide).

hondensis von d. Stadt Honda am Magdalenenfluss (Südamerika).

hordeacēus gerstenartig (Hordeum).

hordeistichus gerstenzellig.

hornus heurig, diesjährig.

horridus zottig, struppig.

hortensis in Gärten wachsend.

hortulanus Gärtner.

hospiṭor (-ari) „hospitire“, nehme als Gast teil.

hospiṭus fremd, Gast.

humifūsus auf die Erde hingegossen,

humilis niedrig. [-gestreckt.]

humus Damm- od. Gartenerde, Humusboden.

Hungaria Ungarn, -rius ungarisch.

hyalinus gläsern, von Glas (*ὑάλη*).

hyperacēum s. hibern.

hybridatio Bastardbefruchtung.

hybridus unecht, Bastard.

hydnoides stachelpilzähnlich (Hydnnum).

Hydrogen = Wasserstoff (v. *γέρω* erzeuge).

hydrogramma Wellenstrich.

hydrocarȳes Lk. Wassernussgewächse.

hydrophōns wasserhaltig, wässriger.

Hydrophyta Endl. Wassergewächse (Algen).

hydropīper Wasserpfeffer.

hydrotropismus Pflanzenbewegung im Wasser.

hygrometricus (-mētrus) Feuchtigk. anzeigend, wetterprophetisch (*ὕγρος* u. *μετρεῖν* messe).

- hygrophilus** Feuchtigkeit od. Nässe liebend.
- hymenium** Keimhaut der Pilze (*ὑμῆνη, -έρος*), näm. die Sporen tragende, von Basidien gebildete Fruchthaut.
- hymenōdon** Hautzahn (*ὑμῆνη u. οδών*).
- Hymenomycētes** Fr. Hautpilze.
- Hyperbel** = Kegelschnitcurve parallel der Kegelachse.
- hyperborēus** nordisch, im Land d. Hyperboräer;
- hyphen** (v. *ἔφη* Gewebe) verzweigt. Fadengewebe od. fadenförm. aneinandergedrehte Zellen d. Pilze.
- Hypomycētes** Fr. Fadenpilze.
- hypnoïdes** astmoosähnlich (Hypnum etc.).
- hypochīlum** Unterlippe (*ὑπὸ u. χειλός*).
- hypocotylus** unter den Cotyledonen befindlich.
- hypocrateriformis** teller- od. untertassenförmig.
- hypogaeus** untererdig (*ὑπόγαιος v. γῆ* Erde).
- hypoglottis** (Geschwulst) unter d. Zunge (*γλώττα*).
- hypogynus** unterstempelig, mit unterständigem Stempel.
- hypoleucus** unten weiss.
- hypopetalus** unterkronblättrig, mit unterständigen Kronblättern.
- hypophēgēus** unter Buchen wachsend (*γηγῆς* lat. fagus).
- hypophyllos** unter Laub befindlich.
- hypostaminea** Juss. mit unterständigen Staubfäden.
- hypothallus** verfilztes Sporenfadengewebe der Pilze etc., „Unterthalus“.
- hypothējus** unten schwefelgelb (*θήϊον* od. *θεῖον* Schwefel).
- hypsipes** hochfüssig, -stielig (*ὕψη* hoch u. pes Fuss).
- hyrcānus** aus Hyrkanien (am Kasischen Meer).
- hystrix** igelstachelig (*ἱστρίς* Stachelborste).
- jaculiformis** spieß- od. pfeilförmig.
- Iberia** Iberien (s. sogl.) od. Armenien (südl. v. Kaukasus).
- ibericus** iberisch, **Ibērus** Ebro in Spanien (Iberien).
- ichoratus** rötlichgelb (v. *ἰχώρα* blutähnliche Flüssigkeit).
- icōnes** (v. *εἰκὼν, -ορος*) Abbildungen.
- Ieosandria** L. Kl. d. Zwanzigmännigen (XII. Kl.).
- icterinus** gelbsüchtig (v. *ἴκτερος* Gelbsucht).
- idaeus** vom Berg Ida (auf Creta).
- jemenicus** von Jemen (Yemen) in Arabien.
- jenensis** von Jena.
- ignarius** zu Feuer dienend, Feuer betr.
- iguaneūs** Iguane od. Leguane betr. (iguana Leguan, eine Baumeidechse).
- illegitimus** „illegitim“, ungesetzlich, z. B. Befruchtung durch d. Blütenteile derselben dimorphen Blütenform (Darwin).
- illustratio** „Illustration“, Erklärung mit Abbildungen.
- ilvensis** von d. Insel Ilva (Elba).
- Imaus Mons** (Emodus) Himalaya, **Imaus Seythieus** Tschiansan od. Muztagh (Innerasien).
- imbecillis** u. -us, fr. imbécille schwach, kraftlos.
- imberbis** bartlos (in u. barba).
- imbibitio** „Imbibition“, Einsaugung (z. B. der Zellhaut).
- imbricatus** (v. imbrex, -icis) wie mit Ziegeln bedeckt, hohlziegelartig.
- immersus** eingetaucht.
- impensus** darauf verwendet, -sa Kosten, -sis auf Kosten.
- imperialis** kaiserlich.
- impressus** eingedrückt.
- impūbes** nicht mannbar, unbehaart.
- imus** unterster.
- inaequalis** ungleich.
- incānus** ganz grau, altersgrau.
- incarnatus** fleischrot, schön rot, „incarnat“.
- inchoatus** angefangen, versucht.
- incisus** eingeschnitten.
- inclinatus** geneigt, gebückt.
- inclusus** eingeschlossen.
- incōla** Bewohner.
- incomparabilis** unvergleichlich.
- incomplētus** unvollständig.
- inconspicuus** unansehnlich.
- inconstans** unbeständig.
- incrūstatus** „inkrustiert“, als Krustenüberzug.
- incubaeus** zum Brüten aufsitzend.

- inecurvus** eingekrümmmt, krumm.
index, -*cis* Anzeiger, Inhaltsverzeichnis.
indigēna, -*nus* Eingeborner, einheimisch.
indivīsus ungeteilt.
indumentum Überzug, Bekleidung.
indusium Schleierchen der Sporangien (b. Farnen).
inebrians berauschend.
inermis unbewaffnet, stachellos.
infectarius färbend, zum Färben dienend.
inferior unterer, niederer, auch geringer.
infērs unten befindlich, unterer.
infestans feindlich, bewaffnet.
infestns feindlich, bewaffnet.
infimus unterster.
inflatus aufgeblasen.
inflexus einwärtsgebogen.
inflorescentia „Inflorescenz“, Blütenstand.
infraetns geknickt, umgebrochen.
infundibuliformis trichterförmig.
infusum Aufguss, **infusorium** Aufgussstierchen.
ingriēs ingrisch, aus Ingemannland (um St. Petersburg).
initiale Anfangspunkt (z. B. d. Wurzelkörpers).
inodōrus geruchlos.
inornatus ungeschmückt.
inquilīnus Einwohner, Insasse.
inquinans schmutzend, -*natus* beschmutzt.
insenlptus eingegraben, eingeprägt.
insertio Einfügung, **insertus**, eingefügt, inseriert".
insidens aufsitzend.
insititus zum Ppropfen gebraucht, insitus gepropft.
instruetus versehen, eingerichtet, „instruiert".
insubriens insubrisch (Insübres, Volk der Umgegend v. Mailand).
insuētus ungewohnt, ungewöhnlich.
insulsns unschmackhaft, abgeschmackt, „ungesalzen".
intēger, -*gra* unverletzt, ganz.
integerrimus ganz unverletzt, vollkommen ganz.
integrifolius ganzblättrig.
integnumentum Ei- od. Samenhülle.
intercalaris eingeschaltet, z. B. intercalares Wachstum des Blütenbodens (Schwendener).
- intercellulare** Zwischenzellenraum.
intermedius mittlerer.
interne (-*nus*) innerlich, innerer.
internodium Stengelglied zwischen je zwei Knoten, Zwischenknotenglied.
interponiert (Schwendener) da zwischengestellt (z. B. Quirle).
interrupte (-*tus*) unterbrochen.
intestinalis eingeweid- od. darmartig.
intextus ein- od. zwischengewoben.
intimus innerster.
intīna „Intine“ d. i. Innenhaut des Pollenkorns.
intra innerhalb.
intricatus in einander gewirrt, verworren.
introrsum einwärts.
intrusus (v. *intrudo*) eingedrungen, hineingestossen.
intūbus Endivie (v. *tubus* Röhre, -röhriger Stengel!).
intus inwendig, im Innern.
intussusceptio Wachsen der Zellhaut einwärts, Zunahme nach innen etc.
Intybus s. intūbus.
inulēus alantartig (v. *Imula* s. No-menkl.).
Inulin = Schleimmehl des Alants (s. eb.).
innloides alantähnlich.
inundatus überschwemmt.
inversus umgewandt, umgekehrt.
involucellum Hüllchen, Hüllblättchen (b. Dolden etc.).
involucratuś mit Hüllblättern verschen.
invulnerum Hülle(b.Dolden u.a.m.).
irrigatus gewässert, gewellt, m. Wellenzeichnung.
irrigūs bewässert.
isagōge (*εἰσαγωγή*) Einleitung.
isatiēdus waidähnlich, -artig (Isatis Waid).
Ischaemon (-um) blutstillend (*ἴσχωμα* hemme, *άίμα* Blut).
isenacensis von Eisenach, Eisenacher.
isiāns „isisch“, der Göttin Isis heilig.
isoliert = abgetrennt, abgesondert.
isospōrus gleichsporig (z.B. Farne) (*ἴσος* u. *σπόρα*).
isthmus Schlund, Hals.
Iteoidēae Bisch. Weidengehölze.

- iteoides** weidenähnlich (v. *ἰτέα* Weide, Wiete).
- jubatus** mähnenartig (v. *jubae*, -*arum* Mähne).
- juga** Rippen, Riefen d. Doldenfrüchte, - **primaria** Haupt-, - **secundaria** Nebenrippen.
- juglandéus** wallnussartig (v. *Juglans*, -*ndis*).
- Jugum** Joch, Blattpaar (bei Fiederblättern).
- juracéus** vielfuss-, kätzchenartig (v. Julius g. *τούλως*).
- jurifer**, -ëra Kätzchen tragend.
- Juiflórae** Endl. Kätzchenblütige.
- juncaceus** binsenartig (v. *Juncus*).
- Juncaginæa** Juss. Binsengewächse.
- juncénus** aus od. voll Binsen, -*cínus* binsenartig.
- Juvavum** (Juvavia) Salzburg.
- juxta** nach, gemäss.
- Juxtaposition** (Schwendener) Danebenstellung od. Anschluss (z. B. bei Sprossungen).
- Kali** „Kali“ od. Laugensalz (in d. Chemie die alkalische Hauptbase!).
- karstiensis** vom Karstgebirge in Krain od. Illyrien.
- kermesínum** karmoisinrot.
- kewensis** (sc. *hortus*) von Kew bei London.
- Kilia** Kiel, -*iensis* Kieler.
- Krönchen** auf den Sporennöspchen der Chara (s. Nom.).
- labellum** (dem. v. *labrum*) „Labell“ d. i. Lippchen (Lippe), bei den Orchideen inneres, längeres Perigonblatt!
- labiatum** (v. *labium*) gelippt, mit Lippen versehen, z. B. bei d. „Labiaten“.
- Labiatiflórae** DC. Lippenblütler.
- labrum**, i. q. *labium* Lippe, Lefze.
- lacea** Lack, Gummilack, Gummirharz.
- laccífer** Gummiharz tragend od. liefernd.
- lacer**, -ëra zerrissen, zerschlitzt, struppig (Kummer).
- lacinia** Zipfel, Fetzen, -*níatus* zipfelig, zerfetzt.
- lac**, -*ctis* Milch, Milchsaft.
- lacrymabundus** thränend (*lacryma* Thräne).
- lacrymans** thränend, weinend, Feucht, ausschwitzend.
- lactarius** Milchner, Milch ausgebend (näml. Pilz).
- lactéus** milchsaftig, milchweiss, wie Milch.
- lacúna** Lache, Grube etc.
- lacunae aëréae** Luflücken des Zellgewebes.
- lacunosus** zellig, grubig, m. Grübchen versehen.
- lacustris** (v. *lacus*) an od. in Teichen od. Lachen wachsend.
- ladanífer**, -ëra myrrhentragend (s. sogl.).
- Ladanum** Gummi od. wohlriechender Cistharz vom Strauch *λιδός* (bei Luther „Myrrhe“).
- laevigatus** geglättet.
- laevis** glatt.
- lagenarius** flaschenförmig (*lagēna*).
- lamellae** „Lamellen“, blattart. Platten od. Strahlen der Blätterpilze.
- lamína** Blech, Blatt, Spreite des Blatts.
- lamína petáli** Platte des Kronblatts.
- lamína prolígera** Keimschicht der Pilze.
- Laminartegmente** (Mikosch) d. s. Blattspreitenhüllen.
- lamprophyllus** glanzblättrig (*λαυπτόος*, *φύλλον*).
- lamprospermus** glanzsamig (s. eb.).
- lanatus** mit Wolle bewachsen (*lana*).
- lanceolatus** lanzettförmig.
- lanceifolius** lanzenblättrig (*lancēa*).
- lanestrís** wollig (*lana*).
- lanéus** wollen, von Wolle.
- lanosus** wollig, voller Wolle.
- lanuginéus** wollhaumig, -*nosus* desgl. (s. sogl.).
- lanugo**, -*mís* Milchhaar, Wollennaum, Wollbehaarung.
- lapathifolius** ampferblättrig (*Lapathum*).
- lappaceus** klettenartig (*Lappa*, s. Nom.).
- lasiocarpus** zottenfrüchtig, mit rauhhaariger Fr.
- lasius** (*λασίος*) rauh, zottig.
- latébra** Schlupfwinkel, Versteck.
- lateral** = seitlich (*latus*, -*ris* Seite).
- lateritius** ziegelrot (later, -*ris* Ziegel).
- latex**, -*cis* Narbenfeuchtigkeit.
- lathyroides** kicher- od. platterbsenähnlich (*Lathýrus* s. Nom.).

- laurinus** lorbeerartig (laurus).
laxiflorus weit-, offen-, schlaffblütig.
laxus „lax“, schlaff, weit, offen etc.
Lebenseinheit (Vöchting) = jed. selbständ. Pflanzengebilde, d. h. das für sich zu leben vermag.
leens Zwiebelscheibe (*λεζος* Napf etc.).
legitimus gesetzlich, „legitim“, z. B. Befruchtung, nämlich durch dimorphe Blütenteile (Darwin).
legumen Hülse, Hülsenfrucht.
legumen biloculare Doppelhülse.
leguminosns hülsenartig, -früchtig, z. B. „Leguminosen“ d. s. Hülsenfrüchte.
leianthus glattblumig (*λειος* glatt, schlicht, kahl etc.).
Leida Leyden.
leiocarpus glattfrüchtig.
leiostachyos (-us) glattährig.
Leitbündel (Russow) d. i. zuerst aus d. Cambium sich bildendes.
lemnacens wasserlinsenartig (Lemma).
lendiger, -era Nisse od. Gnitten (Läuseeier) führend.
lens, -dis Nisse od. Gnitte der Laus, Läuseei.
lens, -tis Linse.
lenticellae Linsenhöckerchen od. Korkwarzen d. Rinde.
lenticularis Linschen od. Linsen betr.
lentiginosns sommerfleckig, -sprosig.
lentigo, -inis Sommersprosse.
Lentiscus Mastixbaum (v. lentesco bin klebrig).
lentus langsam, zäh.
Leodium Lüttich.
leontinus aus dem Leontinischen (bei Isola in Tyrol).
lepetitii Le Petit betr. (n. pr.).
lepides (*λειτης*, -*ιδος*) Schuppen.
lepidocarpus schuppenfrüchtig.
lepidotus schuppig, schülferig.
lepidus niedlich, artig, hübsch etc.
lepodinus rindenzerstörend (*λέπιος* u. *δείρος* schrecklich etc.).
leporinus Hasen betr. (lepus, -ōris).
leprosus aussätzig (lepra Aussatz etc.).
leptocephalus dünnköpfig (*ζεφαλή*).
leptocladus fein- od. dünnstengelig (*χλάδος* Trieb etc.).
leptophyllus dünn- od. feinblättrig.
leucanthus weissblütig, -blumig.
leucocarpus weissfrüchtig.
leucoconius weisstaubig (*χορία* Staub).
Leucoglochin Weiss spitze (*γλωσσίν* od. -*ις*).
leucomelas weiss und schwarz.
leuconeurus weissnervig.
leucosorius weisskapselig, m. weissen Fruchthaufchen (*σωρός* Haufe od. auch *σωρός* Gefäß).
leucostachys weissährig.
levulosis „Levulose“ d. i. Schleimzucker.
libanensis vom Libanon-Gebirge.
liber, -bri Bast.
libriformum „Libriform“ , Bastfaserstoff.
Liburnia Liburnien (Bosnien u. Norddalmatien).
Liburnum Livorno u. Libourne bei Bordeaux.
liburnus, -nius liburnisch, aus Liburnien (s. v.).
lichen, -ēnis (*λειχήν*, -*ηρος*) Flechte.
lichenosus flechtenartig.
Liesch d. s. getrocknete Blätter zum Dichten der Fässer (z. B. von Sparganum, s. Nom.).
ligericus von der Loire (Ligēris).
Lignin = Holzfaserstoff (v. lignum).
lignosus holzig.
ligula (dem. v. lingua) Blatthäutchen, häut. Ansatz der Grasblätter am Halm.
ligulatus m. Blatthäutchen vers. od. auch wie ein Zünglein geformt (sc. flos) (s. sogl.).
liguliflōrs zungenblütig (z. B. Strahlblütchen d. Compositen).
ligusticus, -gurinns ligurisch, aus Ligurien (d. Gebiet um Genua).
liliifolius lilienblättrig.
limacīnus Wegschnecken betr. (limax, -ācis).
limacīs Gen. v. limax (s. eb.) (gr. *λείμουαξ*, -*αζος*).
limbatus gerandet, gesäumt (limbus).
limnobius im Sumpf od. Teiche lebend.
limonius limonfarbig, orangegelb.
limosus schlammig, **limus** Schlamm, Kot.
linacēus leinartig, **linum** Lein.
linariifolius leinkrautblättrig (Linaria).

- linearis**, „lineal“ oder linienförmig (linēa).
- lineatifolius** linirtblättrig, m. durch Linien bezeichneten Blättern.
- linguiformis** zungenförmig.
- linicōla (-us)** Lein bewohnend, unter Lein wachsend.
- linifolius** leinblättrig, flachsblättrig.
- linoides** lein- od. flachsähnlich.
- lintearius** leinwandartig (lintēum Leintuch).
- lippizensis** von Lippiza im österr. Littoral.
- lipsicus, -siensis** Leipziger (Lipsia Leipzig).
- liquaminosus** saftig (liquamen, -inis).
- Liquiritia** Lakritzensaft.
- lithanthrax** Steinkohle ($\lambda\theta\sigma\alpha\varsigma$ u. $\lambda\tau\theta\sigma\alpha\varsigma$).
- lithuanicus** aus Lithauen.
- litigiosus** streitig, voller Streit.
- litoralis** (litoralis) am Strand, an der Seeküste.
- littorēus** (litor.-) desgl. (v. littus od. litus, -ōris).
- lividus** bleifarbig, bläulich, blass.
- livoniēus** livländisch (Livonia Livland).
- löbus** (in compos.) -lappig (löbus gr. $\lambda\theta\beta\sigma\varsigma$ Hautlappen).
- loculamentum** Fach, Gefach.
- locularis** (in compos.) -fächiger.
- locūli** (dem. v. loci) Fächer, z. B. der Frucht, loculi anthērae Anthrenfächer.
- loculicida** (sc. dehiscentia) fachteiliges (Aufspringen d. Frucht).
- locupletissimus** am reichsten, reichlichsten.
- loensta** Heuschrecke, aber auch Ährchen der Gräser.
- lodiculae** Unterschüppchen bei Graspelzen.
- loliacēus** lolchartig (Lolium, s. Nom.).
- Lomentacēae** DC. Gliederschotige Cruciferen.
- lomentum** Gliederhülse od. -Schote.
- Londinium** London, **Londinium Gothorum** Lund in Schweden (Gothland).
- longaevus** hochbetagt, altersgrau.
- longirostris** langschnäblig.
- longisiliquus** langschotig.
- longitudinalis** in die Länge gerechnet.
- lorēus** riemenförmig (lorum Riemen).
- lorīea** Panzerchen (v. Diatomeen), -eatus gepanzert.
- lubriens** schlüpfrig.
- lucens, -cīdus** schimmernd, hellleuchtend (lux, -cis Licht).
- lucifugus** lichtscheu (s. eb. und fugio fliehe).
- lueus, -i** Hain.
- lufthöhlen** innerh. d. Gewebes (z. B. bei Fluviales).
- Luftspalten** in Oberhautzellen.
- Luftwurzel** (z. B. bei Pandanus, Philodendron etc.).
- Lugdūnum** Lyon, **Lugd. Batavorum** (batāvum) Leyden (Holland).
- Ingens** trauernd.
- lumbrialis** regenwurm förmig (lumbričus).
- lumen, -inis** Licht, Weite od. innerer Durchmesser z. B. innerer, freier Raum einer Zelle.
- lunarīs, -rius** d. Mond betr., mond förmig.
- lundensis** von Lund in Schweden.
- lupuliformis** hopfenförmig.
- lupulinus** Hopfenbetr., hopfenartig sich schlingend.
- Lupūlus** (sc. Humūlus) Hopfen (s. d. Nomenkl.).
- luridus** blass, fahl, leichenfarbig, schmutziggelb.
- lusatiēus** Lausitzer (Lusatia Lausitz).
- luteōls** (dem. lutēus) lehmgelblich (v. lütum Lehm od. auch v. lütum Gilbkraut od. Wau), goldgelblich.
- lutescens** gelblich.
- lutetianus** Pariser (Lutetia Parisiorum Paris, eig. Schmutz- od. Lehstadt der Pariser).
- lutēus** gelblich, lehmgelb (v. lütum Lehm), goldgelb (v. lütum Wau, Gilbkraut).
- luxurians** üppig, schwelgend, wuchernd, fruchtbar.
- lyceensis** von Lyck in Ostpreussen.
- lycopifolius** wolfsfussblättrig (Lycopus).
- lyratifolius** leier- od. lyrablättrig, -ratus leierförmig.
- maceratio** Mürb- od. Weichmachung, „Maceration“ (v. macer mager etc.).
- macis** Muskatblüte, Samenmantel der Muskatnuss.

- macranthus** gross- od. langblütig (*μαργός* gross, lang).
- macrocarpus** gross-od.langfrüchtig.
- macrophyllus** grosslaubig.
- macropus** gross- od. langfüssig, -gestielt.
- macrorrhizus** (-os, -on) langwurzlig (*ὅλιχ*).
- macrosiphon** langröhrig (*στύφων* Röhre).
- macrospórae** Gross- od. Langsporen (der Wasserfarne, werden von d. Mikrosporen befruchtet).
- macrosporangia** Grosssporenbehälter (i. d. Sporocarpen der Rhizocarpeen).
- macrostachyos** gross- od. langährig.
- maeūla** „Makel“, Flecken, -atus fleckig.
- maderaspatanus** nicht etwa kahlhäutig oder Fell kährend (v. *μαδαρός* u. *οὐάτος* Fell), sond. i. q. maderaspatensis (s. sogl.).
- maderaspatensis** von Madras (Ost-indien).
- maesiæcus** (moesiacus) aus Mösien (j. Bulgarien etc.).
- maglia** (Solanum m.) Masche od. Netzauge (ital.), fr. maille.
- majuscūlus** etwas gross, grösser (als die andern Buchstaben).
- malachius** malvenrötlich.
- malacophyllus** malvenblättrig, weichlaubig (*μαλαχώς* weich).
- mamilla** Kernwarze.
- mannia** Brust, -warze, -mosus voller Zitzen.
- Manchette** (Manschette) (bei Pilzen) = Kragenhaut unterh. d. Hutes um den Strunk.
- manticus** von Mantes (in Frankr.: Depart. Seine u. Oise), „mantisch“ (Mössl.-Rchb.), nicht v. *mantica* Beutel.
- mantissa** Ergänzung, Nachtrag, „Mantis“ (Mathem.).
- mannale** Handbuch.
- marantinus** marantartig (Maranta, s. Nom.).
- marasmus** das Verwelken, Schwinden (d. Altersschwäche etc.).
- marcescens** welkend, -cidus welk.
- margaritacēus** perlfarbig, perlmutterig (v. margarita Perle, Perl-muschel).
- marifolius** marumblättrig (Marum, s. Nom.).
- marinus** am od. vom Meer, an od. von der See.
- maritimus** am Meer wachsend.
- maritus** Ehemann, Männchen.
- mas-, -cūlus** Mann, Männchen, -culinus männlich.
- massa pollinis** Pollenmasse.
- Massilia** Marseille, -liensis Mar-seiller.
- mastoïdeus** brustartig, -warzig.
- matronalis** matronenhaft, Matronen betr.
- matūrus** reif, zeitig, -ritas Reife.
- matutinus** morgendlich, früher-scheinend.
- meātus intercellulares** Zellenzwi-schengänge.
- median** = mittler, z. B. Mediane = senkr. Mittellebene.
- medicamen**, -inis Heilmittel i. q. medicamentum „Medikament“.
- medicus** ärztlich, „medizinisch“, aber auch medisch, aus Medien.
- mediocris** mittelmässig.
- Mediolanum** Mailand, ital. Milano.
- mediterranēus** mittelländisch, -meerisch.
- medulla** Mark.
- mega(lo)politanus** Mechel- od. Mecklenburger, von Megapolis, d. i. Mechilen- od. Mecklenburg.
- mega(lo)potamīeus** von Rio Grande del Norte (dem grossen Fluss aus d. Norden) in Nordamerika.
- megastachyos** lang- od. grossährig.
- melaenus** schwarz (v. *μέλαζ*, -λαι-ρα).
- melanthus** schwarzblühend.
- melanochaetus** (-os) schwarzborstig (*γαύτη*).
- melanolōmus** schwarz gesäumt, -bärtig (*λώμα* Saum etc.).
- melanophloëns** schwarzsplintig (*γλοιός* Bast, Splint etc.).
- melanōpus** schwarzfüssig, -gestielt.
- Melanosināpis** Schwarzenf.
- melanospermus** schwarzsamig.
- meletenata** fleissige Arbeiten od. Studien (*μελέτημα*).
- melinoides** (bess. mellin.-) honig-gelb (mel, -llis Honig).
- meliteusis** von Melite od. Malta.
- mellēus** honigartig, -gelb.
- mellifer**, -era honigführend, -hal-tend.
- melocarpus** melonenfrüchtig.

- membrana** „Membrane“ d. i. Haut, -nacēus häufig.
- memphitēus** von Memphis (Ägypten).
- mephiticus** „mephitisch“, **mephītis** schädl. Ausdünstung.
- merenchyma** krummflächiges Parenchym od. Mark.
- mericarpium** Teilstückchen (der Doldenpfl.) ($\muέoος$ Stück etc.).
- merismaticus** sich aufteilend (s. sogl.).
- meristēma** „Meristemschicht“ (bei Wurzelbildung, Janczewski) d. i. noch junges, bildungsfähiges Uro. Teilungsgewebe (v. $\muέoτω$ teile).
- mesenteriformis** gekrüseförmig ($\muέo\sigma\tau\epsilon\tau\epsilon\gammao\tau$).
- mesenterium** Gekrüse, Mitteldarm ($\muέoος$ u. $\epsilon\tau\tau\epsilon\gammao\tau$).
- mesocarpium** mittlere (fleischige) Fruchthaut, Fruchtmittelschicht.
- mesophyllum** Laubmittelschicht, Blattmark.
- metachrōus** farbwechselnd ($\chiρo\alpha$ Farbe etc.).
- Metamorphose** = Verwandlung ($\muέo\tau\muόγ\omega\sigma\tau$).
- metaspermus** nachsamig¹⁾ (Gegensatz zu archi- od. gymnospermus ur- od. nacktsamig).
- Metis** Metz, -tensis Metzer, von Metz.
- metropolitanus** von der Hauptstadt (metropōlis).
- metulifer** (-erus, -era) zackenführend (metūla dem. meta = Pyramide od. Spitzsäule).
- miaeacēus** glimmerartig (mica).
- micans** schimmernd, glänzend (mico).
- mieranthus** kleinblumig ($\muizgo\tau$, $\bar{a}r\thetao\tau$).
- microcarpus** kleinfrüchtig.
- Micromycētes** „Kleinpilze“, d. i. mikroskopische etc.
- micropetalus** kleinkronblättrig.
- microphyllus** kleinblättrig, -laubig.
- mieropyle** „Mikropyle“, d. i. Knoospennmund od. enger Eingang in d. Samenknospe für den Pollenschlauch.
- mierorrhīzus** kleinwurzelig.
- micosōma** „Kleinkörperchen“ od. Plasmakörnchen (Strasburger).
- micospermus** kleinsamig.
- microspōra** Kleinspore (z. B. Equisetaceen, — befruchten die Makrosporen, s. d.).
- microsporangia** Kleinsporenbehälter ($\delta\gamma\gamma\epsilon\tau\tau$).
- microstachyos** (-us) kleinährig.
- Milano** ital. Mailand (s. Mediolanum).
- Milchzellen** (David, 1872).
- miliacēns** hirschartig (Milium, s. Nom.).
- militaris** „militärisch“, soldatisch.
- millefolius** tausendblättrig.
- millegrānus** tausendkörnig (grānum).
- miniatius** mennigrot (minium Mennig).
- minimus** (Superl. v. minor Compar. kleiner) kleinster.
- mirabilis** wunderbar.
- Missnia** (Missnia) Meissen, Helvetia Missniae sächsische Schweiz.
- mitis** sanft.
- mixtus** gemischt, **mixtura** „Mixtur“, Mischung.
- modiēus** mässig.
- modificatio** Beschränkung, „Modifikation“.
- modiōlus** (dem. modius Mass) Mässchen od. Mäschchen.
- Moenus** Main.
- moesiacus** (maes.-) aus Mösien (Bulgarien etc.).
- Moguntia** Mainz.
- moldaviēus** aus der Moldau (Rumäniyen).
- Moleküle** = kleinste Massteilchen.
- Molekularstruktur** (Pfeffer) = Anordnung der Moleküle.
- mollis** weich, **mollissimus** sehr od. ganz weich.
- Mollugo** Weichkraut, -klette.
- molluseus** weich.
- molybdinus** molybdän- od. bleiartig.
- monacensis** münchener, **Monacum** München.
- monanthos** einblütig, -blumig.
- Monadelphia** L. Einbrüderige (XVI. Kl.).
- Monandria** L. Einmännige (I. Kl.).
- monile** Halskette, Rosenkranz, -liformis rosenkranzförmig.

1) S. Engler, Antherenbild. d. Metaspermien in Pringsheim's Jahrb. 1875.

- monilifer** rosenkranztragend.
monocarpus ein- od. einzelfruchtig.
Monochlamydæa DC. Einhüllige,
Perigonblütige.
Monoclinia L. Einlagerige, Zwitter-
blumen.
Monocotylæa Einsamenlappige.
Monoezia L. Einhäusige (XXI. Kl.).
monoecus einhäusig (*μονός*, *οῖσος*)
d. i. mit getrennten Geschlechtern
auf demselben Stock.
monographia „Monographie“, Ein-
zelbeschreibung.
Monogynia L. Einweibige.
monomérus aus einem Stück be-
stehend (z. B. Stempel etc.).
monophyllus einblättrig, m. einem
Laubblatt.
monopodium Einzelfussstück, d. h.
für alle Äste Fuss bleibender
Haupttrieb.
monostachyos, -on einährig (*στά-*
χυζ Ähre).
monspeiliacus st. monspeliensis,
aber auch : am Berg Pelion (mons
Pelius) zu Hause, *Dianthus monsp.*
Rehb.: „Vorgebirgsnelke“ (mons
bonae spei Cap der guten Hoff-
nung).
monspeliensis von Montpellier
(Mons Puellarum).
monspessulanus desgl.
monstrositas „Monstrosität“ (s.
sogl.).
monstrosus (-struosis), „monströs“,
d. i. ungeheuerlich, missgebildet
(monstrum).
montanus „montan“, auf Bergen
wachsend.
moravicus mährisch, aus Mähren
(Moravia).
morbillosus kränkelnd (morbillus
dem. morbus).
morio schwarzbraun.
morphologia Gestaltungslehre
(*μορφή*).
morphologischer Ort (Vöchtung) d. i.
Entfernung von dem entsprech.
Ende der Lebenseinheit (Organ-
bildung).
morphonomia Gestaltungsregel.
morsus Biss.
Mosa Maasfluss.
moschatellinus etwas nach Moschus
riechend.
moschatus moschusartig, n. Mo-
schus riechend.
- Mosella** Mosel.
mosquensis Moskauer (Moschia
od. *Moscovia* Moskau).
mucēdo (v. *mucus*) Rotz.
mucidus schimmelig (v. *mucor*).
mucilaginēns schleimig (v. *muci-*
lago, -inis).
mucilāgo Schleim, Rotz (i.q. *mucus*).
mucīnum „Mucin“, ausziehbarer
Klebstoff.
mucor Schimmel, Kahm.
mueosus rotzig (v. *mucus*).
mueronatus zugespitzt, spitzig
(muero Dolch etc.).
muens, -i Rotz.
muldaviens an der Moldau (Mul-
davia), Fluss in Böhmen, zu
Hause.
multicaulis vielstengelig.
multifidus vielspaltig.
multiflorus vielblütig, -blumig.
multilocularis vielfächerig.
multiramēus vielästig, -zweigig.
multoties oft- od. vielmals.
muniens befestigend, schützend.
muralis auf od. an Mauern wachsend.
muricatus (fr. *muriqué*) purpurfar-
big, aber auch stachelnschnecken-
artig, reichstachelig (Kummer)
(v. *murex*, -icis Purpur od.
Stachelschnecke).
murinacēus mäusegrau.
murinus Mäuse betr., mäusegrau
(mus, -ris Maus).
muronum der Mauern (*murus*).
Museardine = durch Schimmelpilze
verurs. Krankh. d. Seidenraupen.
muscarius auf Fliegen bez. (*musca*
Fliege).
muscerda Mäusedreck.
Musei Juss. Moose.
musicōla Moosbewohner (*muscus*
Moos).
muscifer, -era Fliegen tragend (v.
musca), aber auch moostragend
(v. *muscus*).
musicēnus im Moos erzeugt.
Museinæa Bisch. Moosartige.
muscipūla Fliegenfalle (*musca* u.
capiro).
muscoïdes moosartig (*muscus* u.
ειδουαι gleiche).
muscología Mooskunde.
museosus moosig.
museoviensis (sc. *hortus*) des Für-
sten Pückler-Muskau.
muscus Moos.

- mutabilis** veränderlich.
- muticus** unbewehrt, grannenlos.
- mutilatus** (-tilus) verstümmelt.
- Mutina Modena, -nensis** modenesisch.
- mycelium** „Mycel“, d. i. Pilzfaser-gebe, zur Ernährung dienender Pilzunterteil (v. μύκης u. ελύω wickle etc.).
- Mycētes** Spr. Pilze (*μύκης, -τος*).
- myioïdes** fliegenartig (*uvia* Fliege).
- myōdes** (*μυώδης* v. *μῦς*, -*ούρη* Maus) mausähnlich.
- myrepsīcus** zum Balsamkochen dienend (*μυρεψικός*).
- myrrha** „Myrrhe“, Balsamharz (*μύρρα*).
- myrsinītes** myrtenblättrig.
- myrtilloides** heidelbeerartig (Myrtillus).
- mytilīnus** muschelförmig (Mytilus Miesmuschel).
- myūrus** Mäuseschwanz (*μῦς, -ούρης* u. *οὐρά*).
- Myxogasteres** Fr. Schleimbalgpilze.
- Myxomyētes** Wallr. Schleimpilze.
- Nagel** d. i. der schmale, stielförmige Unterteil eines Kronblatts.
- Nannētes** (Nannētes) Nantes an der Loire.
- Nanna** Zwergin u. Mutterschwester (*νάνη*).
- nanus** zwerghaft, ein Zwerg (*νάνος* od. *νάννος*).
- napaeus** (*ναπαῖος*) in Waldschluchten wachsend.
- napiformis** steck- od. kohlrüben-förmig (Napus, s. Nom.).
- napo-brassica** Steckrübenkohl.
- narbonensis** von Narbonne (Südfrankreich).
- narcotīcēs** narkotisch, betäubend giftig (v. *ναρκώω* lähme etc.).
- nascens**, -ntis wachsend (v. nascor entstehe etc.).
- Nassovia** Nassau.
- natans** schwimmend.
- naueinus** (naucus) gering, schlicht.
- nauseosus** brechen- od. ekelerregend (nausēa Übelkeit).
- navicula** (dem. *navis*) Schiffchen.
- nebrodensis** vom Nebrodigebirge (Sicilien).
- nebularis, -losus** nebelig, nebelgrau, düster, auch duftig.
- Necessaria** L (sc. Polygamia XIX, Kl. 3) „Notwendige“ (d. Randblütchen fruchtbar, daher notwendig).
- nectarium** Honiggefäß, -behälter.
- neglectus** vernachlässigt, übersehen.
- nematoïdes** (*νηματώδης*) fadenförmig.
- Nematophycēae** Ag. Fadenalgen.
- nemausensis** von Nîmes (Nemausus) in Südfrankreich.
- nemolapāthum** Waldampfer (*νέμος, -εος* Waldweide).
- nemophilus** Hain od. Wald liebend.
- nemoralis**, -rens, -rosus, -réus im Hain od. Wald wachsend (nemus, -öris).
- nemus, -öris** Hain, Wald.
- Nenuphar** nicht essbar (Nuphar, s. Nom.)
- neomarchīcēus** Neumärker, aus d. Neumark (*νέος* neu).
- neomexicanus** von Neumexiko.
- neomontanus** von Neuberg (Steiermark).
- nepalensis** von Nepal (Nepaul) am Himalaya.
- Nereīs** „Nereide“, Meernymphé, Meer- od. Seeflora.
- nervatio** Geäder, Berippung.
- nervus** „Nerv“, Ader, Rippe (eines Blatts).
- neubergensis** i. q. neomontanus Neuberger.
- nicaeensis** von Nizza (franz. Oberitalien).
- Nicer** (Nicrus), -cri Neckar.
- nidorosus** qualmig.
- Nidrosia** Drontheim (am Nidrfluss in Norwegen).
- nidūlans** nistend, wie ein Nest aussehend.
- nidūlus** (dem. *nidus*) Nestchen.
- nidus avis** Vogelnest.
- nigrescens** schwarz werdend, ins Schwarze ziehend.
- nigrīcans** schwärzlich.
- nilotīcēs** am Nil zu Hause.
- niskiensis** Neisser, *Niskia* Fluss Neisse.
- nisus** das Aufstreben, Emporwachsen.
- nitens** (v. *νιτέω*) glänzend, -*tidus* desgl.
- nitriensis** von Neutra (Nitria) in Ungarn.

nivalis in oder um Schnee wachsend (s. sogl.).

Niveau = Wasserhöhe, z. B. Niveau-Differenz, d. i. Höhenunterschied.

nivēus schneeweiss (nix, -ivis Schnee).

nixus i. q. nisus das Emporklimmen etc.

nobilis edel, vornehm etc.

noctiflorus nachts blühend.

nocturnus nächtlich.

nodiflorus knotenblütig.

nodosus knotig, **nodus** Knoten.

noli tangere Wolle nicht anrühren, „rühr' mich nicht an!“

nomenclatio (-tura) Namengebung, „Nomenklatur“.

nonscriptus unbeschrieben, unbezeichnet.

Noricum, jetzt Salzburg, Steiermark und Österreich.

Norimbergia Nürnberg.

normal = regelrecht (v. *norma* Norm, Richtschnur etc.).

norvegicus norwegisch.

nothus (*νοθός*) unecht, Bastard.

Notorrhizae DC. Rückenwurzler (d. Samen beim Aufgehen).

Noveboracum (Neoboracum) New-York, -boracensis New-Yorker.

Noviomagus Nymwegen.

novitiae, -arum Neugkeiten.

nubilus neblig, wollig, trüb, düster.

Nucamentaceae DC. Nüsschencräfer (s. sogl.).

nucamentacēus nussartig (nucamentum Nüsschötchen).

Nucellargewebeeines Eichens (Strasburger).

Nucellarhöker (Strasburger) einer Kernzelle.

nucistae (sc. olēum) Muskatnussöl.

nucleolus (dem. *nūclēus*) Kernkörperchen in d. Zelle, „Nüsschen“ in dem Zellkern.

nuclēus Samenkern, Zellkern.

Nuculiferae Endl. Nüsschenträger (Asperfolien).

nudicaulis nacktstengelig (nudus blos, nackt).

nudiflorus nacktblütig (ohne Laub am Stock).

numerous zahlreich.

numidēus numidisch (Numidien, j. Algerien).

nutans nickend, gebeugt.

Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

nutatio Neigungsbewegung¹⁾, die beim Wachsen sich äussernde während eines Tags nach oben od. unten (nicht seitwärts).

nux, -cis Nuss.

nyetitropismus Schlafbewegung d. Pfl.

nymphaeoides (-phoides) teich- od. seerosenähnlich.

obcordatus verkehrt herzförmig.

obdiplostēmon (Schwendener), „doppeladig“ (*διτλός* u. *στρυμων*).

obēsus geschwollen, feist, dickgefressen.

oblique, -quus schräg, schief, seitwärts.

oblongus länglich, **oblongum** längl. Rechteck.

obolus Münze, Pfennig, „Obol“.

obovatus verkehrt eiförmig.

obscurus dunkel.

obsolete (-tus) abgenutzt, gemein, veraltet, nicht mehr gebräuchlich.

obtusangulus stumpfleckig, -kantig.

obtusifolius stumpfblättrig.

obtusiseūlus etwas abgestumpft.

obtusus abgestumpft.

occidentalis abendländisch.

oeillatus mit Äuglein versehen.

ochotensis von Ochotsk, am ochotskischen Meerbusen zu Hause.

ochra Ocher, Ocker, -racēus ocker-gelb.

ochrēa (*ορέα*) Tute, häut. Gelenkscheide (z. B. des Knöterichs).

ochroleucus gelblichweiss, blassgelb.

Octandria L. Achtmännige (VIII. Kl.)

octoni, -nae etc. zu acht, je acht.

octopetalus achtkronblättrig.

odontalgicus Zahnschmerzstillend (*οδοῖς*, -όντος u. *ἄλγος* Schmerz).

odoratus wohlriechend, -ratissimus überaus w.

odōrus riechend, von Geruch (besond. in compor. z. B. citriodōrus).

oelandicus von d. Insel Oeland (Schweden).

Oeleanäle der Doldenfrüchte.

Oenipontanus Innsbrucker (*Oenus Inn.*).

1) S. Pfeffer, d. period. Bewegung d. Blattorgane, Lpz. 1875.

- officinalis** „offizinell“, in Apotheken gebräuchlich.
- oleifer**, -ēra etc. Ölgebend, -tragend (olēum).
- oleifolius** olivenblättrig (Olea Ölbaum, Olive).
- Oleracēae** Endl. Gemüsegew. (s. sogl.).
- oleraceus** als Gemüse benutzt (olus, -ēris).
- olidus** übelriechend.
- oligocarpus** wenigfrüchtig ($\delta\lambda\gammaος$ wenig etc.).
- olitorius** vom Küchengärtner (olitor) benutzt.
- ollarius** topfartig, -förmig (olla Topf).
- onomatologīa** Namenkunde ($\sigma\nu\mu\alpha$, - $\alpha\tauο\zeta$).
- onotīeus** mit Eselohren ($\sigma\nu\sigma$ u. $\omega\tauο\zeta$).
- oocarpus** eifrüchtig ($\omega\sigma$ Ei, $\chiαι$ -πόδι).
- oogonium** „Eibildungszelle“, Zelle m. Protoplasmaballen.
- oospōra** Dauerspore, d. i. durch ein Spermatozoid befruchtetes Ei des Oogoniums (s. eb.).
- opāeus** dunkel, schattig, glanzlos, unscheinbar.
- opericūlum** Deckel (v. operio bedecke).
- opīfer**, -ēra hülfreich, Hülse bringend.
- opipārus** herrlich, prächtig (ops, $\sigma\pi\sigma$ Kraft etc., pāro bereite).
- opponierte** gegenüber (z. B. dem Vorblatt).
- oppositifolius** mit gegenständigen od. entgegengestellten Blättern (s. sogl.).
- oppositus** entgegengestellt, gegenüberstehend.
- Optimum** (der Temperatur)=bester, geeignetster Grad.
- opulifolius** schneeballblättrig (Opūlus, s. Nom.).
- opuntius** opuntisch, von Opus, -untis, Stadt in Lokris.
- opusculūm** Werkchen (dem. opus).
- orbicularis**, -atus kreisrund.
- orbis** (sc. terrarum) Erdkreis, Erdenrund.
- orchidēns** orchisartig, wie Knabenkraut.
- oreādes** (z. B. Collybia or.) „Oreaden“, bergbewohnende Nymphen.
- orgyialis** eine Klafter messend ($\delta\gammaνια$).
- orientalis** morgenländisch.
- organifolius** dosten- od. majoranblättrig (Origānum, s. Nom.).
- orthocēras** geradhörnig ($\delta\vartheta\theta\zeta\zeta$, $\chiερο\zeta$).
- orthogonal**(z.B. Trajectionen, Sachs) rechtwinklige (Durchsetzungen).
- orthospermus** geradsamig (bei Dolden).
- orthospōrum** Geradsamen ($\sigma\nu\sigma\eta\zeta$ od. $\sigma\pi\sigma\eta\zeta$).
- osmotīeus** „osmotisch“, die Diösme betr. (s. d.).
- ossēus** knöchern, beinern, knochend. beinhart (os, -sis).
- ossificatus** verknöchert.
- osifragus** knochenbrechend, aber auch: bei Knochenbruch angewendet.
- ostreatus** wie eine Auster (ostrēa) geformt, zweischalig, aber auch rauh, hart.
- otia botanica** bot. Früchte der Musse (otium).
- ovalis**, -atus „oval“, eirund.
- ovarium** Eierstock.
- ovīnus** das Schaf betr. (ovis).
- ovirensis** von den Ovir- (Obir-) Alpen in Kärnthen.
- ovīlum** (dem. ovum) Eichen, Eilein, Samenei.
- owariensis** von Oware (Westafrika).
- oxonia** (-niūm) Oxford.
- oxyacanthus** weissdornartig (Oxyacantha, s. Nom.).
- Oxygen** (fr. oxygène) Sauerstoff ($\delta\xi\eta\zeta$ u. $\gamma\acute{e}r\omega$ erzeuge).
- oxyglottis** spitzzungig ($\gamma\lambda\omega\tau\tau\alpha$ i. q. $\gamma\lambda\omega\sigma\sigma\alpha$).
- oxyptērus** spitzflügig ($\pi\tau\epsilon\sigma\sigma\tau$).
- pabūlum** Futter, Nahrung.
- pacificus** friedlich, vom stillen Ozean.
- Padus** Fluss Po.
- pagānus** ländlich, baurisch, auch heidnisch (pāgus Dorf).
- pagina** Seite im Buch.
- pagus** Dorf, Gau.
- palaeontologīa** Petrefaktenkunde ($\pi\alpha\lambda\alpha\zeta\zeta$ alt, $\sigma\nu\sigma$, $\sigma\nu\tauο\zeta$ Wesen).
- palaria** (sc. radix) Pfahlwurzel (pālus, -i).
- Palatinatus** die Pfalz, **P. electoralis** d. Churpfalz.

palatinus Pfälzer, aus d. Rheinpfalz, palatinisch.
palatum Gaumen, den Mundeingang versperrender Wulst.
paleacēus spelz- od. spreuartig, (palēa Spreublatt).
palēae Klappen der Grasblüten.
pallens bleich, **pallescens** bleichwerdend.
pallidus blass, bleich.
pallitolatus m. Kopfhülle vers. (palliolum).
Pallisadengewebe (richt. Palissaden-) der Blätter (Godlewski) (v. fr. palissade, lat. pálus, Pfahlwerk).
Palmaeæ Bartl. Palmen.
palmaris handgross (v. palma flache Hand).
palmatifidus handspaltig, handfingigerig.
palmutus handförmig, palmblättrig (s. v.).
palmenis von Palma (auf Majorka).
paludosus, -istris sumpfig, in Sumpf wachsend.
panacée (fr.) = Universalmittel (πανάκης Alles heilend).
panaché (fr.) „panachierte“ d. i. buntstreifig.
pandriformis mandolinenförmig (παρδοῦχα dreisaitiges Instrument).
panicā Rispe, **panicēns** rispig.
panicula (dem. panicā) Rispchen, Rispe, **-culatus** in Rispen blühend.
Pannonia, „Pannonien“ od. Ungarn, **-nius** ungarisch.
pannosus zerlumpt, lumpig (pannus Tuch etc.).
panoruitānus von Palermo (Panormus).
pantherinus pantherfleckig.
pantothrix ganz haarspaltig — nämlich alle Blätter.
Papia Pavia.
Papilionacēae L. Schmetterlingsblütige.
papilla Brustwarze, **-atus, -osus** warzig.
papposus m. Haar- od. Federkrone (Pappus) versehen.
pappus Haar- od. Federkrone (z. B. auf d. Samen d. Compositen).
papyracēus papiertartig.
papyriser, -era papiergebend.
papyrinus papiertartig.
par, -es, -ia gleich u. ein Paar.

Parabel = Kegelschnittcurve parallel der Seitenhöhe.
paracorolla Nebenkrone (innerh. der Hauptkrone).
paradisiacus im Paradies wachsend.
paradoxus sonderbar, gegen die Regel.
paramgramma ähnliche Wortbildung, auch Wortfälschung, Seitenstück zu einem Wort.
Parameter (Mathem.) = parallel der Directrix od. Richtlinie in d. Brennpunkt einer Parabel die Achse senkrecht schneidende Linie.
paraphysis Zell- od. Saftfaden zwischen den Sporenschlüuchen der Pilze (v. φύσις Blase).
parasitēus „parasitisch“, schmarotzend d. i. mitspeisend.
parasitus „Parasit“ d. i. Schmarotzer (παράσιτος Mitesser).
parastēmon Nebenfaden (στήμων lat. stamen, Staubfaden).
parastīchon Schrägzeile (bei d. Blattstellung).
parenchyma, „Parenchym“, Würfzellgewebe (παρεγγά, ἐν u. χυμός „Chymus“, s. d.).
parenthēsis Einschaltung s. g., Parenthese (γέσις d. Setzen etc.).
parergon (παρεργόν) Nebenwerk, Anhang.
parietalis, -tinus an Wänden od. Mauern wachsend (paries, -ētis).
Parietales Endl. Wandfrüchtige.
parularius wie ein kleiner Schild (dem. parma).
paronýmus nach einem andern Wort ähnlich gebildet (παρώνυμος).
Parthenogenese (parthenogenesis od. -gennēsis) jungfräuliche Zeugung, d. i. ohne vorausg. Befruchtung (παρθένος Jungfr. u. γένεσις od. γέννησις Erzeugung).
partialis teilweise, zum Teil, „partial“.
partitus geteilt (v. partio teile).
parviflorus kleinblütig, **-folius** -blättrig.
pashalis zur Zeit des Paschafestes (Ostern).
paseua, -orum Weide, Weideplatz.
paseūus auf Weiden, zur Weide dienlich.
Passavia (i. q. Bojodurum) Passau.

- passim** zerstreut, überallhin verbreitet.
- Patavia** Padua u. Passau(Patavium).
- Patavina** (sc. Provincia) d. paduanische Gebiet.
- patens** offenstehend, ausgebreitet.
- pateriformis** (bess. -riformis) schalen- od. schüsselförmig.
- pathología** „Pathologie“ d. i. Krankheitslehre ($\tauάθος$ Leiden etc.).
- Patientia** (sc. Rumex) „Geduldskraut“, s. g. englischer Spinat.
- patulus** offen, offenstehend, ausgebreitet.
- pauciflorus** wenigblumig, -blühend.
- paucistaminēus** m. wenigen Staubgefäßen.
- Pazowa** Passau (vgl. Passavia u. Patavia).
- pebrina** „Pebrine“ d. i. Bakterienkrankheit der Seidenraupe.
- pecten**, -inis Kamm, -tinatus kammförmig.
- pectosis**, „Pectose“, Pflanzengallert, -gelée ($\piγτος$ geronnen).
- pedalis** einen Fuss messend (pes, -ēdis).
- pedatus** mit Fuss versehen, gestielt.
- Pedemontium** Piemont, -montanus piemontesisch.
- pediades** flach, eben ($\piεδιας$, -άδος Fuss-, $\piεδίον$ Feld etc.).
- pedica** Schlinge.
- pedicellus** Stielchen, Blütenstiellatus mit Blütenstiellatus versehen.
- pediculus** Füsschen (dem. pes, -dis) auch: Laus — wegen d. Form!.
- pediformis** fußförmig.
- pedunculus** Blütenstiellaris, -latus mit solchem versehen.
- pelisserianus** pelisserianisch, von Pelisseri.
- pelicula** Häutchen, Fellchen (dem. pellis).
- pellitus** m. Pelz bekleidet (pellis Fell etc.).
- pellucidus** durchscheinend (per u. lucidus).
- peloria** das Regelmässigwerden sonst unregelm. Blumen ($\piέλωρ$, -ος Ungeheuer etc.).
- peltatus** schildförmig (pelta, $\piέλτη$ kleiner, leichter Schild).
- peltiger**, -era Schildträger, -führer.
- pelviformis** schüssel- od. beckenförmig (pelvis).
- pendens** (v. pendo) hängend.
- pendulinus** pendelartig, -dulus herabhangend, Hänge- (z. B. Esche).
- penicillatus** (v. penicillum) pinsel- peninsula Halbinsel. [förmig.
- penitior** eingehender.
- pennatifidus** fiederspaltig (s. sogl.).
- pennatus** gefiedert (v. penna Feder).
- pennatulus** etwas od. nahezu gefiedert.
- pentacrinus** fünflilienartig ($\piέντα$ u. $\zetaούρον$, in der Zoologie Pentacrinus).
- pentactinus** fünfstrahlig ($\acute{α}ξτιν$ Strahl).
- pentacyclius** in fünf Kreisen bestehend ($\chiικλος$).
- pentalobus** fünflappig ($\lambdaοβός$).
- pentamerus** fünfteilig ($\muέρος$ Stück etc.).
- Pentandria** L. Fünfmännige (V.Kl.).
- pentandrus** fünfmännig ($\acute{α}νηρ$, -ρδος Mann, in d. Bot. Staubgefäß).
- pentapetalus** fünf kronblättrig ($\piέταιον$ lat. petalum).
- pentaphyllus** fünflaubblättrig ($\varphiύλλον$ Laubblatt).
- peperitis** od. -tus pfefferartig (s. piperitis).
- peploides** wolfsmilchähnlich (Peplos, s. Nom.).
- pepo**, -onis Pfebe, Melone, Kürbis od. Gurke.
- Peponiferae** Endl. Kürbisfrüchtige, Pfebenträger.
- peponium** Kürbisfrucht (s. eb.).
- Pepsin** = Verdauungs- Erregstoff d. Magens ($\piέψις$ u. $\piέπτω$ kochen etc.).
- peregrinus** fremd, ausländisch, eingewandert.
- perennis** „perennierend“, ausdauernd (per u. annus Jahr).
- perfoliatus** m. (vom Stiel) durchwachsenen Blättern.
- perforatio** Durchbohrung (z. B. der Holzgefässe).
- perforatus** durchbohrt, -stochen.
- pergamēnus** „pergamenisch“, v. Pergamum in Kleinasien.
- perianthium** eig. „Blütenhülle“ ($\piεροι$ herum, $\acute{α}νθος$) Überbleibsel der v. Moossporen durchbrochenen Archegonien, ähnl. einem häutigen Kelch!

periblema Aussenrinde, -hülle (d. Rinde) ($\beta\lambda\eta\mu\alpha$ v. $\beta\delta\lambda\lambda\omega$ werfe).
pericarpium „Perikarp“, Fruchthülle, -gehäuse ($\chiαρτος$).
perichaetium Haarhülle um die Archegonien der Moose ($\chiατη$ langes Haar).
perikline Wandrichtung (Sachs) = in ähnl. Sinn, wie die Oberfläche, gekrümmmt.
perifelinium Hüllkelch der Compositen ($\chi\lambda\lambda\eta$ Lager, Bett).
periderma äussere Hautschicht der Borke od. Rinde.
periödolum unhäutetes Staubkügelchen d. Pilze (s. sogl.).
peridium Sporenhülle der Flechten u. Pilze.
perigonium „Perigon“, Blütenhülle.
Perigynia Juss. Umweibige, d. Stempel umständig (nicht oberod. unter-).
perigynus (sc. flos) m. um den Stempel herum gestellten Blütenstilen.
periodicitas „Periodizität“, d. Wiederkehren in Perioden.
Peripetalia Juss. Umkronblättrige.
periphericus „peripherisch“, am Umfang befindlich.
perispermium „das Perisperm“ od. Zellgewebe um den Eikern herum, äuss. Sameneiweiss.
Peristaminia Juss. m. umständig. Staubfäden.
peristonium „Peristom“, Mundbesatz d. Moosfrüchte ($\sigma\tau\omega\mu\alpha$ Mund).
peritheciun flaschenförm. Fruchtbehler d. Pilze ($\tau\epsilon\sigma\iota\theta\eta\zeta$ Mütze u. dgl.).
perlatus mit Perlen (perla) besetzt, per-latus sehr weit od. breit.
permicus „permisch“, v. d. Stadt Perm am Ural.
permollis sehr weich (per- in comp. sehr).
peronatus gestiefelt (pero, -onis Stiefel).
perpensus genau erwogen (v. perpendo betrachte), auch i. q. suspensus aufgehängt.
perpetius immerwährend.
perpusillus sehr klein, winzig (s. vorh.).

persicarius pfirsichartig (persica Pfirsich).
persicifolius pfirsichblättrig.
persistens festsitzend, stehenbleibend.
personatus (sc. flos) maskenförmig, m. geschloss. Gaumen etc. (persona Maske).
Personatae Endl. Maskenblumige.
pertusus durchstossen, -bohrt, -brochen.
perulae Knospenschuppen, eig. Säckchen (dem. pēra Sack).
pervius durchbohrt, offen, durchzupassieren.
Petalanthae Endl. Kronblütige, Primelblütige.
petaloides kronblattähnlich.
petalum ($\iota\epsilon\tau\alpha\lambda\omega$) Kron- od. Blumenblatt.
petiginosus räudig, flechtig, **petigo**, -inis Räude.
petiolatus m. Blattstiell. vers. (petiolus Blattstiell. [tiolus]).
petraeus auf Felsen wachsend ($\tau\epsilon\tau\alpha\iota\zeta$).

petrefactus versteinert, in Stein verwandelt ($\iota\epsilon\tau\alpha\omega$ u. facio).
Petropolis St. Petersburg, -politänus Petersburger.
petricosus u. **petrosus** felsig, steinig.
penceadanifolius haarstrangblättrig.
phaea Linse, Linsenfrucht, -gericht.
phacorrhizus linsenwurzlig, m. Linsenknoten an d. Wurzeln.
phaenogamus deutlich od. sichtbar blühend.
phänologisch = die Erscheinungs- od. Blütezeit betr. (v. $\varphi\alpha\tau\omega\mu\alpha$ erscheine).
Phänologie = Blütenerscheinungskunde.
phaeus (gr. $\varphi\alpha\iota\zeta$) rot- od. schwarzbraun.
phagedanicus ($\varphi\alpha\gamma\delta\alpha\pi\iota\zeta\omega\zeta$) krebsartig um sich greifend.
phalangifer (v. phalangium Weberknecht) W. tragend.
phalaroides glanzgrasähnlich (Phalaris s. Nomi.).
phaleratus m. Kopf- od. Brustschmuck geziert (phalerae, gr. $\varphi\alpha\lambda\alpha\mu\alpha$).
phanerantherus m. deutlichen Antheren ($\varphi\alpha\tau\omega\varrho\zeta$ sichtbar etc.).
Phanerogamiae, L., Phanerogamen“ d. i. deutlich blühende Pfl.

- pharmaceutes** (φαρμακευτής) Arzneibereiter, „Pharmazeut“.
- pharmacognosia** Arzneiwaarenkunde (φάρμακον u. γνώσις Kenntnis etc.).
- Phasen** = Erscheinungsformen (z. B. Mondphasen) (γύσις v. γαι-ρω etc.).
- phellēma** „Phellem“ d. i. Korkschicht (γελλός Kork).
- pheloderma** (Sano) Korkrindenschicht, „Korkhaut“.
- phellogēnon** (-um) „Phellogen“, Korkstoff (γέρω erzeuge).
- Phelloïdschicht** = korkartige, nicht eig. Korkschicht.
- Phellos** (φελλός) Korkeiche (s. Nom.).
- philaea** erdliebende (φιλῶ u. αῖα Erde).
- philonotis** nassliebend, gern an feuchten Orten (ροτίς d. Nass, die Nässe).
- phlebophōrus** Adern tragend, aderig (γλέψ, -βος, lat. vena u. φορος).
- phleoides** lieschgrasähnlich (Phleum, s. Nom.).
- phloëma** „Phloëm“, Bast- od. Rindenstoff, Bastteil des Cambiums od. Gefäßbündels (v. φλοίς Borke, Rinde, Bast).
- phlomoides** dochtkraut-, wollkrautähnlich (γλομίς od. -μος Woll- od. Kerzenkraut).
- phoenicēus** purpurrot (gr. φοινίζεος).
- phoenicīens** (od. -ius) phoenizisch (φοινίζεος).
- phrygius** phrygisch, aus Phrygien (in Kleinasien).
- Phycēa** Wallr. Algen od. Tange.
- phycochroma** „Phycochrom“, d. i. Farbstoff der Algen od. Tange.
- phyceología** Tang- od. Algenkunde (φύζος lat. fucus Tang).
- Phycomyctes** de By Algenpilze (Pilzalgen).
- phylicifolius** heidenmyrtenblättrig, immergrün-blättrig.
- phylloblastae** Rehb. Blattkeimer (= Dikotylen).
- phylocladum** Blattzweig, blattgleicher Zweig (χλαδὸς Ast etc.).
- phyllodium** Blattstiellblatt, d. i. ein blattartig erweiterter Blattstiell (γυλλώδης).
- phyllōma** Laubgewebe, Blattgebilde (z.B. Phyllostacheln, Delbrouck, Blütenphyllome, Schwendener).
- phyllomania** Laubsucht (μανία „Manie“, Sucht).
- phyllophilus** Lauffreund.
- phyllotaxis** Blattstellung,-ordnung.
- phyllum** (in compos.) Laubblatt (γύλλον).
- phylogenetīens** Gattungs-od. Zunftsbildung betr. (γυλῆ od. γῦλον Stamm etc.).
- physiologīa** „Physiologie“, Naturlehre (v. γύσις, -ιος Natur, λόγιος kundig).
- physiotypīa** Gestaltungslehre der Natur (τυπή, „Type“, Schlag etc.).
- phytanthozōa** Blumentiere (γυτόν, Pflanze, ἄρθρος, ζῶον).
- phytobasānos** Pflanzenuntersuchung (βασάνος Probe).
- phytología** Pflanzenkunde (γυτόν, λόγος kundig od. λόγος Kunde).
- phytozoa** Pflanzentiere (ζῶον Tier).
- picacēus** Elster od. auch Specht betr. (pica Elster, picus Specht).
- picēus** Pech od. Teer liefernd (pix, -īcis Pech, Teer), pechschwarz.
- picifērus** pechtragend.
- pierēus** bitter (v. πικρός).
- pierīdis** des Bitterkrauts (Gen. v. Pieris, s. Nom.).
- Pietavīs** Poitiers.
- pictus** bemalt, farbenstreifig od. -fleckig.
- pileatus** (v. pilēus) mit Hut versehen.
- piliſer** (v. pilus) Haare tragend.
- pili stigmātis** Narbenhaare.
- piloselloides** mäuseohrähnlich (Pilosella, s. Nom.).
- pilosinseūlus** etwas behaart (s. sogl.).
- pilosus** behaart, haarig (v. pilus).
- pilūla** (dem. pila Ball) Pille.
- pilaris** Pillen betr. (s. eb.).
- pilulifer** Pillen tragend (s. v.).
- pilus** Haar (gr. πῖλος).
- pimpinellifolius** pimpinellblättrig.
- pinastrum** (deter. v. pinus) Tanne, Fichte.
- pinētum** (collect. v. pinus) Tannenschlag, -wald.
- pinēus** tanne, an od. auf Tannen wachsend.
- pinicōla** Tannen od. Fichten bewohnend, an od. unter Tannen.
- pinna** Feder, -natus gefiedert.

- pinnatifidus** fiederspaltig.
piperatus gepfeffert, nach Pfeffer schmeckend.
piperitis (-itus) pfefferartig ($\pi\varepsilon\tau\varrho\sigma\tau\eta\varsigma$).
pisiferus erbsentragend.
pisiformis erbsenförmig (pisum).
piscarpus erbsenfrüchtig ($\pi\iota\sigma\sigma\varsigma$ u. $\chi\alpha\varphi\tau\sigma\varsigma$).
pistillaris pistill- od. keulenförmig.
pistillum „Pistill“, Stempel, Mörserkeule.
pityreus kleienartig, schorfig ($\pi\iota\tau\upsilon\varrho\sigma\tau$).
placenta Samenleiste (i. q. spermophorum).
Placentia Piacenza (am Po).
placide (-dus) sanft, gefällig, allmählich, nach u. nach.
plaga Gegend, Distrikt.
planctus breitfüssig.
planiculmis platthalmig, flach- od. plattstenglig.
planiglumis flachspelzig.
planisiliquus flach- od. plattschotig.
planioculus ziemlich platt od. flach.
planta Pflanze, Fusssohle.
plantagineus wegerichartig (Plantago, s. Nom.).
plantatio Pflanzung, „Plantage“.
planus platt, flach, eben.
plasma Bildungs- od. Zellenurstoff ($\pi\lambda\alpha\sigma\mu\alpha$, -tos).
Plasmamembran od. -Haut, Abgrenzung gegen den Zellstoff (Pfeffer).
plasmodium = bewegl. Plasmasmasse (b. Schleimpilzen, z. B. Lohblüte).
plasmolytischer Zustand, d. i. wenn sich das Plasma von der Zellwand zurückgezogen.
plataniolius platanenblättrig.
platanoides platanenähnlich.
platantherus m. breiten Staubbeuteln vers.
platensis vom La Plata-Strom.
platte — d. breite Teil eines Cruciferen-Kraublatts.
platyacanthus breitdornig ($\pi\lambda\alpha\tau\bar{\nu}\delta$ breit, $\alpha\bar{z}a\tau\vartheta\mu$ Dorn).
platycarpus breitfrüchtig, -phyllus breitblättr., -spermus breitsamig.
platystigma Breitnarbe.
plenus (sc. flos) voll, gefüllt.
pleroma „Plerom“, d. i. Centralcylinder d. Wurzel.
- pleurantheae** Seitenblütige (Gräser) ($\pi\lambda\epsilon\nu\varrho\alpha$ Seite).
pleurocarpi (sc. musci) Seitenfrüchtige (Moose).
Pleurorrhizae (sc. Cruciferae) DC. seitenzwergende (d. Samen beim Aufgehen).
plexipes flechtfüßig, -stielig (v. plecto, -xus).
plica Falte, -catus gefaltet.
plicatilis faltig. [artig].
plumarius, -mosus federig, federplumbens bleiern, bleifarbig.
plumula Flaum- od. Blattfederchen d. Samenkeims.
pluvialis Regen betr., **pluvius** desgl.
podagrarius Podagra od. Fussgicht heilend.
podetium Fussgestell, Stiel d. Pilzapotheien.
podium das die Gabeläste tragende Stengelstück.
-podium (in compos.) Fuss, Stiel ($\pi\delta\delta\sigma\sigma\tau$).
podolicus podolisch, aus Podolien (Südrussland).
polifolius poleiblättrig.
poliotrichus grauhaarig ($\pi\omega\lambda\iota\sigma\varsigma$ u. $\vartheta\omega\varsigma$, $\tau\omega\gamma\varsigma\varsigma$).
politus „poliert“, verfeinert, fein.
polius ($\pi\omega\lambda\iota\sigma\varsigma$) grau.
pollen, -inis Samen- od. Blütenstaub, „Pollen“.
pollicaris daunendick (v. pollex, -icis).
pollinarium Pollenmasse, -inium desgl. bei Orchideen.
Pollyeria (sc. Pirus) Bollweiler (Kreis Gebweiler in Ober-Elsass).
polonicus polnisch, aus Polen.
Polyadelphia L. Vielbrüderige (XVIII. Kl.).
polyanthemos (-us) vielblütig, -blumig ($\pi\omega\lambda\iota\varsigma$ u. $\alpha\pi\theta\epsilon\mu\sigma\varsigma$).
Polycarpae Endl. Vielfrüchtler.
polycarpus viel- od. mehrfrüchtig (z. B. gynaeceum).
polycladia Vielverästelung, Astwucherung ($\pi\lambda\alpha\delta\delta\varsigma$ Ast, Zweig).
polyclonos vielzweigig ($\pi\lambda\omega\varsigma$, $-w\omega\varsigma\varsigma$ Trieb etc.).
polydactylos, -on (-us, -um) vielfingerig.
Polyedrisches Parenchym = aus vielfäch. Zellen bestehendes, polyedrische Areolen (Sachs) = Polyederflächlein; Polyeder (Mathem.).

- = Vielfächer, d. i. Körper mit vielen Flächen (*έδοσα* Sitz etc.).
- Polygamia** L. Vielehige (XXIII. Kl.) u. Syngenes. „Vielblütblumige“.
- polygonalis** „polygonal“ d. i. viereckig, -kantig.
- polygrammus** vielstreifig, vielmals gestrichelt (*γράμμα* Strich etc.).
- polygynus** vielweibig, -griffig etc. (*γυνή* Weib, Bot. Stempel).
- polymérus** aus mehreren Stücken bestehend (*μέρος* Stück, Teil etc.).
- polymorphus** vielgestaltig (*μορφή* Gestalt etc.).
- Polypetala** Juss. Vielkronblättrige (*πεταλού*).
- polyphyllus** vielblättrig, dicht belaubt (*γύλλον* Laubblatt).
- polyrrhízus** vielwurzelig (*ρίζα* Wurzel).
- polyspermus** vielsamig (*στέρωμα*);
- polystachyos**. (-us) vielährig (*στάχυς*, -*νος* Ähre).
- Pomacées** Rehb. Apfelfruchtler.
- Pomariae** Lindl. ebenso.
- pomarium** Obstgarten.
- Pomerano-Rugius** pommerisch-rügener (Rugia Insel Rügen).
- pomeridianus** (st. postmer.-) nachmittägig.
- pomifer**, -éra apfelobsttragend (pommum).
- Pomōna** Göttin des Obstes.
- Pomponius** (-ianus) pomponisch (röm. Familie), aber auch prunkend (fr. pompon Zierrat).
- pomum** (fr. pomme) Apfel, **poma aurantiorum** Pomeranzen.
- ponticus** pontisch, von Pontus am schwarzen Meer.
- popinalis** im Küchen gebraucht (popina).
- populinus** an Pappeln wachsend (Populus, s. Nom.).
- populinēus** die Pappel betr.
- porcinus** Schweine betr. (porcus, -i).
- porosus** „porös“, voller Poren od. Löcher.
- porphyrius** porphyr- od. purpurfarbig.
- orrectus** ausgestreckt (v. porrīgo Strecke aus etc.).
- porréus** lauchartig (Porrum, s. Nom.).
- porrifolius** lauchblättrig (s. eb.).
- portentosus** abenteuerlich (portentum Wunder etc.).
- portulacoides** portulakähnlich (Portulaca, s. Nom.).
- porus** (*πόρος*) Durchgang, „Pore“.
- posoniensis** Posener, aus Posen (Posonia).
- posthūmus** nach dem Tod herausgegeben od. zur Welt gekommen.
- postice** (-us) hinten, hinterer.
- Potamīcae** Juss. Fluss- od. Laichkräuter.
- praecultus** sehr hoch.
- praecipue** besonders, vornehmlich.
- praecox** frühzeitig, vor der Zeit.
- praefloratio** Blütenknospen-Anlage.
- praefoliatio** Blattknospen-Anlage, Knospenblatt-Deckung.
- praelongus** langgestreckt.
- praemorsus** vorn abgebissen (v. mordeo beisse).
- praesertim** zumal, besonders.
- praestans**, -**tissimus** vorzüglich, vorzüglichster.
- prasinus** (*πράσινος*) lauchgrün (Prasum in comp. Lauch).
- prāsum** in compos. Lauch (*πράσον*).
- pratensis**, -**torum** auf Wiesen wachs. (pratum).
- precatorius** zum Beten dienend (zu Rosenkranzperlen gebr.).
- prehensilis** anfassend, sich windend.
- prehantoides** hasenkohlähnlich (Prenanthes, s. Nom.).
- Primanblüten** (z. B. Amaryllideen) hintenumläufige Erstlingsblüten (Schwendener).
- primarius** „primär“, Erstling, auch vornehm.
- primitiae**, -arum Erstlingsarbeiten, Anfänge.
- primordialis** (sc. utriculus) Primordialschlauch, erste innere Zellschicht, erstanfänglicher.
- Principes** Endl. Edelbäume (Palmen).
- prismatiens** „prismatisch“, säulen-, ecksäulenförmig (z. B. Gefässe od. Zellen).
- proboscidēus** rüsselartig (*προβοσκίς*, -*θος* Rüssel).
- procambium** Zellschicht, aus der d. Gefäßbündel hervorgehen.
- procērus** von hohem Wuchs, vornehm.
- procumbens** niederliegend.

- procurrens** hinlaufend, sich erstreckend.
- prodigiosus** wunderbar, **prodigium** Wunder.
- prodromus** Vorläufer, Vorrede, Einleitung.
- productus** vor- od. in die Länge gezogen, auch „produziert“ od. hervorgebracht, z. B. „Produkt“.
- proles**, -is Brut, Nachkommenschaft, Sprössling.
- prolifer**, -era sprösslingtragend (s. eb.).
- prolificatio** Sprossung, d. Hervorbringen v. Sprösslingen.
- prolusio** Vorspiel, Einleitung.
- prominens** vorragend, hervorstehend.
- promptuarium** Speisekammer (v. promo hole herbei).
- promulgatus** „promulgiert“, bekannt gemacht etc.
- promyeelium** Keimschlauch, Sporidie, aus welcher das eig. Mycel des Ährenbrands hervorgeht.
- propago**, -inis Ableger, Spross.
- propagulum** kleiner Ableger od. Spross (s. eb.).
- prope** nahe bei.
- propinquus** nahe, verwandt.
- propontius** vom Marmarameer (Propontis).
- prosenchyma**, „Prosenchym“, Faser- od. Streckzellel. Gewebe.
- prosenthesis** Zusatz bei wiederholter Blattstellung.
- prostratus** niedergestreckt, dahinkriechend.
- Proteinkörner** od. Klebermehl (v. dem formwechselnden Gott Proteus abgeleitet).
- protandrae** Pfl. m. vorherreifenden Staubbeuteln (zur Verhütung der Selbstbestäubung, z. B. bei Campanula Medium).
- prothallium**, -illus Vorkeim (i. q. pro-embryo) aus den Farnsporen.
- protogaeus** vorweltlich (*πρώτος* erster, *γαύη* Erde).
- protogenitus** zuerst erzeugt, Urerzeugter (s. eb. u. genitus v. gigno).
- protogynae** (sc. plantae) m. vorherreifenden Stempeln zur Verhütung d. Selbstbefrucht. (z. B. bei Magnolien u. Aristolochia).
- protoëma** Vorkeim beim Generationswechsel d. Moose (*νήμα* Faden).
- Protophyta** Endl. Urpflanzen (*πρώτος*, *φυτόν*).
- protoplasmă** Zellengrund- od. Ursprungsstoff (s. plasma).
- prototypus** von erster od. ursprüngl. Bildung (*πρωτότυπος*).
- proventitius** vorhergehend, -titiae gemmae Proventivknospen (d. i. nicht entwickl. Anfangs-).
- provincialis** „provencer“, aus der Provence.
- pruina** Reif, Duft, -nosus bereift, duftig.
- prunulum** (dem. prunum) Pfläumchen.
- pruriens** juckend, Jucken erregend.
- pruthenicus** (-tenicus) preussisch.
- psamma** (*ψάμμα*) Sand, Mulf.
- Pseudo-** od. Pseud- in compos. falsch, trügerisch (*ψεῦδος* Lug, Trug).
- psilocarpus** nackt- od. kahlfrüchtig (ohne Pappus) (*ψιλὸς* kahl etc.).
- psilophyllus** kahl- od. nacktblättrig.
- psittacinus** papageigrün, -farbig (*Ψιττάκειος*).
- psoralenus** krätzig, schäbig (*ψωραλέος*).
- psylophorus** flohtragend (*ψύλλα* od. -λος Floh).
- ptarmiens** Niesen (*πταιρίδος*) erregend.
- pteridographia** Farnkunde, -eius dazu gehörig (*πτερογράφησις*, *-ίδος* u. *γράφω* beschreibe).
- ptéris** in compos. Farn, eig. Flügel od. Wedel (f. *πτεροφύτη*).
- pterocarpus** flügelfrüchtig, Flügelfrucht.
- puber** (od. -es), -ēris mannbar, erwachsen.
- pubes**, -is Flaum, Behaarung, eig. Mannbarkeit.
- pubescens** weich- od. flaumhaarig.
- pubescencia** „Pubescenz“, weiche Behaarung.
- pudicus** verschämt.
- pudorinus** verschämt, schamrötlich.
- pugillaris**, -iūm Schreibtäfelchen.
- pugillus** Heft.
- pulchellus** (-cellus) schön (dem. pulcher).
- pulicaris**, -rius Flöhe betr. (pulex, -īcis).

- pullus** dunkel- od. schwarzbraun.
pulpa Fruchtbrei.
pulveracēus staubig, pulverig.
pulinatus polster- od. kissenartig (v. *pulinus*).
pumilus niedrig, niedlich, klein.
punctatus punktiert, gedüpfelt.
pungens stechend (*pungo*, pūpūgi, *punctum*, 3.).
punicēus granatrot (v. *Punica* Granatbaum).
punicus punisch, phönizisch, carthagisch.
pustula „Pustel“, Bläschen, -atus m. Pusteln, pockig.
putāmen Stein d. Steinfrucht, Kernstein od. -Schale.
puteanus (-tanēus Kummer ?) in Gruben od. Brunnen vorkommend (*putēus*).
putridus angefaul, morsch.
Pyeniidae Tul., „Pykniiden“, Fruchtfarbenen mancher Pilze (v. *πυκνός* dick, dicht).
pyenocephalus dick- od.. dichtköpfig (s. eb. *ξεραλή*).
pygmaeus (*πυγμαῖος*) zwerg- od. „pygmäenhaft“.
pyramidalis pyramidenförmig.
pyrēna „Pyrene“, Steinfruchtkern, z.B. bei Rubiaceen (*πυρῆνη*, -īros).
pyrenaicus, -aicus pyrenäisch, von den Pyrenäen.
Pyrenomyctes Fr. Kernpilze (s. v.).
pyriodorus von Birngeruch (*pyrus* u. *odōrus*).
pyrogalus feuermilchig, m. feuer-gelber Milch (*πυρός*, -os u. *γάλα*).
pyrotechnicus „pyrotechnisch“, z. Feuerwerk gehörig.
pyxidaris, -arius büchsenartig (*πυξίς*, -ίδος).
pyxidatus mit Büchsen besetzt.

quadratus „quadratisch“, viereckig.
quadrialatus vierflüglig (quadri- in comp. u. alatus geflügelt).
quadriangularis, -atus viereckig, -kantig (angulus Eck, Winkel).
quadrifariam, -ius vierfach (adv. u. adj.).
quadrifidus vierspaltig.
quadrifolius vierblättrig.
quadrijugis (-us) vierjochig, -paarig.
quadrilocularis vierfächiger (loculus dem. locus).

quadriquēter, -tra vierschneidig.
quadrus viereckig, Viereck.
quatēnus wie weit, inwiefern, in Betracht dass.
quater viermal.
quaternellus, -ternus vierfältig.
querētum (collect. v. *quercus*) Eichenwald, -schlag.
querēns eichen, von Eichenholz.
querēfolius eichenblättrig.
querēnus die Eiche betr., zur Eiche gehörig.
querinus, -nēus wie eben.
quinatus zu fünf gestellt, fünffach.
quinduensis vom Berg Quindu (Neugranada).
quini, -ae zu fünf, je fünf.
quinología Quinoakunde (Quinoa, s. Nom.).
quinquecornis fünfhörnig.
quinquedentatus fünzfähnig.
quinquefidus fünfspaltig, -teilig.
quinquefolius füntblättrig.
quinquepartitus fünfteilig, in fünf Teile geteilt.
quinquevulnérus fünfnarbig (vulnus, -ēris Wunde).
Quirl (Wirtel verticillus) Astkreis um einen Stamm herum (z. B. Fichte).
quisqualis ungewiss was für (quis qualis? wer? was für einer?).
quisquillae Schmutz, Unrat, Auswurf.
quisquiliaris in od. auf Schmutz etc. wachsend.
quot wie viele.
quotannis jährlich, alljährlich.
quoties wie oft, wie vielmals.

rablensis aus dem Raiblthal in Kärnthen.
racemosus traubig, traubenartig (racēmus Tr.), gipfelsprossig mit innerem Hauptstamm.
racēnus Traube u. Traubenkamm.
radialis in Radien od. Strahlen gestellt, z. B. radiale Wände (Sachs) d. s. aus der Wachstumsachse rechtwinklig auf d. Oberfläche gestellte.
radians strahlend.
Radiatae Juss. Strahlcompositen.
radiatus gestrahlt, strahlblütig („Radiaten“ bei d. Compositen).

- radicalis** aus der Wurzel, die W. betr.
radicans wurzelnd, wurzelschla-
gend.
radicellae Nebenwurzeln (dem.
radix, -icis).
radicosus wurzelartig, wurzelreich.
radicula Würzelchen od. Schnäbel-
chen des Samenkeimes (aus dem
sich d. Wurzel bildet).
radius Strahl, z. B. Blütchen im
Umkreis der Compositen.
radix, -icis Wurzel.
radula Raspel.
raeborrhizus schweifwurzlig (*ὅπλος*
geschweift).
Rajolen (Rijolen) = Bodenarbeit
des Schichtwechsels.
ramalis ästig, -mealis auf Ästen
wachsend.
ramamentacēns schabselig, spänig
(ramamentum).
ramentum Ausschlagschuppe,
Schabsel, Späne.
ramus an Ästen befindlich.
ramiger, -era Äste führend, ge-
weihästig.
ramosus, -sissimus ästig, sehr
verästelt.
ramuli Ästchen, Zweige (dem.
ramus Ast).
ranae des Frosches, **ranarins** unter
Fröschen vorhanden.
rangiferīnns (st. ramiger ferinus)
Wild-Astmoos betr.
rapa Rübe, -cēns rübenförmig,
-artig.
raphe (*ὅργη*) Naht, mit dem Sa-
menstiel langwegs verwachsene
Samenhaut.
raphida (sc. crystalla) Nadelkry-
stalle, Nadeln (*ὅργις, -ίδος*).
rapum (i. q. rapa) Rübe.
rapunculoides rapunzelartig.
rarior, -issimus seltner, seltenster,
rarus „rar“ etc.
ratisbonensis Regensburger (Ratis-
bōna R.).
ratumagensis von Rouen (Ratumā-
gus od. Rotom.).
ravidus u. ravus graugelb.
receptaenlaris fruchtbodenständig.
receptaeūlum Fruchtboden.
receptio von aussen aufgenommene
od. „Receptions“ - Bewegung d.
Blätter (Pfeffer).
reciprōcus wiederkehrend, (Gram-
matik) rückbezüglich.
- recīsus** zurückgeschnitten (v. re-
scindo).
reclīnatus zurückgeneigt, nieder-
gebeugt.
recte richtig, **rectius** richtiger,
-tus gerade, aufrecht.
recurvatus (-vus) zurückgekrümmt,
krumm.
recutītus beschnitten (v. cutis Haut).
redīvīns wiederauflebend, -auf-
gelebt.
redōlens Geruch verbreitend.
reflexus zurückgebogen.
refulgens zurückstrahlend, wider-
scheinend.
regalis u. regillns königlich, präch-
tig.
Regina Regensburg.
Regiomontium Königsberg.
regius königlich.
regularis „regulär“, regelmässig.
relativ = im Verhältnis, verhält-
nismässig.
reliquiae Überbleibsel, Nachlass.
religiosus „religiös“, heilig.
Renu, -menses Rheims, Rheinser.
remotus entfernt, auseinander.
remontante fr. (z. B. Rose) wieder-
holt blühende.
renifolius nierenblättrig (rēn, -nis
Niere).
repandus geschweift, ausgeschweift.
repens u. reptans kriechend.
repertorium (fr. répertoire) Re-
gister, Liste, „Repertoire“.
Reservestoff, -nahrung = zur Er-
nährung in der Pfl. abgelagerter.
resinosus harzsaftführend (v. re-
sina Harz).
resorbieren = aufsaugen.
resorptio „Resorption“, Aufsau-
gung v. Flüss.
resupinatum (sc. folium) unterst
zu oberst gekehrt.
resupīnus zurückliegend, -geneigt,
verkehrt.
reticulatns netzförmig, -cēnum
Fischnetz (v. rēte, retis Netz).
retinaculum Halter (v. retineo).
retroflexus zurückgebogen.
retrorsum rückwärts.
retusus stumpf, abgestumpft.
revisio „Revision“, Durchsicht.
rhachis (*ὅργις, -εως* Rückgrat etc.)
Blatthauptrippe, Spindel eines
Fiederblatts.

- Raethia** „Rhätien“ (j. Tirol u. Graubündten).
- rhamnoides** kreuzdornähnlich (*Rhamnus*, s. Nom.).
- rhenanus** rheinisch, *Rhenus* Rhein.
- riphaeus** (*ριπαῖος*) od. *riphaeus* rhipäisch od. uralisch, von d. rhipäischen Gebirge (Ural).
- Rhizanthæa** Endl. Wurzelblütler.
- rhizinae** Hautfasern der Flechten.
- Rhizocarpæa** Batsch Wurzel-früchtler.
- rhizoides** wurzelähnlich, -artig, z. B. Rhizoïden = am Vorkern der Chara sich bildende Wurzelbärtchen.
- rhizoma** (*ῥιζώμα*) „Rhizom“, Wurzelstock.
- rhizomorphus** wurzelartig gebildet.
- rhizophorus** wurzeltragend.
- rhizotomicum** (*ῥιζοτομίζων*) Buch üb. Wurzelgräberei od. -Schnederei.
- rhodo-** in comp. Rosen- (*ῥόδον*).
- rhodopollum** (Gen. Pl.) der Rosenverkäufer (v. *ῥοδοπωλήσις*).
- rheadifolius** mohnblättrig (*Rhoeas*, -ädis, s. Nom.).
- rheoifolius** sumachblättrig (v. *Rhus*, -ois, s. Nom.).
- rhombēus** rhombisch, rautenförmig.
- rhomboidalis** rhomboidisch, langrautenförmig.
- rhytidospermus** runzelsamig (*ῥύτις*, -ιδος).
- rictus** Rachen, aufgesperrter Mund.
- Riesen** = Rippchen der Doldenfrüchte (juga).
- rigens** starr, steif (rigeo, -ere starren, steifsein).
- rigidulus** etwas starr od. steif (s. eb.).
- rigidus** starr, steif (s. v.).
- rigūs** bewässert.
- Rillen** (vallecūlae) zwischen d. Riefen d. Doldenfrüchte.
- rima** Ritze, Riss, -mosus rissig, voller Riten.
- rimosipes** rissfüssig, -stielig (s. eb.).
- ringens** mundaufsperrend, rachenförmig (v. *ringor*, 3.).
- ripaei montes** s. *riphaeus*.
- riparius** am Ufer wachsend (ripa).
- rivalis** an Bächen wachsend (rivus).
- riviniāmus** Rivini's (n. pr.).
- rivularis** an kleinen Bächen wachsend.
- rivulosus** rinnig, rissig, rinnselig (s. sogl.).
- rivulus** (dem. rivus) Bächlein, kleiner Bach.
- robertianus** Roberts od. Rupprechts.
- robiginosus** rostig, rostfarbig (robigo, -inis).
- robur**, -ōris Kraft, Steineiche.
- robustus** „robust“, stark, kräftig gebaut (s. eb.).
- Röhrenblüten** (flores tubulosi) bei Compositen (Disteln etc.).
- ros**, -ris Tau, Reif, Duft.
- rosacēus**, -sēus roseartig.
- roseat** betaut, bereift, beduftet.
- roseola** (dem. rosa) Röschen.
- Rosette** = Röschen, rosenförm. Rundverzierung.
- Rosiflora** Endl. Rosenblütige.
- Russia** Russland, — meridionalis Südrussland.
- rossiens** russisch.
- rosmarinifolius** rosmarinblättrig.
- rostellatus** m. einem Schnäbelchen versehen (s. sogl.).
- rostellum** (dem. v. rostrum) Schnäbelchen, Pollinientäschchen der Orchideen.
- rostratus** (v. rostrum) geschnäbelt.
- rosula** (dem. rosa) kleine Rosette, Blätterrosette etc.
- Rotation** = Drehung, Radbewegung.
- rotatus** radförmig (v. roto drehe um, rota Rad).
- rothianus** (rothigūs s. Rothii) nach Roth benannt.
- rothomagensis** (roto- u. rodomensis) von Rouen, vgl. ratumagensis.
- rotundatus** gerundet.
- rotundifolius** rundblättrig (rotundus rund).
- rubellus** (dem. ruber) rötlich.
- rubens** errötend, gerötet, rötlich, rot (v. rubeo).
- ruber**, -bra etc. rot, -berrimus grell rot.
- rubescens** errötend, gerötet (rubesco werde rot).
- rubicundus** rötlichgelb, hochgelb.
- rubifolius** brombeerblättrig (v. Rubus, s. Nom.).
- rubiformis** brombeerförmig, -warzig (Kummer).
- rubiginosus** i. q. robiginosus rostfarbig (rubigo, -inis).
- rubigo**, -inis Rost, Rostfarbe.

- rubioides** brombeerähnlich (Rubus, s. Nom.).
- ruberīca** Rötel, -catus mit Rötel bezeichnet, „rubriziert“.
- rubrifolius** rotblättrig (ruber, -bri).
- ruderālis** auf Schutt wachsend (rudus, -ēris).
- rudimentär** = nur erste, rohe Anfänge zeigend.
- rudimentum** „Rudiment“, erster (roher) Anfang (s. sogl.).
- rūdis, -e** roh.
- rufescens** rötlichwerdend, ins Rote spielend.
- rufidūlus** lichtrot, hell- od. hochrot.
- rufinervis** rotnervig, -aderig.
- rufilūs** (dem. rufus) fuchs- od. hellrot.
- ruga** Runzel, -gatus, -gosus gerunzelt, runzelig.
- Rugia** Insel Rügen.
- rugūla** Runzelchen, -gulosus etwas runzelig.
- rumelīcus** rumelisch, aus Rumelien (Türkei).
- runcīna** Hobel, Schrotsäge, -natus schrotsägenförmig.
- rupestris** auf Felsen wachsend.
- rupicōlus, -a** auf Felsen wohnend (rupes, -is).
- ralīalis** ländlich, bäuerisch, im Feld wachsend (rus, -ris).
- rusticānus, -icus** ländlich, bäuerisch.
- rutacēus** rautenartig, -blättrig (Ruta, s. Nom.).
- rutaefolius** (bess. -tifolius) rautenblättrig.
- ruthenīcus** ruthenisch, aus Rotrussland.
- rutiłus** rötlich, rotgelb.
- sabandūs** savoyer, aus Savoien.
- sabulosus** sandig, **sabūlum** Šand.
- saccatus** (v. saccus) sackförmig.
- saccharīnus** Zucker betr., **sacchārum** Zucker.
- saccharōsis** „Saccharose“, Rohrzucker.
- saccīfer, -era** sacktragend (nicht etwa zuckertragend, was saccharifer!)¹⁾
- saepiarius** an Zäunen wachsend (saepes, -is Zaun).
- sagittalis, -ariūs, -atus** pfeilartig, -förmig.
- sagittifolius** pfeilblättrig (sagitta).
- salicētum** (collect. v. salix, -icis) Weidengehölze.
- salicifolius** weidenblättrig (s. eb.).
- saliciūs** Weiden betr., unter solchen wachsend (s. v.).
- salīgnus** wie Weiden aussehend, auch von Weidenholz.
- salīnus** salzig, an od. bei Salinen wachsend.
- salisburgensis** Salzburger.
- salsus** salzig, scharf, beissend.
- salutaris** heilkräftig (salus, -ūtis Heil etc.).
- samāra** Flügelfrucht.
- sambucinus** hollunderartig riechend, -ähnlich (Sambucus, s. Nom.).
- sanguinālis, -nēus** blutrot (sanguis, -inis).
- sanies, -ei** Jauche, -niosus jauchig, flüssig.
- sapīdus** schmackhaft.
- spinēus** tannenartig (z. B. so riechend).
- saponacēus** seifig, seifenartig (sapo, -ōnis).
- saracenīcus** aus d. Lande der Saracenen (Morgenland).
- sarcocarpīum** Fruchtfleisch, -hülle ($\sigmaάρωξ$, - $\piος$ Fleisch, $\piαρωξ$ Frucht).
- sarcoides** fleischähnlich, -rot (s. eb., $\epsilonιδομαι$ gleiche).
- sardōus** ($\sigmaαρδωξ$) sardinisch, von d. Insel Sardinien.
- Sarmatia** Land der Sarmaten (j. Polen u. Russland).
- Sarmentačēae** Rchb. Zaukenlilien (sogl.).
- sarmentosus** rankentreibend, **sarmētum** Schössling, Ranke.
- sarnīcūs, -niensis** von Guernsey (e. normändische Insel).
- satīvus** gesät, gebaut, als Saat wachsend.
- saturate (-us)** gesättigt (von Farben).
- saxatilis** auf Felsen wachsend (saxus, -i).
- saxifrāgus** Felsen brechend od. zerbröckelnd (frango zerbreche).
- saxosus** felsig, steinig, voller Steine od. Felsen.
- scabellus** (dem. scaber) räudig, schäbig.

1) S. z. B. Jürgens, etymol. Fremdwörterbuch, 1878.

scaber, -bra etc. rauh, **-berrīmus** sehr rauh anzufühlen.
scabiosus schäbig, grindig (scabies, -ei Schorf etc.).
scabiuseculus etwas rauh (anzufühlen).
scalariformis leiterförmig (scalae, -arum Leiter).
scandens kletternd, klimmend (scando steige).
scandīcus skandinavisch, schwedisch.
Scania Schonen (Südschweden).
scapīfer schaft-, stiel- od. stengeltragend (scapus).
scapīflōrus schaftblütig, -blumig.
scapiformis schaftförmig.
scapus Schaft, Stiel, Stengel.
scariosus rasseldürr (fr. scarieux).
scaturigīnus Felsquell bewohnend (scaturīgo, -inis).
seaurus klumpfüssig.
seleratus verbrecherisch, giftig (scelēro v. scelus, -ēris).
shedūla Zettel, Blatt.
Scheibe (discus) = bei Radiaten die innere Partie der Blütchen.
Scheinfrucht (z. B. Maulbeere) = d. Samen einschliessende Fleischmasse als Fruchtstand (Perigonblätter etc.).
Schistocarpi spaltfrüchtige Laubmoose.
schizocarpium Spaltfrucht (σχίζω spalte etc.).
Schlauchgefässe (z. B. in den Blättern u. Stengeln der Monocotylen).
Schleuderzellen (elatēres), z. B. der Mooskapseln.
scholium (σχόλιον) Erläuterung etc.
sciagraphia Schattenriss (σκιά), Umriss.
scissus geschlitzt, spaltig, faserig (v. scindō, 3.).
scitāmen, -inis Geissel, Peitsche, -minosus peitschentreibend.
Scitaminēae DC. Bananengewächse.
Schwärmsporen = freiumberschwimmende (z. B. d. Algen).
sciuroides eichhornähnlich, -schwänzig (sciurus).
sclerenchyma hartes Parenchym (σκληρός hart), z. B. Sclerenchimscheiden bei Carex-Rhizomen.
sclerophyllus hartblättrig.

sclerotium hartfleischige Missbildung (z. B. beim Mutterkorn), Dauermycel des Sclerotium Clavus (Claviceps).
scobiformis sägmehlförmig (scobs, -bis).
scopūlus Felsklippe, Bergkuppe.
scorodonius knoblauchartig (σκόροδον).
scorpīoides skorpionähnlich, -schwänzig.
Scorpionschwanz (cincinnus) gekrümmte Wickel.
scoticus schottisch.
scrobiculatus mit Grübchen vers. (dem. scrobs, -bis Grube).
serophularius skrofelig, Skrofeln heilend, eig. schweinsartig (scrofa od. -pha, dem. -phūla Schwein).
seruposus voll spitzer Steinchen od. Hindernisse, ebenso **-pulosus** skrupelös.
scutatus (v. scutum) schildförmig, wie ein Langschild.
scutellatus (v. scutellum dem. scutum) schildförmig, wie ein Schildchen.
sebāeus talgig, talgartig (sebum Talg, Unschlitt).
sebīfer, -éra Talg führend (s. eb.).
secalinus korn- od. roggenartig (Secāle, s. Nom.).
secernierendes Organ (Reinke) = absonderndes (s. sogl.).
secretio Ausscheidung, Absonderung (v. secerno, 3.).
secretum Absonderungsprodukt, z. B. Milch etc.
secundiflōrus einseitig blühend (secundus v. sequor folge, näm. dem Wind, mit dems. mich abwendend¹⁾).
secundus folgender, zweiter, aber auch: einseitwendig, mit dem Wind weggewandt.
secūriger, -éra beiführend (secūris Beil).
Sedimum Stettin, **-nensis** Stettiner.
seges, -ētis Saat, Saatfeld, -tum der Saaten.
segetalis unter Saaten wachsend.

1) Nicht (n. Jürgens) zweitblütig (v. secundus zweiter, eig. folgender)! — vielmehr nach einer Seite gewendet.

- segmentum**, „Segment“, Abschnitt, Teil, Glied.
- Segregatae** L. Sonderblüt. Compositen (Bl. m. besond. Kelchen).
- seguinus** schierlingsartig (fr. cigue, lat. cicuta).
- Segusio** Susa (Oberital.), -siensis von Susa.
- Selbstbestäubung** u. Fremdbestäub. (durch andre Individuen).
- selectus** ausgerlesen, auserwählt.
- semecarpicus** fahnenfrüchtig ($\sigma\eta\mu\alpha$ Zeichen, Fahne, *zao.tòs*).
- semen**, -inis Samen.
- semestris** sechsmonatlich, ein „Semeester“ od. Halbjahr dauernd (v. sex u. mensis Monat).
- semiapertus** halboffen (semi-, in comp. halb).
- semidecandrus** halbzehn- d. i. fünfmännig, st. zehn nur fünf Staubgefässe zählend.
- semidecurrens** halbherablaufend.
- semiliber**, -béra halbfrei.
- semiovatus** halbfirund.
- semipectinatus** halbgekämmt od. -kammförmig.
- semipedalis** einen halben Schuh messend.
- semperflorens** immerblühend, -virens -grünend.
- sempervivus** immerlebend.
- senescens** alternd, greisenhaft.
- seni**, -nae zu sechs, je sechs.
- senilis** greisenhaft, den Greis betr. (senex, -nis).
- senticosus** dornbuschig (v. sentis).
- sepánum** Kelchblatt, -zipfel.
- separatus**, „separat“, abgesondert, getrennt.
- sepiarius** (i. q. saepiarius) an Zäunen wachsend (sepes, -is, Pl. -ium).
- sepimentum** Umzäunung.
- sepium** Gen. Pl. v. sépes Zaun.
- septentrionalis** nordisch (Septentrio Norden od. Nordwind).
- septicidus** (sc. dehiscentia) wandteilendes Aufspringen (septum Wand u. caedo zerschneide).
- septius** ($\sigma\eta\pi\tau\iota\zeta\delta$) fäulnisregend.
- septius** auf faulen Stoffen wachsend ($\sigma\eta\pi\tau\iota\zeta$ verfault).
- sericanus** serisch, aus d. Lande d. Serer (Ostasien).
- serialis** in Reihen stehend (series).
- sericéus** seidenartig.
- series**, -ëi „Serie“, Reihe, Kette.
- seriflúus** blut- od. molkenflüssig (serum Blutwasser etc.).
- séris** in compos. -Salat ($\sigma\acute{\epsilon}\rho\iota\zeta$, - $\iota\theta\o\zeta$).
- serotínuus** spät im Jahr, spätzeitig, -reif.
- serpyllacéus** quendelartig (Serpulum, s. Nom.).
- serraturae** Sägezähne, serratus gesägt (serra Säge).
- serre** fr. Gewächshaus.
- sertum** od. Pl. -ta Blumengewinde, Guirlande.
- sesquipedalis** anderthalb Schuh lang.
- sesquiterius** dritthalb = $2\frac{1}{2}$.
- sessilifórus** sitzblütig, mit sitzenden Blüten.
- sessilifolius** sitzblättrig, m. sitz. Laubblättern.
- sessilis** sitzend, d. i. ungestielt.
- seta** Borste, -acéus borstenförmig, -arius Borsten enthaltend.
- setiger**, -éra borstenführend (s. eb.).
- setosus** borstig, m. Borsten besetzt.
- seusaurus** von der Save (Sau) in Ungarn.
- sexangularis** sechseckig, -kantig.
- sexuelle Fortpflanzung** = geschlechtliche, d. i. durch Sporen oder Samenverschmelzung der Pollen- u. Eizellen.
- sexus** Geschlecht.
- siccus** trocken, dürr.
- sieñus** sicilianisch.
- Siebröhren** = Gefäße mit siebförmig durchbrochenen Zwischenwänden.
- siifolius** merkblättrig (Sium, s. Nom.).
- Silesia** Schlesien, -siæcus schlesisch.
- silex**, -icis Kiesel, -catus verkieselt, -catum „Silikat“, verkieselter Körper.
- siliéus** kieselartig, -hart.
- siliéula** Schötchen, -losus Schötchen tragend.
- Siliiculosae** L. Schötchen-Cruciferen.
- siliqua** Schote, -quosus Schoten tragend.
- Siliquosae** L. Schoten-Cruciferen.
- siluricus** silurisch (v. Silures, brit. Volk im Fürstentum Wales, Grossbritannien).

silvaticus, -vestris im Wald wachsend.
simplex, -icis einfach.
simplicifolius m. einfachen (ungeteilten) Blättern.
simplicissimus äusserst od. ganz einfach.
simultan = plötzlich, zusammen, auf einmal, z. B. simultane Zellscheidung, Simultankirche etc. (simultaneus von simul adv. zugleich).
sinensis i. q. chinensis sinesisch (chinesisch).
sinicus i. q. sinensis (s. eb.).
sinister, -stra linker, linksgewandter.
sinistrorum linksherum.
sinuatus buchtig, ausgebuchtet, buchtblättrig (sinus).
siphonanthus Röhren- od. Pfeifenblume ($\sigma\acute{\imath}\varphi\omega\nu$ etc.).
Siphonocaulae Bisch. Röhrenstenglige (Armleuchter).
Sirmium Stadt in Slavonien.
sitophilus weizenliebend ($\sigma\acute{\imath}\tau\circ\sigma$).
situla Eimer, **-arius** eimerförmig.
situs, -us Lage, Zustand.
smegmadermus schmier- od. seifenschalig ($\sigma\mu\bar{\eta}\gamma\mu\alpha$ d. Schmieren, $\delta\acute{\imath}\varphi\mu\alpha$ Haut etc.).
soboles Stocksprossen.
sobolifer (-érus, -éra) sprossentreibend, sprossend.
sobrius mässig, trocken (Kummer).
sociatus zusammengesellt, gesellig.
solidus dicht, „solid“, nicht hohl.
solis-equus der Sonne folgend.
solitarius einsam, einzelstehend.
soloniensis, -onius (sc. ager) Gebiet von Solona in Kärnthen od. d. Solonische Geb. in Latium.
solstitialis sommerlich, zur Zeit der Sommerwende od. sommerlich. Sonnenwende, eig. des Sonnenstillstands (sol u. sisto, -stiti, 3.).
somnifer, -éra schlafbringend, -erregend (sonnus).
sonorus tönen, schallend, rasselnd (von sonus Ton).
Soredien = zu ein. Gruppe verein sich lostrennende Gonidien d. Flechten.
sorius sorisch, aus Soria, e. Provinz v. Altcastilien.
sororius schwesterlich, geschwisterlich.

sorosis Scheinbeere, z. B. Ananas, Maulbeere, Anhäufung (v. $\sigma\omega\varrho\circ\varsigma$ Haufen).
Sortiment = Sammlung gleichartiger Pflanzen.
sorus, -ri Sporen- od. Fruchthäufchen d. Farne (s. eb.).
spadicenus kolbig (v. spadix, -icis), aber auch braunrot, dattelfarbig.
spadiceo-griseus braungrau (Kummer).
spadix, -icis ($\sigma\pi\acute{\imath}\delta\iota\xi$, - $\zeta\circ\varsigma$) Palmfruchtzweig, Blütenkolben, aber auch dattelfarbig (s. v.).
sparsiflorus locker-, zerstreutblühend.
sparsus zerstreut (v. spargo, -rsi 3.).
sparteus pfriemengrasartig (spartum, $\sigma\pi\acute{\imath}\alpha\theta\circ\tau\circ\varsigma$).
spatha Blütenscheide ($\sigma\pi\acute{\imath}\alpha\theta\eta$ Spaten, Spatel).
spathacenus scheidenförmig.
spathulatus spaten- od. spatelförmig.
spathulifolius spatelblättrig.
species Spezies, Art, **-cialis** artlich, besonderer, „spezieller“.
specieus artlich eigen, eigentümlich, „spezifisch“.
specimen, -inis Muster, Artbeispiel, Probe.
speciosus wohlgestaltet, sehr schön etc.
spectabilis beträchtlich, ansehnlich, prächtig.
spectans dahin ziarend, betreffend.
speculum Spiegel.
spelta Spelt, Spelz.
spermatium, Pl. -tia Sporen d. Pilze in s. g. Spermogonien (s. hern.).
spermatophyta Samenpflanzen i. q. Phanerogämae ($\sigma\pi\acute{\imath}\varrho\mu\alpha$, - $\alpha\tau\circ\varsigma$ S. u. $\varphi\pi\tau\circ\varsigma$).
spermatozoïda = bewegl. Körpchen aus d. Antheridien, welche die Eizellen der Oogenien befruchten u. die Oosporen hervorbringen (z. B. Chara etc.).
spermogonium „Spermogon“, Fruchtform mancher Pilze ($\sigma\pi\acute{\imath}\varrho\mu\alpha$ u. $\gamma\acute{\imath}\circ\varsigma$ Zeugungsorgan).
spermophorum ($\sigma\pi\acute{\imath}\varrho\mu\acute{\imath}\varphi\circ\varsigma\circ\varsigma$) Samenträger, -leiste.
sphacelatus bündel- od. fackelartig ($\sigma\varphi\acute{\imath}\chi\acute{\imath}\varepsilon\lambda\circ\varsigma$).
sphaericus kugelförmig, „sphärisch“ (v. $\sigma\varphi\acute{\imath}\iota\circ\varsigma\alpha$ K.).

- sphaeroidēus** ein „Sphäroïd“ bildend, kugelähnlich.
- sphaeroarpus** kugelfruchtig.
- sphaerocephalus** kugelköpfig.
- spica** Ähre, -eatus ährig, ährenförmig.
- spicilegium** Ährenlese (*spica u.légo*).
- spicula** (dem. spica) Ährchen, -eu-lous mit Ährchen.
- spiculum** Spiesschen, Pfeilchen.
- spina** Dorn, -nosus dornig, -nosis-simus äusserst dornig.
- spinescens** etwas dornig.
- spinulosus** m. Dörnchen besetzt (spinula dem. v. *spina*).
- Spira** Speyer (Rheinpfalz).
- spiralia** (sc. *vasa*) Spiralgefässe.
- spiralis** schraubenförmig (*spira*, gr. σπείρω Windung, „Spirale“).
- spiranthes** schraubenblütig.
- spissus** dicht gedrängt, langsam, -weilig, zäh (Kummer).
- splendens**, -dīsus glänzend, ins Auge fallend.
- spontanēus** freiwillig, von selbst.
- sponte nascens** frei od. wild wachsend.
- sporae** Sporen, Keimkörnchen (*σπόρος* Saat v. *σπείω* säe).
- sporangium** „Sporangie“, d. i. Sporenhälter (v. ἄγγειον, Keimfrucht d. Kryptogamen).
- Sporenknöpfehen** der Armleuchter (Chara, s. Nom.).
- sporidium** eine Art Spore, secundäre Spore b. Kryptogamen.
- sporocarpium** (i. q. sporangium) Keimfrucht.
- sporogonium**, durch Befrucht. gebild. Embryo in Moosarchegonien (Mooskapseln).
- Sporophyta** Sporenpflanzen, i. q. Cryptogämae L.
- Spreite** = breite Blattfläche (lamina).
- spretus** verachtet, verworfen (v. sperno, sprevi, 3.).
- spumarius** (v. *spuma*) schaumartig, wie Schaum aussehend.
- spumosus** schäumend, schwammig (Kummer).
- spurius** unecht, unehelich, Bastard etc.
- squalens**, -līsus schmutzig, besond. schmutziggelb.
- squama** Schuppe, Deckblatt d. Cyperaceenblüten.
- squamae** Niederblätter.
- squamarius**, -atus, -osus schuppig (s. eb.).
- squamulae hypogynae** Schüppchen unter d. Stempel.
- squamulosus** mit Schüppchen besetzt, schuppig.
- squarrosum** sparrig, steifästig, -ru-lous etwas sparrig.
- stabularis** in Ställen vorkommend (stabulum).
- stagnalis**, -nīsus im Sumpf wachsend (stagnum).
- stamen**, -īnis Staubgefäß, -blatt, -faden.
- staminēus** staubfadenartig, an Stelle d. Staubf. z. B. corona stamīnea d. Staubf. tragende Krone.
- staminodium** in ein Blatt verwandt. Staubgefäß.
- stegocarpus** Dach- od. Deckfrucht, Hagebutte (*στέγη* Decke, *καρπός*).
- stellaris**, -atus sternförmig (stella Stern).
- Stempelpolster** der Doldenblüten.
- stenanthērus** eng- od. schmalbeutlig, mit engen Antheren (*στενός* eng etc.).
- stenolōbus** schmal- od. dünnschotig (*λοβός* Hülse etc.).
- stenetopetalus** dünnkronblättrig.
- stenophyllus** dünnblättrig, -laubig.
- stereoides** (-ōdes) (*στερεός*) fest, dicht.
- sterilis** „steril“, unfruchtbar.
- stictus** (*στικτός* v. *στίξω*) gestrichelt, punktiert.
- stigma**, -ātis (*στίγμα* v. *στίξω*) Narbe, Stich etc.
- stigmatodes** (*στιγματώδης*) narbenartig, -ähnlich.
- stīlus** (stylus) (*στύλος*) Griffel, Pistill, Säule etc.
- stimuli** Brennhaare, -borsten.
- stipes**, -ītis Stengel, Stamm, Stock, Strunk, Stiel, Stange etc.
- stipitarius** auf Stengeln stehend od. wohnend.
- stipitatus** gestielt, gestengelt (s. v.).
- stipticus** (v. *στιπτός* zusammengedrückt etc.) herb, zusammenziehend.
- stipulae** eig. Stützchen, Bot. Nebenblätter, Knospenschuppen.
- stipularis**, -atus achsel- od. nebenblättrig (s. eb.).

- Stipularsegmente** (Mikosch) Achselblatthüllen der Knospen.
- stirps**, -pis Stamm, Baum, Pflanze, Staude etc.
- stolo**, -ōnis Ausläufer, Wurzelschössling etc.
- stolonifer**, -ēra Ausläufer treibend.
- stoloniforus** mit blütentragenden Schösslingen.
- stomāta** Spaltöffnungen (*στόμα*, -*ατος* Mund).
- Strahl** (radius) bei d. Compositen = äusserer Kreis d. Blütchen.
- straminēus** strohartig, von Stroh, strohgellb.
- strata** Schichten, - annūa Jahresringe (d. Stämme).
- strepsis** rauschend (strepo).
- stria** Streif, Strieme, -atus gestreift, riefig.
- strietus** straff, steif, aufrecht etc. (v. stringo ziehe an).
- stridulus** knarrend, klappernd (v. stridēo).
- strigiceps** striegelköpfig, -haarig (striga Strich, Streif etc.).
- strigilis** Striegel, Rosskamm, Schab-eisen (s. eb.).
- strigillarius**, -losus gestrichelt, mit Stricheln (v. strigilla dem. striga, s. v.).
- stringosus** mager, dürr.
- Strobilacēae** Rchb. Zapfen-Coniferen.
- strobilaceus** (v. strobilus) zapfenartig.
- strobilus** Fruchtzapfen, Tannenzapfen (*στροβύλος* Kreisel etc.).
- stroma** (*στρῶμα* Lager) fleischiges Frucht-Lager der Pilze.
- strophiola** Anhang des Nabelstrangs.
- structura** „Struktur“, Gefüge, Bau (v. struo, 3.).
- struma** Drüse, Kropf, -arius dagegen angewandt.
- strumosus** drüsig angeschwollen.
- Stützblatt**, oft umgewandelt in ein Dorn.
- stupa** (stuppa, gr. *στύπη* od. *στύπη*) Werg.
- stylopodium** Griffelfuss, -polster, -postament (s. sogl.).
- stylus** (*στύλος*) od. **stilus** Griffel, Pistill od. Stempelsäule od. -faden.
- styraxflīus** storaxausschwitzend, Storax fliessenlassend.
- suaveolens** wohlriechend.
- suavis**, -īter, adv. angenehm, lieblich etc.
- sub-** in compos. etwas-, fast- (s. sogl.).
- subacaulis** fast stengellos.
- subaequalis** fast od. ziemlich gleich.
- subalatus** etwas geflügelt.
- subalpinus** subalpinisch, an den Voralpen, um d. Alpen herum.
- subdecandrus** fast oder gewöhnlich zehnmännig.
- subdolus** heimlich, trügerisch (i. q. ambigūus).
- suberectus** fast aufrecht.
- Suberin** = Korkstoff (s. sogl.).
- suberosus** (v. suber, -ēris Kork) korkig, K. hervorbringend.
- subinde** unmittelbar darauf, auch wiederholentlich.
- subinteḡer**, -ēgra fast od. ziemlich vollständig, - ganz.
- Sublabiēae** krummliippige Labiaten.
- subliquescentes** beinahe zerfliessend.
- submaculatus** etwas fleckig, etwas bunt.
- submarinus** unterseeisch,-meerisch.
- submersus** untergetaucht.
- subnullus** so gut wie keiner.
- subpilosus** etwas behaart.
- subregularis** ziemlich od. fast regelmässig.
- subrotundus** rundlich, fast rund.
- subsessilis** fast sitzend.
- subsolitarius** fast einzeln.
- subsquamosus** vorübergehend schuppig.
- substantivum** „Substantiv“, Ding od. Hauptwort.
- Substrat** = Unterlage, Boden od. Grund.
- subterrānum** unterirdische Höhle, fr. souterrain.
- subterrāneus** unterirdisch, unter d. Erde befindlich.
- subtilis** eig. feingeweht (v. tela), fein, dünn, zart etc.
- subtortus** etwas gewunden.
- subtus** unten, unterseits.
- subula** Pfrieme, -atus pfriemenförmig.
- suburbanus** nahe bei der Stadt wachsend.
- succedanēus** Wachssaft hervorbringend (succus u. edo gebe aus).
- succedanus** (v. succēdo folge nach) allmählich, z. B. succedane Zellscheide.

- succinetus** umgürtet, gerüstet, auch abgekürzt.
- succinifer**, -era bernsteintragend, -gebend (s. sogl.).
- succinum** Bernstein, Harz (v. succus Saft).
- succisus** unten abgeschnitten (v. succido, 3.).
- Succulentae** Bartl. Saft- od. Fettpl.
- succulentus** saftig, saftreich, **sucus** Saft.
- sudeticus** auf den Sudeten zu Hause.
- suecicus** schwedisch, in Schweden (Suecia) zu Hause.
- Suessonia** Soissons (Frankr.).
- suffocatus** erstickt.
- suffruticēs** Halbsträucher (v. frutex, -īcis Strauch).
- suffruticosus** fast oder halb strauchartig.
- suleatus** gefurcht, **sulcus** Furche.
- sulcus** in comp. -furchig, -zackig.
- sulfurēs** (-phurēs) schwefelgelb.
- sunnum** oberster, höchster.
- superbus** stolz, prächtig.
- Superflua** L. Überflüssige (XIX, 2.) (Rand-u. Scheibenblütlch. fruchtb.).
- superne** obenher, oberhalb, -seits.
- superponiert** (Schwendener) über einander gestellt (z. B. Quirl).
- superpus** oberer.
- supinus** niederliegend, flach ausgebretet, rückwärts gebogen.
- supradecompositus** vielfach zusammengesetzt, vielfach auseinandergestellt.
- surcatus** gesprosst, sprossig od. zweigig (surcus).
- surculus** (dem. surcus) Zweiglein, Moosstengel.
- sursum** aufwärts, in d. Höhe.
- susceptus** unternommen.
- susianus** susanisch, von Susa (in Piemont od. in Persien).
- suspectus** verdächtig, beargwohnt, für giftig gehalten.
- suspensus** hängend, aufgehängt.
- sutura** „Sutur“, Verbindungsnaht (z. B. d. Hülsen).
- syconium** Feigenfrucht (v. σύκων Feige).
- syllabus** Zusammenfassung (v. συλλέγω).
- syllöge** Sammlung (gr. συλλογή).
- svlanus, -vaticus, -vestris** (silv.-) im Wald zu Hause.
- symbolae**, -arum Beiträge (*συμβόλη* v. *συμβάλλω*).
- symmetricus** „symmetrisch“, gleichmässig, z. B. corolla, zwar unregelm., aber linke u. rechte Hälfte gleich!
- sympagnentēra** (sc. Pourretia) m. zusammengefügten Beuteln (v. *συμπήγγυμα* u. *ἔντερο* Blase etc.).
- Syphysogynae** A. Rich. verwachsenweibige (v. *συμφύω*).
- sympodium** wiederholender Spross, d. i. jeder Gabel-Ast wieder Fussstück einer neuen Gabel.
- Synandreae** (A. Braun) m. verwachs. Staubbeuteln, i. q. Synanthreaceae.
- Synanthreaceae** Rich., s. eb. (*ἀρθροά* Staubbeutel).
- synanthria** Blütenverwachsung (*σύν* u. *ἄρθρη*) bei zusammengewachs. Blumen.
- synearpīa** (-īum) Früchteverwachsung, z. B. Brombeere (*σύν* u. *αρπάσ*).
- synergidae** „Synergiden“ (Strasburger) d. s. Ei-Gehülfinnen bei Embryozellenbildung.
- Syngenesia** L. (XIX. Kl.) Verwachsbentige, Kl. d. „Syngenesisten“.
- synonymus** (*συνώνυμος*) „synonym“, d. i. mitnamig, gleichbedeutend.
- synophthīa** Knospenverwachsung (*σύνθαλμός* Auge etc.).
- synopticus** dabei erblickt (*σύνοπτος* Begleiter).
- synopsis** „Synopsis“, d. i. Überblick (*σύνοψις*).
- synopticus** „synoptisch“, übersichtlich.
- Sympetālae** Rehb. Ganzblumige, m. verwachs. Blumenblättern od. ganzer (verwachs.) Blumenkrone.
- syntagma** (Pfeffer) Zusammenhäufung, s. tagma.
- syphiliticus** „syphilitisch“, gegen d. venerische Krankh. od. Lustseuche angew.
- syriacus** (-ricus) syrisch, aus Syrien.
- System** (*σύστημα*, -ātis, gr. *σύστημα*, -ατος) wissenschaftl. Zusammenstellung.
- tabernaemontanus** von Bergzabern (Rheinpfalz).
- tabūlae** Tafeln, Figurentafeln.

taediger, -ēra fackeltragend (taeda Kienholz etc.).

tagma (Pfeffer) (gr. τάγμα v. τάσσω) geordneter Haufen etc.

tangential, als Kreis berührende Gerade.

tanguticus tungusisch (nördl. Innerasien).

Tannin = Gerbstoff, -säure.

tardiflorus spätblühend (tarde langsam, spät).

tartareus den Tartarus (die Unterwelt) betr., auch Weinstein betr. (cremor tartari).

tartaricus (tataricus) tatarisch, aus der Tartarei.

Tasmania „Tasmanien“, Van-Diemensland.

taurus taurisch, vom Gebirg Taurus in Kleinasien od. aus Taurien (Tauris, Halbinsel Krim).

teectorum der Dächer (tectum Dach).

tegens, -ntis deckend, schützend (v. tégo, 3.).

tegmen, -inis Samenhaut (s. eb.).

tegmentum Knospendecke (s. v.).

tegumen, -inis Decke, Hülle (s. v.).

tela (e. g. cellulosa) Gewebe, z. B. Zellgewebe.

templentus, -mūlus betäubend.

tenacissimus überaus zäh od. hartnäckig (s. sogl.).

tenax, -ācis zäh, hartnäckig.

tenellus (dem. tener, -ēra etc.) äusserst zart.

tentaculum „Tentakel“, Tastorgan, Fangarm.

tentaculatus mit Tentakeln versehen (s. eb.).

tentāmen, -inis Versuch (v. tento).

tenuiflorus, -folius dünnblütig, -blättrig.

tenuis, -issimus dünn, äusserst dünn od. schmal.

tephroleucus grauweiss (τεφρός aschgrau, λευκός weiss).

teratologia Wunder- od. Erscheinungslehre, Missbildungslehre (τέρας, -τος Zeichen etc.).

teres, -ētis gedreht, stielrund.

teretifolius stielblättrig, drehrund od. walzenblättrig.

teretiuseilus fast stielrund, etwas walzenförmig (s. v.).

Tergeste Triest.

tergloviensis vom Terglou (in den julischen Alpen).

terminalis gipfelständig, endbildend (termīnus Ende, Ziel).

Terminologie = Kunstsprache (termīnus Ausdruck, eig. Begriffsbegrenzung).

ternatus gedreit, zu drei beisammen, dreizählig.

terni, -nae zu dreien, je drei.

terrestris (v. terra) auf der Erde

terrēus ebenso (terra). [wachsend.

tersus geglättet, glatt (v. téro reibe).

testa Schale, äussere Samenhaut.

testiculatus mit Testikeln od. Hoden versehen.

tetanīeus an Halsstarre (τέταρος Spannung etc.) leidend, gegen solche angewandt.

tēter, -tra hässlich, -terrīmus äusserst hässlich.

tetrachocarpia Vierlingsfrüchte (τέτρωνα in vier Teile geteilt).

tetrades (i. q. basidia) Sporenstützen (τετροάς, -άδος d. Zahl 4).

Tetradynamia L. XV. Kl. „Viermächtige (unter 6 Staubfäden 4 grössere).

tetragōnus viereckig, -kantig (γωνία Eck etc.).

tetrāhit (te trahit dich täuscht?) vierblättrig in die Runde (τέτρωνa vier u. τέτρα Umgang etc.).

tetrālix (τετραέλιξ) vierdrächtig, viermal gewunden (ελιξ, -zos v. ἔλισσω wickle etc.).

Tetrandria L. von **tetrandrus** viermännig, mit 4 Staubgefassen (ἀνθρός, -ρδος Mann, Staubgefäß).

tetragynus vierweilig, m. 4 Stempeln (γυνή Weib etc.).

tetrapetalus vierkronblättrig.

tetraphyllus vierblättrig, m. 4 Laubblättern.

tetrapterus vierflügig, -federig (πτερόν).

tetraquēter (-trus), -tra vierkantig.

tetraspermus viersamig.

tetraspōrae Teilungs-, Verteilungssporen (bei Florideen).

texāns texanisch, aus Texas (Nordamerika).

textilis gewebt, -le Textil, Zeug, Tuch etc.

textura „Textur“, Gewebe, Gefüge.

Thalamiflōrae DC. Bodenblütige.

thalāmus (θάλαμος) Blumen- od. Fruchtboden, eig. Gemach.

- thalassicus** meerisch, am Meer wachs. (*θάλασσα*).
thalianus nach dem Botaniker Thal benannt.
thalloma (Schwendener) Lager- od. Thallusgewebe (s. sogl.).
Thallophyta Endl. Lagerpflanzen.
thallus (*θαλλός*) Lager (besond. Flechten-), Spross etc.
thapsiformis kerzenförmig, wie Wollkraut (Thapsus, s. Nom.).
thēca (*θήκη*) Behälter, Büchse, Sporenkapsel etc.
thejogalus schwefelmilchig (*θηγώρ* od. *θειορ* Schwefel, *γάλα* Milch).
Thelypteris weiblicher Farn (*θῆλυς* weibl., *πτερίς*).
thermalis in Thermen (d. s. Warmquellen) wachsend.
thermicus „thermisch“, Wärme betr. (*θερμός* heiss).
thesaurus (*θησαυρός*) Schatz, Magazin.
thesis „These“, Satz, Behauptung.
thurifer, -era weihrauchtragend (thus, -ris).
thuringiacus Thüringer.
thus, -ris Weihrauch (der Bursaren).
Thyllen-Bildung (Horvath) = Sackod. Beutelstoff-Bildg. (*θύλλις* od. *θύλαξ*).
thymiflorus thymianblütig.
thyrsiflorus straussblütig (*θύρσος* „Thyrsus“ etc.).
thyroides straussähnlich, -artig.
thyrsus, -i Strauss, unwickelter Stab, „Thyrsus“ (*θύρσος*).
thibetanus (tib.-) aus Thibet (Tibet) (Hochasien).
tigillaris latten- od. balkenförmig (tigillum).
tigillum (sc. Croton) tiglisch (n. einer molukkischen Insel benannt).
Tigurum Zürich.
tinctorius, -torum zum Färben dienend, der Färber.
tingens (v. tingo) färbend, benetzend.
tingitanus von Tanger (Tingis) in Marokko (Tingitania), nicht tunesisch (Mössl. u. Rehb.)¹⁾, was tunetanus!
titubans taumelnd, schwankend (Kummer).
-
- 1) bei *Scorzonera tingitana*!
- togularis** bekleidet (Kummer) (dem. tago).
tomentosus filzig, **tomentum** Filz.
tonieus „tonisch“, d. i. anspannend, stärkend (*τόνος* Sehne, Kraft).
tonsurans „Tonsur“ hervorbringend, schädelkählend.
topiarus zur Kunstgärtnerei gehörend (*τοπεῖος* od. *τοπιοῖος* Tau); opus topiarium Plin. beschnittenes Heckenwerk.
torminalis Kolik od. Bauchgrimmen betr. (tormina, -um Schniden im Leib).
Tornæus (-cum) Tournay in Belgien.
tornatus gedrechselt (v. torno).
torpens träge, matt, starr (v. torpeo, 2.).
tortilis gedreht, gewunden (s. sogl.).
tortuosus voller Windungen, **tortus** gedreht, gewunden (v. torqueo, 2.).
torulosus wulstig (torulus dem. torus Polster etc.).
törus, -i Polster, Bett, Blütenpolster, Fruchtboden.
torvus finster, dunkelbraun.
toxicarius giftig (v. *τοξικός* eig. Pfeilgift).
trabēus an Balken vorkommend (trabes, -is).
trachēae, *Tracheen* „geschloss. od. Luftfasern, -röhren.
tracheidae (Möller) tracheenähnl. Holzgefässe.
trachyodon Rauhzahn (*τραχύδον*, *δόντων*).
trachyphyllos rauhblättrig.
tractatus „Traktat“ (fr. traité), Abhandlung.
tragānus bocksartig, von Bocksgeruch (gr. *τραγός* Bock).
tragōdes (gr. *τραγοειδής*) bocksartig.
Trajectum Utrecht (Holland).
Transsilvania Siebenbürgen.
transversalis, -sus quer, z. B. transversale Wände cylindrischer Gefässe (Sachs).
transpiratio „Transpiration“, Ausdünstung (v. fr. transpirer).
tremulus zitternd (v. *trémo* zittere).
trevericus Trier.
Trevirorum (sc. Augusta) Trier.
triacanthus dreidornig (*ἄζαρθα* Dorn).

- triangularis**, -gūlus dreieckig, -kantig (v. tres, comp. tri-).
tribus Zunft, Unterfamilie.
trichōdes (-choides) haarig, -artig, -ähnlich (*τριχώδης*).
trichophyllum haarblättrig (*θριξ*, *τούφος* Haar, *φύλλον* Laub).
trichospermus haarsamig, -früchtig.
trichotomus mit gestutzten Haaren (*τριχέω*).
trichrōmus dreifarbig.
Tricoceae Endl. (s. sogl.).
tricoeens dreikörnig (*κυζζός*; Korn, Kern).
tricōlor dreifarbig.
tricornis dreihörnig (*cornu* Horn).
tricosus streitsüchtig, hadernd (v. tricor hadere).
tricuspidatus (-pis) dreispitzig.
tridactylites dreifingerig (*δάκτυλος* Finger).
tridens, -ntis Dreizehn, -zack.
tridentatus dreizähnig.
trifidus dreiteilig, -spaltig.
triflorus dreiblütig, -foliatus, -folius dreiblättrig.
triglūmis dreispelzig.
trigōnus dreieckig, -kantig (*γωρός* Eck etc.).
trilinguis dreisprachig, in 3 Sprachen ausgedr. [hülsig].
trilōbus (*τριλόβος*) dreilappig,
trimērus (*τριμερής*) dreigliedrig, -teilig.
trimestris dreimonatlich.
trimorphismus Dreierbildung (m. läng., mittl. u. kürz. Griffeln).
trinervius dreinervig, -aderig.
tripartitus in drei Teile geteilt.
triphyllus dreiblättrig, mit dreifachen Laubblättern.
triplex, -īcis dreifach, -fältig.
tripteris dreiflüglig, -wedelig.
triqueter (-trus), -tra dreieckig, -kantig, -schnedig.
Trisepalae Bartl. Dreikelchblättrige.
tristis, „trist“, traurig.
trisulcus dreifurchig, -zackig, -spitzig (*sulcus* eig. Furche).
trivalvis dreilappig (valvae Thürflügel).
trivialis, „trivial“, gemein (v. triuum Scheideweg).
tropicus, „tropisch“, zwischen den Wendekreisen (Tropen) zu Hause.
truncatus verstümmelt, gestutzt (v. *truncus* Stumpf etc.).
- tuber**, -ēris Knolle, -berosus knollig.
tuberculosus voller „Tuberkeln“ (tuberculus dem. v. tuber).
tuberculus, „Tuberkel“, Knoten, Höcker, Warze (s. eb.).
Tubiflōrae Bartl. Röhrenblumige.
tubi pollinis Pollenschläuche.
tubulosus voller Röhrchen, **tubūlus** dem. **tubus** Röhre.
Tulipifera L. Tulpenträgerin (-baum).
Tüpfel = feine, schiefe Spalten der Holzgefässe.
tunetanus tunesisch, von Tunis (Tunes, -ētis).
tunica Hemd, Hautschale (bei Zwiebeln).
tunicatus hautschalig, überkleidet (Kummer).
turbanus gewirbelt, kreiselförmig (v. turbo, -inis).
turfosus turfig, auf Torf wachsend.
turgescens Zustand (de Vries) s. turgor (v. *turgesco* schwelle an).
Turgescenz = Zellenspannung, Anspannung.
turgidus angeschwollen, gedunsen, strotzend.
turgor der strotzende Inhalt.
Turicum Zürich.
turio, -ōnis Stockknospe, -sprosse, z. B. *turiones asparagi* Spargelsprossen.
Turōnes Tours (an der Loire).
turrītus getürmt, turmförmig.
Tute (*ochrēa*) = häut. Scheide üb. den Knöterichgelenken.
typhīnus rohrkolbenartig, -ähnlich (Typha, s. Nom.).
typicus, „typisch“, n. einem Bild gemacht, von bestimmt. Schlag (v. τύπος „Typus“, Figur, Bild, Schlag).
überior, -berrīmus reichlicher, sehr reichlich.
ueranīeus ukrainisch, aus der Ukraine (Südrussl.).
udus feucht, nass.
uliginosus im Nassen wachsend.
ulmarius ulmenartig, -blättrig.
ulmifolius ulmenblättrig.
umbella Schirm, Dolde, -aris, -atus doldenartig, schirmförmig.
Umbellatae u. **Umbelliferae** Doldenblütige.
Umbelliflōrae DC. Schirmblütler.

- umbellula** Döldchen, Teil einer zusammenges. Dolde.
- umbilicalis** nabelförmig, *umbilicus* Nabel.
- umbaculifer**, -ëra sonnenschirmtragend (s. sogl.).
- umbraeūlum** Sonnenschirm (v. *umbra* Schatten).
- umbratieus** schattig, schattenliebend.
- umbriñus** umbrasfarbig, -braun (*umbra* brauner Farbstoff).
- umbrosus** schattig.
- uncinalis**, -atus hakenförmig gekrümmmt.
- uncus**, -i Haken, **uncus**, -a hakig.
- undulatus** wellenförmig, auf- u. abgebogen.
- undulosus** wellig (v. *undula* dem. *unda* Welle).
- unguicularis** fingernagelartig (*unguiculus*).
- unguis** Nagel, Klaue.
- unicus** einzig, **unicum** d. Einzige seiner Art.
- uniflorus**, -folius einblütig, -blättrig.
- uniformis** einförmig (*forma*).
- uniglumis** einspelzig (*gluma*).
- unijugum** (sc. *folium*) einjochig, -paarig (b. Fiederblättern).
- unilabiæae** (sc. *Labiatae*) Einlipper (*labium*).
- unilocularis** einfächerig (*loculus*).
- unipara** (sc. *cyma*) einseitig gekrümmte Trugdolde, s. g. Wickel.
- uniserialis** einreihig (*series*, -ei).
- universalis** gänzlich, allgemein.
- upsaliensis** von Uppsala in Schweden.
- uragogus** urintreibend (*οὐραγός* Urinleiter).
- urbanus** städtisch, um Städte herum wachsend.
- urbicarius**, -bius desgl. (*urbs*, -bis).
- urceolaris**, -atus krug-od. schluchtförmig, mit Schlüuchen vers. (*urceolus*).
- urens** brennend (v. *uro*, 3.).
- Urmeristem** (Sachs) s. Meristem.
- ursi**, -sinus Bären- (*ursus*).
- usitatissimus** überall gebräuchlich.
- usneoides** bartflechtenähnlich (*Usnea*, s. Nom.).
- ussuriensis** am Ussuri (Nebenfluss des Amur) zu Hause.
- ustulatus** angebrannt (näml. so aussehend).
- utilis** nützlich, gebräuchlich (utor, -ti, 3.).
- utriculatus**, -losus schlauchartig, bauchig.
- utričulus** Schlauch, Schlauch- od. Hautfrucht, - **primordialis** „Primordialschlauch, d. i. im Anfang sich bildender.
- utriformis** schlauch- od. sackförmig (uter, -tris).
- utrinque** v. beiden Seiten, an beiden Enden.
- uva crispa** Stachel- od. Rauhbeere, eig. krause Weinbeere.
- uvarius** traubenartig, weintrauben-
uvidus feucht, nass. [(*uva*)]
- vaceinus** die Kuh betr., kuhfarbig (*vacca*).
- vademecum** „Geh' mit mir“, Taschenbuch.
- vagina** Scheide, -atus mit Scheide versehen.
- Vaginaltegmente** (Mikosch) = Scheidenhüllen.
- vaginula** (dem. *vagina*) Scheidchen am Grund der zerrissenen Moos-Archeponien.
- valentinus** von Valencia (Spanien) od. v. Valence (Frankr.) (Valentia), auch Valentins'.
- valesiacus** Walliser, im Canton Wallis z. Hause.
- valleculae** (dem. *valles* od. -lis) Thälchen od. Rillen zwischen d. Rippen der Doldenfrüchte.
- vallicula** Thälchen (dem. *vallis*, s. eb.).
- vallis** (od. -es) Thal, **vallum** Wall, Damm.
- valvae** Thürflügel, Klappen, -atus klappig.
- valvativa** (sc. *vernatio*) klappenart. Knospenblattlage.
- valvula** (dem. *valva*) Kläppchen, **valvulus** i. q. *vallicula*, s. d.
- vaporarius** Dampf, Dunst, Wärme betr. (Kummer: Loh-).
- variabilis** veränderlich.
- Variable** = wechselnde Wertzahl.
- variatio** „Variation“, Abänderung, Schwankung od. Variationsbewegung d. Blätter (Pfeffer¹).

1) Dessen „period. Bewegungen d. Blattorgane“, Leipzig 1875.

- variecolor** buntfarbig.
- variegatus** buntscheckig, -streifig.
- varietas** „Varietät“, Spielart, Abart, Veränderung.
- variola** Pocke, Blätter,-**laris** blätterartig.
- varius** mannigfältig, bunt, verschieden.
- varsoviensis** Warschauer, v. W. (Varsovia).
- vas**, -**asis**, Pl. -sa Gefäß.
- Vasculares** DC. Gefäß - Kryptogamen.
- vascularis** (s. sogl.) mit Gefäßen versehen, **planta v.** Gefäßpflanze.
- vaseolum** (dem. *vas*) Gefässchen.
- Vegetationskonstante** (H. Hoffmann) = Wärmemengenzahl für d. Vegetation.
- Vegetationscurve** (Askenasy) = d. i. der Beobachtungen üb. die Vegetationspunkte.
- Vegetationskegel** (-punkte) = Enden od. jüngste Spitzen, von wo weiteres Wachstum ausgeht.
- Vegetationsphasen** (Askenasy) s. Phasen.
- vegetative Fortpflanzung** = ungeschlechtliche durch Sprosseile.
- vegétus** gesund, munter.
- vegliensis** von Veglia (e. Insel d. ungar. Litorals).
- vehemens**, -menter adv. heftig, stürmisch etc.
- velatus** verhüllt, bedeckt (vélum Segel, Vorhang od. vélo verhülle).
- vellens** fehlerh. st. **vellerens** wollen, wie ein Vliess (vellus, -éris).
- vélum** (fr. voile) Segel, Vorhang, Hautring am Strunk der Pilze.
- velutinus** sammetartig (fr. velouté v. velours Sammet).
- velutipes** Sammetfuss, -stiel (s. eb.).
- véna** „Vene“, Blutader, Ader.
- Vénéris** (Gen. v. Venus) Göttin der Schönheit etc.
- veneticus** venetianisch, v. Venedig (Venetia).
- venetus** venetisch, Veneter (Volk der Veneti), aber auch: seefarbig, bläulich.
- venosus** aderig, nervig (v. *vena*).
- ventosus** windig, auch veränderlich (ventus Wind).
- ventricosus** bauchig (v. *venter*, -tris Bauch).
- vereundus** sittsam, schamhaft.
- véris** (Gen. v. *vér*) des Frühlings.
- vermicularis** wormförmig, wie Würmchen (*vermis* dem. *vermiculus*).
- vernaculus** vaterländisch, inländisch, einheimisch (v. *verna* Inländer etc.).
- vernalis** im Frühling blühend (vér, -ris).
- vernatio** Knospenlage eines (noch nicht entwickelten) Blatts (v. *verno* mache Frühling).
- verniceflorus** Firniss träufelnd (vernis, -icis).
- vernix**, -ícis Firniss.
- vernus** frühlingszeitig etc. (v. *vér*, -ris).
- Verodúnum** (Verdun Frankr.).
- verrúca** Warze, -**cosus** warzig.
- versicolor**, -óris schillernd, bunt, verschied. gefärbt.
- versiflorus** bunt- od. wechselblütig (m. wechselnd. Farben blühend).
- versus** (Praep.) gegen, (Part.) gewendet, umgekehrt.
- verticalis** scheitel- od. senkrecht, z. B. Vertikalebene, -zeile etc.
- verticularis**, -atus quirl- od. wirtelförmig.
- verticillum** (-us) Quirl, Wirtel.
- vérus** wahr, echt.
- vescúlus** (dem. *vescus*) niedlich, zart.
- vescus** essbar (v. *vescor*, -ci sich nähren).
- vesica** Blase, -**carius** blasenartig, blasig.
- vesicosus** blasig (s. eb.).
- vesiculosus** voller Bläschen.
- vespertinus** abendlich (vespera „Vesper“, Abend).
- vestitus** bekleidet (vestio, 4.).
- Viadrus** (Viadúa) Oderfluss (auch Odéra).
- valis** an od. auf Wegen wachsend.
- variarius** desgl. (via Weg).
- vibratilis** zitterig (v. *vibro*, ,vibriere“, zittere).
- viciaefolius** wickenblättrig (Vicia, s. Nom.).
- victorialis** zum Sieg verhelfend.
- Vienna** Wien u. Vienne (Südfrankr.), -**nensis** Wiener u. Vienner.
- viéetus** welk.
- villieaulis** m. zottigem Stengel (villus zottiges Haar).
- vilosus** zottig, haarig (s. eb.).
- Vimära** Weimar.

viminalis, -nēus zum Flechten dienend (vimen, -inis).
Vindelicia das heutige Schwaben.
Vindelicorum (sc. Augusta) Augsburg.
Vindobōna Wien, -nensis Wiener.
vinealis in Wingerten wachsend (vinea Weinberg etc.).
vinifer, -ēra weintragend, -gebend (vinum W.).
Viniferae Juss. Weinträgerinnen (-palmen).
violaceū veilchenblau, violett.
violascens veilchenbläulich, violettwerdend.
virens, -rescens grünend, grünwerdend (virēo 2.).
virescentia Vergrünung von Blüten.
virga Rute, Streif, -atus rutenförmig, gestreift.
virginianus, -ieus virginisch, aus Virginien (Nordamer.).
viridarium Lustgarten (s. sogl.).
viridis grün, viridiflorus grünblütig.
virosus giftig (v. virus indecl. Geifer, Giftschleim).
virusamus giftig (s. eb.).
viscarius klebrig, leimartig (viscum Leim).
viscidulus etwas klebrig.
viscosus voller Leim, klebrig (s. v.).
Vistula (Wisma) Weichsel.
Visurgis Weser.
Viteberga Wittenberg.
vitellarius, -inus ei- od. dottergelb (vitellus Eigelb od. -dotter).
viticūla (dem. v. vitis) Weinstöcklein; viticūlae vitis Geringel der Weinstockkranken.
Vitiensis (sc. Flora) von den Fidschi-Inseln (Australocean).

vitifolius wein- od. rebenblättrig (Vitis, s. Nom.).

visigēnus (-ginēus) weinstock- od. rebenartig ($\gamma\epsilon\nu\delta$ adj. verb. v. $\gamma\epsilon\nu\omega$ erzeuge).

vitta zäh, zum Binden geeignet (v. viēo binden).

vitis Rebe, Weinstock.

vitrēus glasartig.

vitta Strieme, Streif, -atus striemig, gestreift.

vittata Striemen (der Doldenfrüchte).

vivipārus lebendig gebärend, sprossentreibend (vīvus u. pārio, 3. gebäre etc.).

Vochiniensis von den Vocheiner Alpen (Oberkärnthen).
vogesiacus von den Vogesen, aus dem Wasgau.
volēmus die hohle Hand ausfüllend.
volgo-uralensis von den Wolga-Uralländern.
volubilis windend (v. volvo, 3. winde etc.).
volūceris Fem. v. volūcer geflügelt.
volūmen, -inis „Volumen“, Umfang, Band.
volva Tasche, Hülle, -acēus hüllenod, scheideartig.
vomīeus brechenerregend (v. vomo, 3.).
vomitorius zum Erbrechen dienend (s. eb.).
Vorblatt z. B. achselständiger Blüten (A. Braun).
Vorkeim (protonēma) = bei Generationswechsel sich bildender (z. B. bei Chara).
Vratislava (Wratislava) Breslau.
vulgaris, -atus „vulgär“, gemein, gewöhnlich (v. vulgo mache gemein od. vulgus Volk).
vulnerans verwundend (vulnēro, 1.).
vulnerarius bei Wunden gebr. (vulnus, -ēris).
vulpīnus den Fuchs betr. (vulpes, -is).

Winterknospe = üb. Winter auf d. Wassergrund liegende Samenknospe der Hydrocharideen etc.
Wirbel (Quirl, verticillus), wirtelige Stellung = rings um einen Stamm im Kreise herum.
Wurzelspitze mit Wurzelhaube bei Wasserlinsen.

xanthophyllum Blattgelb, auch Anthoxanthin genannt = im Herbst zersetzes Chlorophyll.
xenia „Xenien“, Fremdengaben, Gastgeschenke (gr. ξενίαν v. ξενός fremd).
xerampelinus ($\xi\eta\alpha\mu\pi\epsilon\lambda\iota\omega\sigma$) trockenweinlaubfarbig, hochrotgefärbt ($\xi\eta\omega\sigma$ trocken).
xerophilus das Trockne liebend (s. eb.).
xestripetalus axt- od. beilblättrig, m. axt- od. beilförm. Kronblättern ($\xi\epsilon\sigma\tau\omega\sigma$ od. $\xi\epsilon\sigma\tau\omega\sigma$) i. q. dolabripetalus (dolabra).

xylēma, „Xylem“ = Holz- od. Splintstoff, Holzteil des Cambiums od. Gefässbündels.

xylīnus von Holz od. Baumwolle (*ξύλον*).

xylogénum, „Xylogen“ = Verholzungsstoff der Zellen.

xylóphyllus holzblättrig.

yuccoides yukka- od. palmlilienähnlich (*Yucca*, s. Nom.).

zeylanicus von d. Insel Ceylon.

zizianus nach dem Botaniker Ziz benannt.

zonalis gürtelig, d. Zone betr. (*ζώνη* Gürtel, „Zone“).

zonatus gegürtelt, mit Kreisbogen gezeichnet.

zoospórae, „Zoosporen“ = bewegliche od. Schwärmsporen.

zosteræfolius seegrasblättrig. **Zungenblüten** bei Compositen (*flores ligulati*).

zygomorphia (Schwendener) = „Jochbildung“, d. i. links u. rechts in gleichgeneigten Reihen, in über-einstimmendem Anschluss an d. vorhergehenden (s. hern.).

Zygomorphe Blüten (Schwendener) = d. Netzwerk der sich kreuzenden Parastichen ist symmetrisch, wie die beiderseit. Fischschuppenreihen (z. B. das Androecium der Ranunculaceen u. Lecythideen) (*ζυγός* Joch u. *μοσχή* Bildung, Gestalt).

zygospórae zwei durch Conjugation vereinte Sporen (*ζυγός* Joch, *σπορά*).

zymotícus, „zymotisch“, gärungs-erregend (*ζύμη* Sauerteig).

II. Etymologische Nomenklatur (Worterklärung der Pflanzennamen).

A. Lateinnamen.

Abacosa Alfld. (Leguminosen, XVII. 4) Heckenwicke, fr. vesce de haie, e. hedge-vetch (v. abācus Säulendeckplatte —wegen d. Samenform!), z. B. A. dumetorum Alfid. (Vicia d. L.).

Abasicarpon Andrz. (zu Arabis) Rchb. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Stielschotige“ Gänsekresse (δ priv., $\beta\acute{a}σις$ u. $zao:tos$ — nicht unmittelbar aufsitzt. Schote, diese besond. gestielt!), z. B. A. verna R. Br., arenosa Scop.

1) **Abela** Salisb. (Coniferen, XXI. 9) Abel's Zapfenbaum. 2) **Abelia** R. Br. (Caprifoliaceen, V. 1) „Abelie“, z. B. floribunda Decsn., chinensis R. Br. (u. Clarke Abel, 1816 Reise in China mit Lord Amherst, † 1826).

Abelmoschus Grah. (sc. Hibiscus) L. (Malvaceen, XVI. 8) Bisam-Eibisch od. -Malve, fr. mauve-musquée od. abelmosc, e. abelmusk, musk-seed (-rose) (v. abēlir verschönern, altfr. schmücken, u. moschus Bisam, Wtst.: arab. habbl Samen u. el-mosk Bisam), z. B. A. tetraphyllos Grah. (Indien) s. g. „Jute“, Bastfaser-Eibisch.

Abies (-ētis) Tourn. (sc. Pinus) L. (Coniferen, XXI. 9) Fichte od. Tanne, fr. pin, sapin, sapinette, e. pine-tree od. fir (Föhre) (altröm. Name derselben abies), z. B. Pinus Abies L. = Abies excelsa DC. Rich. s. Picēa Mill. Rottanne od. gem. Fichte, fr. sapin-rouge (- de Noryège), e. common spruce m. v. v.; A. pectinata DC. Lam. (Pin. Picēa L.) Edel- od. Weisstanne (Ab. alba Mill.), fr. sapin blanc od. épicea, e. combe-like-leaved Silver-Fir; A. alba Mchx. (Picea alba Lk., A. canadensis Mill.) Weissfichte Vilm., amerik. Schimmelfichte, fr. sapinette od. pesse blanche, e. white sprucefir; A. nigra Desf. Schwarzf. (A. Mariana Wangh., denticulata Poir. etc.); A. rubra Poir. (Pinus r. Lamb., Picēa r. Lk.) Rotfichte, fr. sapinette rouge, e. redsprucefir (rote Sprossen-F.) m. v. coerulēa Hort., u. a.

Abietinae Carr. (-tinēae Rich. DC.): Tsuga, Pseudo-Tsuga, Keteleeria, Abies, Picēa, Larix, Pseudo-Larix, Cedrus, Pinus = echte Tannen.

Abrōma L., W. (Büttneriaceen R. Br. V. 1) Cacao-Malte, fr. abrome (δ ohne, $\beta\acute{a}ρωμα$ Speise — Gegensatz zu Theobrōma Chokolade!), z. B. A. fastuosum Jacq. (Theobroma augusta L. s. fastuosa Jacq.) (Philippinen).

Abromia Juss., Lam. (Nyctagineen, V. 1) „Zarthülle“, californ. Primel Dietr. (v. $\alpha\beta\acute{a}o\mu\sigma$ zart, elegant etc.), z. B. A. fragrans Nutt., umbellata Lam. (Trieratūs admirabilis l'Hér.).

Abrotānum (sc. Artemisia) L. (Compositen Anthemideen, XIX. 2) Eberreis, Stabwurz, Gartheil O. W., fr. aurone od. abrotone, citronade

(-nelle) „Citronenkraut“, e. southern-wood (gr. ἄβούταρον „Eber-raute“, v. ἀβούς zart, niedlich — bez. d. Blätt., Wtst.).

Abrus L. (Leguminos. od. Papilionaceen, XVII. 4) Kranzerbse, Pater-nosterstrauch, fr. conduri, liane bon Dieu, pois-de-badeau, pois rouges d'Amérique, e. bead's-tree (v. ἀβούς zart etc.), z. B. A. pre-catorius L. (Glycine Abrus autt.).

Absinthium (sc. Artemisia) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Wermut, fr. absinthe, e. worm-wood (gr. ἄψινθιον v. ἀ priv. u. ψίνθος Vergnügen — bitt. Geschmack, Wtst., nach d. Fluss Absus in Palä-stina, Plin.), syn. Absinthium vulgare Fl. Wett.

Abutilon Adans. (sc. Sida) L. (Malvaceen, XVI. 8) Schmuck- od. Schön-malve Rmpl., Sammetpappel, (- malve), fr. abutilon alt. Name für Malve, v. ἀ nicht, βούς Rind u. τιλός Durchfall-?), z. B. Zier. A. megapotamicum A. St. Hil., A. hybridum Lemoini (Winterzier.), viti-folium Presl. (Chili), vexillarium E. Morr. m. v. marmoratum; insigne Planch. u. a.

1) **Acacia** Neck. (zu Mimosa) Rchb. (Mimoseen, XXIII. 1) Akazie (wahre), fr. cassie, acacia des Jardiniers (gr. ἄκαστη v. ἄκη Dorn, i. q. ἄκανθα Dornbaum), z. B. (Stuben) A. grandis, Farnesiana, lophantha, m. Blattphyllodien: armata R. Br., cordifolia Sw., etc. 2) **Acacia** germanica G. Fr. (Amygdalaceen, XII. 1) Schlehedorf = Prunus spinosa L.

1) **Acalypha** L. (Euphorbiaceen, XXI. 4) Brennkraut (ἀ pr., οὐλὸς schön, ἀρπή Berührung), z. B. A. indica L. (Mercurialis zeylanica Herm.), (Gärten) A. Wilkesiana Seem. (tricolor Hort.). 2) **Acalypha** Mappa W. (Ricinus M.-L., Folium Mappae Rumph.) Tischtuch-Ricinus, fr. ricinelle (Molukken). — Acalyphacēae Klitz. Grck. (-phēae zu Rutaceae Rchb.).

Acantholimon Boiss. (Plumbagineen, V. 6) Dornnelkengras (ἄκανθα u. λευκών Wiese), z. B. Zier. A. venustum Boiss. (Statice v. Fenzl), glumaēcum s. Armeriopsis u. Staticopsis.

Acanthus T. (Acanthaceen od. Rhinanthal. XIV. 2) Stachel-Bärenklau, Bartsch, wälsche Bärenklau, G. Fr., fr. acanthe, branche, branc-ur-sine, pied-d'ours, e. brook-ursine (gr. ἄκανθος Dorn), z. B. Zier. A. mollis L., e. soft bear's-breech, grandifolius Hort., fr. grande berce, etc. — Acanthacēae R. Br.

Acer (-ēris) L. (Aceraceen od. Sapindaceen, XXIII. 1) Ahorn, fr. érable, e. maple-tree (v. d. celt. ac Spitz? od. lat. acer, -ēris stark? od. ἀ int. u. ζέρας Horn, wesh. Neutr.! — ungewiss), z. B. A. campestre L. Masholder, fr. érable, e. water-elder, whitten-tree, Zier. A. polymorphum Zucc., e. Japanese Maple, m. v. dissectum, v. roseo-marginatum Hort.; A. platanoides L. Spitzahorn, s. g. Lönne (Lenne), fr. main découpée, m. v. v. dissectum, laciniatum s. crispum; A. monspessulanum L. Ahorn v. Montpellier, etc. — Acēra Juss. Endl., -racēae Grck., -rinēae DC. Ahornbäume (Ord. Malpighinae Bartl.).

Acēras R. Br. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) „Ohnhorn“, Ohnsporn-Orche (ἀ pr. u. ζέρας Horn), z. B. A. anthropophōra R. Br.

1) **Acetosa** u. **Acetosella** (sc. Rumex) L. (Polygonaceen, VI. 3) Sauer- u. Spitzampfer, fr. oiseille des jardins (ordinaire), e. sorrel, und fr. réne-bré, e. spear-sorrel (v. acētum Essig). 2) **Acetosella** (sc. Oxalis) L. (Oxalideen, X. 4) Sauerklee, fr. pain-du-coucou, allélulia, e. wood-sorrel. 3) **Acetosa** (sect. Rumex) Rchb. zweihäus. Ampfer XXI. 6), z. B. R. Acetosella L., scutosa L. (Schildampfer) etc.

Achania Sw. (Malvaceen, XVI. 8) Tuten- od. Dütenmalve (v. ἀχάνεια weite Öffnung, Wtst. v. αχανής nicht gähnend — Blüten zusammen-gedreht!), z. B. A. mollis Ait. (Malvaviscus m. autt.), A. Malvaviscus Ait. Sw. (Malvaviscus arborēus Cav.).

- Achillēa** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Schafgarbe, fr. achillé, herbe à la coupure, e. nose-bleed (Plin.: Achilles heilte damit den von ihm verwundeten Telephus; Andere n. Chirons Sohn Achilles, Myth.), z. B. A. Millefolium L. „Tausendblatt“, fr. mille-feuille, e. millefoil.
- Achimēnes** R. Br. Vahl (Gesneriaceen, XIV. 2) Achimenes (Leonis st. Achaemēnis „Achaemenide“ — altpers. Name, Plin.: bernsteinähn'l. Kraut Indiens), z. B. (Warmh.) cuprea R. Br. (Hängpfl.), patens Benth., longi- u. grandiflōra DC., etc.
- 1) **Achras** L., Wallr. (Styracineen od. Sapotaceen, VI. 1) Sapotillbaum, Breiapfel Dier., fr. sapotier (gr. ἄζωας Mispel, Wurgbirne), z. B. A. Sapota L. 2) **Ahras** (sc. Pirus) Gärtn. (Pomaceen, XII. 4) Holzod. Feldbirnbaum, fr. poirier commun, e. common pear-tree m. v. v. (z. B. fl. pleno Hort.), syn. Pirus L. (Pyraster Bkh.) communis L.
- Achyranthes** L. (Amarantaceen, V. 1) „Spreublume“, fr. cadelari (v. ἄχυρον Spreu, ἄρθη Bl.), z. B. A. Verschaffelti Lem. (Iresine Herbstii Hook.), capituliflōra Coll. (Pfaffia s. Brandesia puberula Mart.), lanata Mill. s. villosa Forsk. (Amarantus ind. Pluk.) syn. Illecebrum lanatum L.
- Achyrophorus** Gärtn. D. Don (zu Hypochoeris) Rehb. (Compos. Cichoreen, XIX. 1) Hachekopf, „Spreuträger“ (s. eb. u. φορός tragend — nöml. d. Fruchtboden), z. B. radicatus Scop. (Hypochoeris r. L.), auch s. Seriola u. Porcellites Cass.
- Acianthus** R. Br. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Spitzenblume“, Borstenpunkt (ἄξις, -ίδος Spitze — d. äuss. Blütenblättch. begrannt!) s. Epipactis Poir.
- Acinēta** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Steiflippe“ (ἄξιντος unbeweglich etc.), z. B. Barkeri Paxt., chrysantha Ldl. (Amer.) etc.
- Acinos** Mnch. (Labiateen, XIV. 1) Basilién-Thymian, e. wild basil (gr. ἄξιρος i. q. ὄξιμος lat. Ocimum, Basilienk.), A. thymoides Mnch. = Calamintha Acinos Clairv. (Thymus Ac. L.).
- Aemella** Pers. Rich. (sc. Spilanthes s. Verbesina) L. (Compos. Anthemid. od. Heliantheen, XIX. 3) „Scharfblatt“, s. g. ABC-Pflanze, Kau-blatt W. (dim. v. ἄξιμη Schärfe — zwergh. Pfl. m. Blätt. v. stechend. Geschmack).
- Aenīda** L. (Chenopodiaceen, XXII. 6) Hanf- od. „Nesselgänsefuss“, s. g. virgin. Hanf, fr. bangue (ἀ pr. u. ξρίδη Brennnessel — wie Br., sticht aber nicht), Zier. A. cannabina Murr.
- Aeonītum** T. (Ranunculaceen, XIII. 3) Sturm- od. Eisenhut, fr. aconit u. napel, fleur-en-casque, e. monk's-hood, aconite, wolf's-bane (v. ἐν ἀζόναις auf Felsen, ἀζούτον Theophr.), z. B. Stoerkianum Rehb., fr. chaperon de moine, char de Vénus, etc.
- Aeōrus** L. (Acoraceen od. Aroideen, VI. 1) Kalmus (gr. ἄξοος ungeschmückt, od. v. ἄξος Heilung), A. Calamus L., fr. acore, roseau aromatique od. odorant, e. sweet-flag od. -rush, spicewort, Gartenpfl. A. graminēus Ait. var. variegatus Hort.
- Acotylēae** Grck., Acotyledonēae Juss. DC. „Acotylen“ d. i. Samen-lappenlose (Kryptogamen L.) (ἀ pr. u. κοτύλη s. κότυλος eig. Höhlung, Knochenpfanne, Becher etc.).
- Acramphibryā** Endl. „Endumsprosser“ Endl. (ἄξοα Ende, ἀμφὶ um, βαῖω sprosse).
- Acranthēae** Endl. „Spitzblüter“ (Gräser) (s. eb. u. ἄρθη Blüte).
- Acroblastae** Rehb. „Spitzkeimer“ (s. v., βλάστη Keim, Trieb).
- Acrobryā** Endl. „Endsprosser“ Endl. (ἄξοον Ende, βαῖω sprosse).
- Acroclinium** Hook. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Immortelle, fr. immortelle, e. everlasting-flower (v. ἄξοα Spizze, κλίνω neige — vor d. Aufgehen geneigte Spizze!), z. B. Gärt. A. rosum Hook., s. Gnaphalium T.

- Acrocomia** Mart. (Palmien, XXI. 6) „Gipfelbusch“ (s. eb. u. *ζόωη* lat. *coma* Haarschopf etc. — Blütenbüschel!), z. B. *A. scleroarpa* Mart. „Hartnuss“, etc. s. *Cocos* L.
- Aeronychia** Forst. (Rutaceen, VIII. 1) „Spitznäglein“ (s. v. u. *στρυξ*, *-χος* Nagel, Klaue — an d. Kronzipfeln!), z. B. *A. laevis* Forst. (Neucaled.) s. *Lawsonia Acronychia* L.
- Acropéra** Lindl. (Orchideen Vandean, XX. 1) Lippensack (s. v. u. *πιγα* lat. *péra* Sack, etc.), z. B. *Loddigesii* Lindl. (*Maxillaria galeata* Ldl.).
- Acrophyllum** Benth. (Cunoniaceen, X. 1) „Endblatt“ (s. v. n. *φύλλον* Laubblatt) syn. *Calycomis* Don u. *Weinmannia* Cunn., z. B. *A. venosum* Benth.
- Aeroptéris** Sm. Lk. (Farne, XXIV. 1) „Spitzfarn“ (s. v., *πτερίς* Farn v. *πτερόν* Feder — Früchtchen an d. Spitze der Fiedern!).
- Acrostichum** L. (Farne od. Polypodiaceen, XXIV. 1) Zeilenfarm, „Spitzreihe“ (*ἄκτον* Spitze od. Anfang, *στήχος* Zeile, „Akrostichon“, Vers mit Anfangsbuchstaben — so unterseits d. Wedel!) Zier. *A. alcicorne* L. (*Platycerium grande*, Neusüdwales), *A. crinitum* L. (Antill.) etc. — *Acrostichaceae* Mett.
- Actaea** L. (Ranunculaceen od. Papaveraceen, XIII. 1) Giftähre, *A. spinata* L. s. g. Christophskraut, Schwarzw- od. Wolfskraut, fr. actée od. herbe de St. Christophe, e. herb-Christopher od. spiked baneberry (gr. *ἄκταιος* am Ufer, *ἄκταια* eig. Hollunder — Fruchtähnlichkeit!).
- Actinidia** Max. Lindl. (Dilleniaceen, XIII. 1) Strahlennarbe, eig., „Strahlengleiche“ (v. *ἄκτη*, *-ίος* Strahl, *εἴδουμεν* gleiche — Narbe strahlig!), z. B. Zier. *A. Kolomikta* Maxim. (Mandschur. Str.).
- Actinoeylus** Klotsch (Rhodaceen, X. 1) „Strahlenkreis“ (s. eb. u. *ζύζλος* lat. *cyclus* Kreis etc. — bez. d. fünfsdrüs. Narbe!), z. B. *A. secundus* Kl. (Piröla sec. L.).
- Ada** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Edle“ (v. adal althochdeutsch „edel“ geb. weibl. Name, Fem. v. *Ado*, wie *Adela* von *Adelo*!).
- Adamia** Wall. (Saxifragaceen, X. 2) „Adamie“, z. B. (Winterbl.) versicolor Fort. (China) s. *Hydrangea* (n. d. uralt. landw. Schriftstellern Adami I u. II, Paxton: n. Dr. med. John Adam in Calcutta).
- Adansonia** L. (Malvaceen, XVI. 8) Affenbrodbaum, Riesenbaum Dietr., *A. digitata* L., fr. pain de singe, calebassier du Sénegal, e. monkey's-bread (n. d. Natf. Mich. Adanson aus Aix, s. d. Aut.).
- 1) **Adélia** L. (Euphorbiaceen, XXII. 13) „Versteckfrucht“ ($\ddot{\alpha}$ pr. u. *δηλός* sichtbar — Fruchteile kaum bemerkbar!), z. B. *A. ricinella* L., fr. ricinelle „kleiner Wunderbaum“. 2) **Adelia** P. Br. Mchx. (Jasmineen, XXII. 2), z. B. *acuminata* Mchx. s. *Forestiera* Poir. (*Borya* W.).
- Adenandra** W. (Rutaceen Diosmeen, V. 1) „Drüsenanthere“ (v. *ἀδήνη*, *-έρος* Drüse, *ἀνηρ*, *-δος* Mann, Bot. Staubbeutel — Drüse an d. Antherenspitze!), z. B. *fragrans* R. u. S. (*Diosma* fr. Bot. M.), *umbellata* W. (*Diosma cistoides* Lam., *Hartogia uniflora* Berg.) m. v. multiflora.
- Adenanthera** L. (Mimoseen, X. 1) „Drüsenanthere“, Korallenerbse (s. eb. u. *αρθίσα* Staubbeutel — diese mit Drüsen), z. B. *A. pavonina* L. Korallen- od. Kondoriholz, s. g. Bastard-Pfauenschwanz.
- Adenocalymna** Mart. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Drüsenhülle“, -kelch Rmpl. (s. v. u. *ζάλυμα* od. *-ύρα* Hülle i. q. calyx), z. B. Zier-kletterstr. *A. nitidum* Mart. (Brasil.), *comosum* Mart. etc.
- 1) **Adenocarpus** DC. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) Drüsenhülse, „-frucht“ (s. v. u. *ζαυτός* Frucht — Hüls. m. Drüsen), z. B. Zier. *A. wolgensis* Spr. (*Calophaca wolgarica* Fisch., *Cytisus* w. L. f., *Colutea* w. Lam.), *foliolosus* DC. etc. 2) **Adenocarpus** Don (Compos.) (d. warz. Achenien m. zwei spitzhök. Flügeln!).

- Adenophōra** Fisch. (Campanulaceen, V. 1) Schellenblume, Drüsenglocke Leun., fr. cloche glandulée, e. glandulous bell-flower (s. v. u. *γορός* tragend — nämli. a. d. Bas. d. Griffels!), z. B. Zier. liliifolia Ledeb. s. Campanula lil. L.
- Adenostyles** Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Drüsengriffel“, Pestwurz (s. v. u. *οτύχος* od. -*ις* Griffel — lange Griffelnarben m. warz. Drüsen!), z. B. alpina Cass. Alpendost Leun. = Cacalia alpina L.
- Adiantum** L. (Polypodiaceen od. Farne, XXIV. 1) Krull- od. Haarfarn, s. g. Frauenhaar, fr. adianté, capillaire, e. lady's hair, maiden — (v. *αδιάρτος* trocken, n. Plinius beim Eintauchen nicht nasswerdend!), z. B. Stubenf. A. capillus Venēris L., e. Venus-hair, A. rubellum Moore, pedatum L. canad. Frauenh., e. pedate-maiden-hair, A. peruvianum u. a.
- Allumia** Raf. (Fumariaceen, XVII. 2) „Zünd-Erdrauch“ (lat. ad u. lumen, fr. allumer anzünden), z. B. Spalier- u. Mauerpfl. A. cirrhosa DC. rankender E., fr. fume-terre grimpante, e. tendrilled Allumia s. Corydalis fungosa Vent. (Fumaria f. Ait.).
- 1) **Adōnis** L. (Ranunculac. XIII. 7) Teufelsauge, Blutströpfchen, fr. adonide, oeil de faisant „Fasanenauge“, e. pheasant's od. bird's-eye „Vogelauge“ (n. Adonis, Liebl. d. Venus, aus dess. Blut die Blume ent-sprang, Myth.), z. B. Topf. A. vernalis L. Berg- od. Frühlings-A., fr. adonide printanière, e. spring-ph.-eye, Gärt. aestivalis L. Sommer-A. s. g. braune Magd, fr. oeil-de-phaisan, e. summer-ph.-eye, Saat autumnalis L. 2) **Adōnis** Rabh. (sc. Mycena) (Pilze, XXIV. 4) schöner Helmpilz Rabh.
- Adoxa** L. (Araliaceen, VIII. 4) Moschus- od. Bisamkraut, A. Moschatellina L. (*αδοξός* unberühmt — unscheinb. Blüten!).
- Aechmēa** Rz. Pv. (Bromeliaceen, VI. 1) „Blütenspitze“-Ananas (v. *αίζμη* Lanzen spitze — Zipfel d. Blüten!), z. B. A. Veitchii Morr., fulgens R. P., miniata discolor Hort., s. Chevalliera Beer.
- Aecidium** Pers. (Pilze, XXIV. 4) Rostpilz, Becherrost (v. *αἰζίτω* miss-handle? od. Paxton: *αἴζιον* Rad u. *εἴδομαι* gleiche? — unsicher!), z. B. A. berberidis P., Berberizien-Rost (— eine Generation von Uredo s. Puccinia graminis, s. d.).
- 1) **Aegilops** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) Knopperf- od. Ziegenbart-Eiche, fr. chêne à grosses cupules (gr. *αἰγίλων* v. *αἴξ*, -*γος* Ziege, *ών* Aussehn). 2) **Aegilops** L. (Gräser, XXIII. 1) Walch, s. g. wilder Weizen, fr. coquioule, Dünnschwanzgras „Ziegenbart“, s. Rhabdochloa P. B.
- Aegopodium** L. Umbelliferen, V. 2) „Geisfuss“, Geier, Giersch, fr. pied-de-chèvre, e. goat-wort (s. eb. u. *πόδιον* lat. podium Fussocke, Fuss-gestell), z. B. Zier. A. Podagraria L. v. fol. varieg. Hort. s. Seséli Aegopodium Scop.
- Aērides** Sw. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Luft“-Orche, fr. fleur de l'air (v. *ἀέρος*, -*έρος* Luft — treibt Luftwurzeln!), z. B. macrostachya Spr. (Epidendron m. Thou., Beclaria m. A. Rich.). — Ähnlich Aēranthus Lindl. u. Aērobium Spr. = Angraecum Thouars.
- Aeschynanthus** Jack (Bignoniac. od. Cyrtandraceen, XIV. 2) Scham- od. Sinnblume, fr. sensitive, e. shame-flower (v. *αἰσχύνουμαι* schäme mich od. Wtst. *αἰσχύνω* verunstalte u. *ἄρθρος* — sonderb. Blütenform!), z. B. grandiflorus Spr. (Incarvillea gr. Spr., Bignonia gr. Thb.), Hängpfl. Boschianus Jack.
- Aescūlus** (Escūlus) L. (Sapindaceen od. Hippocastaneen, VII. 1) Ross-kastanie, Sperwe O. W., fr. maron d'Inde, e. horse-chest-nut (v. esca Speise — wie lucus a non lucendo), z. B. A. Hippocastānum L., fr. la hippocastane, e. (s. eb.); Zier. A. rubicunda Lois. (carnēa Lindl., rosēa Hort.) = Aesc. Hippoc. var. rubicunda Schub.; A. Pavia L. s.

- Pavia Boerh., A. macrocarpa Hort. m. v. v. coccinēa u. marginata Hort.; A. macrostachyā Mchx., A. glabra W., A. pallida W., A. flava DC. (Pavia lutea Poir.), A. humilis Lodd. Zwerg-K., fr. chincapin (Amer.) u. a. **Aethalium** Lk. (Schimmelpilze XXIV. 4) Russpilz od. Russling, Salbenschwamm, s. g. Lohblüte (v. *αἰθαλίων* hitzig, od. *αἴθαλος* od. -*η* Russ!), A. flavum s. septicum, fr. fleur de tan, e. tan-flower, = Fuligo Hall.
- Aethionēma** R. Br. (Siliculosen, XV. 1) „Dürrfaden“, Steinkresse, fr. aethionème (*αἴθος*, -*εος* Hitze etc., *ῥύμα* Faden — Staubfäd. wie versengt!), z. B. saxatile R. Br. (Thlaspi sax. L.), Zier. cordifolium DC., fr. aeth. à feuilles de Coris.
- Aethiōpis** Barr. (sc. *Salvia*) L. (Labiaten, II. 1) äthiopische od. syrische Salbei (gr. *Αἰθιοπή*; Aethiopierin), z. B. A. laciniata Barr. = Hormīnum syriacum Moris.
- Aethūsa** L. (Umbelliferen, V. 2) Gleisse, Hundspetersilje, Gartenschierling, fr. persil des fous, petite ciguē, e. dog's-parsley, A. Cynapium L. (v. *αἴθω* brenne etc. Part. Fem.).
- Agallocha** (sc. *Excoecaria*) L. (Euphorbiac. XXII. 3) Blendebaum (Arbor excoecans Rumph.), Paradies-Aloesholz, fr. calembac (-bouc od. -part) (v. d. arab. aghaludjy geb.) syn. Agallochum praestantissimum u. secundum Rumph. (Aquilaaria ovata L.).
- Agalmýla** Blum. (Bignoniac. XIV. 2) „Waldschmuckbaum“ (*ἄγαλμα* Prachtstück, *ἴλη* Wald), A. staminēa Bl., s. Trichospōra u. Trichospermum Blum.
- Aganōta pulchra autt.** = Andromēda floribunda Bot. Mag. (*ἀγαντός* lieblich).
- Agapanthus** l'Hér. (Liliaceen VI. 1) „Liebesblume“, Schmucklilie, fr. agapanthe, e. african lily (*αγάπη* Liebe, *ἄνθος* Bl.), z. B. Zier. A. umbellatus l'Hér. s. g. blaue Tuberose, fr. ag. en-ombelle od. bleu, e. umbellate od. blue african lily, s. Crinum L. u. Maulhia Thb.
- Agariēns** L. (Pilze, XXIV. 4) Blätterschwamm, fr. agaric, e. agarick (mush-room) (gr. *αγαρίζω* Diosc.), z. B. A. muscarius L. Fliegenschw., fr. ag.-de-mouche, e. toad-stool, A. quercinus L., fr. chénier u. fausse orange, A. speciosus L., fr. orange, A. pratensis L., fr. macaron des près, A. integer L., fr. roumonet, A. campestris L., fr. champignon, u. a. m.
- 1) **Agarista** Don (Ericaceen, X. 1) Torfheide (Agarista, gr. Frauenname, Wtst. v. *ἄγα* sehr, *δημότης* d. beste) = Andromēda L. 2) **Agarista** DC. (Compos. Tageteen, XIX. 2), z. B. maritima DC. (Südecaliforn.) = Leptosyne maritima Ass. Gray.
- Agathaea** (-thēa) Cass. (Compos. Astereen, XIX. 2) Cap-Aster, Schön- od. Himmelsblume (v. *ἄγαθος* herrlich, Wtst. v. *ἄγαθη*, *-ιδης* Knäuel? — Blütenknäuel!), z. B. Topf. A. ameloides DC. s. coelestis Cass., s. Cineraria ameloides L.
- Agathophytum** Moq. (Chenopodiaceen, V. 2) Gutkraut, Gut-Heinrichkr., A. Bonus Henricus Moq., fr. bon Henri (s. eb. u. *ցւրօն* Pflanze — analog Bonus Henricus) syn. Chenopodium B. H. L. u. Blitum B. H. C. A. Mey.
- Agathosma** W. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Gutgeruch“, Duftraute (s. v. u. *օսմη* Duft etc.), z. B. A. hirtum u. barbatum Spr., s. Bucco, Hartogia u. Macrostylis Bartl.
- Agāye** L. (Amaryllideen od. Bromeliaceen, VI. 1) Baum- od. Wunderaloe (*Ἀγαύη*) Herrliche od. Erlauchte, Tochter d. Cadmus v. Theben, Myth.), z. B. A. americana L. m. v. marginata Hort., Gilbeyii Hort., filifera, fr. lin d'Amérique, u. a.
- 1) **Ageratum** L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) Leberbalsam, Bastard-hanf Dietr., fr. agérate, eupatoire de Dioscoride od. bleue u. Célestine, e. blue maudlin (gr. *ἄγριατος* nicht alternd — bekommt keinen w.

Pappus!), z. B. Zier. A. coelestinum Sims od. coeruleum Desf. var. (Coelestina coerulea Cass.) u. A. mexicanum Vilm. v. celest. nanum Hort. (Zwergform), fr. Célestine naine, e. dwarfsky-coloured-maudlin. 2) **Ageratum** (sc. Achillaea) L. (Comp. Anthemid. XIX. 2) Gewürzgarbe Mössl. Rchb., Balsamgarbe, fr. eupatoire de Mésué.

Aggregatae Endl. Rchb. Bartl. Ord. d. Gehäuftblütigen od. Häufelblütler Rchb. (aggregatus zusammengesellt).

Agnostus Cunn. (Proteaceen, IV. 1) Fremd-Silberbaum ($\alpha\gamma\rho\omega\sigma\tau\circ\delta$ unbekannt), z. B. Gewächsh. sinuatus Cunn. u. integrifolius ds., s. Stenoecarpus R. Br.

Agraphis Lk. (Lilaceen, VI. 1) „Unbezeichnete“, Hasenglöckchen Grck., Bastardhyacinthe, fr. hyacinthe bâtarde (Bastard v. Hyacinthus u. Scilla) ($\alpha\gamma\varphi\eta\tau\circ\varsigma$, lat. non scriptus unbeschrieb., d. i. ohne Zeichen auf d. Kronbl!)), z. B. Zier. A. cernuus Rchb. Hoffm. m. v. v. (Hyacinthus belgicus Hort. s. cernuus L., Scilla non scripta Bot. Mag., Endymion non ser. Grck.), A. nutans Lam. s. coerulea Hort., s. Hyacinthus non ser. L.

Agrimonia T. (Rosaceen, XI. 2) Odermennig, Leberklette, fr. aigremoine, e. agrimony (n. Einigen eig. Argemonia v. $\alpha\gamma\epsilon\mu\alpha$ Augenkrankheit, wohl v. $\alpha\gamma\delta\circ\varsigma$ Acker, $\mu\sigma\tau\eta$ Wohnort).

Agropýrum G. (zu Triticum L.) (Gramineen, III. 2) „Ackerweizen“, Quecke, fr. chiendent „Hundszahn“ od. panic rampant, e. quitch-grass „Queckengras“ (s. v. u. $\pi\varphi\circ\varsigma$ Weizen), z. B. A. repens, caninum etc.

Agrostemma L. (Sileneen, X. 4) „Ackerkranz“, Kornrade, fr. fausse nielle („Nigelle“) od. nielle des blés, gerzeau u. coquelourde, e. corn-rose, cockle, corn-bottle (s. v. u. $\sigma\tau\epsilon\mu\mu\alpha$ Kranz, Krone — Nebenkronen um d. Schlund d. Krone!), A. Githago L., Zier. A. Coeli-rosa L., fr. coquel. Rose du ciel, e. rose of heaven „Himmelsröschen“, A. flos Jovis L., fr. coquel. fleur de Jupiter, e. Jove's flower, s. g. Bergrade (Lychnis coronaria alpina Barr.).

Agrostidæa Kth. Strauss- od. Windhalmgräser, s. sogl.

Agrostis L. (Gramineen, III. 2) Straussgras, fr. agrostide od. éternue (gr. $\alpha\gamma\omega\omega\tau\circ\varsigma$), z. B. Zier. A. capillaris Hort. s. nebulosa Boiss., fr. a. capillaire od. nébuleuse, e. common bent-grass, wild A. spica venti L. Windhalm, fr. éternue éventée (Apéra Spica venti P. B.), A. alba L. v. stolonifera E. Mey, s. g. Fioringras, fr. terre-nue, A. canina L. u. vulgaris With. (stolonifera L.).

Ajacis (sc. Delphinium) L. (Ranunculac. XIII. 3) Garten - Rittersporn (grosser R.) (d. Krommittellappen mit dem gr. ΑΙΑ bezeichn., Vergil's Eklogen).

Aigeiros Dub. (zu Populus L.) (Salicaceen, XXII. 7) Schwarzpappeln (gr. $\alpha\gamma\epsilon\iota\circ\varsigma$; Schwarzpappel).

Ailantus (nicht -thus) Desf. (Terebinthaceen od. Xanthoxyleen, XXIII. 1) Götzen- od. Götterbaum, persischer Sumach, japanischer Firmissbaum (n. d. molukk. ailanto „Himmelsb.“) Zier. A. glandulosa W. (procéra Salisb.), fr. ailanthe du Japon (Vernis -), e. ailanto, s. Rhus sinense Elly s. cacodendron Ehrh. „Unglücksbaum“.

Aira W. (Gramineen, III. 2) Schmiele, Schmelengras, fr. erbin, canche, e. bulrush (Wtst. v. $\alpha\iota\circ\omega$ nehme weg — nämli. d. Leben!), z. B. Zier. A. pulchella W. (elegans Gaudin, Avena eleg. M. K.), fr. canche élégante od. délicate, e. nice corn-grass.

Aitonie L. f. (Rutac. od. Meliaceen, XVI. 4) „Aitonsstrauch“ (s. d. Aut.) A. capensis Thb. (Zierstr.) = Cotyledon fol. linear. Burm.

Aizoidæa Rchb. Spr. (zu Ord. Succulentae Bartl.) s. sogl.

1) **Aizoon** L. (sc. Saxifraga) Jacq. (Saxifragaceen, X. 2) „ewiglebender“ od. kleiner Steinbrech ($\alpha\epsilon\iota\circ\omega$; ewiglebend). 2) **Aizoon** Jacq. (Ficoides Glaser, Botan. Wörterbuch.

- deen Juss. Aizoideen Spr. XII. 4) Immergrün Dietr., e. ayegreen, z. B. hispanicum L. = Aëonia Tausch. 3) *Aizōon* (sc. Sedum) L. (Crassulaceen, X. 5) s. Aiz. peregrinum Rchb.
- Ajūga** L. (Labiateen, XIV. 1) Untermäulchen, Günsel, fr. bugle, herbe de St. Laurent, e. bugle (α priv. u. $\zeta\nu\gamma\circ\prime$ lat. jugum Joch — nämli. Obermaul, welches fehlt! Leunis u. K. König: v. $\ddot{\alpha}\gamma\upsilon\circ\zeta$ gliederschwach — geg. Gicht!? Wtst. u. K. König: st. abīga v. abīgo treibe ab — ?), z. B. genevensis L. (Bugula montana Riv.), fr. bugle de Genève, e. Genevian b., reptans L., fr. petite consoude.
- Akebia** Decsn. (Menispermac., XXI. 6) „Akebie“ (n. d. japan. Nam. d. Pfl. akebi), z. B. Zierschlingpfl. A. quinata Thb. (Japan).
- Alaternus** T. (sc. Rhamnus) L. (subg. v. Rhamnus Mill.) (Rhamnaceen, V. 1) Alaternbaum, immergrüner Weggorn, fr. nerprun alaterne, A. latifolius (Phyllica elatior Bauh.) (Südeur.) (v. alterno wechsle ab — nämli. Blattstellung, Wtst.).
- Albersia** Kth. (Amarantaceen, XXI. 5) Wegfuchsschwanz Seub., „Albersie“ Grck. (n. J. Chr. Albers, Med.-Rat in Berlin, g. 1795) A. Blitum Kth. = Amarantus Blitum L. (Euxòlus viridis Moq.).
- Albūca** L. (-cēa Rchb.) (Amaryllideen od. Liliac. VI. 1) „Weisslilie“, Stiftblume (v. albus weiss), z. B. nutans Rchb. (Ornithogálum n. L.) Zier. A. major Dryand., cornuta Desf. u. a.
- 1) **Aleanna** (Alk.-) Rumph. Tausch. (Boragineen, V. 1) „Alkanna“ od. Rotwurz, e. alcanna-root (arab. N.), A. tinctoria L. 2) **Alkanna** spinosa G. = Lawsonia spin. L. (Lythrarieen, VIII. 1). 3) **Ale-** Munt. (Berberideen, VI. 1) = Prinos verticillatus L. (Aquifolium fol. deciduū Duham.).
- 1) **Alcēa** (sc. Malva) L. (Malvac. XVI. 8) spitzblättr. Malve Grck. s. g. Siegmarswurz. 2) **Alcēa** L. (zu Althaea Rchb.) Zier. A. rosēa L. Stockrose, grosse Gartenmalve, fr. mauve de jardin, passe-rose (rose tremière od. d'outre mer), e. rose-mallow u. hollihock (holy-oak), s. Althaea sinensis Cav. (v. $\ddot{\alpha}\lambda\kappa\eta$ Wehr, Hülfe). 3) **Alcēa** L. (Malvac. XVI. 8) Heil-M., z. B. rosēa L. u. ficifolia L.
- Alchemilla** T. (Rosaceen, Dryadeen, IV. 1) Sinau, Frauenmantel, fr. man-telet des dames, alchimille, e. lady's mantle, alchimilla, auch Löwenfuss, fr. léontopétalon „Löwenblatt“, Bärenfuss Vilm. (v. d. arabisch. Namen d. Pfl. alkemelyeh, nicht v. Alchemie!).
- Aldrovanda** Mont. (bess. -dia Grck.) (Droseraceen, V. 5) Blasenfaden, A. vesiculosa L. (Lentiscula palustris indicā Pluk.) (n. Ulyss. Aldrovandi, s. d. Aut.) s. Drosera L. (Drosoφyllum Lk.).
- Alectotorolōphus** Hall. (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Hahnenkamm“, s. g. Klapper, fr. galinette, e. cock's-comb (-weed) (v. $\ddot{\alpha}\lambda\epsilon\tau\omega\varphi$ Hahn, $\lambda\circ\gamma\circ\zeta$ Kamm, Schopf), z. B. major Rchb. u. minor Wimm. Grab., s. Rhinanthus Crista Galli L. (var. a. u. b.).
- Alétris** L. Liliaceen od. Smilaceen, VI. 1) Mehllilie, „Müllerin“, Runzelblume D. ($\ddot{\alpha}\lambda\epsilon\tau\circ\zeta$; v. $\ddot{\alpha}\lambda\epsilon\iota\alpha\circ$ Mehl — mehlicher Überzug!), z. B. Zier. capensis L. (Veltheimia c. Réd. s. viridifolia Jacq.), japonica (Funkia lancifolia Spr.), A. fragrans L. (Dracaena fr. Gawl.), Rotheana (Drac. R.) (moderne Blattpfl.), A. Uvaria L. (Tritoma Uv. Ker) u. a.
- Aleurites** Forst. (Euphorbiac. XXI. 9) „Mehlbaum“ (v. $\ddot{\alpha}\lambda\epsilon\nu\circ\tau\eta\zeta$ von Weizenmehl etc. — B. wie mit Mehl bedeckt!), z. B. lacciféra Gummi-lackbaum = Croton lacciférum L. (Haleucus terrestris Rumph.), A. molluccana W. (Jatropha mol. Sw.) u. a.
- Algae** Juss. DC. Klasse der Algen, Algīnae Bartl. Ord. d. Algen (Wtst. v. alligo fessile, umbinde).
- Algarobia (-ba)** DC. (Mimoseen, XXIII. 1) Johannisbrod-Mimose od. Algarobenbaum (v. d. span. algarrobo Johannisbrod), z. B. A. juli-flōra W.

Alhagi T. Desv. (sc. *Hedysārum*) L. (Leguminos. *Hedysareen*, XVII. 4) Mannaklee, persisches od. Juden-Manna, türk. Süssklee, wilder Honig, fr. manne d'Alagi (- en grain, - de Perse) (arab. Name dafür!). — *Alhagēa* DC.

Alhenna Walt. (Lythrarieen, VIII. 1) echte Alkanna, „*Alhenna*“ der Türken = *Lawsonia inermis* L.

1) **Alisma** L. (Alismaceen od. Helobien, VI. 4) Froschlöffel, A. *Plantāgo* L., fr. alisme, plantain d'eau, flûteau, e. frog-spoon, water-plantain, A. natans L. (*Damasonium repens* Vaill.), fr. flûteau d'eau, pain de grenouille (n. d. celt. alis Wasser, Paxton). 2) **Alisma pratorum** Column. = *Primula veris* L. — *Alismacēa* Rich. DC. (Ordn. *Helobiae Bartl.*).

Alkanna s. Alc.-

Alkekengi Feuill. Dill. (sc. *Physalis*) L. (Solaneen, V. 1) Judenkirsche, Schlutte, fr. coqueret, e. alkekengi od. winter-cherry (arab. i. q. lat. *Halicacābi*, sc. bacca). A. *virginiana* Feuill. (*Physalis pubescens* L.), A. *bonariense* repens Dill. (*Physalis viscosa* L.).

Allamanda L., W. (Apocynaceen, V. 1) brasiliian. Hundswürger (nach d. Prof. Fr. Allamand in Leyden). A. *cathartica* L. (*Orelia grandiflora* Aubl., *Apocynum scandens* Plum.) = Aloë *Dracaena* Lam.

Allantodia R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Wurst“ od. Puddingfarn (v. *ἄλλας*, *-ντος*; Knoblauchswurst, mit Allium — bez. d. Sori!), z. B. A. *tenéra*, australis etc. R. Br.

Alliaria Trag., Ad., R. Br. (sc. *Erysimum*) L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Knoblauchshederich“, „Lauchkraut“, Rampen M. Rchb., fr. alliaire, herbe aux aux „Lauchkr.“ (Pl. v. ail, lat. *allium*), e. hedge-mustard „Heckensenf“, A. *officinalis* Andrz. (s. sogl. *Allium*).

Allium L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Lauch, Zwiebellauch, fr. ail, e. leek, garlick (gr. *άγκυρον*, lat. *allium*, n. Paxton v. d. celt. all, d. i. brennend. Geschmacks!), z. B. *fistulosum* L. Winterzwiebel, A. *Cepa* Sommerzwiebel, A. *sativum* L. Knoblauch, fr. ail, e. buck-rams od. ramson (-sen), A. *Porrum* L. *Porré*, fr. porreau, e. porret, Zier. A. *ursinum* L. „Bärenlauch“, fr. ail d'ours, e. bear's-garlick, A. *nigrum* L., fr. ail noir, e. black-garlick, A. *azurēum* Ledeb. s. *caerulēum* Pall., fr. ail azuré, e. bluish-garlick, A. *fragrans* Vent. „Vanillelauch“, A. *Moly* L. Goldl. u. a.

Alloplectus Mart. DC. (nicht Alop!-) (Gesneriac., XIV. 2) „Umeinander geflochtene“, Urnenröhre Rmpl. (v. *ἄλληλως* wechselseitig u. *πλεξτός*; geflochten — Staubfäden einander umschlingend!), z. B. Gewächsh. A. *Schlimii* Pl. u. Lind., speciosus u. capitatus Hook. etc.

Allosorus Bernh. (nicht -ūrus autt!) (Farne, XXIV. 1) Roll- od. Krullfarn (*ἄλλος* anderer, *σώρος* Haufen — nämli. Sporenbehälter, diese erst rund, dann linearisch, Wst.).

Alnaster Spach (Betulaceen, XXI. 4) Grünerle, A. *viridis* Spach (*Alnus* v. Grck.) (deter. *Alnus*).

Alnus T. (Betulaceen, XXI. 4) Erle, Eller, fr. aulne, guerne od. vergne, e. alder (-tree) u. aller, z. B. A. *glutinosa* G. Schwarzerle (*Betula Alnus* L. var. *glutinosa* L.) m. v. v., z. B. *laciniata* Ait., auch Else Vilm., A. *incana* W., Grau- od. Weisserle (*Betula Alnus* L. var. b., *incana* L.), A. *serrulata* W., *undulata* W., *cordifolia* Lodd. (*cordata* Tenore) etc.

Aloë L. (Liliaceen, VI. 1) Aloë, fr. aloé (-ès), e. aloes (a. d. arab. alloeh, hebr. halal, d. i. glänzend und bitter), z. B. *picta* DC., *ferox* DC., *variegata* L. etc.

Aloëxylon Lour. (Cassieen, X. 1) Bitter- od. „Aloëholz“ (s. eb. u. *ξύλον* Holz), z. B. A. *Agallochum* Lour.

Alōna Lindl. (Solaneen, V. 1) Glocken-Nachtschatten, A. *coelestis* Ldl. (Anagramm v. *Nolana*, v. *nola* „Glöckchen“).

- Alonsōa (-zoa)** Rz. Pv. (Scrophularineen, XIV. 2) Halbkrone, Nesselblatt (n. Alonso od. -zo Zanoni, peruan. Bot, schr. in Fl. Peruv.), z. B. Topf A. Warscewiczii Reg. (compacta Hort.) u. incisifolia R. P., s. Hemitōris urticifolia W. (Celsia u., Hemitōmus u. Desf.).
- Alopecūrus** L., W. (Gräser, III. 2) Fuchsschwanzgras, Wiesenfuchsschwanz, fr. queue de renard, e. fox-tail ($\ddot{\alpha}\lambda\omega.\tau\eta\xi$, - $\varepsilon\zeta\sigma$; Fuchs, $\dot{o}\beta\varrho\alpha$ Schwanz), z. B. pratensis L., agrestis L. „Acker“-F., fr. chiendent, queue de rat.
- Aloysia** Ortega (Verbenaceen, II. 1 od. XIV. 2) Citronenstrauch, s. g. „Citronengeruch“, A. s. Lippia citriodora Pers. (n. d. Königin Marie Louise v. Spanien, † 1819), s. Verbena triphyllus l'Hér.
- Alpinia** L. (Anomeen, I. 1) Galgant, A. Galanga Sw., fr. cachibou, e. galangal (-lingal) (n. d. Prof. Prosper Alpinus in Padua, s. d. Aut.).
- 1) **Alsinastrum** (sc. Elatine) L. (Elatineen, VIII. 4) quirlicher Tännel Grec. (deter. Alsine, Wtst. Alsine u. $\ddot{\alpha}\sigma\tau o\sigma\sigma$ Stern od. Bild. 2) A. (sc. Anacharis) Babingt. (Elatineen, VIII. 4), s. g. Wasserpest = Elodēa canadensis Mchx.
 - 1) **Alsine** Wahlb., L. (Caryophylleen od. Alsinaceen, X. 3) Miere, fr. morgeline, e. alsine od. alcine (v. $\ddot{\alpha}\lambda\sigma\sigma$ Hain? — wahrsch. v. $\ddot{\alpha}\lambda\varsigma$ Salz, Alsine marina Sm. Salzmiere). 2) **Alsine** (sc. Stellaria) Hoffm. mierenart. Sternkraut, s. Larbrea aquatica St. Hil. — Alsinēae Rehb. Bartl., -nacēae DC. (zu Ord. Caryophyllinæ Barth.).
- Alsodia** P. Th. (—dea Spr.) (Violaceen Alsodineen, V. 1), Blattbusch“-Veilchen ($\ddot{\alpha}\lambda\omega\ddot{\delta}\eta\xi$ blättrig, buschig), z. B. A. Piparea P. Th. (Piparea dentata Aubl.), sessilis Spr. (Pentalöba s. Lour.), arborēa P. Th. — Alsodinēae (sc. Violacēae) Rehb.
- Alsophila** R. Br. (Baumfarne, XXIV. 1) „Hainfarn“ ($\ddot{\alpha}\lambda\sigma\sigma$ Hain, $\varphi\acute{\iota}\lambda\sigma\sigma$ Freund), z. B. australis Lab., martinicensis Sieber, medullaris R. Br.
- Alstroemēria** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Alstroemer's“-Lilie, fr. Alstroemère, fleur de Incas „Inkasblume“ (n. d. schwed. Baron A. Alstroemer, † 1794), z. B. Zier. A. peregrina L. Inkaslilie, psittacina Lehm., plantaginæa Mart. (Anden v. Peru).
- Altagāna** l'Hér. (sc. Robinia) Pall. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Sand-Robinie, daurischer Erbsenbaum, s. Caragāna Alt. Poir. u. macrophylla Lam. (n. d. Altaï-Gebirge ben.).
- Alternanthēra** Forsk. (Amarantaceen, XXI. 5) „Antherenwechsel“-Fuchsschwanz (v. alterno „alterniere“ od. wechsle ab, $\ddot{\alpha}\nu\vartheta\eta\eta\alpha$ Staubbeutel — abwechs. fruchtbare u. sterile Antheren!), z. B. Blatt-Zierpf. A. amoena Hort., spathulata Ch. Lem., amabilis Hort., s. Telanthēra Reg.
- Althaea** L. (Malvaceen, XVI. 8) Eibisch, fr. althée od. guimauve, e. marsh-mallow (v. $\ddot{\alpha}\lambda\vartheta\alpha\acute{u}r\omega$ od. $\ddot{\alpha}\lambda\vartheta\acute{e}\omega$ helfe, heile), z. B. officinalis L., Zier. A. (Alcēa) rosēa Cav. Stockrose, -malve, Rosenpappel, fr. rose-tremière, e. holly-hock, A. sinensis Cav. Zwerg-Stockrose, fr. rose trem. de la Chine, e. dwarf-hollyhock.
- Altingia** Noronha (Coniferen, XXI. 9) „Altingie“ (n. d. deutsch. Bot. Alting, Paxton), z. B. A. excelsa Pers. (Araucaria excelsa Hort.), s. Lignum Papuanum Rumph.
- Alyssum** T. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) Schild- od. Steinkraut, fr. alisson (d. pr. u. $\lambda\acute{e}\sigma\sigma\alpha$ Wut-beschwichtigende Kraft¹⁾), od. viell. bess. v. $\ddot{\alpha}\lambda\mu\sigma\sigma\omega\sigma$ traurig), z. B. Zier. A. saxatile L., s. g. Goldkörbchen, fr. goujon saxatile, corbeille d'or, e. rock-mad-wort.
- Amanīta** W. (Pilze, XXIV. 4) Wulstpilz, -scheide, Manschettenpilz Kummer, Fliegenpilz, A. muscaria W. (Agaricus musc. L.), fr. tue-

1) G. Frank's Kräuter-Lex.: Alyssum Berufswant, in Häus. aufgehäng. u. Menschen u. Vieh um den Hals geg. Behexung! D. V.

mouche, e. toad-stool „Krötenstuhl“ (Helm. u. Rabh.: nach d. Berg Amanus in Cilicien).

Amarantaceae R. Br., DC., -anthi Juss., -anthēae (sc. Aizoidēae) Rchb., s. sogl.

Amarantus T. (nicht -thus !) (Amarantaceen, XXI. 5) „Amarant“, Fuchsschwanz, Tausendschön, fr. amaranthe, fleur de jalouse (- d'amour) u. brède, e. amaranth, flower-amour, life-everlasting (gr. ἀμάραντος unverwelklich v. ἀ priv. u. μαραίνω welke), z. B. Zier. tricolor L. s. g. Papageifeder, e. prince's-feather, caudatus L. Fuchsschwanz, speciosus Sims, sanguineus L., cruentus L., u. a. m.

Amaryllidēae R. Br. (Narcissēae Rchb.) zu Ord. Ensatae Bartl. DC. Narzissenschwertel, s. sogl.

Amaryllis Herb., L. (Amaryllideen, VI. 1) Narzissen- od. Schönlinie, fr. amaryllis (altgriech. Frauen-Name, Wtst. schöne Nymphe!), z. B. Zier. (Cap) A. Belladonna L. Belladonna-Lilie Rmpl. m. v. v. (z. B. rosēa, spectabilis, bicolor etc.), fr. Bella d'automne, e. Belladonna-lily, formosissima L. schöner Ritterstern od. s. g. Jakobslilie, fr. am. lis de St. Jacques, reine de beauté, e. very-nice Amaryllis (s. Sprekelia form. Heist.); A. sarniensis L. Jersey-L., fr. lis du Japon, u. a. m.

Amberbōa DC. Lam. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Bisam-“ od. „Muschusblume“ (zu Centaurēa Rchb.) (v. ambra wohlriech. Seeprodukt u. βοή Gebet, Anruf d. Götter, Wtst. fr. amberboi Bisamblume). A. s. Centaurēa moschata L. (suaveolens W.), s. Cyanastrum Cass. „unechte Cyane“!

Ambrīna Spach (Chenopodiaceen, V. 2) „Ambrakraut“, A. ambrosioides Sp., s. Chenopodium ambros. L. (s. eb.).

Ambrosia L. (Composit. Ambrosiaceen, XIX. 5) Traubenkraut (nicht n. d. Götterspeise Ambrosia. sond. nach St. Ambrosius, Herausg. v. Basilius' Hexameri (libri VI), Paris 1721–30). — Ambroisiacēae Lk. Rchb. Spitzkletten Leun. (nicht Götterbrodgewächse!).

Amelanchier Medic. (zu Pyrus Aronia Rchb.) (Pomaceen, XII. 4) Felsenbirne, od. -mispel, Quantel O. W. (ἀ int. μῆλον Apfel od. Birne, ἄγκη wurge — Wurgbirne!), z. B. Zier. A. vulgaris Mnch. (Aronia rotundifolia Pers., Mespilus s. Pyrus Amelanchier L., W.), fr. nèflier à feuilles rondes, amélanches, e. common Am.; A. ovalis DC. (Aronia ov. Pers.), A. Botryapium DC. „Traubenbirne“ (Mespilus canadensis).

Amelia Alfld. (Hypopytaceen Klitzsch., X. 1) „Überschene“ (ἀμελής vernachlässigt etc.), z. B. media u. minor Alfld., s. Pyrōla media Sw. u. minor L.

1) **Amellus** W. (Compos. Astereen, XIX. 2) Mella-Aster (an d. Ufern d. arkad. Flusses Mella, Paxton), z. B. lychnitis L. (Verbesina astroides L.), fr. oeil du Christ, e. amellus-star-wort. 2) **Am.** (sc. Aster) L. Virgil's Aster, Berg-, s. Aster acris Leyss. (in Virgil's Georgika, lib. IV, beschrieben). 3) **Am.** (sc. Calēa) R. Br. „Schönrule“.

Amentacēae Bartl. Ord. d. Kätzchenträger (v. amentum Kätzchen, vgl. Terminologie).

Amethystēa L., W. (Labiaten od. Solaneen, II. 1) „Amethystblume“, Blüting D. (ἀμέθυστος bl. Edelstein, Amethyst), z. B. caerulea L. sibir. Bl. Rchb. s. Lycopus amethystinus Steven.

Amherstia Wall. (Legum. Cäsalpinieen, X. 1) „Amherstie“ (z. Ehr. d. Countess Amherst u. der Tocht. Lady Sarah Amherst), z. B. Warmh. A. nobilis Wall. (Südind.) s. g. Thoca.

Amiciea Hb. Bpl. Kth. (Legum. Hedysareen, XVII. 4) „Amicie“ (n. d. ital. Naturf. u. Mikrosk. J. B. Amici, Erf. d. achromat. Mikr. 1812), z. B. Gewächsh. A. Zygomēris DC. (planta pulcherrima Schlechtendal).

Ammadenia Rupr. (Ahsinaceen, X. 3) „Sand-Sattkraut“ (ἀμμος Sand,

ἀδοξ (Sättigung), z. B. peploides Rupr. = Alsine (Honckenya) peploides Wohlbg. u. Ehrh.

Ammi T. (Umbelliferen, V. 2) Steifstrahl, e. ammey, bishop's-weed, bull-wort (v. ἄμμος Sand), z. B. majus L. = Libanōtis u. Bumium.

Ammobium R. Br. (Comp. Senecionideen, XIX. 2) Sand-Immortelle (s. v. u. βιόω lebe), z. B. Zier. alatum R. Br. (Neuholl.), fr. A. ailé, e. winged A.

Ammophila Host (Gramineen, III. 2) Sandhalm, -rohr, Helmgras O. W. (s. v. u. γέλος Freund), z. B. arenaria Lk. s. Psamma u. Arundo ar. L.

Ammyrsine Pursh (Ericaceen, X. 1) „Sandmyrtle“ (s. v. u. μυροσίνη, Myrtle), z. B. buxifolia Bot. Reg. = Ledum buxif. Ait. (Leiophyllum b. Ell.).

Amomēae Rich. (Ord. Scitaminēae Bartl.) Bananen, Gewürze Leun., s. sogl.

1) **Amōnum** L. (Scitamineen Amoneen, I. 1) Gewürzlilie, Ingwer, fr. amome, e. amoum (arab. hamama, nicht ἀ pr. u. μῶμος Schande etc.), z. B. A. Zingiber L. gem. Ingwer (Ostind.), A. Malaguetta Paradieskorn-Ingwer (A. granum paradisi L.), fr. poivron d'Afrique (Madagask., Guin.) s. g. Cardamome, fr. auch manigette (malaguette). 2) **Am.** (sc. Sison) L. (Umbelliferen, V. 2) Gewürz-Sison, fr. berle aromatique = Sium s. Seseli Am. Roth u. Scop.

Amorpha Duh., L. (Legumin. Galegeen Rchb. XVII. 4) Unformstrauch, „Ungestalt“ Vilm., Bastard-Indigo (ἀ priv. u. μοοφή Gestalt — näml. d. Blüte nicht als Schmetterl.-Bl. kenntlich!), z. B. Zierstr. A. fruticosa L. m. v. Lewisii Lodd., glabra Desf., nana Nutt. (microphylla Pursh), fragrans Sweet u. a.

Amorphophallus Blum. (Araceen, XXI. 1) „Unformpfahl“ (s. v. u. φαλῆος Pfahl, männl. Glied), z. B. Warmh. A. campanulatus Decsn. (Arum c. Roxb. d. i. Glocken-Aron) (Ostind.).

Ampelidēae DC., -dacēae Hb. Bpl. Kth., Grck. (Ord. Ampelidēae Bartl.) Rebengewächse (v. ἀμπελίς, -ίδος Weinstock).

Ampeloprasum (sc. Allium) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Sommerod. Rebenlauch, breitblättr. wilder Lauch, All. Ampelopr. Kit. = Allium rotundum L. (ἀμπελός Weinstock, πούσον Lauch).

Ampelopsis Mchx. (Ampelideen od. Vitaceen, V. 1) Wildrebe, Rebling O. W., Zaun- od. Jungfernrebe, fr. vigne-vierge, e. virgin-wine, virginian creeper, Zier. A. hederacea Mchx. (quinquefolia R. Sch. (s. v. u. ὄψις Aussehn), s. Hedera quinquef. L. (Vitis hederacea W., Cissus hed. Pers.), A. bipinnata Mchx. (Vitis arborēa W., Cissus stans Pers.), cordata Mchx. herzblättr. Wildrebe, fr. vigne-vierge à feuilles en cœur, u. a.

Amphibrýa Endl. „Umsprosser“ (ἀμφὶ um, herum, βοτῶ keime, sprosse).

Amphicarpanthēae (sc. Compositae) Rchb. „Ringsfruchtblütige“ (XIX. 4. L.).

Amsonia Walt. (Apocyneen, V. 1) „Amsonie“, fr. Amsonie (n. d. Bot. Charl. Amson, Reis. in Amerika), z. B. A. virginiana Walt. (Apocynum v. Pluk.) = Tabernaemontana Amsonia L., Zier. A. salicifolia Pursh (Tabernaemont. elliptica Thb.), fr. A. à feuilles de saule, e. willow-leaved A.

Amygdalacēae Rchb., -lēae Bartl. (zu Ord. Rosiflōrae Bisch.), s. hern.

Amygdalopsis Carr. (Amygdalaceen, XII. 1) „Mandelgleiche“ (Amygdalus u. ὄψις Aussehn), z. B. Zier. A. Lindleyi Carr., s. Prunus triloba Lindl.

Amygdalus L. (Rosac. Amygdaleen, XII. 1) Mandelbaum, fr. amygdale od. amandier, e. almond-tree (gr. ἀμυγδάλη Mandel v. αμύσσω zerhöhle — Furchen im Stein, Wst. syrisch ah-mygdala d. i. schöner Baum), z. B. A. communis L., Zier. A. nana L. (Prunus inermis

Gmel.) m. v. *georgica* DC. (aus Georgien), *communis* L. var. fl. pleno Hort., v. *pendula* Hort. etc., A. *sibirica* Pall. (*Persica vulgaris* Mill.), Gartenobst A. *Persica* L. Pfirsich, fr. pécher commun, e. peach-tree, Zier. *Persica* L. m. v. v., z. B. fl. plen. Hort., *camelliaeflora* Fort. etc.

Amyridēae R. Br., Endl. Salben- od. Myrrhenbäume (zu Terebinthacēae Rchb.), s. sogl.

Amýris L. (Terebinthac. Amyrideen, VIII. 1) Myrrhe, Balsambaum (-strauch), fr. amyride, e. myrrh (ἀμύρη Balsam od. Myrrhen-saft), z. B. A. *balsamifera* L., *elemifera* L. etc., s. Icica Aubl.

Anabasēae Bunge, s. Anabāsis L. sogl.

Anabāsis L. (Chenopodiace., V. 2) Kalistrauch (ἀραβίας d. Aufsteigen, gr. i. q. lat. Equisetum), z. B. A. *aphylla* L. = Salsōla articulata Cav. s. *baccifera* Gm. (Kali baccif. Buxb.).

1) **Anacampseros** Ehrh. (sc. Portulaca) L. (Portulacaceen, XI. 1) Liebeskraut (gr. ἀραζάμηψεως Liebe zurückbring. Kraut, v. ἀραζάμητω u. ζηως, z. B. A. arachnoides Sims, s. Ruelinia ar. Haw. (Talínum Anac. W.). 2) **Anac.** (sc. Sedum) L. (Corniculat. Sedein, X. 5) rundblättr. Mauerpfeffer, s. g. Wundkraut, s. *Sedum rotundifolium* Lam. u. *Sedum Aizoon* L. (Anacampseros flore flavo Amm.). 3) **Anac.** orientale T. = Crassula crenata Desf. oriental. Liebeskraut.

Anacamptis Rich. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) Pyramiden- od. Straußsorche, Hundswurz Leun. (v. ἀραζάμητω biege in d. Höhe — bez. d. Pollenmasse, Wtst.) = Orchis pyramidalis L.

Anacardium Roxb. (Terebinthac. Anacardieen, XXIII. 2) Herznuss- od. Nierenbaum, fr. anacardier, e. kidney-nut-tree (v. ἀρά nach oben, καρδιὰ Herz — in d. Höhe gebog. Herz- od. Nierenfrucht!), z. B. A. orientale L. Malaccanuss od. echte Acajou, fr. acajou, pomme sauvage od. noix-de-marais, s. Semecarpus Anacardium L. f.

Anachāris Rich. (Hydrocharideen, XXII. 8) s. g. Wasserpest (v. ἀρά durch, γέλος Freude od. v. ἀραγάιος freue mich darin — durchwuchert d. Wasser, Wtst. anas Ente u. γαλόω?). A. Alsinastrum Bab. auch Wasserthymian, s. Elodia canadensis Rich. (Tropoperara pestifera autt.).

Anacyclus Pers. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Kreis“- od. „Ringelblume“ (Ringblume Grck.), deutscher Bertram Leun. (v. ἀραγυζόω drehe im Kreis herum, Wtst. st. Ananthocyclos — Blütfch. im Umkreis unfruchtbar!), z. B. geb. A. officinarum Hayne, Zier. A. radiatus L. = *Anthemis purpurea* Hort. etc., s. Santolina u. Anthēmis L.

Anaectochīlus Sm. Lindl. (*Anoect.*- Blum.) (Orchideen Neottieen, XX. 1) „Offenlippe“, s. Anoectochilus.

Anagallis T. (Primulaceen, V. 1) Gauchheil, eig. Kucks- (Kukuks-) Heil Mej., Ackerzier, fr. mouron, miroir du temps „Wetterspiegel“, e. brook-lime (v. ἄγγελλω schmücke, n. Paxton v. ἀραγελλώ lache auf — vertreibe d. Melancholie, daher — Gauchheil!), z. B. A. arvensis L. Kolmar O. W., Zier. A. collina Schousb., fr. mouron à grandes fleurs.

Anagyris T. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Zirkelhülsenbaum“, Stinkb. (-strauch Lauche), fr. bois-puant u. fève de trèfle, e. stinking bean (-trefoil) (v. ἀρά rückwärts, γῆρας Ring etc. — Hülsenform!), z. B. A. foetida L. (griech. Inseln), latifolia Brouss. (Bactyribolum l. Dietr.).

Anamirta Colebr. (Menispermaceen, XXII. 6) „An“- od. Scheinmyrtle (v. ἀρά u. μύρτος an, gleichsam Myrtle), z. B. A. *Cocculus* Wight = Menispermum Cocculus L. Kokkelsstrauch.

Ananassa Thb. (Bromeliaceen, VI. 1) Ananas (v. d. brasili. Nam. *nanas* od. *anana*) = Bromelia *Ananas* L. (*Ananas aculeatus* Trew), z. B. A. *sativa* Lindl. Gartenbeet-A., e. pine-apple (Südind.).

- Anarrhīnum** Desf. (Scrophularineen, XIV. 2) Lochschlund-Löwenmaul, fr. muflet, gueule de lion, e. lions-mouth (v. ἀνρήν auf, ὄτιν, -νος Nase, Rüssel, n. Paxton à priv. od. Wtst. ἀνεύ ohne — einer Schnauze nicht gleichend!), z. B. bellidifolium W. (*Linaria odorata* Dodart, *Dodartia* Mill.).
- Anastatīca** L. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Auferstehungskraut“ (v. ἀναστατώς wiederauflebend — d. eingetrockn. Kraut bei Feuchtigk.), A. hierochuntīca L., s. g. Jerichorose, fr. jérose.
- Anchūsa** L. (Boragineen, V. 1) Ochsenzunge, Zier. O. W., fr. langue de boeuf, buglosse u. orcanette, e. bugloss, ox-tongue, orchaneet u. bullace (gr. ἄγχοντα od. ἔγχοντα Schminkwurz), z. B. Zier. A. sempervirens L., fr. buglosse toujours verte, e. evergreen-oxentongue, A. italicā Retz., geb. A. tinctoria L. rote O., fr. alcannette (alkunet) „Alkannawurzel“ (s. *Alcanna*!), e. alkanet.
- Andreaea** Ehrh. Spr. (Moose, XXIV. 2) Steinmoos (n. d. Apoth. Andreä, s. d. Aut.), z. B. alpīna Hedw., rupestris ds. etc., s. *Lichenastrum* Dill. u. *Jungermannia* rup. L. — *Andreaeacēae* DC.
- Andrewsia** Spr. (Gentianeen, V. 1) Andrews-Enzian (n. d. Pfl.-Maler Andrews, s. d. Aut.), z. B. verna Spr. u. autumnalis Spr. — Centaurella verna Mchx. u. C. autumnalis Pursh (*paniculata* Mchx.).
- Andromēda** L. (Ericaceen, X. 1) Torf- od. Rosmarinheide, Gränke O. W., fr. Andromède (n. der von Perseus befreiten Jungfrau Andromeda, Myth.), z. B. polifolia L., fr. A. à feuilles répliées, A. calyculata L. (*Chamaedaphne* c. Mnch. Buxb.), Zier. A. floribunda Bot. M. (*Leucothoë* fl. D. Don) u. speciosa Mchx. (*Zenobia* sp. D. Don).
- Andropōgon** W. (Gramineen, XXIII. 1) „Männerbart“, Bartgras, fr. barbon, e. beard-grass (v. ἀνδρόπογος, -νος Mann, πάγων Bart), z. B. Zier. A. formosus Hort., argenteus DC. u. a.
- Androsāce** T. (Primulaceen, V. 1) „Mannsschild“, fr. androsace u. androsale, e. man's-shield (s. eb. u. σάύζος, -εος Schild), z. B. Zier. A. villosa L., fr. A. velue, e. shaggy sea-navel-wort, laetēa L., lanuginosa Wall.
- Androsaēnum** All., G. (sc. *Hypericum*) L. (subgen. v. Hyp. Lauche) (Hypericēen, XVIII. 2) „Männerblut“, Blutheil, Grundheil, fr. toute-saine, e. tutsan (gr. ἀγδούσαμον, s. v. u. αἷμα Blut), Zier. A. vulgare G. s. officinale All. s. bacciferum Lam., echtes Konrads-kraut, offizinelles Mansblut Vilm.
- Aneēochīlus** fehlerh. st. *Anoectochīlus*!
- Anemagrostis** Trin. (Gräser, III. 2) „Windhalm“ ἀνέμος Wind, ἄγρωστη; Feld- od. Ackergras = *Agrostis* (*Apēra* P.B.) spica venti L.
- Anemīa** (Aneimia) Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Nackt-Mond-raute, -Rispenfarn (v. ἀρείμων kleiderlos), z. B. Warmh. adiantifolia Sw.
- Anemōne** L. (Ranunculaceen, XIII. 6) Windröschen, fr. u. e. anémone, fr. auch fleur aux dames, passe-fleur („Pascha“- od. Osterbl.), e. wind-flower (v. ἀνέμος Wind), z. B. A. nemorosa L., fr. paquette (Osterbl.) od. sylvie, e. limon, pash-rose (pass-) „Osterbl.“, Zier. nemorosa var. alba u. rubra plena Hort., e. double-grove-wind-flower, A. fulgens Gray, fr. briotte (fleischf. Sammt), pavonina DC. (*hortensis* Hort.), coronaria L. m. v. v. Blumisten-Anemone Rmpl., A. japonica S. Z. m. v. Honorine Jobert, fr. a. du Japon, e. Japanese-w.-fl. u. a. m.
- Anēthum** L. (Umbelliferen, V. 2) Dill, fr. anet, e. dill (gr. ἀνήθον jon. ἀνησον i. q. ἀνισον Anis, Paxton v. ἀνεώ adv. hinauf, θέω renne — aufschiess. Wachstum? Wtst. auch αἰθω brenne! — unsicher!).
- Angelīca** L. (Umbelliferen, V. 2) „Engelwurz“, Brust-Seub., fr. angélique, e. herb-gerard, ling-wort (long-) (v. ἄγγελος lat. angēlus Engel, davon d. Eigennam. Angelika!).

- Angelōnia** Hb. Bpl. Kth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Angelonie“ (in Caracas, Südamer. angelon), z. B. Gewächsh. A. salicariaefolia Hb. (Caracas), hirta Cham., procumbens Mart. (Schelveria arguta Nees).
- Angianthus** Wendl. (Compos. Leontopodien Cass., XIX. 2) „Gefäß“- od. Urnenblume ($\ddot{\alpha}\gamma\gamma\sigma\sigma$ dem. $\ddot{\alpha}\gamma\gamma\sigma\sigma$ Gefäß — jed. Blüth. in besond. Kelch!), z. B. tomentosus W. = Cassininia tom. R. Br.
- Angiospermae (mia)** L. „Hüll“- od. „Decksamige“ (s. eb. u. $\sigma.\tau.\acute{e}.o.m.a$ Samen).
- Angophōra** Cay. (Myrtaceen, XII. 4) „Urnenträgerin“, -myrte ($\ddot{\alpha}\gamma\gamma\sigma\sigma$ s. v., $\varphi\sigma\sigma\sigma$ tragend — verholzter Kelch als Fruchthülle!), z. B. Decorat. A. albicans, florida u. buxifolia, s. Metrosidēros G.
- Angraecum** (-grēcum) P. Thouars (Orchideen Vandeen, XX. 1) Angurek- od. Angrek-O. (v. d. malay. angurek od. angrec), z. B. sesquipedalis P. Th. „Anderthalb“- Schuhsporn, s. g. Bourbonthee od. Faam-blätter Leun.
- Anguīna** Mchx. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Schlangengurke (anguis Schl.), A. sinensis Mchx. = Cucūmis anguīnus L. (Trichosanthes ang. L.).
- Angulōa** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Anguloe“ (n. d. span. Nat. Franz. de Angulo), z. B. superba Hb. Bp., grandiflōra Kth., Clowesii Ldl., Rueckeri u. Hohenlohi Ldl. (Südamer.).
- Anguria** Hb. Bpl. (sc. Cucūmis) L. (Cucurbitac., XXI. 2) Arada-Gurke ($\ddot{\alpha}\gamma\gamma\sigma\sigma\sigma\sigma$ eine Art Melone), z. B. rosā u. umbrosa Hb. Bpl. Stachelgurke (Cuc. echinatus Herm.).
- Anigosanthus** Réd. (Anoegos.-, Anigozanthus) Lab. (Amaryllideen od. Hämodoraceen, VI. 1) Röhrenschwerte, „Spatlilie“ (v. $\ddot{\alpha}v\sigma\gamma\omega$ öffne, spalte, $\ddot{\alpha}v\theta\sigma\sigma$. Wtst. v. $\ddot{\alpha}v\epsilon\gamma\omega$ erhebe — auf hohem Schaft!), z. B. Zier. pulcherrimus Hook. (Neuholl.), coccinēus H. P., cruentus Ldl. etc. s. Schwaegrichenia Spr.
- 1) **Anīsum** G. (sc. Pimpinella) L. (Umbelliferen, V. 2) „Anis“-Pimpernelle, fr. u. e. anis, e. aniseed (gr. $\ddot{\alpha}\nu\sigma\sigma\sigma$ i. q. $\ddot{\alpha}v\eta\sigma\sigma$ lat. anethum, arab. anysum, Anis u. Dill), s. Anīsum vulgare G. 2) **Anīsum** stellatum Mat. Med. (Magnolieen od. Illicieen, XIII. 7) Stern-Anis, s. Illicum anisatum L.
- Annona** L. s. Anona Adans.
- Annularia** Sternb. (foss. Equisetaceen, XXIV. 1) „Ring“-Schafthalm (v. annūlus Ring).
- Anoeectochīlus** Blum. (Orchideen Neottien, XX. 1) „Offenlippe“, s. Anaectoch.- ($\ddot{\alpha}v\sigma\tau\sigma\sigma$ geöffnet, $\chi\varepsilon\dot{\iota}\lambda\sigma$ Lippe — Form des Labells!).
- Anomathēca** Ker (Irideen, III. 1) „Wunderkapsel“ ($\ddot{\alpha}v\mu\sigma\sigma$ sonderbar, $\vartheta\acute{\iota}\gamma\eta$ Behälter — d. Kaps. öffnet sich nur an der Spitze), z. B. Stuben A. cruenta Lindl. u. juncēa Ker; s. Anomaza excisa Laws., Gladiō-lus Andr., Anigozanthus Lab.
- Anōna** Adans. Kth. Spr. (Anonaceen, XIII. 6) Flaschenbaum, Flaschen-, Rahm-, Schuppenapfel Dietr., fr. assimine (-nier) u. ateira, corosso-liere u. sappadille (Paxton von menona, Wtst. manoia, seinem Nam. in Banda oriental!), z. B. muricata u. squamata L. (Ind. etc.), s. Porcelia Pers. — Anonacēae Rich. DC., -nēae Rchb., -ōnae Juss. (zu Ord. Trisepalae Baril.).
- Anophȳta** DC. Endl. Gefäßlose, eig. „Obergewächse“, Übererdige ($\ddot{\alpha}v\omega\acute{w}$ - $\varphi\sigma\sigma\sigma$ Gewächs über der Erde).
- Anoptērus** Lab. (Ribesiaceen od. Gentianeen, V. 1) „Emporflügel“ ($\ddot{\alpha}v\omega$ hinauf, $\pi\acute{\iota}\acute{\iota}\sigma\sigma$ Flügel — Samenspitze geflügelt!), z. B. glandulosus Lab. (Baum, Neuholl.).
- 1) **Antennaria** R. Br. (zu Gnaphalium Rchb.) (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Fühlerpappus“, Katzenpfötchen, fr. antennaire, pied-de-chat, e. chaste-weed (v. antenna Antenne od. Fühlhorn eines Insekts — bez. d. Pappus!), z. B. dioeca R. Br. (Gnaphalium dioecum L.)

- m. v. tomentosa, Zier. margaritacea R. Br. (Gnaph. marg. L.), fr. ant. perlée, immortelle blanche (- de Virginie), e. pearly-antennaria.
- 2) Anthennaria** Lk. Spr. (Schimmelpilze) „Fühler-Schimmel“.
- Anthadenia** Van Houtte (Personaten Sesameen, XIV. 2) „Blumendrüse“ ($\ddot{\alpha}r\vartheta\circ s$ u. $\ddot{\alpha}\delta\vartheta\gamma$, $-\acute{e}ro\circ$ Drüse etc. — Blütendecke zehnstrahlig!). A. sesamoides Van Houtte.
- Anthēmis** L. (Comp. Anthemideen) XIX. 2) Kamille Vilm. Hundskamille, Hermel O. W., Gillen (Schilling, 18. Ausg.), fr. camomille (= romaine, — fétide), e. camomil od. matthes ($\ddot{\alpha}r\vartheta\acute{e}pi\circ$ v. $\ddot{\alpha}r\vartheta\acute{e}mu\circ$ i. q. $\ddot{\alpha}r\vartheta\circ s$, Wtst. $\ddot{\alpha}r\vartheta\circ s$ u. $\dot{\eta}\mu\circ s$ halb — alle Strahlenblüsch. s. g. Halbblüten!), z. B. Zier. A. nobilis L. römische K., fr. cam. romaine, s. Ormenis nobilis J. Gay; A. artemisiaefolia W. (Chrysanthemum indicum Curt.) s. g. Winteraster, u. a.
- Anthericum** L. (Liliaceen, VI. 1) Zaunblume, -lilie, Graslilie, Spinnenkraut, Silling O. W., nicht Grasnelke Leun. (was Dianthus Caryophyllus L.!), fr. phalangère, herbe à l'arraignée, e. spider-wort (v. $\ddot{\alpha}r\varthetaeqi\circ$, $-\acute{e}ro\circ$ Halm — Halmart. Schaft! Wtst. v. $\ddot{\alpha}r\varthetaeqi\circ$ blumenreich (?), vielm. $\ddot{\alpha}r\varthetaeqi\circ$ blühend!).
- Anthistiria** W. (Anthest.- Spr.) (Gramineen, XXIII. 1) „Steifhalmgras“ (v. $\ddot{\alpha}r\vartheta\acute{e}t\acute{e}ri\circ$ widerstehe od. bess. v. $\ddot{\alpha}r\vartheta\gamma$ u. $\sigma\tau\acute{e}i\circ\acute{e}o\circ$ steif, straff — steife Halmie), z. B. A. glauca W., s. Heteropogon Pers. (zu Andropogon) Rchb. — Anthistiriae Anders.
- Anthocéros** E. Bot. (Lebermoose, XXIV. 2) „Blumenhorn“, Nadel- od. Hörnerschorf, Rosetten-Leberv., Fruchthorn ($\ddot{\alpha}r\vartheta\circ s$ u. $\acute{e}z\acute{e}go\circ$ od. -as Horn — hornförm. Blütenträger!), z. B. laevis L. u. punctatus Hoffm.
- Antholýza** L. (Irideen, III. 1) Rachenlilie Rchb., Steinblume D. (s. v. u. $\acute{e}v\acute{o}\circ\acute{a}$ Wut — aufgeriss. Rachen!), z. B. Zier. fimbriata Klatt (Babiana f. Bak.).
- 1) **Anthoxanthum** L. (Gräser, II. 2) Ruchgras, eig. „Blütengelb“, fr. flouve (s. v., $\xi\acute{a}r\vartheta\circ s$ gelb — Staubbeutel gelb!), A. odoratum L. gem. R., A. aculeatum L. f. = Cryspsis acul. Ait. stachl. Scheidenähre.
 - 2) A. (sc. Rumex) Murr. i. q. Rumex maritimus L. (acutus Poll.) goldgelber Ampfer Grck.
- 1) **Anthriceus** Pers. (Umbelliferen, V. 2) Kerbel, Klettenkerbel, fr. cerfeuil, e. bastard-parsley „Bastard-Petersilje“ (gr. $\ddot{\alpha}r\varthetai\circ\acute{o}\circ\acute{e}o\circ$ oder $\ddot{\alpha}r\varthetai\circ\acute{o}\circ\acute{e}o\circ$), z. B. A. Cerefolium L. Garten-Kerbel, A. vulgaris Pers., fr. cérofé. 2) A. (sc. Torilis) L. (Umbellif. V. 2) Wald-Borstdolde.
- Anthurium** Sm., Schott (Araceen, IV. 1) „Blütenschweif“ Leun., Schwanz- oder Zipfelblume ($\ddot{\alpha}r\vartheta\circ s$ u. $\acute{o}\acute{v}\acute{o}\acute{a}$ Schwanz — Blumenscheiden mit Schwanzzipfeln!), z. B. Warmh. A. Scherzerianum Schott, leuconeum Lem., rubrinervium Kth. (äquat. Anden).
- Anthyllis** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Wundklee, Wollblume D., Ivo O. W. (v. $\ddot{\alpha}r\vartheta\circ s$ u. $\acute{e}ou\acute{\lambda}\circ s$ Milchhaar — flaumige Hüllblätter!), A. Vulneraria L.
- Antiāris** Leschen. (Artocarpeen, IV. 2) „Pfeilgift“ od. Antscharbaum, Upasbaum, fr. bohon-upas ($\acute{a}rti$ für, gegen, $\acute{a}ou\circ$ Pfeilspitze — lief. Gift für d. Pfeilspitzen d. Malayen), A. toxicaria Leschen.
- Antidesma** L., P. Br. (Urticac. od. Stilagineen, V. 1 od. XXII. 5) Strickrindenbaum, Bitterstrauch D., s. g. Giftstiller (-mischer), A. alexiteria L. „Abwehrstrauch“ ($\acute{a}rti$ gegen, $\acute{e}\acute{o}\acute{s}\acute{u}\acute{a}$ od. $\acute{e}\acute{u}\acute{a}$ Fessel, Band — weg. d. Gebrauchs d. Rinde).
- Antirrhinum** T. (Scrophularineen, XIV. 2) Löwenmaul, fr. muflet (-flier), gueule de lion, muse de veau, e. lion's-mouth, snap-dragon (v. $\acute{a}rti$ gleich od. ähnl., $\acute{e}i\acute{r}$, $-\acute{e}ro\circ$ Nase — Blumenform!), z. B. Zier. A. majus L. m. v. v., z. B. Däumling od. Tom Pouce, gross. od. welscher Dorant (Orant) Vilm. — Antirrhinæae DC.

- Apargia** Scop. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Löwenzahn, „Apargie“ (v. ἀπό fern, ἀργία Feier etc.? — ungewiss!), z. B. A. hirta Hoffm. (Colobium h. Roth).
- Aparine** T., Mnch. (sc. Galium) L. (Rubiaceen, IV. 1) Klebkraut, Kletten = Labkr., s. g. Bettlersläuse G. Frank, fr. grippe od. rièble (rèble), grateron, e. cleaver, goose-grass (gr. ἀπαρίη v. ἀπαίω ergreife — hängt sich an!).
- Apéra** Ad. (Gräser, III. 2) Windhalm, A. spica venti Ad., fr. épis du vent od. éternue éventée, e. addle-oats? (v. ἀπηρος od. -η; nicht verstümmelt — bez. d. zweiten Blütchenansatzes!).
- Apetālae** Raj. Juss. Kl. der Kron- od. Blumenblattlosen (ἀ priv., πέταλον lat. petálum Kronblatt).
- Aphāca** Presl (sc. Lathýrus) L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Grossohrwicke, fr. lisette (v. ἀ pr. u. γάζη Linse — unechte Linse!), A. vulgaris Presl, s. Orōbus Aphāca Döll.
- Aphānes** L. (sc. Alchemilla) Leers (Rosac. Dryadeen, IV. 1) Feld-Sinaw Grck., A. arvensis L., fr. brise des Anglais (v. ἀφανής unscheinbar), s. Alchemilla arvensis Scop.
- Aphelandra** R. Br. (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Einzellen-Anthere“ (ἀγελάνδρης einfach, ἀρνητικός -ρδος Mann, Staubbeutel), z. B. Warmh. u. Stube A. variegata Morel, aurantiaca Nees, Liboniana Hort. Lind. etc., s. Ruellia u. Justicia.
- Aphyllae** (sc. Cryptogāmae) DC. Blattlose Kryptogamen (ἀ pr. u. φύλλον Laubblatt).
- Apiera** W. (Liliaceen Aloideen, VI. 1) „Ohnbitter“-Aloe (ἄπικος nicht bitter), z. B. A. viscosa (Aloë v. L.).
- 1) **Apios** Boerh. Pursh (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Birnwurz“-Süssbohne, Erdbirne (-nuss), Knollenwicke D. (v. ἄπιον Birne, — essb. birnf. Wurzelknollen), A. tuberosa Pursh, fr. apios tubéreux, e. tuberous-rooted Apios, s. Glycine Apios L. 2) **Apios** (sc. Euphorbia) L. (Euphorbiac., XI. 3 od. XXI. 1) Birn-Wolfsmilch, fr. appios od. fausse angélique „Erdmaus“-Euphorbia Wolff.).
- Apium** Hoffm., L. (Umbelliferen, V. 2) „Eppich“ od. Sellerie, fr. célerie od. esprault, e. celery (selery) (v. d. celt. apon Wasser, Paxton, od. ἄπιον Birne, od. st. apiacum „Eppich“ v. apis Biene? — ungewiss!), A. graveolens L., fr. persil des marais „Wassereppich“ Wolff¹⁾, s. Sium Apium Roth, Seseli graveolens Scop. u. Apium Celeri G.
- Aplūda** L. (Gräser, XXIII. 1) „Spreugras“, Stumpfgr. D. (ἄπλονδα Spreu, Plinius: Gras m. klein. dünn. Halm, v. ἄπλοις einfach etc.), z. B. A. mutica L. etc.; A. gigantēa Spr. = Calamīna g. P. B., s. auch Andropōgon.
- Apocynēae** Juss. R. Br. DC. Rehb. (zu Contortae Rehb.), -nacēae R. Br., Grck. Hundswürgerartige, fr. apocynées.
- Apocynūm** L. (Apocynen, V. 1) Hundswürger, -kohl, -wolle D., fr. apocyn u. cynangue, étrangle-chien, e. dog-bane (gr. ἀπόζυγον Hundetod v. ἀπό weg, ab u. κίνων, κίνος Hund), z. B. androsaemifolium L. Mückenwürger od. Fliegenfalle, fr. a. gobe-mouche, e. tutsan-leaved apocynum.
- Aponogētum (-on)** Thb. (Piperaceen od. Alismaceen, VII. 3 od. XI. 3) „Wassergras“ (v. d. celt. apon Wasser u. γέτος Verbaladj. v. γέρω erzeuge), z. B. Zier. A. monostachyūm L. (Saururus natans L. f.), distachyūm Thb. etc.
- Aposēris** Neck. (zu Hyosēris Rehb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Drahtstengel („Endivie“), Sengel O. W., Schweinesalat Seub. (ἀπό

1) S. das neue Franz.-deutsche etc. Wörterbuch v. Dr. H. Leng u. Dr. O. L. B. Wolff, Weimar, Paris u. Strassb. 1836 (Neue Aufl. Wolff).

- weg, ohne, σέρις Salat — keine ord. geniessb. Blätter), z. B. foetida Neck. (Hyoséris f. Rchb., Lapsana f. W.).
- Aquaticae** Endl. Kl. d. Wasserkräuter od. -quirle (-sterne).
- Aquifoliacæae** DC. Rchb. Grck. (zu Sapotacæae Rchb., Ord. Tricoccae Bartl.), s. sogl.
- 1) **Aquifolium** (sc. Ilex) L. (Aquifoliaceen, IV. 4) Stechpalme, -eiche, eig. „Wasserblatt“ (— weg. d. Glanzes!) (aqua u. folium, Wtst. st. acuifolium v. acus Spitze — Stachelblatt!), fr. laurier épineux, houx, épine verte, e. holly-tree. 2) **Aquifolium** foliis deciduis Duham., s. Prinos verticillatus L. (Sapotac., IV. 1) (Str. Virgin.).
- Aquilaria** Lamb. (Thymelæen od. Aquilarieen, X. 1) Adler- od. Aloëholz D., fr. aquilaire, bois de calambac, e. eagle's-wood (v. aquila Adler), z. B. ovata L., malaccensis, fr. calamboü grünl. Adlerh.
- Aquilegia** L. (Ranunculac., XIII. 5) Agley od. Ackelei, eig. „Wassersammelerin“, fr. ancolie, fleur de parfait amour, e. columbine (v. aquila? wahrsch. v. aqua u. lègo sammle — Wassertropfen in d. Blattwinkeln, latinis. Ackelei Mej.), z. B. Zier. A. vulgaris L. Frauenschuh od. Pantoffelchen, s. g. Narrenkappe Vilm., fr. aiglantine od. columbine, A. anemonoides W. (Isopýrum anem. Hort.), A. sibirica Lam. v. fl. pl., A. Skinneri Hook., chrysanthä Gray, canadensis L., etc.
- Arabis** L. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) Gänsekresse, -kraut Seub., Gonnie O. W., fr. arabette, e. wallcress (*Ἄραψ, -βος* Araber, Wtst. viell. veränd. st. Iberis — ?), z. B. Zier. alpina L. (verna Hort.), fr. ar. printanière, corbeille d'argent, tourette, e. rocky-wall-cress, A. arenosa Scop., fr. ar. de sable, e. sandy-w.-cr.
- Araeaca** esculenta DC. (Umbelliferen, V. 2) „Arakatscha“ (südamer. Culturpfl. — vaterländisch!).
- Aracæae** Grck. i. q. Aroidæae Juss. DC. Arongewächse, s. Arum.
- Arachis** L. (Cäsalpinieen, X. 1 od. XVII. 4) Erdeichel (-nuss), A. hypogaea L. (Südamer.), fr. arachide, pistache de terre (pois de terre), e. ground-nut (v. a priv. δέρζης Grat, Dorn, gr. ἀράχιδνα eine Hülsenfrucht, Fr. Riemer's Lex.).
- Aracium** Monn. Neck. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schüsselbl.“ (?), A. paludosum Neck. (Hieracium p. L., Crepis p. Mnch.) (schwerl. v. ἀράχη i. q. γιάλη Schale etc., sond. Wtst. nur d. veränd. Hieracium!).
- Aralia** L. (Araliaceen, V. 5) Doldeneppich, fr. aralie (v. d. kanadischen Namen), z. B. papyrifera Hook. Reispapierpfl. Leun. (China), edulis Zucc. Beerens- od. Bergangelika Leun., spinosa L. (japonica Hort.) Angelikabaum, fr. Angélique épineuse, e. Angelica-tree, Stuben A. Sieboldii Hort. (japonica Thb.), elegantissima Hort. (Neucaledon.) etc. — Araliaceæ DC.
- Araucaria** Rz. Pv., Juss. (Coniferen, XXI. 9) Schuppen- od. Chilitanne Vilm., Schmucktanne (n. Arauca, dem Lande der Araukaner im südl. Chili), z. B. Zier. A. imbricata Pv. echte Sch., „Ziegel“-Araukarie, A. excelsa Ait., s. g. Norfolkichte, brasiliensis Pv., Gewächsh. A. Bidwillii Hook. u. a.
- Arbutus** L. (Ericaceen, X. 1) Sandbeere, Meerkirsche, Erdbeerbaum, fr. arbouse (-bousier), e. strawberry-tree (n. d. celt. ar rauli, but Busch, od. d. celt. arboise Herbbeerbusch, Paxton), z. B. unedo L. u. uva ursi L., fr. cracra, bousserolle, raisin d'ours; s. Arctostaphylos Adans.
- Archangelica** Hoffm. (sc. Angelica) L. (Umbelliferen, V. 2) „Erzengelwurz“, fr. archangélique (vgl. Angelica) (v. ἀρχάγγελος Haupt- od. Erzengel — Hervorheb. ihr. Heilkraft!).
- Aretium** L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Klette, fr. glouteron, e. bur, burdock (haddock) (v. ἀρτετός vom Bären — stachl. Köpfe!), z. B. A. Bardanum L., fr. bardane, u. a.

- Arctocalyx** Fenzl (Gesneriaceen, XIV. 2) „Klettenkelch“ (*ἄρκτος* Bär, *κάλυξ* Kelch), z. B. Endlicherianus Van Houtt.
- Aretostaphylos** Adans. (Ericaceen, X. 1) „Bärentraube“, Grante O. W., fr. raisin d'ours, e. bear-berry (s. eb. u. *σταφύλη* Weintraube), z. B. A. uva ursi Spr. s. officinalis Wimm. Grab. = Arbutus u. u. L.
- Arctotis** L. (Compos. Calendulac. od. Arctoideen, XIX. 4) „Bärenohr“ (s. v., *οὐρά*, *ωτός* Ohr), z. B. calendulacea L. var. tristis etc.
- Ardisia** Sw. W. (Myrsineen od. Sapotaceen, V. 1) „Pfeilspitzkrone“, Spitz- od. Spitzenblume (v. *ἄρδης* Pfeilspitze — bez. d. Kronzipfel!), z. B. Stuben crenulata u. mollis s. villosa Sw., excelsa W. (*Anguillaria bahamensis* G.). — Ardisiacae Juss. (Ord. Myrsinæ Bartl.).
- Areca** L. (Palmen, XXI. 8) Betelnusspalme, Catechu- od. Pinangnuss-P., fr. arec (-quier) (n. d. malabarisch. Nam. areec, ganz jung perynga, Paxton), z. B. oleraea L. Kohlpalme, fr. palmiste franc, chou-palmiste, e. cabbage-tree, Gewächsh. A. alba Bory (Ins. Bourbon), rubra Bor. (Mascarenen), Catechu L. (Ostind.) u. a. — Arecinae Mart.
- Arenaria** L. (Aisinaceen, X. 3) „Sandkraut“, fr. sabline od. sablonnière, e. sand-wort (arena Sand).
- Arena** Lab. (Palmac. Phoenicieen, XXI. 8) „Areng“-Palme (areng, d. vaterl. Name!), z. B. saccharifera Spr. (*Gomutus saccharifer* autt.) echte Zucker- od. Gamouti-P., s. g. Sagueer, Weinpalme, s. Borassus.
- Arethusa** Sw. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Arethuse“, Runzelbart D. (Arethusa, die in eine Quelle verwand. Nymphe der Diana, Myth.), z. B. Warmh. A. capensis L., bulbosa L., etc.
- Aretia** W. (Primulaceen, V. 1) Alpen-Mannsschild (n. Bened. Aretius, Prof. in Bern, † 1574), A. helvetica L. (*Diapensia h.* Jacq.), s. Androsäce alpina Lam.
- Argania** Schousb. (Sapotaceen, V. 1) marokkan. Eisenholz, A. Sideroxylon Schousb. (v. argan, d. marokk. Nam.), s. Sideroxylon spinosum L. u. Elaeodendron Argan Retz (*Rhamnus siculus* L.).
- Argemone** T. (Papaveraceen, XIII. 1) Sand- od. Stachelmohn, fr. argémone, pavot épineux, e. prickly-poppy, s. Papaver spinosum Bauh., Zier. A. grandiflora Sweet (gr. *ἀργεμώνη* v. *ἀργέμα* Stopfen auf d. Auge — wogeg. gebr.!).
- Aria** Crantz (sect. Sorbus Host) (Pomaceen, XII. 3) Mehlbaum (-beere, -birne), fr. viorne, e. mealy-tree (v. Arien in Persien), z. B. A. latifolia Pers. s. Crataegus A. L., Pirus A. Ehrh., A. intermedia Pers. (Crat. Ar. $\beta.$ suecica L.), alpina W. (*Pirus alp.*) u. hybrida L. (Crat. Ar. $\beta.$ fennica).
- Arisarum** T. (Aroideen, XXI. 9) kleiner Aron (gr. *Ἀρίσαρον*, eine Aronart), A. vulgare Targ. = Arum Arisarum L. s. serpentinum Barr., A. potamogetonifolium Bocc. = Ambrosinia Bassii L.
- Arisema** Benth. (nicht -aema Mart.) (Aroideen, XXI. 1) Flecken-Aron, „Aron“-, „Zeichen“ (Arum u. *σήμα* Zeichen etc.), z. B. Zier. A. praecox de Vries (Jap.) u. ringens Schott.
- Aristea (-aea)** Ait. Ker (Irideen, III. 1) „Grannen“-Schwertel, Borstenlilie D. (v. arista Gramme — so zugespitzte Blätt.), z. B. cyanæ W. (*Ixia s. Moraea africana* Hort.), angolensis Bak. (Nied.-Guin.).
- Aristolochia** L. (Aristolochieen, XX. 3) Osterluzey, Heberblume Rmpl., Hohlwurz, fr. poire à putin, aristoloche, e. aristolochy, birth-wort „Geburtswurz“, auch sarrasine (gr. *ἀριστολοχία* Kraut zur Beförd. d. Geburt, *ἰοχέα*), z. B. Zier. A. Siphon l'Hér. (*macrophylla* Lam.) gem. Heberbl., Pfeifenstrauch, -kopfstr. (Nordamer.), tomentosa Sims (daselbst), sempervirens L. s. *Pistolochia cretica* Moris. — Aristolochiae Juss., -iae Bartl. Ord. d. Osterluzygew., -iacæae Grck.
- 1) **Aristotelia** W. (Tiliaceen, XI. 1) Aristotelesstr., chilenischer Jasmin,

A. macqui l'Hér. (glandulosa Rz. Pav.) echter. 2) **Aristotelia** Lour. (Orchid. XX. 1), z. B. spiralis (Neottia sinens.). 3) **Aristotelia** l'Hér. (Ribesiac.). 4) **Aristotela** Ad. (Compos.) (n. d. griechischen Philosophen Aristoteles, † 322 v. Chr.).

Armeniaca T. (sc. Prunus) L. (Juss. subgen. v. Prunus) (Amygdalac. od. Drupaceen, XII. 1) Aprikosenbaum, fr. abricotier, e. apricot (-cock) -tree (n. d. Lande Armenien, arab. alberkuk, span. orient. barcock etc., Mej.), z. B. A. vulgaris Lam. (epirotica Fl. Wett.) m. v. v., brigantiaca Vill. Aprik. v. Briançon, tomentosa Thb. etc.

1) **Armeria** W. (Plumbagineen, V. 5) Gras- od. Sandnelke, Nelkengras, Pinke O. W., fr. gazon d'Espagne (v. d. celt. ar nahe u. mor Meer), z. B. A. vulgaris W. (maritima Mill., pubescens DC.), e. common sea-lavender, s. Statice Arm. L. 2) **Armeria** (sc. Silene) L. (Sileneac., X. 3) Garten-Silene, Kleibuschnelke, s. g. Morgenröschchen, fr. Silène à bouquets, e. Lobel's Catchfly od. Fleabane „Fliegengift“. 3) A. (sc. Dianthus) L. (Caryophylleen, X. 2) rauhe od. Büschelnelke Grck., M.-Rchb.

Armeriopsis Boiss. (Plumbagineen, V. 5) „Nelkengrasgleiche“ (zu Statice L.) (s. eb. u. ὄψις Aussehen).

Armillaria DC. (Pilze, XXIV. 4) „Armband-“ od. Ringpilz (armilla Armband, Manschette), z. B. melléa Honiggelbling, s. g. Hallimasch Kumm. (essb.) etc.

1) **Armoracia** Fl. Wett. (sc. Cochlearia) L. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) Meerrettig (Mähr-, Mer-), Kreen O. W. (s. Armeria od. v. Armorium Bretagne), A. rusticana Fl. Wett. s. sativa Hell., fr. raifort-sauvage, moutarde des Allemands, grand raifort, e. horse-radish, russ. chren. 2) **Armoracia** Bl. u. Fing., F. W. Mey (zu Nasturtium R. Br.) (Crucifer. Siliquos. XV. 2), z. B. amphibia F. W. M., austriaca Bl. Fing.

Arnica L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) Wolverlei (Wohlverleih), fr. arnique, plantain de montagne. A. montana L. (v. ἀρνίον Lämmchen od. ἀρνάζειν Lamppelz — weg. d. Blätt., Paxton).

Arnosériis G., Bernh. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Lämmersalat“, Lammkraut Grck. (ἄρνος; Gen. v. ἀρνητή Widder, ὄσπεις Salat), s. Hyoseris L.

Aroïdées DC. (Aracées Grck.) Bartl. Ord. d. Arongew., fr. aroïdes (*εἰδομαι* gleiche).

1) **Aronia** Pers. (zu Pirus Rchb.) (Pomaceen, XII. 4) Felsenbirne, -mispel Leun., Schwarzbirne Rmpl., Bastard-Eberesche (Abänd. d. Worts Aria, s. d.), z. B. wild u. Zier. A. rotundifolia Pers. (Amelanchier vulg. Mnch., Sorbus Amelanchier Crantz, s. Aronia K. Koch, arbutifolia Pers. (floribunda Spach, Pirus florib. Lindl. Mespilus arbutifol. var. melanoarpa Mehx.), grandifolia Spach (Pirus gr. Lindl.), pirifolia Pers. (Crataegus p. Lam. s. serrata Poir.) etc. 2) **Aronia** (sc. Crataegus) Bosc. Aronia-Dorn (Mespilus Aronia W.).

Arrhenatherum P. B. (zu Holcus Rchb.) (Gräser, III. 2) Glatt- oder Wiesenhafer, A. elatius P. B., fr. ray-gras de France „franz. Ray-gras“, e. french reed-grass, auch fr. avoine élevée (Avéna elatior L.) u. faux-froment (fromental) „falscher Weizen“ s. Holcus avenaceus Scop. (v. ἀροητή männlich u. ἀγητή Spelze, Hachel- — nämnl. an d. männl. Blütchen! Wtst.).

Artemisia L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Beifuss¹⁾, fr. armoise, herbe de Diane (n. d. Göttin Artemis oder Diana, als Lucina Göttin der Geburt, — zur Beförd. früher Mannbarkeit angewandt), e.

1) Nach Schmitthenners deutsch. Etymologie: pipósz dazu gestossen, also „Gewürz“, v. pôszan stossen; aus pôsz später „Fuss“!

mug-wort, moth- od. worm-wort, z. B. A. glacialis L. Gletscher-B., fr. génépi, A. campestris L., fr. armoise des champs „Feld“-B., A. vulgaris L., fr. auch herbe de St. Jean; Zier. A. Stellariana Bess., argentea Ait., annua L., gracilis Hort. (procera W.), Abrotanum L. u. Absinthium L. (s. d.) u. salina W. — Artenisiæ DC. Less.

Arthrolobium Desv. (Leguminos. Hedsareen, XVII. 4) „Glied“- od. „Gelenkhülse“ (*ἀρθρόον* Glied etc., *λόβιον* dem. *λοβός* Hülse etc.), z. B. scorpioides Desv. s. Ornithopus scorp. L.

Artocarpus L. (Urticaceen Artocarpeen, XXI. 1) „Brotfruchtbaum“, fr. artocarpe u. jaquier (*ἄρτος* Brot, *ζαούις* Frucht), z. B. A. incisa L., integrifolia, (Warmh.) imperialis; s. Rademachia incisa etc. Thb. — Artocarpæ Bartl. DC. (zu Ord. Urticinae Bartl.).

Arum L. (Aroideen od. Callaceen, XXI. 9) Aron, Aronswurzel Seub., Dutenkölbe, Zehrwurz Leun., Zahnkraut Rmpl., fr. arum, gouet, pied de veau, pain de lièvre, chou-poivre, e. aron, wake-Robin, cuckoe-pintle „Kukukszapfen“, calves-foot, fever-root, séguine (gr. *ἄρων*, v. *ἄρων*, lat. aro ackere, zeuge?), z. B. A. maculatum L. Pfaffenkind, deutscher Ingwer Leun., A. dracunculus L. „Drachenwurz“, fr. gouet serpentaire, e. snake- od. hare-mint, A. crinitum Ait., fr. gouet chevelu, italicum Mill. etc.

Aruneus (sc. Spiraea) L. (Rosaceen Spiräaceen, XII. 4) Geisbart, Berg-Geiswedel, Johanniswedel etc.), fr. barbe-de-chèvre (- de bouc), e. goat's-beard (lat. aruncus Geisbart).

Arundinaria Mehx. (Gramineen, III. 2) Ludolphsrohr, fr. arundinaire, e. reed-grass (-plant) (v. arundo, -inis Schilfrohr), z. B. Blattpfl. A. falcata Nees (Bambusa s. Arundinacea falc. Hort.) „Sichelbambus“, s. Ludolphia W.

Arundo P. B. (Gramineen, III. 2) Schilfrohr, fr. roseau od. canne, e. reed, z. B. Zier. A. Donax L. (Donax arundinacæa P. B.) m. v. variegata Hort., fr. roseau des jardins, canne de Provence, e. large-leaved reed; mauretanica Desf., fr. roseau d'Algérie.

Asa foetida Kämpf. (nicht Assa!) (sc. Ferula) L. (Umbelliferen, V. 2) Stinkasant, Teufelsdreck = Steckenkraut, e. benjamin (v. *ἀσην* Ekel).

Asarea Lindl. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Fleischlose“, Magerorchis (*ἀσαρός* fleischlos), z. B. Warmh. speciosa Ldl. (Serapias gavilu Pav.).

Asarinæa R. Br. (zu Aristolochiæa Rchb.), s. sogl. Asarum.

Asarum L. (Aristolochieen Asarineen, XI. 1) Haselwurz, eig. Asarwurz Mej., fr. asare, calavet, oreille d'homme, échalotte, échaloigne, nard-sauvage, épi sauvage, rondelle etc., e. hazel-wort, wild spike-nard, assaraback (-bacca), cabarick (*ἀσαρός* astlos) A. europaeum L., s. Hypocistis Beckm.

Ascalonium (sc. Allium) L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Schalottenzwiebel, fr. ascalonite, e. eschalot od. scallion (v. Askalon in Palästina).

Asclepiadæa R. Br., Rchb. -dacæa Grck. (zu Ord. Contortae Bartl.), s. sogl. Asclepias.

Asclepias L. (Asclepiadeen, V. 2) Seidenpflanze, Schwalbenwurz, fr. asclépiade, dompte-venin, herbe de St. Laurent, fleur à mouche, e. swallow-wort, milk-weed (n. *Ἀσκληπίων* od. Aeskulap, d. Gott d. Arzte), z. B. Zier. A. syriaca L., fr. ascl. de Syrie, herbe à la ouate (- à coton) „Wattenkr.“, e. virginian sw.-w. od. milk-w., tuberosa L., curassavica L., e. blood-flower, incarnata L., fr. couleur de chair, e. incarnate sw.-w., carnosa L. (Hoya carn. R. Br.).

Ascobothrus Pers. (Pilze, XXIV. 4) „Schlauchschneller“ (*ἀσφόδης* u. *βόλος* Wurf — d. Sporenschlüche springen auf u. werfen d. Sporen umher), z. B. furfuraceus Pers., s. Peziza.

Ascophora Tod., Nees (Pilze, XXIV. 4) „Schlauchträger“, fr. ascophore

- (s. eb. u. *φροσός* tragend), z. B. *Mucēdo* Schimmel. — *Ascophōri* (zu Hymenomycētes) Corda.
- 1) **Ascýron** (sc. *Hypericum*) L. (Hypericineen, XIII. 2 od. XVIII. 4) „Männerblut“, fr. *ascyre* (v. ἄσυρον i. q. ἀνδρόσαμον Manns-od. Männerblut, Wst. i. q. *Hypericum perforatum* L. — d. Blütenknospen geben zerdrückt blutroten Saft von sich! n. Paxton: ἀ priv. u. οξυός od. σκιρός hart — also weich anzufühlen!) s. *Androsaeum* (s. d.). 2) **Ascýrum** L. (sect. v. *Hypericūm*), z. B. *Crux Andreæ* L. „Andreaskreuz“.
- Asimīna** Adans. (Anonaceen, XIII. 6) Flaschenbaum, Papau (canad. Name) (Etym. unbek.), z. B. *A. triloba* Dun. nordamer. Papau s. *Anōna* tr. L. (*Uvaria* tr. Torr. Gr., *Orchidocarpum arietinum* Mchx. u. *Porelia* tr. Pers.).
- Aspalathus** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Dornhülsenstr., s. g. Witschen D., fr. *aspalathe*, pied d'oe (gr. ἀστάλαθος ein Dornstr.), z. B. *A. spinosa* L., *indica* L. Ebenholz v. Madagaskar, s. *Lotus tenuifolius* Pluk.; *A. Ebēnus* L. amerik. Ebenholz (Bstr. Westind.).
- Asparāgi** Juss., fr. Asparaginees, Asparagoïdes Spargelartige, s. sogl.
- Asparāgus** T. (Liliac. Asparagineen, VI. 1) Spargel, fr. asperge, e. *asparagus* (*sparagus*), sparagrass, sparrow-grass (gr. ἀσπράγας n. Paxton: ἀ int. u. σπαράσσω zerzupfe — bez. d. Blätter!), z. B. *A. officinalis* L. (altilis Aschers.).
- Aspasia** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) *Aspsia* (*Aspsia*, Freundin v. Perikles in Athen, Wst. v. ἀσπιάσιος angenehm, nicht Paxton v. ἀσπάζομαι umfasse), z. B. *epidendroides* Ldl. (Amerika).
- Asperifolia** L., -foliacēae Rchb. „Scharfblättrige“, i. q. *Boragineae* Juss. (asper u. folium).
- Asperūgo** L. (Boragineen, V. 1) Scharfkraut, Schärfpling O. W., fr. rapette, porte-feuille (v. asper rauh etc.).
- Asperūla** L. (Rubiaceen od. Stellaten, IV. 1) Waldmeister, Meister O. W., Meierkraut Vilm., fr. aspérule, rubéole, hépatique étoilée, mosecateline, muguet od. hépatique des bois (s. eb.), z. B. *A. odorata* L. s. g. Maitrank, fr. auch reine des bois, e. wood-ruff, sweet-scented-Squinancy, *A. cynanchica* L. Bräunewurz, fr. herbe à l'esquiancie (petite garance, rubéole), *A. arvensis* L. (*Rubeola coerulea* Bauh.), Zier. *A. azurēa* Spach, e. sky-coloured-wood-ruff.
- Asphodelēae** Bartl. DC., -li Juss. (zu *Liliacēae* Bartl.) „Affodile“, Lauchartige.
- Asphodelīne** Rchb. (zu *Asphodēlus* L.), z. B. *lutēa* Rchb., fr. fleur od. belle d'un jour, s. *Asphodēlus*.
- Asphodēlus** L. (Liliac. *Asphodeleen*, VI. 1) „Affodil“, Lauch, Gilbwurz, Schopflilie, fr. asphodèle, e. asphodel u. daffodil (daffodil-lily) (gr. ἀσφόδελος), z. B. *A. lutēus* L., fr. fleur od. belle d'un jour, e. day-lily.
- Aspidistra** Ker (Liliac. Asparagineen od. Acoraceen, VIII. 1) Schild-od. Wurzelblume, Korbstempel (v. ἀσπιδίον Rundschildchen u. Wst. ἀστρον Stern u. Bild), z. B. *Stuben A. elatior* Decsn. = *Plectogyne variegata* Hort.
- Aspidium** Sw. (Polypodiac.-Farne, XXIV. 1) Schildfarn, fr. aspidie, e. shield-fern (s. eb. — Schildform d. Sporenbehälter!), z. B. Zier. *A. aculeatum* Sw. (*Polystichum ac.* DC.), *A. angulare* Kit. (*Polyst. ang.* Presl), *A. Filix mas* Sw. (*Polyst. s. Polypodium F. m.* L.), Bandwurm-Waldfarn W. „Farnkrautmännchen“ m. v. v. etc., s. *Nephrodium* Rich. „Nierenfarn“.
- Aspidosperma** Mart. (Contorten, V. 1) „Schildsamen“ (ἀσπίς, -ίδος Rundschild, σπέρμα Samen), z. B. *macrocarpon* Mart., Quebracho (Q. blanco = Rinde) (Brasil.).

Asplenium L. (Farne, XXIV. 1) Strich-, Streifen- od. „Milzfarn“, fr. asplénion, e. scal-fern (v. ἀσπλήνιον Milzkraut — strichförm. Sporangien!), z. B. Decor. A. Adiantum nigrum L., Kalth. bulbiferum Forst., falcatum Lam. (Ostind.), flabellifolium Cav. (Neuholl.), Warmh. cicutarium Sw. (Jamaika), pulchellum Radd. (Bras.) etc.

Aster L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Aster“, Sternblume, fr. astère, étoilée, reine Marguérite, e. aster, cod- od. star-wort (gr. ἀστέριος -έρος lat. aster Stern), z. B. Zier. A. chinensis L. v. v., fr. Reines Marguérites couronnées „Cocardenastern“, Rosenaster, Topf. A. alpinus L., ferner Gart. formosissimus Hort., fr. a. très-élégant, e. very-nice a., A. Novi-Belgii Nees, Novae-Angliae Ait., horizontalis Hort. (pendulus Ait.) u. a. — Asteraceae DC., -inæae Rich.

Astrocephalus Vaill. Spr. (Dipsaceen, IV. 1) „Sternkopf“, Grindrose od. Scabiose (s. eb. u. ζεφαλίη Kopf), z. B. A. Columbaria Vaill. — Scabiosa Col. L. (Trichéra C. Schrad.).

Astilbe Hamilt. (Saxifragaceen, X. 2) „Ohnglanz“ (ἀ pr., στιλβός Glanz — keine besond. schöne Blüt. Wtst.), z. B. Zier. A. rivularis G. Don, fr. A. des rivages, e. bearded-Spiraea, s. Hoteia japonica Decsn. (Spiraea jap. Hort. s. barbata Wall.).

Astragalus L. (Legumin. Astragaleen, XVII. 4) Wirbelkraut, Traganth, Stragel Seub., Bocksdorn Vilm., fr. astragale, adragant (dragant), barbe de renard, e. milk-vetch „Milchwicke“ (ἀστράγαλος Halswirbel — die untere Hülsennaht eingedrückt!), z. B. Zier. galegiiformis L., e. goat's-rue-like milk-vetch, A. Tragacantha L., fr. tragacanthe, e. tragacanth „Bocksdorn“.

1) **Astrantia** T. (Umbelliferen, V. 2) Sterndolde, Doldenstern, Thalstern, schwarze Meisterwurz, fr. astrance, radiaire, e. master-wort (v. ἀστράντιος u. ἄντιος entgegenkommend — Gegenstück bildend!), z. B. major L., fr. astr. éllevée, sanicle femelle, e. greater master-wort, A. Epipactis L. f. (Haecquetia Ep. DC.), helleborifolia Salisb., minor Scop., e. smaller m.-w. 2) **Astrantia** africana Mor. (Ranunculac., XIII. 7) = Adonis capensis L.

Astrapaea Lindl. (Malvaceen, XVI. 7) „Blitzmalve“ (αστρωπταῖος blitzend — brillante Blume!), z. B. A. speciosa Ldl. (Pentapetes speciosa W., B. Ostind.).

Astrocephalus Vaill. s. **Astro-**

Astrocarya (-on, -um) W. Mey., Mart. Spr. (Palmaceen Phoeniceen, XVI. 1) „Sternmuss“ (s. v., ζάχυον Nuss), z. B. A. Borsigianum C. Koch, s. Stevensonia.

Ataccia Presl (Aristolochieen Taccaceen, VI. 1) Arrowrootpflanze (ἀ int. u. Tacca), z. B. cristata Presl, s. Tacca integrifolia autt.

Athamanta Koch (Umbelliferen, V. 2) Bären- od. Heilwurz M.-Rchb. Grundheil, Augenwurz Grek., fr. athamante od. grande-berce, e. fluellin, speed-well (v. Ἀθάμαντος, -αρτος Myth. Vater v. Phrixus u. Helle), z. B. A. cretensis L. (Libanotis cr. Scop.), s. Mēum.

Athanasia Cass. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Unsterblichkeitsblume“ (?), Athanasius-Rainfarm, Immortelle, Jüngling D., fr. athanasie (gr. Ἀθανασία v. ἀ u. θάνατος Tod? od. n. Athanasius, s. d. Aut.), z. B. Zier. annua Hort. (Tanaecētum ann. L., Balsamita a. DC.), Athanasiæ Less. DC.

Athyrium Roth (Polypodiac.-Farne, XXIV. 1) Frei-, Bogen- (Seub.), Strichfarn Rmp., fr. athyrium fougère femelle, e. lady's fern (v. ἀθύριος ohne Thüre, frei — nämlich d. Sporangien!), z. B. A. Filix-femina L. m. v. Goeringianum pictum u. v. Elworthii Hort., s. Aspidium Filix-femina L.

Atossa Alfld. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) Zaunwicke, fr. vesceron, e. hedge-vetch (persischer Frauenname!), s. Vicia sepium L.

Attractylis Scop. L. (zu *Carthamus* Rchb.) (Compos. Carduaceen oder Carlineen, XIX. 1) „Spindel“- od. Rockendistel, Wollen-Saflor, fr. quenouillette (v. ἀτράκτος dem. ἀτράκτιον Spindel etc. — Stengel wollig, wie eine solche u. ebenso benutzt, Wtst.), A. lanata Scop. s. *Acarna* W., s. *Carthamus lanatus* L. (*Heteracantha lan.* Lk., *Centrophillum* l. Rchb.).

Atragene L. (Ranunculac. Clematideen, XIII. 6) Alpenranke, -rebe Seub., Doppelblume D., Kletterrose, fr. atragène (ἀτραγενή Theophr. n. Wtst. *Clematis cirrhosa*! nicht ἀτραγίς, eine Distel), Zier. A. alpina L. (*Clematis alp. geranifolia* Moris.), austriaca Scop., Clematis Crantz, sibirica L. (*Clematis sib.* Müll.), americana Sims (Clem. *verticillaris* DC.).

Atraphaxis L. (Polygoneen, VI. 2) Knöterichmelde, Strauchm. D., s. g. Bocksweizen (ἀτράγαζις, lat. *Atriplex v. a* priv. u. τρέψω nähre — ohne sonderl. Nahrung!), z. B. undulata L. (*Polygonum atraphoides* Thb.), s. undulatum Berg.

Atriplex L. (Chenopodiaceen od. Atriplicaceen, XXIII. 1) Melde, Mille, fr. arroche, e. arrach (arach) u. orach, auch notch-weed „Kerb-blatt“ (v. ater in comp. atro- schwarz? od. ἄσπιτος intens. u. *triplex* dreifach — nämnl. Fruchthülle — unsicher!), z. B. geb. A. hortensis L. m. v. v., z. B. (Zier.) *atrosanguinea* Hort. Blutmelde u. cupreato-rosœa Hort., erstere fr. Belle Dame (Bonne-) u. Follette, e. dark purple-coloured Garden-Orach. — Atriplicēae Rchb., -cacēae R. Br.

Atröpa L. (Solaneen, V. 1) Wolfs- od. Tollkirsche, fr. morelle furieuse, bouton-noir, e. mad-apple, s. g. Belladonna, A. *Belladonna* L. (Mittel z. Verschön. d. Augen), fr. belle-dame od. belladonne u. follet (v. ἀτροπός unabwendbar — nämnl. d. Tod!).

Attalēa (-lia) Hb. Bpl. Kth. (Palmen, VI. 1) „Attalus“-P. (n. *Attalus I.*, König. v. Pergamus, † 198 v. Chr., n. Paxton v. *attalus* prächtig (?), vielm. *attalicus* attatisch, auch glänzend etc.), z. B. Warmh. A. *fumifera* Mart., „Seipalme“ (Bras.), *compta* Mart., *excelsa*, *humilis* u. *speciosa* Mart. (Bras.).

Aubrietia Adans. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Aubrietie“, fr. Aubriété, z. B. Zier. *deltoidēa* DC., *purpurea* Hort. (*grandiflōra* Hort.) etc. (n. d. franz. Blumenmaler Aubriet, Tournefort's Begleiter, † 1743), s. *Alyssum*, *Draba* u. *Heliophila*.

Aucuba Kämpf. Schreb. (Loranthaceen od. Cornaceen, XXII. 4) Fleck-Hartriegel, s. g. Goldorange, fr. aucube (n. *aukuba*, d. jap. Namen), z. B. Zier. *japonica* Kämpf. u. *himalaica* Hook.

Aucuparia Med. (sc. *Sorbus*) L. (sect. v. *Sorbus* Med.) (Pomaceen, XII. 3) Eberesche, Vogelbeerbaum, s. g. Quitscheren, A. *sylvestris* Med., fr. sorbier sauvage, e. service-tree, quick-beam, quicken-tree, roan-tree, A. *americana* W. (*Sorbus microcarpa* Pursh, *Pirus amer.* DC.) (*aucuparius* Vogelfang betr. v. avis Vogel, capio fange).

Aulacomnium (-on) Schwägr. (Moose, XXIV. 2) „Furchen“-M., Streifen-Sternmoos Leun. (v. αὐλακές, -αξος Furche u. μνίον, lat. *Mnium Sternmoos*, -höker. Kapselbasis, Wtst.), z. B. *androgynum* Schw. (am Grund d. Bäume), s. *Mnium* Dill.

Aulax Berg. (-axis Haw.) (Proteaceen, IV. 1 od. XXII. 4) „Furchen-blatt“ (?), „Furchenblüher“! (s. eb., Wtst. Staubgef. in d. Kronenfurchen, od. Blattunterseite gefurcht!), z. B. Zier. *pinifolia* R. Br. (*Protea p.* L.), *umbellata* R. Br. (*Protea aulacea* Thb.).

Aurantiacēae Corr. DC. Rchb., -iae Juss. (zu Ord. Terebinthīnae Bartl.) Orangen, s. sogl.

Aurantium (sc. *Citrus*) L. (Aurantiaceen, XVIII. 2) Orange, Pomeranze (*pomum aurantium*), fr. u. e. orange (fr. oranger, e. orange-tree) (v.

aurum Gold), z. B. Gewächsh. C. Aurantium L. echte Or., nur v. : C. Aur. Bigaradia Risso, saure od. Warzen-Or., v. chinensis (sinensis) Risso, süsse Or. od. „Apfelsine“, v. decumāna L. Pompelius, v. nobilis Lois. Mandarin-Or., Zier. Aurantium v. crispa Hort., s. g. Bouquet-Or. (v. v. fl. pleno, salicifolia etc.).

- 1) **Auricūla** T. (sc. Primula) L. (Primulac., V. 1) „Aurikel“ (eig. „Öhrchen“), fr. oreille d'ours, e. bear's-ear, french-cow's-lip (dem. v. auris Ohr). 2) **Auricūla** (sc. Hieracium) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) = Hieracium dubium Sm. 3) **Aur.** (sc. Peziza) L. (Pilze, XXIV. 4) Judasohr, fr. oreille de Judas, e. jew's-ear, s. Exidia Auricula Judae Fr.

Avellāna (sc. Corýlus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) gem. Haselstrauch, fr. avelinier (avellunier), coudrier, abelanie, noisetier, e. hazle-nut (-tree) (v. Avella i. q. Aquila in Oberitalien, Wtst. n. Avellino in d. Prov. terra di Lavoro, Neapel).

Avena L. (Gräser, III. 2) Hafer (Haber), -gras, fr. avoine, e. oats (unbek. Etymologie!), z. B. geb. A. sativa L. gem. H. u. orientalis Schreb. türkischer od. s. g. Fahnen-H., wild A. fatūa L. Flug- od. Windh., fr. haveron, A. sterīlis L. (macrocarpa Mnch., sensitīva Hort.) hygrometrischer od. Wetter-H., u. s. f.

- 1) **Averrhōa (-oea)** L. (Gruinalen od. Bombaceen, X. 4) Karambolabaum, Baumstachelbeere, A. Carambola L. (n. d. arab. Arzt Averrhoes zu Cordova, † 1217). 2) **Av. aēida** L. (Cicca disticha Spr.) (Euphorbiac., XXI. 4) Gröps-Wolfsmilchbaum.

Axolōpha Alfld. (ia DC.) (Malvaceen, XVI. 5) rauhaariger Eibisch, A. hirsuta Alfld. (Althaea h. L.) (v. ἄξων, -ονος Achse? λόφος; Haarschopf — dann fehlerh. gebildet! od. ἄξος adj. schleppend v. ἄγω i. q. έλω ziehe, schleppe? Wtst. d. Fruchtbod. strahlig kammförmig!).

Ayenia Mut. L. (Büttneriaceen, V. 1) „Ayenie“ (n. d. duc d'Ayen de Noailles ben.), z. B. Treibh. pusilla Rz. Pv. (Dayenia inermis Mill.), aculeata Mut. (Byttneria mollis H. B. K.) (Str. Südam.), cordifolia Sess., etc.

Aylanthus Juss. st. Ailantus Desf.

Azadirachtha A. Juss. (sc. Melia) L. (Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) Mannabaum, Paradies-, Paternosterbaum, grossblättr. „Zedrach“ D., s. Azadiracta indica Breyn. (ἄζα Dürre, διὰ wegen u. ὁσσος spalte? Wtst. arabisch! — unsicher!).

Azalēa L. (Ericaceen, V. 1) „Azalee“, Felsenstr. Leun. Rmpl., Bergroschen, fr. azalée (v. ἀζαλέος trocken, dürr — bez. d. Standorts!), z. B. Treibh. A. indica L. m. v. v., pontica L. (arborēa L., Rhododendron flavum G. Don), mollis Blum. (China), wild: procumbens L. Zwergporst, s. g. Gamsennach (südd. Alpen) (Chamaerrhododendron Buxb.).

Azaleastrum Planch. (subgen. v. Rhododendron) (Ericaceen, V. 1) Azaleen-Alpenröschen, Rh. ovatum Lindl. (China) (deter. Azalea).

Azāra Rz. Pv. (Bixaceen od. Homalineen, XIII. 1) südamer. Orleanstrauch (n. d. Spanier Jos. Nic. Azara benannt), z. B. dentata u. serrata R. P.

Azarōlus Scop. Borkh. (Pomaceen, XII. 2) „Lazarole“, welsche Espeln D. (v. ἀζα Dürre — Standort? Wtst. arab. azzarur od. al zarur wild. Apfel!), z. B. A. alpinus Borkh., fr. aubépin Azérolier, épine d'Espagne, e. azarole thorn, s. Crataegus Azarōlus W. Azarolbirne u. Crat. s. Pyrus alpina Dur. „Alpenbirne“.

Babiana Ker (Irideen, III. 1) Pavianswurz (v. babianus Pavian, Wtst. Babia, Göttin d. Kindheit in Syrien — nieder. Kraut!), z. B. Thunbergii u. plicata Ker (Antholyza plic. L., Cap), aurēa Ker = Tritonia aur. Pappe, u. a.

- Bacchāris** L. (Compos. Astereen od. Baccharid., XIX. 2 od. XXII. 14) Bachusstrauch, Kreuzstr. Lauche, fr. bois-Guillaume, s. g. Leistenholz (Landmann's Spiek-Narde, Paxton) (D. Mariae Chirotheca G. Frank) (gr. *Βάζαρις* od. *Βάζαρος* Diosc. v. *Βάζης*, Pflanze m. wohlriech. Wurzel, Riemer), z. B. Zier. halimifolia L. (cuneif. Mnch.) meldenblättr. Kreuzstr.
- Bacillaria** Ehrbg. (Stückalgen od. Diatomeen, XXIV. 3) „Stäbchenalge“, fr. bacillaire (dem. v. *bacillus* Stab).
- Baetris** Jacq. (Palmen, XXI. 6) Rohr- od. „Stabpalme“ (v. *βάτριον* Stab — zu Spazierstöcken, Wtst.), z. B. Warmh. caryotaefolia Mart., setosa M. (m. Borstenwimpfern an d. Fiedern!), longifrons Mart., etc.
- Bacomycēs** Pers. Ach. (Flechten, XXIV. 3) Schwamm- od. Korallenflechte, Becherfl. W. (*βαύος* klein, *μύκης* Pilz), z. B. cocciferus Ach. — Herba ignis Offiz. (Nord-Eur.), s. Cenomyce Ach. u. Cladonia Hoffm.
- Baeothryōn** Nees (sc. Scirpus) Ehrh. (Cyperaceen, III. 1) „Kleinbinse“ (s. v. u. *Γούρων* Binse), s. Scirpus pauciflorus Lightf.
- Baeria** Fisch. Mey. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Baer'sblume“ (n. d. russ. Staatsr. u. Prof. C. E. v. Baer, † 1872), z. B. Zier. chrysostoma F. M., fr. Baerie dorée s. g. „Goldmund“ (Californ.).
- Balanītes** DC. Del. (Zygophylen, X. 1) Zahnbbaum (*βαλανίτης* eichelartig), z. B. aegyptiaca Del. Hadjilidj-Gewürz, s. Ximenia aeg. s. ferox Poir.
- Balanophōra** Forst. (Balanophoreen, XXI. 1) „Eichelträger“, Kolbenschosser (*βαλάρος* Eichel, *φογός* tragend), z. B. fungosa Forst. = Cynomorium Bal. — Balanophorae Rich.
- 1) **Balantium** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Beutel“- od. „Börsen“-F. (gr. *βαλάρτιον* Geldbeutel — Form d. Fruchtschleierchens!), z. B. Gewächsh. B. antarcticum Presl. 2) **Balantium** Hamilt. (Chrysobalanen, XII. 1) (— meist leer. Eierstock, Wtst.).
- Baldingēra** G., Fl. Wett. (Gräser, III. 2) Glanz- od. Bandgras (n. E. G. Baldinger, Prof. in Marburg, † 1804), Zier. B. colorata Fl. Wett. Bandgras d. Gärten, s. Phalāris arundinacea var.
- Ballōta** L. (Labiaten, XIV. 1) „Ballote“, Schwarz- od. Stink-Andorn, fr. ballotte u. marrube, (gr. *βαλλώτης* v. *βάλλω* werfe zurück — durch übeln Geruch, Paxton), z. B. nigra L. v. variegata Hort., fr. marrube noir (marrubin n.) od. fétide, e. hare-hound, B. suaveolens L. s. Bystropōgon l'Hér.
- 1) **Balsamina** Riv. (sc. Impatiens) L. (Balsamineen, V. 1) gem. „Balsamine“, fr. fruit élastique, e. balsam od. balsamine (gr. *βαλσαμίνη* Balsamische, v. arab. balassan?). 2) **Balsamīna** (sc. Momordica) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Balsamapfel, Wunderapfel Vilm., fr. mordique pomme de merveille, e. balsam-apple, balm-Momordica. — Balsaminēa A. Rich. (zu Ord. Gruinales Bartl.).
- Balsamīfluae** Blum. Jess. „Balsamfluss“- od. Amberbäume (zu Ord. Iteoidēa Bisch. Weidengehölze) (*βάλσαμον* u. flūo).
- 1) **Balsamīta** Vaill. Desf. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Balsamblume“, fr. balsamite, z. B. B. vulgaris W. — Tanacetum Balsamīta L. (Südfrankr.) s. g. Frauenminze D., fr. menthe coq, e. spearmint. 2) **Balsamīta** DC. (sc. Chrysanthēmum) L. (Comp. Anthem. XIX. 2) Strahl-Balsamblume, B. annua DC. (Athanasia a. Hort.).
- Balsamodendron** Kth. (Burseraceen, VIII. 1) „Balsambaum“, echter Myrrhenbaum, fr. balsamier (baumier), e. balsam-tree (-shrub), B. Myrrha Lk. (*βάλσαμον* u. *δέρδων* Baum).
- Bambūsa** Schreb. (Bambos Retz.) (Gramineen, VI. 1) Bambusrohr, Bambos, fr. bambou, e. bamboo-cane, auch Riesengras Leun. (v. d. ind. bambos od. d. malay. bambu), z. B. Zier. B. arundinacea L. (Südchina) Riesen-B., (klein) B. Fortunei fol. varieg. s. nivei-vittat. Van Houtt., v.

aureo- u. argenteo-striata Hort., B. aurēa Hort., B. nigra Hort. Paris., fr. b. à bois noir, e. black-stemmed b.-c., etc.

Banisteria L. (Malpighineen, X. 3) Liane od. brasili. Kletterstrauch, fr. quapurier (B. Quapara W.) (n. d. engl. Mission. John Bainster ben.), z. B. B. Quapara W. u. dichotoma L. (Acer scandens etc. Plum.).

1) **Banksia** R. Br., L. f. (Proteaceen, IV. 1) Bank's-Silberfichte (n. d. engl. Nat. u. Reis. in Austral. Jos. Banks, † 1820), z. B. Gewächsh. collīna R. Br., Cunninghamii Sieb., littoralis R. Br. 2) **Banksia** speciosa Kön. (Scitamineen, I. 1) Costwurz = Costus speciosus Sm. 3) **Banksia** Forst. (Thymeläen). 4) **Banksia** Domb. (Lythrareeien).

Baphia Afz. Spr. (Mimoseen, XXIII. 1) „Farb“- od. Klingholz (v. $\beta\alpha\gamma\epsilon\iota\sigma$ Färbererei), z. B. nitida Spr. afrik. Rotholz, e. bar-wood.

Baptisia Vent., R. Br. (Cassieen, X. 1) „Farbstrauch“, wilder Indigo (v. $\beta\alpha\lambda\tau\omega$ farbe), z. B. Zier. B. australis R. Br., s. Podalyria Vent. s. Sophora austr. L.

Barbaraea (-rēa) R. Br. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Winter- od. Erdkresse, Kreissig O. W., Senf- od. Barbarakraut, Barben-Hederich, fr. roquette, herbe de St. Barbe (n. d. St. Barbara ben.), B. vulgaris R. Br. = Erysimum Barbaraea L.

1) **Barbula** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Bärtchen“, Bartmoos (dem. barba).

2) **Barbula** Lour., Pers. (Verbenaceen, XIV. 2) „Bärtchen“-V. (—haarfransige Blütchen, Wtst.).

1) **Bardana** Offiz. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) gebrüuehl. Klette Grck. (v. d. ital. barda Pferdeharnisch? od. st. pardona = Onopordon? Wtst.) i. q. B. major Off., s. Arctium Lappa L. s. Lappa major (Lappa officinalis All.), fr. lapourdier, bardane, fusilage, herbe aux teigneux „Grindigenkraut“. 2) **Bardana** (sc. Arctium) W. = Lappa tomentosa Lane, filzige Kl. Grck.

Barkeria Lindl. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Barker's“-O. (n. Barker-Webb, s. d. Aut.), z. B. spectabilis Batem. (Guatem.), elegans Knowl. Weste.

Barkhausia Mnch., DC. (-hansenii Hoppe) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Schnabelippau Seub. (n. d. Prof. J. G. Barkhausen in Utrecht, † 1723), z. B. intybacēa DC. = Crepis int. Brot., s. Borkhausia Böhm.

Barleria L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Barlerie“ (n. d. Dominikaner James Barrelier in Paris, s. d. Aut.), z. B. B. longifolia L., B. Prionitis L. fussangelf., etc., s. Justicia L.

1) **Barosma** W. (Baryosma R. Sch.) (Rutaceen Diosmeen, V. 1) Duft-raute, Bukkostrauch ($\beta\alpha\omega\iota\varsigma$ stark etc., $\sigma\sigma\mu\eta$ Duft etc.), z. B. odorata D. (nicht -um), serratifolia (Adenandra cordata Lk.) 2) **B.** Tonga Pers. (Dipteryx T. W.) (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3).

Barringtonia Forst., Thb. (Myrtac. Melaleucae., XVI. 8) Myrtenpflaume (n. d. engl. Nat. Dan. Barrington, † 1800), z. B. Gewächsh. B. speciosa L., s. Butonia Juss. (Mammea asiatica L., Commersonia Sonner.) (schönst. B. des Australoceans!). — Barringtoniae (sc. Melaleucaeae) Rehb.

1) **Bartonia** Mühlenb., Pursh (Loasaceen, IV. 1) „Bartonie“ (n. Dr. S. Barton, Bot. in Philadelphia), z. B. Zier. aurēa Lindl. (Mentzelia Lindleyana) m. v. nana (Californ.), fr. Bartonie dorée, e. golden Bartonia. 2) **Bartonia** Sims, W. (Gentianen, IV. 1), s. Andrewsia Spr. u. Centaurium Bartonia Sims.

Bartramia Dill., Hedw. (-ēa DC.) (Moose, XXIV. 2) „Bartram's“-M. (von Dillen n. W. Bartram, Colonist in Pennsylvanien, ben. s. d. Aut.), z. B. pomiformis Flörke (Salzb. Alp.). — Bartramiacēae Schimp.

Bartsia (-tschia) L. (Scrophularineen, XIV. 2) Alpenkamm, Quell-

- Hahnenkamm (n. Joh. Bartsch, s. d. Aut.), z. B. *alpina* L., s. *Staehe-*
lina alp. Crantz (*Euphrasia rubra* Raj.).
- Baryxylon (-um)** Lour. (Cassieen, X. 1) „Schwerholz“, Eisenholz v.
Cochinchina, fr. *baryxyle* ($\beta\alphaρύς$ schwer, $\xiέλον$ Holz), B. *rufum*
Lour.
- Basella** L. (Chenopodiac. od. Phytolaccaceen, V. 3) Malabarspinat, Beer-
 blume (v. einem malabar. Wort abgeleit.), z. B. *B. rubra* L. u. *vesi-*
caria Lam. (— schwarze Beeren z. Rotfärbung!), s. *Anredēra spicata*
Juss.
- Basilaea** Lam., Juss. (Liliaceen, VI. 1) Kaiserkrone (*Corona Regalis*
 Dill. = *Fritillaria imperialis*), B. *bifolia* Poir. etc. ($\betaασιλείος$ könig-
 lich) s. *Eucōmis* L.
- Basilicum** (sc. *Ocimum*) L. (Labiaten, XIV. 1) „Basilienkraut“, gem.
 Basilien, fr. basilic, plante-romaine, e. basil (gr. $\betaασιλικόν$ v. $\betaα-$
 $\sigmaιλεύς$ König — königl. weg. Geruch u. Heilkraft!).
- Basilium** Mnch. (Labiaten, XIV. 1), gem. Basilien = *Basilicum*.
- 1) **Bassia** Juss., Kön. (Sapotaceen, XI. 1) Butterbaum, B. *butyracea*
 Kön. (n. d. Bot. Ferd. Bassi in Bologna, † 1774), s. *Ilippe malabar-*
ris Kön. 2) **Bassia muricata** Allion. (Chenopodiaceen, V. 2) s. *Sal-*
söla mur. L. 3) **Bassiana** (sc. *Botrytis*) Mich. (Pilze, XXIV. 4) Mus-
 cardinepilz d. Seidenraupen.
- Batatas** Lam. (Convolvulaceen, V. 1) Batatenwinde, Camote, fr. patate
 od. batattes (malayisch!), B. *edulis* Chois. = *Convolvulus Batatas*
L. (Ipomoea Bat. Rchb.).
- Batrachium** E. Mey. (zu *Ranunculus* L.) (Ranunculaceen, XIII. 3 od. 7)
 „Froschkraut“, -veilchen, -blume Mej., Haar- od. s. g. Löffelkraut,
 Wasserranunkel, fr. grénouillette, z. B. aquatile u. fluitans Oed., fr.
 brouille-blanche ($\betaατράχιος$ Frosch, $\betaατράχιο$ — $\tauόν$ Veilchen, Mej.).
- 1) **Batschia** Mich. (Boragineen, V. 1) „Batschie“, s. *Lithospermum*
 Lehm. (Rindēra carolinensis Pers.). 2) **B.** Mnch., Cass. (Compos.
 Eupatorineen, XIX. 1). 3) **B.** Thb. (Menispermeen, XXII. 12), z. B.
 racemosa u. *spicata* Thb. (Trichoa etc. Pers.) (n. d. Prof. J.G. Batsch
 in Jena, s. d. Aut.).
- Bauhinia** Plum., L. (Cassieen, X. 1) „Bauhinie“, Fassholz, fr. bois à
 barrique (n. Joh. u. Kasp. Bauhin, s. d. Aut.), z. B. *scandens* L.,
 porrecta W. (*Sennae spuriae* Sloan.) (Indien).
- Beaufortia** Ait., R. Br. (Myrtac. Melaleucac., XVIII. 2) Tristan-Myrte
 (n. d. Herzogin Mar. v. Beaufort), z. B. *splendens* u. *decussata* Ait.,
 s. *Tristania* R. Br.
- Beccabunga** (sc. *Veronica*) L. (Scrophularineen, II. 1) Bachbunge, fr.
 beccabunga, salade de chouette „Kauz-Salat“, véronique mourron-
 née, e. brook-lime (latinisiert „Bach-Pungen“ od. „Bunge“).
- Beckmannia** Host (Gräser, III. 2) Raupenhähre (n. J. Beckmann, s. d.
 Aut.), B. *erucaeformis* W. (*Cynosurus erucaef.* Ait.) s. *Phalāris* L.
- Beffaria** Sm. Druckfehler st. **Bejaria** Sm.
- Begonia** L. (Polygonaceen od. Begonieen, XXI. 9) Schießblatt, fr. bé-
 gorie (n. Mich. Begon, franz. Intendant auf St. Domingo, geb. 1638),
 z. B. *Blattpl. R. Rex J. Pz.*, *falcifolia* Hort., *incarnata*, *argentea*
 Lind., *discolor* R. Br., fr. b. à deux couleurs, e. two-coloured Beg. etc.
 — Begoniaceae R. Br.
- Behenantha** Otth., DC. (-the Schur) (Silenaceen, X. 3) „Behenblume“,
 s. g. Taubenkropf, fr. carnillet (-niolet), e. calves-foot = *Cucubalus*
Behen L. (*Behen vulgaris* Mnch.), s. *Silene inflata* Sm. s. *vulg.*
 Grck. (behen, eig. eine Pfl. am Libanon, $\alphaγθη$ Blume).
- Bejaria** Sm. (Ericaceen, X. 1), „Bejar’s-Rhododendron (n. e. Spanier,
 Namens Bejar).
- Belis** Salisb. (Conifer. Araucarieen, XXI. 9) Spiesstanne Lauch. (v. $\betaέλιος$

Geschoss — spießförm. Nadeln u. Zapfenschuppen!), z. B. lanceolata Sweet (jaculifolia Salisb.) (China).

- 1) **Belladonna** (sc. Atröpa) L. (Solanaceen, V. 1) Wolfs- od. Tollkirsche (ital. bella donna, fr. belle dame, schöne Dame — Mittel für schöne Augen etc.!). 2) **Belladonna** Sweert (sc. Amaryllis) L. (Amaryllideen, IV. 1) Belladonna-Lilie.

Bellevalia Lapeyr. (Liliaceen, VI. 1) röm. Hyacinthe od. Meerzwiebel (n. d. Bot. P. R. Belleval in Montpellier, † 1598), B. romana Lap.

Bellidiastrum Mich. Cass. (zu Arnica) Rchb. (Compos. Bellidieen, XIX. 2) Stern- od. Alpen-Masliebchen, Maslieb-Wolverley, Ruckel O. W. (deter. Bellis, -idis od. Bellis u. *ἀστρον* Bild, Wtst.), z. B. B. Michelii Cass. (Arnica s. Doronicum B. L., W.).

Bellis (G. -idis) L. (Compos. Radiaten od. Bellidieen, XIX. 2) Masliebchen, Tausendschön, Gänseblümchen, fr. paquerette, petite marguerite, fleur printanière, e. daisy (-zy), margarites od. margaronet (v. belle, lat. bellus, allerliebst), Zier. B. perennis L. v. fl. pleno, e. velvet-flower „Sammetbl.“, wild fr. auch liane rade u. margueritelle, e. argentine- od. bone-flower.

Bellium L. (Compos. Radiaten, XIX. 2) italienisches od. See-Maslieb (Bellis maritima Bocc.) (s. v.), z. B. bellidoides L. (Bellis annua minima Triumf.), minutum L. (Bellis cretica T.).

Benedicta DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Benedikten“-Distel, fr. bénarde, chardon béni u. galliotte, e. bennet, holy-thistle (benedictus gesegnet, „benedict“ — Heilkraft!), s. Cnicus B. Vaill. (Centaurēa B. Rchb.).

Benineasia (-casa) Savi (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Benincasie“ (n. d. ital. Grafen Benincasa), z. B. cerifera Savi „Wachsgurke“ (Ostind.).

Benthamia Lindl. (Cornaceen od. Hederaceen, IV. 1) „Bentham's“ Cornel- od. Erdbeerstrauch (n. G. Bentham, s. d. Aut.), z. B. B. fragifera Ldl. (Cornus capitata Wall.) (Nepaul).

Benthamidia florida Spach (Cornaceen, IV, 1) Blumen-Hartriegel (s. eb. u. ειδομαι gleiche), s. Cornus fl. L.

- 1) **Benzoïn** Hayne (Sapotac. od. Styracineen, X. 1) Benzoebaum, echte Benzoe, fr. badamier od. belzof, auch assa-doux, e. benjamin (fr. bien-joint) (n. d. franz. Bot. Benzon, beschr. 1556 die echte Benzoë, Benzonia Schum.), B. officinale Hayne (Benzonia Schum.), s. Storax Benzoïn Dryander. 2) **Benzoïn** (sc. Laurus) L. (Lauraceen, IX. 1) Benzoïn - Lorbeer. 3) **Benzoïn** (sc. Terminalia) L. (Combretaceen, XXIII. 1) Benzoe-Croton, s. Croton Benzoë L. (Terminalia angustifolia Jacq.).

Berberidéae Vent., DC., Rchb. Berberitzenträucher, s. sogl.

Berbérис L. (Berberideen, VI. 1) Berberitzentr., Sauerdorn (-rach), fr. vinettier, épine-vinette, e. pipperidge-tree, barberry (barberry, bearberry) = Bärbeerstr. Mej. (v. d. arab. berberi? Berbéris Berber? — ungewiss!), z. B. B. vulgaris L. (Oxyacantha Galeni Tabern.) m. v. v. (z. B. atro-purpurea Hort.), B. canadensis Pursh (caroliniana Hort.), B. repens Lindl., B. Mahonia Nutt. (Aquifolium Pursh) u. a.

Berchemia Neck. (Rhamnaceen, V. 1) „Berchemie“ (n. ein. franz. Bot. Berchemi), z. B. Gart.-Schlingstr. volubilis DC. (Virgin.), s. Rhamnus s. Zizyphus vol. L.

Bergenia Mnch. (zu Saxifräga Rchb.) (Saxifrageen, X. 2.) sibir. od. Dickblatt-Steinbrech (n. d. Prof. K. A. v. Bergen in Frankf. a. O., schr. Fl. Francofurta, † 1760), Zier. B. bifolia Mnch., s. Saxifräga crassifolia L. (Geryonia Schrk.).

Berisia Spach (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) Alpen-Johannisbeeren (Anagramm v. Ribesia!), z. B. Zier. R. alpinum u. orientale Desf.

Bermudiana Feuill., Dill. (s. Sisyrrhinichium) L. (Irideen, XX. 2) „Ber-

- muden“-Rüsselschwertel (n. d. Bermudes-Inseln ben.), z. B. *coerulea* Feuill. (*Anthericum coer.* D.), s. *Bermudiana graminea* Dill.
- Berteroëa** DC. (zu *Farsetia* Rchb.) (*Crucifer. Siliculosen*, XV. 1) „*Berteroëa*“, Grauschildkresse, Germsel O. W., fr. cresson des sables, *B. incana* DC. = *Alyssum incanum* (*Farsetia* s. *Moenchia* inc. autt.) (n. d. ital. Bot. u. Reis. in Südamer. Jos. Bertero, s. d. Aut.).
- Bertholletia** Hb., Bpl. (*Melaleucaceen*, XVIII. 2) Brasilianer - od. Rahm-Nussbaum (n. d. Chemik. Graf Cl. L. de Berthollet in Paris, † 1822), z. B. *B. excelsa* H. B. (Südamer. B.).
- 1) **Bertolonia** Raddi, Spr. (*Melastomaceen*, XI. 5) „*Bertolonie*“ (n. d. ital. Bot. Bertoloni in Bologna, s. d. Aut.), z. B. *Warmh. marmorata* u. *aenæa* Naud., *paniculata* Spr. (*Str. Brasil.*, 2) **B.** DC. (*Compos. Cichoriac.*, XIX. 1). 3) **B.** Spin. (*Verbenac.*, XIV. 2), z. B. *glandulosa* = *Myoporum viscosum* R. Br. 4) **B.** Spr. (*Guttiferen*). 5) **B.** Moç. Sess. (*Rosaceen*). 6) **B.** Del., Spig. (*Polygalaceen*).
 - 1) **Berula** Hoffm., Koch (*Umbelliferen*, V. 2) „*Berle*“, fr. berle (latinis. Berle), z. B. *angustifolia* Koch (*Sium ang.* L.) Wassereppich. 2) **Berula major** autt. = *Veronica Anagallis* L.
- Beschornesia** Lindl. (*Liliaceen Agaveen*, VI. 1) „*Beschornes*“-Agave, z. B. Gewächsh. *yuccoides* Lindl., *argyrophylla* etc. (n. d. Nam. *Beschornes* geb.).
- Besleria** L. (*Gesneraceen*, XIV. 2) „*Beslerie*“ (n. Bas. Besler, s. d. Aut.), z. B. *violacea* Aubl. (*Kletterstr. Guianas*), s. *Cyrtandra Forst.*
- 1) **Bessera (-ia)** Schult. (*Boragineen*, V. 1) „*Besser's*“-Lungenkraut (s. d. Aut.), z. B. *azuræa* Schult. (*Pulmonaria az.* Bess.). 2) **Bessera** Spr. (*Capparid. Flacourteeen*, XIII. 1) s. *Limacia* (*Koelera W.*, *Rumea Poit.*). 3) **Bessera** Schult. f. (*Amaryllideen*, VI. 1), z. B. *elegans* (Brasil.).
- Beta** T. (*Chenopodiaceen*, V. 2) *Mangold*, *Scharzkraut*, *Dick-* u. *Runkelrübe* etc., fr. bette u. poirée, réparée, racine de disette „*Dickrübe*“, râve-male, e. beet (beet-rave, better-rave) „*Runkelrübe*“, red-beet „*Rotrübe*“ (n. d. celt. bet rot), z. B. *Zier. B. vulgaris* L. v. *rubra* Hort. rotripp. M., fr. poirée à corde rouge, e. red-ribbed b., brasilian Swiss-Chard, *B. vulgaris* v. *lutæa* Hort. gelbripp. M., fr. poirée jaune du Brésil (Chili).
- Betonica** T. (*Labiaten*, XIV. 1) „*Betonie*“, fr. bétaine, e. betony (v. d. celt. ben Kopf u. ton gut — als Niessmittel, Paxton), z. B. *Zier. grandiflora* W. (*Stachys gr.* Benth.) (Sibir.), m. v. *rosæa* Hort., *B. officinalis* L. etc.
- Betula** T. (*Amentaceen*, XXI. 5) Birke, fr. bouleau, e. birch (v. d. celt. betu Birke), z. B. *Zier. B. alba* L. v. *pendula* Ehrh., *odorata* Bechst. (*pubescens* Hort.) „*Ruch*“-B., *verrucosa* Ehrh. (beide *B. alba* L.) etc.
- Betulus** (sc. *Carpinus*) L. (*Amentaceen*, XXI. 5) gem. Weiss- od. Hainbuche, Hornbaum, fr. charme, e. horn-beam, yoke-elm (s. eb.).
- Bicornes** Endl. Kl. der „*Zweihörnigen*“ (bi- zwei, cornu Horn — bez. d. Antheren).
- Bidens** T. (*Compos. Heliantheen*, XIX. 3) „*Zweizahn*“, Wasserdst, fr. bident (bi — zwei, dens Zahn — zweispitz. Achänen!), z. B. *tripartitus* L., fr. tête cornue, langue de chat, s. g. *Frauenspiegel*, Wolff, etc., s. *Coreopsis Bidens* L.
- Bifolium cordatum** Fl. Wett. (*Smilacineen*, VI. 1) „*herzblättr. Zweiblatt*“, Schattenblume, s. *Convallaria bifolia* L. (*Majanthemum bif.* Schmidt).
- Biföra** Hoffm. (*Umbelliferen*, V. 2) „*Bifore*“ Grck., „*Zweihohl-Samen*“ bess. *Biforis* Spr. (bi- u. föro durchbohre), z. B. *flosculosa* M. B., radians ds. (Taurien), s. *Coriandrum testiculatum* L.
- Bifrenaria** Lindl. (*Orchideen Vandeen*, XX. 1) „*Zweizügel*“-O. (bi- u. frenum Zaum, Zügel — d. vier Pollenmassen an zwei besonderen Schwänzchen, Wtst.), z. B. *atro-purpurea* Ldl. (*Maxillaria a.* (Bras.).

- 1) **Bigelovia** Spr. (Oleaceen Foresterieen od. Samydeen, XXIII. 1) „Bigelowie“ (n. d. nordamer. Bot. Bigelow, s. d. Aut.), z. B. B. ligustrina Rees (Forestiera l. Poir., Borya l. W., Adelia l. Mchx.), B. acuminata Rees (Forestiera ac. Mchx.). 2) **B.** Sm. (Taxaceen). 3) **B.** DC. (Compos.).
- Bignonia** L. (Scrophularineen Bignoniac., XIV. 2) Trompetenblume, fr. Bignone (n. d. Abbé Bignon, † 1743, s. d. Aut.), z. B. Zier. capreolata L., fr. B. à vrilles, e. tendrilled Bignonia „Klimm“-Tr., Ge-wächsh. venusta Ker, Carolinae Lindl., Chamberlainii Sims, u. a. B. Catalpa L. (Catalpa bignonioides Walt. s. syringifolia Sims m. v. nana Hort., nägleinblättr. Trompetenbaum. — Bignoniaceae R. Br. Bihi (sc. Musa) L. (Musaceen, XXIII. 1) „Bihai“-Banane, fr. bi-ha-i (Südamer.), s. Heliconia Bihai (vaterl.).
- Bilimbi** (sc. Averrhoa) L. (Gruinalen od. Bombaceen, X. 4) Reizblatt-Av., „Blimbingbaum“ = Blimbingum teres Rumph. (ostind. Bstr.) (vaterl. — reizempfindl. Blattstiele, R. Bruce).
- 1) **Billardiéra** Sm. (-deria Spr.) (Pittosporaceen od. Polygaleen, V. 1) Blaubeer-Schlange, fr. billardière (n. Labillardière, s. d. Aut.), z. B. fusiformis Lab. (Sollya heterophylla Lindl.), paniculata Sm. (Froe-lchia p. W.), explanata Mnch. (Verbena grandiflora, Buchnéra canadensis L.). 2) **Billardiera** (Labillardiera R., Sch.) (Rhamnac., V. 1), z. B. angustifolia DC. 3) **B.** Vahl (Rubiaceen, IV. 1).
- Billbergia** Thb. (Bromeliac., VI. 1) Greisenbart (n. d. schwed. Bot. J. G. Billberg), z. B. Stuben B. pyramidalis, zebrina Ldl. = Til-landsia z., B. Chantini Carr.
- Biöta** D. Don, Endl. (Cupressineen, XXI. 9) Lebensbaum, fr. arbre de vie, e. arbor vitae (gr. βιοτή Leben), s. Thuja L. u. Phyllocladus Spach, z. B. Zier. orientalis Don v. aurea Hort. Waterer u. v. filiformis Hort. s. erecta Lodd. (fadige Zweige) u. pendula Endl.
- Biotia** Cass., DC. (Compos. Sigesbeckien, XIX. 2) „Biot's“-Aster (n. d. Astronomen Biot), Zier. B. latifolia DC. (Aster lat. Desf.), commixta DC., corymbosa DC. etc., s. Aster u. Eurybia.
- Bipinnula** Commers. (Orchideen, XX. 1) „Zweifeder“-O., Runzelbart (dem. bipinnus zweifederig), s. Arethusa.
- Bischoffia** Blum. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Bischoffsbaum“ (n. d. Bot. Bischoff, s. d. Aut.).
- Biscutella** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) Brillenschötchen, fr. lunetièr (bi- zwei u. dem. scutum Schild, -ellum Schildchen — Schötchenform), z. B. auriculata L.
- Biserrula** (fehlerh. Bisserula) L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Doppelsägenhülse“, fr. scie od. double scie (bi- u. dem. serra Säge — Hülse an d. beid. Kanten gesägt!), z. B. Pelecynus L. Sägekraut D., fehlerh. Bisserula u. Bicerula autt.!
- Bismalva** Mnch. (zu Malva) Rehb. (Malvaceen, XVI. 8) „Doppelmalve“, fr. guimauve (bis zweimal od. doppelt — dopp. Kelchhülle!), z. B. B. Alcea L. u. moschata L., s. Malva.
- 1) **Bistorta** (sc. Polygnum) L. (Polygoneen, VIII. 3) Wiesenknöterich, Natterwurz, s. g. Schlippen (als Gemüse), fr. bistorte, e. adder's-wort od. bistort, auch snake-weed (bistortus zweimalgedreht — nämli. d. Blumenähre!), s. Bistorta major autt. 2) **Bistorta** Rehb. (sectio v. Polygnum L.), z. B. vivipara kleine Natterwurz M. Rehb. (Polygnum bistortoides Pursh).
- 1) **Bivonaea (-neā)** DC. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Bivonae“, Gelbtäschel (n. Bivona-Bernardi, s. d. Aut.), B. lutea DC. (Sibir.) s. Thlaspi l. Biv. 2) **Bivonēa (-ia)** Spr., Raf. (Euphorbiaceen, XXII. 5), z. B. axillaris Spr., s. Adelia Martii Spr. (bras. Str.).
- Bixa** L. (Cistifloren Bixaceen, XIII. 1) Orleanbaum, B. Orellana Rumph.

- ostind. O. (nicht Orleana!), (n. d. bras. Nam. d. Pfl. biché), B. Urucurana W. brasil. O., fr. roucouver (orléan od. roucou, Orleana terra der Apoth.). — Bixacēae Rchb., -xinēae Kth. Orleanbäume.
- 1) **Blaeria** L. (bess. **Blairia** G.) (Ericaceen od. Vitaceen, XIV. 2 od. IV. 1) „Blairie“ (n. Patrick Blair, Arzt in Boston, Lincolnshire), z. B. Treibh. ericoides Ait. (Erica Blaeria Thb.). 2) **Blairia** Houst. (Verbeneen, XIV. 2), s. Priva Ad. (Tortula W., Streptium Rxb., Verbena Dill.).
- Blakea** L. (-ckeia P. Br., -ckia Schrk.) (Lythrariaceen od. Melastomaceen, XI. 1) „Blakee“ (n. Mart. Blake, Verbr. nützl. Kenntnisse, Paxton, n. Steph. Blake, schr. 1664 d. prakt. Gärtner, Wtst.), z. B. trinervia L. (Str. Jamaica), quinquenervia Aubl. (triplinervia) (B. Guiana), latifolia u. rosēa Don (Str. Peru) u. a.
- 1) **Blandfordia** Sm. (Amaryllideen, VI. 1) „Blandfordie“ (n. Georg Marquis v. Blandford, Smith's Freunde), z. B. Gewächsh. B. flammea Hook., Cunninghamia Ldl., aurēa Veitch, nobilis Sm. (Neusüdwales). 2) **Bl. cordata** Andr. (Saxifragaceen), s. Solenandra cordifolia Vent.
- 1) **Blattaria** (sc. Verbascum) L. (Scrophularineen od. Solaneen, V. 1) „Schaben“- od. Mottenkraut, fr. herbe aux mites (v. Blatta Schabe u. Motte — geg. solche angew.!). 2) **Blattaria** zeylanica Comm. (Sterculiaceen, XVI. 7) Schabenmalve, s. Pentapetes phoenicea L. (Dombeya s. Cavanillea ph.).
- Blechnum** L., W. (Farne, XXIV. 1) Rippen-, Kamm-, Streifenfarn, fr. blegne (gr. βλέφαρον), z. B. Baumf. B. brasiliense Desv., australe L., occidentale L. u. a.
- Blepharis** Juss. (Acanthaceen, XIV. 2) „Wimper“-Acanthus, fr. blépharès (gr. βλεφαρίς Augenwimper — Brakteen gewimp., Wtst.), z. B. boerhaaviaefolia Juss. (Acanthus maderaspatensis L.), arborea Spr. (Acanthus arb. Forsk.), linariaefolia Pers. (Senegal) u. a.
- Bletia** Rz. Pv. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Bletie“, Erdorchis (zu Orchid. terrestres Bot.) (n. d. span. Apoth. u. Bot. Don Louis Blet in Madrid), z. B. catenulata R. P., ensiformis L. (Peru), bicolor Don (Stelis racemosa Sw., Empusa paradoxa Lindl.).
- Blighia** Kön. (Sapindaceen, VIII. 1) Akeebaum (n. d. Capt. Bligh, dem Verpflanz. dess. n. Westind., schr. Reise im Südmeere, 1792), z. B. sapida Kön., s. Akeesia africana Tuss.
- 1) **Blitum** L. (Chenopodiaceen, V. 2) Erdbeerspinat, Beermelde, Schminkbeere Rmpl., Schmirbel O. W., fr. blette od. épinard-fraise, e. strawberry-spinache (gr. βλιτόν Melde), z. B. capitatum L., fr. bl. capitée. 2) **Blitum** (sc. Amarantus) L. (Amarantac., XXI. 5) wilder Amarant M. Rchb., fr. amarante-blette, s. Blitum album minus Pluck.
- Blysmus** Panz. (Cyperaceen, III. 1) Quellriet (βλυσμός d. Hervorquellen — wächst im Wasser), z. B. compressus Panz. (Scirpus compr. Pers.).
- Bobartia** L. (Cyperac. od. Irideen, III. 1) „Bobartie“, fr. bobart (n. d. Prof. Jak. Bobart in Oxford, † 1679), z. B. Zier. B. indica L. (Schoenus Bobartii Retz.), s. g. Bermudienne od. bunte Moräe, s. Moraea chinensis Thb. (Ixia ch. Ehret).
- Boca** (Bocca) prouacensis Fl. Flum. (Bixaceen, XIII. 1) „Bocco“- od. Rebhuhnholz (vaterl.), s. Banara Aubl.
- Bocconia** Plum. (Papaveraceen, XI. 1) „Bocconie“, fr. bocconie (n. d. Sicilianer Dr. med. Paolo Boccone, gen. Sylvius, schr. Icones pl. rar. Sicil., Melitae, Galliae et Italiae, Oxf. 1674, s. d. Aut.), z. B. Zier. B. cordata W. (Macleya c. R. Br.), fr. B. à feuilles en cœur, e. cordate-leaved B.
- Boebēra** W. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Boeber's“-Stinkblume, s. Dysodia Cav. (n. d. russ. Prof. d. Bot. Boeber, † 1820), z. B. Zier.

chrysanthemoides W. (*Dysodea glandulosa* u. *Tagētes papposa* Mchx.),
s. pumila Hort. Pis. (N.-Amer.).

Boehmera Lk. (-ia Jacq.) (Urticaceen, XXI. 4) Nesselbaum, Kätzchen-
 schwanz, s. g. Ramie, B. ramiflora Jacq. (n. d. Bot. G. R. Böhmer,
 s. d. Aut.), s. Caturus s. Procris ramiflora, B. utilis Rmpf. u. nivéa
 Jacq., s. g. Ramée od. Chinagras (geb. Gespinnstpfl. Hint.-Ind.). B.
 cylindrica Sw. (*Urtica c.* L.) u. a.

- 1) **Boerhavia** L. (Nyctagineen, II. 1) „Boerhavie“, fr. tassole (n. Boer-
 have), Prof. in Leyden, s. d. Aut., z. B. africana Lour., arboréa
 Lag. (Mex.), tuberosa L., erecta L. (*Solanum bacciferum* Pluk.) u. a.
 2) **Boerhavia** Vahl (Valerianeen, II. 1) B. chaerophylloides (Valeriana
 ch. Pers. u. laciniata Rz. Pv.), scandens L. (dichotoma Vahl), s. Va-
 leriana s. *Anisophyllum* sc. Forsk.

Bohēa (sc. Thea) L. (Theaceen, XIII. 1) brauner Thee W., e. bohea
 (bohi) „Theebuh“, s. Thea flor. hexapetalis Amoen. acad. (n. d.
 chines. Berg vui geb. Name).

Bojeria DC. (Compositen Bojerieen) „Bojerie“, z. B. speciosa DC. (n.
 d. Prager Bot. u. Reis. Wenzel Bojer, s. d. Aut.). — Bojeriae DC.

Boissiae Vent. (Cassieen, X. 1) „Boissieu“-Cassie (n. C. V. Boissieu
 de la Martiniere, Begl. Lapeyrouse's, Wtst.).

Boissiera Domb. (Convolvulac. od. Boragineen, V. 1) Brustbeerbaum,
 B. trinervata Domb. = Cordia Boissieri autt. (n. d. Bot. Edm. Bois-
 sier in Genf, s. d. Aut.).

Bolax Comm., Juss., Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Bollendolde“ ($\beta\omega\lambda\alpha\xi$
 Kloss, Bolle — Pfl. als halbkugelf. auf d. Erde lieg. Klumpen, Wtst.),
 s. Azorella Cav.

Bolbitius Tode (Pilze, XXIV. 4) Gold-Dungpilz Kumm. ($\beta\omega\lambda\beta\iota\tau\sigma$ Mist),
 z. B. vitellinus Tode, s. Agaricus v. L.

Bolbophyllum P.-Thou. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Bollenblatt“ ($\beta\omega\lambda-$
 $\beta\circ\varsigma$ lat. bulbus Zwiebelbolle, $\varphi\iota\lambda\lambda\circ\varsigma$ Laubblatt), z. B. leopardinum
 u. mutabile Lindl., s. Diphyses, Tribachia Ldl. u. Dendrobium Sw.

Boldōa Lag. Cav. (Nyctagineen, III. 1) „Boldoblume“ (n. d. span. Bot.
 Dr. Boldo ben.), z. B. fragrans Lag. (folia Boldo Offiz.), s. Salpian-
 thus H. B. K. „Trompetenbl.“

Bolētus Dill. (Pilze, XXIV. 4) Löcher- od. Röhrchenpilz, fr. bolet (gr.
 $\beta\omega\lambda\iota\tau\eta\varsigma$ essb. Pilz), z. B. edulis L., fr. brugnet, B. buglossoides, fr.
 glue des chênes.

Bolleā Rchb. f. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Bollee“ od. Bolle“-O. (n.
 d. deutsch. Reis. auf d. Azoren etc. 1853, Bolle), z. B. violacea Ldl.,
 s. Vanda R. Br.

Boltonia Schreb., l'Hér. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Boltonie“ (n. d.
 schott. Bot. J. Bolton, s. d. Aut.), z. B. Zier. B. asteroïdes l'Hér.
 (Matricaria ast. L.), glastifolia l'Hér., fr. à feuilles de Pastel, e. woad-
 leaved „waidbl.“ B.

Bolus autt. (verdrückt?) st. Boletus, s. d., z. B. scaber, ovinus etc.

Bomarēa Mirb. (Liliaceen, VI. 1) „Bomaree“ (n. Jacq. Christophe Val-
 mont de Bomare, Bot. zu Paris, † 1807, schr. Dict. univ. d'hist. nat.),
 z. B. multiflora Mirb. (Alstroemeria m.), Gewächsh. edulis Mirb.,
 Carderi, Caldasina, Salsilla (windend) etc.

Bombacēae DC. (zu Oxalidēae Rchb.) s. Bombax.

Bombax L. (Oxalid. Bombaceen od. Sterculiac., XVI. 8) Seiden- od. Baum-
 wollenbaum, Wollsame D., Käsebaum, fr. fromager od. bombax, gos-
 sampin u. baquier ($\beta\omega\mu\beta\alpha\xi$ Baumwolle — Samenwolle), z. B. pent-
 tandrum L., fr. capoquier, s. Gossypium javanense Bauh. (*Eriophoros*
javana Rumph.), B. Ceiba L. starker W., Wolldorn, s. Xylon caule
 aculeata Hort. Cliff. (Gossypium arborēum Sloan.) (Südamer.).

Bombycella DC. (Malvaceen, XVI. 8) Seiden-Eibisch ($\beta\omega\mu\beta\nu\xi$, -zos

- Seide etc. — Staubgef. in Seide gehüllt!), s. *Hibiscus* L. u. *Bombyx* Med.
- Bonannia** Raf. (Sapindaceen, VIII. 1) „Bonannie“ (n. Bonanni, wandte zuerst Spiegellicht b. Mikroskop an, schr. Observationes etc., Rom 1699, Wst. n. d. span. Guinea-Insel Bonanno od. Anabon).
- 1) **Bona nox** (sc. Smilax) L. (Smilacineen, XXII. 6) „Gute Nacht“.
 - 2) **B. n.** (sc. Ipomoea) L. (Convolvulac., V. 1) prächt. Trichterwinde (— bei Tag geschlossne Krone!).
- Bonopartea** Rz. Pv. (Bromeliaceen, VI. 1) „Bonapartee“ (n. Napoleon I. Bonaparte), z. B. *juncēa* R. P., s. *Misandra* j. autt. (*Yucca Boscii* Desf.).
- Bonatēa** (bess. -tōa) W. Lindl. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Bonatos“-O. (n. d. Prof. Ant. Bonato in Padua, † 1837), z. B. *speciosa* W. (*Orchis* sp. Sw.) (Capland).
- Bonaveria** Scop., Neck. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) „Bonaverie“ (n. J. B. Bonaveri im 18. Jahrh., schr. Verz. d. Pfl. um Comachio), z. B. *Securidaca* Scop. (*Securidaca vera* G. „beilkrautart.“ B.), s. *Coronilla Securid.* L. u. *Securilla* Pers.
- Bondue** Plum. (sc. *Guilandina* L.) (Legum. Cäsalpinieen, X. 1) prächt. Theodore, s. *Theodora speciosa* Med. (fr. bon duc, guter Führer od. Herzog), s. auch *Bonducella* L.
- Bongardia** C. A. Mey. (Berberideen, VI. 1) „Bongardie“, B. *Rauwolffii* Mey. (n. d. Bot. H. G. v. Bongard, russ. Staatsr., † 1839, s. d. Aut.), s. *Leontice* L.
- Bonjeania** Rchb. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Faltenklee (n. d. Bot. Bonjean in Chambery), z. B. *hirsuta* Rchb., s. *Lotus tomentosus* Rhod.
- Bonnetia** Schreb. (Ternstroemiac. od. Guttiferen, XIII. 1) „Bonnetsbaum“ (n. d. Pfl.-Samml. Ch. Bonnet), z. B. *meridionalis* u. *racemosa* Sw., s. *Mahuria palustris* Aubl. u. *speciosa* Chois.
- Bonplandia** Cav., W. (Rutac. od. Polemoniac., V. 1) „Bonpland'sbaum“, Angosturarindenbaum Rchb. (n. d. Bot. u. Reis. Ronpland), B. *trifoliata* W., s. *Galipea Cusparia* St. Hil. (*Cusp. febrifuga* Hb.) = Angostura Cuspare R. Sch.
- 1) **Bontia** L., W. (Myoporineen od. Polygalac., XIV. 2) wilder Ölbaum, B. *daphnooides* L. (*Olēa sylvestris* Pluk.) (Antill.) (n. d. Bot. Jak. Bontius, † 1631 in Batavia). 2) **Bontia** Petiv. (Orchideen).
- Boōpis** Juss. (Compos. Amphicarpantheen Rchb., XIX. 4) „Rinds“- od. „Ochsenauge“, fr. *boopis*, e. eye of an oxe (v. βοῦς, βούς Rind etc., ὄψ, ὄπος Auge, βοόπις grossäug. Blume!).
- Bootia** Neck., DC. (Caryophylleen od. Silenac., X. 2) „Kuhnelke“, s. *Vaccaria* Med. (βοῶτης Ochsentreiber, Wst. v. Boot, s. sogl.). 2) **Bootia** Wall. (Hydrocharideen) (n. Arn. Boot, Arzt in London, † 1650, od. Ans. de Boot, ein Flamänder, Abb. v. Pfl. 16. Jahrh., Wst.). 3) **B. Bigel.** (Potentilleen).
- Boragineae** Juss., DC. *Boraschgew.* i. q. *Asperifoliae* Rchb. Scharf- od. Rauhblättrige, s. *Borago* (-inis).
- Borāgo** (*Borrage*) L. (Boragineen od. Asperifoliens, V. 1) „Borasch“, Boretsch, fr. *bourrache*, e. *borage* od. *burrage* (v. βορά Speise od. borra kurzes Haar, Wst. d. verand. *corago* (cor u. ago) d. i. herzstärkend! — unsicher!).
- Borassus** L. (Palmen, XXII. 6) Weinpalme (βόασσος lat. *borassus* = Fruchthülle d. Palmen, Diosc.), z. B. *flabelliformis* L., fr. *lontar* od. *bang*, u. *rondier*, „Fächer“-P., s. *Lontarusa domestica* G.
- 1) **Borkhausenia** cava Fl. Wett. (Fumariaceen, XVII. 2) Hohlwurz, s. g. *Kukukblume* (n. Borkhausen, s. d. Aut.), s. *Corydalis bulbosa* Pers. (*Fumaria cava* Ehrh.). 2) **Borkhausenia** Roth (Personaten, XIV. 2) Ziegenkraut, Herzblume, s. *Capraria lucida* W. (*Teedia* Pers.).

- Borkhausia** Böhm. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) i. q. Barckhausia Mnch. (n. Barckhausen, s. d. Aut.), z. B. graveolens Lk. (Barkh. gr. Rchb.), s. Myoséris purpuréa u. Crepis foetida L. (Hieracium foet. Karsch).
- Boronia** Sm. (Rutaceen, VIII. 1) „Boronie“ (n. Franc. Boroni, ital. Begleit. v. Dr. Sibthorp, † 1794), z. B. Stuben: elatior Bartl., pinnata u. serrata Sm., Drummondii etc., s. Heterandra u. Tetrathéca Sm.
- 1) **Borya** W. (Urticaceen od. Euphorbiac., XXI. 4) „Bory'sstrauch“ (n. Bory de St. Vincent), z. B. Zierstr. ligustrina W. u. acuminata W. (Adelia ac. Mehx. u. Forestiera Poir.). 2) **Borya** Lab., R. Br. (Comelyneen, III. 1), s. Baumgartenia Spr. 3) **Borya** Brid. (Moose, XXIV. 2), s. Weisia vulcanica.
- Boseia** Lam., Thb. (Capparideen od. Terebinthac., IV. 3) „Bose's“ Kapperbaum (n. d. Prof. d. Agricultur L. Bose, s. d. Aut.), z. B. undulata Thb. (B. in Capland).
- Bosea** L. (Phytolacceen, X. 5) „Bose's“ Kermesbeerbaum, Goldrutenbaum D. (n. ein. Prof. d. Bot. E. G. Bose od. Kaufm. Kasp. Bose z. Leipz., schr. 1728 üb. d. Beweg. d. Pfl., z. B. Yermamora L. canar. Maulbeer-Erve (span. vervo Erve u. Moro Maulbeere).
- Bossiaeae** Vent. (**Boissiaeae**) (Cassieen, X. 1) „Boissieu's“ Hülsen (n. d. Nam. Boissieu geb.), z. B. Treibh. plumosa, disticha, vera, heterophylla Sm. (Platylodium Sm.) (Neuholl.).
- Boswellia** Roxb. (Terebinthac. Burseraceen, X. 1) indischer Weihrauchbaum (n. Joh. Boswell, Bot. in Edinb., schr. üb. Ambra 1736), z. B. serrata Roxb., thuriféra Colebr. (glabra Roxb.), balsamifera Spr., s. Canarium W.
- Botor** Ad. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Vierkantbohne, eig. „Hirtin“ (v. βότωρ Hirt od. -in, Wtst. malayischer Name!), z. B. B. tetragonalobus Ad., s. Dolichos t. L.
- Botria (-trya)** africana Lour. (Ampelideen, V. 1) afrik. Weinstock, s. Vitis afr. autt. (βότρυς Weintraube).
- Botryanthus** Kl. (Euphorbiaceen, XXI. 1) „Traubenblüt“-E. (s. eb. u. ἄργη Bl.).
- Botryocarpum** Rich. s. Botryocarpum.
- 1) **Botrychium** Sw. (Ophioglosseen - Farne, XXIV. 1) „Traubefarn“, Mondraute, B. Lunaria Pers., s. g. Walpurgiskraut (βότρυς Traube od. βότρυζιον lat. viticulae Geringel d. Weinstocks, Locke). 2) B. Fr. (Pilze) Traubenpilz, s. Cytospora Fr.
- Botryocarpum** Rich. (zu Ribes) Rmpf. (Ribesiaceen, V. 1) Ahlbeerenstrauch (βότρυς, -voς s. v., ωρπός Frucht), z. B. nigrum (Ribes n. L.) m. v. v., schwarze Johannisbeere.
- 1) **Botrys** (sc. Chenopodium) L. (Chenopodiaceen, V. 2) Eichenblatt-Gänsefuss, „Traubenkraut“, fr. botrys. 2) **B.** (sc. Teucrium) L. (Labiaten, XIV. 1) Trauben-Gamander. 3) **Botrys** africana Lour., s. Botrya (Vitis afr. Spr.) (s. v.).
 - 1) **Botrytis** Mich., Nees (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Traubenschimmel“ (gr. βότρυτις traubig — traub. gehäufte Sporen!), z. B. vulgaris Pers. 2) **Botrytis** (sc. Brassica) Metzg. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) Blumenkohl, fr. chou-fleur, e. cauliflower (colly-) (traub. Ansehen d. Wucherung!).
- Bougainvillea** Comm., G. Don (nicht -ginvillea Paxt.) (Nyctagineen, V. 1) „Bougainville's“ Wunderblume (n. d. franz. Seefahrer 1766/69 Bougainville), B. spectabilis W., s. Tricycla Lam.
- Boussingaultia** H. B. K. (Aizoideen od. Chenopodiaceen Baselleen, V. 3) Blumen-Gänsefuss (n. d. Nat. u. Reis. in Südamer., Prof. in Bogota J. B. Boussingault, nicht Chemiker M. Boussingault), z. B. Zier. baselloides Kth., fr. Baselle tubéreuse „beerblumenart.“

- Bouvardia** Salisb. (Rubiac. Cinchonaceen, IV. 1) „Bouvardie“ (n. Dr. Bouvard, Aufs. d. bot. G.'s z. Paris, Wtst. n. Ch. Bouvard, Leibarzt Ludw. XIII, † 1780), z. B. Zier. B. Jacquinii u. splendens (Houstonia coccinea), leiantha u. longiflōra.
- Bovista** L., Pers. (sc. Lycoperdon) L. (Balgpilze, XXIV. 4) „Bovist“ od. Kugel-Balgpilz (d. latinis. bofist od. Bubefist, d. i. Ochsenfurz, in Niederdeutschl., Jürgens).
- Bowdichia** H. B. K. (Cassieen od. Sapotaceen, X. 1) „Bowdichie“ (n. Edw. Bowdich, Seer. d. afr. Gesellsch. in Coast-Castle, † 1824), z. B. virgilioides H. B. K. (B. Südamer.), speciosa Spr. (Moldenhawera floribunda Schrad., Dolichonēma speciosa Nees).
- Bowiēa** Haw. (Liliaceen, VI. 1) „Bowie's-Lilie (n. J. Bowie, Sammler d. Kew-Gärten) B. africana Haw. (Saftpfl.).
- Bowlesia** Rz. Pv., R. Sch. (Umbelliferen, V. 2) „Bowles' Dolde“ (n. ein. irisch. Bot. Bowles, schr. üb. Spanien, † 1780), z. B. lobata R. P., incana u. palmata ds. (Peru).
- Brabējum** L. (Proteaceen, IV. 1 od. XXIII. 1) „Blumensepter“-Baum (v. βραβεῖον lat. praemium Kampfpreis — Ansehn d. Baums!), z. B. stellifolium L. (stellatum Thb.) (B. Capl. u. Aethiop.), s. Brabyla capens. L. f. (Amygdalus Breyn.).
- Brabyla** L. f. (Proteaceen, XXIII. 1) Blumensepter-Baum (βραβεῖον s. eb., ὄλη Holz), s. Brabējum L.
- Brachycōme (-ma)** Cass. (Compos. Bellidieen, XIX. 2) „Kurzhaar“, -schopf (βραχύς kurz, ζόμη lat. coma Haupthaar — Pappus sehr kurzhaarig!), z. B. iberidifolia Benth., e. candytuft-leaved Br.
- Brachylōbus (-os)** All., Desv. (zu Nasturtium Rchb.) (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Kurzschorle“ (s. eb., λοβός Hülse etc.), z. B. austriacum Crantz, amphibium R. Br. etc., s. Nasturtium u. Sisymbrium.
- Brachypodium** P. B. (Gräser, III. 2) „Kurzfuss“, -stiell, Zwenke (s. v., πόδιον dem. v. ποὺς, -όδος Fuss — kurz gestielte Ährchen!), s. Festuca u. Bromus.
- Brachysēma** R. Br. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Kurzfahne“ (s. v., σημα Zeichen, Fahne — vexillum d. Blüte!), z. B. Gewächsh. latifolium R. Br., longifolium u. speciosum (mennigr., Neuhol.).
- 1) **Bradlēa** Adans. (Papilionaceen, XVII. 4) „Bradley's“-Hülse (n. Rich. Bradley, Prof. in Cambridge, † 1732, s. d. Aut.). 2) **Bradliea** G. Schr. (-leya DC.) (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Bradleye“, z. B. glauca Lab. (Neucaled.), philippensis W. (-lippica Cav.) (Str. Philippinen), Glochidion G. (Gl. ramiflorum Forst.) etc. 3) **Bradlaeia** Neck. (Umbelliferen, V. 2).
- Bragantia** Pers. (Aristolochieen, XX. 5) „Bragantie“ (n. d. portug. Prinz. Joh. v. Braganza, Stift. d. Akademie z. Lissabon, † 1806), z. B. Treibh. racemosa Lour. (Str. Cochinchina), s. Apama Lam.
- Brahēa** Mart. (Palmen, VI. 1) „Brahe's“ Fächerpalme (n. d. Astron. Tycho de Brahe, † 1601), z. B. calcarata Liebm., dulcis Mart. (Corypha frigida, Mexiko).
- 1) **Brassavola** Ait., R. Br. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Brassavola's“ O. (n. d. ber. Bot. Ant. Musa Brassavola in Rom, † 1555), z. B. cucullata Ait. etc., s. Epidendron u. Cymbidium. 2) **Brass.** Ad. (Compos. Inuleen, XIX. 2), s. Helenium.
 - 1) **Brassia** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Brass“-O. (n. ein. Reis. u. gesch. Zücht. W. Brass), z. B. maculata R. Br. (Centralam.). 2) **Br.** Benth. (Labiaten, XIV. 1) — Brassiaeae Wall. (zu Labiateae).
 - 1) **Brassīca** L. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) Kohl, fr. chou, e. keal, cabbage, swort, cole-wort (v. βράσω kochen? od. βράσσω rausche? Paxton: n. d. celt. bresic „Kohl“, Varro: v. praeſeo schneide vor — unsicher!), B. oleracea L. „Gemüsekohl“, m. v. v. (acephala DC.

Winterk., gemmifera DC. „Rosenk.“, sabauda L. Savoyer K. od. Wirsing, fr. chou de Savoie, e. crisped cabbage, capitata L. Kopfk. od. „Kappis“, fr. chou-cabu od. pommé, gongylodes L. Kohlrabe, e. cole-rape, botrytis L. Blumenkohl, fr. chou-fleur, e. colliflower etc.), Zier. B. oleracea v. acephala crispa Hort., fr. chou frisé vert, e. curled-german greens, B. oler. v. atropurpurea Hort., v. prolifera Hort. Sprossk., v. laciniata variegata Hort. scheck. Schlitzk., v. palmifolia Hort. Palmk. — Brassicaceae Rich. Kohlartige. 2) **Brassica** marina autt. (Convolvulac., V. 1), s. Convolvulus Soldanella L. Meerstrands-Winde. S. *Napus* u. *Rapa*!

Brassicastrum (zu *Brassica*) Rehb. (Crucif. Siliq., XV. 2) Levkoi- u. levkoiblütiger Kohl, B. Cheiranthus Vill. u. cheiranthiflora DC. (deter. v. *Brassica*).

Braya Sternb. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Bray's“ Rauke, Kriechrauke (n. d. Bot. Fr. Gabr. de Bray, Gesandter etc., † 1831), z. B. supina Koch (Sisymbrium s. L.), alpina Sternb., glabella Richards.

Brayera Kth. (Spiraceen, XII. 2) „Brayer's“ Spiraea (n. D. Brayer in Constantinopel, zuerst geg. d. Bandwurm 1822), B. anthelmintica Kth. s. g. Kusso (Bstr. Abyss.).

Bredemeyera W. (Polygalac., XVII. 3) „Bredemeyer'sstrauch“ (n. d. Hofgärt. z. Wien, Fr. Bredemeyer), B. floribunda W. (Südamer.).

Brexia P. Th., Nor. (Sapotac. Aquifoliac., Wtst. Saxifrageen, V. 1) „Regenblatt“ (v. βρέξις Nassmachen — Schutz geg. Regen, Wtst. madagass. Name!), z. B. B. madagascariensis Ker, s. Venana mad. Lam. Poir. (B., Madag.).

1) **Breynia** Plum., Schreb. (Capparideen, XXIII. 2) „Breyn's“ Lang- od. Dünnhülse (n. Jak. Breyn in Danzig, s. d. Aut.), B. indica L. f. s. Capparis Breynia L., B. disticha Forst. (Neucaled.), arborescens R. Br. (Capparis torulosa). 2) **Br.** Forst. (Euphorbiaceen, XXI. 9).

Brignolia Bertol. (Umbelliferen, V. 2) „Brignoli's“ Dolde, fr. brignole „Brunelle“ (n. d. Prof. J. L. Brignoli von Brunhof in Modena), z. B. pastinaceaefolia Bert. s. Sium siculum.

Brillantasia (-taisia) P. B. (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Brillantaisie“ (n. Brillantais, Rheder d. Compagnie von Oware, Westafr.), z. B. B. owariensis P. B.

Briza L. (Gräser, III. 2) Zitter- od. Flittergras, fr. brize (brise), e. quaking-grass (βρίζα v. βρίζω od. βρίθω nicke), z. B. Zier. B. maxima L. u. minor L. (Bouquets), s. gracilis Hort., Wiesen B. media L.

Broccoli s. *Brassica asparagoides* Metzg. „Spargelkohl“ (ital. Name da-für!), fr. u. e. broccoli (e. bore-cole).

Brodiae Sm. (Liliac. od. Irideen, III. 1) „Brodiae“, fr. Brodiée (n. d. schott. Kryptogamisten James J. Brodie), z. B. Zier. grandiflora, congesta u. coccinea (Nordwestamer.) s. Hookeria coronaria u. Dichelostemma congestum Kth.

Bromelia L. (Liliaceen, od. Bromeliac., VI. 1) Ananas, Br. Ananas L. (Ananassa autt.), fr. bromélie, e. pine-apple (n. d. schwed. Bot. Olaus Bromel, † 1705, schr. Chloris gothica), B. nudicaulis, fr. perroquet „Papageien“-An., lucida W. (lucide-virens Dill.), coarctata (Pitcairnea c.), Pourretia, lanuginosa etc. Bromeliacæae Lindl. Ananaslilien.

Bromus L. (Gräser, III. 2) Trespe, Dord, fr. brome u. fétu, e. cockle, tare, darnel, auch ray (gr. βρόύος wild. Hafer), z. B. Bouquetgr. brizaeformis Fisch., Mey., in Saaten secalinus L., fr. seigle-bâtarde, Bastardroggen.

Brosimum Schreb. (Artocarpeen, XXIII. 2) Brotnussbaum, B. Aliciastrum Sw. essbarfrucht. od. rindiger Br. der Antillen ($\beta\omega\sigma\tau\mu\sigma$ essbar), s. Alicastrum arboréum P. Br.; B. (Alic.) spurium Sw.

- Brossaea** L. (Ericaceen, V. 1) „Brossäe“ (n. Gui de la Brosse, Arzt Ludw. XIII. v. Frankr.), z. B. Treibh. Br. coccinea L. (Str. Südam.).
- 1) **Brotēra** W., Spr. (-terōa DC.) (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) Brotero'sblume (n. d. portug. Bot. Felix A. Brotero, Prof. z. Coimbra, † 1828), z. B. trinervata Pers., contrayerva Cav. (Millera c. ds.).
- 2) **Brotēra persica** Spr. (Labiaten, XIV. 1), s. Hyptis p. Pers. 3)
- Brotēra ovata** Cav. (Büttneriaceen, XVI. 7), s. Pentapetes ov. L.
- Broughtonia** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Broughton's“-O. (n. d. engl. Bot. Arth. Broughton, Insp. d. bot. Gart. auf Jamaicā im 18. Jahrh.), z. B. sanguinēa, alba u. grandiflōra, s. Maxillaria u. Dendrobium.
- 1) **Broussonetia** Vent. (Urticac. Moreen, XXII. 4) Papiermaulbeerbaum, Wautistrauch, fr. broussonétier (n. d. Arzt u. Nat. Broussonet in Montpellier, † 1807), B. papryrifera Vent., fr. mûrier à papier, e. paper-mulberry. 2) **Br.** Orteg. (Cassieen, X. 1), s. Virgilia secundiflōra Cav. 3) **Br.** Gratel. (Conservac., XXIV. 3).
- Browallia** L. (Scrophularieen, XIV. 2) „Browallie“ (n. d. Bischof J. Browallius z. Abo in Finnland, † 1737), z. B. Stuben. abbreviata, humifusa Forsk. (Buchnera h.), elata L. m. v. fl. albo Hort., Czerwiakowska Warcz., demissa L.
- Brownaea** L. (-nēa Jacq., W.) (Polygalaceen, XVII. 3) „Browne's“-Rose (n. Patrick Browne, s. d. Aut.), Gewächsh. B. coccinea L. „Elffaden“ (stamina naturaliter sunt XI, Pers.), Rosa de Monte W. (Hermesias vulgo Rosa de M. Loefl.).
- Brueā** l'Hér., Mill. (Rutac. Zanthophylleen, XXII. 4) „Bruce's“ Gelbholzbaum (n. d. Reis. in Abyss. J. Bruce, † 1794), B. antidisenterica l'Hér. (ferruginēa ds.), trifoliata Spr., s. Evodia drupacea Lab.
- Bruchia** Schwägr. (Moose, XXIV. 2) „Bruch's“- od. Faulmoos (n. d. Apoth. Bruch in Zweibrücken, s. d. Aut.), B. vogesiaca Schwäg. (Sapromā vog. Brid., v. σαρωύ mache faul). Bruchiacēae Schimp.
- Brugmansia** Pers., Bernh. (Solaneen, V. 1) Stechapfelbaum (n. d. Prof. Brugmanns in Leyden, † 1819), z. B. Zier. candida Pers. (Datūra arborēa Hort.), bicolor Pers. (Dat. sanguinēa R. P.) u. Knightii Horst (Dat. cornigēra Hook.). 2) **Br.** Blum., Fisch. (Rhizantheen od. Cytineen, X. 1) neben Rafflesia!
- 1) **Brugiēra** Lam. (Rhizophoreen od. Caprifoliaceen, XI. 1) „Brugières“ Wurzelbaum (n. d. Arzt u. Reis. J. Guill. Brugières in Montpellier, † 1798), z. B. B. gymnorrhīza R. Br. (Rhizophora g. L.) (Östind.) „Nacktwurzelbaum“.
- 1) **Brunellia** Hb. Bpl. (-nelia Rz. Pv.) (Terebinthac. od. Zanthoxylēen, XI. 5) „Brunelli's“ Gelbholzbaum, fr. brunellier (n. e. ital. Bot. Gabr. Brunelli z. Bologna), z. B. acutangula Hb. Bpl., aculeata u. inermis R. P. (B. Peru). 2) **Brunella** elatior Sloan. (Acanthac. XIV. 2), s. Ruellia. 3) **Brunella** T. (Labiaten, XIV. 1) s. Prunella L. (v. Bräune, geg. welche!).
- Brunia** L. (Corniculat. Bruniaceen, V. 1), Capheide (n. e. Reis. in Russl. u. d. Levante Corn. Brun, Dietr. Lex., n. Alex. Brun, Wtst. n. Corn. v. Bruyn (Lebrun) v. Haag, Reis. im Orient 1673/74 u. 1701/08), z. B. B. Levisanus L. (Protea Lev. L.), abrotanifolia L. (Levisanus capensis Petiv.), paleacēa Berg. s. Berardia.
- Brunfelsia** L., W. (**Brunsf.-**) Plum. (Solaneen, V. 1) „Brunsels“-Fruchtbau (n. d. alt. Bot. O. Brunsfels aus Mainz, † 1534, s. d. Aut.), z. B. trifida, americana L. etc.
- Brunsvigia** (-wigia) Heist., Ker (Amaryllidēen, VI. 1) Narzissenschwertel od. Blutlilie (zu Ehren d. Fam. Brunswick, Paxton, n. d. engl. Dynastie v. Braunschweig, Wtst.), z. B. B. Josephinae Red. (Amaryllis gigantēa Mar.), s. Haemanthus u. Buphāne Herb.

Brya P. Br. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) „de Bry's“ od. falsches (grünes) Ebenholz (n. Joh. Th. de Bry, Nat. in Lüttich, † 1617).

Bryaceae Schimp. u. -inae Schimp. Fam. u. Ord. der Knotenmoose, s. Bryum L.

Bryanthus Gmel. (Ericaceen, X. 1) „Moosblumen“ od. Torf-Heide, B. repens Gm., s. Erica s. Andromeda bryantha Thb. L. (v. $\beta\omega\nu\sigma$ lat. Bryum u. $\alpha\rho\vartheta\sigma$ — wie Moos ausseh. Str.), B. erectus.

Bryodēa (-des) Salisb. (Liliaceen, VI. 1) Mooslilie ($\beta\omega\nu\omega\delta\eta\varsigma$ moosartig) (Bryocles Salisb. bei Wittstein, v. $\beta\omega\nu\omega$ u. $\chi\lambda\epsilon\varsigma$ Ruhn — Kaps. sehr vielsamig!), z. B. ventricosa Sal. s. Hemerocallis coerulea Andr. (japonica β . L.).

1) **Bryonia** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10 u. XXII. 3) Zaun- od. Gichtrübe, Entwin O. W., fr. bryone (brionne) od. couleuvrée (herbe à la femme battue, auch feu ardent), e. bryony (briony) u. shank (gr. $\beta\omega\nu\omega\tau\alpha$ od. -ώνη üppig rank. Gew.). 2) **Bryonia** Mechoacanna nigra s. Convolvulus Jalapa „Jalapenwinde“. 3) **Br.** nigra fruticosa (Asperifolien, V. 1), s. Tournefortia. 4) **Br.** alba geniculata (Araliaceen, IV. 1), s. Cissus.

Bryonopsis Hassk., Arn. (Cucurbitaceen, XXI. 10) unechte Zaun- od. Gichtrübe (s. eb. u. $\delta\psi\iota\varsigma$ Aussehen), z. B. erythrocarpa Naud., fr. à fruits écarlates.

Bryophyllum Salisb., Hook. (Crassulaceen, V. 5) „Spross-“ od. „Keimblatt“, „Embryoblatt“, fr. bryophylle (v. $\beta\omega\nu\omega$ keime, $\varphi\tilde{\iota}\lambda\lambda\omega$ Blatt — dies. keimt auf d. Erde liegend!), Zier. B. calycinum Sal.

1) **Bryopteris** (sc. Lycopodium) L. (Bärlappe, XXIV. 1) „Moosfarn“ (Namen für d. Bärlappe) (s. v., $\pi\tau\epsilon\sigma\varsigma$ Farm). 2) **Bryoptéris** Nees (Jungermanniac. XXIV. 2) (Lebermoose mit Blattunterlappchen).

Bryum Dill. L. (Moose, XXIV. 2) Knotenmoos (Birn-, Eichen-, Stamm-, Jungfernmoos), fr. brion od. bry (brye) (gr. $\beta\omega\nu\sigma$ v. $\beta\omega\nu\omega$ keime — üppige M. mit birnförmigen Kapselknoten!).

Bubon L. (Umbelliferen, V. 2) „Scham-“ od. Mutterharzdolde, Stein-eppich, fr. persil de Macédoine (B. macedonicum L.), persil des rochers, e. parsley-pert ($\beta\omega\nu\beta\omega\tau$ Schamleiste — Pfl. geg. Bubonen od. Weichengeschwülste, Wtst.), B. Galbanum L. s. Anisum africanum Pluk. (Str. Cap.).

Bubrōma Schreb. (Malvaceen, XVIII. 1) „Ochsenfrass“ (v. $\beta\omega\tilde{\iota}\varsigma$ u. $\beta\omega\tilde{\iota}\mu\alpha$ Speise — ordin. Cacao nur für Vieh), z. B. Guazuma Juss. (Theobroma Guaz. L.).

Buceo Wendl. (Rutac. Diosmeen, V. 1) Duftraute (bucco Nam. in Süd-afr.), z. B. B. obtusa Wendl. s. Agathosma obt. Bartl. (Hartogia ciliaris L., Diosma ciliata Lam.).

Bucēphalon (-um) Plum. (Urticaceen, XXXII. 4) „Ochsenkopf“ ($\beta\omega\tilde{\iota}\varsigma$ u. $\zeta\epsilon\varphi\alpha\lambda\eta$), B. racemosum L. s. Trophis (Batis Jacq.) americana L. „Futternessel“ (v. $\tau\varphi\omega\varphi\eta$ Nahrung).

1) **Bucēras** Mnch., Ser. (zu Trigonella) (Papilionaceen, XVII. 4) „Ochsenhorn“ ($\beta\omega\tilde{\iota}\varsigma$ u. $\zeta\epsilon\varphi\alpha\varsigma$ Horn). 2) **Bucēras** P. Br. (sc. Bucida) Sw. (Combretac. od. Myrobalaneen, X. 1) Ochsenhorngrißel.

Bucerātes (zu Astragalus) Rchb. (Papilionac. XVII. 4) Kaffee-Stragel, B. baeticus L. (— als Surrogat) (s. eb.).

Bucida L. (Combretac. od. Myrobalaneen, X. 1) „Ochsentöter“, Rindsgift, Kuhhornbaum D. ($\beta\omega\tilde{\iota}\varsigma$ u. caedo töte, in compos. cido, subst. cida). B. Bucēras Sw., fr. grisgris, e. oxe-bane ($\zeta\epsilon\varphi\alpha\varsigma$ Horn — Äste hornart.!).

Buchnēra (Büchnera) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Büchner'sblume“ (n. d. Nat. J. G. Büchner, schr. üb. d. Pfl. d. Voigtlandes), z. B. Treibh. B. coccinea Scop. s. Achimenes cocc. Pers. (Gesneria pulchella Sw., Trevirania cocc. W.). — Büchnerēae (sc. Personatae) Rchb.

Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- Buddlēa** L. (-leya, -leia, -leja) autt. (Verbenac. od. Loganiaceen, IV. 1)
 „Buddle'sblume“ (n. d. engl. Bot. Adam Buddle), z. B. Zier. B.
globosa L. (*capitata* Jacq.), *curviflora* Hook. Arn. (Japan), *Lindleyana*
 Fort. (Chin.) etc.
- 1) **Buettneria** Loefl. (Byttn.—Pers.) (Columniferen od. Büttneriaceen, V. 1)
 „Büttnerie“ (n. d. Prof. Dav. Büttner in Göttingen, † 1768), z. B.
scabra Pers. u. *carthaginensis* Jacq. (Südamer.). — Büttneriacēae DC.
 Rchb. 2) **Büttneria** Duh. (Nyctagineen, V. 1).
 - Buglossum** littorēum Rumph. (Lobeliaeen, V. 1) „Küsten-Ochsenzung“
 (βούζ u. γλώσσα), s. *Scaevola Lobelia* L.
 - Bugrāna** DC. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) (zu *Ononis* DC.) „Ochsen-
 korn“ (βούζ u. grānum Korn).
 - Bugranoides** DC. (Legum. Genisteen, XVII. 4) (zu *Ononis* DC.) (s. eb.
 u. εἰδουαι gleiche).
 - Bugūla** Juss. (-jūla T.) (Labiaten, XIV. 1) Günsel, fr. bugle i. q. Ajūga
 L. (fr. bugle latinis. = Ajuga, unbek. Etymologie!).
 - Bulbīne** W. (-na Dietr.) (Liliaceen, VI. 1) „Zwiebel“ od. „Bollenlilie“
 (v. *bulbus* Zwiebelknolle od. βολβίνη d. Alten = *Muscati comosum*),
 z. B. *frutescens* L. u. *annua* W., s. *Anthericum*.
 - Bulbocapnos** Bernh., Drej. (Fumariaceen, XVII. 2) „Knollen-Erdrauch“
 (s. eb. u. καπνός Rauch, -knollenwurzl. Erdrauch), B. *cavus* Drej.
 = *Corydalis cava* Wahlbg. „Hohlwurz“.
 - Bulbocastānum** T. (sc. *Bunium*) L. (Umbelliferen, V. 2) Ackernuss, Erd-
 kastanie, fr. bulbocastane, terrenoix u. ernote, e. earth-nut (*bulbus*
 Knollen, castānum Kastanie).
 - 1) **Bulbocodium** L. (Colchicaceen od. Melanthac., VI. 1) „Zwiebelglocke“,
 fr. *bulbocode* (v. *bulbus* u. ζώδων Glocke, Wtst. v. ζώας dem. ζώ-
 διον Fell — rauhhäut. Zwiebel), z. B. *vernus* L. Frühlings-Licht-
 blume, Uchtblume (d. i. Frühdämmerungs-), fr. *Crocus rouge u. groin de cochon*, „Saurüssel“. 2) **Bulboe.** (sc. *Narcissus*) L. (Amaryllideen,
 VI. 1) Waldglöckchen, -narzisse, fr. campanelle (-nette), s. *Bulbo-
 codium campanula* autt.
 - Bulbophyllum** Lindl. (*Bolboph.*- P.-Th.) (Orchideen Epidendreen, XX.
 1) „Knollenblatt“ od. „Blätterknolle“ (βόλβος lat. *bulbus* u. φύλλον
 Laubblatt — Wurz. m. falschen, blättrigen Knollen), z. B. *occidentale*
 Spr., s. *Dinēma* Lindl. s. *Epidendron polybulbon* Sw.
 - Bulgaria** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Ranzenbecherchen (bulga Sack etc. —
 Fruchtlager sackartig!), z. B. *sarcoides*, *inquinans* etc.
 - Bulliarda** (-ia) DC. (Crassulac., IV. 4) Wasserniedlich (n. P. Bulliard,
 † 1796 z. Paris, s. d. Aut.), B. *Vaillantii* DC., s. *Tillaea aquatica* Lam.
 - Bumelia** Sw. (Myrsineen od. Sapotac. Lucumeen, V. 1) Eisenholz, s. g.
 Hochstamm D. (Βορμελία eine Eschenart!), z. B. B. *Manglilla* W.,
 foetidissima L., *tenax* W., L. f. (*Chrysophyllum carolinianum* Jacq.).
 - Buniadēae** DC. Zackenschotenartige, s. *Bunias*.
 - Bunias** L. (Cruciferen Buniaden, XV. 2) Zackenschote, -kraut O. W.,
 Bergkohl, Meersenf D., fr. *buniade* (gr. βούριας kegelf. Rübe, Wtst.
 v. βούριος Hügel — wächst auf solchen), z. B. B. *erucago* L. (*Eruca*
monspeliaca Bauh.) u. *spinosa* L. (*Crambe spinosissima arabica* Shaw),
syriaca W. (*Anastatica hierochuntica* Crantz s. *syriaca* Jacq.), s. g.
 „Jerichorose“. — *Buniadēae* DC.
 - 1) **Bunium** L. (zu *Carum*) Rchb. (Umbelliferen, V. 2) Ackerkümmel,
 Knollendolde Leun., fr. *bunion* (v. βούριος Hügel u. Brüste — knoll.
 Form d. Wurzel), B. *Bulbocastānum* Koch (s. d.) „Ackernuss“, fr.
 terrenoix. 2) **Bunius** (s. *Aethusa*) L. (Umbellif., V. 2) Bergkümmel,
 s. *Carum Bunius* L. (*Saxifraga montana minor* Moris.). 3) **Bunius**
 (sc. *Stilago*) Burm. (Stilagineen, XXII. 3) Brüste-Griffelbaum (s. v.).
 - Buphthalmeac** Less., DC. Ochsen- od. Rindsaugen, s. sogl.

- Buphthalmum** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Ochsen“- od., „Rindsauge“, fr. buphthalme od. oeil de boeuf, e. ox-eye ($\betaοῦς$ u. ὄφθαλμος Auge), Zier. grandiflorum L., cordifolium Waldst. s. speciosissimum Schreb., s. Telekia cordif. DC., speciosissimum L., salicifolium DC., arborens L. (Asteriscus frutescens Dill.) (Amer.).
- Bupleurum** L. (Umbelliferen, V. 2) Hasenohr, eig. „Ochsenlunge“ (od. -rippe), fr. oreille de lièvre, e. hare's-ear (s. v. u. οἰευοσ Seite, Lunge, Rippe), z. B. Gartenstr. fruticosum L. u. perfoliatum L., fr. perce-feuille, s. Buprestis fruticosa Spr. s. sogl.
- Buprestis** Spr. (Umbelliferen, V. 2) Strauch-Hasenohr (gr. βούτοηστις ein Käfer u. eine Pfl. d. Griechen, v. πούθω blühe auf — Wirk. d. Pfl. auf d. Rindvieh!), B. fruticosa Spr. (Tenorea frut. ds.), s. Bupleurum fr. L. (Orient u. Südeur.).
- Burchellia** R. Br. (Lonicereen od. Rubiaeen, V. 1) Büffelholz, -horn (n. d. engl. Reis. in Südafr. W. J. Burchell, schr. 1822 Beschreib. etc.), B. capensis R. Br. s. Lonicera bubalina L. (Cephaelis bub. Pers.).
- Burlingtonia** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Burlingtonie“, Gräfin Burlington's Prachtorchis (z. Ehr. d. liebl. Countess Burlington), z. B. rigida Lindl., fragrans Rehb. f. (Bras.).
- Burmannia** L. (Hämodorac. od. Amaryllideen, VI. 1) „Burmannie“ (n. Joh. Burmann, Prof. in Amsterdam, s. d. Aut.), z. B. Gewächsh. disticha L. (Ceyl.), biflora L. (Tripterella coerulea Elliott) (Virgin.). — Burmanniacae Bartl. (zu Ensatae) DC.
- Bursaria** Cav. (Violarieen od. Pittosporaceen, V. 1) „Taschenblume“ (bursa Börse od. Tasche — bez. d. Kapsel!), z. B. spinosa (Str. Neuhol.).
- Bursēra** Jacq., Schreb. (Terebinthac. Amyrideen, XXIII. 2) Chibou- od. Weissgummibaum, Simarubab. D., fr. chibou u. gommier (n. Joach. Burser v. Kamenz in Neapel zu Ende d. 16. Jahrh.), B. gummiifera L., fr. gomart (Westind.), acuminata W. etc., s. Terebinthus major etc. — Burseracae DC., -seræa (sc. Terebinthacæ) Rehb.
- Butēa** Roxb. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Bute's“ Bohne (n. John Earl of Bute, schr. Botanical tables, 9 Bde. in nur 12 Exempl., ein Prachtwerk), z. B. frondosa Rxb. (Erythrina monosperma Lam., Plaso Rheed.), superba peltata Rxb. etc. (Ind.).
- Butomacæae** Grck., -tomæae Rich., DC. (zu Helobiae DC.) Wasserliesche Leun., s. sogl.
- Butōmus** T., L. (Hydrocharideen od. Butomeen, IX. 3) Wasserliesch, -viole, Blumenbinse, Schwanenblume, Kameelheu, fr. butome, junc-fleur (-odorant), e. water-violet (-gladiole), flowering-rush (gr. βούτομος v. βοῦς u. τόμος v. τέμνω schneide ab — „Ochsenchnitt“ — nämli. weiden sie ab!), B. umbellatus L., fr. butome ombellé, e. water-violet umbellate.
- Butoniæa** Juss., Lam. (Myrtaceen, XII. 1) „Ochsenkraft“ ($\betaοῦς$ u. τονίζως v. τόρος Stärke etc., Wtst. v. buttun Name d. Baums auf d. Molukken, baeton im Malayschen), z. B. terrestris rubra Rumph. (Eugenia acutangula L.), speciosa Juss. (Barringtonia sp. L.).
- Butyrospermum** DC. (Sapotaceen, VI. 1) „Buttersamen“, -baum (v. βούτυρον Butter u. σπέρμα Samen), B. Parkii s. Micadania R. Br. Scheabaum, Mungo-Park (Sudan).
- Buxbaumia** L., Hall. (Moose, XXIV. 2) „Buxbaum's“-M., fr. buxbaum (n. d. Nat. u. Reis. J. Chr. Buxbaum, † 1730 bei Merseburg). — Buxbaumiæae Schimp.
- Buxæae** DC., Rehb. (-acæae Klotzsch, Grck.) (zu Butaceae Euphorbiæae Rehb.) Buxgewächse Grck., s. sogl.
- Buxus** L. (Rutac. Euphorbiac. od. Trikoken, XXI. 4) „Bux“- od., „Buchsbaum“, fr. buis (bouis) od. bois-béni, e. box-tree (gr. πύξος v. πυξός fest — weg. d. Holzes, od. πύξις Büchse, Wtst., wozu verarb.), Zier.

B. sempervirens L., m. d. Formen arborescens u. suffruticosa („Staudenbux“); v. v. von arborescens: myrti-, thymi-, angusti-, rotundifolia etc., B. balearica Lam. s. arborēa ds., etc.

Byra - Ebēnus Antillen-Ebenholz, s. Ebēnus (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) (vaterl. byr).

Byssacēi Rchb. Faser- od. Schimmelpilze, s. sogl.

Byssus Dill., L. (Schimmelpilze, XXIV. 4) Gruft- od. Schwindschimmel, Haar- od. Staubaftermoos D., fr. byssus u. fleur d'eau „Priestley'sche Materie“ (gr. βύσσος Flachs, feinste Faser etc.), z. B. antiquitatis L., Jolithus L. „Veilchenstein“ (— rot. Steinüberz. v. Veilchengeruch).

Bystropōgon l'Hér., W. (Labiaten, XIV. 1) Kelch- od. „Stopfbart“, fr. bystropoque (v. βύστρος d. Stopfen, πάγων Bart — Krone durch Haare verstopft!), z. B. suaveolens l'Hér. (Hyptis s. Pers. u. Mesosphaerum hirsutum P. Br.) etc., s. Mentha, Heliotropium canariense Mill.

Byttneria Loefl., s. Büttneria L., Pers.

Cabomba Aubl. DC. (Nymphaeaceen, XIII. 1) Haar-Nixe (v. d. hebr. kab Hohlmass, Wtst. arab. Name, — d. untergetaucht. Blätt. haarspaltig!), C. aquatica Aubl. (Nectris aq.), peltata F. Müll. — Cabombeae Rich. (zu Nymphaeaceae DC. od. Hydropeltidæe Bartl.

Cacalia L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) Pestwurz, fr. cacalie, e. butterbur (κακαλία Diosc. Huflattich, viell. v. καζός schlimm u. λαύ sehr — böß. Unkraut!), z. B. alpina W. (Tussilago Cacalia Scop., Adenostylis viridis Cass.), fr. c. des alpes, Zier. C. Kleinia L. canariische, sonchifolia L. (coccinea Sweet) m. v. aurantiaca Hort., s. Emilia sagittata Cass., fr. c. écarlate, e. scarlet-Cacalia. — Cacaliæ DC.

Cacão T. (-ão Wtst.) (sc. Theobroma) L. (Büttneriaceen, XVI. 4.) „Cacaobaum“ (vaterl.), C. guianensis Aubl. = Theobr. Cac. L., fr. cacaoyer (-caotier), e. cacao-tree.

Cachrys L., Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Gersten“- od. Nussdolle (ζάχυς Gerste — Samenähnlichkeit od. v. ζών brenne, n. Plinius — brennendschmeck. Samen!), C. maritima Spr. (Crithmum marit. L. f.), odontalgica Pall., microcarpa Spr., etc., s. Rumia Hoffm.

Cacoucia Aubl. DC. (Combretac. od. Myrobalanceen, XI. 1) „Cacoucie“, fr. cacouier (vaterl.), C. coccinea (Schousbaea c. W.) (Schlingstr. Guiana).

Cacteæ DC. (-ti Juss.) Cactusartige, fr. cactoïdes (zu Ord. od. Kl. Peponiferae Kürbisfrüchtige, Endl.).

Caeti Juss.: a) Melocacti, b) Echinocacti, c) Mamillariae, d) Opuntiae, e) Ceréi, f) Epiphylla, g) Rhipsalies.

Caetus L. (Cacteen, XII. 1) Fackeldistel, fr. cacte, cardasse (gr. κάκτος v. κακώ behandle übel od. κακοῦμαι bin verletzt, Wtst. — weg. d. Stacheln!), z. B. coccinellifer L. (Opuntia c. T.) Cochenillen-C. od. Nopal, fr. raquette, C. Ficus indica L. indian. Feige, e. pimpillo, C. alatus L. (Epiphillum al. Haw.) „Flügel“-C., C. truncatus Lk. (Epiph. trunc.) stutzästiger, C. speciosus Cav. (-sissimus Desf.) = Ceréus specios., fr. cierge specieuse, C. grandiflorus L. (Ceréus gr.), s. g. Königin d. Nacht, fr. serpent, C. Melocactus L., fr. melon-chardon, C. triangularis L., fr. liane à vers, u. s. f.

Cadaba Forsk. (Capparideen, V. 1) „Cadaba“-Kapper (v. d. arab. kadhab), z. B. farinosa Forsk. (Bornu, glückl. Arab.), s. Stroemia far. Vahl, C. glandulosa Forsk. (Stroemia gl. Vahl) etc.

Caelestina s. Coelestina!

Caesalpinia Plum., L. (Legumin. Cäsalpinieen od. Cassieen, X. 1) Brasilienholz, Fernambukholz, e. brasil-wood (fernambuck-) (n. d. Aristo-

teliker Cäsalpinus Aretinus 1519—1603, s. d. Aut.), z. B. C. echinata Lam. rotes Bras., C. (Haematoxylon) campechiana L. Campecheholz, e. campeche (-pesh) od. indian wood, C. Sappan L. Java- od. Bimas-Rotholz, C. vesicaria L. Brasilienholz, fr. brésillot. — Caesalpiniæae (sc. Cassiæae) R. Br., Rchb.

Caesia R. Br. (Liliaceen, VI. 1) „Cäsius“-Lilie (n. d. Nat. Friedr. Cäsius, schr. tabulae philos. etc. Romae 1651), z. B. vittata, corymbosa etc. R. Br. (Neuholl.), s. Anthericum pusillum etc.

Caesulia Roxb. (Compos. Rolandreen, XIX. 5) „Tretblume“ (v. caesus erschlagen, οὐλὴ Narbe — wie zertreten ausseh. Pfl. Paxton, Wtst.: malabar. Namen!), C. orientalis Roxb. (Meyera or. DC.), radicans W. (Meyera guineens. Spr.), s. Cryptiosperum reptans (ζούγιος versteckt — „kriechend. Verstecksamen“). — Caesuliæae DC.

Cajanus Spr., DC. (Cajan Ad.) (sc. Cytisus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Taubenbohne (v. d. malab. catjang = Taubenfutter, Paxton, z. B. Kalth. C. tricolor, argenteus, C. scarabaeoides P. Th. = Dolichos Catjang L. ind. Bohnenstr., etc., s. Cytisus.

Cajophora Presl (Loasaceen, XIII. 1) „Brennkraut“ (v. Caja Nesselbär od. Juckhaarraupe, v. καίω brenne — Paxton u. Wtst. — weg. d. Brennhaare unangreifb.!), C. lateritia Presl (Loasa lat. Jacq. s. aurantiaca Hook.).

Cakile T. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Meersenf, Rocket OW., fr. caquillier u. roquette de mer (v. καζός schlamm, τήν Knäuel od. τήλη Geschwulst, Wtst.? Leun: arab. Wort!). — Cakilinæae Rchb.

Caladenia R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Schöndrüse“ (καλὸς u. ἀδήν, -έρος Drüse — Glandelreihen auf d. Lippenscheibe!), z. B. alba, carnæa, coerulæa etc. R. Br. (Neuholl.).

Caladium Vent. (Araceen, XXI. 1) Schönblatt-Aron (καλὸς u. ἄδην genug, sehr, Vilm. u. Wtst. aus ein. indischem. Wort geb.), z. B. Zier. C. esculentum Vent. karaibischer Kohl od. Tarro, essb. Zehrwurz, fr. chou caraïbe od. calocasie, auch taro (tallo, tayo) u. goue t comestible, e. eatable cole, violacæa Desf. u. macrorrhizone (Stube). C. seguinum Vent. Schierlings- od. Schweigrohr, fr. sogue od. cigue (lat. cicuta Schierling).

Calamagrostis Roth, Ad. (Gräser, III. 2) Reith- od. Schilfgras (v. calamus Schilfrohr u. ἀγρώτις Gras), z. B. litoræa DC., epigeios Rth. „Land“-Sch. etc.

Calamariae Endl. Kl. d. Schaftfarne (s. eb.).

Calamina P.-B. (Gräser, III. 2) Riesenrohr (gr. καλάμιον von Halmen od. Rohr), z. B. gigantæa P. B. = Apluda gig. Spr.

Calamintha Pursh, Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Schönminze“, Basiliengruendel Leun., Kölme O. W., fr. calamint, e. calamint (καλαμίνθη v. καλὸς u. μίνθα lat. mentha Minze od. Münze!).

Calamites Suck. (foss. Equisetaceen) foss. Schafthalm, „Calamit“ (gr. καλαμίτης z. Halm gehör.).

Calampelis D. Don (Bignoniaceten od. Sesameen, XIV. 2) „Schönrebe“, Hängefrucht (καλὸς u. ἀπτελίς Rebe etc.), z. B. Zier. C. scabra Don, fr. bignone du Chili, e. rough-podded E., s. Eccremocarpus scaber Rz. Pv.

1) **Calamus** (sc. Acorus) L. (Juncaceen od. Acoraceen, VI. 1) „Kalamus“, deutscher Zittwer, fr. acore, e. wild ginger (v. d. arab. kalam od. Wtst. kalem, lat. calamus Rohr, Halm). 2) **Calamus** L. (Palmen, VI. 1) Schilf- od. Rotangpalme, s. g. spanisches Rohr, fr. rotang (rotin u. raton), e. ratan, auch s. g. Palmried, Zier. C. Draco W. Drachen-Rotang, s. g. Drachenblut.

Calandrinia H. B. K. (Portulacaceen, XI. 1) „Calandriniæ“ (n. dem schweizer. Bot. J. L. Calandrini, schrieb Thesen etc. 1734), z. B. Topf.

- C. umbellata* DC., *grandiflora* Ldl. (*glaucha* Schrad.), *speciosa* Ldl., dis-
cölör Schrad. (*elegans* Hort.) etc., s. *Talínium* Ad.
- Calanthe** Lindl., R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schönblüte“ (s. v.
u. ἄνθη — schöne Bl., besond. gross. Labell! Wtst.), z. B. *angrae-*
ciftora Rehb. f., *veratrifolia* R. Br. (*Limodōrum* v. W.), *purpurea*
Ldl. (Ceyl.) etc.
- Calathéa** G. F. W. Mey. (Scitamineen od. Marantaceen, I. 1) „Korb-
lippe“ (v. *zálagoz* Handkorb — Form d. hohl. Labells! Wtst.), z.
B. *zebrina* Mey. (*Maranta* z.), *leopardina* Reg., *lutēa* Spr. etc.
- Calbōa** Van Houtt. (Convolvulaceen, V. 1) „Calboe“, Langfaden (n. J.
Calbo, span. Arzt in Valencia, 16. Jahrh.), z. B. *globosa*, s. *Macro-*
stēma Pers.
- 1) **Calceolaria** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Pantoffelblume“, fr. cal-
céolaire, e. calceolaries (v. *calceōlus* kleiner Schuh), z. B. *Zier. ru-*
gosa Rz. Pv., *Youngii* hybrida Hort., *scabiosaefolia* Sims, *plantaginēa*
Sm. 2) **Calceolaria** Loefl. (sc. *Viola*) L. (Violarieen, V. 1) Pantoffel-
Veilchen.
 - 1) **Calceōlus** (sc. Cypripedium) L. (Orchideen, XX. 1) „Frauenschuh“
(*calceōlus* dem. v. *calcēus* Schuh). 2) **C.** Benth. (Labiaten, XIV. 1)
„Schuhchen“, s. *Plectranthus* l'Hér. u. Germanēa Poir.
 - 1) **Calcitrāpa** G. (sc. Centaurēa) L. (Comp. Centaureen, XIX. 3) „Fer-
senangel“, s. g. Sterndistel, fr. chausse-trape (v. *calx*, -cis Ferse,
trapa Fussangel, fr. trape — weg. d. lang. Kelchstacheln!), s. *Calc.*
Hippophaestum G. (v. ἔπτος Pferd, φαίστος leuchtend). 2) **C.** (sc.
Centranthus) DC. (Valerianeen, III. 1) Stachelspornblume, s. *Va-*
leriana Calcitr. L. (— weg. d. stachelförm. Nektarien!).
- Caldeuvia** G. Don (Corniculaten Cunoniaceen, VIII. 2) „Caldeuvie“ (n.
Alex. Caldcleugh, Samml. in Chili 1819—25), *C. paniculata* Don, s.
Weinmannia p. Cunn.
- Calēa** R. Br. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Schönaster“ (?) (*załóż*?
od. st. *Callea*, Hahnenbart, gr. *zálēa*, lat. *palea* Bart, Kamm d.
Hahns, Riemer? — unsicher, viell. v. G. Caley, st. *Caleya*! s.
sogl.!), z. B. *solidaginea* R. Br. „Schönrule“ (?), *lobata* Ow. (*Co-*
nyza l.), *javanensis* Spr. (*oppositifolia* L.), s. *Isocarpha* opp. R. Br.
- Caleāna** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Caley's“-O., s. *Caleya*
Ait. (n. George Caley, Insp. d. bot. G. St. Vincent, Reis. in
Austral. anf. dies. Jahrh.).
- Caleestasia** R. Br. (Juncaceen od. Bromeliac., VI. 1) Blaubinse, *Ana-*
nasbinse, *C. cyanēa* R. Br. (Str. Neuhol.), s. *Huttia elegans* (v. *za-*
łóż u. ζεστασις d. Ausrecken — Saum d. Blumendecke bild. einen
Stern! Wtst.). — *Calectasiæ* Endl.
- Calendūla** L. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) Regenrose, Ringel- od.
Totenblume Vilm., fr. calendule u. souci, e. marigold (corn-gold)
(dem. v. *calendae* Kalender — zeigt Regen an!), z. B. *C. arvensis*
L., *Zier. C. officinalis* L. m. v. v., z. B. *ranunculoides*, v. *Meteor*,
v. fl. *pleno* Hort., fr. souci-double des jardins, e. double-flowering
common marigold, v. *complanata* Hort., fr. Le Proust, e. level-mari-
gold; *C. pluvialis* L. s. *hybrida* Sweet (*Meteorina gracilipes* Cass.)
m. v. fl. pl. — *Calendulaceae* Rehb.
- Calepīna** Ad. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Schötchen-Löffelkraut, Brach-
schötchen, Wendich O. W. (st. *Chalepīna* i. e. Pfl. aus Chalep od.
Haleb [Aleppo] in Syrien).
- Caleya** Ait. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Caley's“-O., s. *Caleāna* R.
Br., z. B. *major* u. *minor* R. Br. (Neusüdwales). Vgl. *Caleana*!
- Calimérис** DC., Nees (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schönschnitt“, fr.
caliméride (*załóż* u. *μεωΐς* Schnitt — elegant geschn. Blätt., Wtst.
Anthodium aus 2 bis 4 Reihen krautiger Schuppen!), Zier. *C. incisa*

DC. (Aster inc. Fisch.), fr. c. à feuilles incisées, e. cut-leaved c., s. Aster Cassiarabicus.

Calinēa Aubl. (Dilleniaceen, XIII. 4) Raspelstrauch (v. *καλινός* hölzern, v. *ζάλον* Holz, Wtst. guian. Name!), z. B. scandens Aubl. s. Tetracéra Calinea W. (Doliocarpus Cal. F. Gmel.).

Calla L. (Araceen, XXI. 1) Schlangenwurz Seub. (Drachen-), Duttenbeere, fr. calle (chou-calle), e. dracon's-wort (v. *ζάλλος* Schönheit? st. Cala v. *ζαλός* schön?), z. B. C. palustris L. Wasser-Aron, fr. c. des marais, e. marsh-Calla. Stube: C. aethiopica L. (Richardia aeth. Kth.). — Callacéae DC. Bartl. (zu Ord. Aroïdeae Bartl.) Callagewächse.

1) **Callicarpa** L. (-us autt.) (Labiaten od. Vitaceen, IV. 1) „Schön“-od. Wirbelbeere, fr. callicarpe (*ζάλλος* s. eb. u. *καρπός* Frucht etc.), z. B. Zier. Murasaki (fälschl. Deutzia gracilis), purpurea (Porphyrea dichotoma Lour.), umbellata Lour. (Str. Cochinch.), americana L., arboréa Roxb. (Nepaul etc. 2) C. lanata autt. (Lauraceen, XI. 1) s. Tomex tomentosa L.

Callichrōa Fisch., Mey. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Schönfarbblümen“, Schönstrahl Rmpl. (*ζάλλος* u. *χρώα* Farbe etc. — schön gelbe Bl.!), z. B. Zier. C. platyglossa F. M., fr. c. à larges ligules, e. broad-tongued C. „breitstrahl.“

Callioœca Schreb., DC. (Rubiac. Cinchonaceen, V. 1) „Schönbeere“, Brechwurz (s. v. u. *ζόγκος* Korn etc.), C. Ipecacuanha Brotero, s. Cephaëlis „Kopfbeere“, s. d.

Callicōre Lk. (Amaryllid., VI. 1) „Schönmädchen“ (s. v. u. *ζόρη* od. *ζωρή* [*ζούρη*] Mädchen).

Calligónum L. (Polygonaceen, XI. 4) „Schönknöterich“, s. g. Hackenkopf D. (s. v. u. *γόνυ* Knie, Knoten — st. d. Blät. mit merkw. ausseh. Auswüchsen, Wtst.), z. B. asperum Lour. (Trachytella Callig. DC.), polygonoides Pall (Armen.), s. Pallasia l'Hér. (Pterococcus „Flügelkorn“).

1) **Calliopsis** Rchb. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Schön“- od. Mädchenauge (s. v. u. *Ὥψις* Auge, Antlitz etc.), z. B. Zier. C. bicolor v. purpurea, v. nana, v. Drummondii T. u. Gr. u. marmorata, s. Coreopsis tinctoria Bart. 2) **Calliopsis** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5) „Schöngesicht“, s. Eumorpha DC. (Pelargonium elegans, grandiflorum u. variegatum W.).

Calliparia Rchb. (zu Aconitum) Rchb. (Ranunculac., XIII. 3) „Schönwangen“-Sturmhut (*καλλιπαρεῖα* schönwangige), z. B. delphinifolia DC.

1) **Callirrhoe** Nutt., A. Gray (Malvaceen, XVI. 8) „Kallirrhoë“, „Schönfluss“-M. (n. d. Oceanide Kallirhoë, d. i. „Schönfliessende“, *ζαλός* u. *ὕδωρ* Fluss), z. B. digitata, pedata A. Gray (Nuttallia p. Hook., Sida p. Spr.), involucrata A. Gr. (Malva inv. Torr. Gr.) etc. 2) **Callirrhoë** Lk. (Narzisseen, VI. 1).

Callisia L. (Commelinaceen, III. 1) Schön-, Blau- od. Kriechlilie (s. v. u. fr. Lilie), z. B. C. repens L. s. g. Zärtling D.

1) **Callistachya** Sm. (-ys Vent.) (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Schönähre“ (*ζαλλος* u. *στάχυς* Ähre), z. B. Gewächsh. C. lanceolata Vent., ovata Bot. Mag. etc., s. Oxylobium Andr. 2) **Callistachya** Raf. (Scrophularineen, II. 1) s. Veronica virginica L.

Callistemma Cass., R. Br. (fehl. -stema!) (zu Aster) Rchb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schönkranz“, Schönkrone *ζάλλος* u. *στέμμα* Kranz, Krone — d. Borst. d. äuss. Pappus bilden einen solchen, Wtst.), s. Aster chinensis (sinensis) L. u. indicus L.

Callistēmon R. Br. (Myrtaceen Melaleucaceen, XII. 1) „Schönfaden“,

- Reiherbusch, Flaschenbürste (s. v. u. *στήμων* ó lat. stamen Faden — sehr lange Staubfäden!), C. speciosus DC., lanceolatus semperflorens etc., s. Metrosidéros G.
- Callithamnion (-um)** Lyngb. (Florideen-Tange, XXIV. 3) „Schönbusch“ (*θαυρίον* dem. *θάυρος*; Busch — stark verzweigte purp. Fäden!).
- Callitriché** L., W. (Onagreen Callitrichineen, I. 2) Wasserstern, eig. „Schönhaar“, fr. morgeline d'eau (s. v. u. *θοιξ*, *τούχος* Haar). — Callitrichacées Rchb. (zu Onagrariae Juss.).
- Callitris** Vent. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Schmuck-Cypressse (st. Callithrix gr. *καλλιθροῖς*, Wtst. *τροῖς* dreimal — dreizähl. Quirlblätter!), z. B. australis Vent.
- Callixéne** Juss., Lam. (Smilacineen, VI. 1) „Schönfremde“, -myrte (*ξερός* fremd), z. B. marginata G. (Str. Südamer.), s. Enargéa marg. Schreb.
- Callocoeca** (sc. Cordia) L. (Convolvulac., V. 1) „Schönpflaume“, Sebeste (*κόζζος* Korn, Beere etc.).
- 1) **Callopisma** Mart. (Gentianeen, V. 1) „Schönsaft“ - Blume (*ὕπισμα* Pflanzen-Milchsait), z. B. perfoliata M., s. Dejaníra Schlechtd. 2) **C. de Not.** (Flechten, XXIV. 3) „Schönsaft“ - Fl. (Wtst. *ὕπισμα* Ansehen (?), *δητισματι* habe Acht!).
- Callúna** Salisb. (Ericaceen, VIII. 1) „Besenheide“, fr. bruc od. bruyère, e. heath, sweet-broom u. furze, z. B. Zier. C. vulgaris Sal. (*Érica vulg.* L.), e. common ling, m. v. v. (v. *καλλύρω* reinige — als Besen!). — Callunæ (sc. Ericaceæ) Rchb.
- Calobotrýa** Spach (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) „Schöntrauben“ - Johannisbeerstr. (*καλός*, *βότρυς*, *-νος* Traube), Zier. C. s. Ribes sanguinéum Pursh m. v. v. atro-sanguinéum, coccinéum u. roséum Hort.
- Calocasia** fehlerh. st. Colocasia, s. d.
- Calocéra** Fr. (-céras Cord.) (Pilze, XXIV. 4) „Schönhorn“ (*κερός* od. *ζέρως* Horn), z. B. eßb. furcata u. viscosa Fr.
- Calochílus** R. Br. (Orchideen, XX. 1) „Schönlippe“ (*χειλός* Lippe — hier Labell!), z. B. campestris u. paludosus R. Br. (Neuholl.).
- Calochortus** Pursh (Juncaceen od. Liliaceen, VI. 1) „Schöngras“ - Lille (*χόρτος* Gras, Futter — Kraut m. schönen Doldentrauben, Wtst.), z. B. Zier. elegans Pursh (Louisiana), venustus s. lilacinus Bak., glaucus Reg., splendens Benth.
- Calodendron** Thb. (Rutaceen, X. 1) Rauten- od. „Schönbaum“ (*δένδρον* B. — schöne bleib. Blätt. u. fleischf. Blüten, Wtst.). C. capense Thb.
- 1) **Calodracon** Van Houtt. (Araceen, XXI. 1) „Schöndrachenwurz“ (*δράκων* Drachen), C. nobilis Van Houtt. 2) **Calodracon** Benth. (Labiaten, XIV. 1) zu Dracocephalum L. „Schöndrachenkopf“.
- Calogyne** R. Br. (Campanulaceen, V. 1) „Schöngriffel“ - Glockenbl. (*γυνή* — Griff. dreispaltig, jede der drei Narben mit einer Decke).
- Calonyction** Chois. (Convolvulac., IV. 1) „Nacht“ - od. „Pracht“ - Trichterwinde (*νύξ*, *-τρος* Nacht — über Nacht offen!), Zier. C. speciosum Chois. (Ipomoea Bona Nox L., fr. Ipomée bonne-nuit od. Calonyction élégant, e. excellent Ipomoea), macrantholeucum Colla s. Ipom. mexicana v. grandiflora alba Hort.
- Calopháca** Fisch. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Schönlinsse“ (*φανός* od. *-νή* Linse), Zier. volgarica Fisch., s. Cytisus pinnatus Pall. (Colutea volg. Lam., Adenocarpus wolgens. Spr.).
- Calophyllum** L. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 1) „Schönlatt“ (fr. calaba (*καλάβη*) Laubblatt — prächt. Bl.!), z. B. Inophyllum W. „Schönaderblatt“ (Tacamahaca W.) grosses Sch. W., bourbon'scher od. grüner Balsam Leun., C. Madrunno H. B. K. (Fruchtb.), nagassarium Burni., s. Mesua ferréa Nagasbaum od. ceylonsches Eisenholz.

Calopōgon R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Schönbart“, Fransenlippe (*τιώγων* d. Bart — auf dem Labellum). *C. pulchellus* R. Br., s. *Cymbidium* p.

- 1) **Calosanthes (-us)** Haw. (Kalos.- autt.) (Sedeen od. Crassulac., V. 5) „Schönblüte“ (*ἄρθη* od. *αρθος*), Zier. *C. coccinea* Van Houtt. 2) **Calosanthes** Blum. (Bignoniacceen, XIV. 2) „Schönblütenrispe“ (—schöne endständ. Blütenrispen!).

Calospira Ser. (Spiraeaceen, XII. 4) „Schönspiræ“ (zu *Spiraea* L.), Zier. *callosa* Thb. s. *Fortunei* Planch., *crataegifolia* Lk., *cuneifolia* W., bella Sims etc. (*σπείρα* lat. *spira* Windung).

Calostemma R. Br. (Amaryllideen, VI. 1) „Schönkrone“ (*στέμμα* Krone etc. — um d. Schlund d. Bl. ein röhr. Kranz od. zwölzfähn. Mündung), z. B. Gewächsh. *C. purpureum* R. Br., *lutèum* Ker, *album* R. Br. etc. (Austral.).

Calothamnus Lab. (Myrtac. Melaleucaceen, XVIII. 3) „Schönstrauch“ (*θάυρος* Strauch), z. B. *quadrifida* Lab.

- 1) **Calothrysus** Spach (zu *Aesculus* L. (Sapindaceen, VII. 1) „Schönstrauss“ (*θύρος* Strauss etc.), z. B. *Zier. californicus* Nutt. 2) **Calothrysus** R. Br. (Proteaceen, IV. 1).

Calotis R. Br. (Compositen, XIX. 4) „Schönohr“, z. B. *Zier. breviseta* Benth., *cuneifolia* R. Br. (Neuholl.) (*οὖς*, *ωτός* Ohr — 2 häut. Öhrchen d. Samenkrone).

- 1) **Calotropis** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Schönkiel“ (*τρόπις* Schiffskiel — d. Blättch. d. corona staminæ nachenförm. Wtst.), z. B. *Zier. procera* R. Br. e. mudar, Riesenwachspfl. od. grosse Schwalbenwurz (Ind.), s. *Asclepias gigantea* L. 2) **Calotr.** Don (Papilionaceen, XVII. 4) (— grosse carina!).

- 1) **Calpodendron** (sc. *Mespilus*) Ehrh. (Pomaceen, XII. 4) „Urnenbaum“ (*καλπόν* Gefäß etc., *δένδρον* B.), s. *Crataegus pyriformis* W. (Nordamer.). 2) **Calpod.** subgen. v. *Crataegus* Lauch. Scheinmispeln, z. B. *Cr. grandiflora* C. Koch, *mexicana* Moc. u. a.

- 1) **Caltha** L. (Ranunculaceen, XIII. 7) Dotterblume, Schmalz- od. Butterblume, fr. populage, coccusseau, e. marsh-marigold u. cucullate-flower (v. *καλθά* Handkorb), z. B. *C. palustris* L. m. v. fl. pl. Hort. 2) **Caltha** G. Frank (Compos. Calendulac., XIX. 4), *C. vulgaris* st. *Calendula arvensis* Acker-Regenrose. — *Calthæae* Rchb.

Calycantha Rchb. Kl. d. „Kelchblütigen“; *Calycanthæae* DC., Rchb. (sc. *Nyctagineæ*) Ldl. *Calycanthus*artige.

Calycanthinae DC. Bartl. Ord. d. „Kelchblümner“ Leun. i. q. *Calycanthæae* Rchb.

Calycanthus L. (Nyctagineen *Calycantheen*, XII. 5) Würz- od. Gewürzstrauch, eig. „Kelchblume“, fr. *calycanthe*, e. allspice (*καλύνξ*, *-ος* Kelch, *ἄρθος* — Kelch gefärbt wie eine Krone!), z. B. *Zier. C. floridus* L. (*sterilis* Walt.), fr. e. de la Caroline, *praecox* L. s. g. Winterblume, *laevigatus* W. (*ferax* Michx.).

Calycéra Cav. (Compos. Amphicarpanthen, od. *Calycereen*, XIX. 4) „Kelchhorn“ (s. eb. u. *ξερός* Horn — Kelchteile hornförm., Wtst.). — *Calyceræae* R. Br., DC.

Calyciflōrae Endl., DC. Kl. d. „Kelchblütigen“ (Endl. zu *Dialypetæae* als Cohorte).

Calycotome DC., Lk. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Kelchschnitt“ (s. v. u. *τομή* Schnitt — nach d. Abfallen d. Bl. wie abgeschnitten.), z. B. *Zier. villosa* Poir. (*Cytisus lanigerus* DC., *Spartium* l. Desf.), fr. *cytise laineux*, *spinosa* Lk. (*Spart. spin.* L.) etc.

Calymenia Nutt. = *Calyxhymenia* Orteg., s. d.

- Calypsectus** Rz. Pv. (st. Calycopl.-) (Salicarieen, XII. 1) Falten-, Dreh-od. „Schlingkelch“ ($\pi\lambda\varepsilon\tau\sigma\varsigma$ gedreht etc. — gefalt. Kelchsaum!), z. B. acuminatus R. P. (speciosus Kth., B. Peru).
- 1) **Calypso** Salisb. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Calypso“, „Hüllen“-O. (v. $\chi\alpha\lambda'\tau\tau\omega$ verhüllte = Calypso Myth., Oceanide od. Meernymph — einz. schöne Endblüte), z. B. borealis Sal., s. Cymbidium b. Sw. (Norna bor. Wahlb., Cypripedium bulbosum L.). 2) C. P. Th. (Hippocrateen od. Malpighieen, Theaceen, III. 1) (- das ♀ versteckt in d. Blüte!).
 - 1) **Calyptranthes** Schreb., Sw. (-us Juss.) (Myrtaceen, XIII. 1) Deckelmyrte Leun., „Schleierblüte“ (v. $\chi\alpha\lambda\upsilon\tau\tau\varsigma\alpha$ Haube etc., $\tilde{\alpha}r\vartheta\eta$ od. -os — Kelchdeckel fällt b. Aufgehen ab!), z. B. brasiliensis Spr. s. paniculatis Spr. (nicht Rz. Pv.), caryophyllata Pers. (Myrtus car. Sw.) nägleinart. Myrte M. Rehb. 2) **Calyptranthus** P.-Th. (Capparideen, XIII. 1), s. Capparis panduriformis.
- Calyptaria** Naud. (Melastomaceen Davyean, X. 1) „Schleierblume“ (s. v.), z. B. Zier. C. haemantha Van Houtt., s. Melastoma Mutisii Bpl., Calyptrella Naud.
- Calyption** Ging. (Violaceen, XIX. 6) „Schleierveilchen“ (s. v. u. $\gamma\circ\sigma\nu$ Veilchen — d. unt. Kronblatt wie eine Haube!), s. Corynostylis Berterii Mart.
- Calyptrocalyx** Blum. (Palmen, XXI. 6) „Kappenkelch“-P. (s. v. — Kelchblätt. kappenförmig!).
- Calyptostigma** Trautv., Mey. (Lonicereen, V. 1) „Haubennarbe“ (s. v. u. $\sigma\tau\gamma\mu\alpha$ Narbe etc.), z. B. C. Middendorfiana, s. Diervilla Carr. u. Weigela Midd. Hort.
- Calysphyrum** Bung., Mey. (Lonicereen, V. 1) „Kelchknöchel“ ($\chi\alpha\lambda\upsilon\xi$, -zos u. $\sigma\gamma\varphi\varrho\sigma\nu$ Knöchel, Ferse — Kelchröhre stielf.), z. B. Zier. roseum Mey m. v. v., e. rose-coloured Diervilla, s. Diervilla s. Weigela rosea L.).
- Calystegia** R. Br. (st. Calycost.-) Lour. (Convolvulaceen, V. 1) Bärenwinde, fr. calystégie, e. bear-bind (v. $\chi\alpha\lambda\upsilon\xi$, -zos u. $\sigma\tau\epsilon\gamma\eta$ Decke etc. — Bl. in zwei schön. Brakteen eingeschl.), z. B. sepium (Convolvulus sep. L.) Zaunwinde, fr. manchette de vierge, Zier. pubescens Lindl. u. dahurica Chois.
- Calythrix** Lab. (st. Calycothrix) Schauer (Myrtaceen, XII. 1) „Kelchhaar“-M. (s. v., $\vartheta\vartheta\iota\xi$ Haar), z. B. conferta Schau., tetragona Lab., glabra R. Br. (Neuholl.).
- Calyxhymenia** Orteg. (**Calymenia** Pers.) (Nyctagineen, III. 1) „Kelchhautblume“, s. g. Sauerwurz ($\chi\alpha\lambda\upsilon\xi$ u. $\xi\mu\eta\nu$, -eros Häutchen — kelchförm. Involucrum), s. Oxybaphus l'Hér. s. Mirabilis Cav.
- Camāra** Plum. (sc. Lantana) L. (Verbenaceen, II. 1) Schneeball-Verbene, amer. Lantane, s. g. Wandelröschen, fr. camara „Gewölbstr.“ (v. $\chi\alpha\mu\alpha\varsigma\alpha$ Wöldecke, Wtst. südamer. Name!), ferner Zier. C. arboreocensis Salviae folio Plum. = Lantana odorata L., Ait.
- Camarea** A. St. Hil. (Malpighiaceen, X. 3) „Camaree“ (n. Don Man. Fereira de Camara Bethencourt e Sa, Dir. d. Diamanten-Distr. in Brasilien).
- Camaridium** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Wölb“-O. (s. v. u. $\varepsilon\tilde{\iota}\delta\sigma\mu\alpha\iota$ gleiche — Unterlippe concav), z. B. ochroleucum Ldl., purpureum Spr. etc., s. Cymbidium ochrol. Sw. u. vestitum Sw.
- Camarophyllum** Kumm. (Pilze, XXIV. 4) „Krebs“- od. „Garnelenpilz“ Kumm. (cammarus od. gammarus Garnele, $\chi\alpha\mu\mu\alpha\varsigma\varsigma\varsigma$ Krebs), z. B. essb. virginēus „Jungfern“-P. (viell. „Wölbblatt“, s. v. — Lamellen sehr weitläuf. Kumm.).
- Camarōtis** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Wölbbohr“ (s. v. u. $\sigma\tilde{\nu}\varsigma$,

ωτὸς Ohr od. *zauaqwτὸς* gewölbt — Labellspitze gewölbt), z. B. purpurēa Ldl. (Sylhet, Ostind.).

Camassia Lindl. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Schönblumen-Lauch (n. d. amer. Wort quamash od. camass, eine schöne, grosse Blume), z. B. C. esculenta Ldl., fr. camassie comestible, e. eatable C., s. Anthemicum esc. Spr., Phalangium esc. Nutt., Scilla esc. Hook.

Camax Schreb. (Proteac. od. Asperifolien, IV. 1) Pallisadenholz (v. *zápaξ* Stange etc.), z. B. C. fraxinēa W., s. Rapourea Aubl.

1) **Cambessedéa** W. (Terebinthaceen, X. 1) „Cambessedie“ (n. Cambessèdes, s. d. Aut.), C. simplicifolia Kth. (Mauria s. Kth., Str. Peru).

2) **Cambessedesia** DC., Mart. (Melastomac. X. 1), z. B. purpurata DC.

Cambogia L. (Guttiferen Garcineen, XIII. 1) Gummigutbaum, fr. guttier u. camboje, e. gamboge, C. Gutta L., s. Stalagmītes cambogioides W. (gutta Tropfen — hervorquell. Saft!) (n. d. indisch. Gebiet Camboge jens. d. Ganges).

Camelīna Crantz (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Leindotter, fr. caméline od. sésame bâtarde (— d'Allemagne), e. dotter u. gold -pleasure (st. Chamaelina, v. *χαμαὶ* an der Erde u. *λινόν* Lein — Flachsunkraut!), s. Myagrum L. — Camelincæa Rchb. Leindotterartige.

Camellia L., Ker (Theaceen Camellieen, XVI. 8) „Camellie“ (n. d. mähr. Jesuiten G. J. Kamell, latin. Camellius, auf Manilla), Zier. C. japonica Ker, jap. Rose, Stuben: v. v. paeoniaeflora, alba plena u. anemoniflora alba, axillaris Sims (Gordonia anomala). — Camelliacæ DC., -æa Rchb.

1) **Cameraria** L. (Apocyneen, V. 1) „Camerarie“, fr. caméraire (n. d. nürnberg. Arzt u. Bot. Joach. Camerarius, s. d. Aut.). C. dubia Sims (Wrightia d.), lutæa Lam. (Tabernaemontana odorata Vahl).

2) **Cameraria** Dill., Mnch. (Portulacac. Samoleen, III. 3), s. Montia.

Cammaroidéa (zu Aconitum) Rchb. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Cammarum“-Sturmhut (s. sogl.), z. B. cernuum s. flexicaule Hoppe.

Cammārum DC. (-us Jacq.) (sc. Aconitum) (Ranunculaceen, XIII. 3) „Krebs“- od. „Käfer“-Sturmhut (v. *zάμμαρος* lat. gammārus od. camm.-, Krebs od. Käfer — weg. d. ober. Teils d. Krone, d. ein. gekrümmten Krebsschwanz gleicht).

Camissonia Lk. (st. Chamiss.-) (Oenothereen Gaureen od. Onagrareen, VIII. 1) „Chamisso“-Kerze (n. d. Dicht. u. Bot. Chamisso), z. B. C. flava Lk.

Campanūla L. (Campanulaceen, V. 1) „Glockenblume“, Glocke O. W., fr. campanule od. gantelée, fleur en clochette, e. bell-flower, canterbury-bell (dem. v. campāna Glocke), z. B. Zier. (Ampelpfl.) fragilis Cyril., Topf. turbinata Schott, Gartenbl. C. Medium L. Mariette, fr. mariette, Carillon od. Violette de Marie, e. coventry-bell od. marriet, violet-marian, pyramidalis L., nobilis Ldl., carpathica Jacq., macrostyla Boiss. etc., wild. in Wald u. auf Wies. patula L., persicifolia L., Trachelium L., Rapunculus u. rapunculoides L., als Zier. verw. rotundifolia L. v. soldanelliflora plena u. ranunculiflora plena Hort. — Campanulacæ DC., Rchb., -nacæa Rchb., -nulinæ Bartl., -nulinæae Endl. Ord. od. Kl. der Glöckler.

Campanumæa (nicht -moea) Blum., Don (Campanuleen Jasioneen, V. 1), „Milchglockenblume“ (campāna u. μαύρη Säugamme — mit Milchsait!).

Campderia Benth. (Polygoneen, VIII. 3) „Campderie“ (n. F. Campder, schr. Monogr. des Rumex, Par. 1819).

Campēlia Rich. (Commylyneen, III. 1) „Sonnenneigblatt“ (v. *καμπή* Krümmung u. *ἥλιος* Sonne — d. Blätt. d. Perigons neigen zu einander, od. v. *ἔλω* rolle? — ungewiss!), z. B. C. Zanonia Rich. s. Tradescantia Zanonia Sw.

Campella Lk. (Gräser, III. 2) Rasenschmiele (nicht etwa v. campus

- Feld, sond. v. Deschamps, eig. Loiseleur des Longchamps, analog *Deschampsia P.-B.*, z. B. *caespitosa* Lk. (*Aira s. Deschampsia P.-B. caesp.*).
- Camphora** Nees (sc. *Laurus*) L. (*Laurineen*, IX. 1) „Kampher“-Lorbeer, fr. camphrier, e. camphire (-phore) (v. d. arab. kanfur, ind. kanpura „Kampher“), C. officinarum Nees s. *Laurus Camphora* L.
- 1) **Camphorosma** L. (*Chenopodiaceen*, V. 2) „Kampherduftkraut“, fr. camphrée (s. eb. u. δσμή Duft), C. monspeliensis L. (*monspeliaca* Pollich) s. *Kochia arenaria* Roth (*Willemetia ar. Märk.*), ruthenica M. B., annua Pall., ovata W. etc. 2) **Camphorosma paleacea** L. f. (*Cinchonaceen od. Aquifoliac.*, IV. 1) „Kampherduftstr.“ s. *Monetia pal.* Spr.
- Campteris** Presl (*Campderia Lag.*) (*Farne*, XXIV. 1) „Biegungs“- od. Krummfarn, Zweiohr-F. (v. καμπτής Krümmung — nämл. d. Wevelvenen in ihr. Verlauf), s. *Pteris biaurita* L. (— d. unterste Wevelieder zweiteilig!).
- Camptosēma** Hook., Arn. (*Legumin. Phaseoleen*, XVII. 4) „Krummfahne“ (*καμπτός* gekrümmmt, σημα Fahne etc. — Fahnenbasis beiders. m. Anhang, Wtst.), z. B. *Zier. rubicundum* L. (*Dinoclea glycinaoides DC.*, *Kennedyia splendens* Hort.).
- Campylobōtrys** Lindl. (*Rubiaceen*, IV. 1) „Krummtraube“ (*καμπυλός* krumm, βόρρας Traube), z. B. *Warmh. C. regalis* Ldl. (Mexiko).
- Campylocaryum** DC. (*Asperifolien*, V. 1) „Krummnüsschen“ (*καρύον* Nüsschen — diese krumm!).
- Cananga** Rumph. (*Anonaceen*, I. 1) Traubenbaum, äthiop. Pfeffer, fr. canang (vaterl. guian. Name!), s. *Guanabanus Plum.*, z. B. *Ouregou Aubl.* (*Aberemoa* ds.), s. *Uvaria monosperma* W.
- Canarīna** Juss. (-rinia L.) (*Campanulaceen*, V. 1) „Canarienglocke“, fr. canarine campanulée, Stuben. C. *Campanula* L. (*C. Zanguebar Lour.*) Strichelblume, s. *Campanula Canarīna* L. s. *canariensis* L. f. (n. d. canarischen Inseln ben.).
- Canarium** L., W. (*Terebinthac. Bursereen*, X. 1 od. XXII. 5) „Canarienbaum“ (*malay. canari*), z. B. *C. commune* L., *balsamiferum* W., *bengalense* W. ostind. Copal, s. *Boswellia Colebr.*
- Canavalia** DC. (-vali Ad.) (*Legumin. Phaseoleen*, XVII. 4) „Canavalie“, Canavali-Langbohne (vaterl. Nam. auf d. Südseeinseln!), z. B. *ensiformis* DC. (*Dolichos ens.* Thb.), *obtusifolia* DC. (*Dol. rotundifolia* Vahl) etc.
- Cancellaria** DC. (*Malvaceen*, XVI. 8) „Gittermalve“, fr. cancellaire (v. cancelli, -orum Gitter — Kelch im Hüllblatt eingeschl.) (zu *Pavonia Cav.*)
- Candela** Catesb. (*Rhizophoreen*, XI. 1) „Leuchterbaum“, fr. chandèle (lat. *candēla* Kerze etc.), C. *americana* Cat. s. *Rhizophora Candel* L. (*Rhiz. Mangle Pluk.*).
- 1) **Candollēa** Lab. (*Dilleniaceen*, XVIII. 2) „Candolle's“-Strauch (n. d. Prof. Aug. Pyrame de Candolle in Genf, s. d. Aut.), z. B. *cuneiformis* Lab. (*Neuholl.*), *peduncularis* u. *fascicularis* R. Br. (das.), s. *Hibbertia Salisb.* 2) **Candollēa** Armeria Rich. u. *umbellata* Lab. (*Stylidieen od. Plumbagineen*, V. 1), s. *Stylium Arm.* etc. 3) **Candollēa** Baumg. (*Ericaceen*, VIII. 1), s. *Menziësia pilosa*. 4) **Cand.** Batard. (*Gräser*, III. 2), s. *Agrostis*. 5) **Cand.** Mirb. (*Farne*, XXIV. 1), fr. *Candollée* (*candolline*), s. *Cyclophorus Desv.* 6) **Cand.** Raddi (*Jungermannieen*, XXIV. 2).
- Canella** P. Br., L. (*Garcinieen od. Hesperideen*, XI. 1) „Canell“- od. Winterrindenbaum, wild. Zimmet, fr. fausse-canelle, e. canel (v. d. span. *canela* Zimmet), C. *alba* L., Sw. Weiss-Z., fr. canelle blanche

- (- bâtarde poivrée, - du Pérou), s. Winterania Canella L. (Can. Winterana G.), axillaris Mart. (Str. Brasil). — Canellaceae DC.
- Canephōra** Juss. (Rubiaceen, IV. 1) „Korbträgerin“, fr. canéphore (*κανέφορος* v. *κύρις* Matte, Korb etc., *γοργός* tragend — Blumenstiele nach oben korbf.), z. B. axillaris Lam.
- Canistrum** Morr. (Bromeliaceen, VI. 1) „Rohrkorb“ (lat. canistrum), z. B. aurantiacum Morr.
- Cankrienia** de Vries (Primulaceen, V. 1) „Cankriensblume“ (n. B. F. Cankrien, Pfeiffer), z. B. chrysantha de Vr.
- Canna** L. (Marantaceen od. Cannaceen, I. 1) Blumenrohr, fr. canne (- d'Inde), faux-sucrier, e. cane, flowering-reed, indian-cane (-shot) (lat. canna, gr. *κύννα*, celt. can = Rohr), Zier. C. indica L. m. v. Annaei Hort., C. iridiflora Rz. Pv., fr. basilier à fleur d'Iris, e. iris-flowered Flowering-reed, C. glauca L. (blass gelbblum.) u. a. — Cannaceae DC. (-nae Juss., -æae Rchb.) blumenrohrartige (zu Ord. Scitaminæ Bartl.).
- Cannabaceæ** Endl. Grck. hanfartige, -binæae Endl. Ord. d. Hanf-artigen, s. sogl. Cannabis!
- Cannabis** L. (Urticaceen Cannabaceen, XXII. 5) Hanf, fr. canabé (-bou) od. chanvre (alfr. chambrie), e. hemp (gr. *κάνναβις*, arab. kaneb), geb. C. sativa L. Zier. var. gigantica Hort.
- Cantharellus** Ad., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Krug“- od. Faltenschwamm, s. g. Pfifferling (dem. cantharus, gr. *κάνθαρος* Trinkgeschirr — Trichterform d. Huts!), z. B. essb. C. cibarius Fr. Speise-Pf., fr. escaville (escarville), e. blobber, gift. aurantiacus Eierschwammi, e. paddock-stool „Krötenstuhl“, s. Merulius Hall.
- 1) **Cantua** Juss. (Polemoniac. od. Convolvulac., V. 1) „Cantue“ (peruan. cantu), z. B. Treibh. C. splendens s. buxifolia Lam. (Witheringia superba L'Hér.), dependens u. foetida (Periphragmos Rz. Pv.), corodata Juss. (uniflora Pers.), ovata Cav. (Periphragmos uniflora R. P.) (Zaunstr., Peru), s. Gilia, Hoitzia etc. 2) **Cantua** W. (Loasaceen, XIII. 1).
 - Capanæa (-nia)** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) Wagenblume (*καπάνη* thessal. Wagen — Blumenform), z. B. C. grandiflora Decsn.
 - Capellia** Blum. (Dilleniaceen, XIII. 7) „Capellie“ (n. d. Bot. Carlo Capelli, schr. Cat. stirpium in horto Taurinensi, Turin 1821, Wtst. n. Philem. Bar. van der Capellen, Gen.-Gouv. v. Batavia bis 1828), z. B. multiflora Blum. (B. Java).
 - Capillus** Venëris (sc. Adiantum) L. (Farne, XXIV. 1) „Venushaar“ (capillus Haupthaar, Venëris Gen. v. Venus — schön lichte, fein-blättr. Wedel!).
 - Capitata** (sc. Brassica) Metzg. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Kopf“- od. „Haupterkohl“, s. g. Kappis (Weiss- u. Rotkraut) (v. caput, -itis Kopf, Haupt).
 - Capnites** DC. (Papaverac. Fumariaceen, XVII. 2) „Erdrauch“ (v. *καπνίτης* mache Rauch, *καπνός* — bez. d. duft. Belaubung!).
 - Capnorchis** Borkh., DC. (Papaverac. Fumariac., XVII. 2) „Orchis-Erdrauch“ (v. *καπνός* s. eb. u. Orchis — weg. d. ähnl. Blumen!), z. B. Zier. C. spectabilis DC. (Dielytra s. Dicentra spec. autt.) s. g. Herzb. blume, chrysanthia, formosa etc.
 - Capparidastrum** DC. (Capparideen, XIII. 1) unechter Kappernstr. (zu Capparis L., wovon deter. od. Wtst. *αστορού* Bild).
 - Capparidæae** Vent., DC., Rchb. (-ræae Rchb., -rides Juss.) (zu Ord. Rhoeädæae Bartl.) s. sogl.
 - Capparis** L. (Capparideen, XIII. 1) „Kappernstrauch“, fr. cappa (caprier), e. bean-caper (gr. *κάππαρος*, arab. kabar), C. spinosa L. echter K. (essbare Kappern), ovata Desf., sodata, afrik. Salzkapper.
 - Capraria** L. (Personaten, XIV. 2) „Geis“- od. „Ziegenkraut“, fr. capraise

- (v. *capra* Ziege, die d. Kr. gern frisst!), z. B. *Zier. hirsuta* Hb., *Bpl. u. lanceolata* Lk., *Otto*, s. g. *Herzblume* od. *Antillenthee* Leun., *C. lucīda* W. (*Teedia luc.* Rudolph).
- Caprēa** (sc. *Salix*) L. (Salicineen, XXII. 2) Sal- od. Sohlweide, Palmeweide, fr. *marsault* od. gnédie, e. *sallow-tree* od. *goat-willow* (v. *capra* Ziege, von der ihr Laub gern gefr. wird), *Zier.* var. *pendula* u. *tricolor* Hort.
- Caprifoliacēae** Bartl., DC., Rchb., Endl. (-folia Juss.) Geisblattgew. (zu Ord. Rubiacīnae Bartl. DC.).
- Caprifolium** Röhl., Lam., R. Sch. (sc. *Lonicēra*) L., Ad. (*Lonicereen* od. *Caprifoliac.*, V. 1) „Geisblatt“, Je länger je lieber, welsche Specklilie Vilm., fr. *chèvre-feuille romaine*, e. *goat's-leave*, herb-trinity u. heart's-ease, garden-wood-bine od. -honey-suckle, s. *Caprif. hortense* Lam. (*perfoliatum* Röhl.) u. *C. italicūm* R. Sch. (*Periclymēnum* it. Mill.) m. v. v. (v. *capra* Ziege u. folium Laubblatt).
- Caproniana** (sc. *Cerāsus*) Risso (Amygdaleen, XII. 1) „Eberkirsche“, Bocksk. (v. *zάπτος* Eber od. Bock, ital. *caprone*, oder v. fr. *capron* = Riesenerdbeere — bez. d. Geruchs!), z. B. *C. rubra* Risso, s. *Cerasus dulcis* autt.
- Capsella** Vent., Mnch. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Hirtentäschchen“, Täschel O. W., fr. *boursette* od. *mallette à berger*, e. *shepherd's-purse* od. *cass-weed* (dem. v. *capsula* Kapsel). *C. bursa pastoris* Mnch. Säckelkr., fr. *tabouret* od. *moufette*, *C. ceratocarpa* Mnch. etc., s. *Thlaspi L.*
- Capsicum** T. (Solaneen, V. 1) „Beissbeere“, fr. *poivre du Brésil* (- d'Espagne „span. Pfeffer“) u. *corail*, e. *cockspur-pepper* (*závrtíz v. zárltw* beisse, d. *Beissen*, od. *capsicus* v. *capsa* (-sūla) Kapsel-Beerenform !), z. B. *C. annuum* L. s. g. span. *Pfeffer* (ungar. Paprika), *Zier. C. longum* DC. m. v. v., *C. grossum* W. m. v. *luteum*, *C. tomatiforme* Hort., *violaceum* Hb., *Bpl.*, *Kth.*, chilense Hort., *cerasiforme* L. m. v. v., etc.
- Caracalla** Lam., Endl. (sc. *Phaseōlus*) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Kappenbohne“, fr. *caracalle* (lat. *caracalla* i. q. *cuculla* Kappe, gr. *καρακαλλίσσων*, Wtst. *κάρα* Haupt u. *καλλή* od. *καλλεῖα* schöne Kleider etc.), s. *Caracalla arborescens* Lam.
- Caragāna** Lam. (sc. *Robinia*) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Erbsenstrauß, -baum, fr. *caracan* od. *arbre aux pois*, e. *pea-tree* (tatarisch so viel als Schwarzohr Leun.), *Zier. C. arborescens* Lam. (sibirica Ray) m. v. v., *frutescens* DC. (*digitata* Lam.) m. v. v. u. *ferox* Pall. s. *spinosa* DC. (*Robinia spin. L.*).
- Caragnāta** Plum., Pis. (Bromeliaceen, VI. 1) „Caraguate“ (südamer. Name!) = *Bromeli Acanga* L. sparrige *Ananas* D., s. *Tillandsia lingulata* Jacq.; *musaica* E. André „pisangart.“, *latifolia* u. *clavata* Plum. (*Tillandsia serrata* L.), splendens etc.
- Carallia** Roxb. (Rhizophoreen od. Pomaceen D., XI. 1) Wurzelbaum (n. d. hindostan. *Telingasprache carillie* Paxton), z. B. *C. lucīda* Rxb. (B. Ostind.).
- Carallūma** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) Saft-Wachspfl. (*carallum* der *Telingasprache*), z. B. *adscendens* R. Br., *umbellata* Haw. (Str. Ostind.), s. *Stapelia L.*
- Carambōla** Aubl. (sc. *Averrhōa*) L. (Oxalideen Bombaceen, X. 5) s. g. Blümung (v. d. franz. *carambole* Rot- od. *Beiball*, *Billard*).
- Carāpa** Aubl. (-*raipa* Zucc.) (Meliaceen od. Ternstroemiac., VIII. 1) „*Carap*“- od. *Crapholzbaum* (n. d. guian. Nam. *carape* Paxton), z. B. *paniculata* Zucc., s. *Xylocarpus* Schreb.
- Carapichēa** Aubl. (Rubiac. Cinchonaceen, V. 1) „*Carapichee*“ (nach d. caraib. Nam. *carapiche*!). *C. guianensis* Aubl. = *Cephaēlis involucrata* W.

Cardamindum Mnch. i. q. Tropaeolum Kapuzinerkresse (v. Cardamine u. indus).

Cardamine L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Schaumkraut, Wiesenkresse, Gauch- od. Kukucksblume Vilm., fr. cresson des prés, e. meadow-cresses (-cuckoo) (gr. *καρδιάμην* v. *καρδία* Herz u. *δαμέω* bändige, Paxton), z. B. C. pratensis L. Zier. var. fl. pleno.

Cardaria Desv. (zu *Lepidium*) Rehb. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Herzschötchen“, Hungerblümchen-Kresse (v. *καρδία* s. eb.), s. *Lepidium Draba* L. (*Draba umbellata* Mor.) u. *Cardiolépis* Wallr.

Cardiaca T. (sc. *Leonurus*) L. (Labiateen, XIV. 1) „Herzgespann“, fr. cardiaque (gr. *καρδιαζός* Herz betr. od. *καρδία* u. *ἀνή* Heilung, Ruhe).

Cardinalis (sc. *Lobelia*) L. (Lobeliaceen, XIX. 6) „Cardinalblume“, fr. cardinale (Blume scharlachr.).

1) **Cardiolépis** Wallr. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Herzschnuppe“, s. *Cardaria* Desv. (s. v., *λεπίς* Schuppe, — Schötchenform!). 2) **Cardiolépis** Raf. (Rhamnaceen, V. 1).

Cardiospermum L., Sm. (Sapindaceen, VIII. 3) „Herzsamen“, -erbse D., fr. cardiosperme, e. heart-pea (s. v., *οπέρουμα* Samen), z. B. elegans Hb. Bpl. (Schlingstr. Peru), *Halicacabum* L. blasenfrücht. od. gem., fr. pois-de-coeur (cor-inde, Alkekengi), s. *Pisum vesicarium* Bauh. (Wtst.: kugl. Same mit weiss. herzf. Keimwarze!).

Cardopatiæae Less., DC., s. sogl. Cardopatum.

Cardopatum Pers. (-tium Juss., -thum od. -thium ?) (Compos. Carlineen, XIX. 1) „Wegtritt-Distel“ (v. *cardius* u. *πάτος* betretner Pfad, Wtst. *πάθος* Leiden — früher geg. Herzeleiden!), z. B. *corymbosum* Pers., s. *Brotéra* W., *Carthamus* L. u. *Camalium* (Chamalium) Juss. — 2) **Cardopatia** officinalis W. i. q. *Carlina acaulis* L. „Eberwurz“.

Cardopétus Forst. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Muldendistel“? (*χάροδοτος* Mulde etc.?). *C. serratus* Forst., s. *Cardopatium* (*Chamalium*, *Carlina*) s. eb.

Carduaeæae = Compositae Homioianthae Rehb. XIX. 1 (Aequalia L.) Distelartige „Gleichblütler“ (nur Röhrenblütchen etc.!).

Carduncellus Ad., Lob. (sc. *Carthamus*) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Cardun-Saflor“ (dem. v. *Cardunculus*), s. *Carthamus mitissimus* L. (*minutissimus* Paxt. !?).

1) **Carduncélus** (sc. *Cynara*) L. (Compos. Carduac., XIX. 1) „Cardone“, spanische od. „Cardun“-Artischoke M.-Rehb., fr. chardonnète (cardonète) (v. *Cardus* Distel, auf *Candia cardun* u. *chardonna*). 2) **Carduncélus** Ad. (Comp. Card.) „Cardun-Saflor“, s. *Onobroma* G. u. *Carthamus Carduncellus*, s. v.

Carduus L. (Compos. Carduac., XIX. 1) Kopfdistel, fr. cardère u. chardon, e. cardoon u. thistle (lat. *carduus* überh. Distel, v. d. celt. ard Spitzte, gr. *ἄρδις*). *C. nutans* L., s. g. Moschusdistel, fr. épine-blanche sauvage.

Caréum Plin., Ad. (Umbelliferen, V. 2) Kümmel = *Carum* L.

Carex L. (Cyperaceen, XXI. 3) Segge, Riedgras, fr. caret (-reiche) u. laiche „Liesch“, e. sedge, reit, reed (-grass) (v. *careo* entbehre, Paxton, Wtst.), z. B. *arenaria* L. (Offiz. *Rhizoma Carecis* Grck.), etc.

Careya Roxb. (Myrtaceen, XII. 1) „Carey's“-M. (n. d. Bot. W. Carey bei Calcutta), z. B. *arboréa* Rxb. (*Pelvu Rheed.*) (Gespinnstpfl. Ind.).

1) **Carica** L. (Cucurbitaceen Papayaceen, XXII. 9) Melonenbaum (lat. *Caricus* Karier, aus *Caria* in Kleinasiens). *C. Papaya* L. gem. Melonenb. (*Papaya vulgaris* Lam.). 2) **Carica** (sc. *Ficus*) L. (Urticac. Artocarpeen, XXII. 9) gem. Feigenbaum, fr. figuier, e. fig-tree (— lief. d. *caricæ* d. Apoth.).

Caricæae (-cinæae) Nees Seggen od. Riedgräser (v. *Carex*, -icis).

Carissa L. (Apocynneen, V. 1) „Wachsbaum“ (v. *Kάρισσα* Karierin ? Paxton, wahrsch. v. *ζηγός* Wachs, lat. cera, Wtst.: ostind. Namen !), z. B. C. Carandas L. (ind. carandas !), spinarum L. (Spina Rumph.), etc., s. Echites Burm. — Carissæae (sc. Contortae) Rchb. Krähenaugen-od. Wachsbaumartige.

Carlina T. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Karlsdistel“, Eberwurz, fr. carline, e. carline - thistle (st. Carolīna n. Karl d. Gr., dess. Heer davon geheilt wurde, Paxton (?), viell. st. Cardina (ital. = kleine Distel, cardo) als Druckfehler, Leun. !), z. B. Zier. C. acaulis L. Zwergdistel. — Carlinæae Rich.

Carlodovīea (Carlud.-) Rz. Pv. (Palmen, XXI. 9) „Karl-Louisen“-P., fr. carludovique, Panama-P. (n. d. span. König Karl IV. u. dess. Gemahlin Mar. Louise, † 1819), z. B. C. palmata (Salmia p. W., Bombonaxa, Jipijape Leun.), Warmh. humilis, latifolia R. P., Plumieri Kth., etc.

Carlowitzia (-zia) Mnch. (Compos. Carlineen, XIX. 1) Eselsdistel (n. H. K. v. Carlowitz, s. d. Aut.), z. B. C. (Carthamus) salicifolia Mnch. **Carmichaëlia** R. Br., Spr. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Carmichael's“-Hornklee (n. d. Capt. Dugald Carmichaël, s. d. Aut.), z. B. C. australis R. Br. (Lotus austr. s. arborēus Forst.).

1) **Carolinæa** L. f. (Oxalid. Bombaceen, XVI. 8) „Carolinien“-Wollbaum (n. Caroline, Markgräf. v. Baden, † 1783), z. B. alba Lodd. u. princeps L. Pracht-W., s. Bombax grandiflora. 2) **Carolina** Gaud. (Urticaceen, XXI. 4) (N. pr.).

Carota (sc. Daucus) L. (Umbelliferen, V. 2) Möhre, Mohrrübe, Mohrenkümmel, Carote, fr. carotte, e. bird's-nest „Vogelnest“ (— zusammengezog. Dolden nach d. Verblühen !) u. carrot (gr. *καρωτὸν* viell. v. *κάρων* Kopf — Gestalt d. Dolde).

Caroxylon Thb. (Portulacaceen, V. 1) „Kümmelholz“?, Karostrauch (v. caroo = heisse Ebene d. Caplandes, Wtst.). C. Salsöla Thb. (Salsöla aphylla L. f.) Salzstr. v. Cap (schwerl. *ξύλον* Kümmel! *ξύλον* Holz).

1) **Carpesium** L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Strohkelch“, Kragenblume, fr. carpésie (gr. *καρπονίσιον* Holz, Stroh — weg. d. äusseren Kelchschuppen !). 2) **Carpesium** G. Fr. == Valeriana v. Cubæae.

Carpinus L. (Betulaceen od. Cupuliferen, XXI. 8) Hain- od. Weissbuche, Heister O. W., Hornbaum Rmpl. (v. d. celt. car Holz, pinda Kopf — „Kopfholz“, zu Jochen dienend, gr. *ζυγία* Diosc. v. *ζύγιος* z. Joch. geh., Wtst. == Carpinus). C. betulus L., gem. Hainb., fr. carpin od. charme, e. yoke-elm, carpy, horn-beam (hard-), quick-tree (-beam, quicken-beam) m. v. v., C. Ostrya L., C. virginiana Lam. (beide Ostrya vulgaris u. virg.), C. orientalis Lam. (duinensis Scop.), fr. charme d'Orient, e. oriental horn-beam, etc.

Carpoböli DC. (Pilze, XXIV. 4) „Fruchtschneller“ (zu Ord. Basidiomycetes de By) (*καρποτὸς* u. *βόλος* Wurf v. *βόλλω* werfe — d. Fr. springt mit Gewalt ab!).

1) **Carpobolus** Mich. (sc. Lycoperdon) L. (Bauchpilze, XXIV. 4) (s. eb.). 2) **Carpobolus** Sw. (Ricciaceen-Moose, XXIV. 2) „Fruchtschnell“-M.

1) **Carpodétes** Forst. (Rhamnaceen od. Celastrineen, V. 1) „Band“- od. Ringbeere (*καρποτὸς* Frucht u. *δέτη* Band — Beere mitt. v. e. Ring umgeben, Wtst.), z. B. Treibh. C. serratus F. 2) **Carpodétes** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (v. *δέτη* od. *δέτις* Fackelbündel — Frucht scharf dreikantig! — unklar!), s. Pancratium recurvatum Rz. Pv.

Carpoliza Salisb. (st. -lyza, wie Antholyza, s. d.) (Amaryllideen, VI. 1) „Fruchtrachen“-Lilie (*καρποτὸς* u. *λύσσα* Wut — d. Frucht springt in 3 Klappen wie ein Rachen auf). C. spiralis Sal., s. Haemanthus spiralis Ait.

Carthamus T. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Saflor, fr. carthame, e. safflower (arab. quortom od. korthom, hebr. kartami färben). C. tinc-

- torius L., fr. graine de perroquet, fleur de safran, safran bâtarde (- d'Allemagne), safranon, e. dyer's-safflower (zafran, zaffir, -fre, -far) u. saphara.
- Carum** Koch (Umbelliferen, V. 2) Kümmerl, altd. Garbe od. Karve Mej., fr. carvi (gr. κάρον, nach Plinius v. Κάρπα carische Dolde, Paxt. u. Wtst.), C. Carvi L. gem. Kümmerl od. Carve, fr. faux-chervi, e. caraway od. skirwort.
- Caruneularia** Haw. (Asclepiadaceen, V. 2) „Karbunkel“- od. Schwären-Wachspfl. (v. caruncula Fleischgeschwür — d. corona staminea mit Carunkeln). C. peduncularis Haw., s. Stapelia L.
- Carvi** T. (sc. Carum) L. (Umbelliferen, V. 2) Kümmerl, fr. faux-chervi u. carvi, vgl. Carum.
- Carvifolia** Vaill. (sc. Selinum) L. (Umbellif., V. 2) „Kümmerlblatt“, fr. carvifeuille (Carvi u. folium Blatt).
- Carya** Nutt. (Terebinthac. od. Juglandeen, XXI. 4) Pekan- od. Hickory-nussb. (gr. κάρων Nuss), z. B. Zier. C. amara Nutt. (Juglans am. Mchx.), fr. noyer amer, e. bitter-nut-hickory, C. tomentosa Nutt. (Jugl. alba Mill., tomentosa Mchx.), fr. noyer tomenteux, e. mockernut-hick., C. alba Nutt. (Jugl. squarrosa Mchx. s. alba ds.), C. olivae-formis Nutt. (illinoensis Wang., rubra G., Jugl. cylindrica Lam. etc.), fr. noyer-Pécanier, C. porcinus Nutt. (glabra Mill.) „Ferkelnuss“, etc., s. Juglans L.
- Caryocar** L. (Oxalid. Rhizoboleen od. Bombaceen, XIII. 4) Höckernussbaum (s. v. u. κάρα Kopf), z. B. C. nuciferum L., fr. porte-noix, s. Pekea tuberculosa Aubl., C. villosum Pers. (Saouari Aubl.) (Str. Guiana).
- Caryophyllaceae** Grck. (-phyllæe Gay, DC. Rchb., -phyllinae Bisch. Ord. d.) Hornblattgew. Rchb., eig. „Nussblattartigen“, Hornkapseligen (κάρων u. φύλλων).
- Caryophyllaster** Rumph. (Rubiaceen, IV. 1) „Nelkenstern“ (Caryophyllum u. αστηρ Stern, Bild — wie ein kleiner Nelkenbaum!).
- Caryophyllastrum** Ser. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Nelkenwurz, i. q. Geum urbanum (deter. v. Caryophyllum L. Gewürznelke), s. sogl.
- 1) **Caryophyllata** T., Scop. (zu Geuni) Rchb. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) „Nelkenwurz“ (s. v.), z. B. urbana Scop. (Geum urb. L.). 2) **Caryophyllata** alpina Bauh., s. Anemone narcissiflora L. 3) **C.** (sc. Myrtus) L. Nelkenrinde, fr. capelet.
- Caryophylloides** Blum. (Laurineen, IX. 1) Rot-Näglein, Rot-Zimmet, s. Cinnamomum rubrum (sogl. u. ειδουμει gleiche).
- Caryophyllum** Ser. (Caryophylleen, X. 2) Gartennelke = Dianthus Caryophyllum L. (s. sogl.).
- 1) **Caryophyllum** L. (Myrtaceen, X. 1) Gewürznelkenbaum. C. aromaticus L. s. Tangu Pluk., Gewürznäglein, fr. gérofle (gir.-), e. clove (gr. καρωφυλλόν, „Nussblatt“ — nämli. Kopf dess. aus Blätt. gewölbt, Wtst.), s. Eugenia caryophyllata Thb. (Jambolifera c. L.). 2) **Caryophyllum** (sc. Dianthus) L. (Caryophylleen od. Sileneen, X. 2) Garten-nelke (— riecht wie Gewürznäglein!), fr. astropole, e. clove-gilly-flower, m. v. v. (Rümpler: Saum-, Strich-, Band-, Flammen-, Tuschnelken, besond. schön Souvenir de la Malmaison). 3) **C.** saxatilis Bauh. = Arenaria tetraquætra L.
- Caryota** Thb., L. (Fieder-Palmen, XXI. 8) „Nussdattelpalme“, fr. caryote (καρωφυλλός wie e. Nuss gestalt. — palmula caryota d. Alten), z. B. Zier. C. urens L. ostind. Brennp., fr. ayri.
- Caryotaxus** Zucc. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Nusseibenbaum“ (s. v. u. Taxus). C. nucifera Zucc., s. Taxus s. Torreya nucif. Kämpf.
- Cascarilla** Ad. (sc. Croton) L. (Rutaceen Euphorbiac., XXI. 9) Casca-riilen-Croton, fr. cascarille (chacarille), e. cascarilla (dem. des span. cascara Rinde), s. Croton linearis Jacq.

- Casearia** Jacq. (Samydeen od. Peponiferen, X. 1) „Casearie“ (n. d. holl. Missionair in Cochinch. u. auf Malabar, Joh. Casearius, schr. d. Text zu d. ersten Bänd. d. Hort. Malab.), z. B. C. esculenta Jacq., s. Iroucana guianensis, C. parviflora (Samyda p. L.) etc., s. Chaetocrater R. P.
- Casparia** Kth., DC. (Cassieen, X. 1) „Casparbaum“ (zu Bauhinia Plum.) (n. d. Bot. Caspar Bauhin, s. d. Aut.), z. B. C. pes-caprae H. B. K. (Bauh. p. c. Plum.).
- Cassāva** W. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Mandiocapfl. Seub., Maniokwurzel, „Cassavebrot“, e. cassavi od. cassada (vaterl.), s. Jatropha Manihot u. Janipha L.
- Cassebeera (-ia)** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Cassebeer's-F. (n. d. Bot. Cassebeer, s. d. Aut.), z. B. triphylla Kf. (Montevideo), pinnata Kf. (Bras.) etc., s. Pteris, Adiantum, Cheilanthes etc.
- 1) **Cassia** L. (Leguminos. Cassieen, X. 1) Cassie, Sennesblätterstr., Gewürzrinde, fr. casse (-sier) od. laurier casse (n. Olaus Celsius von d. hebr. kezioth, gr. κασσάτης Gewürzrinde), C. Senna Lam. (obovata Collad. s. obtusata Hayn.) Senna-C., C. Fistula L., fr. caneficier (Cathartocarpus Fistula Pers., Bactyrilobium Fist. W.), C. lanceolata Forsk., etc. Zier. C. marylandica L., fr. casse de Maryland, e. M. Cassia etc. 2) **Cassia** (sc. Laurus) L. (Laurineen, IX. 1) Cassienod. Kanehl-Zimmet, s. Perséa Cassia. — Cassiæae Rchb. zu Caesalpiniæae R. Br. (zu Kl. Leguminosae Endl.).
- Cassīne** L. (Sapotaceen od. Terebinthineen, VI. 3) „Cassine“, fr. cassine od. herbe de la St. Barthélémi (cassine von d. Indianern in Florida gebr. Name), z. B. C. Gongonha Mart. Paraguay-Thee, fr. matté od. thé du Paraguay, s. Ilex paraguariensis autt., C. Maurocenia L. Instrumentenholz, C. caroliniana Lam. (Prinos ambigūus Mchx., Ilex vomitoria Ait.) etc., s. Celastrus L.
- Cassinia** R. Br. (Compos. Inuleen od. Gnaphalieen, XIX. 2) „Cassinie“ (n. d. franz. Bot. Henri Cassini, s. d. Aut.), z. B. C. aurēa R. Br. (Angianthus tomentosus Wendl.), spectabilis (Calea Lab.) etc. (Neuholl.). — Cassiniacæa Schultz-Bip. i. q. Compositæ Kl. d. Korbblütler.
- 1) **Cassiöpe** D. Don (zu Andromëda L.) (Ericaceen, X. 1) Zwergholde (Cassiope, Mutt. d. Andromeda, Myth.), z. B. tetragona Don, hypnoides ds. 2) **Cassiopēa** Don (Compositen).
- Cassuvięae** DC., R. Br. i. q. Terebinthi Juss. (zu Terebinthacæae Rchb.) Sumachgew., s. sogl.
- Cassuvium** Lam. (Terebinthac. Cassuvieen od. Anacardieen, IX. 1) abendländ. Nierenbaum, „Leertraube“? (v. cassus leer — unfruchtb., uva Traube? Wst. malay. cadju!), z. B. C. pomiferum Lam. (Anacardium occidentale L.).
- 1) **Cassy(h)a** L. (-sita?) (Lauraceen od. Myristiceen, IX. 1) „Flachsseiden“- od. Schlinglorbeer, fr. cassite (v. κασσίτης flicke zusamm., wovon auch Cuscuta Flachsseite!), z. B. glabella R. Br., melantha ds. etc. (Neuholl.), C. corniculata L. (Cassuta cornēa Rumph.). 2) **Cassytha** Gray (Phytolaccaceen, X. 5), s. Cuscuta.
 - 1) **Castalia (-lis)** Salisb., DC. (Nymphaeaceen, XIII. 1) „Quellnymphe“ (n. d. schön. Nymphe Castalia, Myth. u. Quelle am Parnass). C. alba Lk. (Nymphaea alba L.). 2) **Castalis** Less. (Compos. Calendulac. XIX. 4), s. Dimorphothéca Mnch.
- Castanëa** T. (sc. Fagus) L. (Cupuliferen od. Amentac. Fageen, XXI. 8) wahre od. zahme Kastanie, s. g. Marone, fr. marron (veralt. castagnon), châtaigner, e. eatable chest-nut (sweet —, spanish —), C. vesca G. m. v. v., C. americana G. Don (vesca var. amer. Mchx.), fr. châtaigner d'Amérique, C. pumila Mill. (Fagus p. L., nana Dur.).

- fr. ch. chincapin, e. dwarf-ch.-n. (gr. *κασταρὸν* v. *Kάσταρα* Stadt in Thessalien, lat. castanēa). — Castaneaceae Lk.
- Castilleja** Mut., L. f. (bess. -jia) (Scrophularin., XIV. 2) „Castilleje“ (n. Don Castilleja, Freünd v. Mutis), z. B. grandiflōra Spr. (Euchrōma gr. Nutt.), coccinēa Mut. (Bartsia c. L.), sibirica L. f.
- Castillōa** Cerv. (Urticac. od. Euphorbiac., XI. 3) Kautschukbaum, Holquachitl d. Mexikaner (n. d. span. Bot. Castillo; n. Don Castilleja, s. eb., Wst.), C. elastica Cerv. (Siphonia el. s. Cahuchu W.).
- Casuarīna** L. (Myricaceen od. Casuarineen, XXI. 1) „Casuar“- od. Keulenbaum, Streitkolbenb., Sumpfeiche Leun., fr. filao (n. d. ind. Straussvogel Casuar — Ähnl. mit dess. Federn, blätterlose, keulenf. Äste!), z. B. equisetifolia Forst., africana Lour., paludosa, nana etc. — Casuarinēae Mirb. DC.
- Catabrōsa** P.-B. (zu Poa) Rchb. (Gräser, III. 2) Quell- od. „Futtergras“ (*καταβόωσις* Futter, v. *καταβίβοωσιν* zehre auf), z. aquatica P. B., s. Aira aq. L. (Glyceria aq. Presl s. Catabrosa Kl. Richt.).
- Catalpa** Juss. (zu Bignonia Rchb., L.) (Bignoniaceen, II. 1 od. XIV. 2) Trompetenbaum, -blume, Zier. C. syringifolia Sims m. v. nana, s. Bign. Cat. L.), fr. Bignone de Virginie, C. longissima Sims, etc. (Nam. d. Pfl. in Carolina!).
- Catananche** L. (-ance T.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Zwangkraut“, Rasselblume, Stärkekraut, fr. catanache od. cupidone (*καταράγη*) Zwangmittel, Liebestrank u. Pfl. dazu!), Zier. C. coerulea L., fr. cupidone bleue, m. v. alba Hort.
- Catappa** G., DC. (Combretac. od. Myrobalaneen, XXIII. 1) Büschelblattbündel (auf d. Molukken catappan), s. Terminalia Catappa L. (Amygdalus indica Raj.).
- Cataputia** major G. Fr. i. q. Ricinus communis (Euphorbiac. XXI. 9), davon Cataputöl u. semīna Cataputiae d. Apoth. (vaterl.).
- Cataria** T., Hall., Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Katzenkraut“, chinesischer Ysop (v. catus Kater — Wst. die Katzen wälzen sich darauf herum!), s. Hyssopus Lophanthus L. „Schopfblüte“.
- Catasētum** Rich. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Sieborche“ i. q. Catachaetum autt. (v. *κατασέω* zersiebe — durchlöch. Lippe?, Wst. *κατὰ* herab u. seta gr. *χαίνη* Borste — columna an d. Basis rankig!), z. B. tridentatum Hook., Hookeri Ldl. etc. (Südamer.).
- 1) **Catechu** (sc. Mimōsa) L. (Mimoseen, XXIII. 1) „Catechu“-Mim., fr. cachou (liefert Succes Catechu s. Terra japonica der Apotheken, W. — vaterl. Name!). 2) **Catechu** (sc. Arēca) L. (Palmen, XXI. 5—10) Catechu-P. (Ind.), s. Arēca Taufel G., Rumph.
- Catha** Forsk., Hassk. (Cada?) (Celastraceen, V. 1) Bügelholz, fr. catha (Wst. v. d. arab. kat, schwerl. v. *zádōz* Fass!), z. B. C. edulis Vahl = Celastrus ed. autt.
- Catharanthus** G. Don (Contorten od. Apocyneen, V. 1) „Reinblume“, Rosen-Sinngrün (v. *zaθαρός* rein, lauter, *ἄνθος* Bl.), Zier. C. rosēus G. Don (Vinca ros. L.) m. v. alba Hort., s. Lochnera ros. Rchb.
- Cathartocarpus** Pers. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Reinigungsfrucht“ (v. *zaθάρτης* Reiniger u. *zaθητός* Fr. — zum Abführen), C. Fistula Pers. s. Bacillus Lindl., s. Cassia Fistula L.
- Cathearthia** (st. -tia) Müll. (Papaveraceen, XIII. 1) „Cathecart's“-Keulenmohn (n. d. engl. Lord Cathcart, Gesandter etc. zu Anfang des 19. Jahrh.'s), C. villosa Müll.
- Catiang** DC. (sc. Dolichos) L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) kleine Faseln (vaterl.), s. Phaseolus minor Rumph.
- Catinga** Aubl., Juss. (Myrtaceen, XII. 1) „Catinga“-M. (bei den Garipons in Guiana heisst d. Baum iva-catinga).

- Catonia** Mnch., Cass. (zu *Crepis Rchb.*) (Composit. Cichoriac. XIX. 1) „Caton's“-Pippau (n. d. Römer Cato dem Älteren, † 140 v. Chr.), z. B. *C. crocea*, *aurea*, *alpestris* Rchb. etc. 2) **Catonia** Juss. (Personaten, XIV. 2), z. B. *Brownii* Poir. s. *marginata* St. Hil. (Str. Jamaika). 3) **Cat.** Vahl (Convolvulac. V. 1).
- Cattleya** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Cattley's“-Pracht-O. (n. d. Bar. W. Cattley, Mitgl. d. Lond. Gart. Soc. u. Lindley's Freund), z. B. *crispa*, *Grahamii*, *maxima* Ldl. (Bras.), *citrina* (Sobralia citr. La Ll.) (Mexiko) etc.
- Catürus** L. (Euphorbiac. od. Urticac. Humulineen, XXII. 3) „Katzenschwanz“, fr. cature (v. *catus* Wildkatze etc.), *οὐρὰ* Schwanz — Ansehen d. Blumenähre!), z. B. *ramiflorus* L. (Boehmeria ram. Jacq.) u. *speciosus* L. (*Acalypha hispida* Burm.).
- Caucalinæae** Koch, Haftdoldenartige, s. sogl.
- Caucalis** Hoffmg. (Umbelliferen, V. 2) Haftdolde, fr. caucalide (-lier) u. persil bâtarde (gr. *καυκαλίς* v. *κέω* krieche u. *καυκός* Stengel — mehrere Arten sehr niedr., Wst.), Zier. *C. orientalis* L. s. *pulcherinus* Koch.
- Caulerpa** Lamx. (Fadenalgen, XXIV. 3) „Kriechstengel“-Alge (*καυκός* Stengel u. *ερπω* krieche).
- 1) **Caulinia** W., Pers., DC. (Ceratophylleen, XXI. 8) „Caulinie“, Zwergnixe (-najade) (n. d. ital. Bot. Caulini, schr. Dissert., Napoli 1792), z. B. *fragilis* W., s. *Fluvialis minor* Mich. (*Najas Schrk.*, *Kernera W.*, *Ittnera Gm.* minor). 2) **Caulinia** Mnch. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Caulinias-Bohne“, s. *Kennedya rubicunda* Vent.
- Caulophyllum** W., Mchx. (Berberideen, VI. 1) „Stengel“- od. Löwenblatt D., fr. caulophylle (*καυκός* Stengel etc., *φύλλον* Laub — Blätt. in d. Stiel auslaufend, wie eins damit!), z. B. *thalictroides* Mchx. (Leontice th. L.).
- 1) **Cavanillæa** Thb., Lam. (Sapotaceen od. Leguminosen, XVII. 4) „Cavanillee“ (n. d. Prof. Cavanilles in Madr.), z. B. *C. scandens* (Moldenhauera sc., Capstr.), *philippinesis* Lam. (*Diospyros discolor* W.). 2) **Cavanillæa** Gmel. (Malvac. od. Sterculiac. XVI. 7) „Cavanilles“- od. Scharlachmalve, s. *Pentapetes phoenicea* L. (*Dombeya ph.* Cav.), s. sogl.
- Cavanillesia** Rz. Pv. (Bombaceen, XVI. 8) „Cavanillesie“ (s. eb.), z. B. *cordata* s. *umbellata* R. P., *arboræa* W., *platanifolia* H. B. K. etc. (Str. Südamer.).
- Cavendishia** Lindl. (Ericaceen, VIII. 1) „Cavendishie“ (n. d. Chemik. Henry Cavendish, Entd. d. Wasserstoff, † 1810).
- Ceanothus** L. (Rhamnaceen, V. 1) „Seckelblumenstrauch“, fr. céanothe (gr. *κεάνωθος* Scharte v. *κεντέω* steche od. *κέω* brenne, steche), z. B. Zier. *C. americanus* L. m. v. v., amer. Thee, e. New-Jerseytea od. american red-rod, z. B. v. *azuræus* Hort. s. *tardiflorus* Hornem. u. *rosæus* Hort., *C. thyrsiflorus* Eschsch., *ferræus* W. „Eisenholz“, *discolor* Vent. (Pomaderris disc. Desf., Str. Falklandsinseln) etc.
- Cebatha** Forsk. (Menispermaceen, XXII. 10) „Kebathbaum“ (v. d. arab. kebath, Pfeiffer).
- Cecidodaphne** Nees (Laurineen, VIII. 1) „Gallen“-Seidelbast (*κηρίς*, *-ιδος* Gallapfel u. Daphne, s. d.).
- Cecropia** L. (Artocarpeen, XXII. 2) Ameisenbaum, Armleuchter-, Kanonen- u. Trompetenbaum Leun., fr. coulequin (v. *κούρπω* schreie etc. — d. hohle Stamm als Blasinstrument u. s. f.), z. B. *C. concolor* W. u. *peltata* Jacq.
- 1) **Cedrela** L. (Ampelid. Cedreleen od. Hesperid. Meliaceen Rchb., V. 1) „Cedertanne“, Cuba-Cedernholz, Paternosterbaum, fr. cédrel (v. Cedrus Ceder u. *κατη* Tanne — Geruch des Holzes nach Ceder!), z. B.

C. odorata L., s. g. Cigarrenkistenholz, C. montana Bleistiftholz.
2) **Cedrela** Lour. (Myrtaceen, VIII. 1), s. Baeckea frutescens L. —
Cedrelēae R. Br. Mahagonibäume (zu Ord. Ampelidēae Bartl.).

Cedronella L., Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Citroneen“-Bienensaug, fr. cédronelle (dem. cedar span. Citrone), z. B. Zier. C. mexicana Benth., cana, triphylla Mnch. (*Dracophyllum canariense* L.).

- 1) **Cedrus** T., Barrel., Lk. (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) „Ceder“, fr. cèdre, e. cedar (n. d. Bach Kidron od. Kedron in Judäa, Paxton, v. ζέω brenne, räuchere, Wtst.), z. B. C. libanensis Juss. (Libani Barrel.) i. q. *Pinus Cedrus* L. Libanon-C. od. Cedernfichte W., C. atlantica Man. Atlas-Ceder, C. Deodara Loud. Himalaya-C.
2) **Cedrus** Mahagoni Mill. (Hesperideen, X. 1), s. *Swietenia* M. L. Mahagonibaum.

Ceiba B., Plum., St. Hil. (sc. *Bombax*) L. (Oxalid Bombaceen, XVI. 8) fünfblättr. Wollenbaum (amer. Name!), s. *Eriodendron jasminoides* DC.

Celastrēae R. Br., -inēae DC., -acēae Grck. Fleischmantelgew. (zu Ord. Tricoccae Bartl., Kl. Frangulacēae Endl.).

Celastrus L. (Theaceen Celastrineen od. Rhamnaceen, V. 1) Baumwürger, -mörder, Bügelholz, Kletterstr., fr. céléstre, e. staff-tree (zu Stöcken!) (gr. ζιλαστρον v. ζηλάς Herbst — späte Frucht), z. B. Zier. C. scandens L. (Nordamer.), fr. bourreau des arbres, e. bitter-sweet „Bittersüss“, C. cerifērus autt. „Wachs“-Kletterstr. (Südostasien), e. wax-wort, etc.

- 1) **Celosia** L. (Amarantaceen, V. 1 od. XXII. 5) Hahnenkamm, fr. célosie od. passe-velours, e. cock's-comb of the Florist v. ζηλώω brenne — wie eine Flamme anzusehen, Wtst. ζηλεός verbrannt — Blum. wie vertrocknet!), z. B. Topfbl. C. cristata L., plumosa m. v. v. Federbusch-H., fr. C. à panache cramoisi, e. feathered crimson-Celosia, C. argentea L. m. v. linearis Sweet, s. spicata Hort., C. margaritacea L., fr. Cél. perlée, u. C. japonica. 2) **Celosia** (sc. Iresine) L. (Amarantaceen, XXII. 5) Hahnenkamm-Wollast.

Celsia L. (Scrophularineen od. Verbascineen, V. 1) Bärenschwanz (n. Olaus Celsius, s. d. Aut.), C. Arcturus Vahl (*Verbascum Arct.* L. f.), betonicifolia W. (*Blattaria hispanica* Dodart), linearis (*Hemimēris coccinea*) etc.

Celtidēae (sc. Urticēae Rchb. s. Ulmaceae Endl.) Zürgelbaumartige, s. *Celtis*.

Celtis T., L. (Urticac. od. Ulmac. Celtideen, XXIII. 1) Zürgelbaum (Zirgelb.), fr. micocoulier, fabrecoulier, e. lote- od. nettle-tree u. bitter-oak „Bitterreiche“ (v. ζέλτης Peitsche — zu Peitschenstieln gebr.), z. B. Zier. C. australis L., e. european n.-tr., C. occidentalis L. (obliqua Mnch.), fr. m. de Virginie, e. north-american n.-tr. (in Amerika sugar-berry „Zuckerbeere“) m. v. v., C. aculeata Sw. (*Rhamnus iguanicus* Jacq.), laevigata Spr. (*Momisia* l. D.), etc.

Cembra Scop. (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) Zürbelkiefer, Arve od. Zutsche, fr. cembro od. cimbre, flammet, auch Eouve (Alvies) od. Auvier, e. cembran-pine m. v. pygmaea Fisch. (n. d. ital. Nam. d. Pfl. cembro od. cirmolo geb.).

Cenchrus L. (Gräser, XXIII. 1) Stachel- od. Klebgras, fr. racle (gr. ζέγχος; Hirse), z. B. tribuloides L. (*Panicastrella americ. minor* Mnch.), s. *Crypsis* Ait., *Natia* Ad. u. *Manisūris* Sw.

Cenolophium Koch (Umbelliferen, V. 2) Hohlrippe, -„kamm“ (v. ζενός hohl, λόγιον Schopf etc. — aufgeblas. hohle Jöche), z. B. C. Fischeri Koch (Russl. Lappi.).

Centaurēa L. (Composit. Centaureen, XIX. 3) Flockenblume, Tremse O. W., fr. centaurée, e. centaury, bull-weed, globe-flower od. knap-

weed (v. *Kένταυρος* d. Centaur), Zier. C. americana Nutt., suaveolens Hort., Cineraria L., candidissima Lam., macrocephala W., gymnocarpa Moris., orientale L., moschata L., fr. fleur de Grand-Seigneur „Sultansbl.“ od. bluet du Lévant, e. musk-centaury, m. v. fl. alb. Hort.; wild u. Gart. C. Cyanus L. blaue Kornbl. od. „Cyane“ u. montana L. (Pflaumengeruch!). — Centaureeae Rchb.

Centaurella Mchx. (Gentianen, V. 1) „Kleincentaureie“ (dem. Centaurium, s. hern.), z. B. i. q. Gentiana L. s. Erythraea Pers. Centaurium L. Tausendguldenkr. (Chironia Cent. Curt. s. Gerardi Schmidt). C. (Andrewsia) verna u. autumnalis Spr., „Andrews' Frühlings- u. Herbst-Enzian“.

Centaureum (sc. Centaurēa L. s. Jacēa Pers.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Scharten-Flockenblume (habitus Serratulae Pers.).

Centaureidium Torr.-Gr., Endl. (Compos. Inuleen, XIX. 3) „Schartenflockenblumgleiche“ (s. eb. Centaurēum u. εἰδομαι gleiche), z. B. C. Drummondi T.-Gr., s. Centaurium Ad.

1) **Centaurium** Rich. (sc. Erythraea Pers. s. Gentiana L.) (Gentianen, V. 1) Tausendguldenkraut, fr. chancelague, e. centaury (v. centum = 100 u. aurum Gold — hund. Goldstücke, Wst.), s. Chironia L., Centaurella Mchx. u. Exacum L. 2) **Centaurium** Ad., Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) i. q. Centaurēa Centaurēum L., fr. centaurée, épine jaune „Golddistel“.

Centifolia (sc. Rosa) L. (Rosaceen, XII. 5) „Hundertblattrose“ od. „Centifolie“, Garten-(Bauern-)Rose m. v. museosa Mill. „Moosrose“ (v. centum = 100 u. folium Blatt).

Centinodia Bauh. u. **Centinodium** Rchb. (zu Polygōnum L.) (Polygōnaceen, VIII. 3) „Hundertknoten“, Wegtritt-Knöterich, z. B. aviculare L., „Vogelknöterich“ (centum u. nodus Knoten — der Stengel-gelenke!).

Centradenia G. Don (Lythrarieen od. Melastomaceen, VIII. 1) „Stachel-drüse“ (ζέντρον Stachel, ἀδιψ, -έρος Drüse — d. Connektiv d. kleineren Antheren läuft in eine Drüse aus, das d. grös. in einen Sporn), z. B. Warmh. C. floribunda Planch. (Centralamer.), grandifolia u. rosea Ldl. (Mex.), divaricata G. Don, etc.

1) **Centranthēra** Scheidw. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Antheren-sporn“-O. (s. eb., ανθηρὰ Staubbeutel), s. Acianthēra. 2) **Cetranthēra** R. Br. (Personaten, XIV. 2), z. B. hispida R. Br. (Neuholl.).

Centranthus DC. (Valerianeen, III. 1) „Spornblume“, -Baldrian, fr. centranthe (s. v. u. ἄνθος — lange spitze Nektarien!), Zier. C. ruber DC. m. v. fl. albo (Valeriana rubra L., fr. Valériane rouge).

Centrocarpha D. Don (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Stachelspreu“ (s. v. u. ζάογη Spreu etc.), s. Rudbeckia.

Centrochilus Schauer (Orchideen, XX. 1) „Stachellippe“ (s. v., χειλος Lippe — Labell m. ein. lang. keuligen Sporn), z. B. gracilis Schau.

Centroclinium D. Don, Endl. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Stachelboden“ (s. v., κλίνη Lager, Bett — nämli. Blumenboden m. stachl. Fransen), z. B. altissimum Pöpp., Endl., reflexum Hook, etc., s. Hippoposēris Cass. u. Onosēris Less.

Centrolēpis Lab. (Commelyneen od. Restiaceen, I. 1) „Stachelschuppe“ (s. v., λεπίς Schuppe — d. mittl. Schuppe stachlig! Wst.), z. B. fascicularis Lab. (Van Diemensl.), pulvinata R. Sch. (Desvauxia p. R. Br.).

Centrophylleum Neck. (Kentroph.-) DC. (Compos. Cynareen, XIX. 1) „Stachelblatt“ (s. v., φύλλον Laubblatt), z. B. lanatum DC. Woll-saflor, s. Carthamus lan. L.

Centropogon Benth., Presl (Lobeliac., XIX. 6) „Spornbart“ (s. v., πώγων Bart — d. beid. unt. Antheren in ein. Stachelbart ausl., Wst.),

- z. B. Stuben C. speciosus* Planch., *surinamensis* Presl, *tovarensis*, etc.,
s. Siphocampylōs „Krummröhre“, *u. Sphaeroarpa „Kugelfrucht“*.
Centrosia Rich. (-sis P.-Th., Sw.) (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Stachel“-
O. (s. v., ὥστε Stoss — Labell gespornt, Wtst.), *z. B. sylvatica* P. Th.
(Calanthe s. Lindl.), *s. Alismorchis centrōsis* A. Rich.
Centrosolenia Van Houtt. (?) „Stachelfutteral“, „-scheide“ (s. v., σωλὴν
Rinne, Scheide etc.), *z. B. bractea* u. *picta*.
Centunculus Dill. L. (*Lysimachieen*, IV. 1) Kleinling (*centunculus* dem.
v. cento, -onis Lumpen), *z. B. minimus* L.
Cepa T. (sc. *Allium*) L. (*Liliac. Asphodeleen*, VI. 1) gem. od. Sommer-
Zwiebel, fr. *centenille*, *ciboule* u. *oignon*, e. *cibol* (*ciboul*) u. *onion*
(lat. cepa Zwiebel od. Bolle, v. d. celt. cep Kopf, gr. κεφαλή od. v.
κῆπος Garten? Wtst.).
Cepaea (sc. *Sedum*) L. (*Crassulac. Sedeen*, X. 5) rispige Fethenne (v.
κηπαῖος im Garten gezogen), *s. Sedum spatulatum* W. portulakblättr.
Feth. M. Rchb.
Cephaelidēae DC. Kopfbeerartige, s. sogl.
Cephaēlis Sw. (*Rubiac. Cinchonaceen*, V. 1) „Kopfbeere“, Brechwurz
(v. κεφαλή K. u. εἴλεω wickle ein — Blütenst. !), *z. B. C. Ipecacu-
anha Tuss., eigentl. *Ipecacuanha* M.-Rchb., *s. Callicocca* Ip. Broter.
„Schönbeere“, *alba* W. (*Tapogomea alba* Aubl.), *glabra* W. (*Tapog.*
gl. Aubl.), etc.
Cephalandra Eckl., Zeyh. (*Cucurbitac.*, XXI. 10) „Kopfanthere“ (*κεφαλή*
u. ἀνήρ, -δρός Mann, Staubbeutel), *z. B. Zier. C. grandis* Kurz (*Bry-
onia gr. L.), Balkon *C. quinqueloba* Schrad. „Balkonepheu“, etc.
Cephalanthēae DC. „Kopfblumenartige“, s. *Cephalanthus*.
Cephalanthēra Rich. (*Orchid. Arethuseen*, XX. 1) „Kopfkölbchen“,
ständel, *Orant* O. W. (s. v., ἀνθρώπα Staubbeutel — dieser gestielt,
gipfelständig!), *z. B. grandiflora* Babingt., *Xiphiphyllum* Rchb. f. s.
ensifolia Rich., *rubra* Rich., etc., *s. Serapias* u. *Epipactis*.
1) **Cephalanthus** L. (*Rubiac. Caprifoliac. od. Dipsaceen*, IV. 1) „Kopf-
blume“, Knopfbaum, fr. *cephalanthe*, e. button-wood (s. v. u. ἄνθος
Blume — in ein. Kopf vereinigt!), *z. B. Zier. occidentalis* L. amerik.
Kopfblumenstr., *C. chinensis* Lam. (*Nauclea purpurea* Roxb.), *C.*
orientalis Lour. (*Acrodryon* or. Spr.). 2) **C. procumbens** Lour. (*Planta-
gineen, IV. 1 od. XXIII. 2), *s. Stilbe* pr. 3) **Cephalanthus** Cham.
Schldl. (*Scrophularin. od. Loganiac.* IV. 1), *z. B. Sarandi*, *s. Budd-
lea glabra.
Cephalaria Gren., Schrad., DC. (*Dipsaceen*, IV. 1) „Kopfblume“, Stern-
kopf, Grindrose u. Karde, *s. Dipsacus* L., *Scabiosa* L., *Succisa* M. K.
u. Asteroccephalus Wallr. (s. v.), *z. B. pilosa* Gren., *s. Dipsacus pi-
losus L.
Cephalotaxus Sieb., Zucc. (*Cupressineen*, XXI. 9) „Kugeleibe“, -taxus
(s. v. u. Taxus — bez. d. Blüten!), *z. B. drupacea* s. *Fortunei* Hook.
Cephalotūs R. Br., Lab. (*Crassulac. od. Corniculat. Sedeen*, XI. 5) Drüsens-
köpfchen, Kopfanthere (*κεφαλῶτος* mit ein. Kopf versehen = Kelch
inwend. m. kopftrag. Haaren bes., Wtst.), *z. B. Zier. C. follicularis*
Lab. (*Schlauchpfl. Neuhol.*).
1) **Ceramium** Lyngb., Rochel (-on Ad.) (*Tange*, XXIX. 3) „Horn“- od.
Knotentang W. (v. κέρας Horn? Leun. od. κεράμιον Thongefäß?),
z. B. hirsutum Roth, *s. Callithamnion coccineum* Lyngb. (*Polysiphonia*
cocc. Spr.). 2) **Ceramium** Blum. (*Aristolochieen*, XX. 5). 3) **Ceramium**
Reinw. (*Polypodiac. Farne*, XXIV. 1), *s. Togularia*.
Cerasēae (sc. *Amygdalacēae*) Rchb. Kirschbäume.
Cerasifēra (sc. *Prunus*) L. (*Amygdalac.*, XII. 1) „Kirschpflaume“, amerik.
Kirsche, fr. *cerisette* (*cerasus* u. *féro* trage).
Cerastium L. (*Alsinaceen*, X. 4) „Hornkraut“, fr. *céraiste*, e. *horn-******

weed (*ζέρας* Horn — Form d. vorrag. Kapsel!), z. B. Zier. C. *grandiflorum* W. Kit. s. *argenteum* M. B. (*incanum* Hoffm.), fr. Argentine, tomentosum L., fr. oreille de souris, etc.

- 1) *Cerasus* (sc. *Prunus*) L. (Amygdalac., XII. 1) Sauerkirschbaum, fr. cérisier, e. cherry-tree, s. *Cerasus acida* Fl. Wett. (*Prunus austera* Ehrh.), fr. bigarreau, rote od. weisse (span.) Herzkirsche (gr. *κερασόδης* u. *κερασία*, fr. cerise Kirsche — v. Cerasunt in Kleinasien am Schwarzen Meer). 2) *Cerasus* (sect. v. *Prunus*) Rchb. überh. Kirschbaum, auch Süsskirsche, C. *dulcis* Fl. Wett., fr. guigne (-nier).

Ceratiosicýos Nees, Eckl. u. Zeyh. (Passifloren, XX. 4) „Hörnchen-Stichling“ (*κεράτιον* dem. v. *ζέρας* Horn, u. Sicyos — schotenf. Kapsel).

- 1) *Ceratocephalus* Mnch. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Hornköpfchen“, Sichelsamen Leun. (*ζέρας*, -*ατος* Horn, *κεφαλή* Kopf — Form d. Früchtchen!), z. B. *falcatus* Pers. (*Ranunculus f. L.*) u. *orthoceras* DC. (Ran. falc. M. B.). 2) C. Rich. *delphinifolius* Ehret. (Compos. *Heliantheen*, XIX. 3), s. *Coreopsis verticillata* L. (*Bidens pilosa* L.).

Ceratochilus Lindl., Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Hornlippe“ (s. v., *χειλός* Lippe — diese beiderseits gehörnt, Wtst.), z. B. *grandiflorus* Lodd., s. *Stanhopea* gr.

Ceratochloa DC. (Gräser, III. 2) „Horngras“, -samengras (s. v., *χλόα* Gras — d. unt. Spelze gegrannzt, Wtst.), z. B. C. *unioloides* DC. (*Uniola stricta* Torr.) etc., s. *Festuca*.

Ceratodon Brid. (Moose, XXIV. 2) „Hornzahn“-M. (s. v., *δόδων* Zahn — Zähne zweihörnig!), z. B. *purpureus* Brid., s. *Dicranum* s. *Trichostomum* purp. Hedw.

Ceratolobus Mart. (Palmen) „Hornhülsen“-P. (s. v., *λοβός* Hülse etc.), z. B. C. *glaucescens* Mart.

- 1) *Ceratonia* L., W. (Cassieen Ceratonieen, XXIII. 3) Johannisbrotbaum, C. *Siliqua* W., fr. pain de St. Jean od. caroube (-rouge, -rouche), -roubier, e. carob, St. John's-bread (— lief. *Siliqua dulcis* d. Apoth.) (v. *ζέρας*, -*ατος* Horn — Form d. Hülse!). 2) *Ceratonia* (sc. *Mimosa*) L. (Mimoseen, XXIII. 1) Johannisbrot-Mimose.

Ceratophyllaceae Gray, -llae DC. Igellockgew., *Ceratophyllinae* Bisch. Ord. d. Hornblattgew., s. sogl.

Ceratophyllum L. (Urticaceen od. Ceratophylleen, XXI. 5) „Horn“-od. „Hörnerblatt“, Igellock, Zinken O. W. Wasserzinke, Hirschhorn-Nessel, fr. cératophylle od. cornifle, auch mille-feuille cornue-d'eau (s. v., *κυλλον* Blatt — diese knollige Locken m. Widerhaken!).

Ceratozamia Miq. (Cykadeen, XXII. 12) „Horn“-Zapfenpalme (s. v. u. Zamia), z. B. *terrestris* u. *mexicana* Miq.

Cerbëa L. (Apocynaceen, V. 1) „Gift-Hundswürger“, Schellenbaum (n. d. giftig beissend. Höllen Hund Cerberus d. Myth.), z. B. C. *Manghas* L. (*Arbor lactaria* Rumph. Ostind.) Milchbaum, fr. manglier à fruit vénimeux, s. *Ochrosia Manghas* Burm., C. *chinensis* Spr., s. *Dissolena verticillata* Lour.

Cereis L. (Cassieen, X. 1) Stammhülsenbaum (v. *κεράς* Pflock, Spule — Frucht wie ein Weberschiff od. eine Messerscheide, Wtst.), z. B. Zier. C. *Siliquastrum* L. europ. Judasbaum, fr. gainier, e. Judas-tree, C. *canadensis* L. u. *japonica* v. Sieb. (*chinensis* Bunge), C. *canadensis* L., fr. bouton-rouge, Salatbaum v. Canada.

Cerealia Agric. Saatfrüchte od. „Cerealien“ (cerealis die Ceres, Göttin d. Ackerbaus, betr.).

Cerefolium (sc. *Scandix*) L. (Umbelliferen, V. 2) Gartenkerbel, fr. cerfeuil, e. chervil (Cerefolium Plin., gr. *χαιρέψυλλον*, fr. cerfeuil, deutsch „Kerbel“).

Ceresia Pers. (Gräser, III. 2) „Ceresgras“ (n. d. Göttin Ceres ben.), z. B. Zier. *C. elegans* Pers. u. *fluitans* Elliott (Peru), s. *Paspalum membranaceum* Lam. u. repens.

Cerēus Haw., Mill., DC. (sect. v. *Cactus* Rchb.) (Cacteen, XII. 1) Säulen- u. Schlangencaactus Leun. (gr. κερεύων lat. cerēus Wachs-fackel, daher *Cactus* = Fackeldistel!), z. B. Stuben *C. speciosissimus* Desf. Pracht-blumen-Cactus, phyllanthoides (*Cactus* s. *Phyllanthus alatus*) Flügel-C., *C. grandiflorus* s. g. Königin der Nacht, *C. Ackermannii*, senilis „Greisenhaupt“, flagelliformis Schlangen- od. Peitschen-C. u. a. m. **Cerinthe** T. (Boragineen, V. 1) „Wachsblume“, Wabel O. W., fr. cérinthe (méliinet) (v. κηρος lat. cera Wachs u. κέρα Bl. od. κήριον-θος Bienenbrot — d. Bienen besuchen d. wachsgelben Bl. gern, Wtst.).

Ceropégia L. (Asclepiadeen, V. 1) „Quell-Wachspflanze“, fr. céropége (κηρος Wachs, πηγή Quelle — sondert Wachs ab — wie ein m. Wachskeimen besetzt. Leuchter, abhängende, aufgebog. Zweige Wtst.). z. B. Warmh. *C. Gardneri*, elégans u. *stapeliaiformis* Haw., *C. Candelabrum* L. „Leuchterbaum“.

Ceroxylon Hb. Bpl. (Palmen, XXI. 5–10) „Wachspalme“, fr. céréoxyle, e. wax-palm-tree (s. v., ξύλον Holz — lief. Wachs!), *C. andicola* ds.

Cerris (sc. *Quercus*) L. (Cupuliferen, XXI. 8) burgundische od. „Zerr-eiche“, fr. chêne *Cerris* od. de Bourgogne, e. bitter od. mossy-cupped Oak m. v. v., z. B. v. austriaca Loud. Borkh. östr. Zerreiche (*Q. austriaca* W.) — lief. s. g. franz. od. istrische Galläpfel (v. *cerrus* od. -is eine Art Eiche, viell. v. *cirrus* Franse, weg. des fransigen Becherchens!).

Cervaria G., Lap. (sc. Peucedānum) L. (Umbelliferen, V. 2) „Hirsch-wurz“ (v. *cervus* Hirsch), e. hart's-horn (-root), s. Athamanta *Cervaria* L., *C. nigra* Fl. Wett. (*C. rigidula* Mnch., *C. alsatica* Gaud. (Peucedānum als. L.).

Cervicaria (sc. *Campanula*) L. (Campanulaceen, V. 1) „Halskraut“-Glockenbl., fr. cervicaire (v. *cervix*, -īcis Nacken — analog Trachē-lum, s. d.).

Cervispīna Dill., DC. (Rhamnaceen, V. 1) „Hirschdorn“, gem. Weg- od. Purgierdorn Vilm., fr. nerprun purgatif od. commun, e. purging-buckthorn, yellow-berry „Gelbbeere“ (*cervus* Hirsch u. *spina* Dorn).

Cestracēae DC. (zu Solanēae Rchb.), s. *Cestrum*.

1) **Cestrum** L. (Solaneen od. Cestraceen, V. 1) „Hammerstrauch“, fr. cestrau (galant de jour, - de nuit) (v. κέστρων Hammer — d. Staub-fäd. mit Zahn, nicht Paxton: κέστρον Grabstichel u. Betonike), z. B. *C. vespertinum* Hort. Valenc. (Cantua foetida, Vestia lycioides W.), *C. petiolare* Kth. (Sessēa petiolaris R. P.), *C. venenatum* W. Bohon-Upasbaum Thb. (Cap.). 2) **Cestrum** *spermacocifolium* W. (Rubiac., IV. 1), s. *Bouvardia triflora* Hb. Bpl.

Ceterach Bauh., W. (Polypodiac. Farne, XXIV. 1) Milz-, Schuppen- od. „Zechtfarn“ O. W., Ceterach, fr. cétérac, doradille od. herbe daurade, e. cerach (ceterach) altdeutsch Zecht (arab. cheterak), Zier. *C. officinarum* W. (*Asplenium Ceterach* L.), *C. capense* Kze., etc.

Cetraria Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Tartschen“- od. Moosflechte, fr. cétraire, e. oyster-green (v. *cetra* kurzer Lederschild, s. g. Tartsche), z. B. *C. islandica* Ach. „isländisches Moos“, e. Iceland-moss.

1) **Chaenostōma** Benth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Gaff“- od. „Klaff-mund“, Weitmund Rmpl. (v. χαίνω gähne, klaffe, στόμα Mund — weiter Schlund!), z. B. Gewächsh. *polyanthum* Benth., *fastigiatum* Benth. m. v. *album* Hort. 2) **Chaenostōma** Mart., Rchb. (fehlerh. -stemma) (*Melastomac.* od. *Merianeen*, X. 1).

- Chærophylleum** Hoffmg., L. (Umbelliferen, V. 2) Kälberkropf, -kern, Körfel O. W., eig. „Lustblatt“, fr. cerfeuil (v. $\chiαι\omega$ freue mich, $\varphiυλλον$ Laub — schöne Fiederform! od. d. deutsche „Kerbel“, lat. cerefolium, gräcisiert!), z. B. C. sylvestre L. (Anthriscus s. Hoffm.), fr. cerfeuil sauvage od. persil d'âne „Esels-Petersilje“.
- 1) **Chaetospöra** Ag. (Nostochineen od. Gallertalgen, XXIV. 3) „Borsten-spore“ ($\chiαιτη$ los. Haar, Borste, $\sigmaπορα$ Samen, „Spore“). 2) **Chaetospöra** Hb., R. Br., Rchb. (Cyperaceen, III. 1) Samenhaar-Cypergras (— an d. Basis des Fruchtknotens Borsten! Wtst.), s. Rhynchosporä Vahl s. Schoenus ferruginéus L.
 - 1) **Chaeturus** Lk. (Gräser, III. 2) „Borstenschwanz“, Katzenschw. (s. eb. u. $\sigmaπορα$ Schwanz — unt. Spelze begrannt!), z. B. fasciculatus Lk., s. Polypōgon fasc. Pers. 2) **Chaeturus** Ehrh. (Labiaten, XIV. 1) Katzenschweif, s. Leonurus Marrubiastrum L.
- Chamaebuxus** DC. (sc. Polygala) L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Zwergbux“ ($\chiαιμαι$ an der Erde, niedrig u. Buxus), z. B. C. Karenium Kurz.
- 1) **Chamaecerasus** Pers. (sc. Prunus L., sc. Cerásus Lois.) (Amygdalaceen, XII. 1) „Zwergkirsche“, sibirische Strauchkirsche, Erdweichsel, s. g. Ostheimer Weichselkirsche, fr. faux cérisier, e. ground-cherry-tree od. Siberian cherry (s. v.), s. Cham. alpigéna Delarb. 2) **Chamaec.** T., Med. (Lonicereen, V. 1) Heckenkirsche, z. B. C. Xylostēum Med. u. tatarica Med., s. Lonicera Xylostēum u. tatarica L.
 - 1) **Chamaecistus** Mill. (sc. Helianthēnum) (Cistaceen, XIII. 1) „Erd-ciststrauch od. gem. Sonnenröschen, s. Cistus Helianthēnum L. (Hel. vulgare G.). 2) **Chamaecistus** (sc. Rhodothamnus) Rchb. (Ericaceen, VIII. 1) drüsiger od. Zwerg-Alpenröschen, s. Rhododendron. 3) **Chamaec.** Sloane (Turneraceen, V. 3), s. Turnera cistoides L., Chamaec. Petiv., s. Turnera pumilea L. 4) **Chamaec.** Barrel., s. Cistus thymifolius L. (s. v. u. Cistus).
- Chamaecyparis** Spach (zu Cupressus) (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Zwergcypresse“, s. g. weisse Ceder ($\chiαιμαι$ niedrig, $\chiυπάρισσος$ Cypresse), z. B. Zier. C. sphaeroīdēa Spach m. v. v., s. Cupressus thujoides L. (Thuja sphaeroīdalis Rich.), C. nutkaensis Sp. (Cupr. americana Trautv. s. Thujopsis borealis Fisch.), fr. cuprēs d'Amérique.
- Chamaecyparissias** DC. od. **Chamaecyparissus** (sc. Santolina) L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) gem. Heiligenpflanze, eig. „Zwergcypresse“ (s. v. — der Blätt. wegen, wie eine kl. Cypresse!), s. Santolina vires Mill.
- 1) **Chamaedaphne** Mitch. (Rubiaceen, Cinchonaceen, IV. 1) „Zwerg-Seidelbast“ (s. v. u. Daphne), z. B. C. repens L. (Syringa baccifera Pluk.), s. Mitchella L. 2) **Chamaedaphne** Mnch., Catesb. (Ericaceen, X. 1). Ch. sempervirens Catesb., s. Kalmia angustifolia L., Ch. calyculata Mnch., s. Andromēda cal. L.
- Chamaedorēa** W. (Palmen) „Zwergpalme“ (s. v. u. $\deltaορυ$ Baum, Lanze — kleine P. m. rohrart. Stamm, Wtst.), z. B. Ch. Ahrembergiana Berg-P., elatior Mart., elégans etc.
- Chamaedryon** Ser. (zu Spiraea) (Rosac. Spiraeac. XII. 4) Zwerp-Eich-Spiräen od. gamanderblättr. Rmpl. ($\chiαιμαι$ niedrig, $\deltaοις$, $-υος$ Eiche — m. Blätt. ähnl. denen d. Eiche!), z. B. Sp. chamaedryfolia Jacq. (ulmifol. Scop.), chamaedryfolia L., hypericifolia L. etc.
- 1) **Chamaedrys** T. (sc. Teucrium) L. (Labiaten, XIV. 1) gem. Gamander (— Chamaedrys germanisiert!), Schafkraut, fr. chamédrys od. chênette (s. v. — weg. der Eichenblattform!). 2) **Ch.** (sc. Veronica) L. (Scrophularineen, II. 1) Gamander-Ehrenpreis („Vergissmeinnicht“), fr. germandrée, e. germander.
- Chamae-Iris** (sc. Iris) Bertol. (Irideen, III. 1) falsche od. Erd-Schwertlilie, fr. Iris faux-Iris, e. false I.

- Chamaelaucium** Desf., DC. (Myrtaceen, X. 1) „Zwergpappel“, fr. chameleuce od. pas d’âne (s. v. u. λεύκη Weisspappel), z. B. ciliatum u. plumosum Desf. (Str. Neuholl.). — Chamaelauciæae Rehb.
- 1) **Chamaelæa** (sc. *Tragia*) L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 3) Schiller-Bocks-blatt, span. Zeiland (χαμαιλέος od. χαμαιλέων schillerblättr. Pfl., Riemer od. Chamäleon Zool. od. χαμαι u. ἐλαία Ölbaum, „kleiner Ölbaum“), z. B. C. tricocca G., s. Cneōrum tricoccon L. 2) **Chamaelæa** T., Burm. (Rhannaceen, V. 1) „Chamäleon“-Heidenmyrte, C. pilosa = Phylīca stipularis L. 3) **Ch.** africana Herm. (Thymeläaceen, VIII. 1), s. Grubbia rosmarinifolia Berg., C. indica = Daphne pilosa s. villosa L.
- Chamaemespilus** Med., DC. (sect. v. *Sorbus*) Ser. (Pomaceen Sorbeen, XII. 4) „Zwergmispel“, Strauch-Mehlbeere Rmpl., s. Mespilus Chamaemespilus L. (*Sorbus* Ch. Crantz).
- Chamaemorus** (sc. *Rubus*) L. (Rosaceen, XII. 5) Sumpf-Himbeere M. Rchb., „Zwergmaulbeere“, s. g. Moltebeere (Multe-), e. cloude-berry (s. v. u. Mörus, gr. μόρον od. μώρον Maulbeere).
- Chamaenerion** T., Schreb. (-ium T., Scop.) (zu *Epilobium*) Rchb. (Onagraceen, VIII. 1) Weidenröschen, „Zwergoleander“ (s. v. u. *Nerium*, gr. νίφον Oleander), z. B. C. hirsutum Scop. u. montanum, s. Epilob. hirs. u. mont. L.
- 1) **Chamaepenue** (sc. *Serratula* s. *Staelinæa*) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Erd“- od. „Zwergfichte“ (gr. χαμαιτείκη i. q. -λεύκη Huflattich, lat. *Tussilago* F. W. Riemer — Blätt. nadelförm. etc., Wtst.). 2) **Ch.** Prosp. Alp. (Compos. Carduac., XIX. 1) Topfbl., C. diacantha DC., fr. Cham. à deux épines, e. double-prickled Ch., s. Cardüus diac. Lab.
 - 1) **Chamaepitys** T. (sc. *Ajuga*) Schreb. (Labiaten, XIV. 1) „Erd“- od. „Zwergfichte“, gelber Gümsel, fr. chamépitys od. Iwe musquée u. ivette, e. ground pine (s. v. u. πίτυς Fichte), s. Teucrium Chamaepitys L. 2) **Ch.** incana autt. (Convolvulac., V. 1) Harzkraut, s. *Cressa cretica* L.
- Chamaepillum** Wallr. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) (zu *Erysimum* L.) „Erdfüll“-Hederich (s. v. u. ἄλειον voll).
- Chamaeranthemum** Reg. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zwerg-Menderle“ (χαμαι u. Eranthēnum), C. igneum Reg. = *Eranthēnum igneum* Hort.
- Chamaerops** L. (Palmen, VI. 1) „Zwergpalme“ (s. v. u. ἄρωψ, -όρως Strauch), z. B. Gewächsh. humilis L. mittelmeer., C. chinensis s. excelsa Thb. s. Fortunei Hort., s. g. Hanfpalme.
- Chamagrostis** Borkh. (Gräser, III. 2) „Zwerggras“ (s. v. u. ἄγρωστις), C. minima Bkh., s. *Mibora* v. P.-B. (Sturmia m. Hoppe, Knappia agrostidēa Sm.).
- Chamlagu** (sc. *Robinia* l’Hér. s. *Caragana* Lam.) (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) mongol. Erbsenbaum (mongol. Name!).
- Chamomilla** Gay, DC. (sc. *Matricaria*) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) echte „Kamille“ od. gem. Mutterkraut, fr. camomille, e. camomile u. stitch-wort (gr. χαμαίλιχον i. q. ἀρθεμις eig. „Erdapfel“ v. μῆλον — riecht wie Quitten, Wtst.).
- Chamorchis** Rich. (Orchideen Ophrydeen, XX. 1) Zwergstendel Seub. (χαμαι an der Erde u. Orchis), C. alpina Rich., s. *Ophrys* alp. L. u. Chamaeropēs Spr.
- Chara** L., Ag. (Characeen, XXI. 1) Armleuchter, fr. charagne (-aigne) od. charapot, girandole u. lustre d’eau, e. chandelier (gr. χαρά Freude — nämli. am Wasser, Wtst.). — Characēae Rich. Ord. der Armleuchter (Siphonocaulae Bisch. „Röhrenstengler“).
- Charianthus** Don (-tha A. Braun) (Melastomaceen Miconieen, X. 1) „Reiz“- od. „Graziensblume“ (χαρίεις, -εσσα reizend etc., ἀρθρος od. ἀρθη Bl. — schön hochrot!), z. B. coccineus Don, s. Chaenanthera Rich.

Charieis Blum. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Hölde“, Schmuck- od. Reizaster (s. eb. — schön blau!), z. B. heterophylla Cass., s. Kaulfussia amelloides Nees.

Charissa Becc. (Oiacineen, III. 1) „Holdselige“ ($\chiαρίεις$, -εσσα, -ίεν hold etc.), z. B. Smithii Becc., s. Villaresia Smithii F. Müll.

Charlwoodia Sweet (Liliaceen, VI. 1) „Charlwood's“-Dracaene (n. G. Charlwood od. Charleswood, enthusiasmus, engl. Bot.), z. B. Topf C. rubra (Dracaena r. Hort.), C. (Drac.) congesta Sägezahn. Dr.

Chate (sc. Cucumis) L. (Cucurbitac. XXI. 10) ägyptische Melone Vilm., e. egyptian cucumber (chate, Wtst. d. ägypt. Name, v. $\chiάτος$ od. -τις Mangel?).

Chayota Jacq. (Cucurbitac., XXI. 10) essbare Chayote, C. edulis Jacq. (Name d. Pfl. in Westind., Wtst.), s. Secchium P. Br.

Cheilanthes Sw. (Farne, XXIV. 1) „Lippenschleierchen“, Schuppenfarn ($\chiειλός$) Lippe od. Rand, $\alpha\tau\varthetaη$ Blüte — blühen am Rande, Wtst.), z. B. C. odora Sw., microphylla Sw. etc., s. Notochlaena u. Polypodium.

1) **Cheiranthes** L. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) Lack, Levkoje, Veil Vilm. (arab. kheyry, nicht v. $\chiέιο$ Hand, $\alpha\tau\varthetaος$ Bl., Wtst. die man gern in d. Hand hält), Zier. C. Cheiri L. (kheyry) Goldlack, gelbe Viole od. Veil, fr. cheiranthus garranier, e. yellow-stock, C. incanus L. (Matthiöla inc. R. Br.) m. v. v., z. B. v. cocardeau, Winter-Levkoje, C. annuus L. (Matth. ann. R. Br.) m. v. v., z. B. Erfurter, Sommer-Levkoje. 2) **Cheiranthes** (sc. Brassica Vill. s. Sinapis Koch) (Crucifer. Siliq.) Levkoy-Kohl od. -Senf, lackblüt. Senf Grck. 3) **Ch.** (sc. Erysimum) Pers. (Crucif. Siliq.), s. Erysimum cheiranthoides L. lackart. Schötendotter Grck. 4) **Ch.** (sc. Manulea) L. (Scrophularineen od. Lobeliac. XIV. 2) Lack- od. Levkoy-Handblume, s. Lobelia Ch. L. (Manulea lat. für Cheiranthes „Handbl.“ — fünffing. Blatt!).

Cheiropis Dorst. (sc. Cheiranthes) L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2), s. eb. Goldlack, Gelbveil Vilm., fr. violier jaune od. à fleurs j., girofle des murailles, auch rameau d'or, Jalouse, Muret etc., e. gilliflower, kelri, common wall-flower, s. Cheiranthes fruticosus L., C. Delileanus Hort. Par., fr. girofée de Delile (arab. kheyry, nicht $\chiέιο$, -ος; Hand!).

Cheiropsis DC. (Ranunculaceen Clematideen, XIII. 7) Hand-Waldrebe v. $\chiέιο$, -ος Hand u. ψυις Aussehen — weg. einer d. Blume wie eine Hand einschliess. Hülle, Wtst.), z. B. montana Ham. (anemonaeflora Don) Himalaya-W., s. Clematis mont. s. anem.

1) **Chelidonium** T. (Papaveraceen, XIII. 1) „Schwalbenwurz“, Schell- od. Schöllkraut, fr. chélidoine, e. celandine (-lendine) u. swallow-wort, tetter - wort u. silken - cully „Seidenpinsel“ (v. $\chiελιδών$ Schwalbe — Plin. blüht bei deren Rückkehr!), z. B. diphyllum Mchx., s. Stylophorum d. Nutt., C. Glaucium L. Hornmohn, e. horned-poppy, s. Glaucium luteum Scop., C. corniculatum L. (Glaucium corn. Pers.). — Chelidoniaceae (sc. Papaveraceae) Rchb. 2) **Chelidonia** Koch (zu Cardamine L.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2), z. B. Decor.-Blattpfl. Ch. grandiflora argentea Koch, s. Cardamine chelidonia Pers.

Chelone L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Schildblume“ od. „Krotten-schild“, fr. galane u. tortue (gr. $\chiελώνη$ Schildkröte — weg. d. Oberlippe!), z. B. Zier. C. barbata Cav. v. coccinea, C. glabra L. m. v. v., C. obliqua L. (alba Mch. purpurea Mill.), C. Pentstemon L. s. Pentstemon Ait., s. Pentstemon l'Hér.

Chenopodiæ Endl. Ord. d. Gänsefussgew. (zu Kl. Oleracæe Endl. Gemüsegew.), s. hern.

Chenopodiaceæ Vent., -diæae DC. Gänsefussartige (i. q. Atriplicæae autt. Meldenartige), s. hern.

Chenopodiina Moq.-Tand. (Chenopodiaceae, V. 2) „Gänsefüsschen“ Grck., z. B. *maritima* Moq. = *Chenopodium m.* L.

Chenopodium T. (Chenopodiaceen od. Atripliceeen, V. 2) „Gänsefuss“, fr. pate (patte) d'oeie, herbe aux vers, e. goose-foot od. belvidere (v. γῆν, -νος Gans, ποδίον Socke etc. v. πούς. ὄδος Fuss), Gart. C. hortense R. Cch. (Suaeda hort. Forsk.) „Gartenmelde“, Zier. C. scotarium L., s. g. Studentenkraut u. atriplicis L. Purpur-G., C. ambrosioides L., fr. thé de santé (- du Mexique) od. ambrosine, e. hedge-mustard.

Cherlera (-ia) L. (Arenarieen od. Alsineen, X. 3) „Cherlerie“ (n. Cherler, Mitarb. d. Joh. Bauhin, Herausg. eines Prodromus von Tabernaemontani Hist. plant. univers. 1619), z. B. *C. sedoides* Jacq., s. *Lychnis alpina* Pluk., *C. sedoides* Forsk. = *Arenaria procumbens* Vahl.

Chilodia R. Br. (-dium autt.) (Labiaten, XIV. 1) Lippenzahnstrauch (χειλός Lippe u. δόδοντος Zahn — halb zweiteil. Unterlippe! Wtst.), z. B. *Treibh.* C. scutellarioides R. Br.

Chimaphila fehlerh. st. **Chimatophila** = *Chimaphila* Pursh, s. d.

Chimatophila, s. eb.

Chimonanthus Lindl. (zu *Calycanthus*) L. (Calycifloreen Bunge, XII. 5) „Winterblume“ (-blüte) (v. χειμωνί, -ώρος Winter u. ἄνθος Bl.), z. B. Zier. *C. praecox* s. *fragrans* Ldl. (*Calycanthus pr.* L.) — Stu-
ben im Dez. u. Jan.

Chimaphila Pursh (st. **Chimatophila**) (zu *Piröla* Rchb.) (Ericaceen, X. 1) „Winterlieb“, -grün (χειμωφιλός v. χειμα, -ατος od. χει-
μών, -ώρος Winter u. φίλος Freund, Liebhaber), z. B. *umbellata*
Pursh = *Pyröla* (*Pirola*) *umbellata* L.

China (sc. *Smilax*) L. (Smilaceen, VI. 1) „China“—*Smilax* (— Stech-
winde) (— lief. d. Chinawurzel d. Apoth.).

Chiococca P. Br. (st. **Chionococca**) (Cinchonaceen od. Coffeaceen, V. 1)
„Schneebeerstrauch“, Hohlbleree, fr. chiocoque (v. χιών, -όνος Schnee — Beeren glänz. schneeweiss!), z. B. *C. anguifluga* Mart.
Schlangenstrauch, *C. paniculata* L. (*Psychotria p.* W. s. *alpina*, Bstr.
Surinam), *C. opuliflora* Spr. (*Coffea op.* Forst., Neukaled.).

Chionanthus L. (Oleaceen Jasmineen od. Sapotac. Fraxineen Rchb.,
II. 1) „Schneeblume“, Schneeflockenbaum Rümpl., fr. arbre de neige
od. *Chionanthe de Virginie*, fleur en neige, e. virginian snow-flower
(-drop) (v. χιών, -όνος u. ἄνθος), Zier. *C. virginicus* L. m. v. *ma-
ritima* Pursh, *C. compacta* Sw. (*Linociera c.* R. Br.), *C. tetranda*
Vahl (*Mayepea guianensis* Aubl.).

Chirita Don, Hamilt. (Cyrtandreen od. Scrophularineen XIV. 2) „Hand-
schuhblume“ (v. χειρίς, -ιδος Ärmel, Handschuh? Wtst. ind. Name!),
z. B. *Warmh.* *C. Moonii*, Walkeri u. *zeylanica* Don.

Chironia L. (Gentianeen, V. 1) „Chiron's-Enzian, Tausendguldenkraut,
fr. chirone (n. d. Centauren Chiron, berühmt. Arzt, Myth.), z. B.
• *Zier. C. frutescens* L. „Strauch-Chironie“, Gewächsh. *linoides* L.,
floribunda Paxt. s. *Fischeri* Hort., s. *Erythraea* u. *Centaurium*.

1) **Chironium** Scop. (sc. *Laserpitium*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Chi-
ron's“—Dolde (s. eb.). 2) **Opopanax Chironium** Koch = *Pastinaca*
Opopanax L. (Umbellif. V. 2).

Chlamydæa Banks (-dia G.) (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Mantellilie“,
Flachsliile (v. χλάδυς, -νδος Oberkleid — weg. deren Verwendung!),
z. B. *C. tenacissima* G. = *Phormium tenax* L. neuseel. Flachs.

Chlidanthus Herb., Lindl. (Amaryllideen, VI. 1) Prunk-Narzisse (v.
χλιδή Prunk etc., ἄνθος), z. B. *fragrans* Herb., s. *Pancratium luteum*
Poir.

- Chlôra** L. (Gentianeen, VIII. 1) Achtspalt-Enzian, Bitterling, Grünling Leun., Gelbkraut Rümpl., fr. chlore, e. yellow-wort ($\chiλωρος$; grüngelb), z. B. Zier. grandiflora Griseb.
- Chloranthus** Sw., R. u. Sch. (Piperaceen Chlorantheen od. Caprifoliac., II. 1) „Grünblume“, Grünling, Pflaumenpfeffer (s. eb.), z. B. C. seratus u. spicatus R. Sch. (Jap.), s. Nigrina serr. u. spic. Thb.
- Chloréa (-raea)** Lindl. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Grünorche“ (v. $\chiλωρα$ bin gelb- od. blässgrün), z. B. Austinae Gray.
- Chloridéae** Kth. Fingergräser, s. Chloris.
- Chlôris** Sw., Desv. (Gräser, XXIII. 1) „Grün“- od. Fingergras (v. $\chiλωρι$ bin grüngelb od. $\chiλωρος$; gelbgrün), z. B. Zier. C. tenella Roxb., s. Ctenium indicum Spr.
- Chloroeocicum** Fr. (Nostochineen-Algen, XXIV. 3) „Grünkorn“-Alge (— grün. Überzug v. Rinde d. Bäume!), ($\chiλωρος$ u. $\chiλωρος$ Korn).
- Chlorocérpis** Griseb. (zu Hieracium L.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Grünpippau“ (s. v. u. Crepis, s. d.), z. B. staticifolia Gris. (Hieracium stat. Vill.), s. Tolpis st. Schultz-Bip.
- Chloromýron** Rz. Pv., Pers. (Tiliaceen od. Capparideen, XIII. 1) „Grünbalsambaum“, Marien-B. (s. v. u. $\muνον$ Balsam- od. Duftöl), z. B. verticillatum R. P., s. Oleum s. Balsánum Mariae (B., Peru).
- 1) **Chlorophýtum** Ker (Liliac. Asphodeleen od. Sarmentaceen, VI. 1) „Grünlilie“ ($\chiλωρος$ u. $\varphiτον$ Pfl.), z. B. Zier. Stuben: C. Sternbergianum Steud. (Cordyline vivipara Hort.), s. Anthericum s. g. fliegender Holländer, C. laxum R. Br., inornatum Ker, elatum R. Br. (Phalangium el. Red.). 2) **Chlorophýtum** Ag. (Algen, XXIV. 3) „Grünalge“. 3) **Chl.** Pohl (Rubiacen, IV. 1) — Blätt. schön grün!
- Chloroxýlon** P. Br., DC. (Hesperiodeen od. Cedreleen, X. 1) „Grünholz“ (s. v. $\xiλον$ Holz), C. Swietenia P. Br., s. Swietenia s. Laurus Chloroxylon L. Atlas- od. Seidenholz vom Himalaya, fr. bois satiné.
- Chondrilla** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Knorpelsalat“, Krümmung O. W., fr. chondrille ($\chiρνδρος$ Knorpel u. Klumpen etc. — Gummiklumpen an d. Stengeln, Paxton).
- Chorisia** Kth. (Oxalid. Bombaceen, XVI. 8) „Choris“-Wollbaum (n. d. russ. Nat. u. Reis. Choris ben.), z. B. ventricosa Kth., insignis H. B. K. (B. Südamer.), etc.
- Choristopetalae** DC. „Getrenntkronblättrige“ = Dialypetaleae Endl. u. Polypetaleae Juss. ($\chiωστοτος$ getrennt).
- Chorozéma** Lab. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Kreisfahne“ (v. $\chiροδης$ Kreis, $\sigmaνμα$ Fahne — zugerund. Vexill!), z. B. Gewächsh. ilicifolium Sm., Henchmanni R. Br., varium Benth. etc. (kl. Hstr.), s. Oxylobium Andr.
- 1) **Christophoriana** T., DC. (Ranunculaceen, XIII. 1) „Christophskraut“, schwarze Christwurz, Giftähre od. -traube (v. Χριστόφορος, St. Christoph, „Christusträger“, Legende), z. B. C. nigra s. spicata T. DC., s. Actaea nigra Fl. Wett. s. spicata L., racemosa T. (Actaea rac. L. s. Cimicifuga r. L.). 2) **Christophoriana arboréa** Pluk. (Araliaceen, V. 5) Angelikabaum = Aralia spinosa L. (Angelica arborecens Comm.), C. canadensis Moris. = Aralia racemosa L.
- Chronosemíum** Desv., Ser., DC. (zu Trifolium Rehb.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Dauerfahne ($\chiρόνος$ Zeit, $\sigmaημείον$ Zeichen, Fahne — Blüt. nach d. Verblüh. sitzenbleibend, Wst.), z. B. T. agrarium u. procumbens L. etc., s. Lupulina Desf.
- Chroolepidéae** autt. Schorfalgen, s. sogl.
- Chroolépis (-us)** Ag. (Confervaceen, XXIV. 3) „Hautschorf“ (v. $\chiροά$ od. $\chiρούς$ Haut, $\lambdaέπος$ Schale od. $\lambdaέπις$; Schorf etc. — farb. Überzüge auf Steinen etc.), z. B. Jolithus Ag. „Veilchenstein“, -moos.
- Chrysanthémum** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Wucherblume,

eig. „Goldblume“, fr. chrysanthème, e. chrysantenon (*χρυσός* Gold, *ἄνθεμον* i. q. *ἄνθος*), z. B. C. segētum L. s. g. böse Blume od. Saatwucherbl., fr. fleur dorée, souci des champs (- des blés), marguérite jaune, e. marigold, C. Leucanthemum L. s. g. Marguerite od. grosse Gänseblume, fr. marguérite grande, oeil de boeuf, e. margarite, Gartenbl. C. coronarium L., fr. chr. des jardins, e. garland chr., m. v. fl. albo Hort., C. carinatum Schousb., fr. chr. tricolore, m. v. v., C. rosēum Lindl. (*Pyrethrūm* ros. Ldl. s. carnēum M. B.), liefert s. g. pers. od. kaukas. Insektenpulver, C. indicum Curt. (*japonicum* u. ind. Thb.), Ramatuelle od. s. g. Winteraster, s. Anthémis artemisiaefolia L. s. grandiflōra Hort., m. v. v. z. B. grandiflōrum, Pompon, Bronze-Dragon, Yellow-Dragon etc.

- 1) **Chrysēis** Lindl. (Papaveraceen, XIII. 1) „Goldmohn“ (gr. *Χουσῆς* Frauenname v. *χρυσός* Gold), C. californica Ldl. = Eschscholtzia cal. Cham. 2) **Chrysēis** Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Goldblume, -flockenbl., s. Centaurēa suaveolens W. (*Chrysis* Ren.).

Chrysobalānus L. (Myrobalaneen, XII. 1) „Goldpflaume“, Icaco-Pflaume (*χρυσός* u. *βάλανος*, Eichel etc., lat. glans — eichelförmige gelbe Frucht, Wtst.), C. Icaco L. westind. Cacaopflaume.

Chrysobaphus Wall. (Orchideen, XX. 1), „Goldfarb“-O. (s. v., *βαρφή* Farbe).

Chrysobotrya Spach (zu Ribes) Rmpl. (Ribesiaceen, V. 1) Gold-Johannisbeerstrauch, „Goldträubchen“ (s. v. u. *βότρυς*, -*voς* Traube), z. B. Zier. revoluta Spach (*Ribes aurēum* Pursh) s. g. Chokoladenstr. (*R. fragrans* Lodd.), fr. grosseiller doré, C. Lindleyana Sp., s. Ribes tenuiflōrum Lindl.

Chrysocephalūm Walp. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Goldköpfchen“ Rmpl., fr. chrysocephale (*χρυσός* u. *κεφαλή* Kopf), z. B. Zier. apiculatum Steetz, s. Helichrysum ap. DC. (*Gnaphalium* ap. Lab.).

Chrysoēoma L., DC. (Compos. Astereen od. Eupatorineen, XIX. 1) „Goldschopf“ Seub., -haar, fr. chrysosome (s. v., *ζόμη* lat. coma Haupthaar — gelbe, fein haarf. Blüten, Wtst.), C. coma aurēa L. (*Conyza Comaurēa* L.), s. Linosyris Cass. u. Gnaphalium.

Chrysoglossum Blum. (Orchideen, XX. 1) „Goldzungen“-O. (— Labell goldfarbig!).

Chrysophyllum L. (Sapotaceen, V. 1) Sternapfelbaum, eig. „Goldblatt“, indisches Eisenholz, fr. cañitier (s. v., *φύλλον* Laubblatt — die Bl. unten rostf. goldglänz. überzogen!), C. ferrugineum s. Cainito L., s. Manglilla Chrysoph. Lam. (*Myrsīne Manglilla* R. Br.), auch Nycteration ferruginēum Rz. Pv.

- 1) **Chrysosplenium** T. L. (Saxifragaceen, X. 2) „Goldmilz“, Milzkraut, fr. hépatique des marais, dorine od. saxifrage hépatique dorée, e. milt-wort (-wast), spleen-wort (s. v., *σπλήν*, -*ηρός* Milz — geg. Milzkrankh.!), z. B. oppositifolium L. s. repens Lk. 2) **Chrysosplenium** Walt. (Polygonaceen, VIII. 3) wolliger Knöterich, s. Eriogōnum tomentosum Mehx.

Chrysūrus P.-B., Rich. (Gräser, III. 2) „Goldschwanz“ (s. v., *οὐρὰ* Schwanz — schwanzähnл. Ährchen gelb!), z. B. Zier. C. cynosuroides Pers. (*Cynosurus aurēus*) u. a., s. Hymenothecium Lag., Aegopōgon Hb.

Chysis Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Giess“-O. (*χύσις* d. Giessen od. Schütten — hängt von d. Bäum. herab, Wtst.), z. B. Warmh. C. bractescens Lindl. (Amer.).

- 1) **Cianītis** (bess. *Cyan-*-) autt. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Blauflockenblume, „Cyanengleiche“, Berg- od. Wald-Cyane (*χνανῖτις* od. -*νοετὴ* δῆς), z. B. C. sylvatica autt. = Centaurēa montana L. (*Cyānus* mont. Fl. Wett.). 2) **Cyanītis** Reinw. (Saxifragac., X. 2) Blausteinbrech (— Blüten u. Früchte blau! Wtst.).

- Ciborium** Endl. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) (zu Pezīza L.) „Becherpilz“ (*κιβωτίον* lat. ciborium Becher etc.).
- Cibotium** Kaulf. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Kistchenfarn“ (*κιβώτιον* Kiste — bez. d. Sporangien!), z. B. Chamissoi Kaulf. (Sandwichsins.), Billardieri Klf. (Dicksonia antarctica Lab.).
- Cicca** L. (Euphorbiac., XXI. 4) Wunderbaum- od. Ricinus-Euphorbiūm (*κικίλιον* Wunderb. — d. Rinde ähnl. wie bei Ricinus purgierend, Wtst.), C. disticha L., s. Averrhoa acida L. f.
- Cicendia** Adans. (Gentianeen, IV. 1) Bitterkraut, Fadenblatt Leun., Zindel O. W., Vierspalt-Enzian (n. d. Namen Cicendi geb., Wtst. d. veränd. Gentiana od. Centaurium!), C. filiformis Ad., s. Exäcum fil. W.
- 1) **Cicer** T. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Kicher“, -erbs, fr. poischiche u. garranche, e. chick-pea (cicer, -ēris „Kicher“, hebr. kikar rundlich!), C. arietinum L. u. sativum L. (Cicerula sat. Alfld.). 2) **Cicer** (sc. Astragalus) L. (Legum. Astragaleen, XVII. 4) kicherart. Traganth.
 - 3) **Cicēra** (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) rote Platt-erbs M.-Rehb.
- Cicerbita** Wallr. (zu Prenanthes) Rchb. (Compos. Cichoriace., XIX. 1) „Krautcichorie“ (Cicer od. Cichoria u. herbesco, Partic. herbitus, werde zu Gras od. Kraut, st. Cichoria herbita!).
- Cicerella** Mnch. (zu Lathyrus) L. (Papilionaceen, XVII. 4) „Kicherchen“ (dem. Cicera sc. Lathyrus L.).
- Cichoriaceae** Rchb. (-racées Juss.) cichorienartige Korbblütler (zu Ord. Composite Endl. etc.).
- Cichorium** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Cichorie“, Wegwarte, Warte O. W., fr. cichorée (escarole od. scarole, -riole), e. cichory (succory) (gr. *κιχώτιον* v. *κιών* gehe u. *χωτόν* Acker, Feld etc., Wtst.), z. B. C. Intybus L. gem. u. geb. Cichorie, C. Endivia L. „Endivien-salat“.
- Cicla** (sc. Beta) L. (Chenopodiace., V. 2) weisse Runkelrübe, w. Mangold, s. g. Römischkohl, var. v. Beta vulgaris L. Dickrübe (-wurz) (Wtst. st. sicula — in Sizilien wild, schwerl. v. Cilix, -icis Cilicier in Klein-asien, od. *κίγκλις* Gitter? *κίγκλος* lat. cinclus Wasserstaar?).
- Ciconium** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5) „Storchgeranium“ (v. ciconia Storch, wie Geranium v. *γέρανος* Kranich), z. B. Zier. inquinans Ait. (Pelargonium inq.), zonale L. m. v. scandens Ehrh., acetosum Ait. etc., s. Pelargonium.
- Cicutaria** L. (Umbelliferen, V. 2) Wasserschierling, Wüterich, fr. cicutaire od. ciguë, e. water-hemlock u. kecks (kex), C. virosa L., fr. ciguë vireuse (cicuta Plin. Schierling v. *κιών* od. *γύνω* bin hohl), s. Cicutaria Riv.
- 1) **Cicutaria** Riv., T. (Umbelliferen, V. 2) Wasserschierling, fr. cicutaire (s. eb.). 2) **Cicutaria** Vill. (sc. Chaerophyllum) L. (Umbellif., V. 2) schierlingblättr. Kälberkropf, s. Chaeroph. hirsutum L., Cicut. bulbosa (Chaeroph. bulb. L.), C. palustris tenuifolia Vill., s. Phellandrium.
- Cienfuegia** W. (-fuegosia Cav.) (Malvaceen, XVI. 7) „Cienfuegosie“ (n. d. span. Bot. Bernardo Cienfuegos, Ende d. 16. Jahrh., Pfeiffer), z. B. digitata Cav. etc., s. Fugosa (-ia) Juss.
- Cimicifuga** L. (Ranunculaceen, XIII. 4) Wanzenkraut, -„flucht“ od. -tod, fr. chasse-punaise, herbe aux punaises, e. bug-flight (cimex, -icis Wanze, füga Flucht — vertreibt d. Wanzen), z. B. C. foetida L. (Actaea cim. L.), racemosa Bart. (Act. rac. L.).
- Ciminalis** Ad. s. Cynodon Borkh. (Gentianeen, V. 2) „Kümmel“-Enzian (v. *κιμνάτον* Kümmel), s. Gentiana acaulis u. Pneumonanthe L.
- Cināra** T. s. Cynāra Vaill.

- Cinchona** L. (Rubiaceen Cinchonaceen, V. 1) China- od. Fieberrindenbaum, fr. quinquina, e. china- od. peruvian-bark, C. officinalis L. (n. d. Gräfin de Cinchon, Vicekönigin v. Peru, welche 1638 davon kuriert wurde, Paxton: nach de la Condamine v. kina od. quina der Indianer = Rinde). — Cinchonacēae Lindl. (zu Rubiacēae Rehb., Ord. Rubiacinæ Bartl.).
- 1) **Cineraria** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Aschenpflanze“, Wandelblume Leun., fr. cinéraire, cendrette (v. cinis, -ēris Asche — Ansehen d. Stocks!), z. B. Zier. C. cruenta l'Hér. s. hybrida W. canarische m. v. hybrida nana Hort., C. amelloides L., s. Agathaea am. Cass., C. maritima L. (Senecio m. Rehb.), fr. c. maritime, e. rag-wort od. silvery-white Cin. etc. 2) **Cineraria** (sc. Centaurēa) L., Jacq. Aschen-Flockenblume (Teppichpfl.), s. Centaurēa candidissima Lam.
- Cinnamomēae** Lauch. (sect. v. Rosa) Pfingst- od. Zimmtrosen, z. B. R. cinnamomiæ L., alpīna L. etc., s. sogl.
- Cinnamōmum** R. Br., Nees (Laurineen, IX. 1) Zimmtlorbeer, fr. cinnamon, e. cinnamon (v. d. arab. kinanom od. china u. ammonium Wtst.), s. Laurus s. Persæ Cinnamomum G., L.
- Ciraea** L. (Onagrarieen, II. 1) „Hexenkraut“, fr. circée, herbe aux magiciens (- de St. Etienne), e. witch-wort (hag-)(n. d. Zauberin Circe, Myth.), z. B. lutetiana L., intermedia Ehrh., etc.
- Circinantia** (sc. Chlorophyta) Rehb. „Zirkel“- od. „Wickelkräuter“, i. q. Filices Farne (circinus Zirkel etc. — nämli. beim Sprossen d. Wedel!).
- Cirrhaea** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Rankenschnabel“ (v. cirrus gr. κίρρος Ring, Locke, nicht κίρρως gelb — inner. hin- u. hergedreht. Blütenblatt! Wtst.), z. B. Loddigesii Ldl. (Cymbidium dependens Lodd.), viridi-purpuræ Ldl. (Bras.), s. Gongora v.-p. Hook.) etc.
- Cirrhopetalūm** Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Rankenblatt“ (**Cirropet.-**) (s. eb. u. πετάλον Blütenblatt — d. columna m. 2 blumenblattart. Hörnern an d. Spitze, Wtst.), z. B. Blumēi Ldl., s. Ephippium ciliatum Blume.
- Cirsium** T., Vaill. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Kratzdistel, „Aderkopfkraut“, fr. cirse (v. κιρρός Blutaderknoten — bei d. Alten geg. solche gebraucht, Wtst.), z. B. lanceolatum Scop. (Carduus lanc. L., Cnicus l. W.), eriophorum Scop. (Card. s. Cnic. er. L., W.), palustre Scop. etc., s. Carduus u. Cnicus.
- Cissampēlos** L. (Menispermaceen, XXII. 12) „Epheurebe“, Grieswurz Dietr. (v. κισσός lat. Cissus u. κισσέλος Weinstock — schlingt wie d. Rebe! Wtst.), z. B. C. Pareira L. gebräuchl. Grieswurz Leun., Pareira brava d. Apoth.
- Cissus** L. (Sect. v. Vitis Lauché) (Ampelideen od. Vitaceen, IV. 1) Klimme, griechisches od. arabisches Epheu, Fiederrebe Lauch. (v. d. arab. quissos, Paxton), z. B. Gartenspal. C. antarctica Vent. (Neuholl.), Warmh. C. discolor Blum. (Java) u. vitigena L., porphyrophylla Hort., velutina Hort., capensis W. (Vitis c. Thb.), serianae-folia Bung. (Ampelopsis bipinnata Mehx.).
- Cistacēae** Dunal, **Cisti** Juss., -inēae DC. Rehb., -stēae (sc. Cistinēae) Rehb. „Cistgew.“, s. Cistus.
- Cistiflōræ** Bartl. Ord. der Cistusblütler Rehb.
- Cistus** T. (Cistaceen, XIII. 1) „Cist“- od. Sonnenrose, fr. ciste, e. cistus- od. holly-rose (gr. κιστός Kapsel od. κιστή lat. cista Kiste — weg. der Fruchtkapseln!), z. B. Gewächsh. C. vaginatus Ait. (sympitifolius Lam.), ladaniferus L., laurifolius L., purpurēus Lam. etc.
- Citharexylūm** L. (-raexylon Sm.) (Verbenac. od. Vitaceen, XIV. 2) „Geigenholz“ Leun., fr. guitarin, citharexylon u. cotelet (κιθάρα Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- Cither etc., ξύλον Holz — weiss. Eisenholz d. Handels!), z. B. caudatum L., quitense Spr. (Südamer.).
- Citinus** Sm. (bess. Cytinus L., Pers.) (Aristolochieen, XX. 8) „Fleischkelch“-Osterluzev (*κυτίνος* lat. cytinus fleisch. Kelch d. Granatapfels!).
- Citrullus** Neck. (sc. Cucurbita) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Arbuse, Angurien-Kürbis W., Wassermelone M. Rchb., fr. citrouille, melon d'eau, e. citrul od. water-melon, fr. auch pastèque (v. citrus Citrone), s. Anguria Citrullus dicta Blackw.
- Citrus** L. (Aurantiaceen, XVIII. 1) „Citronenbaum“, fr. citronier, e. citron- od. lemon-tree (n. d. Stadt Citron in Judäa, Paxton, gr. κίτρον lat. citrus Citronenb. — wahrsch. vom Pers. kitt, d. Namen für Medien, Schmittthenner), z. B. C. medica L. gem. Citrone m. v. v., z. B. v. Cedro Citronat, fr. cédrat (florentina, macrocarpa, paradiáca „Paradiesapfel“, umbilicata), v. Limonia s. Limonum „Lime“ (L. Bergamotta, calabrica, dulcis süsse Limonen, fl. pleno, vulgaris), C. Aurantium L. Orange od. Pomeranze (pomum aurantium, fr. pomme d'or od. orange) m. v. v., z. B. v. Bigaradia saure Or. od. Pom. (multiflora, myrtifolia Hort. s. g. Myrtorange, nobilis Lois., s. g. Mandarin-Or., v. salicifolia, v. crispifolia (fr. le Bouquetier), v. Aurantium chinensis „Apfelsine“ od. süsse Or., C. decumana L. (Citr. Aurantium decumánus L. f.), s. g. Pompelmus, Topfor. C. chinensis Hort., Zwergor. C. japonica L.
- Cladium** P. Br. (Cyperaceen, III. 1) Schneide, Nussbinse Seub. (gr. κλάδιον dem. v. κλάδος; Schoss etc., — zahlr. verwirrte Wurzeln u. auch Blütensträusse, Wst.), z. B. Mariscus R. Br. deutsche Schneide.
- Cladonia** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3), „Astflechte“, s. g. Rentiermoos (v. κλάδος Ast etc. — verzweigter Wuchs, Wst.), Cl. rangiferina s. sylvatica, fr. mousse du nord, C. coccifera Hoffm. Korallen-M., C. alcicornis etc.
- Cladosporium** Lk. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Astspore“, Russau, Brandpilz, Kettenfaser (s. eb., σπορὰ Spore — d. zahlr. Zweige laufen in Sporidien aus, Wst.), C. fumago Fr.
- Cladastis** Raf. (Legumin. Sophoreen, X. 1) „Berastatstrauch“, Gelbholzbaum (κλάδος Ast etc. u. δάσος zerreisse), Cl. tinctoria Raf. s. Virgilia lutea L. u. Sophora tinctoria L.
- Clanbrasiliiana** (sc. Abies) DC. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Zwergfichte (N. pr.), s. Abies excelsa DC. var. Clanbrasiliiana.
- Clarkia** Pursh (Onagraceen, VIII. 1) „Clarkie“ (wahrsch. n. d. Apoth. Clark in Grantham, Isaak Newton's Lehrherrn, n. Andern n. d. General Dan. Clarke, Begl. d. Statth.'s Lewis in Louisiana durch Nordwest-Amerika), Zier. C. pulchella Pursh, fr. Cl. délicate, e. nice Cl., m. v. pulcherrima, Cl. elegans Dougl. etc.
- Clavaria** Vaill. L. (Keulenpilze, XXIV. 4) „Keulen“- od. Korallenpilz, fr. clavaire od. ganteline, mairotte (v. clava Keule, Kolbe — astige, keulige Form!), z. B. essb. C. delicata, Botrytus u. flava, s. g. Ziegenbart, fr. gallinette (-nole), glossopètre, langue de terre (-de serpent). — Clavariæ DC. Keulenpilze.
- Claviceps** Fr., s. Cordyceps, s. d. (clava s. v. u. caput, -ceps, -cipitis in compos.) (Pilze, XXIV. 4).
- Claviga (-vija)** Rz. u. Pv. (Myrsineen, V. 1) „Clavigo's“- Myrtenbaum (n. d. span. Nat. J. Clavigo Faxardo, Herausg. v. Buffon's Werk. im Span.), z. B. Zier. C. ornata Van Houtt., s. Theophrasta longifolia Jacq.
- Claytonia** L. (Portulaceen, V. 3) „Clayton's“-Portulak (n. d. engl. Arzt J. Clayton, † 1773 in Virginien), Cl. Portulacaria L. f. Portulakbaum, s. Crassula P. Dill. (Portulacaria afra Schreb.), C. arctica Adams u. sibirica L. (Limnia arct. Stockh.).

Cleanthe Salisb. (Irideen, III. 1) „Schliessblüt“-Schwertel (v. *zλείω* schliesse zu — dreht sich nach d. Verblühen zu, Wtst.).

Clematidēae DC. Waldrebengew. (zu Ord. Polycarpīcae Bartl., Fam. Ranunculaceae Juss.), s. Clematis.

1) **Clematis** L. (Ranunculac. Clematideen, XIII. 7) Waldrebe, fr. clématis, herbe aux gueux, e. lady's-bower, climber u. wavering-tree (gr. *zληματις* u. *zλημα* Klimme, Ranke), Zier. Cl. integrifolia L., patens Morr., Decsn., azurča grandiflora Hort., florida Thb., lanuginosa Lindl. m. v. v., z. B. v. rubro-violacea Hort., Cl. viticella L. m. v. v. (plena, Francofurtensis, Guascoi u. venosa Hort.), s. g. ital. W., C. Viorna L. (Nordwest-Amer.), Cl. Vitalba L. s. g. Hexenzwirn od. gem. W., C. Flammula L. — Bastardformen: Jackmanni, Fortunēi Moore, rubella Jackm., Prince of Wales, Lady Bovill Jackm. u. a. 2) **Clematis** (sc. Mutisia) L. f. (Compos. Mutisieen, XIX. 2) Waldreben-Mutisie.

Clematitís (sc. Aristolochia) L. (Aristolochieen, XX. 5) gem. Osterluzey (v. Clematis, -itis, s. eb.).

1) **Clementēa** Cav. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohnenbaum (n. J. R. Clemente, Prof. zu Madrid, schr. üb. d. Weinbau v. Andalusien), C. nitida Cav., s. Dipterix (Str. Cuba). 2) **Clementēa** palmiformis DC. (Farne, XXIV. 1) Palmenfarn, s. Angiopteris erecta Hoffm. (Polypodium er. Forst.).

Cleōme L. (Capparideen, XV. 2) Pillenbaum, -blume, Senfkapper Leun., fr. cléome u. mosambé (moz. -), e. bastard-mustard (v. *zλείω* verschliesse, nach Octav. Horatius, Arzt d. 4. Jahrh.'s Cleome dem Sinapis verw. Pfl., wovon Linné Gebrauch machte), Zier. C. spinosa L., pungens W. (Süd-Amer.).

Cleonia L. (Labiaten, XIV. 1) „Schliessblüte“, s. g. Kreuzpflanze, fr. cléonie (v. *zλείω* s. eb. — enger Schlund d. sehr dünnen Blüte, Wtst.), z. B. C. lusitanica L. (Prunella lus. Moris.), s. Bugula odorata lusit. Moris.

Clerodendron Hortul. (-drum L.) (Verbenac., XIV. 2) „Loos“- od. Schicksalsbaum (v. *zλῆος* Loos etc., δένδρον B. — eine Art als Schicksalspfl.!), z. B. Wärmh. C. fragrans L. (Volkameria fr. Vent.) (trop. Asien), s. Rhododendron villosum Roth „Duft-Verbene“, C. Thomsonae Balf., squamatum Vahl, calamitosum L. „unheilbringende“ (Volkameria alternifolia Burm.).

Clethra L. (Ericaceen Clethreen, X. 1) „Heidenerle“, Scheineller Lauch., Maiblumenbaum, Laubheide (gr. *zλήθρα* Erle), z. B. Zier. C. alnifolia L., arborča L., tinifolia (Volkameria arborēa), C. mexicana s. quercifolia u. a. (Wtst. *zλήθρα* v. *zλάω* breche — sprödes Holz!).

Cleyēra Thb. (fehlerh. Cleyrea Dietr.) (Theaceen od. Ternstroemiaceen, V. 1 od. XIII. 1) „Cleyers“-Strauch (n. d. holl. Arzt u. Bot. Dr. Andr. Cleyer in Batavia um 1675), z. B. C. japonica Thb. (Ternstroemia jap.), ochnacea DC. (Ternstr. Lushia Don) (Nepaul).

Clianthus Sol., Endl. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Schliessblume“ (v. *zλείω* schliesse u. *ἄνθος* — Ansehn d. aufliegenden Fahne etc.! Wtst.), z. B. Zier. C. Dampieri A. Cunn., s. g. deutsche Flagge.

Clidēmia Don (Melastomaceen, X. 1) „Clidemie“ (n. e. altgriech. Bot. Clidemus, schr. üb. Pfl.-Krankh.), z. B. Gewächsh. C. elegans Don, s. Melastoma agreste Aubl. (Guiana).

Cliffortia L. (Rosac. Cliffortieen od. Sanguisorbeen, XXII. 12) „Cliffortie“ (n. Dr. jur. G. Cliffort, Bürgermeist. v. Amsterd. etc., Gönn. Linné's, † 1750), z. B. odorata L. u. strobilifera L., s. Cedrus comifera Juniperi folio Pluk. — Cliffortiae (sc. Rosaccae) Rehb.

Climacium Web., Mohr (Laubmose, XXIV. 2) „Treppen“- od. „Leitermoos“ (v. *κλίμαξ*, -*ος* od. *κλείμαξ* lat. climax Leiter etc. — bez. d. inner. Peristoms, Wtst.), s. *Hypnum dendroides* L.

Clinopodium T., L. (Labiaten, XIV. 1) „Bettfüsschen“, Wirbeldost Grck., Weichdosten (— majoran), fr. clinopode od pied-de-lit (*κλινοπούδιον* v. *κλίνη* u. *ποδόν*) — Quirlblüt. wie Bettfußrollen, Wtst.), C. vulgare L., s. Calamintha Clinop. Spenner (Melissa Clin. Benth.).

Clintonia Dougl. (Lobeliae, XIV. 2) „Clintonie“ (n. d. General Clinton, Oberbefehlsh. geg. G. Washington in Nordamer., od. n. de Witt, Gouvern. v. New-York, Freund d. Naturw., Wtst.), Zier. C. pulchella Lindl., fr. Clintonie gentile, e. nice Cl.

Clitocybe DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schiefkopf“, s. g. Trichterling (*κλίτρος* Neigung, *κυβή* Napf etc.), z. B. suaveolens, fragrans „Anispilz“, etc.

Clitopilus DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schiefhut“, Pflaumenpilz Kummi. (s. eb. u. *πύλος* Hut), z. B. Prunulus u. popinalis.

Clitoria L. (-ius Petiv.) (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Scham“- od. „Clitorisblume“ D., fr. clitoire (v. *κλειτοῖς* Schamzünglein v. *κλείω* verschliesse), z. B. Galactia L. Milch-Cl. (Phaseolus minor lactescens Sloan.), C. Ternatca L. (von Ternate, Molukk.), s. Vilmoninia DC.

Clivia Lindl. (Amaryllideen, VI. 1) „Clive's“-Lilie (n. d. Herzogin v. Northumberland, ehem. Lady Clive), z. B. Warmh. C. nobilis Ldl. u. miniata ds. m. v. splendens Hort. (Cap), s. Imantophyllum (Himantoph.) Aiton Hook.

Clusia L. (Guttiferen Clusieen, XXIII. 1) Schweingummi v. Jamaica, fr. clusier od. figuier maudit (marron) (n. Charl. de l'Ecluse, lat. Clusius, Prof. in Leyden, s. d. Aut.), Cl. minor L. (fol. venosis Fabr.), s. Decumaria barbára L. — Clusiæ (sc. Guttiferae) Rchb.

Cluytia Ait. (Clutia Boerh., L. f.) (Euphorbiac., XXII. 15) „Cluytie“, fr. clutelle (n. d. Prof. Outgers Cluyt in Leyden, s. d. Aut., † 1650), z. B. androgyna L. f. (Andrachne fruticosa L.).

Clyménium T., DC. (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Rank“-Platterbse, fr. clymène (gr. *κλίμενον* v. *κλίνω* umranke — eine Schlingpfl.), s. Lathyrus bicolor Mnch.

Clypéola G. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) „Schildtäschlein“, fr. clypéole od. bouclier de Narbonne (dem. v. clypēus Schild, C. Jonthlaspi L., s. Jon-Thlaspi DC. (*ior* Veilchen).

1) **Cneōrum** L. (Rutac. od. Terebinthac., III. 1) Zeiland (gr. *κνέωσος* Theophr., Gewächs m. Blätt. wie ein Oelbaum, Wtst.. od. *κνέωσον* Nessel v. *κνέω* jucke), C. tricoccon L. spanischer Z. M.-Rchb., Zwergölbaum (-olive) Wolff, fr. camélée od. garoupe, s. Chamaelæa tricocca Bauh. 2) **Cneōrum** (sc. Daphne) L. (Thymelæac., VIII. 1), s. Thymelæa Cn. Scop. rosmarinblättr. Zeiland od. Zindel, fr. Thymélée des Alpes od. Daphne camélé, e. trailing D. od. garland-flower m. v. v. 3) **Cneorum** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulac., V. 1) candische od. Stechwinde.

Cnestis Juss. (Camareen od. Terebinthac., X. 5) „Raspel“- od. „Juckstrauch“, Baumbohne, Nesselhaarkapsel (gr. *κνῆστις* Raspel etc. v. *κνῆθω* brenne, jucke — bez. d. Kapseln!), z. B. C. corniculata Lam. etc., s. Rouréa Aubl. u. Robergia Schreb.

1) **Cnīeus** L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Stech- od. „Kratzdistel“ (v. *κνίζω* kratze), s. Cirsium Rchb. 2) **Cnīeus** Benedicta Vaill. i. q. Centauræ Benedicta L. Benedicten-Flockenblume (Compos. Centaureen, XIX. 3).

Cnidium Cusson (Umbelliferen, V. 2) „Brenndolde“ (v. *κνίδη* Nessel od. *κνίζω* jucke), z. B. venosum Koch, Cn. Silaus Spr. (Silaus pra-

- tensis Bess.), apioides Spr. (*Ligusticum* ap. Lam.) etc., s. Smyrnium, *Selinum* u. *Angelica*.
- Cobaea** Cav. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Cobäe“ od. „Cobokletterstr.“, Glockenrebe, fr. cobée (n. d. span. Jesuiten u. Bot. Barn. Cobo, † 1657 zu Lima in Peru), Zier. *C. scandens* Pv. (Südam.), fr. *C. grimpante*, e. climbing C.
- Coburgia** Herb., Sweet (Amaryllideen, VI. 1) „Coburgie“, „Coburg's“-Narzisse (n. d. Prinzen Leopold v. Coburg-Gotha, nachmal. König v. Belgien), z. B. *trichroma* Herb. u. *reticulata* Herb., s. *Amaryllis*.
- Coca** (sc. *Erythroxylon*) L. (Malpighieen, X. 3) „Cocastr.“, bolivisches Kaublatt, fr. coca (vaterl.), s. g. Hunger- u. Durstbaum (— d. Blätt. dienen zum Kauen).
- Coccinea (-ia)** Wright-Arn. (Cucurbitaceen, XXI. 9) „Scharlachbeere“ (gr. *ζόζινος*, lat. coccineus scharlachrot — Farbe d. Fr.!), Zier. *C. indica* W.-Arn., s. *Bryonia grandis* L.
- Coccocypselae** Cham., Schidl., s. sogl.
- Coccocypselum** P. Br., Schreb. (Cinchonaceen, IV. 1) „Kugelkapsel“, Hohlbeere, Fachbeere od. Spaltfrucht D. (*ζόζος* Korn, Beere, *κυψέλη* Höhlung, Kapsel — Beere m. hohler Krone, Wtst.), z. B. *biflorum* W. etc., s. *Manettia picta* W.
- Coccoloba** L. (Polygonac., VIII. 3) „Beerenhülse“, „Beerkelch“ D., Traubenbaum (s. v. u. *λοβός* Lappen, Hülse — Frucht dreikant., schwammig, Wtst.), z. B. *C. uvifera* L. Seetraube Leun., e. sea-side-grape „Strandtraube“, *C. sagittifolia* Ort. (Str. Bras.), s. *Polygonum acetosaefolium* Vent., *C. australis* Forst. (Polyg. tamifolium Vent.), *nymphaefolia*, etc.
- Cocculinae** Bartl. Ord. d. „Kokkeln“ Leun. s. *Coccilus*.
- Coccilus** C. Bauh., DC. (sc. *Menispernum*) L. (Laurineen Menispermaeen, VI. 4) „Kokkels“- od. Fischköernerstrauch, Cochenillenbeere (*ζόζος* Korn, Beere, lat. coccus, dem. *coccilus*), *C. caroliniana* DC. (Wendlandia populifolia W.), *C. palmatus* DC., s. g. Columbowurzel d. Apoth.
- Coccyganthe** A. Br. (Caryophylleen od. Silenac., X. 5) „Kukuksblume“ = *Lychnis flos cuculi* L. (*ζόζνιξ*, *-υγος* Kukuk, *ἄρθη* Bl.).
- Coccygea** Scop. (Cotinus *Coccygina* autt.) (Terebinthac. Sumachineen, V. 3) Perückenbaum (gr. *ζοζνύγεα δένδρον*, lat. *Cotinus*, *ζοζνύρως* purpurfarbig).
- Cochlearia** T., L. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Löffelkraut“, fr. herbe aux cuillères, e. spoon-wort (scurvy-grass „Scorbutkr.“), fr. auch cranson (lat. cochlear od. -leare Löffel — Form d. Blätter, Wtst.), *C. officinalis* L. echtes L., *C. Armoracia* L. Meerrettig, fr. cranson rustique, s. *Armoracia rusticana* Fl. Wett.
- Cochliostéma** E. André (Commelyneen, III. 1) „Schneckenfaden“ (*ζοζλίον* dem. v. *ζοζλί*; Schnecken, *στήμα* od. *στήμων* Faden, lat. stamen), Warmh. C. *Jacobianum* E. Andr.
- Cochlospermum** H. B. K. (Theac. Ternstroemiac., XIII. 1 od. XVI. 8) „Schneckensamen“, Löffelsamen D. (?) (v. *ζοζλός*; Schneckenwindung, *σπέρμα* Samen — dies. nieren- od. schneckenförm. gewunden, Wtst.), z. B. *hibiscoides* Kth., s. *Bombax* s. *Maximilianeum* *Gossypium* L. falscher Seidenwollb. Leun., *C. heliacuba* Kth., s. g. Ballonpflanze.
- Cocos** L. (Palmen, XXI. 6) „Kokospalme“, fr. cocotier (gr. *ζοῦζι* vaterl., verw. mit *ζόζος* Korn etc.), *C. nucifera* L. „Kokosnuss“-P., e. coco (cocoa u. cacao), *C. butyracea* L. „Butternuss“-P., *C. guineensis* = *Bactris minor* Jacq. „Guinea“-Kok., Stuben: *C. plumosa* s. Romanzoffiana.
- Codiaeum** Rumph. (Euphorbiac., XXI. 9) „Kopf-Wolfsmilch“ (v. *ζωδία* od. *-δεῖα* Mohnkopf, schwerl. v. *ζωδίον* Vliess — Zweige zu

- Kränen, Wst.), C. andamanicum Kurz, s. Croton and. s. variegatum L. (*Phyllauréa Codiaeum* Lour.).
- Codon** L. (*Convolvulaceen*, V. 1) Schellen- od. Glockenwinde (v. *ζώδων* Glocke etc. — Blütenform!), z. B. C. Boyeni L. (Cap) etc.
- 1) **Codonia** Spr. (zu *Campanula* L.) (*Campanulac.*, V. 1), z. B. C. Medium L. (s. eb.). 2) **Codonia** Vahl (Ebenaceen, XXII. 8) Glockenblüt-Ebenholzb. 3) **Codonia** Dumer. (Jungermanniac., XXIV. 2) Glocken-Lebermoos (— *Involucrum glockig!*).
- Codonium** Vahl (Ebenaceen, XXII. 8) i. q. *Codonia* Vahl (s. eb.), C. arborescens V. (westind. Bstr.), s. *Schoepfia americana* W.
- Codonoprasum** Rchb. (zu *Allium* L.) (*Liliac. Asphodeleen*, VI. 1) „Glockenlauch“ (s. v. u. *πράσον* Lauch — Blütenköpfe vor d. Aufblüh. glockenförmig!).
- Codonopsis** Wall. (*Campanulac.*, V. 1) Dünn- od. Ampelglocke (s. v. u. *οὐεῖς* Aussehen), z. B. Warmh. C. gracilis Hook. f. s. *Leptocodon* u. *Fischeria* G. Don.
- Codonorchis** Lindl. (*Orchideen* Vandeen, XX. 1) „Glocken“-O. (s. v. — Blumenform!).
- Coelestina (-ia)** Cass. (*Compos. Eupatorineen*, XIX. 1) „Himmels“- od. Blaudosten (*coelestinus* i. q. *coelestis* himmelblau — schönblaue Blütenköpfe!), Warmh. C. ageratooides Kth. (*Sparganophorus* ag. Lag. „Wickelträger“), s. *Eupatorium coelestinum* L., C. coerulæa Cass., s. *Ageratum coelestinum* Sims.
- Coeli rosa** Desv. (sc. *Lychnis*) L. (*Caryophylleean* od. *Sileneen*, X. 4) „Himmelsrose“, kahlblättr. Lichtnelke M.-Rchb., e. knight's-cross „Ritterkreuz“, s. *Agrostemma* C. r. L. (*Lychnis segetum* Moris.).
- Coeloglossum** Hartm., Lindl. (*Orchid. Ophrydeen*, XX. 1) „Hohlzungel“ O. W. (v. *ζοιλός* hohl — wovon coelum Himmel, γλώσσα Zunge — Labell m. konkavem Nagel, Wst.), z. B. viride Hoffm., s. *Platanthera vir.* Lindl. u. *Satyrium vir.* L.
- Coelogyné** Lindl. (*Orchid. Malaxideen*, XX. 1) „Hohltempel“ (s. v. u. *γυνή* Weib, Stempel — Columna an d. Spitze kappenförm., Wst.), z. B. marmorata Rchb. f. u. fimbriata Ldl. (*China*), C. speciosa Ldl., s. *Angraecum nervosum* Rumph.
- Coelospermum** Blum., DC. (*Rubiace. Guettardeen*, XXI. 7) „Hohlsamen“ (s. v., *σπέρμα* Samen — Pyrenen vorn hohl, Wst.), z. B. C. scandens u. *corymbosum* Blum. (*Java*).
- Coffea** L. (*Rubiace. Coffeaceen* od. *Cinchonac.*, V. 1) „Kaffeebaum“, fr. caffier (-feyer), e. coffee-tree (*café*, coffee) (n. d. afrik. Land Caffa od. Kafa, wo ursprüngl. zu Hause), C. arabica L. — *Coffeacæae* (zu *Rubiaceæ*) Rchb., -fféacæ DC., -fféinæ Lindl. (zu Ord. *Rubiacæae* Bartl.).
- Coix** L. (*Gramineen*, XXI. 3) Thränenengras (*ζοϊξ*, -*ζος* eig. eine Palme), Zier. C. lacrimans L. (*Lacrima Hort.*) Marien-, Christus- od. Hiobsträne Rmpl., fr. larmes de Job, herbe à Chapelets, e. Job's-tears, s. *Lithagrostis* G.
- Colax** Lindl. (*Orchid. Malaxid.*, XX. 1) „Schmarotzer“ (*ζόλαξ* Schmeichler, Schmarotzer — schmarotzt auf B.), z. B. C. aromaticus, s. *Maxillaria arom.*, C. palmifolius Ldl., s. *Dendrobium p.* Sw., etc.
- Colchicaceæ** DC. (zu Ord. *Liliacæae* Bartl.) Zeitlosen, Giftlilien Seub., s. sogl.
- Colchicum** T., L. (*Melanthaceen* od. *Liliac. Colchicac.*, VI. 3) Zeitlose, fr. colchique, tue-chien, lis vert, e. meadowsaffron (v. *Colchis*, Heimat der Medea, die daraus Gift bereitete, Myth., Wst.: wo nach Dioscorides besond. zu Hause!), C. autumnale L. „Herbst“-Z., Zier. C. variegatum u. alpinum L., byzantinum Gawl., orientale s. g. Herzwurz, fr. hermès od. herniolate „Hermesdattel“.
- Coleanthus** Seidl. (*Gräser*, II. 1) „Scheidenklappgras“, -blütgras Grck.

(*κολεός* Scheide, lat. culēus u. ἄνθος — aufgeblasene Blattscheide, Wtst.), z. B. C. subtilis Seidl., s. Schmidtia s. Tratt. s. utriculosa Sternb.

Coleonēma Wendl. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Scheidenfaden“ (s. eb. u. *νήμα*, -τος Faden — Staubfäden in d. Rinne des Kronblattnagels, Wtst.), Zier. C. pulchra Hort. (album Bartl.), s. Diosma s. Adenandra alba Thb., R. S.

1) **Colēns** Lour. (Labiaten, XIV. 1) „Staubfadenscheide“, Braun- od. Buntblatt (*κολεός* od. -ορ Scheide — Staubfäden als Scheide um d. Griffel, Wtst.), Zier-Blattpfl. C. Blumiēi Benth., scutellarioides Benth. m. v. fol. atro-purp. viride-cinctis, C. nigricans, C. Verschaffeltei Lem., C. multicōlor Veitch, pictus ds. etc., s. Gesnera u. Plectranthus l'Hér.

2) **Colēus** Corda (Pilze, XXIV. 4) Scheiden-Bovist (— Basis der Fruchtlageräste in einen Stiel verw., Wtst.).

1) **Collaea** DC. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Collae“ „Colla“-Süßbohne (n. d. Bot. Colla, s. d. Aut.), z. B. speciosa DC. (Odontia speciosa Bertol., Cytīsus spec. Hort.). 2) **Collaea** procumbens Spr. (Compos. Verbesineen, XIX. 2), s. Verbesīna mutica L. 3) **Collaea** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Colla“-O.

1) **Collēma** Hoffm., Ach. (Gallertflechten, XXIV. 3 od. 4) „Gallert“-Flechte (v. *κόλλη* Leim etc., lat. gluten). — Collemacēae Fr., DC. Ord. der Gallertflechten. 2) **Collēma** Andr. (Campanulaceen, V. 1) Klebantheren-Glockenbl. (— Antheren anfangs etw. zusammenhängend, Wtst.).

Colletia Comm. (Rhamnac., V. 1) „Collets“-Dorn (n. Commerson's Gegen Collet, schr. Pfl. von Brest, — stachl. Pfl., aus Hass v. Commerson so genannt! Wtst.), Zier. C. spinosa Lam. s. horrida W. (ferox Gill., Hook.), C. cruciata Gill., Hook. s. bictonensis Lindl. (Chili), C. serratifolia Vent. (Rhamnus Spartium Domb.) etc.

Collinsia Nutt. (-linsonia DC.) (Scrophularineen, II. 1) „Collins“-Blume (n. Z. Collins, Vice-Präs. d. nat. Ges. in Philadelphia, nicht Newton's Zeitgen. Collins, † 1669), Zier. C. bicōlor Benth. m. v. v., C. verna Nutt., s. Cononeba borealis Spr., C. praecox Vahl (Str. Carolina), C. tuberosa Vahl s. serotina Walt. (Carol.), C. tricōlor Benth. m. v. v., C. candidissima Nutt., etc.

Collomia Nutt. (Polemoniaceen, V. 1) „Kleb“-Enzian, fr. collomie (v. *κόλλη* Leim u. *μοσ* Schulter — nämnl. Deckblatt, das klebr. anzu-fühlen, Vilm. u. Pfeiffer: seminis qualitas, Wtst.: Sam. m. zähklebr. Überzug!), Zier. C. coccinea Lehm., fr. c. écarlate, e. scarlet-Coll. (Calif.), C. grandiflora Dougl. s. glutinosa Dietr. (verwild. an Fluss-ufern!).

Collybia DC. (Pilze, XXIV. 4) „Münz“- od. „Pfennigpilz“ Kumm. (v. *κόλλη* klein. Geldstück — flachrund. Hut!), z. B. C. esculenta (Agaricus prunulus) s. g. Krösling od. Mousseron.

Colocasia Schott u. Endl., Catesb. (sc. Arum) L. (Aroideen, XX. 9) essb. Zehrwurz, Tarro od. Kalo Leun. (arab. kolkas), fr. manteau de Ste. Marie (gr. *κολοκασία* od. -ορ, eine Art Arum! Wtst. v. *κόλον* Speise u. *κάπω* versehe, schmücke — Blätt. zu Kränzen!), z. B. Blattzier. C. esculenta Schott, s. Caladium escul. Vent.

Colocynthis T. (sc. Cucūmis) L. (Cucurbitac., XXI. 10) „Coloquinten“-Gurke, fr. coloquinte (pomme de -), coloquinelle unechte Coloq., e. bitter-gourd (-apple), coloquintida (gr. *κολοκυνθίς* v. *κόλον* Eingeweihe u. *κύπεω* bewege — drastische Wirkung, Wtst.!), s. Trichosanthes amāra L.

Columbaria Thouill. (Dipsaceen, IV. 1) Taubengrindrose (v. columba Taube), C. vulgaris Presl = Scabiosa Columbaria L.

- Columnēa** Plum. L. (Gesneraceen, XIV. 2) „Columnee“ (n. Fab. Columna, aus d. ital. Geschl. d. Colonna, neapol. Bot., s. d. Aut.), Topf. C. scandens L., Schiedeana Schldl., aurantiäca Deesn., cochinchin. Poir. (Achimenes coch. Spr.), erecta Lam. (Trevirania er.), trifoliata Lk. (violacea Jacq. f.), s. Stemodia suffriticosa, etc.
- Columnifērae** Bartl. Ord., Endl. Kl. d. Säulenfruchtgew. od., „Säulensträger“ (columna Säule, fero trage).
- Colurna** (sc. Corýlus) L. (Cupuliferen, XXI. 5) Byzantiner Haselnuss (colurnus aus Haselholz).
- Colutēa** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Blasenstrauch, fr. baguenaude (-dier), faux séné (séné bâtarde), e. bladder-Senna (gr. *ζολούτέα* (-λυτέα od. -ία) Schotenbaum wie Johannisbrodt., F. W. Riemer, Wtst.: v. *ζολούώ* verstümmle — als Gestr. leicht zu zerstören!), Zier. C. arborescens L. m. v. v.), C. cruenta Ait. s. orientalis Lam. (humilis Scop.), C. caspica M. B. (Sphaerophysa DC. „Kugelblase“), C. annua Murr. (Lessoria ann. DC.), C. frutescens L. m. v. grandiflora Hort., fr. bag. d'Éthiopie, s. Sutherlandia frut. R. Br.
- Comaclinium** Scheidw., Planch. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Schopflager“ (*ζόμη* lat. coma Haarschopf, *χλίνη* Bett, Lager — Blumenboden!), Zier. C. aurantiacum Van Houtt., s. Tithonia splendens Hortul.
- Comārum** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Blutauge Grck., Fünfblatt-Gänsekraut, fr. comaret (gr. *ζόυαρος* Frucht d. Erdbeerbaums, F. W. Riemer — ähnl. Frucht! Wtst.), C. palustre s. Potentilla pal. Scop.
- Combretacēae** R. Br., -tēae DC. (zu Ord. Calycanthīnae Bartl.) Langfadenartige, s. sogl.
- Combrētum** Löffl. (Onagreen Myrobalaneen od. Combretac., VIII. 1) Langfaden Leun. (bei Plinius nicht näher erkl. Schlingpfl.), Warmh. C. obtusifolium Löffl. Leimbaum (Bras.), C. purpureum Lam., s. Poivréa coccinea DC., C. macrophyllum etc.
- Commelinā** Dill., L. (-līna Hoffmg.) (Commelinaceen, III. 1) Scheidenod. Schilfslilie, Tagblume, fr. commeline, e. day-flower (n. Casp. Commelyn, Prof. z. Amsterdam, † 1731, s. d. Aut.), Garten C. coelensis W. (tuberosa L.) m. v. v., e. blue day-flower. — Commelinacēae R. Br. (zu Juncinæ Bartl.) Gras- od. Schilfslilien.
- 1) **Commersonia** Forst. (Büttneraceen, V. 5) „Commersonie“ (n. d. franz. Bot. u. Reis. Commerson, s. d. Aut.) C. diphylla Andr. (Büttneria dasypylla Gay (Str. Neuhol.), echinata L. (Resteria alba Rumph.) (B. Austral.). 2) **Comm.** Sonner. (Melaleucaceen, XVI. 8), C. speciosa Sonn., s. Barringtonia spec. L. (B. Australozean).
- Comocladia** P. Br., L. (-dium Sm.) (Terebinthac. Cassuvieen od. Anacardieen, III. 1) „Schopfzweigbaum“, Kotbaum (= weg. d. Geruchs), unechtes Brasilienholz, fr. comoclade (*ζόμη* u. *χλίδος* Zweig — Blattbüschel an d. Zweigspitzen, Wtst.), C. angulosa W. (Dodonea Plum.) (Str. Amer.), dentata L. (B. Südamer.), etc.
- Compositae** Adans. Bartl., Endl., Ord. d. Zusammengesetzten (Korbod. Vereinsblütler) (zu Kl. Aggregatae Endl.) (v. compōnō Part. Pass. -positus).
- 1) **Comptonia** Banks, Schreb. (Taxaceen od. Myricac., XXI. 3) „Comptonie“, fr. comptonie (n. H. Compton, Bisch. von London, Banks' Freund, in Fulham), Zier. C. asplenifolia Banks, s. Liquidambar aspl. L. u. peregrina L. (Myrica aspl. L.). 2) **C.** Duham. (Farne, XXIV. 1), C. Ceterach, e. sweet Fern-bush.
- Conanthēra** Rz. Py. (Liliac., VI. 1) „Kegelanthere“ (*κερνος* lat. conus Kegel, *ἀρθροῦ* Staubbeutel — diese zu einem Kegel zusammengelegt! Wtst.), C. Echeandia Pers. (Echeandia terniflora Ort.), C.

- Forsteri Spr. (*Anthericum Adenanthera* Forst.), *C. bifolia* R. P., s. *Bermudiana bulbosa* Trew (Chili).
- Confervae** Ag., Lk. (Algen od. Confervac., XXIV. 3) Fadenalge, Wasserfaden, fr. lin-marin (v. conferveo gähre, heile zusammen, Plin.; st. conferta v. confercio verdichte, Paxton — ungewiss!), *C. rivularis* L. Bach-W., fr. plante-éponge? — Confervaceae Ag., DC. Ord. d. Fadentange, -væae Kütz. Fam. d. Conferven.
- Coniferae** Juss., Endl., Bartl., Rehb., Ord. d. „Zapfenträger“ (Nadelhölzer) (conus Kegel, Zapfen, fero trage) (Carrière: Cupressineen, Abietineen, Araucarieen, Podocarpeen, Taxineen u. Gnetaceen).
- Coniomorpha** Otth. (*Silenac.*, X. 3) „Kegelfrucht“-*Silene* (zōīōr dem. v. zōīōs Kegel, μορφή Gestalt), s. *Silene conoidæa* L. kegelkelchiger Taubenkropf Grck.
- Coniomyces** Fr., Endl. „Staubpilze“ (v. zōīā Staub, μύζος, -ητος Pilz (μύζος). -myci Nees Ord. d. Staubpilze.
- Conioselinum** Fisch. (Umbelliferen, V. 2) „Schierlingssilje“ (v. *Conium* u. *Selinum*, s. d.), *C. tataricum* Fisch., s. g. Maludenwurz.
- Conium (Conium)** L. (Umbelliferen, V. 2) Schierling, fr. fénouil-sauvage „wild. Fenchel“, e. wild-cicely u. hemlock, auch kecks (kex) (gr. zōīētor od. zōīōr, nicht n. Linné v. zōīōs Staub od. Asche, sond. v. zōīōs Schwindel od. Wtst. v. zōīōθai schwindelig werden).
- Connaraceæ** DC., R. Br., -ræae (sc. *Terebinthacæ*) Rehb. Stechdornartige, s. sogl.
- 1) **Connarus** L. (Terebinthac. Connareen, XVI. 5) Stechdorn, Baumbohne Dietr., fr. connare (gr. zōīrāos lat. *Connarus* i. q. *Paliurus* Stechdorn), *C. decumbens* L. (*Amphinomia* DC.), pubescens DC. (Robergia Schreb.), africanus Lour. (*Omphalobium* G., DC.). 2) **Connarus** Thb. (Malvaceen, XVI. 1), *C. decumbens* Thb., s. *Hermannia triphylla* L.
 - Conoclinium DC. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Kegelbett“-Blume (zōīōs lat. conus, zōīē Bett-Blumenboden — dies. kegelf.), Zier. C. janthinum Moore, s. *Hebeclinium* janth. DC. = *Eupatorium coelestinum* L. himmelbl. Wasserhanf (Bras.).
 - Conomorpha** DC. (Myrsineen, V. 1) „Kegelgriffel“ (s. v., μορφή Gestalt — kurz. Griff. fast kegelf. Wtst.).
 - Conophallus** Beccari (Aroideen, XX. 9) „Kegelphallus“ (s. v., φαλλός Pfahl, männl. Glied, lat. palus — näml. d. Blütenkolbe!), *C. Titannum* E. Becc. Riesen-Arum (Sumatra).
 - 1) **Conophora (-ros)** (Proteaceen, IV. 1) „Coniferen“-Silberbaum (s. v., φορός tragend), *C. capensis* Pet. Gaz., s. *C. pini* folio Petiv. = *Protea* *nana* Thb. (Leucadendron Berg.). 2) **Conophora** DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) Kegel-Pestwurz (— Fruchtbod. m. schmal. unfruchtb. Kegel, Wtst.), s. *Cacalia* L.
 - Conopsea** (sc. *Orchis*) L. (Orchideen Ophryd., XX. 1) Fliegen-O. (gr. zōīōψ, -ωτος Mücke, Entomologie: *Conops* L. Stechfliege), s. *O. conopsea* R. Br. (*Satyrium conopseum* Wahlbg.).
 - Conopsisidium** Wallr. (Orchid. Ophryd. XX. 1) „Stechfliegen“- od. Ku-kuks-O. (s. eb. u. εἰδομαι gleiche), *C. platanthērum* Wallr., s. *Platanthera chlorantha* Custer, etc.
 - Conostylis** R. Br. (Liliac. Hämodorac. od. Amaryllideen, VI. 1) „Kegelgriffel“-Lilie (s. v., στυλίς Griffel — dies. kegelf. verbreit., Wtst.), *C. aculeata* R. Br. etc. (Neuholl.), *C. americana* Pursh, s. *Argolasia aurēa* Pursh „Weisszottige“.
 - Conringia** Heist. (fehlerh. Coringia autt.!) (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Conringie“ (n. H. Conring, Prof. z. Helmstädt, † 1681), z. B. *C. orientalis* Andrcz., s. *Erysimum* or. R. Br. (Brassica or. L.) morgenländ. Schotendotter.

Consolida (sc. *Delphinium*) L. (Ranunculac., XIII. 3) Feld- od. Acker-rittersporn, fr. riste-perle (v. *consolido* befestige, heile zusammen, Chirurgie: *Consolidae regalis flores!*).

Contortae Bartl. Ord., Endl. Kl., Rchb., Fam. d. Drehblütigen od. „Contorten“ (— Blüten drehen sich auf, contortus zusammengewunden v. contorqueo), s. *Apocynæa* Juss., DC.

Contra (sc. *Artemisia*) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Wurmsamen- od. Zittwer-Beifuss (contra gegen — nämл. d. Samen geg. Würmer!).

1) **Contrayerva** (-ba) autt. (sc. *Milleria*) (Compos. Millerieen, XIX. 4) „Gegengift“-M., Giftwurz, e. *contrayerva*, s. *Flaveria Contr.* Juss. (span. = lat. contra u. herba „Gegenkraut“). 2) **C.** (sc. *Dorstenia*) L. (Urticac. Artocarpeen, IV. 1) wurtmtriebende Dorstenie, peruan. Giftwurzel.

Convallaria L. (Sarmentac. od. Smilaceen, VI. 1) Maiblume, Zauke O. W. (fehl. Zanke autt.), fr. *convallaire*, e. may-flower (park-), liriconfancy (v. *convallis* = rings umschloss. Thal), C. *majalis* L., fr. muguet, lis de mai (- des vallées), e. may-lily, convally (lily of t. valley) (flores Liliorum *Convallium* Apoth.), s. *Polygonatum majale* Allioni.

Convallium T. i. q. *Convallaria majalis* L. (s. eb.).

Convolvulacæa DC., Rchb., Endl. Ord. (zu Kl. *Tubifloræ* Bartl.), -vuli Juss. Winden, s. sogl.

Convolvulus T., L. (Convolvulac., V. 1) „Winde“, fr. liserole (-ron, liset), e. winder (wind-rope), rope od. bind-weed (v. *convolvo* winde zusammen — Nachts u. bei Regen!), C. *arvensis* L., fr. fleur des champs, Zier. C. *tricolor* L. m. v. v., z. B. v. *azureus* Hort.

Conyza L. (sc. *Inula*), DC. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Dürrwurz, Flöh-kraut, fr. conize (-se), chasse-puce, e. flea-bane (nach Ambrosinus v. *zorvica* syncop. *zvrvica* Krätze, wogeg. in Anwendung, od. v. *zoria* Asche — als klebr. Pfl. damit behaftet, Wst. — ungewiss!), C. *squarrosa* L. (*Inula Conyza* DC.) sparriger Alant, fr. herbe aux cousins u. buchante, C. *retusa* DC., fr. galiette (saliette „Scharfgesalzene“ Wolff) etc.

1) **Cookia** Retz., Sonner. (*Kookia* Rchb.) (Aurantiaceen, X. 1) Wampee-od. Südsee-Orange (n. d. Erdunsegler Jam. Cook, + 1779), z. B. C. *punctata* Sonner., s. *Quinaria Lansium* Lour. (B. Südchina), C. *chlorosperma*, etc., s. *Glycosmida* Spr. (-osmis Corr.). 2) **Cookia** Gmel. (Thymeläen, VIII. 1).

Cooperia Hook. (Amaryllideen, VI. 1) „Cooper's“-Narzisse (n. d. Gart.-Insp. Jos. Cooper zu Wentworthhouse, Earl Fitzwilliam, od. Dan. Cooper, schr. Fl. metropolit., Lond. 1833—35, Wst.).

Copaifera L. (Cassieen Ceratonieen, Amyrid. od. Polygalac., X. 1) „Co-pai-vabalsambaum“, fr. copahu od. cupaiba (-ayba) (n. d. brasil. Nam. d. B.'s *copaiba*!), C. officinalis L.

Copallinum (sc. *Rhus*) L. (Terebinthac., V. 3) „Copal“-Sumach, fr. copal (-palle, -palline, -palme), e. copal (vaterl. — lief. d. Copalgummi od. -harz!).

Copernicia Mart. (Palmen, VI. 1) „Copernicus“- od. Wachs-P. (n. d. Astronomen Nic. Copernicus, † 1543), C. cerifera Mart., s. *Corypha cer.* autt.

Coprinus Pers. (Pilze, XXIV. 4) „Mistpilz“, -schwamm (gr. *κόπτηρος* v. *κόπτω* Kot od. *κοπτοία* Misthaufen), z. B. *atramentarius* Pers. „Tintenschw.“, *fimetarius* L. „Dungschw.“

Coprosma Forst., L. f. (Rubiac. od. Apocyneen Carisseen, XXIII. 1) „Kotduft“ (s. eb., *δομήν* Geruch etc.), z. B. C. *foetidissima* L. f., *hir-tella* Lab., *lucida* L. f. (Str. Neuseel.).

Coptis Salisb. (Ranunculac., XIII. 7) „Spaltblatt“-Nieswurz (v. *κόπτω*

spalte etc. — verschnitt. Blätter!), *C. trifolia* Sal. = *Helleborus trifolius* L.

- 1) **Corallīna** T. (Florideen od. Blütentange, XXIV. 1) „Korallentang“, -moos, fr. coralline, e. coral-moss (v. *corallino*, -na ital. koralle-farbig). — *Corallinēa* Decsn. Korallentange (zu Ord. Floridēae Ag. Blüten- od. Rot-Tange). — 2) **Corallīna** (sc. *Mespilus*) Rissó (Pomaceen, XII. 4) „Korallen“-Mispel.

- 1) **Corallodendron** T. (-drum) (sc. *Erythrīna*) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Korallenbaum“, „Korallen“-Scharlachblume (*ζωρίλλιον* rote Koralle, δέρδορ B.). 2) **C.** Jungh. (Schimmelpilze, XXIV. 4).

Corallorrhīza Rupp. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Korallenwurz“ (s. v., ὄζα Wurzel — diese wie ein Korallenstock geformt!), z. B. *C. innata* R. Br. gem. K., s. *Ophrys* Cor. L.

Corbularia Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Korb“-Narzisse (v. *corbula* Körbchen — Form d. Nektariums!), z. B. *C. albicans* Haw. (Narcissus a., Pseudo-Narcissus juncifolius Clus.).

Corehōrus L. (Tiliaceen, XIII. 1) Nesselröschenstrauch (gr. *ζόζοζος* schlecht. Gemüse, bei Theophr. = *Anagallis arvensis* L., v. *ζοζώ* reinige — abführend! Wtst.), z. B. *C. olitorius* Trew Muspfl. Diétr., Moluchiagewürz, fr. corette, *C. capsularis* L., s. g. Jute (Bast- od. Textilgew.), Zier. *C. japonicus* L. (*Kerria* jap. DC., Rosaceen) japan. Ranunkelstr., s. g. Judenpappel, fr. mauve des juifs, e. jew's-mallow.

- 1) **Cordaea** Nees (Lebermoose, XXIV. 2) „Corda“-Leberm. (n. d. Bot. u. Reis. *Corda*, s. d. Aut.). 2) **Cordaea** Spr. (Papilionaceen, XVII. 4).

Cordia L. (Convolvulac. od. Boragineen, V. 1) Brustbeere (n. *Euricium Cordus*, Arzt in Bremen, † 1535), z. B. *C. Myxa* L. schwarze Br., Sebéstenenbaum, fr. sebestier, *C. scabra* DC. Rosenholz von Martinique, etc.

Cordiēra Rich. (Rubiaceen Guettardeen, XXI. 7) „Cordiere“ (n. *Cordier*, schr. Guide de l'amateur des champignons, Par. 1826 u. a.), z. B. *C. triflōra* DC., etc.

Cordyceps Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Keulenkopf“ (v. *ζορδίλη* Kolbe etc., -ceps in compos. = caput Kopf), z. B. *C. capitatus* u. *purpurēus*, s. *Claviceps* p.

- 1) **Cordyline** Comm., Pers. (Liliac. Smilac. od. Asphodeleen, VI. 1) „Kolbenlilie“ (s. eb. — bez. d. Wurzeln!), Zier. *C. australis* Lindl., s. *Dracaena* u. *Dianella* austr., Stuben: *C. (Drac.) stricta*, *cannae-folia*, *nutans*, *lentiginosa*, *Haageana* etc. 2) **Cordyline vivipāra** Hort., s. *Chlorophyllum Sternbergianum* Steud. (*Anthericum*).

Cordylocarpus Desf., Sm. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) Keulenrettig D., „Keulenfrucht“ (*ζορδίλη* Kolbe etc., *ζαρτος* Frucht), z. B. *C. glaber* Desf., *muricatus* ds. etc., s. *Erucaria aleppica* G.

Coreopsidēae Less., DC. Wanzenblumenartige, s. sogl.

Coreopsis L. (Coriopsis) (Composit. Heliantheen, XIX. 3) „Wanzenblume“, „Mädchen“- od. „Schönauge“, fr. coréope (v. *ζόης*, -ιος Wanze od. *ζόη* (*ζώη* od. *ζοΐη*) Mädchen? *Ὄψις* Aussehen, Auge — Samenform wanzenartig!), Zier. *C. tinctoria* Nutt. (*Calliopsis* t. DC. s. *bicolor* Hort. m. v. v., z. B. *nana* Hort. u. *nana purpurea* Hort., v. *marmorata* Hort., *C. Drummondii* Torr., Gray, *C. coronata* Hook., *auriculata* L. etc., s. *Calliopsis* Rchb. u. Bidens L.

Corēta P. Br. (sc. *Corchorus*) L. (Tiliaceen, XIII. 1) „Putz“-Corchorus (v. *ζοούω* reinige, putze etc.), s. *Corchorus siliquosus* L.

Coriandrum Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Koriander“, fr. coriandre, e. coriander (v. *ζόγουρ* od. *ζογούρον* v. *ζόης* Wanze — weg. d. Geruchs!), s. *Corion* Hoffmg. — *Coriandrēa* Koch.

- 1) **Coriaria** Niss., W. (Rutac. od. Coriarieen, XXII. 9) „Gerber“- od. „Lederstrauch“, fr. rédoul od. rédoux, herbe faux-tanneurs (lat.

corium, gr. *χόριον* Leder), z. B. *C. nepalensis* u. *myrtifolia* L. 2) **Coriaria** (sc. *Rhus*) L. (Terebinthineen, V. 3) Gerber-Sumach, fr. corovière od. roux (rouvre) des corroyeurs, e. hide-tanning-Rhus, elm-leaved Sumach-tree. 3) **Coriaria** Pall. (*Plumbagineen*, V. 5) „Lederblatt“, s. *Statice latifolia* Sm. s. *cordata* L. — *Coriariæ* DC. (zu Rutaceae Simarubeae Rchb. (Ord. Malpighiæ Bartl.) Ledersträucher.

Coricum Ker (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Jünglings“-O.? (v. *χόριξ*, -*ιζος* Jüngling?), z. B. *bicolor* etc., s. *Corycium* Sw.

Corindum T. (Sapindaceen, VIII. 3) „indianisches Herz“, fr. corinde, s. *Cardiospermum Corindum* L. brasil. Herzsamen (cor, -dis Herz, indus indianisch — Same schwarz m. weiss. herzförm. Keimwarze, Wtst.).

Coringia Rehb., DC. s. *Conringia*!

Corion Hoffmg., Lk. (Umbelliferen, V. 2) „Koriander“, s. *Coriandrum*, z. B. *testiculatum* Lk. (*Coriandrum t. L.*), s. *Bifora flosculosa* M. B. (*χόριον* vgl. *Coriandrum*).

1) **Coris** T., L. (Primulac. od. Personaten Selagineen, V. 1) Erdkiefer, fr. coris od. cauris (*χόρις* Wanze — Ansehen der Blume! coreos herba d. Apoth.), z. B. *C. monspeliensis* L. blaue Erdkiefer, s. *Coris quorundum* Clus. (*Symphytum petraeum* Cam.). 2) C. (sc. *Hypericum*) L. (Creta, Zierpfl.).

Corispernum L. (Amarantaceen, I. 2) „Wanzensamen“, fr. corisperme (s. v., *στέγων* Samen), z. B. *intermedium* (*Kali folio gramineo* Loes.), *squarrosum* L. u. *hyssopifolium* L.

Cormophyta Endl. Stock- od. Achsenpflanzen (*χορυός* Stamm etc., *φυτόν* Pflanze).

Cormus Spach (Pomaceen, XII. 3) Spierlingsbaum, Spierling (s. eb.), *C. domestica* Spach = *Sorbus domestica* L., fr. corme (-mier), sorbe (-bier).

Cornacæae Grck., -næae DC. Endl. Cornellengew. Grck. (zu Araliaceae Rchb.), s. *Cornus*.

Cornelia Hardw. (Lythrarieen, IV. 1) „Corneliuskraut“ (n. Herm. Cornelius, schr. Catal. horti publ. Amstelodami 1661), z. B. *C. verticillata* Arduin., s. *Ammannia baccifera* L.

Corniculatae Endl. Kl. der Horn- od. Gehörntfrüchtigen (corniculum Hörnchen) (zu Kl. Sediflorae Calycantheae Rchb.).

1) **Cornueopiae** (sc. *Fedia* G., sc. *Valeriana* L.) (Valerianeen, III. 1) „Füllhornkraut“, algerischer Baldrian, fr. Valeriane d'Alger od. corne d'abondance (cornu Horn, copia Fülle). 2) **Cornucopiae** L. (Gräser, III. 2) „Füllhorngras“, z. B. *C. cucullatum* L. halskappiges od. morgenländ., fr. coqueluchiole, s. *Alopecurus*.

Cornus T. (Cornaceen, IV. 1) Hartriegel, Hornstranch, Cornelstr., „Cornelle“ Grck., fr. cornouille (-ler), e. cornel-tree, cornelian-, dog's-berry-tree, dog-wood, gatten-wood, auch privet (v. *cornu* Horn — weg. d. Härte d. Holzes!), Zier. C. mas L. Cornelkirsche, Durlitze, fr. cornouiller māle, Cornilles, e. cornelian-cherry-tree, s. C. mascula l'Hér.; C. *sanguinea* L., fr. sanguinelle od. sangain, gem. Hornstr. C. *florida* L. (Benthamidia flor. Spach) Blumen-H., fr. c. fleuri, e. showy C. od. flowered-dog-wood; C. *canadensis* L., fr. herbacé.

Cornutia Plum., L. (Verbenaceen, XIV. 2) „Cornutie“ (n. Jacques Cornut, lat. *Cornutius*, franz. Nat. u. Reis., schr. *Canadensium plant. hist.* 1635), z. B. *punctata* W. (*Hosta coerulea* Jacq.), pyramidata Spr., *staminæa* Vahl, etc.

Corolliflorae DC. Kl. d. Kronblütigen od. Ganzblumigen (Monopetalae Juss.) (corolla Blumenkrone).

- 1) **Coronaria** A. Br. (sc. Agrostemma) L. (Sileneen od. Caryophylleen, X. 4) Garten- od. „Kranzrade“ Grck., s. Lychnis Coronaria Lam. u. Coronaria tomentosa A. Br. (Zier.). 2) C. (sc. Lychnis) Moris. i. q. Lychnis Flos Jovis Lam. (Agrostemma fl. Jov. L.) schirmtraub. Lichtnelke M. Rchb. 3) **Coronaria** Flos cuculi A. Br. Kukucks-Kranzrade (— Lichtnelke), s. Lychnis fl. cue. L. (v. corona Kranz — näm. kleiner um den Schlund der Blume!).
- Coronarieae** Endl., Rchb. Kl. der Kronlilien Endl. (corona Krone — schöne Blumenkr.).
- Coronilla** Neck., L. (Leguminos. Coronilleen, XVII. 4) Kronwicke, „Krönlein“ O. W., fr. coronille, sain foin d'Espagne, e. sickle-wort (dem. corona — Blütenstand!), Zier. C. glauca L. (Mirabellenduft!), variegata, Emērus L. s. g. Peitsche, montana Scop., C. Securidaca L. „Beikr.“, wild C. varia L. (— bunte Krone!). — Coronillæ DC. Peitschenartige.
- 1) **Coronopus** Hall. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Krähenfuss“, Feldkresse, Zwang O. W., fr. coronope (*ζωόνη* Krähe, *πούς* Fuss, Cor. Ruellii All.), s. Cochlearia Coronopus L. (Senebiera Cor. Poir.). 2) **Coronopus** (sc. Plantago) L. (Plantagineen, IV. 1) Krähenfuss-Wegerich (Plant. coronopifolia Roth).
- Corothamnus** Presl. (Papilionac. Genisteen, XVII. 4) Zvergginstter, „Besenstrauch“ (*ζωγός* Besen, *θάυρος* Strauch), z. B. C. decumbens Dur. (Genista prostrata Lam.).
- Corréa** Sm., Andrews (-raea Hort. Kew., -reia Vand.) (Rutac. Diosmeen, VIII. 1) neuseeländ. Thee (n. d. Bot. Correa da Serra in Portugal, † 1823, s. d. Aut.), Treibh. C. ampullacea, bicolor, formosa, speciosa etc., s. Gomphia DC.
- Corrigiola** L. (Paronychieen od. Portulacac., V. 3) Hirschsprung, Strandling, Linge O. W., fr. corrigiole (dem. v. corrivia Schuhriemen), C. littoralis L. — Corrigiolaceæ (sc. Portulacæ) Rchb.
- Cortinaria (-us)** Fr. (Blätterpilze, XXIV. 4) Fasersaum-Pilz, „Spinnwebschleier“ Kumm. (v. *cortina* Bettvorhang, fr. courtine, Schwammhäutchen d. Pilze!), C. castaneus Fr. etc.
- 1) **Cortusa** L. (Primulaceen, V. 1) Alpenprimel, Heilglöcklein, Bärsnikel Rmpl., fr. cortuse, e. mountain-Sanicle (n. d. Prof. J. A. Cortusi, latin. *Cortusus*, zu Padua, † 1596, s. d. Aut.), C. Matthioli L. 2) **Cortusa** arundianacea Plum. (Cannaceen, I. 1), s. Thalia geniculata Rottb. 3) **Cortusa** americana Herm. (Saxifragac., X. 2), s. Tiarella cordifolia L.
- Coryphanthes** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Helm“- od. „Schopf“-O. (*ζόρως* Helm, Schopf, *ἄνθη* Blüte — Oberlippe helmförmig! Wtst.), z. B. Bruchmülleri Rchb. f., speciosa Hook., macrantha ds. (Gongora m. Hook.), etc. (Südamer.).
- Corycium** Sw. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Helm“-O., „Helmring“ D. (gr. *ζωώνιον* dem. v. *ζωώνος* Köcher, Sack etc. — oberst. Blütenblatt ähnl. geformt!) (vgl. Coricium Ker), z. B. C. bicolorum Sw., crispum Sw. (Arethusa cr. Thb.), etc.
- Corydalis** DC. (Fumariaceen, XVII. 2) Hohlwurz, Lerchensporn, Kappenmohn D., fr. coridale (-rydale), fume-terre „Erdrach“, e. hollow-root, birth-wort (*ζωνδαλίς* Schopflerche — lerchenspornartige Nektarien!), s. Fumaria L., Zier. C. lutæa DC. (Capnoïdes l. DC.), C. nobilis Pers. u. ochroleuca K., wild: C. cava Wahlbg. „Hohlwurz“, C. solida Sm. (bulbosa DC.) „Derbwurz“, etc.
- Corylopsis** Sieb. u. Zucc. (Betulac. od. Hamamelideen, XXI. 8) „Scheinhasel“ (Corylus u. *ψύξ* Aussehn), Zier. C. spicata S. Z.
- Corylus** T., L. (Betulac. od. Cupuliferen, XXI. 8) Haselstrauch, fr. coudrier od. noisetier, e. hazle-tree (-nut), auch blea od. bleak (v.

Corymbiferae — Cossignia.

ζόονς Helm — Form d. Kätzchenschuppe, Wtst.), C. Avellāna L. gem. H., fr. noisetier commun, m. v. v., C. tubulosa W., fr. avéline (-inier), e. phillbert, Zeller- od. Lambertsnuss, m. v. rubra Borkh. „Blutnuss“, C. Colurna L. Byzantiner Nuss (byzantīna Desf.), fr. noix de Byzance, e. Constantinopel-hazel.

- 1) ***Corymbiferae*** Vail., Juss., DC. (zu *Synantherae* Rich., Ord. *Compositae* Bartl.) „Ebensträussige“ (v. *corymbus*, gr. *ζόνυμος* i. q. vertex Scheitel, Bot. Ebenstrauss od. Doldentraube). 2) ***Corymbiferae*** (seet. v. Rosa Lauch.) „Büscheleinrosen“.

Corymbium L. (Compos. Rolandreen, XIX. 6 od. V. 1) „Ebenstraussblume“, Wollkorn D., fr. corymbiole (s. eb.), z. B. glabrum u. scabrum L., s. *Bupleurifolia umbellata* Pluk.

Corynandra Schrad. (Capparid. Cleomeen, XV. 2) „Kolbenanthere“ (*ζοοίνη* Kolbe, *ἄρης*, *-ρύπος* Mann, Staubbeutel — diese oben kolbig!), z. B. *pulchella* Schrad. (Nepaul).

Corynephorus P. B. (Gräser, III. 2) „Kolben“- od. „Keulengranne“, Silbergras od. Bunke (s. eb., *φοος* tragend), z. B. C. canescens P. B., s. *Aira can.* L. (*Avena c.* W., Weingärtneria c. Bernh.).

Corynocarpus Forst. (Myrsineen od. Hesperideen, V. 1) „Keulennuss“ D., Kuhbaum von Neuseeland (s. v., *καρπός* Frucht), C. laevigatus Forst. (Str. Neuseeland).

Corypha L., Lam., Roxb. (Palmen, VI. 1) „Schopf“- od. Schirm-P., fr. coryphe (*κορυφή* i. q. *ζόονς* Schopf etc.), Stuben: C. s. *Livistonia australis*, rotundifolia, Jenkinsii, filifera etc. — *Coryphæae* DC.

Corysanthes R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 4) Grosshelm (*ζόονς*, *-νθος* u. *ἄνθη* — d. obere Blütenbl. ein. gross. Helm bildend !), z. B. bicalcarata, fimbriata etc.

Coscinum Colebr. (Menispermaceen, XXII. 6) „Siebsamen“ (*κόσκινον* Sieb dem. *κόσκινον*).

Cosmanthus Nolt., A. DC. (Hydrophyllaeen, V. 1) „Schmuckblume“, fr. cosmanthe (v. *κόσμος* Schmuck etc., *ἄνθος* Bl.), Zier. C. fimbriatus Nolt. (*Eutoca f.* Hort.), fr. c. frangé.

Cosmēa Cav., W. (-mia Domb.) (Compos. Senecionid., XIX. 2), „Schmuck“- Dahlie (s. eb.), Zier. bipinnata W., parviflora W. (*Coreopsis p.* Jacq.), sulphurea W. (*Coreops. artemisiaefolia* Jacq.), s. *Cosmos* Cav. (-mus Pers.).

Cosmibuēna Rz. Pv. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Weltgut“, Fieberrinde (Cosmo- in compos. Welt, bueno, -na span. gut), z. B. obtusifolia R. P., s. *Cinchona macrocarpa* Vahl s. *grandiflora* R. P.), acuminata R. P. (kl. B., Anden) etc.

Cosmidium Gray, Nutt. (Compos. Senecionid., XIX. 2) (zu *Coreopsis* L.) „Schmuckdahliengleiche“ (v. *Cosmus* od. *Cosmēa*, s. d. u. *εἰδουμαι* gleiche), Garten: C. Burridianum Hook. m. v. atro-purpureum, Engelmanni u. filiforme.

Cosmophyllum C. Koch (Composit. Verbesineen, XIX. 2) „Schmuckblatt“ (s. v. u. *γύλλον* Laub), Zier. C. cacaliaefolium s. cacaliooides Koch, s. *Ferdinandea eminens* Lag. (grossblättr. Blattpfl.).

Cosmos Cav. (-mus Pers.) (Compos. Senecionid. od. Heliantheen, XIX. 3) „Schmuck“-Dahlie (vgl. *Cosmēa* W., -mia Domb.), Zier. bipinnatus Jacq., Cav. m. v. purpurēus Hort. Rabattenschmuck Vilsm., s. *Coreopsis coronata* L.; C. diversifolius Otto m. v. atro-sanguineus Bot. Mag., s. *Dahlia Zimapani* Roezl.

Cossignia Comm. (***Cossinia*** Pers., DC.) (Sapindaceen, VI. 1) „Cossignie“ (n. d. franz. Nat. Cossigny, der dem Namengeber Commerson ein Herbar. der Coromandelküste verehrte), z. B. C. pinnata Lam., triphylla Lam. s. *borbonica* Comm. s. g. weiss. Eisenholz (Insel Bourbon), s. *Pimela nigra* Lour.

- Costa** Fl. Flum. (Diosmeen, V. 1) „Costa“-Duftraute (n. Christoph a Costa, portug. Chirurg d. 16. Jahrh.'s).
- Costus** L. (Scitamineen, I. 1) „Costwurz“, wilder Ingwer, fr. cost (costh) (gr. *κόστος*, arab. koost od. gasth „Zierpfl.“), Topf. C. zebrinus u. speciosus Sm. (Banksia sp. Kôn.), arabicus L. s. glabratus Sw. (Anonyma Merian).
- Cota** (sc. Anthémis) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) stechende Kamille M.-Rchb. (cota d. alte Name für eine Kamillenart, von d. gr. *κοτίς* od. *κόττα* Kopf).
- Cotinus** T. (sc. Rhus) L. (Terebinthaceen, V. 3) Perückenbaum, -sumach, Gelbholz, eig. „Ölbaum“ (gr. *κότυρος* Theophr. der wilde Ölbaum — zu Kränzen u. dgl. F. W. Riemer), s. Cotinus Coccygria Scop. (*κότυρος*, cotinus Sumach).
- Cotoneaster** Med. (zu Mespilus), Rehb. (Pomaceen, XII. 4) Quitten- od. Zvergmispel, -quitte, fr. néflier cotonneux, cognassier (deter. v. cotonéum Quitte), C. vulgaris Lindl. s. integriflora Med. (Mespilus Cotoneaster L.) Kutte O. W., fr. cotonéastre commun, C. tomentosa Ldl. s. coccinea Steud. (Mesp. tom. W. s. eriocarpa DC.), fr. néflier tomenteux, e. wolly Cot., C. acuminata (Mesp. ac. Lodd., Crataegus ac. Desf.), C. frigida Wall. (Pirus Nussia Hamilt.) Berg-Zvergmispel, C. Pyracantha Spach „Feuerdorn“, s. Pyracantha Spach.
- 1) **Cotula** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Laugenblume, Kuhdiile Leun., fr. cotule (dem. Cota, alt. Name für eine Kamillenart, s. Cota), Zier. C. stricta L. (Lidbeckia pectinata Berg.) (Str. Cap), alba u. herbacæa, s. Eclipta erecta L. 2) **Cotula** (sc. Anthémis) L. (Comp. Anthem.) Stink-Kamille, fr. oeil de vache, e. may-weed (Wtst. von *κοτύλη* Becher, hohle Hand etc.!).
 - 1) **Cotyledon** L. (Sedeen, X. 5) Nabelkraut, fr. cotylet (-lédon), e. hippwort (gr. *κοτυληδών* Höhlung, Gelenkpfanne, d. Pfl. „Venus-Nabel“, umbilicus Venéris), C. umbilicus L. s. orbiculata, coruscans etc. (jetzt Gartenpfl.!). 2) **Cotylédon** (sc. Saxifraga) L. (Saxifrageen, X. 2) Nabelkraut-Steinbrech, s. g. Venusnabel (umbilicus Venéris). 3) **Cotyledon** pinnata Hort. Kew. (Crassulaceen, V. 5), s. Veréa pinnata Dietr. (Bryophyllum Salisb.), Crassula Cotylédon Jacq., s. Cot. arborescens Pers.
- Couepia** Aubl. (Amygdalac. od. Myrobalaneen, XVI. 7) Guianapflaume (vaterl. Name!), C. guianensis Aubl. = Acia amara W.
- Coumarouna (Cumaruña)** Aubl. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohne od. wohlriechende Coumaroume (guian. Name cumaron), C. odorata Aubl. (Taraléa), fr. coumarou od. coumier, s. Dipteryx W., Schreb.
- Courataria** Aubl. (Lecythideen, XIII. 1) „Couratari“-Topfbaum, fr. couratari (vaterl.), C. estrellensis Raddi, s. Lecythis Couratari autt.
- Courbaril** Plum. (sc. Hymenaea) L. (Cassieen, X. 1) Heuschreckenbaum (südamer. Name!)
- Couroupita** Poir., Aubl. (Lecythideen od. Melaleucae., XVI. 8) „Couroupita“-Topfbaum, fr. couroupite, C. guianensis Aubl., s. Lecythis bracteata autt. (curupitu tumu in Guiana, Wtst.).
- 1) **Courtoisia** Rchb. (Polemoniac. od. Convolvulac., V. 1) „Courtoisblume“ (n. d. Prof. Courtois in Lüttich), C. daucifolia Rehb. 2) **Courtoisëa** Nees, Kth. (Cyperaceen, III. 1).
- Coussapôa** Aubl., Juss. (Urticac. Artocarpeen, XXII. 2) „Coussabibaum“ (vaterl. cussabi), s. Cecropia Gaud.
- Coussaréa** Aubl., Juss. (Rubiac., V. 1) „Coussaree“, z. B. C. violacea Aubl. (in Guiana coussare).
- Coutaréa** Aubl. (Rubiacen, VI. 1) „Coutaree“, Gewächsh. C. speciosa Aubl. (Str. Guiana, Nam. coutare), s. Portlandia hexandra L.

Coutoubéa Aubl. (Gentianeeen, V. 1) (vaterl. Name coutoube).

Cracea Riv., T. (sc. Vicia) L. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) Vogel-wicke, fr. vesseron od. arousses, e. bird's-tares od. ax-vetch, auch heath's-pease „Heiden-Erbse“ (v. *ζωδίω* krächze — von d. schreienden Vögeln gesucht, Wtst., od. fr. craquer krachen u. aufschneiden, d. i. lügen? — ungewiss!).

Crambe T. (Cruciferen Lomentac., XV. 2) Meerkohl (v. *κραμβός* trocken), C. maritima L. gem. M., fr. chou-marin (crambe-), e. sea-kale, Zier. C. cordifolia Stevens, fr. cr. à feuilles en coeur, tatarica Jacq. (Tatarica ungarica Clus.).

Cranichis Sw. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Schädel“-O., Helmlippe D. (v. *κρανίον* Schädel, *ἔχω* habe — d. aufr. Labell. gewölbt, concav, Wtst.), z. B. luteola, aphylla, diphylla etc., s. Polystachya Hook. (Dendrobium polystachyum Sw.).

Craniolaria L. (Bignoniacen, XIV. 2) „Schädelkapsel“, fr. craniolaire od. cornaret (v. *κρανίον* Schädel — Frucht wie ein geteilt. Vogelkopf, Wtst.), C. fruticosa L. (Gesneria fr.), annua L. (Martynia L.).

Craspedia Forst., Schreb. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Fransenblume“ (*κασσοπεῖον* Saum, Franse — frans. Saum d. Blütchen), z. B. C. uniflora Forst. (Neuholl.), pilosa Spr. (Podosperma pedunculare Rchb.) (Neuholl.).

Crassula L. (Crassulac., V. 5) „Dickblatt“ (v. crassus dick), Zier. Cr. coccinea L. (Calosanthes c. Van Houtt.), umbellata Jacq. (Septas capensis L.), falcata (Rochea f. DC.), capitata (Jonquillenduft!), Ampelpfl. spathulata, centauroides L. (Sedoïdes afric. annua Herm.) etc. — **Crassulacae** DC. (zu Ord. Succulentae Bartl.) „Dickblätter“, Saftod. Fettplf.

Crataegus L. (Pomaceen, XII. 2) Weissdorn, fr. aubépine, e. white-thorn (haw-) u. beam-tree (gr. *κράταιγος*, ob v. *κράτος* Kraft u. *ἄγω* führe? od. *κρατέω* beherrsche? crates, -is Geflecht? — unsicher!), Cr. Oxyacantha L. m. v. v., Zier. fl. puniceo, fl. albo pleno u. rubro pleno Hort., C. purpurea Bosc. s. sanguinæ Hort., fr. aub. pourpre, C. grandiflora C. Koch (Mespilus gr. Sm. s. Smithii DC.), fr. nèflier à grandes fleurs, e. Smith's-medlar, C. punctata Ait. (Azarolus Hort., Mespilus cuneifolius Ehrh. s. punct. L.), fr. aub. à fruit ponctué, C. coccinea L. (Mesp. cocc. Mill.) Scharlach- od. Koralldorn, Mehlapfelbaum, fr. aub. écarlate, C. monogyna Jacq. spitzblättr. Weissd. M.-Rchb., etc.

Crataeva L. (Capparideen, XI. 1) „Cratevas“-Kapper (n. d. Wurzelgräber Crateus od. Cratevas, s. d. Aut.), z. B. C. gynandra L. Stinkapfel od. Guakobaum, fr. poire à trois feuilles „Schleimapfelsbaum“ Wolff, C. Marmelos L., C. Tapia L. Steinapfelb., Knoblauchbirne D.

Craterellus Nees (Pilze, XXIV. 4) „Mischkrüglein“, Füllhornpilz Kumm. (dem. v. crater, -ēris Mischgefäß), C. cornucopioides.

Crenéa Aubl., Schreb. (Salicarieen, XI. 1) „Quellenweiderich“, Kerbling D., fr. crénée (v. *κρήνη* Quelle, nicht v. creneau Zinne od. crénelé gekerbt; Wtst. guian. Name!), Treibh. C. maritima Aubl. (Guiana).

Crepidæ Cass. Pippauartige s. Crepis.

Crepidotus Nees (Pilze, XXIV. 4) „Beschuhter“, Halbstiefelchen Kumm. (*κρητιδωτὸς* v. *κρητίδω*), z. B. alveolus muldenf.

Crépis L. (Compos. Cichoriac. XIX. 1) Grundfeste, Feste O. W., Pippau, fr. crémide, e. bastard-hawk-weed „Bastard-Habichtskraut“ — Schuhform od. Festaufliegen d. Blätt.? (*κρητις* Schuh, fester Stand!), z. B. Wiesen : C. biennis L., Anger : C. polymorpha s. virens L.,

- Raine etc. C. tectorum L., Zier. barbata L. (*Hieracium baeticum majus Herm.*), s. g. Christusauge, rubra L.
- Crescentia** Jacq., L. (Personat. Büchnereen, XIV. 2) „Crescentie“ (n. Pet. Crescenzi, Petrus de Crescentiis, in Bologna, † 1320), z. B. C. Cujea u. cucurbitina L. Kalabassenbaum, fr. calebassier. — *Crescentiacae* R. Br.
- Cressa** L. (Convolvulaceen, V. 1) „Creta“-Winde, Harzkraut D., fr. cresse, Cr. cretica L. f. (Cressa = Bewohnerin v. Creta).
- Crinum** L. (Amaryllideen, VI. 1) Hakenlilie, fr. crinole u. lis, e. crinum-lily (gr. *ζούρων* Lilie), Zier. C. gigantēum Hort., longiflorum Herb., seabrum Sims, americanum L., fr. lis-asphodelē Halmilie, C. africanum L. (*Mauhlia capensis* Thb. u. *Agapanthus umbellatus* l'Hér.).
- 1) **Crista galli** (sc. Rhinanthus) L. (Scrophularineen od. Rhinanthac., XIV. 2) „Hahnenkamm“, s. Alectrolōphus Hall. (crista Kamm, e. crest, gallus Hahn). 2) **Cr. g.** (sc. Erythrīna) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4). 3) **Cr. g.** (sc. Hedsārum L., sc. Onobrīchis G.) (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) kleiner Hahnenkamm (Caput galli minus Triumfetti).
- Crithāmus** (nicht Critāmus!) Bess. (Umbelliferen, V. 2) Sicheldolde (v. *ζούρη* Gerste — Standort? weg. d. Ahnlichk. d. Samens mit Gerste, Wtst.), C. Falcaria Rehb. s. agrestis Bess., s. Drepanophyllum sioides Wib. u. Falcaria Rivini Host.
- Crithmum** T. (Umbelliferen, V. 2) Meerfenchel, Bacille, fr. bacile (v. *ζούρη* Gerste — Samenähnlichk.!), C. maritimum L. (Cachrys mar. Spr.), fr. criste-marine od. passe-pierre (perce-) u. pourprier aquatique, e. sea-fennel u. samphire (-pire), auch batis.
- Crocodilium** Vaill., L. (zu *Centaurea*) Rehb. (Compos. Centaureen, XIX. 3) Grossdorn- od. Dürrkelch-Flockenblume, „Krokodil“-Fl. (gr. *κροκόδειλος* eine Pfl., v. *κροκόδειλος* Krokodil — weg. d. stachelschupp. Kelchs!), s. *Centaurea Verütum* L.
- Crocosmia** Planch. (Irideen, III. 1) „Safranschwertel“ (*κρόκος* lat. Crocus Safran, *σμυρί* Duft), C. aurēa Planch., s. Tritonia aurēa Pappe.
- Crocoxylon** Eckl., R. Br. (Celastrineen, V. 1) Safranholtz (Crocus Safran, *ξύλον* Holz — Farbe dess.), C. croceum R. Br., s. Elaeodendron (-um) crocēum DC., „safrangelb. Ölbaum“.
- Crocus** T., L. (Irideen, III. 1) Safran, fr. safran, e. saffron (*κρόκος* Theophr. urspr. ein chaldäisch. Wort, Wtst. v. *ζούρη* Faden — d. Staubfäd. z. Färben!), Zier. C. vernus All. (vernalis Jacq.) m. v. v. (lutēus u. aurēus Lam., sulphurēus u. versicōlor Ker etc.), C. sativus L. Gewürz-S., nudiflorus Sm., etc.
- Crossandra** Salisb. (Acanthaceen, XIV. 2) „Fransenanthere“ (*κρόσσος* Franse, *ἄνηρ*, *-ρδρος* Mann, Anthere od. Staubbeutel — diēse bebartet, Wtst.), C. undulaefolia Sm., s. Harrachia speciosa Jacq. u. Ruellia infundibuliformis Andr.
- Crossopetālum** P. Br. (Sapotaceen od. Celastrac., IV. 4) „Fransenkronblatt“ (s. eb. u. *πτέταλον* lat. petālum Kronblatt), z. B. fruticulosum P. Br. (Str. Westind.), s. Rhacōma Crossopet. u. Myginda Rhac. Jacq., L.
- Crossostylis** Forst., Schreb. (Sterculiac. od. Myrtaceen, XVI. 8) „Fransengriffel“, „Kranzsäule“ D. (s. eb. u. *στυλίς*, *-ιός* Griffel), z. B. biflōra Forst.
- Crotalaria** L. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Rasselhülse“, „Klapperschote“ D., fr. crotolaire, e. rattling-cod (v. *κρόταλον* Klapper), Treibh. C. purpurēa, juncēa L. s. g. Sunn od. bengalischer Hanf, s. Hallia Thb., Rafnia Thb. u. Podalyria Lam.
- Croton** L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Purgierstrauch, „Zeckensame“, Krebsblume D., fr. croton (v. *κρότων* Zecke od. Waldbock, Hundeglaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- laus), Zierblattpfl. C. Benzöö L. Gummilackbaum, pictum u. maximum, trilobatum W., sebiferum W., etc., s. Codiaeum, Clutia, Schradēra etc.
- Crowēa** Sm. (Rutaceen Diosmeen, X. 1) Purgierraute (n. Dr. J. Crowe in Norwich, Bot. u. Samml. v. Weiden), Treibh. latifolia Paxt. (Eriostemon l.), major, etc., Sommer-Zier. saligna Andr. (Str. Neuhol.).
- Crozophóra** Neck. (Euphorbiac., XXI. 9) Lackmuspflanze M.-Rchb., e. litmoss-plant, Färber-Croton W. (*zootwv* Zecke, *ροοδ*; tragend — hökr. Frucht! od. v. *χωλω* färbe? Wst.), s. Croton tinctorium L.
- Crucianella** L. (Rubiaceen, IV. 1) „Kreuzblatt“, fr. crucianelle, croisette, e. cross-wort (dem. v. crux, -cis Kreuz — Blattstellung!), Ampel C. stylosa Trin., e. petty Madder m. v. purp. Hort., angustifolia L., etc., s. Rubia u. Rubiöla.
- 1) **Cruciata** Scop., T. (zu Galium L.) (Rubiac., XXIII. 1) „Kreuz“-Labkraut (cruciatus gekreuzigt — Blattstellung!), z. B. muralis Moris., s. Valantia Cruciate L. s. muralis L. (Galium cr. Sowerb.), fr. torture d'Espagne. 2) **Cr.** (sc. Gentiana) L. (Gentianeen, V. 1) Kreuz-Enzian, s. g. Sibyllenwurz, fr. gentiane croisette, e. cross-wort Gentian. 3) **Cruciata** montana minor Burr., s. Anagallis Monelli L.
- Cruciferae** Juss., DC., Rchb. „Kreuzträger“ od. Kreuzblumige (zu Rhoeädæe Bartl.) (crux, -cis Kreuz u. fero trage).
- Cruciflorae** (sc. Thalamanthae) Rchb. „Kreuzblütler“ Rchb. (s. eb. u. flos, -ōris Blume).
- Cryphiospermum** P.-B. (Compos. Cäsilieen, XIX. 5) „Verstecksamen“ *ζουγις* versteckt, *στέμα* Samen — d. Achänen in d. Spreublättern, Wst.).
- Crypsis** Ait. (Gräser, II. 2) „Dornengras“, C. aculeata Ait., s. Anthoxanthum ac. L., C. alopecuroides Schrad. (Heleochoë al. Host) (*ζούγις* d. Verbergen — Blütenähre an d. Basis von einem Scheideblatt, Wst.).
- Cryptanthus** Klotzsch, DC. (Bromeliac., VI. 1) „Versteckblüte“ (*ζουγιτός* versteckt, *ἄνθος* Bl. — d. Blüt. stecken in d. Blattscheiden), z. B. bivittatus DC.
- Cryptocarya** R. Br. (Laurineen, IX. 1) Nusslorbeer, javan. Eisenholz Leun. (s. eb., *ζάρον* Nuss — d. Frucht steckt in d. beerenart. geschloss. Röhre d. Blütendecke, Wst.), C. glaucescens R. Br. (Neuholl.), mucronata Spr. (Cayenne), s. Laurus mucr. Poir.
- Cryptococcus** Kütz. (Pilze, XXIV. 4) Hefenpilz, Cr. fermentum Ktz. (s. eb., *ζόζος* Korn).
- Cryptogāmae** L. Verborgen- od. Undeutlichblühende, „Kryptogamen“ (s. v., *γάμος* Ehe, Blüte), -gamia L. XXIV. Kl. d. Kryptogamen (*γάμιος* hochzeitlich etc.).
- Cryptomēria** D. Don (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) Cypressen-Wachholder, Wachh.-Cypr. (s. v. u. *μητίον* Hüfte etc. — Stielästchen versteckt!), Zier. C. japonica Don (Cupressus jap. L.) s. elegans Don, s. Taxodium jap. Brong., araucarioides u. elegans Veitch.
- Cubēba** (sc. Piper) L. (Piperaceen, II. 2) „Cubeben“-Pfeffer, „Kubebe“, fr. crébèbe od. cubèbe, poivron à queue od. musqué (- de Mascaren), e. cubeb (vaterl. kupipali d. i. schlechter Pfeffer!).
- 1) **Cueubalus** G. (Sileneen, X. 3) Taubenkropf, Hühnerbiss, fr. cucubale (v. cucubo schreie wie ein Kukuk — also „Kukuksblume“ — ungew., Linné: st. cacobolus v. *καζός* schlecht, *βόλος* v. *βόλλω* Wurf!).
 - 2) **Cueubalus** Behen L. (Sileneen, X. 3), s. Silene inflata Sm. (vulgaris Grck.) aufgeblas. Taubenkr. Grck., s. g. Widerstoss, auch Wandelblume, fr. carnillet (-niolet), e. calves-foot „Kalbsfuss“!
 - 1) **Cucullaria** Raf. (sc. Fumaria) L. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) Kukuks- od. „Kapuzen“-Erdräuch, Mönchskappe, fr. cucullaire (nicht

cucūlus Kukuk, sond. cucullus Kappe, Kapuze). 2) **Cue.** Buxb. (sc. Valantia) L. (Rubiaceae, XXIII. 1) Kappenfrucht-Labkr. (— d. Fr. von d. häut. Braktee kapp. umschloss., Wtst.). 3) **Cue.** Schreb. (Vochysiaceae od. Myrobalaneen, I. 1) „Kappenkelch“, z. B. emarginata Vahl, s. Vochya brasiliensis Vand. (— einer der 5 Kelchlappen gross kap-penf., Wtst.). 4) **Cuc.** Pers. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) Kapuzen-P. od. -Morchele (— Hut am Rand unterseits angewachsen).

Cucūmis L. (Cucurbitaceae, XXI. 1c) Gurke od., „Cucumer“, fr. concombre, lat. cucūmis, -ēris Gurke od. Hohlgefäß (v. d. celt. cucc hohl od. bauchig), z. B. C. Conomon Thb. japan. G., C. Dudaim L. pers. od. wohlriech. G. (Apfelmelone), C. sativus L. Salat-G., Zier. C. metuliferus E. Mey. zackenfrucht. G., fr. c. porte-bornes, e. pronged c., C. Anguria L. Arada-G. (C. echinatus Mnch.), fr. angurie, c. arada od. marron, cornichon des Antilles, e. arada c., C. flexuosus L. Schlangen-G. (Cuc. Melo var. flex. Naud.), fr. melon-serpent, e. snake-c.

Cucurbita L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Kürbis, fr. citrouille od. courge, e. gourd od. bumpkin (pumpion) (v. curvus krumm, Paxton (?), aus cucumis u. orbis Kreis — runde Gurke! Wtst.), Zier. C. Pepo DC. (vgl. Pepo), C. perennis Asa Gray, fr. courge od. cocombre vivace, e. perennial-gourd, dipsacēus Ehrenb. (Bardana Fenzl, Momordica dasycarpa Hochst.) „Karden“-K., C. lagenaria L. „Flaschen“-K., fr. calebasse, e. bottle-gourd, C. melanosperma Naud. Malabar-K., fr. courge-boule de Siam, e. Malabar-melon, fälschl. Angurien-K. (Kletterzierpfl.). — Cucurbitaceae Juss., DC., Rchb.

Culilaban autt. (sc. Laurus) L. (Laurineen, IX. 1) „Culilaban“-Lorbeer (Ostind.) (vaterl. culitlawan — Rinde mit Nelkengeruch).

Cullumia R. Br. (Compos. Gorterien od. Arctoideen, XIX. 3) „Cullumie“ (n. Sir Thom. Cullum, schr. 1774 üb. engl. Pfl.), z. B. C. ciliaris Hort. Kew., s. Berkheya W. u. Gorteria L.

Cuminēae Koch Pfefferkümmelartige, s. Cuminum!

Cuminia Colla (Labiaten, XIV. 1) „Cuminie“ (n. Hugo Cumini, Samml. v. Pilzen 1805 im Thal v. Pisa).

Cumingia Lindl. (Liliaceen, VI. 1) „Cuming“-Lilie (n. d. engl. Reis auf d. Philippinen 1836/39 Cuming), z. B. C. trimaculata Lindl., s. Cummigia D. Don (n. Lady Gordon Cumming in Schottl.).

Cumīnum Bauh., L. (Umbelliferae, V. 2) Kreuzkümmel, plattd. Köhme Mej., Pfeffer- od. Mutterkümmel, C. Cymīnum L. Moris: echter, röm. od. ägypt. Kümmel Leun., fr. cumin (n. d. arab. kammon, gr. κυμινόν lat. cumīnum Kümmel).

Cunila L. (Labiaten od. Boragineen, II. 1) Castriersfaden, fr. cunile (filamenta castrata duo L.) (v. cuneo spizte keilförmig zu — Staubfäden, Paxton? od. conus Kegel, Wtst.? — zweifelhaft!), z. B. fruticosa W. (zu Thymus L.), s. Westringia rosmarinifolia Sm.

1) **Cunninghamia** Rich. (Coniferen Araucarieen, XXI. 9) „Cunninghams“-Tanne (n. d. Bot. u. Reis. Cunningham, s. d. Aut.), z. B. C. sinensis R. Br., s. Pinus u. Belis Salisb. 2) **C.** Schreb. (Rubiaceae, IV. 1), z. B. verticillata W. (Antirrhoea borbonica Gmel., Str., Ins. Borbon), s. Malanea Lam.

1) **Cunonia** Büttn. (sc. Antholyza) L. (Irideen, III. 1) „Cuno's“-Schwertel, Scharlach-Schmetterling (flos papilionacēus coccinēus L.) (n. J. Chr. Cuno, Kunstmätern. u. Gartendicht. z. Amsterdam, schr. 1749 Catal. sein. Gartens). 2) **Cunonia capensis** R. Br. (Cunoniaceae od. Corniculaten, X. 2) Cap-Cunonie, s. Osterdikia Burm. — Cunoniaceae R. Br. (zu Corniculatae Rchb.).

Cupania Plum., L. (Sapindaceen od. Myristicaceen, VIII. 1) „Cupanie“ (n. d. ital. Mönch u. Bot. Cupani, s. d. Aut.), C. americana L. Eisen-

- holz v. Bourbon, C. tomentosa L. (Str. Domingo) (Trigōnis tom. Jacq.), s. Molinaea Juss. u. Quiva Cav.
- Cuphaea (-ēa)** Jacq., P. Br. (Lythraceen, XI. 1) „Kelchhöcker“-Weiderich (*zígoš Höcker* — höck. Kelchgrund!), s. Lythrum Cuphea L. f., Zier. C. lanceolata Ait. m. v. v. purpurea u. nana Hort., viscosissima Jacq., miniata, acinifolia St. Hil., silenoides Nees, strigulosa Bot. Reg., platycentra Benth. etc. (bel. Zierbl. d. Gärt.).
- Cupressīnae** Rich., DC. Cypressen (zu Ord. od. Kl. Coniferae Bartl.), s. Cupressus.
- Cupressus** T. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Cypresse“, fr. cyprès, (gr. *κυπάρισσος* v. *κύω* erzeuge u. *πάρισσος* regelmässig, nicht v. Cypern!), z. B. C. sempervirens L. Pyramiden-C. m. v. funebris Häng-C., C. Lawsoniana Murr. (Chamaecyparis Laws-Parl.), C. nutkaensis Lamb. (Thujopsis borealis Fisch). — Cupressīnae Carrière: Juniperus, Widdringtonia, Frenela, Actinoströbus, Callitris, Libocedrus, Biota, Thuja, Fitz-Roya, Thujopsis, Chamaecyparis, Retinospora, Cupressus, Taxodium, Glyptoströbus, Cryptomeria, Arthrotaxis, Sequoia, Wellingtonia, Cunninghamia u. Sciadopitys.
- Cupuliferae** Rich., Rchb. (zu Amentaceae Bartl., Kl. Juliflorae Endl.) „Becherfrüchtige“ (v. cupula dem. v. cupa Napf, u. féro trage).
- Curatella** L. (Dilleniaceen, XIII. 2) „Schab“- od. „Barbierstrauch“ (v. *κουρεύω* schabe — d. Blätt. dienen in Guiana zum Glätten etc., Wtst. v. curatus bearbeitet, v. curo etc.). C. americana L. (Bstr.), Campaiba St. Hil. (Bras.), imperialis autt., s. Theophrasta imp. Juss.
- Curculigo** G. (Amaryllideen od. Liliaceen, VI. 1) „Kornwurmsame“, Rüssel-Lilie D. (v. curculio Rüsselkäfer od. Kornwurm — Samen-aussehen!), Stuben C. recurvata Dryand. m. v. fol. variegatis, C. orchoides Roxb. etc.
- Curcūma** L. (Scitamineen, I. 1) Gelb- od. Gilbwurz, fr. curcuma u. terre-mérite, souchet, safran des Indes, e. indian saffron (v. d. arab. u. ind. kurkum), s. Amōnum Curcuma L. (C. rotunda u. longa L.).
- Curmeria** Andr., Mast. (Araceen, XX. 9) „Curmerie“ (caraib. Name courimari), z. B. Wallisii Mast. u. picturata André (Neugran.).
- Cuseūta** T., L. (Convolvulaceen, V. 2) Seide, Flachsseide, fr. euscute, barbe de moine, lin de lierre (- maudit) u. cremaillère, auch teigne, e. dotter (v. d. ital. cassuto, arab. kechout Paxton, gr. *καυστήρ* flicke zusammen, verstricke — schlingend. Wachstum!), C. carinata R. Br., s. Grammīca aphylla Lour. — Cuscutaceae DC., Endl., -tēae Presl., Lk. (zu Ord. Tubiflorae Bartl., Fam. Convolvulacēae Juss.).
- Cuscutina** Pfeiff. (Cuscutaceen, V. 2) wohlriech. Flachsseide, C. suaveolens Pfeiff. (Engelmannia Pfeiff.), s. Cuscuta suav. L.
- Cyanaea** DC. (Nymphaeaceen, XIII. 1) „Blaunymphae“ (*χναρός* blau), s. Nymphaea.
- Cyananthus** Wall. (Campanulaceen, V. 1) „Blaublume“ (s. eb. u. *ἄργος*), z. B. lobatus Wall. (Nepaul).
- Cyanastrum** Cass. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Blausternblume“, Moschus-Flockenbl. (s. eb. u. *ἄστρον* Sternblume), s. Amberbōa (Centaurea moschata L.).
- 1) **Cyanēa** DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) (Centaurea sect. Cyānus).
2) **Cyanēa** Renéalm. (Gentianeen, V. 1. 3) C. Gaudich (Lobeliae-en V. 1 od. XIX. 6) „Blaulobelie“ (*χναρός* blau).
- Cyanella** L. (Liliaceen, VI. 1) Cap- od. „Cyanen“-Lilie (dem. v. Cyānus Cyane), C. capensis Jacq., C. alba u. lutēa L. etc. (— mehrere blau-blühende Arten! Wtst.).
- Cyanophyllum** Lindl. (Melastomaceen, X. 1) „Blaublatt“ (*χναρός* blau),

- gv̄llor* Laub — prächt. bläul. Blattpfl.!), Warmh. C. magnificum Lindl.
- Cyānus** Desp., Pers. (sc. Centaurēa L., zu Centaurēa sect. Rehb.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Blaue Kornblume, s. g. „Cyane“ (gr. ζυαρή), fr. aubifoin (aubiton), pérole, barbeau u. fleur d'azur (- des champs, - de Zacharie), e. bachelor's-button, blue-bottle, C. Cyānus L. (Saaten), C. montāna L., C. rosēa Bang, C. trinervia W., repens Dalech., s. Staehelina dubia L.
- Cyathēa** Sm. (Baumfarne, XXIV. 1) „Becher“- od. „Tutenfarn“ (v. ζυάθειον Becherchen — d. Sporenbehälter! od. ζύαθος Becher — ganzer Farmhabitus!), Zier. C. dealbata Hook. (Neuseel.) u. ferox (Stubenf.), C. speciosa H. B. K., s. Hemitelia spec. Kaulf.
- Cyāthus** Hall. (Lycoperdiac. Pilze, XXIV. 4) „Becherpilz“ (s. eb.), z. B. scutellaris u. Crucibūlum „Schmelztiegel“.
- Cycadēae** Rich., Endl. Ord. der Palmfarne od. Zapfenpalmen (zu Kl. Coniferae Endl.), s. Cycas.
- Cycas** L. (Cycadeen, XXIV. 1) Sagobaum, -palme (gr. ζύζας Theophr. ägypt. Palme), Treibh. C. circinalis L. (Indien, Olus calappoides Rumph., Arbor zagoë Amboinense Seb., Sagobaum v. Amboina), C. revoluta Thb. (Jap.), Warmh. Riuminiana Reg., Rumphii u. glauca Miq.
- Cyclāmen** L. (Primulaceen, V. 1) Erdscheibe, Saubrot, Alpenveilchen, fr. pain de pourceau, marron de cochon, e. hog's- od. sow-bread (gr. ζυζλαύις u. -μινορ v. ζύζλος Kreis, Scheibe — scheibenförm. Wurzelstock!), Zier. C. europaeum L., persicum Mill., vernum J. Gray (repandum Sm.), neapolitanum Tenore s. hederaefolium Koch.
- Cyclanthēra** Schrad. (Cucurbitac., XXI. 10) „Ringbeutel“-Gurke, fr. cyclanthe od. concombre grimpante (ζύζλος Ring, ἀργηὸς Staubb- beutel — Antheren als pollenhörender Ring), Zier. C. pedata Schrad. „gefingerte“, fr. c. à feuilles digitées.
- Cyclobothra** Sweet, Benth. (Liliac., VI. 1) „Zirkelgrube“, Bartkaiserkrone (s. v. u. βόθρος Grube — Nektargrube der Blumenblätter!), Stuben C. barbata Benth. (Fritillaria b. L.), alba Benth. (Californ.) (— kugl. inwend. barthaar. Blumen!).
- Cycnoches** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schwanenhals“ (ζύρος lat. cygnus (cyenus) Schwan, αἰγγὺ Nacken — lange, gekrümmte Columua), C. Loddigesii Ldl. (Surin.).
- Cydonia** T. (zu Pyrus Rehb.) (Rosaceen Pomaceen, XII. 4) Quitte, fr. coin (coing, cognassier), e. quince u. malocotoon (melicotony), quince-tree (gr. Κύδωρεα od. -ρία v. Κύδωρ, Stadt auf Creta, jetzt Canea), Garten C. vulgaris Pers., C. rosēa Pers., Zier. C. japonica Pers. m. v. v., C. sinensis Thouin (Pirus sin. Poir.).
- Cylindrocarpa** Reg. (Campanulac., V. 1) „Cylinderfrucht“, Walzen- (analog Prismatocarpus l'Hér. v. ζύλινδρος u. καρπός), z. B. Sewerzowi Reg.
- Cylista** Ait. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Grosskelch“ (v. ζύλις lat. calyx Kelch — dies. sehr gross!), z. B. C. scariosa Roxb., villosa Ait. (Dolichos hirsutus Andr.).
- Cymbalaria** Dill., Mill. (zu Linaria Rehb.) (Scrophularineen, XIV. 2) „Cymbelkraut“, fr. cymbalaire (cimb.-), Zier. u. wild C. muralis Fl. Wett., s. Linaria Cymb. T. (Antirrhīnum Linaria L.) (cymbalum „Cymbel“ od. Hohlbecken — Blatt mittten vertieft).
- Cymbaria** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Nachenkraut“ D., Nachen- od. Bootfrucht, fr. cymbaire (v. ζύλιψη Nachen etc. — Krone oben nachenf. aufgeblasen), z. B. daurica L., borysthenica Pall.
- Cymbidium** Sw. (-dia R. Br.) (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Nachen-

lippe“ (s. eb., *εἰδομαι* gleiche — *Labell concav*), z. B. *alœfolium* Sw., *ensifol.* Sw., etc.

Cyminosma G. (Rutac. Xanthophylleen, X. 1) „Kümmelraute“ (v. *ζι'μυρον* Kümmel, *ζυμή* Duft — d. Blätt. riechen wie Rosskümmel! Wtst.), s. *Jambolifera pedunculata* L. (*Jambolana* Rumph., *Caryophyllus Tangu aromaticus malabaricus* Pluk.).

Cymīnum s. *Cumīnum* römischer od. Mutterkümmel.

Cynanchum L., R. Br. (Asclepiadeen od. Apocyneen, V. 2) „Hundswürger“, Würger Schill., fr. *cynanche* od. étriangle-chien, auch *scammonée* de Montpellier, e. dog's-bane (v. *ζί'ωρ*, *-ιρός* Hund, *ζύγω* wurge etc. — viell. auch geg. d. angina der Hunde! Wtst.), z. B. *C. viminale* L. (Telfel Tavil Alp.).

Cynapiūm (sc. *Aethusa*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Hundspetersilje“, Gleisse, Garten-schierling, fr. *persil de chien* (- de crapaud, - des foux), e. dog's-persil (s. eb. u. *Apium Silje*, Sellerie).

Cynāra Vaill. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Artischoke, fr. artichaut, e. artichoke u. cardoon (gr. *κινάρα* v. *κύωρ* Hund — Schuppen wie Hundszähne), Cultur C. *Scolymus* L. gem. Artischoke, C. *Cardunculus* L. Cardone od. Cardun-Ärtisch. — *Cynaræae* Less. Artischocken-disteln.

Cynarocephālae Juss. (sc. *Synantheræae* Rich.) zu Ord. Compositae Bartl. „Distelköpfige“ (*Cynara* s. eb. u. *ξεφαλή* Kopf).

Cynoerambe (sc. *Mercurialis*) Scop. (Acalypheen, XXII. 8) „Hundskohl“, fr. chou-de-chien (zi'ωr, -i'rōz Hund u. *ζωάμβη* Kohl).

Cynōdon Rich. (Gräser, III. 2) „Hundszahn“ (s. eb. u. *οδώρ* Zahn — spitzgezähnte Spelzen), z. B. *C. Dactylon* Pers., fr. tremme, e. dog's-tooth, kriech. Hundsgras Wolff., s. *Digitaria* u. *Agrostis*; *C. virgatus*, s. *Poa chinensis* Burm.

Cynoglossum L. (Boragineen, V. 1) „Hundszunge“, fr. *cynoglosse* u. langue de chien, e. dog's-tongue (hound's-) (s. v. u. *γλώσσα* Zunge — Form u. Weichh. d. Blätter!), Zier. C. *coelestinum* Hort. (C. *Omphalodes* L.), blaues u. C. *linifolium* L. weiss. Garten-Vergissmeinnicht, s. *Omphalodes verna* Mnch., fr. *cynogl.* printanière, e. garden-forget-me-not u. O. *linif.*, fr. *argentea* od. corbeille d'argent, e. *flax-leaved-hound's-tongue*, wild C. *officinale* L.

Cynomētra L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Hundsmatrize“, -rute D. (s. v. u. *μητρα* lat. matrix Gebärmutter, „Matrize“ — handgrosse fleisch. Fruchthülsen), z. B. *cauliflōra* L. (*Cynomorium* Rumph.), *rami-flōra* L., C. *Agallocha* Spr. (*Aloëxylon Agallochum* Lour.) (Str. Cochinch.).

1) **Cynomorium** L. (Balanophoreen, XXI. 1) „Hundsrute“ (s. v. u. *μογίορ* männl. Glied — weg. d. ähnl. Gestalt d. blattlosen Schmarotzers), C. *coccineum* L. roter Hundskolben, s. *Fungus typhoides cocc.* Bocc. s. g. *Maltheserschwamm* (Balanophöra fungosa Forst.), C. *cajanense* Sw. (Cayenne), *jamaicense* Sw., C. *Balanophöra* W. 2) **Cynomorium** Rumph. (Cassieen, X. 1), z. B. *sylvestre* Rumph., s. *Cynometra ramiflōra* L.

Cynosūrs P.-B., L. (Gräser, III. 2) „Hundsschwanz“, Kammgras, fr. crételle, e. comb-grass (s. v., *οὐρα* Schwanz — ährenf. Rispe!), z. B. *coracanus* L. krummhähr. u. C. *Lima* L. feilenförm. (*Wangenheimia disticha* Mnch.), s. *Eleusine coracana* G.

Cyprarissias (sc. *Euphorbia*) L. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) Cyppressen-Wolfsmilch (*κυπαρίσσιας* v. *κυπαρίσσος* lat. *Cupressus* Cyppresse — weg. d. Blätter!).

Cyperacēae DC., Grck., Seub. „Cypergräser“, Seggen, Riedgräser Seub. (zu Ord. Glumacēae Bartl.).

Cyperoidēae Juss., Rchb. i. q. Cyperacēae (*Cyperus* u. *εῖδομαι* gleiche).

- Cypērus** L. (Cyperaceen, III. 1) Cypergras, fr. souchet, sultan, e. cypērous (v. Κύπρος cyprische Venus od. κύπερος lat. cypērus gewürzh. Pfl. d. Wassers), Zier. C. alternifolius fol. variegatis u. C. Papýrus L. „Papierstaude“.
- Cyphella** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Zitterbecher Kumm. (κύψελλον Höhlung — concave Hutform!), z. B. muscicöla Fr. etc.
- Cypripedium** L. (Orchid. Cypripedieen, XX. 1) Frauenschuh, fr. cypri-pède, chaussure de Venus, soulier de Notre-Dame, e. lady's-slipper, woman's-shoe (v. Κύπρος cyprische Venus, πέδιον dein. πέδη Fussbekleidung), Zier. C. Calceolus L., fr. marjolaine bâtarde u. sabot de la Vierge, e. common lady's-slipper, Dayanum Rchb., insigne Wall., Mauhlei, Hookerae Rchb. f., etc., s. Calceolus Gmel. Amm.
- 1) **Cyrilla** L. Gard. (Cunoniac. od. Saxifrageen, V. 1) „Cyrillo“-Cunonie (n. d. Prof. Dom. Cyrillo in Neapel, schr. pl. rar. regni Neapol., Fasc. I, Napoli 1788), z. B. antillana Mchx. (Itéa Cyrilla Sw. 2) **Cyrrilla** l'Hér. (Bignoniateen, XIV. 2), pulchella l'Hér., s. Treviranía coccinea W.
- Cyrtandra** Forst. (Bignoniateen, XIV. 2) „Krummfaden“ (κυρτός krumm, ἀνήρ, -ρθρος Mann, Staubfaden!), z. B. staminæa Forst., etc., s. Besleria L.
- Cyrtanthéra** Van Houtt. (Acanthaceen, XIV. 2) „Krummanthère“ (s. eb., ἀνθρώπα Staubbeutel), z. B. C. Ghiesbreghtii u. Ghiesbreghtiana Decsn., magnifica, etc.
- 1) **Cyrtanthus** Ait. Herb. (Amaryllideen, VI. 1) Bogenlilie, „Krummblume“ (s. v., ἀνθράξ Bl. — Tubus d. Krone lang u. gebogen, Wtst.), Zier. C. angustifolius Ait. (Amaryllis cylindracéa l'Hér.). C. M., Kennëi, obliquus Ait., etc. 2) **C.** Schreb. (Rubiaceen, V. 1), z. B. longiflorus Gm., s. Solena l. W. (Posoqueria l. Aubl.).
- Cyrtocarpa** H. B. K. (Terebinthaceen, X. 1) „Hökerfrucht“ (κυρτός hökerig, καρπός Fr. — diese oberh. d. Mitte m. 5 Hökern, Wtst.), z. B. procéra H. B. K. (B. Mexiko).
- Cyrtocellum** H. B. K. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Hökerlippe“ (s. v., χεῖλος Lippe — Labell m. hökerig. Nagel, Wtst.), z. B. undulatum Kth. u. flexuosum Hb. Bpl.
- Cyrtodeira** Van Houtt. (Gesnerac., XIV. 2) „Krumm“- od. „Höckerhals“ (s. v., δειλὸν Hals), z. B. C. cupreata Van H., s. Achiménés R. Br.
- Cyrtomium** Presl (Farne, XXIV. 1) „Krummschildfarn“ (κύρτωμα Krümmung), z. B. falcatum Presl, s. Aspidium f. Fisch., Langsd.
- Cystostylis** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1), „Krummgriffel“ (s. v., στυλίς Griffel — Columna halbstielrund u. an d. Spitze breit ohrenf.), z. B. reniformis R. Br. (Neuholl.), reflexa Spr., s. Epipactis r. Lab., etc.
- Cysticarpnos** Boerh., G. (Papaverac. Fumariac., XVII. 2) Blasen-Erdrauch“ (κύστις Blase, καπνός Rauch — Kaps. blasig aufgetrieben, Wtst.), z. B. C. africana G., s. Fumaria vesicaria L.
- Cystidianthus** Hassk. (Asclepiad., V. 2) „Blasennelke“ (s. eb., Dianthus Nelke), z. B. C. campanulatus.
- Cystopteris** Bernh. (Polypodiac.-Farne, XXIV. 1) „Blasenfarn“ (s. v., κύπειος Farm — Indusium ein eiförm. Bläschen, Wtst.), Zier. C. fragilis Bernh., e. brittle C. „brüchiger“, C. regia Presl, etc., s. Aspidium.
- Cyteophytum** Neck. (Papilionaceen, XVII. 4) „Nachenpflanze“ (κύτος, -εος Höhlung, Schiff etc., φύτον Pfl.). Cyteophyta Neck. Fam. d. Nachenpfl. d. i. Papilionaceen (mit carina!) i. q. Cyteophorae (Cytinæa) Neck.
- Cytheraea** DC. (Terebinthac. Spondiaceen, X. 4) Balsampflaume, fr. cythérée (Κύθέρεα Beiname d. Venus nach d. Ins. Cythera bei

Lakonien — schön rot u. w. Blüte u. sehr süsse Frucht), s. Spondias L.

- 1) **Cytinēae** DC., Rchb. (zu Aristolochiēae Bartl.) Wurzelschmarotzer m. verkümm. Blätt. (XX. 8). 2) **Cytinēae** s. Cytophorae Neck. Fam. d. Nachenblütler od. Papilionaceen (v. κύτος, -εος Höhlung, Schiff, carina d. Bot.).

Cytinus L. (**Citimus** Sm.) (Cytineen, XX. 8) Cistwurzel-Schmarotzer (κύτιος eig. Ansatz der Granatapfelblüte — Ähnl. d. Kelchs damit!), z. B. C. Hypocistis L. (ὑποκίστη; Schmarotz. an d. Wurzel des Cistus), s. Thyrsine Gled. u. Asarum Hypocistis L. f.

Cytipōgon Raf. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Cistwurzbart“ (Cytinus s. eb., πώγων Bart), z. B. capitatum u. virgatum Raf.

Cytisus L., DC. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Geisklee, Baumbohne od. Bohnenbaum, fr. cytise (cítise) (gr. κύτιος Kleestr. = Medicago arboréa, n. Kýthros, einer d. Cykladen, ben.), Zier. C. alpinus L. s. angustifolius Mnch. (Laburnum alp. Mill.), fr. cyt. des Alpes, C. Laburnum L. m. v. v., gem. Bohnenb. od. s. g. Goldregen, fr. ébenier des Alpes, faux ébenier, Arc-bois, e. Peascod-tree „Erbschoten“-B., bean-trefoil-tree „Bohnen-Kleebaum“, C. purpureus Scop., C. canariensis L., Rhodus- od. Rosenholz, fr. bois de Cypre, - de Rhode, Treibh. C. elongatus Waldst. u. Kit. rutenförm. u. sessilifolius L.

Czackia Bess. Andrews (zu Anthericum Rehb.) (Liliac., VI. 1) „Czackie“, unechte Zaunlilie (n. d. poln. Bot. u. Patriot. Thadd. Czacki, † 1813 zu Dubno), C. Liliastrum Andr., s. Anthericum s. Phalangium Liliastrum Pers. (Hemerocallis Lil. L.).

Czernya Presl (Gräser, III. 2) Teichrohr, Cz. arundinacea Presl = Arundo Phragmites L. (n. Joh. Czerny, schr. 1517 Ortus sanitatis).

Daboecia D. Don (sc. Andromeda L., sc. Menziēsia Sm.) (Ericaceen, X. 1) „Daboek's“-Heidestrauch (n. d. Nam. eines irländ. Heiligen Daboek), s. Erica Daboecii u. Vaccinium cantabricum Juss. „Heidelbergre v. Cambridge“, D. polifolia Don, s. Menziesia pol. Juss.

Daerydium Sol., Banks (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Thränen“- od. Gummitanne (gr. δάκρυδιον dem. δάκρυ Thräne — d. i. Harz od. Gummi!), D. cupressinum Sol. neuseeländ. Pium.

Daetylicapnos Wall. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Finger-Erdrauch“ (δάκτυλος Finger, καπνός Rauch — zusammenges. Blätt.), s. Dielytra Borkh. u. Adlumia Raf.

Daetylis L. (Gräser, III. 2) Knaulgras, Hundsgras, fr. dactyle od. chien-dent à bossettes, e. buck's-horn u. dog's-grass (v. δάκτυλος Finger — gefingerte Blüten-Knäuel!), Zier. D. glomerata L. fol. varieg. „buntes Kn.“

Dactylites Tausch., DC. (Saxifragac., X. 2) „Finger“-Steinbrech (s. eb.), s. Saxifraga tridactylites L.

Dactylon Rich., Vill. (sc. Cynodon) Pers. (Gräser, III. 2) Fingergras (s. v. — Stellung d. Ährchen!), s. Digitaria Dactylon Scop. s. stolonifera Schrad. gefing. Hundszahn Grck., fr. tremme kriech. Hundsgras Wolff.

1) **Dactylophyllum** Benth. (Polemoniaceen, V. 1) „Fingerblatt“ (s. v., φύλλον Laub — handf. gespalt. Blätt.), s. Gilia Parryae Gray.
 2) **Dactyloph.** Spenn. (Rosac. Potentilleen, V. 5 od. XII. 5) s. Sibaldia L.

Daedalēa Pers. (Hautpilze, XXIV. 4) Wirrschwamm Kumm. (δαιδαλέας künstlich, verworren — Gestalt d. Huts, Wtst.), z. B. D. querčina, abietina etc.

- 1) **Dahlia** Cav., Cass. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Dahlie“ od. Georgine, fr. Géorgine, e. common Dahlia (n. d. Prof. Dahl zu Åbo in Finnland, † 1787, s. d. Aut.), Zier. D. variabilis Desf., D. coccinea W., rosæa W., purpuræa W.-m. v. v., D. Zimapani Roezl. (Bidens atro-sanguinea Hort.) etc., s. Georgina W. — 2) **Dahlia** crinita Thb. (Hamamelideen, XXII. 1) Stellmacherholzbaum, s. Trichocladus crinitus Pers.
- Daſs** L. (Thymelæaceen, X. 1) „Fackel“-Seidel ($\delta\alpha\iota\zeta$; Brandfackel — Form d. Blütenstands!), z. B. laurifolia Jacq. s. octandra L. (Str.).
- 1) **Dalbergia** Roxb. L. (Leguminos. Hedysareen od. Dalbergieen, XVII. 3) Rosenholz, Ficatin- od. Sissuholz, D. latifolia L. (n. d. schwed. Obersten C. Dalberg, der lang in Surinam lebte). Dalbergiæ (sc. Papilionacæae Hedysaræae) Rchb. 2) **Dalbergia** phoenicea Tussac (Personaten od. Gesnerac. XIV. 2), s. Besleria sanguinæa Pers.
- 1) **Dalea** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Schorf- od. Grindbohne (n. d. engl. Bot. Thom. Dale zu Ende d. vor. Jahrh.), s. Psoralea Dalea L. 2) **Dalea** G., P. Br. (sc. Eupatorium) L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1).
- Dalechampia** Plum., L. (Euphorbiac. Hippomaneen, II. 1) „Dalechampie“, fr. dalechampe (n. d. franz. Botaniker Jacques Dalechamps, † 1588, s. d. Aut.), Gewächsh. D. scandens L. u. Roezliana Müll. s. rosæa (schön ros. Brakteen!).
- Dalibardia (da)** Mchx. (sc. Rubus) L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) „Dalibard's“-Brombeere (n. d. franz. Bot. Th. F. Dalibard, schr. Florae Paris. Prodr. 1749).
- Dalrymples** Spr. (-pœla Roxb.) (Rhamnac. od. Sapindaceen, XXIII. 2) „Dalrymplesbaum“ (n. Alex. Dalrymple, schott. Geogr., † 1808, schr. Traité s. l. découvertes etc. 1767), z. B. domingensis Spr., pomifera Roxb. etc., s. Turpinia Vent.
- Damætris** Cass. (Compos. Arctoideen, XIX. 1) „Demeterblume“, Ceresbl. ($\Delta\mu\acute{\alpha}\tau\eta\sigma$ dor. st. $\Delta\mu\acute{\alpha}\tau\eta\sigma$ Göttin Demeter od. Ceres, Wtst. v. $\Delta\mu\acute{\alpha}\tau\eta\sigma\omega$ Bezwingerin — d. Spreublättch. d. Fruchtbodens umfassen d. weibl. Blütchen!), z. B. D. pudica Cass.
- 1) **Dammära** Rumph., Mirb. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Dammarrharzbaum“, Dammar- od. Kaurifichte, fr. dammara (Nam. auf Amboina!), z. B. orientalis s. alba, australis Lamb. etc. 2) **Dammära** selanica Rumph. (Anonaceen, XIII. 6) Bitterholz, s. Xylopia or. Spr.
- Dampiéra** R. Br. (Scaevolaceen od. Campanulac. Goodeniaceen, V. 1) „Dampiere“ (n. d. Weltumsegler Capt. Will. Dampier, s. d. Aut.).
- 1) **Danña** All. (Umbelliferen, V. 2) „Danadolde“ (n. d. Bot. P. M. Dana zu Turin, Ende d. vor. Jahrh., Herausg. d. Pfl. v. Piemont), D. aquilegifolia All., s. Ligusticum aq. W. 2) **Danña** Colla (Composit.).
- Danæ** Med. (Smilaceen, XXII. 13) Traubendorn Lauch. (Danaë, Mutt. d. Perseus, Myth. — Zeus kam in Gestalt goldnen Regens zu ihr, was d. schön. Achseltrauben andeuten, Wtst.), D. racemosa Med., s. Ruscus r. L.
- Danaea** Sm. (Farne, XXIV. 1) „Dana“-Farn (s. vorh. Danaa!), z. B. alata Sm. (Caraiben-Ins.).
- Dandelion** Beckm. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) (zu Tragopōgon) „Löwenzahn“, fr. dent-de-lion, s. Leontodon u. Tragopōgon.
- Daniellia** DC. (Crassulaceen, V. 5) „Daniellie“ (n. Stefano Danielli, schr. Raccolta di questioni intorni etc. Bologna 1723).
- Danthonia** DC. (Gräser, III. 2) „Danthonie's“ Gras (n. d. franz. Bot. Danthonie), D. pallida R. Br., s. Avena Brownii Spr., D. decumbens DC., s. Triodia dec. P.-B. (Sieglungia dec. Bernh.).

- Dantia** P.-Th., DC. (Onagreen Jussieuen, X. 1) „Dantie“ od. Isnardie (n. Ant. Danty d'Isnard, Prof. z. Paris, s. d. Aut. Isnard), D. palustris Klotzsch, s. Isnardia p. L.
- Daphnanthes** C. A. Mey (subgen. v. *Daphne*) (Thymeläeen, VIII. 1) (*Daphne* u. *ἄρθη* Blüte), z. B. D. Cneōrum L., s. Cneōrum!
- Daphne** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Kellerhals, wild. Pfefferstr., Zeiland O. W., fr. thymelée, daphné, garou u. cancetille, e. spurge-olive (-laurel, -flax) (gr. *δάφνη* Lorbeer, Paxton: v. *δαΐω* brenne u. *γάρνη* Stimme — prasselt b. Brennen!?), D. Mezeréum L. gem. S., Stuben (Winterbl.): D. odōra Thb. u. *indica* L., Alpen D. Cneōrum L. rosmarinblättr. Zeiland.
- 1) **Darlingtonia** DC. (Leguminos. Mimosseen, XXIII. 1) „Darlington's“-Mimose (n. d. amerik. Bot. D. W. Darlington, beschr. in Fl. cestrica (v. Chester) 1837 d. Pfl. um Chester, Philad. 1837), z. B. brachylöba u. glandulosa DC. 2) **D.** Torr. (Sarraciaceen, XIII. 1) D.'s Schlauchtute, Fliegenfallen-Schlauch, D. californica Torr.
 - 1) **Darwinia** Rudge (Myrtaceen, XII. 1) „Darwinie“ (n. Erasm. Darwin, Arzt z. Derby, schr. Phytonomia etc.). 2) **D.** Dennst. (Thymeläac.).
 - Dasylirion** R. Br. (-ium Zucc.) (Amaryllid. od. Bromeliaceen, VI. 1) „Zottenlilie“ (*δαοὺς* rauh, zottig, *λείοτος* Lilie — haar. Blütendecken, Wtst.), Warmh. angustifolium u. juncéum, Stuben (Winterbl.) glaucum, acrotrichum s. gracile, longifolium etc.
 - Dasynēma** Schott (Dilleniaceen, XIII. 7) „Rauhfaden“ (s. v., *ῥῆμα* Ge-spinnst, Faden — Blätt. unten wollhaar.), z. B. hirsuta u. pubescens Schott.
 - Dasyphyllum** H. B. K. (Compos. Cynareen, XIX. 1) „Rauhbatt“ (s. v., *γύλλον* Laub — Blätter beiderseits seidenhaar. u. stachlig! Wtst.), z. B. argenteum Kth., etc.
 - Dasypogon** R. Br. (Juncaceen od. Bromeliac., VI. 1) „Rauhbart“ (s. v., *πώγων* Bart — d. 3 äuss. Perigonblätter bebartet, Wtst.), z. B. bromelifolius R. Br. (Neuholl.).
 - Dasypermum** Neck (Umbelliferen, V. 2) „Rauhsamen“ (s. v., *σπέρμα* Samen), s. Scandix.
 - 1) **Datisca** W. (Halorageen, XXII. 10) Streichkraut, gelber Hanf Leun., fr. cannabina, D. cannabina W. (v. *δατέομαι* verteile u. *τσῶ* meine — man glaubt, dass d. Pflanze gegen Scrophulose verteilend wirke). 2) **Datisca** Ham., Don (Resedaceen, XI. 3), z. B. nepalensis Don. — Datiscæae Presl (zu Resedacæae DC.).
 - Datūra** L. (Solanaceen, V. 1) Stechapfel, fr. dature, pomme épineuse, herbe au diable, e. apple-thorn, mad-apple (wahrsc. v. d. arab. tātōrah od. datora Wtst., lat. tatula, od. pers. tat stechen, schwerl. *δατέομαι* verteile), Zier. D. humilis Desf. (fastuosa var. flava fl. pleno), fastuosa L. m. v. duplex alba u. v. dupl. violacea Hort., fr. manteau bleu, Huberiana fl. pl., ägypt. St., D. Tatūla L., D. Metel L., D. mete-loides DC. wilde Giftpfl., D. Stramonium L. — Daturæae (sc. Solana-çæae) Rchb.
 - Daubentonia** DC. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Daubentonie“ (n. d. Nat. L. Joh. Maria Daubenton, s. d. Aut.), Warmh. D. Tripetiana Poir., puničea DC., s. Piscidia pun. Cav., s. Aeschynomène u. Daubentonia DC.
 - Daubenýa** Lindl. (Liliaceen, VI. 1) „Daubený's“-Lilie (n. d. Prof. Dr. Daubeney in Oxford, schr. on t. degree of select. by t. plants w. regard to t. earthy constituents etc. 1833).
 - Daucinæa** Koch „Möhrendoldige“, s. Daucus.
 - Daucus** T. (Umbellifer., V. 2) Mohrrübe od. Möhre (gr. *δαῦζος* v. *δαΐω* brenne — erhitz. Pfl., Wtst. — unsicher!), D. Carōta L. „Carote“ od. Gelbrübe d. Küchengartens, fr. carote (-otte).

- Davallia** Sm. (Farne, XXIV. 1) Büchsenfarn (n. d. Schweizer Bot. Edm. Davall, † 1799), s. Trichomanes. — Davalliacées Mett.
- Daviēsia** Sm. (Cäsalpinieen od. Sophoreen, X. 1) „Daviesie“ (n. d. Bot. Hugh Davies aus Wales, Mitgl. d. Linn. Gesellsch. in London, schr. 1813 üb. grossbrit. Pfl.), Gewächsh. D. corymbosa, latifolia R. Br., mimosoides ds. etc. (Neuholl.), s. Viminaria Lk.
- 1) **Davya** DC., Rehb. (Melastomac. Merianeen, X. 1) „Davye“ (n. d. engl. Nat. Humphrey Davy, † 1829), z. B. glabra u. guianensis DC., s. Lavoisiera DC. u. Platycentrum DC. 2) **Davya** Moç., Sess. (zu Sauvauja W.) (Ternstroemiac., XIII. 1).
- Dayenia** Hill. (Sterculiaceen, V. 1 od. XVI. 8) Dayenie (n. d. Due d'Ayen de Noailles ben.), D. inermis Mill., s. Ayenia pusilla.
- 1) **Decaisnea** Hook. f. (Menispermeen od. Lardizabaleen, XXII. 10) „Decaisnee“ (n. d. franz. Bot. Decaisne, s. d. Aut.), Gewächsh. insignis, s. Stackia ins. 2) **D.** Lindl., Brongn. (Orchideen).
- Decamerion** Nutt. (Vaccinieneen, XVIII. 1) Buckelbeere Lauch. ($\delta\acute{\epsilon}\zeta\alpha$ zehn, $\mu\acute{r}q\acute{o}\acute{r}$ Hüfte etc.), z. B. D. frondosum Nutt., s. Gay-Lussacia frond. Torr. Gr. (Vaccinium glaucum Mich. s. frondosum L.).
- 1) **Deckenia** Wendl. (Palmen) „Decken's“-P. (n. d. Nam. Decken geb.), D. nobilis Wendl. 2) **Deckenia** Göpp. (foss. Palmen), s. Lepidodendron (st. Dechenia? n. d. Oberberghauptm. Dr. H. v. Dechen in Bonn?).
- Decumaria** L. (Myrtac. od. Guttiferen Clusieen, XXIII. 1) „Dekumarie“ Lauch., „Zehnerblütenstr.“ (v. decimus = decimus d. Zehnte — Blume etc. zehnteilig!), D. barbāra L. echte D. (radicans Mnch.).
- 1) **Deeringia** R. Br. (Amarantac. od. Chenopodiaceen, V. 1 od. XXI. 5) „Deeringie“ (n. d. Bot. Schriftst. Dr. Charl. Deering, schr. Catal. Stirpium etc. about Nottingham 1738), D. celosioides R. Br., indīca Spr. (Celosia baccata autt.). 2) **Deeringa (-ia)** Adans. (Umbelliferen, V. 2).
- Defforgia (Desforgia)** Lam. (Campanulac., V. 1) „Desforgie“ (n. d. Gouvern. d. Ins. Bourbon Desforges ben.), z. B. borbonica Lam., s. Forgesia Juss.
- Deidamia** P.-Th. (Passifloreen, XVI. 2) (Deidamia, Tocht. d. Lykomedes, bei welcher Achilles in Frauenkleidern weilte!).
- Dejeuxia** Kth. (Gräser, III. 2) „Dejeux“- Schilfgras (n. d. Nam. Dejeux od. Deyeux geb.), D. silvatica Kth., s. Calamagrostis arundinacea Roth (Arundo silvatica Schrad.).
- Deilosma** Andrcz. (zu Hesperis Rehb.) (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Abendduft“, Nachtviole ($\delta\acute{\epsilon}\acute{\iota}\acute{\lambda}\eta$ Abend, $\delta\acute{\sigma}\mu\acute{\eta}$ Duft, Geruch), z. B. matronalis, L., inodora L. (sylvestris Crantz).
- 1) **Delairea** Lem. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Sommer- od. Schnell-Epheu (n. d. Bot. Delaire ben.) Stuben D. scandens Lem. (Mikania sc. s. Senecio mikanoides Otto). 2) **Delairea** Desv. (Sophoreen, X. 1).
 - 1) **Delima** L. (Dilleniaceen, XIII. 1) „Polierblatt“, Feil- od. Raspelstr., fr. délime (v. delimo feile ab — d. Blätt. dienen z. Polieren), D. sarmentosa L. (Tetračéa s. Dryand.). — Deliméae (sc. Dilleniaceae) Rehb. 2) **Delima** guianensis Rich., s. Begonia castaneifolia Schott (Polygonaceen, XXI. 9).
- Delphinium** L. (Ranunculac., XIII. 3) Rittersporn, fr. dauphin (-nelle), pied d'alouette, éperon de chevalier, e. lark-spur (gr. $\delta\acute{\epsilon}\acute{\lambda}\acute{g}\acute{\i}\acute{r}\acute{\i}\acute{o}\acute{r}$ dem. v. $\delta\acute{\epsilon}\acute{g}\acute{i}\acute{r}$ od. -q; Delphin — Gestalt d. geschloss. Blüte, Wst.), Zier. D. Ajacis L. m. v., z. B. v. formosum Hort., fr. pied d'al. brillant (azurbl. mit Zeich. AJAC), nudicaule Torr. u. Gr. (scharlach), elatum L., grandiflorum L. s. sinense Fisch., hybridum Hort. mit v. coelestinum Hort. u. fl. pl. Hort., triste Fisch. (rotbr.) etc. Saat: D. Consolida (auch Garten: s. g. Levkojen-R. m. v. candelábrum).

- 1) **Demidovia** Pall. (Rosac. Tetragoniaceen od. Portulacac., XII. 4) Neuseeländ. Spinat = *Tetragonia expansa* L. (Culturpfl.) n. d. russ. Grafen Demidoff, Schüler Linné's, † 1828 in Moskau). 2) **Demidovia** Hort. Mosq. (Melanthaceen, VIII. 4), s. Paris L. 3) **Demidoffia** Dennst. (Myrtac.). 4) **D.** Gmel. (Convolvulac.).
- Dendrobium** Sw. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baumwucherer“ D., — Schmarotzer-O. (δέρδον B. βίος Leben od. βιόω lebe — als Schmarotz. auf Bäumen), z. B. Warmh. *densiflorum* Wall., *speciosum* Sw., *formosum* Rxb., *albo-sanguineum* Wall. etc. (Indien).
- Dendrochilum** Blum., Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lippenorche“ (s. eb. u. χεῖλος Lippe — starklipp. B.-Schmar.!), Warmh. *nodatum* Ldl.
- Dendrolinum** Blum. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lein“ (s. v. u. *Linum Flachs* od. Lein), s. *Eria* Lindl.
- Dendrolirium** Blum. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Baum-Lilie“ (λειχον Lilie — schöne Blumen geschlossen v. Liliengestalt, Wst.).
- Dendromēcon** Benth. (Papaveraceen, XIII. 1) „Baum-Mohn“ (s. v., μήζων Mohn — mohnart. Str., Wst.), Gewächsh. *rigidum* Planch.
- Dendropémon** Blum. (Loranthaceen, VI. 1) „Baum-Schmarotzer“ (s. v., πήμων schädlich — Schmar.!).
- Dendrophthöë** Blum., Mart. (Loranthac., VI. 1) „Baum-Schwindsucht“ (s. v., φθόη Auszehrung etc.), s. *Cichlanthus* Blum.
- Dens** Leonis T. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Löwenzahn“ = *Leontodon Taraxacum* L. (— weg. d. scharfzahn. Blätter!).
- Dentaria** T. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Zahnwurz“, fr. dentaire (v. *dens*, -tis Zahn — Wurzel m. Schuppenzähnen!), D. *pentaphyllos* L. (*Saxifraga montana* Gesner), Wald: D. *bulbifera* L.
- Dentella** Forst. (Rubiac. Cinchonac., V. 1) „Zähnchenkrone“, Zahnbüllme D. (dem. v. *dens*, -tis Zahn — bez. d. zahn. Kronzipfel), D. *repens* L., s. *Oldenlandia rep.* Burn.
- 1) **Dentellaria** Raj. (Rubiac. Cinchonac., IV. 1), D. *zeylanica* „Zähnchenkrone“ v. Ceylon = *Knoxia* z. L., fr. dentelaire, herbe aux cancers „Krebsgeschwürkr.“ (d. vor. identisch?). 2) **Dentellaria** Sloan. (Plumbagineen, V. 1), s. *Plumbago scandens* L.
- Deodara** Roxb. (sc. Cedrus) L. (Coniferen, XXI. 9) „Deodara“-Ceder (v. d. indisch. Deva Dara = Gottesbaum) m. v. v. *argentea* u. *viridis* Hort. (Himalaya), s. *Pinus*, *Abies* u. *Larix Deod.* Lamb., Lindl., Koch.
- Deparia** Hook., Grev. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Becherfarn“ (v. δέπτας, -αος Becher, wie analog *Cyathea* v. ζύαθος Becher), z. B. *Moorii*, s. *Cibotium Kaulf.* u. *Dicksonia* l'Hér.
- Dermatogastères** Cord. u. *-mycetes* Rchb., „Fellbauch“- od. Hüllpilze (δέρμα, -ατος Haut etc., γαστήρ, -ερος Bauch, μύκης, -ητος Pilz).
- Deschampsia** P.-B. (Gräser, III. 2) „Deschamps“-Gras (n. d. franz. Bot. Loiseleur Des-Longchamps, † 1849), D. *caespitosa* P.-B., s. *Aira caesp.* L.
- Desclieuxa** (-cliae Moç. Sess.) (Rubiac. Coffeac., V. 1) Perlkaffee (v. d. Nam. Desclieux geb.), D. *leucocarpa* M. S., s. *Margaris DC.*
- 1) **Desfontainaea** (-ia) Rz. Pv. (enesia autt.) (Solanac. od. Gentianeen, V. 1) „Desfontainie“ (n. d. ber. Bot. Desfontaines, s. d. Aut.), D. *Hookeri* Dun., *spinosa* R. P., *splendens* Hb. Bpl., s. *Linkia peruviana* Pers. u. *splendens* Poir. 2) **Desfontainea** Arrab. (Euphorbiac.). 3) **Desfontainesia** Hoffm. (Sapindac. Fraxineen).
- 1) **Desmanthus** W. (Legumin. Mimoseen, XXIII. 1) „Büschenblütenstr.“, Büschelschopf D. (δέσμην od. -αις Bündel, ἄνθος — weg. d. Blütenstands!), D. *destillatorius* „abträufelnder“, *natas*, s. *Neptunaea olereæ* Lour. 2) **Desmanthus** Benth. (Asclepiaddeen od. Gymnanthreen,

V. 2) „Büschenbl.“ 3) **Desmantha** DC. (zu *Desmanthus* W.) (Mimoseen).

Desmidiaeae Endl. Büschel- od. Bündelalgen (s. sogl.).

Desmidium Ag. (Algen, XXIV. 3) Kettenstäbchen, „Bündelgleiche“ (s. v. u. *εἰδοματι* gleiche od. *εἰδος* Bild).

Desmodium Desv. (zu *Hedysarum* Rchb.) (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Bündelhülse“, Wandelklee, bewegl. Süßklee (*δέσμωδης* bündelförmig — weg. d. Blütentrauben!), Warmh. D. (*Hedysarum*) *gyraus* DC. „Drehblatt“-W., penduliflorum Oud., Garten D. canadense DC.

Desmoncus Mart. (Palmen) „Fesselhaken“ (s. v. u. *ὅγκος*, lat. uncus Haken — Schaft u. Blattscheiden m. zahlr. Widerhaken, Wtst.).

Desmotrichum Blum., R. Br. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Fesselhaar“ (*δέσμος* Fessel, *θοιξ*, *τρίχος* Haar — Anthere an ein. Rückenzahn befestigt), D. angulatum s. *Dendrobium* a. Lindl.

Detariæae (sc. *Mimosæae*) Rchb. „Bündel-Mimosen“, s. sogl.

Detarium Juss. (Legumin. Mimoseen, XXIII. 1) „Bündel“-M., „Detar“-M. (v. *δετή* Bündel — Stand d. Blüten, Wtst.: detar Name am Senegal, essb. Frucht: datach), D. senegalense Juss.

Detris Ad. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Gering“-Aster, „Schlecht“-A. (zu *Agathaea* Cass. — Gegensatz!) (v. deter, Fem. -tris, ungebr. Positiv v. deterior, gering, schlecht, Wtst.: detris d. corrumptierte aster!).

1) **Deutzia** Thb., Sieb., Zucc. (Philadelphaceen, XII. 1) „Deutzie“ (n. d. Ratsherrn Joh. Deutz z. Amsterdami), Gart.: D. glabra Sieb., Zucc. (Japan), crenata S., Z. s. scabra Hort. m. v. v., z. B. fl. plen., staminea R. Br. s. canescens Hort. (*Philadelphus* stam. Wall.), Stuben: D. gracilis S., Z. (gracilis vera Hort.), s. g. Maiblumenstrauch m. v. v.

Deyeuxia P.-B. s. Dejeuxia! (zu *Calamagrostis* Roth), z. B. neglecta Fr. s. stricta Nutt., arundinacea Roth = *Arundo silvatica* Schrad.

1) **Diacantha** Lag. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Zweidorndistel“, „Paarstachel“-D. (*δι-* zwei, *ἄζαρθα* Dorn od. Stachel — an d. Basis d. Aste!), D. arboræa Less. (*Barnardesia arb.* L. f.). 2) **Diacantha** (sc. *Grossularia*) L. (Ribesiaceen, V. 1) paarstachelige Stachelpföhre M.-Rchb.

Diadelphia L., Kl. d. „Zweibrüderigen“ (XVII. Kl.) (*δι-* u. *ἀδελφός* Bruder — Staubf. in zwei Partien!).

Dialypetälae DC., Endl. i. q. Polypetälae Juss. „Getrenntkronblättrige“ v. *διαλύτω* trenne, *πέταλον*, lat. petalum Kron- od. Blumenblatt).

Diandria L., Kl. der „Zweimännigen“ (II. Kl.) (*δι-* u. *ἄνηρ*, *-ρος* Mann, Bot. Staubgefäß!).

Diana Comm. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) „Diana“-L. (— wie Diana in d. Wäldern).

Dianella Lam. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Dianelle“, fr. dianelle (dim. Diana, s. eb.), Stuben: D. australis Lam. (*Dracaena indivisa* Hortul.), D. coerulea Sims, longifolia u. revoluta R. Br., s. Dracaena u. Cordyline.

Dianthēra Sol., Jacq. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zweianthere“, fr. dianthère (*δι-* u. *ἄνθηρα* Staubbeutel — jeder Staubf. scheint 2 Antheren zu tragen, Wtst.), D. americana Forsk. s. Barleria (Justicia) flava Jacq.

Dianthus L. (Caryophylleen od. Silenaceen, X. 2) Nelke, Grasblume, fr. oeillet, e. pink od. gilliflower (v. *Ζεὺς*, *Διὸς* u. *ἄριθμος* „Zeus-blume“, Wtst. *δῖος* göttlich, schön!), Garten: D. plumarius L. Federnelke od. s. g. Federröschen, e. pheasant-eye, sweet-William, Gart.- u. Topfbl.: D. Caryophyllus L. Garten-N. od. Grasrose

- (-blume) m. zahlr. v. v. (vgl. *Caryophyllus*!), e. clove-gilly-flower, Gartenzier. D. *barbatus* L., Bartnelke“, s. g. Tausendschön m. v. v., z. B. *nanus* Hort., fr. fleur d'Arménie u. mignonette, e. sweet John, D. *chinensis* L. m. v. v., z. B. *Heddegwigii* Hort. u. Heddew. diadematus, v. *laciniatus* „Schlitz-N.“ u. a., D. *caesius* Sm. m. v. fl. pl. Pfingst-N., wild D. *superbus* L., D. *carthusianorum* L. „Karthäuser“-N. s. g. Marien- od. Blutströpfchen, etc.; ferner Zier. D. *dentosus* Fisch., *dentosus* *hybridus* Hort.
- 1) **Diapensia** L. (-zia Uhlenb.) (Ericaceen od. Primulac., V. 1) „Schmerzheilblume“, Trauerbl. D. (v. διατήρθη = Sanicula, Wtst. v. διὰ wegen u. πένθος Schmerz — Pflanze geg. Wunden!), D. *lapponica* L., s. *Pyxidanthera* Mehx. 2) **Diapensia** (sc. Astartia) Scop. (Umbelliferen, V. 2) = *Sanicula europaea* G. Frank.
- Diaphyllum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Durchblatt“, Durchwachs (διὰ hindurch, γύλλον Laub — durchwachse Blätter!), D. *triradiatum* Hoffm. „dreistrahliges“, s. *Bupleurum perfoliatum* Lk.
- Diastema** Benth. (Gesneraceen, XIV. 2) „Zwischenstellung“ (διάστημα Abstand — nämli. zwischen Achimenes u. Gesnera, Paxton), D. *quinqüe-vulnérum* Van Houtt. „fünfnarbige“.
- Diatoma** DC. (Algen, XXIV. 3) „Schnitt“- od. Stückelalgen (διατομή Spaltung — wegen d. Aussehens!). — *Diatomacae* Harv., -miae Ag. Diatomene od. Bacillarien, d. i. „Stäbchenalgen“.
- Dicentra** Borkh. (Papaverac. Fumariaceen, XVII. 2) „Doppel“- od. „Zweisporn“, -flügel, s. g. Herzblume, Jungfern- od. thränendes Herz (δι- u. κέρατον Stachel, Honigsporn — Antherenklappen lang hornförm. Wtst.), s. *Dielytra* s. *Fumaria spectabilis*.
- Dicéra** Forst. (Tiliaceen Elaeocarpeen, XIII. 1) „Doppelhörnchen“ (δι- u. κέρας od. κέρως Horn), s. *Elaeocarpus Dicéra* L. u. *Eriostemon Collad.*
- Dicerma** DC. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Zweimünzklee“ (δι- u. κέρμα Geldstück — Hülse m. 2 kreisr. münzenförm. Gliedern, Wtst.), s. *Hedysärum* u. *Zornia* Gmel.
- Dichaea** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppelorchis“ (δίχα in zwei Teile geteilt — d. Blätt. stehen zweireihig, Wtst.), z. B. *diandra* Rchb. f., s. *Fernandezia* Rz. Pv.
- Dichilus** DC. (-cheilus Rchb.) (zu *Cytisus* Rchb.) (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Zweilippkelch“ (δι-, χεῖλος Lippe — nämli. d. Kelch!), z. B. *argenteus* L. silberblättr. Bohnenbaum = *Lotus arg. Brot.*
- Dichodon** Bartl. (zu *Stellaria* Rchb.) (Ainsaceen, X. 3) „Doppelzahn“ (δίχα s. v. u. ὀδῶν Zahn — Kronblätter gespalten!), z. B. *cerastoides* L. u. *anomala* Rchb. (*Cerastium anomálum* W. K.).
- Dichoglossa** Fisch., Mey. (Caryophylleen, X. 3) „Doppelzung“ (s. v. u. γλώττα Zunge — Kronblattspreite meist zweiteilig, Wtst.).
- Dichondra** Forst. (Ehretiac. od. Convolvulac., V. 1) „Doppel“- oder „Zweikorn“, fr. dichondre (δι-, κόρδος Knorpel u. Korn — aus jed. Blüte zwei Körner! Wtst.), z. B. *Hängvasen* D. *repens* Forst. u. *sericea* ds., s. *Sibthorbia convolvulacea* L. (Neuseel.).
- Dichorisandra** Mik. (Commelyneen, VI. 1) „Zweispalt-Anthere“ (δι-χωρίζω spalte, ἀνήρ, -νθος Mann, Staubbettel — Staubgef. in zwei Gruppen getrennt), Warmh. D. *ovalifolia*, *discolor*, *nana* (*violacea* u. *alba*), *musaica* Lind. (*Columb.*), *vittata* Lind. etc.
- Dichostylis** P.-B. (Cyperaceen, III. 1) „Doppelgriffel“, Wasserriet (δίχα in compos. διχο-, στυλίς Griffel), D. *fluitans* P. B. (*Scirpus* fl. L.) etc., s. *Echinolytrum* Desv. u. *Eleogiton* Lk.
- Dichophyllum** Dill. (Urticac. Ceratophylleen, XXI. 8) „Zerschniedblatt“, Igellock, s. *Dichotophyllum* st. *Dichotomophyllum* (διχοτομέω zer-

- schnede od. δίζα entzwei u. φύλλον — zerfetztes Laub d. Igellocks!), s. Ceratophyllum.
- Dicksonia** l'Hér. (Baumfarne, XXIV. 1) „Dicksonie“ (n. d. engl. Bot. Jam. Dickson, † 1822, s. d. Aut.), Zier. D. cicutaria Sw., dissecta Sw., punctilöba Kze.
- Diclinia** Juss. „Zweilagerige“, Getrenntblütige — Gegensatz zu Zwitterblüten! (δι- u. κλίνη Bett etc.).
- Diclytra** DC. fehlerh. st. Dielýtra Bork. (s. d.) — oft angewandtes Fehlerwort!
- Dicoma** Cass., Less. (Compos. Carlineen, XIX. 1) „Zweischopf“-Anthere δι-, κόμη lat. coma Haarschopf — Antherenschwänze geschlitzt, Wtst.), z. B. lanuginosa DC.
- Dierānum** Hedw. (Laubmoose, XXIV. 2) „Gabelzahn“-M., fr. bifurque (διπούρος od. -ής zweiköpfig — Zähne d. Peristoms zwei- bis dreiteilig, Wtst.), D. scoparium Hedw.
- 1) **Dictamus** L. (Rutaceen, X. 1) „Diptam“, fr. dictame, e. dictany (dittany) (δίκταυρος v. Δίκτη Berg auf Creta u. θάυρος Strauch, bei d. Alten Origanum Dictaminus L., Wtst.), wild u. Zier. D. Fraxinella Pers. s. albus L. 2) **Dict.** (sc. Origanum) L. (Labiaten, XIV. 1) can-discher Diptam (s. eb.).
- Dictyanthus** Decsn. (-tha Raf.) (Stapeliaceen od. Aristolochieen, V. 2) „Netzblume“ (δίτρυζ od. δίτρυον Netz, ἀργός), z. B. Pavoni Van Houtt., „Pavon's-N.“, s. Stapelia campanulata Pav.
- Dictyosperma** Wendl. (Palmen) „Netznuss“-P. (s. eb., στέφω Samen od. Frucht), D. alba Wendl.
- Didelta** l'Hér., Ait. (Compos. Millereen od. Arctoideen, XIX. 4) „Doppel-delta“ (δι u. δέλτα Buchst. Δ — Form d. dopp. Fruchtknotens!), s. Polymnia L. u. Favonium G.
- Didesmus** Desv. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Zwei-“ od. „Doppelfessel“ δι- u. δεσμός Fessel — Schötchen wie 2 Ket tenglieder, Wtst.), D. perennis Desv., s. Myagrum perenne L.
- Didiscus** DC., Hook. (Umbelliferen, V. 2) „Doppelscheibe“ (δι- u. δίσκος lat. discus Scheibe — Früchte zusammengedr., fast zweifach, Wtst.), Zier. D. coerulēus Hook., s. Trachymēne coer. Rudg. u. Huegelia R. Br.
- Dieffenbachia** Schott, Endl. (Aroideen, XX. 9) „Dieffenbach's“-Aron (n. d. deutsch. Reis. Prof. E. Dieffenbach in Giesen, Wtst. n. d. ber. Operateur Dieffenbach z. Berlin, † 1847), Warmh. D. costata Schott (Caladium cost.), Baraquiniana Verschaff., D. s. Seguine picta u. eburnea elfenbeinw. gestielte.
- Dielytra** Borkh. (nicht Diel.-!) DC. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Doppelfutteral“, -herzohr, Leierblume, Herzblatt s. g. thränend. Herz (δι-, κλύτρον Futteral, Scheide — zwei umgebogen. Ohrzipfel!), Zier. D. spectabilis DC., fr. coeur de Marie, Dielytra de Chine, e. showy Diel., s. Dicentra spect. (Fumaria sp. L.), D. formosa DC., fr. D. d'Amérique, D. eximia DC., fr. D. distinguée, D. chrysanthia DC., etc.
- Diēnia** Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Doppelzügel“ (δι- u. γρία Zügel — d. Pollenmassen zu je 2 zusammenh., Wtst.), D. fusca, cylindrica, Myurus Ldl. (Pedilēa Ldl.).
- Dierāma** Bak. (Irideen, III. 1) „Trichter“-Schwertel (διέραμα Trichter, Durchschlag), D. pendula Bak.
- Diervilla** T. (-ea) L. (Lonicereen, V. 1) „Dierville's“-Geisblatt, fr. dierville (n. d. franz. Chirurg. Dierville, Tournefort's Freund), Zier. D. versicolor Sieb., Zucc. (Weigela japonica Thb. s. arborēa Hort.), D. canadensis W. s. trifida Mnch. (Lonicera Dierville L.), D. roséa Hort. (Weigela ros. L., Calysphyrum ros. Mey.).

- Diētes** Salisb. (Irideen, III. 1) „Doppelverwandte“, „Zweijährige“ Wtst. ($\delta\iota$ - u. $\xi\tau\eta\zeta$ Freund, Verwandter — näm. Iris u. Moraea! Wtst. $\delta\iota$ - $\xi\tau\eta\zeta$ zweijährig!), Stuben: D. bicolor Sal.
- 1) **Dietrichia** Tratt. (Crassulaceen, V. 5), Dietrich's „Dickblatt (n. Fr. Gottl. Dietrich, Übers. v. Loudon's Encyklopädie d. Gartenk., Jena 1836—49, s. d. Aut.), Zier. D. coccinea Tratt. = Crassula s. Larochea (Rochea) coccinea Pers., D. odorata Tratt. (Crassula odoratissima Andr.). 2) **Dietrichia** Gies. (Scitamineen, I. 1).
- Digitalis** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Fingerhut“, fr. doigtier, digitale, gantelet, gant-de-Nôtre-Dame, herbe au pauvre-homme, e. fox-gloves „Fuchshandschuhe“ (digitus Finger), z. B. wild u. Zier. D. purpurea L. m. v. gloxiniaeflora Hort., D. grandiflora Ait. (blassgelb), ferruginea L. (rotgelb), lanata Ehrh. etc.
- Digitaria** Schrad. (Gräser, III. 2) „Fingergras“, -hirse, -fennich Seub., fr. pied de poule „Hühnerfuss“ (s. eb.), D. sanguinalis Scop. (Panicum s. L.), filiformis Köl. (humifusa Rich.), s. Panicum filif. Grck., etc.
- Digraphis** Trin. (Gräser, III. 2) „Doppelschrift“- od. Bandgras ($\delta\iota$ - u. $\gamma\delta\eta\eta\zeta$ Griffel — d. beid. Griffel m. pinselförm. od. federf. Narben, Wtst.), Zier. D. arundinacea Trin., s. Arundinaria americana Mchx.
- Dilatris** L. (Liliac. Hämodoraceen, III. 1) „Doppeldienerin“, fr. dilatris ($\delta\iota$, $\lambda\acute{a}t\zeta\zeta$ Dienerin, Wtst. Blüte aussen, wie d. Kapsel struppig — doppelt bedient!), D. corymbosa L., s. Ixia hirsuta u. Wachendorfia umbellata.
- Dilepyrum** Mchx. (Gräser, III. 2) „Zweihüllgras“ ($\delta\iota$, $\lambda\acute{e}\tau\nu\sigma\sigma$ Schale etc. — jed. Blütch. hat 2 Kelch- u. Kronspelzen, Wtst.), D. minutiflorum Mchx., s. Mühlenbergia diffusa Schreb.
- Dillenia** Thunb. (Ranunculac. Dillenieen, XIII. 6) „Dillenie“, Rosenapfelbaum (n. d. Darmstädter Bot. Dilleniuss, Prof. in Oxford, † 1747, s. d. Aut.), Zier. D. speciosa s. indica Thb.
- Dillwynia (-néa, -winia)** Sm. (Legumin. Cäsalpinieen, X. 1) „Dillwyn's“-Cäsalpinie (n. d. engl. Bot. Lewis Weston Dillwyn, s. d. Aut.), Gewächsh. cinerascens Bot. Cab., floribunda Sm., parvifolia R. Br., speciosa, coronata etc.
- Dimia** Spr., R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Doppelnebenkrone“ (v. $\delta\iota\mu\delta\zeta$ st. $\delta\iota\delta\mu\mu\zeta$ doppelt — d. corona staminea dopp. vorhand., Wtst.) od. „Schreckpflanze“ (v. $\delta\iota\mu\mu\alpha$ od. $-\mu\mu\zeta$ Schrecken — weg. d. Ansehens!).
- 1) **Dimocarpus** W. (Sapindac. od. Amyrideen, VIII. 1) „Doppelfrucht“, Zwillingsspflaume, st. Didymocarpus ($\delta\iota\delta\mu\mu\zeta$ zwiefach, Zwilling, $\chi\alpha\sigma\tau\zeta\zeta$ Fr.), D. Litschi W., s. Sapindus edulis Ait. 2) **D. Lour.** (Euphorbiaceen, XXI. 1).
- Dimorpha** Sm., W. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Zweiform“ D. ($\delta\iota\mu\mu\zeta$ von dopp. Gestalt, Wtst. $\delta\iota\alpha$ durch od. ähnlich u. Amorpha — ein Kronbl. an Stelle d. Carina!), D. grandiflora W. (Parivōa gr. Aubl.), tomentosa W. (Parivōa tom.) Filz-Lederhülse, s. Palovea Aubl.
- Dimorphanthus** Miq. (Araliaceen, V. 5) „Doppelformblüte“ (s. eb., $\ddot{\alpha}\nu\theta\zeta$ — frucht. u. unfrucht. Blüten verschieden, Wtst.), D. manduschuricus Maxim., s. Aralia edulis autt.
- Dimorphopetalum** Bert. (Crassulac., V. 5) „Doppelform-Kronblatt“ (s. eb., $\pi\acute{e}\tau\alpha\lambda\sigma\sigma$ — vier ungleichgrosse Kronblätt., zwei fast verkümmert).
- Dimorphothéca** Mnch., DC. (Comp. Calendulac., XIX. 4) „Doppelformfrucht“ (s. v., $\vartheta\acute{e}\zeta\zeta$ Behälter — zweierlei Achänen, Wtst.), D. plurialis Mnch. s. Calendula pluv. L. „Regenrose“.
- Dinēma** Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Zweifaden“-O. ($\delta\iota$ - u. $\nu\tilde{\eta}\mu\mu\alpha$ Gespinnst od. Faden — je 2 Pollenmassen an 1 Faden! Wtst.), D. polybulbon Ldl. „vielknoll.“ (Epidendron p. Sw.), s. Bolbophyllum orientale Spr.

Dinētus Sweet (Convolvulaceen, V. 1) „Drehwinde“ ($\deltaινήτος$ herumgedreht — Wst. $\deltaις$ doppelt u. $\nuγτός$ gedreht etc. — d. zwei äuss. Kelchblätt. gleich, die drei innern vergröss. sich nach d. Verblühen!), s. Porana Burm. „Wanderwinde“.

Dioclēa Kth. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Diokles“-Bohne (n. d. altgriech. Bot. Diokles von Caristos, schr. ein $\deltaιοκλεύσων$), Gewächsh. D. glycinoides (Kennedyia splendens Vent.) etc., s. Dolichos u. Hymenospóron Spr.

Dionaea L. (Cistineen Droseraceen, X. 1) Venus-Fliegenfalle, fr. dionée u. attrape-mouches, e. catchfly (n. Dione, Mutter d. Venus, Zuname), D. Muscipula L., fr. miracle de nature.

Dioon Lindl. (Diōn Bot. Mag.) (Cycadeen, XXII. 11) „Zweieipalme“ ($\deltaι-$ u. $\ddot{\sigma}ον$ lat. ovum Ei — jede Schuppe mit 2 solchen!), D. edüle Lindl.

Dioscorēa Plum., L. (Sarmentac. od. Dioscoreen, XXII. 6) Yamswurzel (Cassavebrot, Mandiocamehl), fr. dioscorée, igname od. yam, e. yams (n. Dioscorides aus Cilicien, ber. Arzt zu Nero's Zeit, schr. üb. Arzneimittel etc.), Gart. u. Culturpf. D. Batatas Decsn. „Bataten“, fr. ign. batate od. de Chine, e. indian yams, Warmh. D. bulbifera u. discolor variegata, multicolor Baraquin m. v. v. chrysophylla Lind., metallica Lind. etc., D. Eldorado u. prismatica Lind. (— alle buntblättr.). — Dioscorēae DC., -reacēae R. Br. (zu Ord. Liliacēae DC.) Schmeerwurzgewächse Grck.

Diosma L. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Götterduft“, fr. diosme (v. $\deltaιος$ göttlich, Wst. od. $\mathcal{A}ιος$ Gen. v. $\mathcal{Z}\varepsilon\nuς$ u. $\deltaομή$ Geruch etc. od. auch $\deltaιοσμός$ durchdring. Geruch!), Gewächsh. D. fragrans s. speciosa Hort., uniflora L. (Adenandra W.), ovata Thb., capitata L. etc. — Diosmēae Rchb. (zu Rutaceae Rutariae Rchb.) Buccogewächse.

1) **Diosp̄yros** L. (Sapotac. Mimusopeen, XXIII. 2) Dattel- od. Lotuspflaume, fr. plaqueminier (s. eb. u. $\piυος$ Weizen, überh. Frucht! od. lat. pýrus Birne, Paxton — Früchte meist v. angenehm. Geschmack, Wst.), D. Lotus L. Lotusbirne, D. Ebenum L. Kōn. Ebenholz (ignum Ebēnum), s. Melanoxylon Schott. 2) **Diosp̄yros** (sc. Tetranthēra) Spr. (Laurineen, IX. 1), s. Laurus Diosp̄yros Pers.

Diostomaea Spenn. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Göttermälchen“, Zweiblatt (s. v. u. $\sigmaτόμα$ Mund — schöne Blütenform, Wst.), D. ovata u. cordata Spenn., s. Listera ov. u. cord. R. Br.

Diothonaea Lindl., Rchb. f. (Orchideen, XX. 1) „Doppelschleier“-0. ($\deltaι-$, $\deltaθόνη$ Leinwand, Schleier — d. Columna ausgebreit. etc., Wst.), D. cotoniaeflora Rchb. f. „quittenblüt.“

1) **Diōtis** Schreb. (Amarantac. od. Chenopodiac., XXI. 4) „Zweiohr“-Melde ($\deltaι-$, $\bar{o}ψ$, $\bar{o}τος$ Ohr — d. weiß. Perigon zuletzt zweiflügl.), D. atriplicina Spr., s. Obione pedunculata Moq.-Tand. (Atriplex ped. L.), s. Halimus ped. Wallr., D. ceratoides W., s. Ceratospermum paposum Pers. (Achyranthes papp. Forsk.). 2) **Diōtis** Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 2) (zu Santolina L.) (— Kronröhre zweiflügl.).

Dipelta Maxim. (Lonicereen, V. 1) „Doppelschild“ ($\deltaι-$, $\piέλτη$ klein. Rundschild — bez. d. Frucht), D. floribunda Maxim.

Diphāca Lour. (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Zweikernstrauch“, „Doppellinse“ ($\deltaι-$, $\varphiαζή$ Linsenfrucht — jede Hülse trägt 2 Linsen), s. Dalbergia Roxb.

Diphyllea Rich. (-ēja Mehx.) (Berberaceen, VI. 1) „Zweiblattstrauch“ ($\deltaι-$ u. $\varphiυλλείον$ Laub — nicht mehr als 2 Blätt.), D. cymosa Mehx. (Carolina).

Diphysa Jacq. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Zweiblasen“-Strauch ($\deltaι-$, $\varphiύσα$ Blase etc. — Hülse an beid. Enden blasig), D. carthagensis Schiede, etc.

- Diplachne** P.-B., Lk. (zu Festūca) Rchb. (Gräser, III. 2) „Doppel-spelze“ ($\deltaιπλοὸς$ dopp., $\alphaγγη$ Spreu etc. — jed. Blüttch. hat 2 Spelzen, Schläppch. u. Kronspelz), D. serotina Lk., s. Molinia ser. M. K.
- Diplaerum** Kth., Endl. (Cyperaceen, XXI. 11) „Doppel spitze“ (s. eb., $\alphaγον$ Spitze — festschliess. zweispitz. Schlauch um d. Frucht), D. caricinum Kth. etc.
- Diplæus** Nutt. (Scrophularineen, XIV. 2) „Zweiplattennarbe“ ($\deltaι-$, $\piλαζοὺς$ Kuchen od. $\piλάξ$, - $ζός$ Platte — Narbe m. zwei Lamellen), D. glutinosus u. grandiflorus Van Houtt.
- Dipladenia** DC. (Apocyneen, V. 1) „Doppeldrüsen“-Würger (s. v., $\alphaδηγη$, $\varepsilonρος$ Drüse — 2 Drüs. od. Höker an d. Basis des Ovariums), Stub. Gewächsh. D. splendens Hort., atro-purpurea, Harrisii Purdil etc., s. Echites P. Br.
- Diplarrhēa** Dietr. (Irideen, III. 1) „Zweimann“-Schwertel (s. v., $\alphaδδηγη$, $\varepsilonρος$ Mann — nur 2 vollst. Staubgefässe), s. Moraea diandra Vahl.
- Diplasium (-zium)** Sw. (Farne, XXIV. 1) „Doppelschleier“-F. (v. $\deltaιπλάξω$ verdopple od. $\deltaιπλάσιος$ doppelt — zu zweien vereinte Fruchthaufen), Zier. D. gigantēum.
- Diplecolobaeae** (sc. Cruciferae) DC. (richt. **Diplacol-**) „Zweikuchen-lippige“ ($\deltaι-$, $\piλαζοὺς$ Kuchen, $\lambdaοβὸς$ Lappen — bez. des Samens b. Aufgehen!).
- Diplectrum** Pers. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Doppelsporn“ ($\deltaι-$, $\piληκτρος$ Sporn, lat. plectrum etc.), s. Satyrium Sw. L.
- Diplocentrum** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppelstachel“ ($\deltaιπλοὸς$ u. $\zetaρτοον$ Stachel, Sporn — Labell m. 2 Stacheln), D. recurvum Ldl.
- Diplochilus** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Doppellippe“ (s. v., $\chiεῖλος$ Lippe — scheinb. dopp. Labell).
- Diplochiton (-ta)** DC. (Melastomac., VIII. 1) „Doppelhemd“ (s. v., $\chiτων$ Unterkleid etc. — Blüte noch in 2 Brakteolen gehüllt), D. aurēa, bracteata DC. etc.
- Diplochlaena** R. Br. (Rutac. Diosmeen, XIII. 2) „Doppelkleid“ (s. v., $\chiλαινα$ Kleid — bez. d. Blütenform!), s. Diplolaena Desf.
- Diplocōma** Don (Compositen Eupatorin., XIX. 1) „Doppelschopf“ (s. v., $ζόμη$ lat. cōma Haarschopf — dopp. vorhand. Pappus d. Scheibe), D. villosa Don, etc.
- Diploconechium** Schauer (Orchideen, XX. 1) „Doppelmuschel“ (s. v., $ζόγη$ lat. concha Muschel etc. — das Hypochilum nachenf., geöhrt, d. Epichilum konkav), D. gymnocephalum Schauer.
- Diplolaena** Desf., Damp. (Rutaceen, XIII. 2) „Doppelmantel“ (s. v., $\chiλαινα$ i. q. $\chiλαινα$ Mantel, Kleid), s. Diplochlaena R. Br.
- Diplolēpis** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Doppelschuppe“ (s. v., $\lambdaεπις$ Schuppe — jed. Blättch. d. corona staminea scheint doppelt).
- Diplomēris** D. Don (Orchideen, XX. 1) „Doppelstück“, -lippe (s. v., $\muεοις$ od. $\muέος$ Stück, Teil — d. Antherenschnäbelchen m. 2 fleisch. Fortsätzen), s. Diplochilus Lindl.
- Diplomitrium (-on)** Čorda (Lebermoose, XXIV. 2) „Doppelmützchen“ (s. v., $\muιτρίον$ dem. v. $\muιτρα$ Mütze, Haube etc. — scheint dopp. vorhand.).
- Diplopappus** DC. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Doppelpappus“-od. Mantelaster, Feinstrahl (s. v., pappus Samenkronen — diese ein- bis mehrreihig), D. annūus DC., s. Stenactis ann. Nees (Bellis ann. L.).
- Diplopeltis** Endl. (Sapindaceen, XXIII. 1) „Doppelschield“ (s. v., $\piέλτη$ klein. Rundschild — Blütenscheibe in eine Schuppe ausgehend).
- Diploprion** Viv. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) „Doppelsäge“ (s. v., $\piοίων$ Säge — beide Hülsenränder runzl. od. stachlig), D. medicaginoides Viv., s. Medicago Ibyca Spr.

- Diplostephium** DC. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Doppelkranz“-Aster (s. v., στεγτόν dem. v. στέφως i. q. στέφαρος Kranz — Pappus inn. u. aussen borstig), Zier. D. amygdalinum Cass. (Canada) etc., s. Aster L.
- Diplotaxis** DC. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Doppelreihe“, -samen, s. g. Rampe (Rempe) (s. v., τάξις Reihe — dopp. Reihe Samen in jeder Schote!), D. tenuifolia DC. (Wegunkr.), muralis DC., etc.
- Diplothemium** Mart. (Palmen, XXI. 6) „Doppelscheide“ (s. v., θημών Haufen etc. — d. Brakteen schliessen je 2 männl. Blüten ein, einhäus. Blüten an dems. Kolben, aber mit dopp. Scheide), D. maritimum Mart., s. Cocos arenaria Gomez „Sand-Kokospalme“.
- Diplusodon** DC. (Lythrarieen, XI. 1) „Doppelzahn“-Weiderich (s. v., ὁδῶν Zahn — 6 äuss. u. 6 inn. Kelchzähne), D. buxifolium DC.
- Diposis** DC. (Umbelliferen, V. 2) „Doppelgeliebter“ (δι- u. πόσις, -εος Geliebter — Pfeiffer: d. Seitenblüt. männl., d. inner. weibl.!), D. Bulbocastanum DC. „Erdkastanie“, etc., s. Hydrocotyle saniculifol. Lam.
- Dipsacées** Juss., DC., -eae Grek., fr. dipsacées Karden (Caprifoliacées Dipsacées Rchb.).
- Dipsacus** T. (Dipsaceen od. Aggregaten, IV. 1) Kardendistel, Karde, fr. chardon od. cardère, e. fuller's-weed, tazel (-sel) (gr. δίψαζος v. διψάω dürste — sammelt in d. Blattachseln Wasser, daher auch fr. bain de Venus „Venusbad“), Cultur: D. fullonum L. Weberkarde, fr. chardon à bonnetier (- à foulon), cardère des foulons, e. fuller's-thistle (-weed), wild D. sylvestris L. (-ster Huds.) gem. Karde, fr. cardère des bois, e. shepherd's-rod „Schäfer's-Rute“, tazel (-sel) (D. Fullonum var. a L.).
- Diptera** Borkh. (Saxifragac., X. 2) „Zweiflüglerin“ (δι- u. πτέρων Flügel, διπτερος zweiflüglig — weg. d. 2 Kronblätter!), Ampelpfl. D. sarmentosa Borkh. (Saxifraga s. L.) s. g. Judenbart.
- Dipterix** s. Dipteryx.
- Dipterocarpae** Blum., DC. (Tiliaceae Dipteroc. Rchb. u. Ochnaceae DC.) (zu Ord. Columnniferae Bartl.) „Zweiflügelnuss“-Gew., s. sogl.
- Dipterocarpus** Roxb. (Tiliac. Dipterocarpeen od. Ochnaceen, XIII. 1) „Zweiflügelnuss“ (διπτερος zweiflüglig, καρπός Frucht — diese von 2 Flügeln gekrönt).
- 1) **Dipterygia** Presl (Umbellifer., V. 2) „Doppelflügelfrucht“-Dolde (δι- u. πτέρυνξ, -γος Flügel). 2) **Dipterygium** Decsn. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Zweiflügelschötchen“ (δι-, πτερύγιον dem. v. πτέρυνξ, Flügelchen), z. B. isaticarpum Decsn. „waidfrüchtiges“.
- Dipteryx (ix)** Schreb. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) „Doppel-schwinge“, Tongabohnenbaum, D. Tonga Schreb. (δι- πτέρυνξ Flügel — nämnl. d. beid. ober. Kelchzipfel, wie Flügel!), s. Barosma Tonga W., Pers.
- Diptychocarpus** Reg. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Zweifaltenfrucht“ (δι-, πτύχη Falte, καρπός), D. hispidus Reg., s. Chorispora DC. u. Raphanus L.
- Dirce** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Quellenseidel“, Leder-, Blei-, Ceder- od. Sumpfholz (n. der Dirce od. Dirca, Gemahlin d. Königs Lycus v. Theben u. Quelle bei Theben, Myth. — Pfl. im Wasser wachs.), D. palustris L., fr. Dirca des marais, bois de plomb (- de cuir, - des Canadiens).
- Diraea** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Quellenblume“ (s. eb.), Stuben D. Cooceris Decsn., bulbosa m. v. lateritia, u. D. refulgens Van Houtt., s. Gesneria bulbosa autt.
- Disa** Berg., L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Grossblume, Nass-O. (v. δεῖσα Nässe? Wtst. Name d. Pfl. am Cap!), D. grandis s. uniflora

- Berg. (*Satyrium grandifl. Thb.*), *barbata* Sw. (*Satyr. barbata Thb.*), *longicornis* Thb., etc., s. *Schizodium Lindl.*, *Orchis L.*, etc.
- Disaccium** DC. (*Cruciferen Silicos.*, XV. 2) „Zweisack“-Senf ($\delta\acute{\imath}\text{-, } \sigma\alpha\kappa\text{-}$ Säckchen — 2 Kelchblätt. an d. Basis sackförmig), s. *Sināpis T.*, *L.*
- Disandra** L. (*Scrophularineen*, VII. 1) „Einmannblume“, „Wechselmannbl.“ (v. $\delta\acute{\imath}\iota\varsigma$ einer, während $\sigma\delta\acute{\imath}\iota\varsigma$ keiner, $\grave{\alpha}v\grave{\eta}\varsigma$, $-\nu\delta\grave{\eta}\varsigma$ Mann, Staubgef., Paxton u. Wtst. Wechsel in d. Zahl, schlimm zu zählen, (wechs. v. 5—8), also $\delta\grave{\imath}\varsigma$ miss-, schlimm — daher richtiger Dysandra!), Ampelpfl. *D. prostrata* L., s. *Sibthorpia peregrina* Bot. Mag.
- Discanthae** Endl., Kl. d. „Scheibenblütigen“ ($\delta\acute{\imath}\sigma\zeta\omega\varsigma$ lat. *discus* u. $\grave{\alpha}v\grave{\eta}\varsigma$ od. $-\grave{\alpha}\varsigma$ Blüte): Aralien, Umbelliferen, Ampelideen, Cornellinen u. Lorantheaceen.
- Dischidia** R. Br. (*Asclepiad. Ceropegieen*, V. 2) „Spalt“-Wachspfl. ($\delta\acute{\imath}\sigma\chi\iota\delta\grave{\eta}\varsigma$ gespalten — d. corona staminēa zweiteilig), Warmh. *D. Raflesiana* Wall. (*B.-Schmarotzer m. merkw. Anhängseln!*), s. *Colyris Vahl* u. *Leptostemma* Blum.
- Discocactus** Miq. (*Cacteen*, XII. 1) „Scheibencactus“ ($\delta\acute{\imath}\sigma\zeta\omega\varsigma$ lat. *discus Scheibe*), s. *Echinocactus* Salm-Dyck.
- Discomycētes** Fr. „Scheibenpilze“ (s. eb. u. $\mu\acute{\imath}\zeta\eta\varsigma$, $-\eta\tau\varsigma$ Pilz).
- Disparāgo** G., DC. (*Compos. Seriphieen*, XIX. 6) Sommerflockenblume (v. *dispar* ungleich — Wtst.: Anthodium mit nur 2 Blüten, eine zungenförmige u. eine röhrlige!), s. *Seriphium* s. *Centaurēa solstitialis* L.
- Dispēris** Sw. (*Orchideen Arethuseen*, XX. 1) „Doppelsack“-O. ($\delta\acute{\imath}\varsigma$ zweimal, doppelt, $\pi\acute{\imath}\grave{\o}\alpha$ Sack, Tasche etc. — d. beid. Pollenmass. m. entfernten Beutelchen), *D. purpurata* Rchb. f., *alata* Lab. etc., s. *Arethusa* Sw.
- Dispōrum** Salisb. (*Melanthaceen*, VI. 3) „Zweisamen“ ($\delta\acute{\imath}\text{-, } \sigma.\tau\circ\varrho\grave{\alpha}$ od. $-\grave{\alpha}\circ\varsigma$ Same — jedes der 3 Fächer hat 2 Samen).
- Dissolēna** Lour. (*Apocyneen*, V. 1) „Doppelscheide“ ($\delta\acute{\imath}\varsigma$, $\sigma\omega\lambda\grave{\eta}\nu$ Scheide — Krone doppelröhrenf.), *D. verticillata* Lour., s. *Cerbēra chinensis* Spr.
- Disteganthus** Lemaire (*Bromeliac.*, VI. 1) „Doppeldeckblume“ ($\delta\acute{\imath}\text{-, } \sigma\tau\acute{\imath}\gamma\eta$ Decke etc. $\grave{\alpha}v\grave{\eta}\varsigma$ Bl.), *D. basilateralis* Lem.
- Distemma** Lab. (*Passifloreen*, XX. 4) „Doppelkranz“ ($\delta\acute{\imath}$ u. *στέμμα* Kranz — Zusammensetz. d. Blume!), s. *Passiflora* L. u. *Murićuia T.*, z. B. *D. coccinea* DC. (Neuholl.), *Hahnii* Fourn. (Mexiko) etc.
- Distylis** Gaud. (*Campanulac. Goodenoviac.*, V. 1) „Doppelgriffel“ ($\delta\acute{\imath}\text{-, } \sigma\tau\acute{\imath}\lambda\varsigma$ Griffel — zwei unten verwachs. convergente Griffel), z. B. *Berardiana* Gaud.
- Distylium** Sieb. u. Zucc. (*Hamamelideen*, IV. 2) Zwei- od. Doppelgriffel (s. eb.), *D. racemosum*, s. *Hamamēlis rac.* S. Z. (Japan).
- Ditmaria** Spr. (*Myrobalaneen* od. *Vochysiaceen*, I. 1) „Ditmari“ (n. d. Senator *Ditmar* in Rostock, s. d. Aut.), *D. floribunda* Spr. etc., s. *Erisma Rudg.* u. *Debraea R.* u. Sch.
- Diūris** Sm., R. Br. (*Orchideen*, XX. 1) „Doppelschwanz“ ($\delta\acute{\imath}\text{-, } \sigma\grave{\o}\varrho\grave{\alpha}$ Schwanz — *Columna* m. 2 schwanzart. Seitenlappen).
- Dodartia** L., Mill. (*Scrophularineen*, XIV. 2) „Dodartie“ (n. d. alt. Bot. F. Dodart, schr. Mémoires pour servir à l'hist. d. pl., 1676), s. *Anarrhīnum bellidifolium* W. (*Linaria odorata* Dodart, *Timbuleta* Forsk.).
- Dodecadenia** Nees (*Laurineen Tetranthereen*, IX. 1) „Zwölfdrüsen“-Topflorbeer ($\delta\omega\delta\acute{\imath}\zeta\alpha$ zwölf, $\grave{\alpha}\delta\eta\varsigma$, $-\varepsilon\tau\varsigma$ Drüse — Krone u. Kelch zwölftelig), *D. grandiflora* Nees.
- Dodecaandra** L., Kl. der „Zwölfmännigen“ (XI. Kl.) (s. eb., $\grave{\alpha}v\grave{\eta}\varsigma$, $-\nu\delta\grave{\eta}\varsigma$ Mann, Staubgefäßs).
- Dodēcas** L. (*Myrtaceen*, XI. 1) „Zwölffaden“ ($\delta\omega\delta\acute{\imath}\zeta\alpha$ Zahl Zwölf — so viel Staubfäden!), *D. surinamensis* L. (Str.).

Dodecathéon L. (Primulaceen, V. 1) „Zwölfgötterblume“, Göttergabe M.-Rchb., fr. giroseille (gyr.-), douze-dieux, e. cow's-lip „Kuhlippe“ (eig. δωδεκάθεος von den 12 Göttern einer), Zier. D. Meadia L. virgin. G. (für mea dea meine Göttin), fr. gir. de Virginie, e. virginian cow's-lip, m. v. v., integrifolium Mchx., etc.

- 1) **Dodonaea** L. (Sapindaceen, VIII. 1) „Dodoensbaum“ (n. Dodoens, lat. Dodonaeus, aus Mecheln, Leibarzt Kaiser Maximilian's I., † 1585), D. viscosa L. (Ptelea visc. L.), s. Staphylocereon Pluk. u. Thlaspidiooides arborescens Barrere. — Dodonaeacae H. B. K. (sc. Sapindacae Juss., Ord. Malpighinae Bartl. 2) **Dodonēa** Plum. (Anacardiaceen, III. 1) (s. Ilex Dodonaea L. f.), z. B. angulosa W. u. ilicifolia L., s. Comocladia L.

Doellingeria Nees (Compositen) „Döllingerie“, z. B. scabra Nees (n. d. Landshut-Münchener Anatomen J. Döllinger, Wtst.: Th. Döllinger, Reis. am Senegal u. 1836 mit A. v. Nordmann am Kaukasus, † in Moskau).

Dolichonēma Nees (Sapotaceen od. Cassieen, X. 1) „Langfaden“ (δολινός lang, ρῆμα Faden etc. — einer d. Staubfäd. sehr lang u. unfruchtb.), D. speciosa Nees, s. Moldenhawera floribunda Schrad. u. Bowdichia speciosa Spr.

Dolichos G., L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) Fasel-, Soja-, Gezwürzbohne, fr. dolique, e. bonavist (s. eb.), Gärt. D. Lablab L., fr. dolic od. haricot d'Egypte, D. urens L. Teufelsbohne, fr. oeillod. yeux-de-bourrique, D. pruriens L. (Phaseolus americanus Pluk.), fr. pois à gratter od. pouilleux „Kuhkrätze“ Wolff, s. Strizolobium P. Br.

Dolioearpus Rol. (Ranunculac. Delimeen, XXII. 12) „Fassfrucht“ (lat. dolium Fass, ζαοπός Fr. — diese eine einf. ein- bis zweisamige Beere), D. Rolandi, s. Tetracéra Dolioearpus W.

Dolomiaeæ DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Dolomieu“-Distel (n. d. Geologen Dolomieu, † 1801 in Paris), D. macrocephala DC.

Dolophyllum Salisb. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Trugblatt“ (δολός lat. dolus Trug etc., γύλλον Blatt), s. Thuja.

Dolophragma Fenzl. (Caryophylleen, X. 2) „Trugwandkapsel (s. eb., φράγμα Wand, Scheidewand — die Klappen d. Kapsel tragen mitten nur halb d. Wände).

- 1) **Dombeya** Cav., Boj. (Geraniac. Dombeyaceen, XVI. 5) „Dombeye“ (n. Jos. Dombey aus Macon, † 1795 in engl. Gefang.), D. umbellata u. viburnifolia Boj. — Dombeyacae Kth. 2) **D.** lappacea l'Hér. (Bignoniac., XIV. 2), s. Tourretia lapp. 3) **D.** chilensis Lamb. (Coniferen, XXI. 9), s. Araucaria imbricata Pav.

Donatia Forst. (Saxifragac. od. Paronychieen, III. 3) „Donatie“ (n. d. venetian. Bot. Donati), D. fascicularis L. (Str.), s. Polycarpon magellanicum L.

Donax P.-B., L. (Gramineen, III. 2) Pfahl- od. Pfeilrohr, Klarinetten-R. Lauche (gr. δῶναξ od. δῶναξ v. δορέω od. -νάω schwanke umher, Wtst.), D. arundinaceus P.-B., s. sativus Lam., s. Arundo Donax L. (D. Dioscoridis Bauh. u. β indica, D. laconica versicolor Moris.).

Dondia Spr. (Araliaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Dondie“, Sterndolde (n. d. franz. Bot. Dondie Duprée, Wtst. n. Jacopo di Dondie, † 1385, schr. promptuarium medicinae etc.), D. Epipactis Spr., s. Hacquetia Neck. od. Dondisia M.-Rchb. (Astrantia L.) Epipactis.

Dondisia M.-Rchb., s. Dondia.

- 1) **Donia** autt. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Donblume“, deutsche Flagge (n. d. Bot. Gebr. Don, s. d. Aut.), s. Cianthus Sol. 2) **Donia** Hook., Nutt., Less. (Compos. Astereen, XIX. 2) Don's-Aster, D. ciliata Hook. (Grindelia cil. W.), D. glutinosa R. Br. (Grind. gl. W.).

- 3) **Donia** R. Br. (Polygoneen Oxyrideen, VI. 2), D. sapida R. Br., s. Oxyria digyna Cambd. (Rumex d. L.).
- 1) **Doodia** R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Doody's“-F. (n. d. Lond. Apoth. Sam. Doody), D. caudata R. Br., s. Woodwardia c. Sm. 2) **Doodia** Roxb. (Portulacac., X. 1).
- Doratalépis** Benth. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Speerschuppe“, s. Podolépis Lab. „Stielschuppe“ (v. δόρυ, -ατος Speer, λεπίς Schuppe — Schuppenform d. Anthodiums!).
- Doréma** D. Don (Umbelliferen, V. 2) Ammoniakpfl. Leun., Gummidolde (gr. δώρημα Geschenk? wahrsch. δύνα Schaft — lange, schlanke Stengel), D. ammoniacum Don, e. gum-ammoniac.
- 1) **Doria** Ad. (sc. Senecio) L. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Doria“-Baldgreis (n. d. alten Dogen v. Genua, Andr. Doria — weg. d. w. Pappus!), s. Jacobaea Doria Fl. Wett. hohes Kreuzkraut (Greiskr.). 2) **Doria** Thb., Less. (Compos. Senecionid., XIX. 2), s. Cineraria alata u. bipinnata W. (Wtst.: v. d. franz. doré goldfarb. — Blütenfarbe?).
- Doritis** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Spiess“- od. „Lanzen“-O. (nicht v. δωρίτης Preis b. Wettspiel, sond. v. δύνα Lanze — Labell spiessförmig dreilappig), D. pulcherrima Ldl. (Cochinch.).
- 1) **Doronicum** T., L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Gemswurz, fr. doronie, tabac des Vosges (n. Linné v. δῶρον Gabe u. νίκη Sieg od. n. Vaillant v. d. arabischen doronigi — z. Tötung wilder Tiere! Wtst.), Garten: D. caucasicum M. B., fr. d. du Caucase, e. caucasian leopard's-bane u. Pardalianches W. (s. d.). 2) **Doron.** (sc. Senecio) L. Gebirgs-Kreuzwurz M.-Rchb.
- Dorstenia** Plum., L. (Urticaceen Artocarpeen, IV. 1) „Dorstenie“, fr. dorstène (n. Theod. Dorsten, Prof. zu Marburg, † 1539), D. Contrayerva L. peruan. Giftwurz, Bezoar- od. Schlangenwurz, fr. u. e. contrayerva, s. Drakena radix Clus., D. caulescens L. (Parietaria racemosa Plum.), D. radiata Lam. (Kosaria Forsk.).
- Dortmanna** Don (sc. Lobelia) L. (Lobeliaceen, V. 1 od. XIX. 6) Wasser-Lobelie M.-Rchb. (n. d. Gröninger Apoth. Dortmann ben.).
- Doryanthes** Corr. (Amaryllideen Agaveen, VI. 1) „Speerblume“ (δόρυ Speer, ἄνθη Bl. — langer lanzenf. Schaft!), D. excelsa R. Br., D. Palmeri W. Bull etc.
- Doryenium** T., Mnch. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Backenklee Leun., „Spiess“- od. „Speerklee“ (gr. δορίζυλος Diosc. v. δύνα Speer — z. Vergift. d. Speere diente Convolvulus Doryenium L.), D. suffruticosum u. herbaceum Vill.
- Doryopteris** Sm. (Farne, XXIV. 1) „Speerfarm“ (v. δόρυ, -ατος u. -νος Speer, πτεροίς Farn — spießf. Wedel!), Zier. D. collina Raddi (Bras.), sagittifolia Sm., palmata Sm. etc. (das.).
- 1) **Doryphora** Rchb. f. (zu Cephalanthera Rchb.) (Orchideen, XX. 1) „Speerträgerin“ (s. v., φρούριο tragend). 2) **Doryphora** Endl. (Laurineen Monimieen, XXI. 3) (— langlanzettl. Perigonlappen), z. B. D. sassafras Endl. (Neuholl.).
- Dothidéa** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Geschwür“- od. Dürrpilz (v. δοθύνειν od. -θύω Geschwür u. εἴδουμαι gleiche — braune Farbe u. Gestalt wie ein solches), s. Asteroma DC. — Dothideacae DC.
- 1) **Douglasia** Lindl. (Primulaceen, V. 1) „Douglas“-Primel (n. d. schott. Bot. u. Reis. in Californien 1834, David Douglas). 2) **Douglassia** Schreb. (Laurineen, VI. 1), s. Laurus hexandra Sw. 3) **Douglassia** Houst. (Viticeen, XIV. 2) = Clerodendron s. Volkameria fragrans.
- Draba** L., DC. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Hungerblümchen, fr. drave (gr. δράβη Diosc. = Lepidium Draba L., eine bittere Pfl.), D. verna

L., fr. mignonette, Zier. D. aīzoides L., D. repens M.-B., fr. dr. rampante, e. creeping Draba (Sibir.).

Dracaena L. (Liliac. Smilaceen od. Asphodeleen, VI. 1) „Drachenbaum“, fr. dracène (gr. δράκων weiblicher Drache — d. blutrote Saft = Drachenblut!), Dr. Draco L. echter Dr., s. g. Drachenblut, fr. dracène od. dragonnier (bois-de-chandelle), e. dragoon's-blood (Dr. reflexa autt.), Zier. ensifolia Wall., fr. reine des bois, D. Aubryana A. Br. (leichtblüh.), D. terminalis stricta Hort. rotstreif., D. marginata Lam., rubra (rotberige), Warmh. Dr. (Charlwoodia) congesta, (Dracaenopsis) australis, (Dianella) indivisa spitzschilfbl., v. bruno-lineata Hort., v. brun.-lin.-latifolia, (Cordyline) Haageana breitblättr., Mooreana br. carmin., etc.

- 1) **Draco** (sc. Dracaena) L. (Liliaceen, VI. 1) gem. Drachenbaum (s. eb.).
- 2) **Draco** (sc. Pterocarpus) Jacq. (Leguminos. Dalbergieen, XVII. 3) Drachen-Flügelfruchtbaum (draco Drache).

Dracocephalum L. (Labiaten, XIV. 1) „Drachenkopf“, fr. dracocéphale, tête-de-dragon, e. dragoon's-head (gr. δράκων u. ξεφαλή Kopf), Garten D. moldavicum L., fr. moldavique, canescens L., grandiflorum L., argunense Fisch.

- 1) **Dracontium** L. (Aroideen, XX. 9) „Drachenwurz“, fr. draconte, e. dragon's-wort (v. δράκων, -ορτος Drache — Stengel fleckig wie Schlangenhaut!), z. B. pertusum L. = Philodendron pertusum Kth. s. g. Baummörder.
- 2) **Dr.** (sc. Arum) L. kleiner Aron M.-Rchb.

Draeopis DC. (zu Rudbeckia Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Drachenauge“ (s. v., ὀτος Gen. v. ὄψ Auge, Gesicht), Zier. D. amplexicaulis Cass., s. Rudbeckia ampl. Jacq.

- 1) **Draeunculus** T. (sc. Arum) L. (Aroideen, XX. 9) „Drachenwurz“, fr. draconcule od. serpentaire (dem. v. draco Drache).
- 2) **Drac.** Bess. (sc. Artemisia) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Dragun-Beifuss, Esdragon, fr. estragon od. herbe-au-dragon (— Wurzel schlangenartig gewunden).

Drakaea (-kēa) Lindl. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) „Drake's“-O. (n. Franz Drake, d. Erdumsegler unter Königin Elisabeth v. England), D. elastica Van Houtt., s. Arethusa Sw.

Drepanocarpus F. W. Mey. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) „Sichelhülse“ Kino od. senegalsches Santelholz (δρεπάνη Sichel, ζαρός Frucht), s. Pterocarpus L.

- 1) **Drepanophyllum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Sichelblatt“ (s. eb., φύλλον Laubblatt), s. Sium Falcaria L. (Critamus F. Rchb.) u. Falcaria Rivini Host s. vulgaris Bernh. — 2) **Drep.** Rich. (Moose, XXIV. 2) „Sichelmoos“, D. fulvum Hook., s. Fissidens falcifolius Schwägr.

Drimys Forst. (falsch Drymis !) (Magnolieen, XIII. 4) Winternrindenbaum, fr. boique (gr. δρυμὺς beissend, scharf — aromat. Rinde!), Gewächsh. D. Winteri Forst. — Wintera Pers., aromatica Murr. (Chili).

Drosanthē Spach (Hypericinen, XVIII. 3) (zu Hypericum L.) Mannsblutblume (nicht v. δρόσος der Tau, sond. Androsaemum u. ἄνθη Bl.), D. helianthemoidea Spach.

Droséra L. (Cistineen Droseraceen, V. 5) „Sonnenbau“, fr. rosée du soleil, rorelle od. herbe de la rosée, e. ros-solis u. sun-dew (v. δροσός betaut — gestielte Drüschen im Sonnenschein wie Tau), D. rotundifolia L. — Droseracēae, -réae Rchb.

Drosophyllum Lk. (Cistineen Drosereen, V. 5) „Taubblatt“ (δρόσος Tau, φύλλον Blatt — im Sinn der vorigen!), D. lusitanicum Lk., s. Spergula droseroides Brotero.

Drunimondia DC. (Saxifragaceen, V. 2) „Drunimondie“ (n. d. Pflanzensammler Thom. Drummond, † 1835 auf Cuba), D. pentandra DC., s. Mutella pent.

- Drupacēae** DC., Seub., „Steinfrüchtler“ Leun. (drupa, gr. δρύπη Steinfrucht).
- Drusa** DC. (Araliaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Le Dru's“-Dolde (n. d. franz. Bot. u. Reis. in China Le Dru, schr. voyage aux îles de Ténériffe etc., Paris 1810), D. oppositifolia DC.
- 1) **Dryandra** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Dryander's“-Silberbaum (n. d. schwed. Bot. Jon. Dryander), Gewächsh. D. formosa, falcata R. Br., nobilis Lindl., speciosa, floribunda, nivea etc. R. Br. 2) **Dryandra** L., Thb. (Euphorbiaceen, XVI. 4) „Dryandersbaum“, D. cordata L., s. Vernicia montana Lour.
- Dryas** L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) Achtauge, „Dryade“ od. Waldgöttin Vilm., Silberkraut, Hirsch- od. Silberwurz, fr. dryade u. chénette, e. mountain - Avens (*Δρυάς*, -άδος Baumnymphe od. Dryade, v. δρῦς Eiche — Blattähnlichk.), Zier. D. octopetala L. (Alp.), fr. dryade à huit pétales, e. eight-petaled-m.-Av. — Dryadæe Vent.
- Drymaria** W., DC. (Paronychieen, V. 3) „Waldknorpelblume“ (v. δρυμαία od. -ορ Eichwald — sehr verbreitet wachsend, wie ein kleiner Wald, Wst.), D. cordata Kth., s. Holostēum cord. L. (Loeflingia renifolia Lag.) etc., s. Illecebrum T.
- Drymōda** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Waldorche“ (δρυμώδης waldig — auf Waldbäumen), s. Epidendron L.
- Drymonia** Mart. (Gesneriac. od. Bignoniac., XIV. 2) Wald- od. Zart-Gesnere (δρυμόνιος adj. v. δρυμός od. -ωρ Eichwald, Wst. v. δρυμός (?) zart, fein — zarter Klimmstrauch!).
- Drymophila** R. Br. (Sarmentaceen, VI. 1) „Waldlieb“ (s. eb., φιλος, -η Liebhaber, -berin), D. cyanocarpa R. Br. (Neuholl.).
- Drynaria** (bess. *Dryaria*) Bory St. Vinc. (Farne, XXIV. 1) „Baumfarn“ (v. δρῦς, -ύος (nicht δρύρος), Baum; ähnl. Fehler in d. Entomologie Drynobia st. Dryobia „Wald-Eichenglucke“), D. coronans Bory, morbillosum etc., s. Psygnum Presl s. Polypodium L.
- Dryobalanops** G. f. (Tiliac. od. Laurineen, Dipterocarpeen, XIII. 1) Flügeleiche od. Kampherölbaum (δρῦς, -ύος Eiche, βάλανος Eichel, ψύ Gesicht — Frucht wie eine Eichel in einem Becherkelch), D. aromatica G. f., s. Dryobalanus autt.
- Dryopeia (-ēja)** A. P.-Thouars (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Baum“-O. (s. v., ὅπεια schaue — Baumschmarotzer!), D. discolor u. oppositifolia P.-Th.
- Dryoptyris** Sm. (Farne XXIV. 1) „Eichenfarn“ (s. v., πτερίς Farm), s. Polypodium Dryopteris L. Eichen-Tüpfelfarn Leun.
- 1) **Duchesnea** Sm. (-nia) G. Don (Rosaceen Sanguisorbeen, XXI. 8) „Duchesne's“-Erdbeere (n. d. Bot. Duchesne, schr. Hist. des Fraisiers, Par. 1766), D. fragiformis Sm., s. Fragaria indica Hort.
 - 2) **Duchesnia** Cass. (Compos. Inuleen, XIX. 2), s. Francoeuria DC.
- 1) **Dudaïm** (sc. Cucumis) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Apfel-Melone, „Dudaïm-Gurke“ (Dudamia Beckm.), s. Cucumis Melo var. Dudaïm Naud. (Cucumis odoratissimus Mnch. s. pictus Jacq.) (hebräisch. Bibelwort nicht bekannter Bedeutung). 2) **Dudaïm** G. Frank (Solanen, V. 1) Alraun = Mandragora officinalis Mill.
- Dugaldea** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Dugald's“-Blume (n. Dugald Stewart, schott. Philos., † 1828).
- Duhaldēa** DC. (Compositen) „Duhald's“-Blume, D. chinensis DC. (n. d. Reis. J. B. Duhalde, Beschr. v. China, Mitte des 17. Jahrh's.).
- 1) **Duhamelia** Pers., Domb. (Contorten od. Sapotac. Lucumeen, V. 1) „Duhamelie“ (n. d. franz. Bot. Duhamel du Monceau, † 1782), D. ventricosa P., D. Manglilla Domb., s. Bumelia Manglilla W. u. Hamelia Jacq. 2) **D.** Pers. (Rubiaceen, IV. 1).

- Dulacia** Neck. (Myrobalaneen, XII. 1) „Dulac's“- od. Moquillo-Mandel, s. Moquilea Mart., Zucc. od. Acia Schreb. (Acioa Aubl.) (n. Franz Alleon Dulac).
- Duleamära** Mnch. (sc. Solanum) L. (Solaneen, V. 1) „Bittersüß“, Alp- od. Wasserranke, Sausebe, Stickwurz, Seidelbeere, fr. douce-amère, morelle, loque, vierge, vigne de Judée, e. bitter-sweet, woody-night-shade „holziger Nachtschatten“ (dulcis süss, amarus bitter).
- Dulichium** Pers. (**Duleichium**) Rich. (Cyperaceen, III. 1) „Doulichion“-Riet (n. d. echinadischen od. jonischen Insel Αούλιχιον Homer, od. dulcis süss — so schmeck. Wurzel), D. canadense Mchx., spathaceum Pers. (Cyp̄erus spath. W.).
- 1) **Dunalia** Hb., Bpl., Kth. (Solaneen, V. 1) „Dunal's“-Strauch (n. d. franz. Bot. Dunal), D. solanaeá Hb., Bpl. (südam. Str.). 2) **D.** Spr. (Lythrarieen, VI. 1), tuberosa Spr., s. Peplis tetrandra L. 3) **D.** R. Br. (Labiaten).
 - Duperreya** Gaud. (Solaneen od. Convolvulaceen, V. 1) „Duperrey's“- Strauchwinde (n. d. Bot. u. Reis. Duperrey, s. d. Aut.), D. sericea Gaud. (Hstr.).
 - Duranta** L. (Vitaceen, XIV. 2) „Durante“-Müllen (n. d. Arzt u. Bot. Castor Durante, † 1590), Warmh. D. Bonardi, Plumieri L. s. spinosa (Castoreá racemosa Plum.) u. Ellisia L. (Str.).
 - Dario** Rumph., L. (Sterculiaceen, XVIII. 3) Kürbisfruchtbaum, ind. Zibethbaum Leun., fr. durion, D. zibethinus L. (v. duryon, dem malayischen Nam. d. Frucht).
 - Duris** Juss. (Capparideen, XIII. 1) Baumkapper (δοῦρον od. -οα Baum).
 - Duroia** L. f. (Rubiaceen Guettardeen, VI. 1) Waldecacao, Marmeladedosen-Baum (n. d. franz. Bot. Duroi), D. Eriopila L. „Wollhaar“-Cacao (Cacao sylvestris Aubl.), s. Genipa Meriana Pers.
- 1) **Duvalia** Haw. (Asclepiadeen, V. 2) „Duval's“-Wachspfl. (n. den Botanikern Duval, s. d. Aut.) D. compacta Haw., s. Stapelia replicata Jacq. 2) **Duvalia** Nees (Lebermoose, XXIV. 2), D. rupestris Nees, s. Marchantia hemisphaerica L.
 - Duvaua** Kth. (Terebinthac. Anacardieen, XXII. 9) „Duvau's-Nierenbaum (n. d. franz. Freunde Kunth's Duvau), s. Amyris polygamia Cav. (Schinus dependens Orteg.).
 - Duvernoya** Desf. (Lythrarieen, XI. 1) „Duvernoy's“- Kelchhöcker (n. Duvernoy, schr. Fl. v. Tübingen, 1722), s. Cuphea Jacq.
 - Dyckia** Mart., Schult. (Bromeliaceen, VI. 1) „Dyck's“-Ananaspfl. (n. d. Fürst. Salm-Dyck, Gönner d. Bot.), D. frigida Hook. f., s. Pourretia frig. Hort. Lind.
 - Dypsis** Nor. (Palmen, XXI. 8) „Tauchpalme“ (v. δύπτω tauche unter — steht im Wasser, Kolben in nur oben offenen Scheiden), D. pinnatifrons „fiederwedelige“, s. Areca gracilis Thouars.
- 1) **Dysodéa** Pers. (-dia) Cav., Lag. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Stinkblume“ (δυσωδής übelriechend), D. glandulosa Less., s. Boebéra W. 2) **Dysodéa** Pers. (-da Lour.) (Rubiac. Cinchonaceen, V. 1), s. Serissa Commel. 3) **Dysodéa foetida** (Disodea f.) autt. (Compos. Cichoriac., XIX. 1), s. Crepis foet. L. (Barkhausia f. DC., Hieracium f. Karsch).
 - Dysophylla** (nicht **Disoph.-**) Blum., Benth. (Labiathen, XIV. 1) „Stinkblatt“ (s. eb. st. Dysodophyllum v. δυσωδής u. φύλλον Blatt), D. strigosa Benth. (Ostind.), s. Mentha.
 - Dysoxylon** Blum. (Hesperid. Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) Riech- od. „Stinkholz“ (v. δυσύξω rieche übel, od. δυσωδής s. v., ξύλον Holz), D. alliacēum Blum., s. Trichilia alliacēa Forst.

- Earina** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Frühlings“-O. ($\xi\alpha\sigma$, -ρος Frühling — blüht im Sept. u. Okt., d. Frühl. Neuholl.'s), z. B. E. Deplanchei Rchb. f.
- Ebelia** Rchb. (Rubiaceen, IV. 1) „Ebelie“ (n. W. Ebel, schr. de Armeriae genere, Königslb. 1840).
- Ebenaceae** Juss., DC. (zu Ord. Styracinae Bartl.) „Ebenholzbäume“.
- Ebenoxylon** Lour. (Sapotac. od. Lucumeen, XXIII. 2) Ebenholz v. Cochinchina, fr. ébénoxyle, s. *Diospýros Ebénum L.*
- Ebénum** Kön., L. f. (sc. *Diospýros*) L. (Sapotac. od. Lucumeen, XXIII. 2) Schwarzholz = Lotus, Schwarzholzkern, echtes „Ebenholz“ W. ($\mathcal{E}\beta\sigma\rho\sigma$ Théophr., hebr. eben, arab. abnous Stein!).
- 1) **Ebénus** L. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) Ebenholz, Schwarzholz, E. cretica L., fr. ébène (-nier), e. ebony-tree (eben-, ebon-) (gr. $\xi\beta\sigma\rho\sigma$ Theophr., lat. ebénus, arab. abnous). 2) **Ebénus** (sc. Maba) Spr. (Ebenaceen, XXII. 8) gem. Ebenholz (*Ebénus vulgaris* Roxb.). 3) **Ebénus** (sc. Aspalathus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Ebenholz = Dornhülsenbaum, s. g. Rhodiserholz. 4) **Ebénus** Comm. (Lucumeen od. Minusopeen, VIII. 1).
- Ebílum** Pont., Grck. (-us) (sc. Sambucus) L. (Caprifoliaceen, V. 3) Zwerghollunder, Attich od. Eppich, fr. aubier (obier), petit sureau, sureau aquatique, e. danewort, dwarf- od. marsh-elder (lat. ebulum od. -lus Eppich — viell. von εὐ u. βούλη Rat — n. Plinius als Mittel geg. allerlei Übel), E. humile Grck. s. Samb. Ebílus L.
- Ecastophyllum** P. Br. (Hecast.-), H. B. K. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 4) „Einzelblatt“ ($\xi\sigma\alpha\tau\sigma\tau\sigma$, lat. singulus einzeln, $\varphi\iota\lambda\sigma\sigma$ Bl.), E. frutescens P. Br., s. Pterocarpus s. Hedysarum Ecastoph. L.
- Ecballion** Koch (-um Rich.) (Cuecarbitac., XXI. 10) „Spritz“, Vexier-, Eselsgurke (v. $\xi\pi\beta\delta\lambda\lambda\omega$ werfe heraus — nämli. bei Berührung die Samen!), E. agreste Rchb. s. Momordica Elaterium L. (Ecballium Elaterium Rich.).
- Eccilia** Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) Hohlstiel P. Kumm. (v. $\xi\pi\pi\lambda\kappa\alpha\tau\omega$ höhle aus), z. B. calophylla, griseo-rubella Fr. etc., s. Agaricus L.
- Eceromocarpus** Rz., Pv. (Bignoniac., XIV. 2) „Hängfrucht“, Schönrebe Rmpl. (v. $\xi\pi\pi\lambda\mu\mu\mu\mu$ hänge herab, $\chi\alpha\sigma\tau\sigma\tau$ Fr.), E. seaber R. P., rauhfrüchtig, fr. Bignone du Chili, e. rough-podded Eccr. (Wand-Decor.), s. Calampélis scabra Don.
- Echeandia** Orteg. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) „Echeandie“ (n. Greg. Echeandia, Prof. in Saragossa), E. terniflora Ort. s. Conanthera Echeandia Pers.
- Echeveria** DC. (Crassulaceen, X. 5) „Echeveri's“-Dickblatt (n. Echeveri, Wtst.: Echever, Zeichner d. Fl. Mex., in Mexiko), Gärt. secunda Lindl. m. v. glauca, metallica Nutt., coccinea DC., fulgens Lem., Stuben: retusa Lindl., campanulata, etc., s. Cotyledon L.
- Echinacea** Mnch. (zu Rudbeckia Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Stachelkopf“- od. Purpur-Rudbeckie (v. $\xi\pi\pi\sigma$ Igel), Zier. E. purpurea Mnch. s. serotina DC., s. Rudb. purp. L. s. hispida Hoffm.
- Echinanthriscus** Lantzius-Beninga (Umbellifer., V. 2) „Stachel-Klettenkerbel“ (s. eb. u. Anthriscus), E. vulgaris Lantz. s. Anthriscus vulg. Pers. (Scandix Anthr. L.).
- Echinaria** Desf. (zu Sesleria Rchb.) (Gräser, XXIII. 1) „Stachel“- od. „Igelgras“ (s. v. — Kronspelz, eingeschnitten, lang, steif u. rauh), E. capitata Desf. s. Sesleria echinaria Schrad. s. Cenchrus capit. L. f.
- Echinocactus** Salm-Dyck, Lk., Otto (zu Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Stachel“- od. „Igel“-Cactus (s. v.), Topf. E. Ottonis Lehm., Scopa Lk., Otto „Besen“-C., Linkii u. corynodes „kolbiger“, mammillosus Lem., Mirbelii, cylindracus Engelm., etc.

- Echinocarpus** Blum. (Tiliaceen od. Bixaceen, XIII. 1) „Stachelfrucht“- Linde (s. v., *ζαοτός* — Kaps. m. auss. stachl. Klappen), E. s. Slo- anea paradisearum F. Müll.
- Echinochloa** P.-B. (zu *Panicum L.*) (Gräser, III. 2) „Stachelgras“ od. -hirse (s. v., *χλόα* od. *-όη* Gras — Spelz. d. geschlechtslos. Blütch. stark begrannt), E. crus-galli „Hahnensporn“ od. Hühner-Fennich M.-Rchb., fr. pied-de-poule.
- Echinocystis** Torr. u. Gr., Cognx. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Stachel- blase“ (s. v., *ζύστις* Blase — d. kugl. aufgeblas. Frucht stachel- borstig), E. australis Cognx.
- Echinodorus** Rich., Engelm. (Alismaceen, VI. 5) „Igelkopf“- Frosch- löffel, „Igelschlacht“ (s. v., *δορύς* Schlauch — Carpideen lederart. einsamig etc.), E. natans u. ranunculoides Eng., s. Alisma natans etc.
- Echinoglochin** Lehm. (Boragineen, V. 1) „Igelsame“, s. Echinosper- mun Sw. (s. v., *γλώχιν* Spitze, Ecke — stachelspitz. Samen!), E. Lappula Lehm. s. Lappula Myosotis Rupp. (*Myosotis Lappula L.*)
- Echinolobium** Desv. (Leguminos. Hedysareen, XVII. 4) „Stachelhülse“, Esparsette (s. v., *λοβίον* dem. v. *λοβός* Hülse — Glied d. Hülse weichstachl., widerhakig etc.), s. Hedysarum Onobrychis L.
- Echinomelocactus** DC. (Cacteen, XII. 1) „Stachel-Melonendistel“, s. Melocactus DC.
- Echinonyctanthus** Lem., Miq. (Cacteen, XII. 1) „Stachel-Nachtblume“ (s. v., *νύξ*, *-ντος* Nacht, *άρθος* — nächtl. Blüten aus dorn. Höckern), s. Echinopsis Zucc.
- Echinopeae** (sc. Compos. Homioianthae Rchb.) „Kugeldistelartige“, s. Echinops.
- Echinophora** T., Col., L. (Umbelliferen, V. 2) „Stachelträgerin“, - Hülldolle, Igelklette Dietr., fr. échinophore (s. v., *γορός* tragend — d. ganze Pfl. hat Stacheln), E. spinosa L. s. Daucus, Crithmum, Caucalis u. Pastinaca echinophora apūla Column.
- Echinops** L. (Compos. Echinopeen, XIX. 5) Kugeldistel, Igelkopf, Knopfwurz O. W., fr. échinope, boulette, e. globe-thistle (v. *έγριος* Igel u. *ψυ* Ansehen), Zier. E. ruthenicus Fisch., sphaerocephalus L., Ritro' L. glattblättr., fr. boulette azurée. — Echinopsidæa Less., DC. (-opæa Rchb.).
- Echinopsis (-um)** Moq.-Tand. (Chenopodiaceen, V. 2) „Stachelhaar“ Grck. (nicht v. *υἱλός* nackt, sond. *υἱλόν* dor. st. *υἱλόν* Feder — strahlig fünfstachel. Perigon), E. hirsuta Moq. s. Salsola hirsuta L.
- Echinopsis** Zucc. (Cacteen, XII. 1) „Stachelcactus“, „Igelgleicher“ (s. v. u. *ὅψις* Aussehen), Gewächsh. E. Eyriesii Zucc., multiplex Zucc., Decaisneana Lem. u. Zuccarinii, s. Echinonyctanthus Lem.
- Echinospermum** Lehm., Sw. (Boragineen, V. 1) „Igelsamen“, Stachel- nüsschen Seub. (s. v., *στέρωμα* Samen — dies. rauh, wie Kletten!), E. Lappula u. deflexum Lehm., s. Myosotis etc. L., Wahlbg.
- 1) **Echinus** (sc. Statice) L. (Plumbagineen, V. 5) „Stachelblatt“ (gr. *έγριος* Igel). 2) **Echinus** Lour. (Euphorbiac., XXI. 9), E. trisulcus Lour., s. Mappa cochinchinensis autt.
- Echites** P. Br., L. (Apocyneen, V. 1) „Viper“- od. „Otter“-Wachs- kraut, Klammerstrauch D., fr. échite (gr. *έχιτης* Otterstein u. -strauch v. *έχις*, *-ιος* Otter, Schlange — schlangenart. gewund. Stengel), Zier. E. Mélealeuca u. nutans; E. caudata L. s. Strophanthus dichotomus DC.
- Echium** L. (Boragineen, V. 1) „Natterkopf“, fr. vipérine, herbe aux vipères, e. adder's-tongue od. viper's-bugloss (*έχιον* od. *έχειον* Ottern- kraut — Stengel fleckig, Wtst., Staubfäd. wie Schlangenzungen vor- stehend!), wild E. vulgare L., Zier. creticum L. (non Pall.) cana- discher N.

Eclipta L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Fehlkrone“, Mehlblume D. (v. ἔκλειπομαι fehle — dem Samen fehlt Krone u. Flügel, Wtst.: ἔκλειτο lasse aus, ἔκλειψις Verfinsterung, n. Rumphius Auswurf d. Sonne bei Sonnenfinsternissen nach Ausleg. d. Malayen!), E. erecta L. (Cotula s. Verbesina alba), s. Micrelium asteroides Forst.

- 1) **Edgeworthia** Falcon. (Myrsineen, V. 1) „Edgeworthie“ (n. d. engl. Novellistin Miss Mary Edgeworth, † 1849), z. B. chrysanthra Falc.
- 2) **Edg.** Lindl., Meisn. (Thymeläeen, VIII. 1), s. Daphne Gardneri Wall.

Edraianthus DC. (Campanulaceen, V. 1) Büschelglocke Koch-Hallier (v. ἐδοαῖος sitzend, ἀρθρος — sitzende Blüt.), z. B. pumila DC. Zwerg-, „Sitzblume“, tenuifolius u. Kitaibelii A. DC. (östr. Alp.).

- 1) **Edwardsia** Salisb. (-wardia Raf.) (Cassieen Sophoreen, X. 1) „Edwardsie“ (n. d. Bot. S. Edwards), E. chilensis Miers, s. Sophora sericea s. macrocarpa Sm., E. microphylla Sal. (Soph. micr. Ait.) etc.
- 2) **Edw.** Neck. (Compositen).

Eglanteria (sc. Rosa) L. (Rosaceen, XII. 5) gelbe Rose, fr. églantine (-tier), e. eglantine, s. Rosa lutea J. Bauh. (v. d. franz. églantier Hunds- od. Heckenrose).

Ehrenbergia Mart., Spr. (Rutac. Zygophylleen, X. 1) „Ehrenberg's“- od. brasili. Burzeldorn (s. d. Autoren), E. tribuloides Mart., s. Tribulus brasiliensis Hort.

- 1) **Ehretia** L. (Boragineen od. Hydrophylleen, V. 1) „Ehret's“-Wasserblatt (n. G. Dion. Ehret, arb. für Jussieu in Paris, † 1770 in Engl.), s. Hydrophyllum. — Ehretiacæ Mart. (zu Hydrophylæa R. Br.).
- 2) **Ehretia** W. (Ebenaceen, XXII. 6), E. ferrœa W., s. Ferreola s. Maba buxifolia Koen.

- 1) **Ehrharta** Thb., Sm., Web. (Gräser, III. 2) Reis-Leersie, E. clandestina Web., s. Leersia oryzoides Sm., E. capensis Thb. etc. (n. d. schweiz. Bot. Ehrhart, Linné's Schüler). 2) **Ehrhardia** Scop. (Laurineen) (nach demselben!).

Eichleria (g. n.) (Oxalideen, X. 4) „Eichler's“-Sauerklee (n. d. Bot. A. W. Eichler), E. (Oxalis) Blanchetiana Moriç.

Elaeagnæcae R. Br., -nae DC., -ni Juss. (zu Proteacæae Rehb.) Stranddorngewächse, s. sogl.

Elaeagnus L. (Proteac. Elaeagnee, IV. 1) Oleaster od. Ölweide, s. g. wilder Ölbaum, fr. olivier sauvage, olivetier, auch chalef, e. oleaster (olivaster), wild olive-tree (gr. ἔλαιαγνος Wtst. ἔλαια od. -λαίη Ölbaum u. ἔγρος (Vitex Agnus castus) geb. — Blätt. ähnl. denen des Keuschlammus!), Zier. E. angustifolia L. s. hortensis M.-B., fr. daphne-not des Antilles, E. argentea Pursh (macrophylla Hort.) amerik. Silberbaum, fr. chalef argenté, e. Missouri-silver-tree.

Elaeïs Jacq. (Elaïs L.) (Palmen, XXII. 6) „Ölpalme“, fr. avoira, e. oily-palm (ἔλαιος v. ἔλαιον Öl), E. guineensis L. wahre, afrik. u. E. guyanensis P. Br. (Stuben).

Elaeocarpus L. (Tiliac. Elaeocarpeen, XI. 1) „Oliven“- od. „Ölfruchtbaum“, Ganiterbaum D., fr. gauitre (ἔλαιον Öl, ζαρτός Fr. — Ähnlichk. mit ein. Olive), E. sylvestris Poir., s. Adenodus sylv. Lour., E. Perim-Kara DC. malabar. Ganiterb. Leun. (El. copallifer Vahl s. Vateria indica Rheed.), s. Craspedum Lour.

Elaeoselimum Koch, DC. (Umbelliferen, V. 2) „Ölsilje“ (s. v. u. Selinum gr. σέλινον Silje).

Elaephomycës Nees (Bauchpilze, XXIV. 4) Hirschtrüffel, s. g. Hirschbrunst (ἔλαφος Hirsch, μύκης Pilz). — Elaphomycë Fr.

Elaphrium Jacq. (Amyrideen Burseraceen, VIII. 1) Leichtholz Leun. (ἔλαφος gering — gering. spez. Gewicht), s. Fagaria Elaphrium (zu Amyris Spr.) Tacamahac-Harzbaum.

Eläte Ait. (Palmen, XXI. 3) „Fichten“- od. „Tannen“-P. D., fr. élate (gr. ἐλάτη Fichte), E. *sylvestris* L., s. g. wilder Dattelbaum D., s. Phoenix.

Elaterium Mnch. (sc. *Momordica*) L. (sc. *Ecballium* C. Rich.) (Cucurbitac., XXI. 10) „Schleuder“- od. Spritzgurke, Esels-, Vexier-G., Igelod. Hundskürbis, fr. momordique élastique, e. wild-squirting-cucumber, s. *Ecballium agrestis* Rchb. s. *Elaterium* C. Rich. (ἐλατής Treiber etc. — schleudert aufspringend d. Samen fort!).

1) **Elatine** L. (Lythrariaen, VIII. 4) „Tännel“, fr. élatine (ἐλατίνης v. ἐλάτη Fichte etc. — Ähnl. d. Pfl. damit!). — *Elatinæae* Rchb., -tinae Camb., Grck. (zu *Lythrariae* Rchb.). — 2) **Elatine** (sc. *Antirrhinum*) L. (Scrophularineen, XIV. 2) Tännel-Löwenmaul.

Eleniféra Plum. (sc. *Amyris*) L. (Terebinthaceen Amyrideen, VIII. 4) „Elemi“-Balsam, fr. élémier, e. elemy (elemi vaterl. Name d. Harzes u. fero trage), E. *racemosa* Plum., s. *Cornus racem.* Plum. u. *Iccariba* Maregr.

Eleocharis Lestib. (nicht *Elaeoch.*) (Cyperaceen, III. 1) „Teichriet“, Riet Grck. (v. ἔλος, -εος Sumpf u. ζάχις Freude), s. *Scirpus* L. u. Heleocharis R. Br.

Eleogiton Lk. (Cyperaceen, III. 1) Flutsimse (s. eb. u. γείτων Nachbar etc.), E. *fluitans* Lk., s. *Scirpus* s. Heleocharis fluit. Hook.

Elephantopus Cass. (Compos. Segregaten, XIX. 5) „Elephantenfuss“, fr. éléphantope, pied d'éléphant (ἐλέφασ, -αρτος, τοῦς Fuss — weg. d. Wurzelblätt.), E. *scaber* L.

Elephantusia W., Mart. (Pandaneen, XXII. 1) „Elephantenbaum“, fr. éléphantusie (s. eb., οὐσία Wesen), E. *macrocarpa* Mart., s. g. vegetabil. Elfenbein, s. *Phytelephas* Rz. Pv.

Eléphas T. (Scrophularineen, XIV. 2) Elephantenrüssel, Rüsselhelm, fr. éléphas (s. v. — lange Oberlippe!), E. *italica* T., *orientalis* T., s. *Rhinanthus* *Elephas* L., orient. L., etc.

Elettaria Don, Maton (Amomeen od. Scitamineen I. 1) Cardamom-Ingvær (elettari, Nam. d. Pfl. auf Malabar), E. *Cardamomum* White echte Cardamomen (*Cardamomum minus*), Cardamom-Alpinie, s. *Amomum* *Cardamomum* L. (*Alpinia* C. autt.).

Eleusine Lam. (Gräser, III. 2) Hartgras (n. *Eleusina*, Stadt in Attika mit Cerestempel, Ceres od. Göttin d. Getreides!), E. (s. *Poa*) *dura* Scop., s. *Sclerochloa dura* P.-B., Zier. E. *coracana* Lam. ind. Kammgras od. Korakan (Tocussa).

Eleutherococcus Maxim. (Araliaceen, V. 5) Stachelbaum Lauch., „Freikorn“ (ἐλεύθερος frei, ξόζος Korn etc.), E. *senticosus* Max. (Hedera sent. Rupr.).

Eleutherogynæ A. Rich. (sc. Monocotyledones Juss.) „Freiweibige“ (γυνή Weib, Stempel etc. — Frucht knot. unverwachsen, frei!).

1) **Elichrysum** W. (*Helichr.*- G.) (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Strohblume, eig. „Sonnengold“ (v. ὥλιος Sonne, Wst. v. ἐλιτώ od. ἐλώ winde, rolle?, χρυσός Gold), Zier. E. *proliferum* W., spec. *grandiflorum* Hort., purpuréum, besond. aber orientale G. u. *bracteatum* W. s. g. Immortelle von Malmaison, brachyrrhynchum Sond. (Austral.), wild E. *arenarium* DC. Sand-Immerschön. 2) **Eliehr.** *aethiopicum* Pluk. (Rhamnac., V. 1), s. *Phyllica eriophora* Ait.

Elisma Buchenau (Alismaceen, VI. 5) Schwinne-Froschlöffel (v. ἐλος Sumpf — analog *Alisma*!), E. *nataans* Buch. s. *Alisma nat.* L.

Elleanthus Presl (Örhideen Epidendreen, XX. 1) „Wickelblume“ (v. ἐλλιώ wickle ein, ἄνθος — d. Blüt. in Brakteen eingeschloss.), E. *linifolius* Presl, s. *Isochilus* Lindl.

1) **Eloděa** Rich., Mchx. (Elatineen, VIII. 4) Wasserquendel (ἐλωδής, -εος Sumpf liebend), E. *canadensis* Mchx. s. g. Wasserpest, s. Ana-

- chäris Alsinastrum Rich. u. Tropperaria pestifera autt. 2) **Elodes** Ad., Chois. (-des Spach) (Hypericineen, XVIII. 3) „Sumpf“-Hartheu, E. petiolata u. tubulosa Pursh, E. palustris Spach, s. Hypericum Elodes L.
- Elodes** Spach (zu Hypericum L.) (Hypericineen, XVIII. 3) „Sumpf“-Hartheu, E. palustris Spach, s. Hypericum Elodes L. (vgl. eb.) ($\xi\lambda\omega\delta\eta\zeta$, -eos Sumpf liebend).
- 1) **Elsholtzia** W. (Elssholzia Grck.) (Labiaten, XIV. 1) Kamm-Ysop (n. Joh. Sig. Elsholtz, schr. Fl. marchica, † 1688), E. cristata W. (Hyssopus cr. W.), E. ocimoides W. (Mentha oc. Lam.). 2) **Elsholtzia** Rich. (Melaleucaceen, XVIII. 2).
 - 1) **Elsneria** Walp. (Umbelliferen, V. 2) „Elsner's“-Dolde (n. Mor. Elsner, s. d. Aut.).
 - 1) **Eluteria** (sc. Clutia) L. (Euphorbiac., XXII. 14) „Wollhüllen“-Purierstrauch (v. $\xi\lambda\omega$ hülle ein, $\xi\omega\sigma$ Wolle? — unbestimmt, vielleicht d. veränd. Alaternus!), s. Croton Eluteria Sw. (Ricinus dulcis arborescens Seb.). 2) **Elutheria** (bess. Eluteria) P. Br., arborea P. Br., s. Guarea trichiloides L. (Meliaceen, VIII. 1) = Melia Guarea Jacq.
 - Elýmus** L. (Gräser, III. 2) Haargras, fr. élyme (gr. $\xi\lambda\nu\mu\omega\varsigma$ Fennich v. $\xi\lambda\omega$ hülle ein — Blätt. zu grob. Flechtwerk), Zier. E. arenarius L., fr. él. des sables, e. sand-elymus, E. Hystrix L., s. Asperella hystrix Hb. (Hystrix patula Mnch.).
 - Embothrium** Forst. (Proteaceen, IV. 1) „Grübchen“-Anthere (v. $\xi\nu$ in, $\beta\omega\theta\sigma\omega\varsigma$ dem. v. $\beta\omega\theta\sigma\omega\varsigma$ Grube — d. Antheren in einer Grube d. Kelchblätter), Gewächsh. E. speciosissimum Sm. (Telopea R. Br.) (Prachtstr. D.), E. coccineum Forst. (Südspitze Amerika's).
 - Emérus** T. (sc. Coronilla) L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) Peitschen, Skorpion-Kronwicke, fr. émérus, coronille-des-jardins, e. scorpion-Senna-Coronilla (v. $\eta\mu\epsilon\omega\varsigma$ gezähmt — zahme, angenehme Pfl.), s. Emérus major Mill.
 - Emilia** Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Scharlach-Quastenkopf (n. Rousseau's Émile benannt?), Zier. E. sagittata DC. m. v. aurantiaca Hort., „Orangenköpfchen“, s. Cacalia sonchifolia Hort.
 - Empetracæae** (-træae) Nutt. (sc. Rutaceae) Rchb. (zu Ord. Tricoccae Bartl.) Rauschbeerartige, s. sogl.
 - Empétrum** L. (Rutac. Empetraceen, XXII. 3) Rausch- od. Krähenbeere, „Felsenstrauch“ D., fr. camarine od. vaccinet, e. crack-berry (gr. $\xi\mu\pi\tau\eta\varrho\sigma$ auf Felsboden wachs., $\xi\nu$ u. $\pi\acute{\epsilon}\tau\omega\varsigma$), E. nigrum L.
 - 1) **Empusa** Lindl. (Orchideen Malaxideen, XX. 1) „Gespens“-O. ($\xi\mu\pi\omega\varsigma\alpha$ Gespenst, Popanz), E. lancifolia Ldl. (Malaxis l. Sw.), paradoxa Ldl., s. Stelis racemosa Sm. (Bletia bicallosa Don). 2) **Empusa** Cohn (Insektenpilz, XXIV. 4) Fliegentöter, -schimmelpilz.
 - Empusaria** Rchb. f. (Orchid. Malaxid., XX. 1) = Empusa Lindl. (s. eb.).
 - Enaleïda** Cass. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Wehrblume“ ($\xi\nu$ in, $\alpha\lambda\zeta\eta$ od. -zis Wehr, Kraft), E. pilifera Cass., foeniculifolia Cass. (Tagetes clandestina Lag.).
 - Enantioblastae** Endl. „Gegensprosser“ ($\xi\varpi\tau\iota\omega\varsigma$ gegenüber, $\beta\lambda\alpha\sigma\tau\omega\varsigma$ Keim) i. q. Juncacæae Bartl.
 - Enantiosparton** C. Koch (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Zwerg-Pfriemen (s. eb. u. $\sigma\tau\alpha\sigma\tau\omega\varsigma$ Genst, lat. Genista od. Spartium), E. radiatum C. Koch (Genistæ rad. Scop., Telinaria r. Presl, Cytisus rad. Koch) (Südeur.).
 - Encalypta** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Haubenmoos“, Glockenhut ($\xi\gamma\alpha\lambda\pi\tau\omega$ verhüle etc. — grosse Haubenglocke der Kapsel), E. vulgaris Schreb., etc., s. Bryum u. Leersia. — Encalyptacæae Schimp.

Encephalartos Lehm. (Cycadeen, XXII. 11) Brotpalme Leun., Sago-od. Kafferbrotbaum ($\xi\nu$ in, $\chi\varepsilon\varphi\alpha\lambda\eta$ Kopf, $\ddot{\alpha}\sigma\tau\sigma\zeta$ Brot — in d. kopfförm. Zapfen etc.!), E. lanuginosa Jacq. (Zamia lan. Thb.), E. Hildebrandti Lehm.

Endiua Alfld. (Legumin. Viciae, XVII. 4) Zitterlinse (v. $\xi\nu\delta\iota\alpha\omega$ wohne unt. freiem Himmel), E. hirsuta Alfld., s. Ervum hirsutum L. (Vicia h. Koch).

Endivia (sc. Cichorium) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Endivien“- Salat, Wegwarte, fr. u. e. endive (v. $\xi\nu\delta\sigma\nu$ lat. in od. auf, via Weg — Wegwarte, Wtst. v. d. arab. hendibeh!).

Endymion Dumort. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Sternhyacinthe, Hasenglöckchen Grck. (n. d. schön. Hirten Endymion, Myth.), Zier. E. non scriptus Grck. (Agraphis nutans Lk., Hyacinthus n. scr. L.).

Ensatae Endl., Rchb., DC., Bartl. Ord. d. Schwertlilien (Schwertelgew. Rchb.) (v. ensis Schwert).

Ensete (sc. Musa) Bruce (Scitamineen, VI. 1 od. XXIII. 1) äthiopische Banane (vaterl.!).

Enteléa R. Br. (Tiliaceen, XIII. 1) „Schönlinde“ (v. $\xi\nu\tau\epsilon\lambda\eta\varsigma$ vollkommen — schönes Aussehen, Wtst.).

Entoloma DC. (Pilze, XXIV. 4) „Krummrand“, Schleierpilz Kumm. ($\xi\nu\tau\circ\zeta$ einwärts, $\lambda\omega\mu\alpha$ Rand — dies. einwärts gekrümmt!), E. rhodopolium „Rosenpilz“ ($\delta\dot{\alpha}\delta\sigma\zeta$ Rose, $\pi\omega\kappa\epsilon\mu\alpha$ bewohne).

Epacridæae R. Br., DC. (zu Plantaginæae Rchb.) Bergheiden (zu Ord. Ericinæae Bartl.) (s. sogl.).

Epacris Forst., Sm. (Plantagineen od. Epacrideen, V. 1) Fels- od. Bergheide, Felsbusch Rmpl. ($\xi\tau\iota$ auf, $\ddot{\alpha}\nu\sigma\zeta$ Bergspitze — Standort in Neuseeland), Zier. E. grandiflora W., purpurascens R. Br., impressa Lab., etc., s. Dracophyllum Lab.

Ephedra L. (Gnetaceen, XXII. 13) Pferdeschwanz, Meerträubel Rmpl., fr. raisin de mer od. uvette, e. mangrove-grape (gr. $\xi\varphi\epsilon\delta\sigma\alpha$ (- $\sigma\zeta$) daraufssitzend — an Felsen klimmend), Zier. E. vulgaris Rich., mono- u. distachya L., media C. A. Mey.

1) **Ephemérum** Hampe, Schreb. (Moose, XXIV. 2) „Tag“- od. „Eintags“- Moos ($\xi\varphi\mu\mu\epsilon\varrho\zeta$ auf einen Tag, v. $\xi\tau\iota$ u. $\eta\mu\epsilon\sigma\alpha$ — d. Moos dauert nicht lang). 2) **Ephemérum** Rchb. (zu Lysimachia L., Murr.) (Primulaceen, V. 1) Wald- od. „Eintags“- Lysimachie, E. (Lys.) nemorium L. 3) **Ephemérum** T., Moris. (Commelyneen, VI. 1) virginische Tradescantie, E. phalangoides Moris. = Tradescantia virginica L. (tägl. eine neue Blume!), E. bengalense Pluk. bengal. Commelyne, s. Commelina L.

Ephippium Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Sehabrucken“-O. ($\xi\varphi\iota\tau\iota\mu\sigma$ Pferdedecke v. $\xi\tau\iota$ u. $\xi\tau\iota\mu\zeta$ — Labell wie ein Pferdesattel geformt), E. lepidum u. cornutum Blum.

Epicharis Blum. (Hesperid. Meliaceen, X. 1) „Reiz“-, Paradies- od. Pater-nosterbaum ($\xi\tau\iota\chi\alpha\zeta$ reizend — schön. ansehnl. Baum), E. sericea Blum. etc., s. Guarœa Spr.

Epidendron (-um) L. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Baumwurzler“, -orche ($\xi\tau\iota$ auf, $\delta\acute{\epsilon}\nu\delta\sigma\sigma\zeta$ B. — wurzeln od. schmarotzen auf Bäumen!), E. aromaticum s. Vanilla autt. (Vanilla arom. W.) „Vanille“. — Epidendréae Juss. Baumorchen, z. B. Cattleya, Laelia, Epid. etc. 2) **Epidendrum** (sc. Lyperdon) L. (Bauchpilze, XXIV. 4) Baum-Blutmilch Kumm., s. Lycogila Epid. Mchx.

Epigaea L. (Ericac. Rhodoreen od. Melastomaceen, VIII. 1 od. X. 1) „Erd-prmel“, Grundstrauch ($\xi\tau\iota$ u. $\gamma\eta$ od. $\gamma\alpha\iota\zeta$ Erde — kriecht etc.), Zier. E. repens L. kriechendes Immergrün, s. Memecylion L., Mitch., E. cordifolia L., s. Gaultheria sphagnicola, etc.

Epigynia — **Eranthémum**.

Epigynia Juss. „Oberstempelige“ — mit oben, d. h. auf d. Blumenboden stehend. St. ($\xi\pi\iota$ u. $\gamma\upsilon\eta\dot{\imath}$).

Epilinum Weihe (sc. Cuscūta) L. (Convolvulac. Cuscuteen, V. 2) Flachsseide Grck. ($\xi\pi\iota$ u. Līnum gr. $\lambda\acute{e}t\acute{o}r$ Lein od. Flachs).

Epilobium L. (Onagrarieen, VIII. 1) Weidenröschen, Schotenweiderich, Eberich O. W., fr. épilobe, herbe de St. Antoine, e. loose - strife, willow-herb ($\xi\pi\iota$ auf, $\lambda\omega\beta\acute{o}r$ Hülschen od. Schote — Blüt. auf lang. schotenförm. Fruchtkelch), Zier. E. spicatum Lam. s. angustifolium L. (Chamaenerion speciosum Lodd.), fr. osier-fleuri, e. spiked-willow-herb m. v. fl. albo Hort., E. rosmarinifolium Hänke (angustifol. Lam.), fr. épil. à feuilles de Rosmarin, e. rosemary-leaved w.-h., Ufer: E. hirsutum L., fr. ép. rose, - velue od. - hérissé.

Epimedium L. (Papaverac. od. Berberideen, IV. 1) „Nick“- od. Sockenblume Rümpl., Nickvierblatt, fr. épimède, e. barren-wort (v. $\xi\pi\iota\mu\gamma\delta\omega\mu\alpha\iota$ sinne nach — mit gesenkt. Kopf! Wtst.: $\xi\pi\iota$ u. $\mu\gamma\delta\omega\iota\omega\alpha\iota$ in Medien wachsend, n. Dioscor.), Zier. E. macranthum Morr., Desen. u. violaceum Morr., Deesn. (Topf), E. alpinum L., e. alpine barr.-w., E. diphylum Grah. (Aceranthus d. Morr., Deesn.).

1) **Epipaetis** Rich., Hall. (Orchid. Neottieen, XX. 1) Sumpfwurz, -orche, Sitter O. W. (gr. $\xi\pi\iota\pi\alpha\tau\iota\zeta$; von $\xi\pi\iota\pi\alpha\tau\iota\omega$ schliesse zu, Pfl. sonst $\xi\ddot{\iota}\lambda\epsilon\beta\omega\sigma\omega\eta\eta$), E. palustris u. Helleborine Crantz. 2) **Epipactis** (sc. Dondia) Spr. (Umbelliferen, V. 2) grüne Dondie Spr., s. Astrantia Epip. L. f. (v. $\xi\pi\iota\pi\eta\gamma\eta\mu\mu\mu$ mache gerinnen — nämli. Milch, Wtst. v. $\xi\pi\iota\sigma\alpha\omega$ ziehe heraus — d. Wurzel bei d. Alten als Fontanell od. Haarsel, nämli. diej. von d. ähnl. Helleborus albus (Veratrum album), was Haller mit d. ähnl. Epipactis andeuten wollte).

Epipetalia Juss. „Oberkronblättrige“ — mit oberständ. Kron- od. Blumenblättern ($\xi\pi\iota$ u. $\pi\acute{e}\tau\alpha\lambda\omega\eta$).

Epiphyllum Herm., Haw. (zu Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Blattcactus“, Ast- od. Stutzblatt-C. ($\xi\pi\iota$ u. $\varphi\acute{u}\lambda\lambda\omega\eta$ Laub — Blume auf d. Blatt sitzend), Zier. (Stuben, Topf) E. portulacifolium (stumpfkeilblättr.), truncatum Haw. (gestutzt), violaceum u. violac. superbum, Altensteinii Pfeiff. s. truncat. multiflorum, etc., s. Cactus Phylanthus L. u. Phyllocactus Lk.

Epipogium Gm. (-pōgon R. Br.) (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Bartlippchen, „Aufbart“, Bananen-O. ($\xi\pi\iota$ u. $\pi\acute{w}\gamma\omega\eta$ Bart — bez. d. büschelfas. Wurzel), E. aphyllum Gm., s. Satyrium Epipogium L. (Limonidōrum Epip. Sw.).

Epistaminia Juss. mit oberständigen Staubgefassen ($\xi\pi\iota$ u. stamen, -inis Staubgefass).

Epithēnum (sc. Cuscūta) L. (Convolvulac. Cuscuteen, IV. 2) „Quendelseide“ ($\xi\pi\iota$ u. Thymus Thymian od. Quendel).

Equisētum L. (Equisetaceen, XXIV. 1) Schaft- od. Schachtelhalm, Gliederfarn, Kannenkraut, eig. „Pferdeborste“, fr. prèle od. asprèle, e. horse-tail od. shave-grass (v. equus Pferd, sēta Borste). — Equisetaceae DC., Rchb. Kl., Ord. od. Fam. d. Schaftthalme.

Eragrostis P.-B. (zu Poa L.) Rchb. (Gräser, III. 2) „Liebesgras“, Flittergras O. W. (v. $\acute{E}\varrho\omega\zeta$ od. $\acute{E}\varrho\dot{\imath}\zeta$ Liebe, $\acute{\alpha}\gamma\omega\omega\sigma\tau\iota\zeta$ Feldgras, Wtst. $\acute{E}\varrho\dot{\imath}$ sehr, Partikel der Verstärkung! — vielblüt. Ährchen zu einer gross. Rispe vereinigt), Bouquetgr. E. major Host, minor Host s. poaeformis Lk. (Poa Eragrostis L.).

Eranthémum R. Br. (zu Ruellia) Rchb. (Acanthaceen, II. 1) „Erdblume“, Menderle D. (v. $\acute{E}\varrho\alpha$ od. $\acute{E}\varrho\alpha$ Erde, Wtst. $\acute{E}\varrho\dot{\imath}$ sehr, s. eb., $\acute{\alpha}\nu\vartheta\acute{\epsilon}\mu\omega\eta$ i. q. $\acute{\alpha}\nu\vartheta\acute{\epsilon}\omega\zeta$ — schöne zahlr. Blüten!), Warmh. E. sanguinolentum Hort. (Hypoëstes Hook.) (rotader. Blattpfl. d. Warmh.), ignéum Hort. (Chamaeranthemum Nees), leuconeurum Hort., etc.

Eranthis Salisb. (zu Helleborus) Rchb. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Winterblume“ od. Winterling, E. hiemalis Sal., fr. eranthe u. helléborine od. Anémone Aconit des Hollandais, e. common winter-aconite (v. ἥπει fröh od. ἥπει Frühling, ἀνθός Bl. — blüht frühzeitig!), s. Helleborus hiemalis L. „Wintersturmhit“ Rmpl.

Eremostachys L. (Labiaten, XIV. 1) „Einzelähre“ (v. ἔρημος einsam, leer, στάχυς Ähre — hat nur eine od. wenige quirl. Blütenähren), Zier. E. laciniata Bunge (Phlomis l. L.), fr. phlomide laciniée, E. iberica Fisch., Mey. (Phlomis ib. L.), fr. phlomide du Caucase od. d'Ibérie.

Eria Lindl. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Woll“-O. (ἔριον Baumwolle, Wolle — auss. woll. Blüten), E. rosae Ldl. (Octomeria r. Ldl.) etc.

Erianthus Rich., P.-B. (Gräser, III. 2), E. Ravennae Rich. „Ravenna-gras“, -zuckergr., eig. „Wollblütgras“, fr. érianthe od. canne de Ravenne, e. Ravenna-sugar-grass (E. saccharoides Mchx.), s. Saccharum gigantēum Pers. u. Andropōgon Ravennae W. (ἔριον Baumwolle, ἄνθος Blüte — einblüt. Ährchen in Seidenwolle gewickelt), E. japonicus P.-B. (Saccharum jap. Thb., Obanna Kämpf.).

Erica (nicht Erīca) L. (Ericaceen, VIII. 1) Heide, Glocken- od. Schnabelheide Leun., fr. bruyère, e. heath (gr. ἐρίη od. ἐρέτην Diosc. — viell. ἐρείων breche, „Brüchling“? Leun. Wst.), Töpf: E. herbacea L., Gewächsh.: E. cylindrica Wendl., propendens Andr., ventricosa Thb. m. v. elegans, coccinea etc., speciosa Andr. etc., Waldheiden E. vulgaris L., s. Calluna Salisb. — Ericacēae DC., Rchb., Klitzsch., Endl., -cæae R. Br.

Ericinæae DC., Bartl., Leun. Ord. d. Heideartigen Bartl.

Erigéron L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Dürrwurz, Flöh- od. Berufskraut (Berufungskr. Vilm.), eig. „Früh“- od. „Baldgreis“, „Altmannskr.“ Dietr., fr. erigéron, e. flea-bane (v. ἥπει fröh u. γέρων Greis — gleich an d. Blüt. weiss. Pappus!), Zier. E. alpinum L. u. grandiflorum Hort., E. speciosum DC. (Stenactis spec. Lindl.), e. showy fl.-b., E. glabellum Nutt. (Nordamer.), e. smootish fl.-b., Feldunkr. E. canadense L., s. g. Franzosenkraut.

1) **Erínus** L. (Scrophularineen, XIV. 2) Alpen-Leberbalsam Rmpl., E. alpinus L., fr. érine des Alpes, e. alpine liver-balsam m. v. fol. hirsutis Hort. s. hispanicus Boiss. (gr. ἔρινος, ἡ eine Pfl., ὁ lat. caprificus wild. Feigenbaum, v. ἔριον Baumwolle? — unbek.). 2) **Erīnus** (sc. Lobelia) L. (Lobeliaceen, XIX. 6) (langäst. Ampelpflanze). 3) **Erínus** (sc. Campanula) L. (Campanulaceen, V. 1) kleinkronige Glockenbl.

Eriobotrya Lindl. (Pomaceen, XII. 4) „Wolltrauben“-Mispel, japan. Wollmispel, E. japonica Ldl., s. Mespilus Cuila Buchan. u. japonica Thb. (ἔριον Wolle, βότρων Traube).

Eriocaulon L. (Commelyneen od. Restiaceen, III. 3) „Wollstengel“, Eckhalm D., fr. joncinelle (ἔριον Wolle, ζαυλὸς Stengel), E. decangulare L., s. Nasmythia articulata Huds. (Randalia americana Petiv.), quinquangulare L. (Scabiosa graminēa Pluk.), E. spadicēum s. Schoenus spad., etc. — Eriocaulonēae Endl.

Erioenēma Naud. (Melastomaceen, X. 1) „Wollschiene“ (s. v., ζνήμη Bein, Schienbein etc.), E. aenæa marmoræa Van Houtt., s. Bertolina Raddi.

Eriodendron DC. (Malvaceen od. Sterculiaceen, XVI. 8) „Wollenbaum“ (s. v., δέρδον B.), E. pentandrum DC., s. Bombax pentandrum L.

Eriophorum L. (Juncaceen od. Cyperaceen, III. 1) Woll- od. Dungras, Binsenseide, Wiesenwolle Leun., fr. porte-laine, laine des prés (- des marais) u. linaigrette, e. cud-wort (-weed), cotton-weed (s. v., γοργός tragend).

- Eriopōgon** Endl. (Gramineen, III. 2) (zu *Saccharum*) „Wollbart“ (s. v., πώγων Bart — d. Ährch. seidenhaar. mit in eine Röhre verwachs. Schuppen).
- Eriopsis** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Wollorchisähnliche“ (*Eria* Ldl. u. ὄψις Ansehen), *E. biloba* Ldl. (Columbien).
- 1) **Eriostēmon** Pers., Sm. (Rutac. Diosmeen, X. 1) „Wollfaden“-Raute (s. v., στίμων, lat. stamen Staubfaden), Gewächsh. *E. buxifolium*, *cuspidatum*, *linifolium*, *pulchellum* (*Diosma pulchella* L., *Hartogia* p. L.), *E. squamēum* Lab. (*Phebalium squamulosum* Vent.) (Neuholl.), *E. capense* Pers. s. *Diosma* s. *Okea uniflora* L. 2) **Eriostēnum** Collad. (Tiliaceen, XI. 1), s. *Elaeocarpus reticulatus*. 3) **Eriostēmon** Less. (Compositen) (— Antheren mit wollwimper. Schwänzen, Wtst.).
- Erithālis** P. Br. (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Grünchina, Lederkrapp Leun., Balsamstrauch (ἔριθαλης od. -ις v. ἐρι sehr, ἀλήω grüne — tiefgrüne Blätt.), *E. odorifera* P. Br., s. *Amýris balsamifera* L., *E. polygáma* Forst, s. *Timonius Rumph.*
- Ernodēa** Sm. (Cinchonac. Coffeaceen, IV. 1) „Vielast“-Chinastr., „Ästling“ D., westind. Citronenholz, s. g. *Hisparilla* (v. ἔρωδης voller Aste od. Zweige — sehr buschige Pfl.), *E. montana* Sm. (*Putoria* Pers. *Pavetta foetidissima* Cyril.), auch s. *Knoxia litoralis* P. Br. u. *Thymelaea Sloan.*
- Erodium** l'Hér. (Geraniaceen, XVI. 2) „Reiherschnabel“, e. heron's-bill (v. ἔρωδιος Reiher — langschnäbl. Kapsel!), Garten *E. alpinum* l'Hér., *petraeum*, *Manescavi* Boubani (Pyren.), e. *Manescaut's h.-b.* u. *moschatum* l'Hér. (*Geranium m.* L.) bisamduftend. R., e. musk-h.-b., Unkraut *E. cicutarium* l'Hér., s. *Geranium sect. Erodium* L.-Pers.
- Erophīla** DC. (zu *Draba*) Rchb. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Frühlings-Hungerblümchen (ἔρως Liebe, Hunger, φίλη Freundin, Wtst. ἔρως i. q. ἔρωτ Wolle — Stengel unt. u. Blätt. weiss behaart), *E. (Draba) verna* L.
- Erūca** T. (sc. Brassīca), L. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) Rauke, Runke M.-Rchb., fr. roquette, e. rocket-gentle, *E. sativa* Lam. i. q. Brass. Er. L. (*eruca* Plin. wilder Kohl), *E. erecta* Lag., s. *Brassīca Tournefortii* DC.
- Erucāgo** T., Hornem. (sc. Bunias) L. (Crucifer. Lomentac., XV. 2) senfblättr. Zackenschote, *E. runcinata* Hornem., fr. érucage u. roquette des champs Stachel-Meersenf, Bauernsenf (s. eb.).
- Eruearia** G. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Raukensenf“ (s. v.), s. *Sinapis*, *Cordylocarpus* u. *Brassīca*.
- Erueastrum** Presl (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Hundsrauke“, Wegkohl, Rempe M.-Rchb., fr. roquette, e. rocket (deter. v. *Eruca*, Wtst. *Eruca* u. *astrum* Stern od. Bild), *E. inodorum* J. Bauh. s. *Pollichii* Spenn. (*Sisymbrium gallicum* W.), s. *Eruca Erucastrum* Fl. Wett.
- Ervilia** Lk. (zu *Ervum*) Rchb. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) Ross-wicke, Feldlinse (*Ervilia* Plin. = *Lathyrus Cicera* L.), *E. sativa* Lk., s. *Vicia Ervilia* L., W. knotenfruchtige Erve Grck., fr. gerousse, e. ers.
- Ervum** L. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) „Erve“ od. Erbse, Linse, fr. ers od. gerousse (*E. hirsutum* L.), e. ers od. strangle-tare (-weed) „Würg-Lolch“ (v. d. celt. erw d. i. gebautes Land, lat. arvum), *E. Lenticula* Schreb., *E. hirsutum* L. Zitterlinse, s. *Endiusa hirsuta* Alfd. (*Vicia h.* Koch).
- Eryngium** T. (Umbellifer. Saniculeen, V. 2) Mannstreu, 'Brackdistel, fr. éryngie od. panicaut (chardon Roland, - à cent-têtes), e. eringo, sea-holly (-holm), share- od. fever-wood (gr. ἐρύγγιον od. ἡρύγγιον Distelart, n. Paxt. u. Wtst. v. ἐρύγω rülpse, breche mich), Zier. E.

alpinum L., bromeliaefolium L., pandanifolium, amethystinum L. etc., wild E. campestre L. s. g. Brackdistel.

Erysibe Rebent. (-īphe Hedw.) (Schimmelpilze, XXIV. 4) Mehltau, fr. érysiphe u. tēteron „Sauger“, e. mil-dew (gr. ἔρυσιψη rot-pulv. Mehltau v. ἔρυστος rot od. ἔρυστελας Hautenzündung), s. Alphitomorpha Wällr.

Erysimum G., L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) Schotendotter Grck., Hederich Seub., Schoterich O. W., fr. érysime, tortelle, vélar u. girofée, e. hedge-mustard (E. Alliaria L.), Zier. E. Petrowskianum Fisch., Mey., fr. girofée de Petrowski, Marshallianum Andrcz., Barbarea L. v. fl. pl. Hort. u. fol. varieg. (gr. ἔρυσιμον, lat. irio, Wtst. v. ἔριω rette — bez. d. Heilkräfte).

Erythraea Rich. (Gentianen, V. 1) Rosen-Enzian, Tausendguldenkraut, fr. fiel-de-terre, e. centaury, E. Centaurium Pers. (Gentiana Cent. L.) (ἔρυθραιος rötllich).

1) **Erythrīna** L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Scharlachblume“, Korallenbaum Rümpl., fr. érythrine (ἔρυθρος rot), Zier. E. crista galli L., fr. crête de coq, E. Corallodendron L. m. v. orientalis Murr. Korallen- od. Kondoriholz, C. herbacea L. (Florida), E. speciosa Andr., etc. 2) **Erythrīna** (sc. Piscidia) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Fischtöter.

Erythronium L. (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Hundszahn, Zahn- od. Rotlilie, Rotwurz (s. v.), Winter-Zier. E. dens canis L., fr. dent de chien, e. dog's-tooth-Violet.

1) **Erythroxylon** L. (Malpighiac. od. Violac. Sauvageseen, X. 3) „Rotholz“ (s. v., ξύλον Holz), E. Coca Lam., Cocastr., Rmpl. Kaublattbaum, s. Sethia St. Hil. 2) **Er.** (sc. Rhamnus) Pall. (Rhamnac., V. 1) „Rotholzdorn“, fr. nerprun à bois rouge, e. red-wooded bush-thorn.

Escallonia Mut., Sm. (Ribesiac. Escallonieneen od. Saxifrageen, V. 1) „Escallonee“ (n. d. Entdecker Escallon in Neugranada), Gewächsh. E. floribunda HB., macrantha Arn. u. rubra Pers. — Escalloniæ R. Br. (zu Ribesiaceæ Rchb.).

Eschscholtzia (-zia) Cham. (Papaverac., XIII. 1) „Eschscholtzie“ (n. d. Nat. J. Fr. Eschscholtz in Dorpat, † 1831), E. californica Cham. (Chrysœis cal. Lindl.) m. v. leucantha Hort. (calophylla Hort.), fr. globe du soleil, E. de Californie, tenuifolia Benth., crocea Benth. m. v. v. (rosæa, striata etc.).

1) **Escūlus** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) „Speise“-Eiche (v. esca Speise). 2) **Escūlus**, s. Aesculus L. Rosskastanie, s. d.

Esmarchia Rchb. (Ainsinaceen, X. 4) „Esmarch's“-Hornkraut, E. ceras-tioides Rchb., s. Cerastium tetrandrum Curt. (n. d. Bot. Ant. Esmarch, schr. Fl. v. Schleswig u. üb. Gräser, Lpz. 1797).

Ethulia L., Cass. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Sittenheil“?, fr. éthulie (v. ἔθος od. ἔθος Sitte u. οὐλίος heiland, Wtst. ἔσθης Kleid, οὐλός weich, kraus od. αἴγω brenne, οὐλόδηs gefährlich), Zier. E. corymbosa Cass. angustifolia Boj., divaricata L. (Chrysanthemum bengalense Pluk.).

Euazalea Planch. (zu Azalæa L.) (Ericaceen, V. 1) „Schön-Azalee“ (εὖ wohl, schön etc.), z. B. A. pontica, daurica etc.

Eucalyptus Lab. l'Hér. (Myrtaceen, XII. 1) „Schönmützenbaum“, „Schönhaube“, neuholl. Gummibaum, fr. eucalypte (-lipte), Zier. E. globulus Lab. s. glauca DC. Fieberbaum, Fieberheil, robusta l'Hér. austral. Eisenholzb. (Eisen-Veilchenbaum, blauer od. roter Gummib.), E. resinifera Lab., Kinobaum (εὖ- u. ζαλυπτός verhüllt — beim Aufblühen abfall. Haube, wie bei Calyptanthes, Wtst.).

- Eucharidium** Fisch., Mey. (Onagrarieen, IV. 1) „Reiznarzissenähnliche“ (s. sogl. u. εἰδομαι gleiche — angen. rosablüh. Pfl. Wtst.), Garten E. concinnum F. u. M., fr. Euch. élégant, E. grandiflorum F. M. m. v. v.
- Eucharis** Planch. (Amaryllideen, VI. 1) „Reiz“- od. Grazien-Narzisse (εὐχαριστία angenehm etc.), Zier. E. amazonica Lind.
- Euchlaena** Schrad. (Gräser, III. 2) Guatimalagras, s. g. Teosinte, eig. „Schönmantel“ (εὐ u. γάιδα Oberkleid — d. Blüt. betr.!), E. gigantea Schrad. (als Futter geb. trop. Gras), s. Panicum L. u. Reana luxurians Brign.
- Euclidium** R. Br. (Cruciferen Nucamentaceen, XV. 2) „Schönschlösschen“ (γ. εὐκλήσιον wohlverschlossen — sehr deutl. Schotennähte! — εὐ u. κλειδίον Schlösschen!), E. rostratum R. Br., s. Myagrum r. Scop. „Schnabeldotter“, E. syriacum R. Br. (Soria syr. Desv.), s. Anastatica syr. Jacq. (Bunias syr. G.) „syrische Jerichorose“.
- Euenide** Zucc. (Loasaceen, XIII. 1) „Schönnessel“, Langfaden (εὐ u. ζνίδη Nessel), Stuben E. bartonioides Zucc., s. Microsperma bart. Walp.
- Eucōmis** L., l'Hér. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Schopflilie“, fr. eucombe (εὐ u. ζόμη Schopf etc. — an d. Spitze d. Blütentraube ein Blattbüschel!), Zier. E. punctata l'Hér., fr. basilée ponctuée, e. dotted Euc., s. Basilaea p. Juss., Topf E. regia Ait., undulata ds., etc.
- Eudianthe** Rchb. (Sileneen, X. 4) „Schön-Lichtnelke“, s. Lychnis L. (εὐ u. Dianthe i. e. Διὸς ἄνθη Zeus-Blume, Wtst. εὐθὺς schön u. ἄνθη, zu Lychnis — schönrote Bl.!), E. coeli-rosa u. laeta A. Br. (Lychn. coel.-ros. Desr. s. Agrostemma coeli rosa L.).
- Eugenia** L. (Myrtaceen, XII. 1) Gewürzäglein, -nelkenbaum, Jambusenbaum u. s. f. (n. d. Prinzen Eugen v. Savoyen, Gönn. d. Bot., † 1736), E. Jambos L., E. sinemariensis, fr. maripou, Warmh. E. Ugni Hb. (Chili), Michelii Lam., s. g. Cayennekirsche, brasiliensis L., E. caryophyllata Thb., s. Caryophyllum aromaticus L.
- Eulalia** Kth. (Gräser, XXIII. 1) „Eulalie“ (N. pr. v. εὐλαλος beredt), Zier. E. japonica Kth., s. Andropogon.
- 1) **Euosma** W. (-mia H. B. K.) (Rubiaceen, IV. 1) „Wohlduftstrauch“ (εὐ u. δομή Duft etc.), s. Evosmia s. O'Higginsia (Higginsia) Rz. Pv.
 - 2) **Enosma** Andr. (Gentianeen, V. 1).
- Eupatoria** (sc. Agrimonia) L. (Rosaceen, XI. 2) gem. Odernennig (s. sogl.).
- Eupatorium** T. (Composit. Eupatorineen, XIX. 1) Wasserhanf, -dost, Ottig O. W., Kunigundenkraut etc. (gr. εὐπατόριον Pfl. nach Mithridates Eupator, d. Kön. v. Pontus, † 64 v. Chr.), E. cannabinum L., fr. langue de chat, herb de Ste. Cunegonde, eupatoire d'Avicenne u. cornuet, e. water-hemp, eupatory, hemp-agrimony, sweet-maudlin (-mawlin), Zier. (Winter): E. guatimalense, purpuréum L., aromatícum L., ageratoides L., etc. — Eupatoriæ Rich., -iacæae DC., -rinae Rchb.
- Euphorbia** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) Wolfsmilch, Hundsmilch, fr. euphorbe, lait-de-loup, e. milk-weed, sea-lettice, spurge, wolf's-milk (v. εὐφορβίον milchendes Stachelgew. in Afrika, Plinius: nach Euphorbus, Leibarzt d. Königs Juba, ben.), s. Tithymalus T., z. B. E. Esula L., fr. ésule „Eselsmilch“, laitue de chèvre „Ziegenmilch“, Gerardiana Jacq., Cyparissias L. „Cypressen“-W., palustris L., Zier. E. variegata Sims, Stuben E. jacquiniaeflora Hort. (scharl. Winterbl.), splendens Boj., fulgens Karw., etc. — Euphorbiacæa Klitzsch., Grck., -biæae (sc. Rutacæa) Rchb. (zu Ord. Tricoccae Bartl.).
- Euphrasia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) Augentrost, fr. euphrasie, e. euphrasy (gr. εὐφρασία Frohsinn etc. — für ein wirks. Augenmittel

gehalten! Leun., Wtst.), E. officinalis L., fr. langéole od. luminet, e. euphrasys u. eye-bright.

Eurya Thunb. (Theac. Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Weitaststrauch“ D. (v. εὐρὺς weit, breit — bez. d. Äste!), E. japonica s. Macartnei Champ., s. Fisakaki Kämpf.

Euryale Salisb. (Nymphaeaceen, XIII. 1) Dorn-Nymphäe (n. Euryale, e. d. Gorgonen, Myth., nicht Wtst. εὐρύαλος breit — sehr grossblättr.), E. ferox Sal. (—Dornen d. Blattunterseite!), s. Anneslea spinosa Andr.

Eurybia Cass. (zu Aster Rchb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Weithin-mächtige“, „Allgewaltige“ (εὐουρής weit u. breit mächtig, εὐρὺς u. βία Gewalt), Zier. E. corymbosa Cass., Gewächsh. glandulosa u. lyrata DC., Gart. argophylla Cass. „weissblättr.“

Eutaxia R. Br. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Schönreih“-Cäsalpinie (εὐταξία schöne Reihe — steife, einfache gegenständ. Blätt.), s. Dillwynia Sm.

Euterpe G., Mart. (Palmen, XXI. 8) Kohlpalme, Pallisadenpalme Leun. (Euterpe, eine d. Musen, od. v. εὐτερηής wohlfeil — Wtst. stattlich. Ansehen!), E. oleracea Mart. (Arēca ol. L.) u. edulis Mart.

Eutoea R. Br. (Hydrophyllaeen, V. 1) „Vielblumenkraut“, fr. Eutoque (εὐτοζός fruchtbar im Gebären — jede Placenta m. zahlr. Eiern), E. multiflora R. Br., s. Cosmanthus mult. Dougl., Gart. E. Wrangeliana Fisch., Mey., Menziesii R. Br. u. viscida Benth. (Cosmanth. visc. A. DC.) „Klebglocke“, fr. Eut. viscidæ, etc., s. Hydrophyllum u. Polemonium.

Euulmus C. Koch (zu Ulmus L.) (Urticac. Ulmaceen, V. 2) „Schönrüster“ (εὐ u. Ulmus), z. B. campestris L.

Euvicia Endl. (zu Vicia L.) (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Schönwicke“ (εὐ u. Vicia), z. B. Cracca L., angustifolia All.

Euvitis Endl. (zu Vitis L.) (Ampelideen, V. 1) „Schönrebe“ (εὐ u. Vitis), z. B. vinifera L., Labrusca L., etc.

Euxòlus Moq.-Tand. (Amarantaceen, XXI. 5) Spinat-Amarant (εὐ, euxinus wirtbar u. ölus, -ëris Küchenkraut!), E. viridis M.-T., s. Albersia Blitum Kth. (Amarantus Bl. L.).

Evax G., DC. (Composit. Gnaphalieen, XIX. 2) Schimmel- od. Fadenkraut, s. Filago T. (v. εὐαξός zerbrechlich? n. Plinius v. Evax, arab. König zu Nero's Zeit), E. pygmaea Desf. s. umbellata G., s. Micropus pygm. Desf.

Evodia Forst. (Rutaceen, IV. 1) „Wohlduft“-Raute (εὐώδης wohlriechend), z. B. elaeodendroides Bak., hortensis Forst. (Fagara Evodia L.), E. febrifuga St. Hil. (Esenbeckia f. St. Hil.) brasili. China- od. Fiebrindre.

Evolvulus L. (Convolvulaceen, V. 1) „Aufwickelwinde“ (v. evolvo wickle auseinander — nied. kriechende Kräuter!).

Evonymus T., L. (Celastraceen, V. 1) Spindel- od. Spillbaum, Pfefferriesel, s. g. Pfaffenhütchen, fr. fusain od. garais (garas), bonnet de prétre, e. spindle-tree, butonic u. prick-wood (gr. εὐώνυμος von gutem Namen), E. europaeus L. (vulgaris Mill.) m. v. v., Zier. E. japonicus Thb. m. v. v. (macrophyllus, aureo-maculatus, aureo-marginatus Hort.), etc.

Euosmia H. B. K. (-osma W.) (Rubiaceen, IV. 1) „Wohlgeruchstr.“ (εὐ u. ὄσμη Duft), z. B. caripensis Hb. Bpl., s. O'Higginsia Spr. (vgl. Euosma W.).

Ewyckia Blum. (Lythraceen, XI. 1) „Ewyckie“ (n. Van Ewyck, e. holländ. Gelehrten).

Exäcum L. (Gentianeeen, IV. 1) Bitterblatt (v. ex aus, ago treibe — Mittel geg. Gift!), E. filiforme W. (Cicendia fil. Delarbre), E. aphyllosum Jacq. (Lita aph. Dietr.), albens s. pedunculatum L., etc.

- Excoecaria** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XXII. 3) „Blind“- od. „Blendebaum“ (v. excoeco mache blind — Wirk. d. Milchsafts in die Augen), E. Agallocha L. (Arbor excoecans Rumph.).
- Exidia** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Lappenpilz, Hollunderschwamm, s. g. Judasohr, E. Auricula Judae (v. ἔξιδια schwitze aus — weg. d. Sporangien), s. Tremella L.
- Exoascus** Fuckel (Pilze, XXIV. 4) „Aussenschlauch“, Zwetschtaschen-Pilz (ἔξω hinaus, ἀσκός Schlauch — d. Mycel dringt bis in d. Zweige des Baums).
- Exochorda** Lindl. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) Hartschalfrucht-Spiräe (ἔξω aussen, χορδή lat. chorda Darmsaite — bez. d. knorpeligen Frucht!), Zier. E. grandiflora Lindl. (Spiraea gr. Hort.).
- Exostemma** Hayne, DC. (richt. -stema Pers., H. B. K.) (Cinchonaceen, V. 1) „Aussenfaden“ (ἔξω s. v. u. στῆμαν lat. stamen Staubfaden — diese hängen aus d. Blume heraus), E. caribaea Hayne (Cinchona car. W. s. jamaicensis Wright).
- Faba** T., Mnch. (zu Vicia L.) Rehb. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Sauod. Buffbohne (Puffb. Rmpl.), Pferdebohne, fr. fève de marais, e. hog's-bean (lat. faba Bohne v. d. celt. faff, Wtst. gr. φάγω esse?), F. vulgaris Mnch. = Vicia Faba L. (Casp. Meer), F. equina Bauh. s. minor L. (Vicia Faba L. β), narbonensis Biv.
- Fabago** T. (sc. Zygophyllum) L. (Rutaceen, X. 1) gem. Jochblatt, s. g. Bohnenkapper D. (v. faba Saubohne — bohnenf. Samen).
- Fabiana** Rz. Pv. (Solanae. od. Convolvulac., V. 1) „Fabianopflanze“, fr. fabiane (n. d. Erzbischof v. Valencia Franc. Fabiano ben.), Glash. F. imbricata Rz. Pv. (Hstr.).
- 1) **Fabrieia** G. (Myrtaceen, XII. 1) „Fabricius“-Myrte (n. d. Bot. Ph. K. Fabricius). 2) **Fabrieia plicata** Thb. (Amaryllideen, VI. 1) „Fabricius“-Duftlilie, s. Gethyllis plic. Jacq. 3) F. Scop. (Papilionaceen). 4) F. Adans. (Labiaten).
- 1) **Fagara** Schreb. (Terebinthaceen, VIII. 1) Sattelbaum D., fr. fagarier (wahrsch. aus d. Arabischen, schon Avicenna brauchte d. Namen, schwerl. v. φάγος od. φαγεός Wetzstein, der d. Metalle gleichs. anfrisst, φάγος Fresser), F. inaequalis D. (Amyris inaeq. Spr.), copallifera D. (Amyris s. Elaphrium cop. Sess.). 2) **Fagara** L. (Sapotac. od. Rutac. Diosmeen, IV. 1), F. Pterota L. Eisenholz v. Jamai-ka, F. Piperita L. japan. Pfeffer (Piper japonicum Kämpf.).
- Fagonia** T. (Rutac. Zygophylleen, X. 1) „Fagon's“-Jochblatt, fr. fagone (-goue) (n. Guy Crescent. Fagon, Prof. u. Leibarzt Ludw.'s XIV., † 1718), F. persica DC. s. indica L., Bruguieri DC. s. mysorensis Roth.
- Fagopyrinae** Bartl., DC. Ord. d. Buchweizenartigen, s. sogl.
- Fagopyrum** T. (Polygonaceen, VIII. 3) „Buchweizen“, Heidekorn, fr. bucaille od. blé saracın (-noir), e. buck-wheat (book-), bollemong, panicle (pannicle u. bird's-tongue „Vogelzunge“ (v. φρυγός lat. fagus Buche, φρύγος Weizen — Samen wie Buchekern!), F. esculentum Mnch. = Polygōnum Fagopyrum L., F. tataricum G. s. erectum Gm. (Polyg. tat. L.), s. Fagotriticum sibiricum Act. Stockh. (Fagus u. Triticum Weizen).
- Fagraea** Thunb. (Loganiaceen, V. 1) „Fagraeus“-Fruchtbäum (n. Thunberg's Freunde J. T. Fagraeus), F. imperialis u. tahitensis Thb., s. Willughbeia zeylanica Roxb.).
- Fagus** L. (Cupuliferen od. Corylaceen, XXI. 5) Rot- od. Waldbuche, fr. hêtre, fouteau (fayar, fou), faine „Buchecker“, e. beech-tree (gr. φρύγος v. φάγω esse etc.), F. silvatica L. (Castanea Fagus Scop., F.

- sylvestris* Mchx.), fr. hêtre commun, e. common b.-tr., m. v. v., z. B. *asplenifolia* Lodd. s. *heterophylla* Loud., v. purpurēa Ait. (atro-rubens Dur., atro-purp. Hort., colorata DC.) s. g. Blutbuche.
- Falcaria** Host (zu Critānus Trag.) Rchb. (Umbellifer., V. 2) „Sichel-dolde“, Sichel O. W. (falk., -cis Sichel), s. *Sium Falcaria* L. (Seseli Falc. Scop.) u. *Drepanophyllum sioides* Wib. s. agreste Hoffm.
- Farfara** DC. (sc. *Tussilago*) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Huflattich, Husten-, Acker-, Eselshuf (viell. corripiert aus φάρων Luftröhre u. φάγος Lappen, Wtst. v. far Mehl u. féro trage — Mehl auf d. Blattunterseite), Zier. v. fol. varieg. Hort., fr. pas d'âne à feuilles panachées.
- Farfugium** Lindl. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Fleckenblatt-Huflattich (aus Farfara u. fugio fliehe gebildet!), Topfbl. F. grande Ldl., s. *Ligularia Kaempferi* var. Sieb. u. Zucc.
- 1) **Farsetia** R. Br., Turr. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Farsetie“, Sandkresse, Weisssteinkraut, fr. cresson des sables, F. incāna R. Br. (n. d. venet. Bot. Ph. Farseti ben.), s. *Alyssum incānum* L. (Berterōa inc. DC. u. *Farsetiana* DC.). 2) **F.** (sc. *Cheiranthus*) L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) strauch. Mondviole, s. *Lunaria fruticosa* s. leucojifolia T.
- Fatsia** Decsn. (Araliaceen, V. 5) „Fatsie“, F. japonica Decsn., s. *Aralia* jap. s. *Sieboldii* Hort. (vaterl. Name fatsi).
- Fedia** Mnch. (Valerianeen, III. 1) Schmalzkraut, Feld- od. Lämmersalat, Nisschen, Rapünzchen Grck. etc., fr. mache, blanchette u. laitue de brébis, e. rampion u. corn-sallad (v. fedus altlat. Böcklein, Wtst. d. corrumpierte φοῦ!), F. locusta Rchb. s. olitoria Vahl, s. *Valerianella* olit. Mnch. = *Valeriana Locusta* var. α olitoria L.; F. olitoria G. = *Valerianella Auricula* s. dentata DC. (rimosa Bast.).
- Felicia** DC. (zu Aster Rchb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Felicie“ od. „Felix“-Aster (n. d. Legat.-Rat Felix in Regensburg, † 1846), F. tenella Nees, fr. Felicie delicate, e. slender F., s. *Aster tenellus* Thb. (Kaulfussia ciliata Nees).
- Feliciana** Camb. (Lythrarieen, XI. 1?) „Feliciane“ (n. José Feliciano Fernandez Pincher, schr. üb. Agricult. in Brasilien).
- 1) **Fenzlia** Benth. (Polemoniaceen, V. 1) „Fenzl's“-Speerkraut (n. d. Prof. Fenzl in Wien), Zier. F. dianthiflora Benth. (*Gilia dianthoides* Endl.). 2) **Fenzlia** Arn. (Myrtaceen Memecyleen, VIII. 1). 3) **F.** Endl. (Lythraceen, XI. 1?).
- Ferdinanda (-dea)** Lag. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Ferdinand's“-Strauch (n. d. König Ferdinand VII. v. Spanien, † 1833), z. B. F. augusta u. emīnens Lag.
- Ferolia** Aubl. (Rosaceen od. Laurineen Cedreleen, X. 1) Atlas- od. Satinetholz, fr. bois-benoit-fin u. férole (bois de -), e. satin-wood, F. guianensis Aubl., s. *Chloroxylon Swietenii* (guian. Name ferol).
- Feronia** Corr., DC. (Aurantiaceen, X. 1) Wald-Pomeranz, Elephanten-apfel, F. elephantum Corr. (v. *Feronia Göttin* d. Wälder, Wtst. n. Feroni, florent. Bot., schr. 1804 Verz. sein. Gartengew.).
- Ferraria** L. (Irideen, III. 1 od. XX. 3) Tiger- od. Pfauenlilie, F. tigrīda u. pavonia L. (n. d. Jesuiten Ferrari, s. d. Aut.).
- Ferreola** Kōn., Roxb. (Ebenaceen, XXII. 6) Maba-Eisenholz, F. buxifolia Kōn. (Maba Forst.), s. *Ehretia ferræa* W. u. *Pisonia buxif*. Rottb. (v. ferrēus eisern — ungemein hart. Holz!).
- Ferula** T. (Umbelliferen, V. 2) „Steckenkraut“, fr. férule, e. gigant's-fennel „Riesen-Feunich“ (ferūla Rute v. ferio schlage damit), z. B. F. asa foetida L. Stink-Asand von Persien, s. g. Teufelsdreck, Zier. F. communis L. gew. Rutenkraut, tingitana L. f., fr. fér. de Tanger etc.
- Festūca** L. (Gräser, III. 2) Schwingergras, eig. Futtergras, fr. fétueque,

e. fescue-grass (Linné: n. d. celt. fest d. i. Futter geb.), z. B. Zier. F. glauca Schrad., Ufer F. fluitans L. (Poa s. Glycesia fluit. Scop., R. Br.), fr. fétueuse flottante, brouille, etc.

Feuillaea (-llæa, Fevillæa) L., P. (Cucurbitaceen, XXII. 6) „Feuillée“ (n. d. Reis. Feuillée, s. d. Aut.), z. B. cordifolia u. trilobata L., s. Trichosanthes punctata L. f., F. scandens L., fr. liane contre-poisin (couleuvre).

Ficaria Dill. (Ranunculaceen, XIII. 7) „Feigen“-Ranunkel, Feigwurz, Feigwarzenkraut, Scharbock Grck., Schmergel, Gessel O. W., fr. ficaire, petite chélidoine u. hémorrhödale od. aureillette, e. scurvy od. spring-Pile-wort (v. ficus Feige — nämnl. feigenförm. Wurzelknollen), F. ranunculoïdes Mnch. s. verna Huds. = Ranunculus Ficaria L., Zier. F. calthaeflora Rchb.

Ficoidæae Juss., DC. „Feigenartige“ (zu Ord. Urticinae Bartl.).

Ficus T. (Urticac. Ficoïdeen, XXIII. 3) Feigenbaum, fr. figuier, e. fico fig-tree (lat. ficus v. gr. φίκος v. φύουμαι wachse? Wst. d. veränd. σῦνον Feige!), Gewächsh. F. elastică Roxb. Gummibaum d. Stuben, F. australis W., F. scandens Lam. s. stipulata Thb., F. indica L. ind. Baniane, fr. figuier d'Inde, F. benjamīna L. Baniane, fr. baniāns, F. Carica L. essb. Feige, etc.

Filago T., W. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 4) Schimmel- od. „Fadenkraut“, fr. herbe à coton, e. mould-weed (v. filum Faden), s. Evax G. — Filaginæa Cass. (zu Inulæa Cass. od. Gnaphaliæa Less.).

Filipendula T. (sc. Spiraea) L. (Rosac. Spiraeaceen, XII. 4) Erdeichel, „Knollfaden“-Spiræe, fr. Spirée filipendule, e. drop-wort u. queen of meadow „Wiesenkönigin“, Zier. v. fl. pleno Hort. (v. filum Faden, pendulus herabhängend — Wurzelfäden m. knolligen Enden!).

Filices Juss., DC., Rchb., Kl. d. Laub- od. Wedelfarne, fr. fougères, e. ferns. — **Filiæinae** DC. Ord. d. Lauffarne (v. filix, -icis Farnkraut).

1) **Filix** femina Bernh. (sc. Aspidium Sw., Asplenium L. s. Athyrium Roth) (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) weiblicher Schild-, Milz- od. Streifenfarn. 2) **Filix** mas (sc. Aspidium Sw., Polypodium L. s. Polystichum Roth) Wurmfarn, fr. silique. 3) **Filix** (sc. Lichen) L. (Flechten, XXIV. 3) „Farn“-Flechte (filix, -icis Farnkraut, Wst. entw. v. filum Faden, weg. d. Wurzelfäden, od. v. πτυλον Flügel — weg. d. Wedel!).

Fissidens Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Spaltzahn“ (fissus gespalten u. dens Zahn), z. B. adiantoides u. osmundoides Hedw.

Fistula DC. (sc. Cassia) L. (Cassieen, X. 1) „röhrenförm.“ Cassie (fistula Fistel, Röhre etc. — Hülsenform!), s. Cathartocarpus Fistula Pers.

Fistularia Ach., Grev. (Tange, XXIV. 3) „Pfeifen“- od. „Röhrentang“, fistulaire (s. eb.), z. B. F. tabacaria Grev., fr. pétimbe.

Fistulina Nees, Bull. (Pilze, XXIV. 4) „Röhrenpilz“, Leberschwamm Kumm., F. hepatica Bull. s. g. Blutschwamm (essb.) (s. eb.).

Fittonia Coëm., Lem. (Acanthaceen, XIV. 2) „Fittonie“ (n. d. Schwestern Elisab. u. Sarah Mary Fitton, schr. Convers. on botany, 8. edit. Lond.), z. B. Stubenblattpfl. F. Verschaffeltii Coëm. m. v. argyroneura (silberaderig), F. gigantea Lindl. u. Pearcei ds., s. Gymnostachyum Verschaffeltii Lem. etc.

Fitzroya Hook. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Fitzroy“-Cypressse, s. g. Alercobaum, F. patagonica Hook. (n. d. engl. Schiffscap. Fitzroy ben.).

Flacourtie l'Hér., Comm. (Capparideen od. Tiliaceen, XIII. 1) „Flacourtie“ (n. d. franz. Statthalter Etienne de Flacourt auf Madagaskar, † 1660), z. B. F. cataphracta l'Hér., rhamnoïdes Burch. u. inermis Roxb. — Flacourtiacæa Rich., DC., -iæae Rchb. (zu Cistiflora DC.).

- 1) **Flammula** (sc. *Ranunculus*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) brennender Hahnenfuss, „Flämmchen“ (dem. *flamma* Flamme). 2) **Flammula** Dill., Rupp. (sc. *Clematis*) L. (*Ranunculac.*, XIII. 7) scharfe Waldrebe, fr. *flammule* od. *Clématide odorante*, e. sweet-scented Virgin's-bower, m. v. *rubella* DC., s. *Flammula scandens* Dill. (*caespitosa* Scop., „Rasenrebe“ od. *fragrans* Ten.). 3) **Fl.** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Flämmchen“-Schwamm (— weg. d. schnell verschwind. Manschette), z. B. *saniosa*, *limonia* etc., s. *Agaricus*.
- Flindersia** R. Br. (Ampelideen od. *Meliac*. *Cedreleen*, X. 1) molukkischer Raspelbaum (n. d. *Capt. Matth. Flinders*, † 1814), Fl. moluccana R. Br.
- Floridæa** Ag., Rchb. Ord. d. Rot- od. Blütentange Seub., Hautalgen Rchb. (flos, -ōris Blume).
- Fluminia** Fr. (Gräser, III. 2) Flussschwingel (*flumen*, -īnis Fluss), Fl. arundinacea Fr., s. *Scolochlöa festucacea* Lk.
- Fluviales** Endl., fr. *fluviales*, Kl. d. *Najaden* od. „Flusspflanzen“ (s. sogl.).
- Fluvialis** Michel (Najadeen, XXII. 1) „Fluss“-Najade (fluvius Fluss), *F. latifolia* Mich., s. *Najas fluviatilis* Lam., Fl. *flexilis* Pers. (XXI. 1), s. *Najas flex.* Rostk. (*Caulinia fl. W.*), Fl. *minor* Mich., s. *Caulinia fragilis* W. (*Najas minor* Schk., *Ittnera m.* Gm.).
- Foeniculum** Ad., T. (Umbellifer., V. 2) „Fenchel (Fönchel)“, fr. *fénouil*, e. fennel (ital. *finocchio*) (*foeniculum* dem. v. *foenum* Heu, deutsch: Fenchel), Gärten: F. *vulgare* G., s. *Anethum lutēum* s. *Foeniculum* L.
- Foenum** graecum T. (sc. *Trigonella*) L. (Leguminos. Trifolieen, XVII. 4) Bockshornklee, gemeiner Kuhhornklee W., griech. Steinklee, s. g. „griech. Heu“, fr. *fénugrec* od. *senègre*, e. fenugreek (fenny-) (*foenum* od. *fénûm* Heu — näm. getrockn. Blätt. in Käse! — lange hornförm. Hülschen).
- Foetidia** A. Cunningham, Comm., Juss. (Myrtaceen, XII. 1) „Stinkbaum“ D. (v. *foetidus* übelriechend — näm. d. Holz!), F. *mauritiana* Lam. (Ins. Mauritius od. Bourbon).
- Fontanesia** Lab. (Oleaceen, II. 1) „Desfontaine's“-Strauch (n. d. Bot. u. Reis. Prof. Desfontaines z. Paris), Gewächsh. F. *phillyreoides* Lab.
- Fontenellæa** St. Hil. (Spiraeac., XII. 4) „Fontenellee“ (n. *Julia de Fontenelle*, schr. mit H. Tolland Manuel de l'arboriste, Paris 1828).
- Fontinalis** Dill., L. (Moose, XXIV. 2) Quell- od. Brunnenmoos (fons, -tis Quelle), F. *antipyretica* L. (in Quellengräben — früher um Schornsteine geg. Feuersgefahr!).
- Forestiera** Poir. (Oleaceen Forestiereen, XXIII. 1) „Forestiere“ (n. Forestier, Arzt zu Paris zu Poiret's Zeit), F. *ligustrina* Poir. s. *Bigelowia lig.* Rees (*Borya 1. W.*), F. *acuminata* Poir. (*Bigelowia s. Borya ac.*) s. *Adelia acum.* Mchx.
- Forskohlea** L. (Urticaceen, X. 5) Forskohlee (n. Pet. *Forskal*, Prof. in Kopenhagen), z. B. F. *tenacissima* L. f., *angustifolia* L. etc.
- Forstera** L. (Plumbagineen, XX. 1) „Forstere“ (n. d. Gebrüd. Forster, Cook's Begleit. b. d. Weltumsegelung), F. *sedifolia* L. f.
- Forsythia** Vahl (Oleaceen, II. 1) „Forsyth's“-Strauch (n. d. engl. Bot. W. A. *Forsyth*, schr. 1802 üb. d. Cült. d. Obstb.), Zier. F. *viridisima* Lindl. (China), *suspensa* Vahl (*Syringa susp.* Thb., Lilac *persensa* Lam.) (Chin., Jap.), *scandens*, s. *Decumaria* L.
- Fothergilla** L. (Corniculat. Cunoniaceen od. Hamamelideen, XII. 2) „Fothergill's“-Strauch (n. d. Arzt in Upton J. *Fothergill*, † 1780), Zier. F. *alnifolia* L. f. s. *Gardenii* Mchx. (N.-Amer.).
- Fourcroyea (-croya)** Vent. (Bromeliac. od. Amaryllideen, VI. 1) „Fourcroy's“-Agave (n. Fr. v. Fourcroy, Gründ. d. Polytechnikums in

Paris, † 1809), z. B. F. foetida Vent. (Agave foet. L.) „Stinkagave“, F. gigantea V. (Agave cubensis) mex. Gespinnst-Ag., s. g. Maguey-holzbaum.

Fragaria L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 5) Erdbeere, fr. fraise (-sier), e. straw-berry (lat. fraga, -orum Erdbeere v. fragro dufte), z. B. wild u. geb. F. vesca L. gem. Erdb. m. v. semperflorens, fr. fraise de quatre saisons, Monats-E. (z. B. Princesse royale), F. Majauféa Duch. (collina Ehrh.) Knackbeere (z. B. vineux de Champagne), F. elatior Ehrh. (moschata Duch.) Moschus-E., fr. capronnier, F. virginiana Duch. (z. B. Roseberry) Scharlach-E., F. chiloensis Ehrh. Chili-E., F. grandiflora Ehrh. Ananas-E. — Zier. F. indica Andr. (Ampel), e. yellow-str.-b., vesca L. v. muricata Duch. u. grandiflora Ehrh. v. fol. variegat. Hort., F. scabra s. chilensis Ehrh. „Riesen-erdbeere“.

Fragariastrum Ser. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Erdbeer-Fingerkraut, s. Potentilla Fragariastrum Ehrh. s. fragariaefolia Gm. (prostrata Fl. Wett. (deter. v. Fragaria).

Fragifera Koch (zu Trifolium sect. Vesicastrum Rchb.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Erdbeerkelee, Trif. fragiferum L. etc. (fraga Erdbeere u. féro trage — nöml. nach d. Blühen beerenförm. aufgebläsene Kelchröhren).

Fragosa Rz. Pv. (Araliaceen, V. 5) „Fragose“ (n. Joh. Fragoso, Leibarzt Philipp's II., schr. 1572 üb. amerik. Arzneimittel).

Fragaea Reinw. (Contorten Loganiaceen, V. 1) Eisenholz v. Sumatra, Königsholz od. Tembesubaum Leun., F. peregrina Reinw. (vgl. Fragaea, wovon nur irrtümlich entsteht!).

1) **Franciscēa** Pohl (Rhinanthaceen, XIV. 2) „Franzblume“, -strauch (n. Franz od. Franciscus II., Kaiser v. Österreich), Gewächsh. F. uniflora Pohl, eximia Scheidw., calycina Benth. 2) **Franciscēa** (-caria) DC. (Crassulaceen, V. 5), F. coccinea = Crassula s. Rochea coccinea (Calosanthes c. Van Houtt).

Francōa (-kōa) Cav. (Corniculaten Sedein, X. 5) „Franco's“-Dickblatt (n. d. span. Bot. d. 16. Jahrh.'s F. Franko in Valencia). — Francoacae DC., A. Juss.

1) **Frangūla** T. (sc. Rhamnus) L. (Rhamnaceen, V. 1) Faulbaum, „Bruch“-Wegdorn, Bruch- od. Pulverholz, Schwarzerle, fr. frangule, nerprun, bourgène, aulne noir, rhubarbe de moines (— des paysans), e. black-berry-bearing alder od. breaking buck-thorn, s. Frangula Alnus Mill. (v. frango breche — Holz brüchig!). 2) **Frangula** Mill. (sect. von Rhamnus, V. 1), z. B. Rh. rupestris, pumila etc.

Frankenia L. (Violarieen Sauvageseen od. Frankeniaceen, VI. 1) „Frankenie“ (n. d. Prof. Frankenius z. Upsala, † 1661), z. B. F. pulverulenta L. u. hirsuta L. (Nothria h. Berg.).

Fraxinaster DC. (subgen. v. Fraxinus) (Sapotac. Fraxineen, XXIII. 2) Esche (deter. v. Fraxinus Esche), z. B. F. excelsior L., angustifolia Vahl, parvifolia Lam., etc.

Fraxinella T. (sc. Dictamnus) Pers. (Rutaceen, X. 1) weisswurzlicher Diptam, s. Dictamnus albus L., auch Eschwurz, fr. fraxinelle „Eschenstrauch“ (dem. Fraxinus — Ähnlichk. d. Blätt.).

Fraxinus T., L. (Sapotac. Fraxineen od. Oleaceen, XXIII. 2) Esche, fr. frêne, e. ash-tree (v. φράντσις Zaun — Zaunholz!), Zier. F. excelsior L. s. apetala Lam. m. v. v., z. B. v. auræa W. (Fr. auræa Pers.), v. pendula Ait. Traueresche, fr. frêne parasol, v. heterophylla Vahl s. monophylla (simplicifolia W.), v. angustifolia Bauh., F. parvifolia W., F. argentea Lois., F. oxycarpa W. (-phylla M.-B.), F. americana L. (alba Marshal, acuminata Lam.), F. Ornus L. Blumen-E., etc. — Fraxinæae (sc. Sapotacæae) Rchb.

- Fremontia** Torr. (Chenopodiaceen, V. 2) „Fremont's“-Gänsefuss (n. L. C. A. Fremont, schr. 1806 üb. Arachis, 1807 üb. Orobanche Diose. etc.), Kalth. F. californica Torr.
- Frenela (-lia)** Mirb. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Fresniel's“-Cypresse (n. d. Physiker A. J. Fresnel ben.), F. australis, glauca, triquetra etc., s. Callithrix u. Cupressus.
- Freycinetia** Gaudich., DC. (Pandaneen od. Bromeliac., XXII. 1) „Frey-cinet“ (n. d. franz. Schiffscap. Freycinet, auf d. bot. Reise unt. Gaudichaude's Begleit. 1817/20).
- Fritillaria** L. (Liliaceen, VI. 1) „Schachbrettblume“, Kaiserkrone, fr. fritillaire, e. fritillary od. crown-imperial (-thistle) (v. fritillus Schachbrett — scheckige Zeichnung einer Art!), Zier. F. imperialis L., fr. couronne impériale, herbe aux sonnettes, e. imperial crown, m. v. v. (lutea maxima Hort. etc.), F. Meleagris L. Schachbrett- od. Brettspielbl., s. g. Kiebitzei, F. persica L., fr. lis de Perse (— de Suse), e. persian fr. (Treibh.).
- Frullania** Raddi (Lebermoose, XXIV. 3) „Frullanie“ (n. d. Italiener Frullani), z. B. tamarisci u. dilatata Nees.
- Frustranéa** L. (sc. Syngenesia L., XIX. 3) mit unfruchtb. Randblütchen (frustranéus vergleichlich).
- Fucacées** Ag., DC. Echte Tange (zu Ord. Fucoidæe Ag.), s. Fucus.
- Fuchsia** Plum. (Onagreen Myrobalaneen, VIII. 1) „Fuchsie“ (n. d. Prof. in Tübingen Leonh. Fuchs, † 1565), Zier. F. coccinea Ait. (trifylla Plum.), s. Skinnera cocc. Forst., F. corymbiflora R. P. (Anden) m. v. nana, F. fulgens Lindl. (Mexiko), m. v. superba, v. floribunda u. v. pyramidalis; F. gracilis Ldl. (Mex.), microphylla Hb. u. Bpl., globosa Lindl. m. v. erecta u. v. maxima, F. serratifolia R. P., macrantha u. spectabilis Hook. (Königin d. Fuchsien), arborescens Sims (Schufia Spach — anagramm. Fuchsia!), exorticata L. f. (Neuseel.) etc.
- Fucoidæe** Ag., DC., Rchb. Tangalgen Rchb., Ledertange Seub., Schwarztange (fucus Tang, εἰδομαι gleiche).
- Fucus** L., Grev. (Tange, XXIV. 3) Seetang, fr. sart, goëmon (goesmond), e. tang (lat. fucus, gr. φύκος Seetang, v. φύω wachse), z. B. F. vesiculosus L. gem. Blasentang, F. serratus L. Sägetang, etc.
- Fuligo** Hall. (Lycoperdaceen-Pilze, XXIV. 4) Russpilz, s. g. Lohblüte, s. Aethalium Lk. (fuligo, -inis Russ), z. B. F. candida Rebent. (Aeth. cand. Schidl.), F. septium s. flava Lk. „Lohblüte“, etc.
- Fumâna** Dun., Mill. (sc. Helianthémum Bauh. s. Cistus L.) (Cistineen, XIII. 1) heidelbeerblättr. Cistroschen (schwerl. v. fumus Rauch, sond. Eigennamen!), s. Chamae-Cistus Bauh.
- Fumaria** T., L. (Papaverac. Fumarieen, XVII. 2) „Erdrasch“, fr. capnoïde, fume-terre, fiel de terre „Erdgalle“, lait-battu u. pied de geline „Hühnerfuss“, e. fumatory (fumitory) (v. fumus Rauch — fein verteiltes Laub!), z. B. F. officinalis L., capreolata L. etc., s. Corydalis DC. u. Platycapnos Bernh. — Fumariacæe DC., -iæe Rchb.
- Funaria** Hedw., Schreb. (Moose, XXIV. 2) „Strick“- od. Drehmoos (funis Strick), z. B. F. hygrometrica Hedw. „wetteranzeigendes“. — Funariacæe Schimp.
- Fungi** L., DC., Rchb., Endl. Kl. d. Pilze od. Schwämme (fungus, gr. ογόγυος, fr. fonge, e. mushroom Schwamm).
- Funkia** Spreng. (Liliac. Hemerocallideen, VI. 1) „Funks“-Lilie (n. H. Chr. Funk, Apoth. in Gefrees am Fichtelgeb., † 1839), Zier. F. alba Andrews s. japonica Thb., caerulea Andr., grandiflora u. albo-marginata Hook., Sieboldi Hook., lancifolia Spr. m. v. fol. varieg. Hort. etc., s. Hemerocallis L. u. Hosta Tratt.

Fusisporium Lk. (Pilze, XXIV. 4) „Spindelsporen“-Schimmel (*fusus Spindel, σπορὰ Spore* — d. Sporidien spindelf.!), z. B. *solani* Mart. s. g. „Kartoffelfäule“, *aurantiacum* Lk., s. *Camptosporum aur.* Spr.

Gagēa Ker (zu *Ornithogálum* Rehb.) (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Gagel“, Gelb- od. Goldstern (Paxton: n. d. engl. Mönch Thom. Gage, schr. üb. Amerika 1648, Wtst.: Sir Thom. Gage, bot. Dilettant dies. Jahrh.'s), z. B. *lutēa* Ker, fr. étoile jaune, s. *Ornithogalum lut.* L. **Gaillardia** Sw., Foug. (Galardia Lam., Schreb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Gaillardie“, fr. gaillarde (n. Gaillard de Charentonneau, Liebh. d. Bot., Wtst. Marentonneau!), Zier. G. picta Sweet s. *Drummondi* DC. (bicolor var. *Drummondi* Hook.), fr. G. peinte m. v. *nana* Hort., G. perennis Hort. s. *lanceolata* Mchx. (*rustica* Cass.) m. v. *grandiflora* lutea Hort.

Galactodendron Kth. (Urticac. Artocarpeen, XXI. 1) „Milch“- od. Kuhbaum (*γάλα. -αυτος* Milch, *δέρδων* B.).

Galanga Rumph. (Scitamineen, I. 1) „Galgant“, e. galangal (malabar. kelengu!), G. major u. minor Rumph., s. *Alpinia Galanga* Sol.

Galanthus L. (Amaryllideen, VI. 1) Schneeglöckchen, eig. „Milchblume“ (*γάλα Milch, ἄνθος Bl.*), G. *nivalis* L., fr. perce-neige, violier d'hiver (- de Fevrier), violier bulbeux, galantine u. nivéole, e. snow-drop (-deep) m. v. *plicatus*, e. folded sn.-dr. (Caucasus).

1) **Galarrhoeus** Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) „Milchfluss“, -pilz, Pepperling, Brätling (s. v. u. *δοά* od. *δοία* Fluss), z. B. essb. *deliciosus*, *piperratus* etc. — 2) **Galarrhoeus** (nicht -*rhaeus*!) Haw. (Euphorbiac., XI. 3) „Milchfluss“, G. *creticus* Haw., s. *Euphorbia cret.* Mill.

Galatella Cass., DC. (zu Aster Rehb.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Milchaster“ (v. *γάλα Milch* — weg. Milchsafes!), Zier. G. *punctata* Cass., *linifolia* Nees, *dracunculoides* DC., Meyendorffii Reg., cana Nees (Aster canus Waldst. Kit.).

Galaxia Thb. (Irideen, XVI. 1) „Milchschwertel“ (v. *γαλακτών* gebe Milch), z. B. *ovata* u. *graminea* Thb., s. *Ixia Galaxia* u. *fugacissima* L. f., G. *narcissiflora* W. = *Sisyrinchium* n. Cav.

Galbānum Don (Umbelliferen, V. 2) Gummi-Galbanum, „Galban“- od. Mutterharzkraut, fr. galbanifère, e. galbanum, G. officinale Don (lat. *galbānum* Plin. Mutterharz, eine syrische Pfl.), s. *Opoïdēa galbanifera* Lindl., Bubon Galbanum s. *gummiférum* L.

Gale T. (sc. Myrica) L. (Amentac. Myricaceen, XXII. 4) gemeiner Gagel, Wachsbeere, brabanter Myrte, fr. galé (celt. gal = Balsam!).

Galēga T., L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) Geisklee Seub., -raute, „Galei“ O. W., fr. rue de chèvre, e. goat's-rue (n. Ruelle das veränd. glaux, Wtst., v. *γάλα Milch* — den Ziegen Milch gebend!), Garten G. *orientalis* L., G. *officinalis* L., fr. Lavanèse, e. common g.-r., m. v. fl. alb. Hort. (bicolor Hort.), G. *tinctoria* L., fr. faux-indigo. — *Galegæae* (sc. Papilionaceæ) Rehb.

Galeobdölön Sm., Huds. (Labiaten, XIV. 1) Gelb- od. Goldnessel, eig. „Wieselgestank“ (v. *γαλῆ* Wiesel od. Katze etc., *βδόλος* Gestank), G. *lutēum* Sm., s. *Galeopsis Galeobdölön* L. (*Lamium Galeobd.* Crantz), Zier. var. fol. varieg. Hort.

Galeopsis L. (Labiaten, XIV. 1) Hohlzahn, Helmrachen, fr. galéope, eig. „Mardergesicht“, auch Hanfnessel, fr. chambreule (chanvreule) (s. eb. u. *ψύτις* Gesicht etc.), z. B. G. *ochroleuca* Lam. Theekraut O. W. (herba *Galeopsidis* Offizin.).

1) **Galéra** DC., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Mützenschwamm“ (*galērus* Mütze etc.), z. B. *lateritia* DC., s. *Agaricus* l. 2) **Galéra** Blum. (Orchideen, XX. 1) Mützen-O. (— d. *Columna* gewölbt).

- Galinsōga** Rz. Pv. (-gaea Zucc., -gēa Cav., -gia W.) (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Galinsogakraut“, Kleinstrahl, Knopfkraut O. W. (n. M. Galinsoga, k. Intendant zu Madrid), z. B. parviflora R. P., s. g. Franzosenkraut, s. Mocinna Lag. — Galinsogae DC.
- Galipēa** Aubl. (Rutaceen, II. 1) Angosturabaum (n. d. Galipons, Indianern am Orinoko), G. Cusparia St. Hil. s. Angostura Cuspare R. Sch., s. Bonplandia W.
- Galfium** L. (Rubiaceen, IV. 1) Labkraut, Wald- od. Frauenstroh, fr. caille-lait (gaillet), fleur de St. Jean, e. runnet-herb (rennet-), cheese-runnet (-wort), lady's bedstraw (v. γάλα Milch — macht solche gerinnen, wie d. Kälberlab!), z. B. G. verum L. echtes L., s. g. Wegekr. od. Frauenstroh, e. our Lady's-bed, G. sylvaticum L., e. wood-roof „Walddach“, -meister (echtem Waldmeister ähnlich!) etc.
- Galorrhoeus** Haw., s. Galarrhoeus!
- Galphimia (-ia)** Cav. (Caryophylleen Malpighieen, X. 3) „Galphimie“, unechte Malpighie (Anagramm v. Malpighia!), z. B. glauca u. hirsuta Cav. — Galphiniæ Rehb.
- Gamolēpis** Less., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Vereinsschuppe“ (<γάμος Ehe, λεπίς Schuppe — d. Schupp. d. Anthod.'s bis mitten verwachsen), Zier. G. Tagētes DC. s. annua Less., s. Othonna s. Psilotonna E. Mey. Tagētes.
- Gamopetalae** DC., Endl. Kl. d. Ganzkronigen (s. eb. u. πέταλον Kronblatt — verwachs. Krone!).
- Ganja** Rumph., DC. (Tiliaceen, XIII. 1) Muspflanze D. (malay. Name!), G. sativa Rumph. s. Corchorus capsularis L.
- Garcinia** L. (Guttiferen Garcinieen, XI. 1) „Garcinie“ (n. d. Engl. Lawrence Garcin, Reis. d. 18. Jahrh.'s in Indien), G. Mangostana L. wohl-schmeck. Mangostane, fr. brindone.
- 1) **Gardenia** L. f., Ellis (Rubiaceen. Cinchonaceen, V. 1) (zu Randia Houst.) „Gardenie“, fr. gardène (n. Dr. Alex. Garden, Nat. in Carolina, Nord-Amer.), Treibh. G. florida L. s. g. Cap-Jasmin m. v. plena u. v. Fortuneana Hort., Warmh. Stanleyana, G. radicans Thb., G. Rothmannia L. s. capensis Thb. Cap-Eisenholz, G. grandiflora Hort. chines. Gelbschote, G. Thunbergia L. (Thunbergia capensis Montin). — Gardeniacæ Rich., -niæae DC., Cham., Schldl. 2) **Gardenia** Coldenia Dietr., s. Hypericum virginicum (Dietr.) (Hypericineen, XVIII. 2).
- Gardoquia** Rz. Pv. (Labiaten, XIV. 1) „Gardoquie“, fr. gardoquie (n. d. Spanier Don Diego Gardoqui, Mitarb. d. Fl. Peruv., Wtst. Finanzmin. Kön. Karl's IV. v. Span.), Zier. G. betonicoides Lindl. (Cedronella mexicana Benth., Dracococephalum mex. Kth.).
- Garidella** T., L. (Ranunculaceen, X. 3) „Garidel's“-Blume, fr. garidelle (n. d. Provence Pierre Garidel, schr. Pfl. von Aix, † 1739), z. B. G. Nigellastrum L. „Fenchelblume“ u. unguicularis Lam.
- Garrya** Dougl. (Garryaceen od. Antidesmeen, XXII. 5) „Garry's“-Strauch (n. Nic. Garry, unterst. Douglas' Untersuch. d. Pfl. von Nordwest-Amer.), Zier. G. elliptica Dougl. (ähnl. Viburnum). — Garryacæae DC.
- Gasteria** Haw., Duv. (Liliac. od. Bromeliac., VI. 1) „Bauch“-Aloe (v. γαστήρ, -ερος, -στυος Bauch — Blütenröhre an d. Basis), z. B. ensifolia Duv., s. Agave ensif., G. disticha Duv. (Aloë dist. L.), colubrina Nees, subverrucosa Salm-Dyck, etc.
- Gasteromycetes** Fr. „Bauch“- od. Balgpilze (s. eb. u. μύκης, -ητος Pilz).
- Gastonia** Juss., Comm. (Araliaceen, XI. 5) „Gaston's“-Aralie (n. Gaston v. Bourbon, Sohn d. Kön. Henri IV.), z. B. G. palmata Roxb.
- Gastrolobium** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Bauchhülse“ (s. v.,

- λοβίσιν* Hülschen — bauchig aufgetr. Hülse), z. B. bilobum R. Br. (Bstr. Neuholl.), Zier. calycinum, villosum, spinosum etc.
- Gastronēma** Herb., Sims (Amaryllideen, VI. 1) „Bauchfaden“ (s. v., *νήμα* Faden — d. Staubfäd. m. Antheren in d. bauchige Blüte eingeschl., Wtst.), Zier. G. clavatum Van Houtt., sanguinēum Lindl.
- Gaudinia** P.-B. (Gräser, III. 2) Ährenhafer Leun. (n. d. Bot. u. Pred. Gaudin zu Nyon, s. d. Aut.), G. fragilis P.-B., s. Avena fr. Host.
- Gaultheria** Kalm, L. (-thiera autt.) (Ericaceen, X. 1) Wintergrünstrauch, Theebeerenstr., canadischer od. Bergthee Rmpl., Scheinbeere Lauch., fr. gaulthérie, thé de Canada (- de Labrador, - de montagne) (n. d. schwed. Arzt Hugues Gauthier in Quebec), Zier. G. procumbens L., fr. g. couchée, leucocarpa etc.
- 1) **Gaura** Jacq., Pers. (Onagrarieen Oenothereeneen, VIII. 1) „Pracht-nachtkerze“ (*γαύρος* prächtig), Zier. G. Lindheimeri Engelm., G. biennis L., G. fruticosa scandens Loefl. (Combrētum laxum L.) etc.
 - 2) **Gaura** Lam. (zu Lechēa L.) (Cistineen, III. 3) Leche's-Cistrose.
- Gay-Lussaccia** Hb. u. Bpl. (Ericaceen Vaccinieen, XVIII. 1) „Gay-Lussac's“-Torfheidelbeere, Buckelbeere Lauch. (n. d. Chemik. Gay-Lussac, † 1850), G. Pseudo-Vaccinium Cham., Schldl. (Brasil.), pulchra Pohl (Gewächsh.), G. dumosa Torr. u. Gr. (Decamerion d. Nutt.) etc., s. Andromeda u. Vaccinium.
- Gazania** G. (Compos. Gorterieen, XIX. 3) „Gazanie“ (n. Theod. Gaza, Übers. d. Theophrast, 1432), Zier. G. pavonina s. Pavonia R. Br. (Gorteria ringens Thb.), speciosa Less. (Gorteria pectinata Thb.) u. splendens Hort.
- Geaster** Pers., Fr. (-astrum Mich.) (Pilze, XXIV. 4) „Erdstern“ (*γῆ* od. *γέα* Erde, *ἀστήρ*, *-έρος* od. *ἀστρον*, lat. aster od. astrum Stern). — Geasteridē DC.
- Geissōis** Lab. (Cassieen, X. 1) „Dachziegel“ - Hülsenstr. (v. *γεῖσον* Dachziegel — Samen zweireihig ziegelartig), G. racemosa Lab. (Neucaledon.).
- Geissomeria** Lindl. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ziegelkelch“, -ähren = Acanthus (*γεῖσον* Ziegel, *μερις* od. *-ος* Stück etc. — dicht ziegelartig ausseh. Blütenähren), Stuben: G. longiflora R. Br.
- Gelasine** Herb. (Irideen, III. 1) „Lachschnarwel“ (*γελασινός* lachend — schön blaue od. violette Blüten!), Zier. G. azurēa Herb.
- Gelsemium** Juss. (zu Bignonia Rchb.) (Bignoniaceen, XIV. 2) Carolina-Jasmin (gelsemium italic. Name für Jasmin), z. B. G. nitidum Michx. s. sempervirens Pers., s. Bignonia semp. L.
- Genetillyis** (nicht -thyllis) DC. (Myrtaceen, XII. 1) „Venus“-M. (*γενετήλις* Schutzgöttin d. Geburt, Zuname der Venus), Zier. G. macrostegia u. tulipifera Hort.
- Genipa** Plum. (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Marmeladen-Büchse, fr. genipayer (in Guiana geneepapa, in Brasil. janipalea, Wtst.), G. Meriana Plum., s. Duroia Eriopila L. u. Gardenia L. f.
- Genipella** Rich. (zu Genipa Plum.), s. Alibertia Rich.
- Genista** L., Lam. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Genst“ od. „Ginster“, fr. genêt, e. lady's-slipper (v. d. celt. gen., Wtst.: lat. genu Knie?), z. B. sagittalis L. (Cytisus sag. Koch), fr. genistelle od. spargelle, G. tinctoria L. m. v. sibirica Hort., fr. fleur à teindre (herbe à jaunir, - aux teintures) u. génestrole, n. dying-broom (dier's-), Stuben: G. canariensis L., alba L. u. ramosissima (Cytisus Atleyanus), monosperma Lam. (köstl. duft.) etc. — Genistēae Rchb.
- Gentiana** T. (Gentianeen, IV. 2 u. V. 2) „Enzian“, fr. gentiane, e. gentian, baldmony (*γεντιάνη* Diosc. n. Gentius, Kön. d. Illyrier,

der zuerst deren Wirkung erprobte, Paxton u. Wtst.), *G. lutea* L., e. bitter-wort, yellow g. (Offiz.), Zier. *G. acaulis* L., *verna* L., *asclepiadēa* L. s. g. Schellenkraut, wild *G. campestris* L., fr. gentianelle, etc. — *Gentianēae* DC. (-nae Juss., -nacēae Grck.) (zu Ord. *Contortae* Bartl.).

Geoglossum Pers., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Erdzunge“ ($\gamma\tilde{\eta}$ od. $\gamma\acute{e}\alpha$ Erde, $\gamma\lambda\omega\sigma\sigma\alpha$ Zunge), z. B. *viride*, *hirsutum* etc.

Geonōma W. (Palmen, XXI. 6) „Erdpalme“ ($\gamma\epsilon\omega\nu\mu\omega\sigma$ Landverteiler od. in d. Agrikultur erfahren — Stammspross. an d. Spitze werden zu neuen B.), z. B. *paniculigera*, *Carderi* Hort. Bull., *macrospatha* Spruce, etc.

Georchis Rchb. f. (Orchideen Neottieen, XX. 1) „Erd“-O. (s. v. u. *Orchis* — wächst auf d. Erde, nicht auf B!), z. B. *subregularis* Rchb. f.

Georgina W. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Georgine“ od. Dahlie (n. d. Reis. in Sibirien, Prof. Georgi zu Petersburg, nicht nach König Georg III. v. Engl.), s. Dahlia.

Geracium Rchb. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Habichtssalat“ (zu *Hieracium* L.) (Wtst. d. veränderte *Hieracium*! od. v. $\gamma\eta\delta\alpha\sigma\omega$ Perf. $\gamma\epsilon\gamma\eta\delta\alpha\omega\epsilon$, altere — weg. d. Pappus!), z. B. *praemorsum*, *parviflorum* etc. Rchb.

Geraniacēae DC. (-niēae Rchb., -nia Juss.) Storhschnabelige, i. q. Gruinales Endl. s. sogl.

Geranium L. (Geranieen, XVI. 4) Storhschnabel, fr. bec de cicogne (- de grue), géranier, e. stork's-bill (crane's-) (gr. $\gamma\epsilon\delta\alpha\mu\omega\sigma$ v. $\gamma\epsilon\delta\alpha\omega\sigma\omega$ Kranich — schnabelige Frucht!), z. B. wild *G. columbinum* L., fr. pied-de-pigeon, e. dove's-foot, *G. Robertianum* L., fr. herbe à Robert, *G. rotundifolium* L., fr. mauvette „Malchen“, *G. pratense* L., *silvaticum* L., wild u. Gärt. *G. sanguinēum* L., lan-castriene Wither. etc.

Gesneria L., Rchb. (-ria Plum., Pers.) (Gesneraceen od. Scrophularineen, XIV. 2) „Gesnerie“ (n. Conr. Gesner, s. d. Aut.), Gewächsh. *G. s. Naegelia* zebrīna, *cardinalis* Hort. s. *macrantha* Spr., *barbata*, *Bastarde Bethmanni* u. *Donkelaari*, *G. pulchella* Sw., s. *Achimenes coccinea* Pers. — *Gesneracēae* DC., -réae Rchb.

Gethyllis L. (Amaryllideen, VI. 1) „Lust“- od. Duftlilie (-Narzisse), Papierlilie D. ($\gamma\eta\theta\eta\lambda\lambda\lambda\sigma$ Porre, v. $\gamma\eta\theta\omega$ ergötze), *G. ciliaris* L., s. *Papiria cil.* Thb., *G. plicata* Jacq., s. *Hypoxis* s. *Fabricia plic.* Thb.

1) **Gēum** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Nelkenwurz, Benediktenkraut, Raffel O. W., fr. herbe de St. Bénoit, e. herb-Bennet u. sanamund (v. $\gamma\epsilon\mu\omega$ schmecke, rieche? — ungewiss!), Zier. *G. coccinēum* Sibth. „Scharlach“-N., wild. *G. urbānum* L., fr. gariot, e. throat-root, G. rivale L. Wiesen-Garaffel, etc., s. *Adamsia* Fisch. 2) **Gēum** (sc. *Saxifraga*) L. (*Saxifragac.*, X. 2) nierenblättr. Steinbrech M.-Rchb.

Gifōla Cass. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (Compos. Gnaphalieen, XIX. 4) Schimmel-, Filz- od. Fadenkraut (*Anagramm* v. *Filago*¹⁾), z. B. *G. vulgaris* Cass. (*Gnaphalium germanicum* W. u. *pyramidalatum* W.).

Gilia Rz. Pv. (*Gillia* Dietr.) (Polemoniaceen, V. 1) „Gil's“-Speerkraut (n. d. span. Bot. im 18. Jahrh. Ph. S. Gil, schr. mit Xuarez üb. exotische Pfl.), Zier. *G. tricolor* Benth. m. v. v., *G. (Leptosiphon) brevicula* Gray, *G. laciniata* R.-P., *capitata* Dougl., fr. G. à bouquets etc., s. *Ipomeria*, *Ipomopsis* u. *Cantua*.

Gillenia Mnch. (Rosac. Spirāceen, XII. 4) „Gillen's“-Spirae, fr. *Gillénie* (n. d. Arzt Ant. Gillen, s. d. Aut.), z. B. *G. trifoliata* Mnch.

1) Ähnliche sind noch *Ifloga*, *Logia* u. *Oglifa* Cass.

D. V.

(*Spiraea trif.* L. u. *Gastonia palmata Roxb.*), fr. G. à trois folioles, e. three-leaved G.

Gingko L. (Coniferen Cupressineen od. Taxineen, XXI. 5) „Gingko-baum“ (vaterl. Name!), G. *biloba* L. m. v. v. (Arbor nucifera folio adiantino Kämpf.), fr. gingo u. noyer de Japon, e. gingko-tree, s. *Salisburia adiantifolia* Sm., e. maiden-hair-leaved Sal.

Githago Desf. (sc. *Agrostemma*) L. (*Caryophylleen* od. *Sileneen*, X. 5) Rade, Kornblume (— rade), fr. lampette, e. darnel (git od. gith, n. Plinius eig. d. Schwarzkümmel in Saaten!), G. segéatum Desf. (*Lycchnis Githago* Lam. s. segéatum W. (*nicaeensis* A. Br.) = Agrost. Gith. L.

Glabraria L. (*Laurineen*, XVIII. 4) Glatt- od. Leichtholz - Lorbeer (glaber, -bra glatt), s. *Arbor similis Camphorae* od. *Lignum laeve minus Rumph.* (laevis glatt, levis leicht — n. Rumph. gering. spec. Gewicht).

Gladiolus T., L. (*Irideen*, III. 1) „Schwertel“, Siegwurz, fr. glaïeul (glaieul), espatule, e. sword-lily „Schwertlilie“ (dem. v. *gladius* Schwert), Gärt. u. Topfzier. G. *communis* L., fr. glé od. glaïeul commun, e. common sw.-lil., G. *gandavensis* Hort. „Genter“-S. m. viel. v. v., byzantinus Mill., Colvillii Sweet, cardinalis Curt. „Scharlach“-S., ramosus Schneevogt, psittacinus Hook., etc.

Glaucium T., L. (*Papaveraceen*, XIII. 1) Hormmohn, Gilbkraut O. W., fr. glaucie, pavot cornu, e. horned poppy (v. γλαυξός blaugrün — nämli. d. Blätter!), Zier. Gl. *lutéum* Scop. (*Chelidonium Glaucium* L., Gl. *flavum* Crantz), fr. gl. jaune, corniculatum Curt. s. *phoeniceum* G. (*Chelid. corn.* L.) m. v. tricolor Bernh.

1) **Glaux** L. (*Primulaceen*, V. 1) „Milchkraut“, Sermel O. W., fr. herbe au lait (— aux nourrices), e. milk-trefoil (v. γάλαξ Milch, Paxt. u. Wtst. v. γλαυξός s. eb.), G. maritima L. 2) **Glaux** Bauh. (sc. *Astragalus*) L. (*Legumin.* Loteen, XVII. 4) Schwielenblasen-Traganth.

Glaziova Wendl. (*Palmen*, XXI. 6) „Weddel-s- od. Sprühpalme (— wie ein versprühender Springbrunnen!), Zier. G. elegantissima Wendl., s. *Cocos Weddeliana* Hort. (Nam. in Brasil.).

Glecoma (-chōma) L. (*Labiaten*, XIV. 1) Gundelrebe, eig. Gunderrebe Mej., Gundermann, Grund- od. Erdrebe, Erdepheu, fr. lierre-terre, e. ground-ivy, cat's-foot, tunn-hoof (gr. γλυκύων, lat. pulegium Poley, eine Lippenpfl.), s. Glechon Spr.

Gleditschia L. (*Legumin.* Mimosene od. Cassieen, XXIII. 2) Ledershülsenbaum, s. g. Christusdorn (n. Prof. Gleditsch in Berlin, s. d. Aut.), Zier. G. *triacantha* L. m. v. v., fr. févier d'Amérique „amerik. Bohnhülsenb.“, e. honey-locust, amerik. thorny Acacia od. sweet-locust, e. auch three-thorned hon.-loc., G. *inermis* Hort. (*Mimosa Houstoni* l'Hér.), s. G. *sinensis* Lam. s. *horrifica* W. m. v. *inermis* Hort. (G. *japonica* Lodd.).

Gleichenia Sm. (*Farne*, XXIV. 1) „Gleichen's“-F. (n. d. Bot. u. Mikrosk. Frhrn. v. Gleichen-Rusworm in Franken, † 1783). — Gleicheniacae Kze., DC.

Glinus L. (*Ficoideen* od. *Aizoideen* *Tetragoniaceen*, XI. 4) „Klebrüster“, fr. *glinole* (γλίνος v. γλία Leim = klebr. Rüster F. W. Riener, von Theophrast angew. auf Masholder, Paxt., Wtst.), z. B. G. *lotooides* L. u. *dictamnoides* L.

Globularia L. (*Globularieen* od. *Buchnereen*, IV. 1) „Kugelblume“, fr. boulette od. marguérite bleue, e. globularia (globulus dem. globus Kugel), Zier. G. *longifolia* Ait. (*salicina* Lam.). — Globulariæ DC. (zu Personatae Bucheræe Rehb.).

Gloriosa L. (*Liliac.* Asphodeleen, VI. 1) „Prachtlilie“ (gloriosus ruhm-

- voll etc.), Zier. *G. superba* L. (Methonica Red.) (Ind.), Leopoldi Hort. (Westafr.), etc.
- Glossarrhen** Mart. (Violarieen, V. 1 od. XIX. 6) Zungenveilchen „Beutelzunge“ ($\gamma\lambda\omegaσσα$ Zunge u. $\alpha\delta\delta\eta\eta$ männlich etc. — Antherenspitze mit Zungenanhang), *G. floribundus* u. *pauciflorus* Mart. (Str. Brasil.), s. Schweiggera St. Hil.
- Glossodia** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Zungen“-O. ($\gamma\lambda\omegaσσω\deltaης$ zungenähnlich — Zungenanhang zwisch. Columna u. Labell), *G. major* u. *minor* R. Br. (Neuholl.).
- Gloxinia** l'Hér. (Gesneraceen, XIV. 2) „Gloxine (n. d. Arzt Gloxin in Colmar, s. d. Aut.), Warmh. *G. hybrida* Hort. m. v. *crassifolia*, *speciosa* Ker (Ligeria sp. Ker), m. v. *erecta* Hort.
- Glumacées** Bartl., Endl., DC., Rchb., Ord. d. Spelzblütigen od. Balg-pflanzen (Graminēae u. Cyperoidēae).
- 1) **Glyceria** R. Br. (Gräser, III. 2) „Süssgras“, Schwaden Grck., Mannschwingel, fr. herbe à la manne (manne de Prusse, - de Pologne), chien-dent aquatique (v. $\gamma\lambdaυξερός$ süß), *G. fluitans* R. Br. „Mannagrütze“, s. *Festuca fluit*. L. (Poa fl. Scop.), *G. aquatica* Wahlg. „Wasserschwaden“ (Gl. s. *Poa altissima* Mnch., *Poa aq.* L., Gl. *spectabilis* M.-K.). 2) **Glyceria** Nutt. (Umbelliferen, V. 2) Wassernabel, *G. repanda* Nutt. u. *erecta* Nutt., s. *Hydrocotyle repanda* Pers. u. *erecta* L.
- Glycine** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Süssbohne“ (gr. $\gamma\lambdaυξινός$ od. $\gamma\lambdaυξίς$ süß), Zier. (Wanddekor.) *G. chinensis* Sims (Wistaria chin. DC.), m. v. v., *G. frutescens* L. (Wist. fr. DC. s. *speciosa* Nutt.), fr. Gl. d'Amérique, e. shrubby Wist. od. kidney-bean-tree, *G. subterranea* L., s. *Arachis africana* Burm., fr. haricot de terre (- du Pérou), *G. arboreascens*, fr. haricot en arbrisseau „Bohnenbaum“, etc.
- Glycyrhīza** T. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Süssholz, „Süsswurzel“, fr. réglisse, e. sweet-root (s. eb. u. $\phi\acute{\iota}\acute{\iota}\alpha$ Wurzel), *G. echinata* L., glabra L., etc.
- Glycosmis** Corr. (-mida Spr.) (Rutaceen od. Aurantiac., X. 1) „Süssduft“-Limonie (s. v., $\deltaσμή$ Duft), *G. pentaphylla* Corr., s. *Limonia pent.* (Sclerostylis Blum.), *G. arborea* Corr., *cyanocarpa* Spr. u. *chlorosperma* Spr., s. *Cookia cyan.* u. *chlor.* Blum.
- Glycyphylla** Raf. (Ericaceen, VIII. 1) „Süssduftblatt“ ($\gamma\lambdaυξίς$ u. $\varphiύκλοι$ Laub — d. Blätt. riech. angenehm!).
- Glyptostrōbus** Endl. (Coniferen, Cupressineen, XXI. 9) Nuss-Cypresse, s. *Cupressus nucifera* Hort. (v. $\gamma\lambdaυπτός$ Kupfer- od. Stahlstich, $\sigmaτρόβος$ Kreisel etc. — d. Früchte oben m. gefurcht. Torus).
- Gnaphalium** T., L. (Compos. Inuleen od. Gnaphalieen, XIX. 2) Flocken-od. Ruhrkraut, fr. herbe à coton, e. petti-cotty (v. $\gamma\tauαφάλον$ Flocke, Wolle etc.), z. B. *dioicum* L., fr. pied-de-chat „Katzenpfötchen“, e. dow-weed, s. *Antennaria* d. R. Br., *G. arenarium* L. (Helichrysum ar. DC.) „Sand-Immortelle“, -Immerschön Grck., fr. bouton d'or, e. everlasting-flower, als Zier. (Teppich) *G. lanatum* Hort. (Helichrysum petiolatum DC.), Gartenzier. *G. margaritaceum* L. perlköpf., fr. bouton d'argent od. perlrière. — Gnaphaliæ Less.
- Gnetacées** DC. (zu Urticacæae Rchb., Piperacæae Gaud., Coniferae Carr.), s. *Gnetum* L.
- Gnētum** L., Sm. (-ton Blum.) (Gnetaceen, XXI. 9) Meerträubel, z. B. *Gnemon* L. ind. Gnemonbaum D. (st. Cnetum od. Cnethum v. $zvη\varthetaη$ i. q. $zvίδη$ Nessel ? — od. st. Genētum v. $γενήτος$ geboren ? Wst. d. veränd. gnemon ! — ungewiss!).
- 1) **Gnidia** L. (Thymeliaceen, VIII. 1) „Gnidischer“ Lorbeer od. ital. Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- Zeiland (v. Gnidus od. Cnidus, Seestadt in Karien), Zier. G. imbricata Thb., radiata Burm., pinifolia L. f., etc., s. Passerina u. Daphne.
Godetia Lindl., Spach (Onagraceen, VIII. 1) „Godetie“ (n. d. Bot. u. Reis. am Kaukasus, Ch. Godet, s. d. Aut.), Garten G. rubicunda Spach (Oenothera purpurea Curt.), fr. énothère pourpre, e. ruddy God. m. v. v., G. Lindleyana Spach (Oen. Lindl. Dougl.), etc.
Goethaea Nees, Mart. (Geraniac. Wallichieen od. Malvaceen, XVI. 4) „Goethe“-Geranium (n. d. Dichter W. Goethe), z. B. semperflorens u. caulinaria Mart., s. Pavonia Cav.
Goldfussia Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Goldfuss“-Acanthus, G. anisophylla Nees, s. Ruellia anis. (n. d. Prof. Goldfuss in Bonn, † 184*).
Gomotia Mut. (-zia L. f., Schreb.) (Rubiaceen, IV. 2) „Gomozie“, Zier. G. granadensis L. f. Granatbeersträuchlein, s. Nertera depressa G.; viell. richtiger: Gomezia Mut. (Rubiaceen, IV. 2) (n. Bernh. Ant. Gomez, Verf. e. bot.-med. Werks tib. brasili. Pfl. 1803).
Gomphidius Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Pflockgleicher“ ($\gamma\mu\mu\varphi\sigma$ Pflock, Keil, $\varepsilon\delta\delta\omega\omega\alpha\iota$ gleiche), s. Gomphus Pers. Keilpilz, z. B. G. glutinosus u. viscidus, schmieriger u. klebriger K.
Gompholobium Sm. (Cassieen, X. 1) „Pflockhülse“ ($\gamma\mu\mu\varphi\sigma$ u. $\lambda\beta\beta\iota\omega\vartheta$ dem. $\lambda\beta\beta\omega\vartheta$ Hülse — diese wie ein Nagelkopf), Zier. G. splendens, barbigerum DC. „bartführende“, polymorphum R. Br., virgatum ds. etc., s. Burtonia R. Br. u. Jacksonia ds.
Gomphrena L. (Amarantaceen, V. 2) Kugelamarant, s. g. Winterblume od. rote Immortelle, fr. fleur immortelle od. gomphrène (v. $\gamma\mu\mu\varphi\omega\mu\alpha$ Verbindung? — ungewiss!), Zier. G. globosa L. m. v. nana compacta, aurantiaca Decsn. (Haageana Klotsch), etc.
Gomphus Pers., Nees (Pilze, XXIV. 4) „Keilpilz“ Kumm. ($\gamma\mu\mu\varphi\sigma$ Pflock, Keil) (zu Agaricus L.), z. B. rosaeus s. glutinosus Pers. (Nadelw.).
Gongora Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Gongora“-O. (n. Don Aut. Caballero y Gongora, Vicekön. von Neugranada, Wtst. Bisch. v. Cordova, Gönner v. Mutis), z. B. Charontis Rchb. f., portentosa Lindl. „abenteuerliche“, quinquenervis R.-P. (Südamer.) etc., s. Coryanthes, Cirrhaea u. a.
Goniolimon Boiss. (Plumbagineen, V. 5) „Eckwiderstoss“ ($\gamma\omega\tau\iota\alpha$ Ecke Limonium, s. d.), Zier. G. tataricum Boiss. (Statice tat. s. strigosa Pall.), G. eximum Boiss. (Statice ex. Schrank), speciosum Boiss. (Limonium spec. Pers.), Stat. argentea Siev., etc.
Goniophlebium Blum., Presl. (Polypodiaceen-Farne, XXIV. 1) „Eckader“-F. (s. eb. u. $\varphi\lambda\epsilon\psi$, - $\varepsilon\beta\omega\vartheta$ Ader — die Nerven d. Wedel bilden drei- u. viereckige Figuren), Stuben G. argutum Sm., subauriculatum Blum.
Gonolobaeae (sc. Asclepiadæa) Rchb., sogl.
Gonolobus R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Kantenhülsen“-Wachspfl. ($\gamma\omega\tau\omega\vartheta\sigma$ Eck, Kante, $\lambda\beta\beta\omega\vartheta$ Hülse — diese kantig, dreirippig), z. B. Schlingstr. (Südamer.), G. filiformis R. Sch. (Cynanchum leucanthum Jacq. s. Asclepias Jacquiniana Dietr.), guianensis Spr. (Cynanch. viridiflorum Mey.).
Goodenia Sm. (Goodenovieen od. Campanulac. Lobelieen, V. 1) neuhol. Goodenough-Strauch, (n. d. engl. Bot. Dr. Goodenough, † 1827), Stuben G. grandiflora Sims, ovata Sm.
Goodenoviæ R. Br. (zu Ord. Campanulinae Bartl.), s. eb. Goodenia Sm.
Goodia Salisb. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Good's“-Ginster (n. Pet. Good, Samml. für d. Kew-Gärten in Neuhol.), Gewächsh. latifolia Sal. (Str. Neuhol.), polysperma DC. (Cytisus tomentosus Andr.), simplicifolia Spr. (Platycilum Celsianum Delaun.), etc.

Goodyera R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) Spalt-O., Sacklippe (n. d. engl. Bot. John Goodyer zu Hamshire), G. repens R. Br. (Neottia rep. Sw., Satyrium r. L.), Gewächsh. pubescens Lindl.

Gorinkia Presl, s. Conringia Heist. (n. d. Nam. Conring, nicht Gorink!).

Gordonia Ellis (Theaceen od. Malvac., XVI. 8) „Gordonsstrauch“ (n. d. Gart.-Insp. Alex. Gordon zu Mile-Land, London), Zier. G. javanica Ell., s. Franklinia Alatamaha Marshal, Lasianthus, Alcea u. Laplacea Kth. inaequalitātera Schott.

Gorteria L. (Compos. Gorterieen, XIX. 3) „Gorterie“ (n. d. holl. Prof. Joh. v. Gorter zu Harderwyk, † 1783), z. B. G. (Gazania) ringens Thb. u. splendens Hort., pectinata Thb. (Gazania speciosa Less.), G. fruticosa L. f. (Atractylis oppositifolia L.). — Gorteriæ Rchb.

Gossypium L. (Malvaceen, XVI. 8) Baumwollenpflanze, -strauch, -staude, fr. cotonnier, e. cotton-tree (v. gossum Wulst v. d. arab. goz od. gothn sanfte Substanz), G. herbacēum L., fr. carpas, G. religiosum L. (Chin., Ind.) Nanking-B., G. arborēum L. (Ind.).

Graminēae DC., Rchb. (-īna Juss.) (zu Ord. Glumacēae Bartl.) Gräser (gramen, -īnis Gras).

Grammanthes DC. (Crassulaceen, V. 5) „Schriftblume“, fr. grammanthe (γράμμα Buchstabe, ἄρθη Blüte — d. Buchst. V auf d. Blumenblätt.), Zier. G. gentianoides DC., s. Vauanthes Haw. u. Crassula L.

Grammatocarpus Presl. (Loasaceen, XIII. 1) „Schriftfrucht“ γράμμα, -ατος Schriftzug, ζαχ. τός Fr. — d. Kapsel linienförmig gedreht), Zier. G. volubilis Presl. (Seyphanthus elegans Don).

Grammatophyllum Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schriftblatt“ (s. v., γρίζατος Laub — Blätt. linienförm. gestreift), z. B. Roemplerianum Rchb. f., speciosum Blum. (Ind.), s. Angraecum scriptum Rumph. (Epidendrum scr. L. f., Gabertia scr. Gaud.).

Grammitis Sw. (Farne, XXIV. 1) Voll- od. „Schrift“-F. (v. γραμμή Schrift — linienförm. Sporangien), z. B. Ceterach Sw. (Ceterach officinarum W.).

Granadilla T., DC. (Passifloreen, XX. 4) „Granadille“, fr. grenadille, e. granadille (span. Name für Passiflora Passionsblume!), s. Passiflora L.

Granatēae DC., Seub. (zu Lythrariae Salicariæ Rchb.) Granatbäume, s. sogl.

1) **Granatum** (sc. Punica) L. (Salicarieen Granateen, XII. 1) „Granatbaum“, fr. grénadier, e. granate, pomegranate (lat. pomum granatum „kernvoller Apfel“, v. granum Korn). 2) **Granatum** litoréum Rumph., s. Xylocarpus Granatum Kön. (Meliaceen, VIII. 1) ostind. Grenadillenholz, fr. grenade de marqueterie.

Graphephōrun Desv. (Gräser, III. 2) Pinselgras, „Schriftträger“ (v. γραφή Schrift, φορός tragend — d. Spelzen gekielt), z. B. cynosuroides Kön. (Triodia cyn. Spr.).

Graphis Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Schriftflechte“ (v. γραφή Schrift — Ansehen d. Flechte!), z. B. Dumastii Spr., s. Fissurina Dum. Fée.

Gratiōla L. (Scrophularineen Gratioleen, II. 1) „Gnadenkraut“ (v. gratia od. grates Gottesgnade), Gr. officinalis L., fr. gratiole od. séné des près „Wiesen-Sennes“.

Grevillēa R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Greville's“-Silberstrauch (n. d. Bot. C. F. Greville, † 1809, Paxton, od. n. Rob. Kaye Greville, ber. schott. Kryptog.), Zier. G. bipinnatifida, flexnosa, sericēa, etc.

Grewia L., Juss. (Tiliaceen, XIII. 1) „Grewsstr.“, Grew's-Capstr. (n. Nehem. Grew, s. d. Aut.), z. B. G. Microcos L. (Microcos paniculata G.), G. elastica Juss. (Faserpfl. Ind.'s.).

Greyia Hook., Harv. (Saxifrageen, X. 2) „Grey's“-Kafferstrauch (n. Lord Grey of Groby?), G. Sutherlandi Hook.

Griffinia Ker (Amaryllideen, VI. 1) „Griffin's“-Narzisse (n. W. Griffin

- Esq. v. South-Lambeth), Stuben Gr. Blumenavia K. Koch u. Bouché u. *hyacinthina maxima*.
- Grimmia** Ehrh. (Moose, XXIV. 3) „Grimm's“-M. (n. d. Arzt J. F. K. Grimm in Gotha, † 1821, schr. Fl. v. Eisenach), z. B. G. pulvinata Ehrh. „Polster“-M.
- Grossularia** Scop. (sc. Ribes) L. (Ribesiaceen, V. 1) Stachelbeere, „Kräuselbeere“, fr. grosseille (-éillier épineux), e. goose-berry-bush, fea-berry (feabe) (v. grossus dick, dem. grossulus kleine unreife Feige, od. viell. d. Altname „creutzelbeere“ latinisiert, Rümpler). — Grossulariæae (zu Peponiferae Leun. Ribesiacæa Rchb.), -acæa DC. Grck.
- Grubbia** Berg., Schreb. (Thymelæaceen, VIII. 1) „Grubbia“ (n. Mich. Grubb, Vorst. d. ostind. Gesellsch., schr. Beitr. z. Capflora), G. rosarinifolia Berg., s. *Chamaelea africana* Herm.
- Gruinales** Endl. „Storcheschnäbler“ (v. grus, -uis Kranich).
- Guaiacum** L. (-jacum Plum.) (Sapindac. Zygophylleen, X. 1) Franzosenholz v. St. Domingo, fr. gayac, bois-saint-à-pians (südam. Name d. Pfl. gujak!), G. officinale L. „Pockenholz“.
- Guajava** T. (-jaba) (Myrtaceen, XII. 1) Kujavebaum Leun. (vaterl. Name!), G. pyriformis G. s. alba dulcis Comm., pomifera Bauh. s. alba acida Pluk., s. Psidium pyriferum u. pomif. L.
- Guazuma** Plum., Juss. (Malvac. od. Büttneriac., V. 1) Ochsenfrass, -brot (Nam. d. Pfl. in Mexiko), G. polybotrya Cav. u. tomentosa Kth., s. Bubrōma pol. W. u. Theobroma Guazuma L.
- 1) **Guettarda** Vent. L. (Rubiæ. Guettardeen, XXI. 7) „Guettard'sbaum“, fr. guettard (n. d. franz. Pflanzen-Physiol. Et. Guettard, 1748), G. speciosa L., fr. fleur de St. Thomé. — Guettardiæae (zu Rubiacæa) Rchb.
 - 2) **Guettarda** Schreb. (Styracineen, XI. 1), G. argentea W., s. Halesia arborescens P. Br.
- Guilandina** Juss. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Kugel- od. Schusserbaum, fr. cniquier od. guénic, e. nicker-tree (n. Melchior Wieland, latin. Guilandus, Prof. in Padua, † 1590), G. Bonduc L., fr. bon duc, G. Moringa L. (Moringa polysperma G.) Behennussbaum, fr. ben, e. ben-nut, s. Hyperanthera Mor. Vahl, blaues Santel- od. Griesholz (lignum nephriticum), Zier. G. dioeca L. s. inermis Duham. (Gymnocladus canadensis Lam.), G. echinata Spr., s. Caesalpinia echinata autt. „Brasilienholz“.
- Guilemla (-ielma)** Mart. (Palmen, XXI. 6) „Wilhelminen“-P. (n. d. Kön. Kar. Wilhelmine v. Bayern, † 1841), G. speciosa Mart., s. Bactris Gachipaes Hb. u. Kth.
- Gunnëra** L. (Urticac. Artocarpeen od. Gunneraceen, II. 1) „Gunnerspflanze“, fr. gunnère (n. d. Prof. Gunner in Kopenh.), Ornament G. perpensa L. (Perpensem blitispermum T.), Zier. G. scabra R. P. s. Panke acaulis Molin. „Panke“, s. g. Rhabarber-G., G. manicata, s. Misandra Comm. u. Acanthospóra Spr.
- Gustavia** L. (Myrtac. Melaleucac., XVI. 8) „Gustavbaum“ (n. König Gustav III. v. Schweden), Warmh. G. augusta L., s. Perigara hexapetala Aubl., Warmh. ferner G. speciosa DC., insignis Hook., fastuosa W., gracillima Miers, etc.
- Gutierrezia** Lag. (Compos. Solidagineen, XIX. 2) „Gutierrezie“, fr. gutierrezie (n. d. span. Bot. Gutierrezo), Herbstzier. G. gymnospermoïdes Lag. (Gunthera viscosa Reg.), linearifolia Lag. (Galinsoga l. Spr.), etc.
- Guttiferae** Juss., DC., Endl., Rchb. (ungramm. Guttaeferae Kön.) Harzsafthaltige (gutta Tropfen, féro trage).
- Guzmannia** Rz. Pv. (Bromeliac., V. 2) „Guzmannie“ (n. d. span. Nat. u. Sammler A. Guzmann), Zier. G. tricolor R. P. (Pourretia sym-

Gwillimia — Gyrocarpus.

pagnentéra R. P.) u. pieta R. P. (*Nidularium fulgens* Lem.) etc., s. Pitcairnēa l'Hér.

Gwillimia Rottl., DC. (zu *Magnolia L.*) (*Magnoliaceen*, XIII. 7) „Gwillimie“, asiat. Magnolie (n. d. franz. Bot. Guillemeau?), G. (*Magn.*) Yulan Desf.

Gymnadenia R. Br. (*Orchideen Ophrydeen*, XX. 1) „Nacktdrüsen“-O., Händelwurz O. W. ($\gamma \nu \mu r \circ \varsigma$ nackt, $\alpha \delta \gamma \nu$, $-e \nu \circ \varsigma$ Drüse), s. *Orchis* L. u. *Habenaria* W.

Gymnanthēra R. Br. (*Asclepiad. Periploceen*, V. 2) „Nackt-Anthere“ (s. eb., $\lambda r \vartheta \eta \circ \alpha$ Staubbeutel), G. nitida R. Br. (Str. Neuhol.).

Gymnocladus Lam. (*Cassieen Cäsalpinieen*, XXII. 9) „Nacktaastbaum“, Schusserbaum (s. v., $\chi \lambda \alpha \delta \circ \varsigma$ Ast — nach d. Abfall. d. Blät. auffall. nackte Äste!), Zier. *G. canadensis* Lam., s. *Guilandina dioeca* L., fr. cliquier od. bon duc du Canada, ésicot Dietr., e. Kentucky-Coffee-tree, amer. stump-od. nicker-tree „Knickerbaum“, s. *Hyperanthera dioeca* Vahl.

Gymnogramma (-me) Desv. (*Farne*, XXIV. 1) „Nacktschrift“-F. (s. v., $\gamma o \acute{a} \mu \mu \alpha$ od. $-\mu \eta$ Schriftzeichen — nackte Sporangien wie Schriftzüge!), Zier. *G. peruviana argyrophylla* s. *argyraea* Hort. u. *chrysophylla* Kaulf. *aurēa* Hort. „Gold- u. Silber“-F., G. *Wetenhalliana* (Schwefelpuder, Blattquasten), *sulphurea* Desv., *Laneana* Hort. (schönste Form!), etc., s. *Acrostichum L.*, *Grammitis* Sw., *Hemionitis* L. u. a.

Gymnomycētes Rchb. „Nacktpilze“ (s. v., $\mu \acute{u} z \eta \varsigma$, $-\eta \tau \circ \varsigma$ Pilz).

Gymnospermae Endl., Kl. d. Nacktsamigen ($\sigma . \tau \acute{e} \circ \mu \alpha$ Samen) i. q. Coniferae Zapfenträger (Nadelhölzer).

Gymnostachyūm Nees, Ch. Lem. (*Acanthaceen*, XIV. 2) „Nacktähren“-Acanthus (s. v., $\sigma \tau \acute{a} \chi \nu \varsigma$ Ähre — Ährenkolben blattlos! Wst.), Zier. G. Verschaffelti Ch. Lem. (Blattpfl.), etc., s. *Fittonia Coëm.*

Gymnōthrix DC., P.-B. (Gräser, III. 2) „Nackthaar“ (s. v., $\vartheta \varrho \acute{e} \xi$ Haar — Borstenhülle d. Blüt. fällt ab), Zier. *G. caudata* Schrad., *japonica* Kth. u. *latifolia* Schult., *G. crinita* Hb. s. *Pennisētum* cr. Spr.

Gynandrae Endl. (zu *Amphibrýa* Endl.) Kl. d. Weibermännigen ($\gamma \nu \nu \eta$ u. $\lambda r \eta \circ \alpha$, $a r \delta o \circ \varsigma$ Weib u. Mann — mit einand. verwachsen!).

Gynandria L. „Weibermännige“ (XX. Kl.) (s. eb. — verwachs. Geschlechtsteile d. Blüten!).

Gynērium Hb. u. Bpl., Nees (Gräser, XXII. 3) „Frauenhaar“, Pampasgras, fr. herbe géante des pampas ($\gamma \nu \nu \eta$ u. $\varphi \varrho \circ \nu$ Wolle — rauhhaar. Spelzen d. weibl. Blütenchen), Zier. G. *argentēum* Nees, fr. Gyn. *argentē* od. roseau à plumes, e. silver-Gynerium.

Gypsoallis D. Don (Ericaceen, VIII. 1) „Gypsschöne“, fleischfarb. Heide, G. *carnēa* D. Don, fr. bruyère à fleurs carnées, e. flesh-coloured Moor-Heath ($\gamma \nu \nu \circ \varsigma$ Gyps. $z \acute{a} \ddot{\lambda} \circ \varsigma$ Schönheit — auf Kalkboden, schöne Pfl., Wst.), s. *Erica saxatilis* Salisb. (hederacea L., bracteata Mnch.).

Gypsophila L. (Silenaceen, X. 2) „Gypsliest“, -kraut, fr. gypsophile u. soude vermiculaire „Wurm-Salzkraut“ (G. *Struthium L.* „Seifenkr.“), Zier. (Bouquete) *G. paniculata* L., *elegans* M.-B., *Stevenii* Fisch., *scorzonerifolia* Desf., *muralis* L. etc. (s. eb. u. $\varphi \acute{u} \eta$ Liebhaberin — liebt sonnig. trockn. Kalkboden).

Gyrocarpus Jacq. (Myrobaleen, XXIII. 1) „Kreiselfrucht“ (v. $\gamma \nu \varrho \acute{o} \circ \omega \varsigma$ drehe im Kreise herum, $\chi \alpha \circ \tau \circ \omega \varsigma$ Frucht — d. Fr. beim Hochwerfen weg. d. Flügel), G. *americanus* Jacq., asiaticus W. s. *Jacquini Roxb.* (Bäume).

- Habenaria** W., R. Br. (Orchid. Ophryd., XX. 1) Zaum- od. Zügel-O., Riemenlippe (v. habēna Zügel — Lippe riemenförm., Fadenorg. an d. Antherenbase), H. bifolia R. Br. (Platanthēra b. Rehb., Orchis b. L.), viridis R. Br. (Plat. vir. Lindl., Satyrium v. L.), albida Sw. (Gymnadenia albida Rich., Orchis a. Scop. etc.).
- Hablitzēa (-tzia)** M. B. (**Habzelia** DC.) (Chenopodiaceae od. Annonaceen, V. 1 od. XIII. 7) Guineapfeffer (n. C. v. Hablitz, Reis. in d. Krim, Wittst. n. C. L. Hablitz aus Preussen, in Russland erzogen, Begleit. v. S. G. Gmelin etc., schr. üb. Taurien), H. tamoides M. B.
- Habranthus** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (zu Amaryllis Herb.) „Pracht“-Narzisse ($\ddot{\alpha}\beta\vartheta\circ\varsigma$ reizend etc., $\alpha\dot{\nu}\vartheta\circ\varsigma$ Bl.), Zier. H. intermedius Herb., kermesinus Sweet, Andersoni Herb., etc.
- Habrothamnus** Endl. (Solaneen od. Celastraceen, V. 1) „Prachtstrauch“ (s. eb., $\gamma\acute{a}\mu\circ\varsigma$ Strauch), Winterzier. H. elegans Brongn., corymbosus Endl. (Meyenia Schldl.), Regelii Planch. (Guatemala), etc.
- Habzelia** DC. f. (Annonaceen, XIII. 7) Guineapfeffer, fr. coraya (v. habzeli, d. äthiop. Namen d. H. aethiopica (Piper aethiop.), s. Hablitzēa M.-B.
- Hackēa** Schrad. (**Hakea** Wendl.) (Proteaceen, IV. 1) „Hake's“-Strauch (n. d. Bot. u. hannövr. Minist. Frhrn. v. Hake), Gewächsh. H. petrophylloides, florida u. nitida R. Br., etc., s. Conchium Sm. u. Banksia R. Br.
- Hacquetia** Neck. (Umbelliferen, V. 2) Hüllen- od. Kleinkopfdolle, Doldenköpfchen (n. d. Prof. Balth. Hacquet in Lemberg, † 1788), z. B. H. Epipactis DC. gelbgrüne H., s. Astrantia L. f. s. Dondia Epip. Spr.
- Haemadietyon** Lindl. (Apocynen, V. 2) „Blutnetz“ ($\alpha\acute{\iota}\mu\alpha$, $-\alpha\tau\circ\varsigma$ Blut, $\delta\acute{\iota}\tau\circ\varsigma$ Netz — grosse dunkelgr. rot durchad. Blätt.), Warmh. H. nutans A. DC. (Echites rubro-venosa Lind.) m. v. maxima (Prachtbelaub.!).
- Haemanthus** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Blutblume“, — Narzisse, fr. hémanthe od. fleur de sang, e. blood-flower (s. e. u. $\ddot{\alpha}\nu\vartheta\circ\varsigma$ — Blume tiefrot), Stuben H. coccineus L., fr. serpentaire, H. puniceus L., cinnabarinus Deesn., albillos Jacq., spiralis Ait. (Strumaria spir. Ker), multiflorus L., Toxicarium L. (gift.).
- Haematococcus** Ag. (Urkornalgen od. Nostochineen, XXIV. 3) „Blutkügelchen“, s. g. roter Schnee (s. v., $\kappa\acute{\iota}\kappa\kappa\circ\varsigma$ Korn), s. Protococcus nivalis Ag.
- Haematoxylon (-nm)** L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Blut“- od. Campecheholz, Blauholz (s. v., $\xi\acute{\iota}\lambda\circ\varsigma$ Holz — Farbe dess. blutrot!), H. campechianum L., fr. campêche od. assourou, e. blood-wood.
- Haemocharis** Salisb., DC. (Theaceen od. Ternstroemiac., XIII. 1) „Busch“- od. „Heckenthee“ (v. $\alpha\acute{\iota}\mu\circ\varsigma$ Busch, Hecke, $\chi\acute{\alpha}\circ\varsigma$ Freude — Wtst., $\alpha\acute{\iota}\mu\alpha$ Blut? — Blum. meist schön rot?), s. Gordonia Spr., Wickstroemia Schrad., Laplacea St. Hil.
- 1) **Haemodorum** Sm. (Liliac. Haemodoraceen, III. 1) Blutwurz, „-schlauch“ ($\alpha\acute{\iota}\mu\alpha$ Blut, $\delta\acute{\iota}\circ\varsigma$ Schlauch, Wtst.: $\delta\acute{\iota}\omega\circ\varsigma$ Gabe — blutr. Wurzelknollen! $\alpha\acute{\iota}\mu\acute{\omega}\delta\acute{\iota}\omega\circ\varsigma$ Theophr. i. q. Orobanche cruenta Bertol.), H. brasiliense Spr. (Hagenbachia br. Nees). — Haemodoraceae R. Br.
 - 2) **Haemodōron** Wallr. (Rhinanthac., XIV. 2) „Blut-Ervenwürger“ (zu Orobanche L.).
- Hakēa** s. **Hackēa**.
- Halesia** L. (Styracineen od. Ebenaceen, XI. 1) „Hales“-Storaxstrauch, fr. hâlesier (n. Steph. Hales, s. d. Aut.), Zier. H. tetraptera L. Schneeflockenbaum od. „Vierflügelfruchtb.“, e. common snow-drop-tree, H. stenocarpa K. Koch, H. arborescens R. Br. (Guettarda argentēa W.), etc. (Austral.).

- 1) **Halicacába (-um)** Rumph. (Sapindac., VIII. 3) gem. Herzerbse (gr. ἄλικαζάρβος d. arab. alkékengi), s. *Cardiospermum Halicacábum* L., fr. cardiosperme, pois-de-coeur, cor-inde, Alkekenge. 2) **Halicacábum** (sc. Physális) Scop. (Solanaceen, V. 1) Judenkirsche, fr. coqueret od. alkékengi, e. ebenso od. winter-cherry, s. *Physalis Alkekengi* L.
 - Halianthus** Fr. (Alsinaceen, X. 3) „Salzblume“, Salzmiere Grck., Seemiere (v. ἄλιζ, -λὸς Salz od. Meer — salz. Standorte), H. pеплоидес Fr., s. Honckenya peppl. Ehrh. (Arenaria p. L., Alsine p. Wahlbg.).
 - Halimodendron** Fisch. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Salzstrauch“ (ἄλιμος salzig, δένδρον Baum — salz. Standort!), Zier. H. argenteum DC. (Caragana arg. Lam.), Robinia Halodendron L. f.), e. silver-leaved Salt-tree (Sibir.).
 - Halimus** Wallr. (Atripliceen, XXI. 5) „Salzmelde“, Wasserburgel, fr. halime (s. eb.), H. portulacoides Wallr. (Obione p. Moq. Tand., Atriplex p. L.).
 - Halodendron** L. f. (sc. Robinia ds.) (Legum. Galegeen, XVII. 4) „Salzbaum“ (ἄλιζ, -λὸς u. δένδρον), s. *Halimodendron* Fisch.
 - Halodiscus** Ser., Rmpl. (zu *Spiraea* L.) (Rosac. Spirac., XII. 4) „Salzscheibe“? (s. v., δίσκος lat. discus Scheibe? wahrsch. fehlerh. st. *Holodiscus* Lauch., s. d.).
 - Haloragēae** DC., Rchb., Halorrhagidacēae Grck. Wassernussgew., s. Haloragis.
 - Halorágis** Forst. (richt. -orrhágis!) (Halorageen, VIII. 4) „Seebeere“, Wassernuss (ἄλιζ, -λὸς Salz, Meer, ὁλίξ, -αγός Weinbeere — Früchte Weinbeeren ähnl., am Meeresgestade!).
 - Hamamelidēae** R. Br. (zu Laurinēae Rchb., Ord. Umbelliflōrae Bartl.), sogl.
 - Hamamēlis** L. (Hamamelideen, IV. 2) Zaubernuss, „Mitapfel“, Zauberhasel, e. witch-hazel (v. ἄμα zugleich, μῆλον, lat. malum Apfel — alte Frucht u. neue Blüte zusammen! Wtst.: eig. Homomelis v. ὅμος gleich — einem Apfel ähnl.), Zier. H. virginica L. s. corylifolia Mnch. m. v. macrophylla Hort., fr. pistachier noir, e. virginian witch-Hasel (wych-Hazel) virgin. Zauberstr. — Hamamelēae DC.
 - Hamnium** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Häkchen“-Alant? (v. hamulus Häkchen? — schwerl. v. ἀμυλον Stärkemehl!), s. Verbesina alata L.
 - Hancornia** Gomez (Apocyneen, V. 1) „Hancornie“ od. Mangaíba (n. einem Portugies. Phil. Hancorn, Pfeiff.), H. speciosa Gom. u. pubescens Mart. (Str. Brasil.).
 - Hardenbergia** Benth. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Hardenberg's“-od. Kennedy's-Bohne (n. einer Gräfin Hardenberg, geb. v. Hügel), s. Kennedya Vent.
 - Hardwickia** Roxb. (Cassieen, X. 1) „Hardwick's“-Hülsenbaum (n. d. Gen.-Maj. d. Artillerie Thom. Hardwick, Ostind. Compagnie), H. binata Roxb. (Faserpfl. Indiens).
 - Harina** Hamilt. (Palmenen, VI. 2) „Stall“-P.? (lat. hara Schweinstall? Wtst.: ostind. Name!), H. caryotoides Ham. s. Wallichia car. Roxb.
 - Harmala** Mnch. (sc. Pegānum) L. (Rutac. Zygophylleen, XI. 1) gem. Harmala, Harmel- od. arabische Raute, fr. harmale (arab. harmel = Raute, Forskål), H. multifida Mnch., s. Pegan. Harm. L.
 - Harpalium** Cass., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Starr- oder „Packsamenbl.“ (ἀσπαλήν od. -λέος festpackend — nämli. d. Samenhülle!), Zier. H. rigidum Cass., fr. soleil rigide, s. *Helianthus rigidus* Desf.
- 1) **Hartmannia** DC. (Compos. Madieen od. Sigesbeckieen, XIX. 2) „Hartmannie“ (n. K. J. Hartmann, schwed. Arzt etc., s. d. Aut.,

- Pfeiffer n. Jos. Ad. Hartmann, Reis. etc.), z. B. H. Streetsii Gray u. H. Madia L., s. Hemizonia. 2) H. Spach (Onagrarieen, VIII. 1) Hartm.'s-Nachtkerze, H. macrantha Spach, s. Oenothēra tetraptera Cav.
- 1) **Hastingia** Sm. (Labiaten, XIV. 1) „Hastingie“ (n. Warren Hastings, Gen.-Gouv. Ostindiens, † 1818), Zier. H. coccinea Sm., s. Moluccella L. (Holmskioldia Retz.). 2) H. Kön. (Büttneriac., V. 1).
 - Hauya** Moç. u. Sess. (Onagrarieen Montinieen, XXII. 4) „Hauy's“-Montinie (n. d. Mineralogen Réné Just. Hauy, † 1822 in Paris), z. B. H. elegans Moç. u. Sess.
 - Haworthia** Duv., Salm-Dyck (Liliac. Aloïdeen, VI. 1) „Haworth's“-Aloë (n. d. engl. Bot. Haworth), H. albicans Duv., s. Aloë.
 - Hebecladus** Miers (Solanaceen, V. 1) „Flaumschoss“ ($\eta\beta\eta$ Flaum, lat. pubes Mannbarkeitshaare, $\pi\lambda\deltaος$ Trieb, Ast), Zier. H. biflorus Hook. (Peru).
 - Hebeclinium (-num)** DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Flaumlager“-Dosten (s. eb., $\pi\lambda\tauη$ Bett, Lager — Pubescenz d. Fruchtbodens), Zier. H. janthimum DC., s. Conoclinium j. Moore.
 - Hebeloma** DC. (Pilze, XXIV. 4) Jugend-Blätterpilz Kumm., „Flaumrand“ (s. v., $\lambda\omega\muα$ Saum etc. — bez. d. gefransten Manschette, Wst.), H. fastibile, truncatum etc., s. Agaricus L.
 - Hebenstreitia** L., Thb. (Buchmereen od. Selagineen, XIV. 2) „Hebenstreitie (n. d. Prof. Hebenstreit in Leipzig, † 1757), Zier. H. dentata L. (alba Hort.), tenuifolia Schrad. (integrif. L.) etc.
 - Hebradendron** Grah. (Guttiferen, XI. 1) „Hebräerbaum“ ($\epsilon\beta\varrho\alpha\tilde{\iota}\sigma$ hebräisch, $\delta\acute{e}rδo\sigma$ B. — rundum abspringende Antheren, wie durch Beschneidung), s. Garcinia amboinensis Gummigutbaum (Stalagmites cambogioides W. s. Gutta Offiz.).
 - Hecatomia** DC., Rehb. (zu Ranunculus L.) (Ranunculac., XIII. 7) Weissranunkel ($\epsilon\pi\alpha\tau\sigma$ hundert — nämli. Früchtchen in einer Blüte!), z. B. palustris u. pilosa Lour. s. cantoniensis DC., sowie Ran. pyrenaicus L., platanifolius L. etc.
 - Hedera** Sw., L. (Araliaceen, V. 5) Epheu, Eppich, fr. lierre (l'hierre), e. ivy, tree-ivy, „Baumeppich“ (v. d. celt. hedra Cordel od. Wst. $\xi\delta\sigma\alpha$ Sitz v. $\xi\zeta\omega$ sitze fest — an Stämmen etc.), wild u. Zier. H. Hēlix L. europ. E. m. v. v. (palmata Hort. u. aborescens Hort., v. latimaculata elegans (um Spiegel herum), v. taurica Booth (Fenst. u. Ampeln), v. Leeana, v. digitata Hort., v. poëtica Hort. etc.; H. hibernica Hort. irischer od. schott. E., H. colchica C. Koch (Roegneriana Hort.), H. algeriensis Hort. (canariensis W. u. maderensis Hort.) — Hederaceae A., Rich., DC.
 - Hedycarya** L., Pers. (-ia Forst.) (Urticac. Monimieen od. Nyctagineen, XXII. 9) „Süssnuss“, Stielnuss ($\eta\delta\upsilon\varsigma$ süss, $z\alpha\sigma\sigma\sigma\sigma$ Nuss — nussf. Früchte sehr süss!), z. B. H. dentata L. (Str. Neuseel.), hirsuta Spr. (Bengal.) etc., s. Hydrocarya Spr.
 - Hedychium** Kön. (Scitamineen Alpinieen, I. 1) „Süssschnee“, Kranzblume D. (s. v. u. $\chi\omega\tau$ Schnee — liebl. Geruch), Warmh. H. coronarium Kön. (Kaempferia Hedychium Lam.), Gardnerianum Wall.
 - Hedyerēa** Schreb. (Amygdalaceen od. Myrobalaneen, XII. 1) „Süssfleisch“, Zuckerpflaume D. (s. v., $z\sigma\sigma\sigma\varsigma$ Fleisch — sehr süssf. fleisch. Fr.!), H. incana W. etc., s. Licania Aubl.
 - Hedyotidēae** Cham., Schldl. s. Hedyōtis!
 - Hedyōtis** Lam. (Rubiac. Cinchonaceen, IV. 1) „Süsssohr“-od. Ohrkraut Leun., Oehrling D. (s. v., $o\bar{v}\varsigma$, $\tilde{\omega}\tau\sigma\varsigma$ Ohr — bez. d. Blätterform u. weg. süß. Geruchs), H. Auricularia L. (Valerianella palustris Burm.), hispida Lam. (Oldenlandia umbellata L.), graminifolia L. s. herbacea Forst. (Old. stricta Sw.) etc.

Hedysarēae Rchb., s. sogl.

Hedysarūm L. (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) „Süss“- od. „Mannaklee“, Hahnenkopf, fr. sainfoin u. tête de coq, e. cock's-head (gr. ἡδύσαρον v. ἡδύς süss u. σάρον Besen etc., Wtst. ἀρωμα Arom!), Zier. H. coronarium L. spanisch. H. od. Kron-Mannaklee, fr. sainfoin d'Espagne, e. garland-cock's-head m. v. fl. alb. Hort., H. capitatum Desf., H. sibiricum Poir., H. humile L., fr. tête de poule „Hühnerkopf“, H. cordatum Thb. (Hallia cord. Thb.), H. hamatum L. (Stylosanthes procumbens Schreb.), H. gyrans L. (Desmodium gyr. Desv.) beweglicher S., H. Onobrychis L. s. Onobrychis sativa Lam. s. viciaefolia Scop., Esparsette od. türk. Klee.

Heinsia DC. (-tia Van Houtt., -zia Scop.) (Rubiaceae Cinchonac., V. 1) „Heinsius“-Chinatrauch (n. d. Philolog. Heinsius, Übers. v. Theophrast's Schr., Leyden 1613), Zier. H. tigrina.

Helenium L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Alant, fr. Hélénie, e. horse-heal od. bastard-sun-flower (gr. ἑλέριον nach Ἔλευσις, Sohn d. Kön. Priamus v. Troja? Wtst. wohl v. ἥλιος Sonne — Gestalt d. Blume!), Zier. H. autumnale L., tenuifolium Nutt., atro-purpureum Kth. Bouché m. v. grandicephalum Lem., lanatum Spr. (Actinella lan. Pursh), s. Trichophyllum l. Nutt., etc.

Heleocharis R. Br. (Juncaceen, III. 1) „Teichbinse“, -riet (ξηλος, -εος Teich etc., χαρος Freude — wächst in Sumpfen!), H. palustris R. Br. (Scirpus p. L.), uniglumis Lk. (Scirp. un. Lk.), multicaulis Koch, etc.

Helianthēum T. Mill. (Cistaceen, XIII. 1) „Sonnenröschen“, fr. hélianthème, fleur du soleil u. herbe d'or, e. sun-rose (ἥλιος Sonne u. ἄνθευον i. q. ἄνθος Blume), Zier. H. pulverulentum DC. (Cistus apenninus u. polifolius L.), grandiflorum DC. (variabile Spach), umbellatum Mill., guttatum ds. (Cist. gutt. L.), vulgare G. (Chamaec-Cistus Mill.) m. v. lutēum fl. plen., v. album fl. pl. etc., H. coccineum Hort. v. fl. pl.

Helianthus L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sonnenblume“, fr. hélianthe, herbe au soleil, fr. u. e. girasol, e. sun-flower u. turnesol (ἥλιος u. ἄνθος), Zier. H. annuus L. (Peru) m. v. v. (uniflorus, macrophyllus, giganteus, flore pleno, globosus fistulosus Hort.), H. indicus L. m. v. nanus Hort. fl. pl., H. multiflorus L. m. v. fl. pl. u. orgyialis DC. (beide Nordamer.), H. argyrophyllus A. Gr., fr. soleil du Texas; H. tuberosus L., fr. topinambour, s. g. Erdbirne (cult.).

Helichrysum W., G. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Immerschön, Stroh-blümchen, fr. éternelle od. immortelle, fleur de paille, e. eternal-flower, everlasting- (gr. ἔλιος od. ἡλιόχοντος „Sonnengold“ — glänz. goldgelb. Aussehen!), wild H. arenarium DC. Sand-Immortelle, s. Gnaphalium aren. L., Zier. H. bracteatum W. (lucidum Hänk. s. chrysanthum Pers.), Garten-Strohblume, m. v. v. brachyrhynchum Sond., Humboldtianum Gaud. u. orientale G. (Bouquet-I.), macranthum Benth. s. monstrosum Hort. m. v. monstr. purpureum nanum fl. pl., H. creticum, s. Tinearia G. Fr. „Mottenkraut“, etc., s. Elichrysum W. (s. d.).

Heliconia L. (Musaceen, V. 1) „Helikon“-Banane (n. d. Berg Helikon, Sitz der Musen, Myth.), Warmh. H. farinosa, discolor s. bicolor Benth. (Brasil.), Bihai Sw. „Pisang-H.“ (Musa Bihi Hort., Antill.) etc.

Helictères L. (Sterculiaceen, XVI. 7) „Schraubenfrucht“-Malve, „Schraubenbohne“ Leun. (gr. ἑλικτής, -ῆος Ohrgehäng — Kaps. spiral. gewunden), z. B. H. lanata Krz. (Oudemansia l. T. u. B.), H. Isora L. (Faserpfl. Ind. u. Jamaika's).

Heliophila L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Tagliebchen“, „Sonnen-

freund“ Rmpl. (ἡλιος S. u. φιλή Freundin — Standort sonnig!), Zier. H. pilosa Lam. s. arabioides Hort. (Orthoscēlis pil. Spach), circaeoides L. f. (Chamira cornuta Thb.) etc., s. Cleōme, Pilosa u. Peltaria L. — Heliophilæe Rchb.

Heliopsis Pers. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sonnenauge“ Rmpl., fr. héliopside (s. v., ὄψη Gesicht etc. — gelbgestrahlte Blüten!), Zier. H. canescens H. B. K. (Helianthus buplhalmoides Hort.), laevis Pers. etc., s. Acmella, Buplhalmum u. a. — Heliopsidæ DC.

Heliotropium T., L. (Boragineen, V. 1) „Sonnenwende“, fr. héliotope, fleur des dames, herbe aux chances „Skorpionschwanz“, - aux verrues „Warzenkraut“, e. héliotope od. turnsol u. scorpion's-tail (ἡλιος u. τροπή Wende, v. τρέπω wende zu, drehe — wendet sich d. Sonne zu!), Zier. H. grandiflorum Don, s. corymbosum R. P., H. peruvianum L. m. v. v. (Boucheanum, Volaterranum etc.), fr. h. du Pérou od. herbe du Saint-Fiacre, e. widow-wail „Witwenklage“, s. g. Vanillen-Hel; wild H. europaeum L.

Helipterum DC. (Compos. Anthemideen od. Inuleen, XIX. 2) „Schraubenflügel“-Immortelle (v. Helichrysum u. πτέρων Flügel od. ἥλιξ Schraube — nur flaum. Pappus, sonst wie Helichrysum, Wtst.) Sommer-Zier. H. anthemoides u. Sanfordi Hook. (Topf-Imm., Neuholl.), cassianum DC., s. Schoenia Steetz.

1) **Helix** (sc. Hedēra) L. (Araliaceen, V. 5) europ. Epheu (s. Hedēra!) (ἡλίξ alles Gewundene!). 2) **H.** (sc. Salix) L. (Salicineen, XXII. 2) Purpurweide, s. Salix purpurea L.

Helleborine Hall. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nieswurz“-O., fr. élleborine (v. Helleborus, s. sogl. — von Haller weg. d. Ähnl. damit so benannt!), H. latifolia Bauh. (Epipactis Helleborine Crantz), s. Serapias latif. W. (Epip. lat. All.), H. angustif. Bauh. (Serapias longifolia L.).

Helleborus L. (Ranunculac., XIII. 7) Nieswurz, fr. u. e. hellebore od. fr. herbe de cru, e. sneeze-wort (gr. ἐλέβορος, n. Paxton v. ἔλιον bin tödlich u. βούλια Speise — tötet durch ihren Genuss!), Zier. H. niger L. s. g. Christblume od. Schneerose O. W., fr. fleur d'hiver, e. christ-mass-rose, m. v. grandiflorus Hort., H. atrorubens W., Kit., purpurascens ds., orientalis Lam. (Griech.), olympicus Lindl., intermedius Guss. (Calabr.) m. v. abschaisticus Hort., viridis L., wild H. foetidus L., fr. pied de griffon „Greifenfuss“. — Helleboræe Rchb.

Hellenia W. (Scitamineen, I. 1) „Hellenius“-Gewürzlilie (n. C. N. Hellenius, Prof. in Åbo in Finnland, schrieb Dissert. acad. 1789 u. a.), H. coerulea R. Br., rufa Presl., abnormis Ldl., grandiflora Retz. (Costus speciosus Sm.), alba Retz. etc., s. Amōnum.

Helminthia Juss., Pers. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Wurmsalat“ Seub., -lattich M.-Rchb. (v. ἡλμῖντης, -νθος Wurm — d. gestreift. Samen gleichen e. Hauf. Würmer), H. echoïdes G. scharfbláattr., s. Pieris ech. L. **Helminthochorton** Ag. (-os Lk.) (Florideen-Tange, XXIV. 3) „Wurmtang“, -moos, -knotentang W. (s. eb. u. γύρως Futter etc. — wirkt wormabtreibend), s. Sphaerococcus s. Ceramium Helminthochortos.

Helobiae (richt. **Heleobiae**) Bartl., Endl. Kl. d. Sumpffilien od. Schlammwurzler Rchb. (ἡλος, -εος Sumpf, βιόν lebe).

Helonias L., W. (Juncaceen od. Melanthaceen, VI. 3) Torflilie, Schwindblume Rmpl., e. blazing-star (star-wort) (v. ἡλος Teich etc., νησία schwimmend — sumpfieb. Pfl.), Zier. H. latifolia Mehx. s. bullata L., s. Tofieldia calycina Whlnbg. (Anthericum cal. L.) u. Scheuchzeria Pseudo-Asphodelus Scop.

Helosciadium Koch (richt. **Heleosec.**) (Umbelliferen, V. 2) „Sumpfschirm“, Scheiberich O. W. (s. v., ουαύδιον Schirmdach v. ουαύ Schatten — in Sumpf wachs. Schirmpfl.).

- Helosēris** (st. Heleos.) (zu Cineraria) Rchb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Sumpfsalat“ (s. v., σέρις Salat), s. Cineraria palustris L.
- Helōsis** Rich. (Balanophoreen, XXI. 1) Nagelstoss, -schosser (v. ἡλος Nagel, Zwecke u. ὥστη Stoss — stösst nagelförmig hervor! Wtst. Schuppen nagelf.!), H. guianensis s. cayennensis Rich., s. Cynomorium eay.).
- Helospōra** Jacks. (Rubiaceen, IV. 1) „Nagelsamen“ (s. eb., στροφή Samen — diese krumm wie Krallen), H. flavescentis Jacks. (kl. B.), s. Timonius fl. Bak. (Polyphragmon fl. Krz.).
- Helvella** L. (Pilze, XXIV. 4) Falten- od. Steinmorchel, fr. hélvelle (v. helveolus dem. helvus rötlich, od. helus i. q. olus, -ēris Gemüse, Helm. u. Rabenh. v. heluor schwelge: helvelia jed. kl. Küchenkr.!), H. esculenta L. (essb.). — Helvellacei Fr.
- Helwingia** W. (Santalac. od. Cornaceen, XXII. 3) „Helwingie“ (n. d. Bot. G. A. Helwing, Pred. zu Angersburg in Preussen, † 1748, schr. Fl. v. Preussen 1726 u. Flora campana Lps.), H. ruscifolia W., japonica W. (Osyris j. L.).
- 1) **Helxīne** Rchb. (sect. v. Polygonum L.) (Polygonaceen, VIII. 1) „Windknöterich“ (gr. ἔλξινη eine schleppende Pfl. v. ἔλων schleife etc. — windend. Wuchs!), z. B. P. dumetorum L., Convolvulus L., taricium u. Fagopyrum L. 2) **Helxīne** Req. (Urticaceen, XXIII. 1) Wand- od. Glaskraut, Helxines herba Apoth. = Parietaria L., fr. helxine od. pariétaire, H. Soleirolii Requien, s. Parietaria Sol. Spr.
- Hemerocallis** L. (Liliaceen Asphodelean, VI. 1) „Tagschöne“, -lilie, Affold -Lilie Vilm., fr. hémérocale, e. day-lily (v. ἡμέρα Tag, ζύγιος Schönheit — nur b. hellen Tag offen!), Zier. H. fulva L. (crocœa Hort.) m. v. v., flava L., fr. lis jaune, e. yellow day-lily, H. coerulea W. (Funkia coer. Andr. s. ovata Spr.) etc., s. Funkia Spr.
- Hemiantha** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Halbanthere“ (v. ἤμι halb, ἀνθη, -δος Mann, Staubbeutel — dies. nur halb!), Gewächsh. H. pungens R. Br. (Neuholl.).
- Hemiclidia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Halbschliess“-Silberbaum (s. eb., οὐλεῖς, -δος Schloss — d. Frucht springt nur teilweise an d. Spitze auf), s. Dryandra R. Br.
- Hemimēris** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Halbblume“ (s. v. u. μέρος Teil — ein Teil d. Blume viel grösser, so dass sie halb scheint), Gewächsh. H. urticifolia u. coccinea (Celsia linearis Jacq.), linearifolia H. B., parviflora ds., etc., s. Celsia, Diascia DC., Alonsoa R. P.
- Hemionitis** L. (Farne, XXIV. 1) „Esels“-Farn, fr. hémionite, Halbmondkraut, Gitterfarn (gr. ἡμιονίτις v. ἡμιόνος Halb- od. Maulesel — bringt kein. befrucht. Samen hervor), Zier. palmata L. u. japonica Thb.; H. esculenta Retz. (Diplazium esc. Sw.) etc., s. Antrophyum Kaulf., Scolopendrium Sm. u. a.
- Hemitelia** Presl. (Baum-Farne, XXIV. 1) „Halbschleier“-F. (ἡμιτελής halbvollendet — nämli. d. Fruchtschleiercheu zuletzt zurückgebogen), Warmh. grandifolia Spr. (Cyathea gr. W.).
- Henna** Alcanna Rauw. (Lythrareen, VIII. 1) „Henna“- od. „Alkanna-wurz“, s. g. Schminkwurz (vaterl.), s. Lawsonia inermis L. f. s. alba (Alcannae verae radix zum Rotfärben!).
- Hepaticā** L. (Ranunculac., XIII. 7) „Leberblume“, fr. hépatique, e. liver-wort (v. ἡπαρ, -ατος Leber — weg. d. Blattlappen), Zier. H. triloba Chaix (Anemone Hepatica L.) m. v. v., z. B. rubra fl. pleno, fr. herbe de la Trinité, e. three-lobed-Hep., angulosa Lam. (grossblum. azurbl.) etc.
- Hepaticae** Juss. (-ei Rchb.) Kl. d. „Lebermoose“ (s. eb.) (einige geg. Leberkrankh.!).

Heraclēum L. (Umbelliferen, V. 2) Bärenklau, „Herakles“- od. Heilkraut Rmpl., fr. berce, e. comfrey u. bear's-breech (v. Ἡρακλῆς Herakles od. Herkules, der sie zuerst anwandte, Plinius), Gart.-Zier. H. aspérum M. B. s. Panaces Pers. (pubescens Vilm., Rmpl.), gigantēum Fisch., flavescentis Baumg. (austriacum Pall.), wild H. Sphondylium L.

Hermannia L. (Sterculiac. od. Büttneraceen, XVI. 2) „Hermannie“ (n. Hermann, Arzt in Batavia, dann Prof. in Leyden, † 1695), Stuben H. fragrans (Str. Cap.), alnifolia L. (Ketmia africana), triphylla L. (Connārus decumbens Thb.), etc., s. Ketmia T. u. Mahernia L. — Hermanniæ DC.

Herminium R. Br. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Einknolle „Säulchen“-O., Ragwurz Grck., Hünge O. W., fr. hermin (v. ἑρμίνη, -ρος Bettstellenfuss — nur ein Fussstollen, d. i. eine Würzelknolle!), H. Monorchis R. Br. (Orchis Mon. Crantz, Ophrys Mon. L., Satyrium Mon. Pers.).

Hernandia L. (Myristiceen, XXI. 3) „Hernandie“, fr. hernandier (n. d. span. Bot. Dr. Franc. Hernandez, Leibarzt Philipp's II., 1593—1600 als Natf. in Westind.), H. ovigera L. „Eierbaum“, H. sonora L. „Rasselnuß“, span. Arbol de cañon „Kanonenbaum“ (— Steinfrucht hohl m. losen Kernen!).

Herniaria L. (Illecebreen, V. 2) „Bruchkraut“ od. Tausendkorn, Harnkr. G. Frank, fr. hernaire od. herniole, herbe aux hernies, e. hern-hill, black-heath (v. hernia Bruchkrankheit — geg. diese angewendet!), H. glabra, hirsuta L. etc.

Hertia Less. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Hert's“-Fettpfl. (n. d. Bot. Joh. Casim. Hert, schr. de Pimpinella Saxifraga, Gissae 1726), H. s. Othonna crassifolia Less.

Hesperaloë (Liliaceen, VI. 1) Abend-Aloë, neue Zier. H. yuccaeifolia rotblüh. Yucca (Tex.) (Ἑσπερεοῦς, lat. Hesperus od. vespéra Abend etc.).

Hesperidēae L., Rchb. (-ides Endl., fr. hesperidées) „Hesperidenäpfel“ od. Orangen (v. Hesperia Hesperien od. Abendland, Spanien etc.) (s. eb.).

Hespēris L. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Abend“- od. Nachtviole, Frauenviel od. -Viole, Damaskenblume Wilm., Rmpl., Kilte O. W., fr. Julianne, Cassolette, Damas, Girarde etc., e. dame's-violet, rocket u. queen's-gilliflower (s. v.), Zier. H. matronalis L. m. v. v. (candidissima Hort. u. fl. alb. pleno Hort.), H. maritima Lam. (Cheiranthus m. L., Malcolmia m. R. Br.) Seestrand's-Levkoe, e. sea-rocket etc., m. v. fl. alb. Hort., H. bicolor Hort. (Malcolmia b. Boiss.), etc.

Heterocentron (-um) Hook., Arn. (Melastomac. Rhexieen, VIII. 1) „Wechselsporn“ (ἐτερός andrer, wechselnd, abweichend, ξέντρον Sporn etc. — d. Antheren d. läng. Staubfäld. m. gestielt. borstenförm., die d. kürz. nur an d. Basis zweihöcker. Connectiv), Warmh. H. rosēum Hook., subtrinervum ds., etc.

Heteromorpha Cham. (Umbelliferen, V. 2) „Wechselblatt“-Dolde (s. v., μορφὴ Gestalt — nämli. d. beid. Teilstückchen u. d. Blätt.), H. arborescens Schldl., s. Bupleurum arb. L.

Heterotoma Zucc. (Lobiaceen, XIX. 6) „Anderschnitt“-Lobelie (s. v., τομή Schnitt — Oberlippe d. Kelchs drei-, Unterl. zweispaltig), H. lobelioides Zucc., s. Heterosoma autt.

1) **Heuchēra** L. (Saxifrageen, V. 2) „Heucher's“-Steinbrech, fr. Heuchère (n. J. H. v. Heucher, Prof. z. Wittenberg, † 1747), H. americana L. Alaunwurzel, e. alum-root, s. Cortusa amer. Herm. u. Sanicula amer. spicata Pluk., Zier. H. micrantha Dougl. (N.-Amer.), villosa

- Mchx. (N.-Am.). 2) **Heuchéra** dichotoma Murr. (Rubiaceen, V. 1), s. Oldenlandia pentandra Retz.
- Hevéa** Aubl. (Euphorbiaceen, XI. 3) Kaoutschuk- od. Federharzbaum, fr. hévé (hewe Nam. d. B.'s in Guiana, Wtst.), H. guianensis Aubl., syn. Jatropha s. Siphonia Schreb. Cahuchu s. elastica Schr.
- Hexacentris** Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Sechssporn“ (ξεκατον Sporn etc. — im Ganzen sechs Antherensporne! Wtst.), Warmh. H. mysorensis Wight (Mysore in Ostind.), s. Thunbergia L.
- Hexandria** L. VI. Kl. d. „Sechsmännigen“ (s. eb., ἀνήρ, -δρός Mann, Staubgefäß!).
- 1) **Heyderia** K. Koch (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Riesen-Thuja, H. decurrens Koch (Libocedrus dec. Torr.), s. Thuja gigantē Carr. (n. d. Bot. Ed. Heyder, s. d. Aut.). 2) **H. Fr.** (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) „Heyder's“-Morchel.
- Heynéa** Roxb. (Hesperid. Meliaceen, X. 1) „Heyne's“-Orange (n. d. Bot. u. Indien-Reis. Dr. Benj. Heyne, † 1819), Zierb. H. quinquejuga Spr., s. Trichilia russinervis Blum.
- Hibbertia** Anderss., Salisb. (Dilleniaceen, XIII. 3) „Hibbertie“ (n. G. Hibbert, der durch Niven am Cap sammeln liess, † 1838), Ampel H. perfoliata Hüg. u. grossulariaefolia Sims, H. volubilis Andr. (Dillenia scandens W.).
- Hibiscus** L. (Malvaceen, XVI. 8) Eibisch, syrische Rose, Blumenbaum, fr. guimauve „Mistelmalve“ (gr. ἴβισος od. ἴβιζος, dem Ibis gew. Pfl., Paxt., Wtst.), Zier. H. syriacus L. s. Ketmia arborēa Hort., fr. ketmie, H. rosa sinensis L. chines. Malvenrose Rmpl., H. splendens Grah. (Neuholl.), H. rosēus Thor. (Süd-Eur.), Warmh. H. Cooperi Hort. (scheckblättr.), H. liliiflōrus Cav., phoenicēus W. (Ind.), Cameroni Knowl., mutabilis L., fr. fleur-changeante, Thunbergii Hort. (Sida vesicaria Cavend., africana Mill. s. grandiflōra Hort.), Gartenbl. H. Trionum L. Stundenblume, cannabīnus L., obtusifol. W. etc.
- Hicorius** Raf. (Juglandeen, XXI. 8) (zu Juglans L.) „Hickorynussb.“ (vaterl.), s. Carya amer. Nutt. etc.
- Hieracium** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Habichtskraut“, fr. épervière (herbe à l'épervier, e. hawk's-herb (-weed) od. kite's-foot u. sange (v. ἵπαξ, -νος Habicht), z. B. H. murorum L., fr. pulmonaire des Français, Gartenbl. H. aurantiacum L., fr. ép. orangée, e. orange-hawk-weed od. golden mouse-ear, etc.
- Hierochlōa** R. u. Sch. (-chlōë Gm., Rchb.) (zu Holcus L.) (Gräser, XXIII. 1) „Heiligen“- od. Mariengras, Darrgras Seub. (v. ἱερός heilig, χλωρίς od. -όνη Gras — s. g. Heiligen-Gras in Preussen), H. borealis R. u. Sch. s. repens P.-B., s. Holcus bor. Schrad. s. odoratus L.
- Higginsia** Rz. Pv., Pers. (Rubiac. Cinchonac., IV. 1) „Higgins“-Chinastrauch (n. Don O'Higgins, span.-amer. Beamten), z. B. aggregata, obovata u. verticillata R. P., s. O'Higginsia Rz. Pv., Campylobōtrys Lindl. u. Evosmia H. B. K.
- Himantoglossum** Spr. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Riemen“- od. Rollzunge (v. ἰουάς, -άντος Riemen, γλώσσα Zunge — d. drei Labium-lappen lang riemenförmig!), z. B. hircinum Spr. (Loroglossum h. Rich.), s. Satyrium L.
- Himantophyllum** Ait., Spr. (Amaryllideen, VI. 1) „Riemenblatt“ (s. eb., φύλλον Laubblatt), s. Imantophyllum Hook. u. Clivia Lindl. (s. d.).
- Hindsia** (schlecht **Hinsia**) Benth. (Rubiac. Cinchonac., V. 1) „Hinds“- Chinastrauch (n. R. B. Hinds Esq., Nat.-Liebh. u. Reis. 1836/42, nicht Wtst.: n. d. brasil. Nam. d. Pfl. Hinsia!).
- Hippeastrum** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Ritterstern“ (v. ἵππεαστρος Ritter, ἄστρον lat. astrum Stern — d. Blätt. stehen zweizeilig

- od. „reitend“, d. Blüt. sternf. Wtst.), Warmh. H. fulgidum fl. pl. Van Houtt., Johnsii, reginae, vittatum Herb. m. v. v. (Winterbl.).
- Hippion** Schmidt, Spr. (Gentianeeen, V. 2) „Rossveilchen“, Bitterblatt (v. ἵππος Pferd u. ἥριν Veilchen — grös. als ein Veilchen), z. B. obtusifolium Schm. u. axillare ds., H. vernum etc., s. Gentiana etc.
- Hippocastanum** T. (sc. Aesculus) L. (Sapindac. Hippocastaneen, VII. 1) „Rosskastanie“, fr. maron d'Inde, e. common horse-chestnut (s. eb. u. καστανὸν Kastanie), Zier. v. v. fl. pleno, argenteo-variegata u. lacinata Hort., v. rubicunda Schubert. — Hippocastanæae DC. (-nacæae Grck.).
- Hippocratea** L. (Theaceen Malpighieen, III. 1) Waldmandelbaum (n. Hippokrates v. Kos, s. d. Aut.), H. comosa Sw. (Cōa scandens Plum.), aspera Lam. (Tonsella scabra Schreb.) etc. — Hippocrateæ (sc. Theaceæ) Rchb., -ticeæ Juss., H. B. K., -teacæae DC., Kth.
- Hippocrépis** L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) „Pferdehuf“- od. Hufeisenklee (s. v. u. ζογηπίς, -ιδος Schuh — Form d. Hülsen wie Hufeisen!).
- Hippomâne** L. (Rutac. Euphorbiaceen, XXI. 9) Mancinellenbaum, fr. hippomanes od. poirier vénimeux, eig. „Rossbrunst“ od. „Ross-manna“ (s. v. u. μάρια Raserei, Brunst, od. μάρη, später μάρνη Manna — bei d. Alten ein Kraut in Arkadien etc.), H. Manzinella L. Curaregiftbaum, fr. mancinner, H. biglandulosa L. s. Sapium aucuparium Jacq., fr. glutier. — Hippomanæae Rchb.
- Hippomarathrum** Fl. Wett. (sc. Seseli) L. (Umbellifer., V. 2) „Ross-fenchel“ (s. v., μαραθόν Fenchel), H. pelviforme Fl. Wett., s. Seseli articulata Crantz.
- Hippophæ** (nicht Hippophaea!) L. (Santalac. Elaeageneen, XXII. 4) Sand- od. Seedorn, eig. „Rosstöter“ od. „Rosslicht“, fr. hippophæ u. argousier (v. φάω töte, H. d. Alten aber = Euphorbia spinosa! nach Andern v. φάος, -εος Licht — d. Genuss d. Blätt. für d. Augen der Pferde angebl. heilsam!), Zier. H. rhamnoïdes L. gem. Meer-dorn, fr. lumière de cheval (Besingstrauch, Wolff) u. griset, e. sea-buckthorn, shallow-thorn.
- Hippuris** L. (Onagreen Halorageen, I. 1) Tannenwedel, eig. „Pferde-schweif“, fr. pesse od. pin aquatique, e. horse-tail (-willow), s. Lim-nopeuce Vaill., Pinastella Dill. (ἵππος u. οὐοὰ, ἵπποινος d. Alten = Equisetum u. Ephedra!). — Hippuridacæae Grck., -dæae Lk.
- Hiraea** Jacq., L. (Caryophylleen Malpighieen, X. 3) „De la Hire's“- Malpighie (n. d. franz. Bot. de la Hire, † 1727), z. B. H. reclinata L. (Trioptéris Hiraea Banks), odorata W., pinnata W. (Flabellaria paniculata Cav.) etc. — Hiraeacæae Kth.
- Hirculus** Tausch. (sc. Saxifraga) L. (Saxifrageen, X. 2) „Böcklein“- Steinbrech, cistblumiger St. Grck. (dem. hircus Bock — zwei horn-förm. Griffel).
- Holeus** L. (Gräser, XXIII. 1) Ross- od. Honiggras, Darrgras Seub., Wolff, fr. houque u. couesse-couche (v. ὅλκος an sich ziehend, Plinius: zieht Dornen aus d. Fleisch!), s. Hierochlora u. Arrhenatherum P.-B.
- Holeracæe** L. i. q. Oleracæae Endl. Küchenkräuter (holus od. olus, -eris Gemüse).
- Holodiscus** Ser. (nicht Halodiscus autt.!) (Rosac. Spiræaceen, XII. 4) (zu Spiraea L.) „Ganzscheiben“-Spiræe (v. ὅλος ganz, δίσκος, lat. discus Scheibe — diese in d. Blüte mit ganzem Rand! Lauch.), z. B. Sp. ariaefolia Sims.
- Holoschoenus** Lk. (Cyperaceen, III. 1) Kugelriet (s. eb. u. Schoenus Knopfgras), H. vulgaris Lk., s. Scirpus Holoschoenus L.
- Holostea** (sc. Stellaria) L. (Alsinaceen, X. 3) grossblum. Sternmiere, Waldsternkraut, e. wood-row (-rovel „Waldroogen“) (v. ὅλοστεός

ganz knöchern — Kapseln! Paxt. u. Wst. nach Plinius: Gegensatz, wie lucus a non lucendo — weich. Kraut!).

Holostēum L. (Alsinaceen, X. 3) Spurre, Schachtkohl Grck., fr. migno- nette Ackernkengras Wolff (s. eb.), H. umbellatum L.

Holostigma Spach (Onagrarieen, VIII. 1) (zu Monopsis Salisb.) „Ganz“- od. Kugelnarbe (s. v., $\sigma\tau\gamma\mu\alpha$ Narbe — diese ungeteilt!), Zier. Bottae Spach (Oenothera Bistorta Veitchiana Hort. „Veitch's Nacht-kerze“), s. Sphaerostigma bistortum Walp.

Homalia Brid. (Moose, XXIV. 2) (zu Leskēa Hedw.) „Gleichmoos“ ($\delta\mu\lambda\delta\varsigma$ gleichmässig — d. Sporangium an d. Basis gleich).

1) **Homalium** Jacq., Schreb. (Amygdaleen Homalineen, XIII. 3 od. XVIII. 4) „Regelrechtblume“ (s. eb. — gleichförm. Verteilung d. Staubfäden in Büschel!), z. B. racemosum Jacq. (Str.), H. Racoubea Sw. (Racoubea guianensis Aubl.) etc., s. Blackwellia Comm. u. Capimoga Aubl. 2) **Homalium** Pers. (Coniferen Abietineen, XXI. 9), H. incanum Pers., s. Pinēda inc. Rz. Pv. (Str.).

Homogyne Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) Brand- od. Alplatisch ($\delta\mu\delta\varsigma$ gleich, $\gamma\varphi\eta\eta$ Weib., Bot. Stempel — ausser zwittrigen auch weibl. Blüten, deren beider Narben gleich), H. alpīna Cass., s. Tussilago alpīna L.

1) **Honckenya** Ehrh. (zu Arenaria) Rchb. (Alsinaceen, X. 3) „Honcken- nye“ od. Salzmiere, Porselei O. W. (n. Gerh. Aug. Honcken, † 1794, schr. syst. Verz. d. deutsch. Gew.), z. B. peploides Ehrh.

2) **Honckenya** W. (Tiliaceen, XIII. 1) „Honcken's“-Linde.

1) **Hopēa** L. (Sapotac. Mimusopeen, XVIII. 4) „Hope's“-Süssblatt (n. d. schott. Bot. Thom. Ch. Hope, schr. Tentamen inaug. de montibus etc. Edinb. 1787), z. B. H. tinctoria L. f. u. dealbata Hance. 2) **Hopēa** Roxb. fehlerh. st. **Hoppēa** Dietr. (Tiliac. od. Dipterocarpen, XIII. 1) „Hoppe's“-Flügelfruchtbaum, s. sogl.

1) **Hoppēa** Rchb. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Hoppee“ od. Huflattich-Cinerarie (n. d. Bot. Hoppe, s. d. Aut.), Zier. H. speciosa Rchb. (H. s. Cineraria sibirica L.). 2) **Hoppēa** Roxb. (Sapotaceen, X. 1) „Hoppe's“-Baum, H. odorata Roxb. (B. Ostind.), dichotoma W. (Platerra pusilla Roxb.). 3) **Hoppēa** Nees (Cyperaceen, III. 1). 4) H. W. (Gentianeen). 5) **Hoppēa** Dietr. (s. v.).

Hordēum L. (Gräser, III. 2) Gerste, fr. orge, e. barley (v. horreo bin stachlig Leun. od. horridus rauh — weg. d. Grannen, od. Wst.: hordus i. q. fordus schwer, trächtig? — Brot daraus?), gebaut H. vulgare L. gem. vierzeil. (Winter- u. Sommer-) Gerste, e. beer- od. square-barley, H. distichum (-on) L. „zweizeil.“ od. „Sommer“-G., fr. pomette, e. buttledon-barley, H. hexastachyon L. „sechszeil.“ G., wild H. murinum L., fr. orge-follette (-sauvage), e. ryegrass „Mäusegerste“, Zier. H. jubatum L. „Mähnen“-G., e. mane-eared-b.

1) **Hormīnum** T., L. (Labiaten Salviaceen, XIV. 1) Pyrenäen-Melisse, „Reizkraut“ (gr. $\delta\mu\mu\pi\sigma\sigma\sigma$, $-\mu\mu\sigma$ v. $\delta\mu\mu\omega$ rege auf, Dioscorides: reizt z. Liebe), Zier. H. pyrenaicum L. (Melissa pys. Scop.) s. g. Ritterkreuz. 2) **Hormīnum** Mnch. (sc. Salvia) L. (Labiaten, II. 1) Scharlei, Scharlachkraut, Zier. H. coloratum Mnch. (sativum Mill.), s. Salvia colorata Thore m. v. v., fr. sauge ormin, Prudhomme.

Hornungia Rchb. (Crucifer. Siliculos. XV. 1) „Hornungsschötchen“ (n. ein. Apoth. Hornung in Aschersleben), H. petraea Rchb., s. Huttchinsia p. R. Br.

Horsfieldia Blum. (Myristicaceen, XXII. 13) „Horsfield's“-Muskatnussbaum (n. d. engl. Reis. in Java Thom. Horsfield), H. aculeata Blum., odorata W., s. Myristica Spr.

- Hortensia** Comm., Pers. (sc. *Hydrangea*) Sm. (Saxifrageen, X. 2)
 „Hortensia“ (n. Commerson's Geliebten Hortense Barré ben., Wtst.
 n. d. Astronomin Hortense Lapaute, † 1788), Zier H. speciosa Pers.
 s. mutabilis Hort. (*Hydrangea hortensis* Sm. s. *opuloides* Lam.).
- 1) **Hosta** Jacq. (Verbenaceen, II. 1) „Host's“-Verbene (n. d. Arzt u.
 Bot. Host in Wien, s. d. Aut.), *H. coerulea* Jacq., s. *Cornutia Plum.*
 - 2) **Hosta** Tratt. (Liliaceen, VI. 1) „Host's“-Tag-Lilie, *H. japonica*
 Tratt., s. *Hemerocallis* jap. W. 3) **Hostia** Mnch. (zu Barkhausia
 Rchb.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Host's“-Pippau, *H. foetida*
 Mnch. (B. s. *Crepis* foet.). 4) **Hostia** Fl. Flum. (Myrsineen, V. 1)
 - 5) **Hostea** W. (Asclepiadeen, V. 2).
- Hoteia** Morr., Decsn. (Spiriac. od. Saxifrageen, X. 2) japanische Spiräe
 (n. d. japan. Bot. Ho-Tei, Wtst. n. ein. span. Bot.!), Zierstr. H.
s. Spiraea japonica Decsn. Hort., fr. *Hoteia du Japon*, e. Japanese
Hoteia, s. *Astilbe rivularis* Hamilt. (*Spiraea barbata* Wall.).
- 1) **Hottonia** L. (Primulaceen, V. 1) „Hottonie“, Wasserfeder, fr. hottone,
 plume d'eau (plumeau od. -mette), mille-feuille-queue-de-cheval,
 auch lustre d'eau (n. Pet. Hotton, Prof. z. Leyden, † 1708), *H. palustris* L., Zier. H. *indica* L., s. *Limnophila gratioloides* R. Br. —
 2) **Hottonia** W. (Onagrarieen Halorageen, XXI. 5), *H. serrata* W.,
 s. *Serpicula verticillata* L. u. *Udora* Spr.
- Houlellia** Brongn. (Orchid. Vandeen, XX. 4) „Houillet's“-O. (n. d. franz.
 Gärtn. u. Reis. in Brasilien mit Guillemin, Houillet), *H. picta* Rchb. f.
- Houstonia (-tounia)** L. (Rubiaceen, IV. 1) „Houstoun's“-Strauch (n. d.
 engl. Bot. W. Houstoun, s. d. Aut.), z. B. *coerulea* L. (*Chamaejasme*
inodora Pluk.), *H. purpurea* L. (*Knoxia p.* Lam.), *coccinea* Jacq.
 (*Bouvardia Jacquinii* Hb.).
- Houttuynia** Thb., Schreb. (Aroid. Saurureen od. Alismaceen, III. 3 od.
 VII. 3) „Houttuynie“ (n. d. holl. Arzt u. Bot. Houttuyn), Zier. H.
cordata Thb. „Herzblatt“-Echsenschwanz (Chin., Jap.), s. *Polyparea*
cochininchinensis Lour., *H. capensis* Houtt., s. *Montbretia cap.* Bak.
- Hovëa** R. Br. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Hove's“-Giester (n. d.
 poln. Bot. Ant. Pantal. Hove, Reis. in d. Krim u. in Persien, Wtst.
 n. W. How, schr. Phytol. Brit. 1650), Gewächsh. *Celsii latifolia*,
 pungens, major etc.
- Hovenia** Thb., Schreb. (Rhamnac., V. 1) „Hoven's“-Süssdorn (n. ein.
 Bot. Dav. v. d. Hoven, holl. Commiss. in Japan, Wtst.), *H. dulcis*
 Thb., span. Arbol de corintas „Korinthenbaum“.
- Howardia** Weddell (Cinchonaceen, V. 1) „Howard's“-Chinabaum, *H.*
caracasensis Wedd.
- Howea** Becc. (Palmen, XXI. 6) „Howe's“-Palme, *H. Belmoreana* Becc.
 (n. W. E. Howe, s. d. Aut.).
- Hoya** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Hoy's“-Wachspfl., s. g. „Porzellano-
 od. Wachsblume“ (n. d. engl. Zücht. Thom. Hoy, Ob.-Gärtn. d.
 Herz.'s v. Northumberland), Stuben *H. carnosa* R. Br., Warmh.
 bella Hook. (Ampelpfl.), *imperialis* Lindl. (Borneo), *variegata* de
 Vriese (Jap.) etc.
- 1) **Huegelia (Hügelia)** Benth. (Polemoniac., V. 1) „Hügelie“ (n. d. Baron
 K. v. Hügel zu Wien, Reis. in Ostind. u. Austral. 1831/36), *H. cyanæa*
 Rchb. (*collomoides* DC.). 2) **Huegelia** Rchb. (Araliaceen od. Um-
 belliferen, V. 2) „Hügel's“-Aralie, Zier. *H. coerulea* Rchb., fr. Hue-
 gelie azurée, e. blue H., s. *Didiscus coer.* Hook. u. *Trachymene coer.*
 Grah. 3) **Huegelia** R. Br. (*Diosmeen* Boronieen, VIII. 1), s. *Deca-
 diantha* Rchb. s. *Boronia* Sm.
- Hugonia** L. (-na Cav.) (Hugoniaceen, XVI. 6) „Hugonie“ (n. d. engl.
 Bot. J. Hugon, schr. 1711 bot. System), *H. mystax* L. „Knebel-
 bart“-H. (Aegoceratos etc. Raj.), s. *Modira canni* Rheed.

- 1) **Humboldtia** Vahl (Borageen, V. 1) „Humboldtie“ (n. Al. v. Humboldt), H. laurifolia Vahl (Str. Ceyl.), s. Batschia l. Vahl. 2) **H.** Rz. Pv. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Humboldt's“-O., z. B. cordata R. P., s. Stelis cord. Sw. 3) **H.** Wall. (Cassieen, X. 1), H. Brunonis Wall. 4) **H.** Neck. (Gentianeen, V. 2).
 - 1) **Humēa** Sm. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Hume's“-Aster (n. d. Lady Hume, Bar. of Wormleybury Hertsh., † 1837), Zier. H. elegans Sm., fr. Humēe élégante, m. v. v. (z. B. purpurēa), s. Calomeria amaranoides Vent. (Razumovia paniculata Spr.). 2) **Humea** Roxb. (Tiliaceen, XIII. 1).
- Humiria** (Houn-) Aubl. (-ium Rich., A. Juss.) (Meliac. Humiriaceen, X. 1) „Humirie“ (bei den Galipons in Guiana houmiri), H. balsamifera Aubl. (Vantanea paniculata Urban), H. contractum Moric. (Myro-dendron amplexicaule W.). — Humiriaceae Mart. (zu Meliacae od. Styracēe Rchb.).
- Humīlus** L. (Urticaceen, XXII. 5) Hopfen, H. Lupūlus L., fr. houblon, vigne du nord, e. hop- od. hops-plant u. bind (d. germ. Humal latinisiert! nicht etwa humīlis — weil auf der Erde = humus kriechend).
- Hunnemannia** Sweet (Papaveraceen, XIII. 1) „Hunnemannie“ (n. d. engl. Reis. u. Samml. J. Hunnemann, † 1839), Zier. H. fumariaefolia Sweet.
- Huntleya** Batem. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Huntley's“-O. (n. d. Geistl. u. Samml. Huntley), z. B. violacea Lindl. u. Meleagris ds.
- 1) **Hura** L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 9) Sandbüchsenbaum, fr. sablier (südamer. Name hura!), H. crepitans L., s. g. Rasselbüchse, fr. hura. 2) **Hura** Kön. (Scitamineen, I. 1), H. Siamensium Kön., s. Globba Koenigiana Spr.
 - 1) **Hutchinsia** Wight Arn. (Asclepiad., V. 2) „Hutchinsie“ (n. d. Ir-länderin Miss Hutchins, Kryptogamistin). 2) **Hutchinsia** R. Br. (zu Lepidium Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Hutchinsie“ od. Remse O. W., Stein- od. Zwerkgresse, H. petraea u. alpina R. Br., s. Lepidium u. Hormungia petr. Rchb. 3) **Hutchinsia** Ag. (Tange, XXIV. 3) „Hutchins“-Tang, z. B. fastigiata vierteil. H. Wagn., s. Polysiphonia Grev. u. Callithamnion Lyngb.
- Hyacinthus** T. L. (Liliaceen, VI. 1) „Hyazinthe“, fr. hyacinthe (Ja-cinthe), e. hyacinth, crow-toes, our Lady's-flower (gr. Υάζινθος Hyacinth, Liebl. d. Apollo, Myth., die Hyacinthe d. Alten = Gladiolus communis, viell. v. d. arab. jakuth „rot“ abzuleiten), Zier. H. amethystinus L., fr. Jac. améthyste, e. blue-bottle od. amethystine h., m. v. v. (s. H. hispanicus Lam. s. angustifolius Med.), H. orientalis L. gem. Garten-H., fr. Jac. cultivée, e. oriental h., m. v. v. (Holländ., Pariser, einf. Passe-tout, H. albūlus Jord, fr. blanc de montagne, H. praecox Jord. fr. romaine blanche „früheste Topf-H.“).
- Hybanthus** Jacq. (Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Buckelveilchen“, „blume“ (βύδος bucklig, ἄρθος Bl. — bez. d. Form d. Kronblätt.), H. havanensis Jacq., s. Viola Hybanthus L. (klett. Bstr. Südamer.).
- Hydnnum** L. (Pilze, XXIV. 4) Stachelpilz, essb. H. Erinacēus, fr. érinace od. hydne, fr. u. e. urchin (gr. ἴδρων od. οἴδρων Trüffel). — Hydnē DC.
- Hydrangēa** L. (Saxifrageen od. Corniculat. Cunoniac., X. 2) „Wasser-strauch“ (v. ὕδωρ in comp. ὕδοο- Wasser, ἄγγος-, εος Urne — Ahnl. d. Frucht m. ein. Wassergefäss, Lauch.), Zier. (Topf) H. Hortensia Comm. (hortensis Sm.) s. japonica v. Sieb. (opuloides Lam., Hortensia rosēa Desf. s. speciosa Pers. japan. Rose Leun.), H. arborescens L. (vulgaris Mchx., frutescens Mnch.), H. Otasca v. Sieb. (n. Siebold's in Japan geborn. Tochter ben.) etc.

Hydrastis L. (Ranunculac., XIII. 7) „Wasserbürgerin“ (v. ὕδωρ, ὕδωσ-
u. ἀστὴ Stadtbewohnerin, Wtst. n. ein. Amerikanerin ben.!), „H.
canadensis L. (Warneria Mill.).

Hydrilla Rich. (Hydrocharideen, XXII. 8) „Wasserquirl“, H. verticil-
lata Casp. (ὕδωρ- u. ἥλλω wälze — quirlständ. Blätter!), s. Serpicula
vert. L. f. u. Udora occidentalis Koch.

Hydrocarÿes Lk. „Wassernussgew.“ (v. ὕδωρ- in compos. Wasser,
ζάρων Nuss).

Hydrocëra Blum. (Oxalideen od. Balsamineen, V. 1) „Wasserhorn“
(s. v. u. ζέρας od. ζερός Horn — 5 spitze, sitzende Narben!). —
Hydroceræe Blum. (zu Ord. Gruinales Bartl.).

Hydrocharidæe DC., Rchb. -ides Juss. Froschbissgew., Nixenkräuter
Rchb. (zu Ord. Hydrocharidinae Bisch., s. sogl.).

Hydrochäris L. (Hydrocharideen, XXII. 8) Froschbiss, H. morsus ranae
L., fr. morène, e. frog-bit (s. v. u. χέριος, -ιδος Freude — Fundort!).

Hydrochlöa P.-B. (Gräser, XXI. 6) „Wassergras“ (s. v., χλωὰ od. -οή
Gras), s. Hydropýrum Lk.

Hydrocléis L., Rich., Comm. (Alismac. od. Butomeen, XIII. 5) „Wasser-
stolz“ Rmpl., fr. hydrocléide (s. v. u. χλέος Ruhm, Wtst. χλεῖς
Schlüssel — schliess. Milchsaft ein!), Zier. H. Humboldti Endl.
(Limnochäris Humb. L., C. Rich. u. Stratiotes nymphoides W.).

Hydrocotylë T. (Umbelliferen, V. 2) „Wassernabel“, Nabel O. W., fr.
hydrocotyle, goblet (gobelet od. écuelle d'eau), herbe aux Patagons
(s. v. u. χοτύλη Höhlung, Nabel — d. rund. Blätt. mitten vertieft),
H. villosa L. (Centella v. s. Mercurialis afra L.), spananthe W.
spärlich blüh. (Spananthe articulata Jacq.), vulgaris L., etc. — Hy-
drocotyleae DC., Spr.

Hydrolapáthum Huds. (sc. Rumex) L. (Polygonaceen, VI. 3) „Wasser-
ampfer“, e. water-sorrel, Flussampfer Grck., Butterweckenkraut (z.
Einwickeln von Butter!), Hunger- od. Pockenkr., Rossampfer, wilder
Rhabarber, fr. oseille à longues feuilles (s. v., λάτραθον Ampfer).

Hydrolëa L. (Hydroleaceen, V. 2) „Wasser - Ölstrauß“, „-Olive“,
Kleber D., fr. coutarde (s. v. u. Olea Öl- od. Olivenbaum, od. oléum
Öl — d. Blätt. ölig, schmierig!), H. crispa u. urens L. (Wigandia
cr. u. ur. Kth.), spinosa L., zeylanica Vahl (Nama zeyl. s. Steris
aquatica Burm.).

Hydropeltidæe DC., Bartl. „Wasserschildpfl.“ od. Wasserrosen, sogl.
(πέλτη Rundschild, εἴδουμαι gleiche).

Hydropeltis Mchx. (Nymphäac. Hydropeltideen od. Podophylleen, V. 1)
„Wasserschild“ (s. eb. — bez. der aufliegend. Blätt.!), z. B. pur-
puræa Mchx., s. Brasenia peltata Pursh.

Hydropæe Hall. (Najadeen, I. 1) „Wasserlinse“ (s. v. u. γαζῆ Linse),
s. Lemma L.

Hydrophyllum L. (Asperifolien od. Hydrophylleen, V. 1) „Wasserblatt“,
Rinnenblume D., fr. hydrophylle u. feuille d'eau (s. v. u. φύλλον
Laub — Blätt. m. Wasserrinnen!), Zier. H. virginicum Lam. u.
canadense L., etc., s. Nemophila Benth., Eutœca R. Br. u. Phacelia
Juss. — Hydrophyllæe R. Br.

Hydrophytë Endl., Lyngb. „Wassergew.“ i. q. Algae Tange (s. v.,
φυτὸν Gewächs).

1) **Hydropiper** Endl. (sc. Elatine) L. (Lythrarien Elatineen, VIII. 4)
„Wasserpfeffer“-Tännel, fr. hydropiper, e. betle (betel). 2) **Hydro-
piper** (sc. Polygōnum) L. (Polygoneen, VIII. 3) „Wasserpfeffer“-
Knöterich (s. v. u. píper, gr. πέπειον Pfeffer).

Hydropýrum Lk. (Gräser, XXI. 6) „Wasserweizen“, Sumpf-Kappen-
gras, wilder Reis (v. u. πυρὸς Weizen, nicht πυρὸν Wachtfeuer!),
H. esculentum Lk., s. Zizania aquatica L.

- Hygrocybe** Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Wasserschale“, Glaskopf Kumm. ($\dot{\nu}\gamma\circ\circ\zeta$ nass, $\chi\nu\beta\hat{\eta}$ Höhlung, Napf etc. — d. hohle Hut nass!), H. conica, coccinea etc., s. Agaricus L.
- Hygrophila** R. Br. (Acanthaceen, XV. 2) „Nässelfreundin“ (s. eb., $\varphi\iota\lambda\hat{\eta}$ Freundin — wächst in Sumpfen), z. B. H. formosa R. Br. u. brasiliensis Spr., etc., s. Ruellia L. u. Diichtéra Juss.
- Hymenaea** L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Locustbaum (v. $\dot{\nu}\mu\epsilon\nu\alpha\iota\circ$ hochzeitlich — d. Blätterpaare nähern sich in d. Nacht einander), H. courbaril Jacq. ostind. Heuschreckenb., s. g. Locustholz, fr. courbaril, H. Candolleana u. floribunda Kth. (B. Südamer.), s. Trachylobium aut.
- Hymenatherum** Cass. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Hautantherenblume“ (v. $\dot{\nu}\mu\dot{\eta}\nu$, $-\epsilon\nu\circ$ Häutchen, $\alpha\theta\dot{\eta}\circ$, $-\epsilon\circ\circ\zeta$ Spreuschuppe — d. Antheren-Connectiv häutig, breit), Zier. H. tenuilobum DC. s. tenuifolium Cass. (Tex.).
- Hymenocallis** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) (zu Pancratium L.) „Schönheit“- Narzisse (s. eb. u. $z\ddot{\alpha}\lambda\hat{\lambda}\circ\zeta$ Schönheit — sehr zarte Blütenabschn.), H. speciosa Herb., s. Pancratium Dryandri s. speciosum Salisb.
- Hymenodictyon** Wallr. (Rubiace. Cinchonaceen, V. 1) Netzflügelfrucht, „Hautnetz“ (s. v. u. $\delta\acute{\iota}\kappa\tau\nu\circ\circ$ Netz — Samen von netzförm. Flügel umgeben), z. B. flaccidum Wall., s. Cinchona fl. Spr.
- Hymenomycetes** Fr., Rehb., Endl. „Hautpilze“ (s. v. u. $\mu\acute{\nu}\chi\eta\zeta$, $-\eta\tau\circ\zeta$ Pilz).
- Hymenophyllum** L., Sm. (Farne, XXIV. 1) „Hautwedel“-F. (s. v., $\varphi\iota\lambda\hat{\lambda}\circ\zeta$ Laubblatt — Blätt. häutig, zart), z. B. cruentum Cav., asplenoides Sm. (Trichomanes aspl.), etc. — Hymenophyllacae Endl., Grck., -llae Bory (zu Polypodiaceen DC.).
- Hymenoxyx (-is)** Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Spitzhaut“-Blume (s. v. u. $\dot{\partial}\acute{\xi}\dot{\nu}\zeta$ spitz — Pappusblättchen häutig u. zugespitzt), Zier. anthemoides u. californica DC. (Shortia calif. Hort.).
- Hyobanche** Thb., L. (Personaten Orobancheen, XIV. 2) „Schweinswürger“, fr. fleur de fève „Saubohnenblüte“ (v. $\dot{\nu}\zeta$, $\dot{\nu}\circ\zeta$ Schwein u. $\dot{\alpha}\gamma\chi\omega$ Würge) z. B. sanguinea L. (Orobanche mauretanica Petiv.).
- Hyophorbe** G. (Palmen, XXI. 8) „Schweinesfutter“ (s. eb. u. $\varphi\o\varphi\beta\hat{\eta}$ Speise), z. B. Commersonii Mart., indica G. etc., s. Aréca.
- Hyoscyamus** L. (Solaneen, V. 1) Bilsenkraut, eig. „Schweinsbohne“, fr. hyosciame (jusquiam u. lugan), e. hen-bane, musk-crawfoot (v. $\dot{\nu}\zeta$, $\dot{\nu}\circ\zeta$ u. $\chi\nu\alpha\mu\circ\zeta$ Bohne — d. bohnenart. Kapseln auch f. Schweine giftig).
- Hyoséris** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Schweinesalat“, fr. lait-de-cochon (s. v., $\sigma\acute{\epsilon}\nu\zeta\circ\zeta$ Salat), z. B. amplexicaulis Mchx. (Krigia ampl. Schreb.) etc., s. Dens leonis Pluk.
- Hyospáthe** Mart. (Palmen, VI. 3) „Schweinskölbe“ (s. v., $\sigma\pi\acute{\alpha}\theta\eta$, lat. spatha Blütenscheide — in Brasil. „Schweinspalme“!), H. elegans Mart.
- Hypechusa** Alfld. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Aushaltungs“-Wicke, gelbe W. (v. $\dot{\nu}\pi\acute{\epsilon}\chi\omega$ Part. Fem. unterhalte, halte aus — Sinn un-deutlich!), H. lutea Alfld. = Vicia lut. L.
- Hypécoüm** L. (Papaveraceen, IV. 2) Gelbauge Seub., Lappenblume Leun., fr. hypécoon (v. $\dot{\nu}\pi\acute{\eta}\chi\acute{\epsilon}\omega$ töne dazu, rassele — d. Samen in d. reif. Frucht! nicht n. Paxton: $\dot{\nu}\pi\acute{\eta}\chi\circ\circ\zeta$ Diosc. unterthan, lat. procumbens niederliegend!).
- Hypelytrum** Lk., Nees, s. Hypoëlytrum Rich.
- Hyperanthēra** Forsk., Vahl (-antha Perrin) (Cassieen od. Diosmeen, X. 1) „Oberanthere“, Flügelsamen-Moringa, Behennuss D., H. Moringa Vahl (Guilandina Mor. L. s. Mor. pterygosperma G.) ($\dot{\nu}\pi\acute{\epsilon}\circ\zeta$

über, ober, ἀρθηγὰ Staubbeutel — d. 5 läng. fruchtb., d. 5 kürz. unfruchtb.), H. dioeca Pers. (Guil. dioeca L. s. Gymnocladus canadensis Lam.).

Hyperica Juss., -icæae Chois., -cinæae DC., Rchb., -caeæae Grck., fr. hypericoïdes „Hartheugew.“, sogl.

Hypericum T., L. (Hypericinæen, XVIII. 2) Hartheu, Johanniskraut, fr. herbe de St. Jean, e. park-leaves (gr. ὑπέριζον Johanniskr. v. ἐπο unter u. ἐπίη od. ἐπείη Heidekr., Paxfon: ὑπέριο u. επίωρ, ὄρος Bild — weg, d. ansehnl. Blüten!?), H. perforatum L., fr. millepertuis, Zier. H. Ascyon L. (s. d.), calycinum L. (Kleinas.), e. éclair od. Millepertuis à grandes fleurs (à grand calice), e. large-calyxed Hypericon, androsaemum L., fr. toute-saine, e. tutsan, H. Kalmianum L., W. (Hstr. Nordam.), linarioïdes, Gewächsh. H. japonicum L., Thb., sessiliiforum, fr. bois à Baptiste, etc.

Hyperrhiza Bosc., Nees (Pilze, XXIV. 4) Wurzelstreuling Kumm. (ὑπέριο über, ῥίζα Wurzel — überird. Fibrillen wurzelart. zu einem caudex!), z. B. liquaminosa N. Saft-W.

Hyphaena G. (-ne Pers.) (Palmen, XXII. 6) „Gewebe“-P., Dum- od. Astpalme, fr. doume Pfefferkuchenbanm (— Fruchtschale essbar!) (v. ἴρατρο überspinne od. ἴρη Gewebe — Fruchtfasern z. Ver- spinnen!), H. thebaica Mart. (Douma theb. Duham.), s. Cucifera theb. Pers. (cuci, gr. ζούζι Kokosnuss).

Hypholoma DC. (Pilze, XXIV. 4) „Gewebe“- od. „Fadensaum“ (ἴρη Gewebe, λῶμα Saum — d. Manschette spinnwebartig), z. B. H. lateritium DC.

Hypomycetes Rchb., Endl. „Fadenpilze“ (s. eb. u. μύκης, -ητος Pilz).

Hypnum L. (Moose, XXIV. 2) Astmoos, fr. hypne (gr. ὕπνος Moos an Bäumen i. q. σφύγγος, Wtst. v. ὕπνος Schlaf — einschlaf. Wirkung!), Guirländen H. serpens, velutinum, splendens u. cupressiforme L.

Hypocalymna Endl. (Myrtaceen, XII. 1) „Unterhüll“-Myrte (ὑπὸ u. κάλυμμα od. -υρα Hülle — Eierstock unten, d. Blüt. von trockn. Bracteolen umgeben), Gewächsh. Cunninghami Endl.

Hypochoaeris (-choeris) L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Ferkelsalat“, Kosten O. W., fr. laitue-de-cochon (- de porc), porcelle (ὕπο für, ζωϊός, lat. porcellus Ferkel), z. B. pinnatifida Cyr. (Boebera p. Spr.) etc.

1) **Hypocistis** T. (sc. Cytinus) L. (Cytineen, XX. 8) „Hypocist“, W. (succus Hypocistidis Offiz.), s. Thrysine Gled. 2) **Hypocystis** Beckm., s. Asärum Hypocistis L. (Aristolochieen Asarineen, XI. 1) (gr. ὑποζυστὶς Wurzelschmarotzer v. υπὸ u. ζυστός, lat. Cistus — schmatzt an Cistuswurzeln).

Hypocryta Mart. (Gesneraceen, XIV. 2) „Unterbuckel“ (ὑπὸ unten, κυνότος bucklig — Kronröhre hinten an d. Basis), H. gracilis Mart. (Brasil.).

Hypoëlytrum Rich. (Cyperaceen, III. 1) „Unterhüllen“-Segge (ὑπὸ u. ἔλυτον Decke, Hülle), s. Hypelytrum Nees (Hypolytrum Vahl, auch Hypaelyptum Vahl), z. B. argentéum Vahl s. senegalense Pers., filiforme, pungens etc.

Hypoglossum (sc. Ruscus) L. (Sarmentac., XXII. 11) Zungen-Mäusedorn, „Unterzungen“-M., auch Ruscus Hypophyllum „Zungenblatt“, fr. double-langue, hippoglosse (fehlerh. st. hypogl.), langue de cheval u. laurier alexandrin (v. ὑπὸ u. γλῶσσα Zunge — d. Blüten auf d. Blätt. unter besond. Deckblättern stehend!).

Hypognia Juss. „Unterweibige“ od. „-stemplige“ (ὕπο u. γυνή — d. Stempel od. Fruchtknoten unter d. Blume!).

Hypolytrum Vahl s. Hypoëlytrum Rich.

Hypopetalia Juss. „Unterkronblättrige“ (*ἐπό* u. *πέταλον* Kronblatt — diese unterständig!).

Hypophegēa (sc. Monotropa) L., Wallr. (Ericaceen Monotropeen, X. 1) Fichten- od. „Buchenpargel“, Buchen-Ohnblatt (*ἐπό* u. *φύγος*, lat. *fagus* Buche), s. Hypopitys (s. d.).

Hypophyllum (sc. Ruscus) L. (Sarmentac., XXII. 11) „Unterblatt“-Mäusedorn, s. Hypoglossum (*ἐπό* u. *φύλλον* Laubblatt, — Blüt. an d. Blattunterseite!).

Hypopityaceae Klotzsch, Grck. (zu Ericacae Rchb.) Fichtenspargelartige, sogl.

Hypopitys Scop. (sc. Monotropa) L. (Ericac. Hypopityaceen, X. 1) „Fichtenspargel“, Ohnblatt (— Pfl. ohne Laubblätter!) (*ἐπό* u. *πτυξ* Fichte — schmarotzt an deren Wurzeln!), s. Monotropa Hypophegēa Wallr.

Hypostaminēa Juss. mit unterständ. Staubgefassen — nämli. unter d. Fruchtknoten! (stamen, -inis Staubfaden).

Hypoxis L. (Amaryllideen od. Hypoxideen, VI. 1) „Untenspitzkapsel“, s. g. Härtling (*ἐπό* u. *δέσμης* spitz — Basis d. Kapsel! Wtst. d. Blätt. spitzig!), H. Arnotti, decumbens L. (*Anthericum sessile* Mill.), stellata Thb., minuta L. (*Helonias m. L. f.*) etc., s. Fabricia Thb. u. Gethyllis L.

Hypoxylon Bull. (Sphaeriac.-Pilze, XXIV. 4) „Holzstielchen“ Kumm. (*ἐπό* unten, *ξύλον* Holz — leder. fast holzig. Substanz), z. B. vulgare, filiforme etc.

Hyptis Jacq. (Labiaten, XIV. 1) „Beuglippe“, Linksblume D. (v. *ὑπτίος* zurückgebeugt — Form d. Blüten!), z. B. capitata Jacq. (*Clinopodium capense* Sw.), Chamaedrys W. (*Clinop. Cham.* Vahl) etc., s. Nepeta, Brotera Spr. u. a.

Hyssopus L. (Labiaten, XIV. 1) „Ysop“ (*Isop Rmpl.*), fr. hyssope (hyssope), e. hyssop (gr. *ὕσσωπος* v. *ἴβης*. *ἴβος* Schwein u. *ὤψη*, *ὤπος* Gesicht — rüsselart. Blume! Wtst. hebr. esob, arab. azzof = heil. Kraut, nicht näher bekannt!), Zier. H. officinalis L. m. v. v. (fl. albo u. roséo Hort., cristatus L. s. *ocimifolius* (*Elsholtzia crist.*), *Lophanthus* L. chines. Ysop od. Katzenkr. (Cataria flor. inversis Hall.) etc.

1) **Hystrix** Rumph. (sc. Barleria) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Stachel“-Barlierie (gr. *ὔροιξ* Stachelborste), H. frutex Rumph., s. Barl. Hystr. L. 2) **Hystrix** (sc. Aspalathus) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Dornhülse“. 3) **H.** (sc. Merisma) Spr. (Pilze, XXIV. 4) Stachelpilz, s. Hydnus Hystrix u. Echinus Hall. (*Hericium hystrinum* Pers.). 4) **Hystrix** Mnch. (Gräser, III. 2) „Stachelgras“, s. Echinocchlōa P.-B. (— sehr lange, spitze Grannen!).

Jacaranda Juss. (Bignoniaceen, XIV. 2) brasili. Jacarandabaum, s. g. Palisanderholz (Polixanderholz¹) (vaterl. Name!), J. brasiliensis Juss., e. black-rose-wood „schwarz. Rosenholz“, s. Machaerium Pers., Warmh. J. grandiflōra u. mimosaeifolia Ker. 2) **Jac.** Barrel. (Araliaceen, V. 5) „Goldblatt-Allheil“, J. arborēa Barr., s. Panax chrysophyllum Vahl (Amer.).

1) **Jacēa** Pers. (sc. Centaurēa sect. Rchb.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Wiesenflockenblume, fr. jacée u. tête de moineau „Spatzenkopf“ Wolff, s. Rhaponticum Scop. s. Cyānus Fl. Wett. Jacēa (v. jacēo liege nieder), ferner z. B. Centaurēa splendens, Rhapontica L. etc.

1) Palisander n. Goeppert v. pao santo bras. = heilig. Holz (auch Polyxander, Polisander u. a. m.) (Köln. Zeit. Nr. 226. 2., 1881).

- 2) **Jacēa** Camer. (Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Heil-Veilchen“ (v. *λόν* Veilchen u. *αξέομαι* heile, Wtst.).
- 1) **Jackia** Blum. (Polygalaceen, XVII. 3) „Jackie“ (n. d. engl. Reis. in Sumatra 1813/22 W. Jack, s. d. Aut.), z. B. *J. excelsa* Blum. (Monnina exc. Spr.). 2) **Jackia** Spr. (Büttneriac., V. 1 od. XVI. 5), *J. spectabilis* Spr., s. *Wallichia speciosa* DC. 3) **Jackia** Wall. (Rubiaceen, V. 1), *J. ornata* Wall., s. *Zuccarinia* orn. Spr.
 - 1) **Jacksonia** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Jackson's“-Baum (n. d. schott. Bot. G. Jackson), Treibh. *J. trifurcata* (Gompholobium f. Sm.), *spinosa* R. Br. (Neusüdwales), s. *Gomphol. spin.* u. *Daviesia* sp. Sm. 2) **Jacks.** Raf. (Capparideen, XIII. 1).
 - 1) **Jacobaea** T. (sc. *Senecio*) L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Jakobs-Kreuzkraut, Jakobsblume, fr. jacobée, fleur od. herbe de St. Jacques, e. St. James-wort (rag-) u. seggrum (n. d. Apostel Jakobus — blüh. um Jakobstag !) 2) **Jacobaea** Vail. (*Senecio*, sect. a Rchb. flor. radiatis) Strahlblüt-Greiskräuter, z. B. *elegans*, *erucifolius* etc. 3) **Jac.** Plum., s. *Pectis* L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1), *J. humifusa* Plum. u. *Pectis ciliaris* L. 4) **Jac.** Comm., s. *Othonna* L. (Compos. Senecionideen, XIX. 2), *J. africana* Comm., s. Oth. *parviflora* L.
 - Jacobia** DC. (Lythrareen od. Melastomac. Rhexeien, VIII. 1) (zu Trembleya DC.) „Jakobie“ (n. Jakob Trembley, schr. Mem. pour servir à l'hist. d. l. vie etc. de Charl. Bonnet, Bern 1795).
 - 1) **Jacquinia** L. (Myrsineen od. Solaneen Ardisiaceen, V. 1) „Jacquinie“ (n. d. Prof. Jacquin in Wien), Treibh. *J. armillaris* L. „Jacquin's-Armbandstrauch“ (Antill.), *aurantiaca* Ait. (Sandwichsins.). 2) **Jacquinia** aculeata, s. *Medeola* Pers. ac. (Melanthaceen, VI. 3). 3) **Jacq.** Mut. (Tiliaceen, XIII. 1).
 - 1) **Jaegera** Gies. (Scitamineen, V. 1) „Jäger's“-Banane (n. d. Bot. G. F. Jäger). 2) **Jaegeria** H. B. K. (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) „Jägersblume“, z. B. *urticaefolia* Spr. (*Viborgia urt.* Kth.), *uliginosa* Spr. (*Spilanthus ul.* Sw.) etc., s. *Polymnia* L. u. *Verbesina* L.
 - 1) **Jalāpa** T. (sc. Convolvulus) L. (Convolvulac., V. 1) „Jalapenwinde“, fr. u. e. jalap, Jalapenwurz (vaterl., n. d. mexik. Distrikt Jalapa). 2) **Jalāpa** (sc. *Mirabilis*) L. (Nyctagineen, V. 1) Wunderblume, e. marvel.
 - Jambolan** Rumph., s. *Jambolifera* L. sogl.
 - Jambolifera** L. (Rutac. Rutarieen, VIII. 1) „Jamboli“- od. Kummelraute (vaterl. jamboli = olivenart. Frucht), *J. pedunculata* L. (B. Ostind.), aromatische Malabar - od. Tangu-Gewürznelke, s. *Cymnosma* G. = *Caryophyllus Tangu* aromat. malabar. Pluk.
 - Jambos** Adans. (*Jambosa* Rumph.) (sc. *Eugenia*) W. (Myrtaceen, XII. 1) „Jambusenbaum“, fr. giombo (jambosier, jambe-longue) (malay. jambu Schambu), *J. malaccensis* DC., s. *Eugenia Jambos* L., *J. vulgaris* DC. s. g. Rosenapfel.
 - Janipha** Kunth (Rutac. Euphorbiaceen, XI. 3) Brechnuss (n. d. brasili. janipaba!), *J. frutescens* Löfl., s. *Jatropha Janipha* L. s. *carthagagenensis* Jacq.
 - Jasiōne** L. (Campanulac. od. Lobeliaceen, V. 1) Schafrapunzel, Monke O. W., Schafscabiose Rmpf., „Jasonblume“, fr. jasione, e. sheep's-bit (gr. *ιασιώνη* Theophr. v. *Ιάσων* Heilgöttin, Wtst. v. *ιαστις* Heilung od. *ἴον* Veilchen u. *σίος* (θεός) göttlich — vortreffl. Heilpfl.!), z. B. *J. montana* L., e. mountain-sh.-b. u. perennis Lam.
 - Jasminum** L. (Contorten Jasmineen, II. 1) „Jasmin“, fr. u. e. jasmin, e. jessamin od. jasmine (v. *ιασμήνη* Jasmin d. Perser, arab. ysmyn Paxton, jasmin d. Perser), Warmh. *J. officinale* L. m. v. v. echter J., Stuben gracie u. odoratissimum L., *azoricum* L., *glaucum* Hb., Kth. (*ligustrifolium* Lam.) (Cap), *J. Sambac* Ait. arab. J. m. v. v.,

- J. grandiflorum L. s. g. spanischer J., Gärten J. fruticans L., fr. j. jaune, e. shrubby j., nudiflorum Lindl., fr. j. à fleurs nues, e. naked-flowered j., humile L.
- Jatröpha** L. (Euphorbiaceen, XI. 3), „Arztkost“, Brechnuss, fr. médicinier (v. ἰατρός Arzt u. τροφή Nahrung, Wst. γάγω esse), J. Manihot L. Maniok- od. Cassavebrot-Strauch (s. g. Yucca- od. Stärke-wurzel), J. elastica L., s. Hevēa guianensis Aubl. Kaoutschukbaum.
- Ibēris** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) Bauernsenf, Schleifenblume Rmpl., e. clown's-mustard u. candy-tuft, mithridate-mustard (gr. ιβεριός v. Iberia Ebroland, eine kressenart. Pfl.), Zier. I. umbellata L., fr. thlaspi-lilas (taraspic) od. - en ombelle, e. umbelled-candytuft, m. v. v., amara L. (Thlaspi am. Crantz), m. v. hesperidiflora Hort., Topf. I. sempervirens L., fr. taraspic vivace od. corbeille d'argent, e. ever-green candituft, Tenoreana DC., pinnata Gouan, fr. thlaspi odorant, e. sweet-scented c., etc.
- Ieacina** A. Juss. (Myrobalaneen od. Oleineen, XII. 2) Senegal-Cacao-pflaume, I. senegalensis A. Juss.
- Ieaco** Plum. (Myrobalaneen, XII. 2) westind. Cacaopflaume, fr. icaquier (-caque) (vaterl., in Bras. acaja), s. Chrysobalanus Iaco L. s. Guai-era Marcgr.
- 1) **Ieica** Aubl. (Burseraceen od. Amyrideen, VIII. 1) Ieica-Myrrhe, Elemi harzbaum Seub. (vaterl. Name in Guiana!), I. altissima, brasiliensis etc., s. Amyris L. 2) **Ieica (Isika)** coerulea Borkh. (Lonicereen, V. 1) blaue Heckenkirsche, s. Xylosteum canadense Duham. s. Solonis Eaton (Lonicéra coer. L.), Isika lucida Mnch., s. Lonicéra alpigena L.
- Ieosandrae** Lauch. (sect. v. Crataegus L.) (Pomaceen, XII. 2), „Zwanzigmännige“ (<εἴζωσι zwanzig, ἀνήρ, -δρός Mann, Staubgefäß), z. B. Oxyacantha, monogyna etc.
- Ieosandria** L. XII Kl., „Zwanzigmännige“ (s. eb.).
- Idaea** (sc. Vaccinium Vitis) L. (Siphonandraceen od. Vaccinieen, VIII. 1) Preisselbeere, fr. airelle rouge, e. red-bilberry (Idaeus, vom Berg Ida auf Creta).
- Idaeus** (sc. Rubus) L. (Rosaceen, XII. 3) Himbeere, fr. framboise (-sier), e. rasp-berry (ras- od. hind-berry), -bush od. -tree, auch framboise (s. eb.).
- Jeffersonia** Barton (Ranunculac. Podophylleen, V. 1 od. VIII. 1), „Jefferson's-Entenfuss (n. d. Unions-Präs. Thom. Jefferson, † 1826), Zier. J. diphylla Pers. s. Bartonis Mchx. (binata Bart.) „Zweiblatt“, s. Podophyllum diphyllum L. (Virgin.).
- Jenkinsonia** Sweet (Geraniaceen, XVI. 5), „Jenkinson's-Pelargonium (n. Jam. Jenkinson, schr. descript. of brit. plants, Kendal 1775), z. B. J. quinata u. tetragona Sw., s. Pelargonium u. Chorisma Lindl.
- Ifloga** Cass., DC. (zu Gnaphalium Rehb.) (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Haarstempel-Fadenkraut, s. Trichogyne DC., z. B. Fontanesii Cass. (Anagramm von Filago, wie auch Gifola, Logfia etc.).
- Ignatia** L. (-tiana Lour.) (Contorten Strychneen, V. 1), „Ignatiusbohne“ (e. Ignatius Loyola, Stift. des Jesuiten-Ordens), I. philippinica Lour., s. Strychnos Ignatii Berg.
- Jirasekia** W. (Primulaceen, V. 1), „Jirasek's-Gauchheil (n. ein. Bot. Joh. Jirasek, schr. mit Haenke u. A. Beob. auf Reis. n. d. Riesen-gebirge, Dresd. 1791), z. B. alpina Schm. s. tenella Rchb., s. Anagallis tenella L.
- 1) **Ilex** L. (Sapotac. Aquifoliac. od. Ilicineen, IV. 4) Stecheiche, Hülsen, s. g. Stechpalme, fr. chêne-verte u. yeuse od. houx, e. holly-tree od. knee-holly, evergreen oak (lat. ilex, -icis Stecheiche v. d. celt. ec od. ac Spitze), Zier. I. Aquifolium L. m. v. v., fr. houx-commun,

- e. common-holly, Theepfl. I. paraguariensis St. Hil. Paraguay-Thee,
s. g. Mate (nicht Maté). 2) *Ilex* T. (sc. *Quercus*) L. (Cupuliferen,
XXI. 5) eigentl. Stecheiche, fr. yeuse. — *Ilicinæae* Seub. Stech-
palmen od. Hülsenartige (s. 1) *Ilex*.
- Illaria** Lenne, C. Koch (*Loasaceen*, XIII. 1) „*Ilarie's*“-Brennwinde
(n. ein. Berliner Bot. Illaire), Zier. I. canarioïdes marienglockenart.
- Illecēbrum** T., L. (Portulacac. od. Illecebreen, V. 1) Knorpelblümchen
Seub., fr. illecébre, panarine od. herbe au panaris „Nagelgeschwürkr.“
(v. illecébra Anreizung), z. B. *cymosum* L. (*Paronychia cym.* T.),
verticillatum L. etc. — *Illecebreae* DC., R. Br. (zu *Paronychiacæae*
St. Hil. od. *Portulacacæae* Rchb.).
- Illicium** L. (Magnolieen Illicieen, XIII. 7) Stern-Anis (v. *illicio locke*
an), I. *anisatum* L. (*Anisum stellatum* Mat. med.), fr. u. e. badiane,
e. stellated od. indian anise. — *Illiciæae* DC. (zu *Magnoliacæae* Rchb.).
- Ilippe** Kön. (Sapotaceen, XI. 1) Butterbaum (v. *ιλλός* schielend, *τριτος*
Pferd, η Stute? — unklar!), I. *Malabarica* Kön., s. *Bassia longifolia* L.
- Illus** Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Schiel“-Narzisse (*ιλλός* schielend),
z. B. *triandrus*, *cernuus* Haw., *albus* etc.
- Imantophyllum** Hook. (**Imantoph.-**) Hook. (Amaryllideen, VI. 1)
„Riemenblatt“ od. Clive's-Lilie, s. *Clivia Lindl.* ($\mu\alpha\varsigma$, $\delta\tau\tau\sigma$ Riemen,
 $\varphi\tilde{\imath}\lambda\lambda\sigma$ Laubblatt), Stuben I. *miniatum* Hook. m. v. *splendens* Hort.
- 1) **Imbricaria** Hoffm., Schreb. (Flechten, XXIV. 3) Ziegel- od. Schindel-
flechte, fr. imbricaire (v. *imbrex*, -*cis* Schindel od. Dachziegel). 2) *Im-
bricaria* Comm. (Sapotaceen, VIII. 1) „Schindel“- od. „Ziegelbaum“,
fr. bembrice, I. *maxima* Poir. s. g. Molukken-Eisenholz (— zu Schin-
deln benutzt!), s. *Mimusops* L. 3) **Imbricaria** Sm. (Myrtaceen,
V. 1) „Regenschirm“- M. (*imbricus* v. *imber*, -bris Regen — Blüt.
wie ein Regenschirm stehend).
- Impatiens** Riv., L. (Oxalideen Balsamineen, V. 1) Springkraut, Balsam-
mine (lat. *impatiens* ungeduldig — d. frisch. Kaps. springen beim
Berühren auf), wild I. *noli tangere* L., Topf od. Garten I. *Balsamina*
L. m. v. v., fr. bellesamine od. jalouse, e. Balsam od. common-
garden-balsamine, v. Solferino, v. *nana* Hort., I. *glanduligera* Royle
s. Roylei Wall., I. *tricornis* L., e. cornigerous B., etc.
- Imperata** Cyr. (bess. *-tia!*) (Gräser, III. 2) „*Imperati's*“-Gras (n. Fer-
rante Imperati, neapolit. Bot. d. 16. Jahrh.'s), z. B. *cylindrica* Host
u. *sacchariflora* Hort., s. *Saccharum cylindricum* Lam. s. *Lagurus*
cyl. L.
- Imperatoria** T., L. (Umbelliferen, V. 2) Meisterwurz, Ostritz O. W., fr.
imperatoire, Angélique française, e. master-wort (lat. *imperatorius*
kaiserlich v. *imperator* Herrscher — weg. d. unvergleich. Kraft!).
- Incarvillæa** Juss. (Bignoniaceen, XIV. 2) „*Incarville's*“-Trompeten-
blume, fr. *incarvillée* (n. d. franz. Missionair in China R. P. d'*In-
carville*), Zier. I. *chinensis* Lam., s. *Bignonia Tecoma* Juss.
- Indigofera** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „*Indigpflanze*“, fr. indi-
gotier (indigo Indigfarbe u. fero trage), Zier. I. *australis* R. Br.,
decora Lindl., Dosua Ham., etc.
- Inga** Plum., W. (sc. *Mimosa*) L. (Mimoseen, XXIII. 1) „*Inga*“-M. (inga
westind. Name d. Pfl.), z. B. I. *bigemina* W., I. *Sassa* W. abyssin.
Inga-M., Warmh. Harrisii u. *pulcherrima* Cerv.
- Inocarpus** Forst. (Sapotac. *Mimusopeen* od. *Lucumeen*, X. 1) „Sehnen“-
od. „Faserfrucht“ (v. $\iota\varsigma$, $\iota\tau\circ\varsigma$ Sehne etc., $\omega\alpha\pi\tau\circ\varsigma$ Frucht — faser.
Hülle!), I. *edulis* L. (B. Austral.), s. *Gujanus* Rumph.
- Inocÿbe** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Rauchfaserkopf Kummi. (s. eb., $\nu\pi\beta\eta$
Höhlung, Napf etc. — fransig. Hut!), z. B. *rimosa*, *pyriodora* etc.,
s. *Agaricus* L.

Inophyllum (sc. *Calophyllum*) Pers. (Guttiferen, XIII. 1) „Sehnenblatt“, Tacamahaca-Harzbaum W. (s. v., *γύλλον* Laub, Blatt).

Intsia Nor., Thou. (sc. *Acacia* s. *Mimosa*) L. (Mimoseen, XXIII. 1) indisches od. „Intsi“-Eisenholz (vaterl. madagassischer Name!), s. *Tamarindus Intsia* Spr.

Intybus (sc. *Cichorium*) L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Cichorie, Endivie, fr. u. e. endive (v. *tubus* Röhre? — röhr. Stengel? Wtst. arab. *hendibeh*!).

Inula L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Alant, Flöhkraut, fr. aunée od. inule, herbe aux puces, e. elecampane od. flea-wort (aus d. gr. *ἐλέντιον* durch Corruption? od. Wtst. v. *ἴραω* (*ἴρεω* u. *ἴρώω*) leere aus — Wirkung d. Wurzel, Plinius), Gärten I. *Helenium* L., grandiflorum W., oculus Christi u. suaveolens L.

Joachinia Tenore (Gräser, III. 2) „Joachim's“- od. Raupengras (n. Dr. Joachim Jung in Lübeck, vgl. *Jungia*! Wtst. n. Joachim Murat, Schwager Napoleon's I.), *J. phalaroides* Ten. (Beckmannia erucaeformis Host), s. *Cynosurus eruc*. Ait.

Jochröma Benth. (Solanaceen, V. 1) „Veilchenfarbe“ od. blauer Prachtstrauch (*ἰον* Veilchen, *ζωωμα* Farbe), s. *Habrothamnus cyanëus* Ldl.

Johannia W. (Joannēa Spr., *Joannesia* Pers.) (Compos. Carlineen, XIX. 1) „Johannesblume“ (n. d. Erzherz. Johann v. Oesterreich, Pfeiffer), *J. insignis* W. (*Chuquiraga* Juss.), *brasiliensis* Spr., s. *Flotovia glabra* Spr., *J. microphylla* Tratt. (*insignis* W. var.).

1) **Johnsonia** R. Br. (Commelinaceen, III. 1) „Johnsonie“ (n. d. Apoth. Thom. Johnson), z. B. *J. hirta* u. *lupulina* R. Br. 2) **Johns.** Catesb. (Vitaceen od. Verbeneen, IV. 1), *J. americana* Cat., s. *Callicarpa* L. 3) **Johns.** Adans. (Hesperideen, XVIII. 2).

Jolithus (sc. *Lepraria*) Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Veilchenstein“-Fl., s. g. Veilchenmoos (*ἰον* Veilchen, *λίθος* Stein — Geruch der Steinflechte nach Veilchen!).

Jondraba Med. (zu *Biscutella* Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Brillenschote (*ἰον* Veilchen, *Draba* Hungerblümchen), *J. auriculata* L., *hispida* DC. etc.

Jonesia Roxb. (Legumin. Cassieen, X. 1) „Jones“-Hülsenbaum (n. P. Jones, schr. mit Kingston Fl. Devoniensis etc., London 1829), Gewächsh. J. *Asōca* Rxb. (*Asgogam* Rheed.) (B. Ostind.), *J. pinnata* Roxb., etc.

Jonidium Vent. (Violarieen, XIX. 6) *Ipecacuanha*-Veilchen, „Veilchengleiche“ (*ἰον* u. *εἴδουμα* gleiche), *J. Ipecacuanha* Vent. wahre Veilchenwurz (Brechwurzel), s. *Pombalia Ipec.* Vand. (*Viola Ipec.* L. s. *Jonidium* Vent.).

Jonopsidium DC., Rchb. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) stengelloses Löffelkraut (*Jonopsis* u. *εἴδουμα*), Zier. J. *acaule* Rchb., s. *Cochlearia ac.* Desf. s. *pusilla* Broter., s. *Jonopsis* DC.

1) **Jonopsis** DC. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Veilchengleiche“ (s. v. u. *οὐεις* Gesicht, Aussehen — dem Veilchen sehr ähnl.!). 2) **Jonopsis** Hb., Kth. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Veilchengesicht“ (s. eb.), *J. pulchella* Kth., s. *Cybelion* Spr. „*Cybele*“-Veilchen.

Jonquila DC. (sc. *Narcissus*) L. (Amaryllideen, VI. 1) „Jonquelle“, binsenblättr. Narzisse, fr. narcisse jonquille, e. jonquil-Narcissus m. v. fl. pl. (fr. *jonquille* v. jone, lat. *juncus Binse*).

Jonthlaspi T., DC. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Veil-Täschelkraut“, fr. *jon-thlaspi* (*ἰον* u. *Thlaspi* Täschelkr. — Blüt. wie gelbes Veil, Frucht wie *Thlaspi*!), s. *Clypeola Jonthl.* L.

Josephinia Vent. (Bignonaceen od. Pedalieen, XIV. 2) „Josephinie“ (n. d. Kaiserin Josephine v. Frankr.), z. B. *J. imperatricis* Vent. u. *grandiflora* R. Br. (Neuholl.).

- Josikaea** Jacq. (sc. Syringa) (Oleaceen, II. 1) „Josika's“-Lilac M.-Rchb. (n. d. Freifrau Josika ben.).
- Jovibarba** DC. (Crassulac., XI. 5) „Zeus“- oder „Jupitersbart“ (zu Sempervīvum) (Jovis Gen. v. Jupiter u. barba Bart — Ausläufer aus d. untersten Achseln).
- 1) **Ipecacuanha** Vent. (sc. Jonidium) (Violarieen, XIX. 6) Brechwurzel, wahres Brechveilchen (aus d. portug. i klein, pe am Wege, caa Kraut u. goene Brechen erregend). 2) **Ipec.** Arrud. (sc. Cephaēlis) Rich. (Cinchonaceen, V. 1) echte Ipecacuanha, Brech-Kopfbeere (Brasil.).
- Ipomēa (-moea)** L. (Convolvulaceen, V. 1) Trichterwinde, fr. ipomée (v. ἵψη, ἵπος Wurm, ὕμινος ähnlich), Zier. J. purpurēa Lam. s. hispida Zucc. m. v. v., fr. ipomée-pourpre, e. morning-glory, tuberosa L., fr. liane à tonnelles, I. bona nox L. (Calonyction speciosum Chois.), fr. Ip. de l'après-midi, e. excellent Ip., I. pes tigris L., fr. pied de tigre, I. hederacea s. Huberi (Pharbitis hed. Chois.), I. coccinea L., Topf etc. violacea (rubrocoerulea) Hort. u. limbata elegantissima Hort. — beide v. v. von purpurēa Lam., I. mexicana m. v. grandiflora alba Hort., s. Calonyction macrantholeucum Colla, Warmh. gossypifolia etc.
- Ipomopsis** Rich., Benth., Mchx. (Polemoniaceen, V. 1) „Trichterwindengleiche“ (v. Ipomoea u. ἵψη Aussehen), Zier. I. elegans Mchx. (Gilia coronopifolia) m. v. v. (lutēa, superba etc. Hort.), I. s. Cantua picta Hort. (Polemonium rubrum) etc., s. Ipomeria Nutt.
- Ipseā** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Korkbaum“-O.? „Wurm“-O.? (v. ἵψη Korkbaum? od. ἵψη, ἵπος Wurm? — unsicher!), z. B. I. speciosa Ldl. (Ceyl.).
- Iresīne** W. (Irsine Spr.) (Amarantaceen, XXII. 5 od. Chlenopodiace., V. 2) „Wollast“-Amarant, s. g. Straussfeder (v. εἴλος st. ἵπος od. ξυλόν Wolle), Teppichbeete I. Herbstii Hook., s. Achyranthes verschaffelti Lam., m. v. fol. aureo-variegato Hort.), I. Lindeni Van Houtt., I. eriantha Lam. (Celosia er. Vahl), glomerata Spr. (Pfaffia glauca Spr.), I. persica Spr., javanica Spr. (Aerva jav. Juss., Illecebrium jav. L., Amaranthus albus gangeticus Pluk.) etc.
- Iria** Rich. (sc. Cypérus) L. (Cyperaceen, III. 1) Schwertlilien-Cypergras? (v. Iris Schwertlilie, Gen. ἵριος v. ἵρις od. εἴλος Regenbogen? — od. εἰλός Wolle? — culmo seminudo, zur Hälfte nackt, zur Hälfte wollig? — unbek., Wst. d. Name malabarisch!).
- Iriarta (-tēa)** Rz. Pv. (Palmen, XXI. 8) Stelzenpalme (n. d. span. Gönn. d. Bot. Joh. Iriarte), I. exorrhiza Mart., andicola Spr. (Ceroxylon and. Hb.), Treibh. ventricosa Mart., altissima u. praemorsa Kl. etc.
- Iridēae** R. Br., DC., Rchb. (-dacēae Grck., -des Juss.) Schwertlilien od. Schwertelgewächse (Iris, -idis).
- Irio** DC. (sc. Sisymbrium) L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) glatte Rauke, fr. laitue de muraille, s. Sisymbrium glabrum W. (lat. irio = gr. ἵρισμα, v. ἵριουμαι errette — mediz. Kraft, scharf wie Senf!).
- Iris** T., L. (Irideen, III. 1) Schwertlilie, fr. Iris, flambe u. glaieul (lat. gladiolus „Schwertel“), e. flag, flower de luce, spurge-wort u. sword-grass (v. ἵρις, -ίδης od. εἴλος, Gen. auch ἵριος Göttin Iris u. Schwertlilie, st. ἵρις — Farbe des Regenbogens!), Garten: I. pumila L. Zwerg-Schw., I. germanica L. m. v. v. Himmelslilie, Violenwurz, fr. glaieul bleu, sibirica L., florentina L. Veilchenwurz, fr. Ir. armes de France, e. godder, versicolor L., panormitana, Susiana L. Fürstin od. Dame in Trauer (Pers.), fr. deuil od. crêpe, fleur du Diable, iberica Hoffm. m. v. ochracæa, persica L., reticulata M. B., Xiphium L. s. hispanica Hort., xiphoides Ehrh. (anglica Hort.),

- engl. od. portug. etc., wild I. *Pseud-Acōrus* L. Wasser-Schw., spuria L. Bastard-S., graminēa L. grasblättr.
- Irpe** Tod. (Pilze, XXIV. 4) „Eggenpilz“ Kumm. (*ἴσοπηξ* od. *δροπηξ*, lat. urpex Egge — Unterseite d. Hutes!), z. B. lacteus etc., s. *Hydnnum* L.
- Isäti** C. Bauh. (Crucifer. Nucamentaceen, XV. 2) Waid, fr. guède, e. woad, green-weed u. pastel (gr. *ἰσάτις* Pfl. z. Blaufärben, od. v. *ἰσάτω* glätte — galt als Mitt. geg. Hautkrankh.), wild u. cult. I. tinctoria L., s. g. deutscher Indig, fr. pastel, e. dyer's-weed u. pastel.
- 1) **Ischaemum** P.-B. (Gräser, XXIII. 1) „Blutstillgras“, Schuppengr. D. (v. *ἰσχώ* hemme, *αἷμα* Blut), z. B. muticum L., aristatum L., hispidum Kth. (Andropōgon virens Spr.). 5) **Isch.** (sc. Andropōgon) L. (Gräser, III. 2) gem. Bartgras Grck.
- Isertia** Schreb. (Cinchonac. Guettardeen, XXI. 7) „Isert's“-Chinabaum n. d. Chirurg. P. E. Isert, in dän. Diensten, schr. 1788 Reise in Guinea), I. coccinea Vahl = Guettarda cocc. Aubl.
- Isika** Ad., Borkh. = Icica Aubl. (subgen. v. Lonicēra) (Lonicereen, V. 1) Doppelfrucht Lauch., z. B. L. s. Is. coerulea Borkh. (nicht etwa v. Isicus der Isis geheil., sond. icica vaterl., Wtst. d. verstümm. Xylosteum!).
- Ismene** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Ismene“-Narzisse (n. Ismene, Tocht. d. Oedipus u. d. Iokaste, Myth. — Seestrandspfl.!), I. Amancaës Herb., nutans Herb. etc., s. Pancratium.
- Isnardia** L. (Onagrarieen Jussieuën, IV. 1) „Isnardie“, Sumpfranke, Sapfel O. W. (n. Ant. Danty d'Isnard, Prof. z. Paris, † 1724), I. palustris L. (Dantia p. Thou.), s. Ludwigia repens Sw.
- Isochilos (-us)** R. Br. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Gleichlippe“ (*ἴσος* gleich, *χειλός* Lippe — d. Labell mit den übr. inn. Teilen), z. B. linearis u. prolifer Hort. Kew., s. Cymbidium u. Elleanthus Presl „Wickelblume“.
- Isoëtæae** Bartl., Rehb. (zu Selagines Endl.) Brachsenkräuter, s. sogl.
- Isoeteen** L. (Lykopodiac. Isoeteen, XXIV. 1) Brachsenkraut, Brassenfarn, fr. calamaria (*ἴσος* od. *ἴσος* gleich, *ἕτης* Geselle? od. *ἔτος* Jahr? — d. ganze Jahr gleich! — ungewiss!), I. lacustris L. u. echinospōra Durieu, s. Calamaria Dill.
- Isolépis** R. Br. (Cyperaceen od. Juncaceen, III. 1) „Gleichschuppe“, Zartriet, Frauenhaar (s. v., *λεπίς* Schuppe — Schuppen gleichf.!), Topf u. Dekorat. I. gracilis Nees (Ostd.), s. g. Frauenhaar u. pygmaea Roth (Chili) (Ampeln) etc., s. Scirpus u. Heleocharis R. Br.
- Isolirion** Catesb., Bak. (Liliaceen, VI. 1) (sect. v. *Lilium* — aufrechte Blumenform!) (s. v. u. *λεπίον* Lilie), z. B. bulbiferum L., Catesbaei Walt. (Nordamer.) u. gigantēum Wall. s. cordifolium Don, Thunbergianum R. u. S. (Jap.) m. v. v. (z. B. bicolor Sieb, marmoratum ds.).
- Isonandra** Hook., Wight (Myrsineen od. Sapotac. Styraceen, XI. 1) Gutta-Perchabaum (s. v. u. *ἀρήγος*, -δούς Mann — 12 gleichlange Staubgefässe!), I. Gutta Hook., auch Tubanbaum gen.
- Isopōgon** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Gleichbart“ (s. v., *πάγων* Bart — d. Nuss überall gleichbebartet!), Treibh. I. anemonifolius R. Br., Baxteri, cuneatus, formosus R. Br. etc., s. Protēa L.
- Isopōrum** L. (Ranunculaceen, XIII. 7) Tolldocke, Muschelblümchen Leun., eig. „Gleichweizen“ (s. v. u. *παρός* Weizen — die Samen gleichen Getreidekörnern), z. B. wild u. Garten: I. thalictroides L. u. anemonoides (aquilegioides) L., etc., s. Aquilegia W.
- Isöra** L. (sc. Helictēres) (Sterculiaceen od. Bombaceen, XX. 7) „Isora“-Schraubenmalve, s. Helictēres jamaicensis Jacq. (nicht v. *εισορούω* blicke an, sond. Wtst. malabar. isora-murre!).

- Isotoma** R. Br., Lindl. (Campanulaceen od. Lobeliaceen, XIX. 6) „Gleichschnit“-Lobelie, Gleichsäumler Vilm. (s. v. u. *τοιη* Schnitt — nährl. d. Blumenlappen!), Zier. I. axillaris Lindl. (Neuholl.), petraea F. Müll.
- Itéa** L. (Corniculaten Cunoniaceen od. Saxifrageen Escallonieen, V. 1) „Itée“, virginische Weide, fr. Itée (gr. *ἴτεα* lat. *vitis* Wiete, Weide — weidenähnl. Blätter u. am Wasser), Zier. I. virginica L., s. Diconangia Mitch. „Doppelkegelkapsel“.
- Itcoideae** Bisch. Ord. der Weidengewächse (s. eb. u. *εἰδουαι* gleiche).
- Ittnéra** Gm. (Najadeen, XXI. 1) Wassernymphe (n. d. Univ.-Curator F. de Ittner in Freiburg, † 1821), I. major Gm., s. *Najas major* DC. s. monosperma W. (*Fluvialis latifolia* Mich.).
- Juanullöa** Rz. Pv. (Solanaceen, V. 1) „Juanulloe“ (n. Don Georg Juan u. Don Ant. Ulloa, Condamines' Begleiter in Südamer. zur Gradmessung), I. parasitica R. P. (Str.).
- Jubaea** Hb., Kth. (Palmen, XXI. 6) „Mähnenpalme“, Chili-P. (v. *juba* Mähne — feinfiederige Wedel; Wtst. nach Juba, Kön. v. Numidien, schr. unter Augustus üb. Bot. u. Geogr.), Stuben I. spectabilis Hb., Kth., s. *Cocos chilensis* Molin.
- Juglandaceae** Grck., -dæe DC. Wallnussartige (zu Amentacæe DC.) s. sogl. Juglans, -ndis!
- Juglans** L. (Juglandaceen, XXI. 9) Wall- od. Welschnussbaum, eig. „Jupiter's-Nuss“ (*Jovis glans*), fr. noix od. noyer de jauge, e. walnut-tree; z. B. *J. regia* L. m. v. v., fr. noyer commun, e. royal od. common w.-n., Zierb. *J. nigra* L., fr. pacane (-nier), noyer noir, *J. cinerea* L. (*oblonga* Mill., *cathartica* Mehx.) Öl-nuss, fr. n. cendré, e. butter-nut (Amer. oil-nut), *J. fraxinifolia* Lam. (*Pterocarya caucasica* C. G. Mey.), *J. alba* L. (*Carya alba* Nutt.) Hickorynussb. etc., s. *Carÿa* Nutt.
- Jujuba** (sc. *Rhamnus*) L. (Rhamnaceen, V. 1) „Jujuba“- od. Judendorn, rote Brustbeere, fr. jujube (-bier) u. gingeole, nerprun jujubier, e. jujub (-be) (vaterl. Name!), s. *Zizyphus Jujuba* W.
- Juliflorae** Endl. Klasse der Kätzchenträger (*Ιούλιος* st. *οὐλός* Wickel etc., flōreo blühe).
- Juncaginæ** Juss., -aginacæe Rich., Grck., -cīnae Bartl., -cācēae Bartl., -cēae Rehb., -ci Juss. Binsenartige, Gras- od. Simsenlilien Rehb. (s. sogl.).
- Junceus** T., L. (Juncaceen, VI. 1) Binse Grck., Simse Rehb., Seub., fr. jone, e. bent-rush, bul-rush u. reak (v. jungo verbinde — dient zu Geflecht!).
- 1) **Jungermannia** L., Nees (Lebermoose od. Jungermanniaceen, XXIV. 3) „Jungermann's“-Moos, fr. jongermanne, carpolépide (n. Prof. Jungermann in Giessen, † 1653), z. B. *bicuspidata* L. — Jungermanniacæa Rehb. (zu *Sporangiobrya Kapselmoose* Rehb.), Jungermanniæ-“Lebermoose. 2) **J.** (sc. *Mnium*) L. (Moose, XXIV. 2) „Jungermann's“-Sternmoos.
- Juniperus** T., L. (Conifer. Juniperæe od. Cupressineen, XXII. 5) Wachholder, fr. genièvre (genevrier), e. juniper-tree (v. *juvēnis* jung u. pario gebäre — Abortivmittel: *Juniperus Sabina*! Paxton: n. d. celt. *jenepirus rauh*, steif!), *J. communis* L. m. v. v. (z. B. *suecica* Hort., *hibernica* Pyramiden-W., *eracodia* u. *pendula*), *J. Oxycedrus* L. span. od. Ceder-W., fr. cèdre piquant, cedride, e. sharp-cedar, *J. virginiana* L. Ceder-Sadebaum, s. g. rote Ceder, fr. cèdre rouge, e. red-Cedar, m. v. v., *J. lycina* L., s. g. *Olibanum* od. Weihrauch-Wachholder, fr. manne d'encens, *J. Sabina* L. Sadebaum, etc. — *Juniperæae* Rehb.
- Jurinæa** (-aea) Cass. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Kornblumen- od. Silberscharte Seub., Flockenwurz O. W. (n. L. Jurine, Prof. in Genf, † 1819), *J. cyanoides* Rehb. s. *Pollichii* Koch, etc., s. *Serratula* L.

Jussiaea St. Hil., L. (**-sieua** Pers., **-sieuea** Rottl.) (Onagrarieen, X. 1) „Jussieu's“-Kerze (n. Bernh. de Jussieu, s. d. Aut.), z. B. *peruviana* L., *racemosa* Rottl., *J. edulis* autt., s. *Antichorus* Schreb.

Justicia L. (Acanthaceen, II. 1) „*Justicie*“ (n. d. schott. Gärtn. u. Bot. J. Justice, schr. t. brit. gardener's director, 1767 u. a.), Warmh. *J. carnéa* Lindl. (Bras.), *coccinea* Aubl. (Cayenne), *speciosa* Roxb. (Peristrophe Nees) (Ind.), *J. Adhatoda* L. s. *arboréa* Ait., fr. *carmantine*, ind. *Nussb.*, s. *Adhatoda Zeylonensium* Herm., *J. americana* L., s. *Dianthéra am.* Mill., etc.

- 1) **Iva** L. (Compos. Ambrosiaceen, XXI. 5) „*Iva*“ (alt. bot. Name, urspr. *yua*, Wtst. v. abigo treibe ab, nämli. d. foetus, wie *Teuerium* s. *Ajuga Iva* L.), z. B. *annua* u. *frutescens* L., *ciliata* W., etc., s. *Ambrosia* L.
- 2) **Iva** (sc. *Teuerium*) L. (Labiat., XIV. 1) Erdkiefer, Schlagkraut, fr. ivette.

Ixia L. (Irideen, III. 1) „*Klebzwiebel*“, Abendblume Perring (v. ἥξος Mistel, Vogelleim, lat. viscum), Zier. I. *patens* Ait., *maculata* L. m. v. v. (viridiflora Lam., conica Salisb., incarnata Jacq.).

Ixiolirion Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „*Ixia-Narzisse*“ (v. *Ixia* s. eb. u. ἤστατος Lilie — d. *Ixia* sehr ähnlich), Zier. I. *Pallasii* Fisch. m. v. *tataricum* Schult. u. *Ledebouri* Fisch., Mey.

Ixora L. (Rubiac. Cinehonac., IV. 1) „*Ixorastr.*“ (Paxton v. *iswara*, eine malabar. Gotth., der d. Blumen dargebr. werden, Wtst. *isora*!), Warmh. I. *coccinea* L., *Griffithii* Bot. Mag., *odorata* Hook. (*Coffea* od. Forst.), *alba* L. (*Jasmínum indicum* Pluk.), *owariensis* Poir. (*Pavetta* ow. P.-B.).

Kadsura Juss. (Ranunculac. Anonac. od. Menispermeen, XIII. 7) japan. Kugelfaden od. Flaschenbaum (jap. Name d. Pflanze), K. japonica Dun., s. *Uvaria* Jap. (*Sphaerostéma*, fehlerh. -stemma Blum. — d. Staubfäden unten zu ein. Kugel vereinigt).

- 1) **Kaempferia** Spr. (-ia W., Pers., -phria L.) (Scitamineen, I. 1) „*Kämpferie*“ (n. d. Bot. Kämpfer), K. *Galanga* L. Galgant = *Alpinia Gal.* Sw. (*Caiceolus Philippensis* Petiv.), K. *rotunda* L. Veilchen-Gewürzlilie.
- 2) **Kaempferia** Houst. (Verbenaceen, IV. 1) Kämpfer's-Schnittblume, s. *Tomex verbenacea* Sw.

Kageneckia Rz. Pv. (Rosac. Spiráceen, XXIII. 2) „*Kageneck's“-Spiräe* (n. d. Graf. Friedr. Kageneck, österr. Gesandten in Madrid), K. *lancoleta* u. *oblonga* Rz. (Bäume), *glutinosia* Kth. (*Lydaea Lyday* Mol.) klebstige, etc.

Kalanchoë Adans. (**Kalench.-** Haw.) (**Cal.-**) (Crassulaceen, X. 1) „*Kalanchoë-Dickblatt*“ (chines. N. d. Pfl. calankōč, Wtst.), K. *aegyptica* DC. (*Cotylédon nudicaulis* L., Vahl), s. auch *Verēa* W. u. *Crassula* L.

- 1) **Kali** T., Scop. (sc. *Salsola*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) gem. Salzkraut (Kali, eine alkalische Salzbase, Chemie), s. *Kali Tragus* Scop. 2) **Kali** folio graminēo Loes. (Chenopodiaceen, V. 2 od. I. 2), s. *Corispermum intermedium* L. „Wanzensamen“. 3) **Kali** *curassavica* procumbens Pluk. (Portulacac., X. 1), s. *Trianthema monogynum* L. „eingriffel. Dreiblume“.

Kalmia L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) „*Kalmie*“ (n. Pet. Kalm zu Åbo in Finnland, Linné's Schüler), Zier. K. *latifolia* L., e. calico-flower, *angustifolia* L. (*Chamaedaphne sempervirens* Catesb.), e. (in Amerika) sheep-laurel.

Kandelia DC. (Rhizophoreen, XI. 1) Wurzel- od. Leuchterbaum (malab. kandel, lat. candela Leuchter — weg. d. langen, lederartigen, lang hängenbleibenden Früchte vom Ansehn ein. Kronleuchters!), s. *Rhizophora Candel* L.

- Karatas** Jacq. (sc. *Bromelia*) L. (*Bromeliaceen*, VI. 1) „Karatas“-*Ananas*, Karat-Aloe, fr. karatas (in Brasil. *karaquata-acanga*).
- Kataf** Forsk. (sc. *Amýris*) L. (*Terebinthac. Amyrideen*, VIII. 1) arabischer Balsam (arab. kataf!).
- 1) **Kaulfussia (-fusia)** Nees (*Compos. Astereen*, XIX. 2) „Kaulfuss“-*Aster* (n. d. Prof. Kaulfuss z. Halle, † 1830), Zier. *K. amelloides* Nees (*Charieis heterophylla* Cass.) s. *Neesii* Hort. m. v. v. 2) *K. Blum.* (*Mesodmeen-Farne*, XXIV. 1) „Kaulfuss“-*F.*, s. *Aspidium aesculifolium* Blum.
- Kennedyā (-dia)** Vent. (*Legumin. Phaseoleen*, XVII. 4) „Kennedystrauch“ (n. d. Zücht. Kennedy, Firma Lee u. Kennedy in Hammersmith, schr. m. Lee Catal. of pl. and seeds, Lond. 1774), Treibh. *K. bimaculata*, *coccinea*, *rubicunda* Vent., *macrophylla* ds., *cordata* Ldl., etc., s. Glycine L.
- Kentia** Blum. (*Palmen*, XXI. 8) „Kent's“-*P.* (n. d. Miss Kent, schr. *Sylvan sketches*, Lond. 1825), z. B. *K. sapida* Mart. (*Arēca* s. *Sol.*), Zier. *K. Canterburyana* Bull.
- Keraudrenia** Gay (*Büttneriaceen*, V. 3) „Keraudrenie“ (n. Cl. Keraudren, Marine-Generalarzt, Pfeiffer), z. B. *K. hermanniaefolia* Gay (Str. Neuhol.).
- 1) **Kernēra** Med. (*Cruciferen Siliculosen*, XV. 1) „Kerner's“- od. *Felsen-Löffelkraut*, *Stein-Löffelkr.* Seub., *K. saxatilis* Med. (*Cochlearia sax.* od. *Camelina* u. *Myagrum*) (n. d. Bot. J. S. Kerner). 2) **Kernēra** W. (*Potamogeon* od. *Fluvialen*, I. 1), *K. oceanica* W. (*Zostera* oc. L.), s. *Caulinia* Pers. u. *Posidonia* Kön. „Kerner's“-*Seegras*. 3) **Kernēria** Mnch., Cass. (*Compos. Heliantheen*, XIX. 3) „Kerner's“-*Zweizahn*, s. *Bidens* T.
- Kerria** Lk. (**Keria** DC.) (*Rosac. Potentilleen* od. *Tiliaceen*, XIII. 1) „Kerrie“ („Kerie“), japan. *Ranunkelstr.* Gold- od. *Nesselöschen*, *Judenpappel* Leun. (n. d. engl. Bot. John Bellender-Ker, s. d. Aut., od. n. W. Kerr, Samml. für d. Kew-Gärten, Rümpl.), Zierstr. *K. japonica* L. m. v. v. (z. B. fl. *pleno* Hort.), s. *Corchorus japonicus* L., Thb. (*Rubus* j. autt.).
- 1) **Ketmia** T., Scop. (*Malvaceen*, XVI. 8) „Ketmie“, fr. *Ketmie* (Name in Syrien), Zier. *K. rosæa* Hort. (*Hibiscus rosæus* Thor.), s. g. *Festblume*, fr. *fleur de sabale*, *K. liliiflora* Hort. (*Hibisc. lil.* Cav.), s. g. *Ludwigsblume*, fr. *fleur de St. Louis*, *K. syriaca* Scop. (*Hibisc. syr.* L.) syrischer Eibisch (veralt. *Ketmie*, Rümpl.), *K. Trionum* Scop. „*Stundenblume*“ (*Hib. Tr. L.* etc.). 2) **Ketmia** folio quinque-fido Burm. (*Sterculiaceen*, XVI. 8), s. *Bombax gossypinum* L. „Baumwollenbaum“.
- Khaja (-ya)** A. Juss. (*Hesperideen Meliaceen*, X. 1) afrikan. Mahagoniholz (vaterl.!), *Kh. senegalensis* A. Juss.
- Khutrow** (sc. *Abies*) Loud. (*Coniferen Abietineen*, XXI. 9) „Smith's“-od. *Khutrow“-Fichte*, fr. *sapinette de l'Himalaya*, *Epicéa pleureur*, e. *Kh.-spruce-fir*, s. *Abies Smithiana* Lindl. (*Pinus Kh.* Royle s. *Smithiana* Wall. und *Picea Morinda* Lk. (vaterl.).
- Kielmeyera** Mart. (*Ternstroemiac. od. Guttiferen*, XIII. 1) „Kielmeyer's“-*Glanzblatt*, s. g. *Drehstamm* (n. d. Staatsrat K. v. Kielmeyer in Stuttgart, † 1844), *K. speciosa* M., s. *Bonnetia Schreb.*
- Kieseria** Reinw., Nees (*Ternstroemiac. Theaceen* od. *Guttiferen*, XIII. 1) „Kieserie“ (n. d. Prof. d. Med. D. G. Kiefer in Jena), *K. sericea* Rw., *stricta* Nees (*Bonnetia str. Mart.*) etc.
- Kigelia** DC. (*Bignoniaceen*, XIV. 2) „Kigelie“, s. g. *Götzenholz* (malabar. *kigeli-keia*, Wtst.), *K. pinnata* DC. (Afrika).
- Kiggelaria** L. (*Capparideen Flacourtieen* od. *Terebinthaceen*, X. 5 od. XXII. 9) „Kiggelarie“ (n. d. holländ. Bot. Francis Kiggelaar, schr.

- Phytographia curiosa Amsterd.* 1702), *K. africana* L. (B.) u. *integri-folia* autt. (Str. Cap.).
- Kinkina** Adans., s. *Cinchona* L. (vaterl.).
- Kirganelia** Juss. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „*Kirganelie*“ (v. *kirganeli*, Nam. d. Pf. auf d. Malabarküste), K. s. *Urinaria indica* Burm. (*Kirganeli* Rheed.), *K. virginica* Juss. (Str.), s. *Phyllanthus Kirganelia* W.
- Kitaibelia** W. (Malvaceen, XVI. 8) „*Kitaibel's*“-Malve (n. d. Prof. P. Kitaibel in Pest, † 1818), Zier. *K. vitifolia* W., e. vine-leaved K., fr. *Kitaibélie à feuilles de vigne*.
- Kittelia** Rehb. (Lobeliaceen, XIX. 6) „*Kittel's*“-Lobelie (n. M. Kittel, s. d. Aut.).
- Klaprothia** Hb., B., K. (Loasaceen, XIII. 1) „*Klaproth's*“-Brennwinde (n. d. Nat. Klaproth, schr. Beitr. z. chemisch. Kenntnis d. Mineral-körper, 6 Bde. 1795—1815), K. *mentzeloides* H. B. K., s. *Guapurium herbacéum* Spr.
- Klattia** Bak. (g. n.) (Irideen, III. 1) „*Klatt's*“-Schwertlilie (n. F. W. Klatt, s. d. Aut.), K. *partita* Bak.
- Kleinia** L. (zu *Cacalia* L.) (Compos. Baccharideen, XIX. 1) canarische Pestwurz M.-Rehb. (n. d. Bot. J. H. Klein), Zier. *Cacalia Kleinia* L., Kl. *articulata* L. „gliederstengl.“, *ficoides* Haw., *fulgens* Hook. etc.
- Klopstockia** Karst. (Palmen, XXI. 5) „*Klopstock's*“-Wachspalme (n. d. deutsch. Dicht. Klopstock), Kl. *cerifera* Karst. u. *Quinduensis* ds. (*Columbia* im Südam.), s. *Ceroxylon* Hb., Bpl.
- Klotzschia** Cham. (Umbelliferen, V. 2) „*Klotzsch's*“-Dolde (n. d. Bot. Klotzsch in Berlin).
- Klugia** Schldl., Endl. (Gesneriac. od. Bignoniac. XIV. 2) „*Klugie*“ (n. Friedr. Klug, schr. Bücher-Verz. d. Gesellsch. naturf. Freunde in Berlin, 1828), Treibh. Kl. *azuréa*, Warmh. *zeylanica* Schdl.; *Klugia* Endl. s. *Didymocarpus* W., *Klugia* A. Juss. s. *Loxonia* Jack *discolor* u. *hirsuta* Jack (Sumatra).
- Knappia** Sm. (Gräser, III. 2) „*Knapp's*“-Gras (n. J. L. Knapp, Verf. d. brit. Gräser), K. *agrostidea* Sm., s. *Mibora verna* Adans.
- Knautia** Coulт., L. (Dipsaceen od. Aggregaten, IV. 1) „*Knaut's*“-Grind-rose, Ackersternkopf, Kleppel O. W. (n. d. Arzt Christoph Knaut z. Halle, † 1716), Kl. *arvensis* Coulт. (*Scabiosa arv.* L.) u. *silvatica* Dub., K. *palaestina* L. f. (*Pterocephalus brachiatus* Spr.), orientalis L. f.
- Knightia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „*Knight's*“-Silberfichte (n. d. Präsid. d. Gartenbau-Gesellsch. Thom. Andr. Knight Esq., † 1838), K. *ex-celsa* R. Br. (hoh. straff. B.).
- Kniphofia** Mnch., A. Rich. (Liliaceen, VI. 1) „*Kniphofie*“ (n. Joh. Jer. Kniphof, † 1765, schr. Lebendig Officinal Kräuterbuch, Erfurt 1733/34), K. *Quartiniana* A. Rich. s. *aloïdes* Mnch., s. *Tritoma Uvaria* Gawl.
- 1) **Knorréa** Moг. u. Sess. (Terebinthac. Burseraceen, VI. 1) „*Knorr's*“-Tere-binthenbaum (n. G. Wolfg. Knorr, schr. üb. Gartenpfl. 1770—72), s. *Hedwigia* Sw. 2) **Knoria** Sternb., Göpp. (foss. Farnpalmen, XXIV. 1) „*Knorr's*“-Schuppenbaum, s. *Lepidodendron* Brongn.
- Knowltonia** Salisb. (Ranunculaceen, XIII. 7) „*Knowlton's*“-Adonis-röschen (n. d. Curator d. bot. Gart.'s z. Eltham, Thom. Knowlton, † 1781), K. *rigida* Sal. (*Adonis capensis* L. f.).
- Knoxia** L. (Rubiac. Cinchonaceen, IV. 1) „*Knox*“-Chinastrauh (n. Rich. Knox, schr. Berichte v. Ceylon 1681), K. *scandens* P. Br. *Aegiphila elata* W.). K. *zeylanica* L. „Ceylon-Veronika“, s. *Dentellaria zeyl.* Raj., K. *brasiliensis* Spr., s. *Declieuxia herbacea* Schldl.
- Kobresia** W. (Cyperaceen, III. 1) „*Kobresie*“, Hüllsegge (n. Dr. v. Kobres in Augsburg, Förd. d. Bot., verkaufte 1811 sein Naturalienkabinet

- an d. Kronprinzen v. Baiern), K. s. *Elyna Schrad.*, *caricina* W., s. *Carex bipartita* All. s. *hybrida* Schkuhr.
- Kobus** Banks (Magnolieen, XIII. 7) zierliche Magnolie (vaterl.), s. *Magnolia gracilis* Salisb. .
- Kochia** Roth (Chenopodiaceen, V. 2) „*Kochie*“, Pfriemenblatt, Staudich O. W. (n. d. deutsch. Floristen W. Dan. Koch, Prof. z. Erlangen, † 1849), K. *scoparia* Schrad. (*Chenopodium scop.* L.), s. g. Studentenkraut Rmpl.
- 1) **Koeleria** (-ia) Pers. (Gräser, III. 2) „*Koeler's*“-Kammgras, Kamm-schmiele, Ritschgras O. W. (n. G. L. Koeler, Prof. in Mainz, schr. *Descr. graminum etc.*, 1802), K. *cristata* Pers. 2) *Koeleria laurifolia* W. (Menispermaceen, XXII. 4) „*Koeler's*“-Mondsamenbaum, s. *Limacia Becc.* (B. St. Domingo).
- Koelpinia** Pall. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „*Kölpin's*“-Milche (n. Al. Bernh. Koelpin in Greifswald, Pallas' *Zeitgenossen*, schr. üb. d. sibir. Schneerose 1779), K. *linearis* Pall., s. *Lampsana* s. *Rhagadiolus Koelpinia* L.
- 1) **Koelreuteria** Spr. (-ia Laxm.) (Sapindaceen, VIII. 1) *Koelreuter's*-Gelbrispenbaum (n. d. Prof. Joh. Koelreuter in Karlsruhe, † 1806), Zierb. K. *paniculata* Laxm. s. *Paullinioides l'Hér.*, fr. savonnier *paniculé*, e. panicle-flowered K., s. *Sapindus chinensis* L. 2) *Koelreuteria hygrometrica* Hedw., s. *Funaria* h. Hedw. (Moose, XXIV. 2).
 - 1) **Koenigia** Comm. (Büttneriaceen, XIV. 2) „*Königie*“ (n. d. dän. Nat. u. Reis. Joh. Gerh. König) (schwerl. Paxton: n. d. Schweiz. Math. Sam. König!). 2) **Koenigia** L. (Polygonaceen, III. 3), z. B. K. *islandica* L., *nepalensis* Don.
- Kohlrauschia** Kth. (Caryophylleen, X. 2) „*Kohlrausch*“-Nelke (n. d. Pädag. u. Geschichtsschr. Kohlrausch in Hannover, † 1867? od. Physiker Kohlrausch in Erlangen, † 1858? ungew.!), K. *prolifera* Kth., s. *Dianthus prolifer* L. (Tunicae prol. Scop.)
- 1) **Kolbea** Schldl. (Melanthac. od. Juncaceen, VI. 3) „*Kolbe's*“-Giftlilie (n. d. Reis. M. B. Kolbe, schr. Beschr. d. Vorgeb.'s d. Guten Hoffn. u. d. Hottentotten, Frkft. 1745), K. *elegans* P.-B., *Brenniana* Schldl. (*Tulipa* Br. L.). 2) *Kolbia* P.-B. (Passifloreen, XVI. 2) (n. d. Nam. Kolb).
- Koniga** R. Br. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Meerstrands-Steinkraut, K. *maritima* R. Br. (n. Charl. Konig, Insp. d. brit. Museums, mit Sims 1805—1806 *Annales of Botany*), s. *Alyssum mar.* L., Teppichg. K. *variegata* Hort., etc., s. *Adysetum* (-on) Adans., *Glyce* u. *Farsetia libyca* Spr.
- 1) **Kopsia** Blume (Apocyneen, V. 1) „*Kopsie*“ (n. d. Prof. Kops, m. Van Hall, Miquel etc. Verf. d. Fl. batava, fig. col. etc. Amsterd. 1800—1860). 2) *Kopsia* Dumort. (zu *Orobanche* Rehb.) (Personaten Orobancheen, XIV. 2), z. B. *coerulea* Vill., *arenaria* Borkh. etc.
 - 1) **Kosteletzkya** Presl (Malvaceen, XVI. 6) „*Kosteletzky*“-M., z. B. *hastata* Pr. (s. d. Aut.). 2) *K. J. Eck.* (Algen, XXIV. 3).
- Krameria** Loefl. (Polygalaceen, XIV. 2 od. IV. 1) „*Kramerie*“ (n. d. öster. Arzt etc. G. H. Kramer, schr. elenchus vegetab. et animal. per Austriam inferiorem etc. Viennae 1756), z. B. *triandra* Loefl. (peruvian. ratanhia), s. *Ixina* L. (Str. Amer.).
- 1) **Krockeria** Mnch. (Legumin. Loteen, XVII. 4) „*Krocker's*“-Klee (n. d. Bot. A. Krocke, schr. Fl. Silesiaca etc.), K. s. *Lotus oligoceros* Mnch. 2) **Kr.** Neck. (Anonaceen, XIII. 6).
- Kuhnía** L. f., Schreb. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „*Kuhn's*“-Wasserdst (n. Adam Kuhn, Linné's Schüler), K. *Critonia* W. s. *Dalea eupatorioides* L. (*Eupatorium alternifolium* Ard.), s. *Critonia* P. Br., *Kleinia* L. u. *Jaumea* Pers.

- 1) **Kunthia** Hb., Bpl. (Palmen, VI. 1) „Kunth's“-P. (n. d. ber. Bot. K. Sig. Kunth in Berlin, A. v. Humboldt's Freunde), K. montana H. B., xalapensis Dietr. (Chamaedorea Schiedeana Mart.). 2) **K. Dennst.** (Terebinthac. Burseraceen, X. 1), s. Garuga Roxb.
- 1) **Kunzēa** Spr. (Rosac. Prockieen od. Pomaceen, XII. 1) „Kunzee“ (n. d. Prof. Kunze in Leipzig), K. tridentata Spr. (Tigarea trid. Pursh), s. Purshia DC.

Kutelhubaea Fisch. (Rubiac. Gardenieen, V. 1) „Kutschuby's“-Gardenie (n. Kutschuby, Minist. d. Innern in Russland zu Fischer's Zeit), K. insignis Fisch.

Kydia Roxb. (Polygonaceen, VIII. 3) „Kydie“ (n. d. Colonel Rob. Kyd, Dir. d. bot. Gart. z. Calcutta), K. calycina u. fraterna Roxb.

Kyllingia L. f., W. (-ga Rottb.) (Cyperaceen, III. 1) „Kylling's“-Kopfriet (n. d. dän. Bot. P. Kylling, † 1696, schr. Viridarium danicum, 1628), z. B. monocephala L., s. Schoenus coloratus L. u. Mariscus col. Vahl.

- 1) **Labatia** Sw. (Styraceen, X. 1) „Labat's“-Storaxbaum (n. d. franz. Mönch u. Missionair J. B. Labat, † 1738 in Paris). 2) **Labatia** Scop. (Aequifoliaceen, IV. 4) „Labat's“-Stechpalme.

Labiatae Juss., DC., Rchb. „Lippenblüter“, Rachenblumige (v. labium Lippe) XIV. 1 L.

Labiataeflorae Barth., DC., Ord. d. Lippenblumigen (s. eb. u. flos, -ōris Blume) i. q. Labiatae Juss.

Lablab Savi (sc. Dolichos) L. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) gem. od. „Lablab“-Faselbohne (arab. lablab od. liblab), Zier. L. vulgaris Savi s. microcephala DC. (Dolichos purpureus Jacq.), fr. dolique d'Egypte, e. hyacinth-bean m. v. fl. alba Hort. u. albus nanus Hort., s. Lablabia Adans.

Labrusca (sc. Vitis) L. (Ampelideen, V. 1) filziger Weinstock, fr. vigne labruche od. de renard, e. wild-vine od. fox-grape „Fuchstraube“ (labrusca wilde Weinrebe, v. d. hebr. busca Wtst.), s. Vitis aestivalis Mchx. Sommerrebe v. Carolina.

Laburnum Med., DC., Mill. (zu Cytisus Rchb.) (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Goldregen, Bohnenbaum, fr. laburne od. l'aubours, faux ébenier, e. Pea-scod-tree, bean-trefoil, bean-tree, Zier. L. vulgare Gris., s. Cytisus Laburnum L., L. nigriceps L., Adami Poir., alpinum Mill. (Cyt. alp. Mill.) etc. (st. alburnum Splint, von album sc. lignum — sehr weiss. Splint u. hart. Holz, Plin.).

Lachenalia Jacq., L. (Liliaceen, VI. 1) „Lachenal's“-Hyazinthe (n. Werner de Lachenal, Prof. d. Bot. z. Basel, † 1800), Warmh. L. orchioides Ait. (Phormium s. Hyacinthus orch. L. f.), tricolor, quadricolor, uniflora, etc.

Lacis Schreb. (Podostemeen, XIII. 2) „Schlitzblatt“ D. (gr. λαζίς Fetzen — geschlitzte Blätter u. Blütenscheide), z. B. foeniculacea Schr. (Marathrum foen. Hb.) s. g. Passecarne-Gemüse v. Neugranada „übertrift Fleisch“), fluviatilis W. (Mourera fl. Aubl.) etc.

Lacistēma Sw., W. (Urticac. od. Myricaceen, II. 3) „Schlitzfaden“, Gagelpfeffer D. (s. eb. u. στριμων' Staubboden, lat. stamen — diese zweiteilig), L. piperoides W. (Piper aggregatum Berg.) (Str. Jamaica, Surin.).

- 1) **Laetūca** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Lattich“, fr. laitue, laiteron, e. lettuce, lettuce (v. lac, -ctis Milch — führt Milch in d. Gefäßen!), L. sativa L. Lattich-Salat, v. romana Hort. „Römersalat“, s. g. Sommer-Endivie (z. B. gelber Pariser, Romaine blonde maraîchère, gelber Alphange, Forellen- u. Strunksalat), v. capitata

Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

Hort. „Kopfsalat“ (z. B. Steinkopf, Eiersalat, Kopf-Montrée, Schwedenkopf etc.), v. Stech- od. Rupfsalat, s. g. Latsche, Schnittsalat, v. augustana Hort. Spargelsalat (Strunks.); wild L. scariöla L. Wild-L., virosa L. „Gift“-L., etc. 2) **Laetaea** (sc. *Ulva*) L. (Algen, XXIV. 3) Meer-Lattich, fr. laitue de mer.

- 1) **Ladänum** Alp. (nium Spach) (Cistaceen, XIII. 1) „Ladanum“-Gummi (v. d. λιδος - Strauch gesamm. Harz = ladänum), L. creticum Alp., s. Cistus cret. L. u. ladaniferus L. 2) **Ladanum** (sc. Galeopsis) L. (Labiaten, XIV. 1) schmalblättr. Hohlzahn, s. Galeopsis angustifolia Ehrh.
- 1) **Laelia** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Lälia“-O. (Laelius, römischer Geschlechtsname), z. B. grandiflora Ldl. (Mex.). 2) **Laelia** Adans. (Cruciferen Buniadeen, XV. 1) Zackenschote, L. cochlearoides Pers. (Bunias cochl. L.), s. Calepina Corvini Desv.

Lagenaria Ser. (Cucurbitaceen, XXI. 9) „Flaschenkürbis“, s. g. Calabasse, fr. gourde-calabasse u. coui od. courge-bouteille, e. bottle-gourd od. large-american-gourd (v. λάγηρος, lat. lagēna Flasche, weitbauchige mit engem Hals), Zier. L. vulgaris Ser. (Cucurbita Lagenaria L. s. leucantha Duchesn.) m. v. Gurda Ser. Pilgerflasche, fr. gourde de pélérin, L. v. Cugurda L. Heberkürbis, fr. gourde siphon od. courge en entonnoir, v. clavata Ser. Herkuleskeule (L. clavaeformis Hort.), v. pyrotheca Sw. Pulverflasche, fr. gourde poire à poudre, e. powder-horn, v. depressa Ser., v. longissima Hort., fr. g. massue-très-longue.

Lagerstroemia L. (Lythrareen, XIII. 1) „Lagerstroem's“-Baum (n. Magn. v. Lagerstroem, Dir. d. ostind. Kompagnie z. Gothenburg in Schweden, † 1759), L. regina Roxb. prachtvoller L., L. grandiflora Roxb. (Duangang gr. Kurz).

Lagetta Juss. (Myrobalaneen, VIII. 1) Leinwand- od. Spitzbaum Leun., Schnurrenrinde (Nam. d. B.'s in Jamaica lagetto), L. funifera Mart. u. linteraria Lam. (Archipel), s. Daphne brasiliensis Raddi, etc.

Lagoezia L. (Umbelliferen, V. 2) Hasenkümmel, „-haus“, Federknopf D. (v. λαγως Hase, οῖος Haus — Samen in Wollhüllen, wie kl. Häschchen!), L. cuminoides L. (Cumimum sylvestre Bauh.).

Lagopodium Ser. (zu Trifolium Rehb.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) „Hasenpfötchen“ (s. eb. u. ποδίον dem. v. πούς, πόδος Fuss, Socke — Aussehn d. zott. Köpfchen!), s. Trifolium arvense L.

Lagopus Ser. (Leguminos. Trifolieen, XVII. 4) „Hasenfuss“, -pfötchen i. q. Lagopodium! (s. eb.).

Lagoséris Lk., M. B. (zu Barkhausia Rehb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Hasensalat“ (s. v. u. σέσις Salat), L. taraxacoides Lk. etc., s. Crepis u. Barkhausia Mnch.

Lagunaea Cav., Schreb. (Malvaceen, XVI. 8) „Laguna's“-Malve (n. d. span. Arzt u. Bot. d. 16. Jahrh.'s Andr. Laguna), L. aculeata Cav. (Hibiscus Solandra l'Hér. s. Solandra lobata Murr.).

Lagunaria DC., Endl. (Malvaceen, XVI. 8) „Lagunamalvenartige“ (s. eb.), z. B. L. Pattersoni DC. (lilablüh. Prachtb.).

Lagurus L. (Gräser, III. 2) „Hasenschwanz“, Sammetgras, fr. lagurier, lagure, e. hare's-tailgrass (s. v. u. obojà Schwanz — kurze, weiche Ähre!), Zier. L. ovatus L., fr. l. à épis ovales, gros Minet, e. egg-eared-h.-t., L. cylindricus L., s. Saccharum cyl. Lam.

Laläge Lindl. (Leguminosen, XVII. 4) „Lalagestrauch“ (n. der von Horaz verewigten Lalage — prächt. Aussehen!), L. ornata Ldl. (Neuholl.).

Lallemantia Fisch., Mey., M. B. (Labiaten, XIV. 1) „Lallemant's“-Drachenkopf (n. Avé Lallemant, Adjunkt d. bot. Gartens in Petersb.), z. B. iberica M. B. (Dracocephalum ib. M. B.) (Ölpfl.).

1) **Lamarckia** Mnch. (zu *Cynosurus* Rehb.) (Gräser, III. 2) Goldschwanzgras (n. d. Prof. J. B. de Lamarck in Paris, † 1829), Zier. L. aurēa Mnch. (*Cynosurus aur.* L.), fr. Lamarckie dorée. 2) **Lamarckia** Rich. (-ckeia Pers.) (Solaneen, V. 1) „Lamarck's“-Stechapfel, L. coccinēa s. *glaberrima* Rich., s. *Datura* L. 3) **Lamarckia** Bursa Olivi (Tange, XXIV. 3), s. *Codium* Bursa Ag.

Lambertia Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Lambert's“-Silberstrauch (n. d. Bot. Aylmer Bourke Lambert Esq.), L. formosa Sm. (Str. Neuholle).

Laminaria Lamx. (Leder-Tange, XXIV. 3) Riemen- od. „Blatt“-Tang (lamīna Blech, Blatt), z. B. *esculenta* Lamx., *digitata* Lamx. etc. — *Laminariēae* Ag. „Blatt-Tange“.

Lamium L. (Labiaten, XIV. 1) Taubnessel, Bienensaug, Saug O. W., fr. lamion (-mier), oeil de chat, e. archangel, dead-nettle (blind-) (v. λάμιος Schlund od. Λαυτία fabelh. Ungeheuer, Haifisch — aufger. Rachen!), L. album L., fr. lamier blanc, piēd-de-poule, L. maculatum L. rotes Bienenhütel etc.

Lamprophyllae Bartl., DC. „Glanzblattgew.“ (λαμπρός glänzend, φύλλον Laub).

Lamprostachys Boj. (Labiaten, XIV. 1) „Glanz-Ziest“ (s. eb. u. *Stachys* Ziest, v. στάχυς Ähre — schöne, glänz. Endtraube).

Lampsāna T., Vaill. (*Lapsāna* L.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Rainkohl, Hasenlattich, Milche Grck., fr. lampsane, herbe aux ragades „Rainkr.“ (gr. λαυρώνη u. λαυράνη v. λαυράνω purgiere).

Lanaria Ait., Thb. (Amaryllideen, VI. 1) „Woll“-Hyazinthe, Filzlilie (v. lana Wolle — Blume u. Fruchtknoten filzig), L. plumosa Ait., s. *Hyacinthus lanatus* L. (Argolasia Juss.).

Lansium Blum., Rumph. (Hesperideen Meliaceen, X. 1) echter „Lansabaum“ Leun. (wahrsc. vaterl. Name zu Grund liegend), L. domesticum Jack (Cipadessa fruticosa Blum., Str. Molukken), L. montanum Jack (Milnaea m. Roxb.) (Str. Sumatra).

1) **Lantāna** L. (Verbenaceen, XIV. 2) Schneeball-Verbene, s. g. Wandelröschen Rmpl., fr. lantanier (nicht v. lana Wolle, sondern Wtst. v. lentare biegen), Zier. L. hybrida Hort. Blendling von L. Camāra L., L. nivēa Vent., crocēa Jacq. (— Ähnlichk. m. Viburnum!). 2) **Lantāna** (sc. Viburnum) L. (Lonicereen, V. 3) filziger Schneeball, gem. Schlinge, Bandstrauch u. Pabstweide Rmpl., fr. hardeau od. mancienne (-sienne, mentiane), e. way-faring-tree od. wild guelder-rose.

Laodicēa s. Lodoičea Comm.

Lapächys Torr. u. Gr. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Drummond's Rudbeckie, schönste Obeliskenblume, s. Rudbeckia Drummondi Hook. = *Obeliscaria pulcherrima* DC. (v. λαπάχω höhle aus u. laxiere?).

Lapageria Rz. Pv. (Smilaceen, XXII. 6) „Lapagerie“, Warmh. L. rosēa R. P. (n. d. Nam. Tascher de la Pagerie, d. Familiennamen d. Kaiserin Josephine, Dietr. u. Wtst.: n. d. Bot. Jos. Lapagerie).

Lapáthum T., Scop., Lam. (zu *Rumex* Rehb.) (Polygonaceen, VI. 3) Zwitterblüt-Ampfer (gr. λάπαθον Ampfer v. λαπάζω purgiere), z. B. R. *Hydrolapáthum* Huds. Fluss-A., *Nemolapáthum* Ehrh. sc. conglomeratus Murr.

1) **Lapeyrousie** Gawl., Pourr. (-peirousia autt.) (Irideen, III. 1) „Lapeyrouse's“-Schwertel (n. d. Bot. La Peyrouse), z. B. L. abyssinica Bak. (Geissorrhiza ab. R. Br.) „Schindelwurzel“, bracteata Thb. (Gladiolus br. Thb.). 2) **Lapeyrousie** Thb. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 3), calycina Thb. (Osmites cal. L. f.).

Laplačea H. B. K. (Ternstroemiaceen, XIII. 5) „Laplace's“-Baum (n. d. berühmt. Math. etc. Laplace), L. speciosa Kth. (Südam.), inaequalitātera Schott (Gordonia semiserrata Spr. — nur zur Hälfte gesägte Blätt., daher „ungleichseitig“!).

Lappa T. (sc. *Arctium*) L. (Composit. Carduaceen, XIX. 1) Klette, fr. cousins, e. base-rocket (lat. *lappa* v. d. celt. *llap* Hand, gr. *λάπιω* ergreife — wegen d. häckrigen Kelchschuppen!), *L. major* G. (Arct. *Lappa* L.), *L. minor* DC. (*glabra* Lam.), *tomentosa* Lam. (Arct. *Bar-dana* W.) etc.

Lappago Schreb. (Gräser, XXIII. 1) „Kletten“- od. Stachelgras (s. eb. — stachlig gefranste Kelchspelzen), z. B. *L. racemosa* Schreb., s. *Cenchrus rac.* L. u. *Phaläris muricata* Forsk.

- 1) **Lappula** Mnch. (sc. *Myosotis*) L. (Boragineen, V. 1) „Klettchen“- od. Stachelsamen-Vergissmeinnicht (dem. *lappa* Klette — Klettenfrüchte!).
- 2) **Lappula** L., DC. (Tiliaceen, XI. 1) (sc. *Triumfetta*) Jacq. (— hängige Kapseln).

Lapsana T. s. *Lampsana* T., Vaill.

Larbréa St. Hil. (zu *Stellaria* Rehb.) (Alsinaceen, X. 5) Wasser-Sternmiere, -Weichling Grck.. -Hornkr. (n. d. Abbé de l'Arbre, schr. Fl. de l'Auvergne, 1795), *L. aquatica* St. Hil. = *Malachium aq.* Fr. (*Cerastium aq.* L.).

Lardizabala Rz. Pv. (Menispermac. od. Berberideen Lardizabaleen, XXIII. 2) „Lardizabal's“- Schlingstr. (n. d. span. Nat. Mich. Lardizabal y Uribe), *L. bi-* u. *triternata* R. P. (Chili), s. *Boissieria trit.* Domb. — *Lardizabalæae* DC. (zu *Berberidæae* DC.).

Laricio Poir. (sc. *Pinus*) L. (Coniferen, XXI. 9) „Lärchenkiefer“, Meerstrands- od. corsische Kiefer Rmpl., fr. *pin de Corse*, e. corsican od. larch-pine, s. *Pinus maritima* Mill. od. *sylvestris* v. *marit.* Ait. (v. *larix*, -*icis* Lärche).

Larix DC. (sc. *Pinus* L., sc. *Abies* Poir.) (Coniferen, XXI. 9) „Lärche“, fr. méléeze, e. larch-tree (larsh, larynx-tree) (lat. *larix*, -*icis* Lärche), wild u. Zier. *L. decidua* Mill. s. *europaea* DC. (*excelsa* Lk., *vulgaris* Fisch.) m. v. *pendula* Hort., *L. americana* Mchx. (*pendula* Salisb., *microcarpa* Poir., *Pinus laricina* Dur. etc.), fr. mél. d'Amérique, e. american larch, *L. davurica* Turcz., sibir. Ceder, Lärche v. Dahurien in Sibir., etc.

Larochéa Pers. (Crassulaceen, V. 5) „Laroche's“ od. schönrotes Dickblatt (n. d. Genfer Arzt u. Bot. Franç. Laroche, schr. üb. *Ixia* u. *Gladiolus*), Topfbl. *L. coccinea* Pers. (Crassula c. L., Dietrichia c. Tratt.); s. *Rochea* DC.

Laserpitium T. (Umbelliferen, V. 2) Laserkraut, fr. laser, sermontaine, e. lazer-wort (laser-) (gr. *λάσαρον* i. q. *Σλάζτορ*, eine Arznei- od. Speisepfl., u. pix, -*icis* Pech etc., Wtst. *πτυτός* tröpfle), z. B. *latifolium* L., *Siler* L. etc.

Lasiagrostis Lk., Kth. (Gräser, III. 2) „Rauhgras“ (*λασιώς* rauh etc., *ἄγρωστης* Feldgras — d. Kronspelzen rauhhaarig), s. *Stipa splendens* s. *Calamagrostis* Wahlbg. (Calamagr. speciosa Host, *Arundo spec.* Schrad.).

Lasiandra DC. (Melastomaceen, X. 1) „Zotten-Staubfaden“ (s. eb. u. *ἄρνιο*, -*δος*; Mann, Staubfaden — diese meist behaart), Winter-Topfbl. *L. Fontanesiana* DC., *coerulea* (Melastoma coer. Hort.), *lepidota* Naud., *macrantha* Lindl., etc.

Lasiopetalum Cass., Sm. (Büttneriaceen, V. 1 od. XVI. 7) „Woll-Blumenblatt“ (s. v. u. *petalum* gr. *πέταλον* Kron- od. Blumenblatt — diese unten rostfilzig), Treibh. *L. parviflorum* Rudg. (Str. Neuhol.), *ferruginéum* Andr., *arborescens* Ait. (*Gaya platyphylla* Spr.), *purpurea* Sims (*Thomasia p.* Gay) etc.

Lastila Alfld. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Haarflocken“- Platterbse (*λασιώς* zottig, *τύλος* Flocke), *L. hirsuta* Alfld. = *Lathyrus hirs.* L. **Lastraea** Presl (-*streæa* Bory St. Vinc.) (Farne, XXIV. 1) „Delastre“-

Farn (n. C. J. L. Delastre, schr. 1835 üb. d. Veget. d. Depart. de la Vienne), Zier. L. patens Presl (eleg. Grosswedel).

Latania Comm. (Palmen, VI. 1) Schirmpalme (fr. u. ind. latanier nach vaterl. Namen!), Warmh. L. borbonica Lam., fr. latanier rouge (cléophore), s. Livistonia s. Corypha chinens. Mart. (Ins. Bourbon od. Mauritius).

Lathraea L. (Orobancheen, XIV. 2) „Geheim“-Schmarotzer, Schwammkraut, Schuppenwurz, fr. clandestine od. herbe cachée u. écaleuse, L. squamaria L., fr. auch herbe à la matrice (*λαθραῖος* heimlich), s. Orobanche L.

Lathyris (sc. Euphorbia) L. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) kreuzblättr. Wolfsmilch, Spring- od. Maulwurfskraut M.-Rchb., fr. catapuce (gr. *λαθυρίς* v. *λα* sehr u. *θύρω* heile od. *θουρός* heftig — Samen stark purgierend).

Lathyrus L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Platt- od. Blatterbse, fr. gesse, e. chickling - vetch (gr. *λαθυρός*, Paxton *λα* als Augment od. selir, *θυρός* hitzig — früher als *Αφροδισιακον*, Wst.), Saaten L. tuberosus L. Erdmandel od. -nuss, fr. suron, gesse-tubéreuse, magon (macusson, mégusson, minson), e. earth-pea od. -nut, Zier. L. odoratus L., spanische Wicke, m. v. v., fr. gesse odorante od. pois de senteur, e. lady's-pea (sweet-), z. B. v. Kronprinzessin v. Preuss., L. tingitanus L., fr. gesse de Tanger, L. latifolius L. Bouquetwicke (Wolfschote) m. v. v. (albo, roseo, splendens Hort.), grandiflorus Bot. Mag. s. biflorus Raf., e. large-flowered-everlasting-pea, etc.

1) **Laugeria** Sw., Vahl (bess. *-gigeria* Spr.) (Ehretiacen od. Hydrophyll-leen, V. 1) „Laugier's“-Wasserblatt, fr. laugier (n. Laugier, schr. anal. de l'amphibole du cap de Gattes), Zier. L. odorata L. (Edechia Loefl.). 2) **Laugeria** Jacq. (*-gigeria* Rz. Pv.) (Rubiace. Guettardeen, V. 1), s. Guettarda hirsuta u. tomentosa R. S.

Lauréae Rchb. (-ri Juss., -raceae DC.) (zu Laurinæ Vent., Rchb., Ord. d. Lorbeer gew.), s. Laurus!

1) **Laurëola** (sc. Daphne) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) lorbeerblättr. Seidelbast, immergrüner S., Zindelbast, Lorbeerstaude Vilm., fr. lauréole male od. des Anglais, e. spurge-laurel, s. Thymelaea Lau-reöla Scop. (dem. v. Laurus). 2) **Laurëola** Meissn. subgen. v. Daphne (Thymel., VIII. 1), z. B. D. Laureöla u. D. pontica L.

1) **Lauro-Cerasus** T. (sc. Prunus L. s. Cerasus Lois.) (Amygdalaceen, XII. 1) Kirschlorbeer, eig. „Lorbeer-kirsche“, fr. laurier-cerise, amandier, laurier au lait, e. cherry-bay (-laurel) od. laurel-cherry (v. Laurus Lorbeer u. Cerasus Kirsche). 2) **Laurocerasus** Lauché Gruppe v. Prunus „Kirschlorbeerbäume“, z. B. Pr. Lauro-Cer., caroliniana Mill., lusitanica L.

Laurus Plin., T., L. (Lauraceen, IX. 1) Lorbeer, fr. laurier, e. laurel, bay-tree (v. d. celt. blaur d. i. schöngrün, Paxton u. Wst., letzt. auch viell. v. laus Lob — mit Lorbeer gekrönte Sieger!), Zier. L. nobilis L. edler L., L. Sassafras L. u. L. Benzoin L., Lindera Benzoin Meissn. „Benzoe-Lorbeer“ (N.-Amer.).

Lavandula L. (Labiaten, XIV. 1) „Lavendel“, fr. lavande, e. lavender od. spike (-nard) römischer Lavendel, L. Spica L. f. (v. lavo bade, wasche — beim Baden d. Römer!).

Lavatéra T. (Malvaceen, XVI. 8) „Lavatere“, Pappelrose Rmpl., Erne O. W., fr. lavatère (n. d. beiden Schweizer Ärzten etc. in Zürich Lavater, Freunden Tournefort's), Zier. L. arborœa L. Malvenbaum, fr. mauve de mer (-en arbre), e. mallow-tree, tree-like Lavatera, L. trimestris L. Dreimonats-Pappel, Sommer-P. Vilm., fr. mauve-fleuri, e. three-monthly L. m. v. fl. albo.

Lavauxia (-zia) Spach (Onagrarieen, VIII. 1) löwenzahnblättr. Nacht-

kerze, L. mutica Spach, s. Oenothéra taraxacifolia Sweet (n. Franç. Delavaux, Gründ. d. bot. Gartens z. Nîmes).

Lavoisiera DC. (Melastomac. Merianeen od. Lythrarieen, X. 1) „Lavoisiera“ (n. d. ber. Chemiker etc. Lavoisier, guillot. 1794), L. alba DC. etc. — Lavoisieræ DC. (zu Melastomaceæ Rchb.).

Lavradia Vand., Velloz. (Lauradia Spr.) (Violarieen Droseraceen, V. 1) „Lavradiosrauch“ (n. d. Marquis v. Lavradio, Vicekön. v. Brasilien), L. alpestris Mart. s. ericoides St. Hil. (Str. Bras.), elegantissima St. Hil. (Sauvagesia el. St. Hil.), etc.

Lawsonia L. (Lythrarieen, VIII. 1) Alkannastrauch (n. John Lawson, schr. Beschr. v. Carolina, Lond. 1709), L. Acronychia L. (Acronychia laevis Forst.).

Lazarölus Borkh., Med. (Pollyeria Med.) (Pomaceen, XII. 4) Pollyer od. Bollweiler-Birne, fr. poirier cotonneux, e. Bollwyler pear-tree, s. Pirus Pollyeria L. s. Bollwilleriana DC. (tomentosa Mnch., auricularis Knoop) (v. ζαρούς rauh u. Azarölus, s. d.).

Lebeckia Thb. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Lebbeck“-Mimose, fr. ébénier de l'Orient, s. Mimosa Lebbeck L. (n. d. arab. loebach), L. contaminata Thb. (Spartium cont. L. f.), cytisoides Thb. (Ebénus capensis L. f.), etc.

Lebretonia Schrank (Malvaceen, XVI. 8) „Lebreton's“-Malve (Levrettonia Schrk.) (n. F. Manuel Lebreton, schr. de botanica à l'usage d'amateurs, Par. 1787), z. B. L. coccinea Schrk. (Pavonia Schrankii Spr.).

Lecanōra Ach. (Flechten, XXIV. 3) Kuchenflechte, „Schüsselfl.“ (v. λεζάνη Schüssel etc. u. ὄγάω sehe aus — d. Scheibe anfangs concav!), z. B. L. varia, ventosa, tartarea etc.

Lechenaultia R. Br. (Goodenovieen, V. 1) „Lechenault's“-Goodenovie (n. d. franz. Reis. Lechenault de la Tour), z. B. Warmh. L. formosa R. Br., grandiflora DC. (biloba Lindl.), multiflora Lodd. etc.

Lecythidæ Rich. (zu Melaleucacæ Rchb.) Topfbaumgew. Leun., s. sogl. **Lecythis** Loefl. (Melaleucac. Lecythideen, XIII. 1) „Topfbaum“, Topf-fruchtbaum (v. λέζυθος od. λέξος, -εος Topf — d. Frucht gleicht einem bedeckelten Topf!), L. Ollaria L., fr. marmite de singe (Jacapucaya Marcgr.), L. bracteata W. (Coutoupita guian. Aubl.).

1) **Ledebouria** Roth (Sarmentac. od. Smilaceen, VI. 1) „Ledebour's“-Hyazinthe (n. d. Prof. Ledebour in Dorpat, s. d. Aut.), L. hyacinthina Roth (Erythronium indicum Rott.). 2) **Ledeb.** Lk. (Umbelliferen, V. 2), Ledebour's od. taurische Bocksdolde, L. pimpinelloides Lk. (Tragium tauricum Ledeb.).

1) **Lēdon** Clus. (Ericaceen, X. 1) i. q. Lēdum L. Porst (gr. λῆδος lat. Lēdum, Porststrauch), z. B. L. latifolium Clus. = Kalmia latifolia L. 2) **Lēdon** (sc. Cistus) Lam. (Cistaceen, XIII. 1), s. Ledonia Dun. mittelländ. Cistrose, Ladanum-Gummistrauch, s. Cistus ladaniferus Monspeliensem Duham.

Lēdum L. (Ericaceen, X. 1) Porst od. Porsch, Knie-Porst, wilder Rosmarin, fr. lédon u. romarin de Bohème od. sauvage, e. sweet-willow (-gale), s. g. niederländ. Myrte (gr. λῆδος, Ladanum-Strauch), Zier. L. palustre L., fr. lédon des marais, s. g. Bienenheide Vilm., Motzenkraut Rmpl., Wanzenkr. Leun., Brauerkr. Vilm., fr. auch herbe aux punaises.

Leea L. (Ampelideen od. Hesperideen Leeaceen, V. 1) Wasserrebe (n. Jam. Lee, Gründ. d. Hammersmith-Züchterei, † 1795), L. sambucina L., javanica Blum. (Staphylæa indica Burm. u. Aquilicia Cav.), L. spinosa Spr., s. Aralia chinens. L. — Leeacæ (sc. Hesperidæ) Rchb.

- Leersia** Sm., Soland. (Gräser, III. 2) „Leersie“ od. Reisgras (-quecke), L. oryzoides Sm. deutsch. Reis Rmpl. (n. d. Univ.-Apoth. Joh. Dav. Leers zu Herborn, † 1774), s. Oryza clandestina A. Br.
- Legnōtis** Sw., W. (Rhizocarpeen od. Elaeocarpeen, XIII. 1) „Bortenohr“, Saumblume Dietr. ($\lambda\acute{e}\gamma\eta$ od. -rov Borte, $\omega\tilde{\nu}$, $\omega\tilde{\tau}\sigma$ Ohr — gefranst. Kronsaum), z. B. elliptica Sw. u. L. Cassipourea Sw. (Cassipouréa guian. Aubl.).
- Leguminosae** Juss., DC., Endl., Rehb. Kl. od. Ord. d. Hülsenpfl. (v. legümen, -inis Hülsenfrucht).
- Leicesteria (Leye-.)** Wall. (Rubiaceen, V. 1) „Leycesterstrauch“ (v. W. Leycester, Ober-Richter in Bengalien, eiffr. Beförd. d. Gartenbaus), L. formosa Wall.
- Leimanthium** Mchx., W. (Melanthac. od. Juncaceen, XXIII. 1) „Wiesenblume“ ($\lambda\acute{e}\mu\omega\acute{r}$ Wiese, $\ddot{\alpha}\acute{r}\vartheta\iota\omega\acute{s}$ dem. v. $\ddot{\alpha}\acute{r}\vartheta\omega\acute{s}$ Blume), z. B. laetum, pellucidum W. etc., s. Melanthium u. Veratrum.
- 1) **Leiocarpum** DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Glattfrucht“-Rebhuhnlatteich ($\lambda\acute{e}\iota\omega\acute{s}$ glatt, $\omega\alpha\omega\acute{\tau}\omega\acute{s}$ Frucht — Achenien glatt), s. Perdicium L. 2) **Leiocarpus** Blum. (Euphorbiaceen, XI. 9). 3) **Leiocarpus** DC. (Myrobaleen, X. 5) (zu Anogeissus Wall.).
 - 1) **Leiochilus** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Glattlippe“ (s. eb. u. $\chi\acute{e}\iota\lambda\omega\acute{s}$ Lippe).
 - 1) **Leiophyllum** Pers. (Ericaceen, X. 1) „Glattblatt“, Sandmyrte Lauch. (s. v., $\varphi\acute{i}\acute{\lambda}\acute{\lambda}\acute{o}\acute{r}$ Laub — d. Blätt. beiderseits sehr glatt), L. buxifolium Ell. (Ammysrine b. Pursh, Ledium b.). 2) **L.** Miq. (Piperaceen, II. 3) (zu Artanthe Miq.) „Glanzblatt“-Pfeffer — Blätt. oben glänzend glatt, unten weichhaar.
 - Lembotrópis** Griseb. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Nachenkiel“, Schiffchenblume od. Ähren-Geisklee Rmpl. ($\lambda\acute{e}\mu\beta\omega\acute{s}$ Nachen, $\tau\acute{o}\acute{\beta}\acute{\pi}\acute{s}$ Schiffskiel — d. Carina nachenförm.!), Zier. L. nigricans Gris., s. Cytisus nigr. L.
 - Lemma** L. (Najadeen od. Lemnaceen, II. 1) Wasser- od. Meerlinse, Entenflott., -grün Leun., fr. lentille d'eau (- de marais), canillée od. lenticule, e. duck-meat (-weed), fen-lentil (gr. $\lambda\acute{e}\omega\acute{v}\alpha$ od. $\lambda\acute{e}\omega\acute{v}\omega\acute{s}$ Schale, Schuppe, od. Wtst. v. $\lambda\acute{e}\omega\acute{v}\eta\acute{s}$ Sumpfteich!), s. Hydropháce Hall. — Lemnaceae (zu Najadéae) DC.
 - 1) **Lemonia** Lindl. (Rutaceen, V. 1) „Lemon's“-Raute (n. Bar. Sir Charl. Lemon, nicht Wtst. v. $\lambda\acute{e}\mu\omega\acute{r}$ Wiese!). 2) **Lemonia** (zu Gladiolus) Pers. (Irideen, III. 1) „Lemon's“-Schwertel.
 - Lemo férus** Rumph. (Hesperid. Aurantien, XVIII. 2) wilde Lemone od. Orange (Lemo od. Limo, s. g. Pompelmuse od. Citrone).
 - 1) **Lennēa** Klotzsch u. Otto (Leguminos., XVII. 4) Lenné's-Hülsenstr. (n. d. Landsch.-Gärtn. Lenné). 2) **Lennēa** (sc. Monstera) C. Koch (Aroideen, XXI. 3) durchbrochenblättr. Baummölder, s. Philodendron pertusum Kth. u. Monstera deliciosa Liebm.
 - Lennoa** H. B. K., Llal. Lex. (Primulac. od. Lennoaceen, V. 1) „Lemon's“-Schmarotzerpfl. (n. d. Nam. Lenno), L. coerulea H. B. K. (Mex.) (Schmarotz. an d. Rhizom von Perimenium parviflorum Gray, einer Compositen), vgl. Manuel de Villada, Apuntos relativos à la Lennoa coer. H. B. K., La Naturaleza V.
 - Lens** T. (zu Ervum Rchb.) (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Linse, fr. lentille, e. lentil (lens, -tis Linse, celt. lentil, viell. v. lenis mild — als Speise, Wtst.), L. esculenta Mch. s. sativa Hall., s. Ervum Lens L. Saatlinse, E. dispermum Rxb. s. camelorum Spr. etc.
 - Lentago** DC. (sc. Viburnum) L. (Lonicereen, V. 3) kanadischer Schlingbaum (v. lento biege etc.), fr. viorne du Canada od. luisant, e. tree-od. Canada-Viburnum.

Lentibularia Gesn. (Lentibularieen, II. 1) Wasserhelm (v. lens, -tis Linse u. tubulus Röhrchen — Wurzelschläuche!), L. major Riv., s. Utricularia vulgaris L. — Lentibulariæ DC., -riacæ Rich., Grck. Schlauchkräuter od. Wasserhelmgew.

Lenticula Scop. (Najadeen od. Lemnaceen, II. 1) Linschen (dem. v. lens, -tis Linse), z. B. trisulca u. minor. Scop., s. Lemna tris. u. min. L.

Lentiscus T. (sc. Pistacia) L. (Terebinthaceen, XXII. 5) Mastixbaum, fr. pistachier lentisque, e. lentisk (v. lentesco bin klebrig — Mastix-Gummi!).

1) **Leonotis** R. Br. (richtig. **Leontotis!**) (Labiaten, XIV. 1) „Löwenohr“ (v. λέων, ὄτος Löwe, οὖς, ὄτος Ohr), z. B. Leonurus R. Br. (Phlomis Leonotis Pers.) goldfarb. Löwenohr od. Löwenschweif (οὐρά Schwanz — Ährenstand d. Blüt.). 2) **Leonotis** Spr. (Contorten od. Myrsineen, V. 1), L. glycinaria Spr., s. Theophrasta gl. Spr.

Leontice L., Mehx. (Papaveraceen od. Aristolochieen Taccaceen, VI. 1) Löwenblatt, L. Leontopetalum L. (gr. λεοντίζη eine Pfl. — Blumenblatt von d. Form einer Löwenfussspur!), L. altaica Pall., Chrysogönus L. gefiedertes, Alberti Reg. (Turkestan) etc.

Leontodon L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Löwenzahn“, Dohr O. W., fr. liondent, dent-de-lion u. tête de moine, e. dandelion od. lion's-tooth (λέων, ὄτος Löwe, ὀδών, ὄτος Zahn — scharfzähnige Blätter!), L. Taraxacum L. Röhrchenkraut, Kettenblume etc., fr. pissemlit, s. Taraxacum officinale Web., L. autumnalis L. (Apargia aut. W.), hastilis L. (Aparg. hispida W.) etc.

Leontopetalon (-um) Moris. (sc. Leontice) L., s. Leontice!

Leontopodium Pers., R. Br. (sc. Gnaphalium) L. (Compos. Gnaphalien, XIX. 2) „Löwenfuss“, s. g. Edelweiss, fr. pas-de-lion, e. lion's-paw (-leaf) u. padelion (s. v. u. πόδιον Socke v. πούς, -όδος (Fuss)).

1) **Leonurus** L. (richt. **Leonturus!**) (Labiaten, XIV. 1) „Löwenschweif“ (s. v., οὐρά Schwanz — ähriger Blütenstand!), L. Cardiaca L. Herzgespann, fr. mélisse sauvage, e. lion's-tail, archangel u. cardiac. 2) **Leonurus** (sc. Phlomis) L. afrik. Löwenschweif od. Löwenohr (Leonotis Leonurus R. Br.), s. Sideritis africana Barth.

Leopoldia Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Leopold's“-Narzisse (n. Leopold I., Kön. v. Belgien).

Leopoldina (bess. -dinia) Mart. (Palmen) „Leopoldinen“-P. (n. d. verstorben Kaiser Leopoldine v. Brasilien, geb. Erzherz. v. Österreich), L. pulchra Mart.

Leotia Hill. (Pilze, XXIV. 4) Kappenspätz Kumm. (v. λειότης Glätte? dann bess. Liotia! — glattes Hymenium! Wtst.), z. B. circinans u. lubrica.

Lepechinia W. (Labiaten, XIV. 1) „Lepechinie“ (n. d. russ. Bot. J. Lepechin, schr. Tagebuch d. Reisen durch versch. Provinzen d. russ. Reichs in 1768/69), L. spicata W. (Uricicia pyramidata Hortul.), s. Horminum clinopodifolium Pers., etc.

Lepidium L., R. Br. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Schuppenkresse“, Karse O. W., Pfefferkraut Grck., fr. lepidier, passerage (chasse-rage) (λεπίδιον dem. v. λεπίς Schuppe — Schötchen wie Sch.!), L. sativum L. Gartenkresse, fr. anitor, e. garden-cresses, L. vesicarium L., fr. pied de corneille, etc. — Lepidiæ Rchb.

Lepidocarpon R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Schuppenfrucht“, -kopf, schöner Silberbaum M.-Rchb., s. Protea speciosa Thb. s. cristata Lam. (λεπίς, -όδος Schuppe, ζαπτός Frucht).

Lepidocarpon (-um) Mart. (Palmen, XXI. 7) „Schuppennuss“-P. (s. eb. u. ζάπτον Nuss — Blütenkolb. zwischen Schuppen!), z. B. enneaphyllum Barb. Rod., gracile u. tenue Mart. (Südam.).

- Lepidodendron** Brongn. (foss. Lycopodiaceen-Farne, XXIV. 1) „Schuppenbaum“ (s. v. u. *δέρδον* Baum — Schaft wie beschuppt!).
- Lepidosēris** Rehb. (zu Barkhausia Rehb.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schuppenusalat“ (s. v. u. *σέρις* Salat — Kelchschuppen!), z. B. *Bivoniana* Rehb. (*Crepis purpurea* Biv.), *hiemalis* Biv., etc., s. Barkh. u. Crepis.
- Lepigōnum** Wahlbg., Fr. (Alsinaceen, X. 3) „Schuppensamen“ od. Salzmiere Leun., Meersandkr. (v. *λεπίς* Schuppe u. *γόνος* Kind, Samen — Sam. zusammengedrückt, wie eine Sch.!), *L. marinum* Wahlbg., s. *Arenaria media* L. s. *marina* Sm.
- Lepiōta** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Schuppenhut“-P. (v. *λεπίς* Schülfte, Schale, st. Lepidōta v. *λεπιδωτός* schuppig — schuppiger Hut!), *L. procéra* DC. (*Agaricus proc.* L.) s. g. Parasolpilz od. Bubutzen, auch s. g. Schulmeister.
- Lepiphōrum** G. Don (zu Rhododendron L.) (Ericaceen od. Rhodoraceen, X. 1) Schuppenblatt, z. B. *chrysanthum* Pall. (v. *λεπίς* s. v., *φορός* tragend — d. Blätt. sind schüllerig!).
- Lepismium** Hook. (Caetaceen, XII. 1) „Schuppen“-Cactus (v. *λεπίσμιον* Schelfe — Kelchschuppen dachziegelförmig!), s. *Cerēus squamulosus* DC.
- Lepra** Ehrh., Hall. (Lepraria Ach.) (Flechten, XXIV. 3) „Krätz“- od. „Schorf“-Flechte, fr. lèpre (gr. *λέπρα* Aussatz — krätzart. Aussehen!), s. *Verrucaria Hoffm.*
- Leptadenia** R. Br., DC. (Asclepiadeen, V. 2) „Dünndrüsen“-Stapelie (*λεπτός* dünn, *άδηρος*, *-έρος* Drüse — d. Narbenkörperchen sehr klein!), z. B. *pyrotechnica* R. Br. s. g. March (Innerafr.).
- Leptālix** Raf. (zu *Fraxinus* L.) (Oleac. od. Sapotac., XXIII. 2) „Dünn“-Esche (v. *λεπταλής* i. q. *λεπτός* dünn u. *ἄλιξ* od. *ἡλιξ* Kamerad), z. B. *mandschurica* Rupr., *Novaeh-Angliae* Mill.
- Leptandra** Nutt. (Scrophularineen, II. 1) „Dünnanthere“, virgin. u. sibir. Ehrenpreis (*λεπτός* u. *ἀρνός*, *-δρος* Mann, Staubbeutel!), *L. virginica* Nutt. u. *sibirica* ds., s. *Veronica* L.
- Leptaurēa** (sc. Zoegaea) L. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Gold-Feinstrahl“ (s. v. u. *aurēus* golden — analog *Centaurēa* gebildet!), s. *Zoegaea aleppica* Jacq.
- Leptocarpaea** DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) (zu *Sisymbrium* L.) „Dünnsschote“ (s. v. u. *ζυπτός* Frucht — dünne, lange Schoten!), z. B. *Loeselii* DC. (*Sisymbr.* Loes. L.), „Lösel's“-Rauke.
- Leptochlōa** P.-B., Röm. (Gräser, III. 2) „Dünngras“ (s. v., *χλόα* od. *-η* Gras — dünnährig!), *L. cynosuroides* u. *filiformis* Röm., s. *Poa chinensis* L.
- Leptodactylōn** Hook., Arn. (Polemoniaceen, V. 1) „Dünnfinger“ (zu *Gilia* R. P.) (s. v., *δάκτυλος* od. *-or* Finger — d. Blätt. haarspaltig!), *Zier. L. californicum* Hook.
- Leptogium** Fr. (Gallertflechten, XXIV. 3) „Weichboden“-Fl. (v. *λεπτός* od. *-γύνος* auf weichem, zartem Boden vorkommend).
- Leptonia** Lk., Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Zärtling“ Kumm. (v. *λεπτός* mache dünn — häutiges Hutfleisch), z. B. *chalybēa*, *Liukii* etc., s. *Agaricus* L.
- Leptoptēris** Col. (Farne, XXIV. 1) „Dünnwedel“-F. (s. v., *πτερίς* Farn), *Zier. L. superba* Col. (*Todea sup.* Sw.).
- Leptopýram** Rehb. (Ranunculae. Isopyreen, XIII. 7) Doldocke M.-Rehb., eig. „Dünnbirne“ (s. v. u. *πύρα* Birne — kleine Blüt. auf haarfein. Stielen, Wst. kleine, liniennabelige Samen!), *L. fumariooides* Schrk.
- Leptorrhynchus** Benth., DC. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Dünnrüssel“ (s. v., *διγύρος* Rüssel — dünne, schnabelige Achenen!), *Zier. L. aurēus* Benth. (*Helichrysum elegans* Hort., *Morna el. s. nitida* Lindl. u. *Waitzia aur. Steetz*), *suaveolens* Bth. (*Morna nivēa* Ldl., *Helichr.*

- decumbens Portenschl. u. Waitzia corymbosa Wendl. v. Benthamiana Walp.) etc., s. Viraya Gaudich.
- Leptosiphon** Benth. (Polemoniac., V. 1) „Dünnröhre“ (s. v., *στρων* Röhre — enge Röhre d. Blumentrichters!), Zier. L. rosēus u. hybridus Hort., m. v. Vilimorinianus Hort., androsacēus Benth. (Gilia andr. Steud.) m. v. fl. albo Hort., L. lutēus Benth. (Gilia l. Steud.) u. aurēus Bth. (Gilia lutēa v. aurēa Hort.) m. v. rosēus.
- Leptospermum** Forst. Sm. (Myrtaceen, XII. 1) „Dünnsamen“-M., Theed. Südsee-Myrte D., fr. leptosperme (s. v., *στρέμμα* Samen — zahlr. sehr kleine Samen), L. Thea W. (Melaleuca Thea Wendl.), L. scoparium Forst. (Melal. scop. L.) „Besen“-Myrte, s. Billotia Collad.
- Leptosyne** DC. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Feinheitsblume“ (*λεπτοσύνη* Feinheit, Zartheit — in allen Teilen zart), Zier L. Douglasii DC. u. maritima A. Gray, s. Agarista DC.
- Leptotes** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Dünnglatt“-O. (*λεπτότης* Feinheit, Dünne — linienförm. Kronblätt.), z. B. L. bicolor Ldl. m. v. serrulata Hort.
- Lepturus** R. Br. (Gräser, III. 2) „Dünnschwanzgras“ (s. v., *οἰράς* (Schwanz — dünne, fadenf. Ahre!), L. repens R. Br., etc., s. Rottboellia Roth u. Monerma subulata P.-B.
- Leschenaultia** R. Br., s. Lechenaultia!
- Leskēa** Hedw. (-kia W., Brid.) (Laubmoose, XXIV. 2) „Leske's“-Moos (n. d. Prof. N. G. Leske in Marburg, † 1768), z. B. L. sericea Hedw., s. Hypnum L.
- Lespedéza** Rich. (-zia Nutt.) (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Lespedez“-Epsarsette (n. d. Gouv. v. Florida im vor. Jahrh. Lespedez), Zier. L. bicolor Turcz., fruticosa Mchx. etc., s. Anthyllis, Medicago u. Hedsärum L.
- Leucadendron** L. (bess. **Leucod.**- R. Br.) (sc. Melaleuca s. Myrtus) (Myrtac. Melaleucac., XXII. 4) „Weiss“- od. Silberbaum (*λευζός* weiss, *δέρδων* Baum — silberglänz. Blätter!), L. argentēum Lam. (Atlasgebirg), s. Protēa stellaris, L. sphaerocephalūm Berg. (Protea sph. L.) etc.
- Leucanthēum** T., DC. (sc. Chrysanthemum) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Weissstrahl-Wucherblume, grosse Gänseblume, s. g. Marguerite, fr. marguerite grande u. oeil de boeuf, marguerite des champs (s. eb. u. *ἄρθεμον* i. q. *ἄργος* Blume), L. vulgare T. = Chrys. Leuc. L.
- Leueas** Burn., R. Br., Benth. (Labiaten, XIV. 1) Weissfilzkraut (*λευζός* od. -zi*ή* weissanzuseh. Pfl. — Blüt. meist weiss dickbehaart!), z. B. indica, zeylanica, martinicensis etc., s. Phlomis L.
- Leuce** Dub. (subg. v. Populus L.) (Salicaceen, XXII. 7) Silber- od. Weissappeln (*λευζή* weisse — d. Blattunterseiten weissfilz!), z. B. alba L., canescens W., tremula L. etc.
- Leucobryum** Hampe (Moose, XXIV. 2) „Weissmoos“ (*λευζός* weiss, *βρύον* lat. Bryum Moos), z. B. L. vulgare Hampe, s. Dierānum glaucum Hedw.
- Leucodonium** (st. Leuco-Codonium) Rchb. (zu Cerastium L.) (Sileneen, X. 5) „Weissglocken“-Hornkraut (s. v. u. *χαδῶν* Glocke), z. B. C. arvense L., tonmentosum L. etc.
- Leucōjum** L. (Amaryllideen, VI. 1) Knoten- od. Märzblume Leun., Milchglöckchen Seub., Sporkelblume O. W., fr. perce-neige, e. spring-snowflake (gr. *λευζόν* ἥριον eig. Weiss-Veilchen — erscheint mit d. Veilchen!), L. vernum L., s. Nivaria verna Mnch., fr. grelot blanc od. nivéole du printemps.
- Leucomériis** Don (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Weissstück“ (s. v. u. *μερίς* od. -*ρος* Stück, Teil — d. Blätt. unten flockig, filzig!), Zier. L. decōra Krz., spectabilis Don (Eupatorium sp. autt.).

- 1) **Leucophäe** autt. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Weisszunderblatt (*λειζογαρίς* weisschimniernd), L. canariensis Hort. (Chorrastrauch), Teppichg. candicans, macrostachya etc. 2) **Leucophäe** Webb (Labiaten, XIV. 1) Weisschimmerblatt, s. Marrubiastrum Mnch.
- Leucophyta** R. Br. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Weisspflanze“ (s. v., γεύτων Gewächs), Teppichg. L. Brownii Less. (Hstr. Neuhol.).
- Leucopogon** R. Br. (Epacrideen, V. 1) „Weissbart“ (s. v., πώγων Bart Kronsau m. weiss. Längsbart!), Treibh. L. Drummondii DC. (Neuholl.), microphyllum R. Br. (Perōa m. Pers.).
- Leucopsisidium** DC. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Weissaugähnliche“ (v. Leucopsis, s. sogl. u. εἴδομαι gleiche — d. Leucanthemum ähnl.!), Zier. L. arkansanum DC.
- Leucopsis** DC. (Compos. Radiaten, XIX. 2) „Weissauge“, -gesicht (*λευζός* u. ὄψις Auge, Angesicht — Achenen wollig, Strahlenpappus länger etc.), s. Aplopappus DC.
- Leucopus** Lk. (Pilze, XXIV. 4) „Weissfuss“, Violetthut (*λευζός, ποὺς* Fuss — sehr weiss. Strunk, Hut violet od. blau!), s. Agaricus L.
- Leucorehis** E. Mey. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Weissorche“ (s. v. u. Orchis), L. albida E. Mey., s. Gymnadenia a. Rich. (Orchis albida Scop., Satyrium a. L.).
- Leucosināpis** DC. (Cruciferen Siliquos. XV. 2) (zu Sināpis L.) „Weiss-senf“ (— m. weiss. Samen!), s. Sināpis alba L.
- 1) **Leucospermum** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Weissamen“-Silberbaum (s. v., σπέρμα Samen), z. B. L. conocephalon R. Br. „Kegelfrucht“-W., attenuatum, grandiflorum R. Br., etc., s. Protea u. Leucodendron R. Br., L. puber R. Br., s. Diastella bryiflora Salisb. 2) **Leucospermum** Benth. (Labiaten XIV. 1) (zu Teucrium Benth.).
- Leucothöe** D. Don (Ericaceen, X. 1) (zu Andromeda L.) schöne Rosmarinheide (*λευζοθοή* mythol. Name aus λευζός u. θοή hurtig), Zier. L. floribunda Don, s. Androm. pulchra s. floribunda Bot. Mag. (Aganota pulchra), e. many-flowered Andromeda.
- 1) **Leucoxylon** (sc. Bignonia) L. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Weissholz“ (s. v., ξύλον Holz). 2) **Leucoxylon** (sc. Vitex) L. (Verbenac., XIV. 2) „Weissholz“-Müllen (Str. Ceyl.). 3) **Leucoxylum** Blum. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Weissholz“-Glanzblatt (— weiss. Holz u. glänz. lederart. Blätt.).
- Levisanus** Petiv., Thb., Schreb. (sc. Protēa) L. (Proteaceen od. Myrtac. Bruniac., V. 1) stabwurzblättr. Brunie od. Kopfheide, L. capensis Pet. Gaz., s. Brunia Levisamus L. f. s. abrotanoides Berg. (n. d. engl. Geistl. Levisanus) (Erica capitata s. nodiflora Pluk.).
- Levista (-stia)** Pursh (richtig. **Lewisia!**) (Alismac. od. Portulacac., XI. 1) Bitter- od. Tabakswurzel Leun. (n. Meriweather Lewis, engl. Statth. v. Louisiana 1804—06), L. rediviva Pursh.
- Levisticum** Koch (Umbelliferen, V. 2) Liebstöckel, fr. livèche, sermentaire u. séseli des montagnes, e. lovage (gr. λιψυστικόν libysches Kraut, Paxton: v. levo erleichtere, Wst. d. veränd. Ligusticum!), L. officinale Koch, s. Ligusticum Levisticum L.
- Liätris** G. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Glatt“- od. Prachtscharte Rmpl., fr. liatride (v. λιάτρης glatt, λιατρός i. d. Hebamme), Zier. L. spicata W. (Serratula spic. L.), fr. liatride en épî, e. long-spiked L., L. elegans W. (Serratula speciosa Ait. s. Staehelina eleg. Walt.), odoratissima W. (Anonymos Walt.).
- 1) **Libanotis** Scop. (Umbelliferen, V. 2) Heilwurz (gr. λιβανωτής v. λιβάρως Weihrauch u. οἶω rieche — Weihrauchdolde!), L. montana Crantz, s. Athamanta Lib. L. (Seseli Lib. Koch, Turbith. Tausch.), L. sibirica Koch, s. Atham. sib. L. 2) **Lib.** (sc. Cachrys) L. (Umbellif., V. 2) Weihrauch-Gerstendolde.

- Libertia** Spr., Dumort. (Irideen Patersonieen, XX. 2) „Libert's“-Rüsselschwertel (n. d. Belg. Mademoiselle M. A. Libert de Malmédy, lief. Abbild. v. Lebermoosen), L. azurēa Spr., s. Sisyrrhinchium formosum (Nematostigma A. Dietr.).
- Libocedrus** Endl. (Coniferen, XXI. 9) Weissceder Jess. (v. λείβω tröpfle u. Cedrus Ceder — harzreich!), L. Doniana Endl., s. Thuja chilensis Chiliceder, L. decurrens Torr., s. Thuja gigantēa Carr. s. Heyderia decurrens Koch.
- Libonia** C. Koch (Acanthaceen, XIV. 2) „Libon's“-Strauch (n. d. Gärtn. Libon in Lüttich, † 1861 in Brasil.), z. B. Winter-Zier. L. floribunda C. Koch (Bras.) u. penrhosiensis (Sericobonia ignēa Hort.).
- Licania** Aubl. (Rosac. Amygdalac., XII. 1) Süssfleisch-Mandel (v. λεῖν-*rōr* syncop. aus λέζαρον Mulde?, Wtst. d. veränd. calignia, Nam. d. B.'s in Guiana), L. incana Aubl., s. Hedycrea Schreb.
- Lichenes** DC., Endl., Rchb., Kl. d. Flechten, XXIV. 3 (gr. λειχήν lat. lichen Flechte, v. λείχω lecke, streiche hin, — kriechen auf d. Oberfläche etc.).
- Lieuāla** Rumph. (Palmen, III. 1) Strauch-, Roll- od. Cigarren-P. (Name d. P. in d. Macassar-Sprache auf Celebes), L. Rumphii Blum., Rumpf's“ Rollp., L. spinosa Wurmbl., peltata Roxb. etc.
- Liebigia** Endl. (Cyrtaendrac. od. Bignoniac., XIV. 2) Liebig's od. Tromsdorff's-Krummfäden (n. d. Chemik. Just. v. Liebig), L. speciosa Endl., s. Tromsdorffia speciosa Mart.
- Ligeria** Ker (Gesneriaceen, XIV. 2) „Ligerie“ (v. Fluss Liger d. i. Loire? od. st. Liguria v. λιγυός fein, hell,? — ungew.!), Zier. L. caulescens u. speciosa Ker (Gloxinia sp. Ker').
- 1) **Ligularia** Cass., DC. (Compos. Adenostyleen, XIX. 2) Bandblume Rmpl. (v. ligūla Blathäutchen), Zier. L. sibirica Cass., fr. Ligulaire de Sibérie, macrophylla DC. m. v. speciosa DC. (Cineraria macroph. Ledeb.), L. Kaempferi Sieb., Zucc. (Tussilago japonica L. f.) m. v. aureo-mac. S. Z. u. fol. argenteo-varieg., etc., s. Senecio. 2) **Ligularia** Sweet (Geraniac., XVI. 5), s. Pelargonium Athamantoidēa DC., incisum W., trifidum Jacq., etc. 3) **Ligularia** Duv., A. Br. (Saxifragac., X. 2), s. Saxifraga sarmentōsa L. s. ligulata Murr.
- Lignatae** G. (sc. Compositae) „Zungenblütige“ Compositen, i. q. Cichoriaceae (XIX. 1) (ligūla dem. v. lingua Zunge).
- Liguliflōræ** L. (s. eb.) Zungenblütige Compositen (XIX. 1).
- Ligusticum** L. Koch (Umbelliferen, V. 2) Liebstöckel, fr. livèche, sermentaire, e. bladder-seed „Blasensamen“ (Ligisticus aus Ligurien), Zier. L. Levisticum L., L. peloponnesiacum L. (Athamanta goloka Hacq.), s. Molospermum cicutarium DC., fr. livèche du Peloponèse, e. water-hemlock-like bl.-s.
- Ligustrīna** Reg. (Oleaceen, II. 1) Amur-Liguster, Zier. L. amurensis Reg. (ligustrīnus ligusterartig, s. Ligustrum), s. Syringa amur. Rupr.
- Ligustrum** L. (Oleaceen, II. 1) „Liguster“, Rainweide (nicht Rhein —!), fr. frésillon od. troène, e. privet od. prim (print) (v. ligo binde — Zweige z. Flechten!), L. vulgare L., fr. troène, s. g. Beinholt, Zaunriegel u. Dintenbeerstrauch, m. v. v. (z. B. sempervirens Pieri, ital. Lig., v. albo- u. aureo-varieg. Hort.
- Lilac** T., Juss. (Oleaceen od. Jasminen, II. 1) „Lilak“ od. Näglein, s. Syringa L. (in Persien lilac — lilafarb. Blütensträusse!). — Liliaceae Vent. — Lilacum s. Liliacum (fehlerh.!).
- Lilia** Juss., -acēae Bartl., DC. „Liliengew.“, s. *Lilium*!
- Liliaeum** (richt. *Lilacum*!) Perpensa Lam. etc. (Oleaceen, II. 1), s. *Lilac* T. (*Syringa suspensa* etc.).
- 1) **Liliago** (sc. Anthericum) L. (Liliaceen, VI. 1) „Lilien“-Zaunblume

od. Graslilie Grck. 2) **Liliago** (sect. v. *Authericum* Rchb.), z. B. *ramosum* L. (*Phalangium ram.* Lam.) u. *Liliago* Pers. (aus *Lilium* geb.).
Liliastrum Lk. (sc. *Anthericum*) L. (Liliaceen, VI. 1) grosse Zaunblume M.-Rchb. (deter. v. *Lilium*, Wtst.: ἄστρον Bild!), s. Czackia *Liliastrum* Andréz.

Lilium T. (Liliaceen, VI. 1) „Lilie“, fr. lis, e. lily u. luce, auch ray (v. d. celt. li = weiss), Zier. (Topf) *L. auratum* Lindl. „Goldband“-L. Rmpl., fr. lis à bandes dorées, e. golden-rayed lily, speciosum Thb. s. *lancifolium* Hortul. (superbum Thb.) japan. Pracht-L., fr. lis brillant, e. Japanese lily, longiflorum Thb., eximium Court., Washingtonia Kellogg, tigrinum Gawl., tigr. splendens Van Houtt., fulgens Morr. s. *sanguineum* Hort. m. v. atro-sang., superbum L., Gärt. a) Hang- od. Rollblumen-L.: *Martagon* L. Türkembund m. v. v. (z. B. *dalmaticum* Moly s. *Martagon* Catani Vis.), pomponium L., chalcedonicum L.; b) Steh- od. Geradblumige: L. candidum L. m. v. v., bulbiferum L. Feuerl. m. v. phoeniceum Bauh., etc. — Oder: I. Notholirion, Himalaya- od. unechte L. (*ρύθμος* unehelich, λεύκων Lille), z. B. roséum u. Hookeri, II. Eigentl. od. echte L.: a) Eulirion Trichter-L. (*εὐ* schön), z. B. candidum, longiflorum, cordifolium Don s. giganteum Wall., Riesen-L. von Nepaul; b) Archelirion Erz- od. Offenlilien (*ἀρχή* Anfang u. Herrschaft!), z. B. auratum, speciosum, tigrinum; c) Isolirion Gerad-L. (*ἴσος* gleich, aufrecht), z. B. bulbiferum, Catesbaei Walt.; d) *Martagon* Türkembund-L., z. B. pomponium, chalcedonicum etc. Essb. Knollen; L. kamtschateense L. (nigrum Sieb., Fritillaria k. Don u. Sarana k. Fisch.) schwarze od. Serenna-L. (vaterl.).

1) **Limacia** Lour. (Menispermaceen, XXII. 6) „Schnecken“-Moudsameu (v. *linax*, -ācis, gr. λείμαξ, -άξος Schnecke — schneckenf. zurückgebog. Griffel). 2) **Limacia** Dietr. (Bixaceen, XIII. 1) Schneckenfrucht-Orleanbaum (— d. Frucht schneckenf.!).

Limacium Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Schneckenpilz“ (s. eb. — Manschette klebrig, wie eine Schnecke), z. B. *eburneum* u. *discoidēum* (essb.).

Limetta Risso (st. *Limonetta*) (se. *Citrus*) L. (Hesperideen Aurantieen, XVIII. 2) „Limette“, Bergamotte od. Perette, süsse Citrone Leun., fr. limette (-ttier) (dem. v. Limon, arab. limoun Citrone).

Limnanthemum Gmel. (Gentianen, V. 1) „Teichblume“ Seub., -Enzian, Seekanne, Tauche O. W. (v. λιμνη Teich, Sumpf, ἄνθευον i. q. ἄνθος Blume), L. *nymphaeoides* Lk. s. *pelatum* Gmel., s. *Villarsia nymph. Vent.* (Schwiegertia n. W., Menyanthes *Nymphoides* L., Pers.).

Limnanthes R. Br. (Geraniaceen, X. 1) „Sumpfblume“ Vilm. (*λιμνη* u. ἄνθη od. -θος Bl.), Zier. L. *Douglasii* R. Br. m. v. *grandiflora* Hort. (Californ.), alba Hartweg, etc.

Limnocharis Hb., Bpl. (Hydrocharideen, XIII. 1) „Teichfreude“, -blume (s. v. u. χάοις Reiz, Freude — Standort!), Zier. L. *Humboldtii* Rich., s. *Hydrocleis* Hb., Endl.

Limnochlöa (-öö) P.-B. (Cyperaceen, III. 1) „Pfuhlsimse“ (s. v. u. χλόα od. -όι Gras etc. — Sumpfstandort), z. B. *acicularis*, *caespitosa* L. etc., s. *Scirpus* L.

Limnopence Vaill. (Halorageen, I. 1) „Sumpffichte“, Tannenwedel (s. v. u. λεύκη lat. *picea* Pechtanne — tannenart. Aussehen d. Pfl.!), s. *Hippuris* L.

Limodorum T., Thb. (Orchideen Arethuseen, XX. 1) Dingel, fr. limodore (gr. λιμοδῶον od. λειμοδ. - Unkraut unt. d. Kümmel! F. W. Riemer, v. λειμῶν Wiese u. δῶον Gabe, Wtst. λιμοδ. st. Αἴμοδωον Theophr. = *Orobanche cruenta*!), z. B. triste Thb., abortivum Sw. etc., s. *Orchis* etc.

Limonia G., L. (Aurantieen od. Bixaceen, X. 1) „Limonelle“ Dietr.,

L. acidissima L., lucida Forst. etc. (v. *Limon*, arab. limoun Citrone — citronenart. Frucht!).

- 1) **Limonium (Limōnum)** (sc. *Citrus*) Risso (Hesperid. Aurantieen, XVIII. 2) „Limoniensbaum“, Limone od. Sauer-Citrone Leun., fr. limon (-monier), e. lemon (-tree) (s. eb.), s. *Citrus medica* Hayne. 2) **Limonium** (sc. Statice) L. (Plumbagineen, V. 5) Juften-Gerbkraut, Widerstoss, fr. limoine (gr. λειμώνιον Wiesenpfl.), Zier. L. speciosum Pers. (Statice speciosa L.) gem. Strandnelke, fr. Immortelle bleue, e. wild-marsh-Beet, m. v. v. 3) **Limonium** G. Frank i. q. Pyröla L. (Ericaceen, X. 1) Wintergrün, fr. limonellier?

Limopeuce Vaill. s. Limnopeuce! (v. *limus* Schlamm u. πεύκη Fichte — Schlammfichte, s. g. Tannenwedel).

Linacēae Grck., -nēae DC., Rchb. „Flachs- od. Leingew.“, s. *Linum* L.!

Linaria T. (Scrophularineen, XIV. 2) „Leinkraut“, Frauenflachs od. Flachsraut, Drunt O. W., fr. linaire od. lin sauvage, auch pélore, velvete, élatine u. véronique femelle, e. toad-flax od. snap-dragon (v. *Linum* Lein od. Flachs — ähnl. Habitus!), wild *L. vulgaris* Mill., s. *Antirrhinum Linaria* L., Zier. L. bipartita W. m. v. fl. albo, elegans u. triphylla, triornithophora W. „Dreivogel“-Fr., fr. lin. à grandes fleurs, e. three-bird's-toad-flax m. v. carnēa Hort., alpina DC. blaue Johannisblume, Unsrer Frauen Haar, L. *Cymbalaria* Mill. (wild an Mauern u. Ampelpfl.) m. v. fol. roseo-varieg.

- 1) **Lindēra** Thunb. (Lauraceen, VI. 1) „Lindere“ (n. d. schwed. Bot. Linder, nobilis Lindestolpe, Joh., schr. Fl. Wiksbergensis, Stockh. 1716), z. B. *umbellata* Thb., Benzoin Meisn., falscher Benzoebaum. 2) **Lindēra odorata** Aschers. (Umbelliferen, V. 2) wohlriech. Süßdolde = *Myrrhis odorata* Scop.

Lindernia All. (Scrophularineen, XIV. 2) „Lindernie“, Gelbmäulchen (n. d. Bot. Balth. v. Lindern in Strassb., † 1755), *L. pygidaria* L. (*Gratiola inundata* Kit.), japonica Thb. (*Ambulia* Lam.).

Lindheimēra Gray, Engelm. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Lindheimer'sblume“ (n. d. Bot. u. Reis. Dr. Ferd. Lindheimer), Zier. *L. texana* Gray.

- 1) **Lindleya** Hb., Kth. (Rosac. Amygdaleen, XI. 5) „Lindley'smandel“ (n. d. Prof. d. Bot. John Lindley in Lond.), z. B. *L. mespiloides* Kth. 2) **Lindleya** Nees (Theaceen od. Ternstroemiac., XVI. 8) „Lindley's-thee“, z. B. *L. fruticosa* Nees, s. *Gordonia semiserrata* Spr. (Wikstroemia Schrad.).

Lindsaea (-sea, -saya) Dryand. (Farne, XXIV. 1) „Lindsay's“-F. (n. d. engl. Kryptog. Lindsay), z. B. *elongata* Cav., *falcata* Dryand. (*Adiantum* f.).

- 1) **Lingua** (sc. *Ranunculus*) L. (Ranunculac., XIII. 7) grosser Hahnenfuss, eig. „Zunge“ (lat. *lingua* Zunge). 2) **L.** (sc. *Othonna*) L. (Compos., XIX. 4) „Zungen“- Schleierblume. 3) **L.** (sc. *Serapias*) L. (Orchideen, XX. 1) „Zungenorch“ (*Orchis Lingua* Scop.). 4) **L.** (sc. *Acrostichum*) L. (Farne, XXIV. 1) „Zungen“-F.

- 1) **Linkia** Cav. (Proteaceen, IV. 1) „Link's“ Silberbaum (n. d. Bot. H. F. Link). 2) **Linkia** Pers. (Solaneen, V. 1). 3) **Linkia** Lyngb. (*Nostochineen*, XXIV. 3).

Linnaea Gron. (Lonicereen, XIV. 2) „Linnæe“, Rande O. W., nord. Moosglocke od. Moorkriecher (n. d. schwed. Nat. K. v. Linné, lat. *Linnaeus*), wild u. Zier. *L. borealis* Gron., fr. Linnée boréale, e. northern Linnaea.

Linophyllum (sc. *Thesium*) L. (Santalaceen, V. 1) „Leinblatt“, Verneinkraut Grck. (λίνον Leim, γένιον Blatt).

Linosýris DC. (Compos. Baccharideen, XIX. 2) Goldschopf (v. *Linum*

u. Osyris — mit beiden Ähnlichk.), Zier. L. vulgaris Cass. (Chrysocoma Linosyris L.), fr. L. vulgaire u. dorelle, e. common-Linos.

Linum L. (Linaceen od. Caryophylleean, V. 5) Lein, Flachs, fr. lin (filasse de lin „Flachs“, les filasses), e. aise, line, flax (-weed) (gr. λίνον v. d. celt. lin Faden), geb. L. usitatissimum L., Zier. L. grandiflorum Desf. (grandifl. rubrum Hort.), fr. lin à grandes fleurs, e. large-flowered od. crimson flax, campanulatum s. flavum L., fr. lin à fleurs campanulées, e. bell-shaped-flax, perenne L. (montanum Hort.), sibiricum Ait., wild L. catharticum L. „Purgier“-L., fr. lin sauvage purgatif.

Liparia L. (Leguminos. Galegeen od. Genisteen, XVII. 4) „Fettstrauch“ (v. λιπαρός fettig glänzend — nämli. Stengel u. Blätt!), z. B. sphærica L. (Genista afr. ruscifol. Raj.), umbellata L. (Borbonia u. autt.) etc.

Liparis Rich. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Fettblatt“-O., Ständling O. W., Glanzwurz ds., Glanz-O. (s. eb.), z. B. L. Loeselii Rich. (Malaxis Loes. Sw., Ophrys Loes. L., Sturmia Loes. Rchb.).

Lippia L. (Verbenaceen, II. 1 od. XIV. 2) „Lippie“, fr. Lippie (n. d. franz. Arzt u. Reis. in Abyssinien Dr. Aug. Lippi, † 1713, viell. auch Fr. Jos. Lipp, schr. Enchiridium bot., Wien 1765), Ampel L. montevidensis u. L. canescens Kth. (filiformis Schrad. s. repens Hort.), fr. L. blanchatre, e. whitish Lippia, Topf. L. citriodora Hort. (Aloysia citr. Pers. u. Verbena triphyllus l'Hér.) „Citronenstrauch“.

Liquidambar L. (Amentaceen Balsamaceen, XXI. 9) Storax- od. „Amberbaum“ (v. liquidus flüssig u. ambra Amber- od. Balsamharz), Zier. L. styraciflua L. m. v. „Storaxbaum“, fr. L. copal od. Copalme de l'Amérique, e. sweet-Gum-Liquidambar, L. imberbis W. (Liq. orientalis Mill., Platanus or. Pock.).

Liquiritia Mnch., Pers. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Lakritzenholz“, gem. Süssholz, fr. réglisse, e. licorice (-rish) (v. liquīdūm u. radix, -īcis Saft und Wurzel), L. officinalis Mnch., s. Glycrrhiza glabra L. (Apoth. liquiritiae radix Süssholzwurzel, liefert „Lakritzensaft“, Wtst. d. veränd. Glycrrhiza!).

Liriodendron Juss., L. (Magnolieen, XIII. 6) Tulpenbaum, „Lilienb.“, fr. tulipier, e. tulip-tree u. canoe-wood (v. λιτόν Lille, δέρδον B., nicht etwa λίγα Leier, weg. d. Form d. Blätt.), Zier. L. Tulipifera L. (Tulipifera Liriodendron Mill.) m. v. v., Tulpen- oder Leierblatt-B., L. Liliifera L. (Sampacca montana Rumph.).

Lisanthus L. (Gentianeeen, V. 1) „Glattblume“, Bauchbl. D. (v. λίζ od. λισσός glatt, ἀργής — glatte Beschaff. d. Blume u. ganzen Pfl.), Gewächsh. Russelianus Hook., calygonus u. acutangulus Rz. Pv., coeruleascens Aubl., etc.

1) **Lissanthe** R. Br. (Epacrideen u. Stypheliaen, V. 1) „Glattblüte“ (s. eb. u. ἄργη Blüte), z. B. sapida R. Br. (Str. Neuhol.), strigosa ds. (Styphelia str. Sm.) etc., s. Ardisia G. 2) **Lisanthe** Knight, Sabl. (Proteaceen, IV. 1) Glattgriffel, s. Lissostylis R. Br.

Lissochilus (-os) R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Glattlippe“ (s. v., ζειλός Lippe — diese unbehaart!), L. speciosus R. Br. (Cymbidium gigantēum Thb., Cap.).

Lissostylis R. Br. (Proteac., IV. 1) (zu Grevillaea R. Br.) Glattgriffel, s. Lisanthe Knight (s. v. στυλίς Griffel).

1) **Listera** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Listere“ od. Zweiblatt Grck., fr. double-feuille (n. d. Leibarzt d. Königin Anna v. Engl., Mart. Lister, † 1711), z. B. L. ovata u. cordata R. Br. 2) **Listeria** Raf., Neck. (Rubiaceen, IV. 1).

Lita Schreb. (Gentianeeen, V. 1) „Schlicht“-Enzian, Dünning D. (λιτός schlicht, dünn etc.), z. B. L. aphylla D. (Gentiana aph. Jacq.), coerulea W. u. rosae W., s. Vohiria Aubl.

Litchi (Litschi) Sonner. (Amyrideen od. Sapindac., VIII. 1) chines. Zwillingsspflaume (chines. Name d. Pfl.), L. s. *Litsēa chinensis* Lam., s. *Dimocarpus Litchi* W. (*Nephelium L.*, *Sapindus edulis* Lour.).

Lithophila Sw., Schreb. (Paronychieen, II. 1) Stein-Nagelkraut, „Stein“-od. „Felslieb“ (*λίθος* Stein, *γιλός* Liebhaber — Standort stein. Orte!), L. *muscoïdes* Sw.

Lithospermum T., L. (Boragineen, V. 1) „Steinsamen“, Schminke O. W., fr. grémil, herbe aux perles, e. gremil (gray-mill), stone-drop (s. eb. u. *σιτέρων* Samen — hart wie Stein!), Zier. L. *purpureo-coeruleum* L., fr. grémil violet, e. purple-blue Gromwell od. gremil, Garten: L. *pulchrum* Lehm. (*Pulmonaria virginica L.*), *fruticosum* L. u. *petraeum* A. D. C., *canescens* Lehm. s. *conspicuum* Spr., e. whitish Gromwell, L. *officinale* L., fr. millet d'amour „Liebeshirse“ (-gris, perlé, perlé du soleil).

Litsaea (-sēa) Lam., Nees (Amyrideen od. Sapindaceen, VIII. 1) „Litsäe“, Strahl-Lorbeer, Zwillingsspflaume (aus d. chines. od. japan. Namen litchi gebildet, vgl. Litchi Sonner.), z. B. *angustifolia* Krz., s. *Actinodaphne* Nees, L. *chinensis* Lam. (Litschi chin. Sonner.), s. *Tetranthēra laurifolia* Jacq. u. *Dimocarpus Litchi* W.

Littaea Tagliab. (*Lyttaea* Brign.) (Bromeliaceen, VI. 1) „Lyttiae“ (zu Ehr. d. Herzogs v. Lytta bei Mailand, Gönn. d. Bot., Wtst. n. d. Duca Antonio Litta in Lainate, in dess. Gart. d. Pfl. 1815 zuerst in Europa blühte), Zier. L. *geminiflora* Brign. (*Yucca Boscii* Hort.), *albicans* (Agave a.), *modesta* W. Hook. (windend) etc. s. *Uvularia* L.

Littorella L. (Litor.- autt.) (Plantagineen, XXI. 4) Strandling, „Uferkraut“, fr. littorelle (v. *litus* od. *littus*, -öris Strand etc. — besond. an salz. Wassern, Wtst.), L. *lacustris* L., s. *Plantago uniflora* L. f.

Livistona (-ia) R. Br. (Palmen, VI. 1) „Livistone's“-P., Schirmpalme Rmpl. (n. Murray Baron v. Livistone bei Edinburg, Freund Balfour's), L. *chinensis* Mart. *Latanenapfel-P.*, s. *Latānia* Comm., Stuben L. *humilis* R. Br., *rotundifolia* etc.

Livonia, s. Libonia!

1) **Lloydia** Salisb. (zu *Ornithogalum* Rchb.) (Liliaceen, VI. 1) „Lloyd's“-Vogelmilch (n. George N. Lloyd, schr. bot. terminology, Edinb. 1826), L. *alpina* Sal. (*Ornithog. serotinum* Rchb., *Anthericum* ser. L. 2) **Lloydia** Neck. (Compositen).

Loasa Adans., Schreb. (*Loosa* L., Pers.) (Sedifloreen Loasaceen, XIII. 1 od. XVIII. 2) Brennwinde (aus d. südamer. Namen geb.), Zier. L. *aurantia* s. *lateritia* Hook. (*Cajophōra later.* Presl), m. v. *Herberti* Hort., L. *acanthifolia* Lam. (*Ortiga chilensis* Feuill.) — Loasacēae DC.

Lobadium Raf. (subg. v. *Rhus* L.) (Terebinthac. Sumachineen, V. 3 od. XXII. 5) Gewürz-Essigbaum, L. *aromaticum* (*Rhus aromatica* Ait.) (v. *λοβός* Lappen u. *ἄδος* Fülle — Scheibe mit 5 Lappen, darunter d. Blütenblätter eingefügt stehen), s. *Toxicodendron cuneatum* Mill.

Lobelia L. (Campanulac. od. Lobeliaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Lobelie“, Spaltglöckchen, Spleisse O. W., fr. lobélie (n. Lobel od. Matth. de l'Obel, lat. *Lobelius*, Bot. am Hof Jakob's I. v. Grossbrit., † 1616), Zier. L. *Erinus* L. m. v. v. (z. B. *hybrida grandiflora superba* Hort., v. *speciosa* Hort., v. *gracilis erecta* Hort., v. *marmorata* Hort., Topf-Zwergbl. v. Miss. Murphy, Topf: L. *erinoïdes* u. *ramosa* Benth., Gartenbl. L. *fulgens* W. (*Rapuntium f.* Presl), m. v. *multiflora* Hort., L. *cardinalis* Hort. (*Rapuntium card.* Presl), fr. *cardinale*, „Scharlach“-L., etc. — Lobeliacēae Juss., DC., Lobeliacēae zu Campanulacēae Rchb.

Lobularia Desv. (zu *Alyssum* Rchb.) (Crucifer. Siliculos., XV. 1) „Lappen“- od. Meerstrands-Steinkraut (dem. v. *lobus* Lappen — zweiteil.

- Pubescenz), L. maritima Desv., s. *Alyssum marit.* Lam. (*Clypeola* m. L., *Koniga* m. R. Br.).
- Locheria** Neck. (Compositen) „*Lochersblume*“ (n. den Schweizer Hans Loher-Balber, schr. Nekrolog auf P. Usteri M. D. Bürgerm. v. Zürich, 1832), Zier. L. magnifica.
- 1) **Lochnéra** Rchb. (Apocyneen, V. 1) „*Lochner's*“ od. rosenrotes Immergrün, L. roséa Rchb., fr. *Pervenche rose* od. de Madagascar, e. old-maid, s. *Vinca roséa* L. (*Catharanthus ros.* G. Don) (n. M. Lochner, schr. Comment. de Ananassa etc., Norimb. 1719). 2) **Lochneria** Scop. (Tiliaceen, XIII. 1).
- Lockhartia** Hook., Rchb. f. (Orchideen, XX. 1) „*Lockhart's*“-O. (n. Dav. Lockhart, Vorst. d. bot. Gart. in Trinidad, Neugranada), z. B. *pachyglossa* ds. „*Dickzunge*“, elegans Hook. (*Fernandezia* e. Lodd.).
- Locusta** (sc. *Valeriana*) L. (*Valerianeeen*, III. 1) Rapünzchen Grck., s. *Valerianella olitoria* Mnch. (*Valeriana Locusta* L. var. a. *olitoria* L., *Fedia* ol. Vahl (*locusta* Heuschrecke)).
- Lodoicëa** Comm. (*Laodicëa* Labill.) (Palmen, XXII. 13) Meer- od. Seecocos-P., maldivische Nuss (n. *Laodice*, Prinzessin v. Troja? od. st. Ludovicëa? unsicher!), L. *Sechellarum* Lab. (*Cocos maldivica* Pers.), auch s. *Lontärus* u. *Borassus* L.
- Loeflingia** L. (*Loeffl.-* Röm.) (Portulacac. od. Paronychieen, III. 1) „*Loebling's*“-Knaul (n. Pet. Löfeling, Linné's Schüler), L. *indica* L. (*Pharnacieum depressum* L. f.), *renifolia* Lag. etc.
- Loeselia** L. (Polemoniaceen, V. 2) „*Loeselie*“ (n. Joh. Lösel, Prof. zu Königsberg, † 1652), z. B. *ciliata* L. (*Hoitzia Loeselii* Spr.).
- Logania** R. Br. (Gentianeeen od. Loganieen, V. 1) „*Logan's*“-Bitterblatt (n. d. engl. Statth. von Pennsylv. J. Logan, † 1736), z. B. *pentacrina* Scop., Gm. (*Ruyschia Surubea* Jacq., Aubl.) — *Loganiæ R. Br.*
- Logia** Cass. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (Compos. *Gnaphalieen*, XIX. 4) Fadenkraut (*Anagramm* v. *Filago*), z. B. *brevifolia* Cass.
- Loiseleuria** Desv. (Rhodoraceen Azaleen, V. 1) „*Loiseleur's*“- od. niederlieg. Azalee, L. *procumbens* Desv. (n. Loiseleur - Deslongs-champs, s. d. Aut.), s. *Azalea proc.* L. (*Chamaelidon proc.* Lk.).
- Lolium** L. (Gräser, III. 2) Lolchgras, fr. *zizanie*, e. tare (v. d. celt. *loloa* Raygras), z. B. L. *perenne* L., fr. *raygras de l'Angleterre*, engl. Ray- d. i. Rasengras, e. ray- od. rye-grass, L. *temulentum* L. Taumelgras, fr. *ivroire* (*ivraie*) od. gerzerie, e. damel.
- Lomaria** W. (Farne, XXIV. 1) „*Saum*“- od. „*Randfarn*“ ($\lambda\omega\mu\alpha$, $-\alpha\tau\sigma\tau$) Saum — Stand d. Indusien od. Samenhalter!), z. B. Zier-Baumfarn L. *gibba* W. u. Pattersoni Spr., etc., s. *Onoclea* Sw.
- Lomatia** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) Flügelsamen (s. eb. — Frucht m. breit. Hautsaum!), Zier. *longifolia* R. Br., *ilicifolia* etc. R. Br. (Str. Neustädwales), s. *Embothrium* Forst.
- Lomatogonium** A. Br. (Gentianeeen, V. 2) „*Fransenkante*“ Koch (Haller) s. v. u. $\gamma\ddot{\omega}\nu\alpha$ od. $\gamma\ddot{\omega}\nu\sigma$ Ecke, Kante — d. beiden Narben m. d. Carpидien-Nähten d. Länge nach zusammen!), L. *carinthiacum* A. Br. (Gentiana car. Fröl., *Swertia car. Wulf.*).
- Lomatophyllum** W. (Liliaceen, VI. 1) „*Randblatt*“-L., Bandlilie D. (s. v., $\varphi\ddot{\iota}\lambda\lambda\sigma$ Laub — d. Blätt. am Rand knorpelig!), z. B. L. *boniicum* W. (*Phylloma aloiflora* Haw.).
- Lomentacæae** DC., Rchb. „*Gliederschotige*“ Cruciferen (v. *lomentum* Gliederschote).
- Lonas** Adans., G. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) geruchlose Immortelle (*Anagramm* v. *Santolina*, wozu früher gehörig), Zier. L. *indóra* G. s. *umbellata* Cass., fr. *Lonas sans odeur*, e. scentless *Lonas*, s. *Athanasia annua* L.

- 1) **Lonchitis** L. (Farne, XXIV. 1) „Lanzenfarn“, Buchtenf. D. (*λογ-
χίτις* lanzenähnlich), z. B. pedata L. (Pteris podophylla autt.). 2) **L.** (sc. Polypodium) L. (Farne, XXIV. 1) scharfer Schildfarn Grck., s. Aspidium Lonchitis Sw. (Polystichum Lonch. Roth).
- Lonchocarpus** H. B. K. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Lanzenhülse“ (*λόγχη* Lange, *χαρπός* Frucht — Hülse lanzettf.!), z. B. formosanus DC. (Ins. Förmosa), macrophyllus Kth. etc., s. Dalbergia, Robinia etc.
- Lonicera** L. (Caprifoliac. od. Lonicereen, V. 1) „Lonitzere“ Grck., Geisblatt, Heckenkirsche, fr. chèvre-feuille, e. honey-suckle (n. d. Bot. Adam Lonitzer, lat. Lonicerus, Prof. u. Arzt in Frankfurt a. M., † 1586), L. Xylostēum L. Hecken- od. Hundskirsche, nigra L. Hundbeere, e. dog's-berry, L. alpigēna L., tatarica L., etc.
- Lontar** Rumph. (Palmen, XXII. 6) „Lontar“, Wein- od. Palmyrapalme, fr. lontard (v. d. vaterl. lontar), L. domestica G., s. Borassus flabelliformis L.
- Lopezia** Cavend. (Myrobalaneen, I. 1) „Lopezie“ (n. d. span. Nat. Francisco Lopez, Wst. n. Thom. Lopez, schr. üb. d. neue Welt), Zier. L. coronata Andrz. s. racemosa Cavend. (mexic. Jacq.) u. miniata DC.
- 1) **Lophanthus** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Kamm“- od. „Schopfblume“ (*λόφος* Kamm etc., *ἄνθος* — Blüt. in Büscheln!), z. B. chinensis Benth., s. Hyssopus Loph. L. 2) **Loph.** Forst. (Hermanniac. od. Büttneriac., XVI. 2), L. tomentosus Forst., s. Waltheria Loph. Forst.
- Lophospermum** D. Don (Bignoniaceen, XIV. 2) „Kammsame“ Rmpl. (s. v. u. *σπέρμα* Samen — diese von breit. Kammsaum umgeben), Ziergitterpfl. L. scandens Don s. erubescens Zucc. m. v. Andersoni Hort., Balkon-Hängpfl. spectabile Hort.
- Loranthaceae** Don „Riemenblumenartige“ (-thidæae Gray, -thæae Bartl., Rchb.) (s. sogl.).
- Loranthus** L. (Caprifoliac. Lorantheen, VI. 1) „Riemenblume“ (*λόρανθος* lat. lorum Riemen, *ἄνθος* Bl. — Kronzipfel riemenf.), L. europaeus Jacq. (Krain, Litorale etc.).
- Loroglossum** Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Riemenzunge“ (s. eb. u. *γλώσσα* Zunge — d. Labell lang zungenf.!), L. hircinum u. anthropophorum Rich., s. Himantoglossum hirc. Spr. u. Aceras anthr. R. Br.
- Lotæae** Rchb. Schotenkleeartige, s. Lotus!
- Lotos (-us)** DC. (Nymphaeaceen, XIII. 1) weisser Lotus, ägypt. Seerose (*λωτός* — wovon jedoch nicht Lotophagen Homer! s. sogl.), s. Nymphaea Lotus L.
- 1) **Lotus** L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Schoten- od. Hornklee, Schüchel O. W., fr. lotier, mélilot de l'Allemagne, e. lote (-tree) (gr. *λωτός* Theophr., s. sogl.), L. corniculatus L. (— Hörnchen an d. Hülsen spitze!), Zier. L. Tetragonolobus L. (Tetrag. purpuréus Mnch.) engl. Erbse, fr. lotier pourpre, e. purple-trefoil, L. jacobaeus L. Jakobsklee, fr. l. de l'île de Jacques, e. St. James-island's-trefoil. 2) **Lotus** (sc. Rhamnus L. s. Zizyphus T.) (Rhamnaceen, V. 1) Lotus od. essb. Judendorn W., fr. lotos (lotus), lotier des anciens, - des lotophages (*λωτοφάγοι* Homer, die Frucht vom Lotusbaum Essende, Nordafr.). 3) **Lotus** (sc. Nymphaea) L. (Nymphaeaceen, XIII. 1) ägypt. Seerose, fr. lotier d'Egypte. 4) **Lotus** (sc. Diospyros) L. (Sapotaceen, XXIII. 2) s. g. italien. od. indische Dattelpflaume M.-Rchb., e. bastard-lote tree „unechter Lotusbaum“.
- 1) **Loudonia** Lindl. (Halorageen, VIII. 4) „Loudon's“-Seebeere (n. d. engl. Bot. J. C. Loudon). 2) **Loudonia** Berter. (Papilionaceen).

- Louichéa** Schreb. (**Lovichea** l'Hér.) (Chenopodiaceae od. Urticaceen, V. 2) Kampherkraut (n. René Louiche des Fontaines, s. Desfontaines), L. Pteranthus Forsk. s. cervina l'Hér., s. Camphorosma Pter. L.).
- Lowéa** Lindl. (Rosaceen, XII. 5) „Lowe's“-Rose, Berberitzenblatt-R., s. Rosa berberifolia autt. (n. d. Baccalaureus R. T. Lowe, Univers. Cambridge, schr. Primitiae et Novitiae Faunae et Florae Maderae et Portus Sancti, Lond. 1851).
- Loxanthéra** Blum. (Loranthaceen, VI. 1) „Schräganthere“ (*λοξός* schräg etc., *ἀνθηρά* Staubbeutel — diese stehen schief), L. speciosa Blum., s. Loranthus L.
- Lubinia** Vent., Lk. (Primulac. Lysimachieen, V. 1) „Lubin's“-Lysimachie (n. d. franz. Beamt. u. Bot. in Ostindien S. Lubin), L. atropurpurea Lk. (Lysimachia atr. L.), spathulata Vent. (Lys. mauritiana autt.) etc.
- Lucidor** (sc. Antholyza) L. (Irideen, III. 1) „Lichtgeschenk“-Rachenlilie, gestielte R. Dietr. (lux, -cis Licht, *δῶρον* Gabe, — wie in Theodor!).
- Luculia** Sweet (Rubiac. Cinchonac., V. 1) „Luculi“-Chinastrauch (n. d. nepaulischen Nam. d. Pfl. luculi-swa), Zier. L. gratissima, s. Cinchona gr. u. Mussaenda Luculia autt.
- Lucúma** Juss. (Sapotac. Mimusopeen od. Lucumeen, X. 1) „Lucumabaum“ (Nam. in Peru). — Lucuméa Juss., DC.
- Ludia** Lam., Comm. (Bixaceen, XIII. 1) „Spottblatt“, Änderling D. (v. ludo spiele, spotte — näm'l. d. Blätt. in d. Form!), L. heterophylla Lam. „verschiedenblättr.“
- Ludolfia (-phia)** W. (Rohrgräser, III. 2) „Ludolf's“-Rohr (n. d. Prof. Matth. Ludolf in Berlin, † 1756), L. macrosperma W. Riesenrohr (Arundinaria m. Michx., Miegia m. Pers.), glaucescens W. (Panicum arborescens L.) etc.
- Ludovia** Poit., Pers. (Pandaneen Cyclantheen od. Palmen, XXI. 9) „Ludovie“, L. lanceaefolia A. Br., s. Carludovica lanc. Hort. Par. (Salmia W.), s. Carludovia Rz. (Carlodovica R. P.) Karl-Luisen-Palme (n. d. span. König Karl IV. u. dess. Gemahlin Mar. Louise, † 1819).
- Ludwigia** Gronov. (-wigia L.) (Lythrarieen, IV. 2) „Ludwigie“ (n. d. Prof. Chr. Gottl. Ludw. in Leipz.), L. decurrens Walt. s. jussioides Michx. (Carolina), L. aquatica Clayt. (Ammannia ramosior L.), s. Ludwigia DC.
- Luffa** T., Cavend. (Cucurbitaceen, XXI. 5) Kanten- od. Beissgurke, Schwammkürbis Rmpl. (arab. louff), Zier. L. cylindrica s. Poppia Fabiana Hort. (L. Petola Ser.), fr. Paponge, Torchon, Concombre à noyau etc., e. cylindrical-fruited Luffa, L. acutangula Ser. „scharfkantige“, fr. L. à fruits anguleux, e. strainer-vine, s. Cucumis acutangula Ser. u. Momordica Luffa L.
- 1) **Lunaria** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) „Mondviole“, Mondveil Vilm, fr. lunaire, e. moon-wort (v. luna Mond — Form d. Samen!), Zier. L. biennis Mnch. (annua L., inodora Lam.) Silberblatt O. W. (— silberne Schoten - Scheidewände!), rediviva L. (odorata Lam.), s. g. Flittern, fr. lunaire vivace, e. revived moon-wort. 2) **Lunaria** (sc. Rumex) L. (Polygonaceen, VI. 3) Mondampfer. 3) **Lunaria** (sc. Osmunda) L. (Farne, XXIV. 1) Mondfarm, -raute, fr. lunaire, bulbonac u. ménisse, e. lunary, bolbonac (Fiederlappen mondf.). 4) **Lunaria** Plum. (Lentibularien, II. 1) Wasserhelm, L. palustris Plum., s. Utricularia foliosa L.
 - Lunularia** Mich. (Lebermoose, XXIV. 3) „Mondbecher“ Leun. (dem. v. luna Mond — d. Kaps. halbmondf.), L. vulgaris Mich. (Merchantia cruciata L. s. Staurophöra pulchella W.).

Lupēria DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Trauer“-Levkoje (v. λυπηρός traurig — schmutzig gelbrot), s. Matthiöla tristis R. Br.

Lupinaster Mnch., DC. (zu Trifolium Rchb.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) sibirischer Klee (deter. v. Lupīnus, s. d.), z. B. Trif. alpinum L., montanum L., L. macrocephalus Pursh, etc.

Lupīnus T., L. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Lupine“ oder „Wolfsbohne“, fr. lupin, e. lupine (v. lupus Wolf — hungrig wie ein Wolf jed. Boden verzehrend, Wtst. n. Plinius), Zier. L. nanus Dougl. m. v. v. Zwerg-L., fr. l. nain, e. dwarf-l., polypyllus Dougl., varius L. weissblaue (semiverticillatus Desv.), fr. l. petit bleu, L. lutéus L. (auch gebaut!), fr. l. jaune odorante, sulphureus Dougl. (Californ.), tricōlor elegans Hort. etc.

Lupularia Ser. (zu Medicago L.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) „Hopfenklee“, s. Medicago lupulina L. (v. lupulus Hopfen).

Lupulīna Desv. (zu Trifolium L.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Hopfen-Kleeartige (s. eb.), z. B. Tr. procumbens etc.

Lupūlus (sc. Humūlus) L. (Urticaceen, XXII. 5) gem. Hopfen, fr. vigne du nord, e. hop's-plant od. bind (dem. v. lupus Wolf? — ungewiss! Wtst. schlingt sich um Weiden u. dgl. = „Weidenwolf“ (Lupus salictarius Plin.).

Lussacia Spr. (Ericac. Vaccinieen, X. 1) „Gay-Lussac's“-Heidelbeerstrauch (n. d. franz. Nat. Gay-Lussac), L. vaccinium Spr. (Vacc. brasiliense Spr. s. Gay-Lussacia Pseudo-Vaccinium Schldl.), L. buxifolia Spr. (Gay-Luss. b. Hb.) etc., s. Thibaudia glandulosa Hb.

Luxemburgia St. Hil. (Violaceen Sauvagesieen, XIII. 1 od. XVI. 8) „Luxemburgie“ (n. d. Herzog v. Luxembourg, unt. dess. Patronage St. Hilaire 1816—1822 Brasil. bereiste), L. speciosa St. Hil. s. octandra St. Hil. (Str. Bras.), s. Plectanthera Mart.

Luzūla DC. (Juncaceen, VI. 1) „Hainsimsengras“, Marbel Grck. (v. lucus Hain — Standort! Wtst. v. luceo glänze — Blüt. u. Blättr. mehr. Arten!), L. albida DC., silvatica Gaud. s. g. Lichel, campestris DC. gemeiner Marbel, etc.

Lycaste Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Lykaste“ (Paxton: Nam. einer schönen Frau in Sizilien, von Lykastos, Stadt auf Creta, abgeleit.), z. B. Skinneri Ldl. (Guatem.).

Lychnis T., L. (Caryophylleen od. Sileneen, X. 5) „Lichtnelke“, Lichte O. W., fr. lychnide (v. λύχνος Leuchte), Topfbl. L. fulgens Fisch., Haageana Lem. m. v. fl. albo Hort., hybrida aurantiaca Hort., Gartenzier. L. chalcedonica L., s. g. brennende Liebe, fr. fleur de Jérusalem „Jerusalemkreuz“ m. v. v., coeli rosa Desc. (Agrostemma c. r. L.) u. flos Jovis DC. „Jupiters“-L., L. Viscaria L. v. fl. pl. Pechnelke, fr. bourbonnaisse, attrape-mouche, alpina L. (Viscaria alp. Fr.), sylvestris Hoppe v. fl. pl. Hort., wild u. Gart. L. flos culi L. „Kukuks“-Lichte, fr. fleur de coucou od. lampette déchirée, e. cuckoo-flower, L. Preslia Sek., L. grandiflora Jacq. (China) etc.

1) **Lychnītis** (sc. Phlomis) L. (Labiaten, XIV. 1) lichtnelkenart. Flammenlippe. 2) **L.** (sc. Verbascum) L. (Scrophularineen, V. 1) lichtnelkenart. Wollkraut Grck. (v. λύχνης Leuchter, Kerze!).

Lycium L. (Solanaceen, V. 1) Bocks- od. Wolfsdorn, Hexenstrang od. Teufelszwirn Rmpl., fr. lyciet (licet), e. goat's- od. box-thorn (λύκιον Diosc. v. λύκος Wolf od. Λύκια Lycien), Gartenstr. L. barbārum Ait. (vulgare Dun. s. flaccidum Mnch.), L. europaeum L., ruthenicum Murr., chinense Mill. (barbārum var. chin. Ait., barbārum Lour.).

Lycoctōnum (sc. Aconitum) L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Wolfstod“-Eisenhut, Wolfs-Sturmhut Grck., -wurz, fr. tue-loup (étrangle-, herbe

au -), e. wolf's-bane (yellow w.-b.), libbard's-bane (v. λύζος u. κτόνος Mord).

Lycogäla Mich. (Pilze, XXIV. 4) Blut- od. „Wolfsmilch“ (s. v. u. γάλα, κτόνος Milch), z. B. plumbéum Mich.

Lycoperdon Mchx. (Pilze, XXIV. 4) Staub- od. Kugelpilz, Bovist, eig. „Wolfs“-F., fr. vesse- od. pisse de loup „Wolfswind“ etc. (λύζος u. πέρδομαι farze), z. B. L. gigantéum Riesen-Bovist, gemmatum stachelwarziger, etc.

Lycopersicæ Dun. (-on T.) (sc. Solanum) L. (Solanen, V. 1) „Wolfs-pfirsich“, s. g. Paradies- od. Liebesapfel, Tomate, fr. tomate (λύζος u. Persica Pfirsich), L. esculentum Dun. s. Humboldtii W., L. pyriforme Dun. (Solanum pomiferum Cav.), L. procumbens Dun. (Süd-amer.).

Lycopodiaceæ DC., Rchb., Seub. Bärlappgew., -podinæ DC. dsgl., s. sogl.

Lycopodium L. (Lycopodiaceen, XXIV. 1) „Wolfsfuss“, Bärlapp, Kolbenmoos D., fr. lycopode, pied-de-loup, mousse-massue od. plicaire, e. earth-moss (s. v. u. πόδιον Fusssocke v. ποντίς, -όδος Fuss — Form ähnл. d. Wolfsfährte!), L. clavatum L. etc.

Lycopsis L. (Boragineen, V. 1) „Wolfsgesicht“, Krummhals, Wall-Ochsenzunge, fr. licope, lycopside u. face-de-loup (s. v. u. ὄψις Gesicht), s. Echioides Riv.

Lycopus L. (Labiaten, XIV. 1) „Wolfsfuss“, Wolfstrapp, Zigeunerkraut D., fr. lycope, coumène, lance du Christ, e. mother-wort (s. v. u. ποντίς Fuss), z. B. L. amethystinus Steven (Amethystea coerulæa L.) etc.

Lycoris Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Lykoria“-Narzisse (zu Amaryllis L.) (Wtst. n. d. Nereide Lycoris, od. n. Λυγάρεια Gegend bei Delphi), Zier. L. auræa Herb. (Amar. aur. Ait.).

Lygeum L. (Gräser, III. 1) „Nuss“- od. „Bindgras“ (v. λυγών biege, binden), z. B. L. Spartum L.

Lygodium Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Kletterfarn, „Schling“-Mondfarn (v. λυγωδῆς geschmeidig — im Orient zum Flechten), Zier. L. japonicum Sw., scandens Sw. (Osmunda scand. autt.).

Lygodysodæa Rz. Pv. (Rubiæc. Cinchonac., V. 1) „Weidenrute“-Stinkkraut (λύγος Weidenrute, Dysodea v. δυσωδῆς, -εος übelriechend), z. B. ciliata Lk. u. foetida R. P. (Paederia f. L.).

1) **Lyonia** Nutt. (zu Andromëda Rchb.) (Ericaceen, X. 1) „Lyon's“-Torfod. Rosmarinheide (n. d. Sammler in Amerika John Lyon), L. ferrugininea, rigida u. paniculata Nutt., s. Andromëda L. 2) **Lyonia** Raf. (Polygonaceen). 3) **L.** Ell. (Asclepiadæen).

Lysimachia L. (Primulaceen, V. 1) Gilbweiderich, Felberich O. W., Friedlos Jess., fr. lysimaque, herbe à cent-maux (Plinius: n. d. König Lysimachus, wahrsch. aber v. λύω löse, μάχη Kampf — lasse d. Kampf los, daher „Friedlos“, od. löse d. Schmerzen, daher herbe à cent maux!), wild u. Zier. L. vulgaris L., e. common Loose-strife, fr. corneille, L. Nummularia L. (Ampelpfl.) „Pfennigkraut“, Lechenaultii Duby etc.

Lysimachion Tausch. (zu Epilobium Rchb.) (Onagrarien, VIII. 1) Weidenröschen (s. v.), z. B. E. angustifolium L. etc.

Lysipōma Hb. Bpl. Kth. (Campanulac. Lobeliaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Lösdeckel“ (λύσις Lösung, πῶμα Deckel — d. Kapsel springt m. ein. Deckel auf), z. B. acaulis Kth. (Lobelia androsacea W.), aretioides Kth. (Lob. glandulosa W.), etc.

Lythræcæa Grck., -rariae Rchb., -rariæ DC. „Blutkrautgew.“, s. sogl.

Lythrum L. (Lythræcæen, XI. 1) „Blutkraut“, Weiderich, fr. salicaire, e. blit (blites, blits), blood-flower (v. λύθρον Blutschmutz — Farbe d. Blumen u. ehedem geg. Blutfuss), Zier. L. virgatum L. s. austri-

äcum Jacq. (*Salicaria virg.* Mnch.) (N.-Amer.), fr. salicaire effilée, e. rod-like *Lythrum*, L. *Salicaria* L. „Weiderich“, m. v. *roseum superbum* Hort., fr. salicaire commun, e. willow-herbe, L. *Cuphea* L. (*Cuphea viscosissima* Jacq.), L. *fruticosum* L., etc.

Maackia Rupr. (*Cassieen Cäsalpinieen*, X. 1) „Maack's“-Cäsalpinie (n. d. Gymn.-Dir. Maack in Irkutsk), M. *amurensis* Rupr.

Maba Forst. (*Ebenaceen*, XXII. 8) Maba- od. Teufelsbaum, fr. mabouier, Maba-Eisenholz (maba Nam. d. Baums auf d. Tonga-Ins.), M. *buxifolia* Pers. (*Ferreöla bux.* Kön.), M. Ebēnus Spr. (Ebēnus vulgaris Roxb.) gem. Ebenholz.

Maburnia P.-Thou. (*Irideen*, III. 1) „Burmann's“-Schwertel (Anagramm v. *Burmania*!), s. *Burmannia capensis* Mart.

Machaeranthēra Nees (*Compos. Astereen*, XIX. 2) „Säbelanthere“ (*μάχαιρα* Säbel, *ἄνθη* Staubbeutel — Antheren m. Messeranhang an d. Spitze), Zier. M. *tanacetifolia* Rehb. f., s. *Aster tanac.* H. B. K.

1) **Machaerium** Pers., Kth. (*Legumin. Galegeen*, XVII. 4) „Säbelhülse“ (s. eb. — Hülse säbelf. zugespitzt!), M. *acuminatum* Kth. (*Nissolia arborea* Jacq.), *ferrugineum* Kth. (Niss. ferr. W.). 2) **Machaerium** Juss. (*Bignoniaceen*, XIV. 2) „Säbelchen“, *Palisanderholz* (*μαχαιρίον* dem. v. *-χαιρία* Säbel), s. *Jacaranda brasiliensis* Juss.

Machilus Nees, Wall. (*Laurineen*, IX. 1) Duft-Lorbeer, M. *odoratissimus* Wall. (Persea od. G.) (Name indisch. Ursprungs).

Machlis DC. (*Compositen*) „Buhlerin“ (v. *μαχλός* geil etc. — d. ♀ Blüt. nackt).

Macis W. (*Myristiceen*, XIII. 1) Muskatenblume, s. *Myristica moschata* Rumph. s. *officinalis* L. (v. d. gr. *μάκρη* Makir, ind. Gewürz — n. Aemilius Macer, Verf. d. ältest. mediz. Werks „Macer floridus de virtutibus herbarum, d. ganze Mittelalter hind. citiert, s. Jessen Bot. d. Gegenwart u. Vorzeit, S. 130).“

Mackaya Arnott (*Cucurbitaceen*, XXI. 10) „Mackay's“- od. Rotpfahl-Kürbis (n. Dr. Mackay, Dir. d. Gart.'s am Trinity-College z. Dublin, † 1862), s. *Erythropálmum* Blum.

Macleania Grah., Hook. (*Ericaceen Vaccinieen*, X. 1) „Maclean's“-Heidelbeere (n. John Maclean Esq., Kaufm. u. Bot. in Lima, Peru), M. *coccinea* Decsn. etc.

Macleya R. Br. (*Papaveraceen*, XIII. 1) „Macleye“ (n. A. Macley, Sekr. d. Linné'sch. Gesellsch. in Lond.), Zier. M. *cordata* R. Br., s. *Bocconia cord.* W.

Maelūra (-ria) Nutt. (*Urticaceen Moreen*, XXI. 4) Osagendorn Rmpl., -orange (n. d. engl. Geologen W. Maclure, † 1840 in Mexiko), M. *aurantiaca* Nutt., fr. Maclure épineux (mâle u. femelle), e. osage-orange, s. *Morus* s. *Broussonetia tinctoria* L., Vent.

Macradenia R. Br. (*Orchid. Vandeen*, XX. 1) „Langdrüsen“-O. (*μαρξός* lang, gross, *δέρνειν*, *-ερνεῖν* Drüse — langgeschwänzte Pollenmasse!), z. B. *polystachya* Spr. (*Epidendron p.* Thou.) etc.

Macrocarpium Spach (sect. v. *Cornus* L.) (*Cornaceen*, IV. 1) „Grossfrucht“-Cornelstr. (s. eb. u. *zaqtōs* Frucht), z. B. C. mas L. echte Cornelkirsche.

1) **Macrochilus** Knowl., Westc. (*Orchid. Vandeen*, XX. 1) „Langlippe“ (s. v. u. *χειλός* Lippe — lange, ungeteilte Lippe!), s. *Miltonia Lindl.* 2) **Macroch. Presl** (*Lobeliaeaceen*, XIX. 6) „Langlippen“-Lobelie (— lang herabhäng. schmale Lippenzipfel!), s. *Lobelia* L.

Macrochlöa Kth. (*Gräser*, III. 2) „Lang“- od. Pfriemengras (s. v. u. *χλόα* Spross, Gras — sehr hohe Gräser!), z. B. *tenacissima* Kth., s. g.

- Eespererogras od. Halfa (Algerien — dient zu Matten, Geflechten u. als Papier-surrogat).
- Macrocnēmum** P. Br., Vell. (Cinchonaceen, V. 1) „Langschienen“-China-str., „Stengelblume“ D. (s. v. u. *zvήμη* Schienbein — sehr lange Blumenstiele!), M. speciosum Jacq., s. Mussaenda spec. autt.
- Macrolobium** L., Schreb. (Cassieen Cäsalpinieen, III. 1) „Lang“- od. „Grosslappe“ D. (s. v. u. *λοβίον* dem. v. *λοβός* Lappen — d. ob. Kronblatt sehr lang), z. B. hymenaeoides W. (Vouapa bifolia Aubl.), staminēum Mey. (B. Guiana), pinnatum W. (Outea guian. Aubl.), sphaeroearpum W. (Vouapa Simira Aubl.).
- Macropīper** Miq. (Piperaceen, II. 3) „Langpfeffer“ (s. v. u. *pīper* Pfeffer — grosse Blätt.), z. B. excelsum aureo-pictum Bull.
- Macroscēpis** Hb. Bpl. Kth. (Apocyneen, V. 2) „Lang“- od. „Gross-decke“ (s. v. u. *σφέπη* Decke etc. — d. Kelch grösser, als d. Krone u. an d. Basis m. Brakteen), z. B. obovata Kth., longiflōra Spr. etc., s. Cynanchum L.
- Macrostȳlis** Bartl. (Rutaceen, V. 1) „Langgriffel“-Raute (s. v., *στυλίς* Griffel — diese lang hervorstehend), z. B. lanceolata u. barbigēra Bartl., s. Agathosma W. u. Diosma L.
- Macrōtis** Raf. (Ranunculaceen, XIII. 1) „Langohr“, traubiges Christophskraut (s. v. u. *οὐς*, *ωτός* Ohr — lange Blütentraube), s. Actaea race-mosa L.
- Macrothyrsus** Spach (zu Aesculus L.) (Sapindaceen, VII. 1) „Gross“- od. „Langstrauss“ (s. v., *θύρσος* „Thyrsus“ u. Strauss — langer Blütenstiel), Zier. M. parviflōra Walt. s. macrostachya Mehx.
- Macrotropis** DC. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Grosskiel“ (s. v. u. *τρόπις* Schiffskiel — Kielblätt. so gross als d. Fahne), z. B. foetida u. inodora DC., s. Anagyris chinensis u. inodora Spr.
- Macrozamia** Miq. (Cycadeen-Farne, XXIV. 1) „Hoch-Zamia“ (s. v. u. Zamia — hoh. d. Zamia ähnl. Gewächs!), Treibh. M. spiralis Miq. u. plumosa Hort. Bull.
- Madaria** DC. (Composit. Sigesbeckieen, XIX. 2) „Glatzenblume“, zierl. Ölmadie (Gatt. aus Arten von Madia gebildet, v. *μαδία* kahlköpfig?), Zier. M. elegans DC. s. corymbosa Hort., fr. Madaïre élégante, s. Anthémis elegans Hort.
- Madia** Don, Mol. (-dēa Sol.) (Compos. Sigesbeckieen, XIX. 2) Öl-, „Madie“, Klebsaat (v. d. chilenischen madi, od. v. *μαδίω* lat. madeo bin schmierig od. matschig — Charakt. v. Madia sativa!), geb. M. sativa Mol. Ölmadie, Zier. M. elegans Don (Madaria el. DC. s. corymbosa Hort. — Madiæae DC.
- Magnolia** L. (Ranunculac. Magnolieen, XIII. 6) „Magnolien“- od. Biberbaum Rmpl., fr. magnolier od. laurier tulipier „Tulpen-Lorbeer“ (n. d. Prof. Pet. Magnol z. Montpellier, † 1745), Zierb. grandiflora L. m. v. v., obovata Thb. s. purpuréa Sims, Yulan Desf. s. conspi-cūa Salisb. (Südchina) m. v. (Blendlingen) triumphans, Alexandrina, Soulangeana etc., glauca L. s. fragrans Sal. Biber- od. Sumpf-M., fr. arbre de Castor, e. beaver-wood od. swamp-Magnolia, tripetala L. s. umbrella Lam. „Schirmbaum“, fr. arbre parasol, e. elk-wood etc., macrophylla Mehx. (Michauxii Hort.) etc. — Magnoliæae DC.
- Mahagōni** Ad. (sc. Swietenia) L. (Rutaceen, X. 1) „Mahagonibaum“ (Meüblesholtz — westind. Name maagoni!).
- Mahāleb** (sc. Prunus) L. (Amygdaleen, XII. 1) Weichselkirschbaum, Steinwechsel, St. Luzienholz, Felsenkirsche, Dintenbere, fr. Bois de St. Lucie, prunier odorant, e. Mahaleb-cherry-tree, perfumed ch.-tr. (arab. Name mah-haleb!), s. Prunus odorata Lam. m. v. v.
- Mahernia** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Mahernie“ (Hermannie) (Ana-

gramm v. *Hermannia*!), Zier. *M. glabrata* Hort. (jonquillenduft. Stabenpfl.!), incisa Jacq., odorata Andr.

Mahonia Nutt. (Berberideen, VI. 1) „Mahon'sstrauch“, fr. *Mahonie*, e. ash-*berry* (n. d. amerik. Bot. Bernh. Mac-Mahon zu Anfang dies. Jahrh.'s, schr. Gartenkalender, Philad.), Zier. *M. Aquifolium* Nutt. (Berberis Aq. L.) stechpalmlätztr., fr. *M. à feuilles de houx*, e. holly-leaved ash-*berb.*, *M. fascicularis* DC. (Berb. pinnata Lag.), *M. nervosa* Nutt. (glumacea DC.), repens G. Don (Berb. rep. Lindl.) etc. **Majanthēnum** Roth (Smilacineen, VI. 1) „Mai“— od. Schattenblume Grck. (v. Majus Monat Mai u. $\alpha\tau\vartheta\epsilon\mu\sigma\tau$ i. q. $\alpha\tau\vartheta\sigma\varsigma$ Bl.), *M. bifolium* Schmidt s. *Convallaria* Web., s. *Convallaria* bif. L. u. Smilacina bif. Desf.

Majorāna Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Majoran“ od. „Mairan“ Grck., fr. marjolaine, e. majoram (marjoram, -rom, -rum) (n. d. arab. maryamch od. marjamie), *M. hortensis* Mnch. s. *vulgaris*, s. *Origānum Majorāna* L.

Malabatrica (sc. Melastōma) L. (Melastomaceen, X. 1) Schwarzbeere, Tomalopatra (Fructus niger) Rumph. (gr. $\mu\alpha\lambda\alpha\beta\alpha\theta\gamma\sigma\tau$ ind. Gewürz od. Nelkenblatt, Betel), s. *Laurus malabatus*!

Malachium Fr. (zu *Cerastium* Rehb.) (Alsineen, X. 5) „Weichling“ Grck. od. Weichkraut Seub. (gr. $\mu\alpha\lambda\alpha\zeta\mu\sigma\tau$ weiches Kleid — weich-anzufühl. Pfl.!), *M. aquaticum* Fr. (Cerast. aq. L., Larbrēa aq. Ser.). **Malaguetta** (sc. *Anomum*) L. (Scitamineen, I. 1) Malaguetta-Pfeffer, Cardamome (Name in Guinea).

Malaxis Sw. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Zartorche“ (v. $\mu\alpha\lambda\alpha\zeta\sigma\zeta$ lat. *mollis* weich, *zart*), z. B. *paludosa* Sw. (*Ophrys palud.* L.), *monophyllum* Sw. etc. — *Malaxidæ* Lindl.

Malcolmia R. Br. (Crucifer. Siliquosen XV. 2) „Malcolmie“ (n. d. Zücht. W. Malcolm in Lond., † 1835, schr. 1771 A Catal. of Hothouse and Greenhouse), Zier. *M. maritima* R. Br. m. v. *alba*, bicolor Lois., *Chia* R. Br. levant. *M. (Chios)*, s. *Cheiranthus Chius* L.

Malöpe L. (Malvaceen, XVI. 8) „Malvenantlitz“, fr. malope, fausse mauve (v. *Malva* u. $\omega\tau\eta$ Antlitz, Ausehn., Wst. d. veränd. $\mu\alpha\lambda\alpha\zeta\eta$, Plin.), Zier. *M. trifida* Cavend. (*Malopa* tr. Lem.), m. v. *grandiflora* Hort., *parviflora* l'Hér. (*Palavia malvaefolia* Cavend.).

Malpighia L. (Caryophylleen Malpighieen, X. 3) „Malpighie“, amerik. Kirsche, fr. moureiller, brin d'amour (n. Marcello Malpighi, Prof. in Bologna, † 1693), z. B. *argentea* Jacq. (*Bunchosia arg.* DC), *cocclobaefolia* Spr. (*Byrsönima c.* DC.), *Armeniaca* Cav. (*Bunchosia Arm.* DC.), *crassifolia* L. s. *Moureila* Aubl. (*Byrsion. ferruginēa* Hb., Bpl.) (Bstr. Südäm.). — *Malpighiacæae* DC., -iae Juss., -iae Rchb., -inae Bartl. Fam. u. Ord. d. Malp.-Gew.

Malus T. (zu *Pirus* L.) (Rosac. Pomaceen, XII. 4) Apfelbaum, fr. pommier, e. apple-tree (gr. $\mu\bar{\eta}\lambda\sigma\tau$ od. $\mu\bar{\eta}\lambda\sigma\tau$ lat. *malum* Apfel, Obst, *malus* Apfelbaum), Zier. *M. spectabilis* Kaido fl. pleno Prachtapfel Rmpl., *M. floribunda* v. Sieb. „blütenreicher“, Toringo v. Sieb.

Malva L. (Malvaceen, XVI. 6) „Malve“, fr. mauve, e. mallow, auch Rosen- od. Käsepappel Grck., fr. fromageon (lat. *malva*, gr. $\mu\alpha\lambda\alpha\zeta\eta$ v. $\mu\alpha\lambda\alpha\zeta\sigma\sigma\tau$ erweiche — als Heilmittel), z. B. wild M. *rotundifolia* L., fr. petite mauve, wild u. Zier. *M. moschata* L. „Moschus“ M., fr. m. musquée, e. musk-mallow (M. *trifida* Cav.), M. *Alcēa* L., Siegmar'swurz, *silvestris* L., Gärten: *mauretanica* L. *Zebra*-M., fr. m. d'Algier, e. mauritanian M., *crispata* L., *miniata* Cav. (*Sphaeralcēa* m. Spach) mennigr. M., fr. m. à fleur cinabre, e. vermilion M. etc. — *Malvacæae* Juss., R. Br., DC., Rchb., -væae Rchb.

Malvaviscus Ad., Ait. (Malvaceen, XVI. 6) Baum- od. Tutenmalve, fr. mauvisque Bastard-Eibisch Wolff (Wst. aus *Malva* u. $\iota\sigma\zeta\sigma\tau$ ähnl.

- od. Hibiscus gebildet), Treibh. M. arborēus Cav., s. Achania s. Hibiscus Malvaviscus Ait.
- Malvinda** Med. (Maluinda Burm.) (Geraniac. od. Sterculiaceen, XVI. 8) „indische Malve“ (aus Malva u. indica geb.), z. B. M. ulmifolia Burm. (Waltheria ind. L.), palmata „Handblatt“-M. (Sida p.).
- Mammēa** L. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 1) Brüstebaum, „Mammei“ D., Mammibaum, fr. mamei (n. d. amerik. mammey, lat. mamma Mutterbrust — brustwarzenähn'l. Griffel), M. americana L. Aprikosenbaum von St. Domingo, fr. Abricotier d'Amérique.
- Mammillaria** Haw. (zu Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Zitzen“-Cactus (v. mamilla Brustwarze — ganz m. solchen Höckern besetzt!), Zier. M. coronaria, densa u. longimamma (gelb), Lehmanni u. simplex (blassgelb), s. Cactus mammillaris L.
- Mancinella** (sc. Hippomāne) L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Manchinell“-od. Giftpfelbaum (manzanilla dem. v. d. span. manza Apfel — Früchte wie ein Franzapfel).
- Mandevillea** Lindl. (Apocynen, V. 2) „Mandeville's“-Hundswürger (n. H. J. Mandeville Esq., Min. in Buenos-Ayres, Wst.: n. John Mandev., Reis. in Asien u. Afrika, † 1771), z. B. Gewächsh. M. sua-veolens Lindl. (Schlingstr.), s. Echites DC.
- Mandihoea** Piso, s. Manihot!
- Mandirola** Van Houtt. (Gesneriac., XIV. 2) „Mandirola“ (unbek. Etymologie!), Zier. M. multiflora Van H., s. Achimenes m. Gard., pié-turata, Roezlii.
- Mandragöra** T. (Solaneen, V. 1) Hexenkraut, Alraunwurzel, fr. man-dragore, racine du Saint-esprit, mainde-gloire, e. earth-apple, man-drake (v. μάνδρα Viehstall u. αγούα Sammelplatz — wächst um Ställe, Wst. μανδραγόρας od. -οργή betäub. Pfl., hebr. dudaim, als Schlaf- u. Liebestrank gebr., Riemer), M. acaulis G., s. Atrōpa Mandragöra L.
- Manettia** L., Mut. (Rubiac. Cinchonaceen, IV. 1) „Manettie“ (n. Xaver Manetti, Dir. d. bot. Gartens z. Florenz), Gewächsh. M. bicolor Paxt., fimbriata Schldl. (Nacieba Aubl.), picta W., lanceolata Vahl (Ophiorrhiza l. Forsk.), etc.
- Mangiféra** L. (Terebinthac. Anacardieen, V. 1) Mangobaum, „Mango-trägerin“, Mangopflaumenb., fr. manguier (-gier), e. mangrove (ind. Name d. Frucht manga), Warmh. M. indica L., s. Manga Rumph.
- Mangium** Rumph. (Rhizophoreen, XI. 1) Leuchter- od. Stelzenbaum (vaterl. mangle), M. candelabrum, celsum, minus etc. Rumph., s. Rhizophōra Mangle L. Mangrovebaum, fr. palétuvier, M. caseolare Rumph., s. Sonneratia acīda L. (B. Molukk.) (Rhizophōra s. Aubletia caseol. L., G.), s. sogl.
- 1) **Mangle** Pluk., DC. (sc. Rhizophōra) L. (Rhizophoreen, XI. 1) „Mangle“- od. Mongrovebaum, Wurzel-, Leuchter- u. Stelzenbaum, Wurzelsenker (indischer Name des B.'s!), s. Candēla americana Catesb. 2) **Mangle** Sloan. (Anacardiaceen, XXIII. 2 od. Myoporineen, XIV. 2), M. laurocerasifolia Sl. oriental. Nierenbaum, s. Anacardium orientale Bauh. (Avicennia tomentosa L. s. Bontia germinans L. f.).
- Manglilla** Juss. (sc. Bumelia) W. (Sapotaceen od. Lucumeen, V. 1) Eisenholz (manglilla dem. v. mangle in Peru), s. Sideroxylon Manglilla Lam. (Myrsine M. R. Br.); M. Chrysophyllum Lam., s. Duhamelia Manglilla Domb.
- Mangostana** Rumph., G. (sc. Garcinia) L. (Guttiferen, XI. 1) wohl-schmeck. Mangofrucht, fr. mangoustan (-gostan) (malayisch. Name der Frucht!).

- Manicaria** G. (Palmen od. Pandaneen, XXI. 5—10) „Ärmel“- od. „Sackpalme“, westind. Netzpalme, M. *saccifera* G. (v. *manica* Ärmel, Manschette — Blütenscheide!).
- 1) **Manihot** Plum. (Euphorbiaceen, XXI. 11) Manihotwurzel, fr. manioc (-chot) (brasil. Name!), M. *utilissima* Pohl, s. *Jatropha Manihot* L. Cussave, „Maniokmehl“. 2) **Manihot** DC. (sc. *Hibiscus*) L. (Malvaceen, XVI. 8) (zu *Abelmoschus*) indischer od. Manihot-Eibisch, schwefelg. M.-Rchb.
 - 1) **Manna** Don (Sapoteaceen Fraxineen, II. 1 od. XXIII. 2) „Manna“- Esche (*μάρρα* Mannazucker v. d. arab. mann Geschenk — Gabe d. Himmels), M. *rotundifolia* Don s. *Fraxinus* rot. Ait., W. u. Fr. Ornus L. 2) **Manna nepalensis** Don (Legumin. Hedysareen, XVII. 4) Mannaklee von Nepaul, s. *Hedysarum Hamiltonii* Spr.
- Manzanilla** (-canilla Plum.) (sc. Hippomâne), s. *Mancinella*!
- Mappa** Juss., Spr. (sc. *Ricinus*) L. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Molukken-Wolfsmilchbaum, „Tafeltuchb.“ Leun. (v. mappa lat. u. ital. Serviette etc. — Blätter zu Tischdecken! nicht Wtst.: nach Marc. Mappus, Arzt z. Strassb., schr. üb. Thee etc. 1691, vgl. d. folgende!)
- Mappia** Schreb. (Dilleniaceen, XIII. 6) „Mappus“-Dillenie (s. eb.).
- Maranta** L. (Marantaceen od. Cannac., I. 1) „Maranta“, Pfeilwurz, e. arrow-root (n. d. venetian. Arzt Barthol. Maranta, † 1754), M. *arundinacea* L., Zier-Blattpfl. M. *striata* u. *zebrina* Sims, s. *Calathaea* G. F. W. Mey u. *Phrynum* Roxb., W.
- Marasmius (-ium)** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Welk“-P. (*μαρασμός* Altersschwäche, v. *μαραίνω* welke — d. Hutlamellen werd. zuletzt lederartig), M. *alliaceus* Fr. Mousseron d. Küche, Gewürz-P.
- Marathrum** Raf. (Umbelliferen, V. 2) Fönchel od. Fenchel, M. *foeniculaceum* Hb. (*Lacis* f. Spr.) (gr. *μαράθρον* od. -*θορ*, lat. foeniculum), s. *Foeniculum* T. (*Hippomarathrum* Dub.).
- Marattia** Sw. (Osmundaceen od. Wasserfarne, XXIV. 1) „Maratti“- Farn (n. d. Prof. G. F. Maratti in Rom, schr. 1760 de floribus Filicium), Zier. M. *alata* Sm. u. elegans Endl. — *Marattiacae* Kaulf.
- Maregravia** Plum., L. (Guttiferen, XIII. 1) „Maregrav's“-Gummistrauch (n. d. Reis. in Brasil. u. s. f. G. Maregrav, † 1644 in Guinea), M. *umbellata* L., *picta* W. (Str. Bras.), spiciflora Rich. (Str. an Vulkanen auf Guadeloupe). — *Maregraviæ* Juss.
- Marchantia** March. f., Raddi (Lebermoose, XXIV. 3) „Marchantie“, Stein-Lebermoos, Leberkraut Leun., e. litchen (geg. Leberkr. gebr.) (n. d. franz. Gart.-Dir. Nic. Marchant z. Blois, † 1678), M. *polymorpha* Radd., fr. hépatique des fontaines. — *Marchantiacæ* Cord.
- Margaris** DC. (Rubiaceen, XXII. 7) „Perlkaffee“, s. g. Perlitas der Mexikaner, Pfeiffer (*μαργαρίτης*, -*ιδος* Perle — weg. d. Beeren!), M. *barbigera* u. *nudiflora* DC.
- Margarita** Gaud. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Margarite“, fr. marguerite, eig. Ganseblümchen od. Masliebchen (s. eb. — Wtst. d. Strahlblütlchen perlmutterartig rot u. weiss!), M. *Bellidiastrum* Gaud. (*Arnica Bellid.* W.), s. *Bellidiastrum* Mich.
- Margaritaria** L. (Euphorbiaceen, XXII. 7) „Perlenknopfbeere“, M. *nobilis* L. (*μαργαρίτης*, lat. *margarita* Perle — Frucht aus 4—5 glänzend. Knöpfen).
- Marianus** (sc. Cardiūs) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Mariendistel“, fr. chardon Marie, e. Lady's-thistle od. milk-th. (n. Maria, d. Mutter Christi, von deren Milch d. weissen Blattflecken herühren sollen), s. *Silybum Marianum* G.
- Marica** Schreb. (Irideen, III. 1) Sumpflilie Rmpl., Morastl. D. (maricus v. mare, d. celt. mar Moor! Wtst. d. veränd. America — im

- tropischen Amerika z. Hause), M. paludosa W. (Cipura paludosa Aubl.).
- Marila** Pers., Sw. (Guttiferen Clusiaceen, XIII. 5) „Durchschein“-Schweinsgummi (*uaqūn* glühende Kohle — durchscheinende Adern ! Paxton, Wtst.: Name d. B.'s auf d. Antillen !), M. racemosa Sw., s. Bonnetia rac. Sw. (B., Amer.) (Mahurēa Aubl.).
- Mariseus** Hall., Vahl (sc. Cladium) R. Br. (Cyperaceen, III. 1) „Moor“-od. Bollsime D., deutsche Schneide (n. d. celt. mar Moor, latinisiert !), s. Schoenus Mariscus L. u. Cladium germanicum Schrad.
- Marmelos** (sc. Crataeva) L. (Capparideen, XI. 1) Schleimapfel, fr. poire à trois feuilles (v. d. portug. marmelo Quitte, wovon auch marmelade !), s. Cucurbitifera Pluk.
- Marrubiastrum** Mnch. (sc. Leonurus) L. (Labiaten, XIV. 1) „Andorn“-Löwenschweif, fr. marrubiastre, faux marrube (deter. v. Marrubium, s. d.), s. Chaiturus W. Marrubiastr. Rchb. s. leonuroides W.
- Marrubium** L. (Labiaten, XIV. 1) Filz- od. Weichandorn, fr. marrube, pied de loup, e. hoare-hound (v. *μάρον* lat. marum Katzenkraut, hebr. mar bitter, rob viel, schwerlich Linné: v. Maria Urbs, Stadt in Latium).
- Marsdenia** R. Br. (Asclepiaden, V. 2) „Marsden's“-Wachspfl. (n. d. Admir.-Sekr. W. Marsden, schr. hist. of Sumatra, Lpz. 1785), M. tenacissima R. Br. (Faserpfl. Indiens).
- 1) **Marshalia (-llia)** Gmel., Schreb. (Compos. Eupatorineen od. Helianthen, XIX. 1 od. 3) „Marshal's“-Blume (n. Humphrey Marshal), M. bulbosa Raf., aliena Spr. (Montevid). 2) **Marshallia** Pursh (Proteaceen, IV. 1), M. lanceolata Pursh, s. Persoonia lanc. Mchx.
- Marsilēa (-ia** Grck.) L. (Marsiliaceen, XXIV. 1) „Marsilie“, Roll- od. Schneckenfarn, Kleefarn Seub., Schleimfarn Endl., fr. marsile (nicht n. d. Grafen Aloys Ferd. Marsilli v. Bologna, sond. nach L. F. Marsigli, lat. Marsilius, schr. de generatione Fungorum, Romae 1714), M. quadrifoliata L., salvatrix Hanst. „Rettterin“ (— fristete den Gefährten der Burk'schen Austral - Expedition das Leben, Leunis). — Marsiliaceae R. Br., Bartl., Rchb. (zu Hydropterides Endl.) Wurzel-farne Rchb.
- 1) **Martāgon** Cam. (sc. Lilium) L. (Liliaceen, VI. 1) Türkembund, Krull-od. Berglilie, Goldwurz, fr. martagon, e. martagon, king's-spear u. turk's-cap (v. Mars, -tis u. *ἀγών* Kampf, -preis, Wtst.: n. d. Alchymisten st. Martigenus eisenbürtig, Kind des Mars!). 2) **Martāgon** Bak. (sect. v. Lilium L.), z. B. ausser Martagon L. noch byzantinum Hort. s. chalcedonicum L., pomponium L., dalmaticum Moly m. v. album Hort., superbum L., speciosum Thb. s. lancifolium Hort., canadense L. s. penduliflorum Red. etc.
- Martinezia** Rz. Pv. (Palmen, XXI. 11) „Martinez“-P. (n. d. span. Bot. Martinez y Leache Miquel, schr. Disput. de vera et legitima Aloës electione, Pompejopoli, 1644, Wtst.: n. Quer Josef y Martinez, Prof. z. Cadix, † 1764, schr. Fl. v. Spanien), Zier. M. caryotaefolia Hb., Kth., erosa (Antill.).
- Martynia** L. (Bignoniaceen od. Sesameen, XIV. 2) Gemshorn od. Elephantenrüssel, fr. cornaret, e. elephant-trunk (n. John Martyn, Prof. in Cambridge, † 1768, schr. Fl. v. Cambridge), Zier. M. proboscidea s. annua L. (alternifolia Lam.), fr. ongles du diable etc. m. v. v., M. fragrans Lindl., lutea Lindl., spathacea Spr. (Holoregnia viscida Nees), perennis L. (Gloxinia maculata l'Hér.) etc.
- Maru** (sc. Origānum) L. (Labiaten, XIV. 1) arabischer Majoran (v. d. arab. mary-amych).
- Marum** Hall. (sc. Teucrium) (L. (Labiaten, XIV. 1) Katzen-Gamander M.-Rchb., Katzenkraut, fr. marjolaine de Crète, e. mastich (-stick)

(v. d. hebr. mar, gr. μάρον brennend bittere Pfl.), H. hispanicum nigrum Hall., Bocc., s. Teucrium multiflorum L.

Marūta Cass., DC. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Marute“, Stinkkamille, fr. maroute (wahrsc. Marum-Geruch! s. eb.), s. Cotula L. Laugenblume.

Masdevallia Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Masdevall's“-O. (n. d. span. Arzt u. Bot. Jos. Masdevall), z. B. M. attenuata u. Shuttleworthi Rehb. f.

Massonia L. (Liliaceen, VI. 1) „Masson's“-Meerzwiebel (n. d. schwed. Reis. in Südafr. 1772 u. 1786/96 Fr. Masson, schr. Stapeliae novae etc.), M. corymbosa Sims (Scilla cor. Sims), ensifolia (Polianthes pygmaea), lanceolata Thb. s. angustifolia L., etc.

Mastix W. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Mastix“-Pistazie, fr. mastic, e. mastich-tree (gr. μαστίχη Mastix, Harz der Pistazie), s. Pistacia Lentiscus W.

Mastixia Blum. (Cornaceen, IV. 1) „Peitschen“-Cornelstr. (v. μάστιξ, -γος Peitsche — dünne, schlanke Triebe!).

Matricaria Vaill., L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Mutterkraut“, echte Kamille, fr. matricaire, oeil de soleil, e. mother-wort od. camomil (-mile) (v. matrix, -cis Gebärmutter — heil. Kraft d. Kamillenthees für Kindbetterinnen!), Offiz. M. Chamomilla L., Gartenbl. M. eximia Hort. m. v. grandiflora Vilm., M. Parthenium L. (Chrysanthem. s. Pyrethrum Parthenium Sm., Pers.) Metterich Vilm. Jungfernkr., Mädchenblume, Mutterkamille, Fieberkraut, e. common feverfew od. -pellitory, m. v. aurēum Hort., fr. pyrētre dorée, e. golden-feather (Teppichg.) v. fl. pl., wild u. Zier. M. inodora L. (Chrysanth. inod. L., Matricaria grandiflora Hort., Pyrethr. inod. Sm.), parthenioides Desf. (Anthémis p. Bernh.) m. v. multiplex Hort., fr. m. Mandiane.

Matricarioides Less. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) (zu Tanacētum L.) „Mutterkraut“-Rainfarm (s. v., εἴδομαι gleiche).

1) **Matthiöla** R. Br. (Crucifer. Siliquosen, XV. 2) Levkoje, fr. girofée, gazon de Mahon (n. Pet. Andr. Matthioli, lat. Matthiolus, von Siena, Leibarzt d. Kaisers Karl V., † 1577, schr. Compend. de plantis etc.), Gart. u. Topf: M. annua Sw. Sommer- u. M. incana R. Br. Winter-Levkoje, beide m. v. v., s. Cheiranthus annua u. incana L. 2) **Matthiöla** Plum. (Rubiac. Guettardeen, V. 1) „Matthioli's“-Guettarde, M. scabra Plum. (Guettarda sc. Lam.).

Mauhlia (Maulia) Thb. (Liliaceen, VI. 1) „Maulie“ od. blaue Tuberose (n. H. D. Joh. Maule, schwed. Kaufm., Linné's Zeitgenossen), M. capensis Thb., s. Agapanthus umbellatus l'Hér. s. Crinum africanum L.

Maurandia Ort., Jacq. (Scrophularineen, XIV. 2) „Maurandy's“-Kletterpfl. (n. Dr. Maurandy, Prof. in Carthagena), Zier. M. Barklayana Lindl. m. v. v. (lilacina Vilm., coccinea Hort., purpureo-grandiflora Hort. etc.), M. semperflorens Ort. (Usteria scandens Cav.) u. antirrhiniflora W., etc.

Mauritia L. f. (Palmen, XXII. 6) „Moritz“-P. (n. d. Prinz. Moritz v. Nassau-Oranien, † 1665), Zier. M. aculeata HB. Kth., flexuosa L., vinifera Mart., Wein- od. gem. Fächer-P., guaraunischer Palmwein, Leon. od. Ipuruma.

Maurocenia Mill. (Sapotac. Aquifoliaceen, V. 3) Instrumentenholzbaum (n. J. F. Maurocenus, schr. Catal. pl. et. Patav. 1713), M. Frangularia Mill., s. Cassine Maurocenia L.

Maxillaria Rz. Pv. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Kinnbacken“-O. (v. maxilla Kinnbacken — bezügl. d. vorgezogn. Basis der Columna), z. B. aromatica Hook. (Colax ar. Lindl.), picta Hook. (Bras.) etc.

1) **Maximiliana** Mart. (Palmen, XXIII. 3) „Maximilian's“-P. (zu Ehr. d. Prinzen Maximilian v. Neuwied), M. regia Mart. u. insignis ds.

(Brasil.). 2) **Maximilianeum** St. Hil. (-nia Schrk.) (Ternstroemiacaceen, XIII. 1) „Maximilian's“-Schneckensamen (n. Maximilian I., König v. Bayern), s. *Cochlospermum Kth.*, *M. Gossypium* St. Hil., s. *Bom-
bax gossypinum* L. falsch. Seidenwollbaum.

Maximowiczia (-witschia) Rupr. (Menispermeen od. Annonaceen, XXI. 5) „Maximowicz“-Spaltantherenstr. (n. d. russ. Reis. u. Bot. Maximowicz), z. B. *chinensis* s. *amurensis* Rupr., s. *Kadsura chin.* Turcz.

Mecanopsis Vig., DC. (Papaveraceen, XIII. 1) „Mohngleiche“ ($\mu \eta \zeta \omega \nu$ Mohn, $\psi \psi \zeta$ Aussehn), z. B. *M. cambrica* Vig., s. *Papaver cambr.* s. *Stylophorum* c. Spr.

Medeola L. (Melanthac. od. Smilaceen, VI. 3) „Medea“-Spargel (dem. v. Medea, d. Giftmischerin v. Colchis, od. v. medeo heile — Heilkraft), Ampelpfl. *M. asparagooides* L., s. *Myrsiphyllum* s. *Asparagus medeoloides* Thb. (*Dracaena medeol.* L. f.).

1) **Medica** Riss (sc. *Citrus*) L. (Hesperid. Aurantieen, XVIII. 2) Cedrat od. Cedrot M.-Rchb. echte Citrone (Orangerieb.), s. *Citrus Malus Blackw.* „Citronenapfel“ (Medicus aus Medien). 2) **Medica** (zu Medicago Rchb.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) e. medick, z. B. *M. lupulina* Scop. Hopfenklee, fr. lupuline, orbicularis W.

Medicago L. (Legumin. Loteen, XVII. 4) Schneckenklee, e. snail-clover (-trefoil) (ob von medico heile? od. Wtst.: medicus medisch, aus Medien eingeführt die Luzerne!), z. B. geb. *M. sativa* L. Luzerne od. ewiger Klee, fr. trèfle de Bourgogne, e. lucern od. medick-fodder, wild *M. lupulina* L. „Hopfenklee“, fr. trèfle noir, mélilot des champs, mignonette od. minette dorée, *M. falcata* L. „Sichelklee“, fr. lente (vgl. Medicina Rchb.).

Medinilla Gaudich. (Melastomac. od. Lythraceen, X. 1) „Medinille“ (Wtst.: n. D. José de Medinilla y Pineda, Gouv. d. Marianen), *M. farinosa* Gaudich. Gewächsh. magnifica Lindl.

1) **Medium** T. (sc. *Campanula*) L. (Campanulaceen, V. 1) grossblum. Glockenblume, Marienglocke, fr. medium od. mariette (gr. $\mu \eta \delta i o r$ ein Kraut, $\mu \eta \delta i o s$ medisch, Wtst. v. medius mittler — mittelgrosse Blumen?). 2) **Medium** (sc. *Convolvulus*) L. (Convolvulac., V. 1) linealblättr. Winde.

Meesia Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Meese's“-M. (n. d. niederl. Gärtn. Dav. Meese, schr. Fl. Frisia, 1760), z. B. *M. serrata* G., s. *Walkera serr.* W. — Meesiacæae Schimp.

Megapterium Spach (Onagrarien, VIII. 1) Grossflügel-Kerze, grossfrucht. Nachtkerze ($\mu \epsilon \gamma \alpha \zeta$ gross, $\pi \tau \epsilon \varrho \sigma \prime$ Flügel — vierflügl. Kapsel), Zier. *M. Nuttallii* Spach (Oenothera macrocarpa Pursh).

Melaleuca L. (Myrtac. Melaleucaceen, XVIII. 2) Cajaputbaum, fr. caieput (M. Cajaputi Roxb.), „Schwarzweiss“- od. Silberbaum Leun. ($\mu \epsilon \lambda \alpha \zeta$ schwarz, $\lambda \epsilon \nu \zeta \alpha \zeta$ weiss — Stamm schwarz, Äste u. Blätter weiss), Zier. *M. squamæa* Lab., *M. Leucadendron* L. „Weissbaum“ (— auch d. Stamm weiss!), viridiflora (Metrosidēros quinque-nervia Cav.), pulchella R. Br., etc.

Melampyrum L. (Scrophulariineen, XIV. 2) „Schwarzweizen“, altd. „Schwarteweizen“ Mej., woraus: Wachtelweizen, Gletsch O. W. ($\mu \epsilon \lambda \alpha \zeta$ u. $\pi \nu \rho \delta \zeta$ Weizen — d. Samen schwärzt unter Mehl das Brot), in Saaten: *M. arvense* L., fr. mahon od. millet jaune (-sauvage), auch rouge-herbe (rougerelle), e. cow-wheat, Wald: *M. nemorosum*, silvaticum, cristatum u. pratense L.

Melandrium (-dryum) Röhling (Sileneen, X. 5) Lichtnelke, Lichte O. W., fr. ben (Wtst.: n. Girol. Melandri, schr. mit Moretti Analyse chimica di Colchico autumn. etc., Padua 1805), *M. rubrum* Grck. s. *sylvestre* Röhl. u. *M. album* Grck. s. *pratense* Röhl. (*Lychnis dioica* L. $\alpha.$ diurna u. $\beta.$ vespertina Sibth.).

- Melanorrhœa** Wall. (Terebinthac. Anacardieen, XXIII. 2) „Schwarzfluss“ (s. v. u. ὁσία Fluss etc. od. ὁσίω u. ὁσίων rinne — an d. Luft schwarzwerd. Saft), z. B. *M. glabra* Wall. (B.).
- Melanosināpis** Schimp. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) (zu *Sināpis* L.) „Schwarzsenf“ (<μελάς, -άρος u. *Sināpis* Senf — schw. Samen), M. *communis* Schimp., fr. rouette sauvage, s. *Brassica* s. *Sināpis nigra* Koch, L.
- Melanoxylon** Schott. (Cäsalpinieen, X. 1) „Schwarzholz“ (s. v., ξύλον Holz — B. m. braunschw. H.), M. *Braüna* Schott (B. Brasil.).
- Melanthacēae** Endl. i. q. Colchicacēae DC., Giftlilien, s. *Melanthium* L.
- 1) **Melanthium** L. (Juncaceen od. Melanthaceen, VI. 3) „Honigblume“, -binse, fr. mélanthe (gr. μελάνθιον Diosc. eig. „Schwarzkümmel“, F. W. Riemer, Wtst.: v. μέλι Honig u. ἄνθος — Kronblätt. an d. Basis m. Honigsäckchen!), M. *uniflorum* Jacq., s. *Tulipa Breyniana* (Kolbea Schldl.), M. *indicum* L. (Angularia ind. R. Br.), M. *spicatum* Van Houtt. (Wurmbea purp. autt.). 2) *Melanthium* Diosc. (Ranunculac., XIII. 5) = *Nigella sativa* L. (s. eb. 1).
- Melastōma** Burm., L. (Lythrarieen Melastomaceen, X. 1) „Schwarzmund“, -schlund D., -beere, Erdbeerenstrauch Leun., fr. melastome (<μελάς schw., στόμα Mund — anhaltend schwarzen Mund machende Beeren! Paxt., Wtst.), Warmh. M. *malabathricum* L. (Indien) etc., s. Osbeckia L. — Melastomacēae Don, DC.
- Meleagris** (sc. *Fritillaria*) L. (Liliaceen, VI. 1) Schachblume, s. g. Kiebitz-Ei, fr. meléagridre (v. Meleagris Perlhuhn, in ein solch. verwandt. Schwester des Meleager, Myth. — Ähnlichk. mit d. Gefieder des Perlhuhns, Wtst.).
- Melia** L. (Hesperideen Meliaceen, X. 1 od. XVI. 5) „Mannabaum“ (<μελί od. -ή Manna-Esche v. μέλι lat. mel Honig), M. *Azederach* L. Zedrach-M., fr. margousier Paternosterbaum od. Paradiesblume, fr. lilas des Indes. — *Meliae* Juss., -iacēae DC. (zu Hesperidēae Rchb. od. Ampelidēae Bartl.).
- Melianthus** T., L. (Sapindac. Paullinieen od. Rutaceen Zygophylleen, XIV. 2) „Honigblume“, -strauch, fr. mielianthe, fleur à miel, e. honey-flower (s. v., ἄνθος Bl.), z. B. *Winterpfl. major* L. (Capl.), *minor* L., fr. pimprenelle d'Afrique.
- Melica** L. (Gräser, III. 2) Perl- od. Schönras, eig. „Honiggr.“, fr. canfe u. méllica (v. μέλι Honig — d. Mark d. Stengels honigsüß), z. B. *M. nebrodensis* Parlat. s. *glauea* Schult., *uniflora* Retz., nutans L. etc.
- Melicoccea** Juss., L. (Sapindaceen, VIII. 1) Honigbeerenstrauch, „Honigfrucht“ D. (s. v., ωζόνος Korn, Beere — d. Frucht m. süßsäuerl. Fleisch), M. *bijuga* L. span. Mamonicilla „Zitzensucklerin“ (*Melicoccus bijugatus* Jacq.), *diversifolia* Juss. (*Stadmannia* d. Spr.), s. *Nux americana* Comm.
- Melilotus** T., L. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Stein- od. „Honigklee“, „Melilotenkli.“, Klever O. W., fr. u. e. mélilot, fr. trèfle miellé (gr. μελιλύτος nach Honig riechend. Klee), z. B. cultiv. M. *coeruleus* Desr. Siebengezeit O. W., fr. m. bleu, e. blue m. od. great-sweet-scented m., wild M. *officinalis* Desr. s. *arvensis* Wallr., etc.
- Melissa** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Melisse“, Meter O. W., fr. mélisse od. thé de la France, e. balm-mint, balsamint (gr. μέλισσα Biene od. Bienenhonig — d. Bienen anlock. Pfl.), M. *officinalis* L. Citronen-Melisse, fr. citragon (citronelle, herbe de citron), e. balmmint gentle, m. v. fol. varieg. Hort.
- Melissophyllum** Riv. (sc. *Melittis*) L. (Labiaten, XIV. 1) „Melissenblatt“, melissenblättr. Biensauge Grck., Bergmelisse Wolff, fr. mélisse bâtarde (melissière, -lissot) (s. eb. u. φύλλον Laubblatt).

- Melittis** L. (Labiaten, XIV. 1) Biensauge Grck., Immenblatt M.-Rchb. v. μέλιττα i. q. μέλισσα Biene, Imme — d. Bienen anlock. Pfl., M. Melissophyllum L. (s. eb.), M. grandiflora Sm. etc.
- Melo** T. (sc. Cucūmis) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) echte od. Zucker-, „Melone“, fr. mélon sucré, e. melon (melo v. μῆλον Apfel, Melone od. Pfebe) m. v. v. (a. Cantaluppen, b. Netz-M., c. Maltheser-M., Zier. Vilmorin's Kletter-M.).
- Melocactus** C. Bauh., DC. (sect. v. Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) „Melonen“-Cactus, fr. mélon-cardon herissé od. mélocacte, e. melon-thistle (Melo s. eb. u. Cactus), Stuben: M. communis Lk., Otto (St. Domingo).
- Melochia** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) arab. Salatstrauch (aus Melochieh, dem arab. Namen v. Corchorus olitorius, gr. κύονος schlechte Gemüsepf.), M. parvifolia Hb., portoricensis Spr. s. crenata Bert. etc., s. Abutilon Adans.
- Melodinus** Forst (Apocyneen Carisseen, V. 2) „Apfelwirbel“-Hunds-würger, s. g. Windapfel D. (v. μῆλον, lat. malum Apfel u. δίνως od. δίνη Wirbel etc. v. δινέω winde, Wtst.: Stengel windend!), M. phillyreoides Lab.
- Melongéna** T. (sc. Solanum) L. (Solanaceen, V. 1) Eifrucht- od. Apfel-Nachtschatten, eig. „Melonenerzeuger“, fr. melongène u. mayenne od. béringène (aubergine) Melangana-Apfel Wolff, s. Solanum pomiferum Pluk. (v. melo Melone u. -génus, gr. -γένος in compos. erzeugend).
- Melopépo** T. (sc. Cucurbīta) L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Turban-Kürbis M.-Rchb., fr. melonnée (aus melo Melone u. pêpo, gr. πέπων Pfebe, Kürbis).
- Melothria** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Haarblumen“-Zaunrübe, s. g. Kümmerling D. (gr. μήλωθον Rebe, Zaunrübe = Vitis alba Plin.), M. cucumerina L. (Cucūmis parva repens Pluk.) u. pendula L. s. scandens P. Br., s. Trichosanthes cucumerina L., foetida etc.
- Melvilla** Anders. (Lythrarieen, XI. 1) „Melville's“ Kelchhöcker-Weiderich (n. Lord Rob. Dundas Melville, engl. Minist. 1807, Wtst.: Melville, schr. les Amours des plantes, Paris 1835), Zier. M. speciosa Anders., s. Cuphea Jacq.
- 1) **Memecylōn** L. (Melastomac. od. Loranthaceen, XI. 1) Safranbaum Dietr., Leun. (gr. μεμήκυλον Diosc. Frucht d. Erdbeerbaums, Arbutus), z. B. edule Roxb. (Ostind.) u. tinctorium Kön. (ramiflorum Lam.) etc., s. Epigaea repens L. 2) **Memecylōn** Mitch., Burm. (Sapotaceen od. Ericeen, IV. 1), M. umbellatum Burm., s. Samára laeta L. (Str. Ostind.). — Memecylae DC. (zu Ord. Myrtinae Bartl.).
- Menispernum** T., L. (Menispermeen, XXII. 6) „Mondsamen“, fr. menisperme, e. moon-seed (v. μῆν, -ρος Mond u. σπέρμα Samen — dies. halbmond!)., Zier. M. canadense L. (angulatum Mnch.) m. v. lobatum DC. (M. virginicum L., carolinian. Hort.), M. Chondrodendron Spr. „Knorpelb.“ (Chondrod. tomentosum R. P.), M. Coccūlus L. (Coccūlus suberosus DC.) „Kokkelskörner“ (cocculi indīci), M. palmatum L., s. g. Colombowurzel, fr. calumbé (colombo), M. Limacia Spr. (Limacia scandens Lour.) etc. — Menisperma Juss., -mēae DC. (zu Laurinēae Rchb., Ord. Cocculinæ Bartl.).
- Mentha** L. (Labiaten, XIV. 1) „Minze“, „Münze“ (nicht Münze!), fr. menthe, e. mint (lat. menta od. -tha, nach Minthe, gr. Μίνθη, Tocht. d. Cocytus, von Proserpina aus Eifersucht in eine Minze verwandelt, Myth.), Gärt. M. crispa L., fr. baume „Balsam“, M. piperrita Huds. „Pfeffer“-M., e. pepper-mint, M. gracilis fol. varieg. Hort., wild M. rotundifolia L., aquatica u. arvensis L., etc.

Menthastrum Sloan. (Labiateen, XIV. 1) unechte Minze (zu *Mentha* Rchb.) (deter. v. *Mentha*), z. B. *M. sylvestre*, *M. maximum* Sloan., s. *Bystropogon suaveolens* l'Hér.

Menyanthes L. (Gentianeen, V. 1) Fieber-, Biber- od. Bitterklee, Zotten- od. Zottelblume O. W., fr. menyanthe, trèfle des marais (-d'eau), nymphéau (*M. nymphoides* L.), e. water- od. marsh-trefoil (-clover), bog-bean u. feverfew (v. $\mu\eta\pi\eta\varsigma$ Zorn etc.? od. $\mu\eta\pi\eta$, $-\nu\varsigma$ Mond u. Monat? od. $\mu\eta\pi\iota\omega$ zeige an — nämл. Sumpf, Wst. — ungewiss! $\ddot{\alpha}r\theta\eta$ Blume), *M. trifoliata* L. etc.

Menziesia Sm. (Ericaceen Rhodoreen, VIII. 1) „Menzies“-Kugelstrauch (n. Archimbold Menzies, schott. Chirurg u. Bot. unter Vancouvers 1791—1794 Reis. an d. Nordwestküste v. Nordam.), Zier. *M. glabrosa* Sm., *polifolia* Juss., s. *Daboecia* u. *Andromeda* L.

1) **Mercurialis** T., L. (Euphorbiac. od. Acalypheen, XXII. 8) „Merkur“- od. Bingelkraut, fr. mercuriale, foirelle u. cagarelle, auch chou de chien, e. mercury (dog's-) (n. d. Gott Merkur, der seine Heilkraft entdeckte, Plin., od. Mercurius Quecksilber Offiz.), wild. *M. annua* L., s. g. Speckmelde od. Winterkraut, fr. rimberge u. foirande, Wald *M. perennis* L. 2) **Mercurialis** (sc. *Tragia*) L. (Rutac. Euphorbiac., XXI. 3) „Tragus“- od. „Bocks-Bingelkraut“, s. Crotton Gronov.

Merendéra Ramond (Colchicaceen, VI. 3) „Merendere“, Zier. *M. Bulbocodium* Ram., fr. mérèndère bulbocode (*Colchicum montanum* L. s. *Bulbocodium autumnale* Lapeyr.) (v. d. span. Quita meriendas = *Colchicum autumnale* L. abgeleitet!).

1) **Meriana** Sw. (Melastomaceen, VIII. 1 u. X. 1) „Merian's“-Erdbeerestr. od. Schwarzmundbeere (n. d. Dame Mar. Sibylle Merian v. Frankf. a. M., ber. Insektenmalerin u. Reis. in Surinam, † 1717), z. B. *M. leucantha* Sw. u. *purpurea* Sw. (Jamaika), s. *Rhexia* L. 2) **Meriana** Trew (Irideen, III. 1) „Merians“-Schwertel, *M. flore rubello* Trew, s. *Gladiolus Merianus* Jacq. (*Watsonia humilis* Mill.). 3) **Meriana** Fl. Flum. (Convolvulac., V. 1) Merians-Winde.

Meristostigma A. Dietr. (Irideen, III. 3) „Spaltnarbe“ ($\mu\sigma\eta\iota\sigma\tau\circ\varsigma$ geteilt, $\sigma\tau\gamma\mu\alpha$ Narbe — 3 zweiteilige Narben), z. B. *anceps* D., s. Oviëda anc. Spr.

1) **Mertensia** Don (Boragineen, V. 1) „Mertensie“ (n. d. Bot. Mertens), z. B. *virginica*, *sibirica*, *davurica* etc. 2) **Mertensia** H. B. K. (Ulmaceen Celtideen, XXIII. 1), z. B. *laevigata* Kth., s. *Celtis* s. *Momisia* l. Dietr. 3) **Mert.** Soland. (Myrsineen, V. 1). 4) **Mert.** W. (Osmundaceen, XXIV. 1). 5) **Mert.** Roth (Florideen, XXIV. 3).

Merulius Fr. (Pilze, XXIV. 4) Holz- od. Hausschwamm (schwerl. n. Wst. v. *merula* Amsel, vielm. v. $\mu\eta\varrho\circ\varsigma$ Hüftknochen od. $\mu\acute{e}\varrho\circ\varsigma$ Stück etc. u. $\sigma\tilde{\eta}\lambda\circ\varsigma$ od. $\delta\lambda\circ\varsigma$ verderblich — verderbl. Holzschwamm!), *M. lacrymans* Fr., „Thränenschw.“

Mesembryanthemum L. (Aizoïdeen od. Ficoideen, XII. 4) „Mittagsblume“, Zaserbl., Eiskraut, fr. ficoïde, fleur de midi, e. fig-marigold (v. $\mu\sigma\eta\mu\beta\circ\varsigma$ Mittag, $\ddot{\alpha}r\theta\mu\eta\varsigma$ Bl., n. Linné $\mu\acute{e}\sigma\circ\varsigma$ mitten u. $\xi\mu\beta\circ\varsigma$ Embryo — mitten mit Blume wie ein Embryo!), Zier. *M. crystallinum* L. Eispfl., fr. glaciale od. herbe à glace, e. ice-plant, pomericianum L., „Nachmittagsbl.“, Topf *M. caninum*, *tigrinum* Haw., *capitatum* Haw., Ampel *M. tricolor* W. etc. — *Mesembryanthemæae* Seub. Eiskräuter.

Mespilus L. (Rosaceen Pomaceen, XII. 4) „Mispelstrauch“, fr. mèle od. meslier (-lis) u. néflier, e. medlar-tree u. quick (gr. $\mu\acute{e}\sigma\pi\iota\lambda\circ\varsigma$ Mispel v. $\mu\acute{e}\sigma\circ\varsigma$ mitten u. $\sigma\pi\tilde{\eta}\lambda\circ\varsigma$ Fleck u. Stein, Fels), wild u. Gärt. *M. germanica* L. s. *vulgaris* Rchb. m. v. v.

- Mesña** L. (Guttiferen Clusiaceen, XVI. 8) ceylan'sches Eisenholz od. Nagasbaum (n. Mesuah, d. Leibarzt Harun Alraschid's, † 809 in Damascus), M. ferrēa s. speciosa Choisy (Calophyllum nagassaricum Burm.), M. bracteata Spr. (Camellia drupifera Lour.).
- Metel** (sc. Datura) L. (Solaneen, V. 1) weißer Stechapfel M.-Rchb., Stachelnuss Wolff, fr. noix-métel (méthel) (arab. methel, latinis. mixtale, Mischkorn od. Igelskolbe).
- Methonica** Herm. (Liliaceen, VI. 1) Rankenblatt- od. Prachtlilie (v. Methone, macedon. Stadt am thermäischen Busen, Wst. st. mendoni malabarisch = Mendoni Rumph.), Zier. M. superba Lam. s. malabarorum Herm., s. Gloriosa superba L. (foliis cirrhifēris L., Pers.).
- Metrodorēa** St. Hil. (Rutaceen, V. 1) „Metrodoree“ (n. Metrodorus, Pflanzenmaler u. Philos. d. 2. Jahrh.'s v. Chr.), Zier. M. atro-purpurēa Van Houtt., nigra St. Hil. (Str. Bras.) etc.
- Metrosidōeros** G., R. Br. (Myrtaceen, XII. 1) echtes od. „Kerneisenholz“ (v. μήτρα Mark, Kern, σίδηρος Eisen — hart. Kernholz!), M. vera L.; ferner M. corifolius Vent. u. amboinensis G., s. g. Schönmütze, Nanibaum d. Molukken, „Eisenmass“ Rmp., Gewächsh. M. buxifolia Cunn. (Neuseel.), florida Sm. (Leptospermum scandens Forst.) etc., s. Lepto- u. Stenospermum Forst., Sweet.
- Metroxylon** Rottb., Kön., Mart. (Palmen, XXI. 7) „Markholz“-P. (s. eb. u. ξύλον Holz — viel Mark im Stamm!), s. Lepidocaryon Mart., Sagus G. u. Raphia P.-B.
- Mēum** T., Jacq. (Umbelliferen, V. 2) Bärenadolde, -fenchel, Mutterwurz O. W., fr. mēum (méon), e. mew od. set-wort (gr. μῆον Saufenchel st. μεῖον geringer — näm'l. als Athamanta), Zier. M. athamanticum Jacq., s. Aethusa Mēum L.
- 1) **Meyenia** Benth., Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Meyen's“-Bärenklau (n. d. Bot. Prof. Meyen in Berlin), M. erecta Benth., s. Thunbergia L.
 - 2) **Meyenia** Schldl. (Solaneen, V. 1) „Meyenie“. 3) **Meynia** Lk. (-na Roxb.) (Sapotac. Mimusopeen, V. 1) Meyen's Eisenholz, M. spinosa Lk., s. Sideroxylon spin. var.
- 1) **Mezerēum** (sc. Daphne) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Kellerhals, wilder Pfefferstrauch, fr. mezéron, bois gentil od. joli, chamélée u. garou, lauréole femelle, e. mezereon, neck of a cellar, spurge-olive od. -laurel (v. d. pers. mazeryin, ital. ammazare töten — giftig!), Zier. v. v. fl. albo u. autumnale Hort.
 - 2) **Mezereum** C. A. Mey. subg. v. Daphne, z. B. noch D. altaica u. caucasica Pall.
- Mibōra** P.-B. (Gräser, III. 2) Zwerggras (wahrsch. für μιζός βογά kleiner Frass!), M. verna P.-B., s. Chamagrostis minima Borkh. (Sturmia min. Hoppe, Knappia agrostidēa Sm.).
- 1) **Michauxia** l'Hér. (Campanulaceen, VIII. 1) „Michaux'“-Glockenblume (n. d. franz. Bot. Andr. Michaux unter Louis XVI., Reis. in Persien u. Nordamer.), Zier. M. campanuloides Juss. (Mindium Juss., Medium Dioscoridis Rauw.), fr. Michauxie à fleur de Campanule, e. bell-flower-like M.
 - 2) **Mich.** Neck. (Compos.).
- Michelaria** Dumort. (Gräser, III. 2) „Michel's“-Gras (n. Michel, Entdeck. d. Pfl. in d. Ardennen), M. bromoidea Dumort., s. Bromus arduennsis Kth. (Libertia ard. Lej.).
- Michelia** L. (Magnoliaceen, XIII. 7) „Micheli's“-Magnolie (n. d. Florentiner Bot. Pietr. Ant. Micheli, † 1737), M. Champacca L., M. Tsiam-paea L. (evonymoides Burm.), M. Doltsopa Buchan. (Manglietia glauca Blum.).
- Microcarpae** Lauch. (sect. v. Crataegus L.) (Pomaceen, XII. 2) „Kleinfrüchte“, Beeren-Mispeln (μικρὸς klein, καρπός Frucht), z. B. acerifolia Mnch.

- Microcarpium** Spach (sect. v. *Cornus* L.) (Cornaceen, IV. 1) echte Hartriegelstr. (s. eb.), z. B. *C. sanguinea* L., *sibirica* Lodd., etc.
- Mieropus** L. (Compos. Tarchonantheen, XIX. 4) „Kleinfuss“, kleiner Löwenfuss, Falzblume Koch (s. v., ποντίζ Fuss — ähnl. Leontopodium), z. B. *supinus* L. liegend. u. erectus L. aufrecht., *pygmaeus* Desf. (*Evax pygmaea* DC.).
- Microptelēa** Spach (subg. v. *Ulmus* L.) (Ulmaceen, V. 2) Kleinblatt-Ulme (s. v. u. πτελέα Ulme), z. B. *U. parvifolia* Jacq.
- Microperma** Hook. (Loasaceen, XIII. 1 od. XVIII. 2) „Kleinsamen“-Brennwinde (s. v., στέρωμα Samen — Kaps. m. zahllos. kl. Samen), z. B. *bartonoides* Van Houtt. (Eucnide bart. Zucc.), s. *Mentzelia* L.
- Microstylis** Nutt. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Kleingriffel“, Einblatt, *M. monophylla* (-los) Lindl. (Tyrol etc.) (s. v. u. στυλίς Griffel — Columna äuss. klein), s. *Ophrys* s. *Malaxis mon.* Sw., *M. ophioglossoides* Nutt. (*Prescottia oph.* Spr.).
- Mierōtis** R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Kleinohr“ (s. v. u. οὖς, ὄτος Ohr — kleine Blume m. geöhrt. Columna), z. B. *porrifolia* (Epipactis p. Sw.) etc. (Neuholl.).
- Mikania** W. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Mikanie“, s. g. Sommerod. Schnell-Epheu (n. d. Prof. Mikan in Prag), *Stuben* M. scandens Lem. (*Senecio mikanoides* Otto, *Delairea mik.* Lem.), *acuminata* u. *vitifolia* DC. etc.
- Milium** L. (Gräser, III. 2) Hirschen- od. Flattergras, Waldhirse Seub., Millgras O. W., fr. mil u. grémil, fr. u. e. millet (schwerl. n. Paxton v. mille tausend, wahrsc. μιλός od. σμιλός u. -λη Schneide, Schmiele, lat. *milium Hirse*, Wtst.: v. d. celt. mil Stein — harte, glänzende Samen!), z. B. *M. effusum* L., fr. grémil.
- Millea** Cav. (nicht *Milla*!) (Liliaceen, VI. 1) „Milla“- od. unechter Lauch (n. d. Ober-Gärtn. Julian Milla im k. Gart. z. Madrid!), *M. biflōra* Cav. (Mex.), *uniflōra* Grah. (Buen.-Ayr.), *borbonica* Bak. (*Nothoscordum b.* Kth.).
- 1) **Millefolium** (sc. *Achillea*) L. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Tausendblatt“, Schafgarbe, fr. millefeuille, herbe au cocher „Kutscherkr.“, soureils de Venus, e. milfoil (v. mille tausend, folium-Blatt). 2) **Millefolium palustre** Pluk. (Lentibularien, II. 1) „Sumpf-Tausendblatt“, *M. aquaticum* Pluk., s. *Utricularia minor* u. *vulgaris* L. (— stark zerschlitzte, vielteilige Bl.!).
- Millegrāna** Surian (Portulacaceen Illecebreen, V. 3) „Tausendkorn“, fr. mille-grains (mille u. granum Korn — unzählige kleine kugelige Blätter! Wtst. in d. Kaps. unzähl. kl. Samen!), s. *Herniaria* L.
- Milleria** L. (Compos. Millerieen, XIX. 4) „Millersblume“ (n. Phil. Miller 1691—1771), z. B. *angustifolia* Cav. (*Flaveria ang.* Juss.), *quinqueflōra* L. (*dichotoma* Cav.) u. *biflōra* G. (*Delilia Broterii* Spr.).
- Milletia** Wight u. Arn. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Madagascar-Ebenholz (n. d. franz. Bot. Millet d'Aubenton, schr. Notice sur la cult. des oseraies du Dép. de l'Aisne, Lyon 1837), *M. leucantha* Krz., s. *Galedupa elliptica* Lam.
- 1) **Millingtonia** Roxb. (**Mallingt.** W.) (Bignoniaceen, II. 1 od. XIV. 2) „Millingtonie“ (n. d. Prof. Sir T. Millington in Oxford, schr. 1776 üb. Physiologie etc.), *M. (Mall.) hortensis* W., *suberosa* Roxb. (*Bignonia sub.* Roxb.), *ferruginea* Nees (*Meliosma ferr.* Blum.). 2) **Millingtonia** Ham. (Legumin. Onobrychideen, XVII. 4) „Mill's“-Esparsette, z. B. *semi-alata* Ham., s. *Flemingia* Roxb.
- Miltonia** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Milton's“-O. (n. John Milton, † 1674, d. Dicht. d. verlorn. Paradieses Rmp., nicht n. Milton Earl Fitz-William, Gönn. d. Bot., Paxton), z. B. *M. spectabilis* Ldl. (Bras.).

- Karwinskii Hort. etc. (Mex., Centralamer.), s. *Macrochilus Fryanus* Westc.
- Mimetes** Salisb., R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Gauklerblumen“-Strauch (gr. μιμητής Nachahmer — gleicht versch. andern Gattungen!), z. B. *capitulata* u. *cucullata* R. Br. (Südafr.), s. *Protēa* L. etc.
- Mimosa** Ad., L. (Mimoseen, XXIII. 1) Sinnpflanze, fr. mimose (-meuse) (v. μιμέω mache eine Bewegung), Zier. M. pudica L. „empfindl. M.“, Sensitive od. Schampf. Vilm., fr. sensitive (sensible), e. sensitive plant od. chaste Mimosa. — *Mimosae* Endl. (-sacēae Rchb.).
- Mimulus** G., L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Gaukler“- od. Affenblume Rmpf., Maskenbl. Vilm., fr. mimule, e. monkey-flower (dem. *mimus* „Mime“ od. Schauspieler od. μιμώ, -οῦς Affe — sonderb. Blüten!), Topf. M. *moschatus* L. „Moschuspfl.“, *cardinalis* L. m. v. v. Scharlach-G., *cupreus* Hook. v. Brillant Hort., *hybridus* Hort. m. v. v. (z. B. *tigrinus* u. fl. *pleno* Hort.), M. *variegatus* Hort., s. g. Arlequin etc.
- Mimusops** L. (Sapotac. Mimusopeen od. Lucumeen, VIII. 1) „Affen-gesicht“, Spitzblume D. (v. μιμώ, -οῦς Affe, ὄψ Gesicht — wie ein Affenkopf!), z. B. M. *Elengi* Rumph. s. *lucida* Poir., M. *Imbricaria* W. (*Imbricaria* Pers., *Escallonia* Kth.), M. *dissecta* (Achras d. Forst.) etc. — *Mimusopæa* Rchb.
- Mirabilis** L. (Nyetagineen, V. 1) „Wunderblume“, Jalape Dietr., fr. fleur admirable (- de nuit), e. nyctage od. jalap, s. *Nyctago* Juss., DC. (*mirabilis* wunderbar — weg. d. Farbenmannigfalt. d. Blumen desselben Stocks!), Zier. M. *Jalapa* L., fr. belle de nuit (-de quatre heures), belle mexicaine, muerveille du Pérou, e. jalap-flower, s. g. Schweizerhose, longiflora DC.
- Mirbelia** Sm. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Mirbelie“ (n. Brisseau-Mirbel, s. d. Aut. unt. Mirbel!), z. B. Gewächsh. Baxteri, grandiflora, ilicifolia etc., reticulata Sm., s. *Pultenaea rubiae-folia* Andr. (Str. Neuhol.).
- Mitella** T., L. (Saxifrageen, X. 2) „Bischofshut“, fr. mitelle, e. barrenwort? (dem. *mitra* Pabsthus — weg. d. Frucht!), z. B. M. *diphylla* L. (*Cortusa americ. altera* Mentz.), M. *foliis ternatis* L. (*Tiarella trifoliata* L.).
- 1) **Mithridatēa** Wilde, Comm. (Urticaceen Monimieen, XXI. 8) Trommelbaum v. Madagascar, fr. bois-tambour, e. drum-tree (n. *Mithridates* Eupator, Kön. v. Pontus, † 64 v. Chr.), M. *quadrifida* W. (Tambourissa q. Bak.), s. *Ambōra sempervirens* Juss., M. *toxicaria* D. (Ipotox. Pers., Antiāris t. Leschen. Bon-hupas Ostind.). 2) **Mithr.** Cratev. (Liliac., VI. 1) = *Erythronium dens canis* L.
- Mitraria** Cav. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Mitrastrauch“ (v. *mitra* Pabst-hut — vierreck. Frucht), z. B. M. *coccinea* Cav. (Kletterstr. Chiloë).
- Mitralia** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Haubenpilz“ Kumm. (dem. v. *mitra* Kopfbinde etc. — Form d. Schlauchlagers auf dem Stiel mützenförm.), z. B. *cucullata* u. *paludosa* Fr.
- Mnesitheon** Raf. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Gottgedenk“ (*μνήσιθεος*; Gottes eingedenkt, Wtst. nach d. alt. Arzt Mnesitheos ben. F. W. Riemer: Benennung des Juniperus bei Dioscorides!), z. B. *album* Raf. (*Buphthalmum angustifol.* Pers.), *luteum* Raf. (Louisiana) etc.
- Mnium** Dill. (Moose, XXIV. 2) Sternmoos, fr. mnie (*μνίον* v. *μνίω* zerstören = βρύον Moos), z. B. *hornum* u. *ligulatum* (Waldboden).
- Modecca** Jacq. (Passifloreen, XXII. 5 od. XVI. 2) „Modecca“-Passionsblume (ostind. Name d. Pfl.!), z. B. *integrifolia* Jacq., *trilobata* Roxb., etc.

- Moehringia** L. (Alsineen, VIII. 2) „Moehringie“, Dreinerv-Sandkraut, Spelle O. W. (n. d. Arzt H. Möhring z. Jever, † 1792), M. trinervis L.
- 1) **Moenchia** Ehrh. (Alsineen, IV. 4) „Mönchie“, aufrecht. Mastkraut, Vierling O. W. (n. d. Prof. Conr. Mönch z. Marburg, † 1805), M. s. *Sagina erecta* Fl. Wett. 2) **Moenchia** Roth (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Weisssteinkraut, Sandkresse, M. incana Roth, s. *Alyssum inc.* L. (Berterōa inc. DC., Farsetia inc. R. Br.), M. satīva Roth = *Camelinia sat.* Crantz. 3) **Moenchia** Med. (Liliaceen, VI. 1).
- Mogorium** Juss. (Contorten Jasmineen, II. 1) arab. Jasmin, fr. mogori (ostind. Name d. Str.'s), s. *Jasmīnum Sambac* Ait. (Nyctanthes Samb. L., Thb.).
- Mohria** Sw. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) Weihrauch-F. (n. d. Univ.-Adjunct. zu Kiel D. M. H. Mohr, † 1808), M. thurifraga (-fēra) Sw. s. *crenata* Desv., s. *Polypodium* s. *Adiantum Caffrorum* autt.
- 1) **Moldenhauēra** DC. (-hawera Schrad.) (Cassieen, X. 1) „Moldenhauer's“-Hülse (n. d. Pfl.-Physiol. Joh. Jak. Moldenhauer in Kiel, † 1827), M. floribunda Schrad., s. *Bowdichia speciosa* Spr. (Dolichonemia spec. Nees „Langfaden“), M. scandens Spr. (Cavanillēa scand. Thb. 2) **Mold.** Spr. (Urticaceen, XXI. 4).
- 1) **Molinaea** Juss. (Sapindaceen, VIII. 1) „Molinabaum“ (n. d. span. Reis. in Chili 1782, Molina), M. alternifolia u. canescens Roxb., etc., s. *Cupania* Pers. 2) **Molinaea** Comm. (Rhamnaceen, V. 1), s. *Retanilla* DC. 3) **Molinaea** Mart., Bert. (Palmen, XXI. 6) „Molina“-P., s. *Jubaea spectabilis* HB., Kth. (*Cocos chilensis* Mol.).
- Molinia** Mnch., Schrk. (Gräser, III. 2) Blauschmiele, Steifhalm, Pfeifenschmiele, Schmelche O. W. (n. *Molina ben.*, s. eb.), M. coerulea Mnch. Pfeifengras Seub., Vilm., -binse, Zier. v. fol. varieg. Hort. (*Festuca coerulea* Hort., *Aira c. L. f.*, *Melica c. L. Mant.*) bunte Blaugras od. blaue Schmiele.
- Molle** T., Clus. (sc. *Schinus*) L. (Terebinthae. Pistazieen, XXII. 5) Mastix-Nierenbaum, peruv. Pfefferbaum, fr. mastic des Indes (peruan. nulli).
- 1) **Mollūgo** Kth. (sc. *Pharnacēum*) L. (Paronychieen, III. 3) „Weichkraut“, Weichling D. (v. *mollis* weich), M. arenaria Kth. etc., s. *Alsine Pluk.*, *Spergula Burm.* 2) **Mollūgo** (sc. *Galium*) L. (Rubiaeen, IV. 1) weiches Labkraut.
- Molospermum** (bess. **Molopsp.-**) Koch (Umbellifer., V. 2) „Striemen-samen“, fr. livèche, e. bladder-seed (v. μύλωψ, -πος Strieme, στρίωμα Samen — Früchte m. breit. braun. Ölstriemen), Zier. M. cicūtarium DC. (*Ligusticum peloponnesiācum* L.), fr. livèche du Pelopon-nèse, e. water-hemlock-like bl.-s.
- Moluccella** L. (Labiateen, XIV. 1) Trichterkelch (n. d. Molukken-Ins. ben.), M. laevis L. etc.
- Moly** Clus., Mnch. (sc. *Allium*) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Blumen-od. Zauberlauch Vilm. (gr. μύλωψ Zauberkr. od. Knoblauch, Wtst. v. μύλωψ entferne — nämli. Krankh.!), fr. u. e. moly, fr. auch ail doré, e. golden-garlick, s. M. *Dioscoridis Clus.*; M. atro-purpurēum Rudb. = *Allium subhirsutum* u. *descendens* L.
- Mombin** Plum., DC. (sc. *Spondias*) L. (Terebinthaceen, X. 4) Balsampflaume, fr. mombin (Name des B.'s in Amerika), s. *Myrobalanus* s. *Prunus americana* Pluk.
- Momordica** L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Beissgurke“, Springkürbis Dietr., Balsam- od. Wunderapfel, fr. momordique, balsamine male (-rampante), e. balsam-apple (v. mordeo, momordi etc., beisse — Samen wie angebissen! Paxton, Wtst., ätzend. Saft d. Frucht, Leun., Wtst.), Zier. M. *Charantia* L. (*muricata* W.) indisches Gurkenapfel, rebenblättr. B., M. *Balsamina* L. Balsam- od. Wunderapfel, fr. mo-

- mordique pomme de merveille, e. balsam-apple (balm-Momordica), M. Elaterium L. Spritzgurke (vgl. Elaterium Mnch.!).
- Monadelphia** L., XVI. Kl. „Einbrüderige“ (*uoròς*; einzeln, *ἀδελφὸς*; Bruder — in einen Haufen verwachs. Staubfäden!).
- Monandria** L., I. Kl. „Einmännige“ (s. eb. u. *ἄριτος*, *-δος* Mann, in d. Bot. Staubgefäß!).
- Monanthes** Haw. (Crassulaceen, XI. 7) „Einblumen“-Dachwurz, s. Semperivium monanthos autt. (s. v., *ἄριτη* Blüte).
- Monarda** L. (Labiaten, XIV. 1) „Monarde“, fr. monarde (n. d. Arzte Nic. Monardus, † 1578 zu Sevilla), Gartenbl. M. didyma L. „Zwillings“-M., fr. m. écarlate od. Thé d’Oswego, e. Twin-Mon. od. Oswego-tea, M. fistulosa L. m. v. v. (z. B. affinis Lam., altissima W., Clinopodia L., violacea Desf. etc.), fr. m. fistuleuse od. velue, e. tubular-Mon.
- Monas** Ehrbg. (Vibrionen, XXIV. 4) „Monade“, Kugelbakterie, z. B. M. prodigiosa Ehrbg. Wunder-M., blutende Hostie, s. Micrococcus Cohn (*uoràς*; Einheit, „Monade“ Leibnitz).
- Moneses** Salisb., G. Don (-sis Walp.) (Ericac. Pyroleen, X. 1) „Einzelblum“-Wintergrün (s. v. u. *ζόις* Wesen — einblum. Schaft!), M. grandiflora Salisb., s. Pyrola s. Chimatobia uniflora L. u. Mey.
- Monimia** P.-Thou. (Urticaceen Monimieen, XXI. 4) „Monimie“ (n. Monime, Gemahlin d. pontisch. Königs Mithridates Eupator, † 64 v. Chr.), M. rotundifolia P.-Thou. (Ambora tomentosa Bory St. Vinc.) (Str. Ins. Bourbon), ovalifolia P.-Thou. (Str. Martinique) etc. — Monimiæ Juss., DC.
- 1) **Monnieria** L. (-ra Aubl.) (Terebinthac. od. Rutac. Diosmeen, XVII. 1) „Lemonnier’s“ Schlangengiftkraut (n. d. Bot. Guill. Lemonnier, Prof. am k. Gart. zu Paris, † 1800), M. trifolia Loefl.
 - 2) **Monnieria** Pers., P. Br. (Scrophularineen, II. 1) „Lemonnier’s“-Kriechkraut, z. B. africana Pers., s. Herpestes cuneifolia Pursh.
- Monochaetum** DC. (Melastomaceen od. Lythrarieen, VIII. 1) „Einzelborste“ (s. v. u. *χαίτη* loses Haar, Borste — d. Antheren-Connектив läuft in eine Borste aus), z. B. umbellatum DC., s. Arthrostemma Pav.
- Monochlamydæae** DC. „Einhüllige“, Perigonblütige Leun. (s. v. u. *χλαυδίς*, *-δος* Kleid, Mantel — nur einerlei Hüllblätter, nicht besond. Krone u. Kelch!).
- Monoclinia** L. „Einlagerige“, Zwitterblumen (s. v. u. *χλίνη* Bett — beide Geschlechter in einer Blüte beisammen!).
- Monocotylæae** Grck. (-ledonæae Juss.) „Einsamenlapppige“ od. „Monocotylen“ (s. v. u. *ζοτυληδώρ*, *-ύρος* eig. Gelenkpfanne, Saugwarze, Bot. Samenlappen, s. g. Keimblatt!).
- Monodöra** Don, Dumont (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 7) „Einzelfell“-Flaschenbaum, westind. od. Kalabassen-Muskatnuss (s. v. u. *δορά* Haut, Fell — einzellige Frucht!), M. Myristica Don (Annona Myr. G.). — Monodoræae (zu Annonaceæ) Rchb.
- Monoecia** L., XXI. Kl. „Einhäusige“ (s. v. u. *οίκος* Haus — beiderlei Blüten auf einem Stock).
- Monœplgynia** Juss. „Oberweibige“ Monocotylen (s. v., *ἐπι* auf, über, *γυνή* Weib, Bot. Stempel — mit einem oberständigen Stempel).
- Monogynia** L. „Einweibige“ (*uoròς* u. *γυνή* — mit einem Stempel!).
- Monohypogynia** Juss. „Unterweibige“ Monocotylen (s. v., *ὑπό* unter, *γυνή* — mit einem unterständigen Stempel od. Fruchtknoten!).
- Monolopia** DC. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Einschuppenblume“ (gr. *uorολοπός*; mit einfacher Schale — nur ein Schuppenkreis am Anthodium), Zier. M. californica Hort. s. major DC. (Lasthenia glabra Hort. non Lindl.).

- Monoperigynia** Juss. „Umweibige Monocotylen“ (s. v., περὶ herum, γύνη — mit umständigen, d. i. gleichhoch mit den Staubfäden gestellten Stempeln).
- Monorchis** L., Mentz. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Einknolle“ (s. v. u. ὁρχίς Hode — nur eine Wurzelknolle!), s. *Ophrys Monorchis* Hall. (*Herminium R. Br.*, *Satyrium Pers.*, *Arachnites Hoffm.* *Monorchis*).
- Monotropa** L. (Ericaceen, X. 1) Ohnblatt, Schmeerwurz, Fichtenspargel (gr. μονότροπος einsam — Standort! oder auch sonderbar! Wtst.), M. *Hypopithys* L., fr. suce-pin (-racine). — *Monotropéae* Nutt. DC.
- Monsonia** L. (Geraniaceen, XVI. 7) „Monsonie“, fr. monsone (n. Lady Anna Monson, Assistentin von Lee, schr. *Introduct. to Botany*), z. B. *grandiflora* Burm. s. *speciosa* L., *Heritieri* DC. s. *spinoso* l'Hér., *Burmanni* DC. (*Geranium spinosum* L.).
- Monstera** Adans., Schott (Aroideen, VII. 3) „Monster“-Aron od. Baumwürger (v. monstrum, fr. monstre ungeheuerliche Gestalt), Gewächsh. M. *Lennea* C. Koch s. *deliciosa* Liebm., s. *Philodendron pertusum* Kth.
- Montanoa** La Llave u. Lex. (Montagnaea od. -nia Spr.) (Compositen, XIX. 4) „Montanoablume“, „Montagnebl.“ (n. C. Montagne, schr. üb. Phykologie, übers. v. K. Müller, Halle 1851, od. n. d. Naturphilos. Montaigne, Vertheid. v. Raymund's Theol. natur. um 1430? od. n. d. mexik. Patrioten *Montanoa*?), z. B. Gartenbl. M. *heracleifolia* Brongn., pubescens Spr. etc.
- Montbretia** Red., DC. (Irideen, III. 1) „Montbret's“-Schwertel (n. G. Coquebert de Montbret, Reis. im Orient, † 1836), z. B. *capensis* Bak. (*Tritoma Ker* s. *Houttuynia cap.* Thb.), M. *securigera* Red. (*Gladiolus s. Tapinia sec.* Dietr.).
- Montezuma** (bess. *-zumia*) Moç., Sess. (Bombaceen, XVI. 7) „Montezumabaum“ (n. d. mexik. Kaiser Montezuma, 15. Jahrh.), M. *speciosissima* Sess.
- 1) **Montia** Mich., L. (Portulaceen Samoleen, III. 3) Bach- od. Flutquendel, Greusel O. W. (n. Gius. Monti, Prof. zu Bologna), M. *fotiana* L. „Quell-Montie“ M.-Rchb. 2) **Montia** Houst. (Tiliaceen).
- Montinia** L. (Samoleen od. Onagrarieen, XXII. 4) „Montinie“ (n. d. schwed. Bot. Lorenz Montin, schr. üb. *Spachnum*, † 1785), z. B. M. *acris* L. (caryophyllacea Thb.) (Cap.).
- 1) **Moquinia** DC. (Compositen) „Moquinie“ (n. d. franz. Bot. Moquin-Tandon), z. B. Bojeri DC., s. *Spadonisma* DC. 2) **Moquinia** Grissel. (Loranthaceen, VI. 1), z. B. *glabra* Griss. 3) **Moq.** A. Spr. (Campanulac., V. 1), z. B. *rubra* A. Spr. (Capstr.).
- Moracées** Endl., Grck. „Maulbeerbäume“, s. *Morus* T.
- Moraea** L. (Irideen, III. 1) „Moräus“-Schwertlilie, Panther- od. Rollschwertel (n. Joh. Moraeus, Arzt zu Fahlun in Schweden, Linné's Schwiegervater), Zier. M. *chinensis* Thb. chines. Pantherblume Vilm., fr. *Morée de Chine*, e. Chinese M., s. *Pardanthes chin.* Ker, M. *fimbriata* Hort. (*Iris chinens.* Bot. Mag.), M. *diandra* Vahl (Diplarrhena *Moraea* Dietr.).
- Morchella** Dill. (Pilze, XXIV. 4) „Morchel“, Spitzmorchel, fr. morille, e. morille, trub (ob v. mor niedersächs. für mürb? Wtst., Helm.-Rabbst.), z. B. M. *conica* Pers., *esculenta* L. Speisemorchel, u. deliciosa Fr. — *Morchellini* Rchb.
- Moræae** (sc. Artocarpeae) Bartl. Maulbeergew., s. *Morus* T.
- Moricandia** DC. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Moricandi“- od. Ackerkohl (n. Steph. Moricandi, ital. Bot., schr. Fl. Veneta, Genuae 1820 u. a.), wild u. Zier. M. *arvensis* DC. (*Brassica arv.* L. s. pur-

- purēa Mill.), fr. Moricandie des champs, e. cabbage-flowered M., s. Turrītis arv. R. Br. s. Crantzia frutescens Lag.
- 1) **Morina** T., L. (Labiat. Nepeteen, II. 1) „Morine“, fr. morine (n. d. franz. Bot. L. Morin, † 1715), Zier. M. longifolia Wall. u. M. persica Don (Asaphes nepalensis Spr.). 2) **Morina** Don (Verbenaceen).
 - Morinda** Vail., L. (Rubiaceae. Cinchonaceen, V. 1) „indische Maulbeere“, fr. morinde, m. royoc, fausse rhubarbe Tintenwurzel (aus *Morus indica* — Ähnlichk. d. Frucht m. d. Maulbeere!), z. B. M. tinctoria Roxb. (Str. Ostind.), phillyreoides Lab. (Str. Neucaled.), muscosa Jacq. (*Cephaelis* m. Sw.) etc.
 - Moringa** G. (sc. *Guilandina*) L. (Cassieen Cäsalpinieen od. Rutaceen, X. 1) „Moringabaum“ (vaterl. Name!), M. Pterygosperma G., s. *Guil.* Mor. L.; M. zeylanica Lam., s. Hyperanthera Mor. Vahl (Guiland. Mor. Jacq.). — *Moringeae* Wight (zu Rutaceae).
 - Morio** (sc. *Orchis*) L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) gem. od. Salep-Orchis, Wiesen-Knabenkraut, Kukusblume, eig. „Schalksnarr“ (lat. morio, -onis, gr. μωρός Narr — Blüte einer Narrenkappe ähnlich!), fr. folle-femelle.
 - Morisonia** Plum., L. (Capparideen, XVI. 8) „Morison's“-Kaperbaum, Teufelsb. Wolff, fr. mabouia (-bouier), massue des sauvages (n. d. schott. Bot. Rob. Morison), M. americana Jacq., s. *Capparis* *Morisonia* Sw.
 - Morna** Lindl. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Mornablume“ (n. Morna, Heldin nordischer Romane, Wtst.: neuhol. Name!), Zier. M. nitida Lindl. s. elegans Hort. (*Helichrysum* el. Hort., *Leptorrhynchus aurēus* Benth., *Waitzia aur.* Steetz), M. nivēa Lindl. (*Helichr. decumbens* Portenschl., *Leptorrh. suaveolens* Benth., *Waitzia corymbosa* Wendl., v. *Benthamiana* Walp.).
 - Morocarpus** Scop., Ad. (Chenopodiaceen, V. 2) Maulbeerspinat, -frucht, Erdbeerspinat (morus Maulbeere, μωρός Frucht — rote Beerenfrüchte), s. Blitum capitatum L.
 - Morsus ranae** T. (sc. Hydrocharideen) L. (Hydrocharideen, XXII. 8) „Froschbiss“ (morsus d. Biss, rana Frosch — d. mürben Blätter u. weichen Wurzelfasern v. Froschquappen verschluckt!).
 - Morus** T., L. (Artocarpeen od. Urticac. Moreen, XXI. 4) Maulbeerbaum, fr. mûrier, e. mulberry (-tree), hirtle-berry (gr. μόρον n. d. celt. mor gr. μωρός schwarz), Gärt. M. nigra L., fr. mûrier noir, e. black-fruited m.-b.-tr., M. alba L., fr. m. blanc, e. white-fruited m.-tr. m. v. v. M. rubra L. m. v. seabra Loud.
 - 1) **Moscharia** Rz. Pv. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Moschuskraut“ (μωσῆς Moschus, Räucherwerk — riecht wie Moschus!), M. pinnatifida R. P. (*Mosigia* p. Spr.), s. *Moschifera* Mol. 2) **Moscharia** Forsk. (Labiateen, XIV. 1). 3) **Moscaria** Pers., s. *Moscharia* Rz. Pv.
 - Moschatellina** T. (sc. Adoxa) L. (Araliaceen, VIII. 4) Moschus- od. Bisamkraut, fr. moscateline, fleur od. herbe musquée, e. moschatel (s. eb.).
 - Moschosma** Rehb. (Labiateen Ocimoideen, XIV. 1) „Moschusduft“-Kraut (s. v. οὐσιὴ Duft), s. *Ocimum* L.
 - Moussonia** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Moussonie“, z. B. elegans Decsn. (schwerl. n. Mousson = Passatwind, sond. N. pr.!).
 - Moutabēa** (*Moutoubēa*) Aubl. (Cinchonaceen od. Lucumeen, V. 1) Kappenblume D. (Str. Treibh.), s. *Cryptostomum laurifolium* W. (v. ay-moutabou, Nam. d. Pfl. in Guiana).
 - Moutan** Sims, DC. (sc. *Paeonia*) L. (Ranunculaceen, XIII. 2) Baum-Päonie, fr. Pivoine Moutan (- en arbre), e. tree-Paeony (chines. Name d. Pfl.) m. v. v., s. *Paeonia arborēa* Don (suffruticosa Andr., fruticosa Dumort.).

- Moxa** W. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Moxa“- od. Brennwollen-Beifuss, s. g. indisch. Moos, fr. u. e. moxa, s. *Artemisia chinensis* L. (Moxa d. i. Brennwolle, näml. bei Hüftweh auf d. Haut abgebrannt, auch aus zerrieb. Blumen d. *Artemisia vulgaris*, Willdenow).
- Mucor** L., Mchx. (Pilze, XXIV. 4) Schimmel, Kopfschimmel, Kahm (lat. mucor, -ōris n. d. celt. muer feucht — Schimmel etc.), M. *Mucēdo*, fr. fleur d'humidité. — *Mucorinēae* Fr.
- Mucūna** Ad. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Brennbohne, Kuhkrätze (n. d. brasili. Namen mucuna-guaca — brennborst. Hülse!), Zierschlingpfl. M. urens u. pruriens Ad., s. *Strizolobium* P. Br., *Carpo-pōgon* Roxb. u. *Dolichos* G.
- Muellera** (Müllera) L. f. (Cassien Cäsalpinieen, X. 1) „Müller's“-Sophore (n. d. dän. Bot. O. Müller), M. *moniliformis* L. f. „Rosenkranz“-S., M. *verrucosa* Pers. (*Ornocarpum verr.* P. Br.).
- Muenchhausia** L. (sc. Lagerstroemia) W. (Malastomac. od. Lythrarieen, XIII. 1) „Münchhausensbaum“ (n. O. v. Münchhausen), M. *speciosa* L. (Lagerstr. spec. W.), s. *Banava* Camell.
- 1) **Mungo** (sc. Phaseolus) L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Rauhkopf-od. Ichneumonbohne (mungo d. portug. Wort für den ind. Schlangen-Ichneumon). 2) **Mungos** (sc. Ophiorrhiza) L. (Cinchonaceen, V. 1) ostindische od. Ichneumon-Schlangenwurz.
- Murex** Burn. (sc. Pedalium) L. (Scrophularieen od. Sesameen, XIV. 2) „Stachelschnecken-Ruderfrucht“ s. g. Fussangel D. (*murex Stachel-schnecke*), s. *Hyoseyāmus maritimus* Herm.
- Murraya** L., Kön. (Aurantiaceen, X. 1) „Murray's“-Orange (n. d. Prof. Joh. Adam Murray in Göttingen), Warmh. M. *exotica* L. (*Chalcas japonens*, Lour.), Burmanni Spr. (*Glaucena excavata* Burn., Str. Java), Koenigii Spr. (*Bergera K. L.*) (Bstr. Ostind.).
- Murucenia (-euja)** T. (Asclepiadeen Passifloreen, XVI. 2) „Murucuya“-Passionsblume (brasili. Name!), M. *speciosa* Spr. (*Tacsonia* sp. Kth.), aurantiäca Pers. (Str. Neucaled.).
- Musa** L. (Scitamineen Musaceen, V. 1) Pisang, Banane, Paradiesfeige, fr. plantanier, pisang, fruit du père Adam (figuier d'Adam), bananier u. bacove, e. plantain u. banana (Paxton: v. d. ägypt. mauz, Linné: n. Ant. Musa, Leibarzt d. Kais.'s Augustus, schr. de Betonica), Ge-wächsh. M. *vittata* Hort. (*chinensis* Sweet var.), *chinensis* Sweet (*Cavendishii* Paxt.), Ensete Bruc. (Aethiop.), *sapientum* L. Braminen-Banane Rmpl., *paradisiaca* L. (Gespinnstpfl. Indiens) etc. — *Musae* Juss., -*sacēae* DC., Endl. (zu Ord. Scitaminéae Bartl.).
- Muscare** T., Desf. (Liliaceen, VI. 1) „Muskat“- od. Bisamhyacinthe Grck., Moschus- od. Perl-Hyaz., fr. mousse-grecque, e. muscary (d. Blüt. riech. nach Muskattuss), Gärt.: M. *botryoides* Mill. Trauben-Hyaz., Träubel O. W., fr. *lilas-de-terre*, e. grape-flower (-hyacinth), moschatum W., monstruosum Mill. u. comosum L. Feder- od. Corallen-Hyaz. m. v. *plumosum* Hort.
- 1) **Muscipūla** (sc. Dionaea) L. (Cistineen Droseraceen, X. 1) „Fliegen-falle“, fr. Dionée attrape-mouches, e. fly-trap. 2) **Muscip.** (sc. Silene) L. (Sileneen, X. 3) Fliegen-Leimkraut, e. fly-wort (v. *musca* Fliege u. *capiō* fange, nicht Wst.: „Mausfalle“, mus u. capio!).
- Musci** L., Juss., -*cinēae* Bisch., DC., Kl. d. Moose (Laubmoose, fr. mousses frondoses, *Musci frondosi* Hedw.), s. *Bryīnae* Schimp. (*muscus* Moos).
- Mussaenda** L. (Rubiaceen Cinchonaceen, V. 1) Langschiene (ceylan'scher Name einer Art, M. *frondosa* L.), z. B. *coccinēa* u. *candida* Poir. (*Macrocnēnum* cocc. u. *candidissimum* R. Br.), lanceolata Spr. (*Manettia* l. Vahl) etc., s. auch Rondeletia u. *Gardenia*!
- Mussechia** Don (Campanulaceen, V. 1) „Muschia“-Glockenblume (n. Jean Henri Mussche, schr. Catal. d. pl. du jardin. bot. de la ville de Gand,

1810 u. Hort. Gandavensis 1817), Gewächsh. M. Wollastoni Lowe, s. Chrysangia Lk.

- 1) **Mutellina** G. (sc. Mēum) (Umbelliferen, V. 2) Alpen-Bärwurz, Köpernikel Grck., s. g. Muttern Dietr., fr. méon des Alpes, s. Phellandrium u. Ligusticum Crantz. 2) **Mutellina** (sc. Artemisia) (Compos. Anthemideen, XIX. 2) Gletscher-Beifuss, s. Artemisia glacialis Jacq. (dem. Mutina Modena? — Mutellinae radix Offiz.).

Mutisia L. f. (Compos. Perdicieen od. Mutisieen, XIX. 2) „Mutisblume“ (n. d. südamer. Bot. Cōlest. Mutis), z. B. Clematis L. f., grandiflora Hb., Bpl., speciosa Ait. (Bras.), latifolia Don (Schlingstr. Chili) etc. — Mutisiacēae Less., DC., -siēae ds.

Myagrum T., L. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) Hohldotter ($\mu\nu\alpha\gamma\varphi\circ$; eig. Fliegenfänger v. $\mu\nu\alpha$ (- $\nu\alpha$) Fliege u. $\ddot{\alpha}\gamma\varphi\circ$ Jagd, Fang).

Myanthus Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Fliegenblume“ (s. eb. u. $\ddot{\alpha}r\vartheta\circ$ Blume — d. Blüt. nach d. Verblühen wie plattgedr. Fliegen), M. cernūus Lindl. (Catasetum trifidum Hook.).

Mycēlis Cass., DC. (zu Prenanthes Rchb.) (Compos. Cichorieen, XIX. 1) „Fliegenschmutz“- Salat ($\mu\nu\alpha$ Fliege u. $\pi\gamma\lambda\circ$ Fleck, Schmutz — Bezieh. unklar!), z. B. ambigua Cass., muralis Rchb. s. angulosa Cass., s. Chondrilla mur. Wallr. (Cicerbita m.).

Mycēna Fr. (Pilze, XXIV. 4) Helmpilz Kumm. (v. $\mu\nu\zeta\eta\circ$ Pilz), z. B. pura, alliacea etc. (winzige Pilzchen) (zu Agaricus L.).

Mycētes Spr., Kl. d. Pilze (gr. $\mu\nu\zeta\eta\circ$, -ητο \circ od. -ον Pilz, Schwamm).

Mycophyēae Ktzg., Endl. Ord. d. „Schimmelpilz“- od. „Pilzalgen“, Algenpilze Seub., Schleimflocken, s. Phycomycētes de By. ($\mu\nu\zeta\eta\circ$, -ον u. φύζο \circ lat. fucus Alge).

Mygalurus Lk. (Gräser, III. 2) „Mäuseschwanz“ (v. $\mu\nu\gamma\alpha\lambda\circ$ Spitzmaus, οὐρά Schwanz), s. Festuca bromoides L. u. uniglumis Soland.

Mygindia Jacq. (Sapotaceen od. Rhamneen, IV. 3) „Myginda“, Myrrhen-Stechpalme (n. d. Bot. Franz v. Mygind), M. uragōga L., Jacq. Zipfel-M. (Str. Südamer.) (v. οὐρά u. $\ddot{\alpha}\gamma\varphi\circ$ Führer), s. Ilex Myrsinītis s. myrsinoidea Pursh.

Myoctōnum (sc. Aconitum) Rchb. (Ranunculaceen, XIII. 3 od. 7) „Mäuse-tod“-Sturmhut ($\mu\nu\circ$. -νο \circ Maus, $\pi\tau\circ\tau\circ$ Mord).

Myogālum Lk. (Liliaceen, VI. 1) „Mäusemilch“, Stiftblume (s. eb., γάλα Milch), s. Albucea Rchb. u. Ornithogālum (zu Gagea Ker.).

Myopōrum Sol., Banks (Polygalaceen od. Myoporineen, II. 1) „Mäuse-weg“, -frass Leun. (s. eb. u. πόρος Durchgang — d. Blätt. durchsicht. punkt.!), z. B. Ampeln M. parvifolium, s. Pogonia glabra Andrz.

Myosēris Lk., Rchb. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Mäusesalat“ (s. v., σέρις Salat), s. Borkhausia purpurēa Böhm. u. Lagosēris taurica M. B.

Myosotidium Van Houtt. (Boragineen, V. 1) „Mäuseohrgleiche“ (Myosotis u. εἴδουσι gleiche), z. B. nobile Van Houtt.

- 1) **Myosotis** Dill., L. (Boragineen, V. 1) „Mäuseohr“, Vergissmeinnicht, fr. gremillet, oreille de souris, e. mouse-ear ($\mu\nu\circ$. -νο \circ u. οὖς, ωτο \circ Ohr — Form u. Behaar. d. Blätt.!), z. B. Sumpfwies. M. scorpioides L. s. palustris With., fr. scorpione, aimez-moi, grémillet, ne m'oubliez pas, petit-bleu, oeil de perdrix etc., e. marsh-forget-me-not, mouse-od. scorpion-grass echtes Verg., Gärten: M. azorica Wats., Blendl. Impératrice Elisabeth (Hybr. v. azorica Wats. u. alpestris Schmidt), Rabatten M. sylvatica L. u. alpestris Schm. m. v. fl. albo (lithospermifolia Hornem.), e. alpine-forget-me-not. 2) **Myosotis** (sc. Agaricus s. Naucoria) Fr. (Pilze, XXIV. 4) Vergissmeinnicht- od. Schnitzel-Pilz, Rabbst. 3) **Myosotis arvensis** hirsuta Vail. (Alsineen, X. 5), s. Cerastium vulgatum L. s. glomeratum Thuill.

Myosūrus Dill., L. (Ranunculaceen, V. 6) „Mäuseschwanz“, fr. queue

de souris, e. mouse-tail (s. v. u. *οὐρὰ* Schwanz — Form d. Frucht-bodens!), M. minimus L.

Myriandra Spach (subg. v. *Hypericum* L.) (Hypericaceen, XVIII. 2) „Tausendmann“-Hartheu (v. *μυρόνι* zehntausend, *ἄριστος*, *-δοῦς* Mann — tausend Staubgef.!), z. B. H. Kalmianum u. prolificum L.

Myrica L. (Myricaceen, IV. 2 od. XXII. 4) Gagelstrauch, „Wachsbaum“, fr. myrique, e. gale od. dutch myrtle (gr. *μυρίζη* v. *μύρον* ausfliess. Balsamharz), Zier. M. Gale L., fr. mirte Galé od. - bâtarde Olmyrte Wolff, pimento royal, e. candleberry-myrtle od. sweet-Gale, M. cerifera L. brabanter Myrte Viim., fr. Cérier de la Louisiane, e. american candle-berry-Myrte, m. v. latifolia Ait. (M. carolinensis Mill.). — Myricaceae Rich., Grck., -ricæae Rich., Rehb. Gagelgew. Grck., Wachsbeeren Leun.

Myricaria Desv. (Tamaricineen, XVI. 5) „Myricarie“, Wachsbaum, Tamariske, Kerzenbeerstenstr., fr. cirier u. laurier sauvage (*μυρίζη* s. eb. = Tamarix der Alten!), z. B. Zier. M. germanica Desv. (Tamarix germ. L. s. decandra Mnch.) gem. od. deutsche Tamariske, fr. Tamaris d'Allemagne, e. german Tamarisk, M. dahurica DC. sibir. Tamar. (Tamarix dah. W.), fr. Tamaris de Sibérie, e. dahurian myrtle.

Myriophyllum L. (Halorageen, XXI. 9) „Tausendblatt“, fr. mille-feuille aquatique (*μυριόνι* zehntausend, *γύλλον* Laub — Blätt. haarfein zer-schlitzt!).

Myristica L. (Myristiceen, XXII. 13) Muskatnussbaum, fr. muscadier (noix-muscade), e. nut-meg (gr. *μυριστικός* wohlriechend, wie parfümierte Salbe riechend!), M. officinalis L. echte, gebräuchl. — Myristicæ R. Br.

Myrobalana (sc. *Prunus*) Lois. (Drupaceen od. Amygdaleen, XII. 1) Balsam- od. Kirschpflaume, fr. prunier Myrobalan od. Cerisette, e. myrobalan plum (v. *μύρον* Duftöl, *βάλαρος* Nuss etc.), s. *Prunus cerasifera* Ehrh., s. g. amerik. Kirsche.

Myrobalanus G., Lam., DC. (sc. *Spondias*) L. (Terebinthaceen, X. 5) „Balsam“- od. Purgierpflaume, Behennuss, fr. myrobalanier (s. eb.), s. *Spondias* Monbin Jacq. (non L.). — Myrobalanæae (sc. Onagréae) Rehb.

Myrodendron Schreb. (Tiliaceen od. Humiriaceen, XIII. 1) „Balsambau“ (s. v. u. *δέρδων* B.), z. B. amplexicaule W., s. *Houmiria* Juss.

Myrosma L., W. (Scitamineen, I. 1) „Balsam“-Gewürzlilie (s. v., *ζευμή* Duft — wohlriechend!), z. B. cannaeformis W. (*cannaefolia* Spr.), s. *Maranta* Myrosma A. Dietr.

Myrospermum Jacq. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Myrrhenkern“-Baum, Tolu-Balsam, „Balsamsamenbaum“ (s. v., *σπέρμα* Samen, Fruchtkern — haupts. im Stamm Balsam), M. toluiferum Spr., s. *Toluifera* Balsamum L. (*Myroxylon* tol. Rich.).

Myroxylon L. f. (-um Kth.) (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Balsamholz“ (s. v. u. *ξύλον* Holz — dies. von balsam. Geruch!), M. toluiferum Spr. (M. *Toluifera* Kth.) s. *peruiferum* L. f. peruvianischer Balsamb., s. *Myrospermum* tol. Spr. (s. eb.), M. orbiculatum Forst. u. suaveolens Forst., s. *Xylosma* Schreb. (XXII. 11).

Myrrhis Scop., Moris. (Umbellifer., V. 2) Süßdolle, Aniskerbel, fr. cicutaire odorante, cerfeuil musqué (*μυρρίς* Myrrhe, würzig. Kraut), M. odorata Scop., Zier. M. rosæa Spr.

Myrsine L. (Myrsineen od. Solaneen Ardisiaceen, V. 1) Myrrhe, Myrtenblume, e. myrrh (gr. *μυρσίνη* Myrte — ähnl. Belaubung), M. africana Berg. L., M. Manglilla W., s. *Bumelia* Sw. — Myrsinæae Bartl. i. q. Solanacæae Ardisiacæae Rehb.

Myrsiphyllum s. *Myrtiphyllum*!

Myrtacēae DC., Rehb., -tēae Rehb., -ti Juss., -tīlōrae Endl., Rehb., -tīnae Bartl., s. *Myrtus*.

Myrtillus (sc. *Vaccinium*) L. (Ericaceen od. Siphonandraceen Vaccineen, VIII. 1) gem. Heidelbeere, Schwarzbeere O. W., eig. „Myrthen“, fr. myrtle, brimbelle, mäceret, bleuet, e. bilberry, hurtleberry (dem. v. *Myrtus Myrtle* — Ahnl. d. Belaubung!).

Myrtiphyllum P. Br. (*Myrsiph.*-W.) (Melanthaceen od. Smilaceen, VI. 3) „Myrtenlaub“ ($\mu\acute{\imath}\nu\tau\circ\zeta$ u. $\varphi\acute{\imath}\lambda\lambda\circ\zeta$ Laubblatt!), Zier. M. asparagooides W. (Spalier u. Ampel), s. *Medeola* asp. L.

Myrtus L. (Myrtaceen, XII. 1) „Myrte“, fr. myrtle, e. myrtle (mirtle) (gr. $\mu\acute{\imath}\nu\tau\circ\zeta$ v. $\mu\acute{\imath}\nu\varphi\circ\zeta$ ausfliess. wohlriech. Saft), Zier. M. communis L. m. v. v. (z. B. *italica* Mill., *romana*, *baetica*, *tarentina* etc. Mill.), M. leucocarpa Sm. (Griechenl.).

Myrrus Ehrh. (sc. *Festuca*) L. (Gräser, III. 2) „Mäuseschwanz“-Schwingel ($\mu\acute{\imath}\nu\circ\zeta$, - $\nu\circ\zeta$ Maus, $\sigma\circ\varphi\circ\zeta$ Schw.).

Myxa Blackw., Endl. (sc. *Cordia*) L. (Asperifolien od. Convolvulaceen, V. 1) schwarze Sebeste oder Brustbeere, ägypt. od. arab. Pflaume, e. assyrian plum ($\mu\acute{\imath}\xi\alpha$. - $\tau\alpha$ Pflaume od. Sebesten), s. Sebestēna offic. Blackw. „Sebestenbaum“.

Myxaceum DC., Fr. (Pilze, XXIV. 4) Schleim-Hutpilz Kumm. (v. $\mu\acute{\imath}\xi\alpha$ Schleim u. $\acute{\imath}z\circ\eta$ Spitze — Manschette klebrig! Wtst.), z. B. muscosum, croceo-coeruleum etc., s. *Agaricus* L.

Myxogastēres Fr. „Schleimbalgpilze“ (zu Ord. *Myxomycētes* Wallr.) ($\mu\acute{\imath}\xi\alpha$ v. $\gamma\alpha\sigma\tau\circ\zeta$, - $\acute{\imath}\varphi\circ\zeta$ Bauch).

Myxomycētes Wallr. „Schleimpilze“ (s. v. u. $\mu\acute{\imath}\zeta\eta\circ\zeta$, - $\eta\tau\circ\zeta$ od. - $\eta\circ\zeta$ Pilz).

1) **Naegelia** DC., Reg. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Nägelie“ (n. d. Prof. Nägeli in München), Stuben u. Sommergeart. N. zebrina Hort., cinnabarinum Lindl., amabilis Deesn. m. v. Cérisé d'or. 2) **Naeg.** Lindl. (Pomaceen, XII. 4), s. *Cotoneaster* Med.

Naematelia (bess. *Nemata*-) Fr. (Pilze, XXIV. 4) Zitterpilz, eig. „Gespinnstverfertiger“ ($\nu\acute{\imath}\eta\mu\alpha$ Gespinnst, $\tau\epsilon\lambda\acute{\imath}\epsilon\omega$ vollende — Schlauchlager enth. ausser d. Sporidien noch einen festen Körper), z. B. encephala etc., s. *Tremella* Dill.

Nagassarium Rumph. (Guttiferen, XVI. 8) „Nagasbaum“ (v. nagassaran Flöten der Bajaderen — d. Holz dazu lief. B.!), s. *Mesua ferrea* L.

Nageia (-ja) G. (Coniferen Taxaceen od. Myricaceen, XXII. 4) „Nagi“-Gagel (v. nagi, Name d. Str.'s in Japan, naga Beere), z. B. *N. bracteata* Krz. (Podocarpus br. Blum.).

Najadēae A. Rich., Rehb., -jādes Juss., DC. (zu *Helobiae* Endl.) Najaden od. Wassernymphen, s. sogl.

Najas L., W. (Fluvialen od. Helobien Najadeen, XXI. 1) „Najade“, Wassernymph (gr. $\nu\acute{\imath}\acute{\imath}\circ\zeta$, Pl. $\nu\acute{\imath}\acute{\imath}\delta\circ\zeta$ v. $\nu\acute{\imath}\acute{\imath}\circ\zeta$ od. $\nu\acute{\imath}\acute{\imath}\omega$ ($\acute{\imath}\acute{\imath}\circ\zeta$ schwanke, schwimme), s. *Fluviales* Vaill., Mchx. u. *Potamogēton* Pluk.

Napaea L. (Malvaceen, XXII. 13) Sammetmalve, eig. „Waldthal“-M. ($\nu\acute{\imath}\acute{\imath}\alpha\acute{\imath}\circ\zeta$ in Waldthälern etc., *Napaea* Waldthal-Nymphen, Wtst.: zus. aus $\nu\acute{\imath}\acute{\imath}$ nicht u. $\pi\acute{\imath}\circ\zeta$ hell!), z. B. *N. laevis* L. s. hermaphrodita L., s. *Sida* Nap. autt.

Napellus Riv., Dod. (sc. *Aconitum*) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) „Napell“-Eisenhut M.-Rehb., fr. napel, e. lark's-heel „Lerchensporn“, morion, casque, monk's-hood „Mönchskappe“ (dem. v. $\nu\acute{\imath}\acute{\imath}\circ\zeta$ Nachen, nicht Wtst. v. $\nu\acute{\imath}\acute{\imath}\circ\zeta$ Rübe — weg. d. Wurzel!).

1) **Napoleona** P.-B. (Belvisiaceen od. Olacineen, XIII. 1) „Napoleons“-

- Belvisie od. Passiflore (n. Napoleon I., Kais. v. Frankr.), z. B. N. imperialis P.-B. — Napoleonēae DC. 2) **Napoleōna** R. P. (Cyclantheen od. Pandaneen, XXII. 12), s. Phytelēphas R. P.
- Napus** T. (sc. Brassīca) L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Reps (Raps) od. Kohlrübe, Kohlsaatt., fr. chou-navet, navette od. rabette, e. cole-rape, navew (lat. napis, -i Steckrübe, gr. νάπιν od. νάπτειον Senf).
- Nareissus** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Narzisse“, Sternblume Seub., fr. narcisse, e. lily-daffodil, star-flower (-hyacinth) (n. Narcissus, dem in sich verliebten Jüngling, Myth. — blickte unt. sich in d. Quellspeigel, — nick. Blume!), Zier: N. poëticus L. Garten-Sternbl., fr. n. des poètes, Cladinette, oeil de faisant etc., e. poët's-Narcissus, Pseudo-Narcissus L., s. g. Märzbecher u. Osterblume m. v. fl. pleno, Stuben: N. Tazetta L. Dolden-, Bouquet- od. Tross-N. m. v. v., incomparabilis Mill., odōrus W., Jonquilla L. Jonquille od. Binsen-N. (Hermione Jong. Haw. s. juncifolia Salisb. — v. junc, lat. jun-eus) m. v. fl. pl., N. minor L., fr. N. petit, e. smaller-N., calathinus L. s. reflexus Lois. etc. — Narcissēae Rchb. (-si Juss.) i. q. Amaryllidēae DC.
- Nardosmia** Cass. (zu Tussilago Rchb.) (Compos. Tussilagineen, XIX. 2) „Narden“- od. wohlriech. Huflattich (νάρδος wohlriech. Narde, δομή Duft — riecht der Valerianee Nardus ähnl.), Zier. N. frans Rchb., s. g. Winter-Heliotrop d. Orangerien, s. Tuss. fragr. Vill.
- Nardūrus** Rchb. (Gräser, III. 2) „Nardenschwanz“ (s. Nardus u. οὐρα Schwanz), s. Festūca tenuiflora Schreb. u. Micropýrum Gaud. „Kleinweizen“.
- 1) **Nardus** Moris. (Valerianeen, III. 1) Narde (gr. νάρδος, indisch nard — besond. Geruch!), N. celtica Mor., s. Valeriana celt. L. 2) **Nardus** L. (Gräser, III. 1) „Narden“- od. Borstengras Seub., fr. nard, z. B. N. stricta L. „straffles“, indicia L., fr. spicanard od. espicanard, e. nard-spike. 3) **Nard.** Lob. (sc. Andropōgon) L. (Gräser, XXIII. 1) Narden-Bartgras, N. Gangitis Lob. sc. scorpioides Lam., s. Monerma Gang., P.-B.
- Narthecium** Möhring (Liliaceen Asphodeleen, VI. 1) Beinheil, Sumpf- od. Ährenlilie Leun. (Anagramm v. Anthericum, Wtst.: v. νάρθηξ Schaft — nackt. Schaft d. Blum.), z. B. calyculatum Huds. (Töpfeldia palustris Huds.) u. ossifragum Huds., s. Anthericum etc. L.
- Narthex** Falconer (Umbelliferen, V. 2), Stinkasant, s. g. Teufelsdreck νάρθηξ, -zoς Doldenpfl. Ferula, Rute od. Schlagstock!), N. Asa foetida Falc., s. Ferula Asa foet. L.
- Nasturtium** R. Br. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Sumpf- od. Brunnenkresse, fr. laberte, cresson de ruisseau (- de fontaine), e. water-cresses (-parsley), balsamite, lady's-smock, nose-smart (st. nasitorium „Nassenprickler“), z. B. officinale R. Br. (Sisymbrium Nast. L.) „gebräuchl.“ od. Salat-Br.
- Natrix** Mnch. (sc. Onōnis) L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) gelbe od. „Ringelnatter“-Hauhechel (Natrix Zoologie = Ringelnatter, eig. „Schwimmerin“ — angebl. Wirk. geg. Schlangen).
- Nauclēa** L. (Rubiac. Cinchonaceen, V. 1) ostind. Gambirstrauch, Kino od. Bastard-Catechu (st. navicula od. naucella Napf, dem. v. navis Schiff — Kaps. nachen- od. napfförm.), N. Gambir s. orientalis L., africana W. (Uncaria inermis W.) etc.
- Naucloria** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Schnitzelpilz Kumm. (v. naucus gering, Wtst. naucum Nusschale? vielm. nauci indeclin. Sattel innit. d. Nuss, nichts nütze! u. δούλω sehe — Wtst.: Manschette mit d. schupp. Hut verwachsen!), z. B. graminicola etc., s. Agaricus L.
- Nauenburgia** W. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Nauenburgsblume“ (n. d. bot. Autoren Joh. Sam. Nauenburg, schr. Lehrb. d. reinen Bot.,

- Hamb. 1798), *N. trinervata* W., s. *Brotēra Contrayerva* Spr. (*Flaveria repanda* Lag.).
- 1) **Naumburgia** Mnch. (Primulaceen, V. 1) „Naumburgie“ (n. d. bot. Aut. Naumburg od. Nauenburg, s. eb.), *N. thyrsiflora* Mnch. (*Lysimachia th.* L.). 2) **Naumburgia** W. = *Nauenburgia* W. (s. eb.).
 - Nauplius** Cass. (zu *Buphtalmum* Rchb.) (Compos. Inuleen, XIX. 2) Gestirnblume, Wasser-Rindsauge (n. *Nauplius*, d. sternkund. Argonauten, v. *ναῡς* Schiff u. *ἀλείω* fahre zu Schiff), *N. aquaticus* Cass., s. *Asteriscus* Mnch.
 - Navarretia** Rz. Pv. (Convolvulaceen, V. 1) „Navarettie“ (n. Fr. Ferd. Navarette, k. span. Leibarzt, schr. üb. d. Natg. v. Granada), Zier. *N. cotulaefolia* Van Houtt., pubescens, involucrata Rz. Pv. (Chili) etc.
 - Necessaria** L. (sc. *Polygamia*, XIX. Kl. 4. Ord.) „Notwendige“, d. i. Randblütchen fruchtbar, daher notwendig!
 - 1) **Neckēra** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Necker's“-Astmoos (n. d. Bot. N. J. Necker in Mannheim), z. B. *N. heteromalla* Hedw. (*Daltonia het.* Spr.). 2) **Neckeria** Gm. (Paronychieen, I. 1) Necker's od. Pollich's-Feldknaul, *N. campestris* Gm., s. *Pollichia* c. L., Schreb. 3) **Neckeria** Scop. (Fumariaceen, XVII. 2) Necker's-Erdrauch.
 - 1) **Nectandra** Berg., Roxb. (*Gnidia* L.) (Thymeläaceen, VIII. 1) „Honigbeutel“-Strauch (*réztaq* u. *ἀρύρο*, -*δρός* Mann, Bot. Staubgefäß), z. B. *N. Puchury* Nees u. Mart. *Pichurimbohne*, s. *Ocotea Pichurim* Kth. 2) **Nectandra** Rottb. (Laurineen, IX. 1) „Honigdrüsen“-Strauch (— 3 der Staubfäd. mit Honigdrüsen, Leun.), *N. sanguinēa* Rottb., s. *Laurus sang.* Sw.
 - Neetris** Pursh, Schreb. (Hydrocharideen, VI. 2) „Schwimmerin“ (*νηζτοῖς* — schwimmt auf d. Wass.!), z. B. *peltata* F. Müll. u. *aquatica* W. (*Cabomba* p. F. Müll. u. aq. Aubl.) schildblättr. u. Wasser-Haar-nixe, *N. pinnata* Pursh, s. *Floerika palustris* Nutt.
 - 1) **Negundo** Mnch. (sc. *Acer*) L. (Sapindac. Paullinieen, XXIII. 1) Eschen-ahorn (malabar. Name!), Zierb. *N. aceroides* Mnch. s. *fraxinifolia* Nutt. = *Acer Negundo* L. m. v. v. (folio albo u. aureo-varieg. Hort.). 2) **Negundo** (sc. *Vitex*) L. (Verbenaceen, XIV. 2) „Negundo“-Müllen (*Legiondium litorēum* Rumph.).
 - Neillia** D. Don (Rosac. Spiräaceen od. Homalineen, XII. 4) (Gruppe v. Spiräa Lauché), „Neill's“-Spiräe (n. d. schott. Bot. Neill, schr. fruit-, flower- and kitchengarden, Edinb. 1840), Zier. *N. thyrsiflora* Don (Himal.) etc.
 - Nelsonia** R. Br. (Scrophularineen, II. 1) „Nelson's“-Acanthus (n. d. Bot. Dav. Nelson, Cook's Begleiter, nicht Admiral Nelson Dietr.), z. B. *campestris* R. Br. (Neuholl.), *hirsuta* Röm. (*Justicia brunelloides* Lam.) etc. — *Nelsoniæ* (zu *Acanthacæa*) Nees.
 - Nelumbium** W., Juss. (Nymphäaceen, XIII. 6) heilige Padma, prächt. *Nelumbo* od. *Lotusblume* Rmpl. (*nelumbo* d. Namen in Ceylon), *N. speciosum* W. — *Nelumbiae* Endl., Kl. d. Lotusgewächse, -*bonæae* DC. Nelumbien Bartl.
 - Nelumbo** T., G. (sc. *Nymphaea*) L. (Nymphäaceen, XIII. 1) rosenfarb. Seerose, *N. nucifera* G., s. *Nymphaea Nelumbo* L., fr. *fève d'Egypte* (vaterl. Name in Ceylon!), s. *Nelumbium speciosum* W. (*Colocasia* der Römer, Ind. u. Ägypt.). — *Nelumbonæae* DC. Nelumbien Bartl.
 - 1) **Nemathanthus** Schrad., DC. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Fadenblume“ (*νήμα, -ατος* Faden u. *ἄνθος* — d. Blume einzeln auf fadendünn. Stielen), Treibh. *N. chloronēma* u. *ionēma* Mart., s. *Columnea splendens* Hort. 2) **Nemathanthus** Nees (Restiaceen od. Commelyneen, XXII. 3) Fadenblüten-Strickgras, s. *Restio viminēus* L. (— Blüten-decke aus 6 Fäden).

Nematophyceae Rabbst. „Fadenalgen“ i. q. Confervæae Ag. (s. v. u. φύκος Tang od. Alge).

Nemauchenes Cass. (st. *Nematauch-*.) (zu Barkhausia Rehb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Fadenhalsblume“ (s. v. u. αὐχήνη, -έρος Hals od. Nacken — Pappus haardünn), z. B. *aculeata* Cass. (Barkh. aspéra Rehb.), s. Endoptéra DC. u. *Crepis L.*

Nemesia Vent. (Scrophularineen, XIV. 2) Grossfrucht-Löwenmaul (gr. Νεμέσια v. Νέμεσις Rachegöttin, Dioscor. Namen eines Löwenmauls!), *N. macrocarpa* Vent. (Antirrhinum macroc.), bicornis Pers. Antirrh. bic. L.), Zier. floribunda Lehm. (affinis var. Benth.), versicolor E. Mey. m. v. compacta elegans Hort., v. coerulea u. alba Hort.

Nemolapathum Ehrh. (sc. Rumex) L. (Polygoneen, VI. 3) „Hain“- od. knäublüt. Ampfer M.-Rehb., s. *Rumex glomeratus* Schreb. (νέμως Hain, Wiese, λάταθος Ampfer).

Nemophantes Raf. (Aequifoliaceen, IV. 4) „Fadenblüte“, Berghülsen Lauch. (v. νήμα Faden, ὄψ, -πος Ansehen, ἄρθη Blüte — Blüten auf fadendünn. Stielen), *N. fascicularis* Raf. s. *canadensis* DC. (Prinos lucida Ait.) etc., s. *Ilex canad.* s. *prunifolia* Mühlb.

Nemophila Benth., Bartl. (Boragineen Hydrophyllæen, V. 1) „Waldlieb“, Hainschönchen Leun., Triften- od. Hainblume Vilm. (v. νέμως Hain u. γιλός Liebhaber — Standorte), Zier.: *N. insignis* Benth. m. v. v., atomaria Fisch., Mey. m. v. v. (*crambeoides* Hort. u. *cramb. maculata* Hort., *maculata* Benth., *discoidalis* Hort. etc.), s. *Hydrophyllum L.*, *Phacelia* Juss. u. *Eutœca R. Br.*

Nenuphar Hayne (Nymphaeaceen, XIII. 1) Höllenkraut, Mummel, Nixblume, fr. nénuphar od. herbe d'enfer, e. nenewhare od. nénuphar (nenuphar persisch = nicht essbar!), *N. lutéum* Hayne, s. *Nuphar lutéum* Sm. (Nymphaea lut. L.).

Neottia L. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nestwurz“ (νεοττία Nest — Wurzelfasern wie ein solches!), *N. nidus avis* Rich., „Vogelnest“, s. *Ophrys L. u. Spiranthes Rich.* — Neottiæae Lindl.: *Neottia*, *Listera*, *Epipactis* etc.

Neottidium R. Br., Schldl. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Nestähnliche“, Nestwurz (s. eb. u. εἰδομαι gleiche), *N. nidus avis* R. Br., s. *Neottia* nid. av. Rich. (*Ophrys* nid. av. L.).

Nepenthæae Lindl., DC. Kannenträger, Schlauch- od. Kannenpfl. Rmpl., s. sogl.

Nepenthes L. (Aroideen od. Nepenthæen, XX. 3 od. XXII. 13) Kannenstrauß, fr. népente od. plante distillante (gr. νηπενθής i. q. νηπαθής Leid verscheuchend), Zier. *N. destillatoria* L. (Bandura zeylanica Burm.), fr. bandure, *N. Phyllamphora* W. „Blattkrug“ (— Form d. Blüte!), *N. Rafflesiana* Jack, *ampullaria* Jack (Singapore), *villosa* Hook. f. (Borneo) etc.

1) **Nepēta** L. (Labiaten, XIV. 1) Katzenminze, -kraut Vilm., „Nepte“ O. W., fr. menthe de chat, e. cat-mint od. nep (nip), z. B. *N. Cataria* L., Zier. *N. macrantha* Fisch., Meyeri Benth. (micrantha Nees) (v. Nepēta jetzt Nepi, Stadt in Etrurien, wo häufig wild! Wtst.), s. *Melissa*, *Thymus* u. *Teucrium*. — *Nepetæae* Rehb. 2) **Nepeta** (sc. *Melissa*) L. (Labiaten, XIV. 1) katzenminzart. Schönminze, s. *Calamintha* *Nepēta* Sm.

Nephelium L. (Sapindac. od. Urticac. Gunneraceen, XXI. 5) „Kletten“-Seifenbeere (νεγκέλιον dem. v. νεγκέλη Wolke, alt. Namen der Baradana — Frucht hakig, wie Klette), *N. lappacéum* L. Litschibaum od. Zwillingspflaume, s. *Euphoria Nephelium* DC.

Nephrodium Rich., Mchx. (Farne, XXIV. 1) „Nieren“-F. (νεφροῦδης nierenartig — Form d. Fruchthaufen), z. B. *articulatum* Hort.

Nephrolépis Schott (Farne, XXIV. 1) „Nierenschuppen“-F. (*νεργοός* Niere, *λειτι*; Schuppe — d. Indusium nierenf.), z. B. exaltata Schott, *tuberosa* Presl, etc.

Neptunéa (-nia) Lour. (Mimoseen, XXIII. 1) „Neptun's“- od. Wasser-Mimose (n. d. Gott d. Meeres Neptun — d. Pfl. wächst im Wasser), *N. oleracea* Lour., s. *Mimosa* s. *Desmanthus natans* W.

Neríne Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Nerine“-Narzisse (n. d. Nereïde Nerine od. v. *νηρός* wasserliebend), Zier. *N. undulata* Herb. (*Amaryllis crispa* Hort.), *sarniensis* Herb. (*Amar. sarn. L.*) „Guernsey“-Lilie (Stubenbl. d. Vorwinters).

Neríum L. (Apocyneen, V. 1) Oleander, Lorbeerweide, Rosenlorbeer (Lorbeer-Rose), fr. fleur de St. Joseph, oléandre, rosage, e. oleander, rose-bay (gr. *νηρόν* v. *νηρός* wasserliebend!), Zier. *N. Oleander* L. m. v. v. (z. B. fl. pleno u. fl. albo, splendens fl. pl.) etc.

Nertéa Sol., Banks (-ia G., Sm.) (Rubiac. od. Alsineen, IV. 2) „Nertere“ od. Gomozie, Sumpfranke D. (v. Eigennamen? od. *νεοτερούς* unten — nied. Wuchses, steckt m. d. Stengeln in Sumpf), Zier. *N. depressa* G. (*Gomozia granadensis* L. Granadabeeren-Sträuchlein), *N. tetrasperma* H. B. K. s. assurgens P.-Thou., s. *Erythrodanum alsineforme*.

Nesléa (-lia) Desv. (Cruciferen Nucamentac., XV. 1) Rispen- od. Hohl-dotter Leun., Dötterlein O. W., Finkensame (n. d. franz. Bot. J. A. N. de Nesle, schr. Introd. à la Bot. Poitiers), z. B. *N. paniculata* Desv., s. *Myagrum* T.

1) **Nectouxia** H. B. K. (Solaneen, V. 1) „Nectouxie“ (n. d. Bot. Aut. Hipp. Nectoux, schr. Diss. de Cassiis aegypt. u. Voyage dans la haute Egypte, 1808), *N. formosa* Kth., s. *Atropa arenaria* W. 2) **Nectouxia** DC. (Cruciferen).

Neuendorffia Adans. (Solaneen, V. 1) peruvian. Schellenblume (n. Neuendorff, von dem Adanson nichts Näheres mitteilt), *N. peruviana repens* Ad., s. *Nolana prostrata* L.

1) **Neumannia** Brongn. (Bromeliaceen, VI. 1) „Neumann's“-Ananaspf. (n. K. Fr. Neumann, Herausg. v. Marco Polo's Reisen, 1845, Wtst.: n. d. Obergärtn. Neumann in Paris), s. *Pitcairnea l'Hér.* 2) **Neum.** Rich. (Bixaceen).

Neurocarpum (-us) Desv. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Nervenhülse“ (v. *νευρά* Nerv etc., *καρπός* Frucht — jed. Hülsenklappe mit einem Längsnerv), *N. guianensis* Desv., s. *Crotalaria* g. autt.

Neuroptéris Brongn. (foss. Farne, XXIV. 1) „Nerven“-F. (s. eb. u. *πτερίς* Farn).

Nicandra Ad., Juss., G. (Solaneen, V. 1) „Nicanderblume“, „Männer-sieg“, Gift-Blausum, -beere Grck. (n. d. griech. Arzt Nicander in Colophon, 16) v. Chr., od. v. *νικάω* besiege, *ἀνήρ*, *-δοῦς* Mann — als Gift!), Zier. *N. physaloides* G., e. winter-cherry-like *N.*, s. *Atrópa phys.* G. u. *Calydermos* R. P. (nicht Lag.).

1) **Nicotiana** T., L. (Solaneen, V. 1) Tabakpflanze, fr. tabac od. herbe au Grand-Prieur (- à l'ambassadeur, - à la reine), e. tobacco, nicotian (n. d. franz. Gesandt. am portug. Hof Jean Nicot aus Nimes um's J. 1585), Gärt. *N. rustica* L. Bauern-T., fr. tabac rustique od. faux-tabac, *N. havanensis* Lag. (*virginica* Hort.) s. *Tabacum* L., m. v. v., gem. od. Havanna-T., e. true-tabacco, *N. latissima* Mill. s. *macrophylla* Spr. (*Tabacum* L. v. *macroph.* Schrk.) u. gigantēa Hort. „Riesen“-T., Maryland-T., Baumanaster, *N. glauca* Grah., *N. longiflora* Cav. (*angustifolia* R. P.), sehr dekorativ *N. Wigandiioides* Hort. 2) **Nicot.** Schreb. (Gentianen, V. 1).

Nidularia Bull. (Lycoperdace-Pilze, XXIV. 4) „Nestchen“, Teuerling Kunm. (dem. v. *nidus* Nest — nach d. Öffnen gleicht d. Pilzchen

- einem Nestchen mit Eiern darin, nämл. m. den Peridiolen! Kumm.), z. B. Olla u. crucibulum Topf- u. Tiegel-N.
- Nidularium** Sm. (Bromeliaceen, VI. 1) „Vogelnest“-Bromelie, Blüten-nest-Perring (v. nidulum Nestchen — Blütenform!), Stuben: N. ful-gens Lem. (Guzmannia picta Rz. Pv.), Scheremetiewii Reg. etc.
- Nidus avis** (sc. Ophrys) L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Nestwurz od. „Vogelnest“, fr. nid d'oiseau (nidus Nest, avis Vogel), s. Neottia n. av. Rich.
- Nierembergia** Rz. Pv. (Solaneen, V. 1) „Nierembergie“ (n. d. span. Jesuiten u. Prof. Joh. Euseb. Nieremberg, † 1663), Zier. N. graciilis Hook. (Buen-Ayres), calycina, frutescens Dur., N. punicæa Hort. (Petunia violacea Lindl.) m. v. v. etc., s. Leptoglossis Benth., Sal-piglossis R. P. u. Petunia Juss.
- Nigella** T., L. (Ranunculaceen, XIII. 5) „Schwarzkümmel“, fr. nielle u. nigelle, toute-épice, e. bishop-wort u. fennel-flower (nigella dem. v. nigra — schwarze Samen!), Acker: N. arvensis L., fr. nielle des champs, poivrette, Gartenzier. N. damascena L. m. v. nana Hort., s. g. Jungfer im Grünen od. Grethchen im Busch, fr. cheveu de Vénus etc., e. love in a mist, N. hispanica L. m. v. atro-purpurea Hort.
- Nigritella** Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Schwarzstendel“ Seub., Braunelle (v. nigritia Schwarze — schwarzrote Blüt. einiger Arten), z. B. angustifolia Rich. (Satyrium nigrum L., Alpen), globosa Rehb. (Orchis gl. L., Traunsteinera gl. Rehb.).
- Nil** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulaceen, V. 1) arabische od. Nil-Winde, fr. liseron Nil, - de Michaux, étoile du matin (nil d. arab. Name, nicht Fluss Nil! Linné), s. Ipomoea Nil Roth (Pharbitis Nil Chois.) himmelblaue Trichterwinde.
- Nipa** Thb. (Palmen, XXI. 1) Molukken-Strauchpalme (Name auf den Molukken!), z. B. fruticans Thb.
- Niphaea** Lindl. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schneeblume“ (v. νίψη, -ρος; Schnee — schneew. Blütenhaufen), Treibh. N. albo-lineata Hook., rubida Hort. u. Roezlí Reg.
- Niphobolus** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Schnee“-F., Sternhaar-F. (νιφόβολος m. Schnee beworfen — d. Wedel unten schupp. weiss-filzig), Kalth. N. Lingua Spr. (Jap.), adnascens Kaulf. (Cyclophorus Desv.), s. Polypodium adn. Sw.
- 1) **Nissolia** T. (sc. Lathyrus) L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Nissole's“-Blatterbse (n. Guill. Nissolle in Montpellier, † 1735). 2) **Nissolia** Jacq. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) Amarant-Cayennéholz, blaues Eben- od. Luftholz, N. arboræa Jacq.
- Nitella** Ag. (zu Chara Rehb.) (Characeen, XXI. 1) „Armleuchter“ (nitella Leuchter v. nitéo leuchte), z. B. flexilis Ag., tenuissima Desv., gracilis Sm. etc., s. Chara L.
- Nitrania** L., Schreb. (Aizoideen Tetragoniaceen od. Tamariscineen, XI. 1) „Salpeterstrauch“ (gr. νιτρον, lat. nitrum Salpeter — wächst in salz. Wasser Sibirien), z. B. tridentata Desf. (Casp. Steppe), Schoberi L. (Osiris Gm.).
- Nobla (Nobula)** Ad. (sc. Phyllis) L. (Cinchonaceen, V. 1) „Noblastrauch“, canarischer Baldrian (schwerl. fr. noble, lat. nobilis edel, sondern vaterl. Name!), s. Valerianella canariensis frutescens Pluk., simpla Nobla Dill.
- 1) **Noceaea** Rehb. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) „Nocea-Täschelkraut“ (n. Domenico Nocea, Prof. in Pavia geg. Ende d. 18. Jahrh.'s), s. Thlaspi. 2) **Nocea** Cav. (Noceaea Cass., Jacq.) (Compos. Rolandreen, XIX. 3), s. Lagascæa W., z. B. helianthifolia Cass.

- Noisettia** H. B. K. (Violaceen, V. 1 od. XXI. 6) „Noisette's“-Veilchen (n. d. franz. Züchter Léon Claude Noisette, schr. u. a. Le jardin fruitier 1821, 1832/39), z. B. *frangulaefolia* Kth. (Kletterstr. Südamer.), Roquefeuillana St. Hil. (Anchiete Roq. St. Hil.) etc., s. *Ionidium* u. *Viola longifolia* Hort.
- Nolana** Sw., L. (Solaneen, V. 1) „Cymbelblume“ (v. nola Glöckchen etc. — Blütenform), Zier. N. *prostrata* L., fr. Nolane couchée, s. *Teganium procumbens* Schmid. (*Walkeria Ehret.*, *Neuendorffia repens* Ad.), *paradoxa* Lindl., fr. N. *paradoxale*, Ampel N. *atriciliifolia* D. Don s. *grandiflora* Hort. m. v. fl. albo Hort., lanceolata Miers (*Sorema* l. Miers) etc.
- Nolanea** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Glockenpilz“ (s. eb.), z. B. *pascua*, fumosa etc., s. *Agaricus* L.
- Noli tangere** (sc. *Impatiens*) L. (Balsamineen, V. 1 od. XIX. 6) wilde Balsamine, Kräutchen „Rühr' nicht an“ (noli wolle nicht, tangere berühren — d. Samenkapseln springen bei Berühr. auf!).
- Nonnéa** Med. (Boragineen, V. 1) „Nonne'sblume“, Brauntrichter, -blasenkelch, Runzelüsschen Leun., Nämplein O. W. (n. d. Bot. J. Ph. Nonne in Erfurt, schr. üb. *Secale* 1764), z. B. *arvensis* DC. etc., s. *Anchusa* u. *Lycopsis* L.
- Nopaleae** (Cacteae) DC. (Cacteen, XII. 1) Cactusgewächse, z. B. *Nopal sylvestre* Thierr.-Menonville Cochenille-Cactus od. „Wald-Nopal“, s. *Cactus coccinellifer* L. (d. mexik. Name d. Pfl. nopal-nochotzli).
- Norantéa** Aubl. (Guttifer. Marcgravieen, XIII. 1) „Norante“-Gummibaum (aus d. vaterl. Namen bei den Galibis gonora-antegri geb.!), N. *guanensis* Aubl. — Norantéae Chois.
- Nordmannia** Fisch., Mey. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Nordmann's“-Seidelbast (n. A. v. Nordmann). 2) **Nordmanniana** (sc. *Picea*) Loud. (Coniferen, XXI. 9) „Nordmann's“-Tanne od. Kaukasus-Edeltanne.
- Nostoc** Vaill., Vauch. (Algen od. Nostochineen, XXIV. 3) Gallertalge, Zittertang, Schleimling Leun., fr. fleur du ciel, e. nostock (v. νοστός od. νοστίς Nässe), s. *Tremella Nostoc* Pers. (*Linckia Nostoc* Roth). — Nostochaecae Endl., Rabbst., -chīnae Rchb.
- Nothochlaena** R. Br. (bess. *Nothochlaena*) (Farne, XXIV. 1) „Bastard-rock“, Trugfarn Rmpl. (v. νόθος unecht, γλαύρα Oberkleid — d. Indusium durch Borsten vertreten), z. B. Terrarien N. *candida* u. *rufa* Presl (*Acrostichon bonariense* W.).
- Notorrhizéae** DC., Rückenwurzler (sc. *Cruciferae* — hinsichtl. d. Samenkeime!) (v. νώτος Rücken u. ρίζα Wurzel).
- Notylia** Lindl. (Orchideen Malaxideen, XX. 1) „Rückenköcker“-O. (s. eb. u. τύλη Höcker, Wtst. Τύλη Basis), z. B. *multiflora* Lindl. etc., s. *Pleurothallis* R. Br. „Seitenblüt“-O. (— nur 1 Stengelblatt, in dess. Achsel d. gehäuften Blüten).
- Nuelementaceae** DC. (sc. *Cruciferae*) Nusschötchenträger (numentum v. nux, -cis Nussfrüchten).
- Nueuliferae** Endl. „Nüsschenträger“, i. q. *Asperfoliae* (nūcula dem. v. nux, -cis Nüsschen).
- Nuga** (sc. *Guilandina*) L. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Stachelblatt“-Cäsalpinie, s. *Caesalpinia Nuga* R. Br. u. *Nugaria* DC. (v. νύγω steche — Stacheln an d. Blättern! Wtst.: v. *nugae* Kleinigkeiten, Rumpf beschr. d. Baum unter d. Namen *nugae sylvarum*; bei Plinius *Nuga* eine d. Intybus ähnl. Pfl.!).
- 1) **Nummularia** (sc. *Lysimachia*) L. (Primulaceen, V. 1) „Pfennigkraut“, „Münzkr.“ O. W., Nabelkr. u. Egel-Felberich O. W., fr. herbe aux deniers (- aux écus), monnoyère, e. money-wort, buck-weed, penny-wort (-rot), wild u. Ampeln (v. nummus Münze — runde Blätter!).
- 2) **Nummularia** Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Pfennigpilz“ (— weg. d. Form!).
- Glaser, Botan. Taschenwörterbuch. 18

3) **Nummularia** lactea minor Rumph. (Asclepiadeen, V. 2), s. *Dischidia nummularia* R. Br.

Nuphar Sibth., Sm. (Nymphaeaceen, XIII. 1) Nixblume, Mummel O. W., Teichrose Seub. (n. Paxton v. naufar d. i. blau glänzend, arab. Wort für Nymphaea, n. Leunis: nenuphar v. ne nicht, nuphar essbar! od. aus νυμφάριον dem. νύμφη Nymphe, Nixe!), Zier. N. album Hort. (Nymphaea s. Castalia alba), fr. blanc d'eau, nénuphar blanc, e. waterrose, N. lutēum Sm. (Nymph. lutēa L.) s. g. grosses Butterfass, gelbe Kannenblume — Form d. Frucht!

- 1) **Nuttallia** Dicks., Bart. (Malvaceen, XVI. 5) „Nuttall's“-Malve (n. d. nordamer. Prof. Thom. Nuttall), z. B. digitata Dicks. (Sida dig. Spr.), s. *Callirrhoë* Nutt. 2) **Nuttallia** DC. (Aequifoliaceen, IV. 4). 3) **Nutt.** Torr. u. Gray (Rosaceen, XII. 4).

Nux vomīca (sc. Strychnos) L. (Apocyneen, V. 1) „Brechnuss“ (nux Nuss, vomīcus brechenerregend, v. vomo breche mich).

Nyctagineae DC., Rchb., -gīnes Juss. „Nyctagineen“ (zu Ord. Fagopyrinae Bartl.), s. sogl.

Nyctāgo Juss. (Fagopyrineen Nyctagineen, V. 1) „Nacht“- od. Wunderblume, fr. nyctage, belle de nuit (v. νύξ. -ζτός Nacht — öffnet sich in d. Nacht, fr. belle de nuit!), Zier. N. hortensis Juss. (*Mirabilis Jalapa* L.) gem. Wunderbl., N. longiflōra DC. (*Mirab. long.* DC.) m. v. violacea Hort.

Nyetanthes L. (Sapotac. Jasmineen, II. 1 od. XXII. 1) „Nachtblume“ (s. eb. u. ἄνθη Blüte — wie vorh.!), z. B. N. arbor tristis L. Trauerbaum (*Scabrita* od. -tes scabra L.), pubescens Retz. (*Jasminum* p. W.).

Nyeterinia D. Don, Benth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Nacht-Leberbalsam“ (nicht etwa v. νυκτερίνος nächtlich, sond. νύξ. -ζτός Nacht u. ἔσωζ lat. Erīnus — schwärzl. aussehend), Zier.: N. selaginoides Benth. (*Erīnus* sel. Thb.) u. capensis Benth. (*Erīnus cap.* L.) s. lychnidēa L.), s. *Selago* Lychnidea L. f.

Nymphaea L., Neck. (Nymphaeaceen, XIII. 1) Teich-, See- od. Wasserrose, -lilie, Kandel O. W., fr. lis d'eau, nénuphar u. plateau, e. waterrose (-lily) (*νυγαῖα* od. νύμφη Nymphe, Nixe), z. B. N. alba L. (*Castalia* a. Lk.) m. v. v., N. Lotus L., N. lutēa L. (Nuphar lutēum Sm.) gelbe Nixblume, Kellerwurz, gelbe Kannenblume, gross. Butterfass Vilm., N. odorata Ait. (N.-Amer.) u. nitida Sims (Sibir.), versicōlor Roxb. (Ind.), coerulea Savigny (Afr.), ampla DC. (Amer.) etc. — *Nymphaeaceae* Bartl., DC. etc.

Nymphoides T., Fisch. (sc. Menyanthes) L. (Gentianeen, V. 1) Seekanne (*Nymphaea* u. εἶδομαι gleiche), s. *Limnanthēnum peltatum* Gm. s. *nymphaeoides* Lk. seerosenart. Seekanne Grck. (*Villarsia* n. Vent., Schweykerta *Nymphoides* W., Gm.).

- 1) **Nyssa** L. (Santalaceen od. Hamamelideen, XXIII. 2) „Nyssa“- od. Tupelobaum Rümpl. (gr. Νύσσα Nam. einer Wassernymphe), z. B. N. aquatica L. s. denticulata Catesb. (bisflōra Mehx., integrifolia Ait.), fr. nysse aquatique „Wasserbaum“, e. water-Tupelo-tree (Tupelo d. amer. Name!). 2) **Nyssa** R. Br. (Combretaceen, VIII. 1) „Nyssa“- Langfaden, s. *Combrētum* Loeffl.

Nyssanthes R. Br. (Amarantaceen, XXI. 5) „Stechamarant“ (v. νύσσω steche, ἄνθη Blüte — deren Abschnitte sind stachlig! Wtst.).

Obaejaca Cass. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) (zu *Senecio* L.) Wald-Greiskraut (-Kreuzkr.), z. B. O. sylvatīca Cass., s. *Senecio silvaticus* L. (Anagramm v. *Jacobaea*!).

Obeliscaria Cass. (zu *Rudbeckia* Rchb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Säulen“- od. „Obeliskenblume“ (gr. ὀβελίσκος Spitzsäule, Obelisk

— ähnл. erhöhter Blumenboden!), z. B. *pinnata* Vent., *triloba* L. etc., *Zier.* *O. pulcherrima* DC. (Tex.) m. v. *atro-sanguinea* u. *aurantiaca* Hort.

Oberonia Lindl. (Orchideen Malaxideen, XX. 1) „Oberon’s“-O. (n. d. Zauber Gott Oberon!), z. B. *longibracteata* Ldl., *anthropophora* Ldl. (Ostind.), *spathulata* Ldl. (Malaxis equitans Blum.) etc., s. *Cymbidium*, *Dendrobium* etc.

Obione G. (Chenopodiaceen, XXI. 5) Keilmelde, Salme O. W. (aus Obi, sibir. Strom u. ῥων Waare etc. geb. Wort!), z. B. *portulacoides* Moq.-Tand. (*Atriplex* L. s. *Halimus* Wallr. port.), *muricata* G. (*Atriplex sibiricum* L.) etc., s. *Diotis* Schreb. „Zweiohr“-Melde.

Obstruthium s. *Ostruthium*!

Ochna Schreb. (Simarubaceen od. Ochnaceen, XIII. 1) Nagelbeere, z. B. *parvifolia* Vahl (Evonymus inermis autt.) (Str. Arabiens) (v. ὄχνη wilde od. Wurgbirne — Ähnl. m. Birnblättern!). — *Ochnaceae* DC. (zu Rutaceae Simarubiae Rchb.).

Ochrus Pers. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Blass“- od. „Ocher“-Erbse, s. g. italienische E., fr. ocre (ochre), s. *Pisum Ochrus* L. (*Lathyrus Ochr.* DC.) (v. ὄχρος Blässe, bleiche Farbe — gelb, Mark ders.).

Ocimum (nicht **Ocymum**!) L. (Labiateen, XIV. 1) Basilienkraut, wohlreich. Basilikum, fr. basilic, e. basil (gr. ὄξιμον v. ὄξω rieche), *O. gratissimum* L., fr. marjolaine rouge, *O. Basilicum* L. poln. Balsam, Presiljenkraut Vilm., gem. Basilie, *O. minimum* L. m. v. *violetum* Hort.

Octandria L., VIII. Kl. „Achtmännige“ (οκτώ acht, ἀρήσ, -δος Mann, Staubgefäß).

Octentaria Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Achtstück“-O. (s. eb. u. μηρόν Hüfte etc. od. μῆρος Lende — 8 Pollenmassen), s. *Dendrobium* Sw.

Oculus Christi (sc. Inila) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Christusauge“, Christaugen-Alant M.-Rchb.

Ocymum s. *Ocimum*!

Odontia Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Zahnpilz“ (δόδον, -όντος Zahn — Stacheln d. Hutes!), z. B. *fimbriata*, *barba Jovis* etc., s. *Hydnus* L.

1) **Odontites** Spr. (sc. Bupleurum) L. (Umbellifer., V. 2) gelbhüll. Hasenohr M.-Rchb., *O. luteola* Spr. (Bupl. odont. L. s. *aristatum* Bartl.) (— Hüllblättchen spitz!). 2) **Odontites** Hall., Pers. (zu *Euphrasia* Rchb.) (Scrophularineen, XIV. 2) „Zahntrost“ Leun., roter Augentrost, z. B. *O. rubra* Pers., *verna* Bellard., *lutea* Rchb. etc., s. *Euphrasia* etc. u. *Bartsia* L. (v. δόδον, -όντος Zahn — geg. Zahnweh).

Odontoglossum H. B. K. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Zahnzunge“ (s. eb., γλῶσσα Zunge — Labell genagelt u. an d. Bas. m. Kamm versehen), z. B. *Hallii* Lindl. u. *Bicotoniense* Lindl. (Guatem., prächtig!).

Oedera Crantz, L. (-ia DC.) (Compos. Inuleen, XIX. 5) „Oeder’s“-Rindsauge (n. d. Prof. Oeder in Kopenh.), *O. prolifera* L. (Buphtalmum capense L. f.), *aliena* L., *hirta* Thb. (Str. Cap) etc.

Oenanthe Lam. (Umbelliferen, V. 2) (Rebdolde, Pferdesaat Grck., Würzerling O. W. (gr. οἴνος Wein, ἄνθη Blüte — weg. d. Geruchs!), *O. pimpinelloides* L., fr. mèchon, etc., s. *Phellandrium* L.

Oenocarpus Mart. (Palmen, XXI. 11) „Weinfrucht“- od. Most-P., Wein-P. Rmpl. (s. eb. u. ζαπτός Frucht — aus dies. in Brasil. Wein bereitet, s. g. Batava), *O. Bacaba* Mart. u. Batava ds.

Oenothera L. (Onagreen, VIII. 1) Nachtkerze, „Weinblume“ Seub., fr. énothère, e. evening-Primrose (gr. οἴνοθηρίς Blume, deren Wurzel v. Weingeruch!), Zier u. verwild. *O. biennis* L. Garten-Rapunzel Vilm., fr. én. bisannuelle, Onagre commun, Jambon des Jardiniers etc., e. biennal ev. Pr., tree-Pr., *O. taraxacifolia* Sweet

s. acaulis Cav. (*Lavauzia mutica* Spach), *tetraptéra* Cav. (*Hartmannia macrantha* Spach), *serotina* Sweet, fr. én. tardive od. d'automne, *glauca* Mchx. (Mississippi), *Fraseri* Pursh (N.-Amer.), *Drummondii* Hook. m. v. v., *versicolor* Hort. (*campylocarpa* Hort., -*calyx* Koch, Bouché), *grandiflora* W., *Lamarckiana* Ser. s. *grandiflora* Lam. (non W.), *Sellovii* Lk. Otto, *Bistorta Veitchiana* Hort. (*Holostigma Bottae* Spach s. *Bistorta Nutt.*, *Veitch*, *Sphaerostigma bistortum* Walp.) etc. — *Oenotherae* (sc. *Onagréae*) Rchb.

Oglifa Cass., Less., DC. (zu *Gnaphalium* Rchb.) (*Compos. Gnaphalieen*, XIX. 4) *Feld-Fadenkr.* (eins d. *Anagramme* v. *Filago*! vgl. *Gifola*), s. *Filago arvensis* L.

Ohlendorffia Lehm. (*Scrophularineen*, XIV. 2) „*Ohlendorff'sstrauch*“ (n. Dr. Chr. Friedr. Ohlendorff aus Holstein, † auf St. Croix), *O. procumbens* Lehm. (*Cap.*).

Oidium Lk. (*Schimmelpilze*, XXIV. 4) „*Eischimmel*“, *Traubenpilz*, *O. Tuckeri* Lk. (*ώδη* Ei u. *εἰδομαι*).

Olacinæ DC. (zu *Sapotacæa Styracæa*) Rchb. *Stinkholzartige*, s. *Olax*.

Olax L. (*Olacineen* od. *Sapot.* *Styracineen*, III. 1) *Kot-* od. „*Stinkholz*“ (*olax* v. *oleo rieche*, nicht n. Paxton v. *ωλαξ* od. *αἴλαξ* Furche!), *O. zeylanica* L. (B.), *psittacorum* s. *Fissilia psitt.* Lam.

Olbia Med., DC. (zu *Lavatéra* Rchb.) (*Malvaceen*, XVI. 6) „*Olbia*“-Lavatere (*Lav. Olbia* L.), fr. *Lavatère d'Hyères*, e. *downy-leaved mallow* (*Olbia* = *Hyères*, Inseln bei der Provence, wo vorkommend!).

1) **Oldenlandia** L. (*Saxifrageen* od. *Cinchonaceen*, IV. 1) „*Oldenland'sstrauch*“ (n. d. dän. Reisend. H. B. Oldenland, † 1700 in Südafri.). Garten: *O. Deppeana* DC., s. *Hedyotis* L., *O. biflora* L., s. *Antirrhinum humile* etc. Burm., *O. paniculata* L., s. *Mollugo zeyl.* etc. Burm. 2) **Oldenlandia** Plum. (*Onagreen Jussieueen*, X. 1), *O. aquatica* P. Br., s. *Isnardia palustris* L.

Oldfieldia Benth. (*Euphorbiaceen*, XXI. 1) afrik. *Teakbaum*, afrik. *Eichenholz* (n. d. engl. Bot. *Oldfield*).

Olea L. (*Sapotac. Oleaceen*, II. 1) Öl- od. *Olivenbaum*, fr. *olivier*, e. *olive-tree* (lat. *olēa* = gr. *ἔλαια*, celt. *olew* od. eol. *Ölbaum*), cultiv. *O. europaea* L. gem. *Ölbaum*, Treibh. *O. fragrans* Thb. (*Osmanthus* fr. *Lour.*), *O. malabarica* autt. *Nimbobama*, fr. *carabou*, *O. Oleaster* Lk. wild. *Ölb.* (Griechenl., Paläst.). — *Oleacæa* Lindl., -*einæae* Lk., DC., -*einæae* Rchb. (zu Ord. *Ligustrinæa* Bartl.).

Oleander (sc. *Nerium*) L. (*Apocyneen*, V. 1) *Oleander* etc., s. *Nerium*! (aus *Olea* u. *δοίος* Strauch, Wtst. -ander bedeut. *ἀνδρεῖος* männlich, kräftig).

Oleaster Hoffmg., Endl. (*Oleaceen*, II. 1), s. *Olëa*! (deter. *Olëa* *Ölbaum*), wilder *Ölb.*, fr. *olivetier*, *olivier sauvage*, e. *oleaster*.

Oleracæa Endl., Kl. d. „*Gemüsegewächse*“ (*olus*, -*ēris* *Küchenkraut*, *Gemüse*).

Ollaria (sc. *Lecythis*) L. (*Lecythideen*, XIII. 1) Topf- od. *Topffruchtbaum* (*olla* Topf — Ähnl. d. Frucht damit!), s. *Jacapucaya* Maregr.

Olyra L. (Gräser, XXI. 3) *Einkorn*, *Amelkorn*, *Emmergras*, s. g. *Blicken* (gr. *ἄλυρα* Getreide, *Einkorn*, Wtst. v. *ἄλιν* gelte wenig, bei Homer Gerste für d. Pferde!), *O. latifolia* L. (*Jamaica*), *arundinacea* Hb. (Peru) etc. — *Olyréae* Nees.

1) **Omphalæa (-ia)** Fr. (*Pilze*, XXIV. 4) „*Nabelschwamm*“ (*ὅμφαλος* Nabel), z. B. *ostreata* Fr. (*Agaricus ostr. s. dimidiatus* Bull.) *Austernschwamm*, *Buchen-*, *Drehling-*. 2) **Omphalæa** L. (*Euphorbiaceen*, XXI. 3) „*Nabel*“-*Wolfsmilch*, *Grübbling* D. (— *Staubgef.* auf einem fleisch. Nabel), s. *Omphelandria* P. Br.

Omphalobium G. (*Terebinthac. Connareen*, XVI. 5) „*Nabellappen*“ (s. eb. u. *λοβῖτον* dem. v. *λοβὸς* Lappen etc. — d. Samen m. vom

Nabel ausgehend. Arillus), O. Lambertii G., s. g. Zebraholz, O. indicum G. (Connarëus asiat. L.), african. DC. (Conn. afr.) etc.

Omphalodes T. (Boragineen, V. 1) „Nabelkraut“ od. -nüsschen Seub., Gedenkemein (Denkmlein O. W.), Garten-Vergissmeinnicht ($\delta\mu\varphi\alpha\lambda\omega\delta\eta\varsigma$ nabelrund — nämnl. d. Samen!), Zier. O. verna Mnch., s. Cynoglossum Omphalodes L., O. longiflora A. DC. (Lindelofia speciebilibis Lehm.), O. Luciliae Boiss. (Alpen) etc.

Onagra T., Scop. (Onagreen, VIII. 1) Nachtkerze (v. $\overset{\circ}{\nu}\nu\sigma\varsigma$; $\ddot{\alpha}\gamma\eta\sigma\varsigma$ wilder od. Waldesel — weg. d. Blätter wie Ohren), O. biennis Scop., fr. onagre, herbe aux ânes, s. Oenothéra biennis L. — Onagrae Juss., -grariæae DC., -gracæae Grck., -grariae Rchb., -græae ds.

1) **Oncidium** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Wulst“- od. Schmetterlings-O. (v. $\ddot{\alpha}\gamma\eta\sigma\varsigma$, lat. uncus Haken, Höcker etc. — nämnl. auf d. Labellbasis, u. $\varepsilon\tilde{\iota}\delta\sigma$ Bild, Gestalt), O. papilio Lindl. vegetabilischer Schmetterling Leun. 2) **Oncidium** Fr. (Schimmelpilze, XXIV. 4) Schleimhaar od. Papierschimmel, O. chartarum Nees, s. Myxotrichum Kze.

Oneosperma Blum., Van Houtt. (Palmen, XXI. 8) „Bug“ od. Nieren-samen-P. (s. v., $\sigma\pi\epsilon\eta\mu\alpha$ Samen), s. Nephrosperma van Houtteana Balf. f., O. fasciculatum Blum., filamentosum ds. (Areca Nibung Mart. s. tigillarium Jacq.).

Onobrōma G., DC. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) „Eselsfrass“ ($\overset{\circ}{\nu}\nu\sigma\varsigma$ u. $\beta\vartheta\omega\mu\alpha$ Speise), O. creticum, coeruleum, lanatum u. minutissimum Hornem., s. Carthänum etc.

Onobrychæae (sc. Hedysaræae) Rchb., s. Onobrychis.

1) **Onobrychis** T. (sc. Hedysarum) L. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) Esparsette, türkischer Klee ($\overset{\circ}{\nu}\nu\beta\vartheta\eta\mu\varsigma$ „Eselsfutter“ von $\overset{\circ}{\nu}\nu\sigma\varsigma$ u. $\beta\vartheta\omega\mu\alpha$ beisse etc.), O. sativa Lam. gem. Esparsette, fr. sain foin, foin de Bourgogne, plante sacrée, e. cock's-head, esparcet u. sain-foin, auch medick-vetching. 2) **Onobr.** (sc. Astragalus) L. (Legumin. Lotteen, XVII. 4), s. Astrag. tenuifolius L. f. (Phaca caulescens etc. Willich).

Onocleæ L., Sw. (Farne, XXIV. 1) Schminkwurz- od. Roll-F. Dietr., fr. onoclée (n. Vilm.-Rümpl. d. veränd. $\overset{\circ}{\nu}\nu\chi\eta\lambda\varsigma$ Eselsfutter, Wtst. st. Onochilus od. Onochelis = Echium rubrum bei Theophr., Dioscor., Nicander u. Plinius!), Zier. O. sensibilis L. „Fühl“- od. Ross-farn Rümpl.

Ononis L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Hauhechel, Ochsenbruch, fr. bugrane, arrête-boeuf, e. cammock od. rest-harrow (gr. $\overset{\circ}{\nu}\nu\omega\nu\tau\varsigma$ v. $\overset{\circ}{\nu}\nu\sigma\varsigma$ Esel u. $\dot{\alpha}r\eta$ Kauf od. Waare — andere Lesart Anonis „Un-nütze“ v. $\dot{\alpha}$ priv. u. $\overset{\circ}{\nu}\nu\eta\eta\mu\varsigma$ nütze, Wtst.), Zier. O. Natrix L. gelbe H., fr. bugr. gluante, O. rotundifolia L. (Natrix rot. Mnch.), O. frutescens L., e. shrubby rest-harrow, O. pinguis L., fr. mélilot de montagne, - des sables, etc., wild O. spinosa, repens L. etc.

Onopordon Vaill. (-um L.) (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Krebs- od. Eselsdistel, Klebe O. W., Kampf- od. Wolldistel, wilde Artischoke Vilm., fr. pédane (pet d'âne „Eselswind“), e. common spear-thistle (s. v. u. ποοδὴ F. od. Wind, v. πεύδω farze — angebl. Wirk. auf d. Esel! Wtst.), wild O. Acanthium L., Zier. O. illyricum s. elongatum Lam. (horridum Viv.) u. arabicum L.

Onoseris W., Cass., DC. (Compos. Perdicieen od. Mutisieen, XIX. 2) „Eselslattich“, „-salat“ (s. v. u. σέσιτ Salat), Zier. O. purpurata W. u. speciosa Hb., Bpl. (Neugran.), O. mexicana W. (Str.), s. Atractylis L.

Onosma L. (Boragineen, V. 1) Lotwurz, Walzenglocke, Borsteustengel (gr. $\overset{\circ}{\nu}\nu\omega\mu\alpha$ i. q. $\overset{\circ}{\nu}\nu\chi\eta\lambda\mu\varsigma$ Eselsslippe, v. $\overset{\circ}{\nu}\nu\sigma\varsigma$ u. $\dot{\alpha}r\eta$ Geruch u. Geschmack), O. arenarium W.

- 1) **Onychium** Kaulf. (Farne, XXIV. 1) „Huf“- od. Nagel“-F. (v. ὄνυξ, -υχος, dem. ὄνυχιον Klaue etc. — d. Indusiangabel klauenf. gebogen), O. auratum Kaulf. (Pteris filiculosa Desv.), lucidum Spr. (Leptostegia luc. Don) etc. 2) **Onychium** Blum. (Orchideen Malaxid., XX. 1) (— d. äuss. Seitenblätt. d. Blume umgebogen), s. Dendrobium Sw.
- Opalus** Ait. (Sapindac. Acereen, VIII. 1 od. XXIII. 1) italienischer od. „Opal“-Ahorn, fr. érable Opale, e. Opal- od. Italian Maple (gr. ὀπαλός Opal od. Hornkiesel — bez. d. Früchte?), s. Acer italicum Lauth. s. rotundifolium Lam.
- Opercularia** Rich., Schreb. (Rubiace. Cinchonaceen, IV. 1) „Deckelkelch“, -pflanze D., fr. operculaire (v. opercūlūm Deckel — Kelch m. Deckel), O. aspera G. (Rubioïdes asp. Sol.), paleata Young (Cryptospermum Pers.) etc.
- Ophianthe** Hanst. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schlangenblüte“, Runzelblatt (ὄφης, -ιος Schlangen, ἄρθη Blüte), O. libanensis Hanst., s. Rhytidophyllum floribundum Van Houtt.
- Ophiocaryon (-um)** Endl., Meissn. (nicht -carion!) (Terebinthac. Anacardieen, IX. 1) „Schlangennuss“ (s. eb. u. ζάρων Nuss — bez. d. Würzelchens und Schwänzchens), z. B. paradoxum Van Houtt.
- Ophioglossum** L. (Traubfarne, XXIV. 1) „Natterzunge“, fr. ophioglosse, herbe sans couture „ohne Naht“, lance du Christ, e. adder's-tongue (s. v. u. γλώσσα Zunge — dünne, spitzulauf. Ähre), O. vulgatum L. gem. N.
- Ophiopōgon** Curt., Ker (Smilaceen, VI. 1) „Schlangenbart“, e. adder's-beard (s. v. u. πίγων Bart), Zier. O. spicatus Ker (Liriöpe spic. Lour.), O. japonicus Curt. (Convallaria jap. L.), fr. O. du Japon, herbe aux turquoises, e. Japanese adder's-b., O. Jaburan Lodd. (Stubbenpfl.).
- Ophiorrhiza** Forsk. (Cinchonac. od. Contorten, V. 1) „Schlangenwurz“, e. snake-root, tarragon (s. v. u. φίζα Wurzel — diese geg. Schlangenbisse), z. B. O. Mungos L. — Ophiorrhizae (sc. Contortae) Rchb.
- Ophioscorodon** Don, Wallr. (sc. Allium) L. (Liliaceen, VI. 1) „Schlangenlauch“, Perlzwiebel, Rockenbolle Grck., fr. rocambole (-quembole), s. Allium sativum L. v. Ophiose. Hort. Knoblauch (Perlzwiebel-Kn.) (s. v. u. σκύροδον Knoblauch — Staubfäd. wie Schlangenzungen).
- Ophioxylon** Burm. (-um L.) (Apocyneen, XXIII. 2) „Schlangenholz“, fr. serpentine (s. v. u. ξύλον Holz — dies. geg. Schlangenbisse angew.), Treibh. O. serpentinum L. (Str. Ind.).
- Ophrys** L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Ragwurz, Fliegenkraut, Insekten-O. Leun., fr. fleur-ailée (gr. ἡρόντιος Augenbraue — weg. d. gebog. Form d. Kelchblätt.!), z. B. apifera Huds., muscifera ds. etc. — Ophrydæe Lindl.
- Opismenus** Kth. (**Hoplis-** P.-B., Woods) (Gräser, III. 1) „Waffen“- od. Stachelgras, Kraftklaue Perring (gr. ὅπλισμενός bewaffnet — Stachelgrannen!), O. crus galli Kth. (Panicum cr. g. L.) s. g. Hühnerhirse, Zier. O. imbecillis Kth. (Panic. imb. Trin.) etc., s. Orthopōgon R. Br. u. Echinochloa P.-B.
- Opobalsamum** (sc. Amyris) L. (Terebinthac. Amyrideen, VIII. 1) „Balsamsaft“, Mekkabalsam M.-Rchb., fr. xylobalsamum, e. opobalsam (gr. ὄπως Saft etc.), s. Balsamea meccanensis Gled.
- Poppanax** Koch (nicht -ponax L., Pers.) (sc. Pastināca) L. (Umbelliferen, V. 2) „Heilwurz“ (gr. ὄπως τὸν Ἰαραζοῦς Saft der „Allesheilpfl.“, v. πάσις od. πάντα alles u. ἀπέων od. ἀπέομαι heile).
- Oporanthus** Herb., Röm. (Amaryllideen, VI. 1) „Herbstblume“ (ὄπων Herbst, ἄρθος — blüht wie Colchicum im Herbst!), s. Amaryllis Hippeastrum Herb. u. Sternbergia seet. Oporanthus Röm.

Oporīna Less. (-nia Don) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Herbst“-Apargie, O. autumnalis Don = Apargia autumnalis W. s. Leontodon aut. L. ($\delta\tauωρυνδ$ herbstlich).

1) **Opūlus** T. (sc. Viburnum) L. (Caprifoliaceen, V. 3) Schneeball, Wasserschlinge, -holder, m. v. v., fr. Viorne Obier (Obier d'Europe), boule de neige, pain-blanc, rose de Gueldre, e. ople-tree, snow-ball, Gelder-rose od. marsh-elder (lat. Opulus ursprungl. Feldahorn, von $\delta\pi\circ\zeta$ Saft? st. populus Pappel, Wtst. — unsicher!). 2) **Opūlus** Mnch. subg. v. Viburnum L., z. B. noch V. Oxycoccus Pursh, acerifolium L. u. orientale Pall.

1) **Opuntia** Endl. Kl. d. Cactusgewächse. 2) **Opuntia** T. (sect. v. Cactus Rchb.) (Cacteen, XII. 1) Cochenillen-Cactus, Nopal, Feigendistel, fr. poirier piquant (lat. Opuntius opuntisch, v. Opus, -untis Stadt in Lokris — d. Pfl. im östl. Griechenl. wild), Topf: O. vulgaris Mill. (Cactus Opuntia L.), fr. Nopal vulgaire, Raquette etc., e. common indian fig, O. microdasys Lehm. „pinselborstige“, O. Rafinesquiana Engelm., O. Ficus indica Mill. etc.

Oranīa Mart. Blum. (Palmen, XXI. 6) „Oranien“-P. (n. d. holl. Dynastie Nassau-Oranien), Zier. O. regalis Blum. (porphyro-carpa Mart.) (Java), arvensis Becc.

Orbēa Haw. (Asclepiad., V. 2) „Kreiskronen“-Asklepias (orbis Kreis — d. Krone vor ihren Zipfeln m. gross. erhabn. Kreis!).

Orchidæae Grek., -ides Juss., -ideae DC., Rchb. Orchideen, Stendeln od. Knabenkräuter, s. Orchis.

Orchidīnae Bisch., DC. Kl. d. Orchideen¹⁾, s. Orchis.

Orchidocarpus Mehx. (sum Rich.) (Ranunculaceen Annonaceen, XIII. 6) „Hodenfrucht“ (v. $\delta\phi\zeta\zeta$, -ιδος Hode, καρπος Frucht), z. B. grandiflorus Mehx. etc., s. Asimina Spr. u. Porcelia R. P.

Orchis L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Knabenkraut, Stendel, Ragwurz, Kukusblume etc., fr. couillon de chien „Hundehode“, e. orchis, goat's-stones „Geissesteine“, bee- od. gnat-flower, stander, adder-grass etc. (gr. $\delta\phi\zeta\zeta$ Hode — solche Knollen an d. Wurzeln!), z. B. O. morio L. Salep-O. (s. Morio), O. mascuła L., fr. testicule de prêtre, O. militaris L., fr. capette, Gauchblume Wolff, etc.

Oreocallis R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Bergzierge“ (v. $\delta\phi\oslash$. -εος Berg, οὐλλος, τὸ d. Schönheit — auf Bergen in Peru!), Treibh. grandiflora R. Br. (Embothrium gr. Lam.) etc.

Oreodaphne Nees (Lauraceen, IX. 1) „Berg“- od. „Felsenlorbeer“ Rmpl. (s. eb. u. Αἴγρη Lorbeer — berglieb. Lorbeer!), z. B. californica Nees (B.), regalis Reg. etc.

Oreodoxa W. (-xia Hb., Kth.) (Palmen, XXI. 8) „Bergruhm“, -palme (s. v., δέξα Ruhm etc. — Zierde d. Berge in Südamer.), z. B. regia Hb., Kth. (Oenocarpus reg. Spr.), O. oleraea Mart. Kohlpalme (Aréca ol. Jacq.), s. Euterpe caribaea Spr., etc.

Oreopanax Deesn. (Araliaceen, V. 5) „Bergheil“ (s. v. u. πάραξ od. παναξίς alles heiland) (zu Aralia L.), z. B. O. peltatum Lind.

Oreoselinum Hoffm. (zu Peucedanum Mnch. od. Athamanta L.) (Umbelliferen, V. 2) „Bergsilje“, fr. persil de montagne, e. parsley-pert Steineppich (s. v. u. σέλινον Silje), O. legitimum M. B. (Peuced. Oreoselinum Mnch., Atham. Oreosel. L., Selinum Oreos. Scop.).

Origānum T. (Labiaten, XIV. 1) Dosten, Majoran, eig. „Bergschmuck“ (st. Oreogānum!), fr. origan, e. organy (gr. ὄργανον v. $\delta\phi\oslash$, -εος Berg u. γάρος Schmuck — Stand u. Geruch!).

1) Einteilung: a. Malaxidæae, b. Epidendræae, c. Vandæae, d. Ophrydeæ, e. Neottiæae, f. Arethuseæ, g. Cypripediæae.

- Orlaya** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Orlaye“, Breitsame (n. Joh. Orlay, Arzt etc. in Moskau), *O. grandiflora* Hoffm. (Caucalis gr. L., Platyspermum Koch).
- Orleana** Hort. s. Orellana (sc. *Bixa*) L. (Bixaceen, XIII. 1) „Orleanebaum“ (Wtst.: wächst an den Ufern des Orelhana = Marañon od. Amazonenstrom), s. *Arbor mexicana* Bauh.
- Orménis** Cass. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Schösslingblume“ (v. ὄρμηνος Spross etc. — oben blattlose Stengel), z. B. *nobilis* J. Gay, s. g. römische Kamille, s. *Anthémis nob.* L.
- Ormiseus** DC. (Cruciferen Siliquosen, XV. 2) „Halsbandschote“ (gr. ὄρμισκός dem. v. ὄρμος Band — Schote schnur förmig).
- Ormosia** Jacks. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Rosenkranzbohne“ (v. ὄρμως Reihe, Kette — bez. d. Hülse!), *O. dasycarpa* Jacks., s. *Podaliria* Poir. s. *Robinia coccinea* Hort u. *Sophora monosperma* Sw.
- Ornithocephalus** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Vogelkopf“ (ὄρνις, -ιθος Vogel, οὐραλή Kopf — langsnäbl. Columna).
- Ornithogálum** L. (Liliaceen, VI. 1) „Vogelmilch“ od. Milchstern, fr. ornithogale, lait d'oiseau, e. star of Bethlehem (s. eb. u. γάλα Milch — milchw. Blüten), z. B. wild u. Garten: *umbellatum* L. weisse Feldzwiebel od. gem. Hühnermilch Schmidl., fr. fleur od. dame d'onze heures, churle, e. umbelled star of Bethl., Winterbl. *O. arabicum* L. „Stern v. Arabien“, ferner Zier. *O. pyramidale* L., fr. épi de lait, *O. pyrenaicum* L. span. Bethlehemstern, etc.
- Ornithópus** L. (Leguminos. Hedsareen, XVII. 4) „Vogelfuss“, Klauen-schote, Vogelklaue Seub., fr. ornithopode, pied d'oiseau, bois de merle (s. v. u. πούς Fuss), z. B. *perpusillus* L. (*Ornithopodium* Bauh.), gebaut *O. sativus* Brot. s. g. Serradella.
- Ornitrophe** Comm., Juss. (Sapindaceen, VIII. 1) Vogelfutter, -pfeffer D. (v. ὄρνιος den Vogel betr. u. τροφή Nahrung — Fr. von d. Amsel begier. aufgesucht! Wtst.), s. *Schmidelia* L.
- Ornus** Scop., Pers. (sc. *Fraxinus*) L. (Sapotaceen Oleaceen od. Fraxineen, II. 1) Manna-od. Blüten-Esche, Blumen- u. Zwerg-Esche Vilm., fr. orne (-nier), frêne à la manne, e. manna-ash (*ornus* gr. ὄρνινος Berg-Esche v. ὄρος Berg), Zier. *O. europaea* Pers. (*Fraxinus* *Ornus* L. s. *florifera* Scop.), fr. ornier commun, Buch- od. Wald-Esche, e. european flowering ash, m. v. v., *O. mannifera* Hort. s. *rotundifolia* Pers. (*Frax.* rot. Ait.), fr. Frêne à la manne, e. oriental manna ash, eigentl. Manna-Esche, *O. floribunda* G. Don (*Frax. flor.* D. Don), fr. Frêne du Népal, e. abundant-flowering-ash, *O. americana* Pursh (*Frax. am.* L., *Frax. Orn. am.* Lodd.), fr. Fr. à fleurs d'Amérique, e. american Flowering-Ash.
- Orobanche** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Ervenwürger“, Sommer- od. Sonnenwurz, Braunschupper Leun., Hanfwürger u. Kleeteufel, fr. herbe aux taureaux (- du lion), e. broom-rape (v. ὄροβος Erve od. Erbse, ἄγκυρα erwürge — Hülsenfr. umwindend).
- Oróbata** T., L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Kicher- od. Walderbse, fr. orobe, e. bitter-vetch (gr. ὄροβος Erbse etc. v. ὄρω eruge u. βοῦς Ochse — gut. Rindviehfutter), Topf: *O. aurēus* Stev., ferner Zier. *O. vernus* L. (*Lathyrus vern.* Wimm.), s. g. Waldkicher, m. v. v., atro-purpurēus Desf. (Algerien), *flaccidus* Wald Kit., *lutēus* L. s. *montanus* Scop. (Lath. mont. Godr. Gren.), *niger* L. (Lath. niger Wimm.) etc.
- 1) **Orontium** L. (Araceen, VI. 1) Kalmus, Wasserähre D. (v. ὄρω eruge? od. v. Fluss Orontes in Syrien? — wächst im Wasser), z. B. *aquaticum* L., *japonicum* L. (*Rhodēa* jap. Endl.). 2) **Orontium** Pers. (sc. *Antirrhinum*) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Orant“ od. Feld-

- Löwenmaul**, fr. orance od. tête de cochon (v. ὄφος Berg? Wtst.), s. **Orontium arvense** Pers. — **Orontiacēae** DC., Bartl.
- Orphium** E. Mey. (Gentianeen, V. 1) „Rot-Enzian“ (v. ὄφος, lat. furvus braunrot? od. ὄφιον dem. v. ὄφος, lat. orphus Orfe, ein Fisch? Wtst.: n. Orpheus, der wie Chiron in d. Heilkunde erfahren! — unsicher!), Zier. O. frutescens E. Mey. (Str. Cap), s. **Chironia decussata** Vent.
- Orthocēras** R. Br. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Geradhorn“ (ὁρθὸς gerade, ζέφας Horn — d. auss. Blumenblätt. aufrecht linienförm.!), z. B. strictum R. Br. (ähnl. Diuris Sm.).
- Orthosanthus** Sw. (Irideen, III. 1) „Geradblumen“-Schwertel (s. eb. u. ἀνθός — d. Blum. nicht gebückt, wie Gladiolus!), z. B. chimbaccensis Bak. (Moraea gladioloides s. chimb. H. B. K.).
- Orthospērmum** R. Br. i. q. Orthospōrum Ness., P. M. E. s. sogl.
- Orthospōrum** Ness., P. M. E. (Chenopodiaceen, V. 2) „Geradsamen“ s. v. u. σπορά i. q. σπέρμα Sam. — d. Samen steht vertikal), z. B. glaucum u. rubrum P. M. E., s. Chenopodium etc.
- Orthostāchys** R. Br. (Boragineen, V. 1) (zu *Heliotropium T.*) „Geradähren“-Heliotrop (s. v. u. σταχύς Ähre — diese in d. Jugend nicht spiralig), z. B. H. fruticosum L.
- Orthostēmon** R. Br. (Gentianeen, V. 1) „Geradfaden“-Enzian (s. v. u. στήμων, lat. stamen — d. Staubfäd. gleich lang, d. verblüht. Antheren gerad, nicht verdreht, wie Erythraea).
- Orthothecium** Schott., Endl. (Stereuliaceen, XI. 1 od. XVI. 7) „Geradkapsel“-Sterkulie (s. v. u. θηκὴ Behälter — d. Kapsel nicht gedreht, wie Helicteres).
- Orthotrichum** Hedw. (Moose, XXIV. 2) Haarmoos, Goldhaar, eig. „Geradhaar“ (s. v. u. θρίξ, τούρχος Haar — d. Zähne d. Peristoms gerade), z. B. crispulum u. affine (an Waldbäum.). — **Orthotrichacēae** Schimp. Goldhaarmoos Leun.
- Orvāla** L., DC. (Labiateen, XIV. 1) „Orvelkraut“ Vilm., grossblum. Taubnessel (franz. orvale, was aber eig. Salvia Horminum), Zier. O. lamioïdes DC., fr. lamier orvale, e. large-flowered dead-needle (*Laetium Orvala L.*), O. garganica L. f. (Papia g. Mnch.).
- Oryza** L. (Gräser, VI. 2) „Reis“, fr. riz, e. rice (v. d. arab. eruz). — **Oryzēae** Kth.
- Osbeckia** L. (Myrtac. Melastomaceen, VIII. 1) „Osbeck's“-Myrte (n. d. schwed. Bot. P. Osbeck), Treibh. O. chinensis L., aspēra Wight u. Arn., stellata Don (kl. Str.), ornata Sw. (Melastoma orn. Hort.) etc. — **Osbeckiēae** DC.
- Oscillaria** Bosc (Fadenalgen, XXIV. 3) „Schwingfaden“, fr. oscillaire (v. oscillo „oscilliere“ od. schwinge hin u. her), s. Oscillatoria Vauch. — **Oscillariacēae** Rabbst. „Schwingfadenalgen“.
- Osmānthus** Lour. (Oleaceen, II. 1) „Duftblume“ (օσμή Duft, ἀνθος Bl.), O. fragrans Lour. = Olea fragr. Thb. (jap. Thee-Parfum).
- Osmītes** L., Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 3) „Duft“- od. Kampherblume (v. ὄσμη Duft — riecht stark nach Kampher), O. camphorina L. (*Bellis camphorifera* Seb.), calycina L. (*Lapeirousia c.* Thb.) etc.
- Osmunda** L. (Farne, XXIV. 1) Rispen- od. Trauben-F., Mondraute, fr. osmonde, e. osmund, moonfern (-wort), Zier. O. regalis L., s. g. Walpurgiskr., spectabilis W. etc. (n. d. sächs. Gott Osmund, Wtst. d. skandinav. Gott Osmunder, Beiname d. Thor!). — **Osmundacēae** R. Br., Rchb. Traubenfarne Seub.
- Osteospermum** L. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) „Knochen“- oder „Beinsamen“ Rmpl., fr. porte-collier (ὅστεον Knochen, σπέρμα Samen — d. Achenen knochenhart!), O. moniliforme L. „Pater-nosterstrauch“ Rmpl., s. Bidens calendulacea Thb.

- Ostericum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Osterick“ O. W., Mutterwurz (st. Ὀστερικόν v. Ὀστέρα Gebärnutter, Leun.; d. veränderte Ostruthium! Wtst.), früher zu Imperatoria T.
- Ostruthium** (sc. Imperatoria) L. (Umbelliferen, V. 2) Meisterwurz (v. ὄστρούα Auster, lat. ostrum Purpursaft? Wtst. v. στρουθὸς Sperling — Gestalt d. Blüten, wie ein flog. Vogel!), s. Selinum Imperatoria Crantz.
- Ostrya** L., Mich. (Amentac. od. Cupuliferae, XXI. 8) Hopfenbuche, Hartholzbaum (Ὀστρούα od. ὄστρεόν Muschel — weg. d. Kätzchenschalen!), O. vulgaris W. (carpinifolia Scop. s. italica Spach), s. Carpinus Ostrya L., fr. Ostryer commun, e. hop-hornbeam, m. v. quercifolia Hort., O. virginica W. (Carp. virg. Abbot s. triflora Mnch. etc.), fr. charme de Virginie, e. virginian horn-beam.
- 1) **Osýris'** L. (Santalaceen, XXII. 3) Harn- od. Weissstrauch, Sanddorn (gr. ὄσυρος od. ἀξίρης i. q. Chenopodium Gänsefuss, Wtst.: viell. Gott Osiris d. Egypten?), z. B. O. alba L. (Littorale), O. rhamnoïdes Scop. (Hippophaë rhamn. L.), fr. rouvet, s. g. Poeten-Cassie, Wolff. 2) **Osýris** Gmel. (Aizoideen Tetragoniaceen, XI. 1) Salpeterstrauch, s. Nitraria Schoberi L.
- Otaeanthus** Lindl. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ohr-Acanthus“ (v. οὖς, ὥτος Ohr u. Acanthus Bärenklaub), Warmh. O. caeruleus Lindl.
- Othonna** L. (Compos. Senecionideen, XIX. 4) „Schleierblume“, Linnenbl. (gr. ὅθοννα v. ὅθωρη Linnen, Schleier — poröse Blätt.! Wtst.), z. B. crassifolia L. (Hertia Less.), abrotanifolia L. (Cinerea abr. Berg. etc.).
- 1) **Otidēa (-dia s. -dium** Lindl.) (zu Pelargonium l'Her.) (Geraniaceen, XVI. 5) „Trappenschnabel“ (v. ὠτῖς, -ίδος Trappe v. οὖς, ὥτος Ohr — Ohrfedern!), z. B. Treibh. O. carnosa Sweet (Str. Cap), dasycaulon Sweet, etc., s. Pelargonium l'Her. 2) **Otidēa (-dia)** Fuck. (Becherpilze, XXIV. 4) „Ohrenbächer“ (s. eb. u. εἰδομαι gleiche).
 - 1) **Otites** Sm., Otth. (sc. Silene) L. (Sileneen, X. 3) „Ohrlöffel“-Leimkraut (gr. ὡτίτης ohrähnlich), s. Cucubalus Ot. L., Lychnis Ot. Scop. 2) **Otites** (sc. Polypodium) L. (Farne, XXIV. 4) „Ohrenwedel“-F.
- Ourisia** Juss., Comm., Pers. (Scrophularineen, XIV. 2) „Ourisie“ (nicht οὐρία Schwanz, τοῦς gleich, sond. Wtst.: n. Ouris, Gouv. d. Falklandsins., von dem Commerson d. Pfl. erhielt!), Zier. O. coccinea Pers. (Dichroëa cocc. Cav.) (Anden).
- Ouvirandra** P.-Thou. (Najadeen od. Alismaceen, XXI. 1) Spitzenblatt, O. s. Hydrogétion fenestralis Pers. madagassische Gitterpfl. oder Wasser-Yam (v. ouvi Yam u. rano Wasser, Wtst.: auf Madagask. ouvirandu!).
- 1) **Oviéda** L. (-dia DC.) (Verbenac. od. Caprifoliaceen, XIV. 2) „Oviedie“ (n. Oviedo y Valdes, Gonçalo Fernandez de, schr. Sumario . . . de las Indas, Toledo 1526), z. B. O. mitis L. (Clerodendron siphonanthus R. Br.). 2) **Oviéda** Spr. (Irideen, III. 1) „Oviedo's“-Schwertlilie, z. B. anceps Spr., falcata Spr., bracteata ds. etc., s. Meristostigma A. Dietr. u. Lapeyrousie Gawl.
- Oxalēae** Rchb., -lidēae DC., Rchb., -lidacēae Grck. Sauerkleeartige, s. Oxalis.
- Oxalis** L. (Oxalideen, X. 4) Sauerklee, Sauer O. W., fr. oxalide u. surelle, pain du coucou, oseille des bois (- des pâques), e. wood-sorrel, cuckoe's-sorrel (v. ὄξυς scharf, sauer, ἄλις Salz — weg. d. Kleesalzgehalts), wild O. Acetosella L., Zier. O. floribunda Lehm., rosæa Jacq., Valdiviensis Barnéoud, tropaeoloïdes Hook., versicolor (Cap), Deppei Sw. (Mex.), Bowiei Lind. (Cap), corniculata L. v. fol. atro-purp. Hort., etc.

- Oxyacantha** (sc. Crataegus) L. (Rosaceen, XIII. 2) gem. Weissdorn, eig. „Scharf“- od. „Spitzdorn“ (nicht „Sauerdorn“, was Berberis!), fr. mai, oxyacanthe u. épine-blanche (aubépin), e. white-thorn, haw-thorn „Hagedorn“ ($\delta\zeta\bar{\nu}\varsigma$ spitz etc., $\ddot{\alpha}z\bar{a}r\vartheta\alpha$ Dorn), Zier. v. v. fl. puniceo, fl. albo pleno u. fl. rubro-pleno Hort.
- Oxyandra** DC. (Tiliaceen, XIII. 1) (zu *Sloanéa* L.) „Spitzantheren“- Sloanebaum (s. v. u. $\dot{\alpha}v\bar{\eta}\varsigma$, $-\delta\varrho\bar{\sigma}$ Mann, Staubbeutel — diese lang zugespitzt).
- Oxyanthus** DC. (Rubiaceen, Cinchonaceen, V. 1) „Spitzblume“ (s. v. u. $\dot{\alpha}v\bar{\eta}\varsigma$ — spitzulaufende Kronzipfel!), Treibh. O. speciosus DC. s. tubiflorus, versicolor Van Houtt. etc., s. *Gardenia tubiflora* Andr. (Str. Afr.) etc.
- Oxybaphus (-os)** l'Hér. (Nyctagineen, V. 1) „Farbspitzen“-Nachtblume (s. v., $\beta\bar{a}q\bar{\eta}$ Färben v. $\beta\bar{a}q\bar{\omega}$ od. $\beta\bar{a}l\bar{\tau}\bar{\iota}\bar{\omega}$ tauche ein etc. — d. Blüt. an d. Zweigspitzen m. gefärbt. Perigon!).
- Oxyearpus** Lour. (Guttiferen, XI. 1) „Scharf“- od. „Sauerfruchtbaum“ (s. v., $\chi\bar{a}g\bar{\tau}\bar{\iota}\bar{\sigma}$ Fr. — Frucht u. Blätter von sehr sauerem Geschmack).
- Oxycedrus** (sc. Juniperus) L. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) span. od. Cedern-Wachholder Rmpl., fr. Cade, Cèdre piquant, e. sharp-Cedar od. brown-berried Juniper (— spitze Cederblätter!).
- Oxyčeros** Lour. (Rubiaceen, IV. 1) „Spitzhornpfl.“ (s. v. u. $\chi\bar{e}\bar{\rho}\bar{\sigma}$ Horn — m. spitz. hornförm. Stacheln bes.).
- Oxycoccus (-us)** T., Rich. (Ericaceen Vaccinieen, VIII. 1) „Scharf“- od. „Sauerbeere“, Kranich- od. Moosbeere, fr. canneberge, e. moss-, fen- od. cran-berry (s. v. u. $\chi\bar{u}\bar{\chi}\bar{\sigma}$ Beere etc. — sehr saure Beeren!), O. macrocarpa Rich., s. *Vaccinium Oxycoccus* L. (Scholléra Ox. Roth).
- Oxydendron** DC. (Ericaceen Andromedeen, X. 1) „Sauerbaum“ (s. v. u. $\delta\bar{e}\bar{\iota}\bar{\delta}\bar{\varphi}\bar{o}\bar{v}$ B. — saure Blätter!), O. arboréum DC., s. *Andromeda arb.* L.
- Oxylobium** Andr. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Spitzhülsen“-Str. (s. v., $\lambda\bar{\iota}\bar{\beta}\bar{\iota}\bar{o}\bar{v}$ dem. v. $\lambda\bar{o}\bar{\beta}\bar{\nu}\bar{\varsigma}$ Hülse — diese spitz!), O. capitatum Benth., cordifolium Andr. (Str. Neuhol.), retusum R. Br. (*Podolobium coriacum* DC.) etc., s. *Gompholobium Sm.*, *Pultenaea Sm.* u. Chorizema Lab.
- Oxypetalum** R. Br. (Asclepiaden, V. 2) Spitzblume, „Spitzenkrönchen“ Vilm., Rmpl. (s. v. u. $\pi\bar{\epsilon}\bar{\tau}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{o}\bar{v}$ Kronblatt — Kronzipfel spitz!), Zier. O. coeruleum Decsn. (*Tweedia coer.* Don s. versicolor Bot. Mag.).
- Oxytrópis** DC. (Leguminos. Astragaleen, XVII. 4) „Spitzkiel“, -fahne, Fahnwicke, Wirbelkraut (s. v. u. $\tau\bar{\rho}\bar{\sigma}\bar{\pi}\bar{\iota}\bar{\varsigma}$ Schiffsskiel — d. Carina läuft in eine Spitze aus!), s. *Astragalus L.*
- Oxytura** DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Spitzschwanz“ (s. v., $\bar{o}\bar{i}\bar{\rho}\bar{\alpha}$ Schwanz — d. Blüten am Ende d. ob. blattlosen, rauhen Zweige), Zier. O. chrysanthemoides Lindl. (Californ.), s. *Callichroa Douglassii* Torr. u. Gray.
- Ozodia** Wight (Umbelliferen, V. 2) „Wohlgeruchdolde“ (gr. $\delta\bar{\zeta}\bar{\omega}\bar{\delta}\bar{\eta}\bar{\varsigma}$ aromatisch riechend).
- Ozolis** Spr. (Compos. Tageteen, XIX. 2) „Übelgeruch“-Sammelblume, „Stinkblume“ (gr. $\bar{\delta}\bar{\zeta}\bar{\o}\bar{\lambda}\bar{\iota}\bar{\varsigma}$ d. Stinkende, Übelriechende), s. *Tagetes multiflora* HB., Bpl.
- Ozophyllum** Schreb. (Diosmeen, V. 1) „Stinkblatt“ (v. $\bar{\delta}\bar{\zeta}\bar{\omega}$ rieche, $\varphi\bar{i}\bar{\lambda}\bar{o}\bar{v}$ Laub — stinkende Blätter!).

Pachřira Aubl. (Oxalideen Bombaceen, XVI. 8) weisser Prachtwollenbaum, „Dickwollenbaum“ (v. $\pi\bar{\alpha}\bar{z}\bar{\iota}\bar{\varsigma}$ dick, $\chi\bar{\rho}\bar{\iota}\bar{o}\bar{v}$ Wolle, Wtst. Name d. B.'s in Guiana!), P. alba Aubl. (*Carolinéa a.* Lodd.), aquatica Aubl. (*Carol. princeps* L.), s. g. Cacao sauvage.

- Pachites** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Dickähren“-O. (s. eb. — d. Blüt. in dicken, steifen Ähren!).
- Pachycarpus** E. Mey. (Asclepiadeen, V. 2) „Dick“- od. „Feistbalg“ (s. v., *χαρτός* Frucht — d. Balgkapsel bauchig aufgeschwollen m. schwammigen Wänden!).
- Pachydendron** Haw. W. (Liliaceen, VI. 1) „Dickbaum“-Aloë (zu Aloë L.) (s. v., *δέρδον* B. — gedrängte Gipfelblätter!).
- Pachyphytum** Lk., Ott., Kl. (Crassulaceen, V. 1) „Dickpflanze“ (s. v., *γυντόν* Gewächs — fleisch. Staude!), Zier. P. bracteosum Klotzsch (Echeveria br. Lindl.) (Hstr., Mex.).
- Pachyrhizus** Rich. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Dickwurzel“- od. Knollenbohne (s. v. u. *δίτια* Wurzel — diese dickknollig u. essbar!), P. tuberosus Spr. (Dolichos bulbosus L. s. tuberos. Lam., Strizolobium tub. Spr.).
- 1) **Padus** Mill. (sc. Prunus) L. (Amygdaleen, XIII. 1) Ahl- od. Traubenkirsche, Vogelkirsche, Ölbeerbaum Wolff, Silberregen Vilm., fr. cerisier à grappes, laurier-putier „Stinklorbeer“, e. fowl-cherry-tree m. v. v. (Theophr. *πάδος* urspr. = Prunus Mahaleb, viell. Padus = Fluss Po, Wtst.). 2) **Padus** Lauch. (sect. v. Prunus) Traubenkirschen, z. B. noch Pr. Laucheana Bolle, virginiana L., serotina Ehrh. etc.
 - 1) **Paederia** L. (Apocyneen od. Contorten Carisseen, V. 1) „Stinkwinde“, Knackbeere, fr. danaïde (v. paedor Gestank — sehr übl. Geruch d. Pf.), z. B. foetida L. (Lygodysodea foet. R. P., Convolvulus foet. Rumph.), fragrans Lam. (Danaïs fr. Balf. f.) (Ins. Maurit.). 2) **Paederia** Wight (Rubiaceen, IV. 1).
- Paederota** L. (Scrophularineen, II. 1) „Päderastenblume“, „Knabeneilie“ (gr. *παιδελώς*, -ωτος i. q. *παιδεραστής*; Knabenschänder), z. B. P. Ageria s. lutæa L. (Wulfenia Ageria Vahl).
- Paeonia** T., L. (Ranunculaceen, XIII. 2) Pfingst-, Königs- od. Bauernrose, fr. péone od. pivoine, fleur royale, - de mallet „Felleisen“-Bl., e. peony (paeony) (n. Plin. v. Paeon Gott d. Ärzte, od. n. Päonien ben., wo wild wachsend, Wtst.), Zier. P. officinalis L. Putennie od. Gichtrose etc., fr. Pivoine des jardins, e. shop-Paeony, m. v. v. (P. femina L.), P. tenuifolia L. (offic. var.) (Sibir.), P. paradoxa Andr. s. peregrina Mill., P. albiflora Pall. (sinensis Poit.), P. corallina Retz. s. mascula L., fr. piv. mâle od. corail, P. Witmanniana Bot. Reg., P. arborœa Don (P. Moutan Sims) etc. — Paeoniacæe Rchb., Bartl.
- Palafoxia** L., Lag. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Palafoxblume“ (n. d. span. General u. Vert. v. Saragossa, Palafox), Zier. P. texana DC., Hookeriana.
- Palava** Rz. Pv. (via Cav.) (Malvaceen, XVI. 8) „Palavie“ od. „Palau“- Malve (n. A. Palau y Verdera, Prof. z. Madrid im 18. Jahrh.), Zier. P. flexuosa Masters „bogenstenglige“, malvifolia L. (Malöpe parviflora l'Hér.) etc.
- Paliurus** T., G. (Rhamnaceen, V. 1) Stech-, Christus- od. Judendorn, fr. nerprun paliure, porte-chapeau (gr. *παλιούρος* urintreibend v. *πάλλω* treibe, *οὖορ* Harn — soll harntreibend wirken), P. australis G., s. Zizyphus Paliurus W. s. aculeata Lam. u. Rhamnus Paliurus L.
- 1) **Pallasia** L. (sc. Calligönum) l'Hér. (Polygonaceen, VIII. 2) „Pallas“- Knöterich (n. d. russ. Nat. u. Reis. Pallas), z. B. caspica L. (Pterococcus aphyllus Pall.). 2) **Pallasia** Ait. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Schönauge, z. B. procumbens Spr. (Encelia proc. Kth.), halimifolia l'Hér., s. Coreopsis limensis Jacq. Schönauge von Lima (Peru). 3) **Pallasia** Scop. (Gräser, III. 2) „Pallasgras“. 4) **Pallasia** Van Houtt. (Rutac. Diosmeen, V. 1) „Pallas“-Duftraute.

Palmaeae Bartl., DC., Rchb., -mae Juss., Kl. od. Ord. d. Palmen (gr. πάλμα das Geschwungene od. πάλμη Schild, lat. parma, lat. palma Palme).

Palmella Lyngb. (Nostochineen, XXIV. 3) Schleim- od. „Zitteralge“ (v. παλμός das Zittern), s. Coccochlōris. — Palmellacēae Nāg., -mellēae Ktzg. Zitter- od. Gallertalgen.

1) **Panacees** (sc. Heraclēum) L. (Umbelliferen, V. 2) „Allheil“-Bärenklau (πάναξ allesheil. Kraut, „Panacee“, πάς od. πάν u. ἀχέομαι heile), s. Heraclēum aspērum M. B. s. pubescens Vilm. (grosse Gartenzierdolde!). 2) **Panacees** carpimon Cold. (Araliac., V. 5 od. XXIII. 2) canad. Aralie, s. Aralia racemosa L. (Christophoriana canadensis Moris.) (παριμός Früchte tragend).

1) **Panax** L. (Araliaceen, XXIII. 2) „Allheilpflanze“, Kraftwurzel D. (gr. πάναξ, -ακος i. q. παναξίς Alles heiland; Plinius führt 4 παναξ an: asclepische, heraklische, chironische u. centaurische), z. B. P. Schin-seng Nees, e. ginseng, echte Kraftwurz od. Ginseng Leun., fr. mandragore de la Chine, P. crassifolius Decsn. (Aralia trifoliata Hort.). 2) **Panax** aculeatus Ait. (Terebinthac. Zanthoxyleen, XXII. 2) Stachel-Kraftw., s. Zanthoxylum trifoliatum L. (d. vorigen identisch?).

Pancratium Herb., L. (Amaryllideen, VI. 1) Trichter- od. Narzissenlilie, Gilgen od. Kraftblume, fr. pancais (-cratier) (v. πανρωστής Alles beherrschend — stärkende Heilkr.), Zier. P. illyricum L., maritimum L. Meerstrands-Narzisse od. Meerlilie, fr. lis-narcisse (-Matthole), caribaeum L., speciosum Salisb. (Hymenocallis spec. Herb.).

Pandanus L. f. (Pandaneen, XXI. 1) Palmkolbe, Schraubenbaum, fr. pandanier, e. screw-tree (v. d. malayisch. pandang = ansehnlich), z. B. Candelabrum P.-B. „Leuchterbaum“, P. utilis Bory (Madag.), Treibh. graminifolius, odoratissimus L. f. (Atroductylis Forst.), javanicus m. v. variegatus Hort. etc. — Pandanēae R. Br., DC. (zu Ord. Aroidēae Bartl., DC. Palmkolben).

Panicum L. (Gräser, III. 2) Fennich, Hirsegras, Hirse, fr. panic, pied de coq, e. french-wheat, panic-grass (v. panis Brot? wahrsch. v. panica Rispe, Wtst.: πανιζή Perücke v. πανιζός panisch, den Pan betr.), geb. P. miliacēum L. gem. Hirse, Zier. virgatum L. „rutengahm.“, fr. panic effilé, plicatum Lam. m. v. v. (fol. niveo-vittatis, fol. varieg., P. capillare Gron. (Eragrostis elegans Hort., non Nees), P. altissimum Desf. Guineagras, s. g. Mohar od. Riesenschwaden (maximum Jacq.).

Papaver T., L. (Papaveraceen, XIII. 1) Mohn, (verdorb.) Pfaffen, fr. pavot, e. poppy (v. papa Papp, d. i. verdickte Milch, u. verum wahr — früher z. Einschlaf. d. Kinder), geb. P. somnifērum L. m. v. v. Gartenmohn (z. B. monstruosum Hort. s. polycephalum Hort. u. Mursellii Hort. (chines. Gart.-M.) — s. g. Päonienmöhne), P. Rhoeas L. Klatschrose m. v. v. (z. B. fl. pleno, s. g. Ranunkelmohn), P. bracteatum Lindl., P. orientale L. (Kaukas.), fr. P. d'Orient od. du Levant, e. eastern Poppy, P. cambricum L. engl. M., P. nudicaule L. (Sibir.), crocēum Ledeb. etc. — Papaveracēae DC., Rchb. (-rēae Rchb.).

1) **Papaya** T., Juss. (sc. Carica) B. (Peponiferen, XXII. 9) Melonenbaum, fr. papayer, melonifère u. lolotier, e. papaw od. melon-tree (malayisch. Name papaia-maram), P. vulgaris Lam. (Caric. Pap. L.), sylvestris Rumph., fr. champada, s. Bergera Koenigii L. f. (B. Ost-ind.). — Papayaceae Mart. (zu Peponiferae Bartl.).

Paphinia Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Paphnie“, d. i. Paphia od. Venus-O. (v. Paphia Zuname d. Venus n. d. Stadt Paphos auf Cypern), T. cristata Lindl. (Guyana), s. Maxillaria.

- Papilionacēae** L., Rchb. „Schmetterlingsblütige“, fr. papilionacées (v. *papilio* Tagfalter — Gestalt der Leguminosen-Blüten!).
- Papiria (-pyria)** Thunb. (Amaryllideen, VI. 1) Lustlilie, Papierlilie D. (v. *papýrus* Papierstaude — Blätt. wie Papierrollen u. m. trockner Hautscheide), s. Gethyllis L.
- Pappophōrum** Schreb. (Gräser, III. 2) „Dunenträger“, Federgras D. (gr. πάππος Grossvater, davon lat. *pappus* Greisenhaar od. Federkrone — Ähre ein seidenglänzend. Büschel!), z. B. gracile R. Br. (Enneapōgon gr. Desv. „Neunbart“), alopecuroides Vahl (Südamer.).
- Papyrifēra** Vent., s. Broussonetia papyrif. Vent. (Moreen, XXII. 4) Papier-Maulbeerbaum, „Papierträgerin“ (*papýrus* u. féro — Bast zu Papier benutzt!).
- 1) **Papýrus** Bruce, W. (Cyperaceen, III. 1) „Papierstaude“, fr. jone papyracé (gr. πάπυρος i. q. βύβλος od. βύβλος Papierbinse), P. antiquorum W. = Cypérus *Papýrus* L. 2) **Papýrus japonica** Lam., s. Morus s. Broussonetia papyrifēra Vent. Papier-Maulbeerbaum (s. eb.)
- Paradisia** Mazzucati (Liliaceen, VI. 1) „Paradies“ (Eigenname Paradiſ! schwerl. παράδεισος Baum- od. Paradiesgarten!), Zier. P. Liliastrum Bertol. unechte Zaunlilie, s. Czackia s. Anthericum Liliastrum L.
- Parallosa** Alfld. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) einblüt. Erve, P. monanthos Alfld. (Ervum m. L.), s. Vicia monantha Koch (Cracca monanthos Godr. Gren. (gr. πάναθας v. πάνα bei u. ἄλι; -ος See, Eil-schiff — weg. d. Schiffchens d. Blüte? — unklar!).
- Pardalianches** (sc. Doronicum) L. (Compos. Inuleen, XIX. 2) Gemswurz, „Leopardenwürger“, Schwindelkraut, fr. doronic, herbe aux panthères, e. leopard's-bane od. panther-strangler (gr. παρδαλιαγγής sc. γαρμανον Arznei, woran d. Panther erstickt), s. Doronicum austriacum Jacq.
- Pardanthus** Ker (Irideen, III. 1) „Pantherblume“ (*πάρδος*; Panther, ἄρδος Bl. — pantherfleckige Bl.!), P. chinensis Ker (Moraea chin. Thb.).
- Pareira** (sc. Cissampelos) L. (Menispermeen, XXII. 13) gebräuchl. Grieswurz, portug. u. fr. Pareira brava d. i. wilder Weinstock, fr. auch vigne sauvage, liane en coeur (- tête de serpent).
- Parellus** (sc. Lichen) L. (Flechten, XXIV. 3) „Wandflechte“ (fehl. st. parietellus v. paries, -étis Wand!).
- Pariēna** Aubl., Schreb. (Gräser, XXI. 7) „Guianagras“ (guian. Name dess.!), z. B. glauca Nees, campestre Aubl.
- Parietales** Endl. „Wandfruchtige“ (v. paries, -étis Wand — an d. Fruchtwänden befest. Samen!).
- Parietaria** T., L. (Urticaceen, XXIII. 1) „Wand“- od. Mauerkraut, Glas-, Peterskr. etc., fr. casse-pierre, perce-muraille, herbe de Nôtre-Dame, e. pellitory of the walls, parietary, Peterswort (s. eb.), s. Perdicium G. Frank.
- Paris** L. (Melanthaceen, VIII. 4) Einbeere, Wolfs- od. Fuchsbeere, fr. raisin de renard od. herbe paris, e. herb-Paris od. true love (v. par, -is Paar — gleiche Vierzahl aller Teile), P. quadrifolia L. gift. Einbeere (Wald).
- Parkia** R. Br. (Mimoseen, XXIII. 1) „Mungo-Park's“-Mimose (n. d. ber. schott. Reis. Mungo-Park, † 1805 in Afrika), P. africana R. Br., s. Inga biglobosa s. senegalensis u. Mimosa taxifolia Pers.
- Parmelia** Ach. (Flechten, XXIV. 3) „Schild“- od. Schüsselflechte (v. parma Fechtschild — Form d. Fruchtlagers!), z. B. conspersa Ach., usneoides ds. etc.
- Parnassia** T. (Saxifragaceen, V. 3) Ein- od. Herzblatt, Leberblume, fr. fleur du Parnasse, Parnassie, fleur hépatique, hép. blanche noble

(n. d. Berg Parnassus bei Delphi, d. Sitz d. Musen). — Parnassiæ Rchb. (zu *Cistiflora* Bartl.).

Parochétus Hamilt. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Grabenbohne“ (παρα bei, ὄχετὸς Graben, Canal — kriechende Uferkräuter!) Ampel P. communis Ham. (Westind.).

Paronychia T., Juss. (Portulaceen Illecebreen od. Paronychieen, V. 1) „Nagelkraut“ (gr. παρωνύχιον Nietnagel — Aussehen d. Deckblätts. u. geg. Fingerkrankh.), z. B. serpyllifolia Lam. (Illecēbrum s. Vill.). — Paronychiacæ St. Hil., -iæae DC.

Parrotia C. A. Mey. (Hamamelideen, IV. 2) „Parrotie“ (n. F. Parrot, Arzt z. Heilbronn, † 1841, Prof. z. Dorpat), z. B. P. persica C. A. Mey. (Hamamelis p. Fisch.).

Parthenium (sc. Pyréthrum) Pers. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Jungfernkrat“ Mutterkraut, fr. parthénie, espargoutte, petit-muguet (v. παρθένος Jungfrau — gegen Frauenkrankheiten gebr.; Ηλαγήριον bei d. Alten noch andere, z. B. Parietaria, Chrysocoma etc. Wtst.), s. Matricaria Parthenium L., Zier: v. v. (z. B. Teppichg. aurēa, e. golden-feather). 2) **Parthenium** L. (Ambrosiaceen, XXI. 5) „Jungfernblume“, z. B. P. Hysterophorus Vaill. „Gebärmutterträger“, integrifolium L., s. Villanova Lag. Spr.

Paspálum L. (-lus Mnch., Flügge) (Gräser, III. 2) Pfannengras, fr. pas-pale, cérésie (gr. πάσπαλος Hirse aus πᾶς ganz u. πάλη Mehl), z. B. digitatus Mnch., s. Digitaria pilosa.

1) **Passerina** L. (Thymeläaceen, VIII. 1) „Spatzenstrauch“, „Sperlingskraut“, Vogelkopf D., Spatzenzunge, fr. passerine (v. passer Sperling — Samen wie ein Vogelskopf), Zier. P. filiformis L. u. grandiflora L. f. (Cap), hirsuta L. (Metnam Forsk., Sanamunda Breyn) (Str. Südfrankr.). 2) **Pass.** Wickstr. (sc. Stellera) L. (Thymeläac., VIII. 1) Spatzenkraut, fr. le grémil d'Allemagne, s. Passerina annua Wickstr. 3) **Pass.** (sc. Erica) L. „Sperlingsheide“.

Passiflóra Juss., L. (Asclepiad. Passifloreen, XVI. 2) „Passionsblume“, fr. fleur de la passion, grénadille, e. passion-flower, granadille, virginian-climbre (v. passio Passion od. Leiden Christi — n. Ferrari in d. Blume d. Zeichen der Leiden Christi od. Marterwerkzeuge zu finden), Balkon: P. coerulæa L., hermesina Lk., Ott. (Rio Janeiro), edulis Sims (Bras.), fr. grénadille, e. water-lemon, racemosa Brot., quadrangularis L. (Peru) etc. — Passifloræ Juss. (zu Asclepiadæ Rchb. od. Peponiferae DC.).

Pastináca T. (Umbelliferen, V. 2) „Pastinak“, Zuckerwurzel, fr. panais, e. parsnep (-nip) (v. pastinum Hacke — womit d. essb. Wurzeln ausgemacht wurden, Wtst. v. pastus Nahrung!), P. sativa L. m. v. urens Requien.

Patientia (sc. Rumex) L. (Polygoneen, VI. 3) Garten-Ampfer, s. g. englisch. Spinat, fr. patience u. parelle, e. engl. spinach (v. patientia Geduld — lässt sich immer wieder schneiden! Wtst.: von langsam. medizin. Wirkung!).

Pattersonia R. Br. (Irideen, III. 1) „Patterson's“-Schwertel (n. W. Patterson, engl. Cap-Reis., schr. Narrative of four journeys etc. London 1789).

Paullinia Schum., L. (Sapindaceen, VIII. 3) „Paullinie“, fr. liane, Paullinie (n. d. Bot. Paullini), z. B. P. asiatica L., fr. liane épineuse, P. australis, barbadensis, caribaea, multiflora, fr. liane à persil, etc., s. Seriana Schum., Scopolia Sm. etc. — Paulliniæ Rchb.

Paulownia Sieb. u. Zucc. (Bignoniaceen, XIV. 2) „Paulownienbaum“, Blauglockenb., Zierb. P. imperialis S. Z., fr. Paulownie imperiale, e. imperial P. (n. Anna Paulowna, russ. Grossf. u. Gemahlin d.

Prinz. Friedrich d. Niederlande), s. *Bignonia tomentosa* Thb. u. *Incarvillea* tom. Spr.

Pavetta Rheed., L. (Rubiace. Cinchonaceen, IV. 1) „*Pavettabaum*“, Scheel- od. Schellkorn D. (malabar. Name d. B.'s!), z. B. P. *indica* L., *australis* Hook., *pentandra* Sw. (*Psychotria Pavetta* Sw., Bstr. Ostindiens) etc.

Pavia Boerh. (zu *Aesculus L.*) Rehb. (Sapindac. Hippocastaneen, VII. 1) „*Paw's*“-Rosskastanie (n. Pet. Paw, im 16. Jahrh. Prof. in Leyden), Zierb. P. *rubra* Lam. (*Aesculus Pavia L.*), e. american small buck-eye, P. *lutea* Poir. Wangenh. (*Aesc. flava DC.*), fr. pavier jaune, e. amer. sweet buck-eye, P. *humilis* G. Don, Lodd. (*Aesc. Pavia* var. *humilis* Hort. u. v. *atro-sanguinea* Hort.), P. *alba* Poir. s. *edulis* Hort., P. *discolor* Pursh (*Macrothyrsus discolor* Spach), P. s. *Aesc. glabra* W., P. s. *Aesc. rosaea* Arb. Musc. etc.

Pecten DC. i. q. *Pecten-Venēris* (sc. *Scandix*) L. (Umbelliferen, V. 2) „Kamm-Kerbel“, „Venuskamm“ (pecten, -inis Kamm — zweireihig bebart. Fruchtschnabel).

Pedicularis T., L. (Scrophularineen, XIV. 2) „*Läusekraut*“, Rodel O. W., fr. *pédiculaire*, crête de coq, e. lice-bane, louse-wort (v. *pediculus* Laus — früh. Anwend. geg. d. Läuse u. Samenform).

Peganum L. (Rutaceen, XI. 1) „*Feistraute*“ ($\pi\gamma\alpha\nu o\nu$ Raute, Wtst.: v. $\pi\gamma\gamma\nu\omega$ erhitze? — Geschmack u. Wirkung!?) vielmehr $\pi\gamma\gamma\omega$ od. $\pi\gamma\gamma\nu\nu\mu$ schlage, befestige, $\pi\gamma\gamma\sigma$ feist etc. — angebl. weg. d. fleisch. Blätter, F. W. Riemer), z. B. P. *Harmala* L. = $\Pi\gamma\alpha\nu o\nu \dot{\alpha}\gamma\omega\nu$ Diosc.

1) **Peireschia** Spr. (auch *-quia* u. *Pereskia* Plum., Pers.) (zu *Cactus*) Rehb. (Cacteen, XII. 1) „*Peiresce's*“-Cactus, Baum-C. (n. Nic. Fabrice de Peiresce, lat. Peireskius, in Aix, † 1637, schr. üb. Pflanzenkultur), z. B. P. *aculeata* Plum. u. *portulacaefolia* (Cact. *Pefreskia* Pers. u. port. L.). 2) **Pereskia** Fl. Flum. (Theaceen, XIII. 1) (zu Hippocratea L.).

Pelargonium l'Hér. (Geraniaceen, XVI. 5) Kranich- od. „*Storchschnabel*“ (v. $\pi\epsilon\lambda\alpha\gamma\omega\zeta$ Storch, aus $\pi\epsilon\lambda\omega\zeta$ schwarz u. $\dot{\alpha}\gamma\omega\zeta$ weiss — schnabl. Frucht!), Zier. P. *peltatum* Ait. (Epheu-Geranium d. Ampeln), zonale W. m. v. v. u. *inquinans* Ait. m. v. v. (— Scharlach-Geranien d. Gärt. u. Stuben) u. daraus Blendlinge od. Hybriden, P. *grandiflorum* W. s. g. Blumisten-P. m. v. v. u. Hybriden, e. fancy-Pel. d. i. „*Phantasie*“-P.; P. *capitatum* Ait. dichtdold. Stuben-P., P. *odoratissimum* Ait. s. g. Citronen-Ger., P. *roséum* Hort. (rosodorum Hort., radula *roséum* W.) Rosen-Ger., quercifolium Ait. etc.

Pelecyphora Ehrbg. (Cacteen, XII. 1) „*Beilträger*“ ($\pi\epsilon\lambda\epsilon\zeta\omega\zeta$ Beil, $\varphi\omega\zeta\delta$ tragend — Rutenbündel d. röm. Consuln!), P. *aselliformis* Ehrbg. „Rutenbündel“-C. (Fasces-C.), s. *Melocactus* C. Bauh.

Pelegrina (sc. Alstroemeria) L. (Liliaceen, VI. 1) bunte Alstroemerie M.-Rehb., „*Pilgerin*“ (*pelegrinus* st. *peregrinus*, fr. *pelerin* Pilger, Fremdling).

Peloria pentandra L. (Scrophularineen, V. 1 od. XIV. 2) Frauenflachs, Fünffaden-Leinkraut, s. *Linaria vulgaris* Mill. Abnormität (gr. $\pi\epsilon\lambda\omega\zeta$, -os Ungetüm, Monstrosität — ausgeart. Form!).

Peltandra Raf. (Araceen, XXI. 1) „*Scheiben*“- od. „*Schildbeutel*“-Aron ($\pi\epsilon\lambda\tau\eta$ Rundschild, $\dot{\alpha}\nu\eta\omega$, - $\delta\omega\zeta$ Mann, Staubbeutel — dies. schildförm.!), P. *virginica* Raf., s. *Arum* L.

Peltanthera Roth (Apocyneen, V. 1) „*Schildanthere*“ (s. eb. u. $\dot{\alpha}\nu\theta\eta\omega\zeta$ — d. Antheren hängen m. d. Mitte wie Schildchen an d. Narbe).

Penicillaria W., Sw. (Gräser, III. 1 od. XXIII. 1) „*Pinselgras*“, s. g. Duhn (v. *penicillum* Pinsel — Ährchen in Grannen gehüllt), z. B. *spicata* W. (*Holcus spic. L.*), s. *Pennisetum typhoideum* Pers. (Ostind.).

- Penicillium** Lk., Pers. (Schimmelpilze, XXIV. 4) „Pinselschimmel“ (s. eb.), z. B. *glaucum* Pers., *candidum* Grev., s. *Botrytis sparsa* Spr.
- Pennisetum** Rich., P.-B. (Gräser, III. 1) „Federborstengras“ (penna Feder, seta Borste — Ährchen in gezähnte Borsten gehüllt), Zier. *longistylum* Hochst. (Abyss.) s. *vilosum* u. *angustifolium* Hort., s. *Gymnothrix* Hb. „Nackthaar“.
- Pentēmon** Ait. (Pentst.- l'Hér., Pentastēnum l'Hér., Hort.) (Scrophularineen, XIV. 2 od. V. 1) „Fünffaden“, Bartfaden Rmpl. ($\piέντε$, in compos. $\piέντα$ - fünf, $\sigmaιμων$ ὁ d. Staubfaden — deren hier 5 st. 4!), Zier. *gentianoides* G. Don m. v. v. (Chelone g. Hb. Bpl. Kth.), *pubescens* Ait. s. *hirsutus* W., s. *Chelone Pentstēmon* L. (Cynorrhinchium nov.-anglicum Pluk.), *heterophyllum* Hort., *hybridus* Hort., P. *Digitalis* Nutt. (Chel. Dig. Sweet) etc.
- Pentadesma** Don, R. Br. (Guttiferen Garcinieen, XVIII. 2) „Fünfbündel“, Butterbaum, P. *butyracea* Don (s. eb. u. $\deltaέσμη$ Bündel — d. Staubfäden in fünf Haufen).
- Pentandria** L., V. Kl. „Fünfmännige“ (s. v., $\alphaνήρ$, - $\deltaρος$ Mann, Bot. Staubgefäß!).
- Pentapētes** L. (Sterculiac. od. Büttneriaceen, XVI. 7) „Fünfblatt“- od. Scharlach-Malve ($\iotaεντατετές$ i. q. $\piένταφυλλον$ Fünfblatt — fünfteil. Laub, Kelch u. Kapsel), P. *phoenicea* L., s. *Cavanillea phoen.* Gm. (Dombeya ph. Cav.).
- Pentapterigium** flavum s. *Pentapteris*! sogl.
- Pentapteris** Hall., DC. (Onagreen Halorageen, XXI. 8) „Fünfflügel“- Tausendblatt (s. v. u. $\piτεοίς$ od. $\piτέον$ Flügel), s. *Myriophyllum* L. u. *Pentapterophyllum* Dill.
- Pentapterophyllum** Dill. (Onagreen Halorageen, XXI. 8) „Fünfflügelstengel“ (s. v. u. $\phiύλλον$ Laub — Blätt. zu fünf in Quirlen), s. *Pentapteris* Hall.
- Pentaria** DC. (Asclepiad. Passifloren, XVI. 2) „Fünfblatt“-Passiflora (zu *Murucuia* T., Aubl.) (v. $\piέντα$ Fünfzahl — Perigon aus 10 Teilen).
- Pentarrhaphia** Lindl. (schlecht *Pentaraphia*!) (Bignoniaceen, XIV. 2) „Fünfnaht“, bauchige Gesnerie (s. v. u. $\deltaαρή$ Naht — Kelchröhre fünfrippig), P. *cubensis* Decsn., s. *Gesneria ventricosa* Hort.
- Pentas** Benth. (Cinchonaceen Hedyotideen, V. 1) „Fünflappenblume“ ($\iotaεντάς$ Fünfzahl — je 5 Teile!), Treibh. P. *carnea* Benth. (Sipanča Hort.), *carnea roséa* Van Houtt.
- Pentastēmon** s. *Penstēmon*!
- Peperomia** Rz. Pv. (Piperaceen, II. 3) (zu *Piper* L.) „Pfeffergewächs“ Rmpl. (v. $\piέπερη$ Pfeffer u. $\deltaμός$ gleich), z. B. *Stuben-Blattpfl.* P. *arifolia* Miq. v. *argyreia* Hort. (*marmorata* Hook.), *Warmh.* u. *Stub.* *resediflora* Lind., Verschaffelti Lem.
- 1) **Peplis** (sc. Euphorbia) L. (Euphorbiaceen, XI. 3) Meerstrands-Wolfsmilch ($\piέπλης$ od. - $ος$ Kleid — bedeckt d. Erde nach all. Seiten, Wtst.? wohl weg. d. Deckblätter!). 2) **Peplis** L. (Lythrarieen, VI. 1) Bachburgel, Sumpfqundel Seub. (Peplis bei Plinius das Kraut Portulak). 3) **Peplus** (sc. Euphorbia) L. (Euphorbiaceen, XI. 3) Garten-Wolfsmilch, „Gewand“-W. (v. $\piέπλος$ Gewand — weg. d. Hüllblätt.!).
- Pepo** T. (sc. Cucurbīta) DC. (Cucurbitaceen, XXI. 10) gem. Kürbis, „Phebe“ od. „Pfebe“, fr. *pepon* od. *potiron*, e. *pompion* (pumpion) od. *pumbkin* (gr. $\piέπων$, lat. *pepo* Melone, Pfebe, v. $\piέπων$ reif), Zier. u. geb. C. *Pepo* v. *aurantiformis* Hort. „Apfelsinen“-K., v. *verrucosa* Hort. „Warzen“-K., v. *piriformis* alba, *striata* u. *annulata* Hort., v. *maliformis* u. *malif.* *praecox* Hort.
- Peponiferae** Endl., Bartl. Kürbisfrüchtige od. „Pfebenträger“ (s. eb. u. fero trage).

- 1) **Perdicium** L. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Rebhuhn“-Lattich (v. *perdix*, -*cis* Rebhuhn — soll v. Rebhuhn ausgescharrt werden), *P. lactucoides* Vahl (Aster *magellanicus* Lam.), brasiliense L., chilense W. etc., s. *Tussilago*. 2) **Perdicium** DC. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1), *P. Taraxaci* Vahl (semiflosculare Thb., Cap.). 3) **Perdicium** G. Frank (Urticaceen, XXIII. 1), s. *Parietaria* T.

Pereskia s. *Peireskia*!

Peretta Risso (Aurantiaceen, XVIII. 2) „Perette“, Limette, Bergamotte (ital. *peretta* Birnchen, dem. v. *pera* Birne), s. *Citrus Limetta* Risso.

Perfoliata Burm. (-tum G. Fr.) (Umbelliferen, V. 2) „Durchwachs“-Hasenohr (per durch, folium Blatt — d. Stengel scheint durch dass. hindurchgewachsen!), s. *Bupleurum longifolium*, *rotundifolium* etc. L., Bruchwurz: z. B. *montana* u. *alpina* Bauh. etc.

Perforaria Chois. (Hypericineen, XVIII. 2) durchstochenes Johanniskr., s. *Hypericum perforatum* L. (perforo durchbohre — durchsichtige Punkte in d. Blätt.).

Pergularia L. (Asclepiadeen, V. 2) „Laubenstrauch“ D., fr. *pergulaire* (v. *pergula* Durchgang, Rebengeländer — wozu d. windende Str. geeignet), z. B. *edulis* Thb., *purpurea* Vahl (*Asclepias cordata* Burm.) etc.

Periclymenum Mill. (sc. *Lonicera*) L. (Caprifoliaceen, V. 1) deutsches od. Wald-Geisblatt, Specklilie, fr. *chèvre-feuille des bois*, e. woodbine, common honey-suckle (gr. *περικλήματος* rankend. Strauch!), *P. vulgare* Mill. (*Lonic. Peric. L.*), s. *Lonicera germanica* Dietr. (*Caprifolium* Per. R. Sch.).

Perigynia Juss. (Mono-Perigynia, sc. Monocotyledones) „Umweibige“ (*περὶ herum, γυνὴ* Weib, Stempel — diese um- d. i. nicht ober- noch unterständig!).

Perilla L. (Labiaten, XIV. 1) „Perille“, Grossmelisse (indisch. Name d. Pfl.), *P. ocimoides* L. (*Melissa maxima* Arduino), Zier. *P. nan-* kinensis Decsn. m. v. atro-purpur. fol. *laciniatis* Hort. (Blattpfl.).

Peripetalia Juss. „Umkronblättrige“ (*περὶ herum, πέταλος* Kronblatt — letztere stehen um die Stempel herum, nicht höher oder tiefer!).

Periplöea L. (Asclepiadeen, V. 2) Baumschlinge, fr. *périploque* (gr. *περὶ πλοῦ* Umschlingung — Schlingstrauch), Zier. *P. graeca* L. griech. Seidenrebe od. Hundsschlinge, s. g. Maltheserkreuz Rmpf., fr. Pér. de la Grèce, e. greek P., -silk-tree.

Peristaminia Juss. mit „umständigen“ (nicht ober- noch unterständ.) Staubfäden (s. v. stamen, -inis).

1) **Peristera (-ia)** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Tauben“-O. (*περὶ στεργὰ* Taube — schnablige Frucht), z. B. *P. elata* Hook. 2) **Péri-** stera DC. (Geraniaceen, XVI. 4) Tauben-Ger., s. *Pelargonium l'Hér.*

Peristylus Lindl. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Umgrißel“-O. (s. v., *στύλος* Säule, Griffel), z. B. *albidus* Lindl. (*Habenaria* Sw., *Gymna-* denia R. Br., *Orchis albida* Scop.).

1) **Peronia** Réd., DC. (Cannaceen, I. 1) „Peron's“-Bl. (Wtst.: n. Fr. Peron, unter Baudin Reis. in d. Südsee, † 1810), z. B. *stricta* Réd. (*Thalia dealbata* Fras. Sow.). 2) **Perona** Pers. (Zitterpilze, XXIV. 4) „Peron's“-Zitterpilz.

Peronospöra Tul., Cord. (Schimmelpilz, XXIV. 4) „Bohrsimmelpilz“ (v. *περορῶ* durchbohre, *σπόρα* Spore, Helm.-Rabbst.: v. *περόνη* Spitze — d. Spore sitzt an den stachelspitz. Enden d. Seitenzweige), *P. infestans* Casp. s. *effusa* Rabbst. Kartoffelpilz (— Trockenfäule der Kartoffel).

Perötis Ait., Schreb. (Gräser, III. 2) „Stummelgras“ (*περότης* od. *πηρός* verstümmelt — äuss. kleine, wehrlose Kronpelzen), z. B. *latifolia* Ait. (*Saccharum spicatum* L., *Alopecurus malabaricus* Scheuchz.).

- 1) **Persēa** G. (sc. Laurus) L. (Lauraceen, IX. 1) „Perseus“-Lorbeer, Gärtner's heiliger Baum Ägyptens (n. d. Halbgott Perseus, nicht von Persien), P. caryophyllacea G. Nelkenzimmetbaum, P. gratissima G. vegetab. Schmalz (pericarpio butyracēo), echter Abacate- od. Ad-vokatenbaum Leun., P. indica G. Madera- od. falsches Mahagoni-holz. 2) **Persēa** (Laurus sect. Rchb.), z. B. Laurus s. Persea Cinnamomum, Camphora u. Cassia L.

Persīca T. (Amygdalaceen, XII. 1) „Pfirsichbaum“, fr. pécher, e. peach-tree, melicotony (gr. περσική die Persische — stammt aus Persien), Zier. P. vulgaris Mill. fl. pleno Rosen-Pf., v. coccinea, v. v. versicolor, camelliaeiflora u. dianthiflora Hort., Gartenobst: P. vulgaris Mill. (Amygdalus Persica L. u. sibirica Pall.) m. v. v., z. B. fr. grosse Mignonne.

- 1) **Persicaria** (sc. Polygōnum) L. (Polygonaceen, VIII. 1) Flöhlkraut-Knöterich, fr. persicaire (v. Persica s. eb. — weg. d. Ähnl. d. Blätter!). 2) **Persicaria** T. (Polygōnum sect. Rchb.), z. B. Zier. Persic. orientalis T. m. v. v. tabakblättr. Knöterich, wild Hydropiper L., laxiflorum Weihe, amphibium L. etc.

Personatae Endl., Rchb. Maskenblumige, fr. personnées (v. persona Maske) i. q. Scrophulariacae R. Br.

- 1) **Persoonia** Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Persoon's“-Stielechte (n. d. Bot. u. Arzt Persoon). 2) **Persoonia** Mchx. (Compositae). 3) **Persoonia** W. (Hesperideen).

Pervīna T., Scop., Lam. (Apocyneen, V. 1) Sinn- od. Immergrün, fr. pervenche, e. periwinkle (v. pervinco überwinde — nämli. d. Winter), s. Vinca L., z. B. latifolia Garid. s. major Lam. (Vinca maj. L.) u. minor Lam. (Vinca min. L.).

Petalanthae Endl. „Kronblütige“, Primelblütige (πέταλον Kronblatt, ἄνθη Blüte — diese aus einem Kronblatt bestehend od. ganz!).

Petalostēmon DC. (-mum Rich., Mchx.) (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Kronenfaden“ Perring, „Kronblattfaden“ (πέταλον Kronblatt, στήμων d. Faden, lat. stamen — d. Kronblätt. m. fadenf. Stiel-en), z. B. candidus u. violaceus DC., s. Dalca L.

Petasītes T., G. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) Pestilenzwurz, fr. pétasite, chaperonière, e. butterbur od. lag-wort (pestilence-) (gr. πέτασις v. πέτασος Sonnenhut, eine schirmblättr. Pfl.!), wild P. officinalis Fl. Wett. (Tussilago Petasites L.) u. v. hybridus (Tuss. hybrida L.), Zier. P. nivēus Baumg.

- 1) **Petasostylis** Griseb. (Stypheliaceen, V. 1) „Hutgriffel“ (πέτασος Krempenhut, στυλίζι; Griffel), z. B. nigrescens Van Houtt., s. Lisanthe R. Br., Dietr. 2) **Petasost.** (fehlerh. Petalost.) Lindl. (Gentianeen, V. 2), s. Omphalostigma Griseb.

Petesia L., Bartl. (Rubiace. Cinchonaceen, IV. 1) „Flügel“-China, Kratz-od. Kranzbeere, fr. pétésie (Ptesia Sw.) (v. πέτασαι u. πτάσαι od. πτῆμα fliege), z. B. P. Lygistum L. (Manettia Lyg.), carnæa Forst. (B.) etc.

Petilium L. (Liliaceen, VI. 1) Kaiserkrone (πετάλιον od. -ήλιον Blattschirm — Blattschopf üb. d. Blume!), P. imperiale L. = Fritillaria imp. L.

- 1) **Petroselīnum** Hoffm. (Umbellifer., V. 2) „Petersilie“, fr. persil, e. parsley (v. πέτρος Fels u. σίλιον Silje), geb. P. sativum Hoffm. (Apium Petrosel. L.). 2) **Petros.** (Peucedanum sect. Rchb.), z. B. Chabraei Rchb., austriacum Koch etc., s. Oreo selīnum Hoffm., e. mountain-parsley.

Petunia Juss. (Solaneen, V. 1) „Petunie“, Tabaksblume Rmpl. (n. d. brasili. petun „Tabak“), Zier. P. violacea Lindl. m. v. v. (Nierembergia punicea Hort., Pet. mirabilis Rchb. s. phoenicea Lindl.), P.

nyctaginiflōra Juss., fr. P. blanche, - à fleurs odorantes, P. hybrida Hort. m. v. v. Bastard-P., hybr. superbissima Hort., s. Nierembergia R. P.; Salpiglossis integrifolia L. Nicotiana nyctaginiflōra autt.

Peucedānum Koch (Umbellifer., V. 2) Haarstrang, Sau- od. Rossfenchel, fr. peucédane, e. sow-fennel (hog's-), hair-strong (hare's-), sulphur-wort, hog's-root (gr. πευκεδαρός i. q. πικούς bitter, Wtst.: πεύκη Fichte, δαρός niedrig (?), vielm. ausgetrocknet!), Wies. P. officinale L. etc., s. Selinum, Cnidium etc. — Peucedanēae Rehb.

Pezīza Dillw. (Pilze, XXIV. 4) Becherpilz, Napfmorchel, fr. pezize (v. πέζης Stiel od. πέζης ein gestielt. Pilz, Plinius Peziae = Lycoperdon Bovista), z. B. lentiféra, fr. porte-lentille, etc.

Phāea L. (Leguminos. Astragaleen, XVII. 4) Berglinse, Knollenkraut (φάση Linsenfrucht), P. floridāna W. (Robinia vesicaria Jacq.) etc., s. Astragalus leontinus, oroboides etc.

Phacelia Juss. (Boragineen Hydrophylleen, V. 1) „Wasserbündel“, fr. Phacélie (gr. φάσελος, lat. fasciculus Bündel — d. Blüt. stehen in Bündeln, Wtst.), Zier. P. congesta Hook. (Hydrophyllum bipinnatifidum Mchx.), tanacetifolia Benth. m. v. fl. albo Hort., fr. ph. à feuilles de Tanaise, e. tansy-leaved Ph.

Phaēcasium Cass. (zu Crepis Rehb.) (Compos. Cichoriac. XIX. 1) Habichtskraut-Pippau M.-Rehb. (φαιάσιον schöne weisse Schuhe d. Gymnasiarchen in Athen, F. W. Riemer, ζογήτης, lat. Crepis = Schuh), s. Crepis pulchra L. s. Prenanthes hieracifolia W.

Phaedranassa Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Glanzkönigin“, Schminklilie (v. φαιδρός glänzend, ἄνασσα Herrscherin), z. B. chloracra u. obtusa Herb. (Peru), s. Phycella Lindl. (φυζος Schminke).

Phaius (-ios, -jus) Lour. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Fahl“- od. „Dunkelorche“ (φαιος schlummerig, dämmerig, fahl u. dunkel — Farbe d. Blüten), z. B. grandifolius Lour. (Pachyne spectabilis Salisb.) etc., s. Bletia R. P., Dendrobium Sw. etc.

Phalaearcea DC. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Kahl“-Leberbalsam (φαλαιρέα kahlköpfig — d. Achenen ohne Pappus! Wtst.), Zier. coelestina u. Wendlandii.

Phalaenopsis Blum. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Schmetterlings“-O. (φαλαινα, lat. Phalaena Nachtfalter, ψυσ Aussehen — Gestalt d. gross w. Blüten! Wtst.), Warmh. Schilleriana Rehb. f. (Philippin.), grandiflora Lindl. (Java) etc.

Phalangium T. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Spinnenlilie“, Zaunblume, fr. phalangère, e. spiderwort (gr. φαλαγγίου gift. Spinne u. Pfl. geg. deren Biss — weg. d. dünnen, langen Wurzelzweige! Wtst.), Zier. P. Liliago Schreb. (Anthericum Lil. L.), P. Liliastrum Lam. (Anther., Czackia Andr., Paradisia Bertol. Hemerocallis Liliastr. L.) unechte Affodil-Lilie, fr. lis des Allobroges od. Ph. faux-lis, P. ramosum Lam. (Anther. ram. L.) Erdspinnenkr., Sandgras- od. kleine Sand-Lilie, P. (s. Scilla) pomeridianum DC. californ. Seifenpfl. Leun., etc.

Phalāris L. (Gräser, III. 2) „Glanzgras“ (φαλαρίς Grasart, v. φαλαρίς glänzend — solche Samen! W.), Zier. P. arundinacea L. v. picta Hort., s. g. Bandgras, fr. roseau panaché, chiendent-ruban, ruban de bergère, geb. u. verwild. canariensis L. Canariengras (-hirse Grck.).

Phalloidē DC. Giftmorcheln od. Eichelpilze (Phallus sogl. u. εἰδομαι gleiche).

Phallus L., Mchx. (Pilze, XXIV. 4) „Eichel“- od. „Gliedpilz“, Giftmorchel, Giftschwamm Leun. (φαλλός Pfahl, männl. Glied, „Eichel“ — Ähnl. damit!), P. impudicus L., rubicundus Fr. (Satyrus rub-Bosc) (Carolina), conicus Müll. (Verpa c. Sw.) etc.

Phanerogamae L. „Deutlichblühende“ ($\varphi\alpha\nu\epsilon\varrho\circ\zeta$ sichtbar, $\gamma\acute{a}\mu\circ\zeta$ Ehe, in d. Bot. Blüte).

Pharbitis Chois. (Convolvulaceen, V. 1) „Bart“- od. Prunkwinde Rmpl. (gräzisiertes *barba* Bart! Wtst.: v. $\varphi\alpha\beta\eta$ Farbe (!?) — elegante bl., violette od. rote Blüten!), P. barbata od. barbigera Hort. s. limbata Lindl. (*Ipomoea* barb. Hort.) m. v. v. (z. B. *grandiflora* superba), P. Nil Chois. (*Ipom.* Nil Roth) (Südam.), Learii Lindl. (Ostind.).

Pharus P. Br., L., Schreb. (Gräser, XXI. 6) „Lappen“- od. Nervengras D. (v. $\varphi\alpha\sigma\omega\zeta$ Lappen, Hülle — Neger zu Kleidungsst.), z. B. *latifolius* L., P. Br. (Jamaica, Guiana), *aristatus* Retz. (*Zizania* Retzii autt.) ostind. Wasserreis.

Phaseum L., Dicks. (Moose, XXIV. 2) Glanz- od. Bartmoos, Ohnmund, fr. *phasque* (v. $\varphi\alpha\sigma\omega\zeta$ glänze — bez. d. Kapseln! Rabbst., Wtst.), z. B. *nitidum* s. *axillare* etc.

Phaseolus L. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) Bohne, „Fasel“ Rmpl., fr. *fève*, fasole, e. facele, phasel (gr. $\varphi\alpha\sigma\eta\lambda\circ\zeta$ od. $-\eta\lambda\circ\zeta$ Bohne u. Kahn — Ähnl. d. Samens damit!), Gart.: P. *multiflorus* L. türk. od. Feuerbohne m. v. v. *biocolor* u. *albiflorus* Hort., e. scarlet-runner bean, fr. haricot d'Espagne od. écarlate „Scharlachb.“, geb. ausserdem P. *vulgaris* L. gem. Garten- od. Stangenbohne, fr. haricot (des haricots verts Bohnengemüse, - confits au sel eingemachte), P. *nanus* L. Busch- od. Zwerg-B., fr. fèverole kleine Feldbohne.

Phegopteris Fée (Farne, XXIV. 1) „Buchen“- od. Eichenfarn, Tüpfelf-F. ($\varphi\eta\gamma\circ\zeta$, lat. *fagus* Buche, aber auch Eiche, $\pi\tau\epsilon\varrho\circ\zeta$ Farn), z. B. *polypodioides* Fée (Polypodium Phegopt. L.), *Dryopteris* Fée „Eichenfarn“ Grck. ($\delta\eta\upsilon\zeta$, $-\iota\circ\zeta$ Eiche).

Phelipaea T. (Scrophularin. Orobancheen, XIV. 2) „Phelipaux“- Sommerwurz (n. d. beid. franz. Marine-Beamten Louis u. Jerome Phelipaux ben.), z. B. Ph. (s. Orobanche) *lutea*, *coerulea* C. A. Mey., *coccinea* etc.

Phellandrium T., L. (sc. Oenanthe) Lam. (Umbelliferen, V. 2) Wasserpfeffern, Rosskümmel Grck., fr. phellandre (irrtüml. ciguë aquatique Wasserschierling, *Cicuta virosa* L.), P. *aquaticum* L. (Oenanthe aquat. Lam.) m. v. *conioideas* Nolte, Grck. (v. $\varphi\epsilon\lambda\lambda\circ\zeta$ Kork? od. $\varphi\eta\lambda\circ\zeta$ betrüge? $\alpha\eta\eta\circ\zeta$, $-\delta\eta\circ\zeta$ Mann? Krause: st. *Philydron* „Wasserliebhaber“, Wtst. — ungewiss!).

Phellodendron Rupr. (Terebinthac. Xanthophylleen, XXII. 5) „Korkbaum“ ($\varphi\epsilon\lambda\lambda\circ\zeta$ Kork, $\delta\epsilon\eta\delta\eta\circ\zeta$ B.), Zierstr. P. *amurense* Rupr. (Bstr. v. Amurland).

Phellos (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) „Kork“- od. Weiden-eiche, fr. chêne saule, e. willow-oak (s. eb.).

Philadelphus L. (Philadelphien, XII. 1) Pfauenstrauch, deutscher Jasmin, fr. Sérิงa (-gat) ($\varphi\iota\lambda\acute{a}\delta\epsilon\lambda\circ\zeta$ eig. Schwesternliebhaber, z. B. Ptolemaeus Philadelphus v. $\varphi\iota\lambda\omega$ liebe, $\delta\acute{a}\delta\epsilon\lambda\varphi\eta$ Schw., $-\circ\zeta$ Bruder, — geschwisterlich sich umfass. Zweige, Wtst.), P. *coronarius* L. gem. „Kronen“-Jasmin, Antoniblüh Vilm. (*Syringa suaveolens* Mnch.), fr. séringat commun, Sérิงa des jardins, e. garland Phil. od. mock-orange „Orangenspott“, m. v. v. (z. B. *grandiflorus speciosissimus* Hort. für Balkone), P. *latifolius* Schrad. s. *pubescens* Lois., P. *speciosus* Schrad. (*grandiflorus* Hort.), *grandiflorus* W. (*inodorus* Hortulan.), P. *inodorus* L. (*Syringa inod.* Mnch.), P. *floribundus* Schrad., fr. Sér. florifère etc. — *Philadelphacae* Don, Grck., -eae DC., Rchb.

Philesia Juss. (Liliac. Philesiaceen od. Smilaceen, XXII. 6) Lilienstrauch (v. $\varphi\iota\lambda\eta\circ\zeta$ Dieberei od. $\varphi\iota\lambda\eta\circ\zeta$ d. Lieben — liebl. Anblick), Zier. buxifolia Lam. s. *magellanica* Räusch.

Phillyrea L. (Phillyrea T.) (Sapotaceen Oleaceen, II. 1) Steinlinde,

fr. phillyrée, tillot (-lau) (gr. φιλόνεα od. -φίη Linde — ähnl. Blätter), z. B. latifolia, media etc. (Str. d. Mittelmeergeb.'s).

Philodendron Schott, Lindl. (Aroideen Callaceen, XXI. 3) „Baum-mörder“ (v. φιλῶ liebe, umarmen, δέρδων B. — töten B. durch festes Umschlingen!), Stuben: P. pertusum Kth., Selloum C. Koch (Sellowium Hort.), fenestratum Hort. etc., s. Monstera Ad., Caladium Vent. u. Arum L.

Phlogyne Haw. (Amaryllideen, VI. 1) „Weiberlieb“ (s. v. u. γυνὴ Weib), Zier. odōra Haw. (Narcissus odoratus W.), e. sweet-scented Narcissus.

1) **Philonötis** Sw. (Moose, XXIV. 2) „Nassmoos“ (s. v. u. νοτίς Nässe), P. fontana Sw. (Bartramia f. Sw.). 2) **Philonötis** (sc. Ranunculus) Ehrh. (Ranunc. XIII. 3 od. 7) blossgelber Hahnenfuss, s. Ranunc. sardous Crantz s. hirsutus Curt.

Philydrum Banks (Philydreen od. Juncaceen, I. 1) „Wasserlieb“, Wol-leniilie D. (v. ὕδωρ in compos. ὕδωρ [st. ὕδατος] Wasser u. φιλῶ liebe), Zimmerquar. P. lanuginosum G. (Garciana cochinchinensis Dietr.). — Philydræe Endl.

Philyra Klotzsch (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) „Philyra“-Wolfs-milch (n. Philyra, Oceanide u. Mutt. d. Chiron, Myth.).

Phlebodium R. Br. (Farne, XXIV. 1) „Aderfarn“ (v. φλέβωδης aderig — zahlr. veräst. Adern d. Wedel), z. B. Decorat. P. auratum R. Br. (Polypodium aur. L.).

Phlegmäcum Fr. (-tium Wst.), (Pilze, XXIV. 4) Schleimhautpilz (φλέγμα Brand u. Schleim, ἀξη Spitze — klebr. Manschette), s. Myxacium DC.

Phlegmaria (sc. Lycopodium) L. (Bärlappe, XXIV. 1) „Brand“- od. „Zünd“-Bärlapp (φλέγμα Brand, wie bei Selago — weg. d. Blitz-pulvers od. Hexenmehls aus Bärlapp).

Phléum L. (Gräser, III. 2) Lieschgras, fr. fléau (fléole) od. marsette (φλέως Theophr. Liesch, Wst.: v. φλέω fliesse — geg. Ohrenfluss!), z. B. P. pratense L. etc.

Phlomis L. (Labiaten, XIV. 1) „Flammenlippe“, fr. phlomide, sauge en arbrisseau „Strauch-Salbei“ od. sauge de Bethléhem (- de Jerusalem), auch Filzkraut Leun., Löwenschwanz Rmpl. (gr. φλούδη Wollkraut v. φλέω Flamme — früher zu Lampendochten), Garten: P. agraria Ledeb., Samia L., herba venti L. etc., s. Leucas Burm.

Phlox L. (Polemoniaceen, V. 1) „Flammenblume“, fr. u. e. phlox (gr. φλόξ, -γος Flamme — einige Arten sehr feurig! etc.), Garten: Drummondii Hook. m. viel. v. v., subulata L. s. frondosa Hort., setacea L. Rasen-Phl., nivalis Sw., decussata u. hybrida Hort. m. zahlr. v. v., verna Sweet, fr. printanier, maculata L. (latifolia Mchx., pyramidalis Sm. etc.) m. v. alba Hort. (candida Pers., suaveolens Ait.), paniculata L. (scabra Sw., undulata Ait. etc.).

Phoenix L. (Palmen, XXII. 3) Dattelpalme, fr. dattier (palmier d.), e. date-tree (gr. φοίνιξ, -ίδος Dattelp. u. Phönizier od. Purpur — im Lande Phöniziens wachsend), Stub. u. Treibh. P. reclinata Jacq. (Cap), farinifera Roxb. ostind. Sagopalme, silvestris Roxb. (Ostind.), dactylifera L. (Afr. etc.).

Phoenixopus Koch, Cass. (zu Prenanthes Rchb. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Phönixfuss“, Steinsalat, Mauerlattich Séub. (v. φοίνιξ Phönix, fabelh. Vogel u. Purpur — Blütenstiele rot), z. B. viminea s. decurrens Cass., ramosissima Rchb. etc.

Pholiota Fr. (-data!) (Pilze, XXIV. 4) „Schuppenpilz“ Kumm. (v. φοίλις, -ίδος Schuppe, φοίλιδωτος geschuppt — Manschette flockig, strahlig etc.!), z. B. mutabilis Fr., s. g. Stockschwamm.

Phormium Forst., Thb., L. (Liliac. Asphodelen, VI. 1) Flachsliile, neuseeländ. Flachs (φορμίον dem. v. φορμός Schilfkorb, Matte —

wozu verwendet etc.!), Techn. u. Zier. P. tenax Forst. neuseel. od. Schilfflachs, fr. lin de la Nouvelle Zélande, e. tough-flax-lily od. New-Zealand-flax, s. Chlamydæa tenacissima G.

Phorolōbus Desv. (Farne, XXIV. 1) Rollfarn (v. φορός tragend, λοβός Lappen — d. Fruchthaufen trägt d. zurückgerollt. Wedelrand), z. B. crispus Desv., s. Allosorus cr. Bernh. (Osmunda cr. L., Onoclea cr. Hoffm.).

Photinia Lindl. (Pomaceen, XII. 2) „Glanzblatt“-Weissdorn (v. φωτεινός glänzend — immergr. glänz. Bl.), z. B. serrulata Ldl. (Crataegus glabra Thb. s. Mespilus bengalensis Hort.).

Phragmidium Kze., Lk. (Brand-Pilze, XXIV. 4) „Fächerbrand“, „Querwandspore“ (v. φάγμα Scheidewand, εἰδομαι gleiche — Sinn unklar!), z. B. incrassatum Lk. (auf Rosen u. Rubus), s. Puccinia Pers.

Phragmites Trin. (Gramineen, III. 2) Schilfrohr (φραγμή zu Zäunen od. zur Wand dienlich — Gebr. z. Berohrung d. Wände!), P. communis Trin., s. Arundo Phragmites L., fr. roseau u. jonc, e. kex (kecks), reed, rush, gem. Teichrohr.

Phthora Crantz (Thora L.) (sc. Ranunculus) L. (Ranunculac., XIII. 7) Gift-Ranunkel (φθονός Verderben, Tod), s. Ran. hybridus Biria.

Phu DC. (sc. Valeriana) L. (Valerianen, III. 1) grosser Baldrian (Φούντονιsch. Name d. Baldrian n. F. W. Riemer, arab. fu!).

Phycēa (-kēa) Wallr. i. q. Algae Roth, Algen od. Tange (gr. φύκος lat. fucus Tang u. Schminke).

Phycella Lindl. (Amaryllideen, VI. 1) „Schminklilie“ (s. eb. — Blüt. wie geschnickt rot!), Zier. P. corusca Lindl., Herbertiana Ldl. u. ignea Ldl. (Chili), s. Amaryllis.

Phycomycētes de By., Ord. d. „Algenpilze“ od. Pilzalgen i. q. Myco-phycēae Ktzg. (s. eb. u. μύκης, -ητος Pilz).

Phygelius E. Mey. (Serophularineen, XIV. 2) „Sonnenflüchter“ (v. φύγω od. φεύγω lat. fugio fliehe, ὥλιος Sonne — liebt schatt. Stand), P. capensis E. Mey. (Cap.).

Phylīca L. (Rhamnaceen, V. 1) Heidenmyrte (φυλίκη Teophr. = Rhamnus Alaternus L. v. φύλλον Laub — immergrüne Blätter), Stuben: P. ericoides L. (Str. Cap), paniculata Wendl. etc., s. Chamaelea Burn. T.

Phyllamphōra Lour. (Nepentheen od. Aroideen, XXII. 13) „Blattkanne“, Kannenstrauch (φύλλον u. ἀμφορεῖς lat. amphōra Kanne — krugförm. Blattbildg.), s. Nepenthes Phyll. W.

1) **Phyllanthus** L. (Euphorbiac., XXI. 8) „Blattblume“, fr. phyllanthe (φύλλον Laub, ἄρθρος Blüte — dies. unmittelb. auf d. Blätt.), z. B. Emblica L. (Myrobalanus), squamifolius Spr. (Nymphaanthus sq. Lour.).

2) **Phyllanthus** Miq. (sc. Cactus L. s. Opuntia Endl.) (Cacteen, XII. 1) „Blattstengel“-C., s. Epiphyllum Haw.

Phyllis L. (Rubiace. Cinchonaceen od. Umbelliferen, V. 2) „Blatt“- od. „Laubdolde“, s. g. schöne „Phyllis“ (Φύλλις Personennamen v. φύλλον Laub — besond. schönes Laub!), P. Nobla L. (Str. Canar. Ins.), fr. phyllis, s. Bupleuroides Mnch. u. Valerianella canariensis frutescens, simpla Nobla dicta Dill.

Phyllocactus Lk. (Cacteen, XII. 1) „Flügelcactus“, s. Cactus alatus Hort. (φύλλον u. Cactus), Stuben: P. Ackermannii (Mex.), grandis Lem. (Antill., Guian.), anguliger Lem. (Mex.) etc., s. Phyllanthus Miq.

Phyllocladus Rich., Spach (Taxaceen, XXII. 12) „Blattzweigbaum“, „Blattästler“ Perring (φύλλον u. κλάδος Ast od. Zweig — dieser platt, wie ein Laubblatt!), Zier. P. stricta Spach = Thuja s. Biota orientalis L., Don morgenländ. Lebensbaum, Treibh. P. rhomboidalis Rich., trichomanoides R. Br. s. asplenifolius Lab. (Neuholl.).

- Phyllodoce** Salisb. (Ericaceen, X. 1) Blauheide Lauch. (*φύλλον* u. *δοξέω* halte dafür — Blätter liniensf. wie bei *Erica*!), z. B. *taxifolia* Sal. (*Andromeda coer.* L., *Erica c.* W.), s. *Menziesia* Juss., Sm.
- Phyllostegia** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Blattdecktblume“ (s. v. u. *στέγη* Decke — d. Kelchlappen blattartig), z. B. *dentata* u. *grandiflora* Benth. (Sandwichs-Ins.), s. *Prasium* gr. Gaudich.
- Physalis** L. (Solaneen, V. 1) „Blasen“- od. Judenkirsche, Schlutte, fr. coquerette, cerise d'hiver, lanterne etc., e. winter-cherry, morel-berry (-cherry) (v. *φύλλα* u. *φυσαλίς* Blase — Beere in d. blasenart. aufgetr. Kelch!), z. B. wild u. Zier. P. *Alkekengi* L., cult. P. *edulis* s. *peruviana* W. (*Atropa* ed. Hort.), s. g. Ananaskirsche.
- Physocarpos** Camb., DC. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Blasenfrucht“, -spirae (zu *Spiraea* Rchb., Rmpl.) (s. eb. u. *ζαρπός* Frucht — d. Kapsel häut. aufgeblasen!), z. B. Sp. *opulifolia* L. u. *amurensis* Rupr.
- Physostegia** Benth. (Labiaten, XIV. 1) „Blasenkelch“, fr. physostegie (s. v. u. *στέγη* Decke etc. — d. Kelch blasig aufgetrieb.), Zier. *virginiana* Benth. m. v. *speciosa* Bth. u. *nana* Hort., fr. Cataleptique, e. virginian Ph., *imbricata* Hook. (*Dracocephalum imbr.* Hort.) (Tex.).
- Physurus** C. Rich. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Blasenschweif“-O. (s. v. u. *οὐρά* Schwanz — Labell m. Hodensackspore), s. *Anoectochilus* Blum.
- Phyteléphas** Rz. Pv. (Calycantheen od. Pandaneen, XXII. 12) Elfenbeinuss, s. g. vegetabil. Elfenbein, Elephanten-Palme (*φυτόν* Pflanze, *χειρός* Elephant u. Elfenbein — d. harte w. Same als vegetab. Elfenbein!), P. *macrocarpa* R. P., s. *Elephantusia* m. Mart.
- 1) **Phyteuma** L. (Campanulaceen, V. 1) Waldrapunzel, Triftwurz O. W., Teufelskralle (gr. *φύτευμα* Dioscor. kräftigende Pflanze, als Aphrodisiacum), z. B. *spicata* L. (*spicatum* L. u. *nigrum* Schmidt s. *Rapunculus* L., Pers.). 2) **Phyteuma** (sc. *Reseda*) L. (Resedaceen, XI. 3) kleine Resede M.-Rchb. 3) **Phyt.** (sc. *Lobelia*) L. Rapunzel-Lobelie.
- Phytoeréne** Wall. (Urticaceen od. Menispermen, III. 1?) „Quellenstrauch“ (*φυτόν* Pfl., *ζώην* Quelle — lief. durch Anbohren milden Saft!), z. B. *gigantea* u. *borneensis* Becc.
- Phytolacca** T., L. (Aizoideen Phytolacceen, X. 5) Kermesbeere, amerik. Scharlachbeere, eig. „Pflanzenlack“, fr. phytolaque, teinturier, raisin d'Amérique, e. scarlet-berry, kermes-, ten-stamened-Foxgloves (s. v. u. *lacca* Lack — d. Beere lief. rote Farbe!), P. *decandra* L., *dioeca* L. (B. Südam. — bella sombra span.). — Phytolaccæ Rchb.
- Picea** D. Don, Lk. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Tanne, „Pechtanne“, Edeltanne Rmpl., fr. sapin, e. pitch-tree od. spruce-fir (v. pix, -cis Pech), z. B. P. *alba* Lk. echte, deutsche Edel- od. Weisstanne, s. *Abies alba* Mill. (*Pinus Picea* Duroi, *Abies pectinata* Lam., DC.), fr. sapin blanc etc., e. combe-like-leaved Silver-Fir, Zier.: v. v. *Rinzii* s. *metensis*, pendula etc., P. *balsamæa* Loud. (Canad.) nebst v. *Fraseri* Loud., P. *Nordmanniana* Loud. (Kauk.), P. *Pinsapo* Loud. span. Tanne, P. *Pichta* Loud. sibir. Tanne, *cephalonica* Loud. (Apolinæs Planch.), *Reginae Amaliae* Heldr. (peloponnesiaca Hort.), *nobilis* Loud., *amabilis* Loud., *grandis* ds., *lasiocarpa* Lindl. (*grandis* s. *Parconis* Hort.) (N.-W.-Amer.), Pindrow Royle, Himalaya-Tanne, P. *firma* Sieb. u. Zucc., *Webbiana* Lindl. (Japan).
- Pichta** (sc. *Picea* Loud., sc. *Abies* Forb.) sibirische Edeltanne, s. eb. (v. d. russ. picht. engl. pitch Pech).
- Picerëus** Ness. (Cyperaceen, III. 1) „Bittersimse“ (*πικρός*; bitter), z. B. *nitens* Nees.
- Pieris** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Bitterkraut“, fr. pieride (*πικρίς*, -*ίδης*; v. *πικρός* s. eb.), s. *Crepis* L.

Piléa Lindl. (Urticaceen, XXI. 4) „Hut“-Nessel, „Haarnessel“ Perring v. *πῖλος* Filzhut, Kappe, nicht v. pilus ein Haar — d. weibl. Blüte m. ein. kappenf. Kelchklappe, z. B. callitrichoides Lindl., muscosa Ldl., serpyllifolia Wedd. (*Urtica serpyllacea* Kth.) etc.

Pilocarpus Vahl (Rutac. Diosmeen, V. 1) Schleuderfrucht D. (s. eb. u. *ζαοτός* — d. Endocarp löst sich ab u. springt elast. in zwei Lappen auf), z. B. pinnatifolius u. racemosus Vahl (Str. Westind.), s. Euvénymus latifolius racem. Plum.

Piloceréus Lem. (Cacteeen, XII. 1) Hut- od. Kugel-Kerzenactus Rmpl., „Haar“- od. „Vliess“-Kerzenactus (v. *πῖλος* Filzhut od. auch v. d. lat. pilus Haar u. Ceréus Säulen- od. Kerzenactus), z. B. Houlletianus Lem., chrysomallus Van Houtt., etc., s. Cephalocerasus Pfeiff.

Pilogyne Schrad. (Cucurbitaceen, XXI. 10 od. XXII. 3) Kugel- od. „Hutgriffel“, -, Stempel“ (s. v. u. *γυνή* Weib, Bot. Stempel — kopfförm. hutförm. Narbenklappen!), z. B. suavis Eckl. (*Bryonia scabra* Thb.).

Pilophóra Jacq. (Palmen od. Pandaneen, XXI. 5—10) Mützen-, Muff- od. Netzpalme (s. v. u. *φούσις* tragend), P. sacciféra Jacq., s. Manicaria sacc. G. sacktrag. Netzpalme, auch vegetabil. Elfenbein (vgl. Phyteléphas).

Pilosella Koch (zu Hieracium L.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Mäuseohrlein-Habichtskraut, fr. piloselle, oreille de rat (dem. v. pilosus haarig — Behaar. d. Blätt. u. Stiele!).

Pilularia L. (Marsiliaceen od. Wasserfarne, XXIV. 1) „Pillenfarn“, fr. pilulaire, mousse dorée (v. pilula Pille, dem. v. pila Ball — Sporangien wie Erbsen od. Pillen!), P. globuliféra L.

1) **Pimelaea** Sm. (-léa Banks, -lia Forst., Sm.) (Thymeläaceen, II. 1 od. X. 1) „Fett“- od. „Schmeer“-Seidelbast, neuholl. Glanzstrauch Schmidl. (v. *πιμελή* Fett, Schmeer — fett- u. harzreich!), P. decussata R. Br., rosea ds., laevigata G. (*Passerina prostrata* L.), P. Gnidia Sm. (*Banksia* Gn. Forst.). 2) **Pimela** Lour. (Sapindac. od. Terebinthaceen, XXII. 5) Schmeer-Canarienbaum, Schmeer-Copal, P. nigra Lour., s. *Canarium Pimela* W. (*Cossinia borbonica* DC.).

Pimenta Lindl. (Myrtaceen, XII. 1) „Pimentpfeffer“-Strauch, fr. piment, poivre de la Jamaïque, e. cod-pepper, pimento (-ment) (v. d. span. pimento, indianischer Pfeffer), s. Myrtus Pimenta L.

Pimpinella L. (Umbelliferen, V. 2) Bibernelle, fr. pimprenelle, e. burnet od. pimpnell (-pinell) (*pimpinella* st. *bipinnula*, „doppelfiedelige — bez. d. Blätter), z. B. alba s. *Saxifraga* L. Stein- od. Bockspeterlein, fr. persil de bouc, boucage, P. *Anisum* L. „Anis“, fr. l'anis, s. *Tragium Anisum* Lk.

1) **Pinardia** Cass. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Pinardie“ (n. Pinard, Vorst. d. bot. Gartens z. Rouen), z. B. coronaria Less. (Wallis, Veltlin). 2) **Pinarda** Fl. Flum. (Scrophularineen).

Pinaster Clus. (sc. *Pinus*) Sol., L. (Coniferen, XXI. 9) Sand-, Strand- od. Bordeauxkiefer, Terpentinkiefer Vilm., Büschelk., fr. pinastre, pin maritime od. de Bordeaux, e. cluster-pine, pinaster-pine, s. *Pinus maritima* Poir. s. *syrtica* Thore (deter. v. *pinus* Kiefer).

Pinceneectia (-netia) DC. (Bromeliaceen, VI. 1) „Pincenetie“, Keulenzunge (n. d. franz. Eigennamen Pincenect od. -net, Wtst.: viell. st. Freycinetia), Warmh. P. *glaucia* DC. (*Dasyliurum* gl. R. Br.), tuberculata Hort., span. Porra d. i. Keule (— weg. d. unten keulig erweiterten Stammes!).

Pinckneya Rich., Ait. (-néa Pers.) (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Pinckney's“-Chinatrauch (n. d. nordamer. Bot. Pinckney), Treibh. P. *pubescens* Pers. (*Südecarolina*).

- Piněa** (sc. *Pinus*) L. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Pinie“, Nusskiefer, fr. pignon, e. pinion (*pinēus* föhrenartig v. *pīnus* Föhre, Kiefer).
- Pinguicula** L. (Lentibularien, II. 1) „Fettkraut“, Butterschmeerwurz, s. g. Kiebitzfett G. Fr., fr. grassette, herbe grasse od. huileuse u. tue-brébis „Schaftod“, Wolff, auch langue d'oie u. sanicle à éperon (dem. v. *pinguis* fett).
- Pinites** Goepp. (foss. Conifer. Abietineen, XXI. 9) Bernsteinbaum, P. succinifer Goepp. (v. *pīnus* u. *succinium* Bernstein).
- Pinsapo** (sc. *Abies* Boiss. od. *Picea* Lindl.) (Conifer. Abietineen, XXI. 9) spanische Edeltanne Rmpl., fr. sapin d'Espagne, e. mount-Atlas-Cedar (zusamm. aus *Pinus* u. *Sapo*, franz. sapin Tanne), s. *Abies Luscombeana* Hort.
- Pinus** L., Lk. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Tanne, Föhre, Kiefer, fr. pin u. sapin, e. pine-tree u. fir (gr. *πίνος* od. *πύρος* Harz, Theophr. Tanne, lat. *pīnus*, v. d. celt. pin Berg), P. *sylvestris* L. Föhre, Forle od. Kiefer, fr. pin sauvage od. *sylvestre* (- d'Ecosse etc.), e. fir-tree, scotch-fir, bull-trout etc., m. v. *argentea* Hort., P. *Strombus* L. Weymouthskiefer, fr. pin du lord Weymouth, P. *virginiana*, fr. pin de Jersey, P. *austriaca* Höss. s. *nigra* Lk., P. *Taeda* L., fr. pin d'encens Weihrauch- od. Terpentin-Kiefer, *rigida* Mill., *excelsa* Hammilt. Trauerkiefer od. Kiefern König, fr. grand Pin du Népaul od. pleureur, e. lofty-pine, etc.
- Piper** L. (Piperaceen, II. 3) „Pfeffer“, fr. poivre (-vrier), e. pepper (gr. *πέπερι*, arab. babary, lat. *pīper*), z. B. *aggregatum* Berg. (*Lacistema myricoides* W.), *nigrum* L., fr. caméade wilder od. Bergpf., *longum orientale* L., fr. pimpelin od. pipot, P. *Cubēba* L., *Betle* L., etc. — *Piperacēae* Rich., -ītae DC., -īnae DC.
- Piptanthus** Sweet (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Fallblüte“, indisch. Zirkelhülsenbaum (zu *Anagyris* T.), A. *indica* autt. (v. *πίτανω* lasse fallen, *ἄπτω* — lässt beim Aufgehen d. Blume fallen).
- Piraster** Wallr. (sc. *Pirus*) L., Borkh. (Pomaceen, XII. 4) Wild- od. Holzbirne, fr. poirier commun, s. *Pirus Achras* G. s. *communis* L., Zier. v. v., z. B. fl. pleno Hort. (deter. *pirus* Birnb.).
- Pirola** T. (Pyröla L.) (Ericaceen Pirolaceen, X. 1) Wintergrün, fr. pirole, e. winter-green (dem. v. *pīrus* Birnbaum — Aussehen d. Blätter!), s. *Limonium* G. Fr. — *Pirolacēae* Lindl.
- Pirus** Grck. (bess. als *Pýrus* L.) (Pomaceen, XII. 4) Birn- u. Apfelbaum (v. *pīrum*, fr. poire Birne od. *pīrus*, fr. poirier Birnbaum, nicht v. *πύρος* Weizen), P. *communis* L. u. P. *Malus* L. Holzbirnu. Holzapfelbaum, fr. poirier u. pommier-sauvage, e. wild pear- u. crab- od. wild-apple-tree; Zierb. P. *nivalis* Jacq., fr. poire de neige, e. snowy-leaved-pear-tree, P. *sinensis* Lindl. (*sinica* Royle, *communis* Lois.), fr. poirier de la Chine, e. chinese p.-tr. m. v. v., P. *baccata* L. (*Malus baccata* Desf.), fr. pomme baccifère od. - de Sibérie, e. siberian crab m. v. v., P. *spectabilis* L. Ait. Prachtapfelb., fr. pomme-fleuri, e. showy-flowering wild apple tree od. chinese crab-tree.
- Piscidia** L. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Fischtod“, -fänger, fr. bois-ivrant (v. *piscis* Fisch u. caedo in compos. -cido töte — Anwend. d. Wurzelrinde z. Fischfang), z. B. *carthagenaensis* L. (*Carthagenen.*, Südamer.), *longifolia* W. (*Aeschynomene* l. Cav.).
- Piscipula** Loeffl. i. q. *Piscidia* L. (s. eb. — *piscis* u. *capio* fange).
- 1) **Pisonia** L. (Ebenaceen Styraceen, XXIII. 2) „Piso's“-Ebenholz (n. W. Piso, Arzt bei Moriz v. Nassau 1634—41), z. B. *aculeata* L., fr. liane épineuse, P. *inermis* L., *buxifolia* Rottb., s. *Ferreöla* s. *Maba bux*. 2) **Pisonia** Rottb. (Nyctagineen, V. 1) Pison's Wunderblume. — *Pisoniēae* (zu Nyctagineen) Rchb.

Pistacia L. (Terebinthaceen Cassuvieen, XXII. 5) „Pistazie“, Terpentin- u. Mastixbaum, fr. pistache (-chier), e. pistachio-nut (-tree) u. pistake-tree (arab. fustaq, gr. πίσσα Harz u. ἀξέομαι helfe), P. Terebinthus L. (Str. Südeuropa), vera L. Pistaziennuss, fr. noix de pistache (Orient), P. Lentiseus L. Mastixb. (Orient), fr. manne du Libanon od. mastichine.

Pistia Jacq. L. (Hydrocharideen od. Aroïdeen, XIII. 6) Muschelblume gr. πιστίς getränk — wässer. Standort!), P. stratiotes L. Wasserwegerich, s. Plantago aquatica Rumph.

Pistillaria Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Stempelpilzchen (v. pistillum Pistill od. Stempel — keulenförm.), z. B. micans, muscicola Fr. etc.

1) **Pisum** L. (Leguminos. Vicieen, XVII. 4) Erbse, fr. pois, e. pea (Pl. pease) (gr. πίσον v. d. celt. pis), geb. P. sativum L. Feld-, Schoten- od. Brech-Erbse Grck. m. v. v., fr. pois verts od. en cosse, Abänd.: P. arvense L. Zucker-E., fr. p. sans cosse od. goulu, e. sugar-plum, Ackererbse, fr. petits-pois, Früherbse, fr. pois Michaux, etc. 2) **Pisum** (sc. Ulva) L. (Algen, XXIV. 3) Watt-Erbse, fr. poisson-marin.

Piteairnea l'Hér. (-ia Ait.) (Bromeliaceen, VI. 1) „Pitcairn's-Schmarotzer-Ananas (n. W. Pitcairn, Prof. in Edinburg, † 1713), P. latifolia Ait. (Antill.), staminæa Lodd. u. splendens (Bras.), flavescens Bak. (Cochliopetalum flav. Bew.).

Pittosporum Sol., Banks (Pittosporeen, V. 1) „Pech“- od. „Klebsamen“ (πίττα Pech, σπόρων Samen — dies. harzig!), Stuben: P. Tobira Ait. s. chinense Don, span. Azahar de la China Orangenblüte v. China, coriacéum Ait. (Str. Canarische Ins.), viridiflorum Sims, etc. — Pittosporaceae DC.

Placæa Miers (Amaryllideen, VI. 1) „Blumenbank“-Narzisse (v. πλάκη, -αζος Blumenbank, Wtst.: chilen. Name!), Zier. P. Arzae, grandiflora Lam. (Chili).

Plagiochila Dum., Nees (Lebermoose, XXIV. 3) „Schräglippe“, Stutzkelch Leun. (πλαγιός schräg etc., χειλός Lippe — Mündung des Involucells schräg abgest.), z. B. asplenoides Nees.

1) **Planéra** Gm., Mehx. (Urticaceen od. Ulmaceen, IV. 2) „Planersbaum“ (n. d. Prof. Planer zu Erfurt, s. d. Aut.), Zier. P. carpini-folia Wats. (Richardi Mehx.) (Kaukas.), aquatica Gm. (ulmifolia Mehx.), s. Anonymus aq. Walt. (Carolin.). 2) **Planéra** Gies. (Scitamineen, I. 1).

Plantago L. (Plantagineen, IV. 1) Wegerich, Wegbreit Leun., fr. plantain, e. plantain, waybroad (v. planta Fussohle — womit plattgetreten! nicht Linné v. planta Pflanze u. tango fühle an).

Plasmodiophora Woron. (Schmarotzerpilze, XXIV. 4) „Plasmodiumträgerin“ (Plasmodium Schleimkörper, φορός tragend), z. B. bras-sicæ Wor. Kohl-Klauenkrankh. Rmpf.

Platanthéra Rich. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Breitkölbchen“, Threm (Trethm) O. W. (πλατύς breit, ἄρθρον Staubbeutel — platte Antherrhenschnäbelchen!).

Platanus L. (Amentac. Plantaneen, XXI. 9) „Platane“, Sykomore Rmpf., fr. u. e. platane, e. plane-tree (gr. πλατανός v. πλατύς breit — weg. d. Blätt. u. Baumkronen), Zier: P. vulgaris Spach (occidentalis u. orientalis L.) m. viel. v. v., s. g. Kleiderbaum (— weg. Abwerfens d. Rinde!), P. orientalis L. (orient. verus Duh.) u. P. acerifolia Ait. (P. vulg. Spach, v. acerifol. Spach s. orient. Ait., intermedia Hort.). — Platanæae Rehb., -nacæae Lestib., Grck.

Platycapnos Bernh., DC. (zu Funaria L.) (Fumariaceen, XVII. 2) „Breitfrucht“-Erdraunch (s. v., καπνός Rauch), z. B. spicatus Bernh.

- Platycarya** (nicht -*caria*) v. Sieb. u. Zucc. (Juglandeen, XXI. 8) „Platt“- od. „Breitnuss“ (s. v., *zðovor* Nuss — Steinfr. flach gedrückt!), z. B. *strobilacea* S. Z., s. *Fortunaea* Ldl.
- Platyceratum** Rich. (zu *Arabis* Rchb.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Breithörnchen“ (*zéqatíor* dem. v. *zéqaz*, -*toz* Horn), z. B. *alpina* u. *crispata* W.
- Platycerium** Desv. (Farne, XXIV. 1) „Breit“- od. „Platthorn“, Geweihfarn Perring (s. v. u. *zépos* Horn — wie Elenngeweih, schaufilig!), Warmh. u. Ampel: *alcicorne* Gaud. „Elenhnshorn“, s. *Neuroplatyceros* Presl.
- Platyéodon** DC. (Campanulaceen, V. 1) „Breitglocke“, Pracht- (s. v. u. *zúðwɔr* Glocke), z. B. *grandiflora* DC. (*Wahlenbergia* s. *Campnula* gr. Hort.).
- Platylöbium** Sm. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Blattschote D., „Breit“- od. „Platthülse“ (s. v., *λόβιον* dem. v. *λοβὸς* Hülse — diese flach zusammeng.), z. B. *formosum* Sm. (Str. Austral.), latifol. Andr. (*Bossiae heterophylla* Sm.) (Neuholl.).
- Platyspermum** Hook. (-ma Hoffm.) (Umbelliferen, V. 2) „Breitsamen“ (s. v. u. *στέρωμα* Samen), z. B. *grandiflorum* M. u. K., s. *Caucalis* gr. L. (Daucus gr. Scop., *Orlaya* gr. Hoffm.).
- Plectocomia** Mart. (Palmen, VI. 1) „Haarflechten“-P., Stachelrankstamm Rmpl. (*πλεκτός* geflochten, *ζομη* lat. coma Kopfhaar — d. Staubfäden an d. Basis zusammenh.), z. B. *assamica* Griff., macrostachya Krz. etc.
- Plectogyne** Lk. (Acoraceen od. Liliac. Asparagineen, VIII. 1) „Korbstempel“, Erdschild, Schild- od. Wurzelblume (*πλεκτὴ* Korb, *γυνὴ* Weib, Stempel — Narbe sehr gross, korbförmig!), Stuben P. variegata Hort., s. *Aspidistra elatior* Decsn. v. varieg.
- Plectopōma** Van Houtt. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Korbbecher“, Deckelkapsel (s. eb. u. *πώμα* Becher, Deckel — Kapsel m. Deckel!), Warmh. *gloxiniaeflora* V. H., s. Achimenes R. Br.
- Plectranthus** l'Hér. (Labiaten, XIV. 1) „Hahnensporn“, Mottentod, -könig, Harfenstrauch Leun. (*πλεκτόν* Sporn, Stachel — Krone an d. Basis gespornt!), z. B. *fruticosus* l'Hér. (Str. Cap.), *Forskolaei* Vahl, etc., s. *Ocimum* u. *Colēus*.
- Pleēa** Rich. (-ia Mchx.) (Juncaceen, IX. 3) „Plée“-Blume (n. d. Bot. Plée, schr. Types de chaque famille etc., Par. s. 1844), z. B. *tenuifolia* Mchx. (Carolina) etc., s. *Anguillaria* R. Br.
- Pleurorrhizae** (sc. Cruciferae) DC. „seitenwurzl. Kreuzträger“ (*πλευροφόρη* Seite, *φύτα* Wurzel — bez. d. keimend. Samen!).
- Pleurospurum** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Rippensamen“, Hohlruppe Leun., Schlauchrippe Seub. (v. *πλευρά* Rippe, *στέρωμα* Samen — sehr starke Fruchtrippen!).
- Pleurothallis** R. Br. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Seitenblüt“-O. (s. v., *γάλλις* Zweig v. *γάλλω* wachse, blühe — d. Blüten stehen in d. Achsel des einen Stengelblatts!), z. B. *coccinea* R. Br. (*Rodriguezia cocc.* R. P.), *sagittifera* Kth. (*Notylia multiflora* Ldl.), etc.
- Pleurōtus** Fr. (Hautpilze, XXIV. 4) „Seitenohr“, Seitenstiel-P. Kumm., Drehling, P. *ostreatus* Fr. (s. v. u. *ořz*, *štroz* .Ohr — d. Hut sitzt zur Seite!).
- Plinia** L. f. (Amygdaleen od. Myrtac., XII. 1) „Pliniuskirsche“, Furchen- (n. d. röm. Nat. Plinius d. Älteren, † 79 n. Chr.), z. B. *crocēa* L. f., *pedunculata* s. *rubra* L. f., s. *Eugenia* autt.
- Plocăma** Ait. (Cinchonac. Coffeaceen, V. 1) „Zopfchina“, „Flechting“ D. (*χλόζαυος* Haarflechte etc. — herabhäng. verschlungene Zweige!), z. B. *pendula* Ait. (Str. Canar.), s. *Canthium* Lamb.

- Plocoglottis** Blum. (Orchideen, XX. 1) „Zopfzunge“ (v. *πλόζος* Strick etc., *γιώττα* Zunge — Labell an d. Bas. m. eingebogn. Falten an d. Columna gedr.), z. B. javanica Bl.
- Plocostemma** Blum. (Asclepiadeen, V. 2) „Flechtkranz“, -krone (s. eb. u. *στέμμα* Kranz — d. Nebenkrone wie gestrickt), z. B. lasianthum Van Houtt., s. Hoya las. R. Br.
- Plumbaginæae** Vent., DC., Rehb., -inacæae Grck., -ines Juss. Bleiwurzgew., s. Plumbago!
- Plumbago** T., L. (Plumbagineen, V. 1) „Bleiwurz“, fr. plombage (plumbage), dentelaire, malherbe, e. plumbing, plummet od. lead-wort (v. plumbum Blei u. ago führe — d. Wurzelfett ders. färbt d. Hände bleigrau), P. europea L. (*Tripolium* *Dioscoridis*), Zier.: rosea L. (Ostind.) m. v. coccinea (Thalia cocc. Lour., Plumb. cocc. Boiss.), P. Larpentae Lindl. (China) etc.
- Plumeria** L. (-miera T.) (Apocyneen, V. 1) „Plumier's“-Hundswürger (n. d. ber. Bot. Plumier), Zier.: P. rubra L. (St. Antill.), lutea R. P., mexicana Lodd. etc.
- Plutēus** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Sturmtdach“-P. (plutēus od. -ēum Schirm-dach), z. B. phlebophorus, pellitus etc., s. Agaricus L.
- Pneumonanthe** Schmidt (sc. Gentiana) L. (Gentianeen, V. 2) „Lungen“-Enzian, blauer Tarant, gross. Herbst-E., eig. „Lungenblüte“, fr. pulmonaire des marais, e. marsh-Gentian od. windflower-Gent. (*πνεύμων* Lunge, *ἄνθη* Blüte — geg. Lungenkrankh. u. bauchig aufgeblas. Krone).
- Poa** L. (Gräser, III. 2) Rispen- od. Viehgras, Rispelgras O. W., fr. pasturin „Futtergras“ od. poa (gr. *πόα* od. -η u. *ποία* Futter v. *πάνω* weide ab), Zier. P. trivialis L. v. variegata Hort., Wies. pratensis L., zwisch. Pflaster: annua L., etc., s. Glyceria u. Festuca. — Poacæe Endl. Rispengräser.
- Podagraria** Riv., Mnch. (sc. Aegopodium) L. (Umbelliferen, V. 2) gem. Geißfuss, Geier od. Giersch, „Podagra“- od. Fussgicht-Dolde, fr. herbe à Gérard, - à la goutte, podagine, pied de chèvre, e. gout-wort (v. *πούς*, *-όδος* Fuss u. *γραίω* nage etc.), s. Ligusticum Pod. Crantz.
- Podaliria** Dietr. (schlecht -lyria Lam.) (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Podalirie“, wilder Indigo (n. Aeskulap's Sohn Podalirius, gr. *Ποδαλίειος* Arzt d. Griech. vor Troja), z. B. australis Lam., e. southern wild-Indigo, P. alba W. (Sophora a. Ait., Crotalaria a. L., Anonis Mart.) (Carolina), auræa W. (Soph. aur. Ait. etc.) etc., s. Baptisia R. Br., Virgilia Cav. u. Sophora R. Br.
- Podocarpus** l'Hér., Rich. (Coniferen Taxaceen, XXI. 9) „Fussfrucht“, chines. Eibenbaum (*πούς*, *-όδος* Fuss, Stiel, Basis, *ζαρτός* Frucht — fleisch. verdickte Scheibe um d. Samen), z. B. Zier. taxifolius Hb. Bpl. (*Taxus* *montanus* W., Mex.), asplenifolius Lab. (Neuholl.), Koraiana v. Sieb. etc., s. *Taxus chinensis* u. Thalamia asplenifolia Lab.
- Podolépis** Lab. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Stielschuppe“ (s. v. u. *λεπιτή* Schuppe — d. innerst. Kelchschuppen gestielt), Zier. P. auri-culata Hort. s. chrysantha Endl., gracilis Grah. s. angustifolia Hort. m. v. v., affinis Hort., fr. P. à grandes fleurs, etc., s. Scalia Sims u. Stylolepis Gray.
- Podolobium** R. Br. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Fuss“- od. „Stielhülse“ (s. v. u. *λοβότον* dem. *λοβός* Hülse — diese gestielt), z. B. trilobatum R. Br. (Chorozëma trilöbum Sm.), scandens DC. etc., s. Pultenia Andr. u. Daviæsia Sm.
- Podophyllum** L. (Ranunculac. Podophylleen, XIII. 1) „Fussblatt“ Rmpl., Entenfuss, fr. podophylle, e. duck's-foot (s. v., *χυλλόν* Laubblatt —

Aussehn dess. wie ein Entenfuss), Zier. peltatum L., e. May-apple, s. Anadophyllum canadense Catesb., P. diphyllum L., s. Jeffersonia diph. Pers. — Podophyllacēae DC.

- 1) **Podosperma** Lab., Less. (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Stielsamen“ (s. v., στέγμα Samen — d. Achenien gestielt), z. B. pedunculare Rchb. (Craspedia pilosa Spr.) (Neuholl.), angustifolia Lab. (daselbst) etc., s. Podothēca Cass. 2) **Podospermum** DC. (zu Scorzonerā Rchb.) (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Stielsamen“—Scorzonere, z. B. laciniatum DC. u. octangulare Roth.

- 1) **Pogonia** Juss., R. Br. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Bart“—O. (τρόγων Bart — Label m. Kammbart), z. B. ophioglossoides Ker (Nordamer.). 2) **Pogonia** Andr. (Verbenac. Myoporineen, II. 1) „Bart“—Mäusefrass, z. B. debilis Andr. (Myopōrum d.) (— behaart. Schlund).

Pogostēmon Desf. (Labiaten, XIV. 1) „Bartfaden“, indisches Dosten, Patschoulipl. Rmpl., P. Patschouly Pellet. (Ostind.) (s. eb. u. στίγμων Staubfaden — diese mitten bebartet).

Poinsettia (-setta) Grah. (Euphorbiaceen, XI. 3) „Poinsettie“ (n. Poinette od. Poinsette, d. Entd. d. Pfl. in Mexiko), Warmh. u. Stuben: P. heterophylla Karw. (rotgipfelblättrig!), pulcherrima Grah., s. Euphorbia pulcherrima Grah.

Poñcia Neck. (-cina DC., -ciana Breyn., L.) (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Poinci's“—Cassie, fr. poincillade, fleur de paon (-de paradis), „Pfauenschwanz“ (n. de Poinci, Gouv. d. Antill. Mitte d. 17. Jahrh.'s), z. B. Gilliesii L. (Südamer.), bijuga Jacq. etc., s. Caesalpinia etc.

- 1) **Poiretia** Vent., Sm. (Leguminos. Onobrycheen, XVII. 4) „Poiret's“—Esparsette (n. d. franz. Bot. u. Reis. in d. Berberei Poiret), z. B. linearis Sm. (Hovea l., Coronilla l.), psoraleoides DC. (Turpinia montevidensis Spr.). 2) **Poiretia** Cav. (Epaerideen, V. 1) „Poiret's“—Felsbusch, P. cucullata Cav., s. Sprengelia incarnata Sm. 3) **Poiretia** Gm. (Gentianeen, V. 2) „Poiret's“—Enzian.

Polemonium L. (Polemoniaceen od. Convolvulaceen, V. 1) Speerkraut (nicht Sperrkraut!), Leiterblatt od. Jakobsleiter, fr. polémoine, valériane grecque od. bleue griech. Baldrian Rmpl. (v. πολέμως Krieg — speerart. Blätter! Wtst.: n. d. pont. Kön. Polemon ben.), Zier. coeruleum L. blaue Himmelsleiter Grck. od. Jakobsleiter, reptans L., e. creeping Jacob's-ladder, rubrum L. (Cantua coronopifolia) etc.

Polianthes (bess. Poly-) L. (Liliac. Hemerocallideen, VI. 1) „Vielblüt“—Lilie, s. g. Tuberose, P. tuberosa L., fr. tubéreuse des jardins, Jacinthe des Indes, e. tuberosa (Mex.), s. Amica nocturna Rumph. s. g. Nachthyazinthe (v. πολὺς viel, ἀρθη Blüte, nicht v. πόλις Stadt od. πολιος weisslich, Wtst. u. Rmpl. v. πόλις Stadt — Stadtblume, häufige Fensterbl. d. Städte!).

Pollinia L., Spr. (Gräser, XXIII. 1) „Pollini's“ Bartgras, Goldbart (n. d. Bot. Cyrillo Pollini, Prof. zu Verona), z. B. P. Gryllus Spr., depauperata ds., s. Andropōgon u. Homoplitis Trin.

Pollveria (sc. Pirus) W. (Pomaceen, XII. 4) „Pollwiler“ od. „Bollweiler“ Birne, Lazarol-, Hanbutten-, rote Honigbirne Vilm., fr. poirier cotonneux, e. Bollwyller Pear-tree (n. d. Dorf Bollweiler im Elsass, Wtst.: n. d. Bar. v. Pollwiller, in dessen Garten J. Bauhin d. Birne zuerst fand), s. Pirus Pollvilleriana Bauh. s. Pollvilla Gmel. (Pir. tomentosa W., irregularis s. auricularis Knoop u. Lazaröls P. Med.).

Polyadelphia L., XVIII. Kl. „Vielbrüderige“ (πολὺς u. ἀδελφός — in mehrere Bündel verwachsene Staubfäden!).

Polycarpīcae Endl., Bartl., -pēae DC. „Vielfrüchtler“ (s. v. u. πολύς Frucht — d. Blum. vielfrüchtig).

Polycarpon Löffl. (-um L.) (Portulaceen Paronychieen, III. 3) „Viel-

frucht“-Knaul, Nagelkraut (s. eb. — zahlr. kleine Früchte!), z. B. *magellanicum* L. (Donatia fascicularis Forst.).

Polyenēnum L. (Aizoideen Atriplicineen, III. 1) Knorpelkraut, Geferkraut. O. W. (*πολύζυγονον*) vielgliedrig — bez. d. Stengels).

Polygāla L. (Polygalaceen, XVII. 3) Kreuzblume, Ramsel O. W., eig. „Milch“- od. „Vielmilchkraut“, fr. laitier (lotier), e. milk-wort u. stire-wort (*τοῦν* viel, *γάλα*, *-τος* Milch — das Vieh sehr nährend!), Stuben: *P. latifolia* Ker., *cordifolia* W., Treibh. *grandiflora* Hook., *myrtifolia* L. etc. — Polygalaceae Rehb., -lēae Juss., DC., Rehb., -liniae Endl. Bitterlinge Leun.

Polygamia L., XXIII. Kl. „Vielehige“ u. Syngenesia Polygamia L., XIX. Kl. Vielblütige Syngenesisten od. s. g. Compositen (*πολὺν* u. *γάυος* Ehe od. Blüte — vielerlei Blüten auf einer Pflanze od. in einem Blütenkorb!).

Polygonātūm T., Desf. (Liliac. Smilaceen, VI. 1) Weiss- od. Schminkwurz, Gelenkwurz Rmpl., Vielgelenkblatt, Vielknoten-Maiblume, fr. grénouillet od. muguet sceau de Salomon, e. polygony od. Salomon's-seal, „Salomonssiegel“ (s. v. u. *γόνυ*, *-ατος* Knie — zahlr. Knoten des unterird. Stocks!), z. B. *multiflorum* All., *verticillatum* Mnch., *latifolium* Desf. m. v. fl. *pleno*, *vulgare* Desf. (Convallaria *Polygonatum* L.) m. v. *macranthum* (japonicum Hort.).

Polygōnum L. (Polygonaceen, VIII. 3) „Knöterich“ (nicht v. *πολύγονος* vielzeugend, sond. *γόνυ* Knie od. Knoten — viele Knoten d. Stengels!), fr. centinode u. rénouée, trainasse, e. knot-grass, z. B. *aviculare* L., fr. langue de passereau, e. knot-grass „Vogelknöterich“ od. s. g. Wegtritt, *P. Bistorta* L., e. snake-weed m. v. *latifolium* Hort., Gärt.: *P. orientale* L. (Persicaria or. T.) m. v. v., Zier. *P. acuminatum* Kth. s. *cuspidatum* v. Sieb. u. Zucc. (mächt., haselblättr. Zierstr. Japan's), fr. Réneau de Siebold, *P. amplexicaule* Don, sachaliense F. Schmidt; cultiv.: *P. Fagopyrum* L. „Buchweizen“ (s. d.). — Polygonaceae Juss.

Polymnia L. (Compos. Senecionideen, XIX. 4) Musenblume, „Liederreiche“ (n. *Polymnia* od. *Polyhymnia*, d. Muse d. Gesanges — Schönheit. d. Blume!), Zier. *P. Uvedalia* L. (Wedalia Mill.) (Carolina), s. *Didelta* Ait., *P. maculata* Cav. (Mex.).

Polypetāla Juss., Kl. d. „Vielkronblättrigen“ (*πέταλον*, lat. petalum Kron- od. Blumenblatt).

Polypodium L., Sw. (Farne, XXIV. 1) Tüpfelfarn, eig. „Vielfuss“-F., fr. polypode, e. polypody, male-fern (*πόδιον* dem. v. *πούς*, *-όδος* Fuss — weg. d. zahlr. Wurzelstücke der jährl. absterbenden Wedel), wild u. Zier. *P. vulgare* L. Eichenfarn, Engelsüss, m. v. v. (z. B. *cambricum* L. Tüpf. v. Wales), Stuben u. Gewächsh. *P. aurēum* L. (*Phlebopodium aur.* R. Br.), *morbillosum* (*Drynaria coronans* Bor.), *effusum* Sw. (Jamaika), *pectinatum* L. (Westind.).

Polypōgon Desf. (Gräser, III. 2) „Vielbart“- od. Bürstengras (δ πούρων d. Bart — dichtwollige, begrannte Spelzen!), z. B. *elongatus* Hb. Bpl. (Südamer.), *monspeliensis* Desf. (*Santia plumosa* Savi, *Agrostis panicā Host* etc.).

Polypōrus L., Fr., Mehx. (Pilze, XXIV. 4) „Löcher“- od. „Poren-schwamm“, Feuerschwamm, Zunderpilz (s. v. u. *πόρος* Durchgang, „Pore“ — unters. voller Poren!), *P. ignarius*, *fomentarius* etc. — Polyporē DC.

Polysaceum DC. (Pilze, XXIV. 4) Erbsenstreuling Kunim. (*saceus* Sack), z. B. *piscarpum* wahrer E., s. *Polypēra* aut.

Polystichum Roth (Farne, XXIV. 1) Punktfarn, „Vielpunkt“ oder „-Strich“ (*στίχος* Reihe — Fruchthauf. in mehreren Reihen!), Zier.

- P. Filix mas Roth „Farnkrautmännchen“ m. v. cristatum Hort., s. Lastrea Presl, Nephrodium Stremmel (Polypod. *Filix* mas L.).
- Polytrichum** L. (Moose, XXIV. 2) „Haarmoos“, Widerthon, fr. polytric od. perce-mousse (*πολύτριχον* vielhaarig — Stengel u. Mützen!), z. B. commune L. — *Polytrichaceae* Schimp.
- Pomacēae** Rchb. (zu *Rosacēae*) Kernobst, Apfelfruchtartige (v. pōnum Apfel).
- Pomaderris** Labill. (-toderris R. u. Sch.) (Rhamnaceen, V. 1) „Kapselhaut“-Dorn (*πομαδία* Deckel, *δέρως* i. q. *δέρος* Haut — bez. d. Kapsel!), z. B. apetala Lab., candidans, elliptica etc. (Neuholl.).
- Pomariae** Lindl., Grck. i. q. *Pomacēae* s. v. (v. pōnum, pomarius d. Apfelobst betr.).
- Pombalia** Vand. (Violarieen, V. 1 od. XIX. 6) „Pombal’s“ Veilchenwurz (n. d. portug. Minist. Pombal, Marquis de Carvalho, † 1782), P. Ipecacuanha Vand., s. *Viola* s. *Ionidium* Ip.
- Pontederia** L. (Commelinaceen, VI. 1) „Pontederablume“ (n. d. Prof. Jul. Pontedera in Padua, † 1757), Treibh. *P. cordifolia* Mart. (Bras.), azurēa Sw. (Jamaica), lanceolata Nutt. (Südcarol.) etc., s. *Leptanthus* Mchx. u. *Heteranthera* R. P. — *Pontederiae* Mart.
- Populus** T. (Salicaceen, XXII. 7) „Pappel“, Belle, altd. Alber (e. abele-tree) Mej., fr. peuplier, e. poplar, wimote u. abele-tree (v. *παπάλλιον* zittere, zapple Leun., Wtst.: *populus* Volk — dess. Plappern nachahmend!), Zier. *P. nigra* L. m. v. *pyramidalis* Roz. (dilatata Ait., *italica* Ludw.), fr. lēard Schwarz- u. italien. od. lombard. *P.*, canadensis Mch. (*carolinensis* Mch. s. *moniliifera* Ait.), canad. od. Rosenkranz-*P.*, *hybrida* M. B., fr. grisaille (*canescens* Sm., *alba* Mill., *alba-tremula* Wimm.) *Grau-P.*, *alba* L. *Silber-P.*, fr. aubel, *tremula* L. *Zitter-P.*, fr. tremble, e. trembling-asp od. aspen-tree (Espe od. Aspe), *atheniensis* Ludw. (von Athens in Nord-Amer.) s. *tremuloïdes* Mchx. (*graeca* Ait.), *balsamifera* L. (*Tacamahaca* Mill.) echte *Balsami-P.*, fr. harame, nebst cordata Lodd. (*macrophylla* Lindl.) etc.
- Porana** Burm., L. (Convolvulac., V. 1) „Wander“-Winde (v. *πορεύομαι* wandere — erstreckt sich weithin, Wtst.: ostind. Name!), z. B. *volubilis* L. (ostind. Str.), *acuminata* P.-B. (Oware).
- Porcellites** Cass. (zu Hypochoeris Rchb.) (Compos. Cichoriae. XIX. 1) „Ferkelkraut“, fr. porcelle, salade de porc (*porcellus* Ferkel, dem. v. *porcus* Schwein), z. B. *brasiliensis* Less.
- Porlieria** Rz. Pv. (-ia Hb.) (Sapindac. Zygophyllum, VIII. 1) „Porlier’s“ Strauch (n. d. span. Gesandten in Indien Ant. *Porlier de Laxamar*), z. B. *hygrometra* R. P. (Peru).
- Porpax** Lindl. (Orchideen, XX. 1) „Griff“- od. „Henkel“-O. (*πόρπαξ* Handhabe — bez. d. Wurzelknollen!).
- Porphyrocōma** (-me) Hook. (Acanthaceen, XIV. 2) „Purpurschopf“ (*πορφυρόκομη* Purpur, *ζώνη* lat. coma Haarschopf — purp. Blütenschopf!), z. B. *lanceolata* Hort. (Warmh.).
- 1) **Porrūm** T. (sc. Allium) L. (Liliaceen Asphodelen, VI. 1) Lauch, „Porrée“, fr. poireau u. porreau, e. leek (gr. *πάρσον* lat. *porrum* v. d. celt. *pori* essen), cultiv. m. v. v. (z. B. *Porrée* v. Rouen, Erfurter P. etc.). 2) **Porrūm** (sect. v. Allium Rchb.), z. B. *ascalonicum*, vineale etc.
- Portlandia** P. Br., Schreb. (Rubiac. Cinchonaceen, V. 1) „Portlandie“ (n. d. Herzogin v. Portland, Correspond. v. J. J. Rousseau 1766—76), z. B. *coccinea* Sw., *grandiflora* L. etc.
- Portūla** Dill. (sc. Peplis) L. (Lythraceen, VI. 1) gem. Bachburgel Grck. (dem. porta Pforte — wie Portulak aussehend).
- Portulāea** T., L. (Portulacaceen, X. od. XI. 1) Fleischblatt, Burzelkraut, fr. pourpier, e. purslane (-lain) u. porcelain (v. porto führe,

lac Milch? Paxt., od. dem. porta Thüre — bez. abführ. Wirkung? od. latinis. Burzelkraut purslain? — ungewiss!), wild u. Gärt. P. oleracea L. Gemüse-Portulak, s. g. Kerbuzel, Zier. P. grandiflora Lindl. m. v. v., fr. chevalier d'onze heures (z. B. v. plena Hort. Portulakröschen). — Portulacaceae Rchb., -laceae Bartl., DC., Juss.

Posoqueria Aubl. (**Posoria** Raf.) (Rubiaceae Cinchonac., V. 1) „Posoqueria“-Chinastr. (aymara posoqueri d. Nam. ein. Art bei d. Galibis in Guiana), Warmh. P. formosa Planch. u. multiflora Ch. Lem. (kl. B. Südamer.), s. Solena W. u. Gardenia Spr.

Potamīcae Juss., Grck., -mögæae DC., **Potamogetonæ** Rchb. Laichkräuter (s. sogl.).

Potamogéton T., L. (nicht -gēton!) (Fluvialen od. Potamogenen, IV. 3) Laichkraut, Froschlattich, „Flussgewächs“, fr. potamogéton u. potamot, épi d'eau, e. pond-weed (v. ποταμός Fluss u. γέτος Verbaladj. v. γένω erzeuge, od. γείτων Nachbar?, fr. potamo-géton! — wächst in Wasser!).

Potamopitys Buxb. (Lythraceen Elatineen, VIII. 4) „Flussfichte“ (s. v. u. πάτητος Fichte), s. Elatine L.

Potentilla L. (Rosaceen Potentilleen, XII. 3) Fingerkraut, fr. potentille od. quinte-feuille „Fünfblatt“, e. cinque-foil od. five-leaved grass (v. potens, -entis mächtig — heilkraft. Leun. u. Wtst.), z. B. anserina L. Gänsekr. (Gänserich), e. wild-tansy, Zier. atrosanguinea Lodd. m. v. hybrida Hort., nepalensis Hook., grandiflora L., auræa L., fruticosa L. m. v. tenuifolia W. (floribunda Pursh) etc. — Potentillæ Rchb.

Poterium L. (Rosac. Sanguisorbeen, IV. 1) „Becherknopf“, Wiesenknopf, Bibernell (ποτήριον Becher — Gestalt d. Blümchen!), P. Sanguisorba L. (Sang. minor Scop. u. glaucescens Rchb.) (wild u. Küchengart.).

Pottia Ehrh. (Moose, XXIV. 2) „Pott's“ Moos (n. d. Zücht. Hofr. J. F. Pott in Braunschw., † 1805). — Pottiaceæ Schimp.

Preissia Cord. (Lebermoose, XXIV. 3) „Preissie“ (n. d. Prof. Balth. Preiss in Prag, s. d. Aut.).

Prenanthes L. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Nicksalat, Nicke O. W., Hasenlattich Grck., fr. laitue de muraille, e. pellitory (v. πογύρις lat. pronus übergeneigt, ἄρθη Blüte), z. B. purpuræa L.

Preptanthe Rchb. f. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schön“- od. „Anstandsblume“ (πρεπτός anständig etc., ἄρθη), z. B. vestita Rchb. f., s. Calanthe vest. Wall.

Primūla L. (Primulaceen, V. 1) „Primel“ od. Schlüsselblume, Himmelschlüssel Grck., eig. „Erstlingsbl.“, fr. primevère (dem. v. primus erster — im ersten Frühling!), P. veris L. „Frühlings“-Pr., fr. primevère, e. ox-lip, polyanthe (-thos), primrose, cow's-lip u. bird's-eye, Zier. P. Auricula L. m. v. v. „Aurikel“, elatior L. nebst veris L. m. v. v. Garten-Primeln, farinosa L. Mehl-Pr., fr. majale, acaulis Jacq. (grandiflora Lam.) m. v., Topfbl. chinensis Lindl. m. v. v. (z. B. fimbriata, kermesina u. filicifolia), Gletscher minima L., villosa Lap., nivalis Pall. m. v. turkestanica Pall. (Sibir.), cortusoides L. m. v. v. (z. B. amoena) u. a. — Primulaceæ Vent., DC., Grck., -læae (zu Lysimachiacæae) Rchb.

Princípes Endl. i. q. Palmae, „Edelbäume“ (princeps, -ípis Fürst).

1) **Prinos** (-us) L. Aquifoliac. Ilicineen, VI. 1) Kastanien-Stechiche, Winterbeere (gr. πρίνος Stechiche, lat. Ilex, v. πρίνω sage — stachlig-gesägte Blätter!), z. B. verticillata W. (Str. Nordamer.). 2) **Prinus** (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 5) Kastanien-Eiche Rmpl., fr. chêne Prin, e. chest-nut-white Oak.

- Prionium** E. Mey. (Juncaceen, VI. 1) Palmgras, -binse Rmpl.. Baum-binse, P. palmita E. Mey. (Cap.) (v. *πολύων* Säge — gesägte, schwertf. Blätter!), s. Juncus serratus Thb.
- Prismatocarpus** l'Hér. (Campanulac., V. 1) „Säulenfrucht“, Frauen-od. Venusspiegel Seub. (*πρίσμα, -ατος* Prisma, Säule, *καρπός* Frucht), P. Speculum DC. (Legousia arvensis Dur.), s. Campanula Spec. L. (Specularia Heist. Spec. A. DC.).
- Pritchardia** J. Linden (Palmen, VI. 1) „Pritchard's“-P. (n. Steph. F. Pritchard, s. d. Aut.), P. filifera J. Lind. s. filamentosa Mart. (Chili).
- Protœa** L. (Proteaceen, IV. 1) Silberbaum, -fichte, fr. protée, e. silverfir (v. Proteus, dem Gestalt wechselnden Meergott, Myth., Linné: ein wahr. Proteus!), Gewächsh. argentea L., acuminatea Sims, coccinea R. Br. etc. (immergrüne Capstr.). — Proteacæae DC., -tæae Juss., Rehb., -teinae Bartl., DC. Ord. d. Silberbäume, fr. protéoides.
- Protococcus** Ag. (Algen, XXIV. 3) „Urkorn“ (*πρώτος* erster od. Ur-, *ζόζος* Korn — gleichs. Anfang d. Pflanzenwelt!), P. nivalis Ag. „Schneepilz“ (Coccochloris niv. Spr.), viridis Crantz, s. g. Priestley'sche Materie. — Protococcacæae Endl.
- Protomycetes** Unger (Pilze, XXIV. 4) „Urpilz“ (s. eb., *μύκης, -ητος* Pilz), z. B. solani Wallr. Kartoffelkrätze, -gnatz. — Protomycetes Wallr., de By, DC. „Urpilze“.
- Protophyta** Endl. „Urpflanzen“ (s. v. u. *φυτὸν* Pfl.).
- Pruninopitys** Phil. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) „Spitzenfichte“ (*πονυρός* d. äusserste etc., *πέτυς* Fichte), P. elégans Phil.
- Prunella** L. (*Brunella* T.) (Labiaten, XIV. 1) „Brunelle“, Bräunenblume, Braunmälchen, Gottheil (— soll d. Bräune heilen!), fr. brunelle, e. prunel u. brunon (brown-wort) (dem. v. prunus Pflaume, — weg. d. Geruchs! od. brunus, fr. brun braun — braune Kelche! Wst.: pruna Glühkohle u. Bräune — geg. diese!), P. grandiflora Jacq. m. v. alba Hort.
- Prunophóra** Neck. i. q. Prunus, sogl. „Pflaumenträgerin“.
- Prunus** L. (Amygdalaceen, XII. 1) Pflaume, fr. prunier, e. plum-tree (gr. *προῦνος* lat. prunus v. pruina Duft — auf d. reif. Obst!), z. B. spinosa L. Schlehe od. Schwarzdorn, fr. prunelier, épine-noire, e. sloe u. black-thorn, auch german acacia, P. domestica L. s. oeconomica Borkh. gem. Pfl. od. Zwetsche, fr. prune ronde u. longue „Rundpflaume“ u. „Langpfl.“ (Zwetsche), P. insititia L. Haferpfl., Spilling, Bilse; P. avium L. Vogelkirsche, fr. merisier, P. Padus L. Ahl- od. Traubenkirschb., Faulb., P. Mahaleb L. Steinwechsel; Zier. P. Lauro-Cerásus L. „Kirschlorbeer“, P. lusitanica L. portugies. Lorbeer, trilöba Lindl. (Amygdalopsis Carr.) (China) etc.
- Psalliota** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Ring“- od. „Fesselohr“ (*ψάλλιον* Zaun, *οὖς*, *ωτός* Ohr — ringf. stehendbleib. Manschette!), Ps. campestris DC. (Agaricus c. L.) s. g. „Champignon“.
- Psamma** P.-B., R. u. Sch. (Gräser, III. 2) „Sandrohr“ (gr. *ψάμμην* Sand), s. Arundo arenaria L. (Ammophila Host).
- Psammisia** Van Houtt. (Gräser, III. 2) „Sandrohrgleiche“ (s. eb. u. *ἴος* gleich), z. B. sclerophylla V. H.
- Psathyra** DC. (Hutpilze, XXIV. 4) „Mürbpilz“ Kumm. (*ψαθυρος* zerreiblich etc.), z. B. cernua, fatua etc., s. Agaricus L.
- Pseud-Acacia** (sc. Robinia) L. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) unechte Akazie, Schotendorn, fr. faux-acacia, e. locust-tree (v. *ψευδος* Trug, in compos. pseud- od. pseudo-), Zier. v. inermis Dum. Kugel-Akazie.
- Pseud-Acorus** (sc. Iris) L. (Irideen, III. 1) Wasser-Schwertlilie, eig. „falscher Kalmus“, fr. flambe d'eau u. faux-Acore, lis de marais, e. water-flag, bastard-Acorus, flower-deluce (s. v.).

- Pseudo-Capsicum** (sc. Solānum) L. (Solaneen, V. 1) „falsche Beissbeere“, s. g. Korallenkirsche (s. v.).
- Pseudo-Narcissus** (sc. Narc.) L. (Amaryllideen, VI. 1) „unechte Narzisse“, s. g. Märzbecher, fr. campane od. faux-Narcisse (s. v.).
- Pseudo-Platanus** (sc. Acer) L. (Aceraceen, XXIII. 1) Berg- od. Waldahorn, gem. weiss. Ahorn, eig. „falsche Platane“, fr. fausse Platane u. érable Sycomore, e. mock-platane-tree, Sycomore, great maple.
- Pseudo-Strobus** u. **Pseudo-Tsuga** Carr. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) unechte Weymouthkiefer u. Douglastanne, Ps.-Ts. Douglassii Carr.
- Psidium** L. (Myrtaceen, XII. 1) Heilmalte, Guyave- od. Kujavebaum Leun., fr. gouyavier od. poirier des Indes (v. ψιδίς, -ιδός Brosame, ψιδίον Granatapfelb. — wohlschmeck. Fr.!), P. pyriférum L. Erdbeer-Guyave, aromaticum Aubl. Citronellbaum, sinense, Catleyanum Sab. rote Erdbeer-Guyave.
- Psilocybe** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Kahlkopf“-Pilz Kumm. (ψιλὸς kahl, κυβῆ Tassenkopf etc.), z. B. campanulata, coprophila etc.
- Psophocarpus** Neck. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Knallhülse“ (ψόφος Getöse, ζαρτός Frucht — zerplatzt m. ein. Knall!).
- Psoralea** L. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Schorf“- od. „Grindbohne“, Harzklee (ψωραλέος gründig — besond. Kelch drüsenhöckerig!), z. B. aculeata (Str. Cap), americana L. (Str. Madeira), P. Dalea L.
- Psychotria** L. (-ium P. Br.) (Cinchonac. Coffeaceen, V. 1) „Lebens“- od. „Heilchина“ (v. ψυχή Seele, Leben u. ὄτρεω erregt — wird nach P. Browne auf Jamaika als Kaffee gebr.), z. B. emetica Mut. schwarze Brechwurz Leun., pedunculata Sw. (Psychotrium fruticosum P. Br.) etc., s. Psychotrophum P. Br.
- Psyllium** T., Juss. (zu Plantago Rehb.) (Plantagineen, IV. 1) Flohsamen-Wegerich, fr. herbe-aux-puces, e. flea-wort (ψύλλιον Flöhkr. v. ψύλλα Floh — Ähnlichk. d. Samen damit!), s. Plantago Psyllium L. u. arenaria Waldst., Kit.
- Ptarmica** Neck., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Niesekraut“, Dorant, Bertram, fr. bouton d'argent, e. double-flowered-Goose-tongue (gr. πταῦμις Nieskr. — Niesen erregend!), Zier. P. vulgaris DC. v. fl. pl., Clavennae DC. (Achillaea Clav. s. argentēa Vis.).
- Ptelaea** L. (Rutac. Xanthoxyleen, IV. 1) Kleestrauch, Leder-, Geld- u. Hopfenbaum (gr. πτελέα Ulme v. πτηνή fliege — Fruchthautflügel!), Zier. trifoliata L. Kleebaum Vilm., fr. Ptélée à trois feuilles, e. shrubby-trefoil. — Pteleacēa Kth.
- Ptēris** L. (Farne, XXIV. 1), „Flügelfarn“, Saumf. Rmpl., fr. ptéride (πτεροί Farn, v. πτερόν Flügel — nämli. ausgebreit. Wedel!), z. B. aquilina L. „Adler“-F. (— östr. Doppeladler auf d. Querschnitt d. Stengels!), Zier. quadri-aurita m. v. argyreia (-aea Morr.) u. tricolor Lind., cretica L. m. v. albo-lineata, aspericaulis Wall. (Java), arguta Vahl (Canar.) etc.
- Pterocarpus** L. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) „Flügelfruchtbaum“, fr. ptérocarpe (s. eb., ζαρτός Frucht — d. kreisr. Fr. rund v. Hautflügel umgeben!), z. B. santalinus L. Santel- od. s. g. Jamaikaholz (Santalum rubrum Offiz.), P. Draco L. Drachenblut.
- 1) **Pterocarya** Nutt. (Juglandeen, XXI. 9) „Flügelnuss“ (s. v., ζάρων Nuss — angewachs. zweiflügl. Hölle!), Zier. P. caucasica C. A. Mey., s. Juglans pterocarpus Mchx. (fraxinifolia Lam.) u. Rhus obscura M. B., e. caucasian Pteroc. 2) **Pterocarpus** DC. (Polygalaceen, XVII. 3) (— Steinfr. m. Hautrandumgebung!).
 - 1) **Pterococcus** Pall. (Polygoneen, XI. 3) „Flügelkorn“ (s. v., κόνκος Korn — Kanten d. Nuss m. dopp. Hautflügel), z. B. aphyllus Pall., s. Pallasia L. (Calligōnum Pall., l'Hér.). 2) **Pterococcus** Hassk. (Euphorbiaceen, XI. 3 od. XXI. 1) (— d. vier Knöpfe d. Fr. geflügelt).

- Pterophyllum** Gingko Nels. (Cupressineen Taxaceen, XXI. 5) „Flügel-laub“- od. Gingkobaum (s. v. u. *φύλλον*), s. *Gingko biloba* L. (*Salisburia adiantifolia* Sm.).
- Pterospermum** Schreb. (Geranien Dombeyaceen, XVI. 7) „Flügelkern“ Leun. (s. v., *σπέρμα* Samen — dies. m. häut. Fortsatz!), z. B. *Pt. acerifolium* Schreb., s. *Pentapetes ac.Cav.* (*Dombeya* u. *Eriochlaena DC.*).
- Pterostyrax** v. Sieb. u. Zucc. (Styraceen, X. 1) „Flügelstoraxbaum“ (*πτερόν* u. *Styrax* — Fr. fünfflügelig), z. B. *hispida* S. Z. *steifhaar.* (Jap.).
- Ptychosperma** Lab., Scheff. (Palmen, XIII. 3) „Falten“- od. „Runzel-samen“ (*πτυχή* Falte etc., *σπέρμα* — Same kantig etc.), z. B. *Cunninghami* H. Wendl., gracile Lab.
- Ptychotis** Koch (zu *Crithämus Trag.*, Rchb.) (Umbellifer., V. 2) „Falten-ohr“ (*πτυξ*, -*ζος* Falte, *οὖς*, *ἄτος* Ohr — Frucht gerippt!), z. B. *heterophyllum* Koch (*Bunius Rchb.*) i. q. *Crith. saxifragus* Rchb. (*Seseli Sax.* L.).
- Puccinia** Pers. (Staubpilze, XXIV. 4) schwarzer Rost (n. Thom. *Puccini*, Prof. in Florenz), *P. graminis* Tul. Gras- od. Getreiderost, Brand, s. *Urēdo linearis* Pers. (Wintersporen) u. *Aecidium berberidis* Pers. (gelbe Sommersporen an Berberitzestr.).
- Pueraria** DC. (Legumin. Glycineen, XVII. 4) „Puerari's“- od. knollige Esparsette (n. M. N. *Puerari*, Prof. in Kopenhagen) *P. tuberosa* DC., s. *Hedysarum tuberosum* Roxb.
- Pulegium** Mill. (sc. *Mentha*) L. (Labiaten, XIV. 1) „Poley“-Minze, fr. menthe-pouliot, e. poly (-ley), penny-grass, pudding-grass, pulic, puliol (latinisiert poley; Wtst. v. *pulex* u. ägo vertreibe — soll d. Flöhe vertreiben), *P. vulgare* Mill. = *Mentha Pulegium* L.
- Pulicaria** G. (zu *Inula Rchb.*) (Compos. Inuleen, XIX. 2) „Flöhkraut“, Floh-Alant Seub., Dourian O. W., fr. pulicaire, e. flea-wort, penny-royal (v. *pulex*, -*cis* Floh — soll d. Flöhe vertreiben), *P. vulgaris* Mill. u. *dysenterica* Fl. Wett. s. *Inula* etc.
- 1) **Pulmonaria** T., L. (Boragineen, V. 1) „Lungenkraut“, fr. pulmonaire, herbe aux poumons, e. pulmonary, lung-wort u. lady's-glove (v. *pulmo*, -*onis* Lunge), Zier. *azuréa* Bess., *dahurica* (-virica) s. *sibirica* G. Don, *virginica* L. (*Stenhammiéra virg.* Rchb.). 2) **Pulmonaria sylvatica** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) „Lungenflechte“, fr. pulmonaire des chênes, thé des forets (— des Vosges), e. litchen, s. *Sticta* s. *Lobularia Pulm.* Hoffm.
 - 2) **Pulsatilla** T. (sc. *Anemone*) L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) Küchen-schelle, eig. Kuckschelle (Kukus-) Mej., fr. cloucourde od. coquelourde, e. pasque-flower (pasque-) od. campana (dem. v. *pulsatus* geschlagen = kleine Glocke, Wtst. auch pulsare schlagen, umherstossen — nöml. vom Wind auf d. Anhöhen!), *P. vulgaris* Lobel = *Anemone Pulsatilla* L., *pratensis* Mill., *alpina* Delarb. Teufelsbart Grck., *patens* Mill., *vernalis* Mill. etc., s. *Anemone* etc.
 - 1) **Pumilio** Haenke (sc. *Pinus*) L. (Coniferen Abietineen, XXI. 9) Krumm-od. Knieholz-Kiefer, „Zwerg“-K., Latsche, fr. pin suffis du Briançonnais, erin, mugho u. torché-pin (pumilio Zwerg). 2) **Pumilio** (sc. *Silene*) Wulff. (Sileneen, X. 3) „Zwerg“-Leimkraut, s. *Lychnis Scop.* u. *Cucubalus* L. *Pumilio*.
 - Punica** T., L. (Myrtaceen od. Lythraceen, XII. 1) Granatbaum (*Punica Phönizierin* od. *Punierin*, punische Farbe — intensiv rote Farbe v. Blüte u. Frucht), Zierb. *P. Granatum* L., fr. migraine, m. v. fl. pleno Hort., *P. nana* L. Zwergranate m. v. Legrellei fl. pl.
 - Puschkinia** Adams (Liliaceen, VI. 1) „Puschkin's“ Meerzwiebel (n. d. russ. Bot. Graf Mussin-Puschkin von Adams ben., † 1837), *P. scilloides* Adams, s. *Adamsia scill.* W.

Putenia „Putennie“ s. *Paeonia officinalis* Retz. Pfingstrose (v. puteo stinke).

Putoria Pers., DC. (Rubiaceen, Coffeaceen, V. 1) Stinkkaffeestrauch, Vielast-K. (v. putor Gestank — d. zerriebenen Blätt. riechen widrig!), P. s. *Ernodea montana* Sm. — *Putoriaeae* DC. (zu Spermacocēae Endl.).

Puya Mol. (Bromeliaceen, VI. 1) „Puy's“ Ananaspf. (Eigennam. Puy ? od. altfr. Puy Berg, z. B. Puy de Dôme; Wtst.: Namen d. Pfl. in Chili !), z. B. *P. Altensteinii* Lk., *chilensis* Mol. etc., s. *Pourretia lanuginosa* R. P. u. *Pitcairnea l'Hér.*

Pyracantha Spach (sc. *Crataegus* Pers. s. *Mespilus*) L. (Pomaceen, XII. 4) „Feuerdorn“, -busch Vilm., fr. buisson ardent u. pyracanthe, e. fiery-thorn, m. v. crenulata Loud. (gr. πυρός θάνατος v. πῦρ Feuer u. ἄσπερθα Dorn). 2) **Pyrae.** Lauché (sect. v. *Cotoneaster* Med.) (Pomaceen, XII. 4) Feuersträucher, z. B. C. *Pyracantha* Spach u. crenulata Roxb.

Pyraster Borkh. s. Piraster!

Pyrenomyctes Fr., Endl. „Kernpilze“ (v. πυρογήν, -ῆρος Kern, μύκης, -ήτης Pilz).

Pyrethrum W., DC. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Bertram“, Mutterkraut, Flohtöter, Speiwurzel, Geiferwurz, fr. pyréthre (pirète, -rette), pied d'Alexandre, e. bartram (bertram), soap-wort (-weed) Gärten: P. *Parthenium* Pers., Sm. (*Matricaria Parth.* L.) m. v. *aurea* Hort. Teppichg., e. golden-feather u. v. *laciniata* Hort., P. *Tchihatchewii* Boiss., P. *roséum* Lindl., s. g. kaukas. od. persisch. Insektenpulver, P. *eximum* DC. (*Matric. exim.* Hort.) m. v. *grandiflora* Vilm., P. *sinense* Sab. (*Chrysanthémum indicum* L.) s. g. Winteraster, e. Chinese od. Japanese Chrysanth. (gr. πύρεθρον hitzig gewürzh. Pfl., Wtst.: v. πῦρ u. ἀθροῦς häufig, viel).

Pyröla s. Piröla.

Pyrus s. Pirus.

Python (-um) Mart. (Araceen, XXI. 1) Bollenwurz, Glocken-Aron (gr. πυθών eine Pfl. „Bollenwurzel“ F. W. Riemer, v. Πύθιος pythisch, zu Pytho od. Apollo gehörig), s. *Arum campanulatum* autt., s. *Pythodium* Schott. (n. d. mythol. Schlange Python etc. — weg. d. Koltbens u. Gebrauchs geg. Schlangenbiss).

Qualëa Aubl. (Vochysiaceen, od. Myrobalaneen, I. 1) „Qualeastraub“ (n. dem Nam. d. Pfl. bei den Galibis in Guiana quale), z. B. Perrini Spr., *lutea* Lk., *rosea* u. *coerulea* Aubl.

Quamoclit T., Mnch. (sc. *Ipomoea*) L. (Convolvulaceen, V. 1) Trichterwinde (Paxton: v. κίναιος Bohne u. κλίτος Neigung — steigt nicht hoch), Q. *vulgaris* Chois. (*Ipomoea Q. L.*), fr. fleur cardinale (— du Cardinal) od. Ipomée Q., e. Indian Pink u. Cypress-Vine od. american red-bell-flower, m. v. v. fl. albo u. roseo Hort., s. *Ipomoea coccinea* autt.

Quapoya Aubl. (Guttiferen Garcinieen, XI. 1) „Quapoya“-Gummistrauchi (quapoy Nam. d. Str.'s in Guiana !), s. *Xanthe* Spr., *Clusia macrocarpa* Spr.

Quassia L. (Rutaceen Simarubeen, X. 1) „Quassien“- od. Bitterholzbaum, fr. quassie (n. Quassi, dem ersten Negersclaven, der v. d. Rinde Gebrauch machte, Paxton), Q. *amara* L. echte Q., Q. *Simaruba* L. Ruhrrindenbaum.

Quercus L. (Cupuliferen, XXI. 8) Eiche, fr. chêne (veralt. chesne), e. oak-tree (n. d. celt. quer schön u. cuez Baum, latinis. quercus, Andere v. d. gr. ζειρός Ferkel — weg. d. Eichelfutters !), z. B. Q. *Robur* L. f. Stiel- od. Sommer-E. (Q. *pedunculata* Ehrh.), sessili-

flöra Sm. (*Robur* Mill. u. var. β L.) Trauben-, Stein- od. Winter-E., **Zier. macrocarpa** Mchx. (*macrophylla* Hort.), *stellata* Wangh. (*obtusiloba* Mchx.), *rubra* L., *coccinea* W. Scharlach-E., *palustris* W., *Prinos* (-*us* Hort.) *Kastanien*-E. m. v. v., *Cerris* L. türk., Burgunder-od. Zerr-E., *ferruginea* Mchx. (*nigra* L., *marylandica* Ray), *Phellos* L. *weidenblättr.* od. Kork-E., *imbricaria* Mchx. (*laurifolia* Hort.), *infectoria* Oliv. Färber- od. Gall-E., etc.

Queria G., Löffl. (*Paronychieen*, V. 1) „Querie“ (n. Jos. Quer y Martinez, Prof. z. Cadix, † 1764).

Quihoui (sc. *Ligustrum*) v. Sieb. u. Zucc. (Oleaceen, II. 1) japan. Li- guster (schöner Zierstr., vaterl. Name!).

Quillaja Mol. (*Rosac.* Spiräaceen, XXIII. 4) Panamaholz (-rinde), Seifen- rinde, Q. *saponaria* Mol. (Chili) (Nam. in Chili quillaï v. quillean waschen), s. *Smegmaria* W.

Quina Poir. (-iīna Aubl.) (Guttiferen Clusiaceen, XXIII. 1) „Quina- baum“, fr. quinier (Nam. in Guiana quiina!), z. B. *glandulosa* Rz., *guyanensis* Tul.

Quinōa (sc. *Chenopodium*) L. (*Chenopodiac.*, V. 2) „Quinoa“-Spinat, Reismelde Rmpl. (Peru- od. Anden-Getreide) (vaterl. Name kenua od. quinoa!).

Quinquina Condam., Endl. (Cinchonaceen, V. 1) westind. od. St. Lucien-Fieberrindenbaum (*cortex Chinae* St. Luciae Offiz.), fr. bois de fièvres (vaterl. Quinquina Piton), s. *Cinchona* s. *Pitonia* DC. *floribunda* Sw. (*Exostemma floribundum* W.).

Quisqualis Rumph., L. (Combretaceen, VIII. 1) indian. Wunderling od. Sonderling, fr. quisqualier (n. d. Ausdruck des Erstaunens quis? qualis? quisqualis? d. i. zweifelhaft!), z. B. Zier. Q. *pubescens* Burm. s. *indica* L. grosse südind. Liane.

1) **Quivisia** Comm. (Meliaceen od. Hesperideen, X. 1) „Quiviholz“, fr. bois de quivi (quivi d. Name d. Pfl. auf Isle de France), s. *Gaura* L. Cav. 2) **Quivisia** Cav. (Araliaceen, IV. 1) „Quivi“- od. Gilibert's-Aralie, s. *Gilibertia* W.

Racodium Pers. (*Rhacodium* Lk.) (Faserpilze, XXIV. 4) Lappen- od. „Lumpenschorf“ ($\delta\alpha\zeta\omega\delta\eta\varsigma$ lappenartig, zerlumpt — in Weinkellern etc.), z. B. *cellare* Pers. „Kellertuch“.

Racomitrium Brid. (Moose, XXIV. 2) „Zackenmütze“ (v. $\delta\acute{a}\zeta\omega\varsigma$ Fetzen etc., $\mu\tau\zeta\sigma\sigma\varsigma$ Mützchen — Mützenbasis zerschlitzt!), s. *Grimmia* Ehrh.

Radiatae Juss. „Strahlblütige“ Compositen i. q. *Corymbiferae* Vaill., Rchb. (radius Strahl — d. Randblütchen zungenförmig).

1) **Radiola** Gm., Dill. (Lineen, IV. 3) „Zwerg“-Lein, eig. „Strähnchen“, Strahlkraut Leun. Haarkraut O. W., R. *linoides* Gm. (dem. v. radius Strahl — strahl. Ansehen!), s. *Linum Radiola* L. 2) **Radiola** DC. (Crucifer. Lomentac., XV. 2) (zu *Raphanus* T.) „Radieschen“.

Radūla Dumort., Nees (Lebermoose, XXIV. 3) „Kratzmoos“ (radūla Kratzeisen — d. Kapselklappen inwendig knotig gestreift).

Radūlum Fr. (Hutpilze, XXIV. 4) „Raspelpilz“ Kumm. (s. eb. — d. Hut höcker- od. stachelwarzig!), z. B. *tomentosum*, *quercinum* etc.

Rafflesia Arnold, R. Br. (Cytineen Rhizantheen od. Rafflesiaceen, XI. 1) „Raffles“-Riesenblume (n. Raffles, Gouv. v. Surinam, † 1826), R. Arnoldi u. Patma Blum.

Ramischia Opiz (Ericaceen Piroleen, X. 1) „Ramischie“, Einseit-Wintergrün (n. d. Prof. Ramisch zu Prag), R. s. *Pirola secunda* L.

Ramondia Rich. (Solaneen od. Cyrtandreen, V. 1) „Ramondie“ (n. d. franz. Bot. u. Reis. L. v. Ramond), Zier. R. *pyrenaica* Rich. (sci-

pigēra St. Hil.), s. *Chaixia Myconi* Lap. (*Verbascum Myconi* L.) u. *Myconia borraginēa* Lap.

Ranunculastrum DC., Rchb. (sect. v. *Ranunculus*) Gelbranunkel Rchb. (deter. v. *Ranunc.*), z. B. *asiaticus*, *Flammula* L. etc.

Ranunculus Hall., L. (Ranunculaceen, XIII. 3 od. 7) „Ranunkel“, Hahnfuss, fr. rénoncule, e. crow-foot „Krähenfuss“, eig. „Fröschchen“ (dem. v. *rana* Frosch, gr. βάτραχος v. βάτραχος), auch Butterblume, e. butter-flower, z. B. Gartenzier: *asiaticus* L. m. v. *superbissimus* Hort. türkischer Turban Rmpl. (*hortensis* Pers.), fr. bouton d'or, e. king's-cub, gold-knops, aconitifolius L. v. fl. pleno Hort., s. g. Silberknöpfchen, *africanus* Hort., fr. rénoncule Pivoine oder d'Afrique u. turke oder rénoncule des fleuristes, e. garden-crow-foot, R. *acris* L. v. fl. pleno Hort. gefüllt. Spiegelblümchen od. kl. Goldknöpfchen, fr. bassinet (bacinet), *bulbosus* L. m. v. fl. pl. Hort, fr. minon gefüllt. Hahnensporn od. Taubenfuss, R. *repens* L. v. fl. pl. Goldknöpfchen, *illyricus* L. (*sericeus* Russel), R. *Lingua* L. gross. Sumpf-H., *gramineus* L. grasblättr. H., fr. gouette, e. grassy crowfoot, Decorat. v. Teichen R. *aquatilis* L., fr. ré. des marais, salade des grenouilles, e. king's flower, s. *Batrachium aquatum* E. Mey. Frosch- od. Haarkraut, R. *fluitans* Lam. (*fluviatilis* W.), s. Batr. fluit. Wimm.; giftig: R. *secleratus* L., fr. douve od. pied-pou, Sumpf-H.

Rapa T. (sc. *Brassica*) L. (Cruciferen *Siliquos.*, XV. 2) Rübe, Weissod. Wasserrübe, Rübsen od. Rübenkohl, fr. chou-rave, rabiole, e. rape-cole u. turnip (gr. ἥπαρις, lat. *rapa*, celt. rab Weissrübe), R. *esculentus* Koch m. v. *teltoviensis* Alfd. Teltower od. märkische R., Brass. *Rapa v. oleifera* DC. Rübrops Grck., α. *annua* Koch Sommer-, β. *hiemalis* Martens Winter-Rübsen od. Rübsamen.

Rapatea Aubl. (Restiaceen od. Commelyneen, VI. 1) Spatelkraut (vaterl. Name!), z. B. *paludosa* Aubl. (*Mnasion pal.* W.). — Rapateacae Körnicke.

Raphanistrum T. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Hederich Grck., Repshederich, Ackerrettig, Griebel- (Kriebel-) Rettig, Feldkohl, fr. rave sauvage od. raphanistre, e. bank-cresses (deter. v. *raphanus* s. d.), R. *segutum* T. s. *innocuum* Fl. Wett., s. *Raphanus Raphanistrum* L.

Raphanōzon DC., Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Rettiggeruch“-P. (s. sogl. u. ὄξω rieche), z. B. *detonsus* etc., s. *Cortinarius* Fr.

Raphanus T., L. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Rettig (-tich), fr. raifort, e. radish (gr. ἥπαρις v. ἡδύ leicht u. γείρομαι gehe auf), cultiv. R. *sativus* L. Garten-R. m. v. *niger* DC. u. v. Radiola DC. „Radieschen“.

Raphia P.-B., Comm. (Palmen, XXI. 7) Nadelpalme (v. ἕδης Nadel — d. Frucht nadelspitz endigend), z. B. *taedigera* Mart. „fackeltragende“, s. *Rhipis* L., Metroxylon Kön. u. Sagus G.

Raphiolēpis Lindl. (Rosac. Pomaceen, XII. 2) „Nadelschuppe“ (von ἕδης dem. v. ἕδης, -ίδης Nadel, ἔπις Schuppe — nämli. Kelchzipfel!), z. B. *indica* Lindl., *japonica* v. S. u. Zucc. etc., s. *Crataegus* etc. L.

Raphistemma Wall. (Asclepiadeen, V. 2) „Nadelkranz“ (s. v. u. στέμμα Kranz — d. Nebenkronen m. lang. schmal. Blätt.), z. B. *pulchellum* Wall. (Schlingstr. Indiens).

Rapistrum Boerh. (Cruciferen Lomentaceen, XV. 2) Repsdotter, Windsbock Grck. (deter. *rapa*), z. B. *orientale* DC., perenne All. etc., s. *Myagrum* L.

Rapontica Hort. (Oenothereen, VIII. 1) Garten-Rapunzel = Oenothéra biennis L. (*rapa* u. *pontica* pontische).

- 1) **Rapunculus** T. (sc. Campanula) L. (Campanulac., V. 1) „Rapunzel-Rübe“ Rmpl., -Glockenblume M.-Rchb., fr. raponcule, e. rampian.
- 2) **Rapune.** Scop. (sc. Phyteuma) L. (Campanulac., V. 1) Ähren-Rapunzel, s. Rapunculus spicatus Scop. (Phyteuma spicatum L. s. nigrum Schmidt).
- Rapantium** Lobel, Mill., Presl (Lobeliaceen, XIX. 6) „Rapunzel“-Lobelie, fr. raiponce (rapantium od. rapunculus Rapunzel, veraltet Ausdr. für Rübchen), Zier. R. fulgens Presl (Lobelia f. W.), fr. lobélie éclatante od. brillante, splendens Presl (Lob. spl. W.) m. v. queen Victoria Hort., speciosum Pr. (Lob. syphilitica L.) gem. Lobélie, R. cardinale Pr. (Lob. card. L.) Cardinalblume, e. scarlet-Lobelie.
- Ratabida** Raf. (-tibida Sweet, DC.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Säulen-Rudbeckie (Wst.: das veränd. Rudbeckia, wozu früh. gehörig!), s. Rudbeckia columnaris Pursh s. Drummondi Hook. (Obeliscaria pulcherrima s. Tagetes DC.).
- Ravenala (-lia)** Adans. (Musaceen, VI. 1) „Ravenal“-Uranie (Nam. d. Pfl. auf Madagascar ravenal!), R. madagascariensis Poir., s. Urania speciosa W.
- Reäna** Brignoli (Gräser, XXI. 3) „Ré's“-Riesengras (n. d. Bot. Francisco Ré, s. d. Aut.), Zier. R. luxurians Brign., s. Tripsäcum monostachyum, s. g. Teosinte (Euchlaena luxur. Schrad.).
- 1) **Regelia** Planch. (Palmen, XXII. 3) „Regel's“-P. (n. d. Bot. Regel, s. d. Aut.), R. princeps Planch. 2) **Regelia** Schauer (Myrtaceen, XII. 1) „Regels“-Myrte.
- Rehmannia** Bung., Liboschitz (Gesneriaceen, XIV. 2) „Rehmannie“ (n. d. russ. Leibarzt Jos. Rehmann, geb. Badenser, † 1838), Zier. R. chinensis Fisch. s. glutinosa Libosch. (Gerardia glut. L.), s. Diginalis G.
- Reineckea** Kth. (Liliac. Dracaeneen, VI. 1) „Reinecke“ (n. J. C. Reinecke, schr. d. Erde od. Schilderg. d. Natur u. Sitten etc., Weimar 1803), z. B. carnea Kth. v. fol. varieg. silberstreifl. Blattpfl., s. Sansevieria Andr.
- Renanthéra** Lour. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Nierenanthere“, Spinnen-Luftorche (v. ren, renes Nieren, ἀνθησα Staubbeutel), z. B. coccinea Lour. (Cochinch.), arachnites Lindl. etc.
- Renealmia** R. Br. (Irideen, III. 1) „Reneaulme's“-Schwertlilie (n. Paul Reneaulme, franz. Bot., schr. 1611 Essai sur l'hist. des plantes).
- Reseda** L. (Resedaceen, XI. 3) „Resede“ od. Wau, fr. réséda (v. resēdo stille wieder — nämli. d. Krankh.), Farbpfl. R. luteola L., fr. gaude od. vaude, lis des teinturiers, auch herbe-jaune, e. dier's-weed od. weld, Garten: R. odorata L. m. v. v., fr. herbe d'amour od. gaude (gode), fr. u. e. mignonette (z. B. v. eximia, v. gigantea s. rubiginosa, v. multiflora compacta Hort.). — Resedacées DC., -dées Rchb. (zu Cruciferae Capsulares).
- Restiacae** R. Br. (zu Juncinae DC.) Strickgrasartige, s. Restio L.
- Restio** L. (Juncineen Restiaceen, XXII. 3) „Seil“- od. „Strickgras“ (v. restis Seil etc. — dient am Cap als solches), z. B. dichotomus Fris. Deser. (Schoenus capensis Thb. s. Willdenowia teres Thb.), elongatus s. vimineus Fris. Deser., s. Calorophus elong. autt. langer „Schönschlurf“ (ξύρος Schlurf, Schleim etc.).
- Restrepia** Kth. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Restrepia“-O. (n. Jos. Em. Restrepia, schr. Geogr. d. Anden), z. B. elegans Karst. (Columbia).
- 1) **Reticularia** Bull., Tul. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) „Netzling“ (reticulum dem. v. rete, -is Netz), z. B. muscorum etc. 2) **Reticularia**

Baumg. (Flechten, XXIV. 3) „Netzflechte“ (zu *Sticta* Schreb.) (— *Thallus netzaderig!*).

Retinaria G. (Rhamnaceen, V. 1) Harz-Gouanie, amer. Harzbaum, fr. resinier (gr. ὁρτίνη, lat. *retina* od. *resīna* Harz), z. B. scandens G., s. *Gouania Retinaria* DC. (*Sphaerocarya scandens* DC.).

Retinospora (-nispora) Sieb. u. Zucc. (sc. *Juniperus*) (Cupressineen, XXI. 9) „Harzsamen“, Heidewachholder, Lebensbaum-Cypresse, Flach-Cypr. Perring (s. eb. u. σπονδή Samen), Zier. *picifera* (nicht pisif.-!), *aurēa* u. *filifera* Hort., *ericoides* Hort. s. *squarrosa* S. u. Z., s. *Chamae-Cypris picif.* u. *squarr.*, *obtusa* S. u. Z. (*Chamaec. obt.* ds.), s. g. Sonnenbaum Vilm. od. *Hinoki-Cypresse* (Jap.).

Rhabdoeisia Bruch (Moose, XXIV. 3) „Streifen“-Weisie (δάζδος Rute etc. u. Weisia-Moos), z. B. *fugax* Br. (Felsritzen).

1) **Rhaēoma** L. (Sapotac. od. Celastrineen, IV. 1) „Zottelschopf“ (gr. δάζωνας od. δάζος; Lumpen, Fetzen; Wst.: von *Rha* = Wolga, woher d. Pfl. bezogen, *Rhaëoma* Plin. = *Rhēum rhabonticum!*), R. *Crossopetalum* (nicht *Crassop.!* Dietr.) „Fransen“-od. „Zottelblume“. 2) **Rhae.** Adans. (Compositen).

Rhagadiōlus T. (sc. *Lapsana*) L. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) „Ritzen“- od. „Schrundenkelch“, Sichelsalat D., fr. *rhagadolie* (v. δέγχει, -άδος Ritze — jed. Kelchzipfel m. Spaltvertiefungen!), z. B. *edulis* G., etc., s. *Koelpinia* Pall.

Rhamnacēae R. Br., -neae DC., Rehb., -ni Juss. Kreuz- od. Wegdornartige, s. *Rhamnus*!

Rhamnus L. (Rhamnaceen, V. 1) Kreuz- (eig. Kreise-) Dorn Mej., Wegdorn Seub., eig. Wehedorn, fr. *nerprun* (lat. *niger prunus*), e. buckle-thorn od. *rhein-berry*, „Rheinbeere“ (gr. δέρυος Dornstr. v. d. celt. ram Gesträuch), z. B. *cathartica* L. Purgierdorn, Wehenbeere Mej., Dintenbeerstr. Vilm., fr. *bourg-épine*, *nerprun purgatif* od. *commun*, e. purging buck-thorn od. *yellow-berry*, s. *Cervispina cath.* Mnch.

Ramphospermum Andrez. (zu *Sinapis*) Rehb. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) „Schnabelsamen“ (δάμφος Krummschnabel, σιέγμα S. — etwas krumm. Schnabelfortsatz d. Schoten).

1) **Raphis** Lour. (Gräser, XXIII. 1) „Nadelgras“ (δαρπίς, -ίδος Nadel — nadelf. Blütengrannen), s. *Andropōgon acicularis* Retz. 2) **Raphis** P. Br. (*Raphis* L. f., Schreb.) (Palmen, XXI. 7) Nadel- od. Sagopalme (v. δάρπις Nadel od. δαρπίς Rute — d. Palmen sind nur rutenförm. Schafte), Zier. R. *flagelliformis* Ait. m. v. *variegata* etc., s. *Raphia P.-B.* (*Raphis* L. f.), *Sagus* G., *Metroxylon* Kön. „Kernholz“.

Raphistemma s. **Raphist.**

Rhipis L. f., Schreb., Ait. (Palmen, XXI. 7) „Ruten“-P. (v. δαρπίς Rute — rutenf. Stämme!), s. *Raphis* P. Br.

1) **Rhopontia** DC. (Composit. Centaureen, XIX. 3) Klettenblatt-Flockenblume (v. Ρᾶ u. δῆον, lat. *Rha-ponticum* Fluss in Pontus, Ρᾶ auch Wolga), R. *scariosa* DC., s. *Centaurēa Rhapontica* L. (*Serratura Rhaponticum* DC.). 2) **Rhoponticum** Less., Lam. (zu *Centaurea*), z. B. Zier. *scariosum* Lam. (s. eb. 1), fr. u. e. *rhapontic* Flockendistel Rmpf., *pulchrum* Fisch., Mey. etc., s. *Centaurēa Rhap. L.*, *jacea* L., *alba* L. etc. 3) **Rhoponticum** Alp. (sc. *Rhēum*) L. (Polygonaceen, IX. 2) Rhapontik- od. pontischer Rhabarber, fr. *rapon-tique* (fr. u. e. *rhapontic*) de montagne, auch Mönchs-Rhabarber.

Rheedia L., Pers. (*Rhedia* Rehb.) (Guttiferen Garcinieen, XIII. 1) „Rheede’s“-Gummibaum, fr. *cyroyer* (n. H. Rheede Van Drakenstein, s. d. Aut.), R. *lateriflōra* L. (*Mammēa humiliſ* Vahl).

Rhēum L. (Polygonaceen, IX. 2) Rhabarber, fr. *rhubarbe*, e. *rhubarb* (v. δῆον Fluss u. Ρᾶ lat. *Rha Wolga*, daher „Rhabarber“ *Rha bar-*

bärum), z. B. R. Rhabarbärum Pall., fr. u. e. rhabarb (rew-, rheu-, rheu-) eig. „fremdes od. barbarisches Rheum“, R. Rhaponticum L. (s. v.), Zier. R. nobile Hook. f., australe Don, undulatum L., palmatum L. (Nepal), R. Emodi Wall., officinale Baill. (palmatum tangenticum Reg.) etc.

Rhexia L., Nutt. (Lythraceen Melastomaceen, VIII. 1) „Bruchheil“, Ankerblume Rmpl., fr. quadrette od. rhexie (v. ὁγκίς Durchreissung, Bruch — Anwend. geg. Brüche), Zier. R. virginica L., holosericea Epl. (Lasianandra argentea DC.), taxifolia St. Hil. (Marctetia tax. DC.). — Rhexiæ DC.

Rhinanthus L. (Scrophularineen, XIV. 2) Hahnenkamm, Wiesenklapper, Klapperkraut, eig. „Nasenblume“, fr. coquête, e. cock's-comb, fr. auch crête de coq u. oreille de cochon, s. Alectorolophus Hall., z. B. major u. minor L. (v. ἄντη, -ίρος Nase, Rüssel u. ἄνθος Bl. — Ähnl. d. Blume m. ein. Schweinsrüssel). — Rhinanthalacæ DC.

Rhinopetalum Fisch. (Liliaceen, VI. 1) „Nasenkronblatt“ (s. eb. u. petalum Kronblatt — d. oberste Blumenblatt m. hornart. ausgeh. Nektargrube!), z. B. Karelini Fisch.

Rhipidodendron Willd. (Amaryllideen, VI. 1) „Fächerbaum“, -aloë (ἀλόη, -ίδος Fächer, δέρδων Baum — fächerart. Verzweigung dess.), z. B. dichotomum W., s. Aloë dich. L.

Rhipsalis Haw., G. (Cacteen Opuntieen, XII. 1) „Geisselcactus“, Ruten-distel, -cactus Leun. (v. ἀπει, -ιπός Rohrschleuder, Weidenschl. v. ἄπτω schleudere — hängende Blüten!), z. B. penduliflora Nees, parasitica Haw., etc., s. Cactus etc.

Rhizanthæae Endl. „Wurzelblüter“ (ῥίζα Wurzel, ἄνθη Blüte) i. q. Rhizocarpæae Batsch.

Rhizobolus G., Schreb. (Bombaceen Rhizoboleen, XIII. 4) „Wurzelschneller“, Butternussbaum (s. eb. u. βούλος v. βάλλω werfe, d. Wurf — sehr grosse Keimwürzelchen), s. Caryocar butyrosorum W. (Pekea but., Castanea peruviana Clus.). — Rhizobolæae DC., Rchb. (zu Malpighinae Bartl.).

Rhizocarpæae Batsch, Seub. „Wurzelfrüchtige“ (s. v., ζαρπός Frucht) i. q. Rhizanthæae Endl.

Rhizophöra L. (Lythræ. Rhizophoreen od. Loranthæen, XII. 1) Wurzelbaum, -senker, „träger“, fr. paletuvier (s. v., φρούς tragend — d. noch hängende Samen bei d. Berührg. d. Erde Wurzeln schlagend), z. B. R. Mangle L. Mangrovebaum, Leuchter- od. Stelzenbaum, s. Aegiceras G. — Rhizophoræae R. Br., DC. Mangrove- od. Manglebäume.

Rhizopögon Fr., Tul. (Pilze, XXIV. 4) „Wurzelbart“, -Trüffel (s. v., παύγων Bart — netzart. Wurzelfasern!), z. B. aestivus Fr., s. Tuber aest. Spr., etc., s. Lycoperdon gibbosum.

Rhodanthe Lindl. (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Rosenblume“ Vilm. (ῥοδόν Rose, ἄνθη Blüte), Zier. R. Manglesii Lindl. m. v. v. (Neuholl.) „Rosen-Immortelle“ Leun. (z. B. v. atro-sanguinea Hort., v. fl. pleno „Fürst Bismarck“, v. maculata etc.).

Rhodiola L. (zu Sedum DC.) (Crassulaceen, XXII. 7) „Rosenwurz“-Fetthenne (dem. v. ῥοδίος rosig — d. Wurzel v. stark. Rosengeruch!), Zier. R. rosæ L. s. odorata Lam., s. Telephium lutœum minus Morris. s. g. Rhodiserwurz (Anacampsæros T.) (essb., hoh. Norden).

Rhodochiton Zucc. (Scrophularineen, XIV. 2) „Rosenrock“ (s. v. u. γυμνών Unterkleid etc. — Kelch rosenr.!), z. B. Pracht-Schlingpfl. volubile Zucc. (Lophospermum atro-sanguineum Hort., Mex.).

Rhododaphne G. Fr. s. Nerium Oleander L. „Rosenlorbeer“ (ῥοδόν u. Daphne Lorbeer).

Rhododendron L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) Alpenrose, eig. „Rosenbaum“, fr. rosage (-sagine) od. laurier rose des Alpes, e. rose-bay (ἄσπερος u. ἀσπέρος Baum), Alpen: R. ferruginéum L. gem. Alpenröschen od. Almrausch, fr. rosage commun, u. hirsutum L. haarig. Alpenr., fr. rosage velu, Zier.: R. Catawbiense Mchx., Alprose von Catawba (m. viel. Blendling!), maximum L. (Nordam.), ponticum L. m. v. v., dahuricum L. (Südsibir.), Glash. arboréum Sm. (Nordind.), campanulatum Wallr. (das.), argentéum Hook. f., etc.

Rhodolea (-leia) Bot. Mag. (Hamamelideen, IV. 2) „Rosen-Olive“ (s. v. u. Oléa Olive), Treibh. Championi Bot. M. (China).

Rhodóra L. (Ericaceen Rhodoraceen, X. 1) Sumpfrose Leun., Frührose Lauch. (s. v. u. ἄρωδα od. ὄρωδα Sicht, Ansehn), Zier. R. canadensis L., s. Rhododendron Rhodóra G. Don (Chamaer. rhododendros Duham.). — Rhodoracées Klotzsch, Grck. (zu Ericacées Rchb.).

Rhodothamnus Rchb. (Ericaceen, X. 1) Alpröschen, „Rosenbüschlein“ (s. v. u. θάμνος Busch — klein. rosenr. blüh. Str.), s. Rhododen-dron Chamaecistus L.

Rhodotýpus Sieb. u. Zucc. (Rosac. Spiráceen, XII. 5) Jambukistrauch Rmpl., Scheinkerrie Lauch., eig. „Roseubild“ (s. v. u. τύπος Schlag, Bild od. Typus — bez. d. Frucht!), Zier. kerrioides S. u. Z.

Rhoeadéae DC. -ädes Endl. Mohnpflanzen, s. Rhoearia!

Rhoeas (sc. Papáver) L. (Papaverac. od. Rhoeadeen, XIII. 1) Klatsch-rose, -mohn Vilm., Acker-, Feld-, Ranunkelmohn, s. g. Pfaffen, fr. coquelicot, pavot coq., ponceau, fleur pleurétique, e. cockle-weed, corn-poppy etc. (gr. ἁοτις abfallend — näm. d. Kelchblätt. b. Auf gehen!).

Rhopala G. Schreb. (Proteaceen, IV. 1) „Keulen“-Silberbaum (ἀσταλών Keule — näm. d. Narbe keulig!), z. B. complicata Hb. Bpl., mon-tana Aubl., robusta Roxb. (Helicia cochinch. Lour.) etc.

Rhus L. (Gen. Rhöis) (Terebinthaceen od. Anacardiaceen, V. 3 od. XXII. 5) Sumach, fr. rhus od. roux, sumac, e. rhus od. sumach-tree (gr. ῥοῦς. ροῦς od. ῥοῦς von d. celt. rhudd rot — Farbe d. Frucht! od. ῥέω fliesse — lass. Saft fliessen, stopf. Durchfall!), Zier. R. ty-phinum (-na) L. Essig- od. Hirschkolbe, Essigbaum, fr. vinaigrier, e. stag's od. buck's-horn-tree, fever-Rhus, virginian sum.-tree, m. v. pumila u. v. viridiflora Hort., R. Coriaria L. Gerber-S. od. Schwarzmohr Vilm., fr. roux des corroyeurs, e. hide-tanning Rh., elm-leaved Sum.-tree, R. Cotinus L. Perücken-S. (Cotinus Coccygea od. Coccygia Scop.) Gelb- od. Fisetholzbaum, fr. l'arbre à perruques, bois jaune, fustet u. marabout, e. Venus- od. Venice-Sumach, venetian S., R. Toxicodendron L. u. radicans L. (Nordam.), R. vernix L. s. ver-nicifera DC. Firmissbaum (Jap.), R. Copallinum L. „Kopal“-S. (Nord-am.) etc.

Rhymóvis Pers. (Blätterpilze, XXIV. 4) „Furchenschwamm“, Krämpel-od. Deichselpilz Kumm. (v. ῥυμός Furche, ὠον lat. ovum Ei), z. B. involucrata P. wahrer F.

Rhynchosarpa Schrad. (Cucurbitac., XXI. 10) „Schnabelfrucht“ (ὅγιζος Schnabel, ζαρτίζει — Beere m. lang. Schnabel!), Zier. dissecta Naud. (Coniandra d. Schrad.), s. Bryonia diss. s. africana Thb.

Rhynchospéra Klotzsch (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Schnabelranzen“ (s. eb. u. ηγεῖα Sack, Ranzen), z. B. punctata Van Houtt., s. Pleuro-thallis R. Br.

Rhynchosia Lour. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Schnabelkiel“ (s. v. — in Bez. auf d. carina d. Blüt.!), z. B. volubilis, menispermoïdes DC. etc., s. Glycine u. Dolichos.

1) **Rhynchospermum** Reinw. (Apocyneen, V. 1) „Schnabelsamen“ (s. v.

- u. $\sigma \tau \epsilon \omega \alpha$ S.), Zier. jasminoides Ldl. (Schlingpfl. Jap.). 2) **Rh.**- autt. (Compos. Cichoriae, XIX. 1) (— Achenen kurz geschnäbelt!).
- Rhynchospora** Vahl (zu Schoenus) L. (Cyperaceen, III. 1) „Schnabelsamen“, Moorsimse, Semide O. W. (s. v. u. $\sigma \tau \omega \alpha$ Samen — Nuss m. bleibend. Griffel), z. B. alba u. fusca Vahl.
- 1) **Rhytidpermum** (st. **Rhytidosp.**) (Ulmaceen Celtideen, XXIII. 1) „Runzelsamen“-Zürgelbaum ($\delta \nu \tau i s$, - $\iota \delta o \varsigma$ Runzel, $\sigma \tau \epsilon \omega \alpha$ Samen), s. Celtis. 2) **Rhyt.** Lk. (Boragineen, V. 1) (zu Lithospermum) (— d. Nüsschen runzlig!).
 - 1) **Ribes** L. (Ribesiaceen od. Grossularieen, V. 1) Johannis- u. Stachelbeerstrauch (ribes veränd. rubus Leun., od. ribas eine sauere Pfl. d. arab. Ärzte Paxt. = Rheum Ribes Wst. — unsicher!), Gärten: R. nigrum L. Ahlbeere, dän. solbaer „Sonnenbeere“ Mej., fr. cassis od. poivrier, R. rubrum L. m. v. album Hort., rote Johannisbeere, s. g. Ribissel Vilm., fr. ribette, e. currant (corand), R. grossularia L. gem. od. rauhe Stachelb., fr. groseillier commun, R. Uva crispa L. Kahlbeere, R. reclinatum L. rote Stachelb. — Zier.: alpinum L. (dioecum Mnch.), fr. groseillier des Alpes, e. alpine currant, sanguineum Pursh m. v. v. (z. B. atro-sanguineum Hort.), s. Calobotrya sang. Spach, echte Schöntraube, auréum Pursh Goldtraube, s. g. Chokoladestr., s. Symphocalyx Berland. (R. palmata Desf., fragrans Lodd., Chrysobotrya revoluta Spach). 2) **Ribes** (sc. Rhēum) L. (Polygonaceen, IX. 2) Zuckerblatt-Rhabarber (folia tanquam saccharo candido adpersa Dill.). — Ribesiaceae Rchb. (Ribesium G. Fr. „Johannisträubel“).
 - Ribesia** Berland., DC. (zu Ribes, sect. inermia) Johannistrauben (s. eb.).
 - 1) **Riccia** Mich. (Lebermoose, XXIV. 3) „Riccie“ (n. P. Franc. Ricci, Senator in Florenz im 16. Jahrh.), z. B. glauca Mich. — Ricciaceae Rchb. 2) **Riccia** Fl. Flum. (Tange, XXIV. 3).
 - 1) **Richardia** Kth. (Araceen, XX. 9) „Richardie“ od. Calla (n. d. franz. Bot. Prof. L. Cl. Mar. Richard z. Paris), Stuben R. s. Calla aethiopica Kth. (Zantedeschia aeth. Spr.), hastata Hook. m. v. albo-maculata. 2) **Richardia** L., Houst. (Rubiaceen, VI. 1) Richardsonie, R. scabra G., s. Richardsonia sc. Kth. (n. d. engl. Bot. u. Reis. unter Franklin 1819/22 Rich. Richardson, schr. 1699 üb. Gartenkultur).
 - Ricinus** T., L. (Euphorbiaceen od. Trikkonen, XXI. 9) Wunderbaum, fr. ricin od. girasol, e. oil-nut-tree u. palmatory (lat. ricinus Zecke, gr. $\xi \iota \zeta \iota \nu \circ \rho$ hebr. kikar d. i. rundlich — Samenähnlichkeit), Zier. R. communis L. s. tunicensis Desf. (major u. minor Hort.), fr. carapas (-pat), palma Christi u. figuier infernal, e. palma Christi u. palmatory, m. v. v. (rutilans, sanguineus etc.), R. viridis W., africanus Mill. — Riciniae (sc. Euphorbiac.) Rchb.
 - Ridolfia** Moris. (Umbellifer. Anumineen, V. 2) „Ridolfie“, Saatfenchel, R. segētum Moris. (wohlr. Decorat.-Pfl.) (n. C. Ridolfi, Prof. in Pisa, schr. ein. Pfl.-Katal., Florenz 1843), s. Foeniculum seg. autt.
 - Rindēra** Pall. (Boragineen, V. 1) „Rinder's“ Hundszunge (n. Dr. Rinder in Moskau, der d. Pfl. b. Orenburg fand), R. tetraspis Pall., carolinensis Pers., etc., s. Cynoglossum Rindēra Pall. s. laevigatum L. u. Batschia canescens Pers.
 - Ritro** Schkuhr, Endl. (sc. Echinops) L. (Compos. Echinopeen, XIX. 5) echter „Ritro“, kochblättr. Kugeldistel, fr. boulette azurée (Nam. d. Pfl. in Südeuropa), s. Echinops strictus Schrad.
 - Rivina** L. (bess. -nia Juss.) (Phytolaceen od. Chenopodiaceen, IV. 1) „Rivinic“ (n. d. Prof. Rivinus in Leipzig, † 1723), Zier. R. humilis L., R. paniculata L., s. Salvadōra persica Vahl etc.
 - Robertsonia** Haw. (zu Saxifraga) Rchb. (Saxifragaceen, X. 2) „Robertsonie“ (n. W. Robertson, schr. Collect. de Serres chaudes pour forcer

- des ananas etc., Lond. 1798), Ampelpfl. R. sarmentosa Haw. s. stolonifera Jacq., s. g. Judenbart, s. Diptera stol. Borkh. (Saxifr. sarm. L. s. stol. Jacq.), R. crenata Mnch. s. dentata Haw., s. Saxifr. Géum L. **Robinia** L., DC. (Leguminos. Galegeen, XVII. 4) „Robinie“, s. g. Akazie, fr. Robinier, bois d'ainon, e. locust-tree (n. Joh. Robin, Gärtn. d. Kön.'s Heinr. IV. v. Frankr. um 1600), Zierb. R. Pseud-Acacia L. gem. Schotendorn, m. v. v. (z. B. inermis Dum. s. umbraculifera DC. Kugelakazie, fr. Rob. Parasol); R. viscosa Vent. s. glutinosa L. Pech- od. Klebakazie, m. v. albiflora Hort.), R. hispida L. (rosaea Lois.) m. v. v. (z. B. bella rosea) Rosen-Ak. Vilm., fr. Robrose, e. hispid Robinia.
- Robsonia** Berland., DC. (Ribesiaceen, V. 1) „Robson's“-Johannisbeere (n. Steph. Robson, schr. t. brit. Flora, York 1777), s. Ribes speciosum Pursh (Californ.).
- 1) **Robur** (sc. Quercus) L., W. (Cupuliferen, XXI. 8) Stein-, Winter-, Rot-, Traubeneiche (robur, -böris Kraft u. Hartholz, celt. rove), fr. rouvre (roure) od. durelin, e. elke, holm-oak (-tree), auch barren scarlet-oak, s. Q. sessilis Ehrh. (sessiliflora Sm.). 2) **Robur** (sc. Quercus) Sm., Grck., s. Q. pedunculata Hoffm. s. racemosa Lam. Stiel- od. Sommereiche, fr. gravelin (Q. femina Roth, longaeva Salisb., fructipendula Schrk.).
- Roccella** DC. (Flechten, XXIV. 3) Fels- od. Lackmusflechte, fr. orseille (ursolle), e. archil u. litmoss (span. rocca Felsen), s. Lichen Roccella L. — Roccellæ Nyl.
- Rochæa** DC. (Crassulaceen, V. 5) „De la Roche's“ Dickblatt (n. d. Bot. De la Roche), Zier. R. falcata DC., odoratissima u. coccinea DC. (Larochea Pers., Dietrichia Tratt., Kalosanthes Haw.).
- Rodschedia** Gärtn. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Hirtentäschchen, R. bursa pastoris Fl. Wett. (n. d. Bot. E. K. Rodschied, schr. de necess. et util. studii bot. Marburg 1790, † 1796 in Essequebo), s. Capsella Bursa s. Thlaspi burs. past. L.
- Roëlla** L. (Campanulaceen, V. 1) „Roëlle“ (n. W. Roëll, Prof. d. Anatom. z. Amsterd.), z. B. ciliata L. s. reticulata Lam. (Campanula afric. Comm., Aculeosa mauretanica Pluk.), s. Zygophyllum fruticosum autt. u. Roeperia Spr. fruticulosa A. Juss.
- Roestelia** Rebent., Lk. (Staubpilze, XXIV. 4) „Röstel's“- od. Gitterrost, -brand D. (n. d. Apoth. Röstel zu Landsberg), R. cancellata Rebent., s. Gymnosporangium fuscum Oerst. (davon die Aecidium-Generation!).
- Rogiera** Planch., Lindl. (Rubiaceen Hedyotideen od. Rondeletieen, V. 1) „Rogierte“ od. Rondeletie (n. d. Namen Rogier u. Rondelet), Zier. R. cordata u. elegans Planch., gratissima Pl., Ldl. s. Rondeletia Plum.
- Rolandra** Schreb., Rottb. (Compos. Echinopeen, XIX. 5) „Rolander's“- Kugeldistel (n. Dan. Rolander, Schül. v. Linné, bereiste Surinam), R. argentea Sw., s. Echinops fruticosus L. f.
- Romulæa** Pers. (-lia Marrat.) (Irideen, III. 1) (zu Ixia L.) römische Uchtblume (Romulæus v. Kön. Romulus od. römisch), z. B. R. Bulbocodium v. nivale Bak. Schnee-Haarfaden, s. Trichonema nivale Boiss., Ker.
- Rondeletia** Plum., L. (Rubiæ. Cinchonac., V. 1) „Rondeletie“ (n. d. Nat. Guill. Rondelet z. Montpellier, 16. Jahrh.), Zier. R. speciosa major Hort. (odorata Jacq., coccinea Moç., speciosa Lodd.) (Havanna), americana (das.), Burdiei Hook. (Venezuela). — Rondeletiae DC.
- Roripa** Scop. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) Wasserkresse Leun. (rös, -ris Tau? ripa Ufer? — unklar! viell. N. propri.), s. Nasturtium amphibium, silvestre etc.
- Rosa** L. (Rosaceen, XII. 5) Rose, fr. rose (-sier), e. rose, wilde: R. canina L. Hunds- od. Heckenrose, fr. cynorrhodon, e. dog-briar

(-rose), sweet-briar, canker-rose u. hep-tree od. haw-thorn „Hagedorn“, R. arvensis Huds. (*sylvestris* Herm., *serpens* Ehrh., *repens* Scop., Gm.) Kriechrose, fr. R. rampante, e. field-r., R. rubiginosa L. Weinrose, fr. rosier rouillé, R. villosa L. (*pomifera* Herm., K. Koch, *mollis* Sm.) Apfelrose, etc.; Zierr.: a) Pimpinellifoliae K. Koch „Bibernellrosen“, z. B. *lutea* Mill. (asiat. Türkei) m. v. v. (z. B. *bicolor* Jacq. s. *punicæ* Mill. s. g. Kapuziner-R., v. persian yellow (fl. pl.) etc.), R. sulphurea Ait. (*hemisphaerica* Herm.) „Schwefel“-R. od. s. g. gelbe Centifolie Rmpl., R. spinosissima L. s. pimpinellifolia DC. (auch wild), fr. r. pimprenelle, s. g. Marien-R. od. Marterdorn, m. v. v. — b) Cinnamomea K. Koch „Pfingstrosen“, z. B. cinnamomea L. „Zimmt“-R. m. v. v. (z. B. *fœcundissima* Münchh.), R. alpina L. „Alpen“-R. m. v. v. u. Hybr. (z. B. Boursaultrosen alpina-chinensis). — c) Hortenses K. Koch „Gartenrosen“, z. B. damascena Mill. (*Syr.*) Damascener-R., Hauptstammrose d. edlen Garten-Rosen, R. centifolia L. „Centifolie“ m. v. v. (z. B. muscosa Mill. „Moosrose“, v. provincialis Mill. Pomponrose, e. cabbage-r., v. parvifolia W. „Burgunder“-R., v. pulchella Hort. „Champagner“-Röschen, v. divisionensis Hort. „Dijon“-R.), R. gallica L. Essig- od. Purpur-R. (Südeur.), fr. r. de Provins (Champagne). — d) Caninae K. Koch „Hundsrosen“, z. B. villosa L. (*pomifera* Koch) Apfel-R., alba L. weisse R. m. v. v. (z. B. maiden's-blush, fr. Cuisse de Nymphe). — e) Corymbiferae K. Koch „Büscherrosen“, z. B. repens Scop. (s. ob.) s. capreolata Mill. m. v. v. (z. B. Ayrshire-R.), R. sempervirens L. (Orient), multiflora Thb. (Jap., Chin.), moschata Mill. Moschus-R. (als Hybr. Noisette-R.), setigera Mchx. Prairie- od. Kletter-R. (Nordam.) — f) Nobiles K. Koch „Edelrosen“, z. B. chinensis Jacq. s. indica Hort. m. v. v. (z. B. *semperflorens* Curt. s. bengalensis Pers. Monats-R.), R. minima Curt. „Liliput“- od. Lawrence-R. (Topf.), R. fragrans Réd. Theerose, R. borbonica Hort. „Bourbonrose“ m. v. v. (z. B. Gloire de Dijon), R. Noisettana Réd. „Noisette“-R. (Hybr. v. R. bengal. m. moschata!). — Roses remontantes (immerblüh. Hybriden) früher s. g. Herbstrosen (— Abkömml. v. Damascener u. Chineser-Rosen, Rmpl.). — Rosaceae Juss., DC., -sæae (zu Rosa- cæae) Rchb.

Rosanowia Reg. (Gesneriac., XIV. 2) „Rosanowie“ (n. d. Nam. Rosanow geb.), z. B. conspicua Reg., s. Biglandularia Seem.

Rosiflora Endl., Rchb. „Rosenblütige“ (rosa u. flos, -oris Blume etc.). **Rosmarinus** L. (Labiaten, XIV. 1) „Rosmarin“, eig. „Meertau“, fr. encensier u. romarin, e. rosemary (ros-marine) u. heart's-root (ros-, oris Tau, marinus vom Meer — Standort! viell. v. ὁμόψιη niedr. Strauch u. μύρος balsamisch, Leun.).

Ros-solis T., Scop. (Droseraceen, V. 5) rundblättr. „Sonnentau“ (s. v., sol, -is Sonne), s. Drosera rotundifolia L.

1) **Rottboella** L. (-ia Roth, Schreb.) (Gräser, III. 2) „Rottboell's“-Gras, Dünnschwanz (n. d. dän. Bot. C. F. Rottboell, schr. Descr. plant. quarundam Surinamensium, Hafn. 1798), s. Lepturus R. Br. (Aegilops L. u. Cymbachne W. 2) **Rottb.** Scop. (Lucumeen, X. 1).

Roupellia Hook. (Apocynen, V. 1) „Rouppellie“ (n. ein. Eigennamen), Treibh. R. grata Hook. (Schlingstr. Westafr.), s. Strophanthus Stanleyanus Hook.

Royena L. (Lucumeen od. Mimusopeen, X. 2) „Royene“ (n. d. Prof. Adr. v. Royen z. Leyden, † 1779), z. B. glabra L. (*Vitis Idaea aethiopica* Comm., capische Preisselbeere), ambigua Vent., lucida L. *Staphylocarpus* afric. Comm., Cap-Str.) etc.

Roylea Wall. (Labiaten, XIV. 1) „Royle's“ Ballote (n. d. Prof. J. Forbes

Royle z. London), z. B. elegans Wall. (*Phlomis calycina* Roxb., Str. Ostind.), s. *Ballota cinerea* Don.

Rubia T. (Rubiaceen od. Stellaten, IV. 1) Krapp, „Färberrote“, R. tinctoria L., fr. garance, provinziell auch rapequicou u. rubi, e. madder od. mathier u. gosting (v. rubeo bin rot — roter Farbstoff d. Wurzeln). — Rubiacées Juss., DC., Rehb., fr. rubiacées i. q. Stellatae L. Sternkräuter — Rubicinæ Bartl. Ord. d. Krappgew.

Rubus L. (Rosaceen, XII. 3) Brombeere, Steinbeere O. W., fr. ronce od. framboisier, e. bramble, black-, knot-u. rasp-berry (hind-) (v. d. celt. rub rot, d. lat. rubeo bin rot — nämlich d. Früchte etl. Arten), z. B. wild: R. plicatus W., Nees s. fruticosus L. faltenblättr. od. Wald-Brombeere, fr. ronce commune, thyrsoïdēus Wimm., caesius L. Bocksod. Kratzbeere, fr. ronce bleue, e. grey-bramble od. dew-berry, R. Idaeus L. Himbeere, fr. framboise (-sier), e. rasp- od. hind-berry, Zier. R. odoratus L., fr. ronce odorante, m. v. fl. albo, nobilis Reg., bellidi- u. rosaeflōrus Hort., arcticus L., laciniatus W., fr. ronce à feuilles lacinierées, e. cut-leaved-bramble, R. fruticosus L. m. v. fl. pl. u. rubro fl. pl. Hort., fr. r. commune, e. common black-berry.

Rudbeckia Ad. (Myrobalaneen, X. 5) „Rudbeck's“-Balsampflaume (s. sogl.).

Rudbeckia L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Rudbeckie“ (n. d. schwed. Bot. Prof. Olaus Rudbeck), Zier. R. hirta L., speciosa Wend., amplexicaulis Vahl (- folia Jacq.), Drummondi Hook., purpurea L. s. serotina Nutt. etc., s. Dracopis, Obeliscaria, Echinacea Mich. etc.

Rudgea Salisb. (Rubiac. Coffeaceen, V. 1) „Rudge's“-Kaffeestrauch (n. Edw. Rudge, schr. Plantae Guianaæ rariores, Lond. 1805), R. macrocephala Sal., spicata Spr. (Coffea spic. Kth.) etc.

Rudolphia W. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Rudolphi's“-Süßbohne (n. d. Bot. K. Åsm. Rudolphi zu Jena), z. B. peltata W. (*Erythrīma planisiliqua* Corallodendron Plum.), s. Glycine sagittata autt.

Ruellia L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Ruellie“, fr. crustolle (n. d. franz. Arzt etc. Jean de la Ruelle, lat. Ruellius in Soissons, Leibarzt Franz L., † 1537, schr. de natura Stirpium), Zier. R. superba Dietr. (formosa Andr., elegans Poir.) (Hstr. Brasil.), maculata Wall. (Ostind.) etc.

Rumex L. (Polygonaceen, VI. 3) Ampfer, fr. raguette u. oseille, e. sorrel u. dock (lat. rumex, -icis v. δύμα Fluss, Paxton: v. rumo sauge?, rumo od. -mis säugende Brust), Gärten R. Patientia L. s. g. englischer Spinat, scutatus L. Schildampfer, wild: R. Acetosa L. Wiesen-Sauerampfer, fr. oseille ordinaire, e. sorrel, R. Acetosella L. Spitzampfer, R. aquatīcus L., fr. plante britannique, R. crispus L., sanguinēus L. s. nemorosus Schrad., fr. sang-de-dracon, e. bastard-rhubarb, etc.

Rupifraga Ottb. (Sileneen, X. 3) „Felsbrech“, s. Silēne rupestris L. (v. rupes, -is Felsen, frango zerbreche — liebt stein. Boden!).

Ruppia L. (Fluvialen od. Potamogeoen, IV. 3) Seestrands- od. Meerfaden, Wasserriemen, Salde O. W. (n. d. deutsch. Bot. Bernh. Rupp, lat. Ruppius), R. maritima L. (*Buccaferrēa* m. Mich.).

1) **Russelia** L. (Saxifragaceen, V. 2) „Russellie“, R. s. Vahlia Thb. capensis (n. d. Bot. Lord John Russell, Herz. v. Bedford, Wtst.: n. d. engl. Arzt u. Orient-Reis. Alex. Russell, † 1786). 2) **Russellia** Jacq., Juss. (Scrophularineen, XIV. 2) „Russellie“, Zier. (Ampeln) R. juncēa Zucc., multiflōra Sims, sarmentosa v. semperflorens Hort.

Ruscus L. (Sarmentaceen, XXII. 13) Mäusedorn, fr. bruse (bruse) (lat. Radix Brusci), fragon, houx frélon, petit-houx, auch husson, e. butcher's-broom „Fleischerbesen“, knee-holm (rus., -ris Land, scopae Besen, ruris scopae, unde Ruscus Plin.), z. B. androgynus L. (Canar.).

Russula Fr., Pers. (Hutpilze, XXIV. 4) „Rotpilz“, Reizker (dem. v. *russus* rot), z. B. *emetica* s. *lurida* Pers., s. g. „Täubling“, s. *Agaricus* em. Schaeff., R. *foetens* Pers. Stink-Täubling, essb. aurata, lutca etc.

- 1) **Ruta** L. (Rutaceen, VIII. 1) „Raute“, fr. rue, e. rue, herb of grace (gr. ἥριν v. ἔρωμα rette od. ἥρω mache fliessen), R. *graveolens* L. Duft- od. Gartenraute, fr. sauve-vie. 2) **Ruta muraria** (sc. *Asplenium*) L. (Farne, XXIV. 1) Stein- od. Mauerraute, e. wall-rue od. stonefern. — Rutaceae Juss., DC., -tariae Rchb. Rautengew.

Sabadilla (sc. *Veratrum*) L. (Melanthaceen, VI. 3) Läusesamen, fr. cévadille, e. louse-wort (-bane) (dem. v. *cebada* span. Gerstenkorn).

Sabal Adans. (Palmen, VI. 1) Zwergpalme (vaterl. Name!), Stuben *S. umbraculifera* Mart. (Blackburniana Hort.), *Adansoni Guerus* (*Corypha minor* Murr.).

- 1) **Sabbatia** Adans. (Gentianeen, V. 1) „Sabbatia“ (n. d. ital. Bot. Const. *Sabbati*, schr. 1772—84 üb. d. röm. Gart., Wtst. n. *Liberatus Sabbati*, schr. 1745 Synops. pl. Romae), Gewächsh. S. *campestris* Nutt. (Tex.). 2) **Sabbatia** Mnch. (Labiaten, XIV. 1) „Sabbati's“-Lippenblume.

Sabīna (sc. *Juniperus*) L. (Junipereen od. Cupressineen, XXII. 12) Sade- od. Sevenbaum (Sieben-, Seben-), Mägdebaum, Stinkwachholder, fr. sabine od. savinier, e. sabine od. common savin (v. *Sabīna* Sabinierin? Seben (Seven) d. lat. *sabīna*, Wtst.: σέβω verehre — weg. d. Heilkraft! — ungewiss).

- 1) **Sabinēa** DC. (Papilionaceen, XVII. 4) „Sabine's“ Schmetterlingsblüter (n. d. engl. Bot. J. *Sabine*, Stifter d. Vereins f. Gartenkultur in London, † 1837). 2) **Sabinēa** C. Koch (sect. v. *Pinus* L.) (Coniferen, XXI. 9) Sabine-Kiefern (— 3 Nadeln in d. Scheide), z. B. P. *Sabineana* Dougl. (n. d. Reis. Sabine, 1823 in Grönland), Coulteri Don (*macrocarpa* Lindl.), Jeffrei Oreg. „Jeffrey's“-K. (alle in Californ.), Gerardiana Wall. (Himal.).

Sabulina Rchb. (zu *Arenaria* L.) (Alsineen, X. 3) „Sandmiere“, fr. sabline (v. *sabūlūm*, fr. sable Sand — Standort), z. B. *stricta* Rchb. (*Aren. uliginosa* Schleich.).

Saccharum L. (Gramineen, III. 2) Zuckerrohr, fr. canne à sucre, e. sugar-cane (gr. ούζυγον, arab. soukar), S. *officinarum* L. gem. Z. m. v. off. *violaceum*, S. *cylindricum* Lam. u. Maddeni Hort. (Ziergr.).

Saceolabium Blum. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Sacklippe“ (saccus u. labium), z. B. *guttatum* Ldl. (*Sarcanthus gutt.* ds. s. *Aerides retusa* Sw.), s. *Saccochilus* Blum.

Sagina L. (Alsineen, X. 3) „Mastkraut“, Knebel O. W., fr. sagine, e. pearl-wort (sagina Mästung etc.), Zier. S. *subulata* Wimm. (*Arenaria sub. s. acicularis* Hort.).

Sagittaria L. (Alismaceen, XXI. 5) „Pfeilkraut“, fr. saette od. sagette, léchière „Lieschkraut“, e. arrow-head (v. *sagitta* Pfeil — Form d. Blätter!), z. B. *sagittifolia* L. m. v. fl. plen. s. *japonica* Hort., S. *sinensis* s. gigantēa u. *lancifolia* Hort.

Sagus Rumph., G., Jacq., W. (Palmen, XXI. 7) „Sagopalme“, fr. sagu od. lançan, e. sago-tree (malay. sagu d. Name v. mancherlei Palmen), Zapfenpalme Perring, z. B. S. *Rumphii* W. (*Raphia Comm.*, *Metroxylon Rott.*, *Saguerus Rumphii* Roxb.), s. *Arenga saccharifera* Lab. (*Gomutus* sach. Rumph.), S. *taedigera* Mart., *vinifera* Hort. (*Raphia v. P.-B.*) (Guinea), S. *Ruffia* Hort. (Madag.) etc.

Salicaceae Rich., -liecæae Rchb., -lieimæe Rich., DC., -einæae Seub. (zu Ord. Iteoidæa Bisch.) Weiden (s. *Salix*).

- Salicaria** T. (sc. Lythrum) L. (Lythraceen, XI. 1) „Weiderich“, fr. salicaire, gem. Blutkraut (v. salix, -icis Weide — wächst unter solchen!). — Salicariae Juss., -cariæ Rchb.
- Salicornia** T., L. (Aizöideen Atripliceen od. Chenopodiaceen, II. 1) Glasschmalz, „Salzhorn“-Kraut, fr. salicor (-cot, -corne), e. glasswort (v. sal, -lis Salz, cornu Horn — d. Zweige wie Hörner spitz etc.).
- Salisburia** Sm. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) „Salisbury's“- od. Gingkobaum (n. d. engl. Gärtn. u. Bot. R. A. Salisbury), Zier. S. adiantifolia Sm. = Gingko biloba L.
- Salix** T., L. (Salicaceen, XXII. 2) Weide, fr. saule, e. willow, withy „Wiete“ u. wicker (salix, -icis Weide, v. d. celt. sal nahe u. lis Wasser), z. B. Zier. S. babylonica L. Trauer- od. Thränenweide, fr. saule pleureur, e. weeping-willow, s. pendula Mnch., m. v. annularis Hort. Locken-W., wild u. Zier.: S. daphnoides Vill. (praecox Hoppe) gem. Reif- od. Duft-W., acutifolia W. (pruinosa Bess., caspica Hort.), amygdalina L. (triandra Hoffm.), viminalis L. gem. Korb- od. Flechtw., fr. u. e. osier (ozier), pentandra L. Lorbeerw., alba L. gem. Weiss- od. Kopfw. m. v. vitellina L. Gold- od. Dotterw. u. v. argentea Hort. s. regalis Hort. Silberw., fragilis L. Bruch- od. Knackw., purpurea L. (Napoleonis, nigra pendula, babylonica violacea Hort.), S. Helix L. gem. Bachw. (m. v. uralensis Hort., v. Doniana Sm. u. v. mirabilis Hort.), rubra Huds. (m. v. Forbiana Sm., v. Pontederana W. Koch, v. austriaca Host. etc.), S. Caprea L. Sal-, Sohl- od. Palmw. (m. v. pendula Hort. u. Hybrid. capr. fol. varieg. od. tricolor etc.), Silesiaca W., aurita L., cinerea L., phylacae- u. prunifolia Sm., S. Elaeagnos Scop. (rosmarinifolia u. aspleniifol. Hort.) Rosmarin-W., u. a. m.
- Salpianthus** HB. Bpl. (Nyctagineen, V. 1) „Trompetenblume“ ($\sigma\alpha\lambda.\tau\iota\gamma\zeta$ Trompete, $\alpha\nu\vartheta\circ\sigma$ Bl.), s. Boldo Lag.
- Salpiglossis** Rz. Pv. (Srophularin. od. Solaneen, XIV. 2 od. V. 1) „Trompetenzunge“ (s. eb. u. $\gamma\lambda\tilde{\omega}\sigma\sigma\alpha$ Zunge — d. Griffel bild. eine röhr. Zunge!), Zier. S. sinuata R. P. s. variabilis Hort. (Chili) m. v. nana Hort., coccinea Van Houtt. etc.
- Salsöla** L. (Chenopodiaceen, V. 2) „Salzkraut“, fr. salsovie, marie u. cornulaque, e. salt-weed (-wort) (dem. v. salsus salzig — Salzboden!), z. B. S. Kali L. gem. S. (Kali siculum lignosum Bocc.), S. aphylla L. (Caroxylon Sals. Thb., Cap).
- Salzwedelia** G. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Pfeilginster, S. sagittalis Fl. Wett. (n. P. Salzwedel in Frankfurt a. M. im vor. Jahrh.), s. Genista sag. L. (Cytisus s. Koch).
- Salvadöra** L. (Phytolacceen, IV. 1) „Salvadore“, s. g. Siwâk (Senfbaum des Neuen Testamentes) (n. d. span. Bot. J. Salvador ben.), S. persica Vahl, s. Cissus arboréa Forsk. u. Rivinia paniculata L. (Grossularia Embelia Retz.).
- Salvia** L. (Labiaten, II. 1) „Salbei“, fr. sauge, e. sage (v. salvus gesund od. salvo rette, heile), Zier. S. Sclaréa L. Muskateller-S., S. Horminum L. Scharlachkraut, S. officinalis L., Garten-S. m. v. tricolor Hort., S. patens Benth. (Mex.), S. splendens Sell. (ponceau-rote Brakteen, Bras.), coccinea L. m. v. v., S. Roemeriana Scheele (Porphyrantha Decsn., Tex., Bras.), tricolor Lem. (Mex.), janthina Ott., Dieter. (Mex.) etc.
- Salvinia** Mich., Guett. (Wasserfarne od. Rhizocarpeen, XXIV. 1) „Salvinie“, Büschel- od. Schwimmfarn, Schwimmblatt O. W., Kugelknäul (n. Ant. Maria Salvinius, Prof. in Florenz im 17. Jahrh.), S. natans All., Hoffm., s. Marsilia natans L. — Salviacées Bartl., -acéi Rchb.

Sambac Ait. (sc. *Jasmīnum*) L. (Oleaceen, II. 1) arabischer Jasmin, fr. sambac (pers. Name zambac!), s. *Nyctanthes Samb.* Thb. (*Mogorium* Juss.).

Sambūens T., L. (Caprifoliaceen Sambuceen, V. 3) Hollunder, Holder od. Flieder, fr. sureau, e. bore-tree, elder- od. pipe-tree (gr. σαυριβύζη Harfe — aus dess. Holz gemacht! od. σάυρινξ äol. rot — bez. d. Fruchtsaftes! ungewiss!), z. B. nigra L. s. vulgaris Lam. Flieder, Sebestenbaum Vilm., fr. sureau commun, e. common Elder, m. v. v. (z. B. v. lacinata Hort., s. g. Petersiljen-H.), S. canadensis L., racemosa L. Trauben- od. Berg-H. m. v. v., californica s. glauca Hort. m. v. Fontenaysii Carr., etc. — Sambucēae H. B. K., -cinēae Batsch (zu Caprifoliacēae Juss., Rchb.).

Samōlus T., L. (Primulaceen, V. 1) „Salzbunge“, fr. samole od. mouron d'eau „Wasser-Gauchheil“ (v. d. celt. san heilsam u. mos Schwein — bei den Galliern geg. Viehkrankh.), Samolēae (sc. Lysimachiaeae) Rchb., Bungen (nicht Pungen! Grck.).

Samýda L. (Amygdaleen Samydeen, X. 1) „Birkenpflaume“ (v. σαυρίδη Birke — Ähnlichk. damit), z. B. polyandra W. (Melistaurum distichon Forst, Necaled.), serrulata L. (Guidonia ulmifolia Plum., Südamerika). — Samydēae DC. (zu Amygdalacēae Rchb.).

Sanchezia Rz. Pv. (Acanthaceen, II. 1) „Sanchezblume“ (n. Jos. Sanchez, Prof. d. Bot. in Cadix), z. B. nobilis Hook., oblonga u. ovata R. P., etc.

Sandersonia Hook. (Sarmentaceen, VI. 1) Maiblumen-Kaiserkrone, S. aurantiaca Hook. (Südafr.) (N. pr.).

Sandoricum Cav. (Hesperideen, XVIII. 2) „Sandoribaum“ (malay. sandori od. santoor).

Sanguinaria Dill., T. (Papaveraceen, XIII. 1) „Blut“- od. Rotwurz, fr. sanguinaire, e. blood-wort (v. sanguis, -inis Blut — gelbroter Saft!), Zier. canadensis L., e. canadian Buccoon, Redrot od. Turmeric.

1) **Sanguisorba** L. (Rosac. Sanguisorbeen, IV. 1) „Blutsauge“, Wiesenknopf, Kölbel O. W., fr. sanguisorbe, e. burnet (v. sanguis, s. eb. u. sorbēo sauge), z. B. officinalis L., Zier. S. media L. (Canada), canadensis L. u. dodecandra Moretti (Alp.). 2) **Sanguis.** (sc. Poterium) L., s. g. „Bibernelle“, jetzt mit 1 zusamm.! s. S. minor Scop. — Sanguisorbēae Torr. u. Gr.

Sanicūla T., L. (Umbelliferen, V. 2) „Heilkraut“, -dolde, Bruchkraut, fr. sanicle, herbe de St. Laurent, e. bear's-ear „Bärenohr“, sanicle u. self-heal „Selbstheil“ (v. sano heile — als Heilm. sehr in Ruf!). — Saniculēae Rchb.

1) **Sanseviéra** Thb. (-severia Réd.) (Liliac. Asparageen, VI. 1) „Sansevierie“ (n. Raim. v. Samaro, Fürst v. Sanseviero in Neapel!, † 1771, Paxton: n. d. schwed. Bot. M. Sansevier), Stuben: S. carnēa fol. varieg. (Reineckia carn. Kth.), zeylanica Thb. (Liriope spicata Lour.) (Faserpfl. Südindiens). 2) **Sans.** Andr. (Aroideen, XXI. 9).

Santalaceae R. Br., DC., Rchb., „Santelgew.“, s. sogl.

Santulum L. (Santalaceen, IV. 1) „Santelbaum“, fr. u. e. santal (auch sandal) (v. d. pers. sandul, arab. sandal „nützlich“), z. B. album L. (Sirium myrtifolium Roxb.), rubrum L. (Pterocarpus santalinus L. f.), paniculata u. Freycinetiana Santelholz d. Sandwichinseln.

1) **Santolina** (sc. Achillēa) L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Heiligen“-Garbe. 2) **Santolina** T. (Compositen Eupatorineen, XIX. 1) „Heiligenpflanze“, Heiligen- od. Dochtkraut, Baumwollenkr. Leun., fr. santoline od. petit cyprès u. aurone femelle „weibl. Äberute“, e. ground-cypress, Zier. S. Chamae-Cyparissus L. u. rosmarinifolia, S. viridis W., fr. S. verdâtre (santolinus v. sanctus heilig u. Linum Lein).

- Sanvitalia** Lam. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sanvitalie“, fr. sanvitalie (n. d. Prof. Sanvitali zu Brescia, † 1767), Zier. procumbens Lam. s. villosa Cav. m. v. fl. pleno Hort., mexicana Hort. (Zinnia Haageana Reg. s. Ghisbreghtii Verlot).
- Sapindus** L. (Sapindaceen, VIII. 3) „Seifenbaum“, fr. savournier, pomme de savon, e. soap-berry (sope-) (contrah. aus sapo indus „indische Seife“ — d. fleisch. Samenmantel als Seife!), z. B. edulis Ait., s. Dimocarpus Litchi Lour. „Zwillingssplaume“. — Sapindaceae DC., Rchb., -dæe Rchb., -di Juss.
- Sapinus** Endl. (zu *Pinus*) (Coniferen, XXI. 9) „Saftanne“, fr. sapin (v. sapo Saft, *Pinus* Tanne).
- Sapium** Jacq., P. Br., Juss. (Euphorbiaceen, XXI. 2) „Fettbaum“ (v. d. celt. sap fett od. klebrig — in Südamer. als Vogelleim!), z. B. aucuparium Jacq., s. Hippomæne biglandulosa L.
- 1) **Saponaria** L. (Sileneen, X. 2) „Seifenkraut“, fr. saponaire od. savonnière, e. bruise-wort od. saponary, auch soap-wort (-weed), Zier. officinalis L. m. v. v. (fl. pleno etc.), calabrica Guss. (multiflora Hort.) m. v. fl. albo Hort., caespitosa DC., Stuben: ocinoides L.
 - 2) **Saponaria** Lour. (sc. *Sapindus*) L. Seifenbeerbaum (sapo, -ōnis, gr. σάπων, -ώρος Seife).
- Sapotä** Mill. (Sapotaceen od. Lucumeen, VI. 1) „Sapotillbaum“, s. g. Breiapfel, fr. sapote (-tier, -tillier) (in Mex. cochit-zapotl!), s. Achras Sapota L. (Surin.). — Sapotaceae Rchb., -tæae R. Br., -tae Juss., „Sapotaceen“.
- Sappan** (sc. Caesalpinia) L. = **Sappania** DC. (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) „Sappan“- od. Brauholzb. (malayisch. Name!).
- Sarāna** Kamschatčika Hort. (Liliaceen, VI. 1) „Serenna“ od. kamschadalische Kaiserkrone (vaterl.), s. Fritillaria Kamsch. autt. (essbare Zwiebelknollen!).
- Sarauja** s. **Sauravia**!
- Sarcanthus** Lindl. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Fleischblume“ ($\sigma\alpha\varphi\zeta$ - $\chi\omega\zeta$ Fleisch, $\alpha\rho\vartheta\zeta$ — fleisch. Blüten!), z. B. paniculatus Ldl., s. Aerides pan. Ker.
- Sarcocéphalus** Afz. (Rubiace. Cinchonac., V. 1) „Fleischkopf“, essbare Chinabeere (s. eb. u. $\gamma\epsilon\varphi\alpha\lambda\eta$ Kopf), S. esculentus Afz.
- Sarcochilus** (nicht -um!) R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Fleischlippe“ (s. v. u. $\gamma\epsilon\lambda\zeta\zeta$ Lippe — Mittellappe d. Labells fleischig!), z. B. falcatus R. Br. (Neuholl.), nepalensis Spr. (Gastrochilus calceolaris Don s. Saccolabium c. Ldl.).
- Sarcostemma** R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Fleischkrone“, Pfeffermilch D. (s. v. u. $\sigma\tau\epsilon\mu\mu$ Krone, Kranz — d. Blättch. d. inner. Blumenkrone fleischig!), z. B. annulare Roth (Ostind.), s. Asclepias viminalis (Cynanchum vim. L.).
- Sargassum** Ag. (Tange, XXIV. 3) Beerentang, „Sargasso“-Meertang (portug. sargasso Seegras, Wtst.: $\sigma\alpha\varphi\gamma\alpha\eta$ Band — platte Thalluszweige!).
- Sarmentacées** Rchb. Zaukenlilien, fr. sarmentacées (v. sarmentum Schößling, s. g. Zauke).
- Sarmienta** Rz. Pv. (Gesneraceen, II. 1) Kletterhelm (n. d. span. Bot. Mart. Sarmiento ben.), Warmh. S. repens R. P., s. Utricularia fol. carnosis Feuill. (Chili).
- Sarothamnus** Wimm. (Légumin. Genisteen, XVII. 4) „Besenstrauch“, Pfrieme, gem. Besenpfriemen Rmpl. ($\alpha\acute{\iota}\omega\varrho\sigma$ Besen, $\vartheta\acute{\iota}\omega\varrho\sigma$; Strauch), fr. spartion, e. broom, S. scorpiarius Wimm., s. Spartium Sc. L.
- Sarracenia (-cinia)** L. (st. *Sarrasinia* Croom.) (Cistineen Droseraceen, XIII. 1) Wasserkrug, Damensattel, Trompetenblatt (n. Dr. J. A. Sarrasin, Übers. d. Dioscorides 1598, Wtst.: n. d. Arzt Sarrasin in Que-

bec im 18. Jahrh., schr. üb. d. Natg. v. Canada), Kalth. S. Drummondii Hook. m. v. alba u. v. rubra, S. purpurea L., flava L. m. v. Catesbaei, etc. — Sarraceniæ Rehb.

Sarsaparilla (-parrilla) (sc. *Smilax*) L. (Smilaceen, XXII. 6) „Sarsaparillen“-Smilax, fr. salsepareille, e. sarsa od. sarsaparilla (in Südamer. aus zarza span. Brombeerstr. u. parrilla dem. v. parra Weinstock — kl. wind. Str. m. Stacheln!), s. *Smilax glauca* Mchx.

Sassafras F. v. Nees (Laurineen, IX. 1) „Sassafras“-Lorbeer, fr. sassafras, pavamie, bois de canelle, laurier des Iroquois „Irokesen-Lorbeer“, e. sassafrass (saxafr.-) u. ague-tree (vaterl. Name!), S. officinalis F. v. N., s. Perscā s. *Laurus* *Sass.* L.

Sassaparilla W., s. *Sarsap.*- L.

Satureja T., L. (Labiaten, XIV. 1) Pfefferkraut, Bohnenkräutchen, „Serge“ O. W., fr. sarriette, e. savoury od. dittander u. thymbra, Gärt.: S. hortensis L. u. Thymbra L. (lat. saturēja od. -jum von Σάτυρος Satyr — weg. d. aphrodisischen Wirkung!). — *Saturinæae* Benth.

Satyrium Sw., L. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Satyr“-O., Bocksgeilen Dietr., fr. testicle de chien, e. satyron (gr. Σάτυρος geilmachende Pfl. F. W. Riemer, v. d. arab. satar Bock), s. *Orchis* etc.

Satyrus Bosc (Pilze, XXIV. 1) „Satyr“-P. (Σάτυρος Satyr, geiler Bacchus-Gefährte, Myth.), S. rubicundus Bosc, s. *Phallus rubic.* Fr.

Sauraja (-anja, -avia) W. (Theaceen Ternstroemiaceen, XII. 5 oder XIII. 3) „Saurauja“-Theestr. (n. d. port. Bot. Graf Fr. v. Saurauja, Willdenow's Bekannten, g. z. Wien 1760 etc., Dietr.: n. d. Geheimrat Graf v. Saurau!), Warmh. S. macrophylla u. excelsa W. (südamer. B.!), s. *Palava* R. P. u. *Ternstroemia* Mut. — *Sauraujæae* A. Juss.

Sauromatum Schott (-tium Spach) (Araceen Dracunculaceen, XX. 9) „Sarmaten“-Aron (v. Σαυρομάται od. Σαρμαται Sarmaten in Südrussland, Wtst.: σαῦρος Eidechse u. μάται d. Suchen — von den Eidechsen aufgesucht!), S. guttatum Schott., s. *Arum pedatum* Wall. s. *Colocasia* Brong. (Nepal, Java).

Saururus L. (Piperaceen Saurureen, VII. 3) „Eidechsen“- od. „Molchschwanz“ Rmpl., fr. lézardelle u. saurure (σαῦρος od. -οη Eidechse, οὐρά Schwanz — bez. d. Blütenkätzchen!), Zier. S. cernuus L. (Virg.), s. *Serpentaria repens* Pluk., S. natans L. (*Aponogéton monostachyon* L.) etc. — *Saururæae* Rich.

Sauvagesia Jacq., St. Hil. (Violaceen od. Droseraceen, V. 1) „Sauvagesie“ (n. d. Prof. F. B. Sauvages in Montpellier, † 1767), z. B. elegantissima St. Hil. (*Lavradia* el. St. Hil.), erecta Jacq. — *Sauvagesiæae* Bartl. (zu Violacæae Rehb.).

Saxe-Gothaea Lindl. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) „Sachsen-Gothäe“ (n. d. Prinz. Albert v. Sachsen-Gotha, Königin-Gemahl v. England), *Saxgothaea conspicua* Ldl.

- 1) **Saxifraga** L. (Corniculaten Saxifrageen, X. 2) „Steinbrech“, fr. u. e. saxifrage (v. *saxus* Fels u. *frango* zerbreche — Standort!), Zier. (Ampel) S. sarmentosa L. (Diptera s. Borkh.), s. g. Judenbart, Garten: S. umbrosa L., s. g. Porzellanblümchen Rmpl., crassifolia L. roter od. sibirisch. Garten-St., e. drop-wort, Fortunéi Hook. m. v. tricolor Hort., oppositifolia L. m. v. pyramidalis Hort., S. Cotyledon L. etc. 2) **Saxifr.** (sc. *Gypsophila*) L. (Caryophylleen, X. 2) steinbrechende Felsnelke Grck., s. *Tunica* *Sax.* Scop. 3) **Saxifr.** (sc. *Pimpinella*) L. (Umbelliferen, V. 2) gem. Bibernelldolde, fr. sauvage de montagne (- de Virginie), e. break-stone u. London-pride, auch mountain-heath. 4) **Saxifr.** (sc. *Silene* L. s. *Lychnis* Scop.)

(Sileneen, X. 3) steinbr. Leimkraut (Alp.). — Saxifragacæe Vent., DC., -gæa R. Br., -gae Juss., „Steinbrechartige“.

- 1) **Scabiösa** L. (Aggregaten od. Dipsaceen, IV. 1) „Grindrose“, fr. scabieuse, e. scabious (v. scabies, -ei Räude, Grind), Zier. S. atro-purpurea Desf. m. v. v. (z. B. candidissima u. nana), fr. fleur des veuves, e. sweet-scabious, s. g. Wittwenblume, s. Asterocéphalus atrop. Spr., S. caucasica M. B., tatarica Gm., alpina L., etc. 2) **Seabiosia** (sc. Centauræa) L. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Scabiosen-Flockenblume“.

Scammonia (sc. Convolvulus) L. (Convolvulaceen, V. 1) „Scammonium“-Winde (arab. scamunia, od. v. d. gr. σαδίμια Gegrabenes?), s. Scammonia syriaca Mor.

Scandix G. (Umbelliferen, V. 2) Kerbel, Nadelkerbel Seub., Hechel O. W., e. cicely u. shepherd's-needle, cow-weed (v. scando klettere? gr. οζάρδιξ, -ιος Kerbel), z. B. Cerefolium L. Garten-K., fr. cerfeuil, e. sweet-cicely (-fern), S. Pecten L. Kamm-K. od. Venuskamm, S. odorata L., s. Myrrhis Scop.

Seariöla Endl. (sc. Lactuca) L. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) Wild-lattich (st. seriöla dem. σέριος Salat, od. st. Serriöla dem. serra Säge — sägeartige Rippenstacheln d. Blätt.).

Schedonorus P.-B. fehlerh. st. Schoenodorus P.-B. (nicht etwa von σχέδον in der Nähe u. ούος Berg!).

Scheeria Seem. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Scheerie“ (n. Fr. Scheer Esq. ben.), Treibh. S. mexicana Seem., s. Achimenes Scheerii Hort.

- 1) **Schelhammera** R. Br. (Liliac. od. Melanthac., VI. 1) „Schelhammer's“-Giftlilie (n. d. Prof. C. C. Schelhammer in Jena), z. B. undulata R. Br. u. multiflora ds. (Str. Neuhol.). 2) **Schelhammeria** Mnch. (Cyperaceen, XXI. 3) „Schelhammer's“ Cypergras, S. cype-roides Mnch. 3) **Seh.** Heist. (Cruciferen).

Scheuchzeria L. (Juncaceen, VI. 1) Blumensimse, Moorbinse, Spinnling O. W. (n. d. Prof. Scheuchzer in Zürich, † 1738, s. d. Aut.), S. lacustris L.

Schinus L. (Terebinthaceen Anacardieen, XXII. 9) Mastix-Nierenbaum (gr. σχίνος Mastixbaum, v. σχίζω schneide ein — nämnl. dass d. Harz fliesst, lat. lentiscus), z. B. S. Molle L. peruvian. Pfefferbaum (Piperodendron Heist), S. tragodes L. (Fagara tr. L., Xanthoxylon tr. DC.).

Schisandra Sm. (**Schiz-**) Mehx. (Menispermeen Schisandreen, XXI. 5) „Spaltantheren“ - Mondsamen, „Spaltbeutel“ D. (v. σχίζω spalte, ἀρῆρ, -ρος Mann, Bot. Staubbeutel — diese öffnen sich durch vertikale Ritzten), z. B. coccinea Mehx. (Schlingstr. Nordam.), chinensis (Kadsura) Turcz. u. japonica L. (Kads. u. Uvaria j.).

Schisanthes Haw., s. Schisanthes Endl.

Schistocarpi C. Müll. (sc. Musci) spaltfrüchtige Laubmoose (σχιστός v. σχίζω gespalten, ζαρτός Fr.).

Schistostega Web., Mohr (Moose, XXIV. 2) „Spaltdeckel“-Moos (s. eb. u. στέγη Deckel — dies. zerreißt strahlig), z. B. osmundacea Web., M., s. Gymnostomum pennatum Hedw.

Schizaea Sm. (Osmundaceen-Farne, XXIV. 1) „Spalt“-Rispenfarn (v. σχίζω spalte — fächerf. gespalt. Wedel!).

Schizandra s. **Schisandra**!

Schizanthes Endl. (**Schis-**-Haw.) (Amaryllideen, VI. 1) „Spaltblumen“-Narzisse (s. v. u. ἄρθη Bl. — Kranz d. Blütenschlunds gelappt!), s. Narcissus L.

Schizanthus Rz. Pv. (Scrophularineen, II. 1) „Schlitzblume“ (s. v., ἄρθος — d. Krone zweilipp., d. Lippen gespalten!), Zier. S. pinatus R. P. m. v. v., retusus Hook. m. v. v., papilionaceus Hort. m. v. albus, L. Grahamii Hook.

Schizolobium Vogel (Cassieen, X. 1) „Spalthülse“ (s. v., $\lambda\acute{o}\beta\iota\sigma\tau$ Hülse — d. lederart. Epicarp trennt sich v. d. häut. Endocarp!), S. excelsum Vog. (B. Bras.).

Schizonotus Lindl. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Spaltrücken“, -blatt od. -blume (s. v. u. $\nu\acute{a}\tau\sigma\zeta$ Rücken, Wst. $o\bar{\iota}\varsigma$, $\omega\bar{\iota}\varsigma$ Ohr — d. Blätt. fiederspalt. u. m. Blattohren!), Zier. S. tomentosus Ldl., s. Spiraea Lindleyana Wall.

Schizopetalon Sims (-um Hook.) (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Schlitzkronblatt“ (s. v. u. $\pi\acute{e}\tau\alpha\lambda\sigma\tau$ Kronblatt — dies. geschlitzt, fiederspaltig!), Zier. S. Walkeri Sims (Chili).

1) **Schizophyllum** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Spaltlamellen“-P. (s. v. $\varphi\acute{i}\lambda\sigma\tau$ Blatt — d. Lamellen d. Länge nach gespalten!), z. B. commune, s. Daedalea Pers. 2) **Schizoph.** Nutt. (Compositen) (— d. Blätt. dopp. fiederspaltig!).

Schizostylis Harv. (Irideen, III. 1) „Spaltgriffel“ (s. v. u. $\sigma\tau\nu\lambda\varsigma$ Griffel — dies. dreispaltig!), Stuben (Winterbl.) S. coccinea Harv. (Südafr.).

Schlagintweitia Griseb. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) „Schlagintweit's“-Habichtskr. (n. d. Reis. im Himalaya, Gebr. Schlagintweit), S. intybacea Gris., s. Hieracium L.).

Schleicherá W. (Sapindac. od. Malpighieen, XXIII. 2) Macassarölbaum (n. d. Schweiz. Nat. Schleicher, schr. 1815 Verz. d. Schw. Flora, s. d. Aut.), S. trijuga W. (Stadmannia tr. Lam.), s. Melicocca Juss. (B. Ceylon).

Schlismia Planch. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Schlimmie“ (Eigenname), z. B. trifida Rchb., s. Wallisia Schwägr.

1) **Schmidtia** Tratt. (Gräser, II. 1) Scheidenklapp-Gras (n. Fr. Wilib. Schmidt, Prof. in Prag, † 1796), S. subtilis Tratt., s. Coleanthus s. Seid. „Scheidenblüte“. 2) **Schm.** Mnch. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1), s. Aethonia D. Don (n. d. Bot. J. A. Schmidt, s. d. Aut.).

Schobéra (-ia) C. A. Mey. (Amarantac. od. Chenopodiace., V. 2) „Schobere“ od. Soda-Gänselfuss (n. d. Reis. Gottl. Schober, an d. Wolga etc. 1717—18), S. maritima C. A. Mey., s. Suaeda m. Dumort. u. Chenopodium m. Moq., Tand.

Schoenia Steetz (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Schönie“ (n. Dr. J. M. A. Schön in Hamburg), Zier. S. oppositifolia Steetz, s. Helipterum Cassinianum DC.

Schoenoprasum (sc. Allium) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) Schnittlauch, fr. cive od. civette, e. chives od. porret u. shalot (v. $\sigma\chi\omega\iota\sigma\zeta$ Binse, $\pi\acute{a}\sigma\sigma\sigma\sigma\sigma$ Lauch).

Schoenodorus P.-B. (nicht **Schedonorus** P.-B.) (Gräser, III. 2) Binsengras (v. $\sigma\chi\omega\iota\sigma\zeta$ Binse u. $\delta\bar{\iota}\omega\sigma\sigma$ Gabe — d. Blätt. binsenart.!), z. B. pratensis u. arundinaceus Schreb., s. Festuca u. Bromus.

Schoenus P.-B., L. (Cyperaceen, III. 1) Kopfriet, Strickgras, Schmerle O. W., fr. choin ($\sigma\chi\omega\iota\sigma\zeta$ Binse u. Strick — zum Binden benutzt!).

1) **Scholléra** (nicht **Scoll.**-) Roth (Caprifoliac. od. Siphonandrac. Vaccinieen, VIII. 1) „Scholler's“- od. Moosbeere (n. F. G. Scholler, schr. Fl. Barbiensis, Lps. 1775), S. Oxycoccus Roth = Vaccinium Oxy. L. s. Oxycoccus palustris Pers. 2) **Sch.** W. (Commelinaceen, III. 1) „Dünmlume“, s. Leptanthus Mehx. 3) **Sch.** Rohr (Chenopodiac. od. Amarantaceen, XXI. 4) Kleinfrucht-Amarant, s. Microtea debilis Sw. 4) **Sch.** Sw. (Phytolaccaceen, X. 5).

1) **Schomburgkia** Lindl. (Orchid. Epidendreen, XX. 1) „Schomburgk's“-O. (n. d. Reis. Dr. Rob. H. Schomburgk, in Brit. Guiana Entd. d. Victoria Regia, s. d. Aut.). 2) **Schomburghia** DC. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Schomburgk's“-Schönaster, S. caleoides DC.

Schortia s. Shortia!

- Schotia** Jacq. s. **Scotia** Thb. (**Scottia** R. Br.) (Cassieen, X. 1) (n. Rich. Van der Schot, Reis. mit Jacquin).
- Schottia** Jacq. (Asclepiadeen, V. 2) „Schott's“ Asclepias (n. H. Schott).
- Schousboea** W. (Myrobalaneen, XI. 1) „Schousboe's“-Schlingstr. (n. d. dän. Reis. in Marokko 1791/93 Assessor Schousboe, s. d. Aut.), Zier. S. coccinea W. (Guian.), s. Cacoucia Aubl., DC.
- 1) **Schubertia** Mart., Zucc. (Asclepiadeen, V. 2) „Schubert's“ Wachspfl. (n. d. Prof. Schubert in Erlangen, s. d. Aut.), z. B. multiflora Mart.
 - 2) **Schub.** Mirb. (Cupressineen, XXI. 9) Wasser-Cypresse (zu Cupressus Rehb.), z. B. S. disticha Mirb., s. Taxodium Rich. s. Cupressus (Zierb.).
 - 1) **Schweiggeria** St. Hil. (-ria Spr.) (Myrobalaneen od. Violaceen, V. 1 od. XIX. 6) „Schweigger's“-Veilchen (n. d. Prof. Schweigger, s. d. Aut.), z. B. Warmh. S. microphylla u. pauciflora Spr., s. Glossarrhen Mart. 2) **Schweiggeria** Mart. (Guttiferen Clusiaceen, XXIII. 1), s. Renggeria Meissn.
- Schweykerta** Gm., W. (Gentianeen, V. 2) „Schweykert's“ Teichblume, Seekanne etc. (n. J. M. Schweykert, s. d. Aut.), S. Nymphoides Gm., s. Villarsia Nymph. Vent. (Limnanthemum etc.).
- Sciadocalyx** Reg. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Schirmkelch“ (σκιάς, -άδος Schirm, κάλυξ Kelch), Zier. Warscewiczi Reg.
- Sciadophyllum** P. Br. (fehlerh. **Sciodaph.-!**) (Araliac., V. 5) „Schirm“-od. Schattenblatt Seub. (zu Actinophyllum R. u. S.), z. B. Brownii Spr., s. Aralia Sciadoph. Hort. (v. σκιάς, -άδος u. φύλλον — d. Blätter fingerf. ausgebr. wie ein Schirm).
- Sciadopitys** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Schirmtanne“ (s. v. u. πτέρυξ Fichte etc. — d. Zweige stehen im Quirl!), Zier. verticillata S. u. Z., s. Taxus vert. Thb.
- Scilla** L. (Liliaceen, VI. 1) Meerzwiebel, Haspel od. Zille O. W., fr. scille od. squille, e. squill, sea-onion ('leek) (gr. σκιλλα Meerzwiebel v. σκιλλω i. q. σκιλλω spalte — d. Zwiebel in dünne Blätter!). wild u. Zier. S. bifolia L., s. g. Sternhyazinthe Seub. od. Blaustern Rmpl., S. amoena L. (Hyacinthus stellaris Jacq.), campanulata Ait., italicica L., nutans Sm., sibirica Andrcz., peruviana L. (Hyac. peruv. Hort. s. Sc. Clusiana Hort.) m. v. v., nivalis Hort. etc., s. Agraphis Lk.
- Scimmia (Skimmia)** Thb. (Xanthoxyleen, IV. 1) „Skimmie“ (vaterl. Name Miyama Skimmi, Japan), Gewächsh. S. japonica Thb.
- 1) **Scizophila** Heller (Smilaceen, VI. 1) „Schattenlieb“, -blume (σκιάς Schatten, φίλος Liebhaber), S. convallarioides Wib., s. Majanthemum bifolium (Smilacina b. Desf.). 2) **Scizophila** Gaud. (Urticaceen, XXI. 4) (— schattig. Stand!).
- Scirpus** T., P.-B. (Cyperaceen, III. 1) Simse, fr. scirpe, e. rush, bent-grass, reak (reate) (lat. scirpus Simse u. Binse, v. d. celt. sirs Binse, davon scirpo ich binde).
- Seitamineae** Bartl., DC., Endl., Rehb. Bananengew., Gewürzschilfe (-lilien) (v. scitamen, -inis Peitsche — weg. d. Wurzelausschläge!).
- Sclarēa** T. (sc. Salvia) L. (Labiaten, II. 1) Muskateller-Salbei, „Scharleien“ G. Fr., fr. sclarée od. orvale, toute-bonne, e. clary-sage u. orvial (Sclarēa — d. latinisierte „Scharlei“, ital. schiarea — v. clarus?).
- Scleranthus** L. (Portulacac. Sclerantheen, X. 2) Knaul (eig. Gnaphalium, fr. gnavelle Mej.), „Knorpelblume“ (v. σκληρός hart, ἄρθρος — feste, vertrockn. Blüte!), z. B. polycarpus L. (Vermicula nova planta Col.). — Scleranthacēae Lk., Grck., -thēae Rehb. (zu Portulacacēae ds.).
- Sclerochlōa** P.-B. (Gräser, III. 2) „Hartgras“ (s. eb. u. ξύλα od. η Gras — Gräser v. dürr. Ansehn m. Borstenblättern!), z. B. dura u. rigida P.-B., s. Cynosurus dur. L. u. Megastachya rig. R. u. S.

Scleroderma Pers. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) „Hart“- od. Kartoffel-Bovist (s. v., *δέρα* Fell etc. — Peridium fest, rindenartig!), z. B. vulgare Fr. falsche Trüffel. — Sclerodermē DC.

Sclerotium Tode (Urpilze, XXIV. 4) „Hart“- od. Knorpelpilz (*σκληρότιον* i. q. *σκληρότης*; Verhärtung — nämli. d. Schlauchlager!), z. B. clavus Fr. s. g. Mutterkorn (Hungerkorn).

Scollēra Roth s. Schollēra!

Scolochlōa Lk., Koch (Gramineen, III. 2) „Stachelgras“ (*σκωλός* Dorn etc. — weg. d. Kelchspelzen!), z. B. arundinacēa M. u. K. zahmes Rohr = Arundo Donax L. (Donax arundinac. P.-B.).

Scolopendrium Sm. (Farne, XXIV. 1) Hirschzunge, Zungenfarn O. W., fr. scolopendre, e. mule-fern, stone-wort od. scolopendra (v. *σκολοπέρδηα* Skolopender od. Tausendfuss — weg. d. Fruchthaufen, Wtst.), Zier. Sc. officinarum Sm. m. v. v., s. Asplenium Scolop. L.

Scelosanthus Vahl (Cinchonac. Coffeaceen, IV. 1) „Stachelblume“, s. g. Tutenbl. D. (s. v., *ἄρθρος* — Kronlappen zurückgekrümmt! Wtst.), z. B. versicōlor Vahl (Catesbaea parviflōra Lam., Str. Ins. St. Cruz).

1) **Scolymus** (sc. Cynāra) L. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) gem. Artischoke, fr. artichaut, e. artichok u. shard (v. *σκῶλος* Dorn — Pfl. sehr stachlig!). 2) **Scol.** (sc. Protēa) L. (Proteaceen, IV. 1) Artischocken-Weissbaum, s. Leucadendron scolymocephalūm L. f. 3) **Scolymus** L. (Compos. Carduac., XIX. 1) Golddistel M.-Rchb., z. B. maculatus L.

1) **Scopolia** Jacq. (-la ds.) (Solaneen, V. 1) „Scopolie“ (n. d. Nat. Scopoli z. Pavia, s. d. Aut.), z. B. carniolica Jacq. = Hyoscyāmus Scopolia L. (Scopolina R. u. S.). 2) **Scopolia** L. (Thymelāceen, XX. 6), S. composita L., s. Daphne pendula Sm. 3) **Scopolia** Sm. (Xanthoxyleen, V. 1 od. XXI. 5) Scopoli - Gelbholz, s. Toddalia Juss. u. Paullinia Schum. 4) **Scopolia** Forst. (Euphorbiaceen od. Trikoken, XXIII. 2), s. Griselinia Forst., z. B. lucida Forst. (Str. Neuseel.). 5) **Scop.** Ad. (Cruciferen).

Scopolina R. u. S. (Solaneen, V. 1) Krainer Toll- od. Frühlings-Wolfskirsche (vgl. 1. Scopolia Jacq., n. Scopoli ben.), S. atropoides Schult., s. Scopolia carniolica Jacq. (Atrōpa c. Scop.).

1) **Scordium** Sloan. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Knoblauchstrauch“ (*σκόρδιον* dem. *σκόρδον* Knoblauch), S. maritīnum fruticosum Sloān., s. Stemodia maritima Jacq. (Stemodiaca m. P. Br.). 2) **Scordium** T., Cav. (sc. Teucrium) L. (Labiaten, XIV. 1) knoblauchduftender Stachel-Gamander, fr. chamarras (Scordium spinosum Cav.), s. Teucrium spinosum L.

1) **Scorodonia** T. (sc. Teucrium) L. (Labiaten, XIV. 1) salbeiblättr. od. Knoblauch-Gamander (s. eb.). 2) **Scorodonia** (sc. Scrophularia) L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Knoblauchs“-Braunwurz.

Scorodoprasum Mich. (sc. Allium) L. (Liliaceen, VI. 1) Schlangen- od. wilder „Knoblauch“, e. scordion (-diūm) (s. eb. u. *ποάσσον* Lauch).

Scorodosma Bunge (Umbelliferen, V. 2) „Knoblauchduft“, s. g. Teufelsdreck (s. v. u. *δούρι*) Duft), s. Ferula Asa foetida L.

Scorpiurus L. (Legumin. Hedsareen, XVII. 4) „Skorpionschwanz“, -klee, s. g. Raupenklee, fr. chenille, e. scorpion's-tail (Scorpius Skorpion, *οἰοα* Schwanz — gekrümmte u. geglied. Hülse!), Zier. S. vermiculatus L., fr. ch. vermisseau, e. vermicular caterpillar, muricatus L., fr. ch. hérissée, chenillette, e. prickly cater-pillar, subvillosus L., fr. ch. velue, etc.

Scorzonēra T., Vaill., L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Schwarzwurz, „Schlangenwurz“, fr. scorsonère, auch „Vipergras“, e. vipre's-grass (v. seurzon, d. catalon. Wort für Viper, Paxton, od. ital. scorza Rinde u. nēra schwarze).

- Scotia** Thb., Jacq., Ait. (Scottēa DC., Scottia R. Br.) (Cassieen, X. 1) „Scott's“-Cassie od. Guajacstrauch (n. R. D. Scott, Prof. in Dublin, schwerl. d. mittelalterlichen Gelehrten Duns Scotus, † 1308), S. speciosa Thb., s. Guajacum afric. Plum., S. dentata R. Br. (Str. Neuholl.), laevis Ldl. (Str. Afr.) etc.
- Scribaea** Fl. Wett. (Sileneen, X. 3) „Scriba's“-Beeren-Traubenkropf (n. d. Bot. u. Pfarr. Scriba in Arheiligen b. Darmst.), S. divaricata Fl. W., s. Cucubalus baccifer L. (Silene baccifera W.).
- Serophularia** T., L. (Scrophularineen, XIV. 2) Braun- od. Drosswurz O. W., Kropfwurz- od. „Skrophelkraut“, fr. scrophulaire, e. scrophulariy, fig-wort, brown-, kernel- (scrophulae Drüsen od. Skropheln v. scrofa (-pha) Schwein — Gebr. geg. d. Drüsen d. Schweine), z. B. Zier. S. aquatica L., fr. ser. aquatique od. herbe du siège, m. v. fol. variegat. Hort. buntes St. Antonskr. od. Wasserkropfwurz. — Serophulariacēa R. Br., -rinēa ds., Juss., -rinæ (sc. Personatae) Rchb.
- 1) **Scutellaria** L. (Labiaten, XIV. 1) „Schälchen“- od. Helmkrat, Schildhelm od. Schildträger Grck., fr. scutellaire, tertianaire, lysimachie bleue, e. skull-cap (scutella Schüsselchen — näm. auf d. Kelch!), Zier. macrantha Fisch., fr. Toque à grandes fleurs, alpina L. etc. 2) **Scutellaria** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Schüsselflechte (— Fruchtlager schüsself.!).
- Seyphanthus** Sweet, Don, Presl (Loasaceen, XVIII. 2) „Tassenblume“, (v. σεύφην od. σεύδην Wanne od. Tasse, ἄρθος — d. 5 od. 10 Kronblätter kappenf.! Wtst.), Zier. elegans Don, s. Grammatocarpus volubilis Presl.
- Seytanthus** Hook. (Asclepiadeen, V. 2) „Lederblume“ (σεύτος Leder etc., ἄρθος), Zier. S. Gordoni Hook., s. Stapelia s. Hoodia Gordoni Sweet.
- Seaforthia** R. Br. (Palmen, XXIII. 1) „Seaforth's“-P. (n. Franc. Lord Seaforth, Gönn. d. Bot.), Stuben: S. elégans R. Br., Dicksoni u. robusta R. Br., s. Arēca L.
- Sebestēna** G., Dill. (sc. Cordia) L. (Convolvulac. od. Asperifolien, V. 1) „Sebestenpflaume, Brustbeerlein (d. pers. Name d. Frucht sebestan), s. Cordia Myxa L. s. Sebestena officinalis Blackw., Cord. Seb. L. s. Seb. scabra Dill. u. S. domestica (Cord. Myxa Blackw.).
- 1) **Sebifēra** Lour. (Amyrideen od. Laurineen, VIII. 1) „Seben“- oder „Sebestenträgerin“ (s. eb.), S. glutinosa Lour., s. Litsea s. Dimocarpus Litchi (Sapindus edulis Lour.), s. g. Zwillingspflaume. 2) **Sebifēra** Lour. (Euphorbiaceen, XXI. 9) „Talgbaum“ (v. sēbum Talg, fero (trage), s. Ricinus chinensis sebifera Pet. s. Croton sebiferum L. Sebipīra Mart. (Palmen) (südamer. Name! Wtst. od. s. eb. u. pira od. pera ital. Birne?).
- Sebophōra** Neck. (Myristiceen, XXII. 13) (zu Myristica L.) Fett-Muscatnussbaum (sebum Talg u. φροῦρα tragend).
- 1) **Secāle** L. (Gräser, III. 2) Korn, Roggen, fr. seigle, e. rye (v. seco schnide? v. d. celt. segal v. sega Sichel, Wtst.), S. cereale L. Saatroggen. 2) **Secāle** cornutum L. (Pilze, XXIV. 4), s. g. Mutterkorn, Entwick. v. Cordiceps Fr.
- Seechium** P. Br. (Cucurbitaceen, XXI. 8) „Mast“- od. Stachelgurke I.D. (v. σηκώσις Stall — dient z. Mästen! Wtst.: d. veränd. Sicyos, wo zu früher gehörig!), z. B. edule R. Br. essb. Chayotte (Cuba), s. Sicyos edulis Sw.
- 1) **Securidāea** L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Beil“-Kreuzblume (securis Beil, δάκω od. δίκω beisse, greife an — das Beil weg. d. Härte? d. Kaps. m. lang. messerf. Flügel!), z. B. erecta L. (Str. Domingo), volubilis L. s. scandens Jacq. (Str. Südamer.). 2) **Securid.** Mill., T. (sc. Coronilla) L. (Legumin. Coronilleen, XVII. 4) Beilkronwicke,

S. lutea Mill. = *Coronilla Secur.* L., fr. fauille d'Espagne, e. hatchet-vetch (— Beilform d. Hülse!), s. *Securigera DC.* u. *Securilla Pers.* **Securinīga** Juss. (-nēga Comm.) (Euphorbiaceen, XXII. 5) „Beiltrotz“, Axtspott D. (v. *secūris* Beil, nēgo verneine, widerstehe — mehr wie beilhart. Holz!), S. nitida W. (B. Isle de France).

Sedēae (sc. *Corniculatae*) Rchb. s. *Sedum*!

Sédum L. (*Corniculaten* Sedeen, X. 5) Mauerpfleffer, Fetthenne, Fettkraut Seub., „Sede“ O. W., fr. orpin, e. stone-crop „Steinkropf“ (ob v. *sedeo* sitze? od. v. *sēdo* still? — unsicher!), z. B. *S. acre* L., fr. vermiculaire od. pain d'oiseau, e. pepper-crop, S. *album* L. s. *teretifolium* Lam., fr. trique-madame „Tripmadam“, Zier: purpurēum Lk. s. *Telephium* β purp. L., coeruleum Vahl, Sieboldii Sweet m. v. variegata Hort. (Ampeln), maximum Rchb. m. v. fol. varieg., splendens Hort., kamschaticum Fisch., Mey., Topf S. *fabarium* Lem. (*Fabaria* Koch), *Sempervivum* Ledeb. (Kaukas.), Ampehn: *sermentosum* Bge., *Anacampseros* L., *spurium* M. B. etc.

Segregatae L. (*Polygamia segregata*, XIX. 5) Compositen mit „gesonderten“ Blüten (segrēgo sondere ab).

Selaginēae Juss. i. q. *Acanthacēae* „Licht-Acanthaceen“ (*Selago*, -īnis Leuchtkraut etc.).

Selaginella P.-B., Spring. (Lycopodiaceen od. Bärlappe, XXIV. 1) (zu *Lycopodium* L.) Zwerg-Bärlapp, Mooskraut O. W., e. rock (dem. v. *Selago*, -īnis Leucht- od. Blitzpulverkraut, v. σελαγέω leuchte), z. B. *denticulata* Spring. Wimperzahn-B. — *Selaginellae* Metten.

1) **Selago** L., Pers. (Acanthaceen, XIV. 2) „Licht“-Acanthus (Wtst.: celt. sel Gesicht, jach heilsam — geg. Augenkrankh. od. selīgo wähle aus — auserw. Pfl. (?)), z. B. *S. ovata* (Lippia ov. Burm.), *articulata* u. *bracteata* Thb., s. *Stilbe*, *Erinus* etc. 2) **Selago** (sc. *Lycopodium*) L. (Lycopodiaceen, XXIV. 1) Tannen-Bärlapp, Tangelmoos, Semust Grck., fr. selage (-gine) (v. σελαγέω leuchte — weg. d. Blitzpulvers od. Hexenmehl, d. i. Bärlappsmiens!).

Selenipedium Rchb. f. (Orchid. Cypripedien, XX. 1) „Mondfrauen-schuh“ (v. σελήνη Mond u. Mondgöttin Selene, u. πέδον Fuss-schuh — analog *Cypripedium*!), z. B. *caudatum* Rchb. f. (Peru).

Selinum L., Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Silje“, Waldsilje, fr. assilis od. sélin (gr. σέλινον Silje od. Eppich — besond. in compos.), z. B. *Carvifolia* L. „Kümmelblatt“-S.

Semicarpus L. f. (Terebinthaceen Anacardieen, XXIII. 2) „Zeichenfrucht“, ostind. Herzfrucht od. Dintenbaum, *Acajou* ($\sigma\eta\mu\alpha$ Zeichen, $\chi\alpha\sigma\tau\delta$ — d. schwarze Saft zum Zeichnen d. Zeuge!), S. *Anacardium* L. f. (*Anac. orientale* Bauh.).

Sempervivum L. (*Corniculat.* Sedein, XI. 5) Haus- od. Dachwurz, Hauslauch Vilm. (-laub), fr. orpin, grassette, barbe de Jupiter (Jou-barbe), herbe magique od. maure, e. jubarb, house-leek etc. (semper immer, vivum lebendig), z. B. *tectorum* L. Donnerbart etc., m. v. *rustica* Schnittsp. s. *Requieni* Hort., *arachnoidēum* L., *arborēum* L., etc.

Senebiēra Pers., Poir. (Crucifer. Siliculos., XV. 1) Feldkresse, Krähens-fuss (n. d. Pastor Joh. Senebier zu Genf, † 1809, s. d. Aut.).

Senecio T., L. (Compos. *Senecionid.*, XIX. 2) Kreuzkraut, eig. „Greiskraut“ Mej., „Senwurz“ O. W., Baldgreis Grck., fr. *senecon*, e. cross-wort, groundsel (-sil) (v. *senex*, -nis Greis — nach d. Blühen schnell m. weiss. Pappus bedeckt!), Zier. S. *mikanoides* Otto (*Mikania scandens* Lem., *Delairea micanoides* Lem.), s. g. Sommer- od. Schnellepheu d. Stuben, Spaliere: *macroglossus*, Gärt.: *pulcher* Hook. u. Arn., *aurantiacus* DC., *flammēus* Turcz., *elegans* L. m. v. v.

- fr. sen. d'Afrique, e. purple Jacobaea, etc. — Senecioncæ Cass., -cionoidæ Less.
- Senéga** DC. (sc. Polygala) L. (Polygalaceen, XVII. 3) „Senegawurz“ (vaterl., Wtst. n. d. engl. snake Schlangen — d. Wurz. geg. Schlangenbiss!), S. contrayerva DC. „giftwiderstehende“.
- Senna** T., G. (sc. Cassia) L. (Cassieen, X. 1) „Sennes“-Bitterblatt, fr. séné, e. senna od. sene (vaterl. arab. sennat).
- Sequoia** Endl. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Mammouthskiefer, fr. séquoja (californ. Name d. B.), S. sempervirens Endl., e. (in Amerika) Red-wood (Taxodium s. Lamb.), gigantæa Endl. = Wellingtonia gig. Lindl.
- Serapias** L., Sw. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) Schwert-O. (gr. Σεραπίας eine Orchis, nach Σέραπις pers. Kleid weiss m. Purpurstreif, Wtst.: n. Serapis, egypt. Gott — als Aphrodisiacum dienend), z. B. S. Lingua Sw., Xiphophyllum L. f. s. ensifolia L. etc., s. Neottia, Disa etc.
- Seriana (-jana)** Schum. (-jania) Plum. (Sapindaceen, VIII. 3) „Ketten“-Liane (Paxton: n. d. franz. Mönch Paul Sergeant, od. v. series Reihe, Kette — als s. g. Liane od. Schlinggurlande), S. sinuata Schum., s. Paullinia Seriana L., angustifolia W. (Paull. mexic. Jacq.) etc.
- Sericobonia** autt. (Acanthaceen, XIV. 2) „Seidenpinsel“-Libonie aus Sericographis u. Libonia floribunda zusammengezog.! — künstlicher Bastard v. beiden), S. ignea autt. (Serico-Libonia ign.).
- Sericographis** Nees (Acanthaceen, XIV. 2) „Seidenpinsel ($\sigma\eta\varphi\omega\zeta\delta\sigma$ v. Seide, γονγίς, -ώδος Pinsel — d. Griffel!), s. Aphelandra Ghiesbreghtii u. Gendarussa Nees.
- Seriola** L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Klein“- od. Nesselsalat, fr. sériole Kugelträger Wolff (dem. οἴστις; Lattichsalat — ähnl. Blätt.!), z. B. laevigata L., aetnensis L., Jacq. etc.
- Seriphium** L. (Compos. Inuleen, XIX. 6) Meer-Wermut ($\sigma\epsilon\varphi\imath\gamma\mu\sigma$ eine Art Wermut v. d. Insel Seriphos), z. B. cinereum L. f. (Stoebe c. Berg., Breynia cineroides cap. Petiv.), plumosum etc.
- Serissa** Commel. (Rubiac. Cinchonaceen, V. 1) „Serissa“-China (Wtst.: n. d. Bot. Serissa, schr. Vollst. Char. d. Garten-Nelke, 1804), S. foetida W. s. japon. Thb., s. Lycium jap. Thb. s. indic. Retz.
- Serpentaria** Rich. (sc. Aristolochia) L. (Aristolochieen od. Serpentarien, XX. 5) „Schlangenwurz“, fr. liane à serpent, vipérine de Virginie, e. serpentary etc. (serpens, -tis Schlaue — d. Wurz. gegen deren Biss!). — Serpentariae Endl. Kl. d. Schlangenwurz-Gew.
- Serpicula** L. (Onagrarieen Halorageen, XXI. 5) „Kriechkraut“, Schleichling D. (v. serpo kriechen), S. repens L. s. serpyllifolia Burm. (Laurembergia rep. Berg.), verticillata L. f. (Hydrilla v. Rich.).
- Serpillum** T. (sc. Thymus) L. (Labiaten, XIV. 1) Feldthymian, Quendel, Hühnerpolei Vilm., fr. thym sauvage, e. wild-thyme, stone-basil etc. (gr. ἔρυμα v. ἔρωτις kriechen, dem. v. serpens?).
- Serratula** L., DC. (Compos. Carduac., XIX. 1) „Scharte“, fr. sarrette, e. shard od. saw-wort (dem. v. serratus gesägt — bez. d. Blätter!), z. B. tinctoria L., fr. s. teinturienne, e. dyer's-shard, Zier. S. coronata L., etc.
- Sersalisia** R. Br. (Sapotaceen, V. 1) Seiden-Eisenholz (n. d. neapol. Geistl. J. B. Sersalis, gepriesen v. Fabius Columna), S. sericea R. Br. = Sideroxylon sericeum L. f.
- 1) **Sesamum** L. (Bignoniac. od. Sesameen, XIV. 2) weisser „Sesam“, Kuntschut Leun., fr. sésame, e. oily-grain (arab. semsem), z. B. S. orientale L., indicum L., javanicum Burm., s. Achimenes sesamoides

W. 2) **Sesamum** G. Fr. s. Camelina sativa Crantz (Cruciferen Siliculos., XV. 1). — Sesameae DC.

Seseli L. (Umbelliferen, V. 2) „Sesel“, Steinkümmel od. Rossfenchel, fr. séseli, e. sesely u. heart's-wort ($\sigma\acute{ε}\sigma\acute{ε}\lambda$, -εως Diosc. vier versch. Dolden, Wtst.). — Seselinæ Koch.

Sesleria Hard. (Gräser, III. 2) Balgähre, Gilzgras O. W. (n. d. venet. Arzt Leonh. Sesler, schr. Natg. d. adriat. Meeres), S. coerulea Ard., s. Cynosurus c. L.

Setaria P.-B. (zu Panicum L.) (Gräser, III. 2) Borstengras, -Fennich Seub. (seta Borste — Ahre m. Borsten).

Sheppardia (Shepherdia) Nutt. (Elaeagnen, XXII. 4) „Sheppard's“ Silber-Sanddorn (n. John Sheppard, Curat. d. Bot. Gartens zu Liverpool, † 1836, schr. on trees etc. Lond.), Zier. S. argentea Nutt. (Hippophaë arg. L.), scandens Nutt. (Hipp. canad. L.).

Sherardia Dill., L. (Rubiaceen, IV. 1) Acker- od. Blausternchen, Nolde O. W. (n. d. engl. Reis. W. Sherard, † 1728 in Oxford).

1) **Shortia (Schortia)** Hort. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Shortsblume“ (n. Thom. Short, schr. Medicina brit. Lond. 1747), Zier. S. californica Hort., s. Hymenoxis cal. DC. (Ptilomēris aristata Hort.).
2) **Shortia** A. Gray (Ericaceen) (n. Prof. Ch. Wilk. Short in Lexington, Nordam., † 1862).

Sibbaldia L. (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Kriechrose (n. Rob. Sibbald, Prof. in Edinb., schr. üb. schott. Pfl. in Scotia illustr. 1684), S. procumbens L., s. Chamaerrhodos Don u. Pentaphylloides frutic. Pluk.

Sibthorpia L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Sibthorpie“ (n. d. Prof. John Sibthorp in Oxford, † 1796, s. d. Aut.), Ampeln: S. europaea L. (Disandra prostrata L.), evolvulacea L. (Dichondra repens Forst.).

Sicydium Schldl. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Texas-Haargurke (Sicyos u. $\varepsilon\acute{i}\delta\mu\acute{u}\alpha\acute{i}$ gleiche), S. Lindheimeri Torr. u. Gr.

Sieyös L. (Cucurbitaceen, XXI. 10) Haargurke, Stichling (gr. σίκυος Gurke), Zier. angulata L., s. Bryonoides Dill., S. edulis Sw. (Secchium ed. Sw.) essb. Chayote.

Sida L. (Malvaceen, XVI. 8) Sammetmalve, -pappel (σιδη Theophr. eigentl. weisse Teichrose u. Granatapfel, Linné irrite bei Aufstell. dies. Namens, wie öfter, Wtst.), z. B. S. Abutilon L. (Abut. pubescens Mnch.).

Sideritis L. (Labiaten, XIV. 1) Gliedkraut, „Eisenkraut“, fr. crapaudine, marrube-faux, e. clown's- od. iron-wort (gr. σιδηρίτις v. σίδηρος Eisen — Heilm. geg. Wunden v. Eisen geschlagen!).

1) **Sideroxylon** L. (-lum L. f.) (Sapotac. Mimusopeen, V. 1) „Eisenholz“, fr. arbre de Mars, e. iron-wood s. eb. u. ξύλον Holz), z. B. cymosum L. (Str. Cap), decandrum L. (spinos. L. f.) (B. Nordam.).
2) **Sider.** (sc. Acacia) L. (Mimoseen, XXIII. 1) Kieselholz der Antillen.
3) **Sider.** s. Scleroxylon W. (Myrsineen, V. 1) Hartholz, s. Melanophloeos (sc. Myrsine) R. Br.

Sieglingia Bernh. (zu Festuca L.) (Gräser, III. 2) „Siebling's“ Gras (n. d. Prof. Siegling in Erfurt von Bernhardi 1800 ben.), S. decumbens Bernh., s. Triodia P.-B. dec. (Danthonia d. DC.).

Sieversia W. (zu Gēum Rchb.) (Rosac. Potentilleen, XII. 5) Bergnelkenwurz (n. d. russ. Samml. J. Sievers), s. Geum montanum L. (Dryas anemonoides Pall., Anemone pusilla G.).

1) **Sigillaria** Brongn. (foss. Lycopodiaceen, XXIV. 1) „Siegelbaum“ (v. sigillum Siegel — weg. d. Eindrücke!).
2) **Sig.** Raf. (Smilacineen, XXII. 6) „Siegelwurz“ (— Wurzelstock m. Siegelnarben!).

Silaus Bess. (Umbelliferen, V. 2) „Silau“ (v. σελάω glänze — bez. d. Blätter!), S. pratensis Bess.

Silēne L. (Caryophylleen Sileneen, X. 3) Leimkraut, Klebnelke Leun., Spettel O. W., fr. silène u. cornillet, e. catch-fly (v. Σιλήνος Gott Silen, der immer mit Geifer od. σιάλων bedeckt war — weg. d. klebr. Stiele!), z. B. inflata Sm. s. vulgaris Grck. Taubenkropf, nutans L. nickende, Zier. S. pendula L. (barbata, rosea u. graeca Hort.) m. v. v. (z. B. nana, alba etc.), compacta M. B., etc. — Silenæae Rchb., -nacæae DC., Grck.

Siler Scop. (Umbelliferen, V. 2) Rosskümmel, fr. sermontaine, e. mountain-laser-wort (lat. siler, -ēris eig. Spindelb. u. Bachweide, Wtst. d. abgeänd. Sium od. Selinum), S. montanum Crantz, s. Laserpitium Siler L.

Siliiculosae L. (sc. Cruciferae) Schötchenträger (silicula dem. v. silīqua Schote) XV. 1 L.

Siliquastrum T. (sc. Cercis) L. (Cassieen, X. 1) Schotenhülsbaum, Judasb., fr. arbre de Judée „von Judäa“ (deter. v. siliqua Schote), Zier. cordatum u. orbiculatum Mnch. (Cercis canad. u. Siliquastr. L.).

Siliquosae L. (sc. Cruciferae) „Schotenträger“ (siliquosus v. silīqua Schote) XV. 2 L.

Silphium L. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Langstrahl (gr. Σιλφίον i. q. λασαρόν saft. Arznei u. Speise, nordafr. Wort silphi), Zier. S. laciniatum L.

Silybum G., Vaill. (fehl. **Silybrum** Hornem.) (Compos. Carduaceen, XIX. 1) (zu Cardūs Rchb.) Stechkraut, Marien-, Frauen- od. Silberdistel (gr. σιλυβόν Quaste, Wtst. d. ägypt. Name sobil), Zier. S. marianum G., fr. lait de Ste. Marie, e. lady's- od. milk-thistle, S. eburneum Coss., Durieu (Algerien).

Simaruba Aubl. (zu Quassia Rchb.) (Rutac. Simarubeen, X. 1) Bitteresche Leun., „Simaruben“-Bitterholz, fr. macre (-cier) (d. caraib. Name!), S. amara u. ferruginēa Aubl. s. g. Cedronbohne, s. Quassia Sim. u. excelsa. — Simarubæae DC., -bæcae Seub.

Sināpis T., L. (Cruciferen Siliquos., XV. 2) Senf, fr. sinapi od. senève (moutarde „Möstrich“), e. mustard u. senvy (Augment σι u. γάπινον Senf, schwerl. σινάπις schädlich u. ὄψ Auge — beisst in diese, Wtst.), S. nigra L. (Brassica n. L.), fr. roquette sauvage (Melanosināpis Schimp.), gebaut S. alba L., Unkraut S. arvensis L. Hederich, e. carlock, harlock u. kedlack, auch wild-rape.

Sinningia Nees (Gesneriaceen, XIV. 2) „Sinningie“ (n. d. Univ.-Gärtn. W. Sining in Bonn), z. B. Helleri Nees, s. Gloxinia Schottii Mik.

Sipho l'Hér. (sc. Aristolochia) L. (Aristolochieen, XX. 5) Pfeifenkopfstr., Heberblume Vilm., fr. aristoloche en siphon, e. siphon-like od. tube-flowered Birth-wort (σιφών Pfeife etc.).

Siphocampýlos (-us) Pohl (Lobeliaceen, XIX. 6) „Krummhals“-Lobelie (s. eb. u. *καρπούλος* krumm — d. Kronröhre krumm!), Zier. (Winterbl.) Encianus Hort., bicolor etc., schönste coccinēus Hook. (Bras.).

Siphonandracæae Klotzsch „Röhrenbeutelige“, Heidelbeergew. (s. v. u. *ἀρύτη*, -δοῦς Staubbefel).

1) **Siphonia** Rich. (Euphorbiaceen, XXI. 9) Kaoutschukbaum (s. v. — weg. d. Gewinnung in Röhren- od. Gefäßform!), S. Cahuchu Rich. s. elastica Pers., s. Jatrōpha elast. L. f. u. Hevēa guian. Aubl. 2) **Siph.** Benth. (Rubiaceen, V. 1) „Dünnröhrenkrone“ (d. Krone m. sehr lang. dünn. Röhre!).

Siphonocaulæ Bisch. i. q. Characæae DC. „Röhrenstengelige“ (s. v. u. *καρπούλος* lat. caulis Stengel).

Sisārum T., Ad., DC. (sc. Sium) L. (Umbellifer., V. 2) „Zuckerwurz“, fr. girolle, sison-chervi, e. skirret (gr. σισαρόν, arab. dgizer, Siser Plin.), s. Sisar. Germanorum Moris.

Sison L. (Umbelliferen, V. 2) Gewürzdolde, fr. sison (v. d. celt. sisun fliessender Strom — als Standort!), z. B. inundatum L., fr. sison inondé, S. Amōnum L., fr. ginseng.

Sisymbrium All., L. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) Rauke, Raukensenf Grck., fr. roquette (gr. σισύμβριον Diosc.), z. B. officinale Scop., Sophia L. etc.

Sisyrinchium (-syrinchium) T., L. (richt. **Syorrh.** Hoffmg.) (Irideen od. Hämodoraceen, XX. 2) Rüsselschwertel, „Schweinsrüssel“, fr. sisyrinque (v. σῖτος Speise, σῦς Schwein, ὕγρος Rüssel — bez. d. Zwiebel!), Zier. grandifōrum Dougl. (Mex.), longistylum s. Douglasii Hort. (Chil.), Bermudianum L., fr. Bermudienne, e. Bermuda-flag, etc.

Sium L. (Umbelliferen, V. 2) Wassermerk (gr. σῖον v. d. celt. siw Wasser, ein Sumpfkr. F. W. Riemer), Zier. S. latifolium L. Brunnenod. Froschpeterlein, Wassereppich, fr. ache d'eau, e. large-leaved Skirret.

Skimmia s. Scimmia!

Skinnēra Forst. (Onagraceen od. Myrobalaneen, VIII. 1) „Skinner's“ Fuchsia (n. Steph. Skinner, gab 1671 ein Etymologicon bot. heraus), Sk. coccinea Forst. = Fuchsia cocc. Ait.

Smegmaria W. (Rosac. Spiräaceen, XXIII. 2) „Seifenstr.“, Wäscherbaum D., s. g. Panamaholz (-rinde) (σμήγμα d. Schmieren — d. Rinde dient als Seife!), s. Quillaja Saponaria Mol. (Chili) u. Smegmadermos Rz. Pv. „Seifenrinde“.

Smilacīna Desf. (Smilacineen, VI. 1) Schattenblume (v. σμιλαξ, -zoς Stechwinde), S. bifolia Desf. = Majanthemum bif. Schmidt.

Smilax L. (Smilacineen, VI. 1 od. XXII. 6) Sarsaparill - Stechwinde, „Kratzeisenstengel“, fr. squine od. équine (σμιλαξ Stechwinde v. σμίλη Kratzeisen — Stengel voll Stacheln), z. B. S. excelsa L., fr. boyau du Diable „Teufelsdarm“, S. Sarsaparilla L. (Nordam.), etc. — Smilacēae R. Br., DC.

Smyrnium L. (Umbelliferen, V. 2) Myrrhendolde, Liebstöckel, fr. macérion, e. smyrnian (gr. σμύρνιον Dolde mit Myrrhensamen v. σμύρνα i. q. μύρρα Myrrhe), z. B. S. olus atrum L., gem. Maceron- od. Myrrhenkr. Leun., etc. — Smyrnæa DC., -niæa Rchb.

Sobralia Rz. Pv. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Sobral's“-O. (n. d. span. Bot. Don Fr. Mart. Sobral), z. B. macrantha Lindl., dichotoma R. P. (Peru, span. Flor del paradiso) etc.

Sodada Forsk. (Capparideen, XIII. 1) Soda-Kapper (v. d. arab. sodad).

Sogalgina Cass. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Sogalgine“ (Anagramm v. Galinsogea!), Zier. S. trilobata Cass., s. Galinsogea tr. Hort.

Soja Mnch. (Leguminos. Phaseoleen, XVII. 4) „Sojabohne“ (v. suoja Name einer Sauce in Japan, zu welch. d. Bohnen benutzt), Zier. S. hispida Mnch. = Dolichos Soja L.

1) **Solandra** L., Sw. (Solaneen, V. 1) „Solander's“ Stechappel (n. d. schwed. Reis. D. K. Solander, Begleit. d. Weltumsegelers Sir Jos. Banks, s. d. Aut.), Zier. S. herbacea Hort. (Datura ceratocaula Ort.), grandiflora Sw. (Stramonium scandens Pluk. s. Dat. sarmentosa Lam.).

2) **Solandra** L. f. (sc. Hydrocotyle) L. (Umbellifer., V. 2), z. B. capensis L. f. 3) **Sol.** Murr. (Malvaceen, XVI. 8) „Sol.'s“ Eibisch, S. lobata Murr., s. Hibiscus Solandra l'Hér. (Lagunaea l. W.).

Solanoides T. (Phytolacceen, X. 5) „Nachtschattengleiche“ (Solanum u. ειδομαι gleiche).

Solanum L. (Solanaceen, V. 1) Nachtschatten, fr. endormie, herbe aux sorciers u. morelle, e. morel, night-shade, dwale u. bane-wort (v. solari Schmerz stillen — einschlaf. Wirkung!), Culturpfl. S. tuberosum L. Kartoffel, fr. pomme de terre, e. potatoe, irish-auricot, m.

v. v., S. Melongēna L. Eierpflanze, fr. aubergine, S. *Lycopersicum* L. Liebes- od. Paradiesapfel (*Lycopersicum esculentum* Dun.), Zier. S. Pseudo-Capsicum L. Korallenkirsche m. v. nanum (Stubenpfl.), Gärten: *pyracanthum* Lam. (Madag.), *galeatum* Hort. (Bras.), gigantēum Jacq.'s. *niveum* Hort., etc. — Solanēae Juss., DC., -nacēae Rchb.

- 1) **Soldanella** T., L. (Primulaceen, V. 1) Alpenglückchen, Troddelblume Seub., fr. soldanelle des Alpes (ital. soldo, Sou, lat. solidus — weg. d. kreisrund. Blätt.! od. dem. v. soldana Sultanin?). 2) **Soldanella** (sc. *Convolvulus*) L. (Convolvulac., V. 1) Meerstrands-Winde, Seekohl Wolff.

Solidago L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Goldrute, fr. verge d'or, e. golden-rod (v. solidus dicht u. ago führe, Wtst. — zum Wunderheilen), Zier. *S. canadensis* L., nutans Ait., multiflōra Desf., wild S. *Virga-aurēa* L. gem. „Goldrute“.

Sollīa Lindl. (Pittosporaceen, V. 1) „Solly's“-Pechsamensblume (n. d. Bot. Rich. Horstm. Solly ben.), z. B. Ampel *S. heterophylla* Ldl., s. *Billardiera fusiformis* Lab.

Sonchus L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Sau- od. Gänsedistel, „Sonche“ O. W., fr. laiteron (laceron), lait d'âne, laitue de lièvre, e. hare's-lettuce, sow-thistle etc. (gr. σύργχος Theophr. od. σύρχος Hasenkohl, Wtst.: v. σομφωνός weich etc. — Struktur d. Stengels!).

Sonerila (-rilla) Roxb. (Melastomac. od. Burmannieen, III. 1) „Sonerile“ (vaterl. indisch Sonneri-Ila Rheed.), Zier. *S. margaritacea* Lindl. (Ostind.).

Sophōra R. Br. (Cassieen Sophoreen, X. 1) „Sophore“, Eschen-Akazie (d. arab. Name *sophera*), Zier. *S. japonica* L. s. g. Schnurhülse, m. v. v. (z. B. pendula Hort.), s. *Styphnolobium* Schott.

Sophronitis Lindl. (Orchideen Epidendreen, XX. 1) „Züchtige“ (v. σωργορέω bin züchtig — Anthere durch d. Flügel d. Columna verdeckt!), z. B. *grandiflōra* Ldl. (*Sophronia* gr. Ldl.) etc., s. *Cattleya* Ldl.

Sorbaria Ser. (Rosac. Spiräaceen, XII. 4) „Ebereschen“-Spiräe (v. *Sorbus* Eberesche — ähnl. Laub!), s. *Spiraea sorbifolia* L. u. *Lindleyana* Wall.

- 1) **Sorbus** T., L. (Rosac. Pomaceen, XII. 3) Eberesche, Mehlbirn- u. Elzbeerbaum Vilm., fr. sorbe (-bier), e. sorb-apple (*Sorbus* d. Sorbe, slav. Volk, od. sor celt. „herb“, Wtst. wohl auch sorbeo verschlucke od. arab. sorbet od. sherbet, Getränk aus deren Saft!), z. B. Obst *S. domestica* L. Speierling, Spier- od. Sporapfel etc., fr. corne (-mier), e. sorb-apple-tree od. service-tree (*Cornus domestica* Spach), Wald- u. Zierb.: S. *Aucuparia* L. m. v. v. „Vogelbeerbaum“, fr. sorbier des oiseaux, e. fowler's-service-tree, quicken-tree „Quitschen-beerb.“, S. *torminalis* Crantz Elz- od. Arlsbeer., fr. alisier, e. maple-leaved serv.-tr., s. *Crataegus* t. L. (*Pirus* t. Ehrh., *Mespilus* t. All., *Azarolus* t. Borkh.), S. *americana* W., S. *hybrida* L. (*Pirus* *pinnatifida* Ehrh. s. *fennica* Bab., *Azarolus* *pinn.* Borkh., S. *quercifolia* Hort.), S. *Aria* Crantz Mehlbeer. u. *intermedia* Pers. (*scandica* Fries) s. g. Oxelbirne. 2) **Sorbus** DC. (Rosac. Spiräac., XII. 4), s. *Sorbaria* Ser.

Sorēma Lindl. (Nolanaceen, V. 1) „Hauf“-Cymbelblume (v. σώρευμα Anhäufung), Zier. *lanceolata* Miers (Nolana l. Miers).

Sorghum Pers. (Gramineen Andropogoneen, XXIII. 1) Mohrrhirse, „Sorgho“ od. Durrha (sorghī indian. dsura od. durrha arab. Name), S. *vulgare* Pers., fr. millangue od. grand-millet, s. *Holcus avenaceus* s. *Sorgho* L.

Soria Ad., Desv. (Crucifer. Nucamentac., XV. 2) Nusschötchen (n.

- Soria, ein. span. Provinz Altcastiliens?), S. syriaca Desv., s. Euclidi-dium syr. R. Br.
- Southwellia** Salisb. (Sterculiaceen, XVI. od. XXI. 9) „Southwell's“ Stinkbaum (n. Rob. Southwell, schr. 1698 Anleit. z. Trockn. d. Blum.), S. nobilis Sal. (Sterculia nob. Sm.).
- Soyeria** Monn. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Soyer's“ Pippau (n. d. franz. Bot. Soyer-Willemet), z. B. montana Monn. (Hieracium m. Jacq., Crepis m. Tausch.) etc.
- Spadiceiflōrae** Endl. (-es Seub.) „Kolbenblütige“ Seub. (spadix, -īcis Blumenkolbe, flos, -ōris Bl.).
- Sparassis** Fr. (Morchellineen-Pilze, XXIV. 4) Strunkpilz, Ziegenbart, s. g. Glucke (v. σπαρασσω zerzupfe — zerzupft. Ansehen!), z. B. crispa Fr.
- Sparaxis** Ker (Irideen, III. 1) „Schlitzschwertel“ Perring (s. eb. — Blüten-scheide grannig zerrissen), z. B. Stuben: pulcherrima Ker, s. Ixia amoenaflora autt. u. Gladiolus.
- Sparganium** T., L. (Typhaeaceen, XXI. 1) Igelskolbe, fr. métel, laîche „Liesch“, e. bur-reed ($\sigma \tau \alpha \gamma \alpha v o r$ Wickelband — Gebr. d. Blatt. als Böttcher-Liesch!), z. B. ramosum L.
- Sparmannia** Thb. (nicht Sperr- od. Sparrm.-) (Tiliaceen, XIII. 1) „Sparmannsstrauch“ (n. d. schwed. Reis. in Südafr. Andr. Sparmann, + 1787), Zier. S. africana Thb.
- Spartianthus** Lk. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Binsenpfriemen“ Rmpl. ($\sigma \tau \alpha \gamma \alpha t \eta$ od. -or) Strick, wovon Spartium L., u. $\tilde{\alpha} \nu \vartheta o s$ Bl.), z. B. junceum Mnch. m. v. v., fr. genêt d'Espagne, e. spanish-broom, s. Genista junc. Lam. s. odorata Mnch.
- Spartina** Schreb. (Gräser, III. 1) Strick- od. Besengras, Pfriemengriffel D. (s. eb. — steife, z. Binden anwendb. Gräser), z. B. cynosuroides W. Prairiegras.
- Spartium** L. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) Pfriemenstr., Besenpfriemen Vilm., s. g. Besenginster, fr. spartion, genêt à balais, e. broom (v. $\sigma \tau \alpha \gamma \alpha t o v$ Strick), Zier. scoparium L. m. v. v. (z. B. album Hort.), junceum L. (Spartianthus j. Lk.), purgans L. (Genista p. L. f.), fr. griot Purgierginster, etc., s. Sarothamnus Wimm.
- Spartocytisus** Webb., Berth. (Legumin. Galeegen, XVII. 4) Pfriemen-geisklee Lauch. (s. v. u. Cytisus), Zier. sessilifolius Borkh. (Cytisus sess. L.) italien. Bohnenbaum, albus Webb., etc.
- Spatalanthus** Sweet (Irideen, III. 1) „Prachtblume“ ($\sigma \tau \alpha \tau \alpha \lambda \eta$ Luxus etc., $\tilde{\alpha} \nu \vartheta o s$), s. Trichonema monadelpha Ker.
- Spathodēa** P.-B., R. Br. (Bignoniacen, XIV. 2) „Scheidenkelch“ D. ($\sigma \tau \alpha \gamma \eta$ Blattscheide, $\varepsilon i \delta o m a t$ gleiche — Kelch blumenscheidenartig), Zier. speciosa (Westafr.) u. campanulata P.-B., s. Bignonia.
- Spatulea** (bess. Spath.-) Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Spatenpilz“ Kumm. ($\sigma \tau \alpha \gamma \eta$ lat. spatha s. eb. u. $\omega \tilde{\lambda} \lambda o s$ derb, ganz — d. Gipfel spatenf. vom Stiel durchsetzt Kumm., spatelähnл. Form d. Schlauchlagers Wst.), s. Spathularia Pers.
- Specularia** Heist. (Campanulaceen, V. 1) „Venusspiegel“ (v. speculum Spiegel — rund. Spiegel in d. Blume!), S. Speculum A. DC., fr. mirette, e. Venus'-looking-glass, s. Campanula u. Prismatocarpus.
- Spelta** Endl. (sc. Triticum) L. (Gramineen, III. 2) „Spelz“ od. Dinkel, fr. speautre u. blé-loca (locular), e. pelt od. amel-corn, auch fessels (neulat. spelta, d. latinis. Spelz!).
- Spergella** Rchb. (zu Spergula L.) (Caryophylleen od. Illecebreen, X. 5) „Spörkling“ Seub. (dem. Spergula).
- Spergula** L. (Caryophyll. od. Alsineen, X. 5) Spark od. „Spörgel“, fr. aspergoutte (esparg.-, -goule), e. spurry (neulat. Spörgel latinis., od. v. spargo streue aus), Zier. subulata Schwartz (pilifera Hort.).

- Spergularia** Pers., Presl (Alsineen, X. 5) Schuppenmiere Grck., Sperkling O. W. (s. eb.), z. B. segetalis Fenzl (Alsine s. L., Lepigónum s. Koch, Arenaria s. Lam.), salina u. rubra Presl.
- Spermacóee** Dill., L. (Rubiaceae, IV. 1) „Kronsame“ od. Zahnwirbel D. ($\sigma\tau\acute{e}\omega\mu\alpha$ Same u. $\acute{a}z\omega\zeta\eta$ st. $\acute{a}z\eta$ Spitze — zwei Kelchspitzen auf d. Frucht sitzenbleibend), z. B. tenuior L. (Anónymus americanus Pluk.). — Spermacocéa Rchb.
- Sphaeranthus** Vaill., Schreb. (Compos. od. Inuleen, XIX. 5) „Kugel“- od. Ballblume D., fr. sphéranthe ($\sigma\varphi\alpha\iota\alpha\alpha$ Kugel u. $\acute{a}v\vartheta\alpha\delta$ — d. Bl. in kugl. Köpfen), z. B. ind., afric. u. chin. L., s. Ethulia, Cotula u. Senecio.
- Sphaerobólus** Tod. (Pilze, XXIV. 4) „Kugelschneller“ (s. eb. u. $\beta\acute{o}\lambda\alpha\sigma$ Wurf — bei d. Reife kohlsamenähnln. Sporidienblasen abwerfend), z. B. stellatus Tod.
- Sphaeroceoccus** Stackh. (Florideen, XXIV. 3) „Kugel“- od. „Knopftang“ (s. eb., $\nu\acute{o}\zeta\zeta\sigma$ Korn etc. — Form d. Behält.!), z. B. bacciferus Ag. „Beerentang“, crispus Ag. Caraghen-Moos, etc.
- Sphaerophóron** Pers. (-um Duperr., -us Pers.) (Flechten, XXIV. 3) „Knopfflechte“ (s. v., $\varphi\varrho\varrho\zeta$ tragend — kugl. Massen an d. Spitzen d. Thallus!), z. B. ceratites (Dufourea cer. Sommerf.), coralloides Pers. (Stereocaulon globiferum Schreb.).
- Sphaerostigma** Ser. (Onagrarieen, VIII. 1) „Kugelnarbe“ (s. v., $\sigma\tau'\gamma\mu\alpha$ Narbe), Zier. S. bistortum Walp., s. Oenothéra Bistorta Veitcheana Hort. s. Bottae Hort.
- Sphagnum** Dill., L. (Moose, XXIV. 2) Torfmoos, fr. sphoigne (gr. $\sigma\varphi\acute{a}\gamma\varrho\zeta$ i. q. $\sigma\varphi\acute{a}\gamma\gamma\zeta$ Schwamm — locker u. leicht wie Schw.). — Sphagnaceae C. Müll., -ninae Schimp.
- Sphenogyne** R. Br. (Compos. Calendulaceen, XIX. 4) „Keilnarbe“ ($\sigma\varphi\acute{r}\nu$, - $\nu\sigma$ Keil, $\gamma\varphi\acute{r}\nu$ Weib etc. — d. Narbe schräg abgestutzt), Zier. S. speciosa Fisch., Mey. (crocea, elegans u. versicolor Hort.).
- Sphenophyllum** Brongn. (foss. Farne, XXIV. 1) foss. „Keilblatt“ (s. eb., $\varphi\acute{u}\lambda\lambda\sigma$ Laub — dies. keilförm.).
- Sphondylum** T., Hoffm. (**Spondyl-** Scop., DC.) (sc. Heracléum) L. (Umbelliferen, V. 2) Bärenklau ($\sigma\varphi\acute{o}\nu\delta\lambda\zeta\sigma$ od. $\sigma\tau\acute{o}\nu\delta\lambda\zeta\sigma$ Wirbel — aufgetriebene Stengelknoten!), Zier. S. asperum s. pubescens Hoffm. Riesen-B., wild S. branca Scop. = Heracl. Sphond. L.
- Spica** Benth. (sc. Lavandula) L. (Labiateen, XIV. 1) gem. Lavendel, Öl- od. Ähren-Lavendel, fr. lavande, e. lavender-spike (v. spica Ähre — Blütenstand, daher Spiköl st. Lavendelöl!).
- Spicaria** Benth. (zu Hyptis Jacq.) (Labiateen, XIV. 1) „Ähren“-Beuglippe (s. eb.).
- Spigelia** L. (Apocyneen Carisseen, V. 1) „Spigelie“, fr. spigélie, e. worm-grass, pink-root (n. d. Prof. Adr. van der Spiegel zu Padua, + 1625), z. B. marylandica L. (Lonicera m. L. f.), splendens Hook. (Centralamer.). — Spigeliacées Mart.
- Spilanthes** Jacq., W. (-thus Forst.) (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Fleckenblume“, Husarenknopf od. Parakresse Leun. (v. $\sigma\pi\acute{u}\lambda\sigma$ Fleck, $\acute{a}v\vartheta\eta$ od. - σ Bl. — weissl. Bl. m. schwärzl. durch Pollen verursachten Flecken), z. B. Acmella L. s. g. ABC-Pflanze (— Kinder müssen sie kauen etc. Willd.), s. Verbesina Acm. L. f.
- Spinacia** T., L. (-chia G. Fr.) (Chenopodiaceen, XXII. 4) „Spinat“, veralt. Binetsch, fr. les épinards, e. spinach (age) (latinis. Wort, od. v. spina Dorn — stachl. Früchte!), cult. S. oleracea L. m. v. parvifolia Hort. „Winter“-Sp.
- Spiraea** L. (Rosac. Spiráceen, XII. 4) „Spiräe“ od. Spierstrauch, fr. spirée, e. drap-wort (gr. $\sigma\pi\acute{e}\omega\alpha\iota\alpha$ v. $\sigma\pi\acute{e}\iota\alpha\alpha$ lat. spirale Spirale). Gewundene — nämli. d. Kapsel' v. Spir. Ulmaria Wst.), Zier.: pal. Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- mata Thb., japonica Hort. (Hoteia j. Decsn., Astilbe rivularis G. Don), callosa Thb. s. Fortunei Planch. m. v. v., bella Sims s. Hookeri Hort. m. v. coccinea Hort., crataegifolia Lk., fr. sp. à feuilles d'aubépine, salicifolia L., Lindleyana Wall. (Schizonotus tomentosus Ldl.) u. v. a. — Spiraeacae (sc. Rosaceae) Rchb.: a) Sorbaria, b) Physocarpus, c) Holodiscus, d) Spiraria Rispen-Sp., e) Chamaedryon Gammader-Sp., f) Calospira Grossdolden-Sp.
- Spiranthes** Rich. (Orchid. Neottieen, XX. 1) „Wendel“-O., Drehling, Spiral-O., Drehwurz O. W. (s. v. u. $\ddot{\epsilon}r\vartheta\eta$ — Blütenstand spiraling!), s. Ophrys u. Neottia.
- Spirodela** Schleid. (Najadeen, II. 1) „Deutlichgewundene“ (s. v. u. $\delta\eta\lambda\circ\sigma$ deutlich), S. polystachya Schleid., s. Lemna p. L.
- Splachnum** L. (eig. Splanchn.) (Moose, XXIV. 2) „Lungenmoos“, Schirm- ($\sigma\pi\lambda\alpha\gamma\mu\nu$ Lunge etc. — weg d. Sporangiums). — Splachnaceae Schimp.
- Spondias** L. (Terebinthac. Spondiaceen, X. 4) Mombin- od. Balsampflaumenbaum ($\sigma\tau\omega\delta\iota\alpha\zeta$ od. $\sigma\omega\delta\iota\alpha\zeta$ Pflaumenbaum — Ähnl. d. Frucht), s. Mombin Plum. u. Myrobalanus G. — Spondiacae Kth.
- Spongia** L. (Algen od. Amorphozoen, XXIV. 3) Meer- od. Seeschwamm (v. $\sigma\pi\omega\gamma\mu\sigma$ Schwamm), S. communis u. usitatissimus Lam.
- Spongilla** DC. (Algen od. Amorphozoen, XXIV. 3) Flussschwamm, S. fluviatilis (Spongia fluv. L.) (demin.).
- Spongostemma** Rchb. (zu Scabiosa L.) (Dipsaceen, IV. 1) „Schwammkranz“-Scabiose (s. v. u. $\sigma\tau\epsilon\mu\alpha$ Kranz — d. Saum d. Hüllchenkranzes ist schwammig), Zier. S. atro-purpurea L.
- Sprekelia** L., Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Sprekelie“ (n. J. H. v. Sprekelsen in Hamburg, † 1764), Zier. S. formosissima Herb. s. g. Jakobslilie (Amaryllis form. Hort.).
- Sprengelia** Sm. (Epacrideen, V. 1) „Sprengelie“ (n. d. Bot. Konr. Sprengel, s. d. Aut.), Stuben S. incarnata Sm. (Str. Austral.), s. Poiretia cuculata Cav.
- Spumaria** Pers. (Lycoperdaceen, XXIV. 4) Schaumpilz, Kukuksspeichel (spuma Schaum — d. Inhalt d. Peridiums eine schaum. Masse), S. Mucilago P.
- 1) **Squamaria** Hall., Scop. (sc. Lathraea) L. (Scrophularin. Orobancheen, XIV. 2) „Schuppenwurz“ (squama Schuppe — schupp. Schaft), s. Squam. Orobanche Scop. 2) Sq. Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Schuppenflechte (— Thallus schuppenf.).
- Stachys** T., L. (Labiaten, XIV. 1) Ziest, fr. stachide od. épiaire, e. hedge-needle ($\sigma\tau\acute{\epsilon}\chi\nu\zeta$ Ähre — weg d. Blütenstands), Teppich: lanata Jacq., Zier.: coccinea Jacq., grandiflora Hort. (Betonica gr. s. hirsuta L.), wild: germanica L. Rosspole, etc.
- Stachyurus** v. Sieb. (Pittosporaceen, V. 1) „Ahrenschwanz“ (s. eb. u. $\sigma\omega\varrho\alpha$ Schwanz — d. Blütentraube im Herbst als Kätzchen erscheinend), z. B. praecox Sieb. u. Zucc.
- Stagmaria** Jack, Wall. (Terebinthac., XXII. 5) „Teufel“- od. „Tropfen“- Firnißbaum (v. $\sigma\tau\acute{\epsilon}\mu\alpha$ Tropfen — tropft ätzend. Milchsaft aus), S. verniciflora Jack.
- Stalagmites** Murr., Schreb. (Guttifer. Garcinieen, XVIII. 2) „Tropfgummibaum“, Guttabaum D. (Ostind.) (v. $\sigma\tau\alpha\lambda\alpha\gamma\mu\delta\zeta$ d. Tröpfeln — entlässt gelb. Milchsaft), S. Gutta s. cambogioides W. Gummiguttb., s. Garcinia Spr. (Xanthochymus Roxb.).
- Stanhopea** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Stanhope's“-O. (n. d. Grafen v. Stanhope, Vice-Präs. d. Lond. Bot. Gesellsch.), Warmh. insignis Hook., oculata Ldl., tigrina Batem., etc.
- Stapelia** L. (Asclepiaden, V. 2) „Stapel's“ Aaspflanze, fr. stapélie, fleur de crapaud „Krötenbl.“, s. g. Schachbrett (n. d. holländ. Arzt

- J. B. van Stapel, Übers. des Theophrast, † 1736), *S. variegata* L., *hirsuta* L., *cactiformis*, etc. — *Stapeliaceae* (sc. *Asclepiadaceae*) Rchb.
- Staphisagria** Riv., Bauh. (sc. *Delphinium*) L. (*Ranunculaceen*, XIII. 3) Läusesamen-Rittersporn, fr. *staphisiaigre*, herbe aux poux, e. stave's-acre (*σταφίζειν*, -*ιδος*; Rosine, *ἄγριος* wild — Samen rosinenähnl. geg. Läuse!).
- Staphylea (-laea)** L. (*Sapindac.* od. *Celastraceen*, V. 3) Pimper- od. Klappernuss, fr. *staphylier*, pistache sauvage, e. bladder-nut (gr. *σταφυλή* Weintraube — Blütenstand), Zier. *trifoliata* L. (*Staphylo-dendron* tr. Mnch.) u. *pinnata* L. Paternosterstr., Blasen- od. Judennuss.
- Staphyloidendron** Scop., T. (*Sapindaceen*, V. 3) „Traubenbaum“ (s. eb. u. *δέρδον* B.), *S. pinnatum* Scop., s. *Staphylea* p. L. 2) **Staphyloid.** Pluk. (sc. *Dodonaea*) L. (*Sapindaceen*, VIII. 1) Dodoens'-Traubенbaum, s. Dod. s. *Thlaspidioides arborescens* Barr. 3) **Staph.** afri-canum Comm. (*Sapotac.* *Mimusopeen*, X. 2) afr. T., s. *Royéna* lu-cida L.
- Statice** T., L. (*Plumbagineen*, V. 6) Nelkengras, Strandnelke Leun., fr. herbe à sept tiges, e. lavender (gr. *στατίζη* zum Stehen bringend., adstringierend. Kraut — hemmt d. Bauchfuss Plin.), Zier. *S. incana* hybrida Hort., sinuata L. m. v. v., *elata* Fisch., *tatarica* L. s. *dal-matica* Presl (*trigona* Pall.) m. v. *angustifolia* Boiss. (*Goniolimon* tat. Boiss.), *Armeria* Sm. (Arm. vulg. W. s. *campestris* Wallr.) Gras-nelke Grek., fr. gazon d'Espagne, maritima Mill. (Arm. mar. W.) Strandgrasnelke, e. common sea-lavender, m. v. v.
- Steenhammera** Rchb. (*Boragineen*, V. 1) virgin. Lungenkraut, *S. virginica* Rchb., s. *Pulmonaria* v. L. (n. d. Probst in Stockh., C. Steen-hammer, dem Reichenbach bot. Mitteilungen verdankte).
- Stelis** Sw. (*Orchid.* *Malaxideen*, XX. 1) „Stangensegel“ (*στηλίς* Stange m. Segel am Schiffshinterteil, bei Theophr. eine Schmarotzerpflanze *Loranthus europ.*), z. B. *micrantha* Sw. (*Epidendron* s. *Dendrobium* m. Sw.), *racemosa* Sw. (*Bletia bicallosa* Don, *Empusa paradoxa* Ldl.).
- 1) **Stellaria** L. (*Caryophylleean* od. *Alsineen*, X. 3) Stern- od. Vogel-kraut, Sternniere Seub., e. bethlehem-star, hen-bit „Hühnerbiss“ (v. *stell a*Stern), *S. media* Cyr. (*Alsine* m. L.) Vogelmeier od. Meier-rich, fr. mouron, e. chick-weed. 2) **Stellaria** Dill. (*Onagreen*, VIII. 1) „Blattsternkraut“ (— d. Blätter bilden einen Stern).
 - 1) **Stellaris** Mnch. (*Liliaceen*, VI. 1) Milchstern (v. *stella* Stern), *S. corymbosa* Mnch., s. *Ornithogalum umbellatum* L. 2) **Stellaris** bi-folia Mnch. (*Liliac.*, VI. 1) zweiblättr. Zille, s. *Scilla bif.* L.
- Stellatae** L. „Sternkräuter“, i. q. *Rubiaceae* Juss., sternblättr. Pfl., fr. étoilées (s. v.).
- Stellera** L. (*Thymeläaceen*, VIII. 1) „Steller's“-Seidelstr. (n. d. bot. Samml. G. W. Steller, Reis. in Kamschatka, † 1745), St. Passerīna L. (*Passerīna annua* Wickstr.) Spatzenkraut, fr. grémil d'Allemagne u. langue de passerau „Sperlingszunge“.
- Stemodia** L., Schreb. (*Gesneriac.*, XIV. 2) „Doppelfaden“ (*στριφων* Staubfaden, δις od. δύο dopp., zwei — jed. Faden scheinbar m. zwei Antheren), z. B. *aquatica* W. (Ostind.), *camphorata* Vahl (Ceyl.), s. *Chonacöla* Herm., *Capraria* u. *Columnæa* Plum.
- Stemona** Lour. (*Smilaceen*, XXII. 6) „Fadenspargel“ (s. eb. — d. inner. Blumenblätt. tragen d. Antheren), Warmh. *S. tuberosa* Lour., s. *Ubium polypoides* Rumph. (zu *Tamus* W.).
- Stemphylium** Wallr. (*Schimmelpilze*, XXIV. 4) „Trester-schimmel“ (*στέμφυλον* Trester v. Oliven etc. — Wtst. Sporidien olivenförm.!) z. B. *ericocötönum* Wallr. Russtau od. Schwärze der Ericseen, „Eric-Töter“.

- Stenactis** Cass., Nees (Compos. Erigereen, XIX. 2) „Feinstrahl“, Feinchen O. W. (*στενός* schmal, *άντις* Strahl — feine Strahlenblütchen!), z. B. annua Nees s. bellidiflora A. Br., s. Bellis a. L. (Diplopappus a. Bl. Fing. u. Polyactidium DC. a.).
- Stenocarpus** R. Br. (Proteac., IV. 1) „Dünn“- od. „Feinfrucht“ (s. eb., *χαρούς* Fr. — dies. linienf. dünn!), z. B. Cunninghamii R. Br., s. Agnustus sinuatus Cunningham.
- Stenogastra** Bot. Mag. (Cyrtandreen od. Gesneriac., XIV. 2) „Dünnbauch“ (s. v., *γύρτος* od. -η Bauch), Zier. S. concinna Hook.
- Stenoglossum** Kth. (Orchid. Malaxid., XX. 1) „Schmal“- od. „Dünngunge“ (*γλώσσα* Z. — schmal. Labell!).
- Stenophragma** Celak. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) „Dünn“ od. „Schmalwand“ Grck. (s. v., *φράγμα* Zaun, Wand), S. Thalianum Col. (Arabis Thaliana L., Sisymbrium Thal., Gay-Monn.).
- Stenospermatium** Schott (Aroideen, XXI. 1) „Schmalsamen“-Aron, s. Spathiphyllum Schott (*στέρωμα*, -*ατος* Samen).
- Stenospermnum** Sweet (Myrtaceen, XII. 1) „Feinsamen“-Eisenholz (s. eb.), s. Metrosideros R. Br.
- Stenotaphrum** Trin., Kth. (Gräser, III. 2) „Enggrabenspelz“-Gras, Flach- od. Amerikagr., s. Americum complanatum autt. (s. v. *υτάρος* od. -*γράνη* Graben — Kelch- u. untere Kronspelze hohl!).
- Stephanotis** P.-Thou. (Asclepiad., V. 2) „Kranzohr“ (*στέγανος* Kranz, οὖς, *ωτός* Ohr — fünfblättr. Nebenkrone), Warmh. S. floribunda A. Brongn. u. Thouarsii ds. (Schlingstr. Madagascar).
- Stereulia** L. (Stereuliacean od. Büttneriac., XI. 1 od. XVI. 7 u. XXI. 9) „Stinkbaum“ Leun. (v. Stercarius Gott des Mistes, stercus, -ōris Kot — übler Geruch einiger Arten), z. B. acuminata P.-B. (Cola Bauh.), crinita Cav. (Ivira pruriens Aubl.), s. Helictères. — Steruliaceae Rchb., -iae Kth.
- Sternbergia** Waldst. u. Kit. (Amaryllid., VI. 1) „Sternberg's“-Narzisse (n. d. Bot. Kasp. Graf Sternberg, s. d. Aut.), z. B. lutæa Ker (Istrien), s. Amaryllis lut. L., colchiciflora W. K. (Ungarn) etc.
- Stevia** Cav. (Compos. Eupatorineen, XIX. 1) „Stevie“ (n. P. J. Esteve, Prof. z. Valencia im 16. Jahrh.), Zier. S. purpurea Pers., ivaefolia W. u. serrata Cav.
- Stewartia** Cav. (Malvac. od. Ternstroemiaceen, XVI. 8) „Stewart's“ Malvenbaum (n. John Stewart, Marq. v. Bute b. London), S. Malachodendron s. virgin. Cav., s. Stuartia l'Hér.
- 1) **Stiftia** (Stiftt.-) Mik. (Compos. Carduaceen, XIX. 1) Distelbaum (n. d. kais. Leibarzt A. J. v. Stift in Wien, † 1836), z. B. insignis u. chrysanthia Mik. 2) **Stifttia** Nord. (Fucoideen, XXIV. 3).
- Stilago** L. (Euphorbiaceen, XXII. 3) Tropfenbaum, Salamanderb. D. (v. *στίλη*, lat. stilla Tropfen u. ago führe — d. Rinde von Saft strotzend), z. B. S. Bunius Burm. Brüstebaum (Ostind.). — Stilaginæae DC.
- Stillingia** Gard., Schreb. (Euphorbiac., XXI. 8) „Stilling's“ od. chines. Talgbau, Talgbeererb., fr. sébifère, e. tallow-tree (n. d. engl. Bot. Stilling-Fleet im vor. Jahrh., schr. Miscellaneous tracts, 1759), S. sebifera Mchx., s. Croton sebif. L. Talg-Croton.
- Stipa** Vahl, L. (viell. bess. **Stypa**) (Gräser, III. 2) Pfriemen- od. Federgras, fr. stipe od. étièpe, e. feather-grass (v. *στύπη*, lat. stupa Werg, od. v. stipo stopfe aus — lange federige Grannen!), S. pennata L. Waisenhaar, Steinfeder etc., fr. plumet de Vaucluse etc., e. true f.-gr., capillata L. „Haarfedergr.“ etc.
- 1) **Stoebe** Leyss. (zu Centauræa Rchb.) (Compos. Centaureen, XIX. 3) Sommer-Flockenblume (gr. *στοιβή* d. Stopfen — bei d. Alten eig. = Poterium spinosum L.), s. Centauræa solstitialis L. s. sieula Leyss.

u. C. Stoebe L. schmalblättr. Fl. M.-Rchb. 2) **Stoebe** L. (Compos. Segregaten, XIX. 5) „Stopfblume“, z. B. aethiop. L. etc., s. Seriphium L. u. Gnaphalium L. f.

- 1) **Stoechas** T. (sc. Lavandula) L. (Labiaten, XIV. 1) „Zeilen“-Lavendel, fr. stécas u. quercillet, e. cassidony od. french lavender (gr. στοιχία, -άδος; in Zeil. geordn., Wtst. n. d. Stoechaden, d. s. hyerische Inseln), s. St. arabica Antiq. 2) **St.** citrina autt. (sc. Gnaphalium) L. (Compos. Gnaphalieen, XIX. 2) Sand-Immortelle (Gnaph. arenar. L., Helichrysum ar. DC.).

Stokesia l'Hér. (Compos. Ethulieen, XIX. 1) „Stokesie“ (n. Dr. Jon. Stokes, Withering's Gehülf., schr. bot. mater. med., Lond. 1812, Rümpl. n. d. Dublin. Arzt W. Stokes), Zier. S. cyanea l'Hér. (Cartesia centauroides Cav., Carthamus laevis Mill. s. carolinian. Mchx.). **Stramonium** T., Mchx. (sc. Datura) L. (Solaneen, V. 1) gem. Stech-
apfel, fr. stramoine, e. thorn-apple (v. στρόγγυλος Perf. Pass. ἔστρωμα
μιαν drehe — Blüt. der Contorten, Wtst. aus στρούγονται, unser Solanum, u. μαριζόνται rasend zusamm. — macht rasend), Zier. S. fastuosum Mchx. (Datura f. L.) egypt. St., fr. str. d'Egypte.

- 1) **Stratiotes** L. (Hydrocharid., XIII. 6 od. XXII. 10) Wasser- oder Krebsscheere, Siggel D., fr. stratiote, e. water-soldier ($\sigma\tau\omega\alpha\tau\iota\omega\tau\eta\varsigma$; Soldat — Schwertblätter), Zier. S. aloïdes L., s. g. Straussfeder, fr. str. Aloës, e. aloë-like w.-s. 2) **Str.** (sc. Pistia) L. (Lemnaceen, XX. 5) Muschelblume, s. Plantago aquatica Rumph.

Streblidia Lk. (zu Chaetospöra R. Br.) (Cyperac., III. 1) „Dreh“- od. „Walzen“-Riet (v. $\sigma\tau\omega\beta\lambda\varsigma$ verdreht od. $\sigma\tau\omega\beta\lambda\varsigma$ Walze u. εἴδομαι gleiche), z. B. ferruginina Lk. (Schoenus f. L.).

Strelitzia Ait., Schreb. (Musaceen, V. 1) „Strelitzie“ (n. d. Gemahlin Georgs III., g. Prinzessin v. Meckl.-Strelitz), Warmh. S. reginae Banks (Heliconia Bihai L. f.), augusta Thb. (Hel. alba L. f.) (Cap) etc.

Streptocarpus Lindl. (Cyrtandreen od. Bignoniac., XIV. 2) „Drehfrucht“ ($\sigma\tau\omega\epsilon.\pi\tau\eta\varsigma$ gedreht, $\chi\alpha\omega\pi\eta\varsigma$ Frucht — d. lange Schotenkaps. spiraling gedr.), s. Didymocarpus W.

- 1) **Streptogyne** Rchb. (zu Himantoglossum Rchb.) (Orchideen Ophryd., XX. 1) „Drehstempel“ (s. eb., γυνή Weib etc.), z. B. viridis Rchb. (Platanthera v. Ldl., Gymnadenia v. Rich.). 2) **Str.** P.-B. (Gräser, III. 2) „Spiralnarben“-Gr.

Streptopus Rich., Mchx. (Smilacineen, VI. 1) „Dreh“- od. Knotenfuss, Zapfenkraut D., Hockenblatt M.-Rchb. (s. v. u. ποὺς; Fuss — die Stiele gedreht!).

Strizolobium P. Br. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Kreisch“- od. „Rauschhülse“, Juckhaarbohne (v. $\sigma\tau\omega\tau\omega$, lat. strideo rausche — beim Streichen d. rauhfz. Hülse), s. Dolichos pruriens L.

Strobilacæae Rchb. (sc. Coniferae) „Zapfenbäume“ (v. $\sigma\tau\omega\beta\pi\lambda\varsigma$; Tannenzapfen).

Strobilanthes Blum. (Acanthaceen, XIV. 2) „Zapfenblume“ (s. eb., ἄρθη — bez. d. beblätt. Blütentrauben), Zier. auriculata Bl. u. Sabiniana Nees (Ruellia Sab. Lindl.).

Strobus (sc. Pinus) L. (Conifer. Abietineen, XXI. 9) Weymouthskiefer, fr. pin du lord W. od. de la nouvelle Angleterre, e. Weymouth od. white-pine, Pumpkin- etc. ($\sigma\tau\omega\beta\pi\lambda\varsigma$ Wirbel od. Wirtel, aber auch Betäubung — beschwert b. Räuchern d. Kopf, Wtst.).

Strophanthus Pers., Desv. (Apocyneen, V. 1) „Drehblumen“-Hundswürger ($\sigma\tau\omega\phi\pi\eta\varsigma$ Drehung, ἄρθος — d. Kronzipfel mit gedrehten Schwänzen), Warmh. dichotomus DC. (Echites caudata L.), capensis A. DC. etc.

Strumaria Jacq. (Amaryllid., VI. 1) „Kropfflilie“ D. (struma Kropf — d. Griffel in d. Mitte m. solchem), z. B. spiralis Ker (Haemanthus

spir. Ait.), filifolia Jacq. (Leucojum strumos. L., Crinum tenellum L. f.

Struthiopteris W. (Farne, XXIV. 1) „Strauss“-F. (struthio Strauss, πτερος Farn — grosse Wedel), Zier. S. germanica W. u. pennsylvanica W., s. Osmunda Struth. L.

Strychnos L. (Apocyneen, V. 1) Krähenauge ($\sigma\tauοιχρος$ Diosc. eine Pfl. v. $\sigma\tauοιχω$ reisse herum Leun. wegen der narkot. Wirkung), S. Nux vomica L. „Brechnuss“, fr. noix vomique, e. vomic-nut, S. Ignatia Berg. (Ignatia amara L.) Fiebernuss, fr. noix d'Ignace, S. columbrina L. f. (Lignum col. Blackw.) „Schlangenholz“.

Stuartia L'Hér. s. Stewartia Cav.

1) **Sturmia** Rchb. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) Knielippe, Gelbkiel (n. d. Nat. Jak. Sturm in Nürnberg, † 1848, s. d. Aut.), z. B. Loeselia Rchb. „Lösels“ Glanzkraut, s. Liparis Rich. 2) **Sturmia lucida** G. f. (Rubiac. Guettardeen, V. 1), s. Laugeria luc. Rz. Pv.

Stylium Sw. (Plumbagineen Stylidieen, XX. 2) „Säulenblume“ ($\sigma\tauιλος$ Säule, $\varepsilonιδομαι$ erscheine — d. Blütenteile in eine Säule verwachs.), Zier. S. fasciculatum u. Armeria Pers., s. Stylos Poir., auch s. Candollea Armeria Rich. u. Ventenatia Sm.

Stylolepis Lehm. (Compos. Senecionid., XIX. 2) „Stielschuppe“ (zu Podolépis DC.) ($\sigma\tauιλος$ u. $\lambdaετης$ Schuppe — d. Anthodiumschuppen, drüsig. Stielen), z. B. gracilis Lehm.

Styphelia Sm. (Epacrideen Styphelieneen, V. 1) „Hartheide“ ($\sigma\tauυφελος$ hart, fest — d. Frucht betr.), Zier. S. tubiflora u. splendens Sm., s. Epacris, Monotoca R. Br., Ventenata Sm. etc. — Stypheliæe Rchb.

Styphnolobium Schott (Cassieen, X. 1) „Sauerhülse“, s. g. Schnurhülse ($\sigma\tauυγρος$ od. $\sigma\tauυγρος$ sauer, herb, $\lambdaυβιον$ Hülse — dies. m. herb. Mark), s. Sophora R. Br.

Styrax T., L. (Sapotaceen. Styracineen, X. 1) „Storaxbaum“ (n. d. arab. assthirak, od. v. sturia Eiszapfen od. Tropfen, Wtst. — weg. d. austretend. Harzes), S. officinalis L. Apothek.-St. u. S. Benzoïn Dryand.

Suaeda Pall., Forsk. (zu Chenopodium L.) (Chenopodieen, V. 2) „Strandsoda“, Meerstrands-Gänsefuss M.-Rchb. (v. d. arab. souad Soda), S. maritima s. chenopodioides Pall. (Salsola mar. M.-B.).

Suber T. (sc. Quercus) L. (Cupuliferen, XXI. 8) Korkeiche, fr. phello-dry's u. liège, e. cork-tree (suber Kork — liefert in d. Rinde Kork, s. g. Pantoffelholz).

Subularia L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) „Pfriemenkresse“ (subula Pfriemen — bez. d. Stengelblätt.), z. B. aquatica L.

Succisa Vaill. (zu Seabiosa L.) (Dipsaceen, IV. 1) Teufelsabbiss, Sumpf-Scabiose, fr. succise, mors du diable, e. devil's-bit (succisus unten abgeschnitten — gestutzte Wurzel).

Succulentae Bartl. „Saft“- od. Fettpflanzen (succulentus saftig).

Superflua L., XIX. 2, Ord. der „Überflüssigen“ (Strahl- wie Scheibenblüten fruchtbar) (superflūus überflüssig).

Suriana L. (Thymeläac., X. 4) „Surian's“ Seidel (n. Joh. Donat. Surian, Arzt in Marseille, Mitarb. Plumier's), z. B. maritima L., s. Thymelaea Sloan. (Str. Südäm.). 2) **Sur.** Jacq. (Terebinthaceen).

Sutherlandia R. Br. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Sutherland's“ Blasenstr. (n. d. Herzog Jam. v. Sutherland in Edinburg, beschr. 1683 d. Pfl. s. Gartens), Zier. S. frutescens R. Br. (Colutea frut. L.), fr. bagué-naudier d'Ethiopie, e. shrubby bladder-Senna.

Swainsonia Salisb. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Swainson's“ Blasenstr. (n. d. Zücht. Isaac Swainson zu Ende d. vor. Jahrh.'s), Zier. S. purpurea Sal. u. Greyana Lind., s. Colutea L. u. Loxidium Vent.

1) **Swartzia** W. (-zia Rchb.) (Mimoseen Swartzieen, XXIII. 1) „Swartz“-Mimose, Cocoholz, Eisenholz von Cayenne, Panacocoholz (n. d. Prof.

Ol. Swartz in Stockh., s. d. Aut.), S. tomentosa W. etc. 2) **Swartzia** Schreb. (Solaneen, V. 1), z. B. grandiflora Gm. (Solandra gr. Sw.). 3) **Sw.** Hedw. (Moose, XXIV. 2), s. Cynodontium Hedw.

1) **Sweertia (Swertia)** L., Pers. (Gentianeen, V. 2) Sumpf- od. Flügelstiell-Enzian, Tarant O. W. (n. d. holl. Gärtn. Em. Sweert, schr. 1612 Florilegium etc., s. d. Aut.), Zier. S. perennis L., fr. Swertie vivace, e. perennial Fell-wort. 2) **Swertia** Ludw. (Compositen).

Swietenia L. (Cedrelaceen od. Meliaceen, X. 1) Mahagonibaum (n. Gerh. v. Swieten in Leiden, † 1772), S. Mahagoni L., fr. acajou à meubles, e. mahagony, S. febrisfuga Roxb. Fieberrindenb.

Syagrus Mart. (-um Dietr.) (Palmeen, XXI. 6) „Saurüden“-P. (v. σιάργος wilder Eber u. Saurüde, od. Syagrus, nach Aelian vorhomer. Geschichtsschr. d. Trojan. Kriegs?), z. B. cocoides Mart. (Bras.).

Sycomorus (sc. Ficus) L. (Urticac. Artocarpeen, XXIII. 3) Maulbeerfeige, Stamm-, cypr. od. egypt. Feige, fr. sycomore, e. sycamore (-camine) (v. σικαμός Feige u. Morus Maulbeere — Maulbeerblätt. u. Feigenfrüchte!), s. Ficus cypria Rauw.

Symphecalyx (st. **Symphocoe-**) Berland. (zu Ribes Rmpl.) (Ribesiac., V. 1) „Verwachskelch“ Goldtraube (συμφυτής verwachsen u. κάλυξ Kelch), Zier. S. s. R. aurēum Pursh u. tenuiflorum Ldl., s. Chrysobotrya Lindleyana Spach.

Symphoria Pursh, Spr. (Caprifoliac., V. 1), Peterstrauch, Schneebeerenstr. (v. συμφοῖα Versammlung — nämli. v. Beeren), Zier. S. racemosa Pursh, glomerata ds., s. Symphoricarpus Dill.

Syphoricarpa Neck. (-pus Dill., Mehx.) (Caprifoliac., V. 1) Peter- od. Schneebeerenstr., Wachsbeerenstr., fr. symphorine, e. St. Peter's-wort (s. eb. u. καρπός Frucht), Zier. vulgaris Mehx. m. v. fol. varieg., racemosus Mehx. (alba Raf., leucocarpa Hort., Symphoria rac. Pursh), s. Lonicera Symphoricarpus L.

Sympyandra A. DC. (Campanulaceen, V. 1) „Verwachsmännige“ (v. συμφυτής u. ἄνδρος, -δούς — d. Antheren zu ein. lang. Röhre verwachs.), Zier. S. pendula A. DC. (Campanula p. M.-B.).

Syphysogynae A. Rich. sc. Monocotyledonae DC., „Verwachsweibige“ (σύμφυτος u. γυνή).

Syphytum T., L. (Boragineen, V. 1) Beinwell, Wallwurz, fr. symphyte, consoude royal, herbe du Cardinal, e. wall-wort, consound etc. (σύμφυτον v. συμφύτω wachse zusammen — heilt Beinbruch), wild u. Zier. S. officinale L. m. v. purpurēum Hort. u. v. coccineum, Zier. asperrimum Sims m. v. fol. varieg., caucasicum M.-B. s. orientale L.

Sympīza Lichtenst. (Ericaceen, IV. 1) „Pressheide“ (v. συμπίτιον drücke zusamm. — nämli. d. Staubf. an d. Krone, Wtst. zusammengedr. Kelche), z. B. capitella Licht. (Blaeria bracteata L.).

Symplocarpus Salisb., Nutt. (Araceen, XX. 9) „Fruchtvereinigung“ (συμπλοκή Verknüpfung, ζευγπός — d. Beeren, vereinigt), Gewächsh. foetidus Sal. (Pothos foet. Sims), s. Dracontium f. L.

Symploeos L. (Styraceen od. Lucumeen, XVIII. 4) „Staubfadenring“ (σύμπλοκος verflochten — nämli. d. Staubf. an d. Basis), z. B. martinicensis Jacq., tinctoria l'Hér. (Hopea t. Pers.) etc.

Synandrae A. Br. i. q. Synantherae Rich. „Verwachsbeutlige“ (σὺν zusammen, ἀνήρ, -δούς Mann etc.).

Synantheræa Rich., Juss., s. Syngenesia L. Röhrenbeutlige Korbblütter (s. eb. — d. Staubb. in e. Röhre verwachsen).

Syngenesia L. Kl. d. „Verwachsbeutlichen“ (v. συγγενής, zusammen-gewachsen — nämli. d. Staubb.).

Sympetalae Rchb. Ganzblumige (σύν zusammen, πέταλον Kronblatt — diese bild. ein Ganzes!).

Syntherisma Schrad., Walth. (Gräser, III. 2) Bluthirse (v. συνθηρίσμα gehe mit auf d. Jagd — wird mit gemäht zu Viehfutter), z. B. ciliare Schrad. (Digitaria cil. Kön., Panicum c. Retz.), s. glabrum Schrad. (Digit. humifusa Rich.) etc.

Syrenia Andrz. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) „Syrenie“, Lackkrute (Anaglamm v. Erysimum), z. B. angustifolia Rehb. etc., s. Cheiranthus.

1) **Syringa** L. (Oleaceen, II. 1) Näglein, span. Flieder, Lilak, fr. lilas, e. lilac (-lach) u. staff-tree (v. σύριγξ, -γγός Röhre — Form d. Blüte?), Zier. S. vulgaris L. m. v. v. (z. B. alba Hort.), persica L., e. persian jasmin, m. v. laciniata Hort., rothomagensis Renault (chinensis W., dubia P.) (wahrsch. Hybride d. beid. vor.), Rouenflieder m. v. lilas royal „Königsflieder“. 2) **Syringa suspensa** Thb. = Forsythia susp. Vahl (Oleaceen, II. 1). 3) **Syringa amurens**. Rupr. = Ligustrina am. Reg. (Oleac. II. 1). 4) **Syringa** T. = Philadelphus L. (Philadelphus, XII. 1) Pfeifenstrauch (— Holz z. Pfeifenröhren).

Syrus Endl. (Gräser, III. 2) (zu Lepturus R. Br.) „Sauschwanz“ (σύρος, -ών Schwnein, οὐρά Schwanz).

Tabernaemontana L. (Apocyneen, V. 1) „Tabernämontan's“-Milch- od. Kaoutschukbaum (n. Jac. Th. Tabernaemontanus „aus Bergzabern“, Leibarzt d. Pfalzgraf. Joh. Casimir, † 1590), z. B. utilis Walk.-Arn., s. Galactodendron ut. Kth., elastica Spr. (Urceola el. Roxb.) etc., s. Nerium u. Cameraria L.

1) **Tacamahaca** Spach (subgen. v. Populus L.) (Salicineen, XXII. 7) Balsampappel (vaterl.), z. B. P. balsamifera L. 2) **Tae.** (Guttiferen, XI. 1) (Name in Ostind.).

Taceea Forst. (Taccaceen od. Aristolochieen, VI. 1) tahitisches Arrow-root od. = Salep Leun. (malay. Name d. Pfl.), z. B. integrifolia Ker (Ostind.), pinnatifida Sw. (Leontice leontopetaloides G.). — Taccaceae Presl.

Tacsonia Juss. (Asclepiad. Passifloreen, XVI. 2) „Tacsonie“ (taco peruan. Name einer Art), Warmh. T. insignis Maxw. (Peru), quitensis Maxw. u. Vanvolxemii Hort. (Neugran.) etc.

Tacsonioides DC. (zu Passiflora L.) „Tacsoniengleiche“ (s. eb.).

Taeda (sc. Pinus) L. (Coniferen, XXI. 9) Weihrauch- od. Terpentinkiefer, fr. pin de l'encens, e. frank-incense-Pine (Loblolly-, in Amer. Oldfield-Pine) (taeda Kienfackel).

Tagētes T., L. (Compos. Tageteen, XIX. 2) Sammetblume, s. g. Studentenbl., Totenbl. D., Afrikane od. Tuneserbl., stinkende Hoffahrt etc., fr. fleur africaine (- de Tunis, - de Rome), e. french-marigold pass-velours u. velvet-flower (v. Tages, -ētis Enkel Jupiter's, schön. Jüngling, etrusk. Gottheit Myth.), Zier.: patula L. m. v. v., lucida Cav., erecta L. m. v. fl. pl., etc., s. Ozōlis Spr., Enalcida Cass. u. Boebēra W. — Tagetēae Rehb., -tinēae Cass.

Talinum Ad., Juss. (Portulacac., XI. 1) Blüten-Portulak, Brautpfl. Leun. (v. θαλήτια Blüte? Wtst. Name d. Pfl. am Senegal), Zier. T. patens W. (Calandrinia Andrewnski Hort.) u. spectabile Ott.

Tamarindus L. (Cassieen Cäsalpinieen, III. 1) „Tamarindenbaum“, Sauer-dattel Wolff, fr. tamarindier, e. Indian-date u. tamarind (v. d. arab. tamer Dattel u. hindi indisches), T. indica L., Intsia Spr. (Metrosidēros amboinensis Rumph., Rumphia amb. L., P.).

1) **Tamariscus** T., All., Lam., s. Tamarix Desv. 2) **Tamarisens** aethiopicus (Compos. Segregaten, XIX. 5), s. Stoebe cinerea s. ericoides L. (Eupatorium eric. Breyne.) (s. sogl.).

- Tamarix** Desv. (Aizoideen Tamariscineen, V. 3) „Tamariskenbaum“, fr. tamaris, e. tamarisk (v. Tamaris, jetzt Tambro, Fluss d. Pyrenäen, an dessen Ufern wachs., Wtst. n. d. Volk der Tamarisker dort), Zier. T. gallica L. (pentandra Pall.), fr. athle, T. germanica L. (decandra Mnch., Myricaria germ. Desv.), tetrandra Pall. m. v. v. (Oligadeniae Ledeb. „wenigdrüsige“), africana, chin. etc. (Decadeniae Ledeb. „zehndrüs.“).
- Tamus** L., Ait., l'Hér. (Tannus Juss., Dietr.) (Smilaceen, XXII. 6) Schmeer- od. Stickwurz, fr. tame (-mier), e. black-bryony, choke-weed etc. (gr. θάυος; od. θάυρος, Tamnus Plin. Kletterstr. m. Beeren), Zier. T. Elephantipes l'Hér. (Testudinaria Elephantopus Burch.), s. Dioscorēa Spr., T. communis L. gem. Schmeerwurz.
- Tanacētum** L. (Compos. Anthemid., XIX. 2) Rainfarn, Wurmkraut Vilm., fr. tanaisie, herbe aux vers, e. tansy (n. J. Bauhin st. ἀθανατία Unsterblich., schwerl. ταραύς lang u. ἀξηή Spitze od. ἀζέομαι heile — bleibt lang frisch etc., Wtst.), Zier. T. vulgare L. m. v. crispum Hort., fr. Barbotin, e. common tansy, T. annuum L. (Balsamīta ann. DC., Athanasia a. Hort.).
- Tapia** Plum. (sc. Crataeva) L. (Capparideen, XI. 1) Stinkapfel, Totenbaum D., Knoblauchsbirne, fr. tapin (-nier), s. Apioscorōdon Pluk. u. f. Tapia arborēa triphylla Plum. (vaterl.).
- Taralēa** Aubl. (Legumin. Dalbergieen, XVII. 3) Tongabohne (Name bei d. Galibis tarala), s. Diptērix Schreb. u. Dalbergia L.
- Taraxāeum** Hall., Juss. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) Löwenzahn, Röhrchenkraut, Pfaffenöhrlein Seub., Milchbusch Rmpl., fr. dent de lion, e. dandelion od. lion's-tooth u. cucullate-flower (v. τάραχας Bauchgrimmen u. ἀζέομαι heile), T. officinale Web. (Leontodon Taraxacum L.), fr. pisserlit „Bettpisser“ u. salade de taupe „Maulwurfssalat“.
- Tarchonanthus** L. (Compos. Tarchonantheen, XIX. 2) „Tarchon“- od. Tarragonblume, Pelzsame D. (v. Tarchon arab. Name für Tarragona in Spanien, Wtst. tarchon = Artemisia Dracunculus od. Esdragon), T. camphoratus L.
- Tatūla** (sc. Datura) L. (Solaneen, V. 1) blossblauer Stechapfel (Gart. Zier.) (schwerl. dem. v. τάτα Väterchen, sond. v. d. arab. tatorah, lat. tatula = Datura).
- Taxodium** Rich. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Eiben- od. Sumpf-Cypresse, Sumpfeeder, fr. chauve od. cyprès d'Amérique, e. deciduous cypress (τάξος Eibenb. u. ειδουμεν gleiche), Zier. T. distichum Rich. m. v. v., s. Cupressus s. Schubertia Mirb. disticha.
- Taxus** T., L. (Coniferen Taxaceen, XXII. 12) Eibenbaum, Ibe Vilm., Taxus, fr. if, e. yew od. ewe-tree (gr. τάξος i. q. συκίας Eibe, v. τάξις Reihe — Stellung d. Nadeln, Wtst. angeb. v. τόξον Pfeil od. Bogen), Zier.: T. baccatus L., fr. If commun, m. v. v., T. canadensis W. (baccata minor Mchx.) etc. — Taxae Rchb., -ineae ds.
- Tazetta (Tazzetta)** (sc. Narcissus) L. (Amaryllideen, VI. 1) Tross- od. Dolden-Narzisse, fr. Narcisse à bouquet od. - de Constantinople (dem. v. Taza span. d. Tasse — Form d. Nektariuns!), s. Hermione Taz. Haw. u. Narcissus orientalis Hort.
- Tecōma** Juss. (zu Bignonia Rchb.) (Bignoniacceen, XIV. 2) Trompeten-Jasmin (mex. Name tecoma cochitl „Bettpisser“ — harntreib. Wurzeln! Leun.), Zier. T. radicans Juss. m. v. v., fr. Jasmin trompette od. - de Virginie, e. trumpet-flower, grandiflōra Sweet (Bignonia gr. Thb. s. chinens. Lam.).
- Tecophilaea** Bert. (-ēa Endl., Lindl.) (Irideen, III. 1) „Kindlieb“, Topfbl. T. Cyanocrocus Bert. Blau-Crocus (τέκος Kind, φιλέω liebe, Wtst. n. Tecophila Billotti, Tocht. d. Bot. Al. Colla).

- Tectona** Sm. (-nia L. f.) (Verbeneen, V. 1) „Teakbaum“, „Thekab.“, ind. Eichenb. Leun. (tecca d. Namen dies. Schiffsbauholzes in Malabar), T. grandis L., s. Theka Hort., Kew. etc.
- Teedia** Rudolph (Scrophularineen, XIV. 2) „Teedie“ (n. d. Bot. J. G. Teede in Portugal, † in Surinam), T. lucida Rud., s. Capraria 1. W., Herzblume D. (Borkhausenia Roth).
- Teesdalia** R. Br. (bess. -lēa Grck.) (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Zwerg-Bauerntsenf, Rahle O. W. (n. d. engl. Bot. Rob. Teesdale, † 1804), z. B. nudicalis R. Br. (Ibēris nud. L.), T. Lepidium R. Br. (Gepinie Lep. Desv.).
- Teganium** Schmidel (Convolvulaceen, V. 1) „Tiegelchen“, niederlieg. Schellenblume T. procumbens Schmid. ($\tau\gamma\alpha\mu\omega\sigma$ dem. v. $\tau\gamma\alpha\mu\omega\sigma$) Tiegel — d. Eierstock in ein. fleisch. hypogyn. Scheibe), s. Nolana prostrata L. (Walkesia Ehret., Neuendorffia peruv. repens Ad.).
- Telanthēra** (Teleianth.-) Reg. (Amarantaceen, XXI. 5) (zu Alternanthera R. Br.) „Vollantheren“-Amarant ($\tau\epsilon\lambda\epsilon\tau\omega\sigma$ vollendet, $\delta\pi\vartheta\tau\omega\sigma$ — alle Antheren vollständig!), Blattpfl. versicolor Reg.
- Telebōlus** s. Thelebōlus!
- Telezia** Baumg. (zu Buphthalmum Rehb.) (Compos. Heliantheen, XIX. 3) „Telekie“, Rindsauge (n. d. ungar. Grafen Teleki v. Szek), Zier. T. speciosa Baumg. (Buphth. sp. Schreb. s. cordifolium W. K.).
- 1) **Telephium** (sc. Sēdum) L. (Sedeen, X. 5) Fetthenne, e. live-ever (-long). 2) **Tel.** Imperati L. (Paronychieen, V. 1) wechselblättr. Telephium Leun. (gr. $\tau\eta\lambda\epsilon\tau\omega\sigma$ i. q. - $\eta\lambda\omega\sigma$ „ferne Liebe“, F. W. Riemer, Plinius: n. Telephos, von Achilles verwund. König v. Mysien, Fraas: i. q. Cerinthe aspera! Wtst.). — Telephiæ DC. (sc. Paronychiacæ St. Hil.).
- Telfairia** Hook. f. (Cucurbitaceen, XXI. 10) „Telfairie“ (n. d. irisch. Bot. Ch. Telfaire, † 1833), s. Feuillæa peltata s. Jollisia Boj.
- Telmateja** (sc. Equisetum) Ehrh. (Equisetaceen, XXIV. 1) grossscheidiger Schafthalm ($\tau\epsilon\lambda\mu\alpha\tau\omega\sigma$ in Sumpf wachsend), s. Equis. maximum Lam.
- Telmatophæe** Schleid. (Lemnaceen, II. 1) „Teichlinse“ ($\tau\epsilon\lambda\mu\alpha$, - $\omega\tau\omega\sigma$ Teich, $\gamma\alpha\zeta\eta\eta$ Linse), T. gibba Schl. (Lemma g. L.).
- Telopēa** R. Br. (Proteaceen, IV. 1) „Weithinsichtbare“ ($\tau\epsilon\lambda\omega\sigma$ Ferne, $\delta\pi\epsilon\omega$ sehe — in d. Auge fallend rotblühend), T. speciosissima R. Br. (Embothrium spec. Sm.).
- Tenageia** (sc. Juncus) Ehrh. (Juncaceen, VI. 1) Sumpfbinse (v. $\tau\epsilon\nu\alpha\gamma\omega\sigma$ Sumpf), s. Juncus gracilis s. Vaillantii Thuill.
- Tephrosia** Pers. (Legumin. Galegeen, XVII. 4) „Aschenblatt“, surinam'scher Giftbaum Leun. ($\tau\epsilon\gamma\omega\alpha$ od. - η Asche — aschgrau behaart), s. Galēga, Robinia u. Indigofera.
- Teraminus** P. Br., Schreb. (Legumin. Phaseoleen, XVII. 4) „Weich“-od. Laubenbohne D. (v. $\tau\epsilon\gamma\mu\omega\sigma$ od. - $\mu\omega\sigma$ weich, gut zu kochen, Wtst.: reichbehaart, od. v. $\tau\epsilon\omega\mu\omega\sigma$ od. - $\omega\mu\omega\sigma$ Zelt, Laube — wozu in Jamaika gebr.), T. volubilis Sw., s. Phaseolus hirtus Plum. s. Dolichos uncinatus L.
- Terebinthus** T. (sc. Pistacia) L. (Terebinthaceen, XXII. 5) „Terebinthe“, Terpentin-Pistazie, fr. térébinthe (gr. $\tau\epsilon\varrho\epsilon\beta\mu\tau\theta\sigma$ v. $\tau\epsilon\varrho\epsilon\omega$ bohre od. schneide an — dass Saft fliesst). — Terebinthacæae DC., -thinae Endl.
- Terminalia** L. (Combretac. od. Myrobalaneen, XXIII. 1) „Gipfelbündel“, Catappabaum (Katappenb. Perring), indian. Tintenholz od. Mandelb. (v. terminus Spitze — bez. d. Blätterstands an d. Zweigen), T. Catappa L. (Amygdalus ind. Raj.), s. Myrobalanus Fatraea Poir., T. Benzoīn L. s. angustifolia Jacq.

- Ternatēa** T. (sc. Clitoria) L. (Legumin. Glycinieen, XVII. 4) „Ternate“-Schamblume, Blaublume, fr. fleur-bleue (n. d. Molukken-Insel Ternate).
- Ternstroemia** L. f., Mut. (Theaceen Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Ternstroemie“ (n. d. schwed. Reis. in Ostind. C. Ternstroem, † 1745), T. meridionalis Sw. u. japonica Thb. (Cleyera j. Thb.). — Ternstroemiacae DC., -miæae (sc. Theacæae) Rchb.
- Terpanthus** Mart., Nees (Rutaceen Diosmeen, V. 1) „Reiz“- od. „Lustblume“ ($\tau \varepsilon \sigma \pi \nu \varsigma$ reizend etc., $\zeta \iota \theta \varsigma$ — schöne, wohlriech. Blüten), T. jasminodorus Mart. (Spiranthera odoratissima St. Hil.).
- Testudinaria** Salisb. (Dioscoreen od. Smilaceen, XXII. 6) „Schildkrötenwurz“, Elephantenfuss-Schmeerwurz (v. testudo, -inis Schildkröte — Form d. Wurzelkopfs), T. elephantipes Ait. (Tamus el. l'Hér.).
- Tetraçera** L. (Dilleniaceen, XXII. 12) „Vierhornkapsel“-Strauch, Raspelstr. D. ($\tau \acute{\epsilon} \tau \omega \alpha$ vier, $\zeta \acute{\epsilon} \omega \varsigma$ Horn — krummvierhörn. Kapseln), T. potatoria W. (Dillenia scandens autt.) Brunnenb. Leun.
- Tetrodynamia** L., XV. Kl. „Viermächtige“ (s. eb. u. $\delta \acute{\iota} \rho \alpha \mu \varsigma$ Stärke — unter 6 Staubgef. 4 grösste!).
- Tetragonia** L. (Aïzoideen Tetragoniaceen, XII. 4) „Vierecksfrucht“ od. -blatt (s. v. u. $\gamma \acute{\alpha} \rho \varsigma$ od. $\gamma \acute{\alpha} \tau \alpha$ Ecke — Fr. vierkantig geflügelt!), s. Tetragonocarpus Comm., cult. T. expansa L. neuseeländ. Spinat, s. Demidovia tetragonoides Pall. — Tetragoniaceae Rchb.
- Tetragonolòbus** Scop. (zu Lotus Rchb.) (Legumin. Loteen, XVII. 4) Flügelhülse, Spargelerbse, -bohne, Sparz O. W. (s. v., $\lambda \circ \beta \circ \varsigma$ Hülse — diese geflügelt vierkantig), T. siliquosus Roth (Lotus siliq. L.) u. purpuréus Mnch.
- Teträhit** Dill. (sc. Galeopsis) L. (Labiaten, XIV. 1) breitblättr. Hohlzahn, gem. Daun, Hanfmessel ($\tau \acute{\epsilon} \tau \omega \alpha$ u. $\iota \iota \nu \varsigma$ Runde — vier Blätter in d. Runde od. vierkant. Stengel, nicht te u. trahit „täuscht dich“).
- Tetràlix** (sc. Erica) L. (Ericaceen, VIII. 1) Sumpf-Glockenheide Grck., „Vierdraht“-Heide, vierblättr. H. Vilm., fr. bruyère des marais, e. four-leaved od. cross-leaved heath (s. v. u. $\xi \lambda \iota \varsigma$ Drehung — d. Blätter zu vieren in Reihen).
- Tetrandria** L., IV. Kl. „Viermännige“ (s. v. u. $\alpha \nu \gamma \varsigma$, - $\delta \rho \circ \varsigma$ Mann, Staubgefäß).
- Tetranéma** Benth. (Scrophularineen, XIV. 2) „Vierfaden“ (s. v. u. $\nu \gamma \mu \alpha$ Faden — Gegensatz zu Penstemon „Fünffaden“), z. B. T. mexicana Benth. (Penstemon mex. autt.).
- Tetranthéra** Jacq. (Lauraceen, IX. 1) „Vierantheren“-Lorbeer, Topfod. Talg-L. Leun. (s. v. $\dot{\alpha} \nu \vartheta \gamma \varsigma \alpha$ Staubbeutel — d. Antheren vierfächiger), z. B. trinervia Spr., s. Laurus Myrrha Lour. s. Litsëa ceylanica Nees.
- Tetrapeltis** Wall. (Orchideen, XX. 1) „Vierschild“-O. (s. v., $\pi \acute{\epsilon} \iota \tau \eta$ Rundschilde — vier Pollenmassen an gemeins. Drüse), z. B. fragrans Wall. (Nepal).
- Tetraphis** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Vierzahnmoos“ (s. v. u. $\delta \acute{\alpha} \varsigma \iota \varsigma$ Nadel — 4 spitze Peristomzähne), z. B. Browniana Brid. (ovata Hook.), s. Tetrodontium Brid. — Tetraphidæ Schimp.
- Tetraptrëis** Cav. (-ra Dietr.) (Malpighiaceen, X. 3) „Vierflügel“ D. (s. v. u. $\pi \tau \epsilon \bar{\alpha} \nu \iota$ Flügel — d. Kaps. m. 4 gekreuzt. Flügeln), z. B. acutifolia Cav. etc., s. Triopteris Spr.
- Tetrathëea** Sm. (Tiliaceen od. Tremandrac., VIII. 1) „Vierzellen“-Anthere, „Vierbüchse“ Perring (s. v. u. $\vartheta \acute{\iota} \chi \eta$ Büchse etc. — d. Anthere vierfach.), z. B. ericifolia Pers. u. juncëa Sm. (Neuholl.).
- 1) **Teucrium** L. (Labiaten, XIV. 1) Gamander, Bergsalbei, Bathengel, Frauenbiss, fr. germandrée od. calamandrier, e. germander ($\tau \acute{\iota} \zeta \alpha \nu \iota$ n. d. Trojan. Prinzen Teucer ben., Plinius), Zier. T. Chamaedrys

- L. Edel-Gamander od. Feldcypresse, Topf: T. Marum L. (Marum verum Hort.) Katzen- od. Mastixkr. 2) **Teuer.** (sc. Veronica) L. (Scrophularineen, II. 1) breitblättr. Ehrenpreis, fr. teucritte Erdweihrauch Wolff, s. Teucropsis Benth.
- Teutliopsis** Celak. (zu Atriplex L.) (Atripliceen, XXIII. 1) „Mangold-gleiche“ (Τευτλίον lat. Beta Mangold od. Bete u. οὐψις Aussehen), z. B. A. litorale L., patulum L. etc.
- Thalamia** Spr. (Cupressineen Taxaceen, XXI. 9) „Ruder“- od. Thränenbaum (v. θαλαμία Ruder — dazu dien. Holz? Wst.: v. θαλάμος Lager — becherf. Scheibe d. Eierstocks), z. B. asplenifolia Lab. (Podocarpus aspl. Lab.) (B. Neuhol.), s. Dacrydium Sol.
- Thalamillörae** DC. „Bodenblütige“ od. „Fruchtbodenblütl“ Grck. (s. eb. u. flore blühe — d. Blütenteile alle auf d. Blumen- od. Fruchtboden stehend).
- Thalia** L., Schreb. (Marantaceen od. Cannac., I. 1) „Thal's“-Pfeilwurz, fr. Thalie (n. d. deutsch. Arzt J. Thal, lat. Thalius, schr. 1588 Verz. d. Harzpf.), Zier.: cannaeformis W. (Phrynum dichotönum Roxb.), dealbata Sowerb., s. Pteronia stricta Réd. s. Maranta racemosa.
- Thalictrum** T. (Ranunculaceen, XIII. 7) Wiesenraute, Wielandskraut O. W., fr. thalictron od. pigamon, e. meadow-rue (gr. θάλικτρον v. θάλλω grüne — besond. frischgrüne Sprossen), Zier.: T. aquilegiformium L. m. v. v., fr. colombine plumacée od. plumeuse, Stuben anemooides Mchx. v. fl. plen., wild T. minus L., flavum L. etc.
- Thallophyta** Endl. „Lagerpflanzen“ (θαλλός Zweig, Thallus d. Flechten etc., φυτὸν Pfl.).
- Thapsia** T., L. (-ium Nutt.) (Umbelliferen, V. 2) Laser- od. Böskraut, Liebstöckel (gr. θαψία Diosc., n. d. Insel Thapsus ben.), z. B. villosa T., fr. malherbe, T. Asclepium L. „Aeskulap's“-Böskr., s. Panax Ascl. apíolum Col., actaeafolium Nutt. (Ligusticum act.), atro-purpureum etc.
- Thapsus** (sc. Verbascum) L. (Scrophularineen, V. 1) Königskerze, kleinblum. Wollkraut Grck., fr. chandelle royale od. molène, e. high-taper etc. (gr. θάψος Wollkr., Kr. d. Ins. Thapsus).
- Thea** L. (Theaceen od. Ternstroemiaceen, XIII. 1) „Theestrauch“, fr. thé, e. tea (chines. Nam. teha, nicht etwa θέα Göttin!), z. B. T. Bohéa L. brauner Thee, fr. thé bou, T. viridis L. (sinensis Blackw.), fr. thé vert u. impérial „Kaiserthee“ (— beide auch Stubenpfl.). — Theacées Rchb.
- Theka** Juss., s. Tectona !
- Thelaia** Alfld. (Hypopithaceen od. Pirolaceen, X. 1) Wintergrün (v. θηλή Mutterbrust, Zitze — Aussehen d. Blütenknospen), z. B. rotundifolia Alfld. (Pirola r. L.), chlorantha Alfld. etc.
- Thelebölus** Tod. (bess. Telebölus autt.) (Pilze, XXIV. 4) Weitschneller Kumm. (v. τέλος; Ferne, nicht v. θηλή Zitze u. βόλος Wurf — werfen kugl. Sporenblasen aus), T. terrestris Tod.
- Thelygönium** Pers. (Urticac. od. Begoniaceen, XXI. 9) „Mädchen-schief-blatt“ (v. θηλύς weiblich u. γονή Geburt — Plinius: sie bewirkt, dass Mädchen empfangen werden), z. B. Cynorambe Pers. „Hunds-kohl“.
- Thelyphönium** (sc. Aconitum) Rchb. (Ranunculac., XIII. 3) „Frauentod“ (θηλυφόνιος Weiber mordend).
- Thelyptéris** (sc. Polypodium s. Acrostichon) L. (Farne, XXIV. 1) „weiblicher“ od. Sumpf-Farn (s. v., πτερίς Farn).
- Thenardia** Kth. (Apocyneen, V. 1) „Thenard's“ Hundswürger (n. d. franz. Chemiker Thenard, Kunth's Freunde), z. B. floribunda Kth., scabra Spr. (Echites sc. Lab.) etc.

- Theobroma** Juss., L. (Sterculiaceen od. Büttneriac., XVIII. 1) Cacaobaum (v. θεός Gott u. βοῶμα Speise), Th. Cacão L. Chokoladebaum.
- 1) **Theophrasta** (-ea) L. (Solaneen Ardisiaceen od. Myrsineen, V. 1) „Theophrast's“ Myrtenblume, fr. coquemollier (n. Theophrastus, d. Vater d. Naturgesch.), Treibh. T. macrophylla Lk. (Bras.), longifolia Jacq. (Claviga ornata Don) (Neugran.). 2) **Th.** imperialis Juss. (Dileniac., XIII. 2), s. Curatella L.
- Thermopsis** R. Br., Don (Cassieen Cäsalpinieen, X. 1) Feigbohnenstr., Fuchsbohne Rümpl. (v. θερμός Feigbohne od. Lupine u. ψύκτης Aussehen — d. Lupinen ähnl. Kräuter, Wst.), Zier. T. fabacea DC., fr. Th. Fève, e. garden-bean-like Th., s. Podaliria u. Sophöra.
- Thesium** L. (Santalaceen, V. 1) Leinblatt, Verneinkraut, Vermainkr. O. W. (v. θήσης Sklave — weg. gering. Ansehens, n. Athenäus v. Theseus, welch. der Ariadne ein. Kranz daraus gab, Wst.), T. Linophyllum L., etc.
- Thespesia** Corr., Spr. (Malvaceen, XVI. 8) Kirchen-Malve, -pappel (v. θεσπέσιος göttlich — um Kirchen gezogen, Wst.: herrl. gelbe Bl. m. rotfleck. Basis!), T. populnea Corr. (B Ost- u. Westind.), s. Hibiscus p. L.
- Thladiantha** Bung. (Cucurbitac., XXI. 10) „Quetschblüte“ (v. θλάσσω zerquetsche, ἄνθη Blüte — weg. d. Aussehens? Wst.: Bunge kannte nur ein gepresst. Exemplar), Zier. dubia Bung. (Nordchina).
- Thlaspi** Dill., L. (Cruciferen Siliculos., XV. 1) Täschelkraut, Breittasche, Pfennigkraut, Kasper O. W., fr. thlaspie (v. θλάσσω drücke zusammen — Form d. Schötchen!), z. B. T. bursa pastoris L. (Capsella b. p. Mnch.), fr. bourse à berger ou pasteur, T. arvense L., campestre L. etc.
- Thora** (sc. Ranunculus) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) Gift-Ranunkel, fr. thora (st. φθονά Verderben — früher zur Vergift. d. Pfeile), s. Ran. scutatus W.
- Thrinax** L. f., Schreb. (Palmen, VI. 1) Fächer- od. Schilf-P. (gr. θρίνα Dreizack — Fächerform d. Blätt.), Stub. T. parviflora Sw., argentea Lodd. etc., s. Corypha palmaea P. Br. (span. Palma plateada Silber-P.).
- Thrincia** Roth (Compos. Cichoriac., XIX. 1) Hundslattich, Zinnen- od. Randkrönchen, Zinnsaat O. W. (v. θρίγνος Zinne, Rand — Standort auf Mauerzinnen? Stand d. Samen in einem Kranz auf dem Fruchtboden?), T. hispida Roth, s. Colobium h. Roth.
- Thryallis** L. (Malpighiaceen, X. 1) Kurzhäre, Dochtpfl. D. (gr. θρυαλλίς Docht — weg. Anwendg. d. ähnl. Verbascum zu Dochten), z. B. brachystachys u. brasiliensis L.
- Thuja** T., L. (Coniferen Cupressineen, XXI. 9) Lebensbaum, Opfer- od. Weihrauchbaum (gr. θυΐα v. θύω opfere), Zier. T. occidentalis L. m. v. v. (Friedhöfe), fr. Cypres arbre de vie, Cèdre américain od. blanc, e. western arbor vitae, T. orientalis L. (Biota or. Don) m. v. aurea Hort., v. nana u. v. pendula Endl., T. plicata Don, fr. Thuya plissé, m. v. nana Hort., T. gigantea Nutt. Riesen-L., s. Libocedrus decurrens Torr. etc.
- Thujopsis** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) „Lebensbaumgleiche“, japan. Cypresse (θυΐα u. ψύκτης Aussehen), z. B. borealis Fisch. (Chamaecyparis nutkaensis Lamb.), T. dolabrata S. Z., fr. Thuyops, en doloire, s. Phyllocladus dol. Spach.
- 1) **Thunbergia** L. (Acanthaceen, XIV. 2) „Thunbergie“ (n. d. schwed. Bot. Thunberg, s. d. Aut.) Stubeklimmpfl. T. alata Boj., Hook. m. v. v. (z. B. Sommerbank: v. Barkeri, Fryeri u. lutæa Hort.), Warmh. fragrans Roxb. 2) **Thunb.** capensis Montin (Cinchonaceen, V. 1), s. Gardenia Thunb. L.

Thymelaea Ad., Scop. (sc. Daphne) L. (Thymeläaceen, VIII. 1) Seidelbast, Purgierstr., fr. thymélée (gr. θυμέλαια Purgierstr. F. W. Riemer, eig. Daphne Gnidiūm L.), T. Mezerēum Scop. = Daphne Mez. L., T. Passerina Coss., Germ. = Stellēra Pass. L. (Pass. annua Wikst.), T. minor Gessn. = Daphne Cneorum L., etc. — Thymelæae DC., -leacæae Rchb. Seidel.

Thymus T., L. (Labiaten, XIV. 1) „Thymian“, fr. thym, e. thyme (thime u. tyme) (gr. θύμος od. -ον Thymian, Wtst.: v. θύμος Kraft — stärkende Wirkung!), Gart. T. vulgaris L. m. v. fol. varieg. Hort. u. v. golden-fleece, T. citriodora Schreb. (Mittelmeerl.), Topf: T. Mastichīna L. (Span. etc.), etc.

Thyrsacanthus Planch. (Acanthac., XIV. 2) „Strauss“-Acanthus (θύρσος weinlaubumrankt. Stab u. Acanth.), z. B. barterioides Pl. u. rutilans Lindl.

Thysselinum Hoffm. (Thysel.- Ad.) (Umbelliferen, V. 2) „Opfersilje“, Sumpfhaarstrang, Oelsenich Grck. (v. θύω opfere u. Selīnum Silje), T. palustre Hoffm., s. Peucedānum p. Mnch.

Tiarella L. (Saxifrageen, X. 2) „Spitzmütze“ Perring, Turbankapsel, fr. tiarelle (dem. v. tiara pers. Turban — Kapselform), Zier.: cordifolia L., trifoliata L. (Mitella fol. tern. L.).

Tiglium Klotzsch, Meyen (sc. Croton) L. (Euphorbiac., XXI. 9) Purgier-Croton, fr. grains de tilli, e. bezoar-nut „Bezoarnuss“, s. Granum moluccanum Rumph. Granatillbaum (n. ein. d. molukk. Inseln, Wtst. n. τίλος; Diarrhoe — weg. d. Wirkung).

Tigridia Juss. (Irideen, XX. 2) „Tigerlilie“, -blume, fr. tigridie od. fleur tigrée (v. τίγρις, -ίδος Tiger — bunt wie Tigerfell), Zier. T. Pavonia Réd. m. v. v., s. Ferraria Tigridia Bot. Mag. (Tigr. grandiflora Hort.), conchiflora Sweet, gelbe T.

Tilia L. (Tiliaceen, XIII. 1) Linde, fr. tilleul, e. linden-tree (lime- u. teil-tree) (v. τίλον st. τίλων Feder od. Flügel — geflüg. Blütenstiele), T. parvifolia Ehrh. (ulmif. Scop. etc.) Stein- od. Winterlinde, m. v. pendula Hort. u. fol. varieg., T. platyphyllos Scop. (grandifolia Ehrh. etc.) holländ. od. Sommerlinde, m. v. v., T. americana L. Schwarzl. Vilm. (canadens. Mchx. etc.), argentea DC., Silberl. (alba Waldst. Kit. etc.) etc. — Tiliacæae DC., Rchb., -liæae Rchb.

Tillaea Mich. (Crassulaceen, IV. 4) „Tilli's“ Moosblümchen, Moosniedlich (n. M. A. Tilli zu Pisa, † 1740), T. muscosa L.

Tillandsia L. (Bromeliaceen, VI. 1) „Tillandsie“, Greisenbart, Packod. Polstermoos Leun. etc., fr. caragate (n. Prof. Elias Til-Lands, lat. Tillandsius, zu Åbo in Finnland), Zier.: T. splendens A. Brong. (Guian.), bivittata Hook., bulbosa v. picta Hook., etc.

Tilletia Tul. (Staubpilze, XXIV. 4) „Tillet's“ Weizenbrand, s. g. Schmierbrand (n. Matth. Tillet in Bordeaux, † 1791), T. Caries Tul.

1) **Timmia** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Timm's“-Moos (n. d. Bot. J. C. Timm in Malchin, † 1805). — Timmiacæae DC. 2) **Timmia** Gm. (Liliaceen, VI. 1) „Timm's“-Lilie.

1) **Tinus** (L. Ericaceen od. Laurineen, IX. 1) Heidenerle (gr. τίνος lat. tinus Lorbeerschneeballen, v. τείνω dehne hinaus — blüht im Winter!), T. occidentalis L. s. Clethra trifolia Sw. 2) **Tinus** (sc. Viburnum) L. (Caprifoliac., V. 1) Lorbeer-Schneeballen, fr. laurier thym od. tin, s. Laurus Tinus Hort.

Tithonia Desf. (Compos. Heliantheen, XIX. 3) Aurorablume, fr. tithonie (v. Tithonus Liebling der Aurora od. Göttin d. Morgenröte, Myth. — d. Blum. meist morgenrot!), Zier. tagetiflora Desf. u. tubiflora Hortul.

Tithymalus T., Haw. (Euphorbiac., XI. 3 od. XXI. 1) Wolfsmilch (gr. τιθύμαλος od. -μαλλος; Wolfsm. v. τιθή od. τιτθή Amme u. μα-

- λὸς od. μαλλὸς weich — giebt Milch), s. Euphorbia L. — Tithymalæae Rehb. eigentl. Wolfsmilchpfl.*
- Tobira** Kämpf. (Pittosporeen od. Celastraceen, V. 1) (zu Evonymus L.) „Tobira“-Spillbaum (vaterl. Name in Japan), s. Evonymus Tobira L. (Pittosporum Tob., Ait.) (Stubenzier).
- Todēa** W., Sw. (Osmundaceen, XXIV. 1) „Tode's“-Rispenfarn (n. d. Bot. u. Pred. H. J. Tode, † 1797, s. d. Aut.), Zier. T. africana W. (barbara Moore, Osmunda totta Sw.) (Cap), superba Col. etc.
- Tofieldia** Huds. (Melanthaceen, VI. 3) „Tofieldie“, Kelchlilie, Kelke O. W. (n. d. engl. Bot. Tofield † 1793), T. calyculata Whlb. Sumpf-T. Grck., pubescens Pers. (Narthecium p. Mchx.) etc.
- Tolpis** Ad., G. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Borsten- od. Bartripippau (v. Tolp od. Zülpich, Tolpiacum? od. τολύπη Zwirnknaul? — ungewiss!), Garten: T. barbata G. (Crepis b. L., Drepmania b. Juss.).
- 1) **Toluiféra** Lour. (Terebinthaceen, X. 1) Tolubalsambaum, fr. tolu (vaterl. tolu = Balsam), T. Balsäumum L. Tolubalsam (n. Tolu, ein. Stadt am caraibischen Meer ben. Wtst.), s. Myroxylon toluiferum Rich. (Myrospermum tol. Spr.).
- Tommassinia** Bertol. (Umbellifer., V. 2) „Tommassini“-Dolde (n. d. Bot. Tommassini, s. d. Aut.), z. B. verticillaris Bert., s. Peucedanum vert. Koch.
- Tordylium** T., L. (Umbellifern, V. 2) Zirmet, Drehkraut, Kletterdolde, fr. tordyle, codille laiteuse (gr. τορδύλιον eine Doldenpfl., aus τόρδυος Dreheisen u. ἡλιός drehe — d. Samen schneckenf. etc.), T. nodosum L., fr. manchotte.
- Torenia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Torenie“ (n. Olaf Toren, Linné's Schüler, Reis. in China, † 1753) Ampel T. asiatica L., T. Fournieri Lind. (edentula) etc.
- Torilis** Ad., Spr. (Umbellifer., V. 2) Borstdolde, Klettenkerbel (v. τορκία bohre? Wtst. d. corruapierte Caucalis!), z. B. infesta Koch u. T. Anthriscus Gm., s. Caucalis etc. Crantz, Jacq.
- Toringo** v. Sieb. (sc. Pirus) L. (Rosac. Pomaceen, XII. 4) japan. Toringo-Apfel (jap. Name d. Pfl.), s. Pirus Sieboldii Reg.
- Tomentilla** L. (Rosac. Potentilleen, XII. 3) Heidegger, Blutwurz, fr. tormentille, e. tormentil u. sept-foil „Siebenblatt“ (v. torment, -inis Bauchgrimmen? tormentum Bauchweh? viell. besser v. tormentum Seil v. torqueo drehe).
- Terminaria** Ser. (zu Pirus s. Sorbus) (Pomaceen, XII. 4) „Kolikbirne“, Elsbeerbaum Rmpl., fr. tormalinal (tormen, -inis Bauchweh — früh. geg. Ruhr), s. Sorbus terminalis Crantz.
- 1) **Torreya** Walk. (Taxaceen, XXII. 12) „Torrey's“-Eibenbaum (n. d. engl. Bot. J. Torrey, s. d. Aut.), T. grandis Walk., taxifolia Arn., T. Myristica Van Houtt. etc. 2) **Torreya** Arn. (Nyctagineen, V. 1), z. B. paniculata Spr. (Bras.). 3) **Torr.** Raf. (Cyperaceen, III. 1), z. B. caespitosa Raf. (Cyperus caesp. Torr.). 4) **Torr.** Spr. (Verbeneen).
 - 1) **Tortula** Hedw. (Moose, XXIV. 2) „Drehzahn“-M. (tortus gedreht — spiral. Zähne d. Peristoms), s. Zygotrichia Brid. u. Barbula Hedw. 2) **Tortula** Roxb. (Verbeneen, XIV. 2), s. Streptium Roxb. Drehkrone.
 - 1) **Tournefortia** L., R. Br. (Boragineen od. Ehretiaceen, V. 1) „Tournefort's“ Heliotrop, fr. pitton od. faux héliotrope (n. d. ber. franz. Bot. J. Pitton de Tournefort, s. d. Aut.), Zier. T. heliotropoides Hook., s. Messerschmidia L. 2) **Tourn.** Ponted. (Rubiaceen).
 - Tourettea** Domb. (-rettia Schreb., W.) (Bignoniaceen, XIV. 2) „Tourettie“ od. klettenartige Dombeya (n. Marc. Ant. Louis Claret de la Tourette, bot. Aut. u. Rousseau's Freund), T. volubilis Schr. s. lappacea W., s. Dombeya lapp. l'Hér.

- 1) **Toxicodendron** T. (sc. *Rhus*) L. (Sumachineen, XXII. 5) m. v. *radicans* L. „Giftbaum“, wurzelnder Gift-Sumach (*τοξικόν* Pfeilgift, *δέρδων* B.). 2) **Toxic.** pinnatum Mill. (Terebinthaceen Amyrideen, VIII. 1) Giftbalsamb Baum, s. *Amyris toxicifera* L. (Elemifera fol. pinn. Hort. Cliff.). 3) **Toxic.** G. (Sapindac.). 4) **Tox.** Thb. (Euphorbiac.).
- Tozzia** Mich. (Serophularin., XIV. 2) Tozzi's- od. Alpen-Hahnenkamm (n. d. Arzt u. Prof. Luc. Tozzi in Neapel, † 1717), *T. alpina* L.
- 1) **Trachēlum** (sc. *Campanula*) L. (Campanulaceen, V. 1) „Halskraut“-Glockenbl., fr. gantélée, gant de Nôtre-Dame u. trachélon, e. throatwort (v. *τραχύπλαστος* Genick). 2) **Trachelium** L. (Campanulaceen, V. 1) „Halskraut“, fr. trachélon u. herbe aux trachées, z. B. Zier. *T. coeruleum* L. m. v. fl. alb. Hort. (Nordafr.), fr. Trachélie bleue.
- Tradescantia** L. (Commelyneen, VI. 1) „Tradescantie“, Blumenschilf, *T. virginica* L. m. v. v. (Ephemerum *T. phalangioides* Moris.), fr. Ephemère d. Virginie, e. virginian spider-wort, Ampelpfl. *T. guianensis* Miq., discolor l'Hér. m. v. varieg. Hort. (Bras.), zebrina Hort. etc. (n. d. Gärtn. Tradescant Vat. u. Sohn, unt. Karl I. v. Engl., Museum Tradesc. 1656).
- Tragacantha** L. (zu *Astragalus* Rchb.) (Legumin. Astragaleen, XVII. 4) „Bocksdorn“-Traganth (v. *τραγός* Bock, *ἄζαρθα* Dorn — Blattstiele dornig, Wst. d. ausfliess. Gummi bockshornförmig!), z. B. *argentea* Mill., *Astr. verus*, *creticus* etc.
- Tragium** Spr. (Umbelliferen, V. 2) „Bocksdolle“ (s. eb. — Bocksgeruch d. Pf.), *T. tauricum* Ledeb.
- Tragopōgon** T., L. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) „Bocksbart“, Haferwurz, fr. barbe de bouc (- de dieu), e. goat-beard (s. eb. u. *πάγων* Bart), z. B. *pratinus* L., fr. vignette, *T. porrifolius* L., fr. salsifis, e. salsify, etc. (— Samenkrone u. Kelchzipfel langhaarig!).
- Tragopýron (-um)** M. B. (Polygonaceen, VIII. 3) „Bockswiezen“ (s. v. u. *πυρός* Weizen — analog *Fagopyrum* Buchweizen), z. B. *grandiflorum* M. B. (Polygonum gr. W.) etc.
- Tragoselínūm** T., Mnch. (Umbelliferen, V. 2) „Bockssilje“, grosse Bibernell (s. v. u. *Selinum*), *T. magnum* Mnch. (Pimpinella m. L.), *T. Angelica* Lam. (Aegopodium Podagraria L.).
- 1) **Tragus** Hall. (Gräser, XXIII. 1) Stachelgras (gr. *τραγός*: Bock u. Spelzgrütze etc.), z. B. *racemosus* Desf. (*Cenchrus r.* L., *Lappago r.* Schreb.). 2) **Tragus** (sc. *Salsola*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) Bocksmelde, i. q. *Salsola Kali* L. gem. Salzkraut.
- Tramētes** (st. *Tremates*) Kumm. (Pilze, XXIV. 4) „Löcherpilz“ (v. *τράμη* i. q. *τρῆμα* od. *τρήμη* Loch), z. B. *pini*, suavélens etc., s. *Polyporus* L.
- Trapa** L. (Halorageen, IV. 1) Wassernuss, Drabe, fr. corniole, écharbot, marron d'eau, e. water-nut (- caltrop) (n. d. franz. trape, lat. calcitræpa Fussangel — Stacheln d. Nussfrucht!), *T. natans* L., s. g. Jesuitenmütze, fr. tribule aquatique. — *Trapaceæ* Rchb.
- Trauensteineria** Rchb. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Trauensteiner's“-O. (n. Jos. Trauensteiner, schr. d. Weiden Tyrols, Innsbr. 1842), *T. globosa* Rchb. (Orchis gl. L.).
- Tremandra** R. Br. (Tiliac. Tremandreen, VIII. 1) „Lochanthere“, Vierkapsel- od. Zellen-Anthere (*τρημα* Bohrloch, *ἀνήρ*, *-δρος* Mann, Staubbeutel — diese springen durch ein Loch auf), s. *Tetrathēca* Sm. — *Tremandræae* R. Br. (zu *Tiliacæae* Rchb.).
- Tremella** Dill. (Pilze, XXIV. 7) „Zitterpilz“, fr. tremelle (v. tremulus zitternd dem. -mellus), z. B. *lutescens* Pers., *Nostoc* L. Schleimling (Nost. commune Vauch.). — *Tremellini* Fr.
- Treviranía** W. (Gesneriaceen, XIV. 2.) „Treviranie“ (n. d. Prof. L. Chr.

- Treviranus in Bonn, s. d. Aut.), Treibh. *T. coccinea* W., s. Cyrilla pulchella l'Hér.
- Trianéa** Karsten (Hydrocharideen, XXII. 8) „Trianie“ (n. Dr. J. Triana, schr. mit Planchon Prodr. Flor. Novo-Granatensis, Paris 1862), Aquarien: *T. bogotensis* Karst.
- Trianthéma** L. (-um Gaudich.) (Portulacaceen, V. 1 od. X. 2) „Dreiblume“ ($\tau\varphi\alpha$ in comp. $\tau\varphi\iota-$ drei, $\ddot{\alpha}r\vartheta\mu\alpha$ Blume — zu drei in d. Achseln!), z. B. *crystallinum* Vahl (Papularia cr. Forsk.), decandrum L. (Zaleya dec. Burm.) etc. — *Trianthemæ* Rchb.
- Trias** Lindl. (Orchid. Malaxideen, XX. 1) „Dreiecksblumen“-O. ($\tau\varphi\iota\dot{\alpha}$; Dreiheit — d. offn. Blumen bilden ein Dreieck), z. B. *oblonga* u. *ovata* Ldl. (Ostind.).
- Tribulus** T., L. (Rutaceen Zygophylleen, X. 1) Burzeldorn, „Dreispitz“ D., fr. tribule od. herse ($\tau\varphi\iota\beta\omega\lambda\sigma$ dreispitzig — d. Fr. m. 3 od. 4 Stacheln!), z. B. Fischeri Kellogg, terrestris L., s. g. Teufelsdorn.
- Trichéra** Schrad. (Dipsaceen, IV. 1) Grindrose ($\tau\varphi\iota-$ drei u. $\chi\dot{\iota}\mu\alpha$ od. -η Wittwe? Wtst. v. $\vartheta\varphi\iota\zeta$, $\tau\varphi\iota\zeta\sigma$ Haar — d. ganze Pfl. haarig), z. B. *arvensis* Schrad. (Scabiosa a. L., Knautia a. Coult.).
- Trichila** (-lia) L. (Hesperiideen Meliaceen, XVI. 5) „Dreilipp“ ($\tau\varphi\iota-$ u. $\chi\dot{\iota}\lambda\sigma$ Lippe od. $\tau\varphi\iota\chi\alpha$ dreifach — Narbe u. Kapsel!), *T. moschata* Sw., „Moschusholz“, alliacea Forst. (Dysoxylon a. Blum.).
- Tricholádus** Pers. (Hamamelideen, XXII. 1) „Haarzweig“-Lorbeer ($\vartheta\varphi\iota\zeta$, $\tau\varphi\iota\zeta\sigma$ Haar, $\chi\dot{\iota}\lambda\delta\sigma$ Ast etc. — weichwoll. Str.), *T. crinitus* Pers., s. g. Stellmacherholzbaum (Str. Cap), s. Dahlia cr. Thb.
- Trichoderma** Pers. (Pilze, XXIV. 4) „Haarhaut“, Deckschimmel Leun. (s. eb. u. $\delta\acute{e}\varphi\mu\alpha$ Haut — d. Sporengehäuse ein Haargeflecht! Wtst.), z. B. *viride* Pers., *varium* Ehrbg. s. laeve Pers.
- Trichodium** Mchx., Schrad. (Gräser, III. 2) Straussgras ($\tau\varphi\iota\chi\dot{\omega}\delta\eta\varsigma$ voller Haare — nämli. d. Blütenstand!), z. B. *caninum* Schrad. = Agrostis can. L.
- Tricholoma** DC. (Pilze, XXIV. 4) Haarsäumling (s. v. u. $\lambda\ddot{\omega}\mu\alpha$ Saum — d. Manschette randständ., flockig), z. B. *equestre* „Ritterschwamm“, *pomona*, *tigrinum* etc. (essb.), s. Agaricus L.
- Trichománes** R. Hedw. (sc. Asplenium) L. (Farne, XXIV. 1) Frauenhaar, Becherfarn D. etc., fr. trichomane, e. tricomanes (trich.-) ($\vartheta\varphi\iota\zeta$, $\tau\varphi\iota\zeta\sigma$ Haar, $\mu\alpha\varrho\sigma\varsigma$ dünn — dünne, zarte Zweige etc., ihres Aussehens wegen geg. d. Ausfallen d. Haare, Plinius), Zier. *T. spicatum* R. Hedw. s. *spiciferum* Desv. (elegans Hook.) (Guin.), s. Feea polypodiina Bory.
- Trichonéma** Ker (Irideen, III. 1) „Haarfaden“-Schwertel (s. v. u. $\nu\ddot{\iota}\mu\alpha$ Faden — lineargeteilte Narbe des fadenf. Griffels), *T. Bulbocodium* Ker, *Columnae* Rchb. (Romulea s. *Ixia* Col. R. u. S.).
- Trichopilia** Lindl. (Orchideen Vandeen, XX. 1) „Haarkappen“-O. (s. v., $\pi\acute{u}\lambda\sigma\sigma$ klein. Filzhut — Antheren mit einer Haarbüschenkappe), z. B. Treibh. *coccinea* Ldl., *suavis* ds., etc.
- Trichosacme** Zucc. (Asclepiadeen, V. 2) „Haarspitze“ (s. v. u. $\dot{\alpha}\chi\mu\eta$ Spitze — bez. d. Nebenkrone!), Treibh. *lanata* Zucc.
- Trichosanthes** L. (Cucurbitaceen, XVI. 1 od. XXI. 9) Haarwimperblume, fr. trichosanthe (s. v. u. $\ddot{\alpha}r\vartheta\eta$ Bl. — wimperig gefranste Kronzipfel), z. B. *anguinea* L. s. *colubrina* Jacq. (Cucumis a. L.).
- Tricocæa** Endl., Kl. der Schneller od. Springfrüchtler Leun. „Dreikornfrüchtler“ ($\tau\varphi\iota-$ u. $\zeta\acute{u}\sigma\sigma\varsigma$ Korn).
- Tricyrtis** Hook., Wall. (Melanthaceen, VI. 3) „Dreihökerlilie“ Rmpl., -blume Vilm. ($\tau\varphi\iota-$ u. $\chi\dot{\iota}\sigma\sigma\varsigma$ bucklig — d. 3 äuss. Blumenblätt. an d. Basis sackhöckerig), Zier. *T. hirta* Hook. (Jap.), fr. Tr. hérissée, e. rugged Tr.

Tridax — Tripinnaria.

- Tridax** L. (Compos. Astereen, XIX. 2) „Dreibiss“, Dreispalt D. (s. v. u. δάξος; Biss v. δάκνω beisse — Strahlbl. dreizahnig), z. B. *procumbens* L. (Aster americ. proc. Houst.), s. *Balbisia elongata* W.
- Tridentea** Haw. (Asclepiad., V. 2) „Dreizahn“-Wachspfl., „Dreizack“ D. (tridens, -tis Dreizahn etc. — bez. d. Zipfel d. auss. corona staminea), z. B. gemmiflora u. moschata Haw.
- Trientalis** Rupp, L. (Primulaceen, VII. 1) Siebenstern, „Dreifaltigkeitsblume“ (schwerl. v. triens, -ntis Drittel, sond. triens „Dreiwesen“ st. trinitas Dreifaltigkeit), T. europaea L.
- 1) **Trifoliastrum** Ser., Mnch. (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Schabziegerkr., blauer Steinklee (deter. v. trifolium, sogl.), T. coeruleum Mnch., s. *Melilotus coer.* Desr. u. *Trigonella L.* 2) **Trifoliastrum** DC., Rchb. (sect. v. *Trifolium L.*), z. B. repens, hybridum etc.
- Trifolium** T., L. (Legum. Loteen Trifolieen, XVII. 4) „Dreiblatt“, Klee, fr. trèfle, e. trefoil u. clover, auch shamrock (tri- drei u. folium Blatt), z. B. wild u. geb. T. pratense L., s. g. deutscher Klee, fr. mignonet od. rougerole (tremone), e. purple-wort (-grass), T. repens L. weisser od. s. g. Stein-Klee (auch als Zier. m. v. purp. s. atro-purp.), fr. triolet, e. white clover od. honey-stalk, T. incarnatum L. „Inkarnatkl.“, Zier. T. aurantiacum Boiss. Schaf- od. Bienenkl., fr. tr. orange, T. rubens L. gross. Ahren-, Fuchs- od. Katzenkl., fr. tr. rouge, m. v. fl. albo Hort., wild T. arvense L. s. lagopus (*Lagopodium Ger.*), s. g. Hasenpfötchen, fr. pied-de-lièvre, e. hare-foot od. trinity-grass, etc. — *Trifoliæe* (sc. *Lotæae*) Rchb.
- Triglochin** L. (Juncaceen, VI. 3) „Dreizack“, Salzbinse Leun., Kröten-gras, fr. trocart (troscart) u. mille-greux, e. toad-flax ($\tau\varphi\iota$ - u. γλω-χίν od. -tis Spitzte — bez. d. Kapsel!).
- Trigonella** L. (Leguminos. Loteen, XVII. 4) Bockshorn-Klee, fr. trigonelle, eig. „Dreieckchen“ (dem. v. trigōnum Dreieck — wegen d. kleinen Kiels wie dreieckige Blüte), T. coerulea DC., s. *Trifoliastrum* c. Mnch. s. *Melilotus coer.* Pers., Schabzieger-Kl., T. foenum graecum L. „griechisches Heu“ (offiz. *Foeni graeci semina*).
- Trillium** Salisb. (Melanthaceen od. Smilaceen, VI. 3) „Dreiblatt“ od. „Dreifaden“ (contrah. aus trifolium od. trilicium, licum Faden od. Trum — überh. dreizähl. Biütenteile), Zier. grandiflorum Sal. (Nordamerika), sessile L. (*Solanum virgin. triphyllum* Pluk.) etc.
- Trinia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Trinie“, Erddolle, Blumenkohldolde, Scherbet O. W. (n. d. russ. Staatsr. Frhrn. v. Trinius, † 1844, s. d. Aut.), T. glauca Dumort. s. vulgaris DC., s. *Pimpinella gl. L.*
- Triodia** P.-B., R. Br. (Gräser, III. 2) (zu *Festuca L.*) „Dreizahngras“, Haarscheide ($\tau\varphi\iota$ u. ὄδοντος Zahn — d. Spitzen d. unt. Kronspelzchen), T. decumbens R. Br. (*Sieglingia* d. Bernh., *Tridens* d. Röm.), s. *Festuca decumbens* L.
- Triōnum** (sc. *Hibiscus*) L. (Malvac., XVI. 8) Stunden-Eibisch (-blume), Wetteröschen Rmpl., fr. fleur changeante od. - d'une heure (von Triōnes, -num Siebengestirn — Wst.: dreiteil. Blätter!), s. *Hibiscus mutabilis* s. *ternatus* Cavend. (*Ketmia Triōnum Scop.*).
- Triostēum** L. (Lonicereen, V. 1) „Dreiknochenkern“, Dreistein D. ($\tau\varphi\iota$ u. ὀστέον Knochen — drei knochenharte Beerenkerne!), z. B. *hirsum* Roxb., *Emodōrum* Spr. s. *himalayanum* Wall. (Nepal, Emodi montes, Himalaya u. δώρον Gabe).
- Triphasia** Lour. (Aurantiaceen, V. 1 od. VI. 1) „Dreifaltigkeits“-Orange ($\tau\varphi\iota\varphi\alpha\iota\omega\iota\sigma$ dreifach — nämli. Blätt., Kelch u. Krone), z. B. *monophylla* DC. (Timor), *aurantiola* Lour. s. *trifolia* DC. (Limonia tr. L.).
- Tripinnaria** Pers. (Gesneriaceen, XIV. 2) Kürbis- od. Calabassenbaum

- D. (tri u. pinna Feder — d. Blätt. dreifach gefiedert), T. africana Spr. (*Crescentia pinnaria* Jacq., *Tanaëcium* Sw. „Langstiell“).
- Triplaris** L. (Polygonaceen, XXII. 8) Ameisenbaum v. Guiana, s. g. „langer John“ Leun. (v. *triplus* dreifach — bez. d. Blütenteile u. dreikant. Frucht), T. americana L. s. *pyramidalis* Jacq.
- Tripleurospermum** Schultz-Bip. (Compos. Anthemid., XIX. 2) „Drei-rippensamen“ ($\pi\lambda\varepsilon\nu\omega\alpha$ Rippe, $\sigma.\pi\acute{\epsilon}\omega\mu\alpha$ Samen), T. inodorum Sch.-Bip., s. *Matricaria inod.* L. (*Chryanthemum in.* L. etc.).
- Tripolium** Dod., Besl. (sc. Aster) L. (Compos. Astereen, XIX. 2) Strandaster (gr. $\tau\omega\pi\omega\lambda\iota\omega\tau$, ob von $\tau\omega\iota\tau\omega\log$ fruchtbar? Wst.: v. $\pi\omega\lambda\varepsilon\omega\omega$ od. $\pi\omega\lambda\epsilon\omega$ wende um — wechselt dreimal d. Farbe!), T. vulgare Besl. = Aster Trip. L. 2) **Trip.** (sc. *Mesembryanthemum*) L. (Crasulaceen, XII. 4) asterblüt. Zaserblume.
- Tripsacum** L. (Gräser, XXI. 3) Löchergras D. (löcher. Spezien!) (v. $\tau\omega\beta\omega$ zerreibe od. mahle — bez. d. Samens zu Mehl? — ungewiss!), z. B. *cylindricum* Mchx., Zier. *monostachyum* Mchx. (Südcarol.), s. *Reanaluxurians*, Teosinte (auch als Futtergr.) (*Euchlaena lux.* Schrad.).
- Trisepala** Bartl. Ord. d. Dreikelchblättrigen (sepala Kelchzipfel).
- Trisetum** Pers. (zu Avēna) Rchb. (Gräser, III. 2) „Dreiborstengras“ (sēta Borste), z. B. *lobatum* Trin. (*Trisetaria l.* Poir.), s. *Reboulia gracilis* Kth.
- Tristania** R. Br. (Myrtaceen, XVIII. 2) Lorbeermyrte (n. d. f. franz. Bot. Jean de Tristan, schr. üb. d. Fl. v. Orleans 1810), z. B. *laurina*, *conferta*, *macrophylla* etc. R. Br. (Neuholl.), s. *Melaleuca L.*
- Triteleia** Hook., Lindl. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Dreifaltigkeitslilie“ ($\tau\acute{\epsilon}\lambda\varepsilon\omega\zeta$ od. - $\lambda\varepsilon\omega\zeta$ vollendet — Blüt. doldig in dreiblättr. Hülle), Zier. *uniflora* Lindl. (Südäm.), *grandiflora* Ldl.
- Triticum** T. (Gräser, III. 2) Weizen, fr. froment, e. wheat (v. $\tau\acute{\epsilon}\tau\omega\zeta$ zerrieben, gemahlen), cult. T. vulgare L. Winter- od. Kolben-W. ($\beta.$ *hibernum* L.), fr. vulgär rascalade, Sommer- od. Bart-W. ($\alpha.$ *aestivum* L.), fr. from. barbu (marsais, marsage), wild T. repens L. Queckengras, fr. chiendent, panic rampant, e. quick-grass etc.
- Tritoma** Ker (Liliaceen, VI. 1) „Dreischnitt“-L., fr. tritome (gr. $\tau\omega\acute{\epsilon}\tau\omega\zeta$ dreimal geschnitt. — bez. d. Narben u. Kapseln), Zier. T. *Uvaria* Gawl. m. v. v., fr. tr. faux Aloës, *Aletris à grappes*, „Traubben“-L. (Südafr.), s. *Veltheimia speciosa* Roth (*Aletris Uvaria L.*, Aloë Uv. L., *Kniphofia aloïdes* Mch.), T. *Burchelli Herb.* (*Tritomantha B. Lk.*), T. *glauca* Hort. m. v. *recurvata* Hort. (Südafr.) etc.
- Tritomantha** Hoffmg., Lk. (Liliaceen, VI. 1), s. *Tritoma* Ker (so eben), T. *media* Lk. (*Aletris sarmentosa* W.).
- Tritonia** Ker (Irideen, III. 1) „Triton's“-Schwertel (v. Triton Wassermolch, mit feuerrotem Bauch — weg. d. Blumenfarbe, Wst. Tubiform d. Blumen, Meergott Triton auf d. Muschel blasend), Zier. T. *auræa* Pappe (*Babiana aur.* Ker), *croceata*, *purpurea* etc.
- Trollius** Gesn., L. (Ranunculac., XIII. 3 od. 7) „Troll“- od. Troddelblume, Kugelranunkel etc., fr. trolle, boule d'or, e. globe-flower (*trollius latinis*. Troddel od. Troll — Blumenform), wild u. Zier. T. *europeus* L. m. v. v., T. *asiaticus* L. m. v. v. etc.
- Tropaeolum** L. (Geraniaceen od. Tropaeoleen, VIII. 1) Kapuzinerkresse, Spornblume, fr. fleur en capuchon (capucine), e. yellow-lark, indian cress (- *nasturtium*) (v. $\tau\omega\acute{\epsilon}\tau\omega\iota\omega\tau$ Trophäe od. Siegeszeichen — Schildform d. Blätt. u. Helm d. Blumen), Zier. T. *majus* L. m. v. v. (z. B. king of the Tom-Thumbs „König der Zwerge“, v. ruby-king etc.), T. *canariense* Hort. Kanarienvogelrebe, T. *minus* L. e. dwarf ind.-cress, m. v. v. (z. B. *coccinea* Hort.), *peregrinum* Jacq. (adunum Sm.), Balkons: T. *Lobbianum* Paxt. m. v. Lily Smith, Spaliere:

Tropperaria — Turrifina.

- T.** pentaphyllum Lam. (Chymocarpus pent. D. Don), tricolōrum Sw. (coccinēum Miers) etc. — Tropaeolēae DC. (zu Geraniacēae) Rchb.
Tropperaria pestifera autt., s. Elodēa canadensis Mchx. „Wasserpest“ (s. Elodēa Rich.).
- Tsuga** Sieb. u. Zucc. (Conifer. Abietineen, XXI. 9) Schierlings- od. Hemlockstanne, e. hemlock-spruce-fir (vaterl. Name), Ts. canadensis Carr. (Abies Tsuga ds., Abies can. Mchx. etc.).
- 1) **Tsutsui** Kämpf. (Ericaceen Rhodorac., X. 1) japan. Rhododendron (Name im Japan u. China). 2) **Tsutsui** G. Don (subgen. v. Azalea L.), z. B. A. amoena Lindl. (Bürgeri Miq.), indica L.
- Tuber** Mich., L. (Pilze, XXIV. 4) Trüffel, fr. truffe, e. truffle od. earth-nut, auch sow-bread „Saubrot“ (tuber Knolle — Knollenform d. Pilzes unter Moos od. Laubabfall).
- Tuberaria** Dun., DC. (sc. Cistus) L. (Cistineen, XIII. 1) Knollen- od. Trüffelcist (s. eb. — Wurzelknollen), T. variabilis Willk. (Cistus guttatus L., Helianthemum gutt. Mill.).
- Tubiflōrae** Endl., Bartl., Ord. od. Kl. d. „Röhrenblütigen“ (tūbus Röhre, florēo blühe).
- Tulbaghia** L. (Amaryllideen, VI. 1) „Tulbagh's“-Lilie (n. d. holländ. Gouv. am Cap, Tulbagh, † 1771), z. B. alliacēa L. (inodōra G.), violacea Harv. (Cap), Heisteri Fabr. (Agapanthus umbellatus l'Hér.).
- Tulipa** T., L. (Liliaceen, VI. 1) „Tulpe“, veralt. „Tulipane“, fr. tulipe, e. tulip (v. tulipan türk. d. Turban, gr. τολύπη, pers. dolbend, dalmat. dulpanit), Zier. T. Gesneriana L. (hortensis Hort., Asien) m. v. v. (z. B. suaveolens Roth s. Duc van Thol, v. turcica Roth, monströse od. Papagei-T.), T. praecox Ten., oculus solis St. Amans, persica W. (patens Ag., sibirica Patrin, tricolor Ledeb., Browniana Hort.), Clusiana DC., fr. T. de l'Ecluse, auch wild T. sylvestris L. (florentina odorata Hort.), fr. Avant-pâques.
- Tulipifera** (sc. Liriodendron) L. (Magnoliaceen, XIII. 6) „Tulpenbaum“, fr. tulipier (s. eb. u. féro trage).
- Tulostōma** Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Schwielenmund“, Stielbohist Kumm. (τύλος Schwiele etc., στόμα Mund — d. Peridium am Scheitel m. offn. Mund), z. B. mammosum Zitzen-St. Kumm., s. Tylostoma Pers.
- Tunica** Scop. (Caryophylleen od. Sileneen, X. 2) Felsennelke, „Frieslein“ O. W. (tunica Hemd — vierblättr. allg. Hülle der Blüten), wild u. Zier. T. Saxifraga Scop. m. v. flore pleno, s. Dianthus u. Gypsophila L.
- Tupa** Sweet, D. Don (Lobeliaceen, V. 1) Chili-Lobelie (Name d. Pfl. in Peru-Chili), z. B. Feuillei, blanda, ignescens etc., s. Lobelia amplexifolia Hortul.
- Tupistra** Ker (Acoraceen od. Liliaceen, VI. 1) „Hammerkalmus“ (v. τύπιστρος Hammer — Blumenform, Wst. Name d. Pfl. auf Amboina), z. B. squalida Ker u. macrostigma Bak.
- Turgenia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Turgenie“, Zwiesel O. W. (nicht etwa v. turgeo schwelle an, sond. v. d. russ. Staatsr. Dr. Alex. Turgeneff in Moskau), T. latifolia Hoffm. (Caucalis l. L.).
- Turpethum** (sc. Convolvulus) L. (Convolvulac., V. 1) „Turbith“-Winde, ostind. Purgierwurzel, fr. turbit, e. turbith od. gut-wort (arab. turbid Wst.), s. Ipomoea Turp. Rchb.
- Turrita** Wallr. (zu Arabis) Rchb. (Crucifer. Siliquos., XV. 2) turmkrautart. Gänsekresse, fr. plateau (turritus m. Turm verseh., getürmt), T. major Wallr. (Arabis Turr. L. s. rugosa Mnch.), s. Turrītis ochroleuca Lam.
- Turritina** Rich. (zu Arabis) Rchb. Turm-Gänsekresse (s. eb.), z. B. auriculata Lam., stricta Huds. etc.

- Turritis** Dill. (Crucifer. Siliquos. XV. 2) Turmkraut, fr. turritte (-rette) (v. turris, -itis Turm — turmart. Habitus d. Pfl.), z. B. glabra L.
Tussilago T., L. (Compos. Eupatorineen od. Tussilagineen, XIX. 2)
 „Hustwurz“, Huflattich, fr. tussilage u. taconnet, auch pas d'âne, e. horse-shoe od. colt's-foot (v. tussis Husten u. ago vertreibe), Zier. T. nivea Vill. (Petasites nivēus Baumg.), fr. t. blanc de neige, Warmh. T. fragrans Vill. (Nardosmia fr. Rchb., T. suaveolens Desf. etc.) s. g. Winterheliotrop, fr. héliotrope d'hiver. — Tussilagineae Less., DC.
- Tweedia** Hook. u. Arn. (Asclepiadeen, V. 2) „Tweedie's“-Wachspfl. (n. John Tweedie, Samml. in Buenos-Ayres), Zier. coerulea Hook. (Buen.-Ayr.) s. Oxypetālum coer. Decsn.
- Tydea** Decsn. (Gesneriaceen, XIV. 2) „Tydeische“ Prachtblume (ob v. Tydeus, Vat. d. Diomedes, Myth.?), z. B. picta Decsn. (Mex.) m. v. v. u. Blendlingen (z. B. ocellata, v. splendidissima u. reticulata, Lindeni, pardina, Blendl. Beelzebuth, compacta, floribunda etc.).
- Tylophora** R. Br. (Asclepiad., V. 2) „Warzenträgerin“ ($\tauύλος$ Warzenhöcker, $\gammaοούς$ tragend — d. Blättchen d. Nebenkrone dick, fleischig), z. B. grandiflora u. barbata Spr. (zu Hoya Spr.).
- Tylostoma** Pers., s. Tulostoma Fr.
- Typha (Tipha)** L. (Typhaceen, XXI. 3) Rohr- od. Teichkolbe, fr. roseau u. masse d'eau (massette), e. reed-club, mace-reed „Keulen“- od. „Kolbenriet“ (gr. $\tauύφη$ Pfl. d. Ausstopfen, od. v. $\tauύφος$ Teich — Standort!), Zier. T. latifolia L., fr. roseau de Passion etc., e. great cat's-tail, T. angustifolia L., fr. m. à feuilles étroites, e. Red-mace, etc. — Typhaceae DC. (zu Aroideae DC.).
- Typhula** Fr. (Pilze, XXIV. 4) Fadenkeulchen Kumm. (dem. v. Typha, Rohrkolbe), z. B. Todēi, filiformis etc.
- Udōra** Nutt. (Hydrocharideen, III. 1) Wasserquirl (v. udor Nässe — Standort), z. B. occidentalis Koch, s. Hydrilla Rich. (Elodea Ad., Martia Spr.), verticillata Casp. etc.
- Uhde** Kth. (Compositen) „Uhde's“ Blattpfl. (n. Kunth's Freunde Uhde ben.), Zierblattpfl. U. pinnatifida u. bipinnatifida Kth. (Mex.).
- Ilex** L. (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) Stachelginster, Gaspeldorn, Hecksame, fr. argousier, e. gorse (-ze), z. B. Zier. europaeus L. m. v. v. (fl. pleno, vernalis u. nanus Hort.) (wie Ilex v. ec od. ac celt. d. Spitz).
- Ulmaria** T. (sc. Spiraea) L. (Rosac. Spirāceen, XII. 4) Ulmen- od. Sumpfspierstaude, s. g. Mehlkraut od. Johanniswedel, fr. ulmaire (-mère) od. ornière, reine des près Wiesenkönigin, e. common meadow-sweet, U. pentapetala Gilib. (Spir. Ulm. L.) u. Filipendula A. Br. (Spir. Fil. L.). — Ulmariae Vent.
- Ulmus** L. (Urticac. Ulmaceen, V. 2) „Ulme“, Ilmenbaum, Rüster, fr. orme od. ipréau, e. elm (d. celt. elm, lat. ulmus), z. B. campestris L. m. v. v. (z. B. suberosa Loud. Korkrüster od. Yper, auch als Art U. suberosa Mnch.), effusa W. Weiss- od. Flatter-R., montana Sm. m. v. v. (z. B. pendula Hort.), americana L., etc.
- Ulva** L., Lmx. (Ulvaceen od. Hautalgen, XXIV. 3) Haut- od. Blasenalge, Ylle, Wassergallert D. (v. d. celt. ul Wasser), z. B. U. lactuca L. Meerlattich od. s. g. Watt, fr. ulve, laitue d'anguille etc., s. Tremella Schreb. — Ulvacēae Ag., Endl.
- Ulvina** Kütz. (Algenpilze, XXIV. 3) Kahm (s. eb.), z. B. aceti Ktz. s. g. Essigmutter.
- Umbellatae** L. „Doldenpflanzen“, fr. ombellées i. q. Umbelliferae Juss., DC., fr. ombellifères (umbella Schirm v. umbra Schatten u. féro führe, trage).

- Umbelliflórae** DC., Leun., Ord. d. „Schirmblütler“ Leun. (s. eb. u. floreo blühe).
- Umbilícus** DC. (Crassulaceen, X. 4) „Nabelkraut“, fr. nombril de Venus, e. Venus-navel-wort (umbilicus Nabel), s. Cotylédon L.
- 1) **Uncaria** Roxb., Schreb. (Rubiaceen, Cinchonac., V. 1) Gambir- od. „Hakenstr.“ (v. uncus Haken — d. alt. Blattstiele hakig), z. B. aculeata u. inermis W., s. Nauclea L. 2) **Unc.** Burch. (Bignoniaceen, XIV. 2) (— hakig gekr. Kapselapplaten!).
- Unědó** (sc. Arbútus) L. (Ericaceen, X. 1) echter Erdbeerbaum, fr. arbou-sier (Plinius v. unus ein u. édo esse — unum tantum édo, Frucht ungesund, Wtst.), s. Arb. serratifolia Lodd.
- Ungnádia** Endl. (Sapindac. Hippocastaneen, VII. 1) „Ungnad's“-Ross-kastanie (n. Chr. Sam. Ungnad, Gesandt Rudolfs II., schr. de Malo Persica, Frankf. a. O.), Treibh. U. speciosa Endl.
- Unifolium** Hall., Gm. (Smilacineen, VI. 1) „Einblatt“, Schattenbl. (unum u. folium), s. Majanthenum bifolium Schmidt (Convallaria bif. L.) (— nur 1 gross. Stengelblatt).
- Unióla** L., Mchx. (Gräser, III. 2) „Einspelz“-Dord, Spitzgras D., Küsten-hafer (v. unus ein — meist nur 1 Staubgef. d. Blüte), Zier. U. latifolia Mchx. (Nordam.).
- Unóna** L., Schreb. (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 6) „Einheitsbaum“, fr. unone (v. uno vereinige — Staubgef. mit d. Stempeln, Wtst. analog Anona), z. B. discreta L., concolor etc., s. Uvaria L.
- Unxía** L. f., W. (Compos. Millerieen, XIX. 4) „Riech“- od. „Pomaden-kraut“ (v. ungo, unxi etc. salbe — riecht stark nach Kampher), z. B. camphorata W. etc., s. Villanova etc. Lag., Spr.
- Urania** Schreb. (Musaceen, VI. 1) „Himmelsbaum“, Reise- od. Wanderb. (Urania, Muse d. Sternkunde, Himmliche — Schönh. d. Gew.'s), U. speciosa W. s. Ravenala madagasc. Sonner.
- Uraria** Desv. (Legumin. Onobrycheen, XVII. 4) „Hasenschwanz“, Hasenfussklee (v. oīqā Schwanz, Wtst. n. d. indisch. Namen!), U. lagopus Desv., s. Lespedezia Nutt.
- Urceóla** Roxb., Rich., Vand. (Apocyneen, V. 1) malay. Krugbaum, ost-ind. Federharzb., Kaoutschukranke (v. urceolus klein. Krug — Form d. Blume), U. elastica L. (Tabernaemontana el. Spr.).
- 1) **Urceolaria** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) Krug-Narzisse (s. eb. — Saum d. Blüte krug- od. glockenförm.), z. B. pendula Herb. (aurēa Endl.). 2) **Ure.** W. (Rubiaceen, V. 1) (— Blüt. krugf.). 3) **Urc.** Feuill. (Bignoniaceen, XIV. 2).
- Urceolina** Rchb. (Amaryllideen, VI. 1) Krug-Narzisse (s. eb.), s. Urceolaria Herb.
- Urēdo** Pers. (Staubpilze, XXIV. 4) Staub- od. Zellenbrand, fr. urède od. bullaire, e. blast od. blight (lat. urēdo v. uro brenne), z. B. segé-tum u. sitophila Pers. Schmier- od. Faulbrand, Kornfäule. — Uredinæae Rchb. „Brandpilze“.
- Uréná** L. (Malvac., XVI. 8) Malabar-Malve, Stachelkopf (malab. Name uren), z. B. sinuata u. lobata L. etc. s. Hibiscus u. Pavonia.
- Urginéa** Steinh. (Liliaceen, VI. 1) „Urginee“, Meerzwiebel (n.-d. Araber-stamm Ben Urgin, Wtst. v. urgeo drücke — d. Sam. zusammengedr., während v. Scilla kuglig), U. marítima St. (Scilla mar. L.).
- Urinaria** (sc. Phyllanthus) L. (Euphorbiaceen, XXI. 3) „Urinkraut“ (Ostind.) (urina Urin od. Harn).
- Uromýces** Lév., Lk. (Brandpilze, XXIV. 4) „Schweifspore“, „Brand-pilz“ (v. oīqā Schwanz, μιρίζει Pilz, od. v. uro brenne — Brand-pilz!), z. B. rubigo Lk. Getreidebrand.
- Uropodium** Lindl. (Orchid. Cypripedieen, XX. 1) (zu Cypripedium L.)

, „Schwanzschuh“ (s. eb. u. πέδιον dem. πέδη Fussfessel, Schuh), Warmh. U. Lindenii Ldl. (Neugran.).

Uropetalum Ker (-ion Burch.) (Liliac., VI. 1) „Schwanzzipfel“-Lilie (zu Lachenalia Spr.) (s. v. u. πέταλον Kronblatt — d. Perigon tief sechsteilig, Staubf. im Schlund, Wstf., U. hyacinthoides Spr. (Scilla hyac. L.), s. Polemannia hyacinthiflora.

1) **Urospermum** Juss., Desf. (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Schwanzsamen“ (s. v., σιρόμα S. — dies. m. lang. Pappus), s. Arctotis L., Tragopogon L. u. Arnopogon W. 2) **Urosp.** Nutt. (Umbellifer., V. 2), U. aromaticum Nutt., s. Spermatura Rchb. (Myrrhis Moris.).

Urtica T., L. (Urticaceen, XXI. 4) „Brenn“-Nessel, fr. ortie, e. nettle (v. uro brenne), z. B. U. urens L. kleine Br. od. Heiternessel, fr. ort, grièche, cult. u. wild dioeca (-oica) L. grosse Nessel, geb. U. nivéa L. s. g. Ramie (Rameum majus Rumph., Boehmeria ramiflora Jacq.), arboréa L. (Boehm. arb. Jacq.), heterophylla (Faserpfl. Süd-ind.'s) etc. — Urticaceae Rchb., -ceae DC., Bartl., -tiae Juss., -cinae Bartl., DC., Ord. d. Nesselgewächse.

Urvillaea H. B. K. (-ea Kth.) (Sapindaceen, VIII. 1) „Urvilee“ (n. d. franz. Seefahr. Capit. Dumont d'Urville, s. d. Aut.), z. B. ulmacéa Kth., s. Koelreuteria triphylla Pers.

Usnéa Dill., Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) Teller-, Wickel- od. Bartflechte (Paxton v. d. arab. achneh), s. Oschnah Avicenna, U. barbata Dill. (Lichen b. L.) etc. — Usneacées Eschw., Rchb.

1) **Usteria** Cav. (Scrophularineen, XIV. 2) Kletter-Usterie, U. scandens Cav. (n. P. Usteri in Zürich, Annal. d. Bot. 1791—95), s. Maurandia semperflörens Jacq. 2) **Ust.** W. (Gentianeen od. Carisseen, V. 1) Usteri's-Enzian. 3) **Ust.** Dennst. (Euphorbiaceen, XXI. 1) Usteri's-Wolfsmilch.

Ustilago Lk. (Staubpilze, XXIV. 4) Flug- od. Staubbrand, fr. nielle (v. ustus verbrannt — Brand auf allerlei Gräs. u. and. Pfl.). — Ustilaginæ Tul., DC. „Brandpilz“.

Utricularia L. (Lentibularien, II. 1) „Wasserschlauch“, -helm, fr. utriculaire, mille-feuille des marais (v. utriculus Schlauch — als Anhängsel an d. Wurzeln), z. B. vulgaris L., major u. minor L., etc., s. Lentibularia maj. Riv. u. Millefolium aq. Lob. — Utriculariæ Seub.

1) **Uvaria** L. (Ranunculac. Annonaceen, XIII. 6) „Trauben“-Flaschenbaum, fr. uvaire (v. uva Traube — traubenständ. Beeren), z. B. guianensis (Aberomoa Aubl., Cananga Juss.), javanica L. (Unona discreta L.) etc. 2) **Uvaria** (sc. Tritoma Ker etc.) (Liliaceen, VI. 1) Traubenlilie, U. longifolia autt., s. Trit. Uv. (Aloë s. Veltheimia Uvaria) (— dicht traub. Blütenstand).

Uvaria L. (Melanthaceen, VI. 1) „Zäpfchenkraut“, Affenblatt, fr. uvulaire „Traubenblume“ Wolff, Kronlilie Perring (v. uvula Zäpfchen — Mittel geg. d. betr. Krankh., Wstf. d. Blüt. als kleine Trauben, dem. uva), Zier. grandiflora Sm. s. lanceolata Ait. etc., s. Streptopus etc.

Vaccaria Med., Bernh. (zu Saponaria L.) Rchb. (Sileneen, X. 2) „Kuhnelke“, -kraut (v. vacca Kuh), V. vulgaris Host., s. Lychnis Vacc. Scop. (Sapon. Vacc. L.).

Vaccinium L. (Siphonandrac. Vaccinieen, VIII. 1) Heidel-, Bick- u. Preisselbeere od. Preissel O. W., fr. airelle, raisin de bois, e. bilberry (blea-), whortle-berry u. whurt (v. vaccinus — d. Kuh betr.? od. st. baccinum v. bacca Beere? — ungewiss), z. B. V. Myrtillus L. gem. Heidelb., fr. myrtle od. airelle, V. vitis Idaea L. Preisselbeere, fr. air. rouge, e. red - bilberry, V. Oxycoccus L. (Schollera

- Ox. Roth) u. macrocarpum Ait. gem. u. amer. Moosbeere (cranberry) etc. — Vacciniæ DC., Rchb.
- 1) **Vahlia** Thb., Schreb. (Lythrareen od. Saxifrageen, V. 2) „Vahlie“ (n. d. ber. Bot. Vahl, s. d. Aut.), z. B. V. capensis Thb. (Russelia cap. L.). 2) **Vahlia** Dahl (Büttneriaeen, V. 1).
- Vaillantia** R. u. S., DC. (Valantia T., L.) (Rubiac. od. Stellaten, XXIII. 1) „Vaillant's“- od. Kreuz-Labkraut (n. d. franz. Bot. Seb. Vaillant, s. d. Aut.), V. Cruciata R. S. (Galium Cr. Scop., V. ciliata Presl).
- Valeriana** L., Neck. (Valerianeeen, III. 1) „Baldrian“, Speerwurz, fr. valériane, e. valerian od. marum u. spear-wort (v. valère kräftig sein? od. latinis. Baldrian, dem Gott Baldur geweihte Pfl. am Hochzeitstag? nicht etwa n. Horat. Valeriani, schr. Cat. pl. horti Firmani 1812), Zier. V. macrosiphon Hort. (Centranthus m. Boiss.) m. v. v., V. Cornucopiae L., V. rubra L. α . m. v. v. (Centranthus ruber DC.) Gartenbaldrian, fr. v. des jardins, e. red valerian, V. angustifolia Mill. s. rubra L. β . (Centr. ang. DC.), V. officinalis L. Wiesen-B., fr. herbe aux chats, e. shop-valerian, V. Phu L. röm. B. od. Theriakwurzel, fr. grande val., e. cut-finger, etc. — Valerianæae DC.
- Valerianella** T., Lois., Bert. (Valerianeeen, III. 1) Rapünzchen, Ackerod. Feldsalat, Nisschen od. Nissel O. W., fr. valerianelle, bourcette, mäche etc., e. rampion (dem. Valeriana, wozu früher geh.), V. olitoria Mnch. (Fedia ol. Mnch., Vahl), s. Valeriana Locusta v. olitoria L.
- Vallisneria** Mich. (Hydrocharideen, XXII. 3) „Vallisnerie“, Schraubenstengel, -lilie (n. d. Prof. Ant. Vallisneri in Paris, † 1730), Aquar. V. spiralis L.
- Vallöta** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Vallot's“-Narzisse (n. d. franz. Bot. Pierre Vallot, schr. Hist. de la bot. en Bourgogne, Dijon 1828), V. purpurea Herb. (Cyrtanthus p. Herb., Amaryllis p. Ait. s. speciosa l'Hér., Crinum spec. L.).
- Valoradia** Hochst. (Plumbagineen, V. 1) „Valorado“-Bleiwurz (n. d. Nam. Valorado? Wtst. abyss. Name), Zier. V. plumbaginoides Hochst. (Plumbago Larpentae).
- Vanda** R. Br. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Vanda“-O., Schleuderstendel Leun. (v. Vanda, dem Sanskrit-Nam. d. urspr. bek. Art. d. Geschlechts), Warmh. scripta Sw. (Cymbidium scr. Sw.), Roxburghii R. Br. (Nordind.). — Vandæa Lindl.
- Vandellia** L. (Scrophularineen, XIV. 2) „Vandellie“ (n. d. Prof. Dom. Vandelli z. Lissabon, s. d. Aut.), z. B. pratensis L. (Matourea pr. Aubl.) etc., s. Hornemannia W. s. Tittmannia ovata Rchb. u. Torenia diffusa.
- Vangueria** Juss. (-guiera Pers.) (Cinchonac. Guettardeen, V. 1) Zwiebelbaum v. Madagascar (aus voavango madagassisch, fr. vanguier), V. edulis Vahl (Vavanga ed. ds.) etc.
- Vanilla** Plum., Sw. (Orchid. Arethuseen, XX. 1) „Vanille“, fr. vanille (-lier), e. vanilla (v. d. span. vaynilla, dem. v. vayna, lat. vagīna Scheide od. Schote — Form d. Frucht), V. aromatica Sw., s. Epidendron Vanilla L.
- 1) **Varēca** autt. (Tange, XXIV. 3) „Vareke“ (v. Varec od. Varech, Nam. d. Seeauswurfs, besond. d. gem. Blasentangs etc.). 2) **Varēca** Roxb. (Violarieen, V. 1) Stachelfrucht, z. B. lanceolata Roxb. etc., s. Hydnocarpus Vahl, etc. 3) **Var.** G. (Passifloreen, XVI. 2) (auf Ceylon wal-vareka), V. zeylanica G.
- Variolaria** Pers., Ach. (Flechten, XXIV. 3) Blattflechte, fr. variolaire (v. variola Pocke od. Blatter — Ähnl. d. Fruchtlager damit).

- Varronia** Jacq., L. (Asperifolien Hydrophylleen, V. 1) „Varronie“, fr. monjoli (n. d. röm. Schriftst. üb. Landbau M. T. Varro, 116—26 v. Chr.), z. B. floribunda Desv. (*Cordia salviaeefolia* H. B. K. s. *Humboldtii* R. u. S.), lineata Jacq. (*Lantana corymbosa* L. f.) etc.
- Vasculares** DC. (sc. Cryptogämae L.) Gefäß-Kryptogamen (v. *vasculum* dem. *vas*, -sis Gefäß).
- Vateria** Rheed., L. (Tiliac. Elaeocarpeen, XI. 1) „Vaterie“, ostind. Copalbaum (n. Abr. Vater, Prof. in Wittenberg, † 1751), V. *indica* L. (*Elaeocarpus copalliferus* Vahl, Retz).
- Vatica** L. (Tiliaceen, XI. 1) „Seher“- od. Prophetenstr. (v. *vates*, -is Weissager etc. — dient in China bei relig. Gebräuchen), V. *chinensis* L.
- Vananthes (-us)** Haw. (Crassulaceen, V. 5) Schriftblume od. „V-Blüte“, s. Grammanthes DC. (d. Buchstaben V u. οὐθη Bl. — Zeichen auf d. Kronblättern).
- Vaucheria** DC. (Ulvaceen, XXIV. 3) „Vaucherie“ (n. d. Prof. u. Pred. J. P. Vaucher in Genf, † 1841), V. *sessilis* Lyngb., s. *Eccoptosperma* Vauch. u. *Conferva* L. — Vaucheriæ Kütz.
- Vella** L. (Cruciferen Siliculosen, XV. 1) Velarkressa (v. *veler*, d. celt. Wort für Kresse), z. B. *annua* L. (*Nasturtium sylvestre* Bauh.) etc. — *Velleae* Rchb.
- Veltheimia** Gled. (Liliaceen, VI. 1) „Veltheimie“ (n. d. Bot. F. A. Graf v. Veltheim, † 1801), Stuben V. *viridiflora* Gled. (*Aletris cap. Murr.*), Gärten: V. *Uvaria* Gled. (*Tritoma Uv. Ker* etc.) etc.
- Venidium** Less., DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) „Aderstengel“-Bärenohr (v. *vena Ader* u. εἰδομαι gleiche), Zier. V. *calendulaceum* Less. (Südafr.) m. v. *multiflorum* Hort., etc.
- 1) **Ventenäta (-tia)** Koel. (zu Avéna L.) Rchb. (Gräser, III. 2) „Venterat's“ Hafergras (n. d. franz. Bot. Ventenat, s. d. Aut.), V. *bromoides* u. *avenacea* Koel. (*Avena tenuis* Mnch. u. *Trisetum striatum* Pers.). 2) **Ventenatia** Sm. (Plumbagineen, XX. 2), s. *Stylium* Sw. 3) **V.** P. Br. (Ternstroemiacreen, XIII. 1). 4) **V.** Cav. (Epacrideen, V. 1), s. *Styphelia* Sm., *Astroloëma* R. Br. u. *Melichrus* R. Br.
- Verātrum** T., L. (Melanthaceen, XXIII. 1) Niesswurz, Germer, fr. varaire od. vératre, e. paddock-pipe (padow-) (v. verare weissagen — Bedeutung d. Niessens!, Paxton: v. vere wirklich u. ater, -trum schwarz — d. Wurzel! — unsicher), Zier. V. *album* L. m. v. *viridiflorum* M. u. K. Brechwurz, fr. élébore blanc, V. *nigrum* L., fr. varaire noir, e. dark-flowered Ver.
- Verbascum** Mnch., L. (Scrophularineen od. Solaneen, V. 1) Wollkraut, Kerze, fr. molène, e. mullein, wool-blade etc. (n. Tournefort st. barbascum v. barba — bärige Staubfäden), z. B. V. *Thapsus* L. Königskerze, fr. bouillon blanc, e. high-taper (torch-weed etc.), Zier. V. *phoenicum* L.
- Verbēna** T., L. (Verbenaceen, XIV. 2) Eisenkraut, fr. verveine, e. vervain od. vervine (Mejer: eig. Ferbena v. ferrum, Wtst. celt. ferfaen v. fer wegführen u. faen Stein — geg. Steinbeschwerden, viell. auch v. verbum Wort, weil man bei ihm schwor — ungewiss!), Zier. V. *trifylla* L. (*Lippia* s. *Aloysia citriodora* Pers.) Citronenstr., V. *hybrida* Hort. m. v. v. (z. B. v. *striata* Hort., fr. verv. italiennes), V. *Aubletia* L. s. *grandiflora* Mchx., *longifolia* Lam., *pulcherrima* Hort. Vilni., *venosa* Gill., *pulchella* Sweet n. v. *Mahonetii* Hort. (*geranifolia* Hort., *tenera* Spr.) etc. — Verbenæae Rchb., -naccae Juss.
- Verbesīna** L. (Compos. Heliantheen od. Anthemideen, XIX. 2) „Verbesine“ (einige Ähnl. m. Verbena), z. B. V. *pennatifida* Cav. (Mex.).
- Vernicia** Lour. (Euphorbiaceen od. Sumachineen, XVI. 4 od. XXII. 5)

- „Firnißsamen“ - Wolfsmilch (v. vernix, -icis Firniß — Öl aus d. Samen!), V. montana Lour., s. Dryandra cordata L. u. Vernix Thb. Vernix Thb. (sc. Rhus) L. (Terebinthaceen Sumachineen, XVI. 4 od. XXII. 5) „Firnißsumach“, fr. vernis (so eben), s. Vernicia montana Lour.
- Vernonia** Schreb. (Compos. Eupatorineen, XIX. 2) „Vernonie“, Wurmkraut, -töter, fr. vernonie (n. d. Bot. u. Reis. in Nordan. W. Vernon), Zier. V. praealta W. u. novaeboracensis W. (Aster gigantēus Hort., Chrysocōma gig. Walt.) etc., s. Acaricida s. Conyza anthelmintica W.
- Veronica** T., L. (Scrophularineen, II. 1) Ehrenpreis, fr. véronique u. thé d'Europe, e. broom-lime od. speed-well (n. Verónica i. e. vera unica sc. virgo od. Wtst. v. γέρω bringe u. νίκη Sieg), wild V. Chamaedrys L. Bathengel, Denk' an mich, Männertreu etc., fr. V. Germandrée etc., e. wild-gamander, bird's-eye etc., Zier. V. Lindleyana Past., V. decussata Ait. s. myrtiformis (eleg. Hstr. m. viel. Blendl.), Treibh. V. hybrida Hort. m. v. blue Gem, Stuben V. speciosa Hook. m. v. rubra, etc. — Veronicæae Benth.
- Verpa** Sw. (Pilze, XXIV. 4) „Fingerpilz“, Eichelschwamm (verpa i. q. Phallus männl. Glied), V. digitaliformis u. conica, s. Phallus conicus Müll.
- Verruearia** Hoffm. (Flechten, XXIV. 3) „Warzenflechte“ (verruca Warze — Form d. Fruchtkörper).
- Verschaffeltia** Herm. Wendl. (Palmen, XXII. 3) „Verschaffelt's-P. (s. d. Aut.), Treibh. V. splendida H. Wendl., melanochaetes Wendl., „schwarzborstige“, etc., s. Regelia Planch. u. Stevensonia H. Wendl.
- Verutina** Cass., DC. (Compos. Centaureen, XIX. 3) grossdornige Flockenblume (v. veru Wurfspiss), s. Centaurēa Verütum L. (Crocodilium Pers.) (— d. Anthodschuppen langdornig!).
- 1) **Vesicaria** Lam. (Crucifer. Siliculosen, XV. 1) „Blasenschötchen“ (v. vesīca Blase), z. B. V. utriculata Lam., s. Alyssum Vesicaria u. utriculatum L. 2) **Vesicaria** L., Pers. (zu Trifolium L.) (Leguminos. Trifolieen, XVII. 4) Blasenkelchklee, z. B. fragiferum L. u. vesiculosum Savi.
- Vesicastrum** Ser. (zu Trifolium L. sect.) (Legumin. Trifolieen, XVII. 4) Blasenkelchklee (s. eb., deter).
- Vestia** W. (Cestraceen od. Solaneen, V. 1) „Vest's“ Hammerstrauch (n. d. Prof. Lor. v. Vest in Grätz, schr. Manuale bot. 1805), V. lycooides W., s. Cantua ligustrifolia Juss. s. foetida Pers.
- 1) **Viborgia** (Wib.-) Roth (Compos. Inuleen, XIX. 2) Kopfkraut (n. d. dän. Bot. Erich Nilsen Viborg, † 1822), V. Acmella Roth s. parviflora H. B. K., s. Galinsoga Rz. Pv. 2) **Viborgia** Mnch. Thb. (Wib.-Thb. u. -quia Orteg.) (Leguminos. Genisteen, XVII. 4) „Wiborg's“ Ginster, Zier. purpurea Mnch. (Cytisus purp. Scop.), austriaca Mnch. (Cytis. aust. L.), s. Crotalaria L.
- Vibrio** Ehrbg. (Vibrionen od. Bakterien) „Zittertierchen“ (v. vibro vibrere od. zittere).
- Viburnum** L. (Caprifoliaceen, V. 3) Schlingstrauch, Schlinge Grck., Schneeballenstr., Mehlbeerstr., fr. viorne, e. snow-ball od. wayfaring-tree „Wanderbaum“ (v. viēo binde, flechte — biesame Zweige — ungewiss!), Zier. V. Opulus L. (lobatum Lam.) m. v. fl. pleno (rosae-florum sterile Hort.), s. Opulus glandulosa Mnch., s. g. Wasserholder, fr. obier d'Europe, e. marsh-elder, V. Lantana L. Mehlbeerstr., V. prunifolium L. (Lentago Dur.) etc., Stuben V. Tinus L. (Laurus T.). — Viburnēae Bartl.
- Vicia** T., L. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Wicke“, fr. vesce, e. vetch od. fitch (celt. gwig, gr. βιζιά od. -ov. Paxton u. Wtst. v. viēo binde od. vincio umwickle — weg. d. Wickelranken). — Viciæae Rchb.

- Vicioides** Mnch. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) Zitterlinse (v. *Vicia* u. *ειδομαι* gleiche), *V. hirsuta* Mnch. (*Vicia* h. Koch, *Ervum* h. L.).
- Victoria** Schomb., Lindl. (Nymphaeaceen, XIII. 1) „*Victoria*“-Wasserlilie (n. d. Königin Victoria v. Grossbrit., geb. 1819), *V. regia* Ldl. s. *regalis* Schomb. (in Guiana „*Irupé*“ Leun.).
- Victorialis** (sc. Allium) L. (Liliac. Asphodeleen, VI. 1) „Sieglauch“, Netzzwiebellauch, Allermannsharnisch (v. *victoria* Sieg — d. Wurzel verleiht Sieg, Talisman, Wtst. häuf. auf d. Berge St. Victoire, Mons Victorialis, in der Provence).
- Vidūa** Coul., DC. (Dipsaceen, IV. 1) „Wittwenblume“ (vidūa v. vidūus leer, d. Wittwe — Wtst. d. Grübchen d. Involucellumröhre fehlen!), Zier. *V. atro-purpurea* Coul., s. *Astrocephalus* s. *Scabiosa* L.
- Vieusseuxia** Lar. (nicht *Viess.-* Dietr.) (Irideen, XX. 2) „*Vieusseux*“ Schwertel (n. M. Vieusseux, Arzt in Genf), z. B. *V. aristata* Lar., *tricuspis* Thb. etc.
- 1) **Villarsia** Vent. (Gentianen, V. 1) Seekanne, Teichenzian, Tauche etc., fr. *Villarsie* (n. d. franz. Bot. Villars, s. d. Aut.), wild u. Zier. *V. Nymphoides* Vent. (Schweykertia N. Gm., Limnanthemum nymphaeoides Lk. etc.), *chilensis* Lodd. etc. 2) **Vill.** Guett. (Compositen).
- Vilmorinia** DC. (Leguminos. Glycineen, XVII. 4) „*Vilmorin's*“ Schamblume (n. d. Bot. Vilmorin, s. d. Aut.), s. *Clitoria multiflora* Sw.
- Vinca** L. (Apocyneen od. Contorten, V. 1) Sinngrün, „*Winke*“ O. W., fr. pervenche (Pervinca Scop.), e. winter-od. ever-green, periwinkle, virginian bower (v. *vinco* besiege — nämnl. d. Winter, od. Wtst. v. *vincio* binde — lange, biegs. Stengel), wild. u. Zier. *V. minor* L. m. v. v., major L. m. v. v., *V. herbacea* W. K., *rosa* L. (Lochera r. Rchb., Catharanthus r. G. Don), e. old-maid, etc.
- Vincetoxicum** Mnch. (sc. Asclepias) L. (Asclepiadeen, V. 2) Hundswürger, Schwalbenwurz, Giftwurzel, fr. asclepiade dompte-venin, e. swallow-wort (v. *vinco* überwinde, τοξικόν Pfeilgift — nämnl. als Gegengift).
- Viniferae** Juss., DC. (sc. Palmae) Weinpalmen (vinum Wein u. féro trage).
- Viola** T., L. (Violarieen, V. 1 od. XIX. 6) „Veilchen“, fr. violette, e. violet, heart's-ease „Herzlust“ (lat. *viola* dem. v. *īov* Veilchen), wild u. Zier. *V. odorata* L. März-V. m. v. v. (z. B. fl. plen. Hort., v. *alba*, v. *semperflorens* Hort. s. *italica* Voigt, v. *praecox* Hort., v. *rossica* (z. B. the Czaar u. Victoria Riesen-V.), V. *tricolor* L. Stiefmütterchen, s. g. Pensée, fr. herbe od. fleur de la Trinité, e. pansy od. paunce, heart's-ease, m. v. *hortensis* Hort. (grandiflora u. perennis Hort.), V. *altaica* Ker s. *pura* Hort., fr. Pensée vivace bleue, V. *canadensis* L., *cornuta* L. Horn-V., *calcarata* L., fr. violette éperonnée, long-spurred-violet „Langsporn“-V., u. a. m. — Violaceae Rchb., -léae ds., -lariéae Endl., DC., Bartl.
- Viorna** (sc. Clematis) L. (Ranunculaceen, XIII. 3) Haargriffel-, „Wegzier“-Waldrebe (N.-Amer.), fr. Clématide Viorne, e. road-ornamenting Cl., purple-climber etc. (v. via Weg u. orno ziere).
- Virgaurea** T., DC. (*Virga-aurēa* T.) (Compos. Astereen, XIX. 2) „Goldrute“, fr. bose od. bosée (virga Rute, aurēus golden), s. *Solidago* *Virga-aurēa* L.
- 1) **Virgilia** Cav., Pers. (Cassieen Cäsarp., X. 1) Gelbholz v. Cumberland (n. d. ält. röm. Dicht. Virgil), *V. lutea* Lam. (Cladrastis tinctoria Raf.) etc., s. *Sophora*, *Podaliria* etc. 2) **Virgilia** l'Hér. (Compos. Astereen, XIX. 2) *Virgil's-Aster*, s. *Aster Amellus* L.
- Viscaria** Riv., Röhl. (sc. Lychnis) L. (Sileneen, X. 2) „Pechnelke“, klebrige Lichtnelke, fr. attrape-mouche u. Bourbonnaise, e. clammy-Lychnis (v. *viscum* Leim — klebr. Stengel), wild u. Zier. *V. vul-*

- garis Röhl. s. purpurēa Wimm. m. v. fl. plen. u. albo Hort., alpīna Fries, oculata Lindl., coeli-rosa v. aspēra Poir., fr. V. à fleurs ocellées, e. oculate rock-Lychnis, etc., s. Lychnis L.
- Viscum** T., L. (Loranthaceen, XXII. 4) Mistel, urspr. Misle Mej., Leim-beere od. Vogelleim, fr. gui od. gillon, e. mistle-toe (mistletoe od. mistle-tow) (viscum gr. γιγάντης Leim, celt. gui od. gwid Strauch).
- Vismia** Vand., Pers. (Hypericaceen, XVIII. 4) Gummistrauch, fr. gomme-gutte od. scammonée jaune (n. d. Lissabonner Kaufm. Visme ben.), V. guianens. Vand. — Vismiæ Chois.
- Visnäga** Lam. (sc. Ammi Rehb., sc. Daucus L.) (Umbellifer., V. 2) „Visnage“, s. g. Zahnstocher, fr. visnage u. herbe aux curements (aux geneives) (Wtst. st. Bisnaga = bis acutum doppelt spitz — zu Zahnstochern), V. daucoides G. (Südeur., Levante).
- 1) **Visnëa** Schreb. (Sapotac. od. Lucumeen, XI. 3) Wagenholzbaum (Wtst.: Ableit. wie Vismia), V. Mocanera W. (Mocanéra canariens. L. f.). 2) **Visnëa** Steud. (Amaryllideen).
- Vitalba** (sc. Clematis) L. (Ranunculaceen Clematideen, XIII. 3) gem. Waldrebe, „Weissrebe“, Teufelszwirn od. Hexenstr., fr. Clématide des haies, viorne des pauvres, e. bend-with, wild Climber (vitis Rebe u. albus weiss).
- Vitellaria** G. (Sapotac. od. Lucumeen, XI. 3) Butterbaum v. Sudan (v. vitellus Eigelb), V. paradoxa G.
- Vitex** L. (Verbenaceen, XIV. 2) Müllen- od. Pfefferstrauch, Mönchs- od. Klosterpfeffer, Keuschlamm (-baum D.), fr. petit-poivre, gatilier etc., e. chaste-lamb-tree (v. viēo biege — d. biegs. Zweige zu Körben etc.), V. agnus-castus L., s. Wallrothia Leucoxylon Roth.
- Viticella** Dill. (sc. Clematis) L. (Ranuncul. Clematid., XIII. 3) violette, blaue od. ital. Waldrebe, fr. vignette od. Clématide viticelle, e. vine-bower - Cl. od. red-flowered lady's-bower (ital. viticella = kleiner Weinstock), Zier. v. coerulæ Sweet u. V. multiplex G. Don.
- Vitis** L. (Vitaceen od. Ampelideen, V. 1) Weinstock, -rebe, fr. vigne, e. vine (v. d. celt. gwid = bester Baum, Paxton, v. viēo binde? — lat. vitis Rebe), V. vinifera L. m. zahlr. v. v. edler W., V. indīca L. (vinifera sylvestris Pluk.), V. cordifolia s. cordata Mchx. (incisa Jacq.), e. heart-shaped vine od. chicken-grape „Hühnchentraube“ (in Amer. frost- od. wintergrape), V. hederacea Ehrh. (Hedera s. Cissus u. Ampelopsis quinquefolia autt.) wilde od. Jungfernrebe, V. arborœa L. s. caroliniana (Frutex scandens Pluk.), V. Labrusca L. Sommerrebe od. nördl. Fuchsrebe, V. rotundifolia Mchx. s. vulpina Torr. u. Gr. südl. Fuchsrebe, V. riparia Mchx. Uferrebe (odoratissima Don) etc. — Vitacæae i. q. Viniferae Rehb. = Sarmentacæae DC. Weinrebengew. Leun.
- Vittadinia** Rich. (Compos. Senecionideen, XIX. 2) „Vittadini's“-Baldgreis (n. Dr. C. Vittadini in Mailand), z. B. Ampel V. triloba Hort. (Neuholl.), s. Erigeron quercifolius A. Gray.
- Voandzeia (-zoua)** P.-Thou. (Cassieen Geoffreen, X. 1) „Voandzoue“ (n. d. madagass. Nam. voandzou geb.), V. s. Glycine subterranea L. unterird. Süssbohne od. Erdnuss.
- Vochysia** Juss., Lam. (-chya Vand.) (Onagreen Vochysiæ., I. 1) pracht-blumig. „Wotschibaum“ Hb. (Nam. in Guiana vochy), V. guianens. Aubl., s. Cucullaria excelsa W. — Vochysiæ DC., -siaceæ Mart. (zu Calycifloræ Bartl.).
- 1) **Vogelia** Hornem., Med. (Crucifer. Nucamentaceen, XV. 2) „Vogelie“ od. „Neslee“ (n. d. ält. Bot. Mart. Vogel, Herausg. v. Jung's Botanophysica 1678), V. paniculata Horn. (Neslea p. Desv.) s. sagittata Bernh.
 - 2) **Vogelia** Gm. (Amarylliid.). 3) **Vog.** Lam. (Plumbagineen).

- Voglēra** Fl. Wett. (Legumin. Genisteen, XVII. 4) „Vogler's“ od. deutscher Ginster (n. ein. Bot. Vogler, s. d. Aut.), V. spinosa Fl. Wett., s. *Genista germanica* L.
- Vohiria** Juss., Pers. (*Voyra* Aubl.) (Gentianeeen, V. 1) „Vohirie“ (guian. Name d. Pfl.), V. coerulea u. rosaea Aubl., s. *Lita coer. u. ros.* W.
- 1) **Volkameria** L., Pers. (Verbenaceen, XIV. 2) „Volkamerie“ (n. d. Stadtrat J. G. Volkamer in Nürnberg, † 1693), Warmh. Stub. V. fragrans Vent. s. *japonica* Jacq., s. *Clerodendron fr. Hortul.* (*Rhododendron villosum* Roth). 2) **Volk.** Burm. (Capparideen). 3) **Volk.** P. Br. (Ericaceen).
- Volvaria** DC. (Pilze, XXIV. 4) „Scheidenpilz“ (v. *volva* Hülle etc. — d. Perithecum in besond. warzig. Hülle).
- Volvox** L. (Protococcaceen od. Urkornalgen) Kugeltierchen, -alge (v. *volvo* wälze), V. globator L.
- Voyra** Aubl. s. *Vohiria* Juss.
- 1) **Vriesea** Hassk. (Scrophularineen, XIV. 2) „Van-Vriese's“-Blume (n. d. Prof. W. Van Vriese in Amsterd., s. d. Aut.). 2) **Vriesia** Lindl. (Bromeliaceen, VI. 1) „Vriesie“, Zier. V. Glazoviana u. *psittacina* Lindl., s. *Tillandsia* etc.
- Vulneraria** Mnch., Lam. (sc. Anthyllis L. u. sect. v. Anth. Rchb.) (Legumin. Anthyllideen, XVII. 4) „Wundklee“, fr. vulneraire, e. wound-wort od. lady's finger (v. *vulnus*, -ēris Wunde), s. *Vuln. rustica* T. m. v. fl. albo, V. tetraphylla L., etc.
- Vulparia** Rchb. (sect. v. *Aconitum* L.) (Ranunculac., XIII. 3) „Fuchstod“-Eisenhut (*vulpes*, -is Fuchs).
- Vulpia** Gm. (Gräser, III. 2) „Fuchsschwinge“, Mäusehafer, fr. *vulpin*, queue de rénard, e. fox-tail (Wtst. n. d. Apoth. Vulpius in Pforzheim, schr. 1786 Spicil. Fl. Stuttgardensis), V. myōrus Gm. u. *sciuroides* Rchb., s. *Festuca* etc.
- Vulvaria** (sc. *Chenopodium*) L. (Chenopodiaceen, V. 2) „Schamkraut“, stinkend. Gänsefuss, fr. vulvaire, Stinkmelde Wolff, s. *Chenopodium olidum* Curt. (vulva Scham od. Gebärmutter).
- Wachendorfia** Burni., L. (Commelyneen, III. 1) „Wachendorfie“ (n. d. holl. Bot. Is. Eb. Wachendorf), Stuben: W. thrysiflora L. u. hissata Thb., etc., s. *Dilatris* u. *Erythrobulbus* Pluk.
- 1) **Wahlenbergia** Schrad. (Campanulaceen, V. 1) Epheu- od. Zwergglocke (n. Wahlenberg, s. d. Aut.), Topf: W. grandiflora Schrad. (*Platycodon* gr. DC., Campan. gr. Jacq.), wild hederacea Rchb. 2) **W.** Blum. (Rubiaceen). 3) **W.** P. Br. (Terebinthaceen).
 - 1) **Waitzia** Wendl. (Compos. Helichryseen, XIX. 2) „Waitz“-Strohblume (n. d. Bot. K. F. Waitz in Altenburg, † 1848), Zier. aurēa Steetz (Neuholl.), s. *Leptorrhynchus aur.* Benth. (*Helichrysum elegans* Hort., Morna el. Hort. s. nitida Ldl.), W. grandiflora Thomps., corymbosa Wendl. m. v. v. 2) **W.** Rchb. (Irideen).
 - 1) **Waldschmidtia** Neck. (Gentianeeen, V. 1) Seekanne, Tauche etc. (n. ein. Bot. Waldschmidt), W. nymphoides Wigg., s. *Limnanthemum*, *Villarsia*, *Schweyertia* etc.
 - 1) **Wallchia** Roxb. (Palmen, VI. 2) „Wallich's“-P. (n. Dr. Nath. Walllich, Insp. d. bot. Gart. zu Calcutta, s. d. Aut.), z. B. *caryotoides* Roxb. (*Harina car.* Ham.). 2) **W.** DC. (Theaceen od. Geraniac. Wallichieen, XVI. 2) „Wallich's“ *Geranium*. — *Wallichiae* sc. *Geraniaceae* Rchb.
- Waltheria** L. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Waltherie“ (n. d. Prof. A. F. Walther in Leipzig, † 1746), z. B. *americana* L. u. *indica* L., s. *Malvinda ulmifolia* Burm., W. *Astropus* Spr. (*Astrop. tomentosa* Spr.).

- Warszewiczella** Van Houtt. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Warszewicz“-O. (n. d. Bot. u. Reis. in Centralamer. 1845/53 Warszewicz, s. d. Aut.), s. Zygopetalum Hook.
- Washingtonia** Winslow (Conif. Cupressineen, XXI. 9) „Washingtonie“, *W. californica* Winsl. = Wellingtonie (n. G. Washington, dem Befreier v. Nord-Amer.), s. Wellingtonia Lindl. s. *Sequoia gigantēa* Endl.
- Watsonia** Ker, Mill. (Irideen, III. 1) „Watson's“-Schwertel (n. d. Lond. Apoth. W. Watson, s. d. Aut.), z. B. *plantaginēa* Ker, *humilis* Mill. etc., s. Gladiōlus etc.
- Weigela** Thb. (-lia Pers.) (Caprifoliaceen, V. 1) „Weigel's“-Rose (n. d. Prof. in Greifswald E. Weigel, s. d. Aut.), Zier. *W. rosēa* Thb. m. v. v. (Diervilla ros. Ldl.), *amabilis* Van Houtt. (Diervilla coraeensis Thb. s. *grandiflōra* Sieb. u. Zucc.) m. v. v., *W. japonīca* Thb. s. *arborēa* Hort.
- Weingärtneria** Bernh. (Gräser, III. 2) Silbergras, Bunke O. W. (n. d. Correct. Weingärtner in Erfurt, s. d. Aut.), *W. canescens* Bernh., s. *Corynephōrus can.* P.-B. (*Aīra can.* L.).
- Weisia** Spr. (Weissia Hedw.) (Moose, XXIV. 2) „Weiss“-M. (n. d. Prof. F. W. Weiss in Götting., s. d. Aut.) — Weisiacēae Schimp.
- Welfia** H. Wendl. (Palmen) „Welfen“-P. (n. d. Dynastie der Welfen ben.), z. B. *W. Georgii* H. Wendl., *regia* ds. (Neugran.).
- 1) **Wellingtonia** Lindl. (Conifer. Cupressineen, XXI. 9) California-Ceder (n. d. Herzog v. Wellington ben.), *W. gigantēa* Ldl. Mammuthskiefer od. californ. Riesentanne, s. *Sequoia gig.* Ldl. (Washingtonia californica Winslow). 2) **W. Meisn.** (Sapindaceen).
- Welwitschia** Rehb. (Gnetaceen, XXI. 9) „Welwitsch's“ Wunderpfl., *W. mirabilis* Rehb. (Westafr.) (n. d. österr. Arzt u. Reis. für Portugal in Südafr. Dr. Franz Welwitsch), s. *Huegelia* Benth.
- Westringia** Sm. (Labiaten, XIV. 1) Zwergrosmarin (n. J. P. Westring, schr. Schwedens Färbeflechten, Norrköping 1805), Warmh. *W. rosmarinifolia* Sm. (*Cunila fruticosa* W.) (Neuholl.).
- Whitavia** Harv. (Hydrophylleen, V. 1) „Whitlaw's“-Wasserblatt (n. ein. eifr. Bot. Whitlaw ben.), Zier. *grandiflōra* Harv. m. v. v. (z. B. *alba* u. *gloxinioides* Hort.) (Californ.).
- Wibelia** Hoppe, Röhl. (nicht **Wiebelia** Fl. Wett.) (Compos. Cichoriac., XIX. 1) „Wibel's“-Pippau (n. d. Arzt etc. Wibel in Wertheim), *W. apargioides* Röhl. u. *graveolens* Fl. Wett. (Barkhausia grav. Rehb.).
- Wiborgia** s. **Viborgia**.
- Wigandia** H. B. K. (Hydroleaceen, V. 1) „Wigand's“-Blattpfl. (n. Joh. Wigand, Bisch. v. Pommesanien 1540—87, schr. üb. preuss. Pflanzen), Zier. *W. caracasana* Kth. s. *macrophylla* Hort. (Neugran.), Vigieri u. urens Kth., s. *Hydrolēa* L.
- Wiggersia** Fl. Wett. (Legumin. Vicieen, XVII. 4) „Wigger's“-Wicke, Zaun- (n. d. Götting. Prof. F. H. Wiggers), *W. sepium* Fl. Wett., s. *Vicia sepium* L.
- 1) **Willemetia** Neck. (Composit. Cichoriaceen, XIX. 1) „Willemet's“-Pippau (n. P. R. Willemet, s. d. Aut.), *W. apargioides* Cass. (*Wibelia* ap. Röhl.) u. *hieracioides* Monn., s. *Crepis*. 2) **W. Märk.**, Gm. (Chenopodiaceen, V. 2) Sand-Willemetie, *W. arenaria* Gm., s. *Kochia ar.* Roth. 3) **W. A. Brong.** (Rhamnaceen, V. 1), *W. africana* A. Brong., s. *Ceanothus* afr. L.
 - 1) **Wintera** L. (Dilleniaceen, XIII. 4) echter Winter-Rindenbaum (n. Capt. Winter, Drake's Begleiter 1578), *W. aromatica* L. (*Drimys Winteri* L. f.), s. *Winterana* ar. Soland. u. *Tasmannia* ar. R. Br. 2) **Winterania** L. (Hesperideen od. Guttiferen, XI. 1) Kaneelzimmet, *W. Canella* L., s. *Can. alba* Murr. (*Winteranus Cortex* d. Offizinen).

Wistaria Nutt. (Leguminos. Glycineen, XVII. 4) „Wistar's“-Süßbohne (n. Casp. Wistar, Prof. in Pennsylvanien, † 1818), Zierkletterstr. W. chinens. DC. (Glycine chin. Sims) m. v. fl. albo Hort., W. frutescens DC. (Glyc. frut. L., Apios fr. Pursh, Anonymus fr. Walt., Thyrsanthus frut. Elliott) s. speciosa Nutt. m. v. v. (z. B. magnifica Fl. d. Serr.).

Witheringia Schreb. l'Hér. (Solaneen od. Polemonieen, V. 1) „Witheringsblume“ (n. d. Arzt u. Bot. Withering, schr. 1776 Flora v. England, s. d. Aut.), W. solanacea l'Hér. u. superba ds. (Cantua splendens Lam.).

1) **Witsenia** L., Schreb. (Irideen, III. 1) „Witsen's“-Schwertlilie (n. d. holl. Liebh. d. Bot. Witsen ben.), W. corymbosa Gawl. (Nivenia cor. Bak.). 2) **Wits.** Thb. (Büttneriaceen, XVI. 2) „Witsen's“-Salatmalve, W. indica Gm., s. Melochia odorata L.

Wittelsbachia Mart. (Ternstroemiac., XVI. 8) Schneckensamen-Baumwollenbaum (n. d. bairischen Dynastie Wittelsbach ben.), W. insignis Mart., s. Cochlospermum hibiscoides Kth. u. Bombax L.

1) **Wolffia** Mich., Hork. (Lemmaceen, II. 1) „Wolff's“ Wasserlinse (n. d. Prof. Kasp. Friedr. Wolff, † 1794), W. Michelii Hork. = Lemna arrhiza L. 2) **Wolfia** Spr. (Apocyneen, V. 1) brasili. Wolfsstrauch, W. brasiliensis Spr. (nach demselben).

Woodsia R. Br., Spr. (Farne, XXIV. 1) „Woods'“-Wimper- od. Schildfarn, Hüllehteller-F. (n. d. engl. Bot. Jos. Woods, s. d. Aut.), W. pubescens Spr., hyperboraea R. Br. etc., s. Ceterach, Acrostichum etc.

Woodwardia Sm. (Farne, XXIV. 1) „Woodward's“-F. (n. d. engl. Bot. Thom. Jenk. Woodward, schr. m. Goodenough üb. engl. Algen), Zier. radicans Sm., caudata Sw. (Doodia c. R. Br.) (Neuholl.).

1) **Wormia** Rottb. (Dilleniaceen, XIII. 5) „Wormius“-Dillenie (n. d. dän. Philos. Olaus Wormius ben.), W. triquétra Roxb. (Dillenia dentata Thb.). 2) **Wormia** Vahl (Myrobalaneen).

Wredowia Eckl. (Irideen, III. 1) „Wredow's“-Schwertel (n. d. Bot. Wredow, schr. ökon.-techn. Flora Mecklenburgs, Lüneburg 1811), z. B. pulchra Eckl. (Cap.).

Wulfenia L., Jacq. (Scrophularineen, II. 1) „Wulfen's“ Hahnenkamm (n. F. X. v. Wulfen, Geistl. u. Prof. in Klagenfurt, † 1805), z. B. carinthiaca Jacq. s. obliqua Wall. (Paederota Wulfenia Lam.).

Wurmbéa Thb., Schreb. (Melanthac., VI. 1) „Van Wurmb's“-Schwarzbuche (n. F. Van Wurmb, Sekr. d. Akad. d. Wiss. zu Batavia), W. campanulata W. (Melanthium Wurmbéum autt.), purpuraea Ait. (Melanth. spicatum Van Houtt.).

Xanthe W., Schreb. (Guttiferen Garcinieen, XI. 1) Gelbwurz, Gelbmilcher D., „Gelbgummistrauch“ ($\xi\alpha\nu\vartheta\delta$; gelb — solcher Saft d. Str.'s), X. parviflora W. (Schlingstr. Guiana), scandens W. (Quapoya sc. Aubl.) etc., s. Clusia micro- u. macrocarpa Spr.

Xanthium T. (Compos. Ambrosiaceen, XXI. 5) Spitzklette, Klettenwurzel, Klisse O. W., fr. gloutron, tignon, plante à jaunir (gr. $\xi\alpha\nu\vartheta\vartheta\sigma$) Kraut z. Gelbfärb'en v. $\xi\alpha\nu\vartheta\sigma$), X. strumarium L. Kropfklette Wolff, fr. lampourde, X. fruticosum L. (Franseria Cav. artemisifolia L., Ambrosia arborescens Mill.).

Xanthoceras Bung. (Sapindaceen, XXIII. 1) „Gelbhorn (s. v. u. $\chi\epsilon\varrho\alpha\varsigma$ Horn — zwisch. d. Kronblätt. 5 gelbe Horndrüsen), z. B. sorbifolia Bung.

Xanthochymus Roxb. (Guttiferen Garcinieen, XIII. 5) Cambodscha-Stalagmit (Cambogia-), eig., „Gelbsaft“ (s. v. u. $\chi\mu\mu\delta$ Saft, „Chy-

- mus“), *X. pictorius* Roxb. Maler-Gummiguttb., *X. ovalifolius* Roxb. (Warmh.).
- Xanthorrhiza** Marsh. (Ranunculaceen, V. 7) „Gelbwurz“ (s. v., ὁλίζα Wurzel — diese gelb u. zum Gelbfärben), geb. u. wild *X. apiiifolia* P. Hér. s. *tinctoria* Woodh. (Str. Nordam.).
- Xanthorrhoea** Sm. (Commelyneen od. Asphodeleen, VI. 1) „Gelbfluss“, Harzaffodil Leun., -lilie D. (s. v., ὁιά od. ὁνή Fluss — gelbes Harz tritt aus), *X. resinosa* Sm., *arboréa* R. Br., s. g. Grasgummibaum, hastilis Sm. etc.
- Xanthosoma** Schott (Aroideen, XXI. 1) „Gelbleib“, -narbe (s. v., σῶμα Leib — d. Narbe m. gelb. Klebmasse überzogen), Zier. *X. sagittifolium* Schott (Arum s. *Caladium* sag. Vent.), pubescens Pöpp., Endl. (Calla od. Calad. pub.).
- Xanthoxylon** L. (-um Kth.) (Zanthox.- H. B. K.) (Terebinthac. Xanthoxyleen, XXII. 12) „Gelbholz“, fr. clavalier, e. tooth-ache-tree, s. g. Zahnwehholz (s. v., ξύλον Holz), *X. fraxinéum* W. s. americanum Mill. (ramiflorum Mehx.) gem. Zahnwehholz (in Amerika prickly-Ash), s. Fagaria Schreb.
- Xenopōma** W. (Scrophularineen od. Labiaten, XIV. 1) „Fremdentrank“, s. g. Königs- od. Mandarinenthee D. (ξέρως fremd, πώμα od. πόμα Trank), *X. obovatum* W. (Str. China).
- Xeranthēnum** T., L. (Compos. Cynarocephaleen, XIX. 2) Strohblume, Spreu-, Papierbl., fr. xeranthème, e. amaranth the everlasting, silver-knap (v. ξηρός trocken, ἄνθευον Blume), Zier. *X. annum* L. Papierbl. Rmpf. m. v. v. (z. B. imperiale, violaceum, atro-purpureum, grandiflorum, flore roseo pleno), *X. inodōrum* Mnch., ornatum Cass., radiatum Lam. etc., s. Eli- s. Helichrysum W.
- Ximenesia (-zia)** Cav. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Ximenesie“, fr. ximénésie (n. d. span. Apoth. Jos. Ximenes, s. d. Aut.), Zier. encelioides Cav. (Mex.), s. Coreopsis u. Simsia R. Br.
- Xiphidium** Löffl., Schreb. (Hämodoraceen od. Commelyneen, III. 1) „Schwertblatt“, Scheidenlilie D., fr. glaivane (ξίφος Schwert, εἰδοματ gleiche — bez. d. Blätter), z. B. floribundum Sw. s. album W. (albidum Lam.), s. *Ixia* Xiphidium Löffl. m. v. coeruleum Aubl.
- Xiphium** Mill. (sc. Iris) L. (Irideen, III. 1) spanische Schwertlilie, fr. u. e. xiphion (ξίφος dem. v. ξίφος Schwert — näm. d. Blätter), s. Xiphium vulgare Hort.
- Xiphophyllum** (sc. Serapias) L. f. (Orchid. Ophrydeen, XX. 1) „Schwertblatt“-O. (ξίφος u. φύλλον), s. *Serapias ensifolia* L. (Cephalanthéra Xiphoph. Rehb. f.).
- Xora** Sw. (Rubiac. Coffeaceen, V. 1) westind. Kaffeestr. (v. ξωρός lauter, rein), *X. americana* Sw., s. *Coffea occidentalis* Jacq. (Tetramerium odoratissimum G.).
- Xylocarpus** Schreb., Kön. (Hesperideen Meliaceen, VIII. 1) „Holzfrucht“-Mannabaum (ξύλον Holz, καρπός Frucht — holzige Kapsel), X. Granatum Kön. „Grenadiellenholz“ (Granatum litoréum Rumph.).
- Xylomēlon (-um)** Sm. (Proteaceen, IV. 1) „Holzapfel“ (s. v., μῆλον lat. mälum Apfel — d. holz. Frucht verkehrt birnförmig), z. B. piriforme Sm. (B. Neuholl.), s. *Hakea* Pers. u. *Banksia* G. pirif. (Conchium pyriforme W.).
- Xylon** T., Mnch. (Malvaceen, XVI. 8) Baumwollenstaude, fr. u. e. xylon (ξύλον Holz u. Baumwolle), s. *Gossypium* L.
- Xylophyllea** L. (Euphorbiaceen, V. 3) „Holzblatt“ (s. v., φύλλον Laub — blattart. verbreit. Holzzweigmasse), *X. arbuscula* W., s. *Phyllanthus speciosus* s. *latifolius* autt.
- Xylopia** L. (Annonaceen, XIII. 6) Bitterholz (*Xylopītron* Pluk.) (st.

ξυλόπτιζον abgekürzt. Paxton, πτιζός bitter — sehr bitt. Holz), *X. glabra* L. u. *muricata* L.

Xylopleurum Spach (zu *Oenothéra* L.) (Onagrarieen, VIII. 1) „Holz-rippe“, Pracht-nachtkerze (s. v., πλευρών Rippe — achtrippige holzige Kapsel), Zier. X. *Nuttallii* Spach, s. *Oenoth. speciosa* Nutt.

Xylostēon Ad. (-stēum T., Mnch.) (sc. *Lonicēra*) L. (Lonicereen, V. 1) Heckenkirsche, Ahl-, Hunds-, Zaunkirsche, „Beinholz“ Vilm. ($\xi\lambda\sigma\tau\epsilon\sigma$ u. $\lambda\sigma\tau\epsilon\sigma$ Knochen — Holz knochenhart), fr. camérisier (lat. Chamaecerāsus), chèvre des buissons od. des haies, e. fly-honey-suckle, bony-wooded-h.-s., s. *Lonicēra vulgaris* Roehl. s. *dumetorum* Mnch. (Chamaecerāsus *Xylostēon* Med.), Zier. X. *cordatum* Mnch. (Lonic. tatarica Lam., Chamaec. tat. Med.), ciliatum Pursh, pyrenaicum T., canadense Duham. (Lonic. coerulea L.) etc.

Xyris L. (Commelyneen Xyrideen, III. 1) „Scheer“- od. Scharfblatt, Degenkraut D., Stinkschwertel Wolff, fr. u. e. *xyris* (v. ξυρός od. -ov Scheermesser — scharfe, schwert-fadenf. Blätter), X. brasiliensis Hort. (Abildgaardia monostachya Vahl, Cyperus m. L.). — Xyridéae Kth.

Xysmalobium R. Br. (Asclepiadeen, V. 2) „Staubhülse“, Schabsel- (v. $\xi\sigma\mu\alpha$ Geschabtes, Mulf u. λόβιον Hülse — d. Frucht mit grob. Staub bestreut), X. *grandiflorum* R. Br. etc. (Cap), s. Asclepias.

Yucca L. (Liliaceen, VI. 1) Palmililie, Bajonettblume Leun., Schilf-Aloe, Brotwurzel etc., e. Adam's-needle (vaterl. Name d. Pfl.), Zier. Y. *aloifolia* L. m. v. *variegata* Hort., *gloriosa* L. (Faserpfl. Südind.'s), *recurvata* Haw. (recurvifolia Salisb.), *pendula* Carr. (reflexa Hort.), *filamentosa* L. (concreta Hort.) s. g. Seidegras, e. silk-grass, flaccida Carr. (glaucescens Haw.) etc.

Yulan Desf. (sc. Magnolia) (Magnolieen, XIII. 6) schönste od. Lilien-Magnolie (chines. Name yu-lan „Lilie“), s. *Magnolia conspicua* Salisb. (Gwillimia Yulan Rottl.).

Zabāla umbraculifēra Hort. (Palmen, VI. 1) Schirm- od. Zwerg-P. (vaterl. sabal), s. *Corypha minor* Lam. (Rhapis acaulis W. etc.) u. Sabal Ad.

Zacintha (bess. $\gamma\eta\theta\alpha$) T. (Compos. Cichoriaceen, XIX. 1) Zakynthos-Rainkohl (v. $\bar{Z}\acute{a}v\bar{u}\bar{r}\bar{\theta}\bar{o}\bar{s}$ Insel Zante, eine d. jonisch. Inseln), Z. verrucosa G. Warzenkraut Wolff, s. *Lapsana Zac.* L.

Zamia L. (Cycadeen, XXII. 12) Zapfenfarn, -palme, Keulen- D. (v. $\zeta\alpha\mu\alpha$ Schaden, Plin. nennt so gewisse Tannenzapfen, die auf d. Baum selbst verderben, Wst.), z. B. *cycadifolia* Jacq., Z. *furfuracea* Ait. (Palmifolia Ehret.) etc., s. *Zaluzania u. Bertiera*.

Zannichellia L. (Fluvialien od. Potamogeen, XXI. 1) Fadenblatt, Flutstengel, Halde O. W. (n. Hieron. Zannichelli, Apoth. zu Venedig, † 1729).

Zantedeschia Spr. (Aroideen, XX. 9) s. g. Calla (n. d. ital. Bot. Franc. Zantedeschi, schr. üb. Pfl. um Brescia etc., 1824), Zierpfl. Z. *aethiopica* Spr. = Richardia Kth. s. Calla aeth. L.

Zanthorrhīza s. *Xanth.-*; **Zanthoxylon** s. *Xanth.-*

Zapponia Scop. (Verbeneen, XIV. 2) „Zappa“-Verbene (n. d. ital. Bot. P. A. Zappa, Vorst. d. bot. Gartens z. Pavia), Z. *mexicana* Lam. (Priva m. Pers., Blaria m. G.) etc., s. *Lippia u. Verbena*.

Zasmidium Fr. (Pilze, XXIV. 4) „Krempelwollen“-P. (v. $\xi\alpha\mu\alpha$ od. $\xi\delta\mu\alpha$ Krempelwolle, $\varepsilon\iota\delta\mu\alpha$ gleiche).

Zauschneria Presl (Onagrarieen, VIII. 1) „Zauschner's“ Nachtkerze (n. d. Prof. Zauschner in Prag, † 1799), Z. *californica* Presl.

Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- Zěa** L. (Gramineen Olyreen, XXI. 3) Mays od. Welschkorn (gr. ζέα od. ζέα ein Getreide), Z. Mays L., fr. mais, millet gros, e. maize, indian u. turkey-corn, Zier. v. fol. vittatis Hort. „Bandmays“, fr. m. à feuilles rubanées, e. striped-leaved Japan Maize.
- Zedoaria** (sc. Curcūma) Rosc. (Scitamineen, I. 1) Zittwer-Curcume, fr. zédoaire (v. d. arab. djetuar), Z. officinalis u. rotunda Offiz., s. Curcuma aromatica Salisb.
- Zenobia** D. Don (Ericaceen, X. 1) Zenobia-Torfheide, s. g. Gränke Grek. (Ζηνοβία Königin v. Palmyra, in Fesseln beim Triumphzug in Rom, wie Andromeda in Fesseln lag), Z. speciosa Don, s. Andromeda cassinaefolia Vent. s. speciosa Mchx.
- Zeocerithon** (nicht -ton) P.-B. (sc. Hordēum) L. (Getreide, III. 2) Bartod. Reisgerste, fr. rizone d'Allemagne, e. sprat-barley (v. ζέα Getreide u. ζωγή Gerste), Z. commune P.-B. u. secalinum P.-B. (Hordēum capense s. pratense autt.).
- Zephýra** D. Don (Liliaceen, VI. 1) Zephyrlilie (ζεφύρος Westwind — schön azurbl. duft. Bl.), Z. elegans Don.
- Zephyranthes** Herb. (Amaryllideen, VI. 1) „Zephyrblume“ (s. eb. u. ζεφύρη — schöne, duft. Bl.), z. B. grandiflora Ldl. etc.
- Zerumbet** autt. (Cannaceen, I. 1) wild. od. Block-Ingwer (vaterl.), Z. specios., s. Amomum Zer. L., s. Renealmia nutans R. Br.
- Zeugites** Schreb. (sc. Aplūda) L. (Gräser, XXI. 3 od. XXIII. 1) „Ehe“-od. Zwittergras (ζευγίτης angejocht — jed. Ährchen 1 sitz. ♀ u. 2 gestielte ♂ Blüten!), Z. americana Schr.
- Zichyá** v. Hüb. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) „Zichy's“-Bohne (n. d. österr. Gräfin Molly Zichy, Liebh. d. Bot.), z. B. tricolor u. villosa Ldl. etc., s. Kennedya.
- Zieria** Sm. (Rutac. Diosmeen, IV. 2) „Zier'sstr.“ (n. d. poln. Bot. J. Zier, schr. mit Dickson Cryptogamia etc.), z. B. Smithii Andr. s. lanceol. R. Br., etc., s. Boronia Sm.
- Zilla** Forsk. (Crucifer. Lomentaceen, XV. 2) „Zille“ (arab. Name), z. B. myagroides Forsk., s. Bunias aegyptiaca s. spinosa L. (Myagrini spin. Lam. etc.). — Zillæae Rchb.
- Zingiber** G. (Scitamineen, I. 1) „Ingwer“, fr. gingembre, e. ginger (ind. gingi, Wurz v. Zindschi, westl. v. Pondichery), Z. officinale Rosc. — Zingiberacæae DC.
- Zinnia** L. (Compos. Anthemideen, XIX. 2) „Zinnie“ (n. d. Prof. J. G. Zinn in Göttingen), Zier. Z. elegans Jacq. m. v. v. (z. B. nana fl. pl. etc.), Haageana Reg. (auréa Hort.) m. v. v., s. Sanvitalia mexic. Hort., Z. multiflora L. (hybrida Sims.) m. v. v. etc.
- Zizania** L. (-ium G. Fr.) (Maisgräser, XXI. 6) Wasserreis, -kappengras D. (gr. ζιζάνιον i. q. Lolium Lolch), Z. aquatica L., fr. risave, s. Hydropýrum esculentum Lk.
- Ziziphora** L. (Labiaten, II. 1 od. XIV. 1) „Zizikraut“ D., „Flausträgerin“ (zizi d. Indier, gr. ζιζυψ od. σισυψ Vliess, φροῦρος tragend), z. B. capitata L. (Clinopodium fistulosum Pluk.).
- Zizýphus** T., L. (Rhamnaceen, V. 1) Jubbenbaum, Judendorf, Brustbeerenstr. Rmpl. (phōniz. zizuf, gr. ζιζυφος lat. jujuba), Z. Jujuba W. Dornkirsche, fr. pomme d'Inde, Z. spina Christi W. (Oenoplia spinosa Bauh.) etc., s. Rhamnus Ziz. L. (Jujuba aculeata Burm.).
- Zoophthalmum** P. Br., DC. (Legum. Phaseoleen, XVII. 4) Tierauge (ζῶον Tier, ὄφθαλμος Auge etc. — kreisr. Samen m. linear. Nabel umgürzt.), Z. urens DC. (Dolichos. s. Strizolobium ur. Adans.).
- Zostera** L. (Potamogeen, XX. 9) „Wasserriemen“, Wier. O. W., fr. atomère (v. ζωτήρ, -ηρος Gurtel — Form d. Blätter), Z. marina u. oceanica L. s. g. Seegras, fr. foin de mer, e. ore-weed, slank etc., s. Kernéra ocean. W. u. Phycagrostis major Caulini autt. „Tanggras“.

- Zozimia** Hoffm. (Umbelliferen, V. 2) „Zozima's“-Dolde (n. d. Gebrüd. Zozima, Herausg. gr. Classiker), Z. orient. H. s. *absinthifolia* DC.
- 1) **Zuccagnia** Thb., Réd. (Liliaceen, VI. 1) Zipfelblatt-Lilie (n. d. ital. Bot. Att. Zuccagni in Florenz), Z. *viridis* Thb., s. *Uropetalon vir.* Ker (Lachenalia v. Thb. etc.). 2) **Zucc.** Pers. (Cäsalpinieen, X. 1). **Zuccarinia** Blum., Spr. (Rubiaceen, Cinchonaceen, V. 1), z. B. *macrophylla* Blum., ornata Spr. (Jackia orn. Wall.) (B. Malacc.) (s. d. Aut.).
 - 1) **Zygia** P. Br., Juss. (Mimoseen, XXIII. 1) „Joch“-Mimose (*Ζυγία* Ζοχ — verwachs. Staubgef. etc.), s. *Inga marginata* W. 2) **Zygia** G. Fr. (i. q. Acer — jochart. Flügelfrüchte).
 - 1) **Zygodon** Hiern (g. n.) (Rubiaceen, V. 1) „Jochzahn“, Doppelzahn.
 2) **Zygod.** Hook. (Moose) Paarzahn-M. (s. eb. u. *δδων* Z.).
 - Zygotelatum** Hook. (Orchid. Vandeen, XX. 1) „Jochkronblatt“ (s. v., *τέταλον* — Perigonbl. u. Fuss d. Columna verw.), z. B. *crinitum* Lodd. (Mackai Hook., Südam.), s. *Odontoglossum* u. *Eulophia* R. Br.
 - Zygodon** L. (Sapindac. od. Rutaceen, X. 1) „Jochblatt“, Bohnenkapper D., z. B. *Z. Fabago* L. (Capparis Fab. Dod.), *coccineum* L. s. *desertorum* Forsk. etc. (*φύλλον* Laub — d. Blätter jochart. gegenüber).
-

Übersicht der nicht näher ausgeführten Synonyme des Buches.

- | | |
|---|--|
| Aberemoa Aubl. s. <i>Cananga</i> Rumph. u. <i>Uvaria</i> L. | Aeschynomene DC. s. <i>Daubentonnia</i> DC. |
| Acanthospöra Spr. s. <i>Gunnera</i> manic. L. | Aeschynomene Cav. s. <i>Piscidia</i> L. |
| Acaricida W. s. <i>Vernonia</i> Schreb. | Aethionia D. Don s. <i>Schmidtia</i> Mnch. |
| Aceranthus Morr. s. <i>Epimedium</i> L. | Akeesia Tuss. s. <i>Blighia</i> Kön. |
| Acia Schreb. (<i>Acioa</i> Aubl.) s. <i>Dulacia</i> Neck. | Albertia Rich. s. <i>Genipella</i> Rich. |
| Acia W. s. <i>Couepia</i> Aubl. | Alicastrum P. Br. s. <i>Brosimum</i> Schreb. |
| Acaianthēra Scheidw. s. <i>Centranthēra</i> Scheidw. | Alismorchis A. Rich. s. <i>Centrosia</i> Rich. |
| Aerodryon Spr. s. <i>Cephalanthus</i> L. | Alphitomorpha Wallr. s. <i>Erysibe</i> Rebent. |
| Actinella Pursh s. <i>Helenium lanatum</i> Spr. | Amica nocturna Rumph. s. <i>Polianthes</i> L. |
| Actinodaphne Nees s. <i>Litsaea</i> Lam. | Ammannia L. s. <i>Cornelia</i> vertic. Andr. u. Ludwigia L. |
| Actinophyllum R. S. s. <i>Sciadophyl-lum</i> P. Br. | Ambora Juss. s. <i>Mithridatea</i> Comm. Ambora St. Vinc. s. <i>Monimia</i> P.-Thou. |
| Aculeosa Pluk. s. <i>Roëlla</i> L. | Ambulia Lam. s. <i>Lindernia</i> All. |
| Adhatoda Herm. s. <i>Justicia</i> Adh. L. | Amphinomia DC. s. <i>Connarus</i> L. |
| Adamsia W. s. <i>Puschkinia</i> Adams | Anadophyllum Catesb. s. <i>Podophyl-lum</i> L. |
| Adamsia Fisch. s. <i>Gœum</i> L. | Anchieta St. Hil. s. <i>Noisettia</i> H. B. K. |
| Adenōtus Lour. s. <i>Elaeocarpus</i> L. | Andrachne L. s. <i>Cluytia</i> Ait. |
| Adyseton (-um) Adans. s. <i>Koniga</i> R. Br. | Angioptēris Hoffm. s. <i>Clementea</i> DC. |
| Aegiceras G. s. <i>Rhizophora</i> L. | Angostura R. S. s. <i>Galipéa</i> Aubl. |
| Aegiphila W. s. <i>Knoxia</i> L. | Anguillaria R. Br. s. <i>Pleea</i> Rich. |
| Aegoceratos Raj. s. <i>Hugonia</i> L. | Angularia R. Br. s. <i>Melanthium</i> L. |
| Aegopōgon Hb. s. <i>Chrysurus</i> P.-B. | |
| Aerua (-va) Juss. s. <i>Iresine</i> Spr. | |

Anisophyllum Forsk. s. *Boerhavia*
Vahl
Anneslea Andr. s. *Euryale* Salisb.
Anogeissus Wall. s. *Leiocarpus* DC.
Anonis Mart. s. *Podaliria* Dietr.
Anonýma Mer. s. *Costus* arab. L.
Anonýmus Walt. s. *Liátrisodorat*.W.
Anonýmus Pluk. s. *Spermacoce* L.
Anredéra Juss. s. *Basella* L.
Antirrhoea Gm. s. *Cunninghamia*
Schreb.
Antrophýum Kaulf. s. *Hemionitis* L.
Apama Lam. s. *Bragantia* Pers.
Aplopappus DC. s. *Leucopsis* DC.
Aquilicia Cav. s. *Leea* Blum.
Argolasia Pursh s. *Conostylis* Pursh
Argolasia Juss. s. *Lanaria* Ait.
Arthrostemma Pav. s. *Monochae-*
tum DC.
Asaphes Spr. s. *Morina* L.
Asjogam Rheed. s. *Jonesia* Roxb.
Asperella Hb. s. *Elýmus* L.
Asteriscus Mnch. s. *Nauplius* Cass.
Astrolöma R. Br. s. *Ventenatia* Cav.
Astrópus Spr. s. *Waltheria* L.
Atrodaetýlis Forst. s. *Pandanus* L.f.
Aubletia G. s. *Mangium* Rumph.
Avicennia L. s. *Mangle* Sloan.
Azorella Cav. s. *Bolax* Comm.

Bactyrilobium W. s. *Cassia* L.
Baeckeia L. s. *Cedrela* Lour.
Balbisia W. s. *Tridax* L.
Balsaméa Gled. s. *Opobalsánum* L.
Banara Aubl. s. *Boca* Fl. Flum.
Banava Camell. s. *Münchhausia* L.
Bandura Burm. s. *Nepenthes* L.
Bardána Fenzl. s. *Cucurbíta* dipsa-
cæa Ehrbg.
Barnadesia L. f. s. *Diacantha* Lag
Batis Jacq. s. *Bucephalon* Plum.
Baumgartenia Spr. s. *Borya* R. Br.
Benthamidia Spach s. *Cornus* L.
Bergéra L. s. *Murraea* L.
Bergéra L. f. s. *Papaya* T.
Berkheya W. s. *Cullumia* R. Br.
Bertiera aut. s. *Zamia* L.
Biglandularia Seem. s. *Rosanowia*
Reg.
Blackwellia Comm. s. *Homalium*
Jacq.
Bombonaxa s. *Carlodovica* Rz. Pv.
Bonducella L. s. *Bonduc* Plum.
Bon-hopas Ostind. s. *Mithridatea*
tox. Dietr.
Borbonia autt. s. *Liparia* L.
Brasenia Pursh s. *Hydropeltis* Mchx.

Buccaferrěa Mich. s. *Ruppia* L.
Bunchosia DC. s. *Malpighia* L.
Buphané Herb. s. *Brunswigia* Heist.
Bupleurifolia Pluk. s. *Corymbium* L.
Burtonia R. Br. s. *Gompholobium*
Sm.
Byrsoníma DC. s. *Malpighia* L.

Cahuchu W. s. *Castillóa* Cerv.
Calamaria Dill. s. *Isoëtes* L.
Calomeria Vent. s. *Humea* Sm.
Calorophus autt. s. *Restio* L.
Calydermos Rz. Pv. s. *Nicandra* Ad.
Camptospermum Spr. s. *Fusispo-*
rium Lk.
Candalia aut. s. *Coccocypselus* P. Br.
Canthium Lamb. s. *Plocáma* Ait.
Capimoga Aubl. s. *Homalium* Jacq.
Carpopógon Roxb. s. *Mucuna* Aubl.
Cartesia Cav. s. *Stokesia* l'Hér.
Cassipourea Aubl. s. *Legnótis* Sw.
Castanea peruv. Clus. s. *Rhizobó-*
lus G.
Castoréa Plum. s. *Duranta* L.
Catesbaea Lam. s. *Scolosanthus*
Vahl
Cenomyce Ach. s. *Baeomyce* Pers.
Centella L. s. *Hydrocotyle* L.
Cephalocerásus Pfeiff. s. *Piloceréus*
Lem.
Ceratospermum Pers. s. *Diötis*
Schreb.
Chænanthéra Rich. s. *Charianthus*
Don
Chaixia Lap. s. *Ramondia* Rich.
Chaleas Lour. s. *Murraya* L.
Chamaejasme Pluk. s. *Houstonia* L.
Chamaelédon Lk. s. *Loiseleuria*
Desv.
Chamaerépes Spr. s. *Chamorchis*
Rich.
Chamaerrhododendron Duham. s.
Rhodora L.
Chamaerrhôdos Don s. *Sibbaldia* L.
Chamira Thb. s. *Heliophila* L. f.
Chimatobia Mey. s. *Monëses* Salisb.
Chondrodendron R. P. s. *Meni-*
spermum L.
Chorisma Lindl. s. *Jenkinsonia*
Sweet
Chorispora DC. s. *Diptychocarpus*
Reg.
Chrysangia Lk. s. *Musschia* Don.
Chuquiraga Juss. s. *Johannia* W.
Chymocarpus D. Don s. *Tropaeo-*
lum L.

Cichlanthus Blum. s. *Dendrophthoe* Blum.
Cipadessa Blum. s. *Lansium* Rumph.
Cipura Aubl. s. *Marica* Schreb.
Coa scandens Plum. s. *Hippocratea* L.
Cochliopetalum Bew. s. *Pitcairnea* l'Hér.
Codium Ag. s. *Lamarcia* Olivier
Cola Bauh. s. *Sterculia* L.
Collomioides DC. s. *Hügelia* Benth.
Colobium Roth s. *Thrinacia* Roth
Colyris Vahl s. *Dischidia* R. Br.
Conchium Sm. s. *Hackea* Wendl.
Conchium W. s. *Xylomelon* Sm.
Coniandra Schrad. s. *Rhynchoscarpa* Schrad.
Conobea Spr. s. *Collinsia* Nutt.
Coutoupiata Aubl. s. *Lecythis* W.
Crantzia Lag. s. *Moricandia* DC.
Critonia P. Br. s. *Kuhnbia* L. f.
Cryphiospermum P.-B. s. *Caesulia* Roxb.
Cryptospermum Pers. s. *Opercularia* Rich.
Cryptostomum W. s. *Moutabaea* Aubl.
Ctenium Spr. s. *Chloris* Sw.
Cuciferá Pers. s. *Hyphaena* G.
Cueurbitifera Pluk. s. *Marmelos* L.
Cusparia St. Hil. s. *Galipea* Aubl.
Cybelion Spr. s. *Jonopsis* Hb. Kth.
Cyclophorus Desv. s. *Niphobolus* Kaulf.
Cymbachne W. s. *Rottboella* L.
Cynorrhinechium Pluk. s. *Penstemon* Ait.

Daltonia Spr. s. *Neckera* Hedw.
Danaës Balf. f. s. *Paederia* L.
Debraea R. S. s. *Ditmaria* Spr.
Decadiantha Rehb. s. *Hügelia* R. Br.
Decleuxia Schldl. s. *Knoxia* L.
Delilia Spr. s. *Milleria* L.
Dens leonis Pluk. s. *Hyoséris* L.
Desvauxia R. Br. s. *Centrolépis* Lab.
Diascia DC. s. *Hemiméris* L.
Diastella Salisb. s. *Leucospermum* R. Br.
Dichelostemma Sm. s. *Brodiae* Sm.
Dieliptera Juss. s. *Hygrophila* R. Br.
Diconangia Mitch. s. *Itéa* L.
Didymocarpus W. s. *Streptocarpus* Lindl. u. *Klugia* Endl.
Diphýes Blum. s. *Bolbophyllum* P.-Thou.

Douma Duham. s. *Hyphaena* G.
Dracaenopsis DC. s. *Dracaena* australis autt.
Dracophyllum Lab. s. *Epaeris* Forst.
Drakena Clus. s. *Dorstenia* L.
Drepania Juss. s. *Tolpis* G.
Dryobalanus G. f. s. *Dryobalanops* G. f.
Duabanga Kurz s. *Lagerstroemia* L.
Dufouria Sommerf. s. *Sphaerocephalon* Pers.

Eccoptosperma Vauch. s. *Vauchia* DC.
Echinoïdes Riv. s. *Lycopsis* L.
Echinolýtrum Desv. s. *Dichostylis* P.-B.
Edechia Löfl. s. *Laugieria* Spr.
Elaeodendron DC. s. *Crocoxylon* Eckl.
Elýna Schrad. s. *Kobresia* W.
Emelia Retz. s. *Salvadöra* L.
Enargea Schreb. s. *Callixene* Juss.
Encelia Kth. s. *Pallasia* Ait.
Endoptéra DC. s. *Nemauchenies* Cass.
Engelmannia Pfeiff. s. *Cuscutina* Pfeiff.
Enneapōgon Desv. s. *Pappophorum* Schreb.
Erigonium Mchx. s. *Chrysosplenium* Walt.
Erisma Rudg. s. *Ditmaria* Spr.
Erythrobulbus Pluk. s. *Wachendorfia* L.
Erythrodānum P.-Thou. s. *Nertēra* Soland.
Erythropálum Blum. s. *Mackaya* Arn.
Esenbeckia St. Hil. s. *Evodia* Forst.
Euchrōma Nutt. s. *Castilleja* Mut.
Eulophia R. Br. s. *Zygopetalum* Hook.
Eumorpha DC. s. *Calliopsis* Sweet
Euphorbia DC. s. *Nephelium* L.
Euosmia Hb. Bpl. s. *Euosma* W.

Fagotriticum Act. Stockh. s. *Fagopyrum* T.
Favonium G. s. *Didelta* l'Hér.
Feea Bory s. *Trichomanes* L.
Fernandezia Lodd. s. *Lockhartia* Hook.
Fernandezia Rz. Pv. s. *Dichaea* Lindl.

Fernelia Comm. s. *Coccocypselum*
P. Br.
Fisakaki Kämpf. s. *Eurya* Thb.
Fischeria G. Don s. *Codonopsis*
Wall.
Fissilia Lam. s. *Olax* L.
Fissurina Fée s. *Graphis* Ach.
Flabellaria Cav. s. *Hiraea* Jacq.
Flaveria Juss. s. *Milleria* Contra-
yerva L.
Flaveria Lag. s. *Nauenburgia* W.
Flemingia Roxb. s. *Millingtonia*
Ham.
Floerchia Nutt. s. *Nectris* Pursh
Flotovia Spr. s. *Johannia* W.
Forgesia Juss. s. *Desforgesia* Lam.
Fortunaea Lindl. s. *Platycarya* Sieb.
u. Zucc.
Francœuria DC. s. *Duchesnia* Cass.
Franklinia Marshal s. *Gordonia*
Ellis
Franseria Cav. s. *Xanthium* L.
Fugosa Juss. s. *Cienfuegoscia* Cav.

Gabertia Gaud. s. *Grammatophyl-
lum* Blum.
Galedupa Lam. s. *Milletia* Wight
u. Arn.
Garciana Dietr. s. *Philydrum* Banks
Garuga Roxb. s. *Kunthia* Dennst.
Gastrochilus Don s. *Sarcochilus* R.
Br.
Gaya Spr. s. *Lasiopetalum* Sm.
Geissorrhiza R. Br. s. *Lapeyrouisia*
Gawl.
Gerardia L. s. *Rehmannia* Bung.
Germanea Poir. s. *Calceolus* Benth.
Geryonia Schrk. s. *Bergenia* Mnch.
Glaucoma Burm. s. *Murraya* L.
Glechon Spr. s. *Glecoma* L.
Globba Spr. s. *Hura* Kön.
Glyee Spr. s. *Koniga* R. Br.
Glyeosmis Corr. (*-osmida* Spr.) s.
Cookia Sonner.
Gomphia DC. s. *Correa* Sm.
Gomitus Rumph. s. *Sagus* ds.
Gouania DC. s. *Retinaria* G.
Grindelia W. s. *Donia* Hook.
Griselinia Forst. s. *Scopolia* ds.
Guaiera Marcgr. s. *Iacoo* Plum.
Guanabanus Plum. s. *Canangha*
Rumph.
Guparium Spr. s. *Klaprothia* H.
B. K.
Guarea L. s. *Eluteria* P. Br.
Guarea Spr. s. *Epicharis* Blum.

Guepinia Desv. s. *Teesdalea* R. Br.
Gunthera Reg. s. *Gutierrezia* Lag.
Gymnosporangium Oerst. s. *Roeste-
lia* Lk.
Gymnostomum Hedw. s. *Schisto-
stega* Web. u. M.

Hallia Thb. s. *Hedysarum* Thb. u.
Crotalaria L.
Hamelia Jacq. s. *Duhamelia* Pers.
Harrachia Jacq. s. *Crossandra* Sm.
Hartmannia Spach s. *Oenothera* L.
Hartogia L. s. *Bucco* Wendl. u.
Eriostemon Sm.
Hedwigia Sw. s. *Knorria* Moç. Sess.
Heleochlöa Host. s. *Crypsis* Ait.
Helicia Lour. s. *Rhopala* G.
Hemizonia Gray s. *Hartmannia* DC.
Hericium Pers. s. *Hystrix* Spr.
Hermione Haw. s. *Narcissus* L.
Herpestes Pursh s. *Monnieria* Pers.
Heterandra Sm. s. *Boronia* Sm.
Higginsia (O'Higg.-) R. P. s. *Euos-
ma* W.
Hipposéris Cass. s. *Centroclinium*
Endl.
Hoitzia Spr. s. *Loeselia* L. u. *Can-
tua* Juss.
Holmskioldia Retz. s. *Hastigia* Sm.
Holoregmia Nees s. *Martynia* L.
Homoplitis Trin. s. *Pollinia* L.
Hoodia Sweet s. *Scyranthus* Hook.
Hookeria Kth. s. *Brodiaea* Sm.
Hoplisménus P.-B. s. *Oplisménus*
Kth.
Hornemannia W. s. *Vandellia* L.
Huttia aut. s. *Calectasia* R. Br.
Hydnocarpus Vahl s. *Vareca* Roxb.
Hydrocarya Spr. s. *Hedycarya* L.
Hydrogēton Pers. s. *Ouvirandra* P.-
Thou.
Hymenospóron Spr. s. *Dioclea* Kth.
Hymenothecium Lag. s. *Chrysürus*
P.-B.
Hypaelyptum Vahl s. *Hypoelytrum*
Rich.
Hypoëstes Hook. s. *Eranthémum*
R. Br.

Jacapucaya Marcgr. s. *Lecythis*
Ollaria L.
Jaumea Pers. s. *Kuhnla* L. f.
Ipomeria Nutt. s. *Ipomopsis* Rich.
u. Gilia R. u. P.

- Ipo-toxicaria** Pers. s. *Mithridatea* Dietr.
Iroucana Aubl. s. *Casearia* Jacq.
Isocarpha R. Br. s. *Calea* ds.
Iriva Aubl. s. *Sterculia* L.
Ixina L. s. *Krameria* Löfl.
- Kosaria** Forsk. s. *Dorstenia* L.
Krigia Schreb. s. *Hyosēris* L.
- Labillardiera** R.u. S. s. *Billardiera* Sm.
Lablavia Adans. s. *Lablab* Savi
Lagascéa W. s. *Noecaea* Cass.
Lasthenia Hort. s. *Monolopia* DC.
Laurembergia Berg. s. *Serpicula* L.
Lechea L. s. *Gaura* Lam.
Legondium Rumph. s. *Vitex* Negundo L.
Legousia Dur. s. *Prismatocarpus* l'Hér.
Leptanthus Mchx. s. *Pontedéra* L.
u. *Schollera* W.
Leptocodon G. Don s. *Codonopsis* Wall.
Leptoglossis Benth. s. *Nierembergia* R. u. P.
Leptostegia Don s. *Onychium* Kaulf.
Leptostemma Blum. s. *Dischidia* R. Br.
Lessertia DC. s. *Colutea* L.
Lidbeckia Berg. s. *Cotula* L.
Lindelofia Lehm. s. *Omphalodes* T.
Linkia Pers. s. *Desfontainea* R. u. P.
Linnophila R. Br. s. *Hottonia* L.
Linociera R. Br. s. *Chionanthus* L.
Liriöpe Lour. s. *Ophiopogon* Curt.
u. *Sansevieria* Thb.
Lithagrostis G. s. *Coix* L.
Lobularia Hoffn. s. *Pulmonaria* ds.
Loxidium Vent. s. *Swaintonia* Salisb.
Loxonia Jack s. *Klugia* A. Juss.
Ludwigia DC. s. *Ludwigia* L.
Luschia Don s. *Cleyéra* Thb.
Lydaea Mol. s. *Kageneckia* R. u. P.
Lygistum L. s. *Petesia* L.
- Macrostema** Pers. s. *Calboa* Van Houtt.
Mahuria Aubl. s. *Bonnetia* Schreb.
Malanea Lam. s. *Cunninghamia* Schreb.
Mallingtonia W. s. *Millingtonia* Roxb.
- Manglietia** Burm. s. *Michelia* L.
Manulea L. s. *Cheiranthus* L.
Marcetia DC. s. *Rhexia* L.
Martia Spr. s. *Udora* Nutt.
Matourea Aubl. s. *Vandellia* L.
Mauria Kth. s. *Cambessedea* W.
Mayēpea Aubl. s. *Chionanthus* L.
Megastachya R. u. S. s. *Sclerochloa* P.-B.
Melichrus R. Br. s. *Ventenatia* Cav.
Meliosma Blum. s. *Millingtonia* Roxb.
Melistaureum Forst. s. *Samýda* L.
Mentzelia L. s. *Microperma* Hook.
Mesosphaerum P. Br. s. *Bystropogon* l'Hér.
Messerschmidia L. s. *Tournefortia* L.
Meteorina Cass. s. *Calendula* L.
Metnam Forsk. s. *Passerina* L.
Meyera Spr. s. *Caesulia* Roxb.
Micadamia R. Br. s. *Butyrospermum* DC.
Micrelium Forst. s. *Eclipta* L.
Micrococcus Cohn s. *Monas* Ehrbg.
Micrcos G. s. *Grewia* L.
Micropýrum Gaud. s. *Nardurus* Rchb.
Microtea Sw. s. *Schollera* Rohr.
Miezia Pers. s. *Ludolfia* W.
Milnaea Roxb. s. *Lansium* Blum.
Mindium Juss. s. *Michauxia* l'Hér.
Misandra Comm. s. *Gunnera* L. u.
u. *Bonapartea* R. u. P.
Mnasion W. s. *Rapatea* Aubl.
Mocanéra L. f. s. *Visnea* Schreb.
Mocinna Lag. s. *Galinsoga* R. u. P.
Modira canni Rheed. s. *Hugonia* L.
Momisia Dietr. s. *Celtis* T.
Monbretia Bak. s. *Houttuynia* Thb.
Monerma P.-B. s. *Lepturus* R. Br.
u. *Nardus* Lob.
Monetia Spr. s. *Camphorosma* L. f.
Monnina Spr. s. *Jackia* Blum.
Monopsis Salisb. s. *Holostigma* Schap
Monotoca R. Br. s. *Styphelia* Sm.
Moquilea Mart. s. *Dulacia* Neck.
Moschiféra Mol. s. *Moscharia* R.u.P.
Mosigia Spr. s. *Moscharia* R. u. P.
Mourera Aubl. s. *Lacis* Schreb.
Mühlbergia Schreb. s. *Dilepýrum* Mchx.
Mutella aut. s. *Drummondia* DC.
Myconia Lap. s. *Ramondia* Rich.
Myxotrichum Kze. s. *Oncidium* Fr.

- Nacibea** Aubl. s. *Manettia* L.
Nama Don s. *Hydrolea* Vahl.
Nasmythia Huds. s. *Eriocaulon* L.
Natia Adans. s. *Cenchrus* L.
Nematostigma A. Dietr. s. *Libertia* Spr.
Nephrosperma Balf. f. s. *Oncosperma* Blum.
Neuroplatyceros Presl s. *Platycerium* Desv.
Nigrina Thb. s. *Chloranthus* Sm.
Nivenia Bak. s. *Witsenia* L.
Norna Wahlbg. s. *Calypso* Salisb.
Nothoscordum Kth. s. *Millea* Cav.
Nothria Berg. s. *Frankenia* L.
Nugaria DC. s. *Nuga* L.
Nux americana Comm. s. *Melicocca* Juss.
Nymphanthus Lour. s. *Phyllanthus* L.
- Obanna** Kämpf. s. *Erianthus* P.-B.
Ochrosia Burm. s. *Cerbera* L.
Ocotea Kth. s. *Nectandra* Berg.
Odonia Bertol. s. *Collaea* DC.
O'Higginsia R. u. P. s. *Euosma* W.
Okéa aut. s. *Eriostemon* Pers.
Omphalostigma Griseb. s. *Petasostylis* Lindl.
Omphelandria P. Br. s. *Omphalea* L.
Opoidea Lindl. s. *Galbanum* Don
Ormocarpum P. Br. s. *Müllera* L. f.
Ornithopodium Bauh. s. *Ornithopus* L.
Orthopogon R. Br. s. *Oplismenus* Kth.
Orthoscēlis Spach s. *Heliophila* Lam.
Ortiga Feuill. s. *Loasa* Adans.
Oscillatoria Vauch. s. *Oscillaria* Bosc
Osterdikia Burm. s. *Cunonia* R. Br.
Oudemansia T. u. B. s. *Heliōtēres* Krz.
Outea Aubl. s. *Macrolobium* L.
Oxyria Cambd. s. *Donia* R. Br.
- Pachyne** Salisb. s. *Phajus* Lour.
Palovia Aubl. s. *Dimorpha* Sm.
Panicastrella Mchx. s. *Cenchrus* L.
Panke Mol. s. *Gunnēra* R. u. P.
Papia Mnch. s. *Orvala* DC.
Papularia Forsk. s. *Trianthema* L.
Parivoa Aubl. s. *Dimorpha* Sm.
Patma Blum. s. *Rafflesia* Arnold
- Pavonia** Cav., R. Br. s. *Goethēa* Mart. u. *Guazuma* L.
Pectis L. s. *Jacobaea* Plum.
Pedilea Lindl. s. *Dienia* Lindl.
Pekea Aubl. s. *Caryocar* L. u. *Rhibolus* G.
Peltaria L. s. *Heliophila* L.
Pelvu Rheed. s. *Carreya* Roxb.
Pentaphylloides Pluk. s. *Sibbaldia* L.
Perigara Aubl. s. *Gustavia* L.
Periphragmos R. u. P. s. *Cantua* Juss.
Peristróphe Nees s. *Justicia* Roxb.
Peroa Pers. s. *Leucopōgon* R. Br.
Perpensum T. s. *Gunnera* L.
Pfaffia Spr. s. *Iresine* Spr.
Pharnacéum L. f. s. *Loeflingia* L.
Phebalium Vent. s. *Eriostēmon* Sm.
Phyllaurēa Lour. s. *Codiaeum* Rumph.
Phyllōnia Haw. s. *Lomatophyllum* W.
Phrynum W., Roxb. s. *Maranta* L. u. *Thalia* L.
Phycagrostis autt. s. *Zostēra* L.
Pilosa autt. s. *Heliophila* L.
Pinastella Dill. s. *Hippuris* L.
Pineda R. u. P. s. *Homalium* Pers.
Piperodendron Heist. s. *Schinus* L.
Pitonia DC. s. *Quinquina* Condam.
Plaso Rheed. s. *Butea* Roxb.
Platēra Roxb. s. *Hoppēa* Roxb.
Platycentrum DC. s. *Davya* DC.
Platychilum Delaun. s. *Goodia* Saliß.
Plectanthēra Mart. s. *Luxembourgia* St. Hil.
Podothēca Cass. s. *Podosperma* Lab.
Poirrea DC. s. *Combrētum* Lam.
Polemamnia s. *Uropétalum* Ker.
Polyactidium DC. s. *Stenactis* Cass.
Pollīchia Schreb. s. *Neckeria* Gm.
Polyparea Lour. s. *Houttuynia* Thb.
Polypēra aut. s. *Polysaccum* DC.
Polyphragmon Krz. s. *Helospōra* Jacks.
Pleisiphonia Spr. s. *Ceramium* Lyngb. u. *Hutchinsia* Ag.
Polystachia Hook. s. *Cranichis* Sw.
Poppia Hort. s. *Luffa* T.
Porcelia R. u. P. s. *Orchidocarpus* Mchx.
Portulacaria Schreb. s. *Claytonia* L.
Posidonia Kön. s. *Kernēra* W.
Pothos Sims s. *Symplocarpus* Salisb.

Ponrretia R. u. P. s. Guzmannia R. u. P., Puya Mol. u. Bromelia L.
Preseottia Spr. s. Microstýlis Nutt.
Proeris Comm. s. Boehmera Lk. (ia Jacq.).
Psilothonna E. Mey. s. Gamolépis DC.
Psychotróphum P. Br. s. Psychotria L.
Psygnum Presl s. Drynaria Bory
Pterocephalus Spr. s. Knautia pa-
laest. L. f.
Pteronia Réd. s. Thalia L.
Ptesia Sw. s. Petesia L.
Ptiloméri Hort. s. Shortia Hort.
Pultenaea Andr., Sm. s. Ocylobium Andr. u. Mirbelia Sm.
Pultenia Andr. s. Pultenaea!
Purshia DC. s. Kunzéa Spr.
Pntoria Pers. s. Ernodéa Sm.
Pixidanthéra Mehx. s. Diapensia L.

Quinaria Lour. s. Cookia Sonner.
Quiva Cav. s. Cupania Plum.

Raconbea Aubl. s. Homalium Jacq.
Rafnia Thb. s. Crotalaria L.
Randalia Petiv. s. Eriocaulon L.
Randia Houst. s. Gardenia L. f.
Rapourea Aubl. s. Camax Schreb.
Razniovia Spr. s. Huméa Sm.
Reboulia Kth. s. Trisétum Pers.
Renealmia R. Br. s. Zerumbet autt.
Renggeria Meisn. s. Schweiggera Mart.
Resteria Rumph. s. Commersonia Forst.
Retanilla DC. s. Molinaea Comm.
Rhodéa Endl. s. Orontium L.
Rhytidophyllum Van Houtt. s. Ophi-
anthe Hanst.
Robergia Schreb. s. Cnestis Jacq. u. Connarus DC.
Rodriguezia R. u. P. s. Pleurothallis R. Br.
Roepertia Spr. s. Roëlla L.
Rourea Aubl. s. Cnestis Jacq.
Rubioides Soland. s. Opercularia Rich.
Rubiöla T. s. Crucianella L.
Rumea Poit. s. Besséra Schult.
Rumia Hoffm. s. Cachrys L.
Rumphia Pers. s. Tamarindus Spr.

Saceochilus Blum. s. Saccolabium ds.
Saguérus Roxb. s. Sagus Rumph.
Salmia W. s. Carlodovica R. u. P.
Samara L. s. Menecylon Burni.
Sampacea Rumph. s. Liriiodendron Liliiféra L.
Sanamunda Breyn. s. Passerína L.
Santia Savi s. Polypógon Desf.
Saouari Aubl. s. Caryocar villosum Pers.
Sapróma Brid. s. Bruchiá Schwägr.
Scabridia (-tes) L. s. Nyctanthes L.
Scaevöla L. s. Buglossum Rumph.
Sealia Sims s. Podolépis Lab.
Schizodium Lindl. s. Disa Berg.
Schnidelia L. s. Ornithróphe Comm.
Schoepfia W. s. Codonium Vahl
Schradéra aut. s. Croton L.
Schnafia Spach s. Fuchsia Plum.
Selerostylis Blum. s. Glycosmis Corr.
Seleroxylon W. s. Sideroxylon ds.
Securigéra DC. s. Securidaca Mill.
Securilla Pers. s. Securidaca Mill. u. Bonaveria Scop.
Sedoïdes Herm. s. Crassula centau-
roid. L.
Seguine autt. s. Dieffenbachia Schott.
Septas cap. L. s. Crassula umb. Jacq.
Sesséa R. u. P. s. Cestrum L.
Sethia St. Hil. s. Erythroxylon L.
Simsia R. Br. s. Ximenesia Cav.
Siphocampýlos Pohl s. Centropógon Benth.
Sirium Roxb. s. Santálum L.
Sloanea L. s. Oxyandra DC. u. Echi-
nocarpus Blum.
Smegmadermos R. u. P. s. Smeg-
maria W.
Solenandra Vent. s. Blandfordia Andr.
Solenia W. s. Cyrtanthus Schreb. u. Posoqueria Aubl.
Sommeratia L. s. Mangium Rumph.
Sophronia Lindl. s. Sophronitis ds.
Spadonisma DC. s. Moquinia ds.
Spananthe Jacq. s. Hydrocotyle W.
Sparganophórus Lag. s. Coelestina Cass.
Spathiphyllum Schott. s. Steno-
spermatum ds.
Spathularia Pers. s. Spatuléa Fr.
Spermatura Rchb. s. Urosperma Nutt.

- Spiranthēra** St. Hil. s. *Terpnanthus* Mart.
Sphaeralcēa Spach s. *Malva* miniat. Cav.
Sphaerocarpa DC. s. *Centropōgon* Benth.
Sphaerocarya DC. s. *Retinaria* G.
Sphaerophysa DC. s. *Colutea casp.* M. B.
Stackia insignis autt. s. *Decaisnēa* Hook. f.
Staehelina L. = *Centaurēa*, sect. Cyānus Rchb.
Staehelina Crantz s. *Bartsia* L.
Staehelina Walt. s. *Liātris* G.
Stadnannia Spr. s. *Melicocca* Juss.
Staurophōra W. s. *Lunularia* Mich.
Stemodiacaera P. Br. s. *Scordium* Sloan.
Stenhammīra Rchb. s. *Pulmonaria* L.
Stereocaulon Schreb. s. *Sphaerocephalus* Pers.
Steris Burm. s. *Hydrolēa* Vahl
Stevensonia H. Wendl. s. *Ver-*
schaaffeltia ds.
Sticta Hoffm. s. *Pulmonaria* Hoffm.
Streptium Roxb. s. *Blaeria* L. u.
Tortūla Roxb.
Stroemia Vahl s. *Cadaba* Forsk.
Stylis Poir. s. *Stylium* Sw.
Stylophōrum Nutt., Spr. s. *Cheli-*
donium L. u. *Meconopsis* Vig.
Stylosanthes Schreb. s. *Hedysārum* hamat. L.
- Tangu** Pluk. s. *Cyminosma* G. u.
Caryophyllus aromatic. L.
Tambourissa Bak. s. *Mithridatea* Comm.
Tapinia Dietr. s. *Montbretia* Réd.
Tapogomea Aubl. s. *Cephaēlis* Sw.
Tasmannia R. Br. s. *Wintēra* L.
Tatarica Clus. s. *Crambe* T.
Telfel Tavil Alp. s. *Cynanchum* *viminale* L.
Tenorēa Spr. s. *Buprestis* ds.
Tetragonocarpus Comm. s. *Tetra-*
gonia L.
Tetramerium G. s. *Xora* Sw.
Tetradontium Brid. s. *Tetraphis* Hedw.
Teueris u. *Teucropsis* Benth. s. *Teu-*
crum L.
Theodōra Med. s. *Bonduc* Plum.
Thibaudia Hb. s. *Lussacia* Spr.
- Thlaspidioides** Barrere s. *Dodonaea* L. u. *Staphylodendron* Pluk.
Thomasia Gay s. *Lasiopetālum* Sm.
Thyrsīne Gled. s. *Cytinus* L. u.
Hypocistis T.
Tigarea Pursh s. *Kunzēa* Spr.
Timbuleta Forsk. s. *Dodartia* L.
Timonius Bak. s. *Helospōra* Jacks.
Timonius Rumph. s. *Erithālis* Forst.
Tittmannia Rchb. s. *Vandellia* L.
Toddalia Juss. s. *Scopolia* Sm.
Togularia aut. s. *Ceramium* Reinw.
Tomex L. s. *Callicarpa* L. u. *Kaem-*
pfera Houst.
Trachylobium aut. s. *Hymenaea* L.
Trachymene Grah. s. *Hügelia* Rchb.
u. *Didiscus* DC.
Trachytella DC. s. *Calligōnum* L.
Tragia L. s. *Mercurialis* L.
Traunsteinēra Rchb. s. *Nigritella* Rich.
Trembleya DC. s. *Jacobia* ds.
Tribrachia Lindl. s. *Bolbophyllum* P.-Thou.
Trichogyne DC. s. *Ifloga* Cass.
Trichophyllum Nutt. s. *Helenium* Spr.
Trichostōmum Hedw. s. *Ceratōdon* Brid.
Tricycla Lam. s. *Bougainvillēa* Comm.
Trigōnis Jacq. s. *Cupania* L.
Trioptēris Banks s. *Hiraea* Jacq.
u. *Tetrapētra* Cav.
Tripterella Elliot s. *Burmannia* L.
Trisetaria Poir. s. *Trisētum* Pers.
Tromsdorffia Mart. s. *Liebigia* Endl.
Trophis L. s. *Bucephālum* Plum.
Turbith Tausch. s. *Libanotis* Scop.
Turnēra L. s. *Chamaecistus* Sloan.
Turpinia Vent. s. *Dalrymplea* Spr.
Turpinia Spr. s. *Poiretia* Vent.
- Ubium** Rumph. s. **Stemōna** Lour.
Uricicia Hortul. s. *Lepechinia* W.
Verēa W. s. *Crassula* Cotylēdon
Jacq. u. *Kalanchoē* Adans.
Vermicūla Col. s. *Scleranthus* L.
Villanova Lag. s. *Parthenium* L. u.
Unxia W.
Villaresia F. Müll. s. *Chariessa* Becc.
Viminaria Lk. s. *Daviesia* Sm.

Viraya Gaudich. s. *Leptorrhynchus*
Benth.
Vouapa Aubl. s. *Macrolobium* L.

Walkeria W. s. *Meesia* Hedw.
Walkeria Ehret. s. *Nolana* L. u.
Teganum Schmidel
Wallisia Schwägr. s. *Schlimmia*
Planch.
Wallrothia Roth s. *Vitex* L.
Wangenheimia Mnch. s. *Cynosurus*
L.
Warneria Mill. s. *Hydrastis* L.
Weinmannia Cunn. s. *Caldeluvia*
G. Don

Wendlandia W. s. *Coccūlus* DC.
Wickstroemia Schrad. s. *Haemochāris* Sal. u. *Gordonia* Spr.
(*Lindleya* Nees).

Willdenowia Thb. s. *Restio* L.
Willughbeia Roxb. s. *Fagraea* Thb.
Winterana Soland. s. *Wintēra* L.

Ximenia Poir. s. *Balanītes* DC.
Xylosma Schreb. s. *Myroxylon* L. f.

Zaleya Burm. s. *Trianthēma* L.
Zaluzania aut. s. *Zamia* L.
Zornia Gm. s. *Dicerma* DC.
Zygotrichia Brid. s. *Tortūla* Hedw.

B. Deutsch-, Trivial- und Fremdnamen der technischen, merkantilen und besonders wichtigen sonstigen Pflanzen und ihrer Produkte nach wissenschaftlicher Benennung.¹⁾

Aaspflanze	Stapelia.	Alpranke (Bittersüß) Solanum Dulcamara.
ABC-Pflanze	Spilanthes Acmella.	Amarant-Cayenneholz Nissolia.
Achiar	(köstl. Konfekt aus Wurzelspross.) Bambusa arundinacea.	Amarelle Cerasus acida.
Abthon	(Frauenhaar) Trichomänes.	Ameisenbaum Cecropia u. Triplaris americ.
Acajou	(echte) Anacardium orientale, (Mahagoni) Swietenia, (falsche) Strychnos Nux vomica.	Amelkorn (Blicken) Olýra latifolia.
Ackernuss	(Erdkastanie) Bunium Bulbocastanum.	Amerikagras Stenotaphrum s. Amerícum complanatum.
Adamsapfel	Citrus Limetta.	Ammern (Emmer, Ehmer) Tritícum dicoccum u. Olýra.
Adlerholz	Aquilaria, (echtes) Aloëxylon, (unecht.) Excoecaria Agallochum.	Ammoniakpflanze Doréma arménica.
Advogatobaum	Perséa gratissima.	Amstel (Wielandskr.) Thalictrum.
Affenblatt	Uvularia.	Ananaskirsche Physális s. Atrópa edulis.
Affengesichtbaum	Rottlera s. Croton.	Angelikabaum Aralia spinosa.
Afrikane	Tagētes patula.	Angosturarinde Galipéa officinalis.
Agrume	Citrus decumana, medica u. aurantium.	Angurien (Wassermelone) Cucúmis Citrullus.
Ahlbeere	(Alantb. Mej.) Ribes nigrum.	Anis Pimpinella Anísum.
Ahle	(Ahlkirsche) Prunus Padus.	Anke Pinguecula.
Alber	(e. abele-tree) Populus (Pappel).	Ankerblume Rhexia.
Alereobaum	Fitzroya patagonica.	Anthophyllum Offiz. (Mutternelke) Eugenia Caryophyllus.
Alhenna	Lawsonia alba u. inermis.	Antillen-Ebenholz Byra Ebénium.
Alkanna	Anchusa tinctoria, (echte) Alhenna.	Antoniblüh Philadelphus Coronarius.
Almrausch	Rhododendron ferrugineum.	Antscharbaum (-gift) Antiāris Toxicaria.
Aloëholz	Aloëxylon (s. Adlerholz).	Apfel (amerikan.) Pirus coronaria L.
Alpbalsam	(Alpenröschen) s. Almrausch.	Apfelmelone Cucúmis Dudaím.
Alpenbitter	(Iva) Achillēa moschata.	Apostemkraut Knautia (Scabiosa) arvensis.
		Arabisch-Gummi Acacia arabica, gummiféra etc.

1) Der Kürze wegen sind nur die der Erklärung bedürftigsten aufgenommen.

D. Verf.

- Arbe (Arve)** Pinus Cembra.
Arbuse (fr. arbousse) s. Angurien.
Ärghel-Blätter Solenostemma Ar-
ghel.
Arlitze (Elzbeere) Sorbus torminalis.
Armleuchterbaum s. Ameisenb.
Arrow-Root (ostind.) Dioscorēa,
(tahit.) Tacca, (westind.) Maranta
arundinacēa.
Asa foetida Ferula s. Scorodosma
Asa foetida.
Asand (Stinkasand) s. eb.
Aschitze Sorbus Aria u. Aucuparia.
Atlasholz Ferolia guianensis.
Augenwurz Athamanta.
Austerbaum Rhizophōra Mangle.
Ayrshire-Rose (Schling-) Rosa re-
pens s. capreolata u. rubifolia.
- Bacille (Meerfenchel)** Crithmum
maritimum.
Badeschleim Oscillatoria.
Badian (Sternanis) Illicium anisa-
tum.
Bajonettblume Yucca.
Bärentatze Clavaria Botrytis.
Balsam (arab.) Amýris Kataf, (Co-
paiva-) Copaiifera off., (Gilead-)
Balsamodendron gileadense, (Mec-
ca-) B. Opobalsānum, (peru-
vian.) Myrospermum, (Tolu-)
ebenso.
Balsampfel (Springgurke) Momor-
dica Elaterium.
Balsamholz (peruv. Balsam) My-
roxylon peruifērum.
Balsampflaune Myrobalānus s.
Spondias.
Balsternaken (Pastinak) Pastināca.
Bambuspalme (stiellose Wein-)
Raphia.
Banane (Pisang) Musa.
Bandgras Phalāris arundinacēa
pieta.
Baniane Ficus indīca u. benjamīna.
Barille Salsöla Kali u. Soda.
Bartsch (Bärenklav) Acanthus u.
Heracleūm.
Bartgerste Hordeum Zeocr̄thon.
Barthengel (Frauenbiss etc.) Teu-
crium.
Batate (echte) Batatas, (falsche)
Helianthus tuberosus.
Batava (Palmwein) Oenocarpus Ba-
tava Mart.
- Bathengel (Gamander - Ehrenpreis)**
Veronica Chamaedrys.
Batunge (Vatunge) Betonica L.
(Stachys Bet.).
Bauernrose (Gicht-) Paeonia, (Cen-
tifolie) Rosa Cent.
Bauernschminke Lithospermum
arvense.
Baumbinse (Palmgras) Prionium.
Baumcaetus Peireskia.
Baummoos Thamnium.
Becherfarn Trichomānes.
Behennüsse (-öl) Guilandina Mo-
ringa.
Beisskohl (römisch-) Beta Cicla.
Benzoe (echte) Styrax Benzoīn.
Bergamotten (Citronen) Citrus me-
dica.
Bergthee Gaultheria.
Bernitzte (Himbeere) Rubus idaeus.
Bernsteinbaum Pin̄ites succinifer.
Bertram (deutsch., s. g. Dorant)
Achillea Ptarmīca, (gemeiner, s.
g. Mutterkr.) Chrysanthemum
Pyréthrum.
Bertramswurz Anacyclus u. Pyrē-
thrum.
Besinge (Knöppel-) Fragaria collina.
Betehnūsse Areca Catēchu.
Bethlehemstern Ornithogálum.
Bettlersläuse Torilis Anthriscus u.
Galium Aparine.
Bettstroh (Frauen-) Galium verum.
Beutling Pleurospermum.
Bezettten Croton tinctorium.
Biberbaum Magnolia.
Bickbeere (Heidel-) Vaccinium Myr-
tillus.
Bienenheide (Sumpfporst) Ledum
palustre.
Bilimbi od. Blingingbaum Aver-
rhoea Bilimbi.
Bigarrado (Warzen-Pomeranze) Ci-
trus aurantium vulgare.
Birzstrauch (Wachsbeer-) Myrica-
ria.
Bitterholz Quassia amara u. Xylo-
pīcon.
Bitterlinge Polygalēae.
Bitterpilz (Dickfuss) Bolētus pa-
chypus.
Bitterschwamm (Schwefelkopf) Hy-
pholoma fascicularis.
Blacke Homogyne.
Blaugummibaum (Fieber-) Euca-
lyptus globulus.

- Blauholz (Campeche-)** Haematoxylon campechianum.
Bläuling Amethystea coerulēa.
Blicken (Amelkorn) Olýra latifolia.
Block-Ingruber Amōnum Zerumbet.
Blumenkohl Brassīca oleracēa botr̄ys.
Blutholz s. Blauholz.
Blutwurz Tormentilla.
Boa- od. Bonon-Upas Antiāris toxicaria (Antschar).
Bocksdorn Astragālus u. Lycium (Teufelszwirn).
Bockskraut Androsaemum hircinum.
Bocksweizen Atraphaxis.
Bohnenkapper Zygophyllum Fagago.
Bolle (Sommerzwiebel) Allium Cepa.
Borstenglocke Campanula Cervicaria.
Botrys mexicana Offiz. = Chenopodium ambrosioides.
Bouquetwicke Lathyrus latifolius.
Bourbonthee Angraeicum.
Brachschötchen Calepina.
Brasilienbaum Melastōma Acindendron.
Brasilienholz (rot.) Caesalpinia brasiliens. u. echinata, (gelb. od. braun.) C. Sappan, (ostind.) Pterocarpus Draco.
Bratenkraut (Garten - Thymian) Thymus vulg.
Brätling (Milchpilz etc.) Galorrhoeus.
Brauerkraut (Sumpfporst) Ledum palustre.
Braunholz Caesalpinia Sappan.
Bräunewurz Asperula cynanchīca, (Bräunenblume) Prunella.
Brautpflanze Talinum.
Brechhülse Ilex vomitoria.
Brechnuss Strychnos nux vomīca, Jatrōpha u. Janipha.
Brechwurzel Cephāelis s. Ionidium Ipecacuanha.
Breiapfel Achras Sapota.
Brennbohne Mucūna.
Brennpalme Caryota urens.
Brennwinde Loasa.
Brocoli (Spargelkohl) Brassīca ole-rac. asparagoïdes.
Brotnussbaum Brosīnum Alicastrum.
Brombeerraute Vepris.
Bruchkraut Herniaria u. Sanicula.
- Brunnenbaum** Tetracēra potatoria.
Brustbeere Sebestēna u. Zizýphus vulg.
Buccoblätter Diosma (Barosma).
Bufoholne (Sau-) Vicia Faba.
Büffelgras Aristida purpurēa.
Büffelhornholz Burchellia capensis.
Bügelholz Celastrus.
Bügelholzbirne Salacia.
Bulte Ballota.
Büngel Callitrichē.
Büscherllocke Campanula glomerata.
Bunko (Silbergras) Weingärtneria s. Corynephorus.
Burgel Péplis.
Butterbaum Bassia butyracea (Pi-lippe, Pentadesma butyr.), (Sudan-) Vitellaria paradoxa u. Micadania s. Butyrospermum Parkii.
Butterblume Caltha, Ranunculus u. Ficaria.
Butterfass (gross.) Nuphar lutēum.
Butter- od. Ölnuss Juglans cinerea u. Rhizobölus s. Pekea butyrosa.
Butterpilz Bolētus lutēus.
Butter- od. Schmeerwurz Pingui-cula.
Byzantinerhennus (-hasel) Corylus Colurna.
- Cacaomalve** Abroma.
Cacaopflaume Icacina (Icaco).
Caesumuniarwurz (Block - Ingwer, s. d.).
Cajaputölbaum Melaleuca Leucadendron.
Cainea- (Cahinea-) Wurzel Chiococca anguifūga etc.
Calabasse Cucurbita Lagenaria.
Cambogia- od. Cambodscha - Stalagnit Xanthochȳmus.
Camote (Batate, s. d.).
Campecheholz s. Blauholz.
Canariengras (-samen) Phalāris canariensis.
Cantaluppe (Prescott) Cucūmis Melo var.
Caoutschukbaum Siphonia elastīca s. Hevea guianensis, (ostind.) Urceola s. Tabernaemontana elast. u. Ficus elast. u. religiosa.
Cap-Eisenholz Gardenia.
Capuzinerpulver Verātrum Sabbadilla.
Caraghen Sphaerococcus crispus.

- Carabou** s. Nimbobaum.
- Cardobenediktenkraut** Centaurēa Benedicta.
- Cardun** od. **Cardy** (Chardonna) Cȳnara Cardunculus.
- Carfiol** (Blumenkohl, s. d.).
- Cascarillenrinde** Clutia Eluteria.
- Cassavebrot (-wurz)** Dioscorēa u. Jatrōpha Manīhot.
- Cassonade** (Moscovade) Sacchārum.
- Cayennekirsche** Eugenia Michelii Lam.
- Cayennepfeffer** Capsicūm baccatum.
- Ceder** (**Libanon-**) Pinus Cedrus L., (rote od. virginische) Junipērus virginianā,
- Cedernholz** (**Cigarrenkisten-**) Cedrēla odorata.
- Cedrat-Citrone** Citrus medica.
- Cedronbohne** Simarūba ferruginēa.
- Centunnodia** Offiz. = Polygōnum aviculare.
- Chamburu** (gift.) Carīca digitata.
- Champagnerröschen** Rosa pulchella (R. provincialis v.)
- Champignon** Psalliotha s. Agaricus campestris.
- Chinaäpfel** (Apfelsinen) Citrus aurantium sinensis.
- Chinabeere** Sarcocephalus.
- Chinagras** Urtica nivēa u. Boehmeria utilis.
- Chinarinde** (echte) Cinchona officin., (unechte) s. Chinawurzel, (bras.) Evodia febrifūga.
- Chinarose** Hibiscus rosa chinensis.
- Chinawurzel** Smilax China.
- Chokoladenbohne** Theobroma Cacāo.
- Chokoladenstrauß** Ribes aurēum.
- Christblume** Hellebōrus niger.
- Christusauge** Aster alpinus.
- Christusdorn** Paliūrus (Rhamnus s. Zizyphus) spina Christi u. Gleditschia triacantha.
- Christuspalme** (Wunderbaum) Ricinus communis.
- Christwurz** (**Niess-**) Hellebōrus.
- Cibeben** (Zibeben, grosse Rosinen) Vitis vinifera.
- Cigarrenkistenholz** s. Cedernholz.
- Cigarrenpalme** (**Roll-**) Licuāla.
- Cinae** (sc. semina) Offiz. Artemisia contra etc.
- Citrone** Citrus medica.
- Citronenkraut** Melissa offic. u. Artemisia Abrotānum (Stabwurz).
- Citronenstrauß** Lippia citriodōra (Verbēa triphyllos).
- Coca (-blätter)** Erythroxylōn Coca.
- Cocoholz** Swartzia tomentosa.
- Coko** (Kalo etc.) Caladium esculentum.
- Colombowurz** Menispernum palmatum (Coccūlus palmatus).
- Coloquinte** Cucūmis Colocynthis.
- Colsat** fr. = Kohlsaat Brassīca campestris.
- Condori-** od. **Corallenholz** Adenantherā Pavonia u. Erythrīna Corallodendron.
- Contrayerva** Dorstenia Contrayerva u. Milleria Contr.
- Copaiavabsam** Copaiifera.
- Copalbaum** (echter, ostind.) Vateria indica, (unecht. od. Copalgummi) Rhus Copallīnum, (amerik.) Hymenaea.
- Corallenbäumchen** (-kirsche) Solanum Pseudo-Capsicūm.
- Corallenholz** s. Condoriholz.
- Corallenschwamm** s. K.
- Cubacedernholz** s. Cedernholz.
- Culilawanrinde** (unecht. Zimmet) Cinnamōnum syntoc s. spurium.
- Curaregiftbaum** Hippomāne Mancinella u. Strychnos Tieute etc.
- Cussave** s. Cassavebrot.
- Cymbelblume** Nolana, -kraut Linaria Cymbalaria u. Cephalanthēra.
- Cypressenkraut** Santolīna Chamaecyparissus.
- Dammaraharz** Pinus Dammara (Agāthis).
- Darrgras** Holeus u. Hierochlōa.
- Dattelpflaume** Diospīros Ebēnum.
- Deckschimmel** Trichoderma.
- Degent** (schwarzer, Birkenrindenöl, Oleum rusci Offiz.) Betula alba.
- Delebpalme** Borassus Aethiopum.
- Denkmein** (Gedenkemein) Omphalodes verna.
- Dintenbaum** (ostind.) Semecarpus.
- Dochtmalpighie** Thryallis.
- Dohr** (Löwenzahn) Leontōdon.
- Donnerkraut** Sedum Telephium.
- Donrian** (Flöhkraut) Pulicaria.
- Doradille** Ceterach officinarum.
- Dorant** Achillēa Ptarmīca u. Antirrhīnum.
- Dornkirsche** Zizyphus Jujūba.

- Dötterlein** (Finkensamen) *Neslea*.
Drabe (Wassernuss) *Trapa*.
Drachenblut *Pterocarpus Draco* u.
Calamus Dr.
Drachenwurz *Arum Dracunculus*
u. Calla palustris.
Dragon (Esdragon) *Artemisia Dracunculus*.
Drehling (-wurz) *Spiranthes*, (Au-
 sternpilz) *Pleurōtus ostreatus*.
Drehstamm *Kielmeyera*.
Dreifaltigkeitsblume *Trientalis*
europaea u. (Stiefmütterchen)
Viola tricolor.
Drosselbeere (Vogel-) *Sorbus Aucuparia*.
Drosswurz *Scrophularia*.
Drunt (Leinkraut) *Linaria*.
Dubenwok (Schaftthalm) *Equisetum*.
Duhu (Pinselgras) *Penicillaria*.
Dumpalme (Ast-) *Hyphaena*.
Dungras (Woll-) *Eriophorum*.
Durchwachs *Bupleurum*.
Durian (Zibethbaum) *Durio Zibethinus*.
Dürlitze (Herlitze, Cornelkirsche)
Cornus mas.
Dürrbusch *Xerophyta* u. *Xerothamnus*.
Durrha (Sorgho, Mohrhirse) *Sorghum vulgare*.
Duvok s. *Dubenvok*.
- Ebenholz** (schwarz.) *Diospyros Ebenum*, (Madagascar-) *Milletia leucantha*, (westind.) *Aspalathus Ebénus* (Amerimnon Eb.).
Eberich (Weidenröschen) *Epilobium*.
Eberraute (-reis, Stabwurz) *Artemisia Abrotanum*.
Eberwurz (Karlsdistel) *Carlina*.
Edelpilz (Stein-, Herrn-) *Bolétus edulis*.
Edelweiss *Gnaphalium Leontopodium*.
Egelfelberich *Lysimachia Nummularia*.
Ehegras *Apluda*.
Ehmer (Emmer) s. *Ammern*.
Eibencypresse *Taxodium*.
Eichenholz (afrik.) *Oldfieldia*.
Eichhase *Polyporus umbellatus*.
Eierbaum *Hernandia ovigera*.
Eierfrucht (-pflanze) *Solanum Melongena* s. *insanum* (Trongum hortense).
- Eierchwamm** *Cantharellus cibarius*.
Einblatt *Parnassia palustris*.
Einkolle *Monorchis*.
Einkorn (St. Peters-) *Triticum monococcum*.
Eintagblume *Lysimachia nemorum*
u. Tradescantia virginica.
Eisenhart (-kraut) *Verbena*.
Eisenholz (asiat.) *Metrosidéros vera*,
(austral.) *Stadmánna australis* u.
(Schwarzholz) *Acacia Melanoxylon*, (Cap-) *Gardenia Rothmanni*, (Ceylon-) *Mesua ferréa*, (Co-chinch.-) *Baryxylum rufum*, (Jamaika-) *Fagára Pteróta*, (Java-) *Cryptocarya ferréa*, (indisch.) *Mangliilla Chrysophyllum* u. *Sideroxylon*, (Intsi-) *Acacia Intsia*, (- Isle de France od. Bourbon) *Cossinia borbonica*, (Maba-) *Ferreóla Maba* s. *buxifolia*, (weiss.) *Sideroxylon cinereum*.
Eiskraut *Mesembryanthemum crystallinum*.
Eleñiharz *Amýris elemiféra* (Icariba) u. *Icica*.
Elephantenapfel *Feronia elephantum*.
Elephantenbaum *Phyteléphas od. Elephantusia*.
Elephantenfuss *Testudinaria elephantipes*.
Elephantenläuse *Anacardium orientale*.
Elephantenrüssel (Gemshorn) *Martynia*.
Elfenbein (vegetabil.) *Phyteléphas macrocarpa* u. *Manicaria sacciféra* (Pilophöra).
Eller (Erle) *Alnus*.
Else (Eller, Erle) s. eb.
Elsbeerbaum (Arlesbeer.) s. *Arilitze*.
Elsebeere (Traubenkirsche) s. *Ahle* (Ahlkirsche).
Emmer (Ehmer) s. *Ammern*.
Enfer (Ingwer) *Zingiber officinale*.
Engelsblume *Trollius*.
Engelwurz *Angelica* u. *Archangelica* (Erzengelw.), auch *Gentiana cruciata* (Sibyllen-).
Englisches Gewürz *Myrtus Pimenta*.
Englischer Spinat *Rumex Patientia*.
Entwin (Gicht- od. Zaunrübe) *Bryonia*.

- Enzian** (weisser) *Laserpitium latifolium*.
Erdbeerbaum *Arbutus* u. *Benthamia*.
Erbürne (Topinambur) *Helianthus tuberosus*.
Erde (japanische) *Mimosa Catechu* (Terra s. Succus Catechu Offiz.).
Erdeichel *Arachis hypogaea* u. *Laethyrus tuberosus*.
Erdkastanie *Carum* s. *Bunium Bulbo-castanum*.
Erdmandel *Cyperus esculentus*.
Erdmänse s. *Erdeichel*.
Erdnuss s. *Erdeichel* u. *Voandzoua* s. *Glycine subterranea*.
Erne *Lavatéra*.
Escaiol = breitblättr. Endivie.
Eschlauch (Schalotte) *Allium ascalonicum*.
Esdragon s. Dragon.
Esparterogras (Halfa) *Macrochloëa*.
Esicot (Schusserbaum) *Gymnocladus*.
Essigbaum (Essig- od. Hirschkolbe) *Rhus typhina*.
Essigrose (Zucker-) *Rosa gallica*.
Espeln (welsche) *Azarölus*.
Estragon s. Esdragon.
- Faamblätter** (Bourbonthee) *Angraecum*.
Fadenblatt *Zannichellia*.
Fadenseide (Flachsseite) *Cuscúta*.
Fallkraut *Arnica montana*.
Faseln *Dolichos* u. *Phaseolus* (Bohne).
Fassholz *Bauhinia*.
Faulbrand (Schmier-) *Urēdo sitophila*.
Federharzbaum s. Caoutschukb.
Feigbohne *Lupinus* u. *Thermopsis* s. *Podalyria* (Fuchsbohne).
Feigwurz (Feigwarzenkr.) *Ficaria ranunculoides*.
Feinchen (Feinstrahl) *Stenactis*.
Felbrich (Gilbewiderich) *Lysimachia*.
Feldohmkraut *Aphänes arvensis*.
Feldsalat (Nisschen, Nissel etc.) *Fedia* s. *Valerianella olitoria*.
Feldspinat *Blitum bonus Henricus*.
Fenzelholz *Laurus* *Sassafras*.
Fennich *Panicum* u. *Setaria* (Borsstengras), welscher F. *Panicum italicum*.
- Fernambukholz** *Caesalpinia echinata*.
Festblume *Ketmia roséa*.
Festholz (Wagen-) *Visnea mocanera*.
Fettbaum *Sapium*.
Fettmännchen od. **Schmalzkraut** s. *Feldsalat*.
Feuerblume (Klatschrose) *Papaver Rhoeas*.
Feuerkraut (Herba ignis Offiz.) *Baeomyces igniferus*.
Feuerschwamm (Zunder-) *Polyporus ignarius*.
Ficatin (Rosen-Sissuholz) *Dalbergia latifolia*.
Fieberbaum (blauer) *Eucalyptus globulus*.
Fieberholz *Swietenia febrifuga*.
Fieberkraut (Helmkr.) *Scutellaria* u. (Mutterkr.) *Matricaria Parthenium*.
Fiebernuss *Ignatia amara*.
Fieberrinde s. Chinarinde.
Fingerpilz *Verpa* u. *Xylaria* (Holzp.).
Finkensamen *Neslea*.
Fioringras *Agrostis alba* s. stolonifera.
Firmessbaum (Hindostan, Kheu) *Melanorrhœa usitata*.
Firnißsumach *Rhus Vernix*, (japan.) *Rhus vernicifera*.
Fischfänger *Piscidia Erythrina*.
Fischköerner (Kokkels-) *Anamirta Coccílus*.
Fischtöter s. Fischfänger.
Fischtöder (Fustel-, Fustik-) *Rhus Cotinus* u. *Broussonetia tinctoria*.
Flaschenbürste (Schönfaden) *Callistemon*.
Flatterose s. Essigrose.
Fleischblume *Sarcanthemum*, (Kukuslichtnelke) *Lychnis flos cuculi*.
Flieder *Sambucus*, (spanisch.) *Syringa*.
Fliegenfalle *Apoeynum androsaemifolium* u. *Dionaea*.
Fliegenholz *Quassia amara*.
Fliegenpilz (-schwamm) *Amanita muscaria*.
Flittergras (Liebes-) *Eragrostis*.
Flöhkraut *Erigérion*, (-Knöterich) *Polygonum Persicaria*, (-Alant) *Inula Pulicaria*.
Flohsamen *Plantago Psyllium* u. *arenaria*.

Flohtöter Pyréthrum.	Garttheil (Stabwurz etc.) Abrotänum.
Flutgras Glyceria fluitans.	Gauchblume Orchis militaris.
Forle (Föhre, Kiefer) Pinus silvestris.	Geferkraut Polycnémum.
Franzosenholz (Pocken-, lignum sanctum) Guayacum officinale.	Geier (Gersch etc.) Aegopodium Podagraria.
Franzosenkraut Erigéron canadense u. Galinsoga parviflóra.	Geiferwurz Pyréthrum.
Frauenbiss (Bathengel etc.) Teucrium.	Gelbbeereu (Dinte-) Rhamnus catharticus.
Frauenhaar (-gras) Gynerium, (-farm) Adiantum Capillus Veneris u. Trichománes, (Žartriet) Isolépis gracilis.	Gelbholz Caesalpinia Sappan, Rhus Cotinus, Broussonetia tinct. u. Xanthoxýlon, (Cumberland-) Virgilia, (Stachel-) Toddalia.
Frauenniuze Tanacétum Balsamīta.	Gelbkraut Reseda luteola.
Frauenstroh Galium verum (Lab-kraut).	Gelbmilcher Xanthe.
Frauenthräne Ophrys musciféra etc.	Gelbschote (chines.) Gardenia grandiflóra.
Freisankrant (Stiefmütterchen) Viola tricolor.	Gelbwurz Xanthe, Xanthorrhiza, Lilium Martagon.
Friedlos (Gilbweiderich) Lysimachia vulg.	Geleukwurz Convallaria Polygonatum.
Frieslein Tunčica.	Gerbermyrte (-strauch) Coriari myrtifolia.
Froschlattich (Laichkr.) Potamogéton.	Germsel Berterōa.
Frühmorchel (Stock-) Helvella.	Gessel (Feigwurz, s. d.).
Fuchsbohne Podaliria s. Thermopsis.	Getreidebrand Uromyces.
Fuchshirse (welsch. Fennich) Panicum italicum.	Getreiderost Puccinia graminis.
Fünfpling Spergella nodosa.	Gewürfz (engl.) Eugenia s. Myrtus Pimenta.
Fungus chirurgorum Offiz. (Bovist) Lycoperdon.	Gewürzdolle Sison Amōnum.
Fungus melitensis Offiz. (Hundsrute) Cynomorium coccineum.	Gewürznelke (-näglein) Eugenia caryophyllata od. Caryophyllus aromaticus.
Fustelholz (Fustik-) Broussonetia tinctoria.	Gichtbeere (Ahl-, Alant-, s. d.).
Futterhalueenkopf (Esparsette) Onobrychis.	Gichtschwattuun Amanita phalloides.
Futternessel Trophis s. Bucephalon.	Giersch s. Geier.
Futtertrespe Festuca gigantēa (Bromus gig.).	Giftbann s. Antschar, (surinam-scher -) Tephrosia.
Galei (Geisraute) Galéga.	Giftheil Aconitum Anthōra.
Galgaut Alpinia Galanga.	Giftlilien Colchicaceae.
Gallertflechte Colléma u. Leptogium.	Giftmischer Antidesma.
Gallertmoos s. Caraghen.	Giftstiller (-mischer, s. eb.).
Gambianuss (Erdmandel) Arachis hypogaea.	Gifttäubling (Speiteufel) Russula emetica.
Gambirstrauch Nauclea Gambir u. Uncaria.	Giftwicke Coronilla varia.
Gambohanf Galphimia Hibiscus.	Gilkraut Glaucium.
Gamsennach Azalea procumbens.	Gilbwurz Amōnum Curcūna, Asphodélus.
Ganiterbaum Elaeocarpus.	Gilgen (Kraftblume) Pancratium.
Gänserich (Gänsekr.) Potentilla anserina.	Gillen Anthēmis.
Gartenrapunzel Oenothēra biennis.	Gilzgras Sesleria.
	Ginsengwurzel (Panacee) Panax Ginseng.
	Gletsch (Wachtelweizen) Melampyrum.
	Glinze Ranunculus.
	Glockenheide Erīca carnea, Tetrālix etc.

- Glockenrebe** Cobaea scandens.
Glotzblume s. Engelsblume.
Glucke Sparassis crispa.
Götzenholz Kigelia.
Goldbart Pollinia gryllus.
Goldorange Aucuba japonica.
Goldwurz (Schöllkr.) Chelidonium, (Türkenbund) Lilium Martagon.
Gonne (Gänsekresse) Arabis.
Gottheil Prunella, (Gnadenkr.) Gratiola offic.
grains d'Avignon Rhamnus infectorius.
gramen majus Offiz. (Sandsegge) Carex arenaria.
Granatillbaum Croton Tiglum.
gramum Paradisi Offiz. Amomum gr. Par.
Gränke (Torfheide) Andromeda.
Grante Arctostaphylos (Bärentraube).
Grasgummibaum Xanthorrhoea arborea.
Grasrost s. Getreiderost.
Graswurzel (Quecke) Tritium repens.
Greisenbart Tillandsia.
Greiskraut Senecio u. Erigeron.
Grenadillen Passiflora edulis u. quadrangularis.
Grenadillenholz Xylocarpa Granatum.
Grete (faule) Sium Falcaria (Falc. Rivini).
Greusel (Flutquendel) Montia.
Griesholz (blaues Sandel-) Guilan-dina.
Grieswurz Cissampelos Pareira (P. brava).
Grindkraut (-rose) Scabiosa.
Grindwurz (Sauerampfer), Rumex Acetosa.
Guakobauu (Stinkapfel) Crataeva gynandra.
Guatemalagras s. Teosinte.
Guernsey-Lilie Nerine s. Amaryllis sarniensis.
Guianagras Pariana.
Guiana-Seifenbaum Talisia.
Gujavenbaum (Guy-, Kuj.-) Psidium.
Guineagras (gross. Fennich) Panicum maximum.
Guineakorn s. Durrha.
Guineapfeffer Hablitzia (Habzelia).
Gummi animae Offiz. Hymenaea Courbaril.
- Gummi arabicum** Off. Mimoso nilotica W. u. Acacia arab., gummi-féra etc.
Gummibaum Ficus elastica u. australis.
Gummiguttbaum (gummi guttae Offiz.) Stalagnites cambogioides u. Hebradendron.
Gummiguttstrauch Vismia.
Gummi Kino Pterocarpus senegalensis.
Gummilaechbaum Ficus religiosa u. Aleurites laccifera.
Gummi Myrrae (Myrrhe) Amrys Kataf.
Gummi (Senegal-) Acacia senegalensis W.
Gummi-Traganth Astragalus creticus.
Gundram (-tram, Gundermann) Glechoma.
Gurkenbaum Parmentiera.
Gurkenkraut Borago officinalis.
Gutta-Gambir Nauclea Gambir.
Gutta-Pechra Isonandra Gutta.
Guyavebaum s. Gujavenbaum.
- Haargurke** (Stichling) Siccos angulata.
Haberwurz (Hafer-) Scorzonera u. Tragopogon.
Habichtspilz (Hirschschwamm) Hydnus imbricatum.
Hadžilidj-Gewürz Balanites aegyptiaca.
Hagedorn (Hagen) Crataegus oxyacantha.
Halde (Flutstengel etc.) Zannichellia.
Halfa (Espartero) Macrochloa tenacissima.
Hallimatsch Armillaria mellera.
Hainmuelswöhre (Pastinak) Pastinaca sativa.
Hanf (virginischer) Acnida cannabina.
Hanfblume Phelipaea s. Orobanche.
Hanfuessel Urtica cannabina u. Gallospis Tetraphit.
Hauftod s. Hanfblume.
Harfenstrauch (Mottentod) Plec-tranthus.
Harmelraute Peganum Harmala.
Harkraut (Bruch-) Herniaria.
Hartholzbaum (Hopfenbuche) Ostrya.
Hartriegel Cornus u. Ligustrum.

- Härtling** Hypoxis.
Harzlilie Xanthorrhoea.
Haschisch (Molak) Cannabis sativa.
Hasenglöckchen Endymion s. Agraphis.
Hasenkohl Oxalis Acetosella.
Hasenpfötchen Trifolium Lagopus.
Haspel (Meerzwiebel) Scilla.
Hechel Scandix, (Hau-) Ononis.
Hederich Raphanistrum, Erysimum u. Sinapis arvensis.
Heidecker (-egger) Tormentilla.
Heilglücklein Cortusa Mattheoli.
Heiligenpflanze Artemisia Santolina.
Heilwurz Athamanta Libanotis.
Heister (fr. hêtre) Carpinus.
Hemlockstanne (Schierlings-) Abies Tsuga.
Henna (Alhenna, s. d.).
Herkuleskolben Treisia clava, (-keule) Lagenaria vulg. var. clavata.
Herlitze (Durlitze, Cornelkirsche) Cornus mas.
Hermel Anthémis.
Herrnpilz s. Edelpilz.
Herz (thränendes, -blume) Dicentra s. Dielytra u. Capraria s. Teedia.
Heuschreckenbaum (Locust-) Hymenaea Courbaril, (s. g.) Robinia Pseud-Acacia.
Hexenzwirn Lycium barbárum, (-strang, Teufelszwirn) Clematis Vitalba.
Hickorynussb. Carya alba, amara etc.
Himmelfahrtsblume Gnaphalium dioicum.
Himmelsleiter Polemonium coeruleum.
Himmelsschlüssel Primula veris.
Hirschbrunst Elaphomyces.
Hirschschwamm s. Habichtspilz.
Hirsengras Holeus Sorghum u. Milium.
Hirtennadel (Reiherschnabel) Erodium cicutarium.
Hirundinaria Offiz. = Cynanchum Vineotoxicum.
Hisparilla Ernodéa.
Hockenblatt Streptopus amplexifolius.
Hohllauch (Winterzwiebel) Allium fistulosum.
Hohlwurz Corydalis cava u. Aristochia.
Holzapfel (neuholl.). Xylomélum.
Holzbalsam Xylosma.
Holzblatt Xylophylla.
Holzpilz Xylaria.
Honigapfel (Johannis-) Malus praecox Pall.
Honigblume Melianthus major etc.
Hörlitze s. Herlitze.
Hornbaum (Hainbuche etc.) Carpinus Betulus.
Hornfruchtstrauch Thamnëa.
Hornschwinger Ceratochloa s. Bromus unioloides.
Höswurz Gymnadenia (Orchis, Satyrium etc.).
Hundebeere Lonicéra nigra.
Hundetrage (Gundelrebe) Glechoma hederacea.
Hundsgras (Knaul-) Dactylis.
Hundskohl Apocynum u. Mercurialis Cynocrambe s. perennis.
Hundswolle (-würger) Apocynum.
Hundswurz Anacamptis pyramidalis.
Husarenknopf (Parakresse) Spilanthes.
Hygrometer-Griffel Erodium gruinum.

Jakobslauch (Winterzwiebel) Allium fistulosum.
Jakobslilie Sprekelia formosissima.
Jakobsstab Asphodelus lutèus.
Jakobszwiebel (-lauch, s. d.).
Jagarzucker (-palme) Borassus flabelliformis.
Jamaika-Pfeffer Myrtus Pimenta.
Jambusenbaum Eugenia Jambos.
Jasmin (deutsch.) Philadelphus Coronarius, (Cap-) Gardenia florida, (Carolina-) Gelsemium.
Javabalsam Protium javan. (Amýris Protium).
Jehovahblümchen Saxifraga punctata u. umbrosa.
Je länger je lieber (Geisblatt) Lonicera Caprifolium.
Jerichorose Anastatica hierochuntica.
Jerusalemblume Lychnis chalcedonica.
Jerusalempflaume (violette) Prunus domestica var.
Jesuitenpulver (Chinarinde) Cinchona off.
Jesuitenthee Chenopodium ambrosioides.

Ignane (Yamswurz) <i>Dioscoréa alata</i> .	Kajaputölb. s. Cajaput.
Ignatiusholme <i>Strychnos Ignatii</i> .	Kalabasse s. Calabasse.
Ilmenbaum (Feldilmie) <i>Ulmus campestris</i> .	Kalliaturholz <i>Pterocarpus Draco</i> .
Immergrün (Sinn-) <i>Vinca</i> , (Steinbrech-) <i>Aïzoon</i> , (- kriechendes) <i>Epigaea repens</i> .	Kalo (Tarlo) <i>Colocasia</i> , <i>Caladium esculentum</i> .
Immerschön (Sand-) <i>Helichrysum s. Gnaphalium arenarium</i> .	Kameelheu (Blumenbinse etc.) <i>Butomus umbellatus</i> .
Immortelle <i>Gnaphalium</i> , <i>Helichrysum</i> , (Strohbl.) <i>Xeranthemum</i> , (rote) <i>Gomphrena</i> .	Kampher (Kamfer) <i>Laurus</i> s. <i>Persea Camphöra</i> .
Indig (echter) <i>Indigofera</i> , (deutsch.) <i>Isäts tinctoria</i> , (roter, s. g. <i>Persio</i>) <i>Lecanöra tartaræa</i> .	Kandel (Teichrose) <i>Nymphaea</i> .
Insektenpulver (pers. etc.) <i>Pyréthrum roséum</i> .	Kaneelzimmet <i>Winterania Canella</i> .
Instrumentenholzb. <i>Maurocenia</i> .	Kannenkraut <i>Equisétum arvense</i> .
Johannisblutkr. <i>Scleranthus perennis</i> .	Kanonenbaum <i>Cecropia</i> .
Johannisbrot s. <i>Sodbrot</i> .	Kaoutschukb. s. <i>Caoutschuk</i> .
Johannislauh s. <i>Hohllauch</i> .	Kappengras <i>Zizania</i> .
John (langer) <i>Tripláris americana</i> .	Kapperu <i>Capparis</i> , (deutsche) <i>Caltha palustris</i> .
Irländisches Moos s. <i>Caraghen</i> .	Kapura (Sumatra-Kampher) <i>Dryobalanops Camphora</i> .
Juckhaarbohne <i>Dolichos pruriens</i> (<i>Strizolobium</i>).	Kapuzinerpilz <i>Bolétus scaber</i> .
Judasbaum <i>Cercis Siliquastrum</i> .	Karambolabaum <i>Averrhoëa</i> .
Judasolrh <i>Exidia auricula Judae</i> .	Kari - kari (Beissbeere) <i>Capsicum annuum</i> .
Judenbart <i>Diptéra sarmentosa</i> .	Karse <i>Lepidium</i> .
Judendorn <i>Zizýphus Lotus</i> u. <i>Jujuba</i> , auch <i>Rosa canina</i> .	Kartoffelboivist <i>Scleroderma</i> .
Judemanna <i>Alhagi</i> .	Kartoffelfäule <i>Fusisporium solani</i> .
Judemuss <i>Staphyléa pinnata</i> .	Kartoffelkrankeit (Trockenfäule) <i>Peronospóra infestans</i> s. <i>effusa</i> .
Judemappel <i>Kerria japonica</i> .	Kartoffelkrätze <i>Protomycës solani</i> .
Jujubenbaum (-dorn) <i>Zizýphus Jujuba</i> .	Kasi-kari (Speise) s. <i>Kari-kari</i> .
Jungfernkrant (s. g. Metterich) <i>Matricaria Parthenium</i> .	Kassavi s. <i>Cassavebrot</i> .
Jungfernmilch-Pfl. <i>Benzoïn officinalis</i> .	Kastoröl <i>Ricinus communis</i> .
Jungfernrebe (-wein) <i>Ampelopsis quinquefolia</i> .	Katechu (vgl. japan. Erde) <i>Arēca Catechu</i> .
Jüngling <i>Athanasia</i> .	Katzenbaldrian <i>Valeriana officinalis</i> .
Jute <i>Cörchorus textilis</i> s. <i>capsularis</i> u. <i>olitorius</i> , auch <i>Hibiscus s. Abelmoschus tetraphyllum</i> .	Katzeneier <i>Bovista</i> (<i>Lycoperdon</i>).
Juvia-Nüsse (bras., Rahm-) <i>Bertholletia excelsa</i> .	Katzenklee (Hasenpfötchen, s. d.).
Iva (Alpenbitter) <i>Achilléa moschata</i> .	Katzenkorn (Mäusegerste) <i>Hordëum murinum</i> .
Ivenblatt <i>Melissa officinalis</i> .	Katzenkraut (-gamander) <i>Teucrium Marum</i> , auch <i>Nepëta Cataria</i> .
Ixiole <i>Trichonéma</i> .	Katzenpötchen <i>Gnaphalium</i> s. <i>Antennaria</i> (<i>Pes Cati</i>).
Küsebaum <i>Bombax</i> .	Katzensteert <i>Equisétum arvense</i> .
Kahn <i>Ulvina</i> .	Katzenträubling <i>Sedum acre</i> (<i>Vermicularis</i>).
Kaiserling (-sehwamm) <i>Amanita caesarea</i> .	Kaublattbaum <i>Erythroxylon Coca</i> .
	Kaupflanze s. ABC-Pfl.
	Keileken (Holder) <i>Sambucus nigra</i> .
	Kelchblumenstrauch <i>Calycanthus</i> .
	Kelke <i>Tofieldia</i> .
	Kelp <i>Fucus serratus</i> etc.
	Kerbelpföhre <i>Chaerophyllum bulbosum</i> .
	Kerbuzel (Gemüse-Portulak) <i>Portulaca oleracea</i> .

- Kermesbeere (-saft, granum u. sucus Chermes Offiz.) *Quercus coccifera* (Kermeseiche).
- Kermesspinat *Phytolacca esculenta*.
- Kern-Eisenholz *Metrosideros*.
- Kettenhülse (Schnur-) *Sophora japonica*.
- Keulenbaum *Casuarina* u. *Scyphelia*.
- Keuschlamm *Vitex agnus castus*.
- Kicher (-erbse) *Cicer*, *Lathyrus* u. *Orbopus*.
- Kiebitzei *Fritillaria Meleagris*.
- Kiebitzfett *Pinguicula*.
- Kiekbeere (Galle) *Juniperus communis*.
- Kieselholz (Antillen-) *Acacia Sideroxylon*.
- Kilte (Nachtviole) *Hespéris*.
- Kino (-Gummi) *Drepanocarpus* s. *Pterocarpus senegalensis*. (*erinaceum*) u. *Orucaria*, (*Kinobaum*) *Eucalyptus resinifera*.
- Kirsche (amerik.) *Malpighia glabra*, (*Kirschpflaume*) *Prunus cerasifera* (*Myrobalanus Hort.*).
- Klasper (Täschelkraut) *Thlaspi*.
- Klätertopf (Klapper) *Rhinanthus* s. *Alectorolophus*.
- Klebe (Krebsdistel) *Onopordum*.
- Kleberich (Pechnelke) *Viscaria (Lychnis V.)*.
- Kleber (Klebkraut) *Galium Aparine*.
- Klebglocke *Eutoca viscida* (*Cosmanthus v.*).
- Kleeseide *Cuscuta Epithymum*.
- Kleetenfel *Orobanche minor*.
- Kleiderbaum (Platan) *Platanus vulgaris* Spach.
- Kleiderbesen s. *Durrha*.
- Kleppel *Knautia* s. *Scabiosa arvensis*.
- Klettenwurzel (Spitzklette) *Xanthium*.
- Kletterrose *Atragene*.
- Klever (Honigklee) *Melilotus*.
- Klingholz *Baphia nitida*.
- Klisse s. Klettenwurzel.
- Klöwen (Klauenzwiebel) s. *Hohllau*.
- Knackbeere *Paederia*.
- Knackelbeere *Fragaria viridis* s. *collina*.
- Knebel (Mastkraut) *Sagina*.
- Knebelbart *Hugonia Mystax* u. *Aegoceratos*.
- Knoblauchbirne *Crataeva Tapia*.
- Knopfkraut *Galinsoga*.
- Knopfwurz (Kugeldistel) *Echinops*.
- Kölbel (Wiesenknopf) *Sanguisorba*.
- Kölle (Bohnenkraut etc.) *Saturaja*.
- Köhne (Schönminze) *Calamintha*.
- Königin der Nacht *Ceræus grandiflorus*.
- Königsholz s. *Tembesubaum*.
- Königsrinde s. *Chinarinde*.
- Königsstab s. *Jakobstab*.
- Königsthee *Xenopōma*.
- Kohl (caraibischer) *Caladium esculentum*, (römisch.) *Beta Cicla*.
- Kohlportulak *Portulaca oleracea*.
- Kohlrabbi *Brassica oleracea gongylodes*.
- Kohlreps *Brassica Napus* s. *campestris*.
- Kohlrübe (Erdkohlrabe) *Brassica Napus esculenta* s. *rapifera*.
- Kohlsaat (fr. colsat) s. *Kohlreps*.
- Kokkelskörner *Menispermum* s. *Anamirta Cocculus*.
- Kolbenbaum s. *Essigbaum* (*Hirschkolbe*).
- Kollerwurz (gelbe Nixblume) *Nuphar luteum*.
- Kolmar (Gauchheil) *Anagallis*.
- Kolumninfarbe *Roccella tinctoria*.
- Kopfbeere (Brechwurz) *Cephaelis*.
- Kopfkraut *Galinsoga* u. *Viborgia*.
- Köpernikel *Meum Mutellina*.
- Körfel *Chaerophyllum*.
- Kornährenholz (*Palmyra-*) *Sebipira*.
- Kosten (Ferkelsalat) *Hypochaeris*.
- Kotbaum *Comocladia*.
- Krähenauge *Strychnos nux vomica*.
- Krämelpilz *Rhymovis*.
- Kraftwurzel s. *Ginseng*.
- Krammetsbeere *Juniperus communis*.
- Kranichbeere (Moos-) *Vaccinium Oxycoccus*.
- Kratzbeere (Bocks-) *Rubus caesius*.
- Kräuselbeere (Stachel-) *Grossularia*.
- Krebswurz (Natter-) *Polygonium Bistorta*.
- Kreen (Meerrettig) *Armoracia (Cochlearia)*.
- Kreiken (Kriechen etc.) *Prunus insititia*.
- Kreissig *Barbaraea*.
- Kremling *Galorrhoeus*.
- Krempelwollpilz *Zasmidium*.
- Kren (russ. chren) s. *Kreen*.
- Krenzholz (Mistel) *Viscum*.

- Kreuzstrauch Baccharis.
 Kriechen s. Kreiken.
 Krönlein (Kronwicke) Coronilla.
 Kronsbeere (Preissel-) Vaccinium
_{vitis Idaea, (amerik.) V. Oxy-}
_{coccos.}
Kropfkraut (Braunwurz) Serophu-
_{laria.}
Krösling (Mousseron) Agaricus pru-
_{nulus s. Collybia esculenta.}
Krötengras Triglochin.
Krötenschwamm Coprinus fimeta-
_{rius.}
Krullfarn Adiantum.
Krümeling (Knorpelsalat) Chondrilla.
Krummholtz Pinus pumilio.
Krupbolue (Zwerg-) Phaseolus vulg.
_{nanus.}
Kubeben (Schwanzpfeffer) Piper
_{Cubēba.}
Kuhbaum Galactodendron utile.
Kuhblume Caltha pal. u. Taraxacum
_{offic.}
Kuhkrätze Mucūna urens.
Kuhpilz s. Edel- (Stein- etc.).
Kujavenbaum s. Gujavenb.
Kümmelraute Jamboliféra.
Kümmerling Melothria cucumerina.
Kukusblume Lychnis flos cuculi,
_{Fumaria bulbosa, Orchis morio}
_{u. a.}
Kukukskresse = Wiesenschaum-
_{kraut.}
Kukukspilz (-speichel) Spumaria.
Kukuruz (Welschkorn) Zea Mäys.
Kunigundenkraut (Wasserdost) Eu-
_{patorium.}
Kunkelrübe s. Kerbelrübe.
Kuntschut Sesānum orientale.
Kupferkeule (Kolbe) Typha latifolia.
Kurkume (Gilbwurz) Amomum Cur-
_{cūma s. Curc. longa.}
Kusso Brayera anthelmintica.
Kutte Cotoneaster.
- Lablab** Dolichos Lablab.
Lachenknoblauch Teucrium Scor-
_{donium.}
Lachenriet Scirpus s. Trichelo-
_{styles.}
Lackmus Croton tinctorium, (-flech-
_{te) Roccella tinctoria.}
Lakritzenensaft (succus Laquiritiae)
_{s. sogl.}
Lakritzenstrauch (Süssholz-) Gly-
_{cirrhīza.}
- Laetucarium** (Gift) Lactuca virosa.
Lambertsnuss Corýlus tubulosa.
Landmannus Spieknarde s. Kreuz-
_{strauch.}
Latsche (Knieholz, Krumm-, s. d.),
_{(Stechsalat) Lactuca sativa.}
Laubenbohne Teramnus.
Laubheide Clethra alnifolia.
Lauchhederich (-kraut) Alliaria
_{offic.}
Läusekörner (Kokkels-, s. d.) u.
_{Delphinium Staphisagria.}
Läusesamen (-salbe, -pulver) Verā-
_{trum Sabadilla.}
Lawrancerose (Liliput-) Rosa mi-
_{nima.}
Lazarolbirne Pirus Pollveria L.
Lebensbaum Thuja s. Biōta.
Leberbalsam Erīnus alpīnus u. Age-
_{rātum.}
Lederapfel (Rabau, Reinette etc.)
_{Pirus Malus var.}
Lederzucker (Althää-Paste) Althaea
_{officinalis.}
Leiubaum (vegetab. Leim) Com-
_{brētum obtusifolium.}
Leinwandbaum Lagetta.
Leistenholz s. Kreuzstrauch.
Lenne (Lönne, Spitzahorn) Acer
_{platanoides.}
Lettich (Huflattich) Tussilago.
Leuchterbaum Rhizopöhra Mangle.
Leuchterblume Ceropégia.
Lianen Asclepiadēae, Paulliniæ etc.
Lichte (Lichtnelke) Lychnis s. Me-
_{landryum.}
Liebe (brennende -) Lychnis chal-
_{cedonīca.}
Lieber'scher Thee (herba Galeo-
_{psidis Offiz.) Galeopsis ochroleuca}
_{s. grandiflora.}
Liebesapfel (Tomate) Solanum Lyco-
_{persicum.}
Liesch (-gras, Lische) Phleum,
_{(Blumen-, Wasser-) Butōmus,}
_{(Fass-) Sparganium, Typha u.}
_{Sagittaria.}
lignum sanctum s. Franzosenholz.
Lilak Syringa vulgaris.
Lilaschwamm Cortinarius traganus.
Liliputrose s. Lawrancerose.
Limette (Limone) Citrus medīca
_{Limetta.}
Liquiritiae (sc. radix u. succus) s.
_{Lakritzen-.}
Litschipflaume Dimocarpus Litchi.

- Locustbaum (-holz)** Hymenaea Courbaril.
- Lönne** s. Lenne.
- Lohblüte** Aethalium septicum s. flavum.
- Lontar** (Fächelpalme) Borassus flabelliformis.
- Lorbeerkrise = Kirschlorbeer** (Lauro-Cerásus).
- Lorbeermyrte** Tristania.
- Lorbeerrose** (Oleander) Nerium.
- Lorbeerschneeball** Viburnum Tinus.
- Lorbeerweide** Salix pentandra.
- Lorchel** Helvelia.
- Lotuspfl.** (ägypt. Bohne) Nymphaea Lotus, (ostind.) Nelumbium speciosum.
- Lotusstrauch** (Lotophagendorn) Zizyphus Lotus.
- Loxarinde** s. Chinarinde Cinchona offic.
- Ludwigsblume** Ketmia liliiflora Hort.
- Maba** (Ölpalme) Elaïs guineensis.
- Maba-Eisenholz** Ferreóla Maba.
- Macassarölbaum** Schleichéra trijuga.
- Maceronkraut** (Myrrhen-) Smyrnium.
- Macis** (Muskatenblume) Myristica moschata.
- Mädchenblume** s. Jungfernkraut.
- Maderaholz** (-mahagoni) Laurus indica.
- Mädesüß** Spiraea Ulmaria u. Filipendula.
- Maguayholz** Fourcroya gigantæ.
- Mägdehell** (gross.) Senecio nemorensis, (klein.) Sen. vulgaris.
- Magnatentrüffel** Rhizopogon magnatum.
- Mahagoniholz** (echtes) Swietenia Mahagoni, (falsches) s. Maderaholz, (afrik.) Khaga senegalensis.
- Maitrank** s. Waldmeister.
- Malabar-Malve** Uréna.
- Malaccabohne (-nuss)** Anacardium orientale.
- Malaguettapfeffer** Amomum Malagueta.
- Maldivische Nuss** Lodoicea Sechellarum.
- Maldenwurz** Conioselinum tataricum.
- Mammibaum** Mammea americana.
- Mammutbaum (-kiefer)** Sequoia s. Wellingtonia californica.
- Mancinellenbaum** Hippomæne Mancinella.
- Mandarin-Orange** Citrus nobilis.
- Mandarinen-Thee** Xenopoma.
- Mandelu** (grüne) Pistacia vera.
- Mandioccamehl** (Maniok)s. Cassavebrot.
- Mangofrucht (-pflaume)** Mangifera indica.
- Mangostane** Garcinia Mangostána.
- Manilahanf** Musa troglodytarum textaria.
- Maniok** Jatropha Manihot.
- Manna** (Briançon-) Larix decidua s. Pinus Larix, (-Esche) Fraxinus Ornus, (-gras, -grütze) Glyceria fluitans, (-klee, Wüstenmanna) Hedysarum Alhagi, (-Tamariske) Tamárix gallica.
- Mannabaum** Melia Azadirachtha.
- Männertreu** Omphalodes verna u. Veronica Chamaedrys.
- Manschettenpilz** Amanita vaginata.
- Marasche** (Maraschino) Cérásus acida.
- Marbel** (Hainsimse) Luzúla.
- Marienbalsamb.** Chloromýron verticillatum.
- Marienblatt** Tanacétum Balsamita.
- Marienblümchen** (Masliebchen) Bellis perennis.
- Marienglocke** s. Mariette.
- Mariengras** s. Bandgras u. Holcus odoratus.
- Marientreppchen** (Bluts-) Dianthus carthusianorum.
- Mariette** Campanula Medium.
- Markgrafenpulver** Paeonia officin.
- Marmeladendosenb.** Duroia eriopila s. Genipa Meriana.
- Maronen** (Kastanien) Castanea vesca.
- Maronenpilz** Bolétus badius.
- Maruru** Victoria regia.
- Masakna** Sorghum cernuum.
- Maskenblume** Mimulus.
- Mastixb.** Pistacia Lentiscus u. Schinus Molle.
- Mastixkraut** (Katzen-) Teucrium Marum.
- Mate** (Paraguay - Thee) Ilex paraguaiensis.
- Maulbeerfeige** Ficus Sycomorus.
- Maulwurfskraut** Euphorbia Lathyrus.

- Mäusedarm** (Vogelmeier) *Stellaria media*.
- Maye** (Wasser- od. Ruchbirke) *Betula odorata*.
- Meccabalsam** *Amýris Balsamodendron Opobalsánum*.
- Mechoacannawurz** *Convolvulus Mechoacanna*.
- Meergras** (Mooskraut) *Selaginella*.
- Meerhirse** *Lithospermum*.
- Meerlattich** (s. g. Watt) *Ulva lactuca*.
- Meerwatt** *Bryopsis*.
- Megelkraut** (Bibernelle) *Poterium Sanguisorba*.
- Mehlbeere (-birne)** *Sorbus Aria*.
- Mehlkraut** (Wiesenkönnigin) *Spiraea Ulmaria*.
- Mehltau** *Erysíbe communis*.
- Meier** (Meierich, -kraut) *Stellaria media*, (Waldmeister) *Asperula odorata*.
- Meister Asperula**.
- Meisterwurz** *Astrantia major u. Imperatoria*.
- Melonenbaum** *Carica Papaya*.
- Menderle** *Eranthémum*.
- Merian-China** *Meriana s. Tocoyéna*.
- Meteorpapier** *Conferva rivularis*.
- Meter** *Melissa*.
- Metterich** s. Jungfernkraut.
- Miere** (rote) *Alsíne rubra* etc., (Vogel-) *Stellaria media*.
- Milchbaum** s. Kuhbaum.
- Milchbuschsalat** *Taraxáicum offic.*
- Milchglöckchen** *Leucojum vernum* u. *Campanula rotundifolia*.
- Millgras** (Hirse) *Milium*.
- Milzwurz** *Blechnum Spicant*.
- Mirabelle** *Prunus syriaca*.
- Mohar** (Guineagras, s. d.).
- Mohrrhirse** s. Durrha.
- Molak** s. Haschisch.
- Moltebeere** *Rubus Chamaemórus*.
- Moluchiagewürz** *Cochrorus olitorius*.
- Molukken-Croton** *Croton Tiglium*.
- Mombinflaume** *Spondias s. Myrobálanus Mombin*.
- Monatsrose** *Rosa damascéna* s. semiperförens.
- Mönchs-Khabarber** *Rhēum rhaponticum*.
- Mongrovebäume** *Rhizophoréae*.
- Monke** (Schafrapunzel) *Jasiöne*.
- Moorkönig** (Läusekraut) *Pedicularis palustris*.
- Moorsimse** *Rhynchospóra*.
- Moos** (amerik.) *Tillandsia*, (isländ.) *Cetraria*, (schwed.) *Lecanora tatar.*, (indisch.) *Moxa*.
- Moosbeere** *Vaccinium Oxycoccos u. macrocarpum*.
- Mooskraut** s. Meergras.
- Morelle** s. Marasche.
- Morgenblatt** s. Marienblatt.
- Morgenrösehen** *Siléne Armeria*.
- Moscatello** *Cucúmis Melo var.*
- Moschusblume (-pflanze)** *Mimulus moschatus*.
- Moschuskraut** *Adoxa moschatellina*.
- Moschuswurz** (Sunn) *Sumbulus moschatus*.
- Mostrich** (fr. moutarde) *Sinápis nigra* etc.
- Mottenkönig (-tod)** *Plectranthus s. Ocimum*.
- Mottenkraut** *Chenopodium Botrys*, *Ledum palustre*, *Tinearia s. Hellichrysum creticum*.
- Moxa** (Hüftwolle d. Japanesen) *Artemisia vulg.*
- Müllen** *Vitex*.
- Mummel** (Nixblume) *Nuphar*.
- Mundubi** *Aráchis hypogaea*.
- Münzkraut** (Pfennig-) *Lysimachia Nummularia*.
- Muscardine** (Seidenraupenpilz) *Botrytis Bassiana*.
- Muskatnuss** *Myristica moschata* s. officin.
- Muspflanze** s. Moluchiagewürz.
- Musseron** (Krösling, fr. mousseron od. muceron) *Agaricus prunulus* (*Collybia esculenta*).
- Mutterkorn** (*Secále cornutum* Offiz.) *Sclerotium clavus*.
- Mutternelke** (Gewürz-) *Caryophyl-lus aromaticus* s. *Eugenia Caryophyl-lus*.
- Mutterwurz** *Ostericum palustre* (*Angelica pratensis*) und *Méum*.
- Myrrhenkraut** *Smyrnium perfoliatum* s. *Dioscoridis*.
- Myrrhenstrauch (-Gummi)** *Amýris Kataf* s. *Balsamodendron myrrha* Ehrbg.
- Nabelkraut** *Omphalodes u. Coty-lédon Umbilicus*, auch *Hydroco-tyle*.
- Nachthyazinthe** (Tuberós.) *Polianthes tuberosa*.
- Nagasbaum** (ceyl. Eisenholz) *Mesua ferrea*.

- Nagelbohne** Dolichos u. Unguicularia.
- Nagelkraut** Hieracium Pilosella, Paronychia u. Polycarpon.
- Näglein** Syringa, (Gewürz-) s. Mutternelke.
- Nanibaum** (asiat. Eisenholz) Metrosidēros vera.
- Nanking - Baumwolle** Gossypium religiosum.
- Napoleonsweide** (Trauer-) Salix babylonica.
- Nardoo** (Nahrung d. Neuholländ.) Marsilea salvatrix.
- Natte** mehrere Kirschensorten.
- Negerkorn** (Mohrhirse) s. Durrha.
- Nelkenöl** s. Mutternelke.
- Nelkenpfleffer** (Jamaika-, s. d.).
- Nepenthe antiquorum** s. Haschisch.
- Nepte** Nepēta.
- Neroli-Öl** (oleum neroli Offiz.) Citrus aurantium (flores).
- Nesselthee** (obsol.) (flores Urticæ mortuae Offiz.) Lamium album.
- Neunkraft** (Pestilenzwurz) Tussilago Petasites L.
- Nicke** (Nicksalat) Prenanthes.
- Niesekraut** Ptarmica.
- Nil-Lilie** Nelumbium speciosum.
- Nimbobaum** Oléa malabarica.
- Nissel** (Nisschen etc.) s. Feldsalat.
- Nixblume** s. Mummiel.
- Nixkrant** Najas.
- Nolde** Sherardia.
- Nopal** Cactus Opuntia (Op. coccinellifera).
- Norfolkſichte** Araucaria excelsa.
- Nusskiefer** (Pinie) Pinus Pinéa.
- Oea (Oka)** Oxalis tuberosa.
- Ochsenauge** (Wiesen - Wucherbl.) Chrysanthemum Leucanthemum.
- Ochsenbrot** Theobroma s. Bubroma Guazuma.
- Ohmkraut** Alchemilla Aphanes L.
- Oleaster** (Ölweide) Elaeagnus.
- Olibanum** (Weihrauch-Wachholder) Junipérus lycina L.
- Ölbeerbaum** = Traubenkirsche, Prunus Padus.
- Ölnuss** (Butter-) Juglans cinerea.
- Ölsenich** Peucedanum palustre s. Thysselinum (Selinum) pal.
- Ölweide** s. Oleaster.
- Opfersilje** s. Ölsenich.
- Opium** Papaver somniferum.
- Orakelblume** Thespis.
- Orseille** (-Erde) Lecanora parella, (Lackmus-) Roccella tinctoria.
- Osagendorn** (-orange) Maclura aurantiaca.
- Oschar** Calotropis procera.
- Osterblume** (weisse u. gelbe) Anemone nemorosa u. ranunculoides, u. Narcissus Pseudo-Narc.
- Ostheimer** Kirsche Prunus Chamaecerasus.
- Ostritz** (Meisterwurz) Imperatoria.
- Oswego-Thee** Monarda didyma.
- Otterwurzel** = Natterwurz Polygon. Bistorta.
- Ottig** s. Kunigundenkraut.
- Oxelbirne** Sorbus intermedia s. scandica.
- Pack-Choi** (Schangton-Kohl) Brassica chinensis var.
- Packmoos** s. amerikan. Moos = Tillandsia.
- Padmapflanze** s. Nil-Lilie.
- Päde** (Quecke) Triticum repens.
- Palisanderholz** Jacaranda brasiliensis.
- Pallisadenholz** Camax fraxinæ.
- Pallisadenpalme** Euterpe.
- Palmgras** s. Baumbinse.
- Palmililie** Yucca.
- Palmweide** (Sohl-) Salix caprea.
- Palmryaholz** Sebipira.
- Pampasgras** (Frauenhaar) Glycerium argenteum.
- Panacee** s. Ginsengwurzel.
- Panamaholz** (-rinde) Quillaja saponaria.
- Panke** Panke tinctoria.
- Pantoffelblume** Cypripedium Calceolus.
- Pantoffelholz** Quercus Suber.
- Pantöffelchen** Calceolaria u. Aquilegia.
- Papageiholz** Fissilia psittacorum.
- Papau** Asimina.
- Papierblume** Xeranthemum annuum.
- Papierlilie** Papiria s. Gethyllis.
- Papierstrauch** (ostind.) Scaevola.
- Pappelrose** (Rosenpappel) Althaea rosea u. Malva Alcæa.
- Paprika** (span. Pfeffer) Capsicum annuum.
- Paradiesapfel** s. Liebesapfel, (Johannispfälz) Pirus Malus praecox.
- Paradiesblume** Melia Azederach.

- Paradiesfeige** s. Banane.
- Paradieskörner** Amōnum granum paradisi.
- Paraguay-Thee** s. Mate u. Cassīne Gongonha.
- Parakresse**(Fleckblume) Spilanthes.
- Parasolpilz** Agaricus s. Lepiōta procēra.
- Pareira brava** Offiz. s. Grieswurz.
- Parnuaine** = Reinettenapfel.
- Passecarne-Gemüse** Lacis foeniculacēa.
- Pasteke** (Wassermelone) Cucūmis Citrullus.
- Pasternak** s. Balsternaken (Pastinak).
- Paternosterbaum** (-erbse) Melia Azedarach u. Epicharis Blum., (-strauch) Abrus precatorius u. Cedrela, auch Osteospermum.
- Patschouly** Pogostēmon Patchouly.
- Pavettastrauch** Rutidēa coriacēa.
- Pecco-Thee** Thea sinensis Sims
- Pechtanne** (Edel- etc.) Abies pectinata.
- Peitschencaetus** (Schlangen-) Cerēus flagelliformis.
- Peltsche** Coronilla Emērus.
- Pelzsame** Tarchonanthus.
- Pentaphyllum** Offiz. = Potentilla reptans.
- Peperlepeh** s. Kerbelrübe.
- Pepperling** (Milchpilz) Galorrhoeus.
- Perdrigon** (Damastpflaume) Prunus domestica var.
- Perette** Citrus Limetta.
- Perlenschwamm** Amanita rubescens.
- Perillauch** (-zwiebel, Porrée) Allium Porrum.
- Perlmoos** s. Caraghen.
- Persio** (roter Indig) Lecanōra tarācea.
- Pernbalsam** Myroxylōn perufērum.
- Peruspinat** Chenopodium Quinoa.
- Pestileuzwurz** (Pest-) Tussilago Petasites.
- Peterskorn** (Ein-) Triticum monococcum.
- Peterskraut** (Wand- etc.) Parietaria.
- Petersilje** (Pedarsil Karl's d. Gr.) Petroselinum sativum.
- Peterstrauch** (Schnee- od. Wachsbeer-en-) Symphoria s. Symphoricarpus.
- Petsai** (Schangtonkohl) Brassīca chinensis.
- Pfaffenkappe** (Kapuzinerkresse) Tropaeolum.
- Pfaffenkind** Arum maculatum.
- Pfaffenschuh** (Frauen-) Cypripedium Calceolus.
- Pfahlrohr** Arundo Donax.
- Pfauengerste** Hordēum Zeocrithon.
- Pfēbe** (Melone) Cucūmis Melo.
- Pfefferbaum** (Klosterpfeffer) Vitex agnus castus.
- Pfefferkraut** (Bohnen-) Saturēja, (Kresse) Lepidium.
- Pfefferling** (Pfifferling) Merulius Cantharellus, Bolētus piperatus u. Galorrhoeus.
- Pfefferriesel** (Pfaffenhütchen) Evox̄mus.
- Pfefferstrauch** (Kellerhals etc.) Daphne Mezereum.
- Pfefferwurz** (Kalmus) Acōrus Calamus.
- Pfeifenbinse** Molinia coerulea.
- Pfeifeukopfstrauch** Aristolochia Siphon.
- Pfeifenstraneh,** s. eb. u. Philadelphus Coronarius.
- Pfeilgift** (Wurare) Paullinia s. Cururu scandens.
- Pfeilrohr** s. Pfahlrohr.
- Pfeilwurz** (arrow - root) Maranta arundinacea.
- Pfennigkraut** Thlapsi arvense, (Münz-) Lysimachia Nummularia.
- Pferdebohne** Vicia Faba minor.
- Pferdesaat** Oenanthe.
- Pfifferling** s. Pfefferling.
- Pfingstrose** (Putennie, Gichtrose) Paeonia officinalis.
- Pflaumenpilz** Clitopilus.
- Pichurienbohne** Nectandra Puchury.
- Pilau** (Reis) Orȳza sativa.
- Pilgerflasche** Lagenaria var. Gurda.
- Pillenbaum** Cleome.
- Pinanguuss** Arēca Catēchu.
- Piniennuss** Pinus Pinēa.
- Pinke** (Nelkengras) Statice Armeria.
- Pisang** s. Banane.
- Pium** (neuseeländ.) Dacrydium cupressinum.
- Pockenholz** s. Franzosenholz.
- Pockenwurzel** Smilax China.
- Pohon Upas** s. Boa od. Bohon Upas.
- Pollerblattb.** Trachytella aspēra (Calligonum asp.).

- Polstermoos** s. amerik. Moos, Til-
landsia.
- Pomaeocoholz** (Cayenne-Eisenholz)
Swartzia tomentosa.
- Pomadenkraut** *Unxia camphorata*.
- Pompelmus** (*Pumpelmus*) *Citrus decumāna*.
- Pomponrose** (Provencer-) *Rosa centif.* var. *provincialis* Mill.
- Ponceau** (Klatschrose etc.) *Papāver Rhoeas*.
- Porrée** *Allium Porrum*, vgl. Perl-
lauch.
- Porselein** *Honckenya s. Halianthus peploides*.
- Portulakspinat** *Sesuvium*.
- Porzellanbaum** *Portulacaria*.
- Porzellanblümchen** *Saxifraga umbrosa*, (-blume) *Hoya carnosa*.
- Porzellanthee** *Lithospermum officinale*.
- Prairiegras** *Spartina cynosuroides*.
- Prairierose** *Rosa setigēra* Mehx.
- Preissel** *Vaccinium*.
- Preisselbeere** *Vacc. vitis Idaea*.
- Prescott** s. *Cantaluppe*.
- Presiljenkraut** *Ocimum*.
- Pressheide** *Sympīza*.
- Priestley's Materie** *Protococeus viridis*.
- Puffbohne** *Vicia Faba* (F. *vulgaris*).
- Pulque** (Getränk aus d. Gipfel-
sprosse) *Agave mexicana*.
- Pulverflasche** *Lagenaria vulg.* var. *pyrothēca*.
- Pulverholz** (Faulbaum) *Rhamnus Frangula*.
- Pumpelmus** s. *Pompelmus*.
- Purgierbaum** *Croton Tiglium*.
- Purgierkörner**, s. eb.
- Purgierkraut** (Gnaden-) *Gratiola officinalis*.
- Purgiernuss** *Glycine subterranea*.
- Purgierpflaume** *Spondias Myrobālans*.
- Purgierraute** *Crowea latifolia*.
- Purgierstrauh** *Daphne s. Thy-
melaea*.
- Purgierwinde** *Convolvulus Scammonia*.
- Purpurrose** s. *Essigrose*.
- Putennie** s. *Pfingstrose*.
- Quantel** *Amelanchier*.
- Quecke** (Queckengras) *Triticum repens*.
- Quellenbaum** *Phytocrēne gigantēa* etc.
- Quellgras** *Catabrosa s. Glyceria aquatica*.
- Quellmoos** (Hüll-) *Fontinalis*.
- Quercitronholz** *Quercus discolor s. tinctoria*.
- Quinoapflanze** s. *Peruspinat*.
- Quinquina Piton** *Cinchona floribunda*.
- Quitscheren** (Quitze, Vogelbeere)
Sorbus Aucuparia.
- Quittenmispel** *Cotoneaster vulgaris*.
- Rabau** s. *Lederapfel* = Reinette.
- Radieschen** *Raphānus sativus Radiola*.
- Raffel** (Nelkenwurz) *Gēum urbanum*.
- Rahle** = Raden *Agrostemma Githago*.
- Rahle Teesdalēa**.
- Rahmapfel** (Flaschen-) *Anona*.
- Rahmbeere** (Bocks-) *Rubus caesius*.
- Rahmnüsse** (brasil.) *Bertholletia excelsa*.
- Rambourapfel** = Reinette u. Pfund-
apfel.
- Ramée** (Ramie, engl. Chinagras)
*Boehmeria utilis s. Catūrus rami-
florus*.
- Rampe** (Rempe etc.) *Diplotaxis*.
- Rampen** (Knoblauchskraut) *Alliaria officinalis*.
- Ramsch** (Bärenlauch) *Allium ur-
sinum*.
- Ramsel** *Polygala*.
- Ramselwurz** s. Rampen.
- Rande** *Linnaea*.
- Ranunkelstrauh** *Kerria japonica* (Corchorus jap.).
- Rapontika** s. *Rhapontikwurzel*.
- Raps** (Reps, Rüb- od. Kohlsaat)
Brassīca Napus.
- Rapünzchen** (Rapünzchen) s. Feld-
salat.
- Rapunzel** *Phyteuma, Fedia s. Vale-
rianella u. Campanula Rapunculus*.
- Raspelbaum** *Flindersia*.
- Raspelstrauch** *Tetracēra*.
- Rasselblume** *Catananche coerulea*.
- Rasselbüchse** *Hura crepītans*.
- Rasselhülse** *Psophocarpus*.
- Rasselnuss** *Hernandia sonōra*.
- Ratanhiawurzel** *Krameria triandra*.
- Rauhbeere** (Rauch-) *Ribes Grossularia*.

- Raupengras** Joachimia s. Beckmannia erucaeformis.
- Raupeenklee** Scorpīturus vermiculatus.
- Rauschbeere** Empētrum u. Vaccinium uliginosum.
- Rausehhülse** Strizolobium s. Dolichos pruriens.
- Ravennagrass** (Zucker-) Erianthus Ravennae.
- Raygras** (engl.) Lolium perenne, (franz.) Arrhenatherum, (ital.) Lolium italicum.
- Rebenpilz** (Weinstockschimmel) Oidium Tuckeri.
- Rebling** (Wildrebe) s. Jungfernrebe.
- Reelsesaft** Achillea Millefolium.
- Regenrose** (Ringel-) Calendula s. Triptēris.
- Reglise** (Althäe) Althaea officinalis.
- Reiherbusch** s. Flaschenbürste.
- Reineclaudie** Prunus insititia italicica.
- Reinette** Pirus Malus dasypylla.
- Reischker** s. Reizker.
- Reisebaum** (Wander-) Urания speciosa s. Ravelaria.
- Reisgerste** Hordēum Zeocrithon.
- Reismelde** s. Peruspinat.
- Reispapierpfl.** (chines. Reis-) Aralia papyrifera.
- Reithgras** (Schilf) Calamagrostis arundinacea s. silvatica.
- Reizker** Russula u. Galorrhoeus insulsus etc.
- Remontanterosen** Rosa hybrida Hort.
- Remontantenelke** Dianthus semper-florens.
- Rempe** (Hundsrauke) Erugastrum.
- Remse** Hutchinsia.
- Renntiermoos (-flechte)** Cladonia rangiferina.
- Resina** elastica Offiz. (Federharz) s. Caoutschuk, Res. Guajacis Ligni sancti = Guajacum off., Res. Sandarac = Thuja articulata.
- Rhabarber** (Mönchs-Rh.) Rhēum Rhaponticum.
- Rhapontikwurzel** Oenothera biennis.
- Rhodiserholz** Aspalathus Ebēnus.
- Riechkraut** Unxia camphorata.
- Riesenbaum** Adansonia.
- Riesenkanne** (Süssdolde) Myrrhis odorata.
- Riet** (Riedgras) Carex, Riet Heleo-
- chāris u. Scirpus, (Rieth, Schilfrohr) Phragmites.
- Rindgras** (Vieh-) Poa.
- Rindsgift** Bucida.
- Ringpilz** Psalliota.
- Rips** (Reps, Raps) Brassica Napus.
- Rispelgras** Poa.
- Ritschgras** Koeleria.
- Ritterkreuz** Horminum pyrenaicum.
- Ritterschwamm** Tricholoma.
- Roceambolle** (Rocken-) Allium Ophioscorodon, Schlangenlauch.
- Rocket** (Meersenf) Cakile.
- Rodel** (Läusekraut) Pedicularis.
- Röhrenmannia** Ornus europaea.
- Römersalat** (Strunk-) Lactuca sat. romana.
- Rosarium** = Rosengarten.
- Rose** (japan.) Camellia jap., (Jericho-, s. d.).
- Rosenapfel** Jambusa vulg. u. Dilenia.
- Rosenholz** Cytisus canariensis, (Ficatin-, s. d.).
- Rosenlorbeer** = Oleander Nerium Oleander.
- Rosenwurz** Rhodiola.
- Rosinen** (Cibeben, Korinthen) Vitis vinifera.
- Rosmarinapfel**, Sorte v. Traubengapfel Diel-Lucas.
- Rossfenchel** Phellandrium u. (Sau-) Peucedanum.
- Rosskopfstaude** Carlina acaulis.
- Rosskümmel** Phellandrium u. Siler.
- Rossnalve (-pappel)** Malva sylvestris.
- Rossmünze (-minze, Ziest)** Stachys.
- Rosswicke** Astragaloides.
- Rost** Coniomycētes (Staubpilze, Aecidium, Puccinia etc.).
- Rotang** (Palnried) Calāmus Rotang.
- Rotbuche** (Wald-) Fagus sylvatica.
- Rotdorn** Crataegus Oxyacantha flore rubro.
- Rotholz** (afrik.) Baphia nitida, (Brasilien-, s. d.).
- Rotrindenholz** Samadēra indīca.
- Rottanne** Pinus Abies L. s. Abies excelsa Rich.
- Rotwurz** Tormentilla.
- Roucou** Bixa Orellana.
- Rousselette** = Birnsorte.
- Rübe** (weisse, Wasser-, Stoppel-, Teltower) Brassīca Rapa esculenta.
- Rübenkohl** (Rübsamen, Rübse)

- Brassica Rapa oleifera s. campestris.
Ruckel Bellidiastrum.
Ruhrbirne Pirus s. Sorbus torminalis.
Ruhrkraut Gnaphalium u. Inula dysenterica.
Rührbirne Simaruba officinalis.
Ruku s. Roucou.
Runkelrübe Beta, (Zucker-) Beta Cicla.
Runzelblume Aletris.
Russling s. Lohblüte.
Russtan Cladosporium Fumago, (Schwärze) Stemphylium ericerorum.
Rutabaja (schwed. Kohlrübe) Brassica Napus var.
Ryegras s. Raygras (e. rye-grass).
- Sabadillsamen** Veratrum Sabadilla.
Sabinebaum (Sade-, Seven-) Juniperus Sabina.
Sabndu Sorghum saccharatum.
Sadebaum s. Sabineb.
Sämsblätter (Sennes-) Cassia Senna.
Säckelblume (Seckel-) Ceanothus.
Saftgrün (Kreuzdornbeere) Rhamnus catharticus.
Sagapenum, (Teufelsdreck) Ferula persica.
Sagobaum Caryota urens, (-farn) Cycas u. Zamia, (-palme) Sagus farinifera etc., (Portland - Sago) Arum maculatum.
Sagueer (Zuckerpalme) Arenga.
Salap (Salep) Orchis Morio etc., (tahitisch.) Tacc.
Salbenbaum Amýris u. Myroxylon.
Salbenschwamm s. Lohblüte.
Salbnuss (Behen-) Guilandina Moringa.
Salde Ruppia.
Salholz (ostind. Dammar-) Shorea robusta.
Salme (Keilmelde) Obione.
Salweide (Sohl-) s. Palmweide.
Salzinse Triglochin maritimum.
Salzmiere s. Porselein, Honckenya s. Halianthus.
Salzpungen Samolus Valerandi.
Sambac (arab. Jasmin) Jasminum Sambac.
Sammelblume Tagetes.
Sammelgras Lagurus.
Sammelnelke Lychnis Coronaria L.
- Sammelpoppel** Althaea officinalis.
Sandaracharz Thuja articulata.
Sandbeere (Bärentraube) Arbutus s. Arctostaphylos uva ursi.
Sandbüchsenbaum Hura crepitans.
Sandelholz (rot.) Pterocarpus santalinus, (gelb.) Santalum album, (Senegal-) Drepanocarpus senegal., (weiss.) Sirium.
Sand-Luzerne Medicago falcata-sativa.
Santelholz (-baum) s. Sandel-.
Sapfel Isnardia.
Sapotillbaum s. Breiapfel.
Sappanholz Caesalpinia Sappan.
Sarana (essb. Serenna) Lilium kamschatcense.
Sargasso Sargassum bacciferum.
Saribupalme Corypha rotundifolia.
Sarsaparill (Sassa-) Smilax Sarsaparilla.
Sassafras Laurus Sassafras.
Satanspilz Boletus sanguineus s. Satanas.
Satinetholz Ferolia guianensis s. Chloroxylon Swietenii.
Saubeere Solanum nigrum.
Saubrot (Erdscheibe) Cyclamen.
Sauer (-klee) Oxalis.
Sauerdattelb. Tamarindus.
Sauerwurz Calymenia s. Oxybaphus l'Hér.
Saufenchel (Ross-) Peucedanum.
Saug (Bienen-) Lamium.
Saul s. Salholz (Schiffsholzb.).
Saupilz (Schuster-) Boletus luridus.
Saurebe Solanum Dulcamara.
Sauwurz Bryonia alba.
Savoyerkohl (Wirsing) Brassica oler. sabauda.
Scarlet - Pelargonien Pelargonium inquinans, zonale u. Blendlinge beider.
Schabenkraut Verbas cum Blattaria.
Schabziegerklee Trifolium coerulium s. Trigonella (Melilotus) coer.
Schachblume (Kaiserkrone) Fritillaria.
Schachtkohl (Spurre) Holostium umbellatum.
Schafeuter Boletus ovinus.
Schafkraut (Scharf-, Schärfeling) Asperugo procumbens.
Schakarillrinde Croton Eluteria.
Schamblume Clitoria.
Schamkraut Chenopodium Vulvaria s. olidum.

- Schangtonkohl** s. Petsai.
Scharboekskraut s. Feigwurz.
Scharfblatt Xyris.
Scharlacheiche s. Kermesbeere (-eiche).
Scharlachkraut (Scharlei) Salvia Horminum.
Scharte (blaue) Serratula tinctoria, (gelbe) Genista tinct. (Färbeginster).
Scheiberich (Sumpfschirm) Helosciadium.
Scheidenlilie Xiphidium.
Scheinbeere (canad. Bergthee) Gaultheria.
Schellackbaum Croton lacciferum, Ficus religiosa u. indica.
Schellbaum Ahovia major (Cerbëra Ahovia).
Schellenblume Adenophora s. Campanula.
Schelmenkraut Gentiana asclepiadæa.
Scherbet Trinia.
Scheuerkraut Equisetum hiemale.
Schierlingstanne s. Hemlockstanne.
Schiffchenblume Lembotropis.
Schildblume Chelone.
Schimmel Hyphomycetes (Mucor u. Ascophora).
Schirmpalme Corypha u. Livistona.
Schirmtanne Sciadopitys.
Schlafkraut Teucrium Chamaedrys.
Schlaflinse (Blasenstr.) Colutea.
Schlängenäuglein s. Scharfkraut.
Schlängeneactus s. Peitscheneact.
Schlängengiftkraut Monnieria trifolia.
Schlängengras Plantago coronopifolia.
Schlängenholz Strychnos colubrina u. Ophioxylon s. Tiovanna.
Schlängenkraut Calla palustris.
Schlängenmoos Lycopodium clavatum.
Schlängenwurz (ind.) Ophiorrhiza Mungos, (virgin.) Serpentaria, (Natter-) Polygönum Bistorta.
Schlauchfaden (Schimmel) Ascophora mucido.
Schleimapfel Crataeva Marmelos.
Schleindling Tremella Nostoc L.
Schlenderstendel Vanda.
Schlinge Viburnum, (Baum-) Periplœca.
Schlingrose Rosa repens s. capreolata u. rubifolia.
- Schlippen** (Natterwurz) Polygönum Bistorta.
Schlutte (Judenkirsche) Physalis Alkekengi.
Schmack (Sumach, Gerber-) Rhus Coriaria.
Schmalzblume Caltha palustris.
Schmalzkraut s. Feldsalat.
Schmalzling (Butterpilz) Bolétus litéus.
Schmeerwurz (Stick-) Tamus communis.
Schmelche s. Pfeifenbinse.
Schmergel s. Feigwurz.
Schmerle (Kopfriet) Schoenus.
Schmerling Bolétus granulatus.
Schmiele (Schmielenhafer) Aïra flexuosa.
Schmierbrand Urēdo sitophila u. Tilletia.
Schminkbeere (Erdbeerspinat) Blitum.
Schminkbolne Phaseolus vulgaris.
Schminke (Steinsamen) Lithospermum.
Schminkläppchen s. Bezetten.
Schminkwurz Anchusa tinctoria, Henna u. Polygonatum.
Schmirbel s. Schminkbeere.
Schneekensamen Cochlospermum s. Wittelsbachia.
Schnee (roter) Protococcus nivalis.
Schneebeerenstrauch s. Peterstr.
Schneeflockenbaum Chionanthus.
Schneeholder s. Peterstrauch.
Schneerose Rhododendron ferrugineum, (Christblume, s. d.).
Schnellepheu (Sommer-) Mikania scandens od. Senecio mikanoides.
Schmurhülse Sophora japonica.
Schönfaden s. Flaschenbürste.
Schönfuss Bolétus calopus.
Schönrebe Eccremocarpus.
Schotendornbaum (Gummi-) Acacia arabica etc., (gemeiner) Robinia Pseud-Acacia.
Schotenweiderich (Weidenröslein) Epilobium.
Schraubenbaum(-palme) Pandanus.
Schraubenmalve Helictéres.
Schriftblume Grammanthes gentianoides.
Schulmeisterpilz s. Parasolpilz.
Schüchel (Schotenklee) Lotus.
Schuppenapfel Anōna.
Schuppenschwamm Pholiota mutabilis.

- Schusserbaum** *Gymnocladius s. Guilandina.*
- Schüsselflechte** *Parmelia.*
- Schusterpilz** *s. Saupilz.*
- Schüttgelb** *Genista tinctoria, Rhamnus catharticus u. Betula pubescens.*
- Schwalbenwurz** *Asclepias u. Chelidonium.*
- Schwammkürbis** *Luffa.*
- Schwanenblume** (*Wasserviole etc.*) *Butomus umbellatus.*
- Schwanzpfeffer** (*Cubeba*) *Saururus.*
- Schwarzbeere** = Heidelbeere.
- Schwarzerle** (*Faulbaum*) *Rhamnus Frangula.*
- Schwarzkiimmel** (*echt.*) *Nigella, (falsch.) Agrostemma Githago s. g. Raden.*
- Schwarzmundbeere** *Melastoma malabathricum etc.*
- Schwarztanze** *s. Rottanne.*
- Schwarzwurz** (*Hafer-, s. d.*), (*Beinwell, Consolida major Offiz.*) *Symphtium officinale.*
- Schwefelkopf** *Hypholoma fasciculare.*
- Schweinegummi** *Marila racemosa etc.*
- Schweinekraut** *s. Schlangenkraut.*
- Schweinesalat** *Aposeris od. Hyosiris.*
- Schwimmblatt** *Salvinia natans.*
- Schwindelkörner** *Coriandrum sativum.*
- Schwindelkraut** *Doronicum Pardalianches.*
- Schwingel-(gras)** *Festuca, (Manna-) s. Flutgras, (-schilf) Sclochloria festucacea.*
- Sclerotien** = Hartpilze.
- Sebesten** *Cordia Sebestena, (-baum, Holder) Sambucus nigra.*
- Seebälle** *Zostera marina (Seegras).*
- Seegras** (*unecht. Roshaar, fr. crin végétal*) *Chamaerops humilis, (Seebälle, s. eb.).*
- Seelenholz** (*mexik.*) *Xylostium mexicanum.*
- Seetraube** *Ephedra u. Coccoloba uvifera.*
- Seewier** *s. Seebälle.*
- Seide** (*Flachsseide*) *s. Fadenseide.*
- Seidelbeere** *Solanum Dulcamara.*
- Seiden-Eisenholz** *Sersalisia.*
- Seidengras** *Yucca.*
- Seidenstrauch** *Asclepias syriaca.*
- Seifenschwamm** *Tricholoma saponaceum.*
- Semde** (*Schnabelsamen*) *Rhynchospora.*
- Semen** *Cataputiae minoris Offiz. — Euphorbia Lathyris, - Cataputiae majoris Off. — Ricinus communis, - Coccognidii Off. — Daphne Mezerium, - Cocculi Off. — Menispernum Coeculus, - Contrae s. Cynae Off. — Artemisia judaica s. contra.*
- Semmelpilz** *Polyporus confluens.*
- Semmust** *Lyycopodium Selago.*
- Senegal-Gummi** *Acacia senegalensis.*
- Senegawurz** *Polygalä Senega.*
- Senfkraut** (*Barbenhederich*) *Barbaraea.*
- Sengel** *Aposeris.*
- Sennesblätter** *Cassia Senna, (unechte) Bauhinia porrecta (Sennae spuria Off.).*
- Senwurz** *Senecio.*
- Serbet** (*verdünnt. Veilchensyrup*) *Viola odorata.*
- Serblensalat** (*Wurmsamen*) *Artemisia contra.*
- Serenna** *s. Sarana.*
- Serge** (*Pfefferkraut*) *Saturëa.*
- Serradelle** *Ornithopus sativus.*
- Sermel** (*Milchkraut*) *Glaux.*
- Sesam** (*orient.*) *Sesamum orientale.*
- Sevenbaum** *s. Sabinebaum.*
- Sheabaum** (*Butterb.*) *Micadania s. Butyrospermum.*
- Sibyllenwurz** (*Sybille-*) *Gentiana cruciata.*
- Siebengezeit** *Melilotus coerulëus s. Schabziegerklee.*
- Siegmarswurz** *Malva Alcea.*
- Siegwurz** (*Allermannsharnisch*) *Gladiolus communis.*
- Silberbaum** *Elaeagnus argentea u. Protëa.*
- Silberblatt** *Lunaria.*
- Silberfarn** *Gymnogramma.*
- Silberfichte** (*-baum*) *Protëa.*
- Silberregen** (*Traubenkirsche etc.*) *Prunus Padus.*
- Silberseharte** *Jurinëa.*
- Silberwurz** *Dryas octopetala.*
- Silling** (*Zaunlilie*) *Anthericum.*
- Simarube** *Quassia Simaruba, (-baum)* *Bursëa gummiifera.*
- Siriblätter** (*Kaupfetter*) *Piper betle.*
- Sissuholz** *s. Ficatinholz.*

- Sitter** (Sumpfwurz) Epipactis.
Skammonium Convolvulus Scammonia.
Skorpionschwanz Heliotropium.
Södbrot (Johannis-) Ceratonia Siliqua.
Sodomsapfel Solanum Sodomaeum.
Sohlweide s. Palmweide.
Sojabohne Dolichos hispida s. Soja.
Sommereiche Quercus pedunculata.
Sommerepheu s. Schnellepheu.
Sommerlinde (holländ.) Tilia grandifolia.
Sommerrebe Vitis Labrusca.
Sommerthürchen Leucojum vernum.
Sommerwurz (Ervenwürger) Orobanche.
Somehe (Saudistel etc.) Sonchus.
Sonnengünsel (-röschen) Helianthemum (Cistus).
Sonnenwurz s. Sommerwurz.
Sorgho s. Durrha.
Spaltglocke Scaevola.
Spanisches Rohr Calamus Rotang, (falsches) Arundo Donax.
Spargelbohne (-erbse) Lotus s. Trigonolobus siliquosus.
Spargelkohl s. Brocoli.
Spargelsalat Lactuca angustana.
Sparz s. Spargelbohne.
Specklilie Lonicera Periclymenum.
Speckmelde Mercurialis annua.
Speerwurzel Valeriana.
Speierling (Sperberbaum) Sorbus s. Cormus domestica.
Speiteufel Agaricus emeticus (Russula em.).
Speiwurzel Pyrenthrum.
Spelle Moehringia.
Sperkling Spergularia.
Sperwe = Rosskastanie.
Spettel (Leimkraut) Silene.
Spierapfel s. Speierling.
Spike (Spiköl) Lavandula Spica.
Spillbaum (Spindel-) Evonymus europaeus.
Spille od. **Spilling** (catalonische Pflaume) Prunus lutea, (Krieche) Prun. insititia.
Spinat (gem.) Spinacia oleracea, (neuseeländ.) Tetragonia expansa, (engl.) Rumex Patientia.
Spimmling Scheuchzeria.
Spinnenkraut Anthericum s. Phalangium.
Spitzblume Ardisia.
- Spitzenbaum** Lagetta lintearia.
Spitzmorchel Morchella conica.
Spleisse Lobelia.
Sporkelblume (Knoten-) Leucojum vernum.
Spornblume Centranthus (Valeiana rubra etc.) u. Tropaeolum.
Spreublume (Stroh-) Xeranthemum.
Spurre s. Schachtkohl.
Spritzgurke (Spring-) Momordica Elaterium.
Stabwurz (Eberraute etc.) Artemisia Abrotanum.
Stachelkäuse Urēna.
Stachelnsamen Acanthospermum s. Xanthoides.
Stanbflechte Lepraria Jolithus etc.
Ständling Liparis.
Stäubling (Bärlapp) Lycopodium, (Bovist) Lycooperdon.
Standich Kochia.
Steckhörner Cardiūs Marianus (semina etc.).
Steckkraut (Mariendistel) s. eb. u. Silybum Marianum.
Steckwinde Smilax Sarsaparilla.
Steckenkraut Ferula.
Steinbeere (Brom-, Him-) Rubus.
Steineiche (Winter-) Quercus Robur L. s. sessiliflora Sm.
Steineppich Bubon macedonicum.
Steinklee Melilotus u. Trifolium repens.
Steinispel Cotoneaster vulgaris (Mespilus Cot. L.).
Steinmorchel (Speise-) Helvella esculenta.
Steinmuss Pterocarya s. Parinarium.
Steinpilz s. Edelpilz.
Steinröschens (Zeiland) Daphne Cneorum.
Steinsalat (Hasenlattich) Phoenix muralis.
Steinwechsel (Weichselholz) Prunus Mahaleb.
Stellmaehlerholz Trichocladus erinaceus.
Stelzenbaum s. Leuchterbaum.
Stendeln Orchidaceae.
Stephanuskörner Delphinium Staphisagria.
Sternanis Illicium anisatum od. Skimmia fragrans.
Sternblume Aster, Narcissus poeticus, Starlia.

- Sterndistel** Centaurēa Calcitrāpa.
Sterndolle (Strenze) Astrantia.
Sternglocke Campanūla patūla.
Sternhyazinthe (Zille etc.) Scilla bifolia.
Sterukopf s. Grindrose.
Sternschnuppe s. Schleimling.
Stiehling s. Haargurke.
Stickwurz s. Schmeerwurz.
Stielunss (Süss-) Hedycarya.
Stielpfeffer Piper Cubēba.
Stinkapfel Crataeva Papia.
Stinkasaut Ferula Asa foetida.
Stinkbaum Foetidia mauritiana u.
 Anagyris.
Stinkbohne (-frucht) Scorodocarpus s. Ximenia.
Stinkholz Olax zeylanica.
Stinkraute Ticorēa foetida.
Stinkwachholder s. Sabinebaum.
Stocklaek Croton laccifērum.
Stockmorehel s. Frühmorchel.
Stockrose (s. g. Gartenmalve) Althaea rosea s. Malva arborea.
Stockschwamm s. Schuppenschw.
Storax Styrax officinalis.
Strandkiefer Pinus halepensis.
Strandling Corrigōla litoralis u.
 Litorella lacustris.
Strausskirsche Solānum.
Streitkolbenbaum Casuarīna.
Strenze s. Sterndolle.
Strickgras (Seil-) Restio.
Strohblume Xeranthēum, (Immortelle) Gnaphalium u. Helichrysum.
Strunksalat (Römer-) Lactuca sat. romana.
Strunkschwamm s. Glucke.
Stüekelalgen Diatomēae (Bacillaria etc.).
Studentenblume Syringa, Dianthus barbatus, Tagētes u. a.
Studentenkraut Chenopodium scorpiarium (Kochia scop.).
Studentennelke (Bart-) Dianthus barbatus.
Studentenröschen (Herzblatt) Parnassia palustris.
Stundenblume Hibiscus s. Ketmia Triōnum.
Succade Citrus decumāna.
Südseemyrte Leptospermum scorpiarium.
Süssholz (radix Laquiritiae) Glycrrhīza glabra.
- Süßsklee (Manna-)** Hedysārum Alhagi.
Sumpfdeeder Taxodium s. Cupressus disticha.
Sumpfheide Erica Tetrālix.
Sunn Sumbūlus moschatus u. Crotalaria juncēa.
Suppenlauch (Schnitt-) Allium Schoenoprasum.
Sybillewurz s. Sibyllenwurz.
Sycomore Ficus Sycomōrus, (-Platanē) Platānus, (unechte S.) Melia Azedarach.
- Tabak** Nicotiana Tabācum etc.
Tabakir (Bambuszucker) Bambusa arundinacēa.
Tabakspfeife Aristolochia Siphonophora.
Tabakswurz Levista (-stia).
Tabascher s. Tabakir.
Tacamahac-Harz Elaphrīum u. Inophyllum.
Tafelfichte Myrrhis odorata.
Tafeltuchbaum Ricinus Mappa.
Talgbaum (-beerenb.) Stillingia sebifēra u. Croton sebifērum.
Talglobeer Tetranthēra s. Litsēa citrifolia.
Tangu-Gewürznelke Jambolifēra pedunculata.
Tapioca (-oka) Jatrōpha Manihot.
Tarant Sweertia, (blauer) Gentiana Pneumonanthe.
Tarro (Kalo, Colo) Caladium esculentum s. Colocasia esculenta.
Tartar Crambe tatarica.
Tartschenflechte Cetraria.
Tassenblume Scyphantus elégans.
Taubenäpfel = zugespitzte Rosenäpfel.
Tanbeere s. Kratzbeere.
Täubling s. Speiteufel.
Tauche (Seekanne) Limnanthēum etc.
Tausendsehōn (Masliebchen) Bellis perennis, (Bartnelke) Dianthus barbatus, auch Amarantus u. Polygala.
Teakholz (afrik.) Oldfieldia, (ind.) Tectonia.
Teekholz s. eben.
Teltower Rübe Brassica Rapa esculenta teltoviensis.
Tembesubaum (Königsholz) Fagraea (Fragr.) peregrina.
Teosinte(Guatemalagras) Euchlaena gigantēa s. Reana luxurians.

- Terpentin** (gem.) *Pinus sylvestris*, (Bordeaux-) *Pinus Pinaster*, (venetian.) *P. Larix*, (attisch. od. franz.) *P. halepensis*, (canad.) *Abies canadensis*, (cypr. od. von Chios) *Pistacia Terebinthus*, (strassb.) *Pinus Picéa* s. *Abies pectinata*.
- Tertianieberkr.** (Tertianaria) *Scutellaria galericulata*.
- Tenfelsabbiss** *Scabiosa Succisa* L.
- Tenfelsauge** *Adonis*.
- Tenfeldsorn** *Tribulus terrestris*.
- Tenfelddreck** *Ferula Asa foetida*.
- Tenfelshand** *Lycopodium Selago*.
- Tenfelsskrallen** *Phyteuma spicatum*.
- Tenfelpuppe** s. Schluotte.
- Tenfelszwirn** *Lycium barbārum*.
- Thee** (chines.) *Thea chin.*, (Blankenheimer, s. Lieber'scher), (mexik.) *Chenopodium ambrosioides*, (kuril.) *Epilobium angustifol.*, (*Sideritis herba Off.*) *Stachys Ochroleuca*, (*Sideritis herb. flore luteolo Liv.*) *Stachys recta*, (Paraguay-) s. Mate.
- Theemyrte** *Leptospermum scoparium*.
- Theerose** *Rosa fragrans* Réd. u. *indica* Théa Hort.
- Theriaki** (d. Opiumfresser) *Papaver somniferum*, (Theriakwurz.) *Valeriana Phu*, (echte) *Archangelica officinalis*.
- Thränenschwamm** (Haus-) *Merulius lacrymans*.
- Threm** (Trehm) *Platanthēra* (Breitkölbchen).
- Timotheusgras** *Phlēum pratense*.
- Tintenbeere** *Ligustrum vulgare*.
- Tintenholz** (indian.) *Terminalia Catappa*.
- Tintenwurzel** *Morinda royoc*.
- Toddy** (Blütenspindelsaft) Kokoks u. Fächerpalmen.
- Totenbeinbaum** s. Stinkapfel.
- Totenblume** *Calendula officinalis* u. Tagetes.
- Töldoeke** *Isopýrum thalictroides*.
- Tollkorn** (Taumel-) *Lolium temulentum*.
- Tolte** (Milchsalat, -distel) *Mulgedium*.
- Tolubalsam** *Myroxylon toluifērum*.
- Tomate** s. Liebesapfel.
- Tongabolue** (Tonka-) *Dipteryx Tonga* etc.
- Tonkaythee** = chines. Thee, schlechteste Sorte.
- Topfbamm** *Lecythis Ollaria*.
- Topflorbeer** s. Talglorbeer.
- Topinambur** (Erdbirne, s. d.).
- Tournesol** *Croton tinctorium*.
- Träubel** (Traubenzypresse) *Muscari*.
- Traubenbaum** *Coccoloba*.
- Traubeneiche** s. Steineiche.
- Traubenzweig** *Rebenpilz*.
- Traubenschimmel** *Botrytis*.
- Tremse** (Flockenblume) *Centaurēa*.
- Trespe** (Dord) *Bromus*, (canad.) *B. purgans*.
- Tresterschimmel** *Stemphylium*.
- Treufkraut** (Wand-, Glas-) *Parietaria*.
- Trichterling** *Clitocybe*.
- Triftwurz** (Rapunzel, s. d.).
- Tripmadam** *Sedum reflexum* u. *album*.
- Trottelblume** *Soldanella alpīna*.
- Trollblume** s. Engelsblume.
- Trommelbaum** *Mithridatea* s. Ambōra.
- Trompetenbaum** *Cecropia* u. *Bignonia Catalpa*.
- Trompetenblatt** (Wasserkrug) *Sarracenia*.
- Trompeten-Jasmin** *Tecōma*.
- Trompetenzunge** *Salpiglossis*.
- Trossnarzisse** (Dolden-) *Narcissus Tazetta*.
- Trunkelsbeere** *Vaccinium uliginosum*.
- Tubanbaum** s. Gutta-Percha.
- Tuberose** (weisse) *Polianthes tub.*, (blaue) *Agapanthus umbellatus*.
- Tuneserblume** s. Afrikane.
- Tupelobaum** *Nyssa aquatica*.
- Turbanheliotrop** *Tiaridium* s. Heliotr. indicum.
- Turbankapsel** *Tiarella*.
- Turbithwurzel** s. Turpethrinde.
- Turnip** (Weissrübe etc.) *Brassica Rapa*.
- Turpethrinde** *Convolvulus* s. *Iponomea Turpethum*.
- Tusearora - Reis** *Hydropýrum palustre*.
- Uchtblume** *Bulbocodium*.
- Ullneo** (peruv. Nährmittel) *Tropaeolum tuberosum*.
- Uniformstrauch** *Amorpha*.

- Unser-Herrgotts-Bärtlein** Spiraea Ulmaria.
- Unter-Artischoke** s. Erdbirne.
- Unter-Kohlrabi** Brassica Napus s. Napobrassica.
- Upasbaum** s. Boa- od. Bohou-Upas, (-strauch, Upas Tieute) Strychnos Tieute.
- Urinkraut** Phyllanthus Urinaria.
- Urkorn** s. Schnee (roter).
- Vanille** Epidendron Vanilla (V. aromaticata).
- Veil** (gelbe Viole) Cheiranthus Cheiri.
- Veilchenmoos** (-stein) Lepraria Jolithus.
- Veilchenwurz** Viola (Jonidium s. Pombalia) Ipecacuanha, (florent.) Iris florentina.
- Venusfliegenfalle** Dionaea muscipula.
- Venuskamm** (Nadelkerbel) Scandix pecten.
- Venusspiegel** Campanula (Specularia s. Prismatocarpus) Speculum.
- Vereinsblütler** Compositae.
- Vergissmeinnicht** Myosotis palustris etc., (Garten-) s. Denkmlein, (Männer tren) Veronica Chamaedrys.
- Vermainkraut** (Vernein-) Thesisum.
- Vexiernelke** (Sammet-, s. d.).
- Victoriastande** (-stengel) Rhizum undulatum.
- Vierling** Moenchia.
- Vietsbohne** Phaseolus vulgaris.
- Visetholz** s. Fisetholz.
- Vogelkopf** Passerina.
- Vogelpfeffer** Ornitrophe s. Schniedelia.
- Vogelpflaume** s. Ahle.
- Vollfarn** Ceterach officinarum (Grammitis C.).
- Wabel** (Wachsblume) Cerinthe.
- Wachs** (japan.) Rhus succedana.
- Wachsbaum** Myricaria.
- Wachsbeerstrauch** s. Peterstr.
- Wachsblume** Cerinthe u. Hoya carnosia.
- Wachspalme** Ceroxylon andicola.
- Wachspflanze** Asclepias u. Hoya, (ägypt.) Secamone.
- Waid** (s. Indig, deutsch.).
- Walch** (wilder Weizen) Aegilops.
- Waldmeister** (Maitrank) Asperula odorata.
- Waldvöglein** Cephalanthēra (Seriopias etc.).
- Waldwolle** s. Wiesenwolle (Wollgras).
- Waldwnrz** (Fichtenspargel) Monotropa Hypopitys.
- Walpurgiskraut** Osmunda regalis u. Botrychium Lunaria.
- Wampee** Cookia.
- Wandelblume** Cineraria, (Widerstoss) Silene inflata.
- Wandelklee** Hedysarum s. Desmodium gyrans.
- Wandelröschen** Lantana Camara.
- Wanderbaum** Urania speciosa.
- Wanzenkraut** Actaea Cimicifuga u. Ledum palustre.
- Warzenbrand** Aecidium.
- Warzenkrant** Zacintha verrucosa.
- Wasserbaum** Tetracera potatoria.
- Wasserbirke** s. Maye.
- Wasserfaden** (-heede) Conferva.
- Wasserhelm** Utricularia.
- Wasserklette** s. Pestilenzwurz.
- Wasserknobauch** Teucrium Scordium.
- Wasserkrug** s. Trompetenblatt.
- Wasserliesche** Alismaceae.
- Wasserlöhle** (-reis) Zizania aquatica s. Hydroporum esculentum.
- Wasserpest** Elodea canadensis etc.
- Wasserreis** s. (-lolch).
- Wasserriemen** s. Seebälle (-gras).
- Wasserscheere** Stratiotes aloides.
- Wasserwegerich** (Froschlöffel) Alisma Plantago.
- Wasserzinnen** (Igellock) Ceratophyllum.
- Watt** Ulva lactuca.
- Wantistranch** Broussonetia papyrifera.
- Wegtritt** (Vogelknöterich) Polygonum aviculare.
- Weiberkrieg** (Hauhechel) Ononis spinosa.
- Wechselholz** (-kirsche) s. Steinwechsel.
- Weihnachtsrose** s. Christblume.
- Weihrauch** (echt. indisch.) Juniperus Lycia, (gem.) Abies excelsa (Pinus Abies L.).
- Weihsprossen** (Eisenkraut, -hart, s. d.).
- Weinblume** (Nachtkerze) Oenothera.

- Weinpalme** *Mauritia vinifera*, *Borassus flabelliformis*, *Raphia s.*
Sagus vinifera u. *Oenocarpus*.
- Weinraute** *Ruta graveolens*.
- Weinrose** *Rosa rubiginosa*.
- Weisseeder** *Libocedrus*.
- Weissbeern** (Masholder) *Acer campestre*.
- Weisstanne** (Edel-) *Abies pectinata*
 (*Pinus Picea L.*).
- Weissviole** *Arabis alpina*.
- Weisswurz** *Convallaria Polygonatum*.
- Wendich** (Brachschötchen, s. d.).
- Wergtang** *Sphacelaria Scoparium*.
- Wetteröschen** s. *Stundenblume*.
- Weymouthskiefer** *Pinus Strobus*.
- Wicke** (ewige) *Lathyrus latifolius*,
 (span.) *L. odoratus*.
- Widerstoss** *Statice* u. *Silene inflata* etc.
- Widerthon** *Polytrichum*.
- Wielandskraut** (Wiesenraute) *Thlaspium*.
- Wier** s. *Seegras* (-bälle).
- Wiesengeld** s. *Pfennigkraut* (Münz-).
- Wiesenhafer** (franz. Raygr., s. d.) u.
 (Hafergr.) *Avéna pratensis*.
- Wiesenkohl** *Cirsium oleraceum*.
- Wiesenköningin** s. *Mädesüß*.
- Wiesenwolle** (Wollgras) *Eriophorum*.
- Wilhelm** (wohlriech.) *Dianthus prolifer* s. *Tunica prolifera*.
- Windapfel** *Melodinus*.
- Windfahne** (-halm) *Apēra spica venti*.
- Windhafer** (Flug-) *Avēna fatua*.
- Windsbock** (Repsdotter, Hederich)
Rapistrum s. *Myagrum perenne*.
- Winke** (Sinngrün) *Vinca*.
- Winteraster** *Pyrēthrum* s. *Anthēmis artemisiifolia*.
- Winterbeere** *Prinos verticillata*.
- Winterblume** *Gnaphalium arenarium*, *Gomphrena* u. *Eranthēmis hiemalis*.
- Wintereiche** s. *Steineiche*.
- Wintergrün** (Sinn-) *Vinca*, u. *Pyrōla* (*Pirola*).
- Winterheliotrop** *Tussilago* s. *Nardosmia fragrans*.
- Winterkraut** s. *Speckmelde*.
- Winterkresse** *Erysimum Barbarea* *L.*
- Winterlevkoje** *Matthiöla incana*.
- Winterlinde** (Stein-) *Tilia microphylla* s. *parvifolia*.
- Winterling** *Eranthēmis* s. *Helleborus hiemalis*.
- Winterrinde** (Wintere) *Drimys Winterana* (Wintēra *aromatica* Off.)
 u. *Canella alba* s. *Winterāna G.*
 (Winterchan *Canella L.*).
- Wirrschwamm** *Daedalea quercina*.
- Wirsing** s. *Savoyerkohl*.
- Witschen** *Aspalathus*.
- Wittwenblume** *Vidūa* s. *Scabiosa atro-purpurea*.
- Wolfsbeere** (Ein-) *Paris quadrifolia*.
- Wolfsrauch** *Lycoperdon*.
- Wolfswurz** *Aconitum Lycoc̄tonum*.
- Wollblume** *Verbascum* u. *Anthyllis*.
- Wucke** (Wuke) s. *Unter-Kohlrabi*.
- Wunderblumenstranch** *Pisonia*.
- Wunderklee** (Stein-) *Melilotus officinalis*.
- Wundkraut** *Sedum Anacampsēros*
 s. *rotundifolium*, (heidn.) *Solidago Virgaurea*.
- Wurara-Pfeilgift** *Paullinia australis* s. *toxicaria*.
- Wurmfern** *Aspidium Filix mas*.
- Wurmmoos** (-knotentang) *Sphaerococcus* s. *Ceramium Helminthochortos*.
- Wurmkraut** (Rainfarn) *Tanacētum vulgare*.
- Wurmplatte** *Virēa* s. *Helminthia echooides* (Pieris ech.).
- Wurmsamen** (Zittwer, semina *Cinae* Off.) *Artemisia judaica* *L.* (Contra u. *vermisfuga*) u. *A. Santonīca* (Santonīcāc, Contrae s. *Cynae semina* Off.).
- Wurstkraut** *Origānum Majorāna*.
- Wurzelbaum** *Rhizophōra Mangle*.
- Würger** (Hunds-) *Cynanchum*.
- Würzkraut** *Satureja Thymbra*.
- Wüsten-Mamma** *Tamārix gallīca*.
- Yamswurzel** *Dioscorēa sativa* u. *bulbifera*.
- Yukkawurzel** (Stärke-) *Jatrōpha Manihot*.
- Zahnbaum** (ägypt.) *Ximenia* s. *Balanites aegypt.*
- Zahnkorallen** s. *Pfingstrose*.
- Zahnweihholz** (Gelb-) *Xanthoxylōn* s. *Fagūra piperīta*.

Zapfenfarm (Sago-) <i>Zamia lanuginosa.</i>	Zottelblunne (Zotten-) = Bitterklee (Fieber-).
Zapfenholz (Faulbaum) <i>Rhamnus Frangula.</i>	Zuckererbse <i>Pisum sativum arvense.</i>
Zapfenkraut s. Affenblatt.	Zuckerpflaume <i>Hedycréa s. Licania.</i>
Zauke (Maiblume) <i>Convallaria majalis.</i>	Zuckerrose s. Essigrose.
Zaun-Ananas <i>Bromelia Pinguia.</i>	Zuckerrübe <i>Sium Sisárum, (Runkel-) Beta vulgaris rapacea u. B. Cicla rapacéa.</i>
Zäunling (Geisblatt) <i>Lonicéra.</i>	Zuckertanne <i>Pinus Lambertiana.</i>
Zaunrebe (Wild-) s. Jungfernrebe.	Zuckerwurzel(-rübe) <i>Sium Sisárum u. Pastináca satíva.</i>
Zebraholz <i>Omphalobium Lambertii.</i>	Zunderholz <i>Agave americana.</i>
Zedrach <i>Melia Azadirachtha.</i>	Zunderschwamm <i>Polypórus ignarius u. fomentarius.</i>
Zehrwurz <i>Arum maculatum u. Caladium esculentum.</i>	Zürbelkiefer (-tanne) <i>Pinus Cembra (Zutsche).</i>
Zeiland (Seidelbast etc.) <i>Daphne.</i>	Zutsche, s. eben.
Zellernuss <i>Corýlus tubulosa.</i>	Zwang (Krähenfuss) <i>Coronópus.</i>
Ziegenbart <i>Spiraea Aruncus u. Sp. Ulmaria, (Korallenschwamm) Clavaria.</i>	Zweckenbaum s. Zapfenholz.
Ziegenlippe <i>Bolétus subtomentosus.</i>	Zweiblatt <i>Listéra bifolia u. Majanthémum bifolium.</i>
Zier (Schminkwurz) <i>Anchusa tinctoria.</i>	Zwergglocke <i>Wahlenbergia hederacea.</i>
Zigeunerkrant <i>Lycopus europaeus.</i>	Zwerg-Levkoje <i>Cheiranthus s. Matthiola fenestrális.</i>
Zille (Meerzwiebel) <i>Scilla.</i>	Zwergmispel <i>Cotoneaster u. Pirus Chamaemespílus.</i>
Zimmetbaum (Ceylon-) <i>Laurus s. Perséa Cinnamomum, (Cassien-) Perséa Cassia.</i>	Zwenke <i>Bromus s. Brachypodium.</i>
Zimmerterdbeere <i>Fragaria elatior.</i>	Zwetsche (-tschge) <i>Prunus domestica s. oeconomica.</i>
Zindel <i>Cicendia.</i>	Zwiebelbaum (Madagascar-) <i>Vangueria.</i>
Zinken s. Wasserzinken.	Zwiesel <i>Turgenia.</i>
Zinnkraut (Scheuer- etc.) <i>Equisetum arvense.</i>	Zwillingspflaume <i>Dimocarpus Litchi s. Sapindus edúlis.</i>
Zipollen (Sommerzwiebel) <i>Allium Cepa.</i>	Zwirnhülse <i>Xysmalobium s. Asclepias.</i>
Zitteralte s. Schleimling.	Zymbelblume <i>Nolana.</i>
Zittwer (deutsch.) <i>Acorus Calámus, (-Ingwer) Amomum Zedoaria.</i>	Zymbelkraut s. Cymbelkr.
Zittwersamen s. Wurmsamen.	
Zittwerwurzel (Block-Ingwer, s.d.).	

III. Botanische Litteratur.

a. Die Autoren nebst Personalien und wichtigsten Werken.

- Abel**, Reiter u. Abel, Beschr. d. in Deutschl. seltner wildwachs. u. einiger naturalis. Holzarten, Stuttg. 1803. — Abēla Salisb.
- Ach.** = **Acharius**, schwed. Bot., † 1819, schr. Methōdus Lichēnum, Lichenographia etc. — Acharia Thb.
- Adams**, russ. Bot. u. Reis. in Sibirien 1800 u. Kauskasus 1805—06. — Adamsia Fisch., Willd.
- Ad.** = **Adanson**, franz. Bot. u. Reis., † 1806, schr. Hist. d. l. Bot. et plan des familles natur. etc. — Adansonia L.
- Afz.** = **Afzelius**, schwed. Prof. u. Reis. in Sierra Leone, † 1837, Afz. u. Elgenstierna, Genera plant. Guineensium, Upsalae 1801. — Afzelia Sm. Ehrh.
- Ag.**, **Agd.** = **Agardh**, C. A., schwed. Prof. u. Bischof, † 1859, Dispositio Algarum Sueciae, 1810—12, Lehrb. d. Botanik, Kopenh. 1831—32 u. a. — Agardhia Spr. — **Agardh**, D. G., Theoria systematis pl., Lundae 1858.
- Ahnfelt**, Nils Otto, schwed. Bot., Genera plant. Guineensium etc. 1804. — Ahnfeltia Ag.
- Ait.** = **Aiton**, Aufs. d. Kew-Gärten bei London, † 1793, Hortus Kewensis, Ed. II., 1814. — Aitonia L. f.
- Albertini** v. aus Neuwied, † 1831, Dissert. üb. Pilze, Alb. u. Schweiniz, Conspect. fungorum in Lusatiae superioris agro Niskiensi cresc., 1805. — Albertinia Spr., -niæae DC.
- Aldrovandi**, Ulyss., Prof. z. Bologna, † 1605, Dendrologiae libri II, 1690; Pomarium curiosum, Bononiae 1692. — Aldrovanda Monti.
- Alfld.** = **Alefeld**, Dr., Arzt u. Bot. z. Nied.- Ramstadt (Gr. Hessen), † 1865, schr. üb. d. Fam. d. Pyrolaceen, Halle 1856, Bienenflora Deutscgl.'s, 1863; landw. Flora, Berl. 1866.
- All.** = **Allioni**, Prof. zu Turin, † 1804; Rariorum Pedemontii stirpium specimen, 1755; Flora Pedemontana, 1785 u. a. — Allionia L.
- Alpin**, Prosper (Alpinus), Reis. im Orient, † 1617. De plantis Aegypti, Vened. 1592. — Alpinia L.
- Anmann**, J., Stirpium rarior. in imper. Rhuteno etc. Petropoli, 1739. Ammannia L. — **Anmann**, A., die Pflanzenkrankh., Stuttg. 1867.
- Anderson**, mehrere engl. Bot., Anderson Thom., Dir. d. bot. Gart. in Calcutta, schr. Fl. Adenensis 1860, Ceylon Acanthaceae etc., And., Will., Bot. d. Cook'schen Expedition. — Andersonia R. Br. — And., James, † 1809 in Madras.

- Andersson**, N. J., schr. Monogr. Andropogonearum (I. Anthistiriæ), Holmiae 1856, Mon. Salicium etc. Holm. 1867 u. a.
- Andreä** (Andreae), J. G. R., Apoth. in Hannover, † 1793, Briefe aus d. Schweiz m. Kupf., Zürich etc. 1776. — *Andreaea* Hedw.
- Andr.** = **Andrews**, H., Pflanzenmaler in Lond. The botanist's repository etc. 1799—1811. — *Andrewsia* Spr. — **Andrews**, C., Geraniums, a Monogr. London 1805—06.
- Andrz.** = **Andrzejowsky**, russ. Bot., Prof. in Wilna, † 1868, *Czackia*, genre determ. etc. 1818, Diction. glossologiae bot. 1827 u. a. — *Andreasia* DC.
- Angreville**, J. E. d', schr. La flore Vallaisanne, Genève 1863.
- Ant.** = **Antoine**, Franz, Dir. d. k. k. Gart. z. Schönbrunn, schr. die Coniferen, Wien 1840—47, d. Wintergarten etc. 1852. — *Antonia* Endl.
- Arn.** = **Arnott (Walker-Arnott)**, Prof. z. Glasgow, † 1868, Tent. method. muscorum, 1825; *Pugillus* plant. *Indiae orient.*, 1836. — *Arnottia*, Rich. — **Arnott**, A., neue indische Pfl. — **Arnott**, G., üb. *Torreya*.
- Arrabida**, Antonio de, Bisch. in Brasil., schr. Fl. *Fluminensis* (Fl. v. Rio-Janeiro).
- Arrude**, de Camara, schr. 1810 üb. brasili. Pflanzen. — *Arrudæa* Camb.
- Ascherson**, Ferd. Mor., Prof. in Berlin, schr. de fungis venenatis, Berlini 1828, pharmaz. Bot. in Tabellen 1831. — **Ascherson**, P. u. Kanitz, Catal. pl. Serbieae, Bosniae etc. *Claudiopoli* (Klausenburg) 1877. — **Ascherson**, P. Fr. Aug., Custos d. k. Herbar. z. Berlin, schr. Fl. d. Prov. Brandenb. etc., Berl. 1866.
- Askenasy**, E., Prof. in Heidelberg., schr. üb. Pfl.-Physiologie in d. bot. Zeitg. 1877, Beitr. z. Kenntniss d. Chlorophylls, u. a.
- Asso**, Ignacio, span. Bot., schr. Pl. *hispaniensum Epistölae*, Zaragozae 1793 (Briefe an Clusius). — *Assonia* Cav.
- Athanasius**, E., schr. Hist. radicis *Scillæ marinae*, Halae 1794. — *Athanasia* Cass.
- Aubert**, C. M., Aubert du Petit-Thouars, s. Pet.-Thou. — *Aubertia* Bory.
- Aubl.** = **Aublet**, franz. Bot. u. Reis. in Guiana, † 1778, schr. Hist. des pl. d. l. Guiane Franç., 1775. — *Aubletia* Schreb. L. f. etc.
- Aubenton** s. Daubenton.
- Auer**, A., schr. d. Entdeckung des Naturselbstdrucks, Wien 1854.
- Awd.** = **Auerswald**, Bernh., Lehr. u. Mykologe in Leipzig, † 1870, A. u. Rossmässler, bot. Unterhalt. etc., Lpz. 1858, A. Anleit. z. Botanisieren, Lpz. 1860.
- Babington**, Prof. z. Cambridge, schr. Fl. *Bathoniensis* 1834, Manual of brit. bot. Lond. 1843, *Primitiae Fl. Sarnicae* (Fl. d. engl. normänn. Canalinseln, 1839).
- Bachmann** s. Rivinus.
- Bail**, schr. Mykolog. Studien, d. wichtigst. Sätze d. neueren Mykologie, Jena 1861 u. a. m.
- Bak.** = **Baker**, J. G., Syst. Iridearum, 1877, Fl. of Mauritius and t. Seychelles, Lond. 1877; bed. *Liliaceen-Kenner* in Kew bei London.
- Balf.** = **Balfour**, J. H., a manual of bot., illustr. etc., Lond. 1851, t. botanist's companion with a glossary of bot. terms, Edinb. 1860. — *Balfouria* R. Br., *Balfourodendron* (g. n.). — **Balfour f.**, J. B., aspects of t. phaenogam. veget. of Rodriguez, Linn. Soc., 1876, accounts of some exper. on *Dionaea*, Edinb. 1876.
- Baranetzky**, Prof. in Kiew, üb. tägl. Periodicität im Wachstum d. Internodien u. a. (Bot. Zeitg. 1877 etc.).
- Barckhausen**, G., Fasc. Plant. ex Flora comit. Lippiaci, Goetting. 1775. — *Barckhausia* Mnch.

- Barker-Webb**, schr. m. Berthelot Hist. nat. des Iles Canaries etc., Paris 1835—41. — Barkeria Lindl.
- Barnéoud**, Monogr. d. Plantaginées, Paris 1845, B. u. Brongniart, Mém. sur l. fam. des Rhamnées, Par. 1826, u. a.
- Barrelier**, Jacq. (Barrelierius Jacobus) Barrelieri Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observ., Parisiis 1714. — Barleria L.
- Bartling**, Fr. G., Prof. in Götting., † 1875, B. u. Wendland, Beitr. z. Bot. 1824—25. — **Bartling**, Fr. Th., Ord. nat. plant. 1830. — Bartlingia Rehb.
- Barton**, Benj. Smith, Prof. in Philadelphia, † 1815, Fl. Virginica, Elements of Botany u. a. — Bartonia Pursh. — **Barton**, J., lecture sur la géogr. des plant., trad. p. Marschall, Brux. 1829.
- Bartsch**, schr. Fl. d. Umgeg. v. Ohlau in Schlesien, Ohlau 1854. — **Bartsch**, Joh. von Königsberg, Bot. u. Reis. in Surinam, † 1738. — Bartschia L.
- Bary** s. de By, **de Bary**, H. A., s. 1872 Prof. in Strassb., ber. Kryptog., s. 1867 Red. d. Bot. Zeitg., schr. naturw. Elementarb. d. Bot., Strassb. 1878 u. v. a.
- Batalin**, Gegner Darwin's, schr. üb. Mechanik d. Bewegung insektenfress. Pfl. (in d. Flora 1877).
- Bateman**, James, schr. Orchidaceae of Mexico and Guatemala, 1873—43, u. a. — Batemania Lindl.
- Batsch**, Prof. in Jena, † 1802, schr. Elenchus Fungorum 1783—89, Dispos. Gen. pl. Europae, Jenae 1794, Bot. für Frauenzimmer, Weimar, 3. A. 1804, u. a. — Batschia Mehx., Thb.
- Battarra**, J. A., † 1789, schr. Fungorum agri Ariminensis Hist., Faventiae 1755. — Battarrea Pers.
- Bauhin**, Casp. u. Joh., Brüder, Bot. d. 16. Jahrh.'s, schr. Kräuterbücher, unvollend. C. Bauhinus, Prodrom. theatri bot., Basil. 1671, J. Bauhin, Hist. plant. univers., lang nach s. Tod! — Bauhinia L., Plum.
- Baumgarten**, Bot. u. Reis. in Siebenbürgen, Arzt, † 1843, schr. Fl. Lipsiens. etc., Lips. 1790, Enumer. stirpium Transsilvaniae indigen. 1816. — Baumgartenia Spr.
- Beal**, amerik. Bot., schr. Carnivorous plants (Proced. of t. Amer. Assoc. 1876).
- Beauv.** (P.-B.) s. Palisot de Beauvais.
- Beccari**, O., bot. Reis. in Borneo u. Sumatra, schr. Malesia raccolta etc. alle piante dell' Archipelago Indo-Malese e Papuano, Genova 1877 u. Beitr. im Giornale bot. Italian.
- Béchamp**, Prof. d. Chemie in Montpellier, üb. Gährungs- u. Seidenraupenpilze in Comptes rendues s. 1865.
- Bechstein**, Forstrat in Meiningen, † 1822, schr. Forstbotanik, 5. A., 1843.
- Beckmann**, Joan., Lexicon botanicum, Göttingen 1801. — Beckmannia Host.
- Beilschmied** s. Wickstroem.
- Bellardi**, Prof. in Turin, † 1826, schr. De Mimosa sentiente, 1764, Appendix ad Fl. Pedemont. 1792. — Bellardia All.
- Bellenden-Ker**, schr. Iridearum genera, Brux. 1827. — Bellendēna R. Br., Keria DC.
- Beltramini** de Casati, schr. i licheni Bassanesi etc., Bassano 1858.
- Bemmelen**, J. A. v., schr. Repertorium annum liter. Botanicae period., Harlem 1873.
- Bennet**, John Jos., Vice-Präs. d. Lond. Linn. Soc., schr. Pl. javanicae etc. 1838. — Bennetia Gray.
- Benth.** = **Bentham**, G., Präs. d. Lond. Linn. Soc., schr. Labiatarum

- Gen. et Spec. 1832—36, Fl. Hongkong. Lond. 1861, handb. of t. brit. Fl. 1865, **B. u. Hooker**, genera plantar., Lond. 1862—67. — Benthamia Lindl., A. Rich.
- Berg**, O., Florae Brasil. Myrtographia, Lips. 1858, - mantissa I u. II ad revisionem Myrtacearum Americ., Hal. 1859—60.
- Berg.** = **Bergius**, Prof. in Stockh., † 1790, schr. Deser. plant. ex Capite Bonae spei, 1767.
- Berk.** = **Berkeley**, engl. Kryptog., **B. u. Broome**, viele mykolog. Beitr. in Zeitschr., z. B. essb. Pilze v. Feuerland, Introd. to crypt. bot., Lond. 1857, brit. Fungi etc. — Berkeleya Grev.
- Berlandier**, J. L., † 1851 in Mexiko, schr. Grossulariae etc., Genf 1828. — Berlandiera DC.
- Bernh.** = **Bernhardi**, Prof. in Erfurt, † 1850, schr. Catal. pl. Horti Erfurt. 1799, Anleitg. etc. 1804 u. a. — Bernhardia W.
- Bertoloni**, Prof. in Bologna, † 1869, schr. Fl. ital. 1838—54, Fl. ital. cryptog. 1858—67. — Bertolonia Spr., DC.
- Besler**, Bas., Apoth. z. Nürnberg, † 1629, schr. Hort. Eystettens. (bisch. Gart. z. Eichstädt), Norimb. 1613. — Besleria L.
- Besser**, W. v., Prof. z. Krzeminiec in Volhynien, † 1842 als Dir. in Kiew., schr. Primitiae Fl. Galiciae Austriae utriusq., 1809. — Bessera Spr. u. Besseria Schult.
- Betcke**, E. F., Animadvers. bot. in Valerianas, Rostocki 1826, Monogr. d. Brombeerstr. Mecklenburgs, 1850. — Betckea DC.
- Biasoletto**, Dr., schr. üb. Hydrodictyon, Rapport s. l. travaux d. l. sect. bot. des naturalistes à Pise, u. a. — Biasolettia Koch.
- Bieb., M. B.** = **Marschall v. Bieberstein** (Bieberstein), russ. Bot., † 1826, Pfl. d. Kaukasus u. Südrusslands. — Biebersteinia Steph., DC.
- Bigelow**, Prof. z. Boston (N.-Amer.), Florula Bostoniens. 1814, American Medical Bot. 1817—21. — Bigelovia Sm., DC., Nees.
- Billardier**, J. J. (vgl. Labillardier), Icones plant. rarior. Syriae etc. Dec. I, Paris 1791. — Billardiera (-deria) Sm.
- Billot**, C., schr. Annotations à la Flore d. l. France et d. l'Allemagne, Haguenau 1855. — Billotia Collad.
- Bischoff**, G. W., Prof. in Heidelb., † 1854, schr. d. Kryptog. Deutschlands 1828, Lehrb. d. Bot. 1834—40, Handb. d. bot. Terminologie u. Systemkunde 1844, u. a. — Bischofia Blume.
- Bivona-Bernardi**, Antonio, † 1834 in Messina, schr. Sicular. plant. Centuria I et II, Stirpium rar. Siciliae etc. 1813—16. — Bivonaea DC., -vonia (-nea) Spr., Raf. u. Bernardia Mich.
- Blackwell**, J., schr. Collect. stirpium etc., 5 B. — Blackwellianum herbarium emend. et auct., Norimb. 1757—73.
- Blandow**, Apoth. z. Waren (Mecklenb.), † 1810, schr. Mecklenburgs Moose, 1809. — Blandovia W.
- Bl. Fing.** = **Bluff u. Fingerhuth**, Compend. Flor. German. 1825—33.
- Blume**, Dr. C. L., Prof. z. Leyden, schr. Mus. bot. Lugduno-Batav. 1849—56, Neesia, gen. pl. javan. 1834, Rumphia s. comment. bot. de plantis Indiae Orient., Lugd.-Bat. 1836, Fl. Javae etc., Brux. 1829. — Blumea DC., -mia Spr.
- Blytt**, Prof. z. Christiania, † 1862, schr. mit A. de Candolle üb. d. Einwander. d. alpinen Pfl. nach d. Eiszeit (t. immigration of t. Norwegian Flora etc.), Christiania 1876. — Blyttia Endl., Walk.-Arn.
- Bocccone**, S. P., schr. Icon. et descr. rario. plant. Siciliae etc. (52 T.), Oxford 1674 (Museo di piante rare della Sicil., Malta etc., Venetiae, ed. II, 1697). — Bocconia L., Plum.
- Boerhave**, Prof. z. Leyden, † 1738, schr. Index pl. . . in horto academ. 1710 u. Index alter etc. 1720. — Boerhavia L.

- Böhm**, J., Pfl. Physiol. z. Wien, schr. üb. Chlorophyll 1857, Ursache d. Saftsteigens 1863, Stärkebildg. 1876 etc.
- Böhmer**, Prof. z. Wittenberg (Boehmérus), schr. Fl. Lipsiae indigēna, Lips. 1750, de pl. fasciatis 1752, Lexic. rei herb. cont. etymologiam nominum, Lips. 1802. — Boehmeria Jacq. (-ra Lk.).
- Bojer**, Wenzel, von Prag, † 1865 auf Mauritius, schr. Hort. Mauritianus, 1837. — Bojeria DC.
- Boissier**, Edm., Genfer Patrizier, Reis. im Orient, B. u. E. u. F. Buhse, Aufz. d. in Transkauk. u. Persien ges. Pfl., Moskau 1860 (in De Cand.'s Prodromus). — Boissiera Domb.
- Bolle**, Dr. C., Vors. d. Vereins f. Gartenbau in Preussen, Herausg. d. „Deutscher Garten“, Monatsschr., Berlin. — Bolla Rehb. f.
- Bolton**, Jam., Bot. in Edinb., schr. Filices brit., Leeds 1785, Hist. of fungusses (deutsch v. Willdenow) 1795—1820. — Boltonia Schreb., l'Hér.
- Bongard** u. C. A. Meyer, Verz. d. am Saisang-Nor u. Irtisch ges. Pfl., Petersb. 1841, B. Monogr. des Espèces d'Eriocaulon du Brésil, Petersb. Akad. 1831. — Bongardia Rauw.
- Bpl.** = **Bonpland**, Aimé, franz. Bot. u. Reis. (Begl. v. A. v. Humboldt 1799), † 1858, schr. Plant. équinoxiales réc. au Mexique u. Monogr. des Mélastomes. — Bonplandia W. u. Ztschr. Bonplandia, v. Seemann, Hannov. 1853—59.
- Borkhausen**, Assess. d. Ob.-Forst-Coll.'s z. Darmst., schr. Forstbot. od. Beschr. d. in Hess.-Darmst. wachs. Holzarten, Frankf. 1790, Rhein. Museum 1793, Bot. Wörterb., 2 B., Giess. 1797. — Borkhausia Böhm. (-senia Fl. Wett.).
- Bureau**, Alex., von Saumur, schr. Fl. du Centre d. l. France, 3. Aufl. 1857, u. a. — Bureau Spach.
- Bornet**, Prof. z. Cherbourg, Kryptog., B. u. Thuret, Récherch. s. 1. fécond. des Floridées 1867 u. s. l. gonidiès des lichens (Ann. d. Scie. nat. XVII).
- Bory de St. Vincent**, franz. Bot. u. Reis., schr. Exped. scient. de Morée, 1832, nouv. Fl. du Péloponnèse et des Cyclades, 1838. — Borya W., Lab., R. Br.
- Borsczew**, E., d. pharmaz. wicht. Ferulaceen d. casp. Wüste, etc., Untersuchungen üb. d. Gummiharze Asa foetida, Ammoniacum u. Galbanum (8 kol. T.), Petersb. Akad. 1860, d. arabo-casp. Calligoneen (ds. 1860).
- Bosc**, Prof. z. Paris, schr. Mém. s. quelques espèces de champignons d'Amer. 1814, s. l. diff. esp. de chênes etc. en France 1808. — Boscia Lam., Thb.
- Bosch**, R. B. van den, schr. Hymenophyllacae Javanicae, Amsterd. Akad. 1861. — Bosquië Bak.
- Bosse**, Oldenb. Hofgarten-Insp., † 1864, schr. Vollst. Handb. d. Blumen-gärtnerei, 3. A., Hannov. 1859, u. a.
- Bot. Reg.**, Botanisches Register (botanical register), angef. v. Bell.-Ker, fortgef. v. Edwards u. Lindley, Lond. 1815—47.
- Bouché**, P. Fr., Garten-Bes. z. Berlin, † 1856, schr. Garteninsekten, 1833 u. 34, d. Zimmer- u. Fenstergarten, 5. A., Stuttg. 1821, Garten-botanik; Bouché, P. Fr. u. C. Bouché, d. Blumenzucht etc., 2. A., Berl. 1854/56.
- A. Br.** = **Braun**, Alex., Geh. Reg.-Rat, Dir. d. k. bot. Gartens, Prof. in Berlin, † 1877, schr. Vieles üb. Kryptogamen, Pfl.-Physiol., Verjüngung in d. Natur u. a. m. — Braunia Schimp.
- Brefeld**, Docent d. Bot. z. Würzburg, schr. Pilze etc. — Brefeldia Rostaf.
- Bretschneider**, E., schr. Botanicum Sinicum, notes on etc., Lond. 1882, u. a.

- Breyne(e)**, Jak., schr. Exoticar. plant. Centuria etc., Gedani 1678; Breynii Prodrom. rar. pl., Gedani 1739. — Breynia Plum., Schreb.
Bridel-Brideri, S. El. v., † 1828, schr. Muscologia recentiorum etc., Gotha 1797—1822, Bryologia universal., Lips. 1826'27. — Bridelia W.
Brignoli a Brunnhof, Prof. z. Modena, † 1857, schr. Horti Mutinensis Hist. 1842, Catal. pl. etc. 1817, u. a. — Brignolia Bertol.
Brongniart, M. A. Th., Prof. z. Paris, † 1876, schr. Hist. des végét. fossiles, 1828—44, chronol. Übers. d. Vegetationsperioden etc. (deutsch v. K. Müller, Halle 1850), Enumér. des genres de plantes, Par. 1859. — Brongniartia H. B. K.
Broome s. Berkeley.
R. Br. = Brown, Robert, d. grösste Bot. Englands, schr. Vermischte bot. Schriften (deutsch v. Nees), Fl. Novae-Hollandiae, Lond. 1810, u. a. m. — Robertia DC., Mer.
P. Br. = Browne, Patrik, irisch. Bot., schr. Pfl. von Jamaika. — Brownea L., Jacq.
Bruch, Apoth. z. Zweibrücken, † 1847, Br. u. Schimper, Bryología europaea, 1837 f. — Bruchia Schwägr.
Brückmann. F. E., schr. notae et animadv. in Bauhinii prodrönum, Wolfenbütt. 1737, - idem in Pisonis et Bontii libros de Indiae etc., das. 1737, - idem in Ruppii Fl. Jenens., - Konokarpodendron (Artischoke) u. a.
Brunfels, O., aus Mainz, † 1534 in Bern, d. erste deutsche Bot., Herb. vivi Icones 1530. — Brunfelsia L.
Buch, Leop. v., schr. allgem. Übers. d. Flora auf d. canar. Inseln, Berl. 1819.
Buchanan, später Lord Hamilton, schott. Bot. u. Reis. in Indien. — Buchanania Roxb., Spr.
Buchenau, Fl. v. Bremen, 1877, Flora der Maulwurfshügel u. a.
Buek, M. D., Med.-Assess. z. Frankf. a. O., † 1856, schr. Index gen. et spec. ad Decandolli Prodrönum etc., Berol. 1840 u. 42. — Buekia Kth.
Bulliard, Pet., franz. Pilzforscher, † 1793 z. Paris, schr. Fl. Paris. 1776—80, Hist. d. pl. vénén. d. l. France, Dicton. d. l. Bot., 1797. — Bulliarda DC., Neck.
Bunge, A. v., Enum. pl. Chinate borealis, Petersb. 1838, Plantar. Mongholico-Chinens. Dec. I, Anabasearum Revisio, Petersb. 1862, u. a.
Burm. = Burmann. Joh., Linné's Patron, schr. Fl. Zeylanica (The-saurus zeyl.), Amsterd. 1737, Rar. African. plant. Decades X, Amstelod. 1738, u. a. — Burmann f., Prof. in Amsterd., schr. Fl. Ind. m. Prodrom. 1734—93, Fl. Capens., Lugd. Bat. 1768. — Burmannia L.
Buxbaum aus Merseburg, Reis. in Kleinasiens, Akad. in Petersb., schr. Plantar. minus cognit. Centuriae, compl. plantas circa Byzantium, 1728—40. — Buxbaumia Hall., L.
By de s. Bary de.
- Cäsalpinus**, Andr., Prof. z. Pisa, päbstl. Leibarzt etc., † 1603, schr. de plantis libri XVI etc. — Caesalpinia L.
Camb. = **Cambessèdes** von Montpellier, † 1863, schr. Enumer. plant. quas in Balearibus etc., 1827, u. a. — Cambessedia DC. (-ea Kth.).
Camerarius, Joachim, schr. Hort. medicus et philos. etc., Francof. 1588, Matthiolí Kreutterbuch, neue Aufl.; — Opuscula botanici argumenti, ed. J. Chr. Mikau, Prag 1797. — Cameraria L.
Campdera, schr. Monogr. du genre Rumex, Paris 1819. — Campderia Bull., Lag.
Cand. = **Candolle**, de, s. DC. de Candolle.

- Carlowitz**, G. Frhr. v., k. Kammerh. in Dresden, schr. Modifik. d. v. Truchsess. Kirschen-Systems 1819, Catalog d. Dresdener Obstbaum-schule. — Carlowitzia Mnch.
- Carmichaël**, schott. Bot., † 1827, schr. Fl. insulae Tristan da Cunha. — Carmicháélia R. Br.
- Carr.** = **Carrière**. M. E. A., Chef des Pépinières im naturh. Museum v. Paris, Red. d. Revue horticole etc., schr. Traité général des Conifères, Paris 1860.
- Carter**, Reis. im Somali-Land (Afr.), Entd. von Boswellia-Arten in d. sechziger Jahren.
- Casearius**, Joh., Mission. in Cochinchina (17. Jahrh.), schr. d. Text zu d. ersten Bänden d. Hort. malabaricus. — Casearia Jacq.
- Caspary**, R., Prof. d. Bot. z. Königsberg, schr. de nectariis, Bonn 1848, üb. d. Flora v. Preussen, 1863, üb. Blütenprossen auf Blättern, 1874, u. a. — Casparya Kth.
- Cassebeer**, schr. Entwicklung d. Laubmoose, Frankf. 1823. — Casse-beera Kaulf.
- Cass.** = **Cassini**, Henri, franz. Bot., schr. Synanthereen, 1826—34. — Cassinia R. Br.
- Cav.** = **Cavanilles**, Prof. d. Bot. z. Madrid, † 1804, schr. Monadelphiae classis Dissertt. X, Icones et descr. plantar. etc., 1791—1801. — Cavanillēa Gnu., Thb., Cavanillesia Rz. Pv.
- Catesby**, M., schr. Hortus Britanno-Americanus (trees, shrubs etc.), Lond. 1763, Naturg. v. Carolina etc. — Catesbaea Gron., L.
- Celakowski**, Pfl.-Physiolog, schr. z. B. üb. terminale Ausgliederg., Prag 1875, üb. Asclepias etc., 1877, u. a.
- Celsius**, Olaus, schr. Hierobotanicon, Upsaliae 1745—47. — Celsia L.
- Cesati**, Bar. v., Prof. in Neapel s. 1868, C., Passerini u. Gibelli, Compend. de Flora italiana, Mail. s. 1869. — Cesatia Endl.
- Chabräus**, Herausg. von J. Bauhin's Hist. pl. univers., 1650—51 (vgl. Bauhin). — Chabraea DC.
- Chaix**, Dom., † 1800, Pfarr. bei Gap (Dauphinée), schr. Fl. d. Dauphinée. — Chaixia Lap.
- Cham.** = **Chamisso**, Adelb. v., Dicht. u. Bot., † 1838 als Custos d. bot. Inst.'s zu Berlin, schr. Übers. d. nützl. u. schädl. Gew. etc., 1827. — Chamissōa H. B. K.
- Champin**, Aimé, der Weinstock, seine Kultur u. Veredelung, deutsch v. Dr. L. Rösler, Wien 1882.
- Chaptal**, Comte de, Rozier etc., Traité théor. etc. sur la cult. de la Vigne. — Chaptalia Vent.
- Chavannes**, Ed., Introd. à la Flore helvétique de Mr. Gaudin, 1830; Monogr. d. Antirrhinées 1833.
- Cherler**, Prodrōmus Hist. plant. universalis J. Bauhini, 1619; Bauhinus, J., et Cherler, hist. pl. univ., rec. Chabraeus et Graffenried (3 vol. c. m. fig.), Ebroudun. 1650—51. — Cherleria L.
- Chev.** = **Chevalier**, † 1840 z. Freiburg i. Br., schr. Hist. des Graphidées 1824, Fungor. et Byssor. illustr. 1837. — Chevallier, A., schr. du Café etc., Paris 1862. — Chevallieria Gaud., Chevalliera Beer.
- Choisy**, Prof. in Genf, schr. versch. Monogr. u. Plantae javanicae etc., 1858. — Choisia Spr. (-sya Kth.).
- Christ**, J. L., Handb. d. Obstbaumzucht, Frankf. a. M. 1797, Pomol. Handwörterb., Lpz. 1802 u. a., † 1813. — Christia Mnch.
- Cienkowski**, L., Prof. z. Charkow, schr. üb. Myxomyceten, Monaden, Rahmhaut etc. — Cienkowskia Rostaf.
- Clayton**, J., schr. Fl. virginica, Ed. Gronovius, Lugd.-Bat. 1762. — Claytonia L.

- Clusius** (de l'Ecluse, Charles), Prof. d. Bot. z. Leyden, † 1609, schr. Hist. plantar. rarior., 1601. — *Clusia* L.
- Clutius** (Auger od. Oulger Cluyt), Aufs. d. bot. Gart. z. Leyden, † 1650, schr. Hist. nucis medicinae Maldivensis (Borassus flabelliformis). — *Clutia Boerh.*, *Cluytia* Ait.
- Coëmans**, Eug., Abbé in Gent, Paläontolog., schr. Monogr. du genre *Pilobolus*, Brux. Acad. 1861.
- Cohn**, F. J., Prof. z. Breslau, ber. Pfl.-Physiol. u. Kryptog., schr. de cuticula, Vrat. 1850, Wachst. d. Pfl., 1850, Haush. d. Pfl., Lpz. 1854, die Menschheit u. d. Pflanzenwelt, Bresl. 1851, s. 1870 Beitr. z. Biologie d. Pfl.
- Colebrooke**, engl. Beamte in Ostind., schr. Fl. v. Indien, Terebinthineen etc., † 1837 in Lond. — *Colebrookia* Rxb., Sm., Ham., Don.
- Colla**, A., schr. Plantae rarior. in region. Chilens. a Bertero delectae, Taurini. — *Collaea* DC., Spr.
- Colladon**, Arzt u. Bot. z. Genf, † 1862, schr. Hist. nat. des Casques et des Sénés etc., 1816. — *Colladonia* DC.
- Colonna**, Fab. (Columna), schr. Phytobasanos (Pfl.-Probierstein), Neap. 1592. — *Colonna* Cav., -nēa Buchoz u. Columnēa L., Plum.
- Commelyn (-lin)**, Kasp., Prof. d. Bot. z. Amsterd., † 1731, schr. Fl. Malabarica 1696, Horti med. Amstel. pl. rarior. et exot., Lugd.-Batav. 1706. — *Commelynna* L.
- Comm.** = **Commerson**, franz. Bot. u. Reis. in Madagaskar, † 1773 auf Isle de France. — *Commersonia* Forst.
- Cooper**, Dan., schr. Fl. metropolitana, Lond. 1833—35. — *Cooperia* Hook.
- Corda von Prag**, ber. Mykolog., Reis. in Texas, † 1849, schr. Icones Fungorum etc., 1837—54, Deutschl.'s Algen, Nürnb. 1839, Prachtflora europ. Schimmelbildungen, Lpz. u. Dresden. 1839, u. a. — *Cordaea* Nees.
- Cornu**, franz. Mykolog., schr. Monogr. d. Saprolegnien (Ann. d. Scienc. nat. 1872). — *Cornuvia* Rostaf.
- Cornutus**, J., schr. Canadensium plant. historia, Par. 1635. — *Cornutia* L.
- Corr.** = **Correa de Serra**, port. Bot., † 1823, schr. Observat. carpologiae, 1809. — *Corrēa* Sm.
- Coss. Germ.** = **Cosson** u. **Germain**, schr. Observ. s. q. plantes critiques des environs de Paris, 1840.
- Coulter**, Thom., irisch. Arzt in Genf u. Reis. in Mexiko, † 1843 in Dublin, schr. Mém. s. l. Dipsacées, 1823. — *Coulteria* Kth.
- Courtois**, Prof. in Lüttich, schr. Expos. organor. propag. etc., Gaadae 1822. — *Courtoisia* Rchb. (-sēa Kth.).
- Cramer**, J. Chr., schr. Dispos. Syst. plantarum, Marb. 1803.
- Crantz**, Prof. d. Bot. in Wien, † 1799, schr. Stirpes austr. 1762—67, Class. Umbelliferar. emend. 1767, Cl. Cruciformium, Lpz. 1769. — *Crantzia* Vahl, Nutt. u. Scop.
- Cratevas (-tenas)**, Rhizotome od. Wurzelsammler, wahrsch. um 100 v. Chr., Fragmente, herausg. v. Anguillara, u. ein klein. ungedr. Werk. — *Crataeva* L.
- Cunning**, Hugh, Reis. in Südam. u. auf d. Philippinen, Samml. neuer Orchideen u. Cacteen etc., † 1865 z. London. — *Cumingia* D. Don.
- Cunningham**, A., Samml. für d. Kew-Gärten, in Neuhol. ermord.; schr. üb. d. Vegetat. v. Neuholland, Fl. ins. Novae Zealandiae Praecursor etc. — *Cunninghamia* Rich., Schreb.
- Cupani**, F. F., schr. Hort. catholicus principis Catholicae, ducis Misilmeris etc., Neap. 1696. — *Cupania* L., Plum.

- Curtis**, W., Apoth. in London, † 1799, schr. Fl. Londinensis 1777—98, t. bot. Magazine, fortg. v. d. Gebr. Hooker, 1787—1870, British grasses etc. — *Curtisia* Ait.
Cusson, Pierre, Prof. z. Montpellier, † 1783, schr. Umbelliferen u. a. — *Cussonia* Thb.
Cürrie, P. F., schr. Anleit. d. wildwachs. Pflanzen zu bestimmen, Gör-litz 1823.
Cyrillo, Domen., Prof. z. Neapel, schr. Pl. rar. regni Neapolit. fasc. I, Napoli 1788.
Cyrillus, Patriarch v. Alexandrien, † 444, schr. de plantar. et anima-lum proprietate liber nunc primum in lucem editus, Romae 1590. — *Cyrilla* L.

- Dahl**, A., † 1789, schr. Observ. bot. circa syst. veget. divi a Linné, Havniae 1787. — *Dahlia* Cav.
Dalechamps, J., schr. Hist. nat. plant. in libros XVIII digesta, Lugd. 1587. — *Dalechampia* L.
Dampier, W., Weltreis. u. Samml., schr. in Ray's Hist. plantarum, 1704. — *Dampiera* R. Br.
Darwin, Erasm., Arzt etc., schr. Phytonomia etc., 1800. — *Darwinia* Rudg. — **Darwin**, Charles, † 1882, ber. engl. Naturf., Begründ. d. Descendenz-Theorie, schr. on t. origine of species, 1859, Befrucht. d. Orchideen etc. durch Insekten, 1862, Klimmpflanzen, 1865, Variieren durch Domestikation, 1868, u. a. m.
Daubenton (d'Aubenton), † 1800, Prof. zu Paris, schr. m. Desfontaines Beob. d. endogenen Wachstums d. Dattelpalme. — *Dauben-tonia* DC.
de By = **de Bary**, s. Bary.
Decsn. = **Decaisne**, Dr. M. J., Prof. am Jard. des Plantes in Paris, Morren u. Decsn., üb. japan. Pfl. in Gent, Loranthaceen, Brux. 1840, Sur le Dioscorea batatas, 1855, Jardin fruitier du Museum (pomol. Prachtw.) u. a. — *Decaisnēa* Hook. f.
DC. = **de Candolle**, Aug. Pyrame, Prof. z. Genf, ber. Gründ. eines neuen Syst.'s, † 1841, schr. Prodrōmus syst. natur. Regni Vegetab. I—XVI, 1824—64. **DC.** u. **Duby**, Bot. gallica, 1830. **DC.** u. **Rédouté**, pl. crasses, Mem. s. l. Crassulacées, 1828, u. a. — *Candollēa* Lab., Rich. — **A. DC.** = **de Candolle**, Alphonse, Sohn, Prof. in Genf, Forts. d. Prodromus, 1841—64, Introd. à l'étude etc. (deutsch von Bunge), 1844, Géographie bot. etc. u. a.
Delarb're, Abbé, schr. Fl. der Auvergne, 2. A., 1800, † 1841. — *Lar-brēa* St. Hil.
Delessert, franz. Bot., † 1847, schr. Icones selectae plantar. etc., 1820 bis 1846. — *Lessertia* DC.
Delile, franz. Bot. b. Bonaparte's Exped. n. Ägypten 1798, schr. üb. d. Pfl. Ägyptens (Ann. de l'Acad. Par.). — *Delilia* Spr.
Delise, † 1841, schr. Hist. des Lichens. — *Delisaea* (-sea) Spr.
Delpino, F., schr. Rivista bot. dell'anno 1877, Milano 1878.
Denham, Major u. Capt., Clapperton, Narrative of travels (Anhang v. R. Brown), Lond. 1826. — *Denhamia* R. Br.
Dennstedt, schr. Schlüssel zu d. Hort. ind. Malabaricus (dreif. Register), Weimar 1818.
de Not. = **de Notaris**, Guis., s. 1872 Prof. in Rom, schr. Micromy-cetes etc., Musci italicici etc. — *Notarisia* Colla.
Deppe, Ferd., † 1828 in Mexiko, **Schiede** u. **Deppe**, Plantae Mexicanae. — *Deppēa* Cham., Schldl.

- Desf.** = **Desfontaines**, René, franz. Bot. u. Reis. in Algier, † 1833, schr. Fl. atlantica etc., Choix de plant. d'instit. de Tournefort 1808, Hist. d'arbres et d'arbrisseaux, Par. 1809, u. a. — Desfontainia (-nesia) R. P.
- Desm.** = **Desmazières**, franz. Bot., † 1862, schr. Agrostographie du Nord de la France, üb. Pilze, 1826, u. a. — Desmazierella Libert.
- Desv.** = **Desvaux**, Prof. z. Angers, † 1856, schr. Journal de Bot. appliq. à l'agric., pharmacie etc., 1813—14, Fl. d'Anjou, 1827, u. a. m. — Desvauxia R. Br.
- Dickson**, engl. Kryptogamist, schr. Fasc. Plant. cryptog. Britanniae, 1785—1801. — Dicksonia l'Hér.
- Dieffenbach**, E., Weltreis., schr. travels in New-Zealand w. contr. to theology, botany etc., Lond. 1843. — Dieffenbachia Schott, Endl.
- Dierbach**, Prof. in Heidelberg, † 1845, schr. Fl. Heidelbergens., 1819—20, Fl. mythologica, 1833, u. a.
- D.**, **Dietr.** = **Dietrich**, D., Prof. z. Jena, schr. Laubmoose v. Deutschl., 1823 f., Fl. Jenensis 1826, Filic. Jen. 1827, Synops. plant., Vimaræ 1839—52 (5 B.). — Dietrich, F. Gottl., schr. Vollst. Lexik. d. Gärtnerei m. Vorrede v. Sprengel, Weimar 1802—18, Nachtr. bis 1840. — Dietrichia Tratt. — **Dietr.**, A., Linné's Spec. plant. 5. A. (bis Diandria), Berl. 1831—33, Fl. regni Borussiae (12 B.), Berl. 1833—44, Bot. f. Gärtnerei (3 B.), Berl. 1837—39.
- Dill.** = **Dillen** (Dilleniuss), † 1747, deutsch. Bot. in Engl., schr. Hort. Elthamens. 1732, Moose etc. — Dillenia Thb.
- Dillwyn**, engl. Confervenkenner, schr. Brit. Confervae, Lond. 1809. — Dillwynia (-winia, -nea) Sm.
- Diose.** = **Dioscorides**, Pedanius, griech. Nat. u. Arzt, † 64 n. Chr., schr. Materia medica. — Dioscorēa Plum., L.
- Dippel**, L., Prof. am Polytechn. z. Darmst., schr. d. Mikroskop u. seine Anwend. etc., Braunschw. 1867—72, d. Entstehung d. Milchsaftgefässer, Rotterd. 1865 (gekr. Preischr.), d. Blattpfl. etc. 2. A. 1882, u. a.
- Ditmar**, Senator in Rostock, schr. Pilze im Sturm's Flora v. Deutschl. 1817. — Ditmaria Spr.
- Dodoens** (Dodonaeus), Rembert, Leibarzt Kais. Maximil. II., † 1585, schr. Cruydeboek m. Kupfern, umgearb. Hist. stirpium. — Dodonaea L. (-nēa Plum.).
- Don**, D. u. G. **Don**, erst. Bibliothekar d. Linné'schen Ges., † 1841 (— Donia R. Br.), d. letzt. engl. Bot. u. Reis., † 1856. — **D. Don**, schr. Prodr. Fl. Nepalensis u. a. — **G. Don**, Dichlamýdeae plant. 1831—38. — Donia Hook.
- Donati**, ital. Bot., † 1763, schr. üb. venetian. Pflanzen. — Donatia Forst.
- Donn.** J., schr. Hort. Cantabrigiensis etc., London 1815.
- Downing**, Landsch.-Gärtn. u. Pomolog in Nordamer., † 1853, schr. the fruits and fruit-trees of America, N.-York, 2. A., 1878.
- Dozy**, F., Muscor. frondos. novae spec. ex Archipelō Indico et Japonia, Lügd.-Bat. 1844. — **D. u. Molkenboer**, Fl. crypt. v. Nederland, 1845.
- Drejer**, † 1842 in Kopenh., schr. Fl. excurs. Hafniensis 1838, Symbolæ Caricologiae 1844 u. a.
- Dryander**, schwed. Bot., Biblioth. von Sir J. Banks, † 1810 in London, schr. Cat. bibl. nat. Josephi Banks, Lond. 1796—1800. — Dryandra L., Thb., R. Br.
- Duchesne**, Prof. z. Paris, † 1827, schr. Man. bot. d. pl. utiles 1764, Hist. d. Fraisiers, 1766. — Duchesnēa Sm.
- Dufour**, franz. Arzt u. Bot., † 1865, schr. s. l. champignons comestibles etc. — Dufourea Ach.
- Duhamel du Moureau**, franz. Nat., † 1781, schr. Traité des arbres fruitiers, Par. 1768. Deutsch: Pomona gallica, Nürnb. 1771—83, auch

- neu von Poiteau u. Turpin 1808—35, l. phys. d. arbres, u. a. — *Duhamelia* Pers., *Hamelia* Jacq.
- Dunu.** = **Dumont** de Courset, fr. Gartenautor, schr. le botaniste cultivateur etc., 1802. — *Coursetia* DC. — **Dumont** d'Urville, schr. Enum. pl. in insulis Archipelagi et Oriente lectar., Par. 1822. — *Dumontia* Lamx. Ag.
- Dumortier**, belg. Bot. in Tournai, schr. *Florula belg.* 1827, *Syllabus Jungermanniarum*, 1831, *Observ.* s. l. *Graminées belg.*, Tourn. 1823. — *Dumortiera* Nees.
- Dunal**, Prof. z. Montpellier, schr. *Solaneen, Cistineen* etc. in *De Candolle's Prodromus*, Mon. d. Anonacées, 1817 u. a. — *Dunalia* Spr.
- Duperrey**, schr. Voyage autour du monde p. Duperrey etc., Par. 1828. — *Duperreya* Gaud.
- Durante**, Cast., schr. *Herbario nuovo, Veneti* 1636, *Hortulus sanitatis, in's Teutsche, Frankf.* 1609. — *Duranta* L.
- Durieu de Maisonneuve**, Dir. d. botan. Gart. in Bordeaux, schr. Fl. d'Algerie, Catal. d. grains etc. dans l. jard. d. Bordeaux 1863—69, Plant. d. l. Gironde etc. — *Durieua Merat*.
- Duro** = **Duroi** (Du Roi), Arzt u. Dendrolog z. Braunschweig, † 1785, schr. d. Harbk'e'sche wilde Baunizucht etc., 1771—72 u. a. — *Duroia* L.
- d'Urville s. Dumont d'Urv. — *Durvillaea* Bory.
- Duschak**, M., z. Botanik d. Talmud, Pest 1870.
- Duval-Jouve** J., Insp. Acad. Strassb., schr. üb. *Equisetaceen u. Gramineen*. — *Duvalia* Haw. — **Duval**, L. J., Herausg. von Richard, Analyse d. fruit, Par. 1808, Kryptog. d. Fl. v. Regensb., † 1828. — *Duvalia* Nees.
- Duyau**, A., Kunth's Freund, schr. üb. *Veronica* u. verwandte Sippen. — *Duvaua* Kth.
- Ebermayer**, Dr. E., Prof. in München, schr. *Physiologische Chemie d. Pfl.*, Berl. 1882. I. B.
- E. Bot., Englische Botanik (Paxton's Magaz. of Botany, 1834—49).
- Ecklon**, Apoth. u. Reis. am Cap 1823—27, schr. m. Zeyher Enum. plant. Africae, † 1868. — *Ecklonia* Hornem.
- Edwards**, S., the botanical register, s. Bot. Reg., Lond. 1815 (78 col. Taf.). — *Edwardsia* Salisb.
- Ehrbg.** = **Ehrenberg**, Prof. in Berl., † 1876, schr. *Sylvae mycol. Berolinenses* 1818, *Passat-Staub* etc., *Nova gen. plant. u. a.* — *Ehrenbergia* Spr.
- Ehr.** = **Ehrhart (hardt)**, Linne's Schüler, Apoth. in Hannov. u. Stockh., † 1795, schr. Beitr. z. Naturk. etc., 1787—92. — *Ehrharta* Sm., Thb., *Ehrhardia* Scop.
- Eichelberg**, naturgetr. Abbild. u. Beschr. aller in- u. ansländ. Gew. f. Handel u. Industrie (72 col. T.), Zürich.
- Eichler**, A. W., Prof. in Berl., Dir. d. k. bot. Gart., vollend. *Martius Fl. brasiliens.* s. 1840, schr. üb. Entw. d. Blatts, Marb. 1861, üb. *Phanerog.*, Kiel 1878 n. A. Braun's Syst., *Syllabus d. Vorles.* üb. spez. u. mediz.-pharm. Bot., Berl. 1880. — *Eichleria* (g. n.).
- Elkan**, Arzt in Königsb., † 1851, schr. *Monogr. Papaveracearum, Regionem Borussorum*, 1839.
- Elliot**, Steph., amer. Bot., schr. *Botany of South-Carolina (Fl. Caroliniens.)*. — *Elliotia* Nutt., Mühlbg.
- Ell. u. Sol.** = **Ellis u. Solander**, erst. Kaufm. in Lond., † 1776, schr. üb. Korallen. — *Ellisia* L. — **Ellis**, W., Mission. d. Südsee u. v. Madagask., führte Orchid. u. Ouvirandra fenestralis ein, † 1872.
- Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- Elsner.** M., schr. Synops. Fl. Cervimontanae (Hirschberg, Schles.), Vratisl. 1839. — *Elsneria* Walp.
- E. M. = Ernst Meyer.** Prof. in Königsberg, † 1858, schr. Entwicklung d. Botanik etc., Königsb. 1844. — *Ernestia* DC.
- Ender.** Regel u. Ender, Allgem. Gartenbuch, Zürich 1868.
- Endl. = Endlicher.** Steph., Prof. etc. in Wien, ber. Gründ. eines nat. Systems, † 1849, schr. Fl. Posoniae 1830, Prodrom. Fl. Norfolkiae 1832, Enchirid. bot. 1841, m. Fenzl Sertum Cabulicum u. a. — *Stephania* W., Lour.
- Engelmann.** G. schr. t. Oaks of t. United States, t. American Junipers etc., St. Louis 1877, u. a. — *Engelmannia* Pfeif.
- Engler.** A., Antherenbild. d. Metaspermen (Pringsh. Jahrb. 1875), Monogr. d. Araceen, 1878, u. a.
- Eschweiler.** Prof. z. Regensburg, † 1831, schr. Syst. Lichenum etc., 1824, de fructu Rhizomorphae, 1822, u. a. — *Eschweilera* Mart.
- Esper.** Prof. z. Erlangen, Entomolog etc., † 1810, schr. Icones Fuorum, Nürnb. 1797—1802. — *Espéra* W.
- Ettinghausen u. Pokorny,** schr. d. wiss. Anwend. d. Naturselbstdrucks. Wien 1856.

- Fabricius.** Ph. K., Prof. z. Helmstädt, † 1774, schr. Primitiae Fl. Buti-bacensis, Wetzlar 1743, Enum. meth. pl. Horti med. Helmstadiensis 1759. — *Fabricia* G., Thb.
- Fechner.** C. A., schr. Nanna od. üb. d. Seelenleben d. Pflanzen, Lpz. 1848, Z. Erklär. volksth. deutscher Pfl.-Namen, 1871. — **Fechner.** G. Th., schr. Einige Ideen z. Schöpfungs- u. Entwickl.-Geschichte d. Organismen, Lpz. 1873.
- Fée.** Ant. Laur. Apoll., Prof. z. Strassb., † 1874, schr. Essai s. l. Cryptog. des écorces exot. offic., Par. 1824—37, Mémoir. lichénogr., 1838, s. l. fam. d. fougères 1844—66, u. a. — *Feaea* Spr. u. *Feea* Bory.
- Fenzl.** Prof. in Wien, schr. Illustr. et descr. plantar. nov. Syriae et Tauri occid., 1843, Illustr. Bot., Pest 1857, u. a. — *Fenzlia* Benth., Arn.
- Ferrari.** J. B. (Ferrarius), schr. Hesperides s. de malorum aureorum cultura, Romae 1646, de florum cult. libri IV, Rom. 1633, etc. — *Ferraria* L.
- Feuillée (Fevillée),** L., franz. Jesuit, † 1732, schr. Pfl. v. Peru u. Chili, Arzneipfl. v. Peru etc., deutsch v. Huth, Nürnb. 1756. — *Fevillēa* L.
- Ficinus.** M., schr. de triplici vita etc., Salerni 1511. — **Ficinus.** H., schr. Fl. Dresdensis 1816, m. C. Schubert Fl. d. Geg. um Dresden 1821—23. — *Ficinia* Schrad.
- Fiek.** E., Fl. v. Schlesien pr. u. östr. Anteils, Bresl. 1881.
- Fingerhuth** (s. Bluff u. Fing.), Arzt in Esch bei Euskirchen, schr. Tentam. Florulae Lichénum Eiffliacae 1829.
- Fintelmann.** Karl Jul., schr. Lehrb. für Obstbau u. Pomologie (in d. Handbibliothek f. Gärtner), Berl. 1839.
- Fischer.** F. E. L. v., Prof. z. Petersburg, † 1854, schr. Sertum Petropolitanum 1846—69, üb. Balsampappeln, u. a. — *Fischēra* G. Don, Spr. u. Sw.
- Flk. = Floerke.** H. G., Prof. z. Rostock, † 1835, schr. Deutsche Lichenen, de Cladoniis 1828. — *Floerkēa* Spr.
- Fl. Bat.**, Flora Batava s. Kops.
- Fl. Cestr.**, Flora Cestrica (v. Chester, Nordamer.) v. W. Darlington, Philad. 1837.
- Fl. Flum.**, Flora Fluminensis (v. Rio-Janeiro), v. Bisch. Antonio de Arrabida (s. Arrabida).

- Fl. Metrop..** Fl. Metropolitana (Fl. d. Hauptstadt, nämli. London, s. Cooper Dan.), Lond. 1833—35.
- Fl. Mex..** Fl. Mexicanæ v. Moçino u. Sessé, s. d.
- F. M. = Friedr. Meyer.** Prof. z. Götting., s. Meyer.
- Fl. Per..** Fl. Peruviana v. Ruiz u. Pavon, s. d.
- Fl. Wett..** Flora (ökonom.-techn.) der Wetterau, v. Gärtner, B. Meyer u. J. Scherbius, Frankf. a. M. 1799—1801.
- Flügge,** Arzt in Hamburg, † 1816, schr. üb. Gräser u. Plan d. bot. Gart. b. Hamb. 1810. — *Flueggea* W., Rich.
- Focke,** W. O., Arzt in Bremen, schr. üb. d. Kartoffelkrankh. im J. 1845, Brem. 1846, Pflanzen-Mischlinge, Berl. 1881, üb. d. Begriff Species u. Variet., Jena 1875, u. a. — *Fockea* Endl.
- Fontenelle,** Julia de, schr. m. H. Tolland Manuel de l'arboriste etc., Paris 1824. — *Fontenellea* St. Hil.
- Forsk.** = *Forskal.* Pet., dän. Reis. in Arabien, Prof. in Kopenhagen, † 1763, schr. Fl. aegypto-arabica, Ed. Niebuhr, Havniae 1775, Icones rerum nat. etc., 1776. — *Forskaelia* L.
- Forst. = Forster,** Georg, † 1794, u. J. R., Begleit. Cook's auf d. Weltreise, schr. Charakteres generum plant. q. in itinere etc. collegirunt, Lond. 1776, *Florula insular. austral.*, 1786, d. Brotbaum etc. — *Forstera* L.
- Forsyth,** W., schr. a treatise of fruit-trees, Lond. 1803. — *Forsythia* Vahl.
- Fortune,** Rob., Samml. in Japan u. China für England 1843—62, verpfl. d. Thee an d. Himalaya etc. — *Fortunaea* Lindl.
- Fothergill,** J., Arzt in Upton, † 1780. — *Fothergilla* L.
- Fougeroux,** franz. Bot., † 1789, schr. *Commentationes botanicae*. — *Fougeria* Mnch., *Fougerouxia* DC.
- Fourcroy,** A. F., schr. *Récherches s. l. pollens du Dattier d'Egypte*. — *Fourcroea* Vent.
- Fraas,** K., Dir. d. Tierarzneischule in München, schr. *Synops. plant. Floraæ classicae* 1845, Wurzel Leben d. Kulturpfl. etc., 1872, u. a.
- Francis,** schr. British Ferns etc., 1837, t. little Engl. Flora, 1839, Grammar of Botany, 1840.
- Frank,** Georg, Kräuter-Lexikon, 6. A., Lpz. 1766, urspr. Flora G. Franci, Argentor. 1635 (Lexic. pl. haec tenus usual.).
- Frank,** A. B., Prof. in Berlin, schr. Beitr. in Cohn's Beitr., Pringsh. Jahrb., Herausg. v. Leunis' *Synops.*, 3. A., etc.
- Fresenius.** Arzt u. Dozent am Senckenberg'schen med. Inst. z. Frankf. a. M., † 1866, schr. Mikroskop. Organismen, Taschenb. b. Exkursionen, Flora v. Ägypt. u. Abessinien, u. a. — *Fresenia* DC.
- Fr. = Fries,** El. Magn., Prof. in Upsala, schr. *Syst. mycolog.* 1821—29, *Elenchus fungorum*, *Lichenographiae Europæ reform.*, *Summa veget. Scandinaviae* 1846—49 u. a. — *Friesia* Spr. — **Fr. f. = Fries.** Th., Sohn, Prof. in Upsala, bes. *Lichenolog.*, schr. *Lichenes arctoi* etc., 1860, *Lichenogr. scand.* seit 1871.
- Frölich,** Arzt z. Ellwangen, † 1841, schr. de *Gentiana libellus* 1796, *Hieracium* (in De Candolle's *Prodromus*) u. a. — *Froelichia* Juss., Vahl, Mart.
- Frühlingsblumen** von Aglaja v. Enders m. Einleit. v. Prof. Dr. Willkomm, 2. Lief. m. 71 Abb. (Farbdr.), Lpz. 1882.
- Fuchs,** L. v., schr. *Effigies d. plant. etc.*, Lyon 1549, de hist. *stirpium commentarii*, Lugd. 1551. — *Fuchsia* Plum.
- Fuckel,** Apoth. z. Östrich a. Rh., ber. Kryptogamist, † 1876, schr. *Enum. fungor. Nassoviae*, 1860, *Symbolae mycologicae*, 1869/70, u. a. — *Fuckelia* Nitzschke.

Fuhlrott, C., schr. Jussieu's u. De Candolle's nat. Pflanzensyst., Bonn 1829.

Fuller, A. S., schr. Small Fruit Culturist, 1867, deutsch v. Hofgärtner H. Maurer in Jena (bespr. d. besten amerik. Obstsorten).

Funk, H. Chr., Apoth. z. Gefrees a. Fichtelgeb., † 1839, schr. Deutschlands Moose, Kryptog. d. Fichtelgebirges, 1806—38. — *Funkia* Spr.

G. = **Gärtner**, Jos., Prof. in Petersb., dann Arzt in Calw (Würtemb.), † 1791, schr. de fruct. et seminib. pl., Lpz. 1788—91, *Carpologia s. descr. et icones etc.*, Lps. 1805. — *Gaertnera* L., Lam. — **G. f.** = **Gärtner**, K. F., Sohn, † 1850, Arzt in Calw, schr. *Suppl. Carpologiae u. a.*

Galeotti, H. W., † 1858, Hauptred. d. *Journal d'Horticult. prat.* d. 1. Belgique, *Martens* u. **Galeotti**, Ericen v. Mexiko.

Grek. = **Gareke**, Prof. u. Custos d. k. Herbariums z. Berlin, schr. Fl. v. Halle, 1848, Fl. v. Nord- u. Mitteldeutschl., 14. A., 1882, j. Herausg. der Linnaea.

Gardner, G., schr. üb. *Peltophyllum* etc.

Garidel, P. J., schr. Hist. nat. des plant. q. naissent en Provence, Aix 1715. — *Garidella* L.

Garovaglio, S., schr. Alcuni discorsi sulla botanica, Pav. 1862.

Gaudichaud, Beaupré, franz. Bot. u. Reis. um d. Welt m. L. de Freycinet, † 1864, schr. Bot. du voyage autour du monde par Vaillant 1836/37, Par. 1840. — *Gaudichaudia* H. B. K.

Gaud. = **Gaudin**, Pred. z. Noyon, Cant. Waadt, † 1833, schr. *Agrostologia helvetica*, Paris 1811, *Synops. Fl. helvet.*, 1836 (herausg. v. Monnard). — *Gaudinia* P.-B.

Gaulthier, Hugues, Arzt in Quebec, schr. Catal. des pl. usuelles de la France, 1760. — *Gaultheria* L.

Gawl. = **Gawler** s. Bellenden-Gawler-Ker.

Gay, Claude, Mitgl. d. Instituts z. Paris, † 1874, schr. *Hist. fisica y politica de Chile etc. et Atlas*, 1845—53. — *Gaya* Kth., Spr., Gaud. — **Gay**, Jacq., † 1864, schr. Monogr. der Büttneriaceen, *Xeranthes*-mum etc.

Geiger, Prof. in Heidelb., † 1836, schr. *Pharmazeut. Bot.* (2. A., Nees v. Esenb. u. Dierbach, 1839/40), de *Calendula* off., 1818. — *Geigera* Less. (-ia Griseb.).

Gennari, P., schr. *Cryptog. vasculares Ligusticae*, 4. A., Turin 1856.

Germain (s. Cosson), Germain de St. Pierre, Art in Paris, schr. *Guide de Botaniste*, 1852, *Nouv. Dictionn. de Bot.*, 1870, u. a. — *Germania* Lam.

Gesner, Conr., Arzt in Zürich, † 1565, ber. Bot. d. Mittelalters, schr. *Hist. plant.*, de rariss et admirandis herbis, de *Stirpium collectione*, u. a. — *Gesnera* L. (-ria Pers.).

Geyer, K. Andr., durchforschte 1834—45 d. Flora d. nordamer. Union, red. in Meissen d. Chronik d. Gartenwesens, † 1853.

Geyler, Th., s. 1867 Dozent am Senckenberg-Inst. zu Frankf. a. M., schr. üb. *Sphacelarien* etc. (Pringsh. Jahrb. 1865) u. a.

Gibelli (s. Cesati), Assist. am bot. Garten z. Pavia, schr. *Sugli organi reprod. del gen. Verrucaria*, Milano 1865.

Gihoul, L., schr. *Culture forestière des arbres résineux conifères etc.*, Bruxelles 1847.

Gilibert, J. Em., Prof. z. Wilna, dann in Lyon, schr. Fl. lithuanica inchoata etc., Grodno 1781, *Exercit. phytologica*, Lugd. Gallor. 1792, u. a. — *Gilibertia* Gm.

- Gillen**, Arn. (Gillenius), schr. Hortus etc., Cassellis 1627 u. 32. — *Gillenia* Mnch.
Gillies, schott. Arzt u. Bot. zu Meudoza in Chili. — *Gilliesia* Lindl.
Gingins de Lassaraz, Bar. v., schr. Violariées (in Soc. nat. II, Genève 1823), Hist. nat. des Lavandes, Genf 1826. — *Ginginsia* DC.
Giseke, P. D., Prof. z. Hamburg, † 1796, schr. Index Linnaeanus etc., Icones plant. — *Gisekia* L.
Gleditsch, J. G., Prof. z. Berlin, † 1786, schr. Methodus fungorum, Berol. 1753, Bot. medica u. a. — *Gleditschia* L.
Glehn, P. v., schr. Verz. d. im Witim-Olemkaland von Poljakov u. Bar. v. Maydell ges. Pfl. (Act. Hort. Petropol. 1876).
Gloxin, B. P., Arzt in Colmar, schr. Observations bot., Strassb. 1785. — *Gloxinia* P'Hér.
Gm. = **Gmelin**, Sam. Gottl., Prof. z. Petersb., Reis. mit Pallas 1763—74 durch d. russ. Reich, † 1774 in d. Krim, schr. Hist. fucorum 1768, Reise durch Russl. 1774. — **Gmelin**, Ph. Fr., † 1763, Prof. z. Tübingen, schr. Otia bot., Tüb. 1760. — **Gmelin**, J. G., Prof. in Petersburg u. Reis. nach Kamtschatka, † 1755 in Tübingen, schr. Fl. sibirica, 1747—49, Reise durch Sibirien, 1733—43, u. a. — *Gmelina* L. — **Gmelin**, Joh. Fr. (Sohn v. Ph. Fr.), Prof. in Göttingen, † 1804, Herausg. v. Linne's Werken u. Onomatologia bot., 1772—78 (10 T.). — **Gmelin**, C. Chr., Arzt z. Karlsruhe, † 1837, schr. Fl. Badensis, Alsatica etc., 1805—26, 4 B.
Gochnat, Fr. C., schr. Tentamen medico-bot. de Cichoriaceis, Argentor. 1808. — *Gochnatia* H. B. K.
Goebel, Fr., Pharmaz. Waarenkunde (m. Ill.), Eisenach 1827—30. **G.** u. **Kunze**, dass. m. Kupf., 1827—34.
Godet, Bot. z. Neufchatel, Reis. im Kaukasus, schr. Fl. du Jura 1853, Pl. vénénées du cant. d. Neufchâtel. — *Godetia* Lindl., Spach.
Goeppert, H. R., Prof. in Breslau, ber. Paläontolog, † 1884, schr. foss. Farne, foss. Fl. d. Gypsform. Tertiär-Fl. v. Schlesien, üb. d. Riesen d. Pflanzenreichs, Berl. 1869, d. foss. Coniferen, 1850, u. a. — *Goepertia* Schldl.
Goethe, W., schr. Mitth. aus d. Pflanzenwelt (Acta Leopold. 1827/28).
Goiran, A., schr. Nomi volgari adoperati in Italia a designare le principale piante di bosco, Verona 1877.
Good. = **Goodenough**, Dr. Sam., engl. Bot., † 1827, schr. Observ. on t. brit. Fuci, 1795. — *Goodenia* Sm., *Goodenoviae* R. Br.
Gordon, G., Oberaufs. d. Vers.-Stat. Chiswick, schr. üb. Coniferen (the Pinetum), 1858, m. Nachtr. 1862. — *Gordonia* Ellis.
Gottsc̄he (s. Lindenberg), Arzt in Altona, schr. m. Lindenberg u. Nees Synopsis Hepaticarum, 1844—47. — *Gottschēa* Nees.
Gouan, Prof. d. Bot. z. Montpellier, † 1821, schr. Fl. Monspeliaca, Lugd. 1765, Hort. reg. Monspeliensis, 1768, Illustr. et observat. bot., 1773, u. a. — *Gouania* Jacq.
Grabowski, Apoth. in Schlesien, † 1842, schr. m. Wimmer Fl. Silesiae 1827—29, Fl. v. Oberschles., 1843. — *Grabowskia* Schldl.
Grah. = **Graham**, John, † 1839 in Bombay, schr. Catal. of t. pl. growing in Bombay etc., 1839. — **Graham**, Rob., Prof. in Edinburg, † 1845, schr. Fl. v. Schottland. — *Graemia* (*Grahamia*) Hook., Meuziesia *Grahamia* Hook.
Gray, Asa, Prof. z. Cambridge in Nordamerika, schr. Elements of bot., 1836, Bot. of t. United-States, 1845, u. a. — *Asagraea* Lindl.
Grev. = **Greville**, Rob. Kaye, engl. Krypt., mit Hooker Icones Filicium, 1826—31, Scotish Cryptog. Flora, Edinb. 1822—29, Algae brit., Fl. Edinensis u. a. — *Grevillea* R. Br. — **Greville**, Charl., engl. Blumist d. vor. Jahrh.'s, † 1809.

- Grew**, Nehem., schr. t. anatomy of plants, Lond. 1682. — *Grewia* Juss.
— *Grew*, Algae brit., 1830.
- Griffith**, W., Arzt in Ostind., Forscher in Indien u. Afghanistan, gab heraus *Icones plant. Asiaticarum* (üb. 600 Taf.), Calcutta 1847—54.
— *Griffithia* Ag. u. *Larix Griffithii* Hook.
- Grindel**, schr. Pharmaz. Bot. 1802, bot. Taschenb. f. Liv-, Cur- u. Esthland, Riga 1803. — *Grindelia* W.
- Grisebach**, Prof. z. Göttingen, schr. Gen. et Spec. *Gentianearum*, 1839,
Grundr. d. syst. Bot., Götting. 1854, Fl. of t. brit. West-India, Catal.
pl. *Cubensis*, *Spicilegium Fl. Rumelicae et Bithynicae*, Braunschwe.
1843, u. a.
- Gronovius**, Senator z. Leyden, † 1762, schr. Fl. *virginica*, Lugd.-Bat.
1762, Fl. *orientalis*. — *Gronovia* L.
- Günther**, Joh. Chr., † 1833 in Breslau, schr. m. Wimmer u. Grabowski
Fl. v. Schlesien. — *Guntheria* Spr., *Günthera* Andrz.
- Guépin**, Jean Pierre, Arzt in Angres, schr. Fl. de Maine et Loire m.
Suppl. I u. II, 1850—56. — *Guepinia* Fr.
- Gümbel**, Th., schr. d. Moosflora der Rheinpfalz etc., Landau 1857 u.
Herbar. vivum muscorum et lichenum etc.
- Guettard**, Et., franz. Pfl.-Physiolog., schr. Observ. sur l. plant., Paris
1747, üb. Lebenskraft etc., 1748. — *Guettarda* L.
- Guilandinus** s. Wieland.
- Gunner**, Prof. d. Bot. in Kopenh., † 1773, schr. Fl. *Norvegica*, *Nidrosiae* et *Hafniae* 1766—72. — *Gunnera* L.
- Gussone**, Giov., Prof. in Neapel, † 1866, schr. *Florae Siculae Prodr.*
1827/28, *Plantae rariores* etc., 1826 u. a. — *Gussonia* Spr.
- Haenke**, Thadd., aus Böhmen, Reis. in Südam., Mexiko, auf d. Philipinen etc., † 1817 in Bolivia; Presl's *Reliquiae Haenkeanae* etc.,
Prag 1826 f. — *Haenkea* Salish.
- Hagen**, C. G., Prof. in Königsb. 1749—1829, schr. Preussens Pfl., Kön.
1818 (*Chloris borussica*, *Regiom.* 1819). — *Hagenia* Lam., Eschw.
- Hales**, Steph., † 1768, schr. 1727 d. ber. Statik d. Gewächse. — *Halesia* L.
- Hall**, H. C. v., Elementa botanices, Groningae 1834.
- Haller**, Albr. v., Prof. in Göttingen 1736—39, k. brit. Leibarzt etc., † 1777
in Bern, schr. Fl. *jenensis* H. B. Ruppia *aucta* etc., Jen. 1745, Enum.
plant. *Horti Goett.* 1753, *Biblia bot.*, Zürich 1771—72, *Icones pl.*
Helvet., Bern 1795, u. a. — *Halleria* L. — *Haller* f., † 1823 in Bern,
schr. *Tentam. Synopsis Potentillarum*, Bern 1820.
- Hallier**, E., Prof. in Jena, Herausg. v. W. Koch's Taschenb. d. deutsch.
u. schweiz. Flora (7. umg. A., Lpz. 1878), d. pflanzlichen Parasiten
d. menschl. Körpers, 1866, *Phytopathologie*, 1868, *Schlechtendal's*
Flora v. Deutschl., 5. A., 1880.
- Ham.** = **Hamilton**, W. Lord (s. Buchanan), schott. Bot. u. Reis. in
Westind., schr. *Prodr. plant. Indiae occident.*, Lond. 1825, üb. *Hort.*
Malabaricus. — *Hamiltonia* Roxb. — **Hamilton**, Arth., schr. üb. *Scutellaria*, 1832.
- Hampe**, E., schr. Relation üb. d. v. Beyrich in Nordamer. gesamm.
Laubmoose, Handb. f. pharmaz. Bot., Nürnb. 1804. — **Hampe**, Apoth.
z. Blankenburg am Harz, *Icones musc. nov.* etc., Bonn 1844, Fl.
hercynia, Halle 1873.
- Hampel**, W., gr. Schaffgott'sch. Gart.-Insp. z. Koppitz, schr. d. moderne
Teppichgärtnerie, Berl. 1880.
- Hanstein**, Joh. v., Prof. in Bonn, † 1880, schr. üb. Keimentw., Rinde,
Marsilia u. a., Herausg. d. „Bot. Abhandl.“.

- Happe.** A. F., schr. *Conspect. praecipuar. plant. earumq. florum et fructuum etc.*, Berol. 1790—94.
- Hartig.** Th., Forstr. u. Prof. z. Braunschweig, ber. Pfl.-Physiolog. — Hartig, Rob., Prof. z. Neust.-Ebersw., schr. d. Krankheiten d. Waldbäume, 1874.
- Harting.** Pieter, Prof. in Utrecht, schr. Anatomie d. Cacteen, Kartoffelkrankh., 1851, u. a.
- Hartinger.** A., Atlas d. Alpenflora, Wien 1883, 17. Lief.
- Hartmann.** K. J., schwed. Arzt u. Bot., † 1849, schr. Handbok i Skandin. Flora, 1829, 9. A. 1864, Svensk och Norsk Exc. Flor., 1846. — Hartmannia DC., Spach.
- Hartweg.** K. Th., v. Karlsruh., Reis. in Mex. 1836—40, Insp. d. Schweitzing. Gart., *Bentham's Plantae Hartwegianae*. — Hartwegia Lindl.
- Hartwig.** J., Garteninspector in Weimar, d. illustr. Hausgärtner, 10. A. 1885.
- Harvey.** W., Prof. d. Bot. in Dublin, † 1866, schr. *Nereis Boreali-Amer.*, Washington 1852—57, *Thesaurus Capensis*, 1859—63, u. a.
- Hassearl (-karl).** Jul. C., aus Cassel, für Holland Leit. d. bot. Gart. z. Buitenzorg auf Java, siedelte dort s. 1854 d. Chinabaum an, schr. *Pl. javanicae, Filices jav. Horti Bogotiensis descr.*, Amstelod. 1858, *Commelinaceae indicae etc.*, Vindob. 1870.
- Haw.** = Haworth, Adr. Hardy, engl. Bot., † 1833, schr. üb. Saftpfl., Norimb. 1819, Monogr. *Narcissorum*, 1831. — Haworthia Duv.
- Hayne.** Prof. d. Bot. in Berl., † 1832, schr. *Dendrol. Fl. d. Gärten Berlins*, 1822, *Arzneigew.*, Berl. 1843—46, u. a. — Haynea Spr., W.
- Hedw.** = Hedwig aus Siebenbürgen, Prof. z. Leipzig, schr. classische Schriften üb. Moose, *Filicum genera etc.*, Lips. 1799, u. a. — Hedwigia Ehrh.
- Heer.** Osw., Prof. z. Zürich, *Paläontolog*, † 1883, schr. *Urwelt der Schweiz*, 1864, 2. A. 1879, *Pfahlbauten*, d. Tertiär-Fl. d. Schweiz, *Fl. foss. arctica* u. a.
- Hegetschweiler.** schr. Beitr. z. Aufzähl. d. Schweizerpfl., Zürich 1831, *Fl. d. Schweiz (fortg. v. Osw. Heer)*, † 1839. — Salix Hegetschweileri Heer.
- Heiberg.** 1866—68 Red. d. dän. *Botanisk Tidsskrift*, † 1875, schr. *Diatomaceae danicae*, 1863.
- Heister.** Prof. d. Bot. z. Helmstädt, † 1758, schr. *Indices plantar. etc.*, *Systēma pl.*, 1748, u. a. — Heisteria L.
- Heller.** schr. *Fl. Wirceburgensis*, Würzb. 1810—11. — Helleria Mart.
- Henckel v. Donnersmark.** schr. *Nomenclat. bot.*, Halle 1821. — Henckelia Spr.
- Henderson.** E. G., Patriarch d. Handelsgärtn., † 1880, 94 J. alt. — Henderson, J., engl. Bot., † 1866. — Hendersonia Berk.
- Henkel.** J. B., Prof. z. Tübingen, † 1871, schr. m. Hochstetter *Synops. d. Nadelhölzer*, Stuttg. 1865. — Henkel, J. Fr., schr. *Flora Saturnianzans*, d. Verwandt. d. Pfl. u. d. Mineralr.'s, Lpz. 1755.
- Henslow.** schr. on the origin of the prevailing systems of phyllotaxis (Linn. Soc. I. 2). — Henslowia Hook. f., Henslovia Planch.
- Herb.** = Herbert, W., engl. Pfarr. u. Bot., † 1847, schr. *Amaryllideen*. — Herbertia Sweet.
- Herbich.** Fr., schr. *Stirpes rarer. Bucovinae, Stanislavow*, 1853, *Fl. d. Bukowina*, Lpz. 1859. — Herbicia Zawadski.
- Herit.** od. l'Hér. = l'Héritier, Bot. u. Inst.-Mitgl. z. Paris, † 1800, ermord., schr. *Stirpes novae, Geraniologia* 1788, *Sertum anglic.*, 1788, u. a. — Heritiaria Ait., Schrk.
- Herm.** = Hermann, P., Prof. in Leyden, Reis. auf Ceylon, † 1695, *Hermannii Paradisus Batavus etc.*, Lugd.-Bat. 1705. — Hermannia L.

- Heufler**, L. v., d. Hypneen Tirols, Wien 1860. — Heufleria Awd.
- Heyder**, Ed., älт. Rath etc., rief d. Pomol. Instit. v. Proskau u. Geisenheim ins Leben. — Heyderia C. Koch.
- Heynhold**, Nomenclator bot. hortensis, 2 B., Lpz. 1840 u. 46.
- Hil.** od. **St. Hil.** = Saint-Hilaire, A. de, fr. Bot. u. Reis. in Brasil., schr. Voyage dans l. distr. des diamans du Brésil etc., Paris 1833 — Hilairia DC., Hilaria H. B. K.
- Hill**, John, engl. Arzt u. bot. Autor in Lond., † 1775, schr. Hort. Kewensis 1768, Herbar. brit., 1769, u. a. — Hillia L., Jacq.
- Hirschfeld**, Prof. in Kiel, schr. d. ber. Theorie d. Gartenkunst, 1777 bis 1782, Handb. d. Fruchtbaumzucht, Braunschweig 1788. — Hirschfeldia Mnch.
- Hochstetter**, W., Univ.-Gärtn. in Tübingen, schr. m. Henkel üb. Coniferen. — Hochstetteria DC.
- Hoffm.** = **Hoffmann**, G. F., Prof. z. Götting., dann Staatsr. in Petersburg, † 1826, schr. Enum. Lichénium, Deutschlands Flora, 1791 f., Vegetabilia cryptog., Erlang. 1787—90. — Hoffmannia Sw., W. — **Hoffmann**, Herm., Prof. in Giessen, namh. Mykolog, schr. Mykol. Ber. 1870—71, Index fungorum, 1863, üb. therm. Constanten etc., 1875, Lehrb. d. Bot., Darmst. 1857, u. a.
- Hoffmig.** = **Hoffmannsegge**, Graf v., in Dresden, † 1849, schr. m. Link Fl. portugaise, Berl. 1809—40. — Hoffmannseggia Cav.
- Hofmeister**, W., Prof. in Heidelberg., dann Tübing., † 1877, namh. Pfl.-Physiolog, mit Irmisch, Pringsheim u. J. Sachs Herausg. d. Handb. d. physiol. Bot., schr. Beitr. z. Kenntnis d. Gefässkrypt. (18 T.), Lpz., Allg. Morphologie etc., Lpz. 1868, u. a.
- Holmskiold**, dän. Bot. aus Nyborg, † 1794, schr. Beata ruris otia fungis Danicis impensa, Havniæ 1790—91. — Holmskioldia Retz.
- Hook.** = **Hooker**, W. J., s. 1839 Dir. d. Kew-Gärt. b. London, † 1865, schr. Niger-Flora, Lond. 1849, Fl. boreali-amer., Lond. 1829, Hooker u. Greville Icones Filicum, 1829—31, Hooker u. Taylor Muscol. brit. 2. A., 1827, Herausg. d. Lond. Bot. Magazine u. Journal of Botany. — Hookeria Sm. — **Hooker f.**, Hooker, Jos. Dalt., Sohn u. Nachfolg. d. vor. in Kew, Reis. im Himalaya, Hook. u. Thomson Fl. Indica, Lond. 1855, Introd. ess. on t. Fl. of New-Zealand, Lond. 1853, on t. bot. of t. antarctic voyage of t. ships Erebus u. Terror, Fl. Nova-Zelandiae, Lond. 1853, Fl. of India 1873, Synops. Filicum, 1874.
- Hoppe**, Prof. in Regensb., † 1846, Herausg. d. Regensb. Flora, schr. Caricologia germ. (in Sturm's Flora, Regensb.). — Hoppéa W. Rehb., Dietr.
- Hornemann**, Prof. in Kopenh., † 1841, schr. Fl. Dänemarks, Hort. bot. Hafniensis, 1813 f., Nomencl. Fl. Dan., u. a. — Hornemannia W.
- Hornsueh**, Prof. in Greifswald, schr. üb. d. Metamorph. nieder. Organismen, 1820. — Hornschuchia Blum.
- Horsfield**, Thom., schr. Pl. Javanicae rarior. etc., elabor. J. Bennett et R. Brown, Lond. 1838—52, üb. Rhus u. a. — Horsfieldia Blum.
- Hort.** = Hortulorum, kleiner od. gewöhnlicher Gärten.
- Hortulan.** = Hortulanorum der Gärtner.
- Hort. Kew.** = Hortus Kewensis, Pfl.-Catalog der Kew-Gärten b. London v. Hooker u. Walker-Arnott, 1847.
- Hort. Mal.** = Hortus Malabaricus (im 17. Jahrh. angef. v. Joh. Cassarius).
- Host**, Leibarzt z. Wien, † 1834, schr. Fl. austriaca, Icones graminum austr., Salix, u. a. — Hosta Jacq., Hostea W., Hostia Mnch.
- Houstoun**, W., Reliquiae Houstounianae s. plantar. in Amer. meridionali collectar. Icones, Lond. 1781. — Houstounia L.

- Houtt.** = **Van Houtte**, L., Herausg. d. Flore des Serres u. jardins de l'Europe, Gent, schr. pl. des serres et de pleine terre, Gand 1847, † 1876 in Gent.
- Houttuyn**, Arzt u. Bot. z. Amsterdam, schr. natürl. Gesch. d. Pfl., Tiere u. Miner. nach Linnaeus, 1774—83. — *Houttuynia* Thb., Schreb.
- How.** = **Howard**, John Elliot, schr. Illustr. of the Nueva Quinologie of Pavon, 1862. — *Howardia* Wedd.
- Hudson**, W., Apoth. in London, † 1793, schr. Fl. Anglicica, 3. A., 1798. — *Hudsonia* L.
- Hübner**, J. G., Pflanzenkunde, Potsd. 1867 (m. Holzschn.).
- Hügel**, K. Ans. Frhr. v., Reis. in Asien, schr. üb. Kaschmir u. d. Sihksreich, 1837—41, Enum. pl. *Novae-Hollandiae*, üb. d. Südsee etc., 1860, üb. Kabul etc., † 1872 in Brüssel. — *Huegelia* Rchb.
- Hb.**, **Humb.** = **Humboldt**, Al. v., ber. Naturf. u. Reis. in Asien und Amerika, † 1859, schr. Fl. *Fribergensis* etc., 1793, Pl. *equinoxiales*, 1805—18, *Kosmos* u. a. — *Humboldtia* Vahl, Rz. Pv.
- H. B. K.** = **Humboldt**, **Bonpland** u. **Kunth**. *Synops. plantar. q. in itinere ad plagam aequinoctialem orbis novi collegentur* A. de Humboldt et A. Bonpland von Kunth, Paris 1822.

- Jack**, W., schott. Bot. u. Reis. in Sumatra, † 1822, schr. Descr. of Malayan plants, 1820. — *Jackia* Walt. — **Jack** u. **Etheridge**, plants in the lower Old-Red etc., 1877.
- Jackmann**, James, Hand.-Gärtn. in d. Grafsch. Surrey, erzielte besondere Clematis-Varietäten u. Biendlinge.
- Jackson**, G., schott. Bot., schr. in Linn. Soc. Transactions. — *Jacksonia* R. Br.
- Jacq.** = **Jaequin**, Nic. Jos. Bar. v., österr. Arzt, Bot. u. Reis. in Westind., † 1817, schr. *Observationes bot.*, 1764, Fl. austriaca, Hort. *Vindobonensis*, *Icones plant. rar.*, *Collectanea* etc. — *Jacquinia* L.
- Jäger**, G. F., schr. üb. Missbildungen etc., Stuttg. 1814, de quibusd. *Pini sylv. monstris*, 1828, u. a. — *Jaegeria* H. B. K. — **Jäger**, A., *musci cleistocarpi*, St. Gallen 1869. — **Jäger**, H., u. **Beissner**, die Ziergehölze etc., 2. A., Weim. 1883.
- Jaubert**, Graf v., m. **Spach** *Illustrationes plant. orientalium*. — *Jaubertia* Spach.
- Jaume**, St. Hilaire, schr. *Pl. de la France décr. et peintes d'après nature*, 1808. — *Jaumea* Pers.
- Ideler**, G. F., schr. wirthsch. Gärtnerei, 2. Th., Berl. 1798—99. — *Ideleria* Kth.
- Jessen**, Prof. d. Bot. in Berlin, schr. *deutsche Exc.-Flora*, Hannover 1879, Bot. d. Gegenw. u. Vorzeit, Lpz. 1864, u. a.
- Johnson**, Thom., Herausg. von John Gerarde's „the Herball“, 1633. — *Johnsonia* R. Br.
- Irmisch**, schr. z. Morphologie d. Orchideen, 1853, Beitr. z. vergleich. Morphol. d. Pfl. (8 T.), Halle 1854, u. a.
- Isnard** (Ant. Danty d'Isnard), Prof. z. Paris, † 1724. — *Isnardia* L., *Dantia* P.-Th., DC.
- Jühlke**, Franz, Hofgart.-Dir. in Berlin, Herausg. v. Schmidlin's Blumenzucht im Zimmer, 4. A., 1880, *Garten-Buch f. Damen*, 3. A., 1874, u. a.
- Jung**, Dr. Joach. (Jungius), in Lübeck 1587—1657. — *Jungia* G., L. — **Jung**, W., schr. Fl. d. Herzogt.'s Nassau, 1832.
- Jungermann**, Prof. in Giessen, schr. Fl. v. Altorf, 1615, Fl. v. Giessen, 1623. — *Jungermannia* L. u. Nees.

Junghans, P. C., *Icones plantar. offic. ad vitam impressae*, Halae 1788,
Icones pl. rar. 1792. — *Junghansia* Gm. (nicht -hausia!).

Junghuhn, Fr., holl. Reis. in Java s. 1835, schr. *javan. Balanophoreen*,
 1840, *Nova genera et species plant. Florae javanicae*.

Juss. = **Jussieu**. Ant. Laur. de, s. 1770 Prof. am Jardin de plantes
 z. Paris, ber. Bot. u. Begründ. d. natürl. Syst.'s, † 1836, schr. *Genera
 plant. secundum ord. nat. disposita* 1789, *Principes d. l. méth. nat.
 d. vég.* 1824, u. a. — *Jussiaea* St. Hil., *Jussiaea* L., *Jussiaea*
 Rottl. — **Jussieu**, Bernard de, 1699—1777, Onkel des vorig., s. 1759
 im k. Gart. z. Trianon, *Zusammenstell. d. Pfl. darin in 65 Ord.* —
Juss., Joseph de, *Condamne's Reisebegleit. u. Samml. in Südamer.*,
 1735. — **Juss.**, Antoine de, Arzt u. Prof. am bot. Gart. z. Paris,
 † 1758. — **Juss.**, Adrien de (**A. Juss.**), d. Brud. Ant. Laur.'s, † 1853,
 schr. *Euphorbiacearum genera* 1824, *Elementarcurs.* 1840 (deutsch v.
 Schmidt), u. a.

Kämpfer, Engelbr., Leibarzt in Lippe, Reis. in Japan, † 1716, schr. *Amoe-
 nitatum exoticar. fasc. V.*, 1712 (deutsch Lemgo 1717—19), *Icones
 select. q. in Japonia collegit etc.*, Lond. 1791. — *Kaempferia* L.
 (-ra Spr.).

Kalm, Pet., Linné's Schüler, Reis. in Nordamer., † 1779, Prof. z. Åbo
 in Finnland, schr. *Fata botanices in Finnland*, 1758, *Fl. fennica*.
 1765, u. a. — *Kalmia* L.

Kanitz, A., schr. *Gesch. d. ungar. Bot. etc.*, Halle 1865, *Haynaldia n.
 g. in Magyar Növentanidapok*, 1877, u. a.

Karsten, H., schr. *Auswahl neuer etc. Gew. Venezuela's*, Berl. 1848,
Fl. Columbiae specim., Berl. 1858. — **Karsten**, P. A., schr. *Fungi
 novi Fennici*, Helsingfors 1868.

Kaulfuss, Prof. in Halle, † 1830, schr. *Enum. Filicum quas etc.*, 1824,
 d. Wesen d. Farnkräuter, Lpz. 1827, u. a. — *Kaulfussia* Blum., Nees.

Kemmler, C. A. (u. v. Martens), *Flora v. Württemberg u. Hohenzollern*,
 3. A., 1883.

Kerner, J. S., schr. *gift. u. essb. Schwämme*, Stuttg. 1786. — *Kernera
 Mea* u. W. — **Kerner**, A., *Abbild. aller ökon. Pil.*, *Primulaceen d.
 östr. Alpen* (Östr. Bot. Zeit. 1875), *Gesch. d. Aurikel u. a.*

Kew-Gardens s. *Hort. Kew.*

Kickx, J., schr. *Récherches s. l. Flore cryptog. des Flandres*, Brux.
 1840—55.

Kieser, D. G., *Elemente d. Phytotomie*, Jena 1815. — *Kieseria Reinw.*

Kirschleger, Prof. in Strassb., schr. *Fl. d'Alsace*, 1852—58, *Fl. vogéso-
 rhénane*, 1870, u. a.

Kitaibel, Prof. z. Pest, † 1818, schr. *Descr. et Icon. pl. rarior. Hunga-
 riae*, Wien 1803—12. — *Kitaibelia* W.

Kittel, M. B., *Taschenb. d. Flora Deutschlands*, 1837 u. 47. — *Kittelia*
 Rchb.

Klatt, F. W., schr. *Plantae Muellerianae*, Monogr. Gen. *Sisyrrhinchium*,
Revisio Iridearum (in d. *Limnaea*), 1864—66, u. a. — *Klattia* Bak.

Klein, J. H., dän. Reis. in Ostind., 1750—98. — *Kleinia* L. — **Klein**,
 J. Th., schr. *Dubia circa pl. marinas etc.*, Petrop. 1760. — **Klein**,
 M., schr. *Abh. üb. Ratanhia*, Stuttg. 1819, u. a.

Klöbisch, R., schr. *deutsche Waldbäume u. ihre Physiognomie* (16 T.,
 88 Holzs.), Leipzig 1857.

Klotzsch, Apoth. u. Custos d. k. Herbariums z. Berlin, † 1860, schr.
Begoniaceen etc. (12 T.), Berl. 1855, *Herbar. vivum mycolog.* 1855—59,
 fortg. v. Rabenhorst, *Klotzsch* u. Gärcke, d. bot. Ergebnisse d.

- Reise d. Prinz. Waldemar etc., Berl. 1862, u. v. a. — Klotzschia Cham.
- Knab.**, Mich., Verw. d. Frhrn. v. Stieber in Vorchheim b. Nürnberg, schr. Hortopomologium od. Garten-Peltzbuch, 1620.
- Knapp,** Joh. Leonh., † 1845, Herausg. d. Journal of t. naturalist, Lond. 1819, schr. Gramina britann. 2. A. 1840. — Knappia Sm. — **Knapp,** Jos. Herm., schr. Prodr. Fl. Nitriensis, Vindob. 1865.
- Knaut.** Chr., Prof. z. Halle 1654—1716, schr. Method. pl. genuina, Lips. 1716. — Knautia Coul.
- Knight.** Thom. Andr., † 1838, Präs. d. Lond. Gartenb.-Ges., schr. üb. Degenerieren d. Obstsorten. — Knightia R. Br.
- Kniphof,** J. H., Botanica in originali s. Herbar. vivum. Centuria X., Halae 1763 (100 kol. Taf.).
- Knorr,** G. Wolfg., schr. Thesaurus rei bot. hortensisq., Norimbergae 1750—72. — Knorria Sternb., Göpp.
- Knowles** u. Westcott, Herausg. d. Floral Cabinet, Lond. 1837—40, schr. t. Birmingham bot. garden, 1836—37.
- Kny,** L., Prof. in Berlin, schr. Pflanzenleben d. Meeres, Berl. 1875, Fl. d. ozean. Inseln, 1867, bot. Wandtafeln etc., 1876—85 (70 T. in Farbdr.), u. v. a.
- Koch,** W. D. J., Prof. z. Erlangen, † 1849, schr. Synops. Fl. germ. et helvet. od. Taschenb. d. deutsch. u. schweiz. Flora, Leipz., 6. A., 1865, Röhling's Fl. Deutschl.'s m. Mertens bearb. 1823—39 (5 B.), u. a. — Kochia Roth. — **Koch,** K. od. C., Prof. in Berlin, Reis. im Kaukasus, † 1879, schr. Hort. dendrolog. etc., Berl. 1853, Dendrologie etc., Erlang. 1869, d. bot. Gärt. Berlins, 1860, u. a.
- Koeler,** Prof. z. Mainz, schr. Descr. graminum, 1812. — Koeleria Pers.
- König.** Joh. Gerh., dän. Nat. u. Reis. in Ostind., † 1785 in Tranquebar. — Koenigia L. — **König.** Sam. Fr., de Lamio Plinii, Argentor. 1742. — **König.** Em., schr. regnum vegetabile quadripartitum, Basil. 1708. — **König.** K., Geistl., schr. Führer durch d. Pfalz, 1841.
- Kbr.** == Kürber, Prof. z. Breslau, Kryptog., schr. Syst. Lichenum Germ., Bresl. 1855, Parerga lichenologica, 1855 u. 59, u. a. m.
- Körnicke,** Prof. z. Poppeisdorf b. Bonn s. 1867, schr. Mon. de Eriocaulaceis, Berol. 1856, Mon. Marantacearum, Mosk. 1859, Mon. d. Rapataceen (in d. Linnaea, 1872), u. a.
- Körte** s. Schweigger.
- Kohl,** schr. Taschenwörterb. d. bot. Kunstausrücke für Gärtner. Berl. 1883.
- Kops,** schr. mit Van Hall, Miquel etc., Fl. Batava etc., Amsterd. 1800—1860 (üb. 1000 kol. T.). — Kopsia Blum., Dumart.
- Kosteletzky,** schr. Allg. mediz.-pharmaz. Flora (6 B.) Mannheim, Clavis analyt. in Floram Bohemiae phanerogamam, Prag 1824. — Kosteletzky Presl, J. Eck.
- Kotschy,** östr. Reis. im Orient, schr. Vegetat. d. Isthmus v. Suez, Wien 1858, de plantis niloticoo-aethiopicis Knoblecherianis, Wien 1864, plantae Binderianae nil.-aeth., Vienn. 1865, d. Libanon u. seine Alpenflora 1864, u. a. — Kotschya Endl.
- Kratevas** s. Cratevas.
- Krause,** Abbild. u. Beschr. aller Getreidearten, Leipz. 1834—37 (8 H.).
- Krebs,** J. L., vollst. Beschr. u. Abbild. d. sämmtl. Holzarten d. mittl. u. nördl. Deutschl.'s (139 kol. T.), Brschw. 1826—35.
- Krempehuber.** A. v., Salinen- u. Forstmeist. z. München, schr. Lichenenflora Bayerns 1861, Gesch. u. Liter. d. Flechten 1867—70, d. Flechten als Parasiten d. Algen (in der Flora, 1871), u. a.
- Krocker.** Ant. Joh., Arzt in Breslau, † 1823, schr. Fl. Silesiaca renovata 1787—1823. — Krockeria Mnch.

- Krombholz**, J. Vinc. v., † 1843 in Prag, gab heraus Abbild. essb. u. schädl. Schwämme, Prag 1831—47 (10 H., 2000 kol. Fig.).
- Krüger**, Dr. M. Sal., schr. Bibliographia bot. od. Handb. d. bot. Literatur m. biogr. Skizzen, Berl. 1841. — Kruegeria Neck.
- Küchenmeister**, Arzt in Dresden., schr. 2. Abt. d. menschl. Parasiten (pflanzl. Par.), Leipz. 1858.
- Kühn**, Jul., Prof. in Halle, schr. d. Krankheiten d. Culturgew., Berl. 1858, u. a.
- Kützing**, E. T., Prof. an d. Realsch. z. Nordhausen, namh. Algolog, schr. Synops. Diatomacearum 1834, Algarum aq. dulc. Decas, Phycologia germ., 1846, Grundz. d. philos. Botanik, Lpz. 1851—52, u. a.
- Kuhn**, Adam, Bot. in Pennsylvanien, Linné's Schüler. — Kuhnia L. f. — Kuhn. Max, Bot. bes. Farnkennner z. Berlin.
- Kummer**, Paul, schr. Führer in d. Pilzkunde, Zerbst 1871, Kryptog. Charakterbilder, 2. A., Halle 1883, deutsche Blumenwelt in Charakterbildern, 2. A., Halle 1883.
- Kth.** = **Kunth**, Prof. in Berlin, Assist. A. v. Humboldt's u. Bonpland's bei Herausg. d. in Amerika ges. Pflanzen, † 1850, schr. Fl. Berolinens., Handb. d. Bot., Synops. Pl. aequinoct. orbis novi, Par. 1822. — Kunthia Hb.
- Kuntze**, Dr. O., schr. „Um d. Erde“, Lpz. 1881, Phytogeogenesis, Lpz. 1884.
- Kze.** = **Kunze**, Prof. u. Dir. d. bot. Gart. z. Leipzig, † 1851, Deutschland's Schwämme in getrockn. Exempl. 1816, K. u. Schmidt, Mykol. Hefte 1817—23, Anal. pteridographiae 1837, d. Farnkr. in kol. Abb., 1840—51, Schkuhr's Riedgräser 1840—50, u. a. — Kunzia Spr.
- Kurz**, S., schr. Forest Flora of British Burma (Asiat. Soc. of Bengal, 1877), on Pandanophyllum etc., Calcutta 1863, Sketch etc. of t. Nicobar Islands 1875, t. forest of Pegu, 1875.

- Lab.** = **Labillardier**, J. Houtte de, bot. Reis. im Orient u. in Neuholland, † 1834, schr. Icones pl. Syriæ rar., 1791—1812, Novaehollandiae plant. specimen, Sertum austro-caledonicum, Par. 1824—25. — Labillardiera R. S., Billardiera Sm., -deria Spr.
- Lag.** = **Lagasea**, span. Bot., † 1839 zu Barcelona, schr. Amenidades natur. de las Españas etc., 1811, Elenchus plant. etc., 1816, Umbelliferae, 1826, u. a. — Lagascea W., -cia Cav.
- Laharpe**, Pablo J. de, schr. Monogr. d. Juncaceen.
- La Llave**, span. Arzt u. Bot. in Mexiko, schr. mit Juan Lexarca Novorum vegetab. descr., Mexici 1824/25.
- Lam.** = **Lamarek** (La Marek), J. B. v., Nat. in Paris, † 1829, schr. Fl. Franç., Hist. nat. d. vég., 1802, Encycl. méth. botanique, 1783 bis 1817 (13 B. m. Atl.). — Lamarckia Mnch., Rich., -kea Pers.
- Lamb.** = **Lambert**, Aylmer Bourke, schr. Descr. of gen. Pinus, Lond. 1803. — Lambertia Sm. — **Lambert**, G., schr. de geogr. plant. in Wetteravia et Marchia Brandenb. indegenarum, Berol. 1849.
- Lamx.** = **Lamouroux**, Prof. z. Caen, † 1825, schr. Diss. s. plus. espèc. de Fucus, 1805, Thalassiphyses etc., Hist. d. polypes corallig. etc., 1816. — Lamourouxia H. B. K.
- Langsdorff** in Brasil., mit Fischer Reis. um d. Erde unt. Krusenstern, schr. üb. Cainca-Wurzel (Chiococca scandens). — Langsdorffia Mart., W.
- Lantzius-Beninga**, S., schr. d. unterscheid. Merkmale d. Pfl.-Fam. u. -Geschl. (I. Dialy- u. Gamopetalen), Gött. 1866.
- Lap.** = **Lapeyrouse**, Ph. Picot (La Peyrouse) Bar. de, † 1818 in Toulouse, Figures d. l. Fl. des Pyrénées 1813 u. hist. abrég. d. pl. des Pyrénées, 1813—18. — Lapeyrousie Thb., Gawl.

- La R. = La Reina.** schr. Buch d. Tierheilkunde (Albeiteria), 2. A., 1552.
Lasch. Apoth. z. Driesen in d. Neumark, † 1863, sammelte Schwämme
für Rabenhorst's Fungi europaei, mit Baenitz Herbarium norddeutsch.
Pfl., 1860. — *Laschia Corda*.
- Lanche,** W., k. pr. Gart.-Insp. d. Gärtner-Lehranst. b. Potsdam, s. 1877
Geschäftsf. d. deutsch. Pomol. Vereins, † 1883, schr. deutsche Pomologie u. deutsche Dendrologie, 2. A., 1883.
- Lawrence,** Marie, Pfl.-Malerin, a collect. of Roses from nature, 1796—99.
— *Lawrenzia Lyngb.* (Laurencia).
- Lawson,** J., schr. Diss. sistens Nihil officinale, Lugd.-Bat. 1737. —
Lawsonia L.
- Laxmann.** Erich, Past. in Sibirien, dann Prof. u. russ. Hofrat, † 1796,
schr. sibir. Briefe, Götting. 1769, Beitr. z. Flora u. Fauna Russlands
(in Nov. comm. acad. Petropol.). — *Laxmannia Forst.*, R. Br.
- Lebr. = Lebreton,** F. Man., schr. De botanica à l'usage des amateurs
etc., Par. 1787. — *Lebretonia Schrk.*
- Leschenault** s. Leschenault.
- Lecoq,** Henri, Prof. z. Clermont-Ferrand, L. u. *Jnillet* schr. Dict. rais.
des termes de bot., 1831, L. u. *Lamotte* schr. Catal. rais. d. pl.
vascul. du Plateau central d. l. France, 1847, u. a. — *Lecokia DC.*
- Ledebour,** K. F. v., Prof. z. Dorpat, † 1851 zu München, schr. (mit
Meyer u. A. v. Bunge) Fl. altaica, 1829—34, *Icones Fl. ross.*, Fl.
rossica, 1842—53. — *Ledebouria Roth*, Lk.
- Leers,** Apoth. z. Herborn im Nassau'schen, † 1774, schr. Fl. Herbor-
nensis, 1775. — *Leersia Sw.*, Sol.
- Lehm. = Lehmann,** J. C. G., Prof. in Hamburg, † 1860, schr. Monogr.
gen. Primularum, 1817, Potentillar., 1820, *Novarum Stirpium pugil-
lus*, 1828—57, Plantae novae in horto Hamb., u. a. — *Lehmnia Spr.* — *Lehmann*, C., schr. Plantae Preissianae s. Enum. pl. in tot.
Australasia occid. collect. de L. Preiss, Hamb. 1844—48.
- Lej. = Lejeune,** Hospitalarzt in Verviers, † 1858, schr. Fl. des environs
de Spa, 1811—13 (mit Lindenberg), mit Courtois Compend. Fl.
belgicae, *Leodium* 1828—36. — *Lejeunia Gottsch.*, Lindenb.
- Leitgeb,** Prof. in Graz, schr. Pflanzenphysiologie, Lebermoose, Jena
1874, u. a.
- Lelieur,** Graf, Intend. d. Staatsgärten, † 1849 in Versailles, schr. Po-
mone française etc.
- Lem. = Lemaire,** Charl. Ant., Red. d. Jardin fleuriste u. Horticulteur
Universel, Red. d. Illustr. horticole v. Ch. Verschaffelt, † 1871.
- Lenné,** Pet. Jos., Gen.-Dir. d. k. Gartens z. Berlin, Begründ. d. Lenné-
schen Gartenschule, † 1866. — *Lennéa Klotzsch.*
- Leroy,** André, franz. Pomolog, Herausg. d. Dictionnaire de Pomologie
s. 1866.
- Lerz.** schr. Handb. d. Gartenkunde (2 Th. in 4 B.), 5. A., Jena 1849.
- Leschenault** de la Tour, bot. Reis. in Süd-as. u. Südamer., † 1826 in
Paris, schr. üb. d. Veget. v. Neuhol., Par. 1824 (in Peron's Voyage
de decouvertes 1800—1804). — *Leschenaultia R. Br.*
- Less. = Lessing.** Chr. Fr., schr. Synops. gen. Compositarum, Berol.
1832, u. de gen. Cynarocephalorum, Berol. 1832, Synanthereen d.
Berliner Herbariums. — *Lessingia Cham.*
- Lesson,** R. P., Naturf. b. d. antarkt. Exped. d. Capt. Duperrey 1826,
schr. Fl. Rochefortine etc. — *Lessonia Bory.*
- Lestiboudois,** Fr. Jos., Prof. in Lille, † 1815, schr. Botanographie bel-
gique, 1781, De viribus plant. Duaci (Douai), 1783. — *Lestiboudesia
P.-Thou.*
- Leunis.** Joh., Prof. in Hildesheim, † 1875, Synops. d. Pfl., 3. A. v.
A. B. Frank 1882.

- Lev.** = Leveillé, Arzt in Paris, † 1870, namh. Mykolog, *Icones d. champignons de Paulet* 1855 u. zahlr. Abh. über Pilze. — *Leveillaea* Decsn.
- Lex.** = *Lexarza* s. La Llave.
- Leysser.** F. W. v., † 1815, schr. *Fl. Halensis* 1783—96, 2. A. — *Leysera* L., *Leyssera* DC.
- Lib.** = *Libert*, Mar. Anna, Kryptog. z. Malmedy, † 1865, schr. *Mém. s. des cryptog. observ. aux environs de Malmédy*, 1826. — *Libertia* Spr. u. *Libertella* Desm.
- Liboschitz,** Arzt in Petersburg, † 1824 in Wien, schr. m. *Trinius Fl. des environs de St. Petersb. et Moscou*, 1811, *Descr. de mousses etc.*, 1811.
- Libri de re rustica** (Cato, Varro, Columella, Palladius), Basel 1535.
- Lichtenstein,** schr. *Index alph. gener. bot. quotquot a Willdenow in Spec. pl. et Persoonio in Synopsi pl. rec.*, Helmst. 1814.
- Liebe,** Th., schr. geogr. Verbreit. d. Schmarotzerpfl., Berl. 1862, Grundr. d. spez. Bot., Berlin 1866 etc.
- Liebig,** Lud. Leop., ber. Gärtn. in Dresden, † 1872, erzog mit Traugott Seidel zuerst Camellien, Azaleen, Rhododendron, Eriken etc. in Massen. — *Liebigia* Endl.
- Liebmamn,** Reis. in Mexiko, Prof. in Kopenh., † 1856, schr. *Mexicos Bregner*, Kopenh. 1849, *Mexicos Halvgraes* (Cyperaceae), 1850, 1. chênes de l'Amér. trop. (v. Oersted fortg.). — *Liebmamnia Menegh.*
- Liegel,** Dr. G., Pomolog in Braunau (Oberösterreich.), schr. syst. Anleit. z. Kenntn. d. Pflaumen, Passau 1847, u. a.
- Lightfoot,** John, Pfarrer z. Gotham (Engl.), † 1788, schr. *Fl. Scotica*, Lond. 1772. — *Lightfootia* Schreb.
- Liljeblad,** Sam., schwed. Bot., † 1815, schr. *Utkast til en Svensk Flora etc.*, 1792, *Coloniae pl. in Suecia*, Upps. 1819.
- Lindblad,** Adolf, Dozent in Upsala, schr. *Synops. Fungorum in Suecia*, 1853, *Monogr. Lactariorum Sueciae*, u. a. — *Lindbladia* Fr.
- Linden,** Jean Jules, v. Luxemb., Reis. u. Orchideen-Zücht. in Brüssel, s. 1870 Bes. d. Handelsgärtnerei v. Ambros. Verschaffelt in Gent. — *Lindenia* Benth.
- Lindenberg,** Amtm. z. Bergdorf, † 1851, L., Gottsche u. Nees v. Esenb., *Synops. Hepaticarum*, Hamb. 1844—47, *Mon. d. Riccien*, 1836, u. a. — *Lindbergia* Lk.
- Lindl., Ldl.** = *Lindley*, John, Prof. z. London, † 1865, schr. *Synops. of t. Brit. Flora*, 1829, *t. fossil Fl. of Gr.-Britain*, 1831—37, *Sertum Orchidacearum*, 1838, *t. Flower-Garden*, 1850—53, u. a. — *Lindleya* Hb. Kth., Nees.
- Lindsay,** Arzt in Dumfries, schr. a popular hist. of brit. Lichens, 1858, Contrib. to New-Zealand Botany, 1868. — *Lindsaya* Dry.
- Lk.** = *Link*, H. F., zuletzt Prof. in Berlin, † 1851, schr. Diss. bot., 1795, *Element. philos. bot.*, Berl. 1837, *Handb. d. nutzb. etc. Gew.*, 1829—33, *Icones pl. select.* Horti Berol. 1820—28, *Hort. reg. bot. Berol.* 1827—33, u. v. a. — *Linkia* Mich.
- Linke,** J. R., schr. Analyt. Pflanzenschlüssel z. Bestimm. d. deutsch. Pflanzengeschlechter, Lpz. 1863. .
- L.** = *Linné* (Linnaeus), Karl Ritter v., ber. Prof. d. Naturg. u. Systemgründ. d. Bot. z. Upsala in Schweden, † 1778, schr. *Systema naturae* etc., 8. A. v. Gmelin, Lpz. 1788—93, *Genera plantar.*, 8. A. v. Hänke 1791, *Species plant.*, 4. A. v. Willdenow, *Syst. vegetabilium*, 16. A. v. Sprengel 1825—28, u. s. f. — *Linnaea* Gronov. — **L. f.** = *Linné filius*, Carl v., des vor. Sohn, schr. *Decas I u. II plantar. rario*. Horti Upsal., *Nova graminum genera, Method. muscor. ill.*, Ups. 1781.

- Lipp.** J. J., schr. *Eγγειοδιον βοτανικον*, Vindob. 1765.
Lobel (Lobelius), eig. Matth. de l'Obel aus Flandern, Bot. Jakobs I., † 1616 bei London, schr. Plantar. s. Stirpium Hist., Antwerp. 1576, Icones etc. 1581. — *Lobelia* L.
Lodd. = **Loddiges**, Conr., ber. Züchter z. Hackney b. London, † 1820, Herausg. d. Botanical Cabinet, 1818—24. — *Loddigesia* Sims.
Logan. James, Statth. v. Pennsylvan., † 1736, schr. de plantar. generatione, Lugd.-Bat. 1739. — *Logania* R. Br.
Loeffling (*Löfling*), schwed. Bot. u. Reis., † 1756, schr. Iter Hispanicum, Stockh. 1758. — *Loefflingia* L. — *Loefflingia* Röm.
Loesel (Loeselius), Joh., Prof. in Königsl., † 1655, schr. Fl. prussica, 1703, *Plantae in Borussia nascent.*, 1654. — *Loeselia* L.
Loew. E., d. bot. Unterr. an höher. Lehranstalten, Bielefeld u. Lpz. 1876, method. Übungsbuch, Berl. 1875, Artikel in d. Centralorg. f. d. Interessen d. Realschulwesens in Berlin, üb. 2 krit. Hyphomyceten, Berl. 1874, u. a.
Lois. = **Loiseleur-Deslongchamps**, Arzt in Paris, † 1849, schr. Fl. gallica, 1828, Manuel d. plant. us. indigènes, 1819, *Herbier général de l'amateur*, 1816—27. — *Longchampia* DC., *Loiseleuria* Desv.
Lonicer (Lonicērus), schr. Kreuterbuch, künstl. Counterfeyung d. Bäume, Stauden, Kreuter etc., Item Gethieren etc., Frankf. 1609, 2. A., 163^o, Dasselbe herausg. v. Uffenbach, Ulm 1716 u. Augsb. 1783. — *Lonicera* L.
Lorentz. s. 1870 Prof. z. Cordova in Südamer., schr. Moosstudien, bryolog. Notizenb., üb. Laubmoose etc.
Lorinser, G. u. F., schr. Taschenb. d. Flora Deutschl.'s u. d. Schweiz, 2. A., Wien 1851, d. wichtigst. essb., verdächt. etc. Schwämme, 3. A., Wien 1881 (Dr. F. W. Lorinser).
Lond. = **Loudon**, John Claud., schr. Hort. britann., 3. A., 1839, Arboretum u. Fruticetum brit., 1838, t. Gardener's Magazine, 1826—43. — *Loudonia* Ldl. — **Loudon**, Mrs., the ladies' companion to the flower garden, Lond. 1849.
Lour. = **Loureiro**, portug. Mönch, schr. Fl. cochinchinensis, 1790. — *Loureira* Cav., *Lourea* Neck.
Lowe, Rich. Thom., schr. Primitiae Faunae et Florae Madeirae, 1831, a manuel Fl. of Madeira, 1863. — *Loweia* Ldl. — **Lowe**, E. J., schr. Ferns, brit. and exotic, 1856—60, beautiful leaved plants, London 1864, u. a.
Lozano, Pedro, schr. descripcion chorograf. del terreno, rios, arboles etc., del gran Chaco, Gualambo etc., Cordoba 1733. — *Lozania* Seb., Mut.
Lucas. Dr. Ed., ber. Pomolog Deutschl.'s, Vorst. d. Gartenbau-Schule z. Hohenheim, schr. d. Lehre vom Obstbau, 6. A., u. v. a.
Ludwig, Chr. Gottl., Prof. z. Leipz., † 1773, schr. Definit. generum plant., ed. Böhmer, Lps. 1760. — *Ludwigia* L. — **Ludwig**, Chr. Fr., Prof. in Leipz., † 1823, schr. de plant. munimentis, 1776, Handb. d. Bot., 1800. — *Ludwiaria* DC. (?)
Luerssen. Prof. z. Neust.-Eberswalde, schr. Grundz. d. Bot., 1877 u. 1879, Repetit. f. Studierende, Lpz. 1877, Herausg. v. Rabenhorst's Kryptogamenflora, u. s. f.
Lugo, N. Benitez de, u. Germ. Wildpret, schr. Catálogo de las plantas etc. de la Orotava en Teneriffe, 1879. — *Lugoia* DC.
Luizet, Gabr., fr. Pomolog u. Zücht. (bes. Pfirsiche), schr. Traité de cult. et de taille des arbres fruitiers, † 1876.
Lummitzer, Steph., † 1806 z. Pressburg, schr. Fl. Posoniensis, 1791. *Lummitzera* Jacq., Willd.

- Lund**, Dr. P. W., schr. Bemerk. üb. Weg- u. Unkrautpflanzen Brasiliens, 1838 (in Kroyer's naturw. Tidsskrift, II. 1, 1838). — Lundia Schum., DC.
- Lyngb.** = **Lyngbye**, Pred. auf Seeland, † 1837, schr. Tent. Hydrophytologiae danicae, Kopenh. 1819. — Lyngbya Ag.
- Maack**, Dir. d. Gymn. z. Irkutsk, Reis. i. Amurland. — Maackia amurens. Rupr.
- Mackay**, Dr. J. T., Dir. d. bot. Gart. d. Trinity-College z. Dublin, † 1862, schr. Fl. hibernica 1825 u. 35. — Mackaya Arn.
- Magnol**, P. (Magnolius), schr. Hort. reg. Monspeliens., Monsp. 1697. — Magnolia L.
- Magnus**, P., Prof. in Berlin, schr. üb. d. Gatt. *Najas*, 1870, M. u. A. Braun üb. Adventivknospen an Blättr. (Verh. d. bot. Ver. d. Mark Brandenb., 1874).
- Malpighi**, Marcell., ital. Arzt u. Bot., 1623—94, schr. Anatome Plantar., Lond. 1675, Opera postuma, Lond. 1697. — Malpighia L.
- Manetti**, Dir. d. bot. Gart. in Mailand. — Manettia L., Mut., Manetti-Rose (R. chin. Jacq. var.).
- Manger**, H. L., Pomolog u. Architekt Friedr.'s II. in Potsd., schr. Vollst. Anleit. z. syst. Pomologie 1780—83.
- Maregrav**, G., Ingenieur u. Reis. in Afrika, † 1644 in Guinea, Guil. Pisonis et G. Maregravii, Hist. nat. Brasiliæ, Amstelod. 1684. — Maregravia (-fia) L.
- M. B.** = **Marschall v. Bieberstein**, s. Bieberstein.
- Marsh.** = **Marshal**, Humphrey, schr. Beschr. d. wildw. Bäume u. Staudeng. in Nordamer., Lpz. 1738. — Marshalia Schreb.
- Martens**, G. v., Kanzl.-Rath in Stuttg., schr. Monogr. d. Gartenbohnen, 1860, m. Schübler Fl. v. Württemb., 1834.
- Martin**, A., D. Pflanzennamen d. deutsch. Flora etym. erklärt, Halle 1851.
- Mart.** = **Martius**, C. F. Ph. v., aus Erlangen, Reis. in Brasil., dann Prof. in München, † 1868, schr. Hist. nat. Palmarum, 1823—50, Spix u. Mart., Reise in Bras. 1824—31, Fl. Brasiliens., 1837—40. — Martius Schult.
- Mas**, Alphonse, Obstzücht. z. Bourg, † 1875, s. 1863 Herausg. d. pomol. Werkes le Verger, s. 1874 m. Pulliat v. le Vignoble.
- Mass.** = **Massalongho**, Prof. z. Verona, † 1860, schr. üb. Flechten u. foss. Pf. — Massalonghia Kbr.
- Masson**, schwed. Reis. u. Samml. am Cap 1786—96 (Orchideen für Lindley), schr. Stapeliae novae. — Massonia L.
- Maurer**, L. H., Obstz. in Jena, schr. d. Beerenobst unsrer Gärten, Monogr. d. Stachelbeeren, Herausg. d. Cultur- u. Fruchtsträucher v. Fuller (— „d. Fuller Deutschlands“, Rümpler).
- Maximowicz**, russ. Reis. um d. Erde, s. 1853 Conserv. am bot. Gart. z. Petersb., schr. Diagn. plant. nov. asiat. (Mélanges biolog. 1877), Primitiae Fl. Amurensis (Petersb. Akad. 1858). — Maximoviczia Rupr.
- Mayer**, schr. Pomona francoonica (d. Obstsorten Frankens, m. Abb.), 1750. — **Mayer**, J., schr. üb. einheimische Giftgew., üb. essbare Schwämme, Berl. 1801.
- Med.** = **Medicus**, F. K., Reg.-Rath u. Dir. d. Schwetzinger Gartens, † 1808, schr. Philos. Bot., Mannh. 1789—91, üb. Pfl.-Physiol. u. Anatomie, Lpz. 1803, Nordamerik. Bäume etc., 1792, u. a. m. — Medicus Mnch. — **Medicus**, Dr. W., schr. unsre essb. Schwämme, 5. A., Kaiserslaut. 1884.

- Mejer**, Dr. L., in Hannover, schr. üb. d. Deutung d. Pflanzennamen (d. Natur, Halle, Nr. 52, 1881).
- Meisner**, C. Fr., Prof. in Basel, schr. Plantar. vasc. genera etc., Lpz. 1837, Mon. gen. Polygoni, 1825, u. a. — *Meisneria* DC.
- Meister**, G., 1682—87, Reis. in Ostind. u. Japan, Samml. f. d. Prinzen v. Oranien, 1689 in Dresden, schr. indianischer Kunst- u. Lustgarten, Dresden, 1690. — *Meisteria Scop.*
- Meneghini**, Prof. z. Pisa, Algolog, schr. *Conspect. Algolog. Euganeae, Paduae 1837, Synops. Desmidiarum, Alghe italiane e dalmatiche, 1842—46*, u. a.
- Mer.** = **Merat**, F., franz. Arzt u. Bot., † 1851, schr. *Nouv. Fl. des environs de Paris*, 6. A., 1841, *Révue de la Fl. Parisienne* 1843, *Elémens de bot.*, 6. A., 1829, u. a. — *Meratia Lois.*, Cass.
- M. K.** = **Mertens** u. **Koch**, d. erste Prof. in Bremen, † 1831 (s. Koch, Prof. in Erlang.). — *Mertensia H. B. K.*
- Mett.** = **Mettenius**, Prof. z. Leipz., † 1866, schr. *Filices Horti bot. Lipsiens.* 1856, *Rhizocarpeen, Hymenophyllaceen* etc.
- Metzger**, Joh., Gart.-Insp. in Heidelb., dann Dir. d. Landw. Anstalt z. Karlsruhe, † 1852, schr. *Europäische Cerealien*, Mannh. 1824, *Landw. Pflanzenk.*, 1841, *Gartenbuch*, 5. A. 1876. — *Metzgeria Raddi*.
- Meyen**, Prof. in Berlin, † 1840, schr. *Neues Syst. d. Pfl.-Physiologie*, Berl. 1837—39, Beitr. z. Bot. ges. auf d. Reise um d. Erde, Grundr. d. Pflanzengeogr., Berl. 1836, u. a. — *Meyenia Benth.*
- E. Mey.** = **Meyer**, Ernst H. Fr., Prof. in Königsberg, † 1855, schr. *Preussens Pfl.-Gattungen* etc., 1839, *Comment. de plant. Africæ australoris*, ges. v. Drege, Lpz. 1835—37, *Gesch. d. Bot.*, 1854—57, u. a. m. — *Ernestia* DC. — **G. Mey.** = **Meyer**, Georg F. W., Prof. in Göttingen, † 1856, schr. üb. Flechten, *Fl. hannoverana*, Götting. 1849. — **C. Mey.** = **Meyer**, Carl Ant., Reis. in Sibir., dann Dir. d. Bot. Gartens z. Petersb., † 1855, schr. *Pflanzen am Kaukasus* etc., 1831, *Fl. altaica*, *Fl. Prov. Tambow*, *Wiatka* etc. — *Meyera Schreb. (ia)* DC.
- Mehx.** = **Michaux**, André u. Andr. François (Vater u. Sohn), franz. Reis., d. erst. † 1804 auf Madagaskar, schr. *Hist. d. chênes de l'Amérique* u. *Fl. boreali-americana*; **Mehx. f.**, schr. *Hist. des arbres forest. de l'Amér. septentr.*, Paris 1810—13. — *Michauxia l'Hér.* (Mehx. sen.).
- Mich.** = **Micheli**, Insp. d. Gr. Gartens z. Florenz, † 1737, d. grösst. *Kryptog. s. Z.*, schr. *Nova pl. genera*, 1729, *Catal. pl. Hort. Florentini* (*Op. posthum.* 1748). — *Michelia L.*
- Michelis**, F., schr. d. Gedanke in d. Gestaltg. d. Pflanzenreichs, Bonn 1871.
- Miers**, J., Reis. in Südamer., † 1879, schr. *Neue Sippe Brasil.'s*, do. *Chili's*, *Cruikshanksia Miers* u. a. — *Miersia Lindl.*
- Mikan**, J. C., schr. *Delectus Flora et Faunae Brasiliensis*, Viennae 1825. — *Mikania W.*
- Mikosek**, schr. üb. *Knospendecken dicotyl.* Hölzer, Wien 1876, üb. *Chlorophyll.*, 1878, u. a.
- Milde**, Prof. z. Breslau, † 1871, schr. *Mon. d. Equiseten*, Dresden. 1865, d. höh. Sporenpl. Deutschl.'s u. d. Schweiz, Farne etc., *Bryologia silesiaca od. Laubmoose Nord- u. Mitteldeutschl.*, Lpz. 1869, u. a.
- Mill.** = **Miller**, Ph., kenntnissr. engl. Gartenbot., † 1771, schr. *Darstell. d. Linné'schen Sexualsystems* (deutsch u. lat. v. Borkhausen, Frankf. 1804), t. *Gardener's Dictionary od. Gartenlexikon* (deutsch v. Huth, 2. A. 1769—76, 9. A. 1807). — *Milleria L.*
- Miltitz**, v., † 1840 in Dresden, schr. *Handb. d. bot. Litteratur*, 1829 (v. M. u. Reichenbach: *Bibliogr. bot.*).

- Miq.** = **Miquel**, Prof. in Utrecht, † 1871, schr. üb. jav., sumatr. u. jap. Flora, Genera Cactearum, 1837, d. Casuarineen in De Candolle's Prodromus, d. Chloranthaceen etc. in Martius' Fl. brasili., u. a. — Miquelia Nees.
- Mirbel** (Brisseau-Mirbel), fr. Pfl.-Physiol., † 1854, Mitarb. v. Lamarck (Naturg. d. Pfl.). — Mirbelia Sm.
- Moç.** = **Moçino** (u. Sessé), Bearb. d. Fl. Mexicana, † 1819. — Mocinia DC.
- Mnch.** = **Mönch** (Moench), Prof. in Marburg, † 1805, schr. Enum. pl. indig. Hassiae praesert. inferioris, 1777, u. a. — Moenchia Ehrh., Roth.
- Mössler**, Joh. Christ., schr. Taschenb. d. Bot., Hamb. 1805, Handb. d. Gewächskunde (3. A. v. L. Reichenbach, Altona 1833—34). — Moesslera (-ia) Rehb.
- Mohl**, Hugo v., schr. Vermischte Schrift. bot. Inhalts, Tübingen 1845, Anat. u. Physiol. d. veg. Zelle, 1851, u. a. — Mohlana Mart.
- Molina**, J. Ign., Missionär u. Samml. in Chili, schr. Naturb. v. Chili (deutsch v. Brandis, 1786), Saggio sulla Storia nat. del Chili di G. J. Molina, 2. ed., Bologna 1810. — Molina Rz. Pv., Molinia Schrk.
- Mont.** = **Montagne**, Akad. in Paris, † 1866, schr. Fl. Boliviens., 1839, Cryptog. guyan., 1855, Sylloge cryptog. etc., 1856. — **Mont.** u. **Rob.** = **Montagne** u. **Robin**, Ch. (Prof. in Paris), **Sagra** u. **Montagne**, s. d. — Montagnaea (-tanoa) La LL.
- Monti**, Gius., Prof. z. Bologna, schr. Catal. Stirpium agri Bononiensis Prodr., 1719. — Montia L.
- Moq.-Tand.** = **Moquin-Tandon**, Dr. Alfr., Zool. u. Bot. z. Paris, schr. Elém. d. tétratolog. végét., 1841, Chenopodearum monogr., 1846. — Moquinia DC., A. Spr.
- Morandi**, J. B., schr. Hist. botanices practicae s. plantar. q. ad usum medicinae pertinent deser., Mediolani 1761.
- Morel**, Charl., schr. Orchideenkultur, Leyden 1856. — Morelia A. Rich.
- Moretti**, Gius., Prof. z. Batavia, † 1853 z. Pavia, schr. viele Monogr., il botanico ital., 1826, u. a. — Morettia DC.
- Morison**, Rob., Prof. z. Oxford, † 1683, schr. Hort. reg. Blesensis (Blois), 1679, Plant. hist. univ., 1680. — Morisonia L.
- Morren**, Charl. Fr. Ant., Prof. z. Lüttich, Herausg. d. Annales d. l. Soc. Royale d'Horticulture, mit Van Houtte in Gent Hortic. belge bis 1839, s. 1851 Belgique horticole, † 1858. — Morrenia Lindl. — **Morren**, Ed., Prof. in Lüttich, Herausg. d. la Belgique hortic., Liège 1850—70, schr. üb. insektentötende Pfl. (in Bull. Acad. roy. Belge 1875), u. a.
- Mougeot**, A., schr. mit Schimper Monogr. des Plant. fossiles etc. des Vosges, Strassb. 1840. — Mougeotia Ag. u. Kth.
- Mühlenberg**, Geistl. in Pennsylv., † 1817, schr. Catal. Plant. Americ. septentr., 2. A. 1818. — Muehlenbergia Schreb.
- Mühl.** = **Müller**, O. Fr., dän. Staatsr., † 1784, schr. Fl. Fridrichsdalina, Strassb. 1767, Mitarb. v. Oeder's Fl. danica. — Muellera L. f. — **C. od. K. Müller**. Dozent z. Halle, Herausg. d. „Natur“, schr. Bot. Reisen um d. Welt, 2 B., Lpz. 1856/57, Buch d. Pflanzenwelt, 2. A. 1869, Synops. muscor. frondos., 1849—51, de Muscor. Ceylon. collectione, 1868, u. a. — **Herm. Müller**, Reallehrer z. Lippstadt, schr. Geogr. d. Laubmose v. Westfalen, Blumenbefrucht. durch Insekten, 1873, u. a., † 1883. — **F. Müll.** = **Müller**, Ferd. Bar. v., Bot. z. Melbourne in Australien, schr. Fragm. phytogr. Australiae, Deser. notes on Papuan plants, Melbourne 1877, t. plants indig. to t. colony of Victoria, Melb. 1860—62, mit Bentham Herausg. d. Fl. australis (bereits 6 B.). — **N. J. C. Müller**, schr. Unters. üb. d. Molekular-

- kräfte im Baum (Heidelb. Bot. Unters., IV, 3—5), üb. Einwirk. d. Lichts u. d. strahl. Wärme etc., Heidelb. 1876. — **J. B. Müller**, schr. bot. prosod. Wörterb. nebst Charakter. d. wicht. nat. Pflanzenfam., Brilon 1840, Fl. Waldeccens. et Itterensis, Brilon 1841, etc.
- Münchhausen**, O. v., Landdrost. in Kalenberg, † 1774, schr. d. Mutterkorn als Pilz, Hausvater für Baum-Gärtner etc., Hannov. 1765—74, 6 B. — *Muenchhausia* L., DC.
- Mulder**, N., Catal. plant. prope urbem Leidam nasc., Lugd.-Bat. 1817.
- Munk**, d. elektr. u. Bewegungsersch. am Blatte d. *Dionaea muscipula*, Lpz. 1876.
- Munting**, de vera antiquor. herba britann., Amstelod. 1631, Aloidalium, 1680. — *Muntingia* L., Plum.
- Murr.** = **Murray**, Linné's Schüler, Prof. z. Göttingen, † 1791, schr. Prodri. design. stirpium, Goett. 1770, Opuscula, Apparatus medicaminum, 1772—96, 6 B., u. a. — *Murraya* L., Kön.
- Musaeum Zeylanicum** s. Catal. plant. in Zeylania sponte nascentium, Lugd.-Bat. 1726.
- Mutel**, A., schr. üb. neue Orchideen, Fl. Française destinée aux herbarisations, Par. 1834—37.
- Mut.** = **Mutis**, Freund Linné's, Prof. in Madrid, † 1808 z. Santa-Fé in Südamer. — *Mutisia* L. f.
- Naccari**, Prof. in Chioggia, schr. Algologia adriatica, Bologna 1828, Fl. Veneta etc., Venez. 1826—28.
- Nägeli**, Dr. K., Prof. in Zürich u. s. 1857 in München, schr. Cirsien d. Schweiz, üb. Algen, Beitr. z. wiss. Bot. s. 1858; N. u. Schwendener, d. Mikroskop, Lpz. 1865—67, Bot. Mitteilungen, u. a. — *Naelia* DC., Reg., Ldl.
- Nathusius**, Gottlob, ber. Obst- u. amer. Gehölzzüchter z. Althaldesleben b. Magdeburg. — *Nathusia* Hochst.
- Naud.** = **Naudin**, Charl., Mitglied d. Instituts in Paris, Gartenbau-Schriftst., schr. z. B. üb. Cucurbitac., 1860/61, Melastomacearum in mus. Paris. Monogr., 1849—53, mit *Decaisne* Manuel de l'amateur des jardins, 4 B.
- Naumburg**, Jos. Sam., Prof. z. Erfurt, schr. Lehrb. d. Bot., 1798. — *Naumburgia* Mnch., W.
- Neandri**, Joh., Tabacologia, Lugd. Bat. 1626.
- Neck.** = **Necker**, Dr. N. J. v. (de Necker) von Lille, † 1793 in Mannheim, schr. üb. Moose, Elem. stirpium Palatinarum, 1768—69 collectarum, Elem. bot., 3 B., 1791. — *Neckera* Hedw.
- N. ab Es. = **Nees v. Esenbeck**, Chr. Gottfr., Prof. in Bresl., † 1858, schr. üb. Algen u. Pilze, Farne, Lebermoose, mit Weihe d. deutsch. Brombeerstr., m. Walker-Arnott u. De Candolle Fl. Peninsulae Ind. Orient. — **N. M.** = **Nees u. Martius**. — *Esenbeckia* St. Hil., Kth., Blum. — **Nees v. Esenbeck**, Th. Fr. L. jr., d. vor. Bruder, Prof. z. Bonn, † 1837, schr. Syst. d. Pilze, Plantae officinales fortg., Genera pl. Fl. German. fortg. v. Puterlick, *Nees v. Es.*, Th. u. **Sinning**, Samml. schön blüh. Gew. f. Blumen- u. Gartenfreunde (100 kol. Taf.), Düsseld. 1825. — *Neesia* Spr. (od. sen.?).
- Neill**, Dr. Patrick, Seer. d. Garten-Ges. z. Edinb., schr. üb. Algen, t. fruit-, flower- and kitchengarden, Edinb. 1840, † 1851. — *Neillia* D. Don.
- Neilreich**, A., schr. d. Vegetationsverh. v. Croatién, Wien 1868, Nachtr. z. Fl. v. Nied.-Östr., Wien 1866, u. a.
- Nestler**, Prof. in Strassb., † 1832, schr. Index plant. in horto acad. Argentinensi etc., 1818, u. a. — *Nestlera* DC.

- Neubert**, Dr. W., Bot. in Tübing. u. Stuttg., s. 1848 Herausg. d. Deutsch. Magaz. f. Garten- u. Blumenk. (üb. 33 Jahrg.).
- Neuenhahn**, d. Blumenzwiebelgärtner, 2 B., Lpz. 1804.
- Neuwied**, Max Prinz v., 1813 Reis. in Brasilien, schr. Reise nach Bras. v. 1813—17, Frankf. 1819 u. 20, Abbild. z. Naturg. Bras., Weimar 1823—31 u. Beitr. z. Nat. Bras., Weimar 1824—34.
- Newmann (Neumann)**, E., schr. Hist. of british ferns, Lond., 4. A. — Neumannia Brongn., Rich.
- Nicot**, Jean, franz. Gesandt. in Portugal, führte 1560 Samen u. 1564 das Rauchen d. Tabaks in Europa ein. — Nicotiana L.
- Niebuhr**, Karsten, mit Forskal Reis. im Orient, 1762—65, schr. Fl. aegypto-arabica, † 1815. — Niebuhria DC.
- Nieremberg**, Joh. Euseb., Prof. z. Madrid. † 1563, schr. Hist. naturae maxime peregrinae. — Nierembergia R. P.
- Nitschke**, Th., Prof. in Münster, schr. Pyrenomyctes Germaniae, Bresl. 1867—69, u. a. — Nitschkea Ott.
- Nitzsch**, C. L., schr. üb. Infusorien. — Nitzschia Hass.
- Niven**, Ninian, schr. t. visitor's companion to t. bot. gard. Glasnevin, Dublin 1838. — Nivenia R. Br., Becc.
- Nocea**, Domenico, Prof. z. Pavia, schr. Ticinensis horti acad. pl. selectae, Ticini 1800, u. a. — Nocea Cav., Noceaea W., Rchb.
- Nöggerath** u. C. G. Nees v. Esenbeck, Rhizomorphen in d. Steinkohlenklüften, Nögg. üb. foss. Baumst., Bonn 1821.
- Noisette**, Ph., Obergärtner z. Paris (Obstbau-Schule Fontenay-aux-Roses), schr. le Jardin fruitier, 1813 f., † 1849. — Rosa Noisettiana (sc. indica, Noisette-R.). — Noisette, Claude (Bruder), Gärtn. in Amerika. — Noisettia H. B. B.
- Noll**, F. C., d. Thal v. Orotava auf Teneriffa etc., Bresl. 1872.
- Nolte**, Prof. in Kiel, schr. Novitates Fl. Holsaticae, 1826. — Zostera Noltei Hornem.
- Nordmann**, A. v., schr. Symbolae ad Cryptogamas Trans-Caucasi 1849. — Nordmannia Fisch., Mey., Abies s. Picea Nordmanniana Loud.
- Nor.** = **Noronha**, span. Bot. u. Reis. n. d. Philippinen, † 1787 auf Isle de France, schr. Prodr. phytologicus ined. — Noronha Thouars.
- Not.** = **de Notaris**, Gius., s. 1872 Prof. in Rom, † 1877, schr. Syllab. muscorum etc., 1838, Fl. Ligustica 1844, Musci italicici 1863, Desmidiae italiche 1867, Briologia italiana 1869, u. a. — Notarisia Colla etc.
- Nutt.** = **Nuttall**, Prof. z. Philadelphia u. Reis. in Nordwest-Amerika, † 1859, schr. t. Genera of N.-Amer. plants, 1818, N.-Amer. Sylva, 1842—54. — Nuttallia Dicks.
- Nyl.** = **Nylander**, W., Prof. z. Helsingfors in Finnland, g. 1823, schr. Prodr. Lichenogr. Galliae et Algeriae 1857, Lichenes Scandinaviae, 1861, Lich. Novae - Caledon. 1868, u. a. — Nylander, A. E., schr. Alands laf-vegetation 1856, u. a.
- Nym.** = **Nyman**, C. F., schr. Sylloge Fl. Europaeae, Oerebroae 1854—65 (Örebro in Schweden).
- Oberdiek**, J. G. C., Pred. u. Superintend. z. Jeinsen (Hannov.), schr. (holländ.) üb. d. Erfrieren d. Obstbäume etc. (deutsch 1872), Beitr. z. Hebung d. Obstkultur v. Oberdiek u. Lucas, 1875, u. a., † 1879.
- Oeder**, G. Chr. v., Landvogt in Oldenburg, † 1791, Herausg. d. Fl. danica 1761—1871 (16 B., wird fortg.), Elementa botanicae 1761—66. — Oedera Crantz.
- Oersted**, Andr. Sandoe, Prof. d. Bot. z. Kopenh., † 1872, schr. Syst. d. Pilze, Lichenen u. Algen (deutsch v. Grisebach u. Reinke, 1873),

- Palmae centro - american., Kopenh. 1858, Myrtaceae centr.-amer., plantae novae cent.-am. etc.
- Oliver.** D., schr. Fl. of tropic Africa, Lond. 1877, Guide to t. roy. bot. gardens Kew, Lond. 1865, u. a. — Oliveriana (g. n.) Rchb. f.
- Oliv.** = **Olivier**, Prof. z. Aalfort, † 1814 z. Lyon, Reis. mit Brugière n. Ägypt. u. Persien, schr. Voyage dans l'Empire Othoman etc., 1801—07. — Oliviera Vent.
- Orbigny.** Alcide, schr. Voyage en l'Amérique mérid. pend. 1826—33 par Alcide d'Orbigny. — Orbignya Mart.
- Ort.** = **Ortega**, Casimir Gomez, span. Bot. u. Dir. d. bot. Gart. z. Madrid, † 1818, schr. Tabulae bot. 1773, u. a. — Ortega L. (-gia Löfl.). — **Ortega**, José, Apoth., † 1761.
- Osbeck.** Pehrson, schwed. Bot., Almosenier in Ostind. u. China, † 1805 Probst in Gothland, schr. Dag-boek ofve en ostindisk resa. — Osbeckia L.
- Otto.** K. Fr. Ed., g. 1812, Red. d. Hamb. Gart.- u. Blumen-Zeitg., Reis. n. Cuba etc., schr. Reise-Erinnerungen an Cuba, Nord- u. Südamer. 1838—41. — **Otto**, Christoph Fr., k. pr. Gart.-Dir. z. Berlin 1805—43, mit Dietrich Begr. d. Allg. Gartenzeitg., 1833, schr. Pl. rar. in horto Berolin. — Ottomia Miq., Spr., Ottoa Kth. — **Otto**, E. v., schr. Addidamente z. Flora d. Quadergebirgs in Sachsen, Lpz. 1854.
- Otth.** Gust., Pilzforsch. d. Schweiz. — Otthia Nitschke.
- O. W.** s. Wünsche.
- P.-B.** = **Palisot de Beauvais**, Akad. z. Paris, Reis. in Afrika u. Nordamerika, schr. Essay d. nouv. Agrostographie, 1812, Fl. d'Oware et de Bénin en Afrique, 1804—07, Muscologie 1822.
- Pallas.** = **Pallas**, k. russ. Staatsr., † 1811 in Berlin, schr. Reise durch d. russ. Reich 1771—76, Fl. rossica 1784—1815, Specim. Astragalorum, 1802, u. a. — Pallasia L., Ait.
- Pancovii** Thom. herbarium portatile od. behendes Kräuter- u. Gewächsbuch, Cöln a. d. Spree 1673. — Pancovia W.
- Panz.** = **Panzer**, Arzt in Hersbruck, † 1829, schr. Revis. d. Gräsergatt. 1813, ostind. Brotbaum, Nürnb. 1783. — Panzera W., Gm.
- Pappe.** Dr., schr. Synops. pl. phan. agro Lipsiensi indigenarum, Lpz. 1828. — **Pappe**, Dr. med. L. in Hamb., Capreisend. 1830—54, schr. Silva Capensis, a descr. of t. South-African forest-trees, Cape-Town 1854, **P.** u. **Rawson**, Synops. Filicum Afr. austr. 1858. — Pappea Eckl.
- Paracelsus** 1493—1541, eig. Theophrastus Bombastus v. Hohenheim, Paracelsi Theophr. paragraphorum libri XIV, Argentorati 1536. — Theophrasta (-stea) L.
- Parlatore**, Filippo, Prof. z. Florenz, schr. Rar. plant. in Sicilia etc., Fl. Panormitanæ 1839, Fl. italiana 1848—69, u. a.
- Parnell**, Rich., schr. t. grasses of Scotland, Edinb. 1842, t. grasses of Britain, 1845.
- Passerini**, Giov., Prof. in Parma, schr. Fl. Italiae superioris etc., 1844, Esposizione florale univ. di Amsterdam, Milano 1865, u. a., s. Cesati.
- Passow**, schr. d. Pflanze u. d. Luft, Stralsund 1861, Grundr. d. Bot., Strals. 1861.
- Pasteur**, Louis, Akad. z. Paris, schr. Gährungspilze etc. (in Comptes rendus u. Ann. de chimie).
- P. M. E.** = **Patze**, Meyer u. Elkan, schr. Flora d. Prov. Preussen, 1850 (Patze, C., Stadtrat in Königsb.).
- P. Br.** = **Patrick Browne**, irisch. Bot., † 1790 (schr. d. Pfl. v. Jamaika in t. civil and natur. history of Jamaica, 1756). — Brownea Jacq.

- Paulini**, C. F., schr. *Sacra herba s. nobilis Salvia descripta*, Aug. Vind. 1688. — *Paullinia* L.
- Pv.** = **Pavon** (Ruiz u. Pavon), Reis. in Peru u. Chili 1777—88, Herausg. d. Flora Peruviana. — *Pavonia* Cav.
- Paxton**, Jos., engl. Bot., schr. A Pocket bot. dictionary, 2. A., Lond. 1853, Herausg. d. Magazine of Bot. 1834—49 u. Flower-Garden 1850—52. — *Paxtonia* Lindl.
- Payen**, franz. Bot., schr. sur la nature etc. de la Canne à sucre. — *Payena* Kurz.
- Payer**, franz. Bot., schr. Fam. d. Nitrariées, Morées et Anacardiées, 1844, des Ficoidées et d. Cactées, 1851, Bot. cryptog., Paris 1850.
- Pepin**, Pierre Denis, Ob.-Gärt. d. Par. Mus., schr. Beitr. in Bon Jardinier, Revue hortic. etc., † 1876.
- Pereboom**, N. E., schr. *Materia vegetabilis systemati pl.*, Lugd.-Bat. 1787/88.
- Perleb**, C. J., Prof. in Freiburg i. Br., schr. de horto Friburgensi 1829, Lehrb. d. Naturg. d. Pflanzenreichs, Freib. 1836, *Clavis classium* etc., Friburg. 1838. — *Perlebia* Mart., DC.
- Perring**, W., Insp. d. Bot. Gart. in Berl., Mitherausg. d. Gart.-Zeitung. (Berl. 1885, IV. J.).
- P.**, **Pers.** = **Persoon**, geb. z. Capetown, † 1837 z. Paris, Arzt u. Bot., schr. C. a Linné Syst. Veget., Syn. meth. fungorum, Gött. 1801 etc. — *Persoonia* Sm., Mchx.
- Petermann**, W. L., d. Pflanzenreich in vollst. Beschr. all. wicht. Gew. (282 T.), Lpz. 1857, Taschenb. d. Bot., Lpz. 1842, Deutschl.'s Flora (100 T.), Lpz. 1846—49.
- P.-Th. od. Pet.-Th.** = **Petit-Thouars**, L. M. Aubert du, Dir. d. Baumschule z. Paris, † 1831, schr. Hist. d. végét. rec. dans l. îles austr. d'Afrique, 1806, Arbres fruitiers, 1815, les Orchidées d'Afr., 1822, u. a. — *Petitia* Schreb., *Jacq.*, *Thouarsia* Vent., *Aubertia* Bory.
- Pet. gaz.** = **Petiver**, schr. *Gazophylacium* („Schatzkammer“) s. *Opera hist. naturalem spectantia*, Lond. 1764. — *Petivēra* (-ia) L., *Jacq.*
- Pfeffer**, Prof. in Tübing., schr. Osmotische Unters., Lpz. 1877, period. Beweg. d. Blattorg., Lpz. 1875, u. a.
- Pfeiffer**, Dr. L., Arzt u. Bot. z. Cassel, † 1878, schr. Enum. diagn. Cactearum etc., Berol. 1837, Fl. v. Niederhessen, 1847—55, *Synonyma bot. generum etc. ad finem* 1858, Kassel 1870, *Nomenclator bot.*, 4 B., Kassel s. 1872.
- Planchon**, J. E., Prof. z. Montpellier, s. 1845 Herausg. d. Flore des Serres et d. jardins de l'Europe, Gand (Gent).
- Planer**, Prof. z. Erfurt, schr. Fl. v. Erfurt, Übers. v. Linné's Gener. plant., 2 Th., Gotha 1785. — *Planéra* Gm., Mchx.
- Plenk**, J. J., Anfangsgr. d. bot. Terminologie, Wien 1798.
- Plinius** (C. Plinius secundus), † 79 n. Chr., röm. Naturf., schr. Hist. naturalis, 37 B. (herausg. v. Detleffen, Berl. 1866—71). — *Plinia* L. *Plinius indicus* s. Rumpf (*Rumphius*).
- Plum.** = **Plumier**, Charl., franz. Reis. in Westind., † 1704 in Cadix, schr. *Filicetum amer.*, Paris 1703, Plant. amer. quas olim Car. Plumierius detexit etc. (herausg. v. Burmann, Amsterd. 1755—60). — *Plumiera* T. (-meria L., Pers.).
- Pöpp.** = **Pöppig**, Dr. Ed. Fr., Reis. u. Prof. in Leipzig, † 1868, schr. *Nova gen. et spec. pl. q. in regno Chilensi etc. legit Ed. Poeppig et cum Steph. Endlicher descr.*, Lps. 1835—45, 3 B.
- Pohl**, deutsch. Bot. u. Reis. in Brasil., dann Prof. in Wien, † 1834, schr. Tent. Fl. Bohemiae, 1810—15, Plant. Brasil. icon. et descr., Lpz. 1835—45, 3 B. — *Pohlia* Hedw., *Pohlana* Mart.

- Poir.** = **Poiret**, J. L. M., franz. Bot., † 1834 in Paris, schr. *Voyage en Barbarie*, 1789, *Hist. philos. d. pl. d. l'Europe*, 1825—29. — *Poiretia Vent.*, Cav.
- Poit.** = **Poiteau**, M. A., franz. Zücht. u. Reis. auf St. Domingo, gründ. 1829 d. *Revue horticole*, Paris, Red. d. Ann. d. l. Soc. centr. d'Horticult., **P.** u. **Turpin**, Fl. Paris., 1808—13, **P.** u. **Risso**, hist. nat. des orangers, 1818—19, † 1854. — *Poitaea DC.* (-tea Vent.).
- Pollich**, Arzt u. Bot. z. Kaiserslautern, † 1870, schr. *Hist. pl. in Palatinatu etc.*, 1776/77, Gründ. d. Pfälz. Ges. Pollichia. — *Pollichia L.*, Roth, Med.
- Pollini**, C. (Pollinius), schr. *Fl. Veronensis*, Veron. 1822—24. — *Pollinia Spr.*
- Pontedera**, J., schr. *Anthologia s. de floris natura l. III*, Patav. 1720. — *Pontederia L.*
- Pott**, Hofr. in Braunschweig, † 1805, schr. *Index herbarii mei vivi* (herausg. v. Helwig, Braunschw. 1805). — *Pottia Ehrh.*
- Prantl**, Prof. z. Aschaffenburg, schr. Lehrb. d. Bot., Lpz. 1874 u. 76, *Mitth. in Dr. Leimbach's deutsch. bot. Monatsschr.* u. a.
- Pratt**, Anne, schr. t. flowering plants, ferns, grasses and sedges of Gr.-Britain (7 H.), Lond. 1861.
- Preiss**, Balth., Prof. in Prag, schr. *Rhizographia*, Prag 1823. — *Preissia Nees.*
- Presl**, Prof. in Prag, † 1852, schr. *Deliciae Pragenses* 1822, *Reliquiae Haenkeanae*, redig. Prag 1825, *Fl. sicula*, 1826, *Tent. Pteridographiae*, 1836, *Hymenophyllaceae*, 1843, *Epimeliae bot.*, 1849, u. a. — *Preslea (-laea) Mart.*, -lia Opiz.
- Preuss**, Apoth. u. Sanitätsr. z. Hoyerswerda, † 1855, schr. üb. Pilze in Sturm's *Fl. Deutschl.*, Übers. untersucht. Pilze etc., Halle 1851. — *Preussia Fuck.*
- Pringsheim**, N., Prof. in Berl., Herausg. d. *Jahrb. d. wiss. Bot.* s. 1857, namh. *Pfl.-Physiolog* etc.
- Pritchard**, Steph. F., schr. alphab. list of indig. et exotic pl. at St. Helena, Capetown 1836. — *Pritchardia filifera* J. Lind.
- Pritzel**, Cust. d. k. Bibl. z. Berlin, † 1874, schr. *Anemonar. Revis.* 1842, *Icon. bot. index etc.*, 1855, *Thesaurus liter. bot. omn. gent.*, 2. A. 1872.
- Pulteney**, Rich., schr. *Hist. and biogr. sketches of t. progress of Botany in England*, Lond. 1790. — *Pultenaea Sm.*
- Pursh**, F., engl. Bot. u. Reis., † 1820 in Canada, schr. *Fl. Americae septentrionalis*, Lond. 1816. — *Purshia Spr.*, DC.
- Pynaert**, Ed., belg. Gärtn. aus Gent, schr. *Manuel d. l. cult. forcée des arbres fruitiers*, 1861, Mitred. d. Fl. d. Serres, v. Abbé Dupuy's *Abeille pomologique* etc.
- Quer**, schr. üb. d. Literat. d. Botanik Spaniens, 1762. — *Queria Löfl.*
- Rbh.** = **Rabenhorst**, Ludw., ber. Kryptog. in Meissen, schr. *Fl. lusatica*, 1839—40, üb. Algen, Moose, Lebermoose etc., z. B. in Deutschlands Kryptogamenflora (2 B., Lpz. 1844—53), Herausg. d. Hedwigia s. 1852. — *Rabenhorstia Fr.*
- Raddi**, Gius., ital. Bot. u. Reis. in Brasil., † 1829, schr. *Jungermanniogr. etrusca*, 1820, Pl. brasili. etc., I. *Filices*, 1824. — *Raddisia u. Raddia Leand.*, *Raddiana Raf.*
- Rademacher**, Jac. Corn., schr. *Naamenlyst der planten op het eiland Java*, Batav. 1780—82. — *Rademachia Thb.*

- Radlkofe**, L., Prof. in München, schr. Krystalle pfl. u. tier. Ursprungs, Sapindaceen, 1875, d. Befrucht. d. Phanerogam., Lpz. 1856, u. a.
- Raf.** = **Rafinesque-Schmalz**, Prof. in Nordamer. u. Reis., † 1840, schr. Medic. Fl. of t. United-States, 1830, New Flora and Bot. of N.-Amer., 1836.
- Rafn**, dän. Bot., schr. Entwurf einer Pfl.-Physiologie, Kopenh. 1798 (deutsch v. Markussen). — Rafnia Thb.
- Ram.** = **Ramond**, Bar. v. (R. de Carbonnières), Prof. u. Staatsr., † 1827 z. Paris, schr. Observ. d. l. Pyrénées, 1789, Voyage au Sommet du Mont Perdu, 1807. — Ramondia Rich.
- Ratzeburg**, Prof. z. Neust.-Eberswalde, † 1871 z. Berlin, schr. d. Unkräuter v. Deutschl., 1859, (Brand u. Ratzeb.) die deutsch. Giftgew., 1838 (2. Abt. Kryptog. v. Phoebus). — Ratzeburgia Wall.
- Rauwolff**, Leonh., Arzt u. Reis. im Orient, schr. Fl. orientalis (Beschr. d. Reise im Morgenland). — Rauwolfia L. u. D. Don
- Ray** (Wray) od. **Rajus**, engl. Pred. u. Naturf., † 1705, schr. Catal. pl. c. Cantabrigiam nasc., 1660, Pl. Angliae, 1670, Hist. plant., 1686—1704, Method. plant., gramin., juncor. etc., Lond. 1703. — Rajania L.
- R. Br.** = **Rob. Brown**, s. d.
- Ré**, Giov. Francesco, † 1833 in Turin, schr. le Iride coltivade, Padovae 1823, Fl. Segusiens., 1825, Fl. Torinense, 1825. — Rea Bert. u. Reana Brign. — **Ré**, Filippo, † 1817 in Reggio, schr. Saggio teoretico-pratico sulle malattie delle piante, 1807.
- Rebender**, C., schr. de olei resinaeq. proferendorum organis etc., Bonn 1865.
- Rebentisch**, Arzt z. Landsberg a. d. W., † 1810, schr. Prodri. Fl. neu-marchiae, 1804, Index pl. c. Berolin. nasc. 1805.
- Red.** = **Redouté**, Pierr. Jos., Cabinetsmal. Ludw. XVI, † 1840, schr. Liliacées, Par. 1802—07, **R. u. Thory**, l. Roses 1817—20, Choix d. plus belles fleurs, 1827, u. a. — Redoutea Vent.
- Reg.** = **Regel**, Dr. Ed. v., 1837—39 in Bonn, Fl. Bonnensis, 1842 in Berlin, dann Dir. d. bot. Gart. in Zürich, gab 1843 mit Osw. Heer d. Schweizer Gart.-Zeitschr., 1852 d. Gartenflora heraus, 1855 Dir. d. bot. Gartens in St. Petersburg (v. Trautvetter's Nachf.), schr. mit E. Ender Zimmergärtnerie 1868, m. Herder Index seminum q. hort. bot. imper. Petropoli. etc. offert, 1860—62, Tent. Fl. ussuriensis, Fl. v. Ostsibir. u. Turkestan, Dendrologie Russl.'s, u. a. — Regelia Planch.
- Reichard**, Joh. Jac., Arzt u. Bot. z. Frankf. a. M., † 1789. — Reichardia Roth.
- Reichardt**, H. W., Cust. am bot. Cabin. z. Wien, schr. üb. Gefäßbild. d. Farne, 1859. — **Reichardt**, Ed., de plantar. partibus anorganicis, 1856.
- Rehb.** = **Reichenbach**, G. Ludw., Prof. etc. z. Dresden, vorz. Florist, Gründ. eines Systems, Herausg. v. Mössler's Handb. d. Gewächsk., 2. A., 1827—39, schr. Iconogr. bot. 1823—32, u. a. — Reichenbachia Spr. — **Reichenbach**, A. L., schr. Bot. f. Damen, Lpz. 1854. — **Rehb. f.** = **Reichenbach filius**, H. Gust., s. 1864 Prof. etc. z. Hamburg, schr. Xenia orchidaceae od. Beitr. z. Orchideenkunde, Lpz. 1858, Beitr. z. syst. Pflanzenk., Lpz. 1871, u. a. — **Reichenbach**, v., schr. d. Pflanzenwelt in ihrer Bezieh. z. Sensibilität u. z. Ode, Wien 1858.
- Reimar (-us)**. Herm. Dietr., schr. Diss. animadv. quasd. de Opii etc. usu exhib. 1784. — Reimaria Flügge.
- Reinw.** = **Reinwardt**, Prof. z. Leyden, Reis. in Indien, † 1854, schr. üb. d. Veget. d. Inseln im indisch. Archipel, Berl. 1828. — Reinwardtia Spr., Dumort.
- Relhan**, R., schr. Fl. Cantabrigiensis, Cantabr. 1820. — Relhania Gm., l'Hér.

- Reneaulme.** Paul de (Renealmus), † 1624 in Blois, schr. Specim. Hist. plant., Parisiis 1611. — *Renealmia* R. Br.
- Req.** = **Requien**, Bot. in Avignon, z. B. Helxine Req. — Requienia DC.
- Retz.** = **Retzius**, Prof. in Lund, † 1821, schr. Fl. Scandinaviae Prodr. Ed. 2, Lps. 1795. — *Retzia* L., Thb.
- Rheede**, Heinr. van Rheede tot Drakenstein, Gouvern. v. Malabar, schr. Hort. ind. malabar., Amsterd. 1678—1703. — Van Rheedia Plum., *Rheedia* Pers.
- Rich.** = **Richard**, L. Cl. Mar., Prof. d. Bot. z. Paris, für Ludw. XVI. Reis. u. Samml. in Guiana, † 1821, schr. Analyse du fruit 1808, Comment. de Coniferis et Cycadeis (publ. p. A. Richard, 1826), de Musaceis (do. 1831), Fl. boreali-amer. 1803, u. a. — *Richardia* Kth., Houst. — **Rich.** f. od. A. **Rich.** = **Achilles Richard** Sohn, Prof. z. Paris, † 1852, schr. Nouv. élém. d. bot. et physiol. vég. 1819 (deutsch v. Kittel), Botanique médicale 1823 (deutsch v. Kunze u. Kummer), Monogr. d. Orchidées (Herausg. von d. Vaters Werken).
- Risso**, J. A., Prof. z. Nizza, † 1845, schr. Hist. nat. de l'Europe mérid. 1826—28, (mit Poiteau) Hist. nat. des Orangers, Fl. de Nice, 1844, u. a.
- Rivière**, A., Chef d. Luxembourg-Gartens z. Paris, † 1877, schr. unvollend. ill. Werk üb. Obstbaumkultur, üb. Orchideen, u. a. — *Riveria* H. B. K.
- Riv.** = **Rivinus** (Bachmann), Prof. z. Leipzig, † 1723, schr. Introd. general. in rem herbar. 1690, Ordo plantar. 1690—99. — *Rivina* L. (-nia) Juss.
- Robin**, Jean, Henri IV. Gärtner., schr. mit Vallet 1608 le jardin du Roy très chretien Henri IV. — *Robinia* L. — **Robin**, Vespas. Sohn, Arborist am Jard. d. Plantes, schr. Enchiridion du Jard. royal, führte Pseud-Acacia Tourn. (*Robinia* L.) ein. — **Rob.** u. **Raf.** = **Robin** u. **Rafinesque**, schr. Fl. of Louisiana, N.-York 1817. — **Robin**, Charl., Prof. d. Med. z. Paris, schr. Hist. nat. d. végét. parasites sur l'homme et l. anim. vivantes, 1853.
- Rocheil**, Ant., † 1847 in Graz, schr. Plantae Banatus rarae, 1828, u. a. *Rocheilia* Lam., Don.
- Roehl.** = **Roehling** (Röhling), Pfarr. z. Messenheim (Hessen), † 1813, schr. Fl. Deutschlands, 2. A., Frankf. 1812 (neu v. Mertens u. Koch, 3 A., 1823—39), Deutschl.'s Moose, Brem. 1810, u. a.
- R.** od. **R.** u. **Sch.** = **Römer**. J. J. u. **Schultes**, erst. Prof. in Zürich u. Landshut, † 1819, **R.** u. **Schultes**, Herausg. v. Car. a Linné Syst. veget., 16. A., 1817—30, **R.** u. **Usteri**, Magaz. f. Bot. 1785—90, **Römer**, J. J., Archiv f. Bot., 1796—1805, Fl. Europaea, Nürnb. 1797, Collectanea ad rem bot. spect., Turici 1809. — *Roemeria* Med., Thb. — **Römer**, F. A., Bergr. z. Clausthal, schr. Algen v. Deutschl., 1845, Versteiner. d. Harzgeb.'s, 1843. — *Roemeria* Raddi.
- Roep.** = **Roeper** (Röper), Prof. z. Rostock, schr. Enum. Euphorbiarum etc., 1824, zur Flora Mecklenburgs, 1843—44, Vorgefasste botan. Meinungen verteidi., Rostock 1860. — *Roepera* A. Juss. (-ria) Spr.
- Roscoe**, W., Gelehrt. b. Liverpool, † 1831, schr. üb. Scitamineae, 1828. — *Roscoea* Sm.
- Rossmässler**, E. A., † 1856, schr. mikroskop. Blicke etc., Lpz. 1852, d. Wald (illustr. Werk), Lpz. 1863, u. a.
- Rostafinski**, Thom. v. aus Warschau, s. 1869 Prof. z. Strassb., schr. Syst. d. Mycetozoen, Strassb. 1873, Fl. Polonicae Prodr. 1873, u. a.
- Rostkovius**, Mediz.-R. in Stettin, schr. üb. Pilze in Sturm's Flora 1840, mit Schmidt Fl. Sedinensis, 1828. — *Rostkovia* Desv.
- Rostrup**, Seminarlehr. auf Fünen, schr. üb. Brandpilze, blütenlose Pfl. etc., m. Deichmanu **Branth** Lichenes Daniae etc., 1870.

- Roth**, A. W., Arzt z. Vegesack b. Bremen, † 1834, schr. Bot. Abhandl., Nürnb. 1787, Catalecta bot. etc., 1797—1806, Tentam. Fl. German. 1788—1800, Manuale bot. 1830, u. a. — Rothia Pers., Schreb., Lam.
- Rxb.** = **Roxburgh**, W., Reis. in Ostind., Arzt u. Dir. d. bot. Gart. in Calcutta, † 1815, Oberbot. in Edinburgh, schr. Pl. of t. coast of Coromandel 1795—1819 (herausg. v. Banks), Fl. indica, 1832 (3 B.).
- Royle**, John Forbes, Dir. d. bot. Gart.'s z. Saharumpore in Ostind., dann Prof. in Lond., † 1858, schr. üb. indische Pfl., an essay on t. antiquity of Hindoo-medicine, Lond. 1837, on Caoutshouc and Sarsaparilla, Lond. 1838, u. a. — Roylea Wall.
- Rudbeck**, O., schwed. Prof. d. Bot. in Upsala, schr. Propagatio planitarum, Ups. 1686. — Rudbeckia L.
- Rudolph**, Fr., schr. üb. Algen (in Plantae Ecklonianae). — Rudolphia W.
- Rücker**, Sig., ber. engl. Blumist, bes. Orchideen, Camellien u. Azaleen, † 1875. — Rückeria DC.
- Ruellius**, J., schr. de natura stirpium, Fol., Basileae 1543. — Ruellia L.
- Rümpler**, Th., Gen.-Sect. d. Gartenbau-Ver.'s z. Erfurt, schr. d. Zimbergärtneri, Berl. 1877, Vilmorin's Blumengärtn., 2. A., 1878, Ill. Gartenbau-Lexikon, Berl. 1880—82.
- R. P. Rz. Pv.** = **Ruiz u. Pavon** (s. Pavon), span. Bot., d. erst. † 1815 in Madrid, beide 1779—88 Reis. durch d. span. Amerika, schr. Quinologia 1792, Fl. Peruviana et Chilens., 1798—1802. — Ruizia Cav., Schreb., Pers.
- Rumpf** (**Rumphius**) aus Hanau, lang auf Amboina (Molukken), gen. Plinius indicus, † 1702, Burnmann's Herbar. amboinense 1741—55 als dess. Nachlass. — Rumphia L.
- Rupp**, Bernh., schr. Fl. Jeunensis, Tref. 1718. — Ruppia L.
- Rupr.** = **Ruprecht**, F. aus Prag, Reis. im Kaukasus, 1860—61, dann Cust. etc. in St. Petersb., † 1870, schr. Flores Samojedorum 1845, Algae Ochotenses 1850, Fl. ingrica 1860, u. a. — Ruprechtia E. Mey.
- Russell**, Patrick, Roxburg's Vorgäng. b. d. Exped. in Coromandel. — Russellia Jacq., Schreb. — **Russell**, Lord John, Herz. v. Bedford, legte an Arboretum Woburnense (bes. Weiden-Cultur). — Bedfordia DC.
- Saccardo**, P. A., Herausg. d. Michelia, Commentar. mycol. etc. (Jahrg. 1874—82), Berlin.
- Sachs**, Jul., s. 1868 Prof. z. Würzb., namh. Pfl.-Physiolog, schr. Lehrb. d. Bot., 4. A., Lpz. 1874, Gesch. d. Bot. 1875, Arb. d. bot. Instit. in Würzburg s. 1873, u. a.
- St. Hil.** = **Saint Hilaire** s. Hilaire.
- Sadler**, J., schr. de Filicibus veris Hungariae, Transsylvaniae, Croatiae et Litoralis hung., Budae 1830. — Sadleria Kaulf.
- Sagra**, Dir. d. bot. Gart. in Havannah, u. **Montagne**, schr. üb. Pfl. v. Cuba in Hist. phys., polit. et natur. de l'ile de Cuba p. Ramon de la Sagra etc., 1823—35 (bearb. v. A. Richard). — Sagraea DC.
- Sal.** = **Salisbury**, Rich. Anth. (eig. Markham), Gärtn. u. Mitgl. d. Linné'schen Ges. in London, † 1829, schr. Icones Stirp. rar., 1791, Paradisus Londinens. 1806—07, üb. Zapfenbäume etc., 1816. — Salisburia Sm.
- Sanio**, Dr. C., Pfl.-Anatom, schr. Unters. üb. d. Epidermis u. Spaltzellen d. Equisetac., Halle 1858, üb. Holzzellen (Bot. Zeit. 1863), Florula Lycensis, Hal. 1858, u. a.
- Sassi**, ital. Prof. d. Bot., schr. üb. Lebermoose (Dichlamys etc.). — Sassia Mol., Juss.

- Sauvages**, Prof. z. Montpellier, † 1767, schr. Syst. d. Pfl. nach d. Blättern. — *Sauvagea* Neck., *-vagesia* Jacq.
- Savi**, Gaët., Prof. z. Pisa, † 1844, schr. Fl. Pisana 1798, Materia med. veget. toscana, 1805, Bot. etrusca 1808—25, Fl. italiana 1818—24, u. a. — *Savia* Raf.
- Schacht**, Herm., Prof. in Bonn, † 1864, Lehrb. d. Pfl.-Physiol. u. Anatomie, Berl. 1856—59, d. Spermatozöiden im Pflanzenr., 1864, u. a.
- Schaeffer**, J. Chr., Superintendent z. Regensb., † 1790, Fungor. Bavariae et Palatin. Icones, 1762—74. — *Schaefferia* Jacq.
- Schräer**, Pred. in Belp (Cant. Bern), † 1853, schr. Lichenum helvet. spicilegium, 1823—42. — *Schaereria* Kbr.
- Schauer**, J. K., schr. Chamaelauciae, Comm. bot. Vratisl. 1841, de Regelia, Beaufortia et Calothamno, Vrat. 1843, u. a.
- Scheele**, Adolf, Pfarr. u. Bot. b. Hildesheim, † 1864, schr. Fl. von Texas.
- Scheidw.** = **Scheidweiler**, M. Jos., aus Köln, † 1861 z. Gent, 1838 Red. d. Horticole belge, schr. les plantes et leur vie, Cours rai-sonné d'agricult. etc., Bruxell. 1841—43, Bearb. d. Cacteen u. a.
- Schenk**, A., Hofr., s. 1868 Prof. in Leipzig, schr. mehreres üb. foss. Flora, Algolog. Mitteilungen, Fl. v. Würzburg, 1848, u. a.
- Scheuchzer**, schweiz. Bot., schr. Herbarium diluvianum, Tiguri 1719, Agrostogr. Helvet. Prodr., Zür. 1708, u. a. — *Scheuchzeria* L.
- Schiede** u. **Duppe**, Samml. v. Plantae mexicanae, beschr. v. Schlechtendal u. Chamisso, **Schiede** schr. de plantis hybridis sponte natis, Cassel 1825. — *Schiedea* Bartl.
- Schimper**, Prof. in Strassburg, † 1880, **Sch.** u. **Migeot**, schr. Mon. d. pl. foss. des Vosges, Strassb. 1840, Sch. Synops. muscorum europ., 1860, Traité de paléontologie végét., Paris 1869—74, u. a.
- Schinz**, S., Prima lineae bot. ex tab. phytogr. J. Gesneri, Zür. 1875.
- Schk.** = **Schkuhr**, Chr., Univ.-Mechanik. z. Wittenberg, † 1811, schr. Enchiridion bot., 1805, kryptog. Gewächse, 1809, Deutschlands Kryptogamen, 1810—47, u. a. — *Schkuhria* Roth.
- Schildt**. = **Schlechtendal**, D. F. Leonh. v., Prof. etc. z. Halle, † 1866, schr. Fl. v. Deutschl., Jena 1841—64, Hort. Halensis, 1841—53, Fl. Berolinensis 1823—24, mit v. Mohl Herausg. d. Bot. Zeit. — *Schlechtendalia* Less.
- Schleicher** in Bex, schweiz. Bot., schr. Fl. d. Schweiz od. Catal. Pl. in *Helvetia* etc., 4. A., 1821. — *Schleichera* W.
- Schleiden**, M. J., Prof. z. Jena, dann Dorpat, s. 1866 Staatsr. a. D. in Dresden, **Schl.** u. **Nägeli**, Zeitschr. f. wiss. Bot., Zürich 1844—46, Schl. üb. Ernähr. d. Pfl., 1846, Grundr. d. Bot., 2. A., 1850, u. a. — *Schleidenia* Endl.
- Schlotheim**, E. F. v., Kamm.-Präs. in Gotha, † 1832, schr. Petrefaktenk., 1820, Nachtr. z. Petr. 1822—23. — *Schlotheimia* Brid.
- Schmidel**, C. C., Prof. z. Erlangen, schr. Dissertationes etc., Icones plant. et analyses partium (2. A. v. Bischoff), Norimb. 1782. — *Schmidelia* L.
- Schmidlin**, schr. Blumenzucht im Zimmer, 4. A., Berlin 1880 (illustr. Prachtausg.). Vgl. Schüle sen.
- Schmidt**, J. A., schr. Anleit. z. Kenntn. d. natürl. Fam. d. Phanerogamen, Stuttgart 1865, Beitr. z. Flora d. Capoverdischen Inseln, Heidelberg 1852. — **Schmidt**, Fr. Wilibald, Prof. in Prag, † 1796, schr. Fl. bohemica inchoata. — *Schmidtia* Tratt. — **Schm.** u. **Kze.** = **Schmidt** u. **Kunze**, schr. Mykolog. Hefte, 1817—23, u. Deutschlands Schwämme etc., 1816—18. — **Schmidt**, F., Reis. im Amurland (bot. Teil) od. *Florula Amguno-Burejensis et Fl. Sachalina*, Petersb. 1868.

- Schmitz**, J. Jos., Lehr. an d. Ritt.-Akad. z. Bedbury, † 1845, **Schm.** u. **Regel**, Fl. Bonnensis, 1841. — *Schmitzonia* Fr.
- Schnizlein**, A., Prof. z. Erlangen, † 1868, schr. Fl. v. Baiern, 1847, Iconogr. famil. nat. regni veget., Bonn 1843—70.
- Schoepf (Schöpf)**, Joh. Dav., schr. Materia med. americ. etc., Erlangae 1787. — *Schoepfia* Schreb., DC.
- Schomburgk**, Sir Rob., engl. Reis. u. Consul in St. Domingo, dann Siam, Einführ. v. Victoria regia, † 1865 z. Berlin, schr. Deser. of brit. Guiana, 1840, Reis. in Guiana u. a., 1841. — *Schomburgkia* Lindl., DC.
- Schott**, H. W., Dir. d. k. k. Gärten zu Schönbrunn, † 1865, **Seh.** u. **Endlicher**, schr. Meletemata bot. 1832, Sch. üb. Aroideen, Rutaceen u. Farne. — *Schottia* (-tia) Jacq.
- Schousboe**, dän. Bot. in Tanger, schr. Pfl. v. Marokko, 1791—93. — *Schousboea* W.
- Schouw**, Prof. in Kopenh., † 1852, schr. Gründg. einer allg. Pflanzengeogr. (deutsch Berl. 1823). — *Schouwia* DC.
- Schrad.** = **Schrader**, Prof. in Göttingen, † 1836, schr. Sertum hanooveranum 1795—98, Herausg. d. Journals f. Botanik, 1799—1810, Fl. germanica, Götting. 1806, Spicileg. Fl. Germ., Hort. Goetting. 1809, Anim. ad Floram Capensem, 1832. — *Schradera* Vahl, Sw.
- Schrk.** = **Schrank**, P. F. v., Jesuit u. Prof. z. München, † 1835, schr. Bair. Flora, 1789, Primit. Fl. Salisburgens., 1792, Fl. Monacens., 1811—18, u. a. — *Schrankia* W., Scop.
- Schreb.** = **Schreber**, J. C. Dan. v., Prof. z. Erlangen, † 1810, schr. Beschr. d. Gräser m. Abb., 1769—1810, Spicileg. Fl. Lipsiae, 1771, Linnaei genera plant., 1789—91. — *Schrebera* L., Roxb.
- Schubert** (Edel u. Roth), schr. Plantar. species q. per Aegyptum, Arabiā et Syriam coll. (v. A. Schenk in Würzb., 1840), Naturgesch. d. Pflanzenreichs in kolor. Bildern (v. Hochstetter bearb.). — *Schubertia* Mart., Mirb.
- Schübler**, Gust., Prof. in Tübingen, † 1834, schr. Characteristica Cerealium, 1818, üb. Agrikulturchemie (2. A., 1838), **Sch.** u. **Martens**, Fl. v. Württemberg, 1834, u. a. — *Schueblera* (-ia) Mart.
- Schüle**, W. sen., Dir. d. k. Gartenbau-Schule Hohenheim, schr. 3. Ausg. v. Schmidlin's wicht. Futter- u. Wiesengräsern. — **Schüle**, W. jr., s. 1879 Dir. d. k. Obst- u. Gartenbau-Schule z. Grafen-Brumath, Red. d. Zeitschr. f. Wein-, Obst- u. Gartenbau.
- Schult.** = **Schultes**, Prof. in Landshut, † 1821, schr. Österreichs Fl., 1814, Baierns Fl., 1811, R. u. S. (Römer u. Schultes), 16 A. v. Linné's Syst. veget. — *Schultesia* Mart., Spr.
- Schultz**, C. Fr., Arzt z. Neubrandenburg, † 1765, schr. Prodr. Fl. Star-gardiens., Berl. 1816—19. — *Schultzia* Spr. — **Schultz**, C. H., gen. Schultzenstein, Prof. z. Berl., Förd. d. Gartenbaus, † 1871, schr. Nat. d. lebenden Pflanze, 1825—28, *Tanacetaceae*, 1844, Pfl.-Physiol., z. B. neues Syst. d. Pfl.-Morphologie, 1847, u. a. — **Schultz**, C. H., gen. Bipontinus, Arzt u. Bot. in Deidesheim (Rheinpfalz), † 1867, schr. Anal. Cichoriacearum Palatin., 1841, u. a. — **Schultz**, Fr. W., Brud. d. vor., Arzt in Weissenburg, † 1869, schr. Fl. d. Pfalz etc., Grundz. d. Phytostatik etc. (Pollichia, J. 1863).
- Schulzer** v. Müggensburg, österr. Hauptm. in Slavonien, schr. Icon. Hymenomyc. Hungariae, 1874, **Sch.**, **Kanitz** u. **Knapp**, schr. d. bish. bekannt. Pfl. v. Slavonien, 1866. — *Schulzeria* R. S.
- Schum.** = **Sehumacher**, Prof. in Kopenh., † 1830, schr. Kjovenhanske Fl., 1804, Medicinsk Plantelaere, 1825—26.
- Schwägrichen**, schr. Hist. muscor. hepaticor. Prodr., Lps. 1814, Specim.

- muscor. frondos. I., Berlin 1830, Herausg. v. Winkler's Giftgew. Deutschlands, Leipz. 1854. — Schwaegrichenia Spr.
Schwalbe, C. G., schr. de China officinarum, Leyd. 1715. — Schwalbea L.
Schweigger, de plantar. classificatione nat., Regiomontani 1820. — Schweigera Spr., (-ia) Mart.
Schweinfurth, G., schr. novae species aethiop., Flora der Soturba an den nubischen Küste, 1868.
Schwendener, s. 1867 Prof. in Basel, jetzt z. Berl., schr. Unters. üb. Flechten-Thallus, 1860, Algentyphen d. Flechten-Gonidien (neue Flecht.-Theorie), 1869, S. u. Nägeli, Mikrosk. 1865—67, Neue mechanische Theorie d. Blattstellung, Lpz. 1878, u. a.
Schweykert, J. M., Catal. pl. horti bot. Carlsruhani etc., Carlsruh. 1791. — Schweykerta W.
Scop. = **Scopoli**, zul. Prof. z. Pavia, † 1788, schr. Fl. carniolica, 2. A., 1772, Fundament. bot., Vienae 1786, Deliciae Flor. et Faun. Insubricae, 1786—88. — Scopolia (-la) Jacq., L. Sm., Forst., Scopolina R. S.
Scott, J., schr. Orchardist, 2. A., Lond.
Secretan, L., Landamann v. Waadt, † 1839 z. Lausanne, schr. Mycogr. Suisse, 1833.
Seemann, Dr. Berth. aus Hannover, Gärt. u. Reis., 1863 Red. d. Journ. of Botany in Lond., † 1872 in Centr.-Amer., Herausg. d. Bonplandia, Hannov. 1853—62, schr. d. Palmen, 2. A., 1863, Fl. Vitiensis 1865—68, u. a.
Seguierii bibliogr. bot. Access. Brumaldi bibl. bot., 3 p., Hag.-Comit. 1770.
Seliger, schles. Pfarr. u. Bot., † 1812, schr. Bryologie. — Seligeria Schimp.
Sendtner, Prof. z. München, † 1859, schr. d. Solaneen (in Martius' Fl. brasili.), üb. d. klimat. Verbreit. d. Laubmoose durch d. östr. Küstenländer, üb. d. Vegetationsverh. Südbayerns etc. — Sendtnera Endl.
Senebier, J., schr. Physiologie végétale, Genève 1801. — Senebiera Poir.
Ser. = **Seringe**, Prof. z. Lyon, † 1858, schr. (in de Cand.'s Prodr.) Aconitum etc., Mélanges bot., Genève 1824—26, Elémens d. Bot., üb. Cerealiens (in Fl. d. jard. et des grand. cultures, Lyon 1845—49), u. a. — Seringea (-ia) Gay, Spr.
Sessé, Dr. Mart., Mitherausg. d. Fl. mexicana (v. Moçino u. Sessé), mex. Botaniker. — Sesséa R. P.
Seub. = **Seubert**, Hofr. u. Prof. am Polytechn. z. Carlsruhe, † 1878, schr. Fl. azorica, 1844, Elatinear. Monogr., 1845, Lehrb. d. gesammt. Pflanzenk., 5. A., 1870, schr. in Martius' Fl. brasili. u. a.
Shaw, Thom., Geistl. u. Reis. in Nordafri., † 1751, Prof. z. Oxford, schr. Pfl. d. Levante etc., Oxf. 1738. — Shawia Forst.
Sheppard, schr. on trees, their uses and biography, Lond. 1848. — Sheppardia Nutt.
Sibth. = **Sibthorp**, John, Prof. z. Oxford, † 1796, schr. Fl. graeca, Lond. 1810—40 (durch Smith herausg.), Fl. Oxoniens. 1794. — Sibthoria L.
Sickler, J. V., schr. d. Deutsche Obstgärtner od. gemeinnütz. Magaz. d. Obstbaues, Weimar 1794—1804 (22 B. m. kol. Taf.).
Siebold, Ph. Fr. v., ber. Ethnogr. u. Erforsch. d. japan. Reichs, † 1866 z. München, schr. Synops. plant. oecon. regni japonici, 1827, Fl. japonica, 1835—44 (mit Zuccarini).
Siegesbeck, Dr. J. G., Prof. in St. Petersb., schr. Botanosophiae veroris brev. sciagraphia, Petrop. 1737. — Siegesbeckia L.

- Simler.** R. Th., Leitfaden f. d. bot. Formenlehre, Zür. 1871, bot. Taschenbegleiter d. Alpenclubisten, Zür. 1871.
- Sims,** John, engl. Bot. z. London, † 1838, setzt. d. bot. Magazin v. W. Curtis fort bis 1826. — Simsia R. Br.
- Sinning,** s. Nees v. Esenbeck, Th.
- Sismonda,** E., Elementi di storia nat. Botanica, Torino 1858.
- Sloane,** H., schr. Catal. pl. ins. Jamaicæ, Lond. 1696. — Sloanea L.
- Smee,** Alfr., Besuch. ber. Gewächsh., schr. My Garden (viel übersetzt), Abh. üb. d. besten Obstsorten Englands, 1874, † 1877.
- Sm. = Smith,** Jam. Edw., Präs. d. Linné'schen Ges. z. London, † 1828, schr. Plant. icon. haec tempus ineditae etc., 1789—91, Bot. Gramm. z. Erläut. d. Jussieu'schen Systems, Weimar 1822, (mit Sowerby) Engl. Bot., 1790—1814, Fl. britica, Exotic Bot., u. a. — Smithia Ait., Schreb., Dry. — **Smith.** W., Prof. in Cork, † 1857, schr. Synops. of t. brit. Diatomaceæ, Lond. 1853—56.
- Sol.** = **Solander,** Biblioth. am Brit. Mus. z. London, † 1782, schr. (m. Ellis) üb. Corallen. — Solandra L., Sw.
- Solms-Laubach,** Herm. Graf zu, s. 1879 Prof. d. Bot. in Göttingen, bed. Mykol. u. Bryol., schr. de Lathraeae positione etc., 1865, Tent. Bryologiae Algarviae, 1868, üb. monocot. Embryone etc., 1878, u. a.
- Sonder,** Med.-R. in Hamb., schr. Fl. Hamburg. 1851, d. Algen d. trop. Australiens 1871, (m. Harvey) Fl. Capens.
- Sonnerat,** fr. Reis. in Ostind., † 1814, schr. Voyage à la Nouv. Guinée, do. aux Indes orient. et à la Chine, 1806. — Sonneratia L. f., DC.
- Sowerby,** Jam., engl. Maler u. Naturf., † 1822, lief. Engl. Bot. or col. fig. (Text v. Smith), t. Ferns of Gr.-Britain (Text v. Ch. Johnson), Grasses of Gr.-Brit., u. a. — Sowerbaea Sm.
- Soyer-Willemet,** Oberbibl. z. Nancy, † 1867, schr. Observ. sur quelq. pl. de France, 1828, Abhandl. in Mém. d. l. Soc. nat. de Nancy. — Soyeria Monn.
- Spach,** Ed., schr. (mit d. Grafen Jaubert) Illustr. plantar. oriental., Revis. Populorum, do. Grossulariae, do. gen. Acerum et sp. Hippocastani 1834 (in Ann. d. Sc. nat.). — Spachea A. Rich.
- Spenner,** Prof. z. Freiburg i. Br., schr. Fl. Friburgens., 1825—29, Handb. d. angew. Bot., 1834—36, u. a. — Spennera DC.
- Spiegel,** A. (Spigelius), schr. Isagoges in rem herbar. libri II, Lugd.-Bat. 1633. — Spigelia L.
- Splitgerber,** F. L., schr. Observ. de Bignoniacis surinam., Amsterd. 1841, Obs. de Voyria, Enum. Filicum etc. Surinamens. etc.
- Sporleder,** F. W., schr. Verz. der in d. Grafsch. Wernigerode wildw. Phanerog. u. Gefäßkrypt., Wernig. 1868. — Sporledera Hemp.
- Spr. = Sprengel,** Curt (Konr.), Prof. etc. z. Halle, † 1833, schr. Anleitung z. Kenntn. d. Gew., Halle 1802—04, Hist. rei herbar., 1807—08, Gesch. d. Bot., 2 T., Altenb. u. Lpz. 1817/18, Plant. umbellif. Prodri. 1813, Linnaei Syst. Veget. 16. A., Spr. (Schrader u. Link), Jahrb. d. Gewächsk., 1818—20, Fl. Halens., 1832, u. a. m. — Sprengelia Sm.
- Spring.** Dr. A. F., Prof. in Lüttich, † 1872, schr. Monogr. d. Lycopodiaceæ 1842 u. 49 (Bearb. ders. in Martius Fl. bras.).
- Spruce,** R., Palmae Amazonicae (Linn. Soc. Journal).
- Stackhouse,** John, engl. Bot., † 1819 z. Bath, schr. Nereis brit., 2. A., Oxf. 1816. — Stackhousea (-ia) Sm.
- Steetz,** J., schr. Enum. Compositarum q. in Australia annis 1838—41 colleg. L. Preiss, üb. d. Tremandreen etc., Hamb. 1853.
- Steph. = Stephan,** Fr., Prof. in Moskau, † 1817, schr. Enum. Stirpium agri Mosquensis 1792, Icones pl. Mosq. 1795. — Stephania W., Lour.
- Stephenson,** J. u. **Churchill,** J. M., schr. Medical botany (new ed. by Burnett, Lond. 1834—36).

- Sternb.** = **Sternberg**, Graf v., Vorst. d. k. Böhm. Ges. d. Wiss., † 1838, schr. Revis. *Saxifragarum*, Geognost.-bot. Darstell. d. vorweltl. Flora, 1820—28. — *Sternbergia Waldst.*, Kit.
- Steudel**, E. Th., † 1856, schr. Nomencl. bot., Ed. 2, Stuttg. u. Tübing. 1840/41. — *Steudelia Spr.* — **Steudel**, E. G., schr. *Synops. pl. glutinacearum*, Stuttg. 1855/56.
- Stev.** = **Steven**, Univ.-Kanzl. in Moskau, † 1863, schr. Verz. d. Pfl. auf d. taur. Halbinsel, Mosk. 1857. — *Stevenia Adams*.
- Stoll**, Oesterr.-Ungar. Pomologie, I u. II, Äpfel u. Birnen, Wien 1883 (80 Farbdr.-Abb.).
- Strasburger**, Ed., s. 1869 Prof. in Jena, j. Bonn, schr. üb. *Azolla*, d. Coniferen u. Gnetaceen, 1872, d. Angio- u. Gymnosperm., Jena 1879, u. a. m.
- Strumpf**, Ferd. L., schr. d. offizin. Gewächse in d. nat. Pflanzenfamilien, Berl. 1840. — *Strumpfia Jacq.*, Schreb. (-phia Pers.)
- Sturm**, Jak., Entomolog. u. Bot., Herausg. v. Deutschlands Flora in Abbild. n. d. Nat., Nürnb. 1798—1855. — **Sturm f.**, Joh. W. Sohn, setzte d. Werk fort (Mitarb. v. Martius), † 1865. — *Sturmia G.*, Hoppe, Rehb.
- Suard**, franz. Bot., schr. Catal. d. pl. vaseul. du dép. d. l. Meurthe, Nancy 1843. — *Suardia Schrk.*
- Suck.** = **Suckow** (*Succovius*), s. 1774 Prof. in Heidelb., † 1813, schr. üb. Calamiten, Ökonom. Botanik, 1777, Anfangsgr. d. theor. u. angew. Bot., 2. A., 1797, u. a. — *Succovia Mnch.* (-owia Med.). — **Suckow**, Fr. W. L., Arzt u. Cust. d. Museums in Mannheim, schr. Fl. Mannhemiens., 1821.
- Sullivan**, Bryolog z. Columbus (Ohio), † 1873, schr. *Musci Alleghanienses* 1846, *Icones muscorum*, d. Moose in Ch. Wilke's Unit. States Exploring Expedition, 1859, *Musci Cubenses* etc., New-York 1861.
- Sulzer** s. Kalchbrenner. — *Sulzeria R. S.*
- Suter**, schr. Fl. Helvetica, Turici 1802. — *Sutera Roth*, (-ia DC.).
- Sw.** = **Swartz**, Olof, schwed. Bot. u. Reis. in Westind., † 1818, schr. *Nova gen. et sp. plant. etc.*, 1788, *Icones pl. incognit. Fl. Indiae occidentalis*, 1797—1806, *Summa veget. Scandinaviae*, 1814, u. a. — *Swartzia W.*, (-zia Rehb.).
- Sweert**, schr. *Florilegium*, tract. de floribus et aliis Indicis plantis, Francof. 1612. — *Sweertia L.*
- Sweet**, Rob., engl. Bot., schr. Geraniaceae, Lond. 1820, Hort. suburb. Londinens. 1818, Hort. britannicus, 3. A. v. G. Don 1839, Fl. austral-asica 1827/28. — *Sweetia DC.*
- Tabernaemontanus** (v. Bergzabern), Jac. Theod., Arzt u. Bot., † 1590, schr. Kräuterbuch m. viel. Abb. — *Tabernaemontana L.*
- Targioni-Tozzetti**, Bot. in Florenz, † 1783, schr. Fl. v. Italien, 1763. — *Targionia Mich.*
- Taschenberg**, schr. Handb. d. bot. Kunstsprache, Halle 1843, u. a.
- Tausch.** = **Tauscher**, Ign. Fr., Prof. in Prag, † 1848, schr. Herb. Fl. Bohemicae univ., *Hortus Canalius*, 1823, Fl. select. Fl. Bohem., 1837. — *Tauscheria Fisch.*
- Taylor** s. Hooker. — *Tayloria Hook.* — **Taylor**, Thom., Bot. in Nordamer., schr. de Marchantieis.
- Ten.** = **Tenore**, Michele, Prof. in Neapel, † 1861, schr. Fl. Napolitana, 1811—38, u. v. a. — *Tenorea Bert.* (-ia Spr.).
- Thal.** Joh., Arzt in Nordhausen, schr. *Sylva Hercynia* u. Hort. medic. et philos., † 1583. — *Thalia L.*, Schreb.
- Théis**, A. de, schr. glossaire de botanique etc., Paris 1810.

- Th. Fr.** s. Fries, Th. Magn. Sohn, Fr. f.
- Theophrastus** von Eresus, ber. griech. Philosoph etc., † 288 v. Chr. z. Athen, Theophrasti Eresii de histor. plantar. libri X (zuerst Amsterd. 1644). — Theophrasta (-stea) L.
- Thevenot**, übers. 1695 des Indienfahrers Kosmas „christl. Topographie“ aus d. 6. Jahrh. — Thevenotia DC.
- Thom.** = **Thomas**, Eman. nebst Brüdern, Schweizer Sammler z. Haller's Zeiten, schr. Catal. d. pl. suisses q. se vendent chez Em. Thomas à Bex (Cant. de Vaud), 1818. — Thomasia Gay. — **Thomas**, O., schr. Guide pratique de pomologie etc., Nancy 1876.
- Thomé**, Prof. Dr., Lehrb. d. Bot., Braunschw. 1872 u. 76, d. Flora v. Deutschl., Oesterr. u. d. Schweiz in Wort u. Bild (3 B., 600 T.), Gera 1885.
- Thomson**, Rob., schr. Catal. of fruits cultiv. in t. Garden of t. Hortic. Soc. of London etc., † 1869. — Thomsonia Wall.
- Thory**, s. Redouté. — **Thory**, Claud. Ant., schr. Hist. de Grosseillers, Par. 1829, Monogr. s. l. genre Rosier 1820, u. a.
- Thon.** = **Thonars (Du Petit-Thonars)**, s. Pet.-Th. — Thouarsia Vent.
- Thouin**, André, Prof. d. Agrikult. z. Paris, † 1824, schr. s. l. cult. d. Dahlia, 1804, Cours d. cult. et d. naturalisation d. végétaux, 1827. — Thouinia Poit.
- Threlkeld**, Dr. med. u. Bot. z. Dublin, schr. Synops. Stirpium Hiberniorum, † 1728. — Threlkeldia R. Br.
- Thb.** = **Thunberg**, ber. schwed. Bot. u. Reis. in Ceylon, Japan etc., 1743—1828, Schül. u. Nachfolg. Linné's z. Upsala, schr. Fl. japonica, 1794—1805, Fl. Capens. 1807—13. — Thunbergia L.
- Thuret** s. Bornet. — **Thuret**, Gust. z. Antibes, † 1875, Entd. d. Geschlechtigk. d. Tange, schr. s. l. Fécond. d. Fucacées, 1853—57.
- Thurnmann**, J., schr. Essai de Phytostatique appliqué à la chaîne de Jura, Bern 1849; dessen Boden-Nomenclatur.
- Tiedemann**, F., Gesch. des Tabaks u. andr. ähnl. Genussmittel, Frankfurt a. M. 1854. — Tiedemannia DC.
- Timm**, J. C., schr. Fl. Megapolitanae Prodr., Lips. 1788. — Timmia Hedw.
- Tineo**, V., schr. Catal. pl. horti reg. Panormit., 1827, Pl. rarior. Siciliae etc., Panorm. 1846.
- Tode**, Pred. u. Bot. im Mecklenburgischen, † 1797, schr. Fungi Mecklenb. selecti 1790—91. — Todea W.
- Tommassini**, Ritter v., k. k. Hofr. z. Triest, schr. Fl. v. Südistrien (Östr. Bot. Zeit. 1873). Sulla veget. dell' isola di Veglia, Trieste 1875. — Tommassinia Bertol.
- Tornabene**, Fr., schr. Ricerche bibliografiche sulle opere botaniche del secolo XV, Catania 1840.
- Torr. Gr.** = **Torrey**, John u. **Gray**, Asa (s. Gray), **Torr.**, J., schr. a Fl. of t. north- and middle section of t. United States, 1824, u. v. a. — Torreya Van Houtt., Spr., Raf.
- T. od. Tourn.** = **Tournefort**, ält. franz. Bot. u. Reis., 1656—1708, Vorarb. Linné's, schr. Institutiones rei herbariae (ed. A. de Jussieu, Lugd. 1719), Hist. d. pl. d. Paris (2. A. v. Jussieu, 1725), Elémens de Bot. 1797, Voyage du Levant, 1717, u. a. — Tournefortia W., R. Br., Hook.
- Tragus (Bock)**, Hier., † 554, einer d. ält. deutsch. Bot., schr. New Kreuterbuch etc., Strassb. 1551. — Tragia Plum.
- Trattinick (-nik)**, L., Prof. in Wien, schr. d. essb. Schwämme Österreichs, Wien 1809, Archiv d. Gewächsk., Wien 1812—14, Genera pl. method. nat., Wien 1802, u. a. — Trattinickia Pers., W., Mart.

- Trautvetter (-wetter)**, E. G., schr. *Salicetum Comment.*, 1836, Middendorf's Reise in Nordsibir. 1843—44. — **Trautvetter**, E. R. v., schr. *Plantar. messes a. 1874 in Armenia a Radde et in Daghestania a Becker factas commentatus est Trautv., Plantae Sibir. boreal. a Czeganowski et F. Mueller a. 1874—75.*
- Trentepohl**, Pred. im Oldenburgischen, schr. Beitr. zu Roth's *Catalecta bot. u. Bot. Bemerkungen*. — *Trentepohlia Mart.*, Roth, Ag.
- Trev.** = **Treviranus**, zul. Prof. in Bonn, † 1864, schr. üb. *Pfl.-Physiologie* (z. B. *Phys. d. Gew.*, Bonn 1835—38). — *Trevirania W.*
- Trevisan**, Viet., Graf in Venetien, Akad. zu Padua, schr. *Lichenotheca Veneta s. 1869, Prosp. della Fl. Euganea*, 1842, u. a.
- Trew (Treu)**, Chr. Jak., Arzt in Nürnb., schr. 1769 *Hort. nitid. superbiens floribus etc.*, Norimb. 1750—72, *Pl. select. quar. imagines Ehretius Londini pinx.*, Norimb. 1750—73. — *Trewia L.*
- Triana**, J. et J. E. **Planchon**, schr. *Prod. Florae Novo-Granatensis*, Par. 1862.
- Trin.** = **Trinius**, Frhr. v., † 1844 als Staatsr. z. Petersburg, bes. *Agrostograph*, schr. *Fundam. Agrostogr.* 1820, *Species graminum etc.*, 1828—36, u. a. — *Trinia Hoffm.*
- Triumfetti**, J. B., schr. *de ortu et vegetatione plantarum*, Romae 1685. — *Triumfetta L.*
- Tschudi (-dy)**, v. u. Sohn, Schweiz. Nat., schr. *de Coniferis*. — *Tschudya DC.*
- Tul.** = **Tulasne**, L., Ren. u. Charl., Gebrüd. im Dep. Indre et Loire, erst. Naturalist am Mus. z. Paris b. 1872, schr. üb. *Leguminosae* u. zahlr. mykol. Abh. — *Tulasnodea Fr.*
- Turezaninow**, N., schr. *Fl. Baicalensi-Dahurica*, 1835, *Animadversiones etc.*, 1858. — *Turczaninovia DC.*
- Turner**, W., engl. Arzt, schr. neues Herbarium, 1551. — *Turnera L.* — **Turner**, Dawson, reich. Bankier z. Yarmouth, † 1856, schr. *Synops. of t. brit. Fuci, Muscol. hibern. spicilegium*.
- Turpin**, fr. Pflanzenmaler, † 1840 zu Paris, lief. *Cactées* 1830, *Fl. usuelle*, 1834, *Iconogr. végét.* 1841, u. a. — *Turpinia H. B. K.*, Vent.
- Turra**, Antonio, ital. Bot., schr. *Istoria del arbore della China*, *Fl. italicae Prod.*, Vened. 1780. — *Turraea L.*
- Tuss.** = **Tussae**, F. Rich. de, fr. Bot., schr. *Fl. Antillarum*, Par. 1808—26, 4 B. — *Tussaca Rchb.*

- Uechtritz**, R. v., schr. d. wicht. Ergebnisse d. Durchforsch. d. schles. *Phanerogamen-Flora* im J. 1876.
- Ulloa**, A. de, schr. *Physik. Nachrichten von Süd- u. Nordamer.*, Lpz. 1781. — *Ulloa Pers.*
- Ulrich**, W., *Internationales Wörterb. d. Pflanzennamen*, Lpz. 1872 (lat., deutsch, fr. u. engl.).
- Unger**, Prof. in Wien, † 1870, schr. *Synops. plantar. fossil.*, Lips. 1845, *Gen. et spec. pl. foss.*, Wien 1840, mit St. Endlicher Grundz. d. Bot., Wien 1843, d. Pfl. u. d. Luft, Wien 1853, d. versunk. Insel Atlantis, d. phys. Bedeut. d. Pflanzenkultur, Wien 1860, u. a.
- Ungnad**, Chr. Sam., schr. *de Malo persica*, Frankf. a. O. 1757. — *Ungnadia Endl.*
- Urville** s. D'Urville. — *Urvillaea H. B. K.*
- Usteri**, P., Herausg. d. *Annalen d. Bot.*, Zürich 1791—95, u. a. m. — *Usteria W.*

- V.** = **Vahl**, Mart., Linné's Schüler, Prof. in Kopenhagen, † 1804, sehr. Symbolae bot. 1790—94, Eclogae americ. 1796—1807, Enum. plant. 1804—06. — Vahlia Thb., Schreb.
- Vaill.** = **Vaillant**, Seb., fr. Bot. u. Reis., Prof. z. Paris 1714, schr. Bot. Parisienne (300 Fig. p. Aubriet), Par. 1727. — Vaillantia R. S., DC.
- Valentini**, M. B., Hist. simplicium reform. etc., acced. C. B. Valentini (fil.) India literata, Francof. 1716. — **Valentini**, Chr. B., Tournefortus contract. etc., Lugd.-Bat. 1715. — Nach Jessen: **Valentini**, Bernh. 1657—1729, Prof. z. Giessen, schr. Museum Museorum etc., Francof a. M. 1704—14 (spät. lat. Hist. simplic. reform. etc.), Prodr. Hist. nat. Hassiae, Gissae 1707, u. a. — Valentinia Sw.
- Vand.** = **Vandelli**, Domin., portug. Bot., Prof. z. Lissabon, schr. Pfl. v. Brasilien. — Vandellia L.
- Van Houtte**, Herausg. d. Flore des Serres et des Jardins de l'Europe, Gent, s. 1845, später Planchon etc.
- Van Hulle** von Gent, (mit Pynaert etc.) Herausgeb. d. Bulletins mensuels du cercle d'Arboriculture en Belgique s. 1855.
- Van Rheede** s. Rheede.
- Vater**, A., schr. Catal. pl. Horti Wittenbergensis, Wittenb. 1722. — Vateria ind. Rheed.
- Vaucher**, Pred. u. Prof. z. Genf, † 1841, schr. Hist. d. Conferves d'eau douce, 1803, Monogr. d'Orobanches, u. a. — Vaucheria DC.
- Veitch**, John Gould, schott. Gärtn. u. Reis. in Japan u. Austral. bis 1866, führte neue Gartenpfl. ein, † 1870. — Veitchia u. Coléus Veitchii. — **Veitch**, James u. Söhne, Handelsg.-Firma in Chelsea (Engl.).
- Velley**, Thom., engl. Offizier, † 1806, lief. Coloured figures of marine plants, Bathon 1795. — Velleja Sm., Lab.
- Vent.** = **Ventenat**, Prof. in Paris, † 1805, schr. Principes de Bot., 1795 (deutsch A. v. Haller, 1802), Choix de pl. etc., 1803, Jard. d. Malmaison, 1803—04, u. a. — Ventenata Koel. (-tia) Sw., P. Br.
- Venturi**, Ant., schr. studi micologici, Brescia 1842, i miceti dell'agro Bresciano, Bresc. 1845. — Venturia de Not.
- Verschaffelt**, Ch., Gart.-Liebh. in Gent, veranl. d. Ersch. d. Illustration horticole (redig. v. Lemoine), † 1880. — Verschaffeltia H., Wendl.
- Vesling**, schr. Veslingii J. de plantis Aegypt. observ. ad Pr. Alpinum, Patavii 1638. — Veslingia Fabr.
- Vest de**, schr. Manuale bot., stirpes tot. Germaniae phanerog., Klagenfurt 1805. — Vestia W.
- Vicat**, P. R., schr. Hist. d. pl. vénéneuses d. l. Suisse, Yverdon 1776. — Vicatia DC.
- Vietz**, lief. Abb. aller mediz.-ökonom.-technol. Gewächse etc., 6 Bde., Wien 1800—6.
- Viguier**, A., schr. Hist. nat. d. pavots et d'argémones, Montpellier 1814. — Viguiera Kth. (-ia) Less.
- Vill.** = **Villars**, Dan., Arzt u. Prof. z. Strassb., † 1814, schr. Hist. d. pl. du Dauphiné, 1786—89, Catal. d. pl. etc. de Strassb., 1807, u. a. — Villarsia Vent.
- Vilm.** = **Vilmorin**, L., fr. Gartenz., schr. Essai d'un catal. méth. et synonyme des Froments, Par. 1850, Illustrierte Blumengärtnerei, 2. Ausg. (m. II. Suppl.) v. Dr. Grönland u. Th. Rümpler, Berlin 1873. — Vilmorinia DC. — Vilmorin u. Andrieux, ber. Paris. Gärtner-Firma.
- Vis.** = **Visiani**, R. de, schr. pianti fossili della Dalmazia, Recens. altera plantar. minus cogn. q. Hort. Patavinus colit, 1858, Pl. quaed. Aegypti et Nubiae, Patavii 1836.

- Vittadini**, namh. Mykolog z. Mailand, † 1865, schr. Mon. Tuberacearum, 1831, do. Lycoperdineorum, 1842, Funghi mangerecci, 1835, u. a. — *Vittadinia* Rich.
- Viviani**, D., schr. Fl. Italicae fragmenta, Genuae 1808. — *Viviania* Cav., G. Don.
- Vöchtung**, schr. üb. d. Bau d. Melastomaceen (Hansteins Abh. III), üb. Organbildung im Pflanzenr., Bonn 1878, u. a.
- Vogel**, B. C., schr. de gen. plant., Altorphii Noric. 1768, d. amerik. Agave, Nürnb. 1800. — *Vogelia* Horn., Gm. — **Vogel**, Mart., Schül. v. J. Jung, gab dess. Botanico-physica heraus, 1678. — **Vogel**, Th., schr. (zu Meyen's Beitr.) üb. Leguminosen.
- Vogler**, nass. Hofr. z. Weilburg, † 1816, schr. üb. Farbepfl. (Krell'sche Annal. s. 1784). — *Voglera* Fl. Wett.
- Voigt**, F. G. u. F. S., schr. Handwörterb. d. bot. Kunstsprache, Jena 1803, Handb. d. prakt. Bot., Jena 1850. — *Voigtia* Spr.
- Voit**, Dr., Arzt u. Bryolog in Schweinfurt. — *Voitia* Hornsch.
- Volkamer**, schr. Fl. Norimbergensis, 1700. — *Volkameria* P. Br.
- Vriese**, G. H. de, schr. Plantae Preissianae, Amsterd. 1845, Pl. Indiae Batavae Orientalis, Lugd.-Bat. 1857, Goodenoviae 1854, u. a. — *Vriesia* Lindl.
- Wagner**, Herm., schr. Führ. ins Reich d. Kryptogamen, Bielefeld 1852, Malerische Bot., 2 B., Lpz. 1861, Deutsche Flora (nach Bentham's Handb. d. brit. Fl.), 1869, u. a.
- Wahlbg.** = **Wahlenberg**, Prof. in Upsala, Thunberg's Nachf., † 1851, schr. Fl. laponica, 1812, Fl. Carpathorum principal., 1814, Fl. suecica 1831—33, u. a. — *Wahlenbergia* Schrad., Dietr.
- W. K.** = **Waldstein** u. **Kitaibel**, Waldstein-Wartenberg Graf Ad., a. dess. Kosten d. Descr. et Icones plantar. rario. Hungariae (s. *Kitaibel*) herauskamen. — *Waldsteinia* Kit., W.
- Waldner**, schr. Deutsche Farne, m. Berücks. angrenz. Gebiete (12. u. 13. H., Heidelb. 1883).
- Walker-Arnott**, G. A., Pugillus plantar. Indiae Orient., 1836, u. a., s. Arnott. — *Walkera* Schreb., (-ia) Ehret.
- Wall.** = **Wallich**, Nathanael, V.-Präs. d. Linné'schen Ges. z. London, schr. Tent. Fl. Nepalensis ill., Calcutta 1824—26, Pl. asiat. rario., 1830—32. — *Wallichia* Roxb.
- Wallr.** = **Wallroth**, Arzt in Nordhausen, † 1857, schr. Rosae plantar. generis hist. succincta, Nordh. 1828, Fl. Cryptog. German. (in Bluff u. Fingerhuth's Fl. germ., 1831—33), Annus bot., 1815 (in Spengels Fl. v. Halle), Beitr. z. Bot., Lpz. 1842, u. a. — *Wallrothia* Spr., Roth.
- Walpers**, Dozent zu Berlin, † 1863 (Selbstmord), schr. Repert. bot. syst., 1842—48 (später als Annales botanices syst.), Animadv. crit. in Leguminosas Capenses u. a.
- Walter**, Thom., Farmer in Carolina, schr. Fl. Caroliniana, Lond. 1788.
- Walther**, G. F., Prof. in Leipzig, † 1746. — *Waltheria* L., Spr.
- Warner**, Rob., schr. üb. d. Kultur der Orchideen. — *Warneria* Mill.
- Warszewicz**, J. v., poln. Flüchtlings, Reis. f. Van Houtte in Gent s. 1850, † 1866, Insp. d. Bot. Gartens z. Krakau. — *Warszewiczella* Van Houtt.
- Watson**, P. W., engl. Bot., schr. Cybele brit., Lond. 1847—52, Dendrolog. brit., 1825, üb. d. geogr. Verbr. d. Gew. Gr.-Brit. (deutsch v. Beilschmied, Bresl. 1838). — *Watsonia* Mill. — **Watson**, H. C., üb. seltene brit. Pfl., 1835—37.

- Webb**, John, amer. Beerensamml. u. Culturist v. Cranberry (*Oxycoccus macroc.*) in N.-Amer. — *Webbia* DC.
- W. M. = Weber u. Mohr** (erst. Prof. z. Kiel, † 1823), bot. Taschenb., 1807, W., Hist. Musc. hepatic., 1815, Hort. Kiliens., 1822. — *Webera* Hedw., Schreb.
- Weddel**, Hugh Algernon, Reis. in Peru u. Bolivia, schr. Mon. v. Cinchona, Fl. v. Südamer., Alpenfl. d. Cordilleren u. a. — *Weddelia* Tul.
- Wedel**, G. W., schr. Opiologia, Jenae 1674, de Corchoro, Jen. 1695, de Oenanthe Theophrasti, 1710. — *Wedelia* Jacq.
- Weigel**, Prof. in Greifswald, schr. Observ. bot., 1762, Fl. Pomerano-Rugica, 1769. — *Weigela* Thb., (-ia) Pers., Schreb.
- Weihe**, Arzt z. Herford, † 1834, W. N. od. **W. E. = Weihe u. Nees v. Esenbeck**, d. deutsch. Brombeerstr., 1822—27, W., deutsche Grüsser etc., 1823—30. — *Weihea* Spr., Eckl.
- Weinmann**, J. G., Apoth. z. Regensburg, schr. Phytanthozoa-Iconogr., Regensb. 1737—45. — *Weinmannia* L. — **Weinmann**, s. 1823 Gart.-Insp. z. Paulowsk b. Petersb., schr. Elenchus pl. hort. imp. Pawloskii et agri Petropolitani, 1824, Hymeno- et Gasteromycet., etc., 1836.
- Weis**, F. G., schr. Pl. cryptog. Florae Goettingensis, Gott. 1770. — *Weisia* Hedw.
- Weitenweber**, Arzt z. Prag, Red. d. Zeitschr. Lotos. — *Weitenwebera* Kbr.
- Wenderoth**, Prof. z. Marburg, † 1861, schr. Lehrb. d. Bot., 1821, Fl. Hassiaca, 1846, d. Pflanzengart. d. Univ. Marburg, 1850, u. a.
- Wendland**, J. Christoph, Gart.-Insp. zu Herrenhausen b. Hannover, † 1828, W. (u. **Schrader**) Sertum Hannoveran., Hort. Herrenhusanus 1789—1801, Ericarum Icon. et deser., 1793—1823, u. a. — *Wendlandia* W., Bartl. — **Wendland, H. Ludolf**, Sohn u. Nachf., † 1869, W. (u. **Bartling**), Beitr. z. Bot. 1824—25, Index Palmarum, 1854. — **Wendland, Herm.** (d. vorig. Sohn u. Nachf.), **H. Wendl.** (u. O. Drude), Palmae australasicae (Linnaea 1875).
- Westcott**, Freder. (s. Knowles), mit Knowles d. bot. Gart. v. Birmingham, 1723.
- Wibel**, Arzt z. Wertheim in Franken, schr. Primitiae Fl. Werthemensis, 1799. — *Wibelia* Pers., Röhl.
- Wickstroem**, schwed. Bot., schr. Jahresber. üb. d. Fortschritte d. Bot. (deutsch v. Beilschmied), 1820—46, W. och N. J. Anderson. årsberättelse om bot. arbeten etc., Stockh. (Jahrg. 1837—56), Stockholms Flora, 1840. — *Wickstroemia* Schrad., Spr.
- Wiegand** s. Wigand.
- Wieland**, Melch. (Guilandus), Prof. z. Padua, † 1590, schr. De Stirpium aliquot nominibus vetustis epistolae, Basil. 1557, Papyrus, Vened. 1572. — *Guilandina* Juss.
- Wiesner**, J., Prof. in Wien, schr. üb. Chlorophyllbildung, Imbibitionswasser u. s. f., Wien 1875 f.
- Wigand**, Joh., Bischof v. Pommesanien 1540—87. — *Wigandia*, H. B. K. — **Wigand**, Alb., s. 1851 Prof. in Marburg, schr. bot. Unters., d. Baum etc., Braunschweig 1854, Lehrb. d. Pharmakognosie, 2. A., 1872, üb. Darwinismus, Genealog. d. Urzellen, 1872, d. bot. Gart. z. Marb., 2. A., u. a. m.
- Wiggers**, Prof. d. Pharmazie in Göttingen, schr. Handb. d. Pharmakognosie, Götting. 1864. — *Wiggersia*, F. H., schr. Primitiae Fl. Holstacieae, Kiel 1780. — *Wiggersia* Fl. Wett.
- Wight**, R., Dir. d. bot. Gart. z. Madras, schr. Contrib. to the Bot. of India, 1834, Spicilegium Neilgherense, Madras 1846—50, W. u. **Walker-Arnott**, Prod. Fl. Peninsulae Indiae orientalis, Lond. 1834. — *Wightia* Spr.

- W.** od. **Willd.** = **Willdenow.** Prof. z. Berlin, † 1812, hervorrag. Botaniker, schr. Anleit. z. Selbststud. d. Bot. (4. A. v. Dietrich, 1832), Fl. Berolinensis Prodr., 1787, Hort. Berolin., 1816, Caricologia, 1805, Berlin. Baumzucht, Berl. 1811, u. a. — Willdenowia Thb.
- Willemet.** P. R., schr. Herbar. Mauritianum, Lpz. 1796. — Willemetia Neck., Gm., A. Brong.
- Willich,** J. Fr., schr. Scholia in Vergilii opuscula de re hortensi, Basel 1548. — Willichia L., Spr. — **Willich,** Chr. L., schr. Illustrat. bot., Gotting. 1766.
- Willkomm,** Moritz, s. 1873 Prof. in Prag, schr. Führer in's Reich d. deutsch. Pfl., Lpz. 1862, (m. Lange) Prodr. Fl. Hispanicae, Stuttg. 1877, Atlas d. Bot. 1873, u. a.
- Wilson.** W., engl. Bryolog, † 1871, schr. Bryologia brit., 3 A., 1855. — Wilsonia R. Br.
- Wimmer.** Fr., Schulr. u. Gymn.-Dir. z. Breslau, † 1868, schr. (m. Grabowski) Fl. Silesiae 1827—29, Salices europaeae 1866, d. Pflanzenur., 9. A., Bresl. 1868, u. a.
- Winckler,** Ed., sämmtl. Giftgew. Deutschl.'s (96 kol. T.), Berl. 1832, Handb. d. pharmaz. Bot., Lpz. 1846. — **Winckler,** Emil, Gesch. d. Bot., Frankf. a. M. 1854.
- Wirtgen.** Rector u. bed. Bot. z. Coblenz, † 1870, schr. Fl. d. Reg.-Bez. Coblenz, 1841, Leitf. f. d. Unterr., 2. A., 1846, Fl. d. preuss. Rheinprov. 1857, Fl. d. preuss. Rheinlande 1870, u. a. — Galium Wirtgenii Schultz.
- Withering,** Arzt z. Birmingham, † 1799, schr. a bot. arrangement of t. veget. in Gr.-Britain, 5. A., 1812. — Witheringia l'Hér., Schreb.
- Wittmack,** Prof. in Berl., schr. Musa Ensete, Beitr. z. Kenntn. d. Bananen, Halle 1867, mit Perring Herausg. d. Gart.-Zeitung. s. 18-2, schr. üb. vergl. Kulturen m. nord. Getreide (Landw. Jahrb. 1876), üb. eine neue Ölsaat 1877, üb. Carica Papaya (Sitz-Ber. d. Bot. Ges., Berl. 1878), u. a. m.
- Wtst.** = **Wittstein,** schr. Etymolog. Handwörterb. d. Pflanzenk., Ansbach 1852, 2. A. Erlangen 1856.
- Wolf,** Casp. Fr., Prof. d. Akad. z. St. Petersb., schr. Theoria generationis u. Nov. comment. acad. Petropolit., † 1794. — Wolfia Spr.
- Woods.** Jos., schr. Bemerk. üb. d. europ. Gräser (in Linn. Transactions, 1838), u. a. — Woodsia R. Br., Spr.
- Woronin,** M., russ. Bot., schr. üb. Synchitrium, üb. d. Bau des Stamms v. Calycaanthus (Bot. Zeit.), u. a. — Worouinia Cornu.
- Wrangel,** F. A., schwed. Bot., schr. Abh. üb. Cardamine parviflora L., Stockh. 1823. — Wrangelia Ag.
- Wredow,** schr. Ökon.-techn. Flora Mecklenburgs, Lüneburg 1811, d. Gartefreund (5. A. v. C. Helm, Berl. 1837). — Wredowia Eckl.
- Wright,** Will., schott. Arzt u. Bot., schr. A bot. account of t. Quassia Simaruba, Edinb. 1778. — Wrightia R. Br.
- O. W.** = **Wünsche.** Dr. O., Oberlehr. am Gymn. z. Zwickau, schr. Schulflora v. Deutschl., Lpz. 1877, Excurs.-Fl. d. Königr. Sachsen, Lpz. 1869, Neubearb. v. Schmidlin's Anl. z. Bot., 3. A., 1882.
- Wulfen,** Francis Xaver de, Jesuit u. Prof. z. Klagenfurt, † 1805, schr. Cryptog. aquat. 1803, Pl. rar. descr. 1805. — Wulfenia L., Jacq.
- Wulff,** Joh. C., schr. Fl. borussica. — Wulfia DC.
- Wydler,** H. in Bern, De Candolle's Conservator, schr. üb. Blüten-Autholysen, Regensb. 1859, üb. dichasiale u. sympodialre Verzweig. vegetat. Achsen (Flora, 1876), u. a. — Wydleria DC., Lindl.
- Ximenes,** Jos., span. Apoth. — Ximenesia Cavend. — **Ximenes (-nez),** Franz, span. Mönch, schr. üb. mediz. Pfl. od. Quattro libro... que Fr.

Hernandez etc., Mex. 1605 (später Fr. Hernandez, Opera quum edita
tum inedita etc., Madr. 1790). — Ximenia Schreb.

Young, Edw., sebr. treatise on Opium, Lond. 1753, Farne von Wales.
— **Young**, Arth., landw. Autor, † 1820, schr. Travels during 1787—89.
Youngia Meyen, Cass.

- Zalheimb**, J., schr. de Saccharo deque viribus ejus atq. usu, 1772.
Zaluzanski, Adam, böhm. Bot. d. 16. Jahrh.'s, dess. Pfl.-Syst. in Zalu-
zanii Methodi herbariae libri tres, 1598 u. 1604. — Zaluzanskia Neck.,
Zaluzania Pers.
Zanardini, Giov., Mitgl. d. Instit. z. Venedig, schr. Synops. Algarum
etc., 1841, Iconogr. phycolog. adriat. et mediterranea 1862—76, u. a.
— Zanardinia Zanard.
Zannichelli, schr. istoria delle piante che nascono ne' lidi intorno a
Venezia, Vened. 1735. — Zannichellia L.
Zanoni, G., schr. istoria botanica, Bologna 1675, Rarior. stirpium hist.
ed. C. Montius, Bonon. 1742. — Zanonia L.
Zenker, Prof. in Jena, † 1837, schr. Fl. v. Thüringen 1836—48, merkan-
tile Warenk. 1831—35, u. a.
Zeyher, bad. Geh.-Rat u. Dir. d. Schwetzing. Gart.'s, † 1843, s. Ecklon.
— Zeyhera Spr., (-ia) Mart.
Zimmermann, F. J. v., schr. Grundr. d. Phytologie, Wien 1831.
Zinn, J. G., Prof. in Götting., schr. Catal. pl. Horti acad., Gött. 1757,
Observ. bot., Gött. 1753. — Zinnia L.
Ziz, J. B., Hess. Darmst. Med.-R. z. Mainz, † 1829. — **K. Z.** = Koch
u. **Ziz**, Samml. d. rhein. Flora s. Koch. — Zizia Koch.
Zobel, Prof. d. Forstsch. z. Weisswasser in Böhmen, † 1865, Bearb.
v. Corda's Icon. fungorum, Prag 1854.
Zoega, J., schr. Fl. islandica. — Zoaea L.
Zollikofer, schweiz. Bot., schr. Alpen-Flora, St. Gallen 1828. — Zolli-
kofera DC.
Zorn, B., schr. Botanologia medicin. od. Anweisung u. s. w., Berl.
1714. — Zornia Gm.
Zuccagni, Attil., Gart.-Insp. z. Florenz, schr. Synops. pl. Horti Floren-
tini, Florenz 1793. — Zuccagnia Thb., Red., Pers.
Zucc. = **Zuccarini**, Prof. z. München, † 1848, schr. Fl. d. Umgeg. v.
München, 1829, Naturg. d. Pflanzenr.'s, 1:43, Mitarb. v. Siebold's
Fl. japonica. — Zuccarinia Blum., Spr.
Zuchold, E. A., schr. Additamenta ad Pritzelii Thesaurum etc., 2 Fasc.
1852 u. 66.
Zwackh, W. v., schr. Enum. Lichenum Fl. Heidelbergensis 1862. —
Zwackhia Kbr.
Zwinger (Zvinger), schr. Theatrum botanicum d. i. vollk. Kreuterbuch
etc., Basel 1696. — Zwingera Schreb.

b. Geographische Botanik oder die Autoren und botan. Werke nach den Ländern alphabetisch zusammengestellt.¹⁾

I. Europa.

- a) **Im Allgemeinen:** Batsch, Fries, Hepp, Nyman, Poiret, Risso (Süd-E.), Römer, J. J., Schimper, Wimmer.
- b) **Deutschland:** Abel u. Reiter, Albertini etc. (Lausitz), Alefeld, Aschersson, F. A. (Brandenburg), Barkhausen (Lippe), Bartsch (Schles.), Bayrhoffer (Taunus), Becker I (Plauen), Becker II (Mecklenb.), Berthold (Westf.), Besler (Bayern), Bischoff, Blandow (Meckl.), Bluff etc., Bönninghausen (Westf.), Böhmer (Sachs.), Boll (Meckl.), Bossler (Els.-Lothr.), Caflisch (Südostdt.), Detharding (Meckl.), Dierbach (Heidelb.), Dietrich, A. (Preuss.), Dietrich, D. N. F., Dillen (Giesen), Döll (Baden), Dosch u. Scriba (Gr. Hess.), Ehrenberg (Berl.), Elsner (Schles.), Endlicher (Pos.), Fabricius (Gr. Hessen), Ficinus (Dresden), Fiek (Schlesien), Fingerhuth (Eiff.), Flörke, Fl. Wett. (Hessen), Flotow (Schlesien, Brandenburg, Pommern), Fuckel (Nassau), Fürnrohr (Regensburg), Funk, Garecke, Gmelin, F. Ch. (Baden), Göppert (Schles.), Grabowski u. Günther (Schlesien), Hagen (Pr.), Hallier-Koch, Hayne (Pr.), Hampe (Harz), Heller (Würzb.), Hepp (dsgl.), Hoffmann I u. II, Hoppe, Höfle (Bodens.), Hübener, Jessen, Jung (Nass.), Jungermann (Giess.), Kabath (Schles.), Karsch (Westf.), Kirschleger (Els.), Kittel, Koch, Körber, König, K. (Pfalz), Krempelhuber (Bayern), Krocker (Schles.), Kützing, Kunth (Berl.), Kunze, Lachmann (Braunschweig), Lambert (Brandenb.), Langenthal (Nordd.), Leers (Nassau), Leysser (Halle), Lösel (Pr.), Lummitzer (Pos.), G. Meyer (Hannov.), A. Meyer (Oldenb.), Milde, Mönch (Hess.), H. Müller (Westf.), J. B. Müller (Waldeck), Murray, Necker (Mannh.), Nees u. Weihe, Nolte (Holst.), v. Otto (Sachs.), Patze etc. (Pr.), Pollich (Pfalz), Planer (Erfurt), Rabenhorst (Laus.), Ratzeburg, Rebentisch (Neumark), Regel (Bonn), Röhling, Römer, F. A., Röper (Meckl.), Rostkovius (Stett.), Roth, Rupp (Jena), Schäffer (Bay.), Schenk (Würzb.), Schkuhr, Schlechtental (Halle etc.), Schmidt u. Kunze, Schmitz u. Regel (Bonn), Schneider (Laus., Magdeb.), Schnittspahn (Hess.), Schnizlein (Bay.), Schrader (Hannov.), Schrank (Bay. etc.), Schreber (Leipz.), Schübeler u. Martens (Württ.), Schultes (Bay.), Schultz (Stargard), Schultz, F. (Pfalz), Schummel (Schles.), Schwabe (Anh.), Schweykert (Carlsru.), Sendtner (Südbay.), Seubert (Südd.), Sonder (Hamb.), Sporleder (Harz), Spenner (Freiburg), Sprengels (Halle), Sturm, Suckow (Mannh.), Thomé, Timm (Meckl.), Tode (dsgl.), Uechtritz (Schles.), Valentini (Hess.), Vater (Wittenb.), Volckamer (Nürnb.), H. Wagner, Wallroth, Weber (Kiel), Weigel (Pomm.-Rüg.), Weihe u. Nees, Weis (Gött.), Wenderoth (Hess.), Wendland (Hann.), Wessel (Ostfriesl.), Wibel (Wertheim), Wiggers (Holst.), Willdenow (Berl.), Wimmer etc. (Schles.), Wirtgen (Rh.-Pr.), Wünsche (Sachs.), Wredow (Meckl.), Wulf (Pr.), Zenker (Thür.), Zeyher (Schwetzingen), Zinn (Gött.), Ziz (Rheinl.), Zuccarini (Münch.), Zwackh (Heidelb.).
- c) **Österreich-Ungarn:** Andrä (Banat, Siebenb.), Baumgarten (Siebenb.), Besser (Galiz.), Crantz, Dolliner (Nied.-Östr.), (Ettinghausen (Tyr.), Herbich (Bukow.), Heussler (Tyrol), Host, Jacquin, Kalchbrenner

1) Das Nähere s. in dem Autorenverzeichnis.

D. V.

- (Ung.), Kauitz (Donaul.), Kitaibel (Ung.), Knapp (dschl.), Kosteletzky (Böhml.), Maly (Steierm.), Menyharth (Ung.), Neilreich (Croat.), Ott (Böhml.), Pohl (dschl.), Pokorny, Presl. (Böhml.), Rochel (Banat), Sadler (Ung.), Schultes, Schulzer v. Müggenburg (Ung.), Kauitz u. Knapp (Slavon.), Scopoli (Kärnth. etc.), Tausche (Böhml.), Thomé, Tommassini (Istr.), Trattinick, Visiani (Dalm.), Wahlenberg (Karpath.), Waldstein (Ung.).
- d) **Schweiz:** Andreä, d'Angreville (Wallis), Chavannes, Christener, De Candolle, Ducommun, Gaudin, Godet, Greml, Haller, Heer, Hegetschweiler, Höfle (Bodens.), Koch-Hallier, Milde, Nägeli u. Schwendener, Schärer, Scheuchzer, Schleicher, Secretan, Suter, Thomas I u. II, Thomé, Vicat, Vogel, Zoilikofer.
- e) **Niederlande u. Belgien:** Boerhave (Nied.), Crepin (Belg.), Dumortier (Belg.), Hannon (dschl.), Kickx (Fland.), Lejeune (Belg.), Lestiboudois (dschl.), Libert (do.), Morren (do.), Westendorp (do.).
- f) **Dänemark:** Heiberg, Holmskiold, Hornemann, Lyngbye, O. F. Müller, Oeder, Rostrup, Schumacher.
- g) **Skandinavien mit Lappland:** Acharius, Agardh, Blytt (Norw.), Dübén u. Ihrmann (Schwed.), Fries I u. II, Gunner (Norw.), Hartmann (Schwed.), Liljeblad (dschl.), Lindblad (do.), Nylander, Retzius, Swartz, Thedenius (Schwed.), Wahlenberg (Lappl.), Wahlberg (Gothenb.).
- h) **Grossbritannien:** Aiton, Babington (norm. Ins.), Bentham, Berkeley, Bolton, Curtis, Dickson, Dillen, Dillwyn, Don, Engl. Botany, Edwards (bot. Regist.), Endlicher (Norfolk), Francis, Goodenough, Grew, Greville (Schottl.), Hassall, Hill, Hooker u. Taylor, Howe (Derbysh.), Hudson, Knapp, Lightfoot (Schottl.), Lindley, Lindsay, Loudon, Lowe, Newman, Parnell (Schottl. etc.), Pratt, Ray (Rajus), Relham (Cambridge), Smith, W., Smith, J. E., Sowerby, Stackhouse, Symons (brit. Ins.), Threlkeld (Irl.), Turner, Watson, Wilson, Withering.
- i) **Frankreich:** Balbis, Barrelier, Bastard, Boreau, Bosc, Bulliard, Castagne, Chaix, Cosson u. Germain, de Candolle u. Duby, Delarbre, Desmazieres, Desvaux, Duhamel, Dujardin, Durieu, Garidel, Gaultier, Godet, Godron u. Grenier, Gouan, Guépin, Jaune St. Hilaire, Lamarck, Lapeyrouse (Pyren.), Lecoq, Lelieur, Leroy, Lessson, Loiseleur, Merat, Nylander (Gall. u. Algerien), Poiteau (Par.), Ramond (Pyren.), Soulavie (Südfr.), Soyer-Willemet, Suard, Thuilier (Par.), Tournefort, Vaillant, Ventenat (Malmaison), Vigneux (Par.), Villars (Dauph., Strasb.).
- k) **Spanien u. Portugal:** Asso, Barrelier, Bernal (Aragon.), Cambeses (Balear.), Colmeiro, Figueiredo (Port.), Hoffmannsegge u. Link (Port.), Lagasca, Lapeyrouse (Pyren.), Loefling, Ramond (Pyren.), Solms-Laubach (Algarvien), Webb, Willkomm u. Lange.
- l) **Italien:** Allioni (Piem.), Balbis (Turin), Barrelier, Battarra (Rimini), Bellardi (Piem.), Beltramini (Bassano), Bernardi (Sicil.), Bertoloni, Bivona-Bernardi (Sic.), Boccone (Sic. u. Malta), Brignoli (Modena), Cesati, Cupani, Donati (Venet.), Gasparrino (Palermo), Gennari (Ligur.), Gussone (Sic.), Meneghini (Eugan. etc.), Micheli (Florenz), Monti (Bologna), Moretti, Nocca (Tessino), de Notaris, Parlatore (Sic. etc.), Passerini (Ob.-It.), Presl (Sic.), Ré (Segus., Turin), Savi (Etrur.), Scopoli (Insubr.), Tenore (Neap.), Todaro (Palerm.), Trevisan (Venet.), Turra, Viviani, Zannichelli (Vened.), Zanardini (adr. u. Mittelm.), Zuccagni (Florenz).
- m) **Türkei, Griechenland u. s. f. (Balkanhalbinsel):** Ascherson u. Kauitz (Bosn., Serb. etc.), Bory de St. Vincent (Pelop., Cyklad.), Bux-

baum (Constantinop.), Dumont d'Urville (Archipel etc.), Kanitz (Bulg.), Olivier (Türk.), Sibthorp (Griech.).

- n) **Russland u. Kaukasusländer:** Adams (Sibir., Kauk.), Marschal von Bieberstein (Südr., Kauk.), Fischer, F. E. L. (Petersb.), Fischer v. Waldheim (Mosk.), Gilibert (Litth.), Gmelin, S. G. (Russl., Krim), Grindel (Ostseepr.), Kalm (Finnl.), Karsten (desgl.), Küllwein, Laxmann, Ledebour, Liboschitz (Petersb., Mosk.), C. A. Meyer (Kaukasus etc.), Pallas, Rostafinski (Polen), Stephan (Mosk.), Steven (Krim), Weinmann (St. Petersb.).

II. Asien und indischer Ocean.

- a) **Orient (Levante) und Arabien:** Alpinus (Orient), Anderson (Aden), Billardier (Syr.), Boissier (Pers.), Botta (Yemen), Buhse (Armenien), Endlicher u. Fenzl (Kabul), Fenzl (Syr., Taurus), Forskål (Arab. etc.), Griffith, Grounovius (Orient), Labillardier s. Billardier, Olivier (Pers.), Shaw (Levante), Schubert (Arab. etc.), Tournefort (Levante), Trautvetter, E. R. v. (Armen., Kauk.).
- b) **Sibirien, Nordost- u. Centralasien:** Adams (Sib.), Bongard u. C. A. Meyer, Bunge (Altai), Glehn, A. v. Humboldt, Ledebour (Altai), Maximowicz (Amur), Regel (Turkest.), Ruprecht, Schmidt, F. (Amur), Trautvetter, E. G. (Nordsib.), Turczaninow (Baikal, Daurien).
- c) **Ostindien u. Sundainseln:** Anderson (Ceyl.), Arnott-Walker, Beccari (Malayen-Archipel), Bennett (Java), Blume (dschl.), Bosch (dschl.), Burmann, Colebrooke, Commelyn, Choisy (Java), Dou D. (Nepal), Dozy (ind. Archipel), Dumont d'Urville (Ost. Archip.), Graham (Bombay), Hasscarl (Java), Hermann (dschl.), Hooker, J. D. (Himalaya), Hooker u. Thomson (Ind.), Horsfield (Java), Houston (Südasiyen), Humboldt (Mitt.- u. Südias.), Jack (Sumatra), König, J. G. (Ostind.), Kops (Java), Kurz (Birma), Leschenault (Südas.), Miquel (Sundains. etc.), Moritzi (Java), Museum Zeylanicum (Ceyl.), Nees, Walker-Arnott u. de Candolle (Ostind.), Reinwardt (ind. Archip.), Rheede (Ostind.), Roxburgh (dschl.), Royle, Scheffer (Java), Sonnerat (Ostind.), Steetz (Südas.), Sweet (dschl.), Thwaites (Ceyl.), Valentini M. B. (Ind.), de Vries (Ostind., Java), Wallich (Nepal etc.), Wendland jr. (Südas.), Wight (Ind.), Zollinger (ind. Archip.).
- d) **Ostasien mit Philippinen und Molukken:** Bentham (Hongkong), Blanco (Phil.), Bretschneider (China), Dozy (Japan), Fortune (China, Japan), Hance (Hongkong), Kaempfer (Japan), Lehmann (Ostas.), Loureiro (Cochinchina), Maximowicz (Amurl.), Miquel (Japan etc.), Noronha (Phil.), Regel (Ussuri), Rumpf (Rumphius) (Mol.), Schmidt, F. (Amur), v. Siebold u. Zuccarini (Jap.), Sonnerat (China etc.), Suringar (Jap.), Thunberg (dschl.), Zuccarini s. v. Siebold.
- e) **Indischer Ocean:** Balfour f. (Rodriguez), Bojer (Mauritius), Commerçon, Baker (Maurit. u. Seychellen), Duncan (Maurit.), Reichardt (Ins. St. Paul).

III. Afrika nebst Inseln:

Afzelius (Sierra Leone), Alpin (Ägypt. etc.), Bergius (Cap), Burmann (Cap), Burmann f., Delile (Ägypt.), Durieu (Algerien), Ecklon u. Zeyher (Cap), Forskål (Ägypt. etc.), Fourcroy (dschl.), Fresenius (Ägypten u. Abyssinien), Hiern (trop. Afr.), Hooker, W. J. (Niger), Kirk (Südafrika), Kolbe (Cap), Kotschy (Ägypten), Nylander (Algier), Oliver (trop. Afr.), Olivier (Ägypt.), Palisot de Beauvais (Oware u. Benin), Pappe (Cap), Petit-Thouars, Poiret (Berberei), Schmidt, J. A. (Capoverde), Schousboe (Marokko), Schrader (Cap),

Schubert (Ägypt. etc.), Schweinfurth (nub. Küste), Sonnerat (Guinea), Thunberg (Cap), Vesling (Ägypt.), Willemet (Marokko). — **Afrik. Inseln:** Baker (Seychellen), v. Buch (canar. Ins.), Carmichael (Tristan d'Acunha), Commerson (Madagaskar), Desfontaines (atl. Ozean), Lowe (Madeira), Lugo (Teneriffa), Petit-Thouars (afr. Ins.), Schmidt, J. A. (capoverd. Ins.), Seubert (Azoren).

IV. Amerika.

- a) **Südamerika:** Aublet (Guiana), Bancroft (dsgl.), Berg, O. (Bras.), Bonpland, Bosc, Colla (Chili), Feuillée (Peru, Chili), Fl. Peruviana v. Ruiz u. Pavon (do.), Gay Cl. (Chili), Gillies (do.), A. de St. Hilaire (Bras.), Hieronymus (Patagon.), Humboldt, Karsten, Leschenault, Lund (Bras.), Maregrav (do.), Martius (do.), Michaux, Miers (Bras., Chili), Mikan (Bras.), Molina (Chili), Montagne (Bolivia, Guiana), Pöppig u. Endlicher (Chili), Pohl (Bras.), Raddi (do.), Ruiz u. Pavon (Peru, Chili), Schöpf, Schomburgk (Guiana), Spring (Bras.), Ulloa, Vandelli (Bras.), Wagener (Venezuela).
- b) **Westindien u. Mittelamerika incl. Mexiko:** Amson, Bateman (Guatemala, Mex.), Bonpland, P. Browne (Jamaika), Desfontaines (atl. Ins.), Desportes (St. Domingo), Grisebach (Westind.), Hamilton (do.), Hartweg (Mex.), La Llave u. Lexarza (do.), Liebmann (do.), Humboldt, Bonpland u. Kunth (Mex., etc.), Plumier (Westind.), Sloane (Jamaika), Swartz (Westind.), Tussac (Antillen).
- c) **Nordamerika:** Amson, Arthur (Jowa), Barton (Virgin.), M. v. Bieberstein, Bigelow (Boston), Bosc, Catesby (Carolina), Clayton (Virg.), Desfontaines (atl. Ins.), Elliott (Carol.), Engelmann (Union), Asa Gray (Texas, Neu-Mex.), Gronovius (Virg.), Hampe, Harvey, Marshall, Medicus, Michaux, Mühlenberg, Nuttall, Pursh, Rafinesque, Richard, Robin u. Rafinesque (Louis.), Schöpf, Sullivant, Torrey u. Gray, Tuckermann, Ulloa, Walter (Carol.), Webb.

V. Australien und Südsee:

- R. Brown (Neuholl.), Dieffenbach (Neuseel.), Forster (Australoz.), Gris mit Brongniart (Neucaled.), Hombron u. Jacquinot (Südsee-Ins.), Hooker, J. D. (Neuseel.), Kny (Australozean), Labillardier (Neuh. u. Neual.), Leschenault (Neuh.), Lindsay (Neuseel.), F. v. Müller (Austr. u. Papualand), Seemann (Fidschi-Ins.), Sonder (trop. Austr.).

c. Spezialbotanik oder botanische Monographien, Dissertationen und andere Spezialschriften nach dem Inhalt alphabetisch geordnet.¹⁾

Acanthaceae, Ceylon-, Anderson.	Aeoniti generis Monogr., Reichenbach.
Acanthion u. Acanthus terms, Yates.	Aconito, de - observ., Koelle.
Acerum Revisio, Spach.	Aeonitum, Seringe.
Achilleis, de -, Meckel u. Willdenow (1789).	Aeonitum, Esquisse d'une Monogr. du genre - (sans nom).
Achlya prolifera, Pringsheim.	

1) Das Nähere siehe in dem Autorenverzeichnis.

- Actinea**, Jussieu.
Adventivknospen, Magnus u. A. Braun.
Aegagropila Sauteri, Lorenz.
Agaricorum Monogr., Persoon, — (nach d. Lamellen geordn.), Otto, J. G. (1816).
Agave americana, Vogel, — (notes on -), Engelmann, G. (St. Louis 1875).
Agave et Fourcroya, Zuccarini.
Agaven-Studien, Koch, K.
Agrikulturpflanzen, Ernährung der -, Walz.
Agrostographiae fundamentum, Trinius.
Agrostographie du Nord de la France, Desmazières.
Agrostogr., essai de nouv. -, Palisot-Beauvais.
Agrostographia Helvet., Scheuchzer.
Agrostologie helvet., Gaudin.
Akazie, Cultur der -, J. G. Hess.
Algae britann., Grew.
Algae brit., fresh-water -, Hassall, — Cooke, M. C. (Lond., 130 kol. T.).
Algae japonicae, Suringar.
Algae ochotenses, Ruprecht.
Algarum species, Kützing (Lips. 1849).
Algarum Sueciae Dispos., Agardh.
Algarum Synopsis, Zanardini.
Algarum unicellarum g. n., A. Braun.
Alge, eine neue parasitische, J. Kühn (Halle 1879).
Algen, über einzellige -, Nägeli, — Neill, (Befr., Vermehr. etc. vieles) Pringsheim.
Algen Deutschlands, Rabenhorst (Kryptog.-Flora, Lpz. 1844—53).
Algen v. Deutschland, Römer, F. A.
Algen, die - des süßen Wassers, Nees sr. (Hamb. 1814).
Algen, die - in Plantae Eckloniae, Rudolphi.
Algen, die - des trop. Australiens, Sonder.
Algen, mikroskopische -, Cohn, F. (viele Schriften).
Algenflora v. Württemberg, Kirchner, O. (1880).
Algenkunde, Beitr. zur -, v. Suhr.
Algensysteme, neuere -, Nägeli.
- Algentyphen** der Flechtengonidien, Schwendener.
Algue italiche e dalmatiche, Meneghini.
Algologia adriatica, Naccari.
Algologiam etc. (Contribuciones ad -) Reinsch (1875).
Algologische Mittheilungen, A. Schenk (1857).
Algues, Brébisson, — (Physiol. des -) Derbès u. Solier.
Allii species, Treviranus.
Aloë, amerikanische -, Major (Schlesw. 1668).
Aloës et Mesembryanthemi Mon., Salm-Dyck.
Aloidarium, Munting.
Aloide, de -, de Bergen.
Alpenflora, Atlas der -, Hartinger Ant. (Wien, I—XXVII).
Alpenflora des Libanon, Kotschy.
Alsodeiarum Ill. et Descr., Oudemans.
Amarantorum Hist., Willdenow.
Amaryllideen, Herbert.
Ammoniacum et Asa foetida, Borszczow.
Amazonenpalmen, Spruce.
Anabasearum Revisio, Bunge.
Anacardiées, Payer.
Ananascultur, Gontois.
Anaphytose (Pflanz.-Verjüngung), Schultz, C. H. (Berl. 1843).
Anatomie d. Pfl. (gekr. Preisschr.) Rudolphi, — Grundzüge der -, Kieser.
Anatomy of plants, Grew.
Anatomie u. Physiologie d. Pfl., Schacht, — Unger (1855).
Andropogonearum Mon. (Anthistirieae), Andersson.
Anemonearum Revisio, Pritzel.
Anémones, s. q. nouv. esp. des -, Jussieu.
Angio- u. Gymnospermen, Strasburger.
Amonacées, Dunal.
Antholysi, de -, Engelmann, G. (Francof. 1832).
Anthospermeae, Cruse.
Antirrhineae (Mon.), Chavannes.
Antrocephalus (Lebermoos), Lehmann.
Araceen (Monogr.), Engler.
Armeriae, de gen. -, Ebel, W. (Königsb. 1840).

- Aroideen**, Schott, — Petri, Fr. (Berol. 1863).
Arbres et arbrisseaux, Desfontaines.
Arbres fruitiers, Petit-Thouars.
Arboriculture fruitière, Pynaert.
Arnieae vires, Collin.
Artemisia glomerata, Batka.
Artemisiarum Mon., de Besser.
Artemisiis, de -, Stechmann.
Artischoke. Brückmann.
Arzneimittellehre (Lehrb.); Buchheim, R. (Lpz. 1859), — (Grundzüge der -), Binz (3. A., 1879).
Arzneygewächse, Hayne.
Arzneikräuter-Wiss. (2. A., 1770), Schäffer.
Arzney- u. techn.-wicht. Pfl. geschl., Berg, O. (Berlin 1845).
Asa foetida et *Ammoniacum*, Borszczow.
Asaro, de -, Scheffler.
Ascomyceten, Bauke (1877).
Asperifoliae nuciferae, Lehmann.
Astragalorum Spec., Pallas.
Astrantia (Mon.), Stur.
Atropa Belladonna, Thunberg u. Lindbohm.
Aufastung, wirthsch. Bedeut. der -, Uhlig, C. (Dresden 1875).
Aurikel, Gesch. der -, Kerner.
Avellana Mexic., Spies u. Brückmann.
Azolla, Strasburger.
Azolla nilotica, Decaisne u. Mettenius.
Azollen, Beitr. z. Kenntn. der -, Meyen.
- Balanophoren**, zur Kenntn. der -, Göppert.
Balanophorae javanicae, Junghuhn.
Balanophoreae, O. Beccari.
Balsaminearum, de floribus etc. -, Rooper (1830).
Balsamum de Mecca, Nicolai.
Bambuseae, Ruprecht (1839).
Bastardbefruchtung, Wichura, — F. v. Gärtner.
Bastarderzeugung, Wiegmann, — F. v. Gärtner (1849).
Batis maritima L., Torrey.
Batrachinm. Rossmann.
Baunfarne, Wagener.
Baumpflanzung in d. Städten, Fintelmann, L. (Bresl. 1877).
- Baumschnitt** (Darstellung), Lucas (1879).
Baumschule, die -, H. Jäger (1868).
Baumzucht, Harbke'sche wilde -, du Roi (1795—1800), neu v. Pott (1874).
Bäume Mecklenburgs, Becker, H. Fr.
Bäume, unsere - und Sträucher, B. Plüss (1884).
Beaufortia et **Regelia**, Schauer.
Bereenobst d. Gärten, Maurer (1867).
Befruchtung etc., Treviranus (1844).
Befruchtungslehre, Corda.
Befruchtungsorgane, v. Gärtner.
Befruchtungstheorie, Hartig.
Befruchtung durch Insekten, Sprengel, — H. Müller.
Begoniaceen, Klotzsch.
Begoniacées, Mem. sur la fam. d. -, de Candolle, A.
Bepflanzung d. Strassen etc., Jablanzky (Wien 1879).
Betulacearum Mon., Regel.
Bicornes, Klotzsch.
Bienenflora, Alefeld (1863).
Bignoniacae surinam., Splitgerber,
Biologie, allgem., d. Pfl., Agardh, C. A. (1832), — (Beitr. z.), Cohn, F. (Br. 1875—85).
Birkenfamilie in Italien, Schouw.
Birnen-Classification, Jahn.
Blattpflanzen, Dippel.
Blattstellung (Wechsel etc.), Schwendener (1879—83).
Blätterschwämme (Eintheil.), Tode.
Blaugummibaum, v. Hamen (1876).
Blumengärtner, praktischer (4. A.), Gruner, — Förster, C. F.
Blumengärtnerei, Bosse.
Blumenstudien, Reichel.
Blumenzucht in ihr. ganzen Umfang, Bouché.
Blumenzwiebelgärtner, Neuen-Blütenantholyse, Wydler. [hahn.
Bohnen (Garten-), Martens.
Boletus suaveoleus, Enslin.
Boopis et *Acicarpha*, Jussieu.
Borbonia, Thunberg u. v. Hartmann.
Boswellia-Arten (Entd.), Carter.
Boswellia, Colebrooke.
Botrychiorum Mon., Milde, J. (Vindob. 1869).
Botrydium, ein neues -, Kützing.
Bouvardia, Schlechtendal.
Brandpilze. Rostrup, — de Bary (Berl. 1853).

- Brand-**, Rost- und Mehlthaupilze
um Wien, Voss, W. (1876).
- Braya**, Sternberg u. Hoppe.
- Briología italiana**, de Notaris.
- Brombeersträucher**, deutsche -, Weihe u. Nees v. Esenb.
- Mecklenburgs, Betcke.
- Brotbaum**, ostind. -, Panzer.
- Brunia**, Thunberg u. Nyblaeus.
- Bryologia Algarviae**, Solms-Lau-
bach, Gr. v.
- britannica, Wilson.
- europaea, Bruch u. Schimper.
- germanica, Nees, Hornschuch
u. Sturm (Nürnberg. 1823—31).
- mosquensis (Florula), Fischer
v. Waldheim.
- silesiaca, Milde, J. (Lpz. 1869).
- universalis, Bridel-Bridieri.
- Bryologie**, skandinavische -, Berg-
gren.
- Bryologische** Notizen aus d. Rhön,
Geheeß (1870—71).
- Bryoniae albae**, de radice -, Schwäg-
richen und Trautmann.
- Bryophyllum calycinum**, Berge, H.
(1876).
- Butyrospermum**, Kotschy.
- Büttneracées**, J. Gay.
- Büttneriearum** in Nova-Hollandia
Mon., Steetz.
- Buxbaumia** (Blasia, Jungermannia),
de -, Schmidel.
- Byssorum et Fungorum** Ill., Cherler.
- Cacao** u. Chokolade, Mitscherlich.
- Cacteae** in horto Dyckensi, Salm-
Dyck.
- Cactearnum** Enumeratio, Pfeiffer.
- Cactearum** Genera, Miquel.
- Cacteen**, Anatomie der -, Harting,
— Schleiden.
- Bearb. der -, Scheidweiler.
- Cactées** et Berbérinées (Organogénie), Payer.
- Café**, du -, Chevallier (1862).
- Caffe**, de - (chocolatae, herbae thee
ac nicotianae natura), Meisner,
1721.
- Cainea** (Chiococca), Langsdorff.
- Calamites**, Ettinghausen.
- Calendula officinalis**, Geiger.
- Calligoneae arabo-caspiae**, Bors-
zczow.
- Calothamnus**, Schauer.
- Calycanthus**, Stammbildung des -,
Woronin.
- Cambium** u. Dickenwachsth., Schu-
mann, C. (1873).
- Camellia et Thea**, Synops., See-
mann (1859).
- Camelliæ**, üb. -, Berlièze (Berlin
1838).
- Camphrier**, sur le -, Vries.
- Cannie à sucre**, Payen.
- Cantua**, Jussieu.
- Caoutschouk** u. Sassafrasille, Royle.
- Capparideæ**, Calycereæ etc., Wal-
pers.
- Capsici**, Mon. gen. -, Fingerhuth
(1832).
- Cardamine parviflora**, Wrangel.
- Carica Papaya**, Wittmack.
- Caricologia**, Willdenow.
- Caricologia germanica**, Hoppe.
- Caricologiae Symbolæ**, Drejer (Lips.
1844).
- Caricum distigmat**, Synopsis, Fries.
- Carex** Hist. d. - Schkuhr, de la
Carnivorous plants, Beal. [Vigne.
- Carpologia**, Gärtner.
- Casses et Sénées**, Colladon.
- Cassia Filipendula**, de Candolle.
- Cassiengruppe** Senna, Batka (Prag
1873).
- Cassiniaeæ**, Schultz-Bipontinus.
- Castanea vesca** s. vulgaris, Hay-
nald, J. L.
- Casuarineen**, Miquel.
- Casuariniæ**, de -, Stache.
- Catalpa**, über -, Bolle, C.
- Catechino**, de -, Zwenger.
- Cedri** mont. Libani etc., Trew.
- Cerastien**, drei -, Stein, B. (1878).
- Ceratophylleæ**, Schleiden.
- Céréales de la Suisse**, Mon., Se-
ringe (Bern 1818).
- Cerealien**, europäische, Metzger.
- Cerealium characteres**, Schübeler.
- Chaerophyllum bulbosum**, Londes,
— nitidum, Ascherson.
- Chamaelaucliae**, Schauer (Vratisl.
1841).
- Chamaerops excelsa**, Gay.
- Champignons**, Palisot, Tulasne, —
(böhm.), v. Leonhardi (1863).
- comestibles, Dufour, — (Hist.
d. com. et vénén.), Roques.
- hypogées, Tulasne, -- (aus
Columbiën etc.), A. Braun (1858).
- Icônes et Classific. d. -, Le-
veillé,

- Champignons**, de la France, Bül- liard.
 — quelq. esp. de l'Amér., Bosc.
Characeen, europ. —, Sydow, — die, Afrikas, A. Braun (1868).
Charen (Befrucht.), de Bary (1871), — (Keimung), de Bary (1875).
Chênes de l'Amérique, Michaux.
 — de l'Amér. tropic., Liebmamn.
 — de France, Bosc.
Chenopodearum Mon., Moquier-Tandon.
China, della arbore —, Turra.
China officinalis, Schwalbe.
Chinabäume, Weddell.
Chinarinde, chem. Unters. der — Cothenius.
Chinin u. Chinarinden, Binz, C. (1880).
Chionyphé, Thienemann.
Chloranthaceen, Miquel.
Chloris protogaea, Unger.
Chlorophyll (Entsteh.), Wiesner, — Böhm, J. A. (1857), — Mikosch, — Haberlandt, — (Untersuch.), Pringsheim (1876—81).
Chlorophylle (Réch. microsc. s. l.), Gris, A. (1857).
Chocolata inda, Norimb. 1644, Colmenerus, A., — Ledesma.
Chocolatae de potu, Linné u. Hoffmann.
Chrysanthemum indicum, Ruprecht.
Cichoriacearum Palatin. Anales, Schultz-Bipontinus.
Cichoreis, de —, Gochnat.
Centa aquatica, Wepfer.
Cieuta virosa, de —, Thomé.
Cienkowskia, Baillon.
Cinchona, Weddell.
Cinchonae Mon. Tent., Rohde, — (Mon. d.Gatt.), Kuntze (Lpz. 1878).
Cirsien der Schweiz, Nägeli.
Cistacearum Conspl. Mon., Spach (1836), — (Organogr.), Spach (1837).
Cistinées, St. Hilaire.
Cladonia, Dufour.
Cladoniis, de —, Floerke.
Claytonia cubensis, Bonpland.
Clusiacées, Baillon, — (Hyperic. etc.), Müller, K. (1882).
Coenogonium Linkii, Schwendener.
Coffea, de —, Georgii, — Abendroth, — Marcus.
Colocasia odora etc. (note s. l.), Brongniart.
Commelinaceae indicae, Hasscarl.
Compositae Australiae, Steetz.
Compositarum Synops., Lessing.
Confervae britann., Dillwyn.
Conferves d'eau douce, Vaucher.
Coniferae, Traité gén., Carrière.
Coniferarum Synops., Endlicher (Sangalli 1847).
Coniferen, Antoine, Fr. (Wien 1840, 54 T.).
Coniferen, Cycadeen etc. (Commentar), Richard.
Coniferen, Hochstetter u. Henckel.
 — Strasburger, — Fam. der —, Courtin (Stuttg. 1858).
 — (geograph. Verbreit.), Beinling (Bresl. 1858).
 — (männl. Blüte), Zeile.
 — (Morphologie), Zuccarini.
 — einige, des ciliischen Taurus, Antoine u. Kotschy.
 — fossile, Goeppert.
Coniferenblätter, Berthold (Bresl. 1875).
Conifères (Pinetum), Gordon.
 — resin., Cult. forest, Gihoul.
Coniferis, de —, v. Tschudi.
 — de — et pice conficienda, Axt.
Corallines, s. les —, Trevisan.
Corchoro, de —, Wedel.
Coton, cult. d. —, Aubry le Comte.
Cranberry (Oxycoccus), Webb.
Crassulacées, de Candolle.
Crataegus et **Mespilus**, Koch, K. (1854).
Crotonis Monogr., Geiseler.
Crueiformium Classis, Crantz.
Cruikshanksia, Miers.
Cryptogamae aquatae, Wulfen.
Cryptogamae britann., Dickson.
Cryptogamae guianenses, Montagne.
 — italicae, Bertolini.
 — Trans-Caucasicae, Nordmann.
 — vasciculares Ligusticae, Genari.
Cryptogamarum botanice, Payer.
 — german. Flora, Wallroth.
Cryptogamia, Schrader.
Cryptolepis, Falconer.
Cucurbitacées, Naudin, — (la vrille d. —), Chatin, A. (1866).
 — nouvelles, Cogniaux, — (s. la constit. de l'androcée etc.), Baillon, L. (1878).

Cuscuteae genus, Engelmann, G.
Cycadearum Monogr., Miquel (Tra-
 jecti 1842).
Cycadeen nymejanske, Samm.
Cycadées, de pl. -, Lehmann.
Cynanchum, Thunberg u. Almer.
Cynarocephalorum Syn., Lessing.
Cynoglosso, de -, Schreck.
Cyperacearum Collectio, Lagger u.
 Reuter.
Cyperaceen, Nees v. Esenbeck
 (Zeichn. dazu, Putterlick).
Cyperacées de Mex., Liebmamn.
Cypero esculento, de -, Preuschen.
Cyperographia synoptica, Kunth.
Cyperus, Fenzl.
Cyrtandraceae, Jack, W.
Czackia, Andrzejczowsky.

Dahlia, sur la cult. de -, Thouin.
Damenbotanik, Boitard, — Reichenbach, A. L., — Lindley, J.
Daphne, Thunberg u. Wickstroem.
Darlingtonia californ., Torrey J.
 (Washingt. 1853).
Dattelpalme, Pollen der -, Fourcroy.
 — (Wachstum), Daubenton.
Dattier, le -, Delchevalerie (Gand,
 1873).
Degenerieren d. Obstsorten, Knight.
Delphiniiis, quibusd. addit. Aconito,
 de -, Reichenbach.
Dendrologie, Aldrovandi, — Koch,
 K.
 — britische, Watson.
 — deutsche, Lauche.
 — Russlands, Regel.
Desmidiacées italiche, de Notaris.
Desmidiearum Syn., Meneghini.
Diagramme der Rhoeadineen,
 Schmitz, Fr. (Halle 1878).
Diatomaceae danicae, Heiberg.
Diatomacearum brit. Syn., Smith,
 W.
 — Synops., Kützing.
 — (Conjug.), Thwaites.
Diatomaceen, Pfitzer, — (Bau u.
 Nat.), Weiss, A. (1871), — pela-
 gische d. Ostsee, Engler (1883).
Dichlamydeae plantae, G. Don.
Dickenwachstum d. Holzkörpers,
 Kny, L. (1882), — d. Stengels,
 Nägeli, C. (1864).
 — u. Cambium, Schumann (1873).
Dionaea (Monogr.), Ellis.

Dionaea muscipula (elektr. Beweg.),
 Munk.
 — (Notice s.l.g.) Dumortier (1837).
 — (some experim.), Balfour f.
Dioscorea batatas, Decaisne.
Diplolaena, Desfontaines.
Dipsacées, Coulter.
Disporum gen., D. Don.
Dracaena, Thunberg u. Dalmann,
 — Berthelot.
Drachenbäume (Wachstum), Wos-
 sidlo, — (im Allgem.), Koch, K.
 (1855).
Draecunculus, de -, Besser, W. S.
Drosera (Tentakeln), Darwin, Fr.
Droseracées, St. Hilaire.
Echites, Thunberg u. Hast.
écorce, l'-, Vesque.
Edgeworthia, Falconer.
Elatinearum Mon., Seubert.
Elektromotor. Wirkung an Pfl.,
 Kunkel.
Embryonen monocotyl. -, Solms-
 Laubach.
Epheu-Luftwurzeln, Schuch.
Epidermis-Funktionen, Desrous-
 seaux.
Epilobium. Mon. d. Gatt., Hauss-
 knecht, C. (Jena 1884).
Equisetaceen, Duval-Fouvre.
 — (Schutzscheide), Pfitzer.
Equiseten (Monogr.), Milde (Dresd.
 1867).
Equisetenzellen, Holzzellen etc.,
 Sanio.
Equisetum, Wickstroem.
Erdäpfel (Abh.), Ludwig, J. A. J.
Erdbeerentreiberei, Gontois.
Erfrieren der Obstbäume, Ober-
 dieck.
Ergot of t. Rye, Quekett.
Eriearum Icones et Descr., Wend-
 land.
Eriocaulacearum Monogr., Kör-
 nicke.
Eriocaulon du Bresil (Mon.), Bon-
 gard.
Ernährung d. Pfl., Schmacher.
Erysimum, Gay, J.
Essbare Schwämme, unsre -, Me-
 dicus W.
Essb. u. schädliche Schwämme in
 Abbild., Krombholz.
Eucomium rosae, Strauss.
Euphorbiacearum genera, Jussieu,
 A. de.

Euphorbiarum Enumeratio, Rooper.
— *Pharmacographia*, Landsberg.

Faecae cerevisiae, de -, Bail.
Farbverhältnisse d. Blüten, Schübler (1833).

Färbeplänen. Vogler.
Farne, Deutschlands-, Waldner.
— fossile -, Goeppert.
— Lebermoose u. Algen, Nees v. Esenbeck sr.
— Pflanzengr. der -, Luerssen (Berl. 1874).

Farnflora von Chili, Sturm, J. W.
Farnkräuter, Kultur der -, Courtin,
— Plaschnik, — (in kol. Abb.), Kunze, G. (1840—51).
— (Entwickl.-Gesch.), Leszczyc-Suminski, — Kny.
— (Wesen der -), Kaulfuss, — (Cultur u. Wachstum), Sadebeck (1877).
— (Wachstum u. Bau), Stenzel (1859—61).

Farsetia (Mon.), Fournier.
Fasergewebe des Leins, Hanfs etc., Reissek (1852).
Fenster- u. Zimmergarten, Bouché.
Ferns, british, Newmann, — brit. and exotic., Lowe.
— of Derbyshire, Howe.
— of Great-Britain, Sowerby u. Johnson.

Ferulaceen der caspischen Wüste, Borszczow.

Fettpflanzen. Säurebildg. d. -, de Vries (1844).

Ficoidées et Cactées, Payer.

Ficus, Thunberg u. Gedner.

Fieberheilbaum, v. Hamm (1876).

Fieberrinde (Abh.), Salm-Dyck.

Filices brasilienses, Raddi.

— britann., Bolton.

— Deckenianae, Kuhn, M. (Lps. 1867).

— javan. Horti Bogot., Hasskarl.
— jenenses, Dietrich, D.

— Lechnerianae Chil. et Peruv., Mettenius, G. (Lpz. 1856—58).

— verae Hungariae etc., Sadler.
— Musci frondosi et hepatici, Weber u. Mohr (1807).

Filicetum americ., Plumier.

Filicum Afric. austr. Syn., Pappe u. Rawson.

— berolinens. Syn., Strempel.

Filicium *Enumeratio*, Kaulfuss.

— *Icones*, Hooker u. Greville (Lond. 1831).

— *semina*, Wolff.

— *Synopsis*, Hooker f.

Flachsbau, der -, Giersberg (Lpz. 1877).

Flechten. Meyer, G. F. (Entwickl., Metamorph. u. Fortpfl.).

— Normann, — d. Grossh.'s Hessen, Friedrich, C. (Riga 1878).

— u. fossile Pfl., Massalongho.

— Geschichte der -, Wallroth.

— Europa's (getrockn.), Hepp.

— morphol. Grundr. d. Fam. d. -, Montagne.

— der Wetterau, Theobald.

— (Plaudereien), Stitzenberger.

— (als Parasiten der Algen), Krempelhuber

— Gesch. u. Liter. d. -, Krempelhuber.

— von Nordamerika, Tuckermann.

Flechten - Theorie (Abwehr der Schwendener'schen) Körber (1874).

Flechten-Gonidien, Bornet u. Thuret.

Flechensystematik, Stitzenberger.

Fleischfressende Pflanzen, Rees u. Will, — Pfeffer, W. (1877).

Fleurs, fruits et feuillages choisis de l'île de Java (Abb.), Bertha Hoola van Nooten.

Flora medica, Chiaie.

Florideen - Befruchtung, Bornet u. Thuret.

— (Befr., Unters. üb.) Schmitz, Fr. (Berl. 1883).

Flower-Garden, Lindley.

Forest - Flora of British - Burma, Kurz, S.

Forest-trees, Torrey-Bigelow.

Forstbotanik, Bechstein, — Reum, — Seutter.

— beschreibende -, Behlen, — Hessens, Borkhausen.

Forstbotanische Beiträge, Willkomm.

Forstflora von Deutschl. u. Österreich, Willkomm.

Forstl. Culturpfl. Deutschl. (Natg.), Hartig, Th. (1851).

Forsttechnologie, Völker.

Forstmänner, Bot. f., Doeblner (Aschaff. 1858).

Fortpflanzungsorgane d. Cryptogamen, Wurm, F.

- Fossile Pflanzen (Synopsis)**, Unger.
 — Pfl. von Dalmatien, Visiani.
 — (Herbarium diluvianum), Scheuchzer.
 — (végét. fossiles, prodrome d'une hist. d. -), Brongniart.
Fougères de l'Amérique, Plumier — sur la fam. des -, Fée.
Fraisiers, hist. d. -, Duchesne.
Frankeniacées. St. Hilaire.
Frauenzinner. Bot. für -, Batsch, — Rousseau, J. J.
Fraxinellae, pl. fam. -, Nees u. Martius.
Froments (Catal. meth.), Vilmorin.
Fruchtbäume u. Sträucher, Dochnahl.
Fruchtbaumzucht (Handb. d. -), Hirschfeld.
Frühlingsblumen (Abb.), Aglaja v. Enders.
Fruit-culturist. small -, Fuller.
Fruit. Flower- and Kitchen-garden, Neill.
Fruit-Manual, Hogg, R.
Fruitiers, arbres -, Petit-Thouars u. Luizet.
 — — culture forcée des -, Pyañaert.
 — — Traité des -, Duhamel.
Fruits and Fruit-trees of America, Downing.
Fruit-trees (a treatise), Forsyth.
Fruits cultured (Catal.), Thomson.
Fuci brit., Goodenough, — (Syn.), Turner.
Fucoideae. Früchte der -, Link.
Fucorum Hist., Gmelin, F. G.
 — Icones, Esper.
Fucus, Diss. s. plus. espèces d. -, Lamouroux.
Fumaria, de -, Riecke.
Fumariaceeu, Crucifer. etc., Eichler (1865).
Funghi mangerecci, Vittadini, — Agrumicoli, Penzig (Padova 1882).
Fungi novi fennici, Karsten.
 — venenati, Ascherson.
Fungis, de -, Seyffert.
Fungorum agri Arimin. Hist., Battarra.
 — Bavariae etc. Icones, Schäffer.
 — Elenchus, Batsch, — Fries.
 — Icones, Corda-Zobel.
 — Index, Hoffmann, H. in Suecia Syn., Lindblad.
 — Methodus, Gleditsch.
- Fungorum** Nassov. Enum., Fuckel.
 — Synopsis, Persoon.
 — et Byssorum Illustr., Chevalier.
Fungusses, british -, Bolton-Wildenow.
Futter- u. Wiesengräser, d. wicht. -, Schmidlin-Schüle.
- Gardner's Magazine**, Loudon.
Gartenbau-Lexikon, illustriertes -, Rümpler.
Gartenbau, der -(Ausstellungsber.), Fenzl (Wien 1874).
Gartenbotanik, Bouché.
Gärten, bot. (ihre Aufgabe etc.), Kerner, A. (1874), — (u. deren Verwalt.), Schauer, C. (1833).
Gartenbohnen (Monogr.), Martens.
Gartenbuch, allgem. -, Regel u. Ender, — (deutsches), Walter (3. A., Stuttgart 1820).
Gartenbuch, Metzger, — Ritter, J. A. (1850).
 — für Damen, Jühlke.
Gartenfreund, Wredow (G. A. Gärdt u. Neide, Berl. 1859).
Gartenkunde, Handb. der -, Lerz.
Gartenkunst, Siebeck, — der ital. Renaissance-Zeit, Tuckermann (1884).
 — Theorie der -, Hirschfeld.
Garteupflaueu (Bestimmen der -), Berger, E. (1855).
Gährungspilze, Pasteur.
 — u. Seidenraupenpilz, Béchamp.
Gasteromycetes (et Hymeno-), Weinmann.
Gentiana, de - libellus, Frölich (1796).
Gentianae fauce de (barbatae), Nees u. Prinz Max v. Wied.
Gentianearum, fam. de char. -, Grisebach (Berl. 1836).
 — genera et spp., Grisebach.
Gefäßbildung d. Farne, Reichardt.
Gefässkryptogameu, Hofmeister, — Sadebeck, R.
 — Westphalens, Berthold, — der Schweiz, Bernoulli (1857).
Gefäßpfl. d. bot. Gart. zu Salzburg, Aberle (Wien, I, 1877).
Generationswechsel d. Pfl., Celakowski (1874).
Georgineu, Gerhard.
 — (Nelken u. Hortensien), Gluthorst.

- Geometr.** Anordn. d. Blätt. u. Blütenst., Bravais, L. u. A. (deutsch von Walpers, Bresl. 1839).
- Gemüsegärtner**, der, H. Jäger(1871).
- Geraniaceae**, Sweet.
- Geraniis**, de - (Specimen bot.), Burmann.
- Geraniologia**, l'Héritier.
- Geraniums** (Mon.), Andrews.
- Geschlecht** d. Pfl., Lehre von d. -, Treviranus.
- Gesneraceae**, Hanstein.
- Getreidearten** (Abbild. u. Beschr.), Krause.
— (Cerealien), Metzger.
- Getreide** (Culturen mit nordischem), Wittmack (1876).
- Gewächse** für Handel u. Industrie, Eichelberg.
- Gewächshauspflanzen** (Verzeichniss), Ventenat.
- Giftgewächse**, deutsche, Brandt u. Ratzeburg.
— (Pinakothek), Schenk u. Günther.
— Deutschlands, Brandt, Phoebus u. Ratzeburg.
— — Winckler, Emil.
— einheimische (u. essb. Schwämme), Mayer, J. C. A.
- Giftgräser** (intoxicating grasses), Hance.
- Giftige** u. essbare Schwämme, Kerner, J. S.
- Giftpflanzen** Deutschl.'s, Gressler.
— (Abbild. u. Beschr. v. 48 Arten), Juch.
— von Neufchatel, Godet.
— der Schweiz, Hegetschweiler.
— die wichtigsten d. deutschen -, Buhle.
- Giftpflanzenbuch**, Berge u. Riecke.
- Giftpilze** Schlesiens, die -, Schummel.
- Gladiolus**, notice sur le -, Niccles,
— (europ. Arten), Dietrich (Berlin 1832).
- Globulariées**, Willkomm.
- Glumacearum** Synops., Steudel.
- Gnetaceen**, Strasburger.
- Goethea**, Nees v. Esenbeck u. Martius.
- Goodenoviaeae**, Vriese, — R. Brown, Hooker u. Lindley.
- Gramina** brit., Knapp.
— austral. (Icones), Host.
- Gramineae**, Nees v. Esenbeck sr. u. Fr. Nees.
- Graminearum** Africæ australioris Mon. ill., Nees v. Esenbeck.
- Graminées** belges, Dumortier.
- Gramineen**, Duval-Jouve, — (Blütenbau), Cruse, W., — (Nervation), v. Ettinghausen (1865), — (Bestäubung), Hildebrand, F. (1872).
- Gramineus** Hort. Woburnensis -, Sinclair.
- Graminum** Descr., Koeler.
— nn. gg., Linné f.
— spp., Trinius.
- Graphidées**, Hist. de -, Chevalier.
- Gräser**, Fluegge, — belg., Hall, — deutsche, Weihe.
— (Beschr. u. Abbild.), Schreber, — europ., Woods.
- Grasses**, the - of Great-Britain, Sowerby u. Johnson.
—, the - of Scotland, Parnell, — of Britain, ders.
- Gräsergattung**, Revision der -, Panzer.
- Gras-** u. Kleesamen, Wittmack (Berl. 1873).
- Griffel** u. Narbe (anatom. Bau), Behrens (Göttingen 1875).
- Grosseillers**, Hist. des -, Thory.
- Grossulariae**, Berlandier.
- Grossulariarum** Revisio, Spach.
- Harzpflanzen** (végétaux résineux), Duplessy.
- Haselstrauch**, Palandt.
- Hausgarten**, der -, H. Jäger (2. A., 1885).
— der - auf dem Lande, Heinrich.
- Hausgärtner**, der, illustr., J. Hartwig (10. A., 1885).
- Haushalt** d. Pfl., Cohn.
- Hauschwamm**, Bourwieg.
- Héderacées** etc., notice s. l., Maréchal, E. (Brux. 1880).
- Hedysari** spp. (Mon.), Basiner.
- Hefe**, Brefeld, — (Morph. u. Biolog.), Schumacher (Wien 1874).
- Heiden**, Waitz.
- Heiden-** u. Wiesenvegetation, Drude u. Wendland.
- Heliophileen**, Revision der -, Sonder.
- Heliotropiorum** Mon., Lehmann.
- Helleborus niger**, Schobinger.

- Hemerocallis**, Schlechtendal.
Hepaticae Europae etc., Jack, J. B. (1877).
Hepaticarum Evol. hist., Kny. — *Synopsis*, Gottsche, Lindenbergs u. Nees.
Hepaticorum muscor. Hist. Prodri., Schwägrichen.
Hepaticologia germ., Hübener (Mannh. 1834).
Herbar schlesisch. Pilze, Schneider, W. G.
Hermannia, Thunberg u. Daudenelle.
Hesperiden Nürnberg's etc., Volckamer.
Hesperides, Ferrari.
Hieracien der Schweiz, Christener.
Hieraciorum Symbolae, Fries.
Hieracium, Frölich.
Hierobotanicon, Celsius.
Himbeeren, Myatt.
Hippocastani Revisio, Spach.
Hirszen-Bestandtheile, Jenisch.
Höhre Sporenpl., Farne etc., Milde.
Holzarten d. mittleren u. nördl. Deutschl. (Abb.), Krebs.
— Gescl. d. vorzügl. (syst. Abh.), Burgsdorf.
— indische, Brandis.
Holzpflanzen Österreichs, die —, Pokorny, — (Anat. u. Physiol. d. —), Hartig, Th. (1878).
Hopfenbau, Saher (1861).
Hornschuchia, Nees v. Esenbeck sr.
Hortipomologium (Gart.- u. Peltz- buch), Knab, Mich. u. Dümller.
Hortus gramineus, Sinclair.
Houttonynia et Saururus, Meyer, E. H. F.
Hoya carnosa, Tassi.
Hybridae pl. sponte nasc., Schiede.
Hydrillen, Caspary.
Hydrodycetion, Biasoletto.
Hydrophytes d. l. Belgique, Morren.
Hydrophytologiae danic. Tentam., Lyngbye.
Hydropyrum, Münter.
Hymenomycetes Hung. (Icones), Schulzer.
Hymenomycetorum Hung. Icones, Kalchbrenner.
Hymeno- et Gasteromycetes, Weinmann.
Hymenophyllaceae, Presl.
— *Javanicae*, Van den Bosch.
- Hymenophyllaceen**, Mettenius.
Hypocreaceen (zwei krit.), Loew.
Hypnea Tyrols, Henfle.
Hypochoerideae, Schultz-Bipontinus.
- Jardin**, le - botan. d. l. faculté d. médec. de Paris, Baillon (1884).
Jardin fruitier, Noisette.
Indische Holzarten, Brandis.
Infusorien, Nitzsch.
Infusorienstaub, Ehrenberg.
Insectivorous plants, Ch. Darwin (London 1875).
Insektenfressende Pfl., Batalin, — Cohn, F., — Cramer, C. (Zürich 1877), — Stein, B.
Insektenfützdende Pfl., Morren, Ed. (1875 u. 77).
Inulinvorkommen, Kraus.
Iride, de, Ekmann.
— coltivade, Ré.
Iridearum genera, Bellenden-Ker.
— Revis., Klatt.
— Syst., Baker.
Iris indica sp., D. Don.
Juncaceen (Mon.), Laharpe, — (klein. Beitr.), Buchenau (1870).
— am Cap, Mon., Buchenau (1875).
Juneo, de - (Mon. gen. Junci), Rostkovius (Berol. 1801).
Juneorum. Cyperor. et Gramin. Meth., Rajus.
Jungermannia. Endlicher.
Jungermanniarum Syllabus, Dumortier.
— Synops., Eckart, — Herbarii Montagneani spp., Nees u. Montagne (1836).
Jungermanniographia etrusca, Raddi.
Juniperus americ., Engelmann.
- Kaffee** u. Kaffeebaum (gründl. Nachr. von —), La Roque.
Kartoffelkultur etc., Regel, E. (1865).
Kartoffelkrankheit, Harting, — Decken-Himmelreich (Ratibor 1855).
— von 1845, Focke, — (Ursache etc.), de Bary (Lpz. 1861).
Kartoffeln (Monogr.), Putsche-Bertuch, — (Zersetzung durch Pilze), Reinke u. Berthold (1879).
Kartoffelpflanze, Schacht (1856), — Preiss, B. (1844).

- Keimen** etc. d. Pfl., Wolff, E., — Fleischer, — (Mono- u. Dicot.), Hanstein (1870).
- Keimung** v. *Triticum* u. *Secale*, Just, L. (1870).
- Kernobstsorten**, deutsche -, Diel.
- Kernpilze** Deutschlands, Nitschke.
- Kirschen-System** (Modifik.), v. Carlowitz.
- Klimmpflanzen**, Darwin, Ch.
- Kohlarten**, kultiv. - (syst. beschr.), Metzger, J.
- Konokarpodendron**, Brückmann.
- Korkeiche** (*Chêne liège*), C. de Candolle.
- Kork** u. verkorkte Gewebe, v. Höhn, 1877.
- Korkkryptogamen**. Fée.
- Korkentwick.** auf Rinde, H. Mohl (1836).
- Krankheiten der Kulturgew.**, Kühn. — der Waldbäume, Hartig, R.
- Kräuterkunde**, Vorles. über die -, Link.
- Krebs** d. Apfelbäume, Goethe, R. (Berl. 1877).
- Kresse**, Assimilation der -, Morgan.
- Kryptogamen**, A. Braun.
- der belg. Flora, Westendorp.
 - Deutschl.'s, Bischoff, —Schkuhr, — O. Wünsche (Lpz. 1875).
 - des Fichtelgebirges, Funk.
 - der Göttinger Flora, Weis.
 - Führer in d. Reich der -, Wagner, H.
- Kryptogamen-Flora** Deutschlands, Rabenhorst, — von Schlesien, Cohn, F. (1877—79).
- Kryptogamen**, Millardet.
- von Malmedy, Libert.
 - der Niederlande, Dozy.
 - des Taunus, Bayrhoffer.
- Kryptogamenk.** (Elementarcurs.), Helmert u. Rabenhorst (1828).
- Kryptog.** Gewächse v. Deutschl. u. der Schweiz, Bischof (1828).
- Kryptogamische** Giftgew. Deutschlands, Phoebus.
- Krystalle** in Pflanzenzellen, Holzner (Münch. 1864).
- Küchengarten** in Böhmen, Mehler.
- Kulturpflanzen** (Ursprung), Goeze.
- Labiatarum** gg. et spp., Bentham, — Schreber.
- Labiatis**, de pl. -, Koch, W. D. J.
- Lactariorum** Sueciae Mon., Lindblad.
- Lamio** Plinii, de -, König, S. Fr.
- Landschaftsgärtnerei**, Petzold (Lpz. 1862).
- Landwirtschaftl.** Pflanzenkunde, Langethal (Jena 1851—55).
- Metzger.
 - Landy.** Flora, Alefeld (1866).
 - Lardizabaleae**, Decaisne.
 - Lathraea**. Solms-Laubach, Gr. v.
 - Laubhölzer**, die - Deutschlands im Winter, Willkomm (Dresd. 1859).
 - Laubmoose** (Entwickl.), Cassebeer.
 - Lorentz, — neue, Dozy, — preuss., Ebel.
 - Nord- u. Mitteldeutschl.'s, Milde.
 - Westphalens, Müller, H.
 - d. österr. Küstenlande, Sendtner. - Laurinarum** Syst., Nees v. Esenbeck sr.
 - Lavandes**, Gingins.
 - Lebermoose**, Leitgeb, — (Bemerk. üb.), Bischoff, G. W. (1835).
 - Farne u. Algen, Nees v. Esenbeck sr.
 - u. Flechten der Rinde Pao Pereira, v. Flotow.
 - Sassi, — (Naturg. d. europ. etc.), Nees v. Esenbeck sr. (1833—38).
 - (Oelkörper der -), Pfeffer, W. (1874). - Lecidea**, v. Flotow.
 - Leguminosae capenses** (Anim. crit.), Walpers.
 - Leguminosarum**, de generibus -, Bentham, G.
 - Leguminosen** (Blumenf.), Brown.
 - (Beitr.), Meyen u. Vogel, — Tulasne. - Leguminoses**, la graine des -, Chalon, J. (1875).
 - Libanon-Alpenflora**, Kotschy.
 - Lichen esculentus**, Pallas u. Eversmann.
 - islandicus, Cramer u. Reisse, — Ebeling. - Lichenen** Deutschlands, Floerke.
 - Schlesiens, v. Flotow. - Lichenenflora** Bayerns, Krempelhuber.
 - von Würzburg, Hepp. - Lichenes arctoi**, Fries f., — Meyen u. J. v. Flotow.
 - Americae septentr., Tuckermann.
 - Daniae, Rostrup, Deichmann u. Branth.

- Lichenes** Scadin. et Novae-Caled., Nylander.
Licheni Bassanesi, Beltrami.
Lichenographia Europae reform., Fries.
— *Galliae et Algeriae Prodri.*, Nylander.
Lichenogr. (Mémoires), Fée.
Lichenologica Parerga, Körber.
Lichenologie (d. neuer. Fortschr.), Bentzel-Sternau (1859).
Lichenotheca Venet., Trevisan.
Lichens, british -, Lindsay, — english -, Smith u. Sowerby.
— History of the -, Delise.
Lichenum Eiffiae Florulae Tent., Bluff u. Fingerhuth.
— Enumer., Hoffmann, G. F.
— Germanor. Syst., Körber.
— Heidelb. Enum., Zwackh.
— Helvet. Spicilegium, Schärer.
— Histor. Tent., Hagen, — Luyken.
— Method., Acharius.
— Systema, Eschweiler.
Licht (rotes u. blaues, Wirk. auf d. Protoplasma), Luerssen.
Lichtes, die Wirk. des - auf Gew., Glocker (1820), — Pringsheim (1881), — auf eine Pfl., Schmidt, P. (1870).
Liliacées, Rédouté.
Lilium sarniense (Guernsey-Lilie), Berry.
Lolium temulentum, Roeper, J. (1873).
Loniceren, die - des russ. Reichs, Kirillow (Dorp. 1849).
Loranthaceen, Decaisne, — de Candolle.
Luftwurzeln d. Epheus, Schuch.
Lupine, weisse (Anbau der -), Wulfen.
Lychnophora Mart., Schultz-Bipontinus.
Lycoperdineorum Mon., Vittadini.
Lycopodiacées (Mon.), Spring, — Strasburger (1873).
Lythrum Salicaria, Freyer.

Macrozamia Preissii, Heinzel.
Mais, vorl. Mitteil. üb. den -, Körnicke, Fr. (1872).
Malpighiacées, Mon., A. de Jussieu (1843).
Malus persica (Pfirsich), Ungnad.
Mannae excorticatio, Ledel.

Marantearum Mon., Körnicke, — (Morph. u. Syst.), Eichler (1884).
Marattiacées, de Vriese u. Harting (1851), — Jonkman (Utrecht 1879).
Marchantia polymorpha, Mirbel.
Marchantiae, Taylor.
Marsilia, Hanstein (1864), — u. Pilularia, A. Braun (1870—72).
Maulbeerbaumzucht u. Seidenraupe (aus d. Chines.), Stuttg. 1837, — Pathe (Berl. 1865).
— u. Seidenbau, Rammlow (Berl. 1845).
Maulwurfshügel-Flora, Buchenau.
Medicago-Arten Linné's, die -, Urban, J. (1883), — (Keimung), Urban (1873).
Medical botany, Stephen u. Churchill, neu: Burnett.
— Flora of the United States, Raffinesque.
Medizinische Pflanzenkunde, Ximenez, — Zorn.
Mediz.-ökonom.-techn. Gewächse (in Abbild.), Vietz, — Bischoff (1843 u. 47).
— -pharmazeut. Botanik (Handb.), Winckler, Ed., — Schleiden.
— (Handb.), Luerssen.
— Flora, Kosteletzky.
Meer-Botanik, Charla.
Meeres-Algen, Pringsheim, — Langenbach (1873).
Melastoma et **Rhexia**, Humboldt u. Bonpland.
Melastomacearum Mon., Naudin.
Melastomaceen (Bau), Vöchting.
Melastomacées, de Candolle.
Melastomes (Mon.), Bonpland.
— (the malayan spp.), Jack, W.
Melocacti gen. (Mon.), Miquel.
Mémoires lichenogr., Fée.
Menschliche Pflanzenparasiten, Küchenmeister.
Mentharum Rhenanarum Herbar., Wirtgen.
Menyanthes trifoliata, Thunberg u. Kjellmann.
Meratia, Punica et Calyceanthus, Nees v. Esenbeck.
Merkantile Warenkunde, Zenker.
Mesembryanthemien (Entw. etc.), Hagen, C. (1873).
Mesembryanthemi et Aloës Mon. Salm-Dyck.

- Metamorphose** (Essai s. l. m. d. pl.), Goethe (übers. v. Fr. Soret) (1831).
- Metamorphose** d. nied. veget. Organismen, Hornschuch.
- Michelia**, Comment. mycolog., Saccardo.
- Micologia Italiana**, Bibliogr. della -, Saccardo, Penzig u. Pirotta.
- Micologici studi**, Venturi.
- Micromyctes**, de Notaris.
- Mikroskopische Blicke** in d. inneren Bau etc., Rossmässler.
- Milchbehälter** der Pfl., Schmalhausen.
- Milchsaftbehälter**, David.
— (Entstehung der -), Dippel.
- Mimosa sentiente**, de -, Bellardi.
- Mirabilis** Jalapa, Finger, F. (Bonn 1873).
- Missbildungen** etc., Zuccarini.
— d. Gewächse, Jäger, G. F. (Stuttgart 1814).
- Monadelphiarum** class. Diss., Cavanilles.
- Monotropa**, Hypopithys et Neottia etc., Drude, O. (1873).
- Moose**, Dillen, — Necker.
- Moose** Deutschlands, Funk (1820), — Roehling, — K. Müller (1853).
— Mecklenburgs, Blandow.
— Ehrenbergs aus Ägypten, Lorentz.
— Tent. meth., Walker-Arnott.
— u. Farne, Hedwig.
— Lebermoose u. Algen Deutschlands, Rabenhorst.
- Moosflora** d. Rheinpfalz, Gümbel (1857).
- Moosstudien**, Lorentz, — (Allgäuer Alp.), Molendo.
- Morchel** (Gemeingefährl. d. essb.), Ponfick.
- Morées**, Payer.
- Morphio**, de -, Kindscher.
- Morphologie** der Gewächse, Hofmeister, — (neues Syst. d. -), Schultz, C. H. (Berl. 1847).
— d. Pfl., vergleichende -, Irmisch.
- Mousses** (Réch. anat. u. morph.), Schimper (1848).
- Musa** Ensete, Wittmack.
- Musae paradisiacae** Diss., Tilesius.
- Muscariense** Arboretum (Park v. Muskau), Petzold et Kirchner (Gotha 1864).
- Musci Alleghanici**, Sullivant.
- Musci cleistocarpi**, Jäger, A.
— cubenses Wrightiani, Sullivant.
— exoticci, Hooker, W. J. (Lond. 1818).
— italicici, de Notaris.
— hepatici, Weber.
- Muscologia britann.**, Hooker u. Taylor (Lond. 1818).
— german., Hübener.
— hibern. Spicileg., Turner.
— recentior, Bridel-Brideri.
- Muscologie**, Palisot de Beauvais.
- Muscorum europaeorum** Synops., Schimper.
- Historia, Dillen.
— Method. illustr., Linné f.
— Physiologia, Necker (1774).
— Syllabus, de Notaris.
- Muscorum frondosorum** n. g. ha-license, Lobarzewski.
— Synops., K. Müller (Berol. 1849—51).
— Sueciae Dispos. syst., Swartz.
— Specimen, Schwägrichen.
— hepaticorum Hist., Weber.
— Hist. Prodr., Schwägrichen.
— novorum Icones, Hampe.
- Mycetozoen**, Syst. der -, Rostafinski, — de Bary (1864).
- Myographie Suisse**, Secretan.
- Mycologia europaea**, Persoon (Lpz. 1822—28).
- Mycologiae Symbolae**, Fuckel.
- Systema, Fries.
- Mykologie**, Bail (1867).
— allgem. - (Handb.), Bonorden, — (Beitr. z.), Fresenius, G. (1863).
- Mykologische Abhandlungen**, Tulasne.
— Beobachtungen (Gastero- u. Hyphomomyc.), Schmitz, J.-
— Berichte, Hoffmann, H.
— Hefte, Kunze u. Schmidt.
— Skizzen, Sorokin.
- Mutterkorn**, v. Münchhausen, — (l'ergot du seigle, Mém.), Féé.
— (Verhütung etc.), Kühn (Halle 1863).
- Myrtaceae centro-americ.**, Oersted.
- Myrtacearum americ.** Revis., Berg.
— xerocarpicarum etc., Schauer (1840).
- Myrtographia brasiliensis**, Berg.
- Mythologische Flora**, Dierbach.
- Myxogasteres Fruct.**, Bail, Th. (1859).
- Myxomyceten**, Cienkowski.

- Nadelhölzer**, Synops. d. -, Henkel.
Najas (Mon.), Magnus.
Narcissorum Mon., Haworth.
Nectar, du - (appareils sécrétaires), Desvaux.
Nectarieen, Bedeutung der -, Kurr.
Neetariis, de -, Weihe, — (Bed. z. Befrucht.), Würz u. Kurr.
Nelken (oeillets), Ardène.
Nelkentheorie, Rudolphi (2. A., 1799).
Nelkenzucht, Behr u. Münzel, Lpz. 1810.
Nepenthes destillatoria, Moore.
Nereïs britann., Stackhouse.
Nessel, d. (als Textilpfl.), Bouché, C. B., u. H. Grothe (Berl. 1877).
Neuen schönsten Pfl., die - (der Gewächsh.), H. Jäger (1873 u. 81).
Nihil officinale, Lawson.
Nitrariées, Payer.
Noix vomique, Desportes.
Nopaleen, Martius.
North-American Sylva, Nuttall.
Nostocaceen, insb. Rivularien, de Bary (1863).
novae spp. aethiop., Schweinfurth.
Nutzbare Gewächse (Handb.), Link.
— u. schädл. Gew., Chamiso.
Nutzbaumpflanzungen, Fintelmann (Potsd. 1856).
Nützliche u. schädл. Schwämme, Lenz.
Nützliche Pflanzen (Handb.), Duchesne.
Nutzpflanzen, die - Griechenlands, v. Heldreich (Athen 1862), — (tabell. Übers. d. wicht.), Goeze, E. (1883).
Nymphaea (Mon.), Lehmann.
— semi-aperta, Sturm, J. W.

Oaks of the United States (Eichen d. V. St.), Engelmann.
Obstarten, Amoreux.
Obst- u. Weintraubenarten Württembergs, Berg.
Obstbau (deutsch. Magaz.), Bertuch.
— Bivot, — Harlin, — (Vervollk.) Borchers.
— (Lehre von d.), Lucas, E.
Obstbäume (Erzieh. junger - u. d. künstl. Baumformen), Lucas, E. (1875).
Obstbäume (Erfrieren der -), Ober-
dieck, — (Schutz der - gegen Krankh.), Lucas, — Klotz (Danz. 1879).
Obstbaumschmitt, d. -, H. Jäger (Lpz. 1860), — u. franz. Obstbaumzucht, Meyer, J. G. (1871 bis 1879).
Obstbaumzucht, Christ, — Fintelmann, — Hendess.
— Riviére, — (d. Ganze der -), Röver.
— vollständ. Anleitg. d. -, Rubens.
— (in Töpfen u. Kübeln), Rivers (Weimar 1864).
Obstgärtner. d. deutsche -, Sickler.
— d. - im Zimmer, Diecker (Passeau 1826).
Obst- u. Beerenfrüchte Deutschl.'s, die -, Calwer.
Obstkunde, syst. Handb. der -, Dittrich.
— Josst.
Obstnamen, Etymologie d. -, Oberdieck.
Obstsorten, bessere zusammengest., Pochhammer.
— die besten - Englands, Smee.
— Degenerieren der -, Knight.
Oeillets (Nelken), Ardène.
Oelsaat, neue -, Wittmack.
Oekonomische Flora Deutschlands, Moser, H. C.
Oekon.-technische Flora, Schmidt (Jena 1827).
Oekonomische Pfl. (in Abbild.), Kerner, A.
Oekonomische Pflanzenkde., Whistling.
Oenanthe Theophrasti, Wedel.
Offizinelle Gew., Anleit. z. Kenntn. der -, Kunth.
Olea europaea, Lehr.
Olei resinaeque preferendorum organa, Rebender.
Olive and its products, Bernays (1872).
ombellifères, les pl. -, Gandy.
Ombellifères, Mém. s. les -, de Candolle.
Onagraires, de Candolle.
Onagrearum Synops., Mon., Spach (1835).
Ophioglosseen Deutschlands, Milde (Breslau 1858).
Opii usu, de -, Reimarus.
Opiologia, Wedel.
Opium, treatise on -, Young.

- Opora**, Zeitschr. f. Obstbau, Zittau 1834—35.
- Orangenbäume** (nederlantje Hesperides), Commelin.
- Orangers**, Hist. nat. des -, Poiteau u. Riss.
- Orchardist**, Scott.
- Orchidacea** (*Xenia*), Beitr. z. Orchideenknnde, Reichenbach f.
- Orchidaceae**, the - of Mexico, Bateman.
- Orchidacearum** Sertum, Lindley.
- Orchidee**, de -, Carpow.
- Orchideen** (Befrucht.), Darwin, Ch. — (Cultur), Warner, — Morel. — epiphytische, Pflzer. — neue, Mutel. — (Morphologie der -), Irmisch. — tropische, Josst. — Zwiebelgew. u. Baumfarne, Wagner.
- Orchidées d'Afrique**, Petit-Thouars. — (Mon.), Richard f., — Rivière.
- Organographie** d. Pfl., Stein, — de Candolle-Meisner. — Agardh (übers. v. L. Meyer) (Kopenh. 1831).
- Organologische Studien**, Auerbach, L. (Bresl. 1879).
- Orobanchen-Cultur**, Tittelbach u. Caspary.
- (z. Kenntn. der -), Schultze, F. W.
- Orobanches**, germin. des - (Mon.), Vaucher.
- Osmundae**, gen. Mon., Milde (Vind. 1868).
- Oxalis**, amerik. Arten von - (Mon.), Zuccarini.
- Oxalisarten** (Lebensverh.), Hildebrand, F. (Jena 1884).
- Palmae amazonicae**, Spruce.
- australasicae, Wendland und Drude.
- centro-americanae, Oersted.
- Palmarum** anatomie, Wossidlo.
- index, Wendland.
- Hist. nat., Martius.
- Palmen**, Naturgesch. der -, Seemann (Lpz. 1857), — (Vegetationsorgane der -), Karsten, H. (1847).
- Pandanophyllum**, Kurz, S.
- Papaveris** gen. (Mon. Tent.), Elkan (Regiom. 1839).
- Papaveraceen** (Diagramm der -), Beneke, F.
- Papierstände** (de Papyro frutice), Hahn.
- Papyrus**, sur le -, Malherbe, — Wieland (Guilandus).
- Parerga lichenologica**, Körber.
- Paronychiaceen**, Baptista.
- Paronichiées**, de Candolle.
- Parthenogenesis** d. Pfl., A. Braun, — Regel (1859).
- Passiflora mauritiana**, Petit-Thouars.
- Passiflorées et Cucurbitacées**, Dutailly (1879).
- Pavots et argémones**, Hist. n. des -, Viguier.
- Pedicularibus**, de -, Richers.
- Pelargonien**, Reider, — Kultur, Klier.
- Pelorien** (bei Labiaten), Peyritsch, — (ad indolem) Ratzeburg (1826).
- Peltophyllum**, Gardner.
- Peruviani corticis**, de usu -, Tretzel.
- Petrefaktenkunde**, Schlottheim.
- Pflanzenanatomie** (Anatome plantarum), Malpighi.
- (Beitr. z. vergleichend.), Westermäier (1881). — (Beiträge zur -), Medicus, — (Grundriss), Kiefer.
- Pflanzenbau** und Leben, Thomé (1834).
- Pflanzenbewegung**, Wiesner (1881).
- Pflanzen-Einwanderung** d. norw. Flora, Blytt.
- Ernährung etc., Schultz von Schultzenstein.
- Wolff, Em.
- Erzeugung, Logan.
- Früchte, Watzel.
- Familien, deutsche -, Hoffmann, H.
- Geographie, Meyen, —, A. v. Humboldt.
- Atlas der -, Rudolph.
- Krankheiten (Handb.), Sorauer, — (sulle malattie delle piante), Ré, — Ammann (Stuttg. 1867), — (Atlas der -), Zimmermann, O. E. R. (Halle 1885).
- Pflanzenmissbildung**, Unger (1849).
- Pflanzennamen-Deutung**, Mejer.
- Pflanzen-Pathologie**, Meyen, — Unger.
- Physiologie (Entwurf), Rafn, — (Grundz.), Frank, A. B. (1882).
- neues System d. -, Meyen.
- Treviranus.

- Pflanzen-Physiologie**, Reum.
 — — Schutzmittel (de pl. munimentis), Ludwig.
 — — Stacheln, Delbrouck, — (Haare u. Dorne), Suckow (1875).
 — — Symmetrie, Schneckenburger.
 — — Zeugung, neue Theorie der —, Endlicher (Wien 1838).
- Pflanzliche Parasiten** des Menschenkörpers, Hallier.
- Pflanmen**, Günderode u. Höpfner.
 — Anleit. z. Kenntn. der —, Liegel.
- Pfropfens**. Mon. des —, Berg (1824).
- Phaenologie**. Beitr. z. —, Egon Ihne (ph. Beob. in Europa), 1879 bis 1882, — H. Hoffmann (Giessen 1884).
- Phallus impudicus** (germinat.), Oschatz (Vrat. 1842).
- Phanerogamen-Befruchtung**, Radlkofler.
- Pharmakognosie**, Wigand, — (Handb.), Wiggers, — (d. Pflanzenr.), Berg, O. (Berl. 1857).
- Pharmazeutische Botanik**, Grindel, — (Handb.), Nürnb. 1804.
 — — Geiger-Nees v. Esenbeck u. Dierbach, 1840.
 — Warenkunde, Goebel u. Kunze.
 — (pharm.-veget.) Rohwarenk., Dietrich, F. D., u. Krumbholz (Jena 1846).
- Phormium tenax**, Gillet.
- Phyceae novae**, Areschoug.
- Phycologia adriat. et mediterran.** (Icon.), Zanardini.
 — germanica, Kützing.
- Phycoxanthin**, Reinke, J. (1876).
- Phylogiae elementa**, Drejer.
- Physiologie u. Anatomie d. Pfl., Schacht.**
 — der Gewächse, Treviranus.
 — u. Pathologie d. Pfl., Meyen,
 — Unger.
- Physiologie végétale**, Senebier, — de Candolle-Röper.
 — nouv. syst., Raspail, —, Elémens, Richard, A.
- Physiologische Botanik** (Handb.), Hofmeister u. Irmisch, etc.
 — Pflanzenchemie, Ebermayer, — Untersuchung, Pfeiffer, W. (1873).
- Phytanthozoa** (Icon.), Weinmann.
- Phytochemia**, Koch (Jena 1834).
- Phytopathologie**, Hallier.
- Phytostatik** (Jura), Thurmann, — (Pfalz), Schultz, Fr. W.
- Phytotomie**. Elemente der —, Kieser, — Meyen.
- Pierreia**, Hance.
- Pili plantarum** (Pflanzenhaare), Bahrdt.
- Pilobolus** (Mon.), Coëmans.
- Pilularia**, Agardh u. Leche, — u. Marsilia, Hanstein.
- Pilze**, v. Albertini u. v. Schweinitz (Consp. fungorum etc., Lps. 1805), — (Abhandl.), Léveillé,
 — Brefeld (Meth. z. Unters., 1874), — Harzer, — (Befrucht.), Karsten, H., — Syst. der —, Nees jr., Henry u. Bail (Bonn 1837—58), — essb. —, Berkeley u. Broome, — (als Krankheitserreg.), Haupt, W. A. (1877), Winter, G. (1878), Hartig, R. (1880), — (verbreit. deutsche), Lösecke u. Bösemann (1872), — (in ök.-chem.-toxicol. Hins.), Boudier (deutsch Husemann, 1867), — Flechten u. Algen, Syst. der —, Oersted (deutsch Grisebach u. Reinke), — (in Sturm's Flora Deutschl.), Ditmar, — Rostkovius (1840), — Preuss (Übersicht, 1851), — Flechten u. Myxomyceten, de Bary (1866), — (der Insektenkrankh., Seidenraupe etc.), Lebert, H. (1858). Pilzepizootien, Bail (1869). — Pilzkunde, Führer in die —, Kummer (1871). — Pilzsammler, Hahn, G. (1883).
- Pinetum** (üb. Coniferen), Gordon.
- Pinus g.**, Lambert.
- Piperaceae** (Bemerk.), Kunth.
- Pipere**, de —, Heister (1740).
- Pistill** (Entwick.-Gesch. des —), Buchenau (1857).
- Plantae aquaticeae**, Chatin.
 — diaphoreticae (Syn.), Rosenthal.
 — officinales (Forts.), Nees v. Esenbeck jr.
 — parasiticae, Chatin.
- Plantagineen**, Leydolt.
- Plantaginées**, Barnéoud.
- Plantarum Papilionacearum** Mon. med., Ebermaier (1824).
- Plantarum de anima —**, Valentini, Fr. (Region. 1758).
- Plantes fossiles des Vosges**, Mougeot u. Schimper.
- Poirrier**, sur la cult. du —, Desfontaines.

- Pollens**, Schutzm. des -, Kerner, A. (1873).
Polline, de plantar. -, Fritzsche (1833).
Polygoni Monogr., Meisner.
Pomarium Bononiae, Aldrovandi.
Pomologen (Leitf. f. angehende -), Lucas (1879).
Pomologie (bonnes poires), Baltet.
Pomologie, Diction. de -, Leroy, — guide pract., Thomas.
Pomologie, syst. Anleitung d. -, Manger.
— deutsche -, Lauche.
— Handb. d. -, Hinkert.
— österr.-ungar., Stoll.
Pomologisches Handwörterbuch, Christ.
Pomona austriaca, Kraft, J.
— franconica, Mayer, — gallica, Poiteau u. Turpin.
Pomone française, Lelieur.
Populorum Revisio, Spach.
Portulaceen, Revis. d. -, de Candolle.
Potentillarum Synops., Haller f.
— Monogr., Lehmann.
Primeln, vergl. Anatomie der -, Kamienski.
—, die - der europ. Gärten, Stein, B. (1882).
Prinulaceen d. österr. Alpen, Kerner, A.
Primularum Monogr., Lehmann.
Propagatio plantarum, Rudbeck.
Proteaceen, fossile -, Ettinghausen.
Protoplasma, Velten, — (Studien üb. -), Strasburger (1876).
— (Struct. u. Beweg.), Frommann, C. (1880), — Hanstein (1880).
Pteridographia americ., Petiver.
Pteridographiae Tentamen, Presl.
Puccinia rosae et rubi, Schwabe.
Punica, Meratia et Calycanthus, Nees v. Esenbeck sr.
Pyrenomycten, Sollmann.
Pyrenomyctes German., Nitschke (Bresl. 1867—70).
Pyrola et Chimophila, de -, Radius.
Pyrolaceen, Alefeld.
Quassia Simaruba, Wright.
Quercitronrinde, Hamburger, Z. S. (1879).
Querschnitte von 100 Holzarten, Nördlinger (1876—80).
Quinologia, Ruiz u. Pavon.
- Rankenbildung**, Warming.
Ranunculaceae Candolii, Schlechtendal.
Rapateacearum Monogr., Körnicke.
Rafanhia, de -, Klein.
Reana luxurians, Baillon.
Rebschulen (bei Heidelb.) (1875).
Regelia, Beaufortia etc., Schauer.
Reis (Rayss), Beschr. des -, Rauwolf, 1783.
Résédacées (Mon. d.-), Müller, Jean.
Restio, Thunberg u. Lundmark.
Rhabarbari, de eximia etc., Gerber.
Rhabarbaro, de -, Ziervogel.
Rhabarbersorten, Myatt.
Rhabarberwurzel, Calau.
Rhamnées, Barnéoud u. Brongniart.
Rheum off. botanices, Scheltema.
Rhizocarpeen, Mettenius.
Rhizographia, Preiss (Prag 1823).
Rhizomorpha, Eschweiler.
Rhodoreae et **Rhododendreae**, Seidel.
Rhododendro chrysantho, de -, Zahn.
Rhododendron arboreum var. roseum, Edwards.
Rhus (Mon.), Horsfield.
Riccieen (Mon.), Lindenberg.
Riedgräser, Schkuhr.
— die - Württembergs, Fleischer.
Riesen, die - der Pflanzenwelt, Mielck, — Göppert.
Rosae pl. g., Hist. succincta -, Wallroth.
Rosarum Mon., Crépin (1880).
Rose, Hist. n. d. l. -, Guillemeau.
Rose, die -, Cohn, F. (1863).
Rosen, die - (nach d. Nat. gez.), Rössig, — (25 Grupp.), Selbstherr.
Roses from nature, a collection, Lawrence.
Rosier genre (Mon.), Thory.
Rostpilzformen d. deutsch. Coniferen, Rees.
Rubiaceae capenses, Cruse.
Rubiacearum Sect. Anthospermae, Cruse.
Rubaceen d. trop. Afrikas, Hiern.
Runnex (Mon.), Campdera.
Rutaceen, Farne etc., Schott u. Endlicher.
- Saccharum** etc., Zalheimb.
sacra herba (nobilis Salvia), Paulini.

- Saftbewegung** u. Function, Cotta.
Saftpflanzen, Haworth.
Saftsteigen (Ursache), Böhm, J.
Salices europaeae, Wimmer.
Saliceetum (Comm.), Trautvetter.
Salicium Monogr., Anderssen, N. J. (Holm. 1867).
Salix (Mon.), Host.
Salvia, Etlinger.
Salvinia natans, Duvernoy, — Bischoff, — Juranyi (1873).
Samenschalen d. Scrophular., Bachmann (1881).
Sapindacearum foss. Mon., Massalongho.
Sapindaceen, Radlkofler.
Saprolegniacen, Cornu.
Saprolegnia, Walz.
Sarsaparilla et Caoutschouc, Royle.
Sassafras arbor, Trew.
Sassaparillae radix, Hilmziker.
Saururus et Houttuynia, Meyer, E. H. F.
Saxifraga (Ind. crit.), Engler.
Saxifragearum Revis., Sternberg.
Schachtelhalme v. Esthl., Lievl. etc., Klinge, M. (1882).
Schaftpflanzen (Stud. üb. -), Griesmann (1883).
Scheitelwachstum der Wurzeln, Schwendener (1882).
Schimmelbildungen, europäisch. -, Cornu.
Schimmel- oder Algengattungen, Carus.
Schmarotzergew. u. Krankheiten, Regel.
Schmarotzerpflanzen (geogr. Verbreit.), Liebe.
Schmarotzerpilze d. Menschenkörpers, Hallier, — Gruby.
Schmetterlingsblütigen, Fam. d. -, Eisengrein.
Schutzscheiden, Schwendener (1882).
Schwämme Bayerns (Abb.), Schäffer-Persoon (Erlang. 1800).
— Deutschlands, Schmidt u. Kunze, — (getrockn.), Kunze.
— essbare, Persoon (deutsch von Dierbach) (1822).
— die essbar. - Oesterr., Trattinick, — Corinser, — d. - Frankreichs u. Deutschlands, Cordier.
— (Samml. für Rabenhorst's Fungi europ.), Lasch.
- Schwärmsporen** (Einfluss d. Lichts auf d. -), Stahl.
Schwarzkiefer, Höss.
Seilla, Corvinus, — marit., Athanasius, — Gugubauer.
Scitamineae, Roscoe.
Scitaminearum Mon., Horaninow.
Scutellaria, Hamilton.
Secretionsorgane, Reinke.
Seigle ergöté (Traité), Read.
Selbstbefruchtung (Gesetz d. Vermeid. d. -), Thomé (1870).
Senega, de radice -, Hellmuth.
Sénés (et Casses) Colladon.
Sempervivien, neue -, Lehmann u. Schnittspahn.
Simarubées, Planchon (1847).
Sisyrinchium (Mon.), Klatt.
Smilaceae (Bemerk.), Kunth.
Smilacear. structura, Beinling (1850).
Solanacearum Ordo, Stromeyer.
Solanen, Dunal, — Sendtner.
Sorghii vulgaris (seminum anal.), Werner.
Spargel (Anl. z. Erzieh.), Nebbien.
Spermatozoïden im Pflanzenreich, Schacht.
Sphacelarien, Geyler, — Magnus, P.
Spiraea, du g., Cambessèdes (1824).
Spongia marina, de -, Uhle.
Sporangium d. Gefäßkryptogam., Mohl, H. (1837).
Stachelbeeren (Mon.), Maurer.
Stacheln u. Dorne, Delbrouck (1873).
Stapelia, eine europ. - Mikan.
Stärkeumbildungsfermente, Baranetzky (Lpz. 1878).
Sternanis, de Vriese.
Sternkräuter, Fam. d. -, Willemet.
Stirpes Austriae, Crantz.
Strelitzia, Assimilation d. -, Holle.
Stylium graminifolium, Morren.
Styraee, de -, Will.
Succinorum Hist., Sendel.
Succulentarum pl. Hist., Bradley.
Synanthreneen, Cassini.
— des Berlin. Herbariums, Lessing.
- Tabaci** Hist., Antz.
Tabaco, de -, Milchsack.
Tabacologia, Neander.
Tabak (Anbau), v. Babo u. Hofacker.
— u. ähnliche etc., Tiedemann.
Tabakkultur in Holland, Schwab.

- Tamus Elephantipes** (Mittelstock), Enderle.
Tanacetae, Schultz v. Schultzenstein.
Tanaceteen, Schultz-Bipontinus.
Tange (Abb.), Kützing.
Technische Pflanzen Deutschlands, Calwer, — Vietz.
Teppichgärtnerei, Hampel.
Teratologie der ovula, Peyritsch.
— Grundlegung der -, Wigand.
Tératologie végét. Elem., Moquin-Tandon.
— (Essai hist.), Kirschleger.
Terebinthineen, Colebrooke.
Tertiärflora etc., Weber u. Wessel.
— der Schweiz, Heer.
Thallassiophytes, Lamouroux.
Thé, cult. du -, Aubry le Comte.
Thea, de -, Genge.
Thee, der - (Mon.), Houssaye.
Thymelaeum Syn., Meisner.
Tiliarum, Rev. g. -, Spach (1834).
Torfmoose (Entw.-Geschichte d. -), Schimper (1858).
Torreya, G. Arnott.
Traubenkrankh., die -, Dorner, J. (Pest 1853).
Traubensorten (vorz. Württemb.), Single.
Tremandreamum Syn., Schuchardt.
Tremandreen, Steetz (Hamb. 1853).
Trichome u. Stacheln, Uhlworm (1873).
Trichostomaceae europ., Lindberg.
Tuberaceae (Trüffelpilze, Mon.), Vittadini.
Tuberibus terrae, de -, Brückmann.
Tüpfel (Entst. u. Bau), Dippel, L.
Turgor (d. Zellen), Vries.
Turneraceen Mon., Urban, J. (1883).

Umbelliferae, Lagasca.
Umbelliferarum Cl. Emend., Crantz.
— Prodr., Sprengel.
— spp. minus cognitae, Sprengel.
Umbelliferen, Cusson.
Umwandlung v. Antheren in Carpelle, H. Mohl (1836).
Unkraut- u. Wegpfl. Brasiliens, Lund.
Unkräuter von Deutschland, die -, Ratzeburg.
Unorganische Pflanzenbestandteile, Erdmann.
Uredinen, de Bary (Berl. 1865—66).

Urticées (Mon.), Weddell.
Ustilagineen, de Bary (1882).

Valerianas, in -, Betcke.
Valerianeen (Mon.), Dufresne, — u. deren Gebrauch, Ebers (1858).
Valerianées, de Candolle.
Vallisneria spiralis, Müller, J. Fr. (Bonn 1875).
Vegetationsorg. d. Phanerog. u. Farne, de Bary (1877).
Vénéneuses, pl. - de la Suisse, Vicat.
Verbasci g. Prodr., v. Berchtold u. Pfund (1840).
Verbreitungsmittel, Hildebrand (1873).
Veredelung d. Obstes, Keyser.
Verger, le -, Mas Alphonse.
Verjüngung (Anaphytose), Schultz, C. H. (1851).
Veronica u. verwandte Sippen, Duvan.
Vermehrung, üb. ungeschlechtl. — d. Phanerogamen, Baum, O. E. (1850).
— der Gramineen, Hildebrand.
Verpflanzen der grossen Bäume, Reinecken, R. (1877).
Verrucaria, Gibelli.
Vigne, cult. de la -, Chaptal.
Vignoble, Puliat.
Violacées, St. Hilaire.
Violariées, Gingins.
Visnea Mocanera, Schacht.
Vorwelt, Flora der -, Corda.
Voyria, Splitgerber.

Wachsüberz. d. Epidermis, de Bary.
Wald, der - im Haushalt d. Natur, Weber, R. (1874).
Waldbau, Cotta (5. A., 1832), — Gwinner (2. A., 1841).
Waldbäume, deutsche - , Klöbisch, — (Krankh. d.), Hartig, R. (1874).
Walderziehung, Schultz (Lpz. 1839).
Waldes, des deutschen - Vergangenheit u. Zukunft, H. Hoffmann (1871).
Warenkunde, merkantile -, Zenker.
Weg- u. Unkrautpfl. Brasiliens, Lund.
Weiden Tyrols, die -, Trauensteiner.
Weinbau-Kalender, v. Babo.
— -Katechismus, Dochnahl.

- Weinbau-Schule**, Dornfeld.
 — **Siebenbürgens**, Fabini.
 — (theor.-prakt. Abh.), Chaptal, Rozier, Parmentier u. Dussieux.
Weinstock etc., Champin.
Weintraubenarten (u. Obst-) Württembergs, Berg.
Wiesen- u. Heidenvegetat., Drude u. Wendland.
Winden, das - d. Pfl., Schwenderer (1883).
Winterflora, H. Jäger (1880).
Wintergarten, der -, Antoine, — Schmidlin, E. (1847).
Wintergärtner, Dietrich, F. G. (3. A., 1808).
Wurzel-Auscheidung, Walser.
Wurzelkraft, Lehre v. d. -, Brosig, M. (Breslau 1876).
Wurzelleben der Kulturpflanzen, Fraas (1870).
Wurzelverwachsungen, Franke, M. (1881).

Xenia orchidacea, Reichenbach f.
Xeranthemum, Gay, J.

Zapfenbünne, Salisbury.
- Zea Mays**, de pl., Marabelli (1793).
Zelle, die - als Elementarorg., David, G. (1873), — u. Zellkern, Auerbach, L. (1874).
Zellenstreckung u. Turgor, Vries.
Zellhülle (neuere Theorie), DippeL, L.
Ziergärtnerei, Katechismus der -, H. Jäger (Lpz. 1871).
Ziergehölze, Jäger, H., u. Beissner.
Zierpflanzen, Samml. von -, Labram.
Zimmer-Blumenzucht, Schmidlin. — u. Fenstergarten, Bouché.
Zimmergarten, Keller.
Zingiberaceis, Observ. de -, Hall.
Zooophytes, Hist. nat. d. -, Du-jardin.
Zoosporen u. Algen, Walz.
Zuckerahorn, v. Paschwitz.
Zuckerriübe (Anat. u. Entw.), Droy-sen, K. (1877).
Zwergbaumzucht, Liebitzer.
Zwergmandeln, Schlechtendal.
Zwiebelblumen (Traité d. fleurs à oignon, Harlem 1760), Kampen.
Zwiebelgew., Biolog. d. -, Berg, E. v. (1837), — lilienartige u. Prachtg., Kreysig (1836).

d. Nomenklatur und Wörterbücher der Botanik.

- Balfour**, the botanist's companion with a glossary of botan. terms, Edinb. 1860.
Beckmann, Lexic. botanicum, 1801.
Bischoff, Handb. der bot. Terminologie, 1844; d. bot. Kunstsprache in Umrissen, Nürnb. 1822; d. beschreib. Bot. (1839, u. von J. A. Schmidt herausg. 1857).
v. Böninghausen, Nomenclator bot., 1821.
Borkhausen, bot. Wörterbuch (2 B.), 1797 (Nachtr. v. Dietrich).
Böhmer, Lex. rei herbariae, cont. etymol. nominum, 1802; Comment. bot.-liter. de plantis in memoriam cultorum nominatis, Lips. 1799.
Bouillard, Dict. élém. d. bot., refondu p. Richard, Paris 1802.

Deunstede, Nomencl. bot. (I. Pl. phanerog.), 1810.
Dierbach, Repertorium bot., Lemgo 1831.
Dietrich, A., u. de Vriese, Kunstvoordenleer d. Planten, Amsterdam 1834.
Dietrich, A., Terminologie d. phanerog. Pfl., 2. A., 1838.
Doechnahl, Fr. J., Biblioth. hortens. (1750—1860, versch. Werke), 1861.
Fechner, Erklär. volkst. deutsch. Pflanzennamen, 1871.
Gérardin, Dict. raisonné de Bot., Paris 1822.
Gesner, C., Catal. plant., Namensbuch all. Erdgewächse (Lat., Gr., Dtsch. u. Frz.), Zürich 1542.
Germain, Nouv. Dict. de Bot., 1870.

- Gmelin, J. Fr.**, Onomatologia bot. (9 Bde.), 1772—78.
- Hayne**, Termini bot. iconib. ill., bot. Kunstspr., Berlin 1799.
- Henckel v. Donnersmark u. Willdenow**, Nomencl. bot., 2. A., Halle 1821.
- Heynold**, Nomencl. bot. hortens., alphab.-synon. Aufzähl. der in Europa kult. Gew., 1840 u. 46.
- Index d. Kunstvoordelen d. Planten**, Amst. 1836 (s. Dietrich, A., u. de Vriese).
- Johrenius**, Vademecum bot., Colbergae 1710.
- Jürgens**, etym. Fremdwörterb. d. Pflanzenk., 1878.
- Kachler**, Grundr. d. Pflanzenk. in Gestalt eines Wörterb.'s d. betr. Sprache, Wien 1830.
- Kohl**, Taschenwörterb. d. botan. Kunstausr., Berl. 1883.
- Kyber**, Lex. rei herbar. trilingue, Argentor. 1553.
- Langenthal**, Terminol. d. beschr. Bot. u. lat. Wörterb., 1845.
- Lecoq u. Julliet**, Dict. des termes de bot., Paris 1831.
- Leroy**, Diction. de Pomologie, s. 1866.
- Lüder**, Nomencl. bot. stirpium Marchiae Brandenb., Berl. 1786.
- Martin**, A., d. Pflanzennamen d. deutsch. Flora, Halle 1851.
- Mejer**, üb. d. Deutung d. Pflanzennamen („Natur“), 1881.
- Müller, J. B.**, bot. prosodisch. Wörterbuch, 1842.
- Nennich**, allg. Polyglotten-Lex. d. Naturg. (20 Spr.), Hamb. (20 Thlr.)
- Oberdieck**, Etymologie d. Obstnamen, Bresl. 1866.
- v. Perger**, Studien üb. d. deutsch. Namen d. in Deutschl. heimischen Pfl., Wien 1858.
- Paxton**, Jos., a Pocket bot. dictionary, 2. A., London 1853.
- Pfeiffer**, Nomencl. bot. (4 Bde.), 1872.
- Plenk**, Anfangsgr. d. bot. Terminologie, Wien 1795.
- Räuschel**, Nomencl. bot. omnium a Linnaeo descr. plant., Lps. 1797.
- Reichenbach**, Repert. rei herb. s. Nomencl. gen. plant., Dresden 1841.
- Römer, J. J.**, Vers. eines Wörterbuchs d. bot. Terminologie, Zürich 1816.
- Schlickum**, Taschenwört. d. bot. Kunstausr. (Lpz. 1875).
- Steudel, E.**, Nomencl. bot., 1840 bis 1841, cryptog., Stuttg. 1824.
- Théis, A. de**, Glossaire de bot. ou Dict. etymol. etc., Paris 1810.
- Voigt**, Handwörterb. d. bot. Kunstsprache, Jena 1803.
- Walpert, Gu. G.**, Repertor. botanices syst. (Lps. 1844—48).
- Walpert, H.**, Synonyme u. syn. Wörterb. d. deutsch. Pflanzennamen (1852).
- Willdenow**, s. Henckel v. Donnersmark.
- Wittstein**, etym.-bot. Handwörterbuch, 2. Aufl., 1856.

e. Botanische Litteratur und Geschichte.

- Haller, A.**, Bibliotheca bot., Tiguri 1771—72.
- Jessen**, Bot. d. Gegenw. u. Vorzeit, 1864.
- Krüger, M. S.**, Bibliographia bot., Handb. d. bot. Literatur etc., 1841.
- Meyer, E.**, Geschichte d. Botanik, 1854—57.
- v. Miltitz u. Reichenbach**, Biblioth. bot., Berlin 1829.
- Pritzel**, Thesaurus lit. bot. omn. gent., 2. A., 1872.
- Pulteney**, Gesch. d. Bot. (bes. in Engl.), aus d. Engl. v. Kühn, Lpz. 1798.
- Pulteney**, esquisses hist. et biogr. des progrès de la bot. en Angleterre, 1809.
- Willkomm**, gegenw. Stand d. bot. Wissensch., 1868.
- Winckler, Emil**, do., Frankf. a. M., 1854.
- Zuchold**, Additamenta ad Pritzeli Thesaurum, 1852 u. 66.

IV. Die wichtigsten essbaren und giftigen Schwämme.

a. Essbare.

Agaricus procērus (Lepiota pro-cēra) Parasolpilz, s. g. Schulmeister.

Agaricus mutabilis (Pholiota m.) Schuppenp. od. Stockschwammi.

Amanita vaginata Wulstscheide, s. g. Manschettenpilz.

Am. caesarea (Agaricus caesarēus) Kaiserschwammi.

Armillaria Armbandpilz, z. B. mel-lēa Honiggelbling, s. g. Hallimasch, straminea strohgelber, robusta etc.

Boletus edulis Edel- od. Herrenpilz, Steinpilz.

Boletus bovinus Kuhpilz.

Boletus Intēus Butterpilz.

B. granulatus s. g. Schmerling, be-körnter Röhrchenpilz Kumm.

B. ovīnus (Polypōrus ov.) Schaf-euter.

B. seaber Birken- od. Kapuzinerp.

B. rufus rotbrauner Röhrchenpilz Kumm.

B. castanēus kastanienbrauner R.

B. asprellus rauhschuppiger R.

B. elegans schöner R.

B. flavidus gelblicher R.

B. subtomentosus s. g. Ziegenlippe.

B. badius s. g. Maronenpilz.

Bovista plumbēa Bleikugel, s. g. Katzenier.

Calocēra furcata u. **viscosa** Gabel-u. klebriges Schönhorn.

Camarophyllum Garnelenpilz, z. B. **virginēus** Jungfern., **caprinus** Ziegenp., **ovīnus** Schaf-G., **pra-tensis** Wiesen-G. etc.

Cantharellus Faltenpilz, z. B. **cibarius** Gälting, guter Eierschw., Pfifferling etc.

Clitocybe Trichterling, z. B. **odōra** Duftp., **suaveolens** Wohlgeruchp., **fragrans** Anisp.

Clitocybe dealbata verfärbender Tr. Kumm., **opipāra** prächtiger, **gibba** buckliger etc.

Clitopilus Pflaumenpilz, z. B. **po-pinalis** wohlschmeck., **Prunulus** wahrer Pfl., **Oreella** rötlicher Pfl.

Clavaria „Keulenpilz“, Korallen-schwamm, s. g. Ziegenbart, z. B. **delicata** zarter, **flava** eigentl. Ziegenb., **Botrytis** Trauben-K., **coralloides** Bärentatze, **aurēa** Gold-K., **abietina** Tannen-K., **digitella** s. anomala Finger-K., **amethystina** Amethyst-K. etc.

Collybia „Pfennigpilz“, z. B. **oreades** Krösling od. Herbstmousse-ron, **tenacella** zäher, **esculenta** essb., **porrēa** Zwiebel-Pf., **eras-sipes** s. fusipes Dickfuss, **ery-thropus** Rotfuss etc.

Cortinarius „Spinnwebschleier“-Pilz, z. B. **castanēus**.

Entoloma Schleierpilz, z. B. **rhopodium** Rosen-.

Galorrhoeus „Milchpilz“, Pepper-ling, Brätling, Kremling etc., z. B. **deliciosus** köstlicher, **acris** scharfer, **rubellus** rötlicher, **volemus** Birnen-M., **serifluus** Serum-M., **mitissimus** mildester, **glycosmus** Wohlgeruch-M., **piperatus** weiss. Pfefferp., Kuhpilz etc.

Helvella Falten-, Stock- od. Früh-morchsel, s. g. Lorchsel, z. B. **escu-lenta** Speise - Helvelle, **crispa** krause, etc.

Hydnnum Stachelpilz, z. B. **coral-loides** Korallen-St., **diversidens** ungleichzähniger, **imbricatum**

dachziegelschupp., Hirschschw., Habichtsp., **Erinacēus** Igel etc.
Hypholōma „Gewebsaum“, z. B. lateritium Bitterschw.
Lepiota Ringpilz, z. B. exoriata geschundener, procēra Parasolp. (Agaricus procērus), erminēa Hermelinp., granulosa bekörnelter m. v. amianthīna u. v. carcharias, clypeolaria schildförm. etc.
Limacium „Schneckenpilz“, z. B. eburnēum knochenweiss., discoideum scheibiger etc.
Lycoperdon Staubpilz, Bovist, z. B. gemmatum stachelwarziger, m. v. v. (perlatum, furfuraceum etc.), gigantēum Riesenbovist, caelatum s. areolatum getäfelter, s. g. Hasenbovist.
Marasmius „Schwindpilz“, z. B. scorodonius Lauchp.
Morchella Morechel, z. B. deliciosa köstliche, esculenta Speise - M., conica Spitz-, patula Glocken-, etc.
Plenrōtus „Seitenstiel“ - P., z. B. ostreatus Austerp. s. g. Drehling, ulmarius Ulmenp.
Polypōrus „Porenpilz“, z. B. confluentis Semmelpilz, sulphurēus schwefelgelber, frondosus laubart., umbellatus doldiger s. g. Eichhase, ovinus Schafeuter (Bolētus ov.) etc.
Psalliōta Ringpilz, z. B. campestris (Agaricus c.) ächter Champignon, sylvaticus kreideweiss., arvensis Schaf-Champignon.
Rhymovis Krämpelpilz, Deichselp., z. B. involuta wahrer Kr., atrotomentosa schwarz-filzig.
Russūla Reitzker, Täubling, z. B. aurata goldgelber, lutea gelber, xerampelina, hochroter, integra unschädl., alutacea ledergelber, virescens grünend., lactea milchweiss., vesca Speisep.
Rhizopōgon Wurzeltrüffel, z. B. Magnatum Magnaten-, nivēus schneeweiss.
Sparassis Glucke, z. B. crispa krause, brevipes kurzstielige.

Tricholōma „Haarsäumling“, Ritterschwamm, z. B. equestre eig. Ritterschw., prasinum lauchgrüner, pomōnae Obstb., Columbetta Tauben-, tigrinum Tiger-, gambosum Huf-, saponacēum Seifenschwamme, nudum nackter etc.
Tuber Trüffel, z.B. cibarium Speise-, pallidum bleiche, fuscum braune, albīdum weisse etc.

b. Giftige.

Amanīta Wulstpilz, z. B. muscaria (Agaricus muscarius) Fliegenpilz, pantherina Pantherschw., rubescens Perlen-, phalloides Gichtschw., solitaria, verna, excelsa, aspēra etc.
Bolētus Satānas Satanspilz, lurīdus Sau- od. Schusterpilz, lupinus Wolfs-, piperatus Pfefferpilz, pa-chypus Dickfuss od. Bitterpilz, radicans wurzelnder, calopus Schönfuss-Röhrenpilz.
Cantharellus Faltenp. z. B. aurantiacus falsch. Eierschw.
Cortinarius traganus Bocksgeruchp., Lilaschwamm.
Galorrhoeus insulsus (Agaricus ins.) weissmilchender Reitzker, geschmackloser Milchp., torminosus Birken - Reitzker (-Rietsch Kumm.), fuliginosus Russ-M., chrysorrhoeus Goldfuss-M., the-jogalus Schwefel-M., etc.
Gomphus glutinos. schmier., „Keilpilz“, Schleimschw. (Agaricus glut.).
Hypholōma „Gewebsaum“, z. B. fascicularis Schwefelkopf, Bitterschwamm.
Russūla Reitzker, Täubling, z. B. emetica Speiteufel, furcata Gabel-R., rubra roter, heterophylla (furcata var.).
Tricholōma „Haarsäumling“ z. B. impolitum glanzloser, urens brennend., rutilans rötlicher.

V. Übersicht

des von Bartling und Bischoff verbesserten de Candolle'schen Systems (nach Leunis-Frank's Synopsis des Pflanzenreichs).

A. Plantae vasculares, Gefäßpflanzen.

A. Phanerogamae L., Phanerogamen oder Samenpflanzen.

I. Kl. Dicotyledonēae Juss.

1. Unterkl. Choristopetālae DC. (Polypetālae Juss.)

1. Ord. Leguminosae Juss.: 1. Fam. Mimosēae R. Br., 2. F. Caesalpiniēae R. Br., 3. F. Swartziēae DC., 4. F. Papilionacēae L. (Leguminosae J.) (Phyllolobēae u. Sarcolobēae).
2. Ord. Rosiflōrae Bisch.: 5. Fam. Chrysobalanēae R. Br., 6. F. Amygdalēae Bartl. (Drupaēae DC.), 7. F. Spiraeacēae Kth., 8. F. Sanguisorbēae Lindl., 9. F. Rosacēae Spenn., 10. F. Poma-cēae Lindl.
3. Ord. Terebinthīnae Bartl. Balsamgew.: 11. F. Cassuvīēae R. Br., 12. F. Connaracēae R. Br., 13. F. Amyridēae R. Br., 14. F. Aurantiacēae Corr. (u. Olaciēae Endl.), 15. F. Zygophyl-lēae R. Br., 16. F. Rutacēae Bartl., 17. F. Diosmēae A. Juss., 18. F. Xanthoxylēae A. Juss., 19. F. Simarubēae DC., 20. F. Ochnacēae DC.
4. Ord. Tricocceae Bartl. Schneller: 21. F. Staphyleacēae Lindl., 22. F. Hippocrateacēae Kth., 23. F. Celastrinēae R. Br., 24. F. Pittosporēae R. Br., 25. F. Aquifoliacēae DC., 26. F. Rhamnēae R. Br., 27. F. Bruniacēae R. Br., 28. F. Empetrēae Nutt., 29. F. Euphorbiacēae Juss., 30. F. Stackhousēae R. Br.
5. Ord. Malpighinae Bartl.: 31. F. Rhizobolēae DC., 32. F. Hippocastanēae DC., 33. F. Sapindacēae Juss., 34. F. Erythroxylēae Kth., 35. F. Coriaricēae DC., 36. F. Acerinēae DC., 37. F. Malpighiacēae Juss.
6. Ord. Ampelidēae Bartl.: 38. F. Cedrelēae R. Br., 39. F. Meliacēae Juss., 40. F. Leeacēae Bartl., 41. F. Sarmentacēae Vent. Reben.
7. Ord. Gruinales Bartl. Schnabelpfl.: 42. F. Oxalidēae DC., 43. F. Linēae DC., 44. F. Geraniacēae DC., 45. F. Tropaeolēae Juss., 46. F. Hydrocerēae Blum., 47. F. Balsaminēae A. Rich.
8. Ord. Columnifērae Bartl.: 48. F. Malvacēae Bartl., 49. F. Dom-bevacēae Kth., 50. F. Hermanniacēae Kth., 51. F. Büttne-Glaser, Botan. Taschenwörterbuch.

- riacēae R. Br., 52. F. Sterculiacēae Kth., 53. F. Tiliacēae Kth., 54. F. Dipterocarpēae Blum.
9. Ord. **Lamphyllae** Bartl.: 55. F. Chlaeniacēae P.-Th., 56. F. Ternstroemiacēae DC., 57. F. Camelliaēae DC. (Theacēae Rchb.).
10. Ord. **Myrtīnae** Bartl.: 58. F. Myrtacēae R. Br., 59. F. Lecythidēae Rich., 60. F. Melastomaēae Don, 61. F. Memecylēae DC.
11. Ord. **Calycanthīnae** Bartl.: 62. F. Calycanthēae Lindl., 63. F. Granatēae Don.
12. Ord. **Calyciflōrae** Bartl.: 64. F. Combretacēae R. Br., 65. F. Vochysiācēae Mart., 66. F. Rhizophorēae R. Br., 67. F. Philadelphēae Don, 68. F. Onagariae Juss., 69. F. Lythrariēae Juss., 70. F. Haloragēae R. Br.
13. Ord. **Succulentae** Bartl. (Corniculatae Rchb.): 71. F. Cunoniacēae R. Br., 72. F. Saxifragēae Vent., 73. F. Crassulacēae DC. (Sedēae Rchb.), 74. F. Ficoīdēae Juss. (Aizoīdēae Spr.), 75. F. Nitriariacēae Lindl.
14. Ord. **Caryophyllīnae** Bartl. Wendl.: 76. F. Silenēae Bartl. Nelken, 77. F. Alsinēae Bartl. Mieren, 78. F. Portulaēae Bartl., 79. F. Paronychiēae St. Hil. (Illecebrēae DC.), 80. F. Scleranthēae Lk., 81. F. Phytolaccēae R. Br., 82. F. Amaran-tacēae R. Br., 83. F. Chenopodiacēae DC. (Atriplicēae Rchb.).
15. Ord. **Guttifērae** Bartl.: 84. F. Garciniēae Bartl. (Clusiēae Rchb. Canellēae DC.), 85. F. Hypericinēae DC., 86. F. Franke-niacēae St. Hil. Salzpf.
16. Ord. **Cistillōrae** Bartl.: 87. F. Tamariscinēae Desv., 88. F. Parnassiēae Rchb., 89. F. Droseracēae DC., 90. F. Sarraciēae Turp. Kannenträger, 91. F. Sauvagesiēae Bartl., 92. F. Vio-lariēae DC., 93. F. Cistinēae DC., 94. F. Bixinēae Kth., 95. F. Marcgraviēae Juss., 96. F. Flacourtiacēae Rich.
17. Ord. **Peponifērae** Bartl.: 97. F. Nopalēae s. Cactēae DC., 98. F. Grossulariēae s. Ribesiācēae DC., 99. F. Escalloniēae R. Br., 100. F. Cucurbitacēae Juss., 101. F. Loasacēae Juss. Brennwinden, 102. F. Turneracēae DC., 103. F. Malesher-biacēae Don, 104. F. Passiflorēae Juss., 105. F. Papayaēae Mart. Melonenbäume, 106. F. Homalinēae R. Br., 107. F. Samydēae Gärt. Birkenpflaumen.
18. Ord. **Rhoeadēae** Bartl.: 108. F. Capparidēae Vent., 109. F. Crucifērae Juss. (Siliquosae, Latiseptae s. Siliculosaes, Angusti-septae, Nucamentaceae, Lomentaceae), 110. F. Papaveracēae DC., 111. F. Fumariacēae DC., 112. F. Resedacēae DC., 113. F. Polygalēae Juss. Bitterlinge, 114. F. Tremandrēae R. Br.
19. Ord. **Hydropeltidēae** Bartl.: 115. F. Nymphaeacēae Bartl., 116. F. Nelumbonēae Bartl., 117. F. Cabombēae Rich. Haarnixen.
20. Ord. **Polycarpīcae** Bartl.: 118. F. Ranunculacēae Juss., 119. F. Paeoniacēae Bartl., 120. F. Dilleniacēae DC., 121. F. Magnoliacēae DC. (Illiiciēae DC. Rchb.)
21. Ord. **Trisepālēae** Bartl.: 122. F. Anonacēae Rich., 123. F. Myristicēae R. Br. Muskatnussartige.
22. Ord. **Cocculināe** Bartl.: 124. F. Menispermēae Juss., 125. F. Berberidēae Vent.
23. Ord. **Umbelliflōrae** Bartl. Schirmblüter: 126. F. Hamamelidēae R. Br. Zaubersträucher, 127. F. Hederacēae A. Rich. (Cornēae DC.), 128. F. Araliacēae Juss., 129. F. Umbellifērae Juss. (Umbellatae L.) (Orthospermae, Campylospermae, Coilospermae).
24. Ord. **Loranthēae** Bartl.: 130. F. Loranthacēae Don Mistelartige.

2. Unterkl. **Gamopetālae** DC. (**Monopetālae** Juss.)

25. Ord. **Ligustrīnae** Bartl. (*Oleacēae* Lindl.: 131. F. *Oleīnēae* Lk. (*Oleīnēae* u. *Fraxinēae*), 132. F. *Jasminēae* R. Br.)
26. Ord. **Rubiācīnae** Bartl. (*Rubiaceae* Juss.): 133. F. *Viburnēae* Bartl. Holdergew., 134. F. *Caprifoliacēae* Bartl. (*Lonicērēae* R. Br.), 135. F. *Cinchonacēae* Lindl. (*Coffēīa* u. *Cinchonēa*), 136. F. *Stellatae* L. (*Ophiorrhizēae*, *Hameliacēae*, *Genipēae*), 137. F. *Lygodysodeaceae* Bartl. Stinkschlingsträucher.
27. Ord. **Contortae** Bartl.: 138. F. *Loganiēae* R. Br., 139. F. *Apocynēae* R. Br., 140. F. *Asclepiadēae* R. Br., 141. F. *Gentianēae* Juss.
28. Ord. **Tubiflōrae** Bartl.: 142. F. *Boraginēae* Juss. (*Asperifoliēa* scharfblättr. u. *Tournefortiēa*), 143. F. *Hydrophyllēae* R. Br., 144. F. *Solanacēae* Rchb. (*Solanēa* Beeren-, Daturēa Kapselfr.), 145. F. *Cuscutēae* Presl, 146. F. *Convolvulacēae* Vent., 147. F. *Hydroleacēae* R. Br. Klebergew., 148. F. *Polemoniacēae* Vent.
29. Ord. **Labiatiſlōrae** Bartl. (*Personatae* u. *Nuculifērae*): 149. F. *Bigoniacēae* R. Br., 150. F. *Acanthacēae* R. Br., 151. F. *Labiatae* Juss., 152. F. *Verbenacēae* Juss., 153. F. *Selaginēae* Juss., 154. F. *Myoporinēae* R. Br., 155. F. *Sesamēae* DC., 156. F. *Cyrtandracēae* Jacq., 157. F. *Gesneriacēae* Rich., 158. F. *Orobanchēae* Juss., 159. F. *Scrophularinēae* R. Br. (*Personatae* u. *Rhinanthacēae* Juss.) (*Verbascēa*, *Antirrhinēa*, *Veronicēa*, *Rhinanthēa*, *Crescentiacēa*), 160. F. *Lentibulariae* Rich. (*Utriculariēae* Seub.)
30. Ord. **Myrsinēae** Bartl. Myrrhen: 161. F. *Primulacēae* Vent., 162. F. *Ardisiacēae* Juss.
31. Ord. **Styracīnae** Bartl.: 163. F. *Sapotēae* R. Br. DC., 164. F. *Ebenacēae* Juss., 165. F. *Styrracēae* Rich.
32. Ord. **Ericinēae** Bartl.: 166. F. *Epacridēae* R. Br., 167. F. *Ericēae* R. Br. (*Arbutēa*, *Ericēa*, *Pirolēa*, *Rhododendréa* s. *Rhodracēae*), 168. F. *Monotropēae* Nutt. Ohnblätter, 169. F. *Vacciniēae* DC.
33. Ord. **Campanulīnae** Bartl.: 170. F. *Campanulačae* DC., 171. F. *Lobeliacēae* Juss., 172. F. *Styliđēae* R. Br., 173. F. *Goedenoviēae* R. Br.
34. Ord. **Compositae** Bartl.: 174. F. *Synantherēae* Rich. (*Cassiniacēae* Sch. Bip. *Syngenesia* L.) Röhrenbeutlige (*Corymbifērae* Vaill. DC. od. *Radiatae* Juss., *Cynarocephalēae* Juss. s. *Capitatae* L., *Cichoriacēae* Rchb. s. *Ligulatae* L.), 175. F. *Ambrosiaceae* Lk. Spitzkletten, 176. F. *Calycerēae* R. Br. Kelchhornartige.
35. Ord. **Aggregatae** Bartl.: 177. F. *Valerianēae* DC., 178. F. *Dipsacēae* DC., 179. F. *Globulariēae* DC., 180. F. *Plumbaginēae* Vent., 181. F. *Plantaginēae* Vent.

3. Unterkl. **Monochlamydēae** DC. (**Apetālae** Juss.)

36. Ord. **Proteīnae** Bartl.: 182. F. *Proteacēae* R. Br., 183. F. *Aquilařiēae* R. Br. Adlerhölzer, 184. F. *Thymelaeēae* Juss., 185. F. *Elaeagnēae* R. Br., 186. F. *Santalacēae* R. Br., 187. F. *Laurinēae* Vent.
37. Ord. **Fagopyrīnae** Bartl.: 188. F. *Nyctaginēae* DC., 189. F. *Polygonēae* Juss., 190. F. *Begoniacēae* R. Br.
38. Ord. **Urticīnae** Bartl.: 191. F. *Urticēae* Bartl., 192. F. *Artocarpēae*

- Bartl. (*Moréae*, *Artocarpéa* u. *Platanéae*), 193. F. *Monimiéae* Juss. Trommelbaumartige.
 39. Ord. *Iteoïdæae* Bisch. Weidenartige: 194. F. *Balsamiflæae* Blum., 195. F. *Salicinæae* Rich.
 40. Ord. *Amentacæae* Bartl. Kätzchenträger: 196. F. *Ulmacæae* Mirb., 197. F. *Juglandæae* DC., 198. F. *Cupuliferae* Rich., 199. F. *Betulacæae* Bartl., 200. F. *Myricæae* Rich., Gageln, 201. F. *Casuarinæae* Mirb. Keulenbäume.
 41. Ord. *Coniféræae* Bartl.: 202. F. *Taxinæae* Rich., 203. F. *Cupressinæae*, Rich., 204. F. *Abietinæae* Rich., 205. F. *Cycadæae* Rich. Zapfenpalmen.
 42. Ord. *Piperinæae* Bartl.: 206. F. *Chloranthæae* R. Br. Pflaumenpfefferartige, 207. F. *Piperacæae* Rich., 208. F. *Saururæae* Rich.
 43. Ord. *Aristolochiæae* Bartl.: 209. F. *Taccacæae* Presl Arrowrootgew., 210. F. *Asarinæae* R. Br., 211. F. *Cytinæae* Brongn. Hypocistgew., 212. F. *Balanophoræae* Rich. Kolbenschosser.
 44. Ord. *Ceratophyllinæae* Bisch.: 213. F. *Ceratophyllæae* Gray, 214. F. *Nepenthæae* Lindl. Kannenträger.

II. Kl. *Monocotyledonæae* Juss.

1. Unterkl. *Sympygynæae* A. Rich. (verwachsenweibige).
 45. Ord. *Hydrocharidæae* Bisch. Nixenkräuter: 215. F. *Hydrocharidæae* DC.
 46. Ord. *Seitaminæae* Bartl. Gewürzlilien: 216. F. *Musacæae* DC., 217. F. *Cannacæae* Ag., 218. F. *Amomæae* Rich. (Zingiberacæae Ingwer gew.).
 47. Ord. *Orchidinæae* Bisch.: 219. F. *Orchidæae* Juss. (phyllocaulae, gymnocaulae, exoticae s. epiphytae).
 48. Ord. *Ensætae* Bartl. Schwertblättrige: 220. F. *Bromeliacæae* Lindl. Ananasgew., 221. F. *Amaryllidæae* R. Br. (ohne u. mit Nebenkronen), 222. F. *Iridæae* R. Br., 223. F. *Haemodoracæae* R. Br. Blutwurzart., 224. F. *Hypoxidæae* R. Br. Härtlinge, 225. F. *Burmanniæae* Bartl.

2. Unterkl. *Eleutherogynæae* A. Rich. (freiweibige).

49. Ord. *Liliacæae* Bartl.: 226. F. *Dioscoræae* R. Br. Yamswurzelart., 227. F. *Smilacæae* R. Br., 228. F. *Colchicacæae* DC., 229. F. *Asphodelæae* Bartl. Affodillilien (Zwiebelknollige u. Faserknollige).
 50. Ord. *Palmae* Bartl.: 230. F. *Palmae* L. (*Coryphæae* Fächer-, *Phœnicæae* Fieder- u. *Calamæae* Rotangpalmen).
 51. Ord. *Aroïdæae* Bartl.: 231. F. *Typhacæae* DC. Rohrkolben, 232. F. *Pandanæae* R. Br. Palmkolben, 233. F. *Orontiacæae* Bartl. Kalmusgew., 234. F. *Callacæae* Bartl.
 52. Ord. *Helobiae* Bartl. Sumpflilien: 235. F. *Butomæae* Rich. Blumenbinsen, 236. F. *Alismacæae* Rich. Froschlöffel, 237. F. *Junca-ginæae* Rich. Binsenartige, 238. F. *Podostemæae* Rich. Stielfaden, 239. F. *Najadæae* A. Rich. (*Potamogæae* DC.) Najaden od. Laichkräuter, 240. F. *Lemmæae* DC. Wasserlinsen.
 53. Ord. *Juncinæae* Bartl. Gras- od. Schilfflilien: 241. F. *Commelynæae* R. Br., 242. *Xyridæae* Kth Degenkräuter, 243. F. *Restiacæae* R. Br. Strickgräser, 244. F. *Juncacæae* Binsen od. Halbgräser.

54. Ord. **Glumacēae** Bartl. Balg- od. Spelzblütige: 245. F. Cyperacēae DC. (Cyperēae, Scirpeae Simsen, Caricēae Seggen), 246. F. Graminēae Juss. Gräser (Süssgr.-) (Rispengräser u. Ährengr.-).

B. Cryptogamae L. (*Acotyledoneae* Juss.) Kryptogamen oder Sporenfarnen.

III. Kl. *Cryptogamae vasculares*, Gefüsstkryptogamen.

55. Ord. **Goniocaulae** DC. Gliederfarne: 247. F. Equisetacēae DC. Schafthalme.
56. Ord. **Filičīnae** DC. Farne: 248. F. Rhizocarpēae Batsch Wurzel- od. Wasserfarne, 249. F. Isoëtēae Bartl. (Selaginellēae Frank), 250. F. Lycopodiacēae DC. Bürlappe od. Moosfarne, 251. F. Ophioglossēae R. Br. Natterzungen, 252. F. Filīces Juss. Farnkräuter, Wedel- od. Laubfarne (Marattiacēae Kaulf., Osmundacēae R. Br., Schizaeacēae Mart., Gleicheniacēae Kze., Cyatheacēae R. Br. Baumf., Parkeriacēae Hook., Polypodiacēae Mett.).

B. Plantae cellulare, Zellenpflanzen.

IV. Kl. *Cryptogamae cellulare, Zellenkryptogamen.*

a. Foliosae, beblätterte.

57. Ord. **Muscīnae** DC. Moose: 253. F. Musci Juss. Laubmose (M. frondosi, Bryīnae Schimp. (a. Stegocarpi Deckelfrucht., b. Cleistocarpi Schliessfrucht., c. Schistocarpi C. Müll. Spaltfrucht.), 254. F. Sphagnacēae C. Müll. (Sphagnīnae Schimp.) Torfmoose, 255. F. Anthocerotēae Nees Fruchthornmose, 256. F. Ricciacēae Rehb., 257. F. Hepaticae Juss. Lebermose.
58. Ord. **Siphonocaulae** Bisch. Röhrenalgen: 258. F. Characēae Rich.: Armleuchter.

b. Aphyllae, blattlose.

59. Ord. **Algīnae** Bartl.: 259. F. Lichēnes DC. (a. Gymnocarpi, b. An-giocarpi, c. Collemacēi, d. Byssacei), 260. F. Algae DC. (a. Floridēae Ag. s. Rhodospermēae Harv. Blüten- od. Rot-tange, b. Fucoïdēae Ag. s. Melanospermēae Harv. Leder- od. Schwarz-tange, c. Conservacēae Ag. Fadenalgen, d. Siphonēae Grev. Schlauchalgen, e. Palmellacēae Nāg. Zitteralgen, f. Conjugatae Vauch. Jochalgen, g. Diatomacēae Harv. Stückelalgen, h. Phycchromacēae Rabenhorst Phycchrom-haltige).
60. Ord. **Fungīnae** Bartl. (Mycētes Spr.) Pilze: 261. F. Hymenomycētes Fr. Hautp. (Hutp.), 262. F. Pyrenomycētes Fr. Kernp., 263. F. Gasteromycētes Fr. Bauchp., 264. F. Hyphomycētes Fr. Fadenp., 265. F. Coniomycētes Fr. Staubpilze (Brand, Rost etc.).

Nachzutragen:

- S. 4: **antidrom** (Gegens. zu homodrom) gegenläufig (s. homodromia).
„ 11: **convergens** zusammenneigend, „convergent“.
„ 13: **delphinialis** aus der Dauphinée (Frankr.).
„ 15: **dipyrēnus** mit zwei Steinkernen (näml. drupa).
„ 15: **divergens** auseinanderlaufend.
„ 17: **eximius** aussergewöhnlich, ausgezeichnet.
„ 23: **homodrom** gleichläufig (s. sogl.).
„ 26: **latipes** breitfüssig, -stielig.
„ 34: **orthostichus** m. senkr. Blattzeile (Blattstellung).
„ 34: **ortus** Aufgang, Entstehung (v. orior 4).
„ 35: **parallelinervius** parallel- od. streifenervig (Blatt).
„ 38: **phycoxanthīnum** Tanggelbstoff ($\varphi\tilde{\nu}\kappa\sigma$ u. $\xi\alpha\tau\theta\circ\zeta$).
„ 38: **pinax** ($\pi\acute{v}\alpha\xi$, - $\alpha\zeta\sigma$) Brett, Tafel, Gemälde.
„ 40: **polypyrrēnus** mit vielen Steinkernen (s. pyrēna).
„ 42: **quintuplinervius** fünfnervig (näml. Blatt).
„ 44: **rhachis** Blattspindel d. Fiederblätter ($\delta\acute{v}\chi\iota$; Rückgrat).
„ 54: **triplinervius** dreinervig, -rippig (Blatt).
„ 383: **Coir** (Roya, Kokosfaser) Cocos nucifera.
„ 383: **Copra** (Kopperah, Kokosnusskerne) Cocos nucifera.

Wesentlichere Druckfehler.

- S. 57: **visigēnus** st. **vitigēnus**.
„ 75: Kletten = Labkraut st. Kletten-Labkr.
„ 85: **Bainster** st. **Banister**.
„ 99: **Butaceae** st. **Rutaceae**.
„ 99: **arobescens** st. **arborescens**.
„ 130: **Botrytus** st. -tis.
„ 184: **Glycessia** st. -ceria.
„ 190: -ähren = **Acanthus** st. -ähren-Acanth.
„ 222: **Kiefer** st. **Kieser**.
„ 244: **Auzīa** st. **Auzīā**.

- S. 264 unten: „**Muschia**“ st. „Mu- sche's“.
„ 266 oben: **berry-Myrte** st.-myrtle.
„ 273 oben: **Noisettia** XXI. 6. st. XIX. 6.
„ 287: **hermesina** st. **kermesina**.
„ 288: $\pi\epsilon\lambda\epsilon\zeta\sigma$ st. - $\zeta\sigma$.
„ 294 unten: $\varrho\acute{o}\nu\upsilon\xi$ st. $\varrho\acute{o}\nu\iota\xi$.
„ 298 oben: **Strombus** st. **Strobus**.
„ 299 unten: **Plantaneen** st. **Plat-**.
„ 316 unten: **kochblättrig** st. **kahll-**
blättrig.
„ 386: **Coriari** st. -**ria**.
-

Werke zur Botanik

aus dem Verlage von
T. O. Weigel in Leipzig.

Aus der reichen Sammlung der zumeist wissenschaftlich gehaltenen Werke meines Verlags hebe ich einige hervor, welche auch von allgemeinerem Interesse sind.

Zu den Tafelwerken älteren Ursprungs bemerke ich, dass die Farben der kolorierten Abbildungen nicht mittels der Druckpresse, sondern mit der Hand aufgetragen sind, wodurch die Abbildungen ein wirklich künstlerisches Gepräge erhalten. Hinsichtlich der Schönheit und Naturtreue überragen diese handkolorierten Werke die Erzeugnisse der Druckpresse natürlich ganz ausserordentlich.

Briefe über Humboldt's Kosmos. Ein Kommentar zu diesem Werke für gebildete Laien, bearbeitet von *B. von Cotta, Julius Schaller, W. C. Wittwer und H. Girard.* 4 Teile mit Supplement (Biographie Humboldt's, herausgegeben von Dr. Wittwer), also 5 Bände, mit Karten, lith. Tafeln und vielen Holzschnitten. Ermässigter Preis (früher 46 M 50 Ø).

 10 Mark. 

Ein vortrefflicheres, gediegeneres Werk kann für so mässigen Preis schwerlich geboten werden.

In einer kleinen Anzahl von Exemplaren sind noch vorhanden:

Deutschlands Flora oder Botanisches Taschenbuch. Von **G. F. Hoffmann.** 2 Teile in 3 Abteilungen. Mit 38 handkolorierten Kupfern. 1800—1804. Ermässigter Preis (früher 18 M) 4 M 50 Ø.

Deutschlands Gräser und Getreidearten zu leichter Erkenntnis nach dem Wuchse, den Blättern, Blüten und Früchten zusammengestellt und für die Land- und Forstwirtschaft nach Vorkommen und Nutzen ausführlich beschrieben von **Dr. Carl F. W. Jessen.** Mit 208 Holzschnitten. 1869. 5 M 40 Ø.

Taschenbuch für Gartenfreunde. Eine Erläuterung von 1960 Zierpflanzen nach natürlichen Familien geordnet und mit Nachweisungen zu ihrer Kultur versehen von **H. G. L. Reichenbach.** 1827. Ermässigter Preis (früher 3 M) 1 M.

- Doblhoff**, Über die Drainage. Ein Beitrag z. wissenschaftl. Begründ. u. z. prakt. Ausführg. dieses Systems andauernder Bodenverbesserung etc. 1851. 75 M .
- Drejer, S.**, Symbolae carioeologicae etc. Mit 17 Taf. u. 3 Tab. 1844. 15 M .
- Hedwig, R. Ad.**, Observationum botanicarum Fasc. I. Mit 11 kolor. Tafeln. 1802. 3 M .
- Hoffmann, G. F.**, Deutschlands Flora, od. botan. Taschenbuch. 2 Teile mit 38 kolor. Tafeln. 1800—1804. 3 M .
- v. Holleben**, Aufforstung verödeter Muschelkalkberge unter Anknüpfung an d. Verhältn. im Fürstent. Schwarzburg-Rudolstadt. 2. Aufl. 1862. 1 M .
- Jacquin, Nic. Jos.**, Plantarum rariorū horti Caesarei Schönbrunnensis descriptiones et icones. Mit 500 kolor. Taf. 4 voll. 1797—1804. 240 M .
- **Oxalis**. Monographia, iconibus illustrata. Mit 81 kolor. Tafeln. 1794. (Einziges noch vorhand. Expl.) 120 M .
- Ledebour, C. Fr.**, Icones plantarum novarum vel imperfecte cognitarum, floram Rossicam, imprimis Altaicam, illustrantes. 5 tom. Mit 500 kolor. Tafeln. 1829—1834. 225 M .
- v. Martius, C. Fr. Ph.**, Genera et species palmarum quas in itinere per Brasiliam annis 1817—1820 suscepto collegit etc. 3 voll. Mit 245 kolor. Taf. u. d. Portr. d. Verf. 1823—1840. 1000 M . Mit schwarzen Kupfern 600 M .
- **Nova genera et species plantarum**, quas in itinere etc. 3 voll. Mit 300 kolor. Tafeln. 1823—1829. 300 M .
- **Icones plantarum cryptogamicarum**, quas in itinere etc. Mit 76 kolor. Tafeln. 1828—1834. 120 M .
- **Reise in Brasilien**, auf Befehl Sr. Maj. Max Joseph I. Königs v. Bayern, in den Jahren 1817—1820 gemacht u. beschrieben von Dr. J. v. Spix u. Dr. C. v. Martius. 3 Teile. Mit Atlas. 1823—1831. gr. 4. 100 M .
- **Pflanzen u. Tiere d. trop. Amerikas**. Mit 4 lith. Tafeln. 1831. 4 M 50 A .
- Mettenius, G.**, Beiträge z. Botanik. I. Heft. M. 6 lith. Taf. 1850. 2 M 40 A .
- Paykull**, Fauna Sueciae insulae. 3 tom. 1798—1800. 6 M .
- Persoon, C. H.**, Commentarius ad Jac. Chr. Schaefferi fungorum Bavariae indigen. icones etc. 1800. 8 M .
- **Mycologia Europaea** etc. I. II. III. 1. M. 30 kolor. Taf. 1822—1828. Kart. 24 M .
- Petzholdt, Alex.**, Beitrag z. Kenntnis der Steinkohlenbildung etc. Mit 1 Tafel. 1882. 1 M 50 A .
- Pohl, J. E.**, Plantarum Brasiliæ icones etc. 2 tom. Mit 200 kolor. Tafeln. gr. fol. 1827. (1830) et 1831. In Mappen. 240 M .
- Dasselbe. Pracht-Ausg. auf grossem Papier. 400 M .
- Reise im Innern von Brasilien, in den Jahren 1817—1821 unternommen. 2 Teile. 1837. 50 M .
- Reinsch, P. F.**, Contributiones ad algologiam et fungologiam. I. Mit 131 Tafeln. 1875. Kart. 60 M .
- Neue Untersuchungen über d. Steinkohle des Carbon, des Dyas u. Trias. Mit 94 Tafeln. 1881. Kart. 50 M .
- Mikrophotographien üb. d. Structurverhältnisse u. Zusammensetzung d. Steinkohle des Carbon etc. 73 phot. Darstellngn. nebst einem landschaftl. Titelbilde. 1882. In Mappe. 60 M .
- Dünnenschliffe hierzu. I. Serie zu 24 Stück 61 M . II. Serie zu 12 St. 36 M .
- Schäffer, J. Chr.**, Fungorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascentur, icones, nativis coloribus expressae. Ed. nova comm. aucta a C. H. Persoon. 5 tom. Mit 330 kolor. Tafeln. 1800. 108 M .
- Schmidel, C. Chr.**, Icones plantar. Editio secunda. 3 manipuli mit 75 kolor. Tafeln. 1793—1797. 60 M .
- Vorstellung einiger merkwürdiger Versteinerungen etc. Mit 24 kolor. Tafeln. 1793. 10 M .
- Descriptio itineris per Helvetiam, Galliam et Germaniae partem anno MDCCCLXXIII et MDCCCLXXIV instituti. Mit 2 Tafeln. 1794. 1 M .
- Swartz, O.**, Observationes botanicae, quibus plantae Indiae occidentalis etc. illustr. etc. Mit 11 Taf. 1791. 2 M .
- Flora Indiae occidentalis etc. 3 Tle. mit 29 kolor. Tafeln. 1797—1806. 15 M .
- **Icones plantarum incognitarum**, quas in India occident. detexit atque delin. Ol. Swartz. Fasc. I. Enth. Bog. A. B. mit 13 kolor. Taf. 1794—1800. 9 M .
- Dispositio systematica museorum frondosorum Sueciae. Mit 9 kolor. Tafeln. 1779. 4 M .
- Wulfen, Xav.**, Plantarum rariorum descriptiones. 1805. 1 M .
- Cryptogama aquatica. Mit 1 Tafel. 1803. 2 M 25 A .