

2
7.76
1 N
SIEBENBÜRGENS KÄFERFAUNA

AUF GRUND IHRER ERFORSCHUNG BIS ZUM
JAHRE 1911

ZUSAMMENGESETZT VON


Dr. KARL PETRI

BURGERSCHULDIREKTOR IN SCHAASBURG

HERAUSGEGEBEN

VOM

SIEBENBÜRGISCHEN VEREIN FÜR NATURWISSENSCHAFTEN
ZU HERMANNSTADT



KOMMISSIONS-VERLAG VON
R. FRIEDLÄNDER & SOHN, BERLIN

SIEBENBÜRGENS KÄFERFAUNA
AUF GRUND IHRER ERFORSCHUNG BIS ZUM
JAHRE 1911

ZUSAMMENGESTELLT VON

Dr. KARL PETRI
BÜRGERSCHULDIREKTOR IN SCHAASBURG

HIERAUSGEGEBEN

VOM

SIEBENBÜRGISCHEN VEREIN FÜR NATURWISSENSCHAFTEN
ZU HERMANNSTADT

KOMMISSIONSVERLAG VON
R. FRIEDLÄNDER & SOHN, BERLIN

573
049
912
ENT

Siebenbürgens Käferfauna

auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911

zusammengestellt von

Dr. Karl Petri

Bürgerschuldirektor in Schässburg



Hermannstadt

Buchdruckerei Jos. Drotleff

1912

Vorwort.

Seit dem Erscheinen der letzten entomologischen Arbeit des um die Landeskunde Siebenbürgens so verdienten Dr. phil. h. c. E. A. Bielz im Jahre 1887, welche übersichtlich das Ergebnis der Forschung auf dem Spezialgebiete der Coleopteren-Kenntnis bis zum Schlusse des Jahres 1886 darstellt, sind abermals 24 Jahre vergangen. Dieser lange Zeitraum ist auch an dieser Wissenschaft nicht spurlos vorübergegangen. Es haben sich die Methoden des Sammelns vervollkommenet, es hat sich die Literatur ausserordentlich vermehrt, indem zahlreiche Familien und Gattungen monographisch bearbeitet wurden, wobei das ganze palaearktische Faunengebiet Berücksichtigung fand, es sind die Instrumente der Untersuchung unter dem Einfluss der hohen Entwicklung der Technik leistungsfähiger und vollkommener geworden, der hochentwickelte Austausch von wissenschaftlichem Material hat das vergleichende Verfahren der Untersuchung gefördert, wodurch erst der Charakter der Fauna eines Gebietes ins rechte Licht gerückt und in ein bestimmtes Verhältnis zur Fauna der umgebenden Gebiete gebracht wird, die systematische Wissenschaft hat aber auch unter dem Einfluss der modernen naturwissenschaftlichen Theorien Elemente in sich aufgenommen, die ihr ursprünglich fremd sind, vor allen Dingen Entwicklungsgeschichte und vergleichende Anatomie, auch die Paläontologie wird mehr und mehr herangezogen, um die verwandtschaftlichen Beziehungen der Arten, Gattungen und Familien sicherer festzustellen; die Entomologie ist aus einer rein systematischen zu einer biologischen Wissenschaft geworden, welche nicht nur gewisse äussere, morphologische Verhältnisse von systematischer Wichtigkeit, sondern das ganze Werden und Sein, das Leben der Tiere nach allen Richtungen berücksichtigt. Diese Einflüsse finden ihren Gesamtausdruck auch in der Zusammenstellung und Anordnung der Käferfauna ganzer faunistischer Gebiete, am vollkommensten in denen der ganzen Erde, im sogenannten natürlichen Systeme. Die Kataloge wollen also nicht mehr nur in Linné'schem Sinne als ein mächtiges Fachwerk angesehen werden, dessen Endzweck im wesentlichen ein nomenclatorischer ist, sondern sie geben ein Bild der verwandtschaftlichen Verhältnisse in der Ordnung der Käfer, soweit dieselben gegenwärtig wissenschaftlich festgestellt werden konnten. Es ist natürlich, dass dieses Bild um so lückenhafter ist, je kleiner ein

Faunengebiet abgegrenzt wird, weil darin alle jene Glieder ausfallen, welche nur eine beschränkte Verbreitung besitzen.*

Die Bestrebungen auf dem Gebiete der modernen Entomologie liefern auch das kritische Material, mit Hille dessen das bisher in Geltung gestandene System zahlreiche, wesentliche Veränderungen erfahren hat, die sich zu erkennen geben nicht nur in einer vielfach gegen früher abweichenden Gruppierung der Familien, Gattungen und Arten, sondern auch darin, dass die Charaktere der Abteilungen höheren und niederen Grades wesentlich schärfer gefasst wurden, wobei manche Familien (wie die *Platypidae*, *Metaulacnemitae*) ihre Selbständigkeit verloren durch Verschmelzung mit verwandten Familien, während andererseits manche Gattungen, wie z. B. die Gattung *Phrydiuchus* für *Marmaropus topiarius* Germ. und *Speiseri* Schultze, die Gattung *Brachyodontus* für *Rhytidosomus Reitteri* Weise, drei neue Arten und für *Amatus alpinus* Hampe etc. neu aufgestellt, und frühere Untergattungen zum Range von Gattungen erhoben werden mussten, so z. B. die frühere Untergattung *Phytonomus* Schönh., in der alten Gattung *Plinthus* die frühere Untergattung *Neoplinthus* Bedel; die alte Gattung *Cleonus* wurde sogar in 23 neue Gattungen zerteilt.

Von grosser Wichtigkeit gerade in entwicklungsgeschichtlichem Sinne ist die Variabilität der Arten. Die Vertreter einer Gattung zeigen alle untereinander eine gewisse Verwandtschaft. Ist die Stammform ausgestorben, welche gleichsam den Typus der Gattung darstellt, so führt die Entwicklung in verschiedenen Verbreitungsgebieten in divergierender Richtung zur Entstehung neuer Arten, die ganz bestimmt von einander unterschieden werden können. Doch kommt es wohl nicht selten vor, dass die Stammform, oder was man als solche nach dem gegenwärtigen Stande der Erkenntnis anzunehmen geneigt ist, in manchen Gebieten noch anzutreffen ist, in andern aber bereits zu divergieren beginnt: es entstehen die Varietäten oder Lokalrassen. Den Beginn dieser

* Ich habe mich auf die obigen Ausführungen auch aus dem Grunde hier näher eingelassen, um der Behauptung entgegenzutreten, dass einseitige Katalogisierung die wichtigste und einzige Aufgabe der modernen Systematik sei (vergleiche L. Ganglbauer: Die Käfer Mitteleuropas), obgleich auch der vielseitige Wert dieser wissenschaftlichen Beschäftigung nicht zu unterschätzen sein wird. Dieselbe schliesst ja vielmehr die Biologie als eine ihrer wesentlichen Aufgaben ein, und wenn gefordert wird, dass letztere intensiver zu betreiben sei, so geschieht dies aus dem Grunde, weil wir von verhältnismässig nur sehr wenigen Käfern ihr Leben in allen seinen Beziehungen kennen. Die Forderung ist also wohl berechtigt, und ich schliesse mich derselben aus vollem Herzen an, nur muss betont werden, dass zweckmässig zu betreibende Biologie, ich möchte sagen „experimentale Systematik“, nur im Zusammenhang mit Systematik denkbar ist, und dass die Pflge dieses Teiles der Wissenschaft viel frei verfügbare Zeit, Geduld, Ausdauer und Scharfsinn erfordert, was denn wohl auch mit die Ursache ist, dass so Wenige sich mit ihr beschäftigen können, obgleich das zu erstrebende Ziel, den Schleier von so manchem tiefen Geheimnis im Leben der Käferwelt mehr und mehr zu lüften, ein so lockendes ist, und wohl auch von vielfachem praktischem Nutzen sein würde.

Divergenz deuten bereits die individuellen Abweichungen an, wofür ein prächtiges Beispiel die Coccinelliden abgeben. Daher hat die moderne Entomologie die schwierige Aufgabe, auch diesen zahlreichen Variationen ihre eingehende Beachtung zu schenken, weil sie in ihnen das Mittel erkannt hat, die Verwandtschaft der Arten festzustellen und dadurch auch für die Entwicklungslehre ein reiches, nicht zu unterschätzendes Beweismaterial zu liefern.

Aber nicht nur in Beziehung auf den gegenwärtigen Stand der Systematik entspricht die Bielz'sche Käferfauna Siebenbürgens nicht mehr den gegenwärtigen Anforderungen, sondern es hat sich auch die Zahl der in Siebenbürgen seit ihrem Erscheinen aufgefundenen Arten bedeutend vermehrt. Das älteste systematische Verzeichnis der Käfer Siebenbürgens, welches von E. A. Bielz im I. Jahrgang der „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften 1850“ und im II. Jahrgang derselben Zeitschrift 1852 veröffentlicht wurde, enthielt 2220 Arten und 16 Varietäten und wurde durch spätere Nachträge bis Ende des Jahres 1853 um 257 Arten und 3 Varietäten, also auf 2477 Arten und 19 Varietäten vermehrt. Das von Karl Fuss im „Archiv für siebenbürgische Landeskunde“ unterm 15. Juni 1869, also 16 Jahre später, veröffentlichte Verzeichnis wies zusammen mit den in den „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenb. Vereins für Naturwissenschaften“ XXI. Jahrgang 1871, XXIII. Jahrgang 1873 und XXIV. Jahrgang 1874 einen Stand von 2983 Arten, also innerhalb 20 Jahren einen Zuwachs von 506 Arten aus. Die bis zum Schlusse des Jahres 1886 reichende, im XXXVII. Jahrgang der „Verhandlungen und Mitteilungen des siebenb. Vereins für Naturwissenschaften“ im Jahre 1887 wieder von E. A. Bielz veröffentlichte Käferfauna Siebenbürgens ergab einen Stand von 75 Familien, 936 Gattungen, 3705 Arten und 320 Varietäten, demnach den ansehnlichen Zuwachs von 722 Arten innerhalb 12 Jahren.

Dank der unermüdlichen Sammelthätigkeit unserer siebenbürgischen Entomologen Friedrich Birthler in Sächsisch-Regen, Friedrich Deubel in Kronstadt, M. v. Kimakowicz in Hermannstadt, Alexander Ormay, einstigen Gymnasialprofessors in Hermannstadt, Ludwig Méhely, einstigen Realschulprofessors in Kronstadt, A. Müller in Hermannstadt, Eduard Scheeser in Kronstadt, Rudolf Albrecht in Hermannstadt, Karl Höchsmann, Bürger-schulprofessors in Schässburg, und des Verfassers, dann mehrerer ungarischer und zahlreicher deutscher, namentlich Wiener Entomologen, welche gelegentliche Sammeltouren in Siebenbürgen unternahmen, hat die Zahl der in Siebenbürgen nachgewiesenen Käfer innerhalb der letzten 24 Jahre abermals um 1 Familie, 181 Gattungen, 1058 Arten und 82 Varietäten zugenommen, wozu noch 324 Aberrationen hinzukommen, so dass sich ein gegenwärtiger Stand von 76 Familien, 1117 Gattungen, 4763 Arten, 402 Varietäten und 324 Abänderungen ergibt. Die auffallend starke Vermehrung der Gattungen ist zum Teil auf Rechnung des oben erwähnten Umstandes zurückzuführen.

Ich halte es für angezeigt, das immerhin schöne Ergebnis der Durchforschung der siebenbürgischen Landesteile Ungarns im wesentlichen durch die deutsche Arbeit von 9 Dezennien bekannt zu geben, namentlich auch um der Gefahr vorzubeugen, dass dasselbe spurlos verschlungen werde in einem Käferkatalog, der das gesamte Königreich Ungarn umfassen wird, in dem die siebenbürgischen Landesteile als *Hungaria orientalis* figurieren werden und dem auch die magyarisierende Tendenz unserer gegenwärtig noch üblichen Orts-, Fluss- und Gebirgsnamen nicht abzusprechen ist. Mit aus diesem Grunde habe ich und zwar nicht in Abkürzung, wie dies im Bielz'schen Verzeichnis der Fall ist, die ausgeschriebene, gegenwärtig noch in Geltung befindliche und allgemein bekannte Lokal-Nomenclatur verwendet.

Die Veröffentlichung des neuen Käferkataloges ist notwendig auch darum, weil sich in das Bielz'sche Verzeichnis zahlreiche Irrtümer eingeschlichen haben, wie sie sich bei der Schwierigkeit der Determination mancher Spezies auch in andern Verzeichnissen einstellen. Die Richtigstellung konnte an vielen Orten erfolgen und ist durch entsprechende Fussnoten angezeigt. In solchen Fussnoten ist auch auf solche Arten aufmerksam gemacht, deren Vorkommen bei uns zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, aber aus verschiedenen Gründen wenig wahrscheinlich ist. Hieher gehören auch solche Spezies, deren Vorkommen in den benachbarten Faunengebieten verbürgt ist, von denen jedoch eine nahe verwandte Art in neuerer Zeit beschrieben wurde, die wahrscheinlich die Stelle jener Form bei uns vertritt. So führt z. B. Bielz die in Oesterreich und in der Schweiz vorkommende *Laena viennensis* Sturm für Siebenbürgen an, da die vicariirende *Laena Ormay* Reitter erst 1887, also ein Jahr nach dem Erscheinen seiner »Fauna transsylvanica«, beschrieben wurde; ferner soll sich nach Bielz der *Liparus dirus* Herbst bei uns finden, weil ihm der viel später beschriebene *Liparus transsylvanicus* m. unbekannt war; auch der den Ländern des Mittelmeergebietes eigentümliche *Larinus longirostris* Gyllh. wird für den dem südöstlichen und östlichen Europa eigenen *Larinus Beckeri* m. angeführt usw. Es wird die Aufgabe unserer Entomologen sein, die endgiltige Berichtigung dieser zweifelhaften Fälle vorzunehmen.

Für die relative Richtigkeit der Angaben im neuen Verzeichnis bürgt auch mit der Umstand, dass das reiche und schöne Sammelergebnis unseres erfahrenen und erfolgreichsten Sammlers, Friedrich Deubel in Kronstadt, fast vollständig und auf das sorgfältigste von Autoritäten auf dem Gebiete der Entomologie determiniert wurde, wie Regierungsrat L. Ganglbauer, Direktor der zoologischen Abteilung des kaiserlichen Museums in Wien, kaiserlicher Rat Edmund Reitter in Paskau, Dr. Karl Daniel in München und Dr. Josef Daniel in Ingolstadt, Oberst Schultze in Detmold (+), Dr. Eppelsheim in Germersheim (+), Stierlin in Schaffhausen (+), Dr. Krauss in Marburg (Steiermark), Dr. Holdhaus in Wien, Dr. Bernhauer in Grünberg (Oberösterreich), Dr. Flach in Aschaffenburg,

Schilsky in Berlin, J. Weise in Niederschönhausen-Berlin, Oberpostrat Formanek in Brünn u. a. Ebenso haben es die Professoren Ormay und Méhely gehalten und in zweifelhaften Fällen, namentlich wenn die nötige Literatur mangelte, hat auch der Verfasser die Unterstützung eines Teiles der angeführten Herren nie vergebens in Anspruch genommen, wofür denselben auch hier der verbindlichste Dank ausgesprochen wird.

Besonders wertvoll und auch reich an Erfolgen sind die Sammel-touren gewesen, welche L. Ganglhuber in Siebenbürgen unternommen hat, namentlich ist es die Sammelreise in das Rodnaer Gebirge, deren Ergebnis er in den Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Band XI, Heft 2, 1896 veröffentlicht hat.

Die Resultate einer vierjährigen Sammelperiode im südlichen und westlichen Siebenbürgen publizierte Professor Alexander Ormay in der Beilage zum Schulprogramm des Hermannstädter Staatsgymnasiums 1888 unter dem Titel »Adatok Erdély bogárfaunájához«. Er beschrieb in demselben an neuen Arten: *Pherosilchus Elelkae*, *Sphaerosoma Reilleri*, *Meleus Elekeschii*.

Das Ergebnis einer ebenfalls vierjährigen Sammelarbeit im Kronstädter, Fogarascher, Háromszéker, Udvarhelyer, Csiker, Maros-Tordaer, Kolosér und Szolnok-Dobokaer Komitat veröffentlichte der Oberrealschul-professor Ludwig Méhely in »Az értesítő tudományos közlemények, termész. tudom. szak.«, XX. Jahrgang, 2. Heft 1895.

Eine lobenswerte, mit analytischen Tabellen versehene Arbeit, bestimmt für die Hand der Schüler, schrieb im Programm des Klausenburger röm.-kath. Obergymnasiums vom Jahre 1890/1 unter dem Titel »A kolozsvári bogárgyűjtő« Dr. Aloysius Pachinger. Abgesehen von dem pädagogischen Werte dieser Arbeit kann dieselbe mit Rücksicht auf die Bereicherung unserer Landeskunde nur mit Vorsicht benützt werden, da das von Schülern viele Jahre hindurch zusammengetragene Material mit Rücksicht auf seine Herkunft sehr unsicher ist und kaum aus der Umgegend von Klausenburg allein abstammen dürfte.

Ernst Csiki, Kustos an der zoologischen Abteilung des ungarischen National-Museums, schrieb in »A pótfüzetek (LV.) állattani közleményei,« 1900: »Magyarország cicindela-féléi« (*Cicindelidae*), in den Annales musei nationalis hungarici IV. Jahrgang 1906) »Beiträge zur Kenntnis der ungarischen *Morphocaraben*.« Beschreibungen mehrerer Blindkäfer Siebenbürgens lieferte derselbe in Annales musei nationalis hungarici II, 1904 von *Pholeuon hungaricum*; in derselben Zeitschrift I, 1903 unter dem Titel »Magyarországi új bogarak« von *Anophthalmus Deubelianus*; in derselben Zeitschrift III, 1905 von *Anophthalmus pseudoparocetus*; in »Rovartani lapok« XI, 1904 von *Anophthalmus Sziladyi*; in »Természeti füzetek« 24, 1901 von *Anophthalmus Mallászi*; in »Állattani közlemények« I, 1902 von *Anophthalmus Bielzi* var. *transsylvanicus*, welchen Ganglbauer in den Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien, 1899 als *Anophthalmus pilosellus* Mill. gedeutet hatte.

Meine eigenen, auf Siebenbürgen bezüglichen Arbeiten, welche, soweit sie umfassenderer Art sind, immer auch die siebenbürgische Fauna berücksichtigen, sind folgende: Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, Hermannstadt 1891: Ueber den Stand der Coleopterenfauna Schässburgs; in derselben Zeitschrift 1901: Monographie des *Coleopterentribus Hiperini*; in derselben Zeitschrift XLIV, 1894: Monographie des *Coleoptereugenus Liparus Otiv*; Wiener entomologische Zeitung XXV, 1906: *Matthodes serbotae*; ebenda XXVI, II, 1907: Vier neue Rüssler aus Turkestan und eine neue *Crepidodera* aus Siebenbürgen; ebenda XXII, 1903: *Agabus regalis* vom Bulea-see; ebenda 1904 und 1905: Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, LV. *Genus Lixus*; Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1902: *Otiorrhynchus amplus* und *Quedius decoratus*; Annales musei nationalis hungarici VI, 1908: I. Eine neue blinde Scydmaeniden-Gattung aus Ungarn (soll heissen Siebenbürgen); II. Beitrag zur näheren Kenntniss der *Saulcyella Schmidti Maerkel*; III. Eine neue Cleonide aus Turkestan; Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Brünn: Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, LX.: *Genus Larinus* und Verwandte; Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, IV. Band 1896: Revision der Gattung *Plinthus*.

Ich halte es für überflüssig, die zahlreichen übrigen kleinern Arbeiten nicht siebenbürgischer Autoren hier besonders anzuführen, da sie für jede Species in dem Catalogus coleopterorum Europae etc. von Heyden etc. 1906 zu finden sind. Doch halte ich es für eine Ehrenpflicht, bei dieser Gelegenheit auch jenes Mannes zu gedenken, der uns am Beginne der letzten Periode (1887—1910) im Jahre 1891 die „Fauna transsylvanica“ geschenkt. Es ist der frühere Dozent an der kaiserlichen Universität Dorpat, jetzt Privatgelehrter in Ebenhausen (Bayern), Dr. Georg von Seidlitz. Dieses Werk ist der Anstoss geworden zu vertiefter, mit neuem Eifer und einem gewissen Sicherheitsgefühl begonnenen und fortgeführten Arbeit auf dem Gebiete unserer heimischen Entomologie. Das Werk, wenn es auch wie jede andere so umfassende Arbeit gewisse Mängel besitzt, ist bis jetzt einzig in seiner Art und vollständig noch durch kein anderes gleichwertiges ersetzt (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, ist noch nur Torso), auch hat es eine Bedeutung gewonnen, die es zu einem unentbehrlichen Handbuch nicht nur für die baltischen Provinzen und Siebenbürgen, sondern für ganz Europa macht. Wenn neben demselben in zweifelhaften Fällen auf die Originalbeschreibungen zurückgegangen werden muss, so glaube ich, dass das auch bei allen andern kompendiösen Zusammenfassungen (Bestimmungstabellen Reitter's) der Fall sein wird; aber gerade diese Kürze hat auch den Vorzug, die sichere Determination wenigstens von Familie und Gattung, oft auch der Art ausserordentlich zu erleichtern und zu beschleunigen, indem sie vieles Nachschlagen in zerstreuten Werken erspart. Es ist seiner Anlage

und Durchführung nach auf streng wissenschaftlichen Grundsätzen ausgearbeitet, und wenn die strenge Kritik, die der Verfasser gelegentlich übt an Autoren, ihren Beschreibungen und an ihrer zuweilen jeder Wissenschaftlichkeit entbehrenden Willkürlichkeit, so erscheint mir das als ein Verdienst, das wohl dem Verfasser manchen offenen und heimlichen Gegner geschaffen hat; jeder wahre Freund der Wissenschaft aber freut sich dieses grossen „Reinmachens“ mit dem scharfen Besen der Kritik. Mir selbst ist das Werk eben wegen seiner kompendiösen Kürze unentbehrlich geworden, namentlich bei Bestimmung der Familie und Gattung, wenn es auch ernster Arbeit bedarf, um sich in demselben mit Leichtigkeit zurechtzulinden. Und so sei dem Verfasser, der uns auch mit einer ganzen Reihe neuer Arten beschenkte, wie *Carabus decorus*, *Dyschirius latipennis*, *Anophthalmus Bielzi*, *Gyrinus hungaricus*, *Cyrtusa Fussi*, *Oliorrhynchus edentatus*, *Paophilus Hampei*, *Brachysomus transsylvanicus*, *Borypythos globus*, und der mit unsern siebenbürgischen Entomologen, besonders früher, stets in freundschaftlicher Föhlung gestanden ist, der herzliche Dank für seine schöne Gabe auch an dieser Stelle, wenn auch spät, so doch nicht zuspät, dargebracht.

Und somit übergebe ich die jüngste „Fauna transsylvanica“ voll Vertrauen der Öffentlichkeit. Möge auch an ihr die echte Kritik ihre Aufgabe erfüllen, damit, was unbeabsichtigt an Fehlern und Irrtümern enthalten ist, nach wissenschaftlichem Rechte falle, das Neue, das noch aufzufinden sein wird — denn mancher Teil Siebenbürgens ist noch gründlicher zu durchforschen —, hinzugefügt werde, möge sie, kurz gesagt, ein neuer Anstoss werden für unsern jüngeren Nachwuchs, seine Arbeit auf dieses schöne und interessante Gebiet zu verlegen, damit in absehbarer Zeit unser wahrer Besitz, auch was diese Kleinwelt anbetrifft, immer zuverlässiger und genauer festgestellt und verbucht werde. Ich hoffe, es werden sich immer noch neue Arbeiter finden, welche auch auf diesem Gebiete die Fahne sächsisch-deutscher Forschung hochhalten werden.

Schässburg, den 15. August 1910.

Dr. Karl Petri.

Berichtigungen und Ergänzungen.

- Pag. 6 Z. 30 v. o. ist vor a. Bielzi zu setzen; a. Deubelianus Fleischer (C. Pareysi v. Deubelianus Fleischer, W. c. Z., August 1911, Heft VI/VII). Nach Csiki eine aberrante Form des C. v. euehromus.
- Pag. 32 Z. 1 v. o. lies „ovipennis“ statt ovipunnis.
- Pag. 42 Z. 4 v. o. ist nach crepitans einzuschalten: **Ganglbaueri** Apfb. Karlsburg, Schässburg (c. a.).
- Pag. 42 Z. 6 u. 7 v. o. ist bei psophia Karlsburg, Schässburg (c. a.) zu streichen. Br. psophia wird bei uns wahrscheinlich durch Ganglbaueri ersetzt. Nach Fleischers Bestimmung kommen bei uns auch vor folgende zwei Arten: —
- Pag. 65 Z. 9 v. u. hinter gracilis: Sc. debilis Hochh. Alsó-Rákos, Rotenturm (Deubel).
- Pag. 74 Z. 25 v. o. vor punctus einzuschalten: Ph. puella Nordm. Alsó-Rákos (Deubel).
- Pag. 86 Z. 7 v. u. ist als Aberration zu Br. exigna zu setzen: a. **colorata**. Ausser den Beinen und Fühlern sind auch die Flügeldecken und die beiden ersten Abdominalsegmente gelb. Schässburg (c. a.).
- Pag. 97 Z. 13 v. u. ist bei rigidicornis hinter (Glashütte) einzuschalten „Vajda-Hunyad“.
- Pag. 136 Z. 4 v. u. ist hinter (Müller) einzuschalten „Vajda-Hunyad (c. a.)“.
- Pag. 146 Z. 5 v. o. vor morosa ist einzuschalten: **marginata** Küst. Vajda-Hunyad (c. a.).
- Pag. 148 Z. 13 v. u. lies „Calytis“ statt Cadytis.
- Pag. 149 Z. 8 v. o. lies „Thymalus“ statt Tymalus.
- Pag. 160 Z. 23 v. o. lies „Cathartus“ statt Chatartus.
- Pag. 161 Z. 8 v. u. ist vor Passandrii einzuschalten: **Lathropus Erichs. sepicola** Müll. Karlsburg unter den Weingärten vom Zaune geklopft (c. a.).
- Pag. 170 Z. 33 v. o. ist Baassen (c. a.) zu streichen.
- Pag. 183 Z. 23 v. u. lies „Mysia“ statt Misia.
- Pag. 185 Z. 3) v. o. ist hinter (Bielz) einzuschalten „Vajda-Hunyad (a. c.)“.
- Pag. 187 ist vor Helodidae als Familienname XXXIX zu setzen, entfällt also vor Dascillidea.
- Pag. 215 Z. 17 v. o. lies „Hedobia“ statt Hodobia.
- Pag. 217 Z. 17 v. u. lies „Caenocara“ statt Coenocara.
- Pag. 281 Z. 25 v. o. ist hinter pallida einzuschalten: **nigriceps** Redt. Schässburg (c. a.).
- Pag. 289 Z. 16 v. o. ist hinter der Gattung Charagus einzuschalten:

Pseudochoragus n. g.

Antennae breviusculae, marginem posteriorem thoracis haud attingentes, 9-articulatae, juxta marginem inferiorem oculorum insertae, articulis duobus basalibus crassioribus, quattuor sequentibus tenuioribus, clava triarticulata, subdepressa, articulis subrotatis. Rostrum breve, subplanum, apice subdilatatum. Oculi laterales, subovati, convexi, haud prominenti. Thorax convexus, subcylindricus, antice rotundato angustatus, lateribus haud, ante basin elevato-marginatus, basi subbispinatus. Scutellum minutissimum. Elytra oblongo-ovata, basi latitudine thoracis, margini posteriori thoracis applicata, convexa, pygidium haud tegentia, striatopunctata. Pedes breviusculi, posteriores vix crassiores, tibiis rectis, tarsis brevioribus, 4-articulatis, articulis basalibus angustis. art. 3^o bilobato, subdilatato, art. ultimo vix elongato. Coxae anteriores globosae, paulo prominentulae, haud separatae, coxae posteriores aequilate distantiae.

Die Gattung gehört in die Subfamilie der Choragini und steht in nächster Verwandtschaft mit der Gattung Choragus, von welcher sie sich wesentlich nur durch die 9-gliedrigen Fühler unterscheidet. Mir ist nur folgende Art bekannt geworden:

brachycerus n. sp. Long. 14–15 mm

Dem Choragus Sheppardi sehr ähnlich, aber schmaler und etwas kleiner, pechschwarz, Basis der Föhler, Schienen und Tarsen rotlichgelb, Kopf und

Halschild matt, sehr dicht und fein maschig punktiert, Flügeldecken glanzend, äusserst zart und zerstreut anliegend behaart. Die beiden ersten Fühlerglieder länger als breit, das erste cylindrisch, etwas gebog n, das zweite nach aussen gerundet erweitert, etwas breiter als das erste, die folgenden vier Glieder länger als breit, dünn, von abnehmender Länge, die zwei ersten Glieder der scharf abgesetzten Keule kaum so lang als breit, das letzte eiförmig. Büschel kürzer als breit, Stirne flach gewölbt, kaum schmaler als der Büschel. Halschild cylindrisch, gewölbt, vor der Mitte nach vorne stark gerundet verengt, die schwach erhabene Leiste vom schwach zweibuchtigen Hinterrande schmal, aber deutlich und überall gleichweit entfernt, in der Mitte der Scheibe häufig eine leichte Längsvertiefung. Die langlich eiförmigen Flügeldecken sind an der Basis genau von der Breite des Halschildes und dem Hinterrande desselben eng angeschlossen, an den Seiten etwas gerundet erweitert, grösste Breite etwas hinter der Mitte, an der Spitze gemeinsam abgerundet, das Pygidium nicht bedeckend, punktiert-gestreift, die Streifen schwach vertieft, an der Spitze etwas verworren, die Zwischenräume wenig gewölbt, fast glatt.

Ich sammelte diese Art in einem Exemplar wahrscheinlich durch Klopfen an einem Zaun unter den Weingärten oberhalb der Festung in Karlsburg, besitze jedoch auch zwei Exemplare aus Trenosin in Nordungarn, welche mir von Dr. Branssik als Choragus piceus zugesendet worden sind.

Adephaga.

I. Cicindelidae.

Cicindelinae.

1. Cicindela Dej.

- soluta* Latr. Kronstadt (Méhely).
silvicola Latr. Durch das Gebiet verbreitet, auf sonnigen Waldwegen bis in das Gebirge (Frecker Geb., Serbota).
hybrida L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, namentlich an dem Ufer süsser Gewässer.
 var. *riparia* Latr. Rodnag. (Vale vinului), Vargyastal (Deubel); Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz).
campestris L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, an sonnigen Bergabhängen, Waldwegen bis ins Gebirge.
 a. *coerulescens* Beuth. Zood, Puj (Hätszeg, Csiki).
 a. *connata* Heer. Schässburg (c. a.)*
 a. *manca* D. Torre (afinis Heer). Hermannstadt (Csiki); Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel).
 a. *funeris* Sturm. Kronstadt (Méhely); Petrozsény (Deubel).
germanica L. Karlsburg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Thalheim, Unterkerz, Fogarasch, Persány, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh), Borszék, Sächs.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay). In den Flusstälern auf sandigen Feldern und Wiesen.
elegans var. *stigmatophora* Fisch. Torda, Szamosfalva bei Klausenburg (c. a.). Auf Salzboden. Die Dilaceral-Form mit vollständig unterbrochener Mittelbinde sehr selten.
chiloleuca Fisch. Déva, Reussmarkt, Salzburg, Torda, Szamosfalva, Baassen, Eidisch, Zsabenitza, Szamosfalva, Mezőség (Záh). Auf Salzboden, höchstens sekundär durch Ueberschwemmungen an andern Lokalitäten.
 In Schässburg findet sich diese Art nicht.
litterata var. *viennensis* Schrank. Porcesed, Mediasch, Schässburg, Nagyenyed, Záh, Sächs.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a., in Flusstälern); Dicső-Szt.-Márton (Csiki); Nussbach (Deubel).
lunulata F. Auf Salzboden, nur sekundär an anderen Orten.
 a. *fabricii* Beuth. Torda, Szamosujvár (Csiki).
 a. *barbara* Cost. Klausenburg (Meleg völgy, Tarcsahegy, Csonthehy, Csiki).

* Sammlung des Verfassers.

- a. *memoralis* Oliv. Schässburg (c. a., bei einer Ueberschwemmung der Kokei).
 a. *ragusae* Beuth. Salzburg b. H. (Csiki).
 a. *conjunctae-pustulata* Doktat. Salzburg, Torda (Csiki).
 a. *venatoria* Poda. Torda (Biró).

II. Carabidae.

Carabinae.

2. Cycchrus Fabr.

- rostratus* L. Paringul, Mádo, Gölzenberg, Präsbe, Kerzer, Arpascher Geb., Kronstadt, Schullergebirge, Bucsecs, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Grossschenk, Záh, Hargita, Marosgebirge (Bielz); Schanta, Gyógy, Remele (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Rotenturm, Retjezat, Nagyenyed, Rodnag. (c. a.).
 var. *Hoppei* Ganglb. (elongatus Hoppe). Hätszeg. Geb., Retjezat (Bielz); Porkovica (Ormay).
 Ob wir den 19-23 mm grossen Hoppei Ganglb. haben, wäre erst sicherer zu erweisen, da meine Exemplare vom Retjezat zwar schlanker, aber nicht grösser als die Stammform sind.
 var. *pygmaeus* Chd. Surian, Zibinsjaser, Surul, Kerzer Geb. (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay); Bucsecs, Frecker Geb. (Serbota), Retjezat, Paringul, Borszék, Rodnag. (c. a.).
semigranosus Pall. Zemeschter Gebirge, Kronstädter Gebirge (Deubel).
 var. *balkanicus* Hopff. Schieltal (Zenoga), Zood, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Dragus, Fogarasch, Kronstadt, Schullergebirge, Nussbach, Bithalm, Mediasch, Schässb. (Bielz); Ompolyitzafal (Karlsburg, c. a.); Rodnag. (c. a.); Vargyastal (Deubel); Rotenturm (Ormay).
attenuatus F. Bithalm, Mediasch (Bielz); Bodzaer Gebirge (Deubel).

3. Calosoma Weber.

- inquisitor* L. Hermannstadt, Grossscheuern, Szombat, Grossschenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Bistritz (Bielz). In Eichenwäldern.
 (Callipora.)
sycophanta L. Mühlbach, Hermannstadt, Reussdörfel, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Szamosujvár (Ormay).
 var. *severum* Chd. Siebenbürgen (Klausenburg).

4. Procerus Dejean.

- gigas* Creutz. Rotenturmpass (Bielz).

5. *Carabus Latr.*

(Procrustes.)

corlaceus L. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzungen, Götzenberg, Präße, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tömöscher Pass, Bucsecs, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Bolzaer Pass, Nussbach, Gross-Schenk, Birthälm, Mediasch, Schässburg, Borszék, Sächsisch-Regen, Bistritz, Rodna, Klausenburg (Bielz).

Bielz hält die Rassen dieser Art, die allerdings ineinander übergehen, nicht auseinander; ich führe die Fundorte für die Varietäten daher an, soweit sie in meiner Sammlung vertreten sind. *V. subrugosus* Kr. ist nach dem europäischen Katalog synonym mit *Var. Hopfkarteni* Kr., der bei uns nicht beobachtet wurde, während die der *Var. spretus* Dej. genäherte Form (*V. banaticus* Redtenb.) nachgewiesen wurde.

var. rugifer Kraatz. Csukás, Előpatak, Nagyenyed, Schässburg, Borszék, Rodnagebirge (c. a.).

var. spretus Dej. (banaticus Redtenb.). Déva, Karlsburg (c. a.); Klausenburg (Dr. Pachinger).

(Pseudocoebeus.)

irregularis F. Götzenberg, Präße, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge, Kuhhorn (Bielz); Schanta (Ormay).

var. Montandoni Buys. (Peronae Hopffg.) Zood, Kronstadt, Bucsecs, Tömöscher Pass, Piatra-mare, Hosszufalu, Tesla, Dongókő, Bolzaer Pass (Bielz); Bistra, Schuler Geb., Frecker Gebirge, (Serbota, c. a.).

(Megodontus.)

planicollis Küst. Schieltal (Strazsa), Dusch, Präße, Sterpu, Zood, Surul, Fogarascher Gebirge, Frecker Jäser, Porumbacher Gebirge, Negoi, Kerzer Gebirge, Bulea-Jäser, Frecker Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Paringul, Retjezat, Bistra (c. a.).

var. verae Csiki. Südöstliche Geb. (Csiki).

Deubeli Reitter. Bucsecs (c. a.).

violaceus L. Rodnagebirge, Frecker Geb. (Serbota), Malomviz, Rotenturm, Szurdok-Pass (c. a.).

Bielz führt nur die Stammform an und die Varietät *cyaneolimbatus* Kr., die bei uns jedenfalls nicht vorkommt. Ich beschränke mich daher bei der Angabe der Fundorte auf diejenigen Formen, die in meiner Sammlung vertreten sind.

var. obliquus Thoms. Kerzer Geb. (Bielz).

Das Vorkommen dieser Varietät mit ihrer Aberration ist noch zu erweisen, da sie nicht mehr gesammelt worden ist.

a. Germari Sturm. Präße, Kerzer Geb., Bodzaer Pass, Kuhhorn, Borgoer Pass (Bielz).

a. pygmaeus f. n. Schässburg (c. a.).

C. violaceus a. **pygmaeus**. Länge 20 mm. Sie hat Grösse und Gestalt des *C. nesi* Hoppe, aber die matten, fein gekörnten Flügeldecken des typischen *violaceus* mit goldgrünen Rändern der Flügeldecken und einem ähnlichen unbestimmten Fleck in den Grübchen neben den Hinterwinkeln des Halsschildes.

Der Seitenrand des Halsschildes ist vorne schmaler, hinten breiter abgesetzt als bei der typischen Form. Das vorliegende Exemplar ist wohl nur eine Zwergform des typischen *violaceus*.

var. Méhelyi Ganglb. Fogarascher Gebirge, Bucsecs, Schässburg, Előpatak (c. a.).

var. macilentus n. v. Schässburg, Bistra.

C. violaceus var. **macilentus** n. v. Herr Reitter, dem ich diese Varietät vorlegte, bezeichnete sie als *var. macilentus*, ohne sie beschrieben zu haben; ich akzeptiere den Namen. Sie hat dieselbe Grösse, wie *var. méhelyi*, ist aber auch im weiblichen Geschlechte schlanker als diese und in beiden Geschlechtern lebhaft, wie lackiert glänzend. Der Seitenrand der Flügeldecken ist blau oder grün, die Punktierung von Kopf und Halsschild etwas feiner, aber runzlicher, die Flügeldecken sind kaum gekörnt, sondern sehr fein, aber deutlich verworren runzlig punktiert, die primären Grübchen nicht aegdentet. Länge 25–27 mm.

(Chaetocarabus.)

intricatus L. In den Wäldern des ganzen Gebietes unter Baumrinden oder in faulem Holz.

var. angustatus Haury. Schässburg (c. a.).

(Mesocarabus.)

catenulatus Scop. Königstein, Nagyhagymás, Egyeskő (Balánbánya, c. a.). Scheint ausschliesslich in Kalkgebirgen zu leben.

(Platycarabus.)

Fabricii Panz. Rodnageb. (Bielz).

var. malachiticus Thoms. Rodnageb. (Bielz, c. a.); Kelemengebirge (Müller).

(Hydrocarabus.)

variosus Fbr. Durch das ganze Gebiet verbreitet, an sumpfigen Stellen.

var. castulifer Fleischer. Bihar Komitat (Fleischer).

(Chrysocarabus.)

auronitens F.

var. Escheri Pall. In allen Gebirgen unter Baumrinden und Steinen.

a. funestus Csiki. Paringul.

var. laevipennis Seidl. Rodnagebirge, Marosgebirge, Görgénygeb., Kronstädter Gebirge.

a. opacus Haury. Zusammen mit dem vorigen.

(Tomocarabus.)

convexus F. Hátszeg, Schieltal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präße, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, Hargita, Sächsisch-Regen, Marosgeb. (Bielz); Mezőfele (Maros-Tordaer Kom.), Szamosujvár, Rotenturm (Ormay); Detunata (Mallász); Bükszád, Dees (c. a.).

var. Merkli Hopffg. Kerzergebirge, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz).

a. gracilior Géh. Siebenbürgen.

(Callistocarabus.)

marginalis F. Hermannstadt, Grossau, Marosgebirge (Bielz).

Bielz kannte die Varietät *decorus* Seidl. nicht; es ist wahrscheinlich, dass *C. marginalis* F. bei uns nicht, sondern nur die Varietät vorkommt.

var. decorus Seidlitz. Rátosnya (Birthler); Vargyastal. (In einem Helixgehäuse, Deubel.)

(*Limnocarabus*.)

clathratus L. Heldsdorf (Bielz); Kis-somlyó (Csik, Méhely.)

(*Carabus* s. str.)

granulatus L. Durch das ganze Gebiet his in die Gebirge verbreitet.

a. **rubripes** Géh. (rufofemoratus Letz). Zusammen mit der Stammform.

a. **forticostis** Kr. Kronstädter Gebirge, Ober-Tömös (Deubel); Schässburg (c. a.).

var. **interstitialis** Duft. Dees (c. a.).

cancellatus Illig.

Bielz führt die Stammform fast für ganz Siebenbürgen, Deubel vom Königstein an; ich habe dieselbe noch nicht gesehen und bin der Ansicht, dass dieselbe bei uns gar nicht vorkommt. Bei dieser sind die Tuberkeln der Primärreihen flach und schwach entwickelt, die Zwischenräume der Tuberkelreihen und Rippen ansserordentlich fein granuliert, matt; erstes Fühlerglied rot, Beine schwarz (Stammform); ebenso fehlt uns a. **rufipes** Kr. und **assimilis** Duft., **bononiensis** Géh., **tuberculatus** Schm. Die Varietät **biharius** Reitter gleicht der Varietät subgraniger Reitter, nur besitzt sie rotes erstes Fühlerglied und nur die Beine sind schwarz.

var. **Mühlfeldi** Géh. Nagybagymás, Kelemen-gebirge, Schulergebirge (Holdhaus).

var. **biharius** Reitter. Schässburg (c. a.); Hlászeger Tal (Deubel).

a. **pseudo tuberculatus** Lapong. Schässburg, Kronstadt, Csukás (c. a.).

var. **pseudo graniger** Reitter. Rodnagel. (c. a.).

var. **subgraniger** Reitter. Die häufigste Art: Torockó, Retjezat (Malomviz), Pilis (Nagyenyel), Kronstadt, Rosenauer Gebirge, Schässburg (c. a.).

var. **graniger** Palliardi. Torockó, Retjezat, Balánbánya (c. a.).

var. **seythicus** Schm. (**pseudoseythicus** Lapong). Kronstadt, Balánbánya, Borszék (c. a.); Rodnagel (Holdhaus).

a. **transsylvanicus**. Schulergebirge, Csukás, Schässburg (c. a.).

Carabus cancellatus a. **transsylvanicus**. Diese Varietät steht, was Grösse, Gestalt, Färbung und grobe Runzelung der Flügeldecken-Intervalle anbetrifft, am nächsten dem **seythicus** Schm., von dem sie sich nur durch etwas glänzende, hell kupferrote Färbung unterscheidet.

var. **bucsecsianus** Born. Kronstadt, Schulergebirge, Bucsecs (c. a.).

var. **nigricornis** Dej. Torockó, Baassen, Pilis (Nagyenyel), Schässburg (c. a.).

Ulrichi Germ. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **Leuckarti** Petri. Mit der Stammform, auch vom Schuler- und Rodnagel (Deubel).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei uns nur die kräftiger skulptierte Form der var. **Leuckarti** vorkommt, die in der Regel nicht, wie Reitter (Bestimmungstabelle der Carabini) angibt, grösser oder robuster als die Stammform ist, sondern durch breitere, stärkere Rippen und kräftigere Körner der Tuberkelreihen ausgezeichnet ist.

var. **fastuosus** Pall. Nagyág (Bielz).

arvensis Herbst (**nigrinus** Westh.). Branisch-Wald (Hermannstadt), Surul, Bucsecs,

Schulergebirge, Tesla, Marosgebirge, Kubhorn, Borgoer Pass (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay).

var. **carpathus** Born. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Deubel); Rodnagel, Nagybagymás, Schässburg (c. a.).

obsoletus Sturm. Rodnagel (Ganglbauer, Waldregion des Koronjis, eine Form, die zwischen dem typischen **obsoletus** und der Varietät **euchromus** Pall. in der Mitte steht.

var. **Csikii** Mallász. Wahrscheinlich hat Mallász die von Ganglbauer im Rodnagel gesammelte Zwischenform als var. **Csikii** beschrieben. Hierher gehören wahrscheinlich die Bielz'schen Fundorte des **obsoletus**: Kapnikbánya, Laposer Gebirge, Görgény, Marosgeb., Gyergyó (Bielz).

var. **Uhligi** Holdhaus. Nagybagymás, Kelemengebirge (Holdhaus); Ratosnya (Müller).

var. **euchromus** Pall. Schietal, Götzenberg, Präsbe, Fogarascher Gebirge, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Kronstädter Geb., Kronstadt, Piatra-mare (Bielz); Szurdokpass (c. a.).

a. **Bielzi** Birtbler. Zibins-Gebirge (Bielz, c. a.).

var. **procerus** Bielz. (nagyagensis Birtbl.). Zalatra, Nagyág, Déva (Bielz); Karlsburg (c. a.).

a. **Prunneri** Mall. Detunata.

var. **fossulifer** Fleischer. Biharer Gebirge (Fleischer); Nagyenyel (Kollegienwald, c. a.).

(*Morphocarabus*.)

Scheidleri Panz.

Scheidleri var. **Kollari** Palliardi. In meiner Sammlung befindet sich ein Exemplar dieser Varietät, das ich im Tauschwege von Kelencsényi in Tapolcsán erhielt und aus Dees stammen soll. Da ich der Fundortsangabe nicht trane, habe ich die Varietät nicht in unser Verzeichnis gesetzt.

var. **Méhelyanus** Csiki. Nagybagymás, Kelemen (Holdhaus).

var. **comptus** Dej. Retjezat (Csiki); Torockó (c. a.).

Ich besitze zwei Exemplare aus Torockó, das eine (**laonchen**) besitzt nur vier Primär-Intervalle, muss also ein **comptus** sein, doch Erweiterungen der Fühlerglieder kaum bemerkbar, das zweite (**Weibchen**) ist entschieden **Hampei** mit fünf Primär-Intervallen. Ich habe den Fundort Torockó daher als fraglich auch zu **comptus** gesetzt.

a. **Hopffgarteni** Kr. Dees. (Nach einem von Kelencsényi stammenden, in meiner Sammlung befindlichen Exemplar.)

var. **Rothi** Dej. Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neulorf b. H., Holzmengen, Leschkirch, Girelsau, Talmesch, Porumbach, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Agnetheln, Mediasch, Schässburg (Bielz); Talmescher Geb. (c. a.).

- a. *vitosus* Csiki.
 a. *ignoscus* Csiki.
 a. *varistriatus* Kr.
 a. *quadrifasciatus* Kr.
 a. *laestriatus* Kr. } Zusammen mit
 der Stammform.
- var. *Hampel* Küst. (*aurosericeus* Kr., *Zoppai* Kr., *marginatus* Kr., *Marusii* Bielz).
 Várárhely, Nyárádta, S.-Regen, Tekendörf, Záh, Gyeke, Nagyenyed, Zalatna, Karlsburg, Nagyág, Déva (Bielz); Torockó (c. a.).
- a. *dacicus* Bielz. (*dacicus* Csiki). Dees, Csákgörbő, Magyar-Lajos, Oláh-Laposbánya, Czibles, Rodna (Bielz); Naszód (c. a.); Szamosujvár (Csiki).
- Dacicus* Bielz ist den Fundortsangaben nach entschieden identisch mit *dacicus* Csiki, daher ist Bielz als Autor anzuführen.
- a. *validus* Csiki. Nagyág (Csiki).
 a. *diffinis* Csiki (*comptus* Friv.?) Bihar-gebirge, Gyalu, Hidegszamos (Bielz); Klausenburg (Csiki).
 a. *spectabilis* Csiki. Rodnagebirge (Csiki, c. a.).
 a. *incompus* Kraatz. Kronstadt, Tömöser Pass, Krizba (Bielz); Előpatak, Nussbach (Bielz, c. a.); Csukás, Schullergebirge (c. a.); Telek, Udvarhely (Csiki).
 a. *elegantissimus* Csiki. Kronstadt (Zinne), Baroth (Csiki).
- Ernst Csiki, Kustos am ung. National-Museum, hat „Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Morphocaralen“ (Annates Musci hung. IV. 1906) die in Ungarn vorkommenden Morphocaralen in 6 selbständige Arten eingeteilt, von denen 3 Arten in Siebenbürgen vertreten sind, und zwar:
1. *Carabus comptus* Dej. Retjezat.
 (var. *Hopfgarteni* Kr. soll nur auf einer Bergkuppe der Szörényer Alpen vorkommen.)
 2. *Carabus Rothi* Dej. Hermannstädter, Grosskokler und Fogarascher Komitat.
 a. *vitosus* Csiki.
 a. *ignoscus* Csiki.
 a. *varistriatus* Kr.
 a. *quadrifasciatus* Kr.
 a. *laestriatus* Kr.
 3. *Carabus Hampel* Küster. Mezőség, Mieresch- und Kleinkokeltal.
- var. *validus* Csiki. Nagyág.
 var. *dacicus* Bielz. Szamosztal (Szamosujvár, Naszó).
 var. *diffinis*. Csiki. Kolozsvár, Gyalu, Hidegszamos.
- Comptus* Friv. ist identisch mit *diffinis* Csiki und wenn *Hampel* zur Art erhoben wird, kein Hindernis vorhanden, den Varietätsnamen *comptus* Friv. beizubehalten.
- var. *spectabilis* Csiki. Rodnagebirge.
 var. *incompus* Kr. Keresztényhavas, Krizba, Tesla, Tömös, Telek, Nussbach, Udvarhely, Előpatak.
 a. *elegantissimus* Csiki. Kronstadt (Zinne, Baroth)]

(Trachycarabus.)

scabrieusculus Ol. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Hargita, Csiker Gebirge, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay); Bükszád (c. a.); Nagybagmäs (Deubel).

var. *Lippi* Dej. Hätzeg, Déva, Piski, Broos, Mühlbach, Gross-Schenk, Schässburg, Oláhfal, Záh, Klausenburg, Gyalu (Bielz); Hermannstadt, Salzburg, Szamosujvár (Ormay); Puj b. Hätzeg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Rodnageb., Alsó-Rákos, Kronstadt, Rotenturm (Deubel).

var. *costulatus*. Retjezat (c. a.).

C. scabrieusculus var. *costulatus*. Diese Varietät hat die Grösse der Stammform und unterscheidet sich von derselben dadurch, dass die Flügeldecken wie bei v. *Lippi* deutlich punktiertgestreift und die innern Zwischenräume in der Basishälfte fast glatt sind; den zweiten und sechsten Zwischenraum bilden in der Basishälfte nur schwach unterbrochene, glatte, etwas über die übrigen Zwischenräume erhabene Rippen, der vierte, achte und zwölfte Zwischenraum sind dentliche Kettenstreifen mit ziemlich tiefen Gruben.

var. *minutus* Motsch. Rotenturm (c. a.); Kronstädter Gebirge (Deubel).

(Dentocarabus.)

montivagus Pall. Déva, Birtihalm, Mediasch, Persanyer Gebirge (Bielz); Stolzenburg, Seliste (Ormay).

Wahrscheinlich kommt die Stammform bei uns gar nicht zur Entwicklung, sondern nur die Varietät *blandus*.

var. *blandus* Friv. Bihar Gebirge (Reitter); Schässburg (c. a.); Vargyastal, Kronstadt (Deubel).

(Orinocarabus.)

concolor F.

var. *transylvanicus* Dej. In allen höheren Gebirgen Siebenbürgens, namentlich oberhalb der Baumregion.

(Carpathophilus.)

Linnei Panz. In allen Gebirgen, auch in Wäldern unseres Berglandes, z. B. in Schässburg.

Eine auffallende Bildung findet sich bei einem sonst ganz normalen, 20 mm langen, aus Schässburg stammenden Exemplar (Weibchen): Beide Fühler desselben sind 13 gliedrig, das 11. Glied ist fast so lang als das 10. und normal, das 12. ist nur $\frac{1}{2}$ so lang als das 11., aber ebenso dick, das 13. doppelt so lang als das 12. und nur halb so dick und etwas gebogen, das 12. und 13. zusammen sind so lang als das 11. Man erhält von der ganzen Bildung der Fühler nicht den Eindruck der Abnormität.

var. *Macairei* Dej. Kerzer Gebirge (Bielz); Negoi, Königstein, Bucsecs, Schullergebirge, Bodzaer Geb., Retjezat, Rodnagebirge (Deubel).

var. *Ludovicus* Csiki. Rotenturm (Csiki).

var. *5-costatus* n. v. Schässburg. (In Wäldern unter Baumrinden und Laub, c. a.); Kronstadt (col. Deubel).

Die neue Varietät verdient wegen einiger wesentlicher Abweichungen von unseren Gebirgsformen Erwähnung und einen besonderen Namen. Das Hals-

schild ist schmaler und länger, der Seitenrand seiner ganzen Länge nach stärker aufgebogen, die Hinterecken viel weniger nach abwärts gebogen, so dass der Hinterrand stärker ausgerandet erscheint. Die Flügeldecken besitzen die grösste Breite nicht hinter, sondern in oder vor der Mitte, in den Zwischenräumen der Grübchenreihen, deren Grübchen je drei Kiellinien unterbrechen, befinden sich fünf gitterförmig gewinkelte, nicht unterbrochene Kiellinien. Während der Halsschild in der Regel nach hinten deutlich ausgeschweift verengt ist, besitzt ein Exemplar einen beinahe quadratischen Halsschild, der nach hinten kaum bemerkbar verengt erscheint (a. quadratocollis).

a. *quadratocollis* m. Schässburg (c. a.).
(Phricocarabns.)

glabratus Payk. Götzenberg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Bodzaer Pass, Gross-Schenk, S.-Regen, Kuhhorn, Klausenburg, Gyeke (Bielz).

var. *punctatocostatus* Haury. Kerzer Geb. (Bielz).

var. *extensus* Kr. (breviusculus Kr.). Rotenturm, Bucsecs, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *angustus* n. v. Schässburg, Rotenturm, Kronstadt, Borszék (c. a.)

Carabus glabratus var. *angustus* (Männchen und Weibchen). Von der Stammform, namentlich aber der Varietät *extensus*, durch schlankeren, schmalen Körper, von der ersteren auch durch den lebhaften Glanz der Flügeldecken verschieden. Manche Stücke sind so schmal, dass sie auf den ersten Blick an *C. violaceus* var. *Méhelyi* oder var. *macilentus* m. erinnern, von welchen sich jedoch sicher durch breiteren gewölbteren, am Hinterrande nur schwach ausgerandeten Halsschild mit breiter aufgebogenem Seitenrande, besonders aber durch den Besitz von nur zwei Borsten auf der Oberkante des zweiten Lippentastergliedes unterscheiden werden kann. Ein besonders schmales Exemplar (Männchen) aus dem Rotenturm besitzt auf dem zweiten Lippentastergliede drei Borsten. In der Penisform kann ich keinen Unterschied konstatieren. Von v. subglabratus Reitter unterscheidet sich diese Varietät durch feinere, verworrene Körnelung der Flügeldecken, keine Spur von gereihten Körnern, und höchstens auf der Spitze mit einigen grösseren Körnern und Grübchen, ebenso breit aufgebogenem Seitenrand des Halsschildes wie bei der Stammform.

Nebriinae.

6. Leistus Frölich.

ferrugineus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

rufescens F. Schässburg (am Kokelufer unter Blättern im Ufergebüsch, Bielz, c. a.); Ujszékely (an der Kokel), Rodnagerbirge (c. a.).

(Pogonophorus.)

rufomarginatus Duft. Deva, Seliste, Präsbe, Gross-Schenk (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (Witenberg, Wiesenberg, c. a.); Kronstadt (Scheeser).

nitidus Duft. Präsbe, Fogarascher Geb., Kronstadt (Bielz); Hätzeger Gebirge (Deubel).

(Oreobins.)

gracilis Fuss. Bucsecs (Bielz, Deubel, c. a.); Paringulgebirge, Retjezat (c. a.).

(Leistidins.)

piceus Fröl. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge (Waldregion); Kuhhorn (Ganglbauer).

alpicola Fuss. Frecker-, Bulca-Jäser, Bucsecs (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Präsbe (c. a.); Pietrosul (Müller).

7. Nebria Latr.

(Nebria Dan.)

livida L. An Flussufern. Hermannstadt, Harbach (Leschkirch), Altufer (Rotenturm, Kerz, Fogarasch, Bielz); Schässburg (Kokel, c. a.); Alsó-Rákos, Honigberg (Altufer, Deubel).

piceicornis F. Rotenturm (Altufer), Kronstadt (Bielz); Kerz (Altufer, c. a.).

Jokischi Sturm. Hätzeg (Deubel, vidit Ganglbauer).

var. *nigricornis* Villa. Schieltal (Skok), Paringul, Gurariu, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Hosszufalu, Rodna (Bielz); Schanta (Ormay).

Gyllenhali Schönh. Paringul, Piatra alba (Zibinsgebirge), Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Bucsecs, Hosszufalu (Bielz); Papolcz, Bodzaer Gebirge, Kovászna (Méhely); Rodnagerb. (Deubel).

Das Vorkommen der *N. Gyllenhali* auf dem Paringul und Kerzer Gebirge scheint mir zweifelhaft, da ich vom Kerzer Gebirge nur *N. Heegeri* besitze; ebenso zweifelhaft sind Bucsecs, Fogarascher und Zibinsgebirge.

Heegeri Dej. Hätzeger Gebirge (Bielz); Retjezat, Kerzer Gebirge (Bulea, c. a.); Bucsecs, Zernerschter Geb. (Deubel); Rátosnya (Müller).

(Helobia.)

brevicollis F. (cursor Bedel). Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Marpo, Rotenturm, Fogarascher Geb., Schässburg (Bielz); Kerz (c. a.).

(Alpacus.)

carpathica Bielz. Paringul, Zibins-Jäser, Kristest (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota).

Fussi Bielz. Dees, Sátor (Stoikafalva); Magyar-Lapos, Oláhlaposbánya, Kapnikbánya, Czibles, Rodnagerbirge (Bielz).

Reichi Dej. Paringul, Gurariu, Steffeste, Galbina, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge (Bielz); Präsbe, Bistra (Mühlbacher Gebirge, c. a.); Präsbe (Deubel).

var. *bissenica* Bielz. Surul, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz).

transsylvanica Germar. Paringul, Verfu lui Petru (Mühlbacher Gebirge), Surian, Zibinsgebirge, Zibinsjäser, Steffeste, Negovan, Sterpu, Galbina, Surul, Frecker Jäser, Negoi, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Königstein, Bu-

csecs, Piatra-mare, Kelemen-Gebirge, Kuhhorn.

Soll auf dem Schulergebirge nicht vorkommen (Deubel).

- a. *Ormayi* Ganglb. Mit der Stammform.
- a. *alpigrada* Csiki. Karpathen.

Notiophilinae.

8. *Notiophilus Duméril.*

Da Bielz die zwei dem *N. aquaticus* und *palustris* ähnlichen Arten, *N. pusillus* Waterh. und *hypocrita* Putz nicht kannte, bleihen die von ihm für die zwei ersten Arten angeführten Fundorte am besten aus.

pusillus Waterh. Schässburg, Karlsburg, Unterkerz, Hätzeg, Hermannstadt, Bükszád (c. a.).

aquaticus L. Schuler-Gebirge, Bucsecs, Retjezat (c. a.); Rodnagelbirge, Nagy-hagymás (Deubel).

palustris Duft. Paringul, Előpatak, Schässburg, Balánbánya (c. a.).

hypocrita Putz. (laticollis Petri). Rotenturm, Bükszád, Tordaer Schlucht, Schässburg (c. a.); Negoi, Paringul, Rodnagelbirge, Nagy-hagymás (Deubel).

rufipes Curt. Hätzeg, Kronstadt, Előpatak (Bielz); Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.).

biguttatus F. In Wäldern durch das ganze Gebiet, in den Gebirgen bis oberhalb der Waldregion.

Omophroninae.

9. *Omophron Latr.*

In den Letten und im Sande an Flusssufern.

limbatum F. Hammersdorf, Rotenturm, Kerz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Alsó-Rákos, Hätzeg (c. a.); Rosenau (Deubel).

Elaphrinae.

10. *Blethisa Bonelli.*

multipunctata L. Reussener Teiche, Klausenburg, Gyeke (Bielz).

11. *Elaphrus Fabr.*

An Gewässern.

uliginosus F. Hermannstadt, Hammersdorf, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen, Bistritz, Gyeke, Záh (Bielz); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

oupreus Duft. Szombat, Kronstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg (Bielz).

riparius L. Hermannstadt, Rotenturm, Szombat, Kronstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz).

Ulrichii Redtenb. Szombat, Kronstadt, S.-Regen, Klausenburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Alsó-Rákos, Naszód, Tordaer Schlucht (c. a.).

aureus Müll. Hätzeg, Reussener Teiche, Rotenturm, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Héviz, Schässburg, Sächsisch-Regen, Klausenburg, Dees (Bielz); Alsó-Rákos, Naszód, Unterkerz (c. a.); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay).

Lorocerinae.

12. *Lorocera Latr.*

piliornis F. Hätzeg, Götzenberg, Kronstadt, Schuler-Gebirge (?), Bodzaer Pass (Bielz); Rodnagelbirge (c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel).

Scaritinae.

13. *Chivina Latr.*

In der Erde grabende Tiere.

fossor L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

collaris Hbst. Wie der vorige verbreitet.

14. *Dyschirius Bonelli.*

Die Arten leben, wie die der vorigen Gattung, grösstenteils an Gewässern.

digitatus Dej. Schässburg, Naszód (c. a.); Alsó-Rákos, Honigberg (Deubel).

latipennis Seidl. Rotenturm, (Altuf, Seidlitz).

arenosus Steph. (thoracicus Bielz). Rotenturm, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz).

Nach Dr. Fleischer lebt diese Art auf Salzboden; daher scheint ein Teil der Fundorte, welche Bielz für diese Art anführt, nicht zuverlässig und eher auf *D. latipennis* Seidl. zu beziehen, wenigstens mit Bezug auf Rotenturm, Szombat und Fogarasch.

strumosus Er. Marosujvár, Torda. (Auf Salzboden, c. a.).

politus Dej. Kronstadt, Marienburg (Bielz); Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); S.-Regen (Müller).

nitidus Dej. Dobra, Hermannstadt, Rotenturm, Poresest, Kronstadt, Marienburg b. Kr. (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Karlsburg, Unterkerz, Nussbach, Schässburg (c. a.).

Bonelli Putz. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel).

Laferlei Putz. (semistriatus Schaum nec Dej. nec Heer.). Karlsburg, Unterkerz, Schässburg, Rotenturm (Bielz, c. a.); Altuf (Deubel).

slmills Petri. Schässburg (Koke'ufer, c. a.); Rodnagebirge (Ganglbauer).

Die Art hat wohl die grösste Ähnlichkeit mit *D. intermedius* Putz., von dem sie sich nur durch feinere gegen die Spitze und die Seiten der Flügeldecke fast ganz erloschene Punkstreifen unterscheiden.

tensillocilis Mars. (Fleischeri Deville). Torda (Salzboden, c. a.).

angustatus Ahr. Benczenz b. Broos (Bielz); Nagyenyei, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Honigberg (Altuf, Deubel).

aeneus Dej. Dobra, Unter-Kerz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Frecker Geb., Nagyenyei (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Honigberg (Altuf, Deubel).

substriatus Duft. Dobra, Déva, Schässburg, Csáki-Gorbó (Bielz); Karlsburg, Rotenturm (c. a.).

ruficornis Putz. Karlsburg (Mieresch, Bielz, c. a.); Unter-Kerz, Bistra (am Mühlbach), Schässburg (Kokeluf, c. a.).

salinus Schaum. Déva, Salzburg, Nussbach (?), Eidisch, Zsabenitza (S.-Regen, Bielz); Marosujvár, Torda, Klausenburg (Umgebung, c. a.).

intermedius Putz. Nussbach, Rotenturm (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel).

globosus Hbst. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rotenturm, Fogarasch (Bielz); Remete (Nagyenyel), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge (alpin, Ganglbauer); Balánbánya, Schuler-Gebirge, Csukás, Dees, Unter-Kerz, Tordaer Schlucht, Paringul, Schässburg, Borszék (c. a.).

rufipes Dej. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyei (Ormay); Baassen (Hutweide, c. a.); Hätzeg, Honigberg (Altuf, Deubel).

laeviusculus Putz. Törzburg (Bielz); Schässburg (c. a.).

? **laticola** Chand. Déva (Salzboden, c. a.).

retundipennis Chd. Gross-Scheuern (Bielz).

Broscinae.

15. Broscus Panz.

cephalotes L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Bembidiinae.

16. Asaphidion Gozis.

(Tachypus Lap.)

An Gewässern und feuchten Orten.

caraboides Schrank. Hätzeg, Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Fogarasch, Marienburg b. Kr., S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Remete (Nagyenyel, Ormay); Schässburg, Nagyenyei, Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pallipes Duft. Hätzeg, Seliste, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Bucsecs (c. a.); Nagyenyei, Kakova (Ormay).

flavipes L. Hätzeg, Salzburg, Talmesch, Porcest, Nussbach, Kronstadt, Törzburg, Előpatak, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Pilis (Nagyenyel, c. a.).

17. Bembidium Latr.

(Bracteon.)

striatum F. Hätzeg, Girelsau, Rotenturm, Marienburg b. Kr. (Bielz); St. Annensee, Unter-Kerz (Altuf, c. a.); Kelemengebirge (Müller).

foraminosum Sturm. Hätzeg, Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.); Honigberg (Deubel).

velox L. Hätzeg, Rotenturm, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

littorale Oliv. Rotenturm, Unter-Kerz, Kronstadt, Marienburg b. Kr., S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hammersdorf, Remete (Nagyenyel, Ormay); Karlsburg (c. a.); Honigberg (Alt, Deubel).

(Pogonidium.)

laticolle Duft. Rotenturm, BIRTHÄLM, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Schässburg (Kokel, c. a.).

(Chloridium.)

splendidum Sturm. BIRTHÄLM, Dees (Bielz); Schässburg (Kokel), Klausenburg (c. a.); Honigberg (Alt, Deubel).

(Neja.)

pygmaeum F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Klausenburg (Bielz).

var. **bitunulatum** Bielz. Hätzeg, Rotenturm, Fogarasch, Törzburg, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Remete, Kakova, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Talinberg, Deubel); Karlsburg, Schässburg, Nagyenyei (c. a.).

(Metallina.)

lampros Hbst. Durch das ganze Gebiet bis in die Gebirge.

var. **properaus** Steph. (velox Er., 14-striatum Thoms.). Mit der Stammform.

(Princidium.)

punctulatum Drap. Surul, Ober-Sebes, Hosszufalu (Bielz); Talmesch (Ormay); Rotenturm, St. Annensee, Naszód, Klausenburg, Unter-Kerz (c. a.); Honigberg (Alt, Deubel).

(Testedum.)

bipunctatum L. Neudorf b. H., Götzenberg, Fogarascher Gebirge (Bielz); Retjezat, Paringul, Kerzer Geb., Frecker Gebirge, Rodnagebirge (c. a.).

(Notaphus.)

dentellum Thbg. Klausenburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Baroth (Méhely); Nussbach, Marosujvár (c. a.); Honigberg (Deubel).

varium Olio. Kronstadt, Nussbach (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Kakova (Ormay); Honigberg (Deubel); Marosujvár, Unter-Kerz (c. a.).

adustum Schaum. Salzburg, Rotenturm, Fogarasch, Gross-Schenk, Nussbach, S. Regen (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Honigberg (Deubel); Schässburg (Kokel), Unter-Kerz (Alt, c. a.).

(Plataphodes.)

Fellmanni Mannh. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Bucsecs (c. a.).

(Plataphna.)

prasinum Duft. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge (Bielz).

Hier scheint ein Irrtum vorzuliegen, da meine Exemplare von denselben Örtlichkeiten entschieden B. Fellmanni Mannh. sind; das Vorkommen des B. prasinum Duft. erscheint also sehr zweifelhaft.

(Periphna.)

fasciolatum Duft. Hätzeg, Gurariu (Bielz); Alsó-Rákos, Borszék, Rotenturm, Retjezat (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

coeruleum Serv. Remete (Nagyenyed), Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

tricolor F. Hätzeg, Gurariu, Zood, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Törzburg, Marosgebirge, Borgóer Pass (Temen, Bielz); Rotenturm, Kakova, Remete (Nagyenyed), Sebeshely, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Balánbánya, Ilvamika (Naszód, c. a.).

atrocoeruleum Steph. Borgóer Pass (Bielz); Kerzer Gebirge, Bulea (Ormay).

Das Vorkommen dieser dem westlichen Europa angehörigen Art bei uns scheint mir noch der Bestätigung zu bedürfen.

libiale Duft. Gurariu, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Schässburg, Ilvamika, Retjezat, Bistra, Balánbánya, Csukás, Szurduk-Pass (c. a.); Rodnagelirge (Ganzl aner).

fulvipes Sturm. Csáki-Gorbó, Borgóer Pass (Bielz).

testaceum Duft. Hätzeg, Hermannstadt, Rotenturm, Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., Reps, Mediasch, Schässburg, S. Regen, Dees (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Bistritz, Klausenburg, Ilvamika (Naszód), Nussbach (c. a.).

fluviatile Dej. Rotenturm, Fogarasch, Gross-Schenk (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Marienburg b. Kr. (c. a.).

Andreae Fr. Hätzeg, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S. Regen, Gyeke (Bielz); Schanta, Resinar, Remete (Ormay); Rodnagelirge (Ganglbauer); Balánbánya (c. a.).

var. distinguendum Duv. Reps (Bielz); Ilvamika (Naszód, c. a.).

var. Bualli Duv. Rodnagelirge (c. a.); Dees (Deubel).

var. femoratum Sturm. Hätzeg, Gurariu, Zood, Marienburg bei Kr., Előpatak, Schässburg (Bielz); Kerzer Gebirge, Remete, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Déva, Ilvamika (Naszód), Unter-Kerz (c. a.).

ustulatum L. Hätzeg, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Detunata (Mallász); Szurduk-Pass (c. a.).

rupestre L. Hätzeg, Szeliste, Gurariu, Bistritz (Bielz).

lunatum Duft. Kerz, Szombat (Bielz); Schässburg, Ujszékely (Kokel, c. a.); Honigberg (Altufér, Deubel).

bisignatum Men. Siebenbürgen (Bielz).

modestum F. Am Ufer stehender und fließender Gewässer durch das ganze Hügel- und Bergland.

decorum Panz. Gurariu, Götzenberg, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Remete (Ormay); Alsó-Rákos, Balánbánya, Schässburg, Dees, Ilvamika (c. a.); Rodnagelirge (Deubel).

var. alpinum Dej. Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelirge, Szurduk-Pass (c. a.).

dalmatinum Dej. Hermannstadt, Pilis (Nagyenyed), Tordaer Schlucht, Schässburg, Előpatak, Alsó-Rákos (c. a.); Rosenau (Bucsecs, subalpin), Vargyastal (Deubel).

brunnicornis Dej. Schässburg (Schleifengraben, c. a.); Ilvamika (vidi); Predéal (Deubel).

Milleri Duv. Götzenberg, Előpatak (Bielz); Schässburg (Schleifengraben, c. a.).

a. brunneum. Schässburg (c. a.).

B. Milleri Duv. a. brunneum m. Die meisten Exemplare aus Schässburg haben ganz braune Flügeldecken, oft auch braunen Halsschild, es besitzt dann nur der Kopf eine schwärzliche Färbung; nicht selten wird auch dieser brann mit metallischem Schimmer, so dass der ganze Körper braun ist mit hellern Beinen, Tastern und ersten Fühlgliedern; für diese Abänderung schlage ich den Namen brunneum vor.

Stephensi Crotch. Schässburg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Kronstadt (Deubel).

monticola Sturm. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Vargyastal (Deubel); Detunata (Mallász).

transsylvanicum Bielz. Dees, Laposer Geb., Bistritz, Fogarasch (Bielz); Jaad (Bistr., c. a.).

Bielz führt als Fundort auch Schässburg an; da er aber B. brunnicornis nicht angibt, so liegt hier wahrscheinlich eine Verwechslung mit letzterer Art vor; ebenso wird es mit dem Fundorte Fogarasch sein.

var. cardionotum Pulz. Zusammen mit der Stammform.

(Synchostictus.)

ruficornis Sturm. Götzenberg (Bielz); Nagy-Hagymás (Deubel).

Schäzburg als Fundort ist zu streichen.

Millerianum Heyd. Kerzer Gebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.); Rodnag. (Ganglbauer); Hátszeg, Kronstadt (Deubel); Sebeshely (Broos, Ormay); Detunata (Mallász).**atroviolaceum** Duft. (stomoides Dej.). Kerzer Gebirge, Csukás, Rodnag. (Paringul, Szováta (c. a.)).**decoratum** Duft. Gurariu, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

(Pseudolimnaeum.)

viridimicans Dan. Kerzer Gebirge (Ganglbauer); Bucsecs (Busten), Rodnag. (Deubel).

(Talanus.)

aspericollis Germ. Baassen (Bielz).

(Emphanes.)

minimum F. Dobra, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Marosujvár, Malonviz (Hátszeg, c. a.); Hammersdorf (Ormay).var. **rivulare** Dej. Klausenburg (c. a.).

(Testudinulum.)

glaciale Heer. Zibinsjäser, Surul, Frecker Jäser, Kerzer Gebirge, Arpascher Geb., Bucsecs, Kuhlhorn (Bielz); Frecker Geb. (Serbota), Paringul (c. a.).

(Lepha.)

quadriguttatum F. (quadripustulatum Serv.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Baassen, Schässburg, Maros-Ujvár, Rodnag. (c. a.); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).**quadrinotatum** L. Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Zood, Kronstadt, Nussbach, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Paringul, Nagyenyed, Rotenturm (c. a.).**humale** Sturm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).**tenellum** Er. Hátszeg, Fogarasch, Törzburg, Marienburg b. Kr., Héviz (Bielz); Ilvamika (Naszód), Nagyenyed, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufér), Dees (Deubel); Hammersdorf (Ormay).a. **triste** Schilsky. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).**Schuppeli** Dej. Schässburg, Hermannstadt (c. a.); Balánbánya (Méhely); Rodnag. (Deubel).

(Trepanes.)

Doris Gyll. Zood, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Ormay).**articulatum** Gyllh. Hátszeg, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Déva, Marosujvár, Baassen, Ilvamika (Naszód, c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Gyógy (Bad, Ormay).**octomaculatum** Goeze. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Halvelagen (Weiher), Schässburg (Schleifengraben, c. a.).

(Diplocampa.)

assimile Gyllh. Schässb. (Atelshill, c. a.); Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).var. **fasciatum** m. Unter-Kerz, Klausenburg (Stadtteiche, c. a.).B. *assimile* v. *fasciatum*. Kopf und Halschild matt erzgrün. Flügeldecken hellbraun, mit gelber schiefer Querbinde hinter der Mitte, welche vom Seitenrande bis zum dritten Streifen reicht, während die runde gelbe Makel der Stammform vom Seitenrande bis etwa zum fünften Streifen reicht.

(Philocthus.)

guttula F. Hermannstadt, Kronstadt, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kleinpold, Kakova, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Bembidium obtusum F., welche Art Bielz für Schässburg anführt, ist irrthümlich in unser Verzeichnis gekommen, also zu streichen, obwohl ihr Vorkommen bei uns nicht ausgeschlossen ist.

Mannerheimi Sahlb. Hermannstadt, Schässburg (c. a.).**biguttatum** F. Neudorf b. H., S.-Regen, Záh (Bielz); Honigberg (Altfluss), Marosujvár (c. a.); Hermannstadt, Talmes, Szamosujvár (Ormay); Detunata (Mallász).**inoptatum** Schaum. (biguttatum Reitenh.). Reys, Schässburg, Dees (c. a.); Szamosujvár (Méhely).**lunulatum** Fourer. (guttula Redtenh.). Karlsburg, Marosujvár, Déva, Schässburg, Tordaer Schlucht, Dees (c. a.); Mező-Sámsond (Méhely).18. *Tachys Stephens.***bistriatus** Duft. Hátszeg, Dobra, Salzburg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Törzburg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (c. a.); Rodnag. (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).a. **rufulus** Rey. Schässburg (c. a.).**micros** Fisch. (gregarius Chaud.). Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Szováta (c. a.).**scutellaris** Steph. Szamosfalva (Bielz)var. **laticollis** n. v. Déva, Torda (c. a.).T. *scutellaris* v. *laticollis*. Länge 2-2,3 mm. Ausser durch geringere Grösse unterscheiden sich unsere Tiere von zwei aus Eisleben stammenden Exemplaren meiner Sammlung durch breiteren, an den Seiten vorn stärker gerundeten, nach hinten stärker verengten, gewölbteren und glänzenderen Halsschild mit durchwegs ziemlich deutlicher Mittelreihe und seichtem oberem Quereindruck hinter dem Vorderrande; vor den Hinterwinkeln sind die Seiten kaum ausgebuchtet und diese selbst stumpfwinklig infolge der beiderseitigen Abschragung des Hinterrandes. Die Färbung der Flügeldecken ist im allgemeinen dunkler, bei den meisten Exemplaren sind dieselben ganz braun.

(Tachyura.)

parvulus Dej. Nagyg, Neudorf bei H. (Bielz); Alsó-Rákos, Baassen, Bük-szád (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

var. *curvimanus* Woll. Schässburg, Nagy-enyed (c. a.).

quadrilsignatus Duft. Hätzeg, Zood, Talmesch, Porcest, Kerzer Gebirge, Mediasch, Dees (Bielz); Rotenturm, Unterkers (c. a.); Kakova, Gyergyótölgyes (Ormay).

sexstriatus Duft.

var. *politus* n. var. Rotenturm, Baassen, Schässburg (c. a.).

T. *sexstriatus* var. *politus*. Ich habe diese Art früher für Varietät *bisbimaculatus* Cheor. (*tetragraphus* Reitter, *diabrychus* Schann nec *Kolenati*) gehalten, welche demnach aus unserm Verzeichnis zu streichen ist. Sie besitzt die Färbung und Zeichnung der Varietät *bisbimaculatus* Cheor., unterscheidet sich aber von dieser, sowie von der Stammform durch die wie bei T. *quadrilsignatus* Duft kräftig punktierten, an der Basis und vor der Spitze abgekürzten, stark vertieften drei Streifen der Flügeldecken; der vierte Streifen ist nur angedeutet.

var. *crux* Putz. Rodnagelirge (Bielz); Rotenturm (c. a.).

19. *Tachyta Kirby*.

nana Gyll. Durch das ganze Gebiet unter Baumrinden.

Trechinae.

Trechl.

20. *Perileptus Schaum*.

Am Ufer von Flüssen.

areolatus Creutz. Déva, Rotenturm, Repts. S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Unterkers, Alsó-Rákos, Rodnagelirge (c. a.); Bistritz, Kronstadt, Balánbánya (Deubel).

21. *Thalassophilus Wollaston*.

longicornis Sturm. Klausenburg (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

22. *Trechus Clairv.*

(*Trechoblemus*.)

micrus Hbst. Neudorf b. H., Fogarasch (Bielz); Rodnagelirge (Ganglbauer); Malomviz (Lunka negru, Deubel).

(*Lasiotrechus*.)

discus F. Rotenturm, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Újszékely (c. a.); Vargyas (Deubel); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

(*Trechus s. str.*)

quadrilstriatus Schnrk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *obtus* Er. Kerzer Gebirge (Bielz). *nigrinus* Putz. Szurul (Bielz).

rubens F. Präbe (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Előpatak, Szováta, Schässburg (c. a.); Obertönmös (Deubel); Rodnagelirge (Ganglbauer).

amplicolis (sculptus Schm.) Fairm. Előpatak (c. a.); Rodnagelirge (Bielz).

subnotatus Dej.

var. *cardioides* Putz. (palpalis Dej.). Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borgoer Pass, Rodnagelirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Puj (bei Hätzeg), Schulergebirge, Csukás (c. a.); Rotenturm, Gyógy (Ormay).

latus Putz. Götzenberg, Präbe, Surul (Bielz); Kerzer Gebirge, Malomviz, Retjezat, Paringul, Schässburg (Wolkendorfer Grund, Schowesgraben), Balánbánya, Borszék, Rodnagelirge (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel); Schanta, Porkovieza, Gyógy (Ormay).

fontinalis Rybinski. Rodnagelirge (c. a.).

Diese Art ist dem Tr. *latus* Putz sehr ähnlich, aber leicht von ihm zu unterscheiden durch das verdickte erste Glied der Hintertarsen.

insclitus K. Daniel. Oestliche Karpathen. *plicatulus* Mill. Rodnagelirge (c. a., teste Ganglbauer).

Dejeani Putz. Retjezat, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea, c. a.); Mühlbacher Gebirge, Zibinsgebirge, Surul, Königstein, Kelemengelirge (Bielz).

Tr. *dejeani* Putz wird im Rodnagelirge von Tr. *plicatulus* Mill. vertreten.

banaticus Dej. Retjezat? (Deubel).

Bielz hat diese Art mit Tr. *Dejeani* Putz verwechselt, wie er Tr. *plicatulus* Mill. mit Tr. *Dejeani* verwechselte. Tr. *banaticus* Dej. ist eine noch nicht sicher geklärte Art aus den Banater Bergen.

striatulus Putz. Rodnagelirge (c. a., Ganglbauer).

Tr. *striatulus* Putz, *pulchellus* Putz und *carpathicus* Rybinski mit var. *breviusculus* Dan., von denen die beiden letzteren Bielz unbekannt waren, sind einander nahe verwandt, die letztere Art mit Tr. *striatulus* Putz oder eher mit Tr. *pulchellus* zusammengefallen worden; daher führe ich für dieselben nur die neuern, mir bekannten Fundorte an.

marginalis Schaum. Hätzeg (Piatra Sipothului, Bielz); Malomviz, Retjezat, Bucsecs, Schuler-Gebirge (c. a.); Rosenauer Geb. (Deubel); Schanta, Präbe, Porkovieza, Kerzer Gebirge (Ormay).

rhilensis Kaufmann. Siebenbürgen.

pulchellus Putz. Paringulgebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Geb. (Glashütte), Borszék, Rodnagelirge (c. a.).

carpathicus Rybinski. Balánbánya, Schuler-Gebirge, Bucsecs, Rodnagelirge (c. a.).

var. *breviusculus* Dan. Csukás, Rodnagelirge? (c. a.).

Ormayi Ganglb. Rotenturm, Büdös (c. a.); Schuler-Gebirge, Bodzaer Gebirge, Zernester Gebirge, Vargyastal (Deubel).

Bielz führt auch an Tr. *Perthyi* Heer von Resinar, Surul und Görgénygebirge und Tr. *Longhi* Com. von Csáki-Görbó, die bei uns sicher nicht vorkommen; ebenso Tr. *rotundipennis* Duft (Präbe, Fogarascher, Kerzer Gebirge), Tr. *croaticus* Dej. (Fogarasch und Tr. *rotundatus* Dej. (Kerzer Gebirge).

procerus Putz. Surul, Frecker Gebirge, Negoi, Kerzer Gebirge, Arpascher-, Fogarascher-, Rodnagelirge (Bielz); Bucsecs, Plaju foi (Zernest, Deubel).

- corpulentus** Wse. Präsbe (Bielz).
subterraneus Mill. Rodnagebirge (Bielz);
 Roreul (jenseits der Grenze in der Bukowina, Deubel).
ruthenus Reitter. Rodnagebirge (Kuhhorn, c. a.).
Klimakoviczi Ganglb. Frecker Geb. (Serbota), Kerzer Gebirge (Buleatal, an der Grenze und oberhalb der Baumregion, c. a.).

23. *Anophthalmus Sturm.*

(Dnvalins.)

- pseudoparoecus** Csiki. Höhle bei Zalátna (Preszaka, c. a.).
Sziladyi Csiki. Höhle bei St. György im Erzgebirge (c. a.).
Dleneri Csiki. Bucsecs (Deubel, Csiki 1910);
 Rovartani Lapok, XVII. 5—8. füz. 1910.
Mallászi Csiki. Detunata.
Deubeli Ganglb. Retjezat (Zenoga-See, c. a.).
Deubelianus Csiki. Königstein (Valea Vle-
 duci a lui Tamas, Deubel).
gracilis n. sp. Kerzer Gebirge (Butianu,
 Lakutz, c. a.).

Anophthalmus gracilis. Long. 3.2 mm. Nitidus, testaceus, glaber, A. Deubelianus Csikii proximus, sed magnitudine minore, striis septem elytrorum imprimis distinctis. Caput rotundatum, temporibus param convexis, sulcis frontalibus usque ad stricturam capitis extensis, arcuatis, profundis; Oculi, pigmento non infecti, rotundi. Antennae breves, apicem versus incrassatae, articulo secundo quarto baud brevior. Prothorax capite vix latior, subcordatus, latitudine maxima brevior, lateribus basin versus leviter arcuatis, ante basin rectis, acutis, margine laterali subtiliter reflexo, dorso medio sulcato, intra angulos posticos vix excavatus. Elytra subparallela, lateribus medio parum rotundata — ampliata, humeris convexis, apice conjunctim rotundata, striis septem punctatis, duobus internis profundis, exteris subtilioribus, instructa, stria tertia foveolis tribus, primo pone basin, secundo in medio, tertio ante apicem impressa.

Die neue Art steht entschieden dem mir unbekannten A. Deubelianus Csiki am nächsten, unterscheidet sich jedoch von demselben durch geringere Grösse (3.2 mm gegen 4.3 mm), deutliche sieben Punktstreifen der Flügeldecken, gleichlanges zweites und viertes Fühlerglied, der Beschreibung nach abweichende Kopfform und kurze Fühler. Sie nähert sich einigermaßen auch dem Trechus Kimakoviczi Ganglb., von dem sie durch geringere Grösse, pigmentlose Augen, wesentlich schmäleren Kopf und Halsschild und schmäler abgesetzten Seitenrand des letzteren abweicht. Von A. Deubeli Ganglb. unterscheidet sie sich durch geringere Grösse, weniger gleichbreite Gestalt, wesentlich schmäleren Kopf und Halsschild, kürzere Fühler, stärker convex gerundete Schultern usw.

Csiki gibt nicht an, ob bei A. Deubelianus die Spitze der Flügeldecken einzeln oder zusammen abgerundet ist; da er sie mit A. Deubeli vergleicht, muss ich ersteres annehmen, und dann wäre dieses ein weiteres gutes Unterscheidungsmerkmal, da sie bei der neuen Art zusammen abgerundet sind.

- Merkli** Friv. Malomviz (Hátszeg, Lunka negru); Paringulgebirge (Karsia, c. a.).
dacicus Friv.
 var. **malomvicensis** Ganglb. Malomviz (Hátszeg, Lunka negru, c. a.).
Dietli Ganglb. Zibinsgebirge (Vurfu mare, Csiki).
oavlfuga Ganglb. Paringulgebirge (Baumgrenze, c. a.).

- Budae** Kenderesy. Höhle bei Ponoriclu (Hátszeg, c. a.).

Ganglbauer gibt die Grösse des A. Budae Kender. mit 5 mm an; mein Exemplar hat nur eine Länge von 4.6 mm.

Bielz führt auch A. Redtenbacheri Friv. aus einer Höhle bei Nagyenyed (Remete) an, doch dürfte diese Art bei uns nicht vorkommen, und eher A. Sziladyi Csiki oder eine neue Art in dieser Höhle leben.

- Bielzi** Seidl. Fogarascher Gebirge (Bielz);
 Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
 var. **transsylvanicus** Csiki. (pilosellus Ganglbauer, Miller). Schuler-Gebirge, Csukás, Vargyastal (in der Umgebung der Almascher Höhle, c. a.); Rodnageb., Bucsecs, Flintschhölle bei Rosenau, Nagyagymás (Deubel). Am Csukás fand ich zwei Exemplare unter den Wurzeln eines Eichenstumpfes.
 var. **pilosellus** Mill. Rodnagebirge (Szaka, Deubel, 1 Exemplar).

24. *Epaphius Samouelle.*

- secalis** Payk. Petrozsény, Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalú, Klausenburg (Bielz).

Patrobi.

25. *Patrobus Stephens.*

- excavatus** Payk. Schieltal, Zalátna, Mediasch, Fogarasch, Kronstadt, Bükszád. Ojtoz-Pass, Oláhfalú, Rodna-Gebirge (Kuhhorn, Bielz); Malomviz, Előpatak, Schässburg (c. a.); Honigberg (Alt-
 ufer, Deubel); Hermannstadt, Torda, Gyógy (Ormay).
quadricollis Mill. Kerzer Gebirge, Bucsecs, Schuler-Gebirge, Tömöser Pass, Piatra mare, Csukás, Tesla, Dongókő, Bodzaer Pass, Rodnagebirge (Bielz).

26. *Deltomerus Motsch.*

- carpathicus** Mill. Rodnagebirge (Bielz).

Pogoninae.

Leben ausschliesslich auf Salzboden.

27. *Pogonus Dej.*

- luridipennis** Germ. Szamosfalva, Kolos, Zabenica (S.-Regen, Bielz); Marosujvár, Déva (c. a.); Torda (Ormay).
iridipennis Nic. Déva, Salzburg, Szamosfalva, Kolos, Zabenica (Bielz); Marosujvár, Torda (c. a.).
chalcus Marsh. Persány (Bielz).
riparius Dej. Déva, Salzburg, Szamosfalva, Eidisch, Zabenica (Bielz); Szováta (c. a.).
persicus Chd.
 var. **peisonis** Ganglb. Déva, Baassen, Marosujvár (c. a.).
 (Pogonistes.)
depreus Motsch. Torda (c. a.).

Panagaeinae.

28. Panagaeus Latr.

- crux major** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. **Schaumi**. Schässburg, Előpatak (c. a.).
 a. **trimaculatus** Dej. Fogarasch, Schässburg (Bielz).
bipustulatus F. Hátzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Reschinar, Szeliste, Rotenturm, Salzburg, Szamosujvár (Ormay).

Chlaeniinae.

29. Chlaenius Bonelli.

- An den Ufern der Gewässer und feuchten Orten.
 (Chlaenites)
spoliatus Rossi. Salzburg b. H., Reussener Teiche, Girelsau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).
 (Dinodes.)
decipiens Dufour (azureus Duft) Altufer bei Fogarasch (Bielz).
 (Chlaenius i. sp.)
festivus F. Déva, Fogarasch, Mediasch, Gyeke (Bielz); Szamosujvár (Ormay).
veslitis Payk. (viridipunctatus Goeze.). Hátzeg, Hermannstadt, Neudorf bei H., Leschkirch, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, S.-Regen, Schässburg, Dees, Gyeke (Bielz); Ober-Kerz, Rotenturm, Remete (Nagyenyed), Szamosujvár (Ormay).
nitidulus Schnrk. Am Ufer süsser Gewässer durch das ganze Berg- und Hügelland.
nigricornis F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Gross-Schenk, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Balánbánya (Deubel); Pókafalva (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay).
tristis Schall. Déva, Reussener Teiche, Gyeke (Bielz); Hermannstadt, Dálnok (Háromszék, Ormay).

30. Callistus Bonelli.

- lunatus** F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Oodinae.

31. Oodes Bonelli.

- heloploides** F. Hermannstadt, Kronstadt, Marosgebirge, Bistritz, Záh (Bielz).
gracilis Villa Rodna (Bielz); Schässburg (Röhricht im Atelsloch, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Licininae.

32. Badister Dej.

- unipustulatus** Bon. Hátzeg, Záh (Bielz); Reps, Nagyenyed, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
bipustulatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. **binotatus** Fischer. Karlsburg (c. a.).
sodalis Duft. Hermannstadt, Grossscheuern, Hosszufalu, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt, Honigherg (Altufer, Deubel).
 (Baudia.)
peltatus Panz. Kronstadt (Bielz); Honigherg (Altufer, Deubel).

33. Liolus Latreille.

(Neorescinus.)

- Hoffmannsegg** Panz. Schieltal, Götzenberg, Präse, Porcest, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Königstein, Bucsecs, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass, Sächs.-Regen, Marosgebirge (Bielz); Zalatna (Präszaka), Bistra, Csukás, Büdös, Annensee, Retjezat, Schässburg, Schuler-Gebirge (c. a.); Schanta (Ormay).
 (Licinus s. str.)
cassideus F. Déva, Fogarasch, Marosgebirge, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Hátzeg, Puj (c. a.).
depressus Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Amblystominae.

34. Amblystomus Erichs.

- metallescens** Dej. Hermannstadt (Ormay).

Harpalinae.

Daptin.

35. Daptus Fischer.

- vittatus** Fisch. Déva (c. a.).
 a. **Komineckil** Bielz. Déva, Eidisch (Birther), Zsabenitz (Bielz).

36. Ophonus Stephens.

(Ophonus s. str.)

- obscurus** F. (columbinus Germ.). Salzburg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Záh (Bielz); Alsó-Rákos, Pilis (Nagyenyed, c. a.).
sabulicola Panz. Déva, Birthalm, Mediasch, Schässburg, Klausenburg, S.-Regen (Bielz).

diffinis Dej. Előpatak (Bielz).

Das Vorkommen des *O. diffinis* Dej. in Siebenbürgen dürfte nicht genügend verbürgt sein. (Tachyphonus.)

rupicola Sturm. Mühlbach, Neudorf b. H., Götzenberg, Rotenturm, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Klausenburg (c. a.).

punctatulus Duft. (atcollis Mannh.). Kronstadt, Bükszád, Marosgebirge, Bistritz, Gross-Scheuern, Mediasch, Hargita, Oláhfalú (Bielz); Déva, Schässburg (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

cordatus Duft. Präsbe, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

puncticollis Payk. Paringul, Götzenberg, Kerz, Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Reps, Pilis (bei Nagyenyed, c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Magyar-Bükkös, Remete (b. Nagyenyed, Ormay).

brevicollis Serv. Paringul, Kerzer Geb., Záh (Bielz); Schässburg (c. a.).

var. **parallelus** Dej. Hammersdorf (Bielz).

azureus F. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **coeruleipennis** Mén. Rotenturm (Ormay).

cribricollis Dej. Kronstadt (Bielz).

signaticornus Duft. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.).

(Parophonus.)

mendax Rossi. Déva, Hunyád (Bielz).

(Pseudophonus.)

maculicornis Duft. Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay).

var. **complanatus** Dej. Hátszeg, Birtihalm, Mediasch, Schässburg (Kokelufer, Bielz); Honigberg (Altufér, Deubel).

(Pardileus.)

griseus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pubescens Müll. Ebenso.

(Harpalophonus.)

calceatus Duft. Gross-Scheuern, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Kakova (Ormay).

hospes Sturm. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

var. **sturmi** Dej. Hátszeg, Déva, Salzburg, Fogarasch, Hosszufalu, Borszék, Záh (Bielz); Marosujvár (c. a.).

37. *Harpalus Latreille.*

aeneus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **confusus** Dej. Schässburg, Borszék (Bielz); Déva, Nussbach (c. a.); Rotenturm, Ober-Kerz, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt (Deubel).

var. **semipunctatus** Dej. Schässburg (c. a.).

var. **limbopunctatus** Fuss. Hargita, Borszék (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szakadát, Ober-Kerz, Rotenturm, Remete, Szamosujvár (Ormay); Oláh-

falu, Rodna, Schuler-Gebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **interstitialis** Gredl. Déva (c. a.). (Lasioharpalus.)

distinguendus Duft. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auf Feldern.

smaragdinus Duft. Déva, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Hargita, S.-Regen, Záh (Bielz).

cupreus Dej. Déva, Salzburg, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

dimidiatus Rossi. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

(Harpaloxys.)

rufus Brüggen. Rotenturm, Kronstadt, Reps (Bielz); Torda, Gyéres (c. a.).

atratus Latr. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Hátszeg, Szurduk-Pass, Déva, Torda, Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay).

var. **subsinuatus** Duft. Tordaer Schlucht (c. a.).

pygmaeus Dej. Déva (c. a.); Salzburg (Ormay).

(Amblystus.)

latus L. Hermannstadt, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen, Borszék, Záh (Bielz); Déva, Nagyenyed, Rodnagebirge (c. a.); Michelsberg, Rotenturm, Ober-Kerz, Szamosujvár (Ormay).

luteicornis Duft. Déva, Hermannstadt, Reinsar, Kronstadt (Bielz); Klausenburg, Schässburg (c. a.); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay).

quadripunctatus Dej. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Szurduk-Pass, Bistra, Rodna-Gebirge (c. a.); Hammersdorf, Schanta (Ormay).

rubripes Duft. Gross-Scheuern, Präsbe, Rotenturm, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Előpatak, Karlsburg, Pilis (Nagyenyed), Oláhfalú (c. a.).

var. **sobrinus** Dej. Kronstadt (Bielz).

(Harpaloderus.)

honestus Duft. Karlsburg, Hátszeg, Szurduk-Pass, Schässburg, Borszék, Tordaer Schlucht, Déva, Nussbach (c. a.); Zernest, Honigberg (Altufér, Deubel).

Da Bielz *H. honestus* Duft. und *H. rufitarsis* Duft. nicht von einander trennen konnte, sind seine Fundortangaben nicht verwendbar.

rufitarsis Duft. Karlsburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

neglectus Serv. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay).

(Harpalobius.)

fuscipalpis Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz).

Fröhlichii Sturm. Hermannstadt (Alter Berg, Bielz).

autumnalis Duft. Zood, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Tordaer Schlucht (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Ober-Kerz, Grossau (Ormay); Kronstadt (Deubel).

- hirtipes** Panz. Hargita, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz).
zabroides Dej. Torda (Deubel).
servus Duft. Déva, Kronstadt, Dees (Bielz); Retjezat (c. a.).
flavicornis Dej. Schässburg (Bielz); Karlsburg (c. a.).
tardus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
modestus Dej. Záh (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
anxius Duft. Hátzeg, Déva, Gross-Scheuern, Záh, Gyeke (Bielz); Karlsburg, Pilis (Nagyenyei), Nagyenyei (c. a.).
taciturnus Dej. Siebenbürgen.
 Siehe Catalogus coleopterorum Europae etc. Heyden etc. 1906, col. 68.
serripes Quens. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
 (Aetophilus.)
picipennis Duft. Déva, Gross-Scheuern, Reinsar, Marienburg b. Kr., Gyeke (Bielz); Karlsburg, Hermannstadt, Orlat, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 (Microderes.)
scaritides Sturm. Klausenburg (Bielz).

Aenpalpini.

38. Trichotichus Morawitz.

- laevicollis** Duft. (satyrus Strm.). In unsern Gebirgen.

39. Stenolophus Dej.

- teutonus** Schnk. Hátzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Reussener Teiche, Gross-Schenk, Hätz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Borszék (Bielz); Pilis (Nagyenyei), Déva (c. a.); Hammersdorf, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay).
Skrimsiranus Steph. Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Marosujvár (c. a.).
 a. **affinis** Bach. Marosujvár, Puj (Hátzeg, c. a.).
discophorus Fisch. Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Hosszufalu, Schässburg (Kokeluf, c. a.).
 var. **flaviusculus** Motsch. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).
Steveni Kryn. Hammersdorf (Bachufer), Reussener Teiche, Klausenburg, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
mixtus Hbst. Hermannstadt, Schässburg, Záh (Bielz); Hátzeg (Deubel).
 var. **Ziegleri** Panz. Schässburg (c. a.).

40. Aenpalpus Dej.

- flavicollis** Strm. Dobra, Hammersdorf, Rotenturm, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Kronstadt (Deubel); Torda.

- brunnipes** Sturm. Dobra (Bielz).
interstitialis Reitter. Déva (c. a.).
suturalis Dej. Szamosujvár (Ormay).
meridionalis L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
dorsalis F. Fogarasch (Altfer, Bielz); Kronstadt (Deubel).
luteatus Duft. Kronstadt.
exiguus Dej. Gross-Scheuern, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

41. Anthracus Motschulsky.

- longicornis** Schaum. Marosujvár (c. a.).
consputus Duft. Honigberg (Altfluss, Deubel).

42. Bradycellus Erichs.

- harpalinus** Serv. Schidtal (Bielz); Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Schulergebirge, Rodnagelbirge (Deubel).
collaris Payk. Schässburg, Birtihalm (Bielz); Baassen, Borszék (c. a.); Rodnagelbirge, Nagyhagymás (Deubel).

43. Dichirotrichus Duv.

- pubescens** Payk. Mühlbach, Salzburg, Szamosfalva, Kronstadt, Torda, Dees-Akna, Szováta (c. a.); Hermannstadt (Ormay), N.-Eidisch.
 var. **ustulatus** Dej. Salzburg, Szamosfalva (Bielz).
obsoletus Dij. Grossschenk (Bielz).

Das Vorkommen dieser dem südlichsten Europa angehörigen Art dürfte kaum wahrscheinlich sein, jedenfalls aber weiterer Belege bedürfen.

Anisodactylini.

44. Diachromus Erichs.

- germanus** L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

45. Anisodactylus Dejean.

- (Hexatrichus.)
poeciloides Steph. Torda (Bielz, c. a.); Kronstadt (Deubel).
 (Anisodactylus s. str.)
binotatus F. Durch das ganze Gebiet.
 var. **spureaticornis** Dej. Wie die Stammform.
nemorivagus Duft. Durch das ganze Gebiet.
signatus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Zabrinae.

46. Zabrus Clairville.

- tenebrioides** Goeze. Hermannstadt, Salzburg, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

Amarinae.

47. *Amara Bonelli*.

(Triena.)

fulvipes Serv. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Szamosujvár (Ormay).**concinna** Zimm. (amabilis Hampe). Salzburg, S.-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Ormay).**tricuspidata** Dej. Freck, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Malomviz, Rotenturm, Petrozsény, Ponor (Hátszeg, c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).**plebeja** Gyllh. Kronstadt (Bielz); Petrozsény, Schässburg (auf Grasrispen), Nieder-Eidisch (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

(Amara s. str.)

similata Gyllh. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Nagyenyed, Borszék (c. a.); Hermannstadt (Ormay).**ovata** F. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Retjezat, Rodnageb. (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm, Schanta (Ormay).a. **adamantina** Kolenati. Schässburg (c. a.).**saphyrea** Dej. Déva (Bielz).**montivaga** Sturm. Präsbe, Kronstädter Geb. (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Borszék (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Szeliste (Ormay); Schuler-Gebirge (Deubel).**nifida** Sturm. Hátszeg, Präsbe, Reps, S.-Regen (Bielz); Retjezat, Rotenturm, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).**communis** Panz. Durch das ganze Gebiet.**convexior** Steph. Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Kronstadt, Zernest, Tusnád (Deubel).**lunicollis** Schiölde. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge (c. a.); Porumbacher Gebirge, Nagyág (Ormay).**Schimperi** Wenck. Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Vale vinului (Rodnagebirge, Ganglbauer).**curfa** Dej. Schieltal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Heltau, Fogarasch, Nussbach (Bielz); Karlsburg, Rodnagebirge, Alsó-Rákos (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Nagybagymás (Deubel); Detunata (Mallász).**aenea** Degeer. Durch das ganze Gebiet.**spreta** Dej. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Zernest (Deubel).**famelica** Zimm. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge, Marosujvár (c. a.).**eurynota** Panz. (vulgaris F.). Hermannstadt, Schässburg, Rodna, Záh (Bielz); Karls-

burg, Baassen (c. a.); Ober-Kerz, Miriszlo (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt, Schuler-Gebirge (Deubel).

familiaris Duft. Durch das ganze Gebiet.**anthobia** Villa Déva (c. a.).**lucida** Duft. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Marosujvár (c. a.).**tibialis** Payk. Gross-Scheuern, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Borszék (c. a.).

(Celia.)

ingenua Duft. Déva, Hermannstadt, Sächsisch-Regen, Záh (Bielz); Schässburg, Baassen, Borszék (c. a.).**cursitans** Zimm. Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.).**municipalis** Mill. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Hátszeg (Deubel); Schässburg (c. a.).**misella** Mill. Zibinsgebirge, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Geb., Bucsecs, Piatra mare, Csukás (Bielz); Rodnagebirge (Ganglbauer, c. a.).**erratica** Duft. Hermannstadt, Borszék, Dees (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Paringul (c. a.); Bucsecs, Nagybagymás (Deubel); Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).**Quenseli** Schönh. Bucsecs (Deubel, c. a.).**bifrons** Gyll. (livida F.). Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Reps, Klausenburg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Karlsburg, Reps (c. a.).

(Acrodon.)

brunnea Gyll. Kronstadt (Bielz).

(Bradytus.)

apricaria Payk. Hermannstadt, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Dees, Záh (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Bistritz (c. a.); Salzburg, Nagyenyed (Ormay).**fulva** Dej. Hermannstadt, Zood, Mediasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hammersdorf, Miriszló (Unterweissenburger Komitat, Ormay); S.-Regen, Bistritz.**consularis** Duft. Hermannstadt, Götzenberg, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed (c. a.).

(Cyrtotonotus.)

aulica Panz. Csib, Götzenberg, Mediasch, Schässburg, Nussbach, Krizha, Kelemengebirge, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz, Előpatlak, Klausenburg, Rodnagebirge (c. a.); Vargyastal (Deubel); Hermannstadt, Hammersdorf, Bistra (Ormay).**convexiuscula** Marsh. Hosszufalu, Záh (Bielz).

(Leirides.)

nobilis Duft. Kronstadt (Bielz).

(Percosia.)

equeslris Duft. Unter-Kerz (Bielz); Schässburg, Bistra, Balánbánya, Klausenburg. Pilis (Nagyenyed), Rodnagebirge (c. a.).

Pterostichinae.

Stomlul.

48. *Stomus Clairville*.

pumicatus Panz. Im Gebirge und im Bergland verbreitet.

Pterostichini.

49. *Abax Bonelli*.

ater Villa L. (striola F.). In den Wäldern des ganzen Gebietes.

Nach Seidlitz (F. transs.) soll bei uns nur die dem südlichen Europa eigentümliche Varietät A. v. inferior Seidl. vorkommen.

var. *inferior* Seidl. Bistra, Schässburg (c. a.).

var. *parallelus* Duft. Durch das ganze Gebiet.

var. *carinatus* Duft. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Holzungen, Götzenberg, Porumbak, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Gebirge, Nussbach, Reys, Schässburg, Oláhfalú, Marosgebirge, Dees (Bielz); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Detunata (Mallász).

var. *latus* Dej. Siebenbürgen (Hätzeg? Bielz).

var. *porcatus* Duft. Hätzeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Abacopercus.)

Schuppeli Pall. Déva, Detunata, Gyalu, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.).

var. *Rendschmidtii* Germ. Retjezat, Holzungen, Girelsau, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Bucsecs, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass, Birtalm, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Zalatna (Präszaka), Torockó, Reys, Nagyenyed, Rotenturm, Klausenburg (c. a.); Hammersdorf, Rakovicza, Präshe, Déva (Ormay); Detunata (Mallász).

50. *Molops Bonelli*.

var. *robustus* Dej. Siebenbürgen (Bielz).

var. *elatus* F. Götzenberg, Präshe, Fogarasch, Talmesch (Bielz).

Nussbach und Oláhfalú als Fundorte des *M. elatus* F. sind zu streichen; ob *M. elatus* überhaupt bei uns vorkommt, ist noch zu erweisen, da er vom ähnlichen *M. alpestris* Dej. sicher nur durch die Penisform unterschieden werden kann und Ormay vom Götzenberg den *M. alpestris* Dej. nachweist.

var. *alpestris* Dej. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay); Szurdok-Pass (c. a.).

? *ovipunnis* Chd. Kronstadt (Bielz).

Deubel hat *Molops ovipennis* Chd. bei Kronstadt nie gesammelt; ebensowenig ist die Varietät wieder gesammelt worden, so dass das Vorkommen dieser Art bei uns sehr fraglich erscheint.

? var. *medius* Chd. Kerzer Gebirge (Bielz).
var. *piceus* Panz. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *montanus* Heer. Kerzer Gebirge (Bielz).
var. *orthogonius* Chd. Siebenbürgen (Bielz).

51. *Pterostichus Bonelli*.

(Adelosia.)

var. *macer* Marsh. Hätzeg, Csiker Gebirge (Bielz); Baassen (c. a.); Hermannstadt, Salzburg, Szakadát (Ormay).

(Poecilus Bon.)

var. *Koyi* Germ. Kronstädter Gebirge (Bielz); Transsylvania (c. a.).

var. *marginalis* Dej. Malomviz, Retjezat, Bistra, Rodnagebirge, Tordae Schlucht (c. a.); Bálványos bei Torja (Méhely).

a. *Szepigletti* Csiki. Rodnagebirge (c. a.); Nagybagmász, Bucsecs, Königstein, Schulerger Gebirge (Deubel).

var. *lepidus* Leske. Schietal, Hätzeg, Präshe, Surul, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Königstein, Hosszufalu, Tartlau, Nussbach, Bükszád, Gross-Schenk, Schässburg, Oláhfalú, Hargita, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz, Ratosnya, Szurdok-Pass, Bistra (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

var. *cupreus* L. (cursorius Heer.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. *affinis* Sturm. Mit der Stammform.

a. *erythropus* Fald. Mit der Stammform.

var. *coerulescens* L. Hätzeg, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Klausenburg, Schässburg, Borszók, Rodnageb., Petrozsény, Bükszád (c. a.).

var. *striatopunctatus* Duft. (subcoeruleus Schaumnec Quens.). Dobra, Rotenturm, Reussener Teiche, Fogarasch, Schässburg, Dees (Bielz); Karlsburg, Ujszékel b. Sch. (c. a.).

Pt. subcoeruleus Quens., welcher im Kaukasus vorkommt, ist bei uns nicht nachgewiesen, und die Angaben Bielz's beziehen sich auf *striatopunctatus* Duft., der an Flussufer nicht selten ist.

(Pedius.)

var. *inaequalis* Marsh. Götzenberg (Bielz); Schässburg (unter Weidenrinde, c. a.); Várhegy (Deubel).

(Lagarus.)

var. *vernalis* Panz. (biimpressus Fuss.). Hätzeg, Hermannstadt, Dobra, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Héviz, Kronstadt, Nussbach, Marienburg b. Kr., Bükszád, S.-Regen, Záh, Schässburg (Bielz); Szurdok-Pass, Reys, Retjezat, Nagyenyed, Pilis (b. Nagyenyed, c. a.); Rotenturm, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. *cursor* Dej. Marosujvár (c. a.); Kiszék (Méhely).

(*Lyperosomus*.)

aterimus Herbst. Gross-Schenk, Sächs.-Regen, Csiker Gebirge (Bielz).

elongatus Duft. Klausenburg (Bielz).

(*Bothriopterus*.)

oblongopunctatus Fbr. In den Wäldern des ganzen Gebietes verbreitet.

angustatus Duft. Retjezat, Zibinsgebirge, Zood (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay).

(*Platysma*.)

niger Schall. Hätzeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Nussbach, Reps, Mediasch, Oláhfal, Borszék, S.-Regen, Záh (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg, Schanta, Präsbe, Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallász).

Pt. *niger* v. *distinguendus* Heer. ist aus unserm Verzeichnis zu streichen, obgleich ich zwischen zwei Exemplaren des *distinguendus* aus Uralsk und unserem Pt. *niger* keinen wesentlichen Unterschied zu entdecken vermag.

(*Omaeus*.)

vulgaris L. Schieltal, Hätzeg, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Marienburg, Nussbach, Mediasch (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Torda (c. a.); Hermannstadt, Ober-Kerz (Ormay); Detunata (Mallász).

(*Pseudomaeus*.)

nigrita F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Tömöspass, Bükszád, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Vidra (Aranyos-Tal), Záh (Bielz); Paringul, Pilis (Nagyenyed), Klausenburg (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

anthracinus Illig. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarascher Geb., Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg (Bielz); Retjezat, Klausenburg (c. a.); Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

gracilis Dej. S.-Regen, Klausenburg (Bielz).
minor Gyllh. Déva, Hermannstadt (J. W.), Gross-Scheuern, S.-Regen, Dees. Záh (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay).

(*Argutor*.)

interstinctus Sturm. Hätzeg, Gross-Scheuern, Nussbach, Schässburg, Oláhfal, Záh (Bielz); Schässburg, Pilis (Nagyenyed), Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Stolzenburg, Kákova, Dálnok (Háromszék, Ormay).

strennuus Panz. Hätzeg, Präsbe, Gross-Schenk, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Balánbánya, Szurduk-Pass, Klausenburg, (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm,

Talmesch, Arpascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Porumbaker Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

diligens Sturm. Hätzeg (Bielz); Csukás, Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Borszék, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg (Ormay).

(*Orites*.)

negligens Sturm. S.-Regen (Bielz).

Da Pt. *negligens* bis jetzt nur vom Riesengebirge bekannt geworden ist, und die Bielzsche Angabe durch neuere Funde bis jetzt noch nicht bestätigt worden ist, scheint das Vorkommen dieser Art bei uns nicht ausser allem Zweifel.

(*Pseudorthomus*.)

unctulatus Duft. Vistea mare, Kronstädter Gebirge, Schuler-Gebirge, Kelemengebirge (Bielz); Retjezat, Frecker Geb. (Serbota), Bucsecs, Borszék, Rodnageb. (c. a.); Schanta, Porkovicza, Präsbe, Porumbaker Gebirge, Arpascher Geb. (Ormay).

subsinnatus Dej. Besineu, Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Bielz).

Bielz führt auch Pt. *subsinnatus* Dej. von zahlreichen Fundorten an, an denen später nur Pt. *unctulatus* Duft. nachgewiesen worden ist, was das Vorkommen dieser Art bei uns sehr in Frage stellt.

(*Haptoderus*.)

brevis Duft. Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat, Szurduk-Pass (c. a.).

Bielzi Fuss. (*festinans* Chd.). Bihargeb. (Muncsel mare bei Rekeczel).

(*Steropus*.)

rufitarsis Dej. Rodnagebirge (Deubel c. a., Ganglb.); Detunata (Mallász). Schanta, Porkovicza, Bistra, Arpascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Porumbaker Gebirge (Ormay).

var. *Deubeli* Ganglb. Schuler-Gebirge, Csukás, Balánbánya, Borszék, Rodnageb., Bistra (c. a.); Detunata (Mallász).

var. *tenuimarginatus* Chd. Negovan, Präsbe, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Bucsecs, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass, Rodnagebirge (Bielz); Paringulgebirge, Retjezat (c. a.).

aethiops Panz. Surul, Kronstädter Geb., Schuler-Gebirge, Czibles, Rodnagebirge (Bielz).

Das Vorkommen des Pt. *aethiops* Panz. scheint mir sehr fraglich, da das Tier seit Bielz nicht mehr gesammelt worden ist.

madidus F. Marosgebirge, Rodnagebirge (Kuhhorn, Bielz).

Aus demselben Grunde ist auch das Vorkommen des Pt. *madidus* bei uns nicht wahrscheinlich.

cophosioides Dej. Déva (Bielz).

(*Cophosus*.)

cylindricus Hbst. Hermannstadt (Bielz).

(Pterostichus s. str.)

melas Creutz. Holzmengen, Götzenberg, Präsche, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Mediasch, Schässburg, Reys, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Tordaer Schlucht, Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Schanta, Remete (Nagyenyed), Szamosujvár (Ormay).

var. **hungaricus** Dej. (transylvanicus Chaud.). Kerzer Gebirge, Kronstadt, Porcest, Surul, Piatra mare, Csukás, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Schanta, Remete, Szamosujvár (Ormay); Bistra, Schässburg, Balánbánya, Oláhfalú, Retjezat, Nagyenyed, Torockó, Tordaer Schlucht (c. a.); Detunata (Mallász); Schuler-Geb., Nagyagymás (Deubel).

Die siebenbürgischen Stücke des *Pt. hungaricus* Dej. sind kleiner und gedrungener als vier Exemplare, welche ich aus Ungarn besitze, auch ist der Halsschild bei den siebenbürgischen Stücken nach hinten in der Regel nicht viel stärker als nach vorne verengt; in der Form der Hinterbrust-Episternen, die Seiditz als Unterschied hervorhebt, finde ich keinen bemerkbaren Unterschied.

Kokeili Mill. Fogarascher Gebirge, Rodnagebirge (Kuhhorn, Bielz).

(Petrophilus.)

foveolatus Duft. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Bucsecs, Predeal, Marosgebirge, Rodnagebirge (Bielz); Schulergebirge (c. a.).

var. **interruptistriatus** Bielz. Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodnagebirge (Ganglbauer, c. a.); Detunata (Mallász).

Findeli Dej. In sämtlichen höheren Randgebirgen.

(Cheporus.)

transversalis Duft.

var. **Etelkae** Ormay. Retjezat, Detunata, Aranyostal (Skerisora, Bielz); Paringul, Nagyenyed (c. a.).

Ich habe die Bielz'schen Fundorte des *Pt. transversalis* Duft auch zu *Etelkae* gezogen, da es mir zweifellos scheint, dass sie sich auf die Varietät beziehen. Um so mehr wundert es mich, dass Ormay den *Pt. transversalis* von Remete anführt, das unweit Nagyenyed liegt, woher mir *Pt. Etelkae* vorliegt.

(Oreophilus.)

maurus Duft. Paringul, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge (Bulea), Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Bielz).

a. **erythromerus** Ganglb. (madilus Strm.). Zusammen mit der Stammform.

(Bryobius.)

Jurinei Panz.

var. **Heydeni** Dej. Retjezat, Besineu, Galbina, Präsche, Surul, Frecker Gebirge (Negoi), Kerzer, Arpascher, Fogarascher, Kronstädter Gebirge, Bucsecs, Piatra mare (Bielz); Malomviz, Bistra, Paringulgebirge, Rodnagebirge (c. a.); Schanta, Porkovicza (Ormay).

(Calopterus.)

fossulatus Quens. Retjezat, Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz).

var. **Welensi** Drap. (Klugi Dej.). In allen höheren Gebirgen.

var. **marginatus** n. v. Rodnagebirge (c. a.).

Im Rodnagebirge kommt eine Form des *Pt. fossulatus* Quens. vor, welche deutlich gerandete Flügeldeckenbasis besitzt, wodurch sie dem *Pt. variolatus* Dej. noch ähnlicher wird, von dem sie sich nur durch kürzere Basalgrübchen des Halsschildes und seichteren Quereindruck vor der Basis desselben zu unterscheiden scheint. Ich schlage für diese Varietät den Namen *marginatus* vor. Oft besitzt sie wie die Varietät *Welensi* Drap. zwei Basalgrübchen auf der Halsschildbasis.

52. *Sphodrus Clairv.*

leucophthalmus L. Déva, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Holzmengen, Girelsau, Kronstadt, Hosszufalu, Krizba, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

53. *Laemostenus Bonelli.*

(Cryptotrichus.)

janthinus Duft.

var. **coeruleus** Dej. Hermannstadt, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Rotenturm (Ormay).

(Laemostenus.)

venustus Clairv. Schässburg (Breite, Witeberg, am Fusse, unter der Rinde, im morschen Holze hohler Eichen im Herbst und im ersten Frühjahr); Riuszad (Ormay).

(Pristonychus.)

punctatus Dej. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Méhely).

terricola Hbst. (inaequalis Panz.). Hermannstadt, Birtihalm, Kronstadt, Hosszufalu, Krizba (Bielz).

Nachdem diese Art seit Bielz nicht mehr gesammelt wurde, gewinnt es fast den Anschein, als ob hier eine Verwechslung mit *L. punctatus* Dej. vorliege, der dem *L. terricola* sehr ähnlich ist.

54. *Platyderus Schaum.*

ruficollis Marsh. Hammersdorf, Mediasch (Bielz); Torockó (Ormay).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese dem Westen Europas angehörige Art nur irrtümlich in unser Verzeichnis gekommen ist, da *Pt. rufus* Duft. früher nur als Varietät des *Pl. ruficollis* Marsh. angesehen wurde.

rufus Duft. Schieltal, Präsche, Porcest, Surul, Kerzer Gebirge, Königsstein, Schässburg, Borszék (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Csukás, Zalatna (c. a.); Déva, Hammersdorf, Götzenberg, Riuszad (Ormay); Bistritz (Prof. Müller).

55. *Calathus Bonelli*.

fuscipes Goeze. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **latus** Serv. (punctipennis Germ.). Detunata (Mallász).

erratus Sahlb. Hátszeg, Götzenberg, Präsbe, Porcest, Kronstadt, Tömös-Pass, Bükszád, Oláhfalú, Marosgebirge, Borszék (Bielz); Schuler-Gebirge, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Detunata (Mallász).

ambiguus Payk. Gross-Scheuern, Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Borszék (Bielz); Rotenturm, Intra-Gald, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Detunata (Mallász).

metallicus Dej. In den höheren Gebirgen.

mollis Marsh. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

melanocephalus L. Im ganzen Gebiete verbreitet.

var. **alpinus** Dej. Petrozsény, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Präsbe (Ormay).

var. **noricus** Dan. Bucsecs (c. a.).

micropterus Duft. Surul, Zibinsgebirge, Steffeste, Bucsecs (Bielz); Paringul, Retjezat, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Nagybagmás, Pietrosul (Kelemengeb., Deubel).

56. *Dolichus Schall*.

halensis Schall. Déva, Kasanest, Vácza (Bad), Piski, Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

57. *Synuchus*.

nivalis Panz. Retjezat, Schieltal, Déva, Götzenberg, Surul, Bükszád, Gyalu (Hidegszamos, Bielz); Schässburg, Borszék, Csukás (c. a.); Bistra, Kerzer Gebirge (Ormay); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

58. *Olisthopus Dejean*.

Sturmi Duft. Mühlbach (Rekita), Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

rotundatus Duft. Déva, Hermannstadt, Oláhfalú (Bielz); Schässburg (c. a.).

59. *Agonum Bonelli*.

(Anchomenus.)

ruficorne Goeze. An den Ufern süßes Gewässer und an feuchten Stellen durch das ganze Gebiet.

(Anchus.)

obscurum Herbst. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen, Bánffy-Hunyad, Záh (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Platynus.)

scrobiculatum F. Götzenberg, Zood, Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz); Malomváz (c. a.).

banaticum Friv. Retjezat, Zenoga-See, Vale Valeriaska (c. a.).

glaciale Reitter. Negoi, Kerzer Gebirge, Vister-Tal, Fogarascher, Kronstädter, Schuler-Gebirge, Piatra mare (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs (c. a.).

(Limodromus.)

assimile Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge in Wäldern.

(Batenus.)

livens Gyllh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

(Agonum s. str.)

quadripunctatum Dej. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

impressum Panz. Schanta (Ormay).

Schässburg als Fundort des *A. impressum* ist zu streichen.

sempunctatum L. Hátszeg, Retjezat, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Bucsecs, Hosszufalu, Tartlau, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, Marosgebirge (Bielz); Szurdok-Pass, Annensee, Borszék, Nussbach, Frecker Geb. (Serbota), Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

viridicupreum Goeze. Honigberg (Altufér, Deubel).

var. **austriacum** F. Präsbe, Girelsau, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Klausenburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Honigberg (Altufér, Deubel).

marginatum L. Hátszeg, Salzburg, Rotenturm, Hammersdorf, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

Mülleri Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland.

a. **tibiale** Heer. Dees, Naszód, Klausenburg (c. a.); Balánbánya (Deubel).

a. **amethystinum** n. a. Paringulgebirge (c. a.).

A. Mülleri a. *amethystinum*: Oberseite ganz blaugrün gefärbt bis auf den schmal bronzefarbenen Seitenrand des Halsschildes und den breit bronzefarbenen Seitenrand der Flügeldecken.

gracilipes Duft. Petrozsény (Paringul, Bielz).

Ist aus der Reihe der bei Schässburg bis jetzt aufgefundenen Käfer zu streichen.

- versutum** Gyllh. Gross-Scheuern, Marpod, Búkszád (Bielz); Gölzenberg (Ormay); Honigberg (Altuf, Deubel).
- viduum** Panz. Retjezat, Schieltal, Neudorf b. H., Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Annen-See, Schässburg, Oláhfalú, Marosgebirge (Bielz); Paringul, Klausenburg, Dees, Szurdok-Pass (c. a.); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay).
- var. **moestum** Duft. Hermannstadt, Kronstadt, Záh, Gyeke (Bielz); Retjezat, Paringul (c. a.).
- m. **emarginatum** Gyllh. Klausenburg (c. a.). (Euophylus.)
- antennarium** Duft. Retjezat, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Pilis (Nagyenyed, c. a.); Hammersdorf, Rotenturm (Ormay).
- Ormay führt auch *A. scitulum* Dej. von Hermannstadt und Baumgarten an, was wahrscheinlich auf Irrtum beruht, da die Art der westeuropäischen Fauna angehört.
- micans** Nicol. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Ujszékely (Kokel), Dees (c. a.); Honigberg (Deubel).
- fuliginosum** Panz. Gross-Scheuern (Bielz); Retjezat, Klausenburg (c. a.).
- piceum** L. Gross-Scheuern (Bielz).
- gracile** Gyll. Kronstadt (Gespreng, Deubel, Méhely).
- Thoreyl** Dej. Záh (Bielz).
- var. **puellum** Dej. Gross-Scheuern (Bielz). (Idiochroma, Clibanarius.)
- dorsalis** Pontopp. Durch das ganze Berg- und Hügelland bis in die Gebirge.

Lebiinae.

60. *Lebia Latreille.*

- (Lamprias.)
- cyanocephala** L. Hátzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Predeal, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Puj (Hátzeg), Malomviz, Baassen, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Salzburg, Hammersdorf, Rotenturm, Stolzenburg (Ormay).
- chlorocephala** Hoffm. Wie der vorige verbreitet.
- (*Lebia* s. str.)
- crux minor** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
- trimaculata** Vill. Déva, Klausenburg (Bielz); Felső-Orbó (Ormay).
- marginata** Geoffr. Déva, Mediasch, Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz (Altuf auf Weidengebüsch), Schässburg (Kokel, c. a.); Rosenau (auf Weide, Deubel).
- humeralis** Dej. S.-Regen (Bielz); Schässburg (Scherkes, Gr.-Alischer Reg., c. a.).
- scapularis** Geoffr. (nec. Fourer.). Mediasch (Bielz).

61. *Llongychus Wissmann.*

- quadrillum** Duft. Rotenturm, S.-Regen, Dees (Bielz); Petrozseny, Nagyenyed (c. a.); Altuf (Deubel).
- var. **major** Mill. Siebenbürgen (Bielz).

62. *Metabletus Schmidt-Goebel.*

- obscuroguttatus** Duft. Hermannstadt, Neudorf b. H., Birtihalm, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (c. a.).
- pallipes** Dej. Hátzeg, Déva, Hermannstadt, Oláhfalú, Gyeke (Bielz).
- truncatellus** L. Hátzeg, Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Zalatna, Repts, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

63. *Microlestes Schmidt-Goebel.*

- (*Blechnus* Motsch.)
- minutulus** Goeze. (glabratus Duft.). Hátzeg, Schieltal, Dusch, Kerz Gebirge, Schässburg, S.-Regen, Záh, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel, Méhely).
- maurus** Sturm. Schässburg, Tordaer Schlucht, Hátzeg (c. a.); Gyeke, Záh, Vurvurasa (Méhely); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

64. *Dromius Bonelli.*

- longiceps** Dej. Hermannstadt, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg (Bielz).
- linearis** Oliv. Hátzeg, Mediasch, Birtihalm, Schässburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Rotenturm, Borszék, Rodnageb. (c. a.); Klausenburg (Müller).
- agilis** F. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Rotenturm, Kerz, Arpascher-Gebirge (Bielz); Borszék, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel); Bistritz (Müller).
- longulus** Friv. Schässburg. (In morschem Zwetschken- und Lindenholz, auf Ahorn unter Moos, c. a.).
- fenestratus** F. Kronstadt, Csukás, Nagy-hagymás (Deubel).
- quadrinotatus** Panz. Fogarasch (Bielz); Rotenturm, S.-Regen (Bielz); Baassen, Schässburg, Bucsecs (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
- quadrinotatus** Panz. Fogarasch (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Ormay).
- quadrisingatus** Dej. Schässburg (Siechhofen unter der Rinde eines Apfelbaumes und unter Moos, c. a.); Hermannstadt (unter Weidenrinde, Ormay).
- nigriventris** Thoms. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hammersdorf, Kleinpold (Ormay).

65. *Demetrias Bonelli*.

(Aëtrophorus.)

imperialis Germ. Kronstadt, Klausenburg, Záh (Bielz).

(Demetrias s. str.)

monostigma Sam. Hátszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Schässburg (Kokelufer, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (Müller).*atricapillus* L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, Hosszufalu (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Ponor bei Puj (Hátszeg, c. a.); Hátszeg, Rosenau (Deubel); Klausenburg (Müller).66. *Cymindis Latreille*.

(Cymindis s. str.)

humeralis Geoffr. Schieltal, Rotenturm, Porcest, Reps, Nussbach, Kronstadt, Ojtosz-Pass, Oláhfalú, Csik, Balánbánya, Marosgebirge, Klausenburg (Bielz); Puj (Hátszeg), Előpatak, Rodnagebirge, Schässburg (Fuchsloch im Moos, c. a.); Talmesch, Nagyg (Ormay); Detunata (Mallász).*axillaris* F. Déva, Gross-Scheuern (Bielz); Hátszeg, Pilis (Nagynyed, c. a.); Klausenburg (Müller).*cingulata* Dej. Déva, Godinest, Mada, Gurariu, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Krizba, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Hargita, Oláhfalú, Keroly (Bielz); Balánbánya, Rotenturm, Tordaer Schlucht, Rodnagebirge, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Hermannstadt (Ormay).67. *Polystichus Bonelli*.*connexus* Geoffr. Klausenburg (Müller).

Oðacanthinae.

68. *Oðacantha Paykull*.*melanura* L. Gross-Scheuern, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Lazaret, c. a.).

Dryptinae.

69. *Drypta Latreille*.*dentata* Rossi. Hátszeg, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm, Klausenburg (c. a.); Keisd, Várhegy (Deubel); S.-Regen (Müller).

Brachyninae.

70. *Brachinus Weber*.*crepitans* L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.*psophia* Serv. Hátszeg, Dobra, Déva, Mediasch, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Szamosujvár (Ormay).*immaculicornis* Dej. Dobra, Déva, Mediasch (Bielz).*explodens* Duft. Hátszeg, Hermannstadt, Girelsau, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Katona (Mezőség, Bielz).var. *strepens* Fisch. Klausenburg, Karlsburg, Schässburg (c. a.).var. *glabratus* Dej. Hátszeg, Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel).71. *Aptinus Bonelli*.*bombarda* Illig. Klausenburg (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

III. Haliplidae.

72. *Haliplus Latreille*.*obliquus* F. (amoenus Oliv.) Hermannstadt, Neudorf b. H. (Bielz); Klausenburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).*variegatus* Sturm. Mezőség, Gyeke (Bielz).*fulvus* F. Hermannstadt, Sibó, Schässburg (Bielz); Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel, Gespreng).*flavicollis* Sturm. (impressus Er.?). Hátszeg, Neudorf b. H. (Bielz); Kronstadt (Deubel).*laminatus* Schall. (cinereus Aubé). Schässburg (Bielz); Lotriona (Rotenturm), Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).*ruficollis* Degeer. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Klausenburg, Schässburg, Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel); Maaren (rechtes Altufer, Ormay).var. *Heydeni* Wehncke. Schässburg (c. a.).*fulvicollis* Er. Schässburg, Mezőség (Záh, Gyeke, Bielz); Baassen (c. a.).*fluviatilis* Aubé. Neudorf b. H., Zood (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.).*lineatocollis* Marsh. Lotriona (Rotenturm, c. a.).73. *Cnemidotus Illig*.*impressus* Panz. (caesus Duft.) Hermannstadt, Poplaka b. H., Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Maaren (Altufer, Ormay).

IV. Dytiscidae.

Hydroporinae.

74. *Oxynoptilus* Schaum.

cuspidatus Kunze. Kolos (Bielz).

75. *Hyphydrus* Illig.

ovalus L. (ferrugineus L.) Fogarasch, Nussbach, S.-Regen, Klausenburg, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel); Maaren (Altuer, Ormay).

76. *Hygrotus* Steph.

inaequalis F. Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Nussbach, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Agostonfalva, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
versicolor Schall. Hermannstadt, Reussener Teiche (Bielz); Kakova (Ormay).
decoratus Gyllh. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

77. *Coelambus* Thomson.

impressopunctatus Schall. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerz, Kronstadt, Nussbach (Bielz); Halvelagen bei Sch., Agostonfalva (c. a.); Maaren (Alt), Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay).
parallelogrammus Ahrs. Kronstadt, Záh (Bielz).
enneagrammus Ahrs. (nigrolineatus Aub.). Déva, Salzburg (Bielz).
confluens F. Neulorf, Baassen (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

78. *Bidessus* Sharp.

unistriatus Illig. (parvulus Panz.). Rotenturm (Bielz); Karlsburg (c. a.); Hermannstadt, Maaren (Alt, Ormay).
geminus F. (minimus Bedel.). Salzburg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Holz-mengen, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Héviz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Orlat, Karlsburg, Baassen, Halvelagen b. Sch., Marosujvár (c. a.); Kakova, Maaren (Alt), Nagyenyed (Ormay).

79. *Hydroporus* Clairville.

(Deronectes.)
platynotus Germ. Rotenturm (Lauterbach, c. a.).
(Oreodytes.)
Sanmarki C. R. Sahlb. Kronstadt, Tartlau (Bielz).

(Graptodytes.)

pictus F. Hermannstadt (Bielz); Maaren (Alt, Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

granularis L. (minimus Scop?). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Honigberg (Deubel).

(Hydroporus i. sp.)

Genei Aubé.

var. *obliquesignatus* Bielz. Klausenburg (Bielz).

lineatus Degeer. (quadrilineatus Drap.). Klausenburg (Bielz); Honigberg (Deubel); Salzburg (Müller).

halensis F. Mediasch, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Bistritz, S.-Regen (Müller).

dorsalis F. Arapatak (Bielz); Honigberg (Deubel).

erythrocephalus L. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Oláhfalva, Nussbach (c. a.); Hermannstadt, Maaren (Alt, Ormay); Kronstadt (Deubel); Marosvásárhely (Müller).

var. *deplanatus* Gyllh. Oláhfalva, Schässburg (c. a.).

rufifrons Duft. Hermannstadt, Rotenturm (Bielz); Honigberg (Deubel).

scalesianus Steph. Klausenburg (Stadtteiche, c. a.).

angustatus Sturm. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Deubel).

palustris L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

ellypticus n. sp. Rotenturm (Lautertal in fließendem Quellwasser, c. a.), zwei Exemplare.

Hydroporus ellypticus, Länge 3 $\frac{5}{8}$ mm.

Hydroporo marginato Duft. similis, magnitudine minore, corpore angustiore, convexiore, elytris minus subtiliter et minus dense punctulatis, margine elytrorum laterali basin versus distincte curvato diversus. Hydroporo palustris L. etiam propinquus, sed forma et corpore convexiore, latiore, nitidior, forma metathoracis, signatura elytrorum etc. abunde distinctus. Fuscus, nitidus, capite medio, lateribus prothoracis, margine basali et laterali, maculis duobus elytrorum, antennis, palpis pedibusque testaceis. Corpus convexum, lateribus rotundatum medio latissimum. Caput disperse punctulatum, subimpressum, antennae graciliores, testaceae, apicem versus cum apice palporum, obscuriores. Prothorax convexus, ante basin vix impressus, juxta angulos posticos foveola rotunda obsitus, disperse punctatus, lateribus distincte subtiliter marginatis. Elytra punctulata, subtiliter pilosa, margine laterali basin versus ascendente. Processus presternalis obsolete tuberculatus, alae laterales metathoracis apice angustae, lineiforme terminatae, metathorax, coxae posticae abdominisque segmentum I et II disperse profundius, segmenta cetera subtilius punctata, segmentum ultimum longitudinaliter rugulosum. Unguiculi tarsorum anteriorum aequales.

Durch die deutlich aufsteigende Seitenrandlinie der Flügeldecken bei abgestutzten Fortsätzen der Hinterhüften gehört die Art in die Gruppe des *H. palustris*, von welchem sie sich durch verhältnismässig breiteren, gewölbteren Halsschild, seitlich regelmässig gerundeten, glänzenderen Körper, kürzere und feinere Behaarung

der Flügeldecken, linienförmig anslaufende Spitze der Seitenflügel des Metathorax, tiefere und entferntere Punktierung und grösseren Glanz der Unterseite, durch die Färbung der Flügeldecken und durch gleiche Klauen der Vordertarsen des Männchen unterscheidet. Die Flügeldecken sind dunkelbraun, ein ziemlich breiter, gerader, an der Naht nicht nach hinten erweiterter Basalfleck, der die Naht nicht erreicht, aber mit dem vorne breit, hinten schmal und verwaschen gelben Seitenrande zusammenhängt, zwei Flecken auf der hintern Hälfte neben dem Seitenrande, von denen der vordere sich linienförmig nach hinten verlängert, der hintere punktförmig ist, wenig scharf abgegrenzt gelb. Auf dem Prosternum ist ein Höckerchen nicht bemerkbar, wohl aber eine halbkreisförmige, nach vorn offene, erhabene Linie, die Spitze des Hinterbrustflügels ist sehr kurz, schmal, linienförmig, während sie bei *H. palustris* ein schmales, aber doch deutliches Dreieck bildet. Die Klauen der Vordertarsen sind bei beiden Exemplaren gleich.

Ich habe die Art verglichen mit zahlreichen *H. palustris* aus Siebenbürgen, Norwegen und Böhmen, auch mit *H. marginatus* aus Steiermark, von dem er sich durch schmalere Gestalt, weniger feine und dichte Punktierung der Flügeldecken und deutlich aufgebogenen Seitenrand der Flügeldecken unterscheidet, während er ihm in Färbung und Glanz sehr ähnlich ist.

tristis Payk. Oláhfalva, Nussbach (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely).

elongatulus Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz); Nagyenyed (Ormay).

marginatus Duft. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

planus F. Hermannstadt, Balánbánya, Záh (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Halvelagen b. Sch., Klausenburg, Előpatak (c. a.); Honigberg (Deubel); Maaren (Alt, Ormay); S.-Regen (Müller).

pubescens Gyll. Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Deubel).

morio Heer. (nivalis Heer.). Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

discretus Fairm. Bükszád, Schässburg. (In Tümpeln, c. a.).

nigrita F. Balánbánya, Torda (Bielz); Borszék, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

melanarius Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz); Paringulgebirge (c. a.).

ferrugineus Steph. Michelsberg, Götzberg, Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz).

Noterinae.

80. *Noterus Clairville.*

crassicornis Müll. Hermannstadt, Unterkers, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Klausenburg, Agostonfalva, Halvelagen bei Sch. (c. a.).

clavicornis Deg. Hätzeg, Hermannstadt, Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Maaren (Alt), Kakova (Ormay).

Laccophilinae.

81. *Laccophilus.*

variegatus Sturm. Dobra (Lapusnyak), Klausenburg (Bielz).

obscurus Panz. Fogarasch (Bielz); Baassen, Klausenburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel); S.-Regen (Müller).

virescens Brahm (hyalinus Degeer). Hermannstadt, Thalheim, Nussbach, Előpatak, Héviz, Mediasch, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Maaren (Alt), Kakova, Szamosujvár (Ormay).

Colymbetinae.

82. *Agabus Linné.*

(Gaurodytes.)

guttatus Payk. Gurariu, Götzberg, Zood, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Törzburger Pass, Balánbánya, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Bistra, Malomviz (c. a.); Gyógy (Ormay).

biguttatus Oliv. Malomviz (c. a.).

var. **nitidus** F. (fontinalis Steph.). Götzberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Balánbánya (Bielz).

bipustulatus L. In stehendem Süßwasser durch das ganze Gebiet, auch im Gebirge (Buteanu Lakuz und Frecker Gebirge Serbota, c. a.).

regalis Petri. Kerzer Gebirge (Buleasee), Borszék (Közhegy, c. a.).

Ormay führt A. Solieri autorum = A. regalis Petri auch vom Buteanu (Lakuz-Tümpel) an; ich habe in diesem nur A. bipustulatus L. in grosser Zahl gesammelt. Die Vereinigung unseres A. regalis mit A. Solieri v. Kiesenwetteri Seidlitz vom Berge Kern in Illyrien, wie sie Dr. Holdhaus (Abh. K. k. Z. h. Gesellsch., Wien, VI. 1) ohne weitere Begründung annimmt, kann ich nicht akzeptieren: Nach Kiesenwetter sind die Tiere aus Illyrien sehr klein und weichen im übrigen vom echten A. Solieri nicht ab. A. regalis aber besitzt die Grösse der norwegischen Tiere (9—10⁵ mm.); dazu kommt noch ein Unterschied in der Skulptur der Oberseite, den ich in meiner Beschreibung nicht anführte: die eingeritzten Linien der Oberfläche bilden wesentlich breitere Maschen; der Verlauf der eingeritzten Linien wird dadurch vollkommen unregelmässig und die von ihnen eingeschlossenen Felder sind mehr weniger breit unregelmässig-polyedrisch, während bei A. Solieri die Linien unter einander mehr-weniger parallel verlaufen, an dem Vorder- und Hinterende zugespitzt sind und dadurch die längs-rissige, der des A. bipustulatus sich nähernde Skulptur erzeugen.

paludosus F. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Honigberg (Tümpel, Deubel).

uliginosus L. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz).

congener Payk. Mediasch, Bozauer Pass (Bistritz, Forduló, Bielz).

affinis Payk. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.).

(Scytodytes.)

Sturmi Gyll. Hermannstadt, Szombat (Bielz).

(Eriglenus.)

undulatus Schrk. (Hermanni Bedel). Hermannstadt, Götzberg, Kronstadt, Schässburg, Oláhfalva, Csáki Gorbó (Salomon, Bielz); Klausenburg (c. a.).

labiatus Brahm (femoralis Payk.). Schielfal, Hammersdorf (Bielz); Honigberg (Tümpel am Altfluss, Deubel).

83. *Platambus Thomson.*

maculatus L. (inaequalis Panz.). Zood, Szombat, Fogarasch, Nussbach, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Malomviz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Ober-Kerz (Ormay); Hátszeg, Zernest, Vargyasbach (Deubel).

84. *Copelatus Erichs.*

ruficollis Schall. Hermannstadt, S.-Regen, Mediasch (Bielz); Maaren, Szamosujvár (Ormay); Honigberg (Deubel).

85. *Ilybius Erichs.*

fenestratus F. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay); Honigberg (Deubel).

fuliginosus F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Nussbach, Mediasch, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Klausenburg, Kronstadt (c. a.); Honigberg (Deubel).

subaeneus Er. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg, Nussbach (c. a.).

ater Degeer. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

obscurus Marsh. S.-Regen (Bielz).

guttiger Gyllh. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz).

86. *Rhantus Lacordaire.*

Grapei Gyllh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Méhely).

punctatus Geoffr. Hermannstadt, Neudorf b. H., Thalheim, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Ágestonfalva (c. a.).

notatus F. (suturalis Lacord.). Hermannstadt, Girelsau, S.-Regen, Záh (Bielz); Klausenburg (c. a.).

adpersus F. (bistriatus Bedel nec Bergström). Hermannstadt, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg, Brenndorf (Altflussufer in Tümpeln, Deubel).

Bielz führt Rh. bistriatus Bergstr. = adpersus F. an. Die Synonymie seines Rh. bistriatus mit Rh. adpersus F. beweist, dass seine Art der Rh. adpersus F. ist; demnach

ist Rh. bistriatus Bergström vor der Hand aus unserem Verzeichnis zu streichen.

exoletus Forst. Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Deubel).

87. *Colymbetes Clairville.*

fuscus L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Karlsburg, Baassen, Klausenburg (c. a.); Rotenturm (Ormay).

Dytiscinae.

88. *Hydaticus Leach.*

seminiger Deg. Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Kronstadt, Klausenburg (c. a.); Maaren (Altfer, Ormay).

transversalis Pontopp. Mühlbach, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Nagyenyed, Miriszló, Kakova (Ormay); Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).

stagnalis F. Burzenland (Brenndorf, Altfluss in Tümpeln, Deubel, c. a.).

89. *Graphoderes Thomson.*

austriacus Sturm. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz).

bilineatus Deg. Brenndorf (Altfluss in Tümpeln, Deubel).

cinereus L. Hermannstadt, Nussbach, Mediasch, Gyeke (Bielz); Nieder-Eidisch (c. a.); Maaren (Altfer), Salzburg, Szamosujvár (Ormay); Brenndorf, Honigberg (Altfer in Tümpeln, Deubel).

zonatus Hoppe. Kronstadt (Gespreng, Méhely).

90. *Acilius Leach.*

sulcatus L. Hermannstadt, Salzburg, Girelsau, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Baassen (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

91. *Dytiscus L.*

marginalis L. Hermannstadt, Unter-Kerz, Szombat, Fogarasch, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Pöplaka (Ormay).

var. ♀ **conformis** Kunze. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

dimidiatus Bergstr. Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen, Marosgebirge (Bielz); Honigberg (Deubel).

circumcinctus Ahr. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

circumflexus F. Hermannstadt, Girelsau (Bielz); Schässburg (c. a.); Altfluss (Deubel); Salzburg (Ormay).

92. *Cyblister Curtis.*

laferimarginalis Deg. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (? Deubel), Mediasch, Záh, Gyeke (Bielz); Salzburg, Nagyenyed, Tinód (Unterweissenburger Komitat), Marosujvár, Miriszló, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

V. *Gyrinidae.*93. *Gyrinus Geoffroy.*

bicolor Payk. Hermannstadt, Mezöség (Záh, Bielz); Szamosujvár (Ormay).
colymbus Er. Halvelagen bei Sch. (c. a.).
distinctus Aub. Rotenturm (Lauterbach), Bükszád (c. a.).
 var. *hungaricus* Seidl. Rotenturm, Bükszád (c. a.).
natator L. Schässburg, Héviz, Bükszád (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Da Bielz *G. colymbus* Er. und *distinctus* Aub. nicht bekannt waren, führe ich als Fundorte des *G. natator* L. nur jene an, die mir bekannt geworden sind.

94. *Orectochilus Lacord.*

villosus Müll. Fogarasch, Mediasch, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Vargyasbach (Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

VI. *Rhysodidae.*95. *Rhysodes Dalm.*

(*Omoglymnus*.)

Germari Ganglb. Alsó-Rákos (Tepe, Deubel).

(*Rhysodes* s. str.)

sulcatus F. (*exaratus* Dalm.). Kronstadt (Noa, Fichte, Méhely); Nussbach (Eiche b. Ameisen, Deubel).

Polyphaga.

Staphylinoidea.

VII. *Staphylinidae.*

Piestinae.

Plestini.

96. *Slagonium Kirby.*

quadricorne Kirby. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea-See), Baassen, Schässburg (c. a.); Klausenburg (Müller).

humerales Germ. Schässburg (c. a.).

97. *Thoracophorus Molsch.*

corticinus Motsch. Hermannstadt (Bielz); Baassen (Alter Nussbaum), Schässburg (Eichenholz, c. a.); Kronstadt (Götzentempel oberhalb der Flintschhöhle, alte Buche bei *Lasius brunneus*).

Oxytelinae.

Micropeplini.

98. *Micropeplus Latreille.*

laevipennis Epp. Rodnagebirge, Nagybagy-más, Bucsecs, Schuler-Gebirge (aus Grashüscheln gesiebt, Deubel); Schässburg (Hausgarten, wahrscheinlich aus Gesiebsel vom Kerzer Gebirge stammend, 20. Februar 1910, c. a.).

staphylinoides Marsh. Neudorf b. H. (Bielz).

fulvus Er. Malomviz (Lunka negru, Bachufer unter Moos, c. a.).

porcatus F. S.-Regen (Bielz); Előpatak (in einem Tümpel, c. a.); Kronstadt (gesiebt und gekötschert, Deubel); S.-Regen (Müller).

Phloeocharini.

99. *Phloeocharts Mannerheim.*

subtilissima Mannh. Durch das ganze Gebiet verbreitet unter Baumrinde und Laub.

100. *Olistherus Heer.*

substriatus Gyllb. Negoi, Fogarascher Geb. (Bielz); Bucsecs, Bistra (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel); Porkovicza (Zoodtal, Ormay).

Proteinini.

101. *Metopsia Wollaston.*
(*Phoeobium* Er.)

clypeatum Müll. Schässburg (auf Pilzen, c. a.); Gyógy (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

102. *Megarathrus Stephens.*

depressus Payk. Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Schanta (Ormay).

affinis Müll. (*sinuatocollis* Kr.). Hermannstadt (Bielz); Koronjis (Rodnagebirge, c. a.); Bodzaer Gebirge, Zernest (Deubel).

denticollis Beck. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Bistra (c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

sinuatocollis Lac. Rodnagebirge, Schnlurgebirge, Bistra, Retjezat (c. a.).

hemipterus Illig. Hermannstadt (J. W.), Rotenturm (Bielz); Schässburg, Baassen, Karlsburg (Ompolytza, c. a.); Tusnád (Deubel); Bistritz (Müller).

103. *Proteinus Latreille*.

- ovalis** Steph. Kronstadt (Zinne), Bucsecs (subalpin, Deubel).
brachypterus F. Mediasch (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Balánbánya (c. a.); Hermannstadt, Götzenberg, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Rosenau (Deubel).
limbalus Makl.
 var. **oblongus** Petri. Schässburg, Ober-Kerz, Rotenturm, Búdös (c. a.).
macropterus Gyllh. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Schanta, Prásbe (Ormay); Bistritz (Müller).
atomarius Er. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz).

Omalini.

104. *Anthobium Steph.*

- (*Anthobium* s. str.)
anale Er. Zibinsgebirge (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).
alpinum Heer. (montanum Er.). Resinar, Kerzer Gebirge (Bielz); Schuler-Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Schässburg, Kronstadt, Baassen, Borszék (c. a.).
palligerum Kiesenw. Alsó-Rákös, Schässburg, Oláhfalú (c. a.); Kronstadt (Deubel); Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallász).
longipenne Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schulergebirge, Unter-Kerz, Retjezat, Bistra, Balánbánya (c. a.); Götzenberg (Ormay); Detunata (Mallász).
 (Eusphalerum).
ophthalmicus Payk. Zibinsgebirge, Sächsl.-Regen (Bielz); Kerzer Gebirge, Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).
sorbi Gyllh. Michelsberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Bistritz (Müller).
Marshami Fauv. Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay).
torquatum Marsh. Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay).

Das Vorkommen dieser dem Westen Europas angehörigen Arten, *A. torquatum* Marsh. und *obsoletum* Er., bedarf jedenfalls weiterer Bestätigung.

- limbatum** Er. Kronstadt (Bielz); Schanta, Resinar (Ormay); Schuler-Gebirge, Rosenau (Deubel).
abdominale Grav. Fogarasch, Kronstadt? (Bielz).
 Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.
primulae Steph. Girelsau, Zood, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Schässburg, Schulergebirge (c. a.); Götzenberg (Ormay).

obsoletum Er. Zibinsgebirge (Bielz).

minutum F. Zibinsgebirge, Kronstadt, Oláhfalú (Bielz); Schässburg (c. a.); Klausenburg (Müller).

florale Panz. Gölzenberg, Fogarasch (Bielz); Zibinsgebirge (Klamm), Retjezat, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

105. *Acrulia Thomson*.

inflata Gyll. In unsern Gebirgen verbreitet.

106. *Acrolocha Thomson*.

striata Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (einigemal im Flug gefangen, dann aus Holzabfällen, Rinden etc. gesiebt, am 20. Februar siebte ich eine grössere Anzahl aus verwesenden Pflanzenstoffen im Hausgarten). Puj (Hlászeg, c. a.).

107. *Phyllodrepa Thomson*.

(*Phyllodrepa* s. str.)

floralis Payk. (rufipes Fauv. ex parte, *maculicornis* Heer.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Frecker Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schulergebirge, Balánbánya, Előpatak, Szováta, Schässburg (Kokel, Geniste, c. a.); Kronstadt (Deubel); Schanta (Ormay).

var. **nigra** Grav. Zibinsgebirge (Bielz).

salicis Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

melanocephala F. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und in altem Eichenholz, in Nestern der *Lasius fuliginosus* und *brunneus*, c. a.); Rosenau (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

(*Dropephila*.)

ioptera Steph. Szurdok-Pass (unter Rotbuchenrinde, Mai 1910, c. a.).

scabriuscula Kr. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge (Deubel).

linearis Zetterst. Bistra (wahrscheinlich unter Tannenrinde, c. a.).

(*Hapalaraea*.)

pygmaea Gyll. Schässburg (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Csukás, Rotenturm (Deubel).

(*Dialycera*.)

distincticornis Baudi. Schässburg (zwei Exemplare, das eine gekötscherl, das andere unter der Rinde eines alten Eichenstumpfes, c. a.).

Die Art ist zwar nur aus dem südlichen Gallien und Piemont bekannt; da jedoch die Beschreibung genau auf die vorliegenden Exemplare passt, dürfte kaum eine Verwechslung vorliegen. Dr. Bernhauer sah das eine der beiden Exemplare und bestätigte meine Determination.

108. *Omallum Gravenhorst.*

- rivulare** Payk. Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos, Rotenturm, Hátzeg (c. a.); Hermannstadt, Michelsberg, Heltau, Zood, Grosspold (Ormay).
- funebre** Fauv. Rodnagebirge (Hochalpin, aus Grashüscheln gesiebt, Deubel).
- oxyacanthae** Grav. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagebirge (Deubel, Ganglbauer); Bucsecs (Deubel).
- caesum** Grav. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Schuler-Gebirge, Malomviz, Torockó, Hátzeg, Rotenturm, Unter-Kerz, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Zood, Schanta, Gyógy (Ormay); S.-Regen (Müller).
- excavatum** Steph. Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Unter-Kerz, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Csukás, Bucsecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).
- validum** Kr. Bucsecs (alpin, Deubel).
- ferrugineum** Kr. Rotenturm, Bistra (c. a.).
- Lokayi** Fleischer. Bucsecs (Deubel, c. a.; in einem Jahre aus trockenem Reisig bei der Schutzhütte in grosser Anzahl, später nicht mehr gesammelt).

109. *Phloeonomus Heer.*

(Xylostiba.)

- monilicornis** Gyll. Kronstadt (Deubel); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter der losen, feuchten Rinde von Bergahorn).

(Phloeostiba.)

- planus** Payk. Gross-Scheuern (Bielz); Rátosnya (unter Erlenrinde), Bistra, Schässburg (am ausfliessenden Saft und unter Buchenrinde oft in grosser Zahl, c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

- lapponicus** Zett. Bistra (1 Exemplar, c. a.).

(Phloeonomus s. str.)

- pusillus** Grav. Hermannstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt, Zernest (c. a.).

- minus** Er. Schässburg (unter Eichenrinde oder aus Eichenholz, 11. April, c. a.).

110. *Xylodromus Heer.*

- affinis** Gerh. (cephalotes Epp.). Oláhfalú (Bad Homrod, c. a.).

- concinus** Marsh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Breite in altem Eichenholz, c. a.); Hátzeg (Deubel).

- depressus** Grav. (deplanatus Gyllh.) Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Reps, Oláhfalú, Schässburg (Lindenholz, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rátosnya (Müller).

- testaceus** Er. Hermannstadt (Bielz); Hátzeg (c. a.); Wolkendorf bei Kr. (Deubel).

111. *Philorinum Kraatz.*

- sordidum** Steph.

var. **Hopffgarteni** Epp. Siebenbürgen (Eppelsheim-Hopfgarten).

112. *Phyllodrepoidea Ganglbauer.*

- crenata** Grav. Kerzer Gebirge (Bielz).

113. *Lathrimaeum Erichson.*

- melanocephalum** Ill. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (einmal an Rinderknochen, c. a.); Schuler-Gebirge, Bucsecs (Deubel, subalpin); Präsbe (Ormay).

- atrocephalum** Gyll. Kronstadt (Bielz); Schässburg (unter Laub, sehr häufig, c. a.); Hermannstadt, Heltau, Gyógy (Ormay).

- unicolor** Marsh. Zibinsgebirge (Bielz).

L. **unicolor** Marsh., dem westlichen Europa angehörig, dürfte irrthümlich in unser Verzeichnis gekommen sein.

114. *Olophrum Erichs.*

- boreale** Payk. Schässburg (einmal gesammelt, c. a.).

- assimile** Payk. Kronstadt (Bielz); Baassen, Schässburg (Kokelufer unter Blättern in Weidengebüsch, c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

- alpinum** Heer. Hátzeg Gebirge (subalpin, Deubel).

115. *Arpedium Erichs.*

- quadratum** Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Giespreng, Deubel).

116. *Acidota Mannerh.*

- crenata** F. Ober-Sebes, Kerzer Gebirge (Bielz); Bucsecs, Schuler-Gebirge, Nagybagymás, Rodnagebirge (Deubel).

- cruentata** Mannh. Schässburg (7. November, Atelshill, Kokelufer im Geniste, c. a.).

117. *Amphichroum Kraatz.*

- canaliculatum** Erichs. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Malomviz, Szováta (c. a.); Bucsecs, Schuler-Gebirge, Nagybagymás, Rodnagebirge (Deubel).

- hirtellum** Heer. Kronstadt (Rititvoi, 1 ♂, c. a.).

118. *Lesteva Latreille.*

- pubescens** Mannh. Rotenturm, Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Balánbánya, Csukás (c. a.); Bucsecs (Deubel); Hermannstadt, Heltau, Vidra (Erzgebirge), Remete (Nagyenyed, Ormay).

longelytrata Goeze (linlor F, maura Er.).
Durch das ganze Berg- und Gebirgs-
land an Flussufern.
punctata Er. Zibinsgebirge (Bielz); Ba-
lánbánya (c. a.); Präsbe (Ormay).

119. *Geodromicus Redtenb.*

plagiatus F. Baassen (Bielz); Vargyas (in
der Nähe der Almascher Höhle,
Deubel).
a. *nigrita* Müll. Unter-Kerz, Tordaer
Schlucht (c. a.).
suturalis a. *concolor* Luze. (Grosses Exem-
plar). Schässburg (Kokelufer, c. a.).
puncticollis Wse. (*cardicollis* Petri). Schäss-
burg (Kokelufer, einmal unter Kukurutz-
stroh im Frühjahr gesammelt).

120. *Anthophagus Gravenh.*

Die Arten leben auf Blüten und Nadelholz, doch
werden einige auch unter Steinen auf Alpenwiesen
gesammelt.

(*Anthophagus* i. sp.)

bicornis Block. Präsbe, Kerzer Gebirge,
Maresgebirge (Bielz); Kronstadt, Zer-
nest (Deubel); Retjezat, Bucsecs (c.
a.); Schanta (Ormay); Detunata (Mal-
lász).

alpinus Payk. Szurul, Zibins-, Kerzer-,
Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodna-
gebirge (c. a.); Detunata (Mallász).

sudeticus Kiesenw. Zibinsgebirge, Negoi,
Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat, Pa-
ringul, Frecker Gebirge (Serbota, c.
a.); Bucsecs (Deubel).

alpestris Heer. Surul, Zibinsgebirge, Präsbe,
Fogarasch, Fogarascher, Kerzer Geb.
(Bielz); Retjezat, Paringul, Bistra, Bor-
szék, Rodnagebirge, Bucsecs, Schuler-
Gebirge, Schässburg (c. a.); Detunata
(Mallász).

abbreviatus F. Kronstadt (Bielz); Csukás,
Büdös, Schässburg (c. a.); Bistritz,
Schuler-, Fogarascher Gebirge (Deubel).

a. *fascifer* Reitter. Schässburg (c. a.).
melanocephalus Heer. Zibins-, Fogarascher
Gebirge (Bielz).

A. *melanocephalus* Heer dürfte wohl bei uns
nicht vorkommen; wahrscheinlich liegt hier eine
Verwechslung mit A. *omalinus* Zett. vor, den
Bielz nicht anführt.

omalinus Zett. Bucsecs, Schuler-Gebirge
(c. a.); Paringul, Hätzeger Gebirge,
Nagyhagymás (Deubel).

(*Phaganthus*.)

caraboides L. Zibinsgebirge, Hosszufalu,
Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf
Weidenblüten, wohl durch das ganze
Gebiet verbreitet).

praeustus Müll. Zernest (Plaju foi, Deubel).

121. *Eudectus Redtenb.*

Giraudi Redtenb. Bucsecs (Alpin und sub-
alpin gesiebt, Deubel).

122. *Coryphlodes Bernhauer.*

Deubeli Bernh. Rodnagebirge, Bucsecs (aus
Grasbüscheln gesiebt, Deubel).

123. *Niphetodes Mill.*

Die Arten werden aus Grasbüscheln gesiebt.

(*Niphetodes* s. str.)

Redtenbacheri Mill. Rodnagebirge (Koronjis,
c. a.), Kuhnern, Deubel).

Spaethi Ganglb. Rodnagebirge (Kuhhorn, c.
a., Deubel).

Eppelsheimi Ganglb. Rodnagebirge (Kuh-
horn, Koronjis, c. a., Saka, Deubel).
(*Hypsonothrus*.)

Deubeli Ganglb. Rodnagebirge (Kuhhorn),
Bucsecs (Deubel, c. a.); Kerzer Ge-
birge (Vunetare, c. a.).

Oxytelini.

124. *Syntomulum Curtis.*

aeneum Müll. Retenturm, Bülös, Frecker
Gebirge (c. a.); Rodnagebirge (Deu-
bel).

125. *Deleaster Erichs.*

An Flussufern im Gestein.

dichrous Grav. Kronstadt (Bielz); Unter-
Kerz, Schässburg (c. a.); Hermanns-
stadt, Retenturm (Ormay).

var. *Leachi* Curt. Michelsberg, Zood, Ro-
tenturm, Ober-Schebesch, Porcesest,
Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu
(Bielz); Unter-Kerz, Schässburg, Alsó-
Rákos (c. a.).

126. *Coprophilus Latreille.*

striatulus F. Gross-Scheuern, Gross-Schenk,
S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel);
Schässburg (c. a.).

127. *Acrognathus Er.*

mandibularis Gyll. Honigberg (Altufer, Deu-
bel).

128. *Planeustomus Duval.*

Kahri Kraatz. Siebenbürgen. (Lebt auf
sumpfigen Wiesen, gräbt in der Erde,
schwärmt gegen Sonnenuntergang).

palpalis Er. Honigberg (Altufer, Deubel).

129. *Ancyrophorus Kraatz.*

longipennis Fairm. Bucsecs (Subalpin, Deu-
bel).

omalinus Er. Csukás (Bachufer unter
Steinen, c. a.).

130. *Thinobius Kiesenw.*

(*Thinophilus*.)

linearis Kr. Honigberg (Altufer, Deubel).

131. *Trogophloeus Mannerh.*

(*Thinodromus*.)

dilatatus Er. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (c. a.); Rodnagebirge (Valea vinului), Alsó-Rákös (Deubel).

hirficollis Rey. Rotenturm (Altufcr unter Steinen, c. a.); Honigberg, Alsó-Rákös (Deubel).

(*Carpalimus*.)

arcuatus Steph. Gross-Schenk (Bielz); Unter-Kerz, Alsó-Rákös (Altufcr, c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel).

(*Trogophloeus* s. str.)

bilineatus Steph. An den Ufern süsser Gewässer durch das ganze Berg- und Hügelland.

rivularis Motsch. Schässburg (c. a.); Bistritz, Honigberg (Deubel).

(*Boopinus*.)

memnonius Er. Honigberg (Altufcr, Deubel).
polius Kiesenw. Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

(*Taeniosoma*.)

elongatus Er. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Kokelufer, häufig, c. a.); Talmesch (Ormay).

impressus Lec. Baroth (Méhely); Honigberg (Altufcr, Deubel).

corticinus Grav. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Talmesch (Ormay).

punctatellus Er. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.).

pusillus. Schässburg (Fuchsloch, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

subtilis Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

(*Troginus*.)

exiguus Er. Karlsburg (Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel).

132. *Haploderus Stephens.*

caelatus Grav. Hátszeg, Götzenberg, Präsbe, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Talmesch (Ormay); Bistritz (Müller).

caesus Er. Neudorf b. H. (Bielz); Karlsburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

133. *Oxytelus Gravenh.*

Die Arten leben unter faulenden Pflanzen- und Tierstoffen, oft in Exkrementen.

(*Oxytelus* s. str.)

rugosus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

opacus Kr. Fogarasch (Bielz).

rugifrons Hochb. Hátszeg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Oláhfalú (c. a.).

insecatus Grav. Hermannstadt, Holzmengen, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (3. April, auf Kohlblättern),

Marosujvár (c. a.); Schuler-Gebirge, Altufcr (Deubel).

fulvipes Er. Rotenturm (unter Blättern, c. a.).

(*Tanyraerus*.)

laqueatus Marsh. (uteipennis Er.). Salzbürg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge, Borszék, Bucsecs (c. a.); Paringul, Schulergebirge (Deubel).

(*Caccoporus*.)

piceus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(*Epomotylus*.)

sculptus Grav. Kronstadt, Schässburg, Záh (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Déva (c. a.).

(*Anotylus*.)

inustus Grav. Schässburg (Fuchsloch am ausfliessenden Saftc einer Buche, Witeberg, c. a.).

sculpturatus Grav. Kronstadt, Rotenturm, Zalatna (Präszaka), Schässburg (c. a.).

polius Er. Schässburg (Fuchsloch in 1 Exemplar, c. a.).

nitidulus Grav. Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Schässburg, Torockó, Naszód, Rodnagebirge (c. a.).

intricatus Er. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

complanatus Er. Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

clypeonitens Pand. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Zalatna (Präszaka), Schässburg, Karlsburg (c. a.).

tetracarinatus Block. Hermannstadt, Holzmengen, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Schässburg, Oláhfalú, Gyeke (Bielz); Gyógy (Ormay); Paringul (Deubel).

hamatus Fairm. Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenauer Geb., Rodnagebirge (Deubel).

134. *Platystethus Mannh.*

Die Arten dieser Gattung leben ähnlich wie die der vorigen.

(*Pycnocraerus*.)

arenarius Geoffr. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

laevis Kiesenw. Rodnagebirge. (Oberhalb der Baumregion aus Grashüscheln gesiebt, Deubel).

(*Platystethus* s. str.)

cornutus Grav. Hermannstadt, Grossschenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **alutaceus** Thoms. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

capito Heer. Karlsburg, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Schulergebirge, Honigberg (Altufcr, Deubel).

nodifrons Sahlb. Rodnagebirge (Deubel).

nifens Sahlb. Unter-Kerz, Schässburg, Torda, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

135. *Bledius Mannh.*

Die Arten dieser Gattung graben Gänge in der Erde, besonders in der Nähe der Gewässer.

(*Bledius* s. str.)

furcatus Ol. (taurus Germ.). Déva (Bielz).

tricornis Hbst. Salzburg, Schässburg (Bielz); Torda, Marosujvár, Baassen (c. a.); Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Nieder-Eidisch (Müller).

unicornis Germ. Déva, Salzburg (Bielz); Torda, Baassen, Szováta (c. a.).

(*Elbidus*.)

bicornis Germ. Salzburg (Bielz); Torda (c. a.).

(*Blediodes*.)

littoralis Heer. Kronstadt, Tartlau (Bielz).

pallipes Grav. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Altufer (Deubel).

longulus Er. Schässburg (c. a.).

opacus Block. Hermannstadt, Birtihalm, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos (c. a.).

atricapillus Germ. Hátszeg, Schässburg (Kokelufer in feuchten Letten, c. a.).

var. **nanus** Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kulterberg, Waldrand in lehmig-sandiger Erde, c. a.).

fracticornis Payk. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Előpaták (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

procerulus Er. Hátszeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

crassicollis Lac. Birtihalm (Bielz); Baroth (Méhely).

cubicollis Heer. Hermannstadt, Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).

dissimilis Er. Hermannstadt, Tartlau (Bielz); Karlsburg, Schässburg (Kokelufer, c. a.).

var. **nigricans** Er. Schässburg (c. a.).

erraticus Er. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Schässburg (Kulterberg zusammen mit *B. nanus* Er., c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Hesperophilus*.)

subterraneus Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Altufer (Deubel).

arenarius Payk. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

fossor Heer. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.).

Oxyporini.

Oxyporini.

136. *Oxyporus Fbr.*

Die Arten leben auf Hutpilzen.

rufus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

maxillosus F. Hátszeg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Bistra, Csukás (c. a.).

var. **angularis** Gebl. Csukás (c. a.).

var. **Schönherri** Mannh. Csukás (c. a.).

Steninae.

Stenini.

137. *Stenus Latr.*

(*Stenus* s. str.)

biguttatus L. Im ganzen Berg- und Hügel-land an den Ufern der süßen Gewässer.

var. **bipustulatus** Thoms. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

bipunctatus Er. Wie der vorige verbreitet, auch am Annen-See bei Tusnád.

longipes Heer. Déva, Zalatna, Héviz, Schässburg, Raassen, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **carinifrons**. Schässburg (Kokel, c. a.)

Stenus longipes var. *carinifrons*. Die Taster dieser Varietät sind ähnlich gefärbt wie die des *Stenus biguttatus* L., das erste Glied ist ganz, das zweite in der Wurzelhälfte gelb, das dritte an der Wurzel sehr schmal, etwas heller. Die ausgehöhlte Stirne ist kräftig gekielt. Bei einem Weibchen ist der Körper bläulichschwarz ohne Metallschimmer, während ein Männchen aus Mehadija lebhaften Schimmer besonders auf dem Abdomen besitzt. Die Varietät gehört entschieden zu *St. longipes*, da sie den schlanken Körper dieser Art besitzt; auch die gelbrote Makel auf den Flügeldecken stimmt nach Grösse und Lage genau mit der bei *St. longipes* überein, ebenso die Punktierung des Abdomens, welche bis zur Spitze desselben kräftiger und tiefer ist als bei *St. biguttatus*, auf welche diese Varietät nach der Tasterfärbung und Körperform gedeutet werden könnte. Auch die männlichen Geschlechtsauszeichnungen an den hintern Ventralsegmenten stimmen mit denen des *St. longipes* überein.

guttula Müll. Hátszeg, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Szurdok-Pass, Reys (c. a.).

stigmula Er. Schässburg (c. a.); Brenn-dorf (Priesterhügel am Altufer, Deubel).

bimaculatus Gyll. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Klausenburg.

Juno Payk. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

ater Mannh. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet.

clavicornis Scop. Schässburg, Reys, Nussbach, Kronstadt, Záh (Bielz); Tordaer Schlucht, Petrosény, Rotenturm, Baassen (c. a.).

providus Er. Kronstadt, Bükszád, Schässburg (Bielz); Baassen, Karlsburg, Szováta (c. a.); Hermannstadt, Heltau, Rotenturm, Kleinpold (Ormay).

scrutator Er. Kronstadt, Schässburg, Oláh-falu (Bielz).

Rogeri Kr. Rodnagebirge (Valea vinului). Oláh-falu (c. a.).

silvester Er. Rodna-Gebirge, Tordaer Schlucht, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (Müller).

proditor Er. Gyógy (Bad, Ormay).

asphaltinus Er. Talmesch (Bielz); Schässburg (c. a.).

fossulatus Er. Kronstadt, Bükszád (Bielz); Zalatna, Topánfalva, Schässburg, (Schleifengraben, c. a.).

gracilipes Kr. Kerzer Gebirge, Retjezat (c. a.); Vargyasbach (Deubel).

aterrimus Er. Schässburg (bei Formicaru), Gross-Alisch b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm (Ormay).

alpicola Fauv. Csukás, Bucsecs, Königstein (Deubel).

(Nestus.)

ruralis Er. Fogarasch (Bielz); Nussbach, Unter-Kerz, Nagyenyed (c. a.).

buphthalmus Grav. Hermannstadt (Bielz); Ober-Kerz, Unter-Kerz, Alsó-Rákos (Tepe), Schässburg (Kokeluf, c. a.); Honigberg (Altuf, Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay); Maros-Gebirge (Müller).

incrassatus Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel); Unter-Kerz (c. a.).

canaliculatus Gyll. Hermannstadt (Bielz).

morio Grav. Fogarasch, Schässburg (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

trivialis Kr. Nagyenyed (c. a.).

melanarius Steph. Kronstadt (Gespreng, Méhely); St. Annen-See (c. a.).

atratus Er. Oláh-falu (Bielz); Nagyenyed (c. a.).

subdepressus Rey. Unter-Kerz (c. a.).

melanopus Marsh. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay).

foraminosus Er. Schässburg (Bielz).

nanus Steph. Schässburg, Rotenturm (c. a.); Nagyhagymás, Schuler-Gebirge, Rodnagebirge (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

circularis Grav. Hätzeg, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Balánbánya, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

vafellus Er. Gross-Scheuern (Bielz); Unter-Kerz (c. a.).

cautus Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Ober-Kerz (c. a.).

fuscipes Grav. Hermannstadt (Bielz); Honigberg, Brenndorf (Altuf, Deubel).

Argus Grav. Honigberg (Altuf, Deubel).

humilis Er. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **phyllobates** Pennecke. Hätzeger Gebirge, Rodnagebirge (Deubel).

carbonarius Gyll. Nussbach (Bielz); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

(Tesnus.)

eumerus Kiesenw. Schässburg, Paringul, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

opticus Grav. Hermannstadt (Bielz).

crassus Steph. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg, Tordaer Schlucht, Unter-Kerz (Klosterweiher, c. a.).

formicetorum Mannh. Schässburg (c. a.).

nigritulus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

brunnipes Steph. Hätzeg, Rodnagebirge (c. a.).

(Hypostenus.)

latifrons Er. Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

tarsalis Ljungh. Petrozsény (c. a.); Hätzeg (Deubel).

similis Hbst. Hätzeg, Neudorf bei H, Schässburg, Reys, Héviz (Bielz); Schuler-Gebirge, Unter-Kerz, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Detunata (Mallász).

solutus Er. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

cicindeloides Schall. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Schuler-Gebirge, Baassen, Marosujvár (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt, Michelsberg, Talmesch, Rotenturm (Ormay).

fornicatus Steph. Kronstadt (Gespreng, Méhely); Honigberg (Altuf, Deubel).

(Hemistenus.)

binotatus Ljungh. Holzmengen, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Schuler-Gebirge (Deubel).

pallitarsis Steph. Holzmengen (Bielz); Brenndorf (Altuf), Kronstadt (Gespreng, Deubel).

picipes Steph. Hätzeg, Schässburg (Bielz).

bifoveolatus Gyll. Kronstadt (Deubel).

(Parastenus.)

glacialis Heer. Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs, Paringul, Nego (Deubel).

fuscicornis Er. Hermannstadt (c. a.).

Die Art wird wohl oft verwechselt werden mit *St. vafellus* Er. und *Argus* Grav., von denen sie leicht unterschieden werden kann durch tiefer gespaltenes viertes Tarsenglied und das gestreckte erste Glied der Hintertarsen, das deutlich länger ist als das Krallenglied.

geniculatus Grav. Hermannstadt (Bielz).

flavipalpis Thoms. Schässburg (c. a.).

transsilvanicus Bernh. Rodnagebirge (Saca, Deubel, c. a.); Bucsecs (c. a.).

palustris Er. Retjezat (Zenoga-See, c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Deubel).

Schässburg und Héviz sind zu streichen.
impressus Germ. Hermannstadt (Belz).

Schässburg und Héviz sind zu streichen.

Erichsoni Rye. Hermannstadt, Kronstadt, Reps, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg, Baassen, Balánbánya, Ratosnya, Rodnagebirge (c. a.).

montivagus Heer. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Präsbe (Ormay); Büdös, Borszék, Csukás, Bucsecs (c. a.); S.-Regen (Müller).

var. *coarcticollis* Epp. Frecker Gebirge (Serbota), Borszék, Ratosnya, Rodnagebirge (c. a.); Nagy-Hagymás (Deubel).

var. *carpathicus* Ganglb. Schuler-Gebirge, Alsó-Rákos, Balánbánya, Rosenauer Gebirge (c. a.); Nagyagymás, Paringul, Rodnagebirge (Deubel).

obscuripes Ganglb. Rodnagebirge (Ganglbauer, Deubel, c. a.); Bucsecs, Nagyagymás (Deubel).

pallipes Grav. Előpatak (c. a.); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Altufer, Deubel); Rotenturm (Ormay).

Kolbei Gerh. Schässburg, Rotenturm, Borszék (c. a.); Várhegy (Deubel); Rodnagebirge (Ganglbauer).

Reifferti Weis. Rodnagebirge (Szaka, Putredu, aus Grashüscheln gesiebt, c. a.); Bucsecs (Deubel).

138. *Dianous Samouelle*.

coerulescens Gyllh. Déva, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Csukás, Szurduk-Pass, Paringul (c. a.); Rodnagebirge (Valea vinului), Törzburg, Hátszeg (Deubel).

Euaesthetinae.

Euaesthetini.

139. *Euaesthetus Leconte*.

bipunctatus Ljungh. Kronstadt (Bielz); Schässburg (Breite, Witeberg, aus Grashüscheln gesiebt), Unter-Kerz (Klosterweiher, aus Moos gesiebt, c. a.).

ruficapillus Lac. Kronstadt (Gespreng), Rodnagebirge (Alpin, Deubel).

laeviusculus Mannh. Schuler-Gebirge (Deubel).

Paederinae.

Paederini.

140. *Astenus Stephens*.

(*Sanias* Er.)

uniformis Duv. Rosenau (Umgebung der Flintschhöhle, Deubel).

filiformis Latr. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Unter-Kerz, Marienburg b. Kr., S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Kakova (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. *laticeps*. Előpatak, Schässburg (c. a.).

A. *filiformis* a. *laticeps* Länge 4⁵—6 mm. Zur Vergleichung lagen mir vor zwei Exemplare *Astenus filiformis* Latr. aus Berlio. Unsere Exemplare besitzen meistens einen breiten und grösseren Kopf mit flacheren Augen und in der Anlage rechtwinkligen, weniger breit abgerundeten Schläfen, wodurch diese parallel oder nahezu parallel zu einander verlaufen, während sie bei den Berliner Stücken deutlich nach hinten konvergieren. Die Flügeldecken sowie die ersten Hinterleibssegmente sind etwas weniger dicht und gröber, körnig punktiert, glänzender, fast wie bei A. *cribrellus* Baudi, der mir aus Margellau (von Reitter stammend) vorliegt, von dem unsere Art jedoch durch breiteren, robusteren Körper, längere Flügeldecken, namentlich aber grösseren Kopf und breiteren Halschild zu unterscheiden ist.

angustatus Payk. Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Déva, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel). Wahrscheinlich über unser ganzes Hügel- und Bergland verbreitet.

var. *neglectus* Mark. Schässburg, Marienburg b. Sch., Borszék (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (bei Ameisen, Deubel).

immaculatus Steph. Hermannstadt, Előpatak (Bielz); Schässburg (c. a.).

141. *Paederus Fabr.*

(*Paederidus*.)

ruficollis F. (*sanguinicollis* Steph.). Hermannstadt, Holzmeigen, Kerz, Arpascher Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Héviz, Schässburg, Mediasch, Marosgebirge, Präsbe (Bielz); Karlsburg, Hátszeg, Nagyenyed, Petroszény, Előpatak (c. a.); Rotenturm, Talmesch, Remete, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

gemellus Kr. Hátszeg, Arpascher Gebirge, Dees (Bielz); Petroszény, Unter-Kerz, Héviz, Schässburg, Naszód, Ilvamika b. Naszól (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Paederus* s. str.)

riparius L. Hátszeg, Gross-Scheuern, Marienburg bei Kr. (Bielz); Heltan (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

fuscipes Curt. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Sächs.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Marosujvár, Petroszény (c. a.); Rodnagebirge (alpin), Schuler-Gebirge (Deubel).

limnophilus Er. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Porcesst, Marienburg b. Kr., Bükszád, Mediasch, Schässburg (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Ilvamika (bei Naszód, c. a.); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

littoralis Grav. (gregarius Fauv., vulgaris Mill.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

brevipennis Lac. Gross-Scheuern, Rotenturm, Záh, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Törzburg (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

142. *Stiliclus Serville.*

angustatus Geoffr. (fragilis Grav.). Hátszeg, Ober-Sebes, Reps, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufér, Deubel); Hermannstadt (Ormay).

subtilis Er. Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Karlsburg, Reps (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).

rufipes Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Balánbánya, Ober-Kerz, Előpatak, Karlsburg (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt (Deubel).

similis Er. Hátszeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen, Záh (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Rotenturm, Hermannstadt (Ormay).

orbiculatus Payk. Hermannstadt, Holzminen, Marienburg bei Kr., Bükszád (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Rotenturm (Ormay).

Erichsoni Fauv. Hermannstadt, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Rosenau, Zernest (Deubel).

143. *Scopaeus Kraatz.*

sulcicollis Steph. (cognatus Rey.). Kerzer Gebirge, Rotenturm (Ormay); Hátszeg, Schässburg, Baassen. (Auch in Maulwurfshäufen, in welchen die gelbe Ameise lebt).

minutus Er. (sulcicollis aut. et Ganglbauer). Kronstadt, Oláhfalú (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.).

minimus Er. Rotenturm, Ober-Kerz (Glashütte), Schässburg, Borszék (c. a.).

bicolor Bandi. Nagyenyed (c. a.).

gracilis Sperk. Schässburg, Búdös, Naszód (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

laevigatus Gyllh. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Unter-Kerz (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

144. *Lithocharis Lacord.*

ochracea Grav. Karlsburg, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Türkenhüll, von Schilfrohr geklopft, Oktober, c. a.).

145. *Medon Stephens.*

(Medon s. str.)

castaneus Grav. Hermannstadt (Bielz).

brunneus Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Torockó, Búdös, Schässburg, Szováta (c. a.).

ferrugineus Er. (brachypennis m. olim, nitidus Petri). Schässburg (Scherkes, am Waldrande unter Blättern im ersten Frühjahr, einmal im Fuchsloch).

fuscus Mannh. Gross-Scheuern, Holzmenen (Bielz); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel); Kakova (Ormay).

rufiventris Nordm. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, c. a.).

(Chloeocharis.)

melanocephalus F. Hátszeg, Hermannstadt, Zood (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Marosujvár (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Pseudomedon.)

obsoletus Nordm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kokelufer, in Geniste, 6. November, c. a.).

var. **obscurus** Er. Hermannstadt (Bielz).

146. *Lathrobium Gravenh.*

(Lobrathium.)

multipunctatum Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Rotenturm (Ormay).

(Platydomene.)

sodale Kr. Siehenbürgen (Katalog. col. Europa, 1906).

L. angusticollis Lac. ist aus dem Verzeichnisse siebenb. Käfer zu streichen.

picipes Er. Kerzer Gebirge (Ormay).

(Tetartopus.)

quadratum Payk. Déva, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

terminatum Grav. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel); Hermannstadt (Ormay).

angustatum Lac. Gross-Scheuern (Bielz); Rodnagebirge, Honigberg (Altufér, Deubel).

Nach Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa) soll diese Art nur im Westen von Europa bis Wien vorkommen; daher sind die Angaben für das Vorkommen der Art bei uns zu überprüfen, zumal Bielz L. scutellare Noim. nur als Varietät des L. angustatum auffasst.

scutellare Nordm. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

(Lathrobium s. str.)

rufipenne Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz).

Bükszád als Fundort des L. rufipenne Gyllh. ist irrtümlich aufgenommen worden.

elongatum L. Zibinsgebirge, Krizba, S.-Regen, Mezöség (Záh, Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

- geminum** Kr. (boreale Thoms. nec. Hochh.).
Bükszád (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Honigberg (Altuler, Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
ripicola Czwal. Kronstadt, Zernes, Vargyastal (Deubel).
laevipenne Heer. Bükszád (Bielz); Hátzeg (Krivalia), Rotenturm, Schässburg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).
castaneipenne Kol. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel); Geisterwald (Méhely).
fulvipenne Grav. Hátzeg, Präsbe, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay); Borszék (c. a.).
var. Letzneri Gerh. Honigberg (Altuler, Deubel); Schässburg (c. a.).
brunnipes F. Déva, Kerzer Gebirge, Mezőség (Záh, Bielz); Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
foveatum Steph. Honigberg (Altuler, Deubel).
filiforme Grav. Honigberg (Altuler, Deubel).
longulum Grav. Zibins-Gebirge (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
var. longipenne Fairm. Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).
dilutum Er. Schässburg (c. a.).
pallidum Nordm. Schässburg (c. a.); Geisterwald (Méhely); Várhegy (Deubel).

(Glyptomerus.)

- coecum** Friv. Rotenturm (Ormay); Karlsburg (aus einem verpilzten, modrigen Buchenstumpf gesiebt, c. a.).

147. *Scimbalium* Erichs.

- anale** Nordm. Siebenbürgen (Katalog, Coleopt. Europae).

148. *Achenium* Curtis.

- humile** Nic. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Altuler), Várhegy (Deubel); Szamosujvár (Ormay).

149. *Doliceon* Laporte.

- biguttatus** Lac. Déva (c. a.); Klausenburg (Müller).

150. *Cryptobium* Mannh.

- fracticornis** Payk. Zibinsgebirge, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt, Schässburg (Breite, auf sumpfigem Boden aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.);

- Rotenturm, Präsbe (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel); Rodnagebirge (Ganglbauer).
var. brevipenne Muls. Schässburg (c. a., mit der Stammform).

Staphylininae.

Xantholinini.

151. *Leptacinus* Erichs.

- batychrus** Gyll. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Hátzeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
var. linearis Grav. Kronstadt (Deubel).
formicetorum Maerk. Schässburg. (In den Nestern der grossen braunen Ameise, c. a.); Kronstadt (ebenso, Deubel).

152. *Xantholinus* Serville.

(Gyrolhypus.)

- punctulatus** Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
var. Thomsoni Schwarz. Zusammen mit der Stammform.
angustatus Steph. (ochraceus Gyll.). Hermannstadt, Reys, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm (Ormay); Kronstadt, Nagyhagymás, Rodnagebirge (Deubel).
atratus Heer. Kronstadt (bei Ameisen), Rodnagebirge (Deubel).
(Xantholinus s. str.)
relucens Grav. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
glaber Nordm. Schässburg. (In alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.).
rufipennis Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Honigberg (Altuler), Nussbach (Deubel).
decorus Er. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Sächsisch-Regen (Bielz); Hátzeg, Baassen, Schässburg. (In alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Bistritz (Müller).
tricolor F. Gross-Scheuern, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Malomviz (Hátzeg), Schässburg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Hermannstadt, Kronstadt, Hátzeg, Zernes, Alsó-Rákos (Deubel); Michelsberg, Heltau, Rotenturm, Präsbe, Porumbaker Gebirge (Ormay).
crassicornis Hochh. Schuler-Gebirge (Deubel).
procerus Er. Hátzeg (Bielz).
validus n. sp. Schässburg (Kokeluer, c. a.).

Xantholinus validus n. sp.

Nigro-piceus nitidus, palpis, antennarum articulis tribus basalibus, pedibus, abdominis segmentis ultimis, meso- et metasterno rufo-testaceis, elytris pallide testaceis. Caput oviforme, disperse subtiliter punctatum, medio laeve, striis frontalibus interioribus postice vix convergentibus, oculis mediocribus. Prothorax capite angustior, latitudine maxima sesqui longior, basin versus conspicue angustatus, lateribus disperse irregulariter punctatus. Elytra prothorace vix breviora, vix latiora, nitida, disperse subtiliter

punctata. Abdomen modice nitidum, subtiliter coriaceum, valde disperse punctulatum.

Länge 10⁵—11⁵ mm. 2 specimina.

Etwa von der Gestalt und Grösse des *X. relucens*, aber durch vollkommen eiförmigen Kopf, feine und gleichartige Punktierung desselben und andere Merkmale leicht zu unterscheiden.

Der Kopf ist vollkommen eiförmig, nach hinten stark gerundet, erweitert, mit vollkommen abgerundeten und breiten Schläfen, die vorderen Stirnfurchen parallel, nur an der äussersten erlöschenden Spitze etwas nach innen gebogen, die hinteren Stirnfurchen vom innern Augenrande schief nach rückwärts gerichtet und etwas ausserhalb der Richtung der vorderen Stirnfurchen in einem Grübchen endigend; sehr zerstreut und fein punktiert mit breiter, glatter Mittellinie. Die Fühler schwarz, die drei ersten Glieder heller, das dritte etwas länger als das zweite, konisch, die folgenden Glieder quer, die vorletzten an der Spitze fast doppelt so breit als lang. Der Halsschild schmaler als der Kopf, fast um die Hälfte länger als breit, nach hinten deutlich, wenn auch nicht sehr stark verengt, mit breitem, glattem Mittelfeld, die Seiten verworren fein punktiert, die Punkte vorne zahlreicher als hinten in der Mitte sehr spärlich und von derselben Stärke, wie die des Kopfes, separierte Mittelreihen kaum erkennbar. Flügeldecken fast von Halsschildlänge und kaum breiter als der Halsschild an der breitesten Stelle, glänzend zerstreut, feiner als der Halsschild und leicht punktiert. Schildchen glatt und dunkel. Hinterleib gewölbt, parallel, mässig, etwas fettig glänzend, fein chagriniert mit sehr zerstreuten feinen Punkten, sehr fein, etwas abstehend behaart (bei seitlicher Ansicht deutlich erkennbar) mit einzelnen längeren Borsten am Seitenrande, an der Spitze und auf der Unterseite, eine einzelne Borste steht auf dem fünften sichtbaren Dorsalsegmente zu beiden Seiten der Scheibenmitte vor dem Hinterrande. Tarsen nicht erweitert, sexuelle Unterschiede nicht bemerklich.

Ich hielt die Art bisher für *X. procerus* Er. Bei der Revision meiner Sammlung fiel mir der bedeutende Grössenunterschied zwischen meinen Exemplaren und den Angaben Erichson's auf und die Bemerkung bei Kraatz (Insekten Deutschlands, Staphylini, p. 637), dass *X. procerus* die „ansehnlichste europäische Art sei“. Später teilte mir Dr. Bernhauer, dem ich ein Stück vorlegte, mit, dass ihm das Tier unbekannt sei. Obgleich es nun schwer und unsicher ist, nach der Beschreibung Unterschiede aufzufinden, so glaube ich, ausser dem Grössenunterschiede, dem übrigens aus bekannten Gründen keine allzugrosse Bedeutung beigelegt werden darf, doch einige Unterschiede konstatieren zu können. Während die neue Art der Gestalt nach in die Nähe des *X. relucens* gehört, heisst sie die Kopfform und Punktierung des *X. distans*. Die Färbung von Kopf und Halsschild ist dunkelbraun, bei *X. procerus* schwarz mit Metallschimmer, bei letzterem sind die Flügeldecken braunrot, bei der neuen Art hell gelbbraun, wie bei *X. relucens*. Die drei ersten Fühlerglieder sind bei beiden Exemplaren heller, bei *X. procerus* schwarz. Die Kopfpunktierung des letzteren scheint kräftiger zu sein als bei der neuen Art, bei der sie ebenso fein ist als bei *X. distans* und etwas feiner als bei *X. tricolor*; auch die Punktierung der Flügeldecken ist zerstreuter, feiner und seichter als bei *X. procerus*.

Ob der von Biel aus Hätzeg angeführte *X. procerus* auch hieher gehört, kann vorläufig nicht entschieden werden, da mir Tiere aus dieser Gegend fehlen.

cribripennis Fauv. Schielfal (Bielz); Csukás (? c. a.).

distans Rey. Kronstadt (Bielz); Paringul, Zalata, Rotenturm, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge, Schuler-Gebirge, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

linearis Oliv. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *longiventris* Heer. Karlsburg, Unterkerz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

153. *Nudobius Thomson*.

lentus Grav. (Wingelmülleri Bern.). Kronstadt (Bielz); Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Hätzeg (Deubel); Rodnagerbirge (Ganglbauer, unter Fichtenrinde); Negoj (Wingelmüller teste Bernhauer).

154. *Ganropterus Thomson*. (Eulissus Epp.)

fulgidus F. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Marosgebirge, Dees (Bielz); Puj (Hätzeg); Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); S.-Regen (Müller).

155. *Baptolinus Kraatz*.

pilicornis Payk. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Bozauer Pass (Bielz); Bistra, Paringul, Retjezat, Bucsecs (c. a.); Schanta, Präsbe, Zood (Ormay).

affinis Payk. In unsern Berg- und Gebirgswäldern unter der Rinde verschiedener Baumarten.

156. *Othius Stephens*.

punctulatus Goeze (fulvipennis F.). Gross-Scheuern, Mediasch, Kronstadt, Hosszufalu, Bozauer Pass, S.-Regen, Malomviz, Hermannstadt, Búdös, Schässburg (in Wäldern unter Laub, c. a.); Gölsenberg, Szamosujvár (Ormay).

laeviusculus Steph. Schässburg (c. a.).

melanocephalus Grav. Kronstadt (Bielz); Rodnagerbirge (c. a.).

lapidicola Kiesenw. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucsecs, Rodnagerbirge (Deubel).

myrmecophilus Kiesenw. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

transsylvanicus Ganglbauer. Rotenturm, Schuler-Gebirge, Csukás, Rosenauer Gebirge, Balánbánya (Egyeskő), Rodnagerbirge (c. a.); Nagybagmás (Deubel).

crassus Motsch. (pallidus Brancsik). Zibinsgebirge (Porkovicza), Kerzer Geb., Gyógy (Ormay); Malomviz, Topánfalva, Ratosnya, Borszék, Balánbánya, Búdös, Bucsecs (c. a.); Bucsecs, Rodnagerbirge (Ganglbauer).

Staphyllinid.

157. *Actobius Fauvel.*

clnerascens Grav. Zibinsgebirge, Mezöség (Záh, Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

158. *Neobisnius Ganglbauer.*
(*Bisnius Thoms.*)

villosulus Steph. Schässburg (Kokelufer, im Geniste, c. a.); Kronstadt, Dees (Deubel).

procerulus Grav. Törzburg (Deubel).

var. *prolixus* Er. Zibinsgebirge, Fogarasch (Bielz); Rotenturm (Altfer unter Steinen), Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt, Bistritz, Rodnag. (Deubel).

159. *Hesperus Fauvel.*

rufipennis Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg. (In Eichenmulden, ein ♀ am ausfliessenden Eichensaft, ein ♂ im Moos am Fusse eines Ahornstammes).

160. *Philonthus Stephens.*

(*Philonthus s. str.*)

splendens F. Zibinsjäser, Negovan, Kerzer Gebirge, Hosszufalu, Dongókő. S.-Regen, Mezöség (Záh, Bielz); Rotenturm, Frecker Gebirge (Serbota), Klausenburg (Malomvölgy, c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

intermedius Lac. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Rinderdünge), Klausenburg (c. a.).

laminatus Creutz. Götzenberg, Kronstadt, Bodzaer Pass, Mediasch (Bielz); Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnag. (c. a.); Klausenburg (Müller).

laevicollis Lac. Neudorf b. H., Präsb, Frecker Jäser, Kronstadt, Piatra mare, Bozauer Pass, Mediasch, Bistritz (Bielz); Hermannstadt, Frecker Geb. (Serbota), Ba'ánbánya, Bistra. Rodnag. (c. a.).

montivagus Heer. Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay); Retjezat, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs, Schässburg, Rodnag. (c. a.).

cyanipennis F. Fogarascher Geb., Königstein (Bielz); Szováta, Schässburg (Fuchslochgraben unter Blättern, c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay); S.-Regen (Müller).

aeneus Rossi. Im ganzen Berg- und Hügel-land verbreitet.

chaliceus Steph. Hermannstadt, Schässburg (Breite, unter Eichenrinde, c. a.); Kronstadt (Deubel).

addendus Sharp. Kronstadt (Noa, Méhely); Klausenburg (c. a.).

carbonarius Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Nagyenyei (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely).

temporalis Rey. Kerzer Gebirge (Bulea), Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Szováta (c. a.).

atratus Grav. Déva, Gross-Schenern, Gross-Schenk, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Bülös, Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. *coerulescens* Lac. Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rotenturm, Ilvamika (Naszód, c. a.).

Bodemeyeri Epp. Rodnag. (Deubel).
rotundicollis Men. Dobra, Déva, Götzenberg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

aerosus Kiesenw. Retjezat (2 Exemplare, c. a.).

Meine zwei Exemplare (♂ und ♀) besitzen bloss eine Länge von 75 (♂) — 95 (♀) mm.

ebeninus Grav. Durch das ganze Berg- und Hügel-land verbreitet, auch im Rodnag. (c. a.).

corruscus Grav. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Schuler-Gebirge (Deubel).

concinus Grav. Kronstadt, Oberkomana (Méhely); Karlsburg, Schässburg, Rodnag. (c. a.); Nagyhagymás (Deubel); Detunata (Mallász).

sanguinolentus Grav. Gross-Scheuern, Michelsberg, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Klausenburg (c. a.).

immundus Gyllh. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Baassen, Ilvamika (Naszód), Bükszád, Rotenturm, Marosujvár (c. a.).

debilis Grav. Kronstadt, Bükszád, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (unter verwesenden Pflanzenstoffen, 20. Februar), Frecker Gebirge (Leita, in Sägespänen beim Sägewerk), Dees, Rodnag. (c. a.); Detunata (Mallász).

decorus Grav. In den Wäldern des ganzen Gebietes.

fuscipennis Mannh. (politus F.). Neudorf b. H., Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Kokelufer), Dees (Bielz); Klausenburg, Reys (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

Mannerheimi Fauv. (lucens Er.) Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Rodnag. (Deubel).

varius Gyllh. Mediasch, Oláhfalva (Bielz); Schässburg (Witeberg), Frecker Geb. (Serbota), Marosujvár, Tordaer

- Schlucht, Naszód (c. a.); Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).
- a. *bimaculatus* Grav. Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz).
- frigidus* Kiesenw. Retjezat, Paringul, Bucsecs (c. a.); Hátszeg (Deubel).
- marginatus* Stroem. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schuler-Gebirge, Mediasch (Bielz); Rotenturm, Szurduk-Pass (c. a.); Zoodgebirge (Porkovicza, Ormay); Marosgebirge (Müller).
- lepidus* Grav. Déva, Reps, Előpalak, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Alsó-Rákos, Rátosnya, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).
- nitidulus* Grav. Déva (Bielz).
- longicornis* Steph. Kronstadt (Bielz).
- fenestratus* Fauv. (bipustulatus Woll.) Hermannstadt (Ormay).
- cruentatus* Gmel. Michelsberg, Mediasch, Borgoer Pass (Bielz); Oláhfalú, Szurdukpass, Paringul, Schässburg (c. a.); Detunata (Mallász); Bistritz (Müller).
- varians* Payk. Gross-Schenk, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Schässburg, Karlsburg, Ilvamika (Naszód), Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt, Nagybagymás (Deubel).
- var. *agilis* Grav. Hermannstadt, Detunata (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel); Detunata (Mallász).
- albipes* Grav. Zibinsgebirge, Kronstadt, Bucsecs, Csukás, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Garten unter faulenden Pflanzenstoffen, c. a.); Hermannstadt (Ormay).
- var. *alpinus* Epp. Zoodgebirge, Kronstadt (Bielz).
- Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Varietät in Kronstadt.
- cephalotes* Grav. Hermannstadt, Holzmenzen, Kronstadt (Bielz); Oláhfalú (c. a.); Almaser Höhle (in grosser Menge, Deubel).
- fimetarius* Grav. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Schuler-Gebirge, Mediasch, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Nagyenyed, Rodnagebirge, Szurduk-Pass (c. a.); Baumgarten b. H., Kerzer Gebirge (Ormay).
- sordidus* Grav. Klausenburg (Bielz); Rotenturm (Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Marosgebirge (Müller).
- Scribae* Fauv. Talmesch (Bielz).
- fuscus* Grav. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Honigberg (Alt- ufer, Deubel).
- umbratilis* Grav. Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- corvinus* Er. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

- ventralis* Grav. Schielthal, Oláhfalú (Bielz); Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- discoidens* Grav. Déva, Bükszá, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Remeite (Nagyenyed, Ormay).
- quisquiliarius* Gyllh. Hermannstadt, Héviz, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. *inquinatus* Steph. Gyógy (Ormay); Baróth (Méhely); Schässburg (c. a.).
- rufimanns* Er. Zibinsgebirge (Bielz).
- fumarius* Grav. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (Knopf an feuchter Stelle, c. a.).
- virgo* Grav. Schässburg (c. a.).
- micans* Grav. Marosujvár (c. a.); Kronstadt, Nagybagymás (Deubel).
- fulvipes* F. Hermannstadt, Schässburg (Kokelufer, nicht selten, Bielz); Marosujvár, Naszód, Ilvamika (c. a.); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Hátszeg (Deubel); Detunata (Mallász); S.-Regen (Müller).
- punctus* Grav. Kronstadt (Bielz).
- (Rahigus.)
- tenuis* F. Hátszeg, Zood, Präbsbe, Nussbach, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Baassen, Schässburg (c. a.); Breundorf (Alt- ufer, Deubel).
- pullus* Nordm. Déva, Nussbach, Oláhfalú (Bielz); Petrozsény, Puj (Hátszeg), Zala, Rotenturm, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Rodnagebirge, Hátszeg (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay).
- (Gabrins.)
- vernalis* Grav. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.
- femoralis* Hochh. Balánbánya (Vigázókő, Méhely); Hátszeg (Deubel).
- exiguus* Nordm. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagebirge (Deubel).
- astutus* Er. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Szurduk-Pass (c. a.).
- nigritulus* Grav. Im ganzen Gebiete verbreitet.
- var. *trossulus* Nordm. Schässburg, Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.).
- var. *piliger* Rey. Rodnagebirge (Deubel, c. a.).
- splendidulus* Grav. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- Philonthus thermarum Aubé, welcher von Bielz aus Bükszá angeführt wurde, ist zu streichen, da das betreffende Exemplar meiner Sammlung ein kleiner, unausgefärbter Philonthus splendidulus Grav. ist.
- ### 161. Staphylinus Linné.
- (Trichoderma.)
- pubescens* Deg. Götzenberg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Puj (Hátszeg), Kerzer Gebirge, Klausenburg, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

(Abemas.)

chloropterus Panz. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagel, Kerzer Gebirge, Puj (Hätzeg), Klausenburg (c. a.).

(Platydracus.)

fulvipes Scop. Zibinsgebirge, Gurariu, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Balánbánya (c. a.).

stercorarius Oliv. Gross-Scheuern, Borgoer Pass, Kelemengebirge (Bielz); Nagyhagymás (Deubel).

chalconcephalus F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Fogarascher Gebirge (c. a.); Götzenberg (Ormay); S.-Regen (Müller).

latebricola Grav. Schässburg (c. a.).

(Staphylinus s. str.)

caesareus Cederh. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

erythropterus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Göerius.)

olens Müll. Schietal, Zibinsgebirge, Ober-Sebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

tenebricosus Grav. (brachyptera Fairm.). Hätzeg, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Nussbach, Kronstadt, Schässburg, Oláh-falu (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Präsbe (Ormay).

ophthalmicus Scop. Königstein (Bielz); Nagylak (Un erweisensburger Komitat, Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

similis F. (nitens Fauv.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

macrocephalus Grav. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Rodnagel, Balánbánya (Egyeskő, c. a.).

var. **Ormayi** Reitter. Präsbe, Schanta (Ormay); Schuler-Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota). Búdös (c. a.); Pietrosul (Kelemengebirge), Bucsecs (Deubel).

var. **alpestris** Er. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyhagymás (Deubel).

(Pseudocypas.)

brunnipes F. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

fuscatus Grav. Götzenberg, Kronstadt, Bucsecs, Mediasch, Marosgebirge (Bielz); Heltan, Hermannstadt, Torockó, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagel, Schässburg (c. a.).

mus Brüll. Surul (Bielz); Balánbánya, Schässburg (c. a.).

ploipennis F. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Königstein, Hosszufalu, Bükszád (Bielz); Nagyenied (Ormay); Torockó, Baassen, Schässburg, Tordaer Schlucht, Puj (Hätzeg), Klausenburg (c. a.); Detunata (Mallász); Marosgebirge Müll.).

aeneocephalus Dej. Talmesch, Kronstadt, Bucsecs, Dongókő, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Retjezat, Malomviz (c. a.); Marosgebirge (Müller).

fulvipennis Er. Hammersdorf, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Baassen, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

(Tasgius.)

pedator Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Puj (Hätzeg, c. a.); Várbely (Müller).

(Ocybus.)

falcifer Nordm. Mediasch (Bielz).

globulifer Geoffr. (edentulus Block.). Hätzeg, Hermannstadt, Götzenberg, Kronstadt, Hosszufalu, Sächs.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Nagyenied (c. a.).

compressus Marsh. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Kerzer Gebirge, Schässburg (c. a.).

162. *Ontholestes Ganglb.*

(Leistotrophus Kr.)

tessellatus Geoffr. (nebulosus F.). Michelsberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Balánbánya, Karlsburg, Schässburg (c. a.).

murinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

163. *Emus Curtis.*

hirtus L. Hätzeg, Hermannstadt, Girelsau, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Bistritz (Müller).

164. *Creophilus Mannh.*

maxillosus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **ciliaris** Steph. Hammersdorf (Bielz).

Quedlini.

165. *Quedius Stephens.*

(Ediquus.)

microps Grav. Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

Die Zahl der hintern Punkte des Scheitels scheint veränderlich und stimmt bei keinem meiner beiden Exemplare mit der Beschreibung überein. Bei dem einen Exemplar befindet sich zwischen dem hintern Augenrande und der Einschnürung des Halses fast in der Mitte nur ein grösserer Punkt, unmittelbar vor der Einschnürung ein fast ebenso grosser zweiter Punkt; bei dem andern Exemplar befinden sich zwischen dem hinteren Augenrand und der Einschnürung die beiden normalen Punkte, aber unmittelbar vor der Einschnürung ebenfalls zwei fast gleich-grosse Punkte nebeneinander.

longicornis Kr. n. sp. Schässburg (c. a.; 1 ♂).

Quedius (Ediquus) longicornis Kr. Länge 12 Millimeter.

Dunkelbraun, der Kopf pechschwarz, die Flügeldecken, die hinteren Ränder der Abdominalsegmente und die Hinterleibsspitze hell gelbbraun, die Beine und die beiden Wurzelglieder der Fühler rötlichbraun. Kopf querrundlich, vom Hals durch eine scharfe, vertiefte Linie abgeschnürt, die Augen fast nur von halber Schläfenlänge, fein chagriniert, matt, ausserdem fein etwas undicht, auf der Stirnmitte erloschen und entfernter punktiert. Der hintere Supraorbitalpunkt befindet sich in der Mitte zwischen dem vorderen und der Einschnürung, der kleinere Scheitelpunkt nahe der Einschnürung, etwas nach innen gerückt, neben demselben und auf den Schläfen zahlreiche gröbere Punkte, der grosse Schläfenpunkt etwas vor der Mitte der Schläfen. Die Oberlippe ist tief ausgerandet, wie die Mundteile ausser den braunen Mandibeln hell rötlichgelb. Das dritte Fühlerglied ist um die Hälfte länger als das zweite, die fünf vorletzten nach gewisser Richtung schwach quer. Der Halsschild breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, fein chagriniert, matt, die Hinterecken vollkommen verrundet, neben demselben tief eingedrückt, ausser den normalen drei Rückenpunkten befinden sich jederseits auf der Scheibe in einer zur dorsalen Punktreihe fast parallelen, aber etwas nach aussen gebogenen Reihe drei Diskalpunkte, von denen der dritte wesentlich weiter nach hinten gerückt ist als der hintere Dorsalpunkt, hiebei ist der vor dieser Reihe befindliche Marginalpunkt, welcher denselben Abstand vom Vorderrande besitzt, wie der in der Dorsalreihe mitgezählte Marginalpunkt, nicht mitgezählt. Ausserdem befindet sich noch ein Diskalpunkt im ersten Drittel in einiger Entfernung vom Seitenrande. Das dunkelbraune Schildchen ist glatt, die Flügeldecken so lang aber kaum so breit als der Halsschild, glänzend, nicht chagriniert, wenig dicht, kräftig punktiert und fein grau behaart, die Härchen etwas aufgerichtet, aber nach hinten geneigt. Der Hinterleib nach hinten nur schwach und allmählich verengt, glänzend, ebenso kräftig und nicht dichter als die Flügeldecken punktiert und fein grau niederliegend behaart. Das sechste Bauchsegment an der Spitze tief ausgerandet, die Vordertarsen mässig erweitert.

Dr. Bernhauer, dem ich die Art vorlegte, determiniert dieselbe als *Qu. longicornis* Kr. mit dem Bemerkung, dass die Beschreibung des *Qu. longicornis* bei Ganglbauer nicht ganz stimme. Weil nun weder Kraatz (Insekten Deutschlands. I. Abt., II. Bd., p. 494) etwas von einer ausserhalb der Rückenreihe befindlichen Punktreihe das Mindeste erwähnt, noch Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa, II. Bd.), der ausdrücklich bemerkt, dass ausser den drei Rückenpunkten keine andere Punkte auf dem Halsschild vorhanden seien, so lasse ich obige Beschreibung stehen. Durch Vergleich eines später von Herrn Bickhardt in Frankfurt a. M. eingesendeten Exemplares des *Qu. longicornis* aus West-Deutschland habe ich mich von der Richtigkeit der Bernhauerschen Determination überzeugt.

(Microsaurns.)

brevis Er. Schässburg (Oktober, in einer alten Eiche bei *Lasius brunneus*; c. a.).

lateralis Grav. Kronstadt (? Deubel); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchslöcher unter Laub, 2 Exemplare, c. a.).

brevicornis Thomson. Schässburg (in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen, 4 Exemplare; c. a.); Kronstadt (Möhely).

oohripennis Men. Hermannstadt (aus Pilzen, Ormay); Schässburg, Baassen, Reys, Kronstadt, Hammersdorf, Roßnagerbürg (c. a.).

fulgidus F. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

cruentus Oliv. Gross-Scheuern, Mediasch, S.-Regen, Mezöszög (Záh, Bielz); Baassen, Schässburg, Reys (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); S.-Regen (unter Weidenrinde, Müller).

var. **virens** Rottenbg. Bozauer Pass (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Kerzer Gebirge (Ormay).

ventralis Arag. Schässburg (Breite, in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen, 3 Exemplare, c. a.).

mesomelinus Marsh. Kronstadt (Bielz); Puj Hätzeg, Kriwadia (bei Hätzeg, Hölle), Zalatna (Hölle bei Präszaka), Karlsburg (Hölle im Ompolyitzatal), Retjezat, Büdös, Schässburg (c. a.); Schanta (Ormay).

maurus Sahlb. Ober-Kerz (Glashütte), Rotenturm, Schässburg (in einer alten Eiche, c. a.).

xanthopus Er. Kronstadt, Tartlau (Bielz); Büdös, Schässburg (in alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen), Bistra (c. a.).

scitus Grav. Schässburg (in einer alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eiche, 1 Exemplar, c. a.); Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

infuscatus Er. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz).

(Quedionuchus.)

cinctus Payk. Zibinsgebirge, Kronstadt, Teszla, Dongókő, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Malomviz, Klausenburg, Schässburg (c. a.).

punctatellus Heer. (pediculus Fauv.). Kerzer Gebirge (Bielz); Schuler-Gebirge, Hätzeg (c. a.); Rodnagerbürg (Deubel).

laevigatus Gyll. Götzenberg, Kerzer Geb., Bucecs, S.-Regen, Borgoer Pass (Temen, Bielz); Retjezat, Bistra, Zalatna, Schuler-Gebirge (c. a.); Schanta, Porumbacher Gebirge (Ormay); Zernest (Deubel); Rodnagerbürg (Ganglbauer).

a. **resplendens** Thoms. Bistra, Büdös (c. a.).

(Quedius s. str.)

fuliginosus Grav. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

tristis Grav. Kronstadt (Bielz).

molochinus Grav. Zibinsgebirge (Bielz). Schässburg (Scherkes, Waldrand unter Laub, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

(Sauridus.)

ochropterus Er. Zibins-Jäser, Götzenberg, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Retjezat,

- Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs, Borszék (c. a.); Paringul, Kelemen-gebirge (Deubel); Schanta, Zoodgeb., Kerzer Gebirge (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).
- a. *Kiesenwetteri* Ganglb. Paringul, Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagebirge (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).
- var. *obscuripunnis* Bernh. Csukás, Schuler-Gebirge, Balánbánya, Malomviz, Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).
- dubius* Heer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
- picipes* Mannh. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- transsylvanicus* Weise. Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.); Kerzer Gebirge (Bulea, Deubel).
- umbrinus* Er. Götzenberg, Kronstadt, S.-Regen, Borgoer Pass (Bielz); Malomviz, Balánbánya, Borszék, Előpatak, Schässburg (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).
- fumatus* Steph. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Hermannstadt, Szováta (c. a.).
- limbatus* Heer. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay).
- humeralis* Steph. Michelsberg (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- obliteratus* Erichs. Zibins-Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Heltau (Ormay); Hammersdorf, Toroczko, Büdös, Szováta, Hátszeg, Kronstadt, Rátosnya, Schässburg (c. a.).
- maurorufus* Grav. Zibinsgebirge, Bucsecs, S.-Regen (Bielz); Borszék, Balánbánya, Schuler-Gebirge (c. a.).
- Quedius riparius Kell., welchen Bielz aus Oláhfaln anführt, ist durch einen Irrtum meinerseits in das Verzeichnis gelangt, daher zu streichen.
- plancus* Er. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Zoodgebirge (Porkovicza, Ormay).
- scintillans* Grav. Zibinsgebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.).
- (*Raphirus*.)
- pyrenaicus* Bris. Kronstadt (Bielz); Csukás, Balánbánya, Büdös, Bistra (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).
- auricomus* Kiesenw. (*decoratus* Petri). Frecker Gebirge (Serbota), Paringul (c. a.).
- Dr. Bernhauer hat meinen Qu. *decoratus* als Qu. *auricomus* Kiesenw. bestimmt, der bisher nur aus Kärnten und dem westlichen Europa bekannt war.
- cincticollis* Kr. Surul (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Bucsecs, Balánbánya, Schuler-Gebirge, Retjezat (c. a.).
- alpestris* Heer. Kronstadt, Dongókő (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea), Zood (Ormay);

- Paringul, Szurdukpass, Bucsecs, Rodnagebirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
- rufipes* Grav. Zibins-Gebirge, Tesla, Dongókő (Bielz); Arpascher Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
- paradisianus* Heer. (*monticola* Er.). Frecker Gebirge, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Paringul, Malomviz, Bistra, Büdös, Rodnagebirge, Borszék, Bucsecs, Balánbánya (c. a.).
- collaris* Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Borszék, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Heltau (Ormay); Rodnagebirge (Ganglbauer).
- acuminatus* Hochh. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay).
- picipennis* Heer. (*altenuatus* Gyll.). Schielltal, Zibinsgebirge, Unter-Kerz (Bielz); Balánbánya, Schässburg, Oláhfaln (c. a.); Rotenturm (Ormay).
- Scribae* Ganglb. Zalatna, Schässburg (Türkenhill), Rodnagebirge (c. a.).
- beops* Grav. Hermannstadt, Kerzer Geb., Kronstadt, Tesla, Bozauer Pass (Krazna, Bielz); Schanta, Gyógy (Ormay); Karlsburg, Unter-Kerz, Alsó-Rákös, Baassen, Schässburg, Zalatna, Balánbánya, Hátszeg (c. a.); Detunata (Mallász).
- var. *fallaciosus* Kr. Rodna-Gebirge (Ganglbauer, c. a.).
- fulvicollis* Steph. Kerzer Gebirge (Bulea), Schuler-Gebirge, Malomviz, Paringul, Retjezat, Bucsecs, Borszék, Rodnageb. (c. a.).

166. *Velleius Mannh.*

- dilatatus* F. Klausenburg, Gyalu, S.-Regen, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Hangestein, im Mulin einer von Hornissen bewohnten Eiche, Deubel).

167. *Heterothops Stephens.*

- praevia* Er. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- dissimilis* Grav. Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Kronstadt (Zinne, c. a.); Rodnagebirge (Ganglbauer).

168. *Astrapaenus Gravenh.*

- ulmi* Rossi. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

169. *Euryporus Erichs.*

- picipes* Payk. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed, Büdös (c. a.); Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).

170. *Acylophorus Nordm.*

- glaberrimus* Herbst. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Atelshill, c. a.).

171. *Tanygnathus Erichs.*

terminalis Er. Unter-Kerz (Ufer des Klosterweihers, c. a.).

Tachyporinae.

Bolltoblini.

172. *Mycetoporus Mannh.*

(Ischnosoma.)

longicornis Mäkl. Schässburg (Siechhofberg, Gelber Berg, Witeberg, unter Laub, c. a.); Kronstadt (Deubel).

splendidus Grav. Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Unter-Kerz (c. a.).

(*Mycetoporus* s. str.)

orcophilus Bernh. Rodnagerbirge (Kuhhorn, Deubel, c. a.).

piceolus Rey. Rodnagerbirge (Deubel).

Mulsanti Ganglb. Schuler-Gebirge (c. a.); Bucsecs, Nagybagymás, Rodnagerbirge (Deubel).

Baudueri Rey. Baassen, Schässburg (c. a.); Rodnagerbirge (subalpin, Deubel).

a. *puncticollis* n. v. Hätzeg (c. a.).

Mycetoporus Baudueri a. *puncticollis*. Das von mir bei Hätzeg gesammelte Stück weicht vom normalen *Myc. Baudueri* nur durch den Besitz von je einem Diskalpunkte auf dem Halsschild ab. Dieser Punkt befindet sich hinter dem innern Vorderrandspitze etwas vor der Mitte des Halsschildes.

brunneus Marsh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

longulus Mannh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

bimaculatus Lac. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

punctipennis Scriba. Siebenbürgen (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, II. 371).

forticornis Fauv. Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hätzeg (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

ambiguus Luze. Schässburg, Rotenturm (c. a.).

clavicornis Steph. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Bucsecs, Kronstadt, Rodnagerbirge (Deubel).

solidicornis Steph. Hätzeg (Deubel, c. a.).

angularis Rey. Hätzeg (Deubel), Rodnagerbirge (alpin, Deubel, c. a.).

niger Fairm. Schulergebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

splendens Marsh. Balánbánya, Hätzeg, Rotenturm, Schässburg (c. a., aus Laub gesiebt); Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

Märkeli Kr. Rosenau, Zernest (Deubel). *Wingelmülleri* Luze. Siebenbürgen (Katalog. col. Europa).

rufescens Steph. Kronstadt (Bielz); Rosenau (Deubel).

laevicollis Epp. Bucsecs (Deubel); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

punctus Gyll. Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Szóváta (c. a.); Hätzeg, Nagybagymás, Rodnagerbirge (Deubel).

173. *Bryoporus Kraatz.*

rugipennis Pand. Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagerbirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

Bryoporus rugipennis a. *nigripennis*. Bei einigen Exemplaren ist nicht nur die Scheibe des Halsschildes, sondern auch die Flügeldecken dunkelbraun; ich schlage für diese Aberration den Namen *nigripennis* vor.

var. *nigripennis* n. a. Kerzer Gebirge, Rodnagerbirge (c. a.).

rufus Er. Bucsecs, Csukás, Balánbánya, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge, Nagybagymás, Hätzeg (Deubel).

cernuus Grav. Déva (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (Kälbertritt unter Laub, c. a.); Hätzeg (Deubel); Königstein (Méhely); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. *merdarius* Oliv. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagerbirge (Deubel).

174. *Bolytobius Mannh.*

(*Carphacis*.)

striatus Oliv. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Fogarascher Gebirge (Müller).

(*Lordithon*.)

bicolor Grav. Csukás (Anfang Juli auf Baumpilzen in Mehrzahl, c. a., Deubel).

trimaculatus Payk. Hätzeg, Dusch, Kerzer Gebirge Kronstadt? (Bielz); Csukás (c. a.).

var. *Kraatzii* Pand. Siebenbürgen (Bielz).

trinolatus Er. Hätzeg, Zibinsgebirge, Fogarasch, Olábfalu, Schässburg (Bielz); Kronstadt, Rodna (Deubel).

var. *discophorus* Rey. Schässburg (Fuchseloch, aus Baumschwämmen, c. a.).

exoletus Er. Schieltal, Hätzeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Olábfalu, Csukás, Rodnagerbirge (c. a.); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

thoracicus F. (*pygmaeus* F.). Hätzeg, Schieltal, Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen, Götzenberg (Bielz); Olábfalu, Rodnagerbirge (c. a.).

var. *biguttatus* Steph. (*intrusus* Hampe). Hermannstadt, Kronstadt, Olábfalu (Bielz); Bistra, Zalátna, Schässburg, Rodnagerbirge (c. a.).

(*Bolytobius* s. str.)

lunalutulus L. Auf Schwämmen durch das ganze Gebiet verbreitet.

Bei einem Exemplar meiner Sammlung von der Bistra ist die Spitze der vier Fühlerwurzelglieder schwärzlich und die Tibien und Tarsen gebräunt.

pulchellus Mannh. Hermannstadt (Ormay).
speciosus Er. Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Retjezat, Csukás, Rodnagelirge (c. a.); Negoï, Bucsecs, Gonosza-Bach (bei der Gonosza-Höhle, Deubel).

175. *Bryocharis Lacord.*

analís Payk. Zibinsgebirge (Bielz); Hätzeg (Deubel).
 var. *merdaria* Gyll. Rodnagelirge, Kronstadt (Deubel); Detunata (Mallász).
inclínans Grav. Kronstadt (Bielz); Bucsecs (subalpin, Deubel).
formosa Grav. Zibinsgebirge, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (Fuchsloch unter Laub in Hecken, c. a.); Hammersdorf (Deubel).

176. *Conosoma Kraatz.* (*Conurus* Steph.)

litoreum L. Hermannstadt, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelirge (Deubel).
pubescens Grav. Durch das ganze Gebiet unter Moos, Blättern, in modernem, mulligem Holz.
immaculatum Steph. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Előpatak, St. Annensec, Schässburg (c. a.).
pedicularius Grav. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet unter Laub und verwesenden Pflanzen.
bipunctatum Grav. Előpatak (in einem mulligen Weidenstamm in Mehrzahl, c. a.); Rosenau (Deubel).
bipustulatum Grav. Ober-Sebes (Bielz); Schässburg (im Moos alter Eichen, c. a.); Tahmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Rosenau (Deubel).

177. *Lamprinus Heer.*

erythropterus Panz. Schässburg (Reissel, 25. Juli in Mehrzahl, c. a.).

178. *Lamprinodes Luze.*

sagínatus Grav. Reps (Bielz).

179. *Tachyporus Gravenh.*

Diese Arten leben unter Laub und verwesenden Pflanzen- und Tierstoffen, zuweilen trifft man sie auch auf Blüten.

nifidulus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
macropterus Steph. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Előpatak, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 var. *Abner* Sauley. Karlsburg (c. a.).
pusillus Grav. Hermannstadt, Reps, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz, Előpatak, Oláhfalú (c. a.); Kronstadt, Nagybagymás (Deubel).

transversalis Grav. Girelsau (Bielz).

ruficollis Grav. Schiellthal, Hermannstadt, Fogarasch, Reps, S.-Regen (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.).

atriceps Steph. Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Előpatak, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

tersus Er. Reps, Schässburg (c. a.); Erösd (Altfluss, Deubel).

chrysomelinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *basalis* Epp. Kronstadt (Deubel).

hypnorum F. Wie der vorige verbreitet.
selufus Er. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Schenk, Előpatak, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel); Hätzeg, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Detunata (Mallász).

formosus Matth. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Dees (Méhely).

abdominalis F. Hermannstadt, Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Petrócsény, Karlsburg, Előpatak, Reps, (c. a.); Kronstadt (Deubel).

obtusus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

180. *Tachynus Gravenh.*

flavipes F. Zibinsgeb., Kronstadt, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

proximus Kr. Bodzaer Gebirge (subalpin, Deubel); Retjezat, Rodnagelirge (c. a.).

humeralis Grav. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bucsecs, Rodnagelirge (Deubel).

subterraneus L. Präsche (Bielz); Bodzaer Geb., Kronstadt (Deubel).

bipustulatus F. Neudorf b. H. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

pallipes Grav. Schiellthal, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Götzenberg (Ormay); Borszék, Csukás, Oláhfalú, Paringul, Rodnagelirge (c. a.).

fimetarius Grav. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Hätzeg, Schuler-Gebirge (c. a.); Michelsberg (Ormay).

rufipes Degeer. Götzenberg, Kerzer Geb., Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Paringul, Oláhfalú, Rodnagelirge (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Detunata (Mallász).

laticollis Grav. Kronstadt (Bielz); Schanta (Ormay); Hermannstadt, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Detunata (Mallász).

marginellus F. Götzenberg, Sachs.-Regen (Bielz); Hermannst. (Ormay); Rodnagelirge (Deubel); Szováta (c. a.).

collaris Grav. Gross-Scheuern, Götzenberg, S.-Regen (Bielz); Paringul, Malomviz, Rotenturm, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

rufipennis Gyll. Zibinsgebirge (Bielz). (Drymoporus.)

elongatus Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Bucsecs (c. a.); Kronstadt, Rodnageb. (Deubel).

181. *Coproporus Kraatz*.

colchicus Kr. Rosenau (Deubel).

182. *Leucoparyphus Kraatz*.

silphoides L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Götzenberg, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Déva (c. a.); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

Hypocyptini.

183. *Hypocyptus Mannh.*

longicornis Payk. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Büdös, Schässburg (aus Laub gesiebt, c. a.).

laeviusculus Mannh. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).

discoideus Er. Hermannstadt (Bielz); Baassen (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

seminulum. Zibinsgeb., Schässburg (Bielz); Unter-Kerz (Altuf, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Habrocerini.

184. *Habrocerus Erichs.*

capillaricornis Grav. Durch das ganze Gebiet in Buchenwäldern unter Laub.

Trychophyini.

185. *Trichophya Mannerh.*

pilicornis Gyll. Schässburg (Atelsbill, im Walde unter Blättern und am Kokei-fer unter Geniste, 13. Mai und 17. November, c. a.).

Aleocharinae.

Dinopsini.

186. *Dinopsis Matthews.*

erosa Steph. Zibins-Gebirge, Kronstadt (Bielz).

Myllaenini.

187. *Myllaena Erichs.*

dubia Gravenh. Kronstadt? (Deubel).

intermedia Er. Szurdok-Pass, Csukás, Unter-Kerz, Schässburg (an feuchten Orten aus Moos und Pflanzenbüscheln gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

brevicornis Matth. Götzenberg, Präsbe, (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

minuta Grav. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen. Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.).

infuscula Kr. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm (wie *M. intermedia* gesammelt, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Pronomaeini.

188. *Pronomaea Erichs.*

rostrata Er. Ober-Kerz (Glashütte), Unter-Kerz, Déva, Karlsburg, Schässburg, Baassen, Szováta (c. a.).

Hygronomini.

189. *Hygronoma Erichs.*

dimidiata Grav. Dobra (Bielz); Előpatak (auf Schilfrohr, c. a.).

Oligotini.

190. *Oligota Mannh.*

(Holobus.)

flavicornis Lac. Präsbe (Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

apicata Er. Kronstadt (Deubel); Schässburg (Langheltgraben, aus dem Moose eines Ahornstammes gesiebt, c. a.).

(*Oligota* s. str.)

granaria Er. Schässburg (Wahrscheinlich in einer alten Eiche bei *Lasius brunneus*, c. a.).

pusillima Grav. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Marosujvár (c. a., am 3. April auch auf Kohlstrünken gesammelt); Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel).

Bolitocharini.

191. *Brachida Rey.*

exigua Heer. Rotenturm, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

192. *Encephalus Westwood.*

complicans Westw. Hermannstadt (auf Schwämmen, (Ormay); Schässburg (Türkenhill, aus Büscheln von Sumpfpflanzen gesiebt); Rodnageb., Schuler Gebirge (Deubel).

193. *Gyrophæna Mannerh.*

Die Arten leben auf Pilzen.

Gyrophæna clavigera Scriba ist *Atheta clavigera* Scriba, wird also in der Gattung *Atheta* (*Rhopalocera*) aufgeführt. *Gyroph. pulchella* Heer, welche Bielz von Olábfalu anführt, ist zu streichen, da sie durch einen Irrtum meinerseits aufgenommen wurde.

(*Gyrophæna* s. str.)

affinis Sahlb. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Tordaer Schlucht, Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.).

nitidula Gyll. Präsbe (Bielz); Zalatna (Ompolyitzatal, Csukás (c. a.); Paringul (Deubel).

nana Payk. Präsbe, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

gentilis Er. Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Zalatna (Ompolyitzatal, Csukás, Büdös, Rodnagelbirge (c. a.).

bihamata Thoms. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Schässburg, Zalatna (Ompolyitzatal, c. a.).

fasciata Marsh. Bodzaer Gebirge, Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).

laevipennis Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

lucidula Er. Präsbe (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Poweri Crotch. Schässburg (c. a.)

minima Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás (c. a.); Kronstadt (Deubel).

manca Er. Borszék (Bielz); Déva, Előpatak, Schässburg (c. a.); Tusnád (Deubel).

(*Phaenogyra*.)

strictula Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Rosenau (Deubel).

polita Grav. Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Csukás (c. a.); Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).

boleti L. Kerzer Gebirge (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Schulergebirge, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Bucsecs (Deubel); Piatra mare (Méhely).

(*Agaricochara*.)

laevicollis Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

194. *Placusa Erichs.*

Die Arten leben unter Baumrinden.

(*Placusa* s. str.)

complanata Er. (*humilis* Er.). Kronstadt (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

pumilio Grav. Schässburg (c. a.); Ober-Komana (Méhely).

afrata Sahlb. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

tachyporoides Walt. (*infima* Er.). Hermannstadt (unter Nadelholz-Rinde, Ormay); Bistra, Borszék, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

(*Calpusa*.)

adscita Er. Hermannstadt (Nadelholzzrinde, Ormay).

195. *Cyphea Fauvel.*

curtula Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenau (Deubel).

196. *Thectura Thomson.*

cuspidata Er. Hermannstadt (Bielz); Marosujvár, Schässburg (Oktober 1910 in grosser Zahl unter der Rinde verpilzter Weidenstümpfe am Kokelufer, c. a.); Kronstadt (Deubel).

197. *Homalota Mannh.*

plana Gyll. Marosujvár (unter Schwarzpappel-Rinde), Bistra, Klausenburg (c. a.); Rodnagelbirge (Deubel).

198. *Silusa Erichs.*

(*Stenusa*.)

rubra Er. Schässburg Fuchsloch, auf Pilzen, c. a.).

(*Silusa* s. str.)

rubiginosa Er. Mező-ég (Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Szurdok-Pass (c. a.).

199. *Leptusa Kraatz.*

(*Leptusa* s. str.)

fuliginosa Aubé. Schässburg, Bistra (c. a.); Ilátszeg (Deubel).

angusta Aubé (anal. Gyll.). Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Präsbe, Kerzer Geb. (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Előpatak, Csukás, Unter-Kerz, Schulergebirge, Bucsecs, Büdös, Annensee, Borszék, Rodnagel, Paringul (c. a.).

haemorrhoidalis Heer. Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Bistra, Rodnagelbirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

(*Pachygluta*.)

ruficollis Er. Frecker Gebirge (Serbota, 1 ♀, c. a.).

(*Pasilia*.)

carpathica Weise. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Balánbánya (Egyeskő), Schulergebirge, Rodnagelbirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).

(Pisalia.)

eximia Kr. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Rodnagebirge (Bielz); Heltan, Schanta, Präsbe, Gyógy (Ormay); Frecker Geb. (Serbotia), Büdös, Reps, Bucsecs, Borszék (c. a.).

alpicola Brancs. Kerzer Gebirge (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay); Rodnagebirge, Borszék, Schuler-Gebirge (c. a.); Csukás, Nagybagymás (Deubel).

puellaris Hampe. Bucsecs, Königstein (Deubel); Rodnagebirge (c. a.).

flavicornis Brancs. Rodnagebirge (c. a.).

piceata Rey.

var. **Koronensis** Ganglb. Rodnagebirge (Korunjis, aber auch an andern Stellen, Ganglbauer, Deubel, c. a.).

200. *Euryusa Erichs.*

Die Arten leben bei Ameisen (*Lasius brunneus*) namentlich in alten Eichen.

castanoptera Kr. Csukás (c. a.).

optabilis Heer. Hätzeg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

sinuata Er. Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Előpatak, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

brachelytra Kiesenw. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Szováta, Alsó-Rákos, Ratosnya, Rotenturm, Bistra, Präszaka (Zalatna), Hätzeg, Schässburg, Szováta (c. a.); Hermannstadt, Gyógy (Ormay).

201. *Tachysida Rey.*

gracilis Er. Schässburg (Alte Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.).

202. *Phymatura Sahlberg.*

brevicollis Kr. Bistra (6 Exemplare, ♂ ♂ und ♀ ♀, c. a.).

Ich habe die Mundteile dieser Art mikroskopisch untersucht und gefunden, dass dieselben einige Abweichungen von denen der Gattung *Bolitochara* zeigen, welche wenigstens Ganglbauer in seinen „Käfern von Mitteleuropa“ II. Band, p. 266 nicht erwähnt, indem er bloss auf die nahe Verwandtschaft mit *Bolitochara* hinweist, ohne unter den unterscheidenden Merkmalen die Unterschiede im Bau der Mundteile zu erwähnen. Die Mandibeln sind nicht einfach, sondern zeigen hinter der Spitze, wenigstens bei der linken Mandibel, ein deutliches kleines Zahnchen. Das stiftförmige vierte Kiefertasterglied ist nicht halb so lang als das dritte, sondern hat $\frac{3}{4}$ der Länge desselben. Die Zunge erreicht die Spitze des zweiten Lippentastergliedes, die Paraglossen reichen bis zur Hälfte des zweiten Lippentastergliedes. Die Lippentasterglieder nehmen an Dicke allmählich etwas ab, die beiden ersten sind länger als dick und nahezu gleichlang, das dritte ist länger als das zweite und gegen die Spitze schwach verdickt.

Die geschlechtliche Auszeichnung besteht nicht nur in einem Körnchen vor dem Hinterrande des 7. Dorsalsegmentes, sondern auch das achte Dorsalsegment ist ausgezeichnet, indem der Hinterrand desselben in der Mitte schmal und wenig tief ausgerandet ist, und neben der

Ausrandung jederseits drei stumpfe kleine, aber deutliche Zähne stehen. Ich glaube kaum, dass wir es hier mit einer neuen Art zu tun haben, wohl aber dass diese Auszeichnung den früheren Beobachtern entgangen ist, weil das echte Dorsalsegment in der Regel fast vollständig unter das siebente zurückgezogen ist.

203. *Bolitochara Mannh.*

Die Arten leben auf Pilzen.

Reyi Sharp. Malomviz (Lunka negru, c. a.).

lucida Grav. Hätzeg Gebirge, Kronstadt (Bielz); Csukás, Előpatak, Büdös, Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

Mulsanti Sharp. Büdös, Schässburg (Siechhofwald, c. a.).

lunulata Payk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

bella Märk. Kronstadt (Bielz); Hätzeg, Karlsburg, Retjezal, Rotenturm, Schässburg, Unter-Kerz, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

obliqua Er. Retjezal, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Geb., Kronstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Csukás, Büdös, Schässburg (c. a.).

varia Er. Kronstadt (Zinne, Deubel).

204. *Autalia Mannerh.*

Die Arten leben auf Pilzen, auch in trockenem Rinderdünger, unter Laub.

impressa Oliv. Klausenburg (Bielz); Schässburg (in Pilzen, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

puncticollis Sharp. Kronstadt (Zinne, Deubel).

rivularis Grav. Harbachufer, Gross-Scheuern, Kronstadt, Maros-Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a., unter Laub).

Myrmedoniini.

205. *Falagria Mannh.*

Die Arten leben wie die vorigen.

(*Falagria* s. str.)

sulcata Payk. Hätzeg, Hermannstadt, S.-Regen, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Naszód (c. a.); Kronstadt (Deubel).

splendens Kr. Schässburg (1 Exemplar, c. a.).

sulcatula Grav. Hätzeg, Hermannstadt, Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Anaulacaspis*.)

thoracica Curt. Schielthal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Marosgeb. (Bielz); Unter-Kerz, Topánfalva (Erzgebirge), Rotenturm (c. a.); Gyógy (Ormay); Nagybagymás (Deubel).

nigra Grav. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

(Cardiolo.)

obscura Grav. Hátzeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.).

206. *Borboropora* Kraatz. (*Pseudoscopaeus* Weise.)

Reitleri Weise. Kerzer Gebirge (Glashütte).

207. *Tachyusa* Erichs.

Die Arten leben an den Ufern der Gewässer.
(*Ischnopeda*.)

umbratica Er. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Baassen, Szováta, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

exarata Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Cathusia.)

scitula Er. Karlsburg, Schässburg (c. a.).
(*Tachyusa* s. str.)

objecta Rey. Karlsburg, Schässburg, Unter-Kerz (c. a.).

coarctata Er. Hátzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Unter-Kerz, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Bistritz, Kronstadt (Deubel).

nitella Fauv. (*concinna* Kraatz nec Heer., Ganglb.). Baassen (c. a.).

constricta Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Dees, Kronstadt (Deubel).

(Calusia.)

balteata Er. Hátzeg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

208. *Gnypeta* Thomson.

carbonaria Mannh. Kronstadt (Deubel).

ripicola Kiesenw. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

velata Er. Honigberg (Altufur, Deubel).

209. *Aleuonota* Thomson.

(Aleuonota s. str.)

atricapilla Rey. (*rufotestacea* Kr.). Kronstadt (Bielz).

gracilentia Er. Rodnagerbirge (c. a.).

(Apimela.)

macella Er. Honigberg (Altufur, Deubel).

210. *Atheta* Thomson. (*Homalota* Er.)

(Hydresmectina.)

subtilissima Kr. Honigberg (Altufur, Deubel).

(Hydresmecta.)

fluviatilis Kr. Unter-Kerz (c. a.).

(Diacra.)

lutipes Er. Götzenberg, Präsbe (Bielz); Rotenturm (c. a.).

(Glossola Fowler-Alconota Rey.)

gregaria Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay, Deubel).

(Alconota Thoms.)

currax Kr. Puj (Hátzeg, c. a.); Rodnagerbirge, Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).
cambrica Woll. Bistra (c. a.); Kronstadt (Deubel).

aegyptiaca Motsch. Ober-Tömösch (Deubel).

Im Catalogus Col. Europae, Heyden etc. 12. 195 ist diese Art als fragliches Synonym zu *A. cambrica* Woll. gestellt.

sulcifrons Steph. Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel).

insecta Thoms. Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Rodnagerbirge, Vargyasfufer (Deubel).

(Metaxya.)

terminalis Grav.

var. **grisca** Thoms. Schässburg (c. a.).

melanocera Thoms. Hermannstadt, Baumgarten b. H. (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

elongatula Grav. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Rodnagerbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

morio Heer. Kronstadt (Deubel).

hygrotopora Kr. Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Vargyastal, Zernest (Deubel).

gemina Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

islandica Kr. Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagerbirge (c. a.).

(Hygroecia.)

fallaciola Sharp. Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Rodnagerbirge (determ. Eppelsheim, Deubel).

(Parameotica.)

laticeps Thoms. Schässburg, Rodnagerbirge (c. a.).

(Dracula.)

vilis Er. Götzenberg, Präsbe (Bielz).

(Orestiba.)

bosnica Ganglb. Bucsecs (Deubel, c. a., determ. Ganglbauer); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

Bielz kannte *Atheta bosnica* Ganglb. nicht, welche bei uns die *Atheta tibialis* Heer zu vertreten scheint; daher ist *A. tibialis* Heer vorläufig zu streichen.

(Taxicora.)

deplanata Grav. Marosujvár (c. a.).

(Dinaraea.)

angustata Gyll. Kronstadt, Altufur (Deubel).

aequata Er. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg, Marosujvár, Unter-Kerz (unter Baumrinde, c. a.); Tusnád (Deubel).

linearis Grav. Götzenberg, Präsbe, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Schässburg (unter Baumrinde, c. a.); Zernest (Deubel).

(Pachnida.)

nigella Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

(Alcanta.)
incana Er. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).
 (Plataraea.)
melanocephala Heer. Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (alpin, Deubel).
brunnea F. Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Rodnagebirge (c. a.).
 (Ptychandra.)
hepatica Er. Bistra, Rotenturm (c. a., 2 ♂♂).
 (Bessobia.)
occulta Er. Kronstadt (Méhely, an einer Hausmauer); Hermannstadt, Schässburg (Kokelufer, c. a.).
fungivora? Thoms. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
excellens Kr. Schässburg, Rodnagebirge (♂ c. a.).
 (Anopleta.)
corvina Thoms. (excavata Er.). Götzenberg, Präße (Bielz); Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).
arcana Er. Schnlergebirge, Bucsecs (Deubel).
 (Traumocelia.)
picipes Thomson. Surul, Kronstadt (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge, Bucsecs (Deubel).
angusticollis Thoms. (ravilla Kr.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.).
 (Philygra.)
palustris Kiesenw. Rotenturm, Präße (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel); Malomviz (c. a.).
procera Kr. St. Annensee, Schässburg (Siechhofberg, c. a.).
 (Microdota.)
aegra Heer. Rodnagebirge (c. a.).
excisa Epp. Rotenturm (♂, c. a.).
mortuorum Thoms. Rotenturm (c. a.).
amicula Steph. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (auf Kohlstrünken, 30. April, c. a.).
subtilis Scriba. Schässburg (Fuchsloch am ausfliessenden Saft einer Buche, März, c. a.); Vargyastal (Deubel).
spatula Fauv. Rodnagebirge (c. a.).
paleola Er. Schässburg (Fuchsloch auf einem Pilz, c. a.); Gyógy (auf Pilzen, Ormay).
 (Rhopalocera.)
clavigera Scriba (Atelshill, Kokelufer in Geniste, 7. November, c. a.).
 (Alaobia.)
scapularis Sahlb. Kerzer Gebirge (Bielz).
 (Atheta s. str.)
subterranea Rey. Bucsecs (c. a.).
nigricornis Thoms. Rodnagebirge (Koronjis, c. a.).
 Atheta excavata Gyl., welche Bielz anführt, dürfte A. excavata Er. = A. corvina Thoms. sein, da erstere nur aus Schweden und England bekannt ist.

divisa Märk. Schnlergebirge (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).
basicornis Rey. Schässburg (Breite, in einer alten Eiche, 7. Oktober, c. a.).
autumnalis Er. Karlsburg (Juli, c. a.).
oblita Er. Schässburg (Gross-Alischer Kupa, 4. Mai, c. a.); Kronstadt (Deubel).
coriaria Kr. Rodnagebirge (Deubel).
gagatina Baudi. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Heltan, Gyógy (Ormay); Rotenturm, Hätzeg, Schässburg (an ausfliessendem Buchensaft, c. a.); Tusnád (Deubel).
myrmecobia Kr. Rodnagebirge (c. a.).
sodalis Er. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Schässburg (c. a.); Tusnád (Deubel).
pallidicornis Thoms. Kerzer Gebirge (Bielz); Hätzeger Gebirge, Ompolytza (Karlsburg), Karlsburg, Csukás (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).
nigritula Grav. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Heltan, Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); Nagyenyed, Schässburg (altes Eichenholz, c. a.); Altufer, Hätzeg (Deubel).
liturata Steph. Bucsecs (Malajest, Méhely); Ompolytza (Karlsburg), Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
boletophila Thoms. Karlsburg, Bistra, Rotenturm, Schässburg (c. a.).
spelaea Er. (Ompolytza-Tal bei Karlsburg in einer von Fledermäusen bewohnten Höhle im Dünger derselben, c. a.).
crassicornis F. (sericans Grav.). Kronstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kleinpold (Ormay); Ober-Kerz (Glashütte), Zalatna, Rodnagebirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).
 ♀ var. **fulvipennis** Muls. Rotenturm (c. a.).
pilicornis Thomson. Rodnagebirge (Deubel); Schässburg, Bistra, Rotenturm (c. a.).
xanthopus Thoms. Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Kronstadt (Deubel).
trinotata Kr. Kronstadt (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Hätzeger Gebirge (c. a.).
euryptera Steph. Hermannstadt (Ormay, am ausfliessenden Eichensaft); Altufer (Deubel); Schässburg (auf Krautstrünken, 3. April, c. a.).
valida Kr. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).
aquatica Thoms. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
Pertyi Heer. Kronstadt, Hosszufalu (Bielz).
 Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.
castanoptera Mannh. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge Gyógy (Ormay); Unterkerz, Baassen, Schässburg, Schnlergebirge (c. a.); Tusnád (Deubel).

aquatilis Thomson. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
(Liogluta.)

hypnorum Kiesenw. Kronstadt (Deubel).

pagana Er. Bucsecs (Deubel).

granigera Kiesenw. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Bistra, Schässburg, Borszék, Ratosnya (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

♀ **var. subalpina** Rey. Bistra, Csukás (c. a.).

microptera Thoms. Rodnagebirge (Deubel).

longiuscula Grav. (vicina Steph.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hätzeg, Baassen, Bistra (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

nitidula Kr. Kronstadt (Bielz); Zoodgebirge (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Rákos (c. a.).

oblonga Er. (oblongiuscula Sharp.). Schanta (Ormay); Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Rákos, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Rodnagebirge (Deubel).

(Thinobaena.)

vestita Grav. Rosenau (Deubel).

(Dimetrota.)

contristata Kr. Bucsecs (Deubel).

atramentaria Gyllh. Schulergebirge (c. a.).

picipennis Mannh. (subrugosa Rey nec Kiesenw.). Fogarascher Gebirge, Zernest (Deubel); Bistra (c. a.).

putrida Kr. Rotenturm (c. a.); Bulesee, Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

cinnamoptera Thoms. Marosujvár, Tordaer Schlucht, Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

marcida Er. Rosenau (Deubel); Schässburg (c. a.).

laevana Rey. Karlsburg, Zalatna, Schässburg (auf Pilzen, c. a.).

(Badura.)

parvula Mannh. Rodnagebirge, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge, Nagybagymás (Deubel).

(Datomica.)

cribrata Kr. Rodnagebirge (c. a.).

sordidula Er. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz).

celata Er. Kronstadt (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

zosteriae Thoms. Kronstadt (Bielz); Borszék, Schässburg (29. Juli, Fuchsloch, c. a.).

(Pycnota.)

paradoxa Rey. (Skalitzky Bernh.). Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

(Chaetida.)

longicornis Grav. Gross-Scheuern (Bielz); Bükszád, Rodnagebirge (c. a.); Schuler-Gebirge, Kronstadt (Deubel).

(Coprothassa.)

consanguinea Epp. Kronstadt (Bielz); Schanta (Ormay).

melanaria Mannh. Baassen (c. a.).

sordida Marsh. Götzenberg, Präbsbe, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Rodnagebirge, Karlsburg, Baassen, Rotenturm (c. a.).

(Acrotona.)

pygmaea Grav. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Bistra (c. a.).

aterrima Grav. Götzenberg, Präbsbe (Bielz); Schanta (Ormay); Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

parva Sahlb. Bucsecs, Kronstadt, Zernest (Deubel).

parens Rey. Hätzeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

orphana Er. Rodnagebirge, Nagybagymás, Kronstadt (Deubel).

fungi Grav. Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rodna-Gebirge, Ratosnya, Előpatak, Schässburg (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel).

var. orbata Er. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (Kloster-teich), Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt, Altufer (Deubel).

clientula Er. (pulchra Kr.). Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen der A. clientula Er. in Kronstadt, ebenso das der A. sordidula Er.

fuscipes Heer. Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).

laticollis Steph. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

subsiniata Er. Karlsburg (am ausfliessenden Saft einer Ulme), Schässburg (c. a.).

(Amischa.)

analís Grav. Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Zalatna, Rodnagebirge, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

soror Kr. Götzenberg, Präbsbe (Bielz); Rodnagebirge, Paringul, Schässburg (c. a.).

cavifrons Sharp. Karlsburg, Schässburg (c. a.).

(Amidohia.)

talpa Heer. Schässburg, Búdös (c. a.); Kronstadt (Ameisennester, Deubel).

validiuscula Kr. Kronstadt (Bielz).

(Meotica.)

exilis Er. Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

indocilis Heer. Schässburg (Witeberg, an den Wurzeln von Pflanzen, c. a., determin. Ganglbauer).

211. *Sipalia* Rey.

infirma Weise (Leptusa infirma W.). Kerzer Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota, aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.); Nagybagymás (Deubel); Rodnageb. (Ganglbauer).

curtipennis Aub. Kronstadt (Zinne), Alt-
ufer (Deubel).

Deubeli Bernh. Alsó-Rákos (Deubel, c. a.);
Kronstadt (Zinne, Deubel).

Bielz kennt weder *S. curtipennis* Aub. noch
S. Deubeli, von denen erstere oft für *S.*
arida Epp. gehalten wurde, die bei uns wohl
nicht vorkommt, jedenfalls aber erst nachzu-
weisen sein wird.

armata Epp. Hátszeg, Baassen, Schäss-
burg (Kokelufer in Geniste, c. a.);
Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

circellaris Grav. Neudorf b. Il., Kronstadt
(Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Or-
may); Borszék, Előpatak, Schässburg
(c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

caesula Er. Balánbánya (c. a.).

alpicola Mill. (*Atheta alpicola* Mill.) Rodna-
gebirge, Zernerster Gebirge, Kerzer Ge-
birge (Bulca, c. a.).

carpathica Mill. Bucsecs (c. a.); Rodna-
gebirge (Deubel).

212. *Notothecta* Thoms.

flavipes Grav. Schässburg (Breite, 11. April
1909, c. a.); Kronstadt (Deubel).

confusa Märk. Schässburg (Breite, 11. April
1900, c. a.).

anceps. Schässburg (c. a.); Kronstadt
(Deubel).

213. *Dadobla* Thoms.

immersa Er. Rotenturm, Schässburg,
Büdös, Borszék (c. a., unter der Rinde
verschiedener Bäume); Kronstadt
(Noa, Deubel).

214. *Tomoglossa* Kraatz.

luteicornis Kr.? Schässburg (Türkenhill,
Oktober, c. a.).

215. *Callicerns* Gravenh.

rigidicornis Er. Ober-Kerz (Glashütte), To-
roczkó (Erzgebirge, Eichenstumpf, Juli
1903, c. a.).

216. *Thamlaraea* Thoms.

cinnamomea Grav. Kronstadt, Hosszufalu
(Bielz); Honigberg (Altufér), Alsó-
Rákos (Deubel).

hospita Märk. Kerzer Gebirge (Bielz);
Hátszeg (c. a.); Honigberg (Altufér,
Deubel).

217. *Astilbus* Stephens.

canaliculatus F. Durch das ganze Gebiet
verbreitet.

218. *Zyras* Stephens.

Die Arten leben in der Nähe oder in Ameisen-
nestern.

(*Zyras* s. str.)

collaris Payk. Hermannstadt, Gross-
Scheuern (Bielz); Unter-Kerz, Schäss-
burg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

fulgidus Grav. S.-Regen (Bielz); Hermann-
stadt (Ormay); Hátszeg (Deubel, c.
a.); Schässburg (c. a.).

Haworthi Steph. Gross-Scheuern, Klausen-
burg (Bielz); Gyógy (Ormay); Szó-
váta, Rotenturm, Rátosnya, Hammers-
dorf, Schässburg (bei *Myrmica laevi-*
nodis, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deu-
bel).

(Pella.)

funestus Grav. Hermannstadt, Mediasch,
S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyógy
(Ormay); Schässburg (bei *Lasius fuli-*
ginosus, c. a.); Kronstadt, Hátszeg
(Deubel).

cognatus Märk. Gross-Scheuern, Holzmen-
gen, Mezőség (Záh, Bielz); Gyergyó-
Tölgyes (Ormay); Schässburg (bei *La-*
sius fuliginosus, c. a.); Honigberg
(Deubel).

humeralis Grav. Hermannstadt, Harbach-
Tal, Hosszufalu (Bielz); Gyergyó-Töl-
gyes (Ormay); Kronstadt (Deubel);
Schässburg (c. a.); Klausenburg (Mül-
ler).

similis Märk. Hermannstadt (Ormay);
Schässburg (bei *Lasius fuliginosus*,
c. a.).

limbatus Payk. Schässburg (bei *Ponera*
contracta, c. a.); Honigberg (Deubel).

(*Myrmedonia* Er.)

lugens Grav. Mezőség (Bielz); Hermann-
stadt (Ormay); Schässburg (bei *La-*
sius brunneus, c. a.); Kronstadt (Deu-
bel); Klausenburg (Müller).

laticollis Märk. Schässburg (bei *Lasius*
fuliginosus, ziemlich häufig, c. a.);
Kronstadt (Deubel).

Hampei Kr. Hermannstadt (J. W., Bielz).

Da Bielz den *M. laticollis* Märk. nicht
anführt, liegt es nahe, anzunehmen, dass hier
eine Verwechslung vorliegt, da *M. Hampei* nur
aus Kroatien nachgewiesen ist.

(*Myrmoecia*.)

plicatus Er. Michelsberg, Mediasch (Bielz).

219. *Lomechusa* Gravenh.

strumosa Grav. Präsche (Bielz).

220. *Atemeles* Stephens.

emarginatus Payk. Hátszeg (Bielz); Schäss-
burg (bei *Myrmica rubra*, c. a.); Rátosnya
(Müller).

paradoxus Grav. Götzenberg, Präsche
(Bielz); Schässburg (Breite, April, in
Haufen der *Formica rufa*, c. a.); Kron-
stadt (Deubel).

Aleocharini.

221. *Phloeodroma Kraatz.*

concolor Kr. Schässburg (c. a.).

222. *Phloeopora Erichs.*

testacea Mannh. (reptans Er.). Porumbach, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

angustiformis Baudi. Ilátszeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

teres Grav. (corticalis Er.). Götzenberg, Präse, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und in altem Eichenholz, c. a.).

corticalis Grav. (major Kr., latens Er.). Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Klausenburg (Sigmund-Park unter Baumrinde, c. a.); Ilátszeg (Deubel).

223. *Ilyobates Kraatz.*

Die Arten leben in der Nähe oder in Ameisenkolonien.

nigricollis Payk. Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Schässburg (c. a.).

Meinen sämtlichen *I. nigricollis* fehlt die Aushöhlung des letzten Fühlergliedes, welche bei *I. Meeh* Baudi deutlich zu beobachten ist. Schliesslich besitzt das ♂, ähnlich wie die Männchen des *I. Meeh*, in der Mitte der Basis der vier ersten Dorsalsegmente ein etwas feineres Fältchen. Da aber die Tiere im übrigen mit der Beschreibung des *I. nigricollis* übereinzustimmen scheinen, getraue ich mich nicht, dieselben als neue Art anzusprechen.

var. *Deubeli* Bernh. Ober-Kerz (Glashütte), Héviz (c. a.); Bucsecs, Ilonigberg (Deubel).

Meeh Baudi. Ilátszeg, Schässburg, Előpatak, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

224. *Calodera Mannh.*

nigrita Mannh. Borgoer Pass (Bielz); Ilonigberg (Altufer, Deubel).

aethiops Grav. Ilonigberg (Altufer, Deubel).

uliginosa Er. Kerzer Gebirge (Bielz).

225. *Chilopora Kraatz.*

longitarsis Er. Schässburg (Schleifengraben), Krivadia (Ilátszeg, in einer Höhle, c. a.); Kronstadt, Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).

rubicunda Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

226. *Amarochara Thomson.*

(*Amarochara* s. str.)

umbrosa Er. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

(*Mniobates*.)

forticornis Lac. Götzenberg, Präse (Bielz); Schässburg (c. a.).

227. *Ocalea Erichs.*

badia Er. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Rodnagebirge (Deubel); Baassen, Büdös, Schässburg, Rotenturm, Malomviz (c. a.).

var. *puncticollis* Rey. Kronstadt (Bielz).

var. *robusta* Bernh. Büdös, Csukás (c. a.); Bucsecs, Kronstadt (Deubel).

picata Steph. Hermannstadt, Heltau (Ormay); Bucsecs (subalpin, Deubel).

228. *Deubelia Bernhauer.*

picina Aubé. Kronstadt (Gespreng, aus Rasen von Sumpfpflanzen gesiebt, Deubel; c. a.).

229. *Ocyusa Kraatz.*

(*Ocyusa* s. str.)

maura Er. Kronstadt (Gespreng, Deubel). (*Mniuss*.)

incrassata Rey. Schässburg (Scherkes, aus Laub gesiebt, 10. März, c. a.); Bucsecs, Schulergebirge, Nagyhagymás (Deubel).

230. *Oxypoda Mannh.*

Die Arten leben auf Pilzen, am ausfliessenden Bsumsaft, unter Laub etc.

(*Oxypoda* s. str.)

spectabilis Märk. (ruficornis Gyll.). Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Citendell, auf verpilztem Eichenstumpf, 12. Oktober, c. a.); Zernest (Deubel).

lividipennis Mannh. (luteipennis Er.). Hermannstadt (Ormay); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

opaca Grav. Zibins-Gebirge, Gross-Schenk (Bielz); Hermannstadt, Gyógy, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay); Balánbánya, Bistra, Baassen, Schässburg (unter faulenden Pflanzenstoffen, häufig, c. a.).

vittata Märk. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, (Ormay); Schässburg (an Eichenstämmen, c. a.).

longipes Rey. Kronstadt, Zernest, Schulergebirge (Deubel).

(*Podoxya*.)

nimbicola Fauv. Siebenbürgen (Catalogus Col. Europ. etc., 1906, col. 212); Rotenturm (c. a.).

vicina Kr. (humidula Er.). Schässburg (Kokel, Geniste, c. a.).

induta Rey. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

Skalitzkyi Bernh. Schulergebirge, Nussbach (Deubel); Rodnagebirge (c. a.).

umbrata Gyllh. Kronstadt (Bielz); Bistra, Rodnagebirge, Borszék, Baassen (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

sericea Heer. Schässburg (c. a.).

Doderoi Bernh. Kronstadt, Rosenau (Deubel).

exoleta Er. Rodnagebirge (Deubel, c. a.); Rotenturm (c. a.).

exigua Er. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Törzburg (Deubel).

(Deropoda.)

rufula Rey. Hermannstadt (Bielz).

rugulosa Kr. Rotenturm (c. a.).

(Baeoglana.)

praecox Er. Unter-Kerz (c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel).

(Mycetodrepa.)

alternans Grav. Rotenturm, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Borszék, Csukás (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

formosa Kr. Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

(Sphenomma.)

togata Er. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Borszék, Balánbánya (Egyeskő, aus dem Moos und den Algenbüscheln einer Quelle in Anzahl, c. a.).

montana Kr. Porumbacher Geb. (Ormay); Bucsecs, Kerzer Geb. (Bulea), Rodnagebirge (aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.).

rufa Kr. (praecellens Epp.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Puj (Hátszeg, c. a.); Erüsd (Altufcr, Deubel).

(Demosoma.)

bicolor Rey. Bucsecs (subalpin), Schulergebirge, Zernest (Deubel); Malomviz (c. a.).

haemorrhoea Mannh. Schässburg (aus dem Holze alter, kranker Eichen, c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

rugicollis Kr. Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel).

formiceticola Märk. Kronstadt? (Deubel).

amoena Fairm. Kronstadt (Bielz); Búdös (c. a.).

filiformis Redt. Karlsburg, Búdös, Schässburg (Kokelufer), Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

(Bessopora.)

soror Thoms. Paringul, Tordaer Schlucht, Rodnagebirge (c. a.); Nagybagymás, Bucsecs (Deubel).

Deubeli Bernh. Bucsecs, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

annularis Mannh. Kronstadt (Bielz); Göfzenberg (Ormay); Zalatna, Schässburg, Balánbánya, Búdös, Borszék (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs, Rodnagebirge (Deubel).

brachyptera Steph. Rodnagebirge (c. a.).

231. *Platyola* Rej.

fusicornis Rey. Marosujvár (Mai, c. a.).

232. *Stichoglossa* Fairm.

(*Stichoglossa* s. str.)

semirufa Er. Hermannstadt (Ormay); Baassen (c. a.).

(*Dexiogyra*.)

corticina Er. Hermannstadt (Bielz); Malomviz, Schässburg (c. a.); Honigberg (Altufcr, Deubel).

(*Ischnoglossa*.)

prolixa Grav. Bucsecs, Bistra (c. a.); Königstein, Nagybagymás (Deubel).

233. *Thiasophila* Kraatz.

angulata Er. Schässburg, Präszaka (Zalatna, in den Nestern der *Formica rufa*, c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

234. *Eurymninsa* Ganglb.

crassa Epp. Schässburg, Marosujvár, Unter-Kerz (c. a.).

235. *Cratararea* Thoms.

(*Microglossa* Kr. ex parte.)

suturalis Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Zernest (Deubel).

236. *Microglossa* Kraatz.

pulla Gyllh. Schässburg (in allen kranken Eichen), Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

gentilis Märk. Reps, Schässburg (bei *Lasius brunneus* in alten Eichen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

marginalis Grav. Honigberg (Altufcr, Deubel).

237. *Homoeusa* Kr.

acuminata Märk. Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Hátszeg, Schässburg, (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, oft in Gesellschaft der *Euryusa*-Arten, c. a.).

238. *Dinarda* Mannerh.

dentata Grav. Klausenburg, Schässburg in den Nestern der *Formica rufa*, c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **Märkeli** Kiesenw. Schässburg (mit der Stammform, c. a.); Kronstadt (Deubel).

239. *Aleochara* Gravenhorst.

Die Arten finden sich unter fanlenden Pflanzen- und Tierstoffen, einige in den Nestern von Ameisen.

(*Aleochara* s. str.)

curtula Goeze (fuscipes Grav.). Hátszeg, Gross-Scheuern, Mezöség, Gycke (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermann-

stadt, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).

crassicornis Lac. (*lateralis* Heer.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

laticornis Kr. Hätzeg (Deubel).

lala Grav. Rotenturm (c. a.).

brevipennis Grav. Kronstadt (Deubel).

var. *curta* Sahlb. (*fumata* Er.). Schässburg, Puj (Hätzeg, c. a.).

(Baryodma.)

intricata Mannh. (*hipunctata* Er.). Gross-Scheuern, Ober-Sebes, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Baumgarten (Ormay); Rodnageb., Kronstadt (Zinne, Deubel).

morlon Grav. Hermannstadt (Bielz); Rodnagebirge (Alpin, Deubel).

tristis Grav. Hätzeg, Hammersdorf, Holzungen (Bielz); Baassen, Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel).

moesta Grav. Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Onpolyczatal (bei Karlsburg, in einer Höhle auf den Exkrementen von Fledermäusen in grosser Zahl, c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Homoeochara.)

sparsa Heer. (*succicola* Thoms.). Kronstadt (Bielz); Marosujvár, Schässburg (Kokelufur), Rotenturm (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

(Polychara.)

lanuginosa Grav. Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Topánfalva (Erzgebirge, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

villosa Mannh. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Méhely); Schässburg (c. a.).

rufitarsis Heer.). Hätzeg (Deubel); Petrosény, Schässburg (c. a.).

sanguinea L. Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).

fumata Grav. (*mycetophaga* Kr.). Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

moerens Gyll. Kronstadt (Deubel).

haematodes Kr. Kerzer Gebirge (Bielz).
Das Vorkommen der *A. haematodes* Kr. bei uns scheint weiteren Nachweises zu bedürfen, da die Art dem südlichsten Europa angehört.

laevigata Gyll. (*bisignata* Er.). Salzburg, Neudorf b. H. (Bielz); Déva, Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Ceranota.)

erythroptera Grav. Bucsecs, Kronstadt (Deubel); Schässburg (Klossel, Eichenmuhl, 9. April, c. a.).

(Coprochara.)

bilineata Gyll. Oláhfalva (Bielz); Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

bipustulata L. (*nitida* Grav.). Salzburg, Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Schässburg, Bistra, Frecker Geb. (Scrobota), Rodnagebirge (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

VIII. Pselaphidae.

Faronini.

240. *Faronus Aubé.*

Laferlei Aub. Csukás (am Bachufer in 2 Exemplaren aus Laub gesiebt), Bucsecs (Deubel).

Raffrayi Lokay. Rodnagebirge (im September 1910 von Dr. Lokay gesiebt, Acta soc. ent. Bohemiae, VII, 1910, p. 91, fig.)

Euplectini.

241. *Sauleyella Reitter.*

Schmidtii Märk. Schässburg Fuchsloch, im Mai in einem von *Lasius brunneus* bewohnten Nussbaum, Breite, September und Oktober in Mehrzahl, im April in einem Exemplar in Eichen, welche von *Lasius brunneus* bewohnt waren, c. a.).

242. *Trimium Aubé.*

latipennis Tourn. (det. Reitter). Schässburg Breite, Oktober in alten, von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen, c. a.).

Merkli Reitter (det. Reitter). Schässburg (25. Juli, Reissel, im Mulm und Holz einer Linde, c. a.).

brevicornis Reichenb. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Előpatak, Rotenturm, Karlsburg, Schässburg (c. a.).

carpathicum Sauley. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Hätzeg, Schässburg unter Laub und in Baummuhl, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

243. *Euplectus Leach.*

(Plectophloeus.)

Euplectus cavifrons n. sp. Länge 1.4 mm. Schässburg (c. a.).

Euplecto nubigeno affinis, rufotestaceus, nitidus, subtilissime pubescens; capite transverso, temporibus rotundatis, impunctato, nitido, postice utrinque fovea rotundo impresso, antice transverse profunde sulcato, margine anteriore modice elevato, crassato, medio marginis postice late sinuato, utrinque subfoveolato. Antennae validae, articulis duobus basalibus incrassatis, 3 subquadrato, ultimis valde transversis. Prothorax laevis, subordatus, medio foveolis duobus latis, rotundis obsitus. Elytra latitudini posticae aequilonga, lateribus parum rotundato-amphata, stria humerali ante medium evanescente. Abdomen tergitis anterioribus haut lineatum, subtilissime dense coriaceum, modice nitidum.

Unter den Arten des Subgenus *Plectophloeus* besitzt keine andere eine ähnliche Stirn- und Färbung. In Gestalt und Färbung steht sie dem *Euplectus nubigena* nahe, ist aber etwas kleiner als die kleinsten Stücke derselben und während bei *E. nubigena* die beiden vorderen Stirngrübchen durch eine seichte Vertiefung verbunden sind, haben wir bei dieser Art eine stark vertiefte Querrinne, deren wulstiger Vorderrand auf der hinteren Seite in der Mitte

breit und seicht, aber deutlich ausgerandet ist, und in den äussersten Ecken der Furche befindet sich beiderseits je ein wenig auffälliges seichtes Grübchen. Die beiden hintern Stirngrübchen sind ründlich und isoliert und stehen weder mit der vorderen Furche noch untereinander in Verbindung. Die Fühler sind kräftig und kaum so lang als Kopf und Halsschild zusammengenommen, das vorletzte, stark quere Fühlerglied ist fast ebenso dick als der Knopf. Die beiden mittleren Grübchen des fast herzförmigen Halsschildes sind isoliert, das vordere seichter, ründlich, den Vorderrand nicht erreichend, das hintere etwas tiefer und etwas quer, das Seitengrübchen seicht und mit dem hintern Mittelgrübchen nur undeutlich verbunden.

nubigena Reitter. Kronstadt (Bielz); Csukás, Schässburg (c. a.).

venustus Csiki. Annal. mus. hung. VIII. 1910, Rotenturm (ungar. Nat.-Museum, col. Diener).

ornatifrons Reitter. Siebenbürgen, nahe der rumänischen Grenze (Wiener e. Ztg. XXIX. 151—163. 1910).

Tischeri Aub. (Tischeri Heer.). Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.)

carpathicus Reitter (det. Reitter). Frecker Gebirge (Serbota), Hätzeg, Rotenturm, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

(*Euplectus* i. sp.)

brunneus Grimmer. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucsecs (Deubel); Csukás, Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a., det. Reitter); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

Duponti Aubé. Kronstadt? (Deubel); Rodnagebirge (Ganglbauer, unter Buchenlaub.).

bescidicus Reitter (det. Reitter). Csukás (c. a.).

piceus Motsch. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg, Borszék (c. a.).

nanus Reichenb. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Szováta, Unter-Kerz, Schässburg, Marosujvár (c. a., det. Reitter); Rotenturm (Ormay).

sanguineus Denny. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

signatus Reichenb. Kronstadt (Bielz); Schässburg (unter Laub, c. a.).

Felschei Reitter (det. Reitter). Schässburg (alte Eiche bei *Lasius brunneus*, c. a.).

punctatus Muls. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos (in einem Lindenklötz bei Ameisen, c. a.).

falsus Bed. (intermedius Reitter). Schässburg, Csukás (c. a., det. Reitter).

Karsteni Reichenb. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*), Baassen, Marosujvár, Alsó-Rákos (c. a.).

244. *Bibloplectus* Reitter.

ambiguus Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

245. *Bibloporus* Thoms.

bicolor Denny. Holzmengen, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Kronstadt, Zalutna, Búdös, Borszék, Schässburg (im Mulm alter Eichen und Buchen, c. a.).

Trichonychini.

246. *Trichonyx* Baudi.

sulcicollis Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde einer vertrockneten Espe, welche von *Ponera contracta* und einer *Myrmica*-Art bewohnt war), Schässburg (in einer von *Lasius brunneus* bewohnten Weissbuche, c. a.).

247. *Amaurornyx* Reitter.

Märkeli Aub. Hermannstadt, Holzmengen (Bielz).

Batrini.

248. *Batrissus* Laporte.

Ormayeri Reitter. Michelsberg (Burg), Rotenturm (Bielz); Schässburg, Szurdok-Pass (in Maulwurfshaufen und unter Steinen bei der gelben Ameise, im Herbst und im Frühjahr, c. a.).

Die Beschreibung des Batr. Ormayeri Reitter bedarf insoweit einer Ergänzung, als weder Reitter noch Ganglbauer in ihren Beschreibungen des feinen, scharfen Dornes Erwähnung tun, welcher beim Männchen an der Unterseite der Mittelschenkel deutlich wahrnehmbar ist, und zwar nicht nur bei den aus der Gegend von Schässburg stammenden Exemplaren, sondern auch bei denen vom Rotenturm- und Szurdok-Pass.

formicarius Aub. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen, Alsó-Rákos, Hätzeg, Schässburg (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, seltener in Ameisenhaufen der *Formica rufa* in Eichenwäldern, auch auf der Weissbuche, c. a.); Bistritz (Müller).

249. *Batrissodes* Reitter.

moreanus Reitter (det. Reitter). Schässburg (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, einmal in einer alten Weissbuche), Baassen, Rosenau (c. a.).

Ich habe unsere Art und vier Weibchen vom Csorbasee in Ungarn mit zwei deutschen Stücken, mir von Reitter freundlichst übersendet, das ♀ aus Baiern stammend und von Flach gesammelt, verglichen und gefunden, dass *B. moreanus* sich tatsächlich von *B. Delaportei*

durch kräftigere Fühler und obsoletes Rückenlättchen auf den Flügeldecken unterscheidet. Der Unterschied im Fühlerbau tritt namentlich beim Weibchen hervor: während bei Delaportei alle Fühlerglieder bis zum achten wenigstens so lang als breit, das vierte und fünfte sogar länger sind, sind die Fühlerglieder des weiblichen *moreanus* von vier an umso deutlicher quer, je näher sie der Spitze sind, das neunte Glied ist kaum merklich breiter als das achte, die dreigliedrige Keule daher kaum abgesetzt; an der Spitze der männlichen Mittelschienen befindet sich ein deutlicher feiner Sporn. *B. moreanus* scheint den *B. Delaportei* im östlichen Europa zu vertreten.

venustus Reichenb. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Hätzeg, Baassen (Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Kronstadt (Deubel).

adnexus Hampe. Csukás, Schässburg (wie der vorige, aber selten); Kronstadt, Tusnád (Deubel).

exculptus Hampe. Hermannstadt (Bielz).

oculatus Aub. Hermannstadt (Bielz).

Bryaxini.

250. *Brachygluta* Thomson.

xanthoptera Reichenb. Kerzer Gebirge, Tartlau (Bielz); Nagyenyel, Unter-Kerz (c. a.).

fossulata Reichenb. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Heltau, Rotenturm (Ormay); Baassen, Unter-Kerz, Schässburg (c. a., wohl im ganzen Gebiet verbreitet, unter Laub und Gras), Kronstadt (Deubel).

iristis Hampe. Hermannstadt (Bielz); Szováta (auf Salzboden), Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

Helleri Schmidt. Déva (Bielz); Dees-Akna (c. a.).

haematica Reichenb. Durch das ganze Berg- und Hügelland am Ufer süsser Gewässer.

♂ var. **trigonoprecta** Ganglb. Zusammen mit der Stammform.

♂ var. **sinuata** Aub. Mit der Stammform.

251. *Reichenbachia* Leach.

juncorum Leach. Bistritz (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (c. a.).

impressa Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel, c. a.).

autennata Aub. Schässburg (Türkenhill, im Röhricht einer sumpfigen Stelle in grösserer Anzahl, 24. Oktober, ♂ und ♀, c. a.).

252. *Bryaxis* Sauley. (*Rybaxis* Sauley.)

longicornis Leach. (*sanguinea* auct.). Hermannstadt, Michelsberg, Götzenberg, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

Bythini.

253. *Bythinus* Leach.

(*Arceopagus*.)

crassicornis Motsch. Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Topánfalva (Erzgebirge), Unterkerz, Csukás, Hätzeg, Alsó-Rákös, Ratosnya, Büdös, Rotenturm, Schässburg (unter Laub, wohl durch das ganze Gebiet verbreitet); Bucsecs (Deubel); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay).

bajulus Hampe. Kronstadt, Bucsecs (Bielz); Hätzeg, Alsó-Rákös, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Heltau, Gyógy (Ormay).

♂ var. **Ormayi** Ganglb. Torockzó, Hätzeg, Karlsburg, Rotenturm, Schässburg (c. a.).

Reitteri Sauley. Kerzer Gebirge (Bielz); Götzenberg (Ormay); Rotenturm (c. a.); Bucsecs, Kelemengebirge, Rodnagebirge (Deubel).

var. **sculptifrons** Reitter. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz, Borszék, Torockzó (c. a.); Gyógy (Ormay).

carpathicus Sauley. Bucsecs (Alpin, Deubel).

Deubel führt wohl den *B. carpathicus* für den Bucsecs an, aber als fraglich; seiner Ansicht nach dürfte auch dieser *Bythinus* der *B. transsylvanicus* sein.

transsylvanicus Ganglb. Bucsecs (c. a.).

musorum Kiesenw. Kronstadt (Bielz).

femoratus Aub. Kronstadt, Rotenturm (c. a., 3 ♂♂); Hätzeg (Deubel).

Weisei Sauley. Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

bulbifer Reichenb. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Heltau (Ormay); Unter-Kerz (c. a.).

Curtisi Leach. Hermannstadt (Bielz); Baumgarten, Heltau, Michelsberg, Kerzer Gebirge (Ormay); Unter-Kerz, Büdös, Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagebirge (Deubel).

var. **hungaricus** Reitter. Gyógy (Ormay); Schässburg, Baassen, Rotenturm (c. a.).

nodicornis Aub. Kronstadt (Bielz); Talmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); Hätzeg, Kerzer Geb. (Bulea), Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.).

Deubeli Ganglb. Rodnagebirge (Ganglbauer, c. a., Deubel); Büdös (c. a.); Bucsecs, Nagybagmás (Deubel).

ruthenus Sauley. Negoj (subalpin, Deubel).

acutangulus Reitter. Kronstadt, Bucsecs, Hätzeg (Deubel).

securiger Reichenb. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

macropalpus Aub. (*distinctus* Chaud.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Türkenhill, an sumpfiger Stelle, Oktober, c. a.); Kronstadt (Deubel); S. - Regen (Müller).

Hoptfgarteni Reitter. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

lunicornis Reitter. Bucsecs, Rosenauer Gebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Burrelli Denny. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Schässburg (c. a.).

nigripennis Aub. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Talmesch, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Rodnagebirge, Schässburg (c. a.).

Stussineri Reitter. Nagyhagymás (Deubel).

validus Aub. Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

puncficollis Denny. Hermannstadt, Unterkarz, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Rotenturm, Büdös, Topánfalva (Erzgebirge), Schässburg (c. a.).

254. *Tychus* Leach.

niger Payk. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kerz, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Rotenturm, Karlsburg, Kronstadt (Kapellenberg), Schässburg (c. a.); Nagyhagymás, Bucsecs (Deubel).

var. **dichrous** Schmidt. Schässburg (c. a.).

Pselaphini.

255. *Pselaphus* Herbst.

Die Arten werden aus Laub und verwesenden Pflanzenstoffen gesiebt.

Helsei Herbst. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Borszék, Rotenturm (c. a.); Kerzer Gebirge, Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Bistritz, Klausenburg (Müller).

mehadiensis Friv. Rotenturm (aus Laub gesiebt, c. a., Deubel).

Ctenistini.

256. *Ctenistes* Reichenbach.

Die Art lebt wie die Pselaphiden.

palpalis Reichenb. Hätzeg, Dobra, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, BIRTHÄLM (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).

Tyrini.

257. *Tyrus* Aubé.

mucronatus Panz. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Götzenberg, Präshe (Ormay); Szurduk - Pass, Előpatak, Büdös, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

IX. Clavigeridae.

258. *Claviger* Preysler.

testaceus Preyssl. Hätzeg, Gross-Scheuern, Michelsberg (Burg, Bielz); Rotenturm (in den Nestern der *Lasius flavus*, unter Steinen zusammen mit *Batrachus* Ormay); Szurduk-Pass (c. a.).

longicornis Müll. Götzenberg (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, in einem Baumstrunk bei *Myrmica rubra*, c. a.); S.-Regen (Müller).

X. Scydmaenidae.

Cephenini.

259. *Euthiconus* Reitter.

parallelocollis Saulcy. Kerzer Gebirge (Bielz); Gyógy (Ormay).

260. *Euthia* Stephens.

plicata Gyllenh. Kronstadt (Zinne, Bielz); Wolkendorf b. Kr. (Deubel).

Schaumi Kiesenw. Hätzeg (Longitudo 1'3 mm, 1 ♀, c. a.).

Merkli Simon. Siebenbürgen (Hätzeg?, Catalogus Col. von Heyden etc. 1906, Col. 231).

Deubeli Ganglb. Kronstadt (Ganglbauer, Käfer von Mitteleuropa, III. Bd. 22).

scydmaenoides Steph. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Deubel).

261. *Cephenium* Müller.

(*Megalodorus*.)

majus Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Borszék (c. a.).

banaticum Ganglb. Kerzer Gebirge (Glashütte, Büdös, Topánfalva (Erzgebirge), Hermannstadt (c. a.); Bodzauer Gebirge, Nagyhagymás (Egyeskö), Schulergebirge (Deubel).

Reitteri Brisout (*laticolle* Reitter). Schietal, Hermannstadt, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel).

difficilis Reitter. Kronstadt (Deubel).

carnicum Reitter (*hungaricum* Reitter). Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Zalatna, To-

pánfalva (Erzgebirge), Büdös, Alsó-Rákos, Schuler-Gebirge, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Bodzaer Gebirge, (Deubel).

thoracicum Müll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz).

carpathicum Sauley. Kronstadt (Zinne, Deubel).

minutissimum Aubé. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

regale Hoidhaus. (Annales mus. nat. hung. 1908, VI, 578). Rotenturm (Lautertal und Riu vadului, auch im Alltal aus Laub gesiebt, c. a., Deubel).

262. *Microtherium Petri*.

Annales mus. nat. hung. 1908, VI, 570.

Herr Kustos Csiki hat (Magyarország faunájához II. köt. 8) den Gattungsnamen *Microtherium* (Scydmaeniden) in *Etelea* umgewandelt, weil schon eine Säugetiergattung, *Microtherium* Meyer 1865, den Namen führe. Schon Kiesenwetter nimmt (Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, Anobiiden, p. 199, Anm.) anlässlich der Umtaufung der Gattung *Aspidiphorus* in *Coniporus* durch Thomson Stellung gegen dieselbe, indem er die Berechtigung der Umtaufung anzweifelt, nachdem die in Betracht kommenden Genera verschiedenen Ordnungen der Arthropoden (Insecta — Crustacea) angehören. Umsoweniger erscheint mir in diesem Falle die Umtaufung berechtigt, nachdem die beiden in Betracht kommenden Genera verschiedenen Tierkreisen angehören (Vertebrata — Arthropoda), und ich behalte daher den ursprünglichen Namen bei, da eine Kollision der Namen ausgeschlossen erscheint.

tenue Petri. Rotenturm (Lauterburg, unter tiefen Blätterlagen Anfang Juni von mir gesammelt, c. a., 1 Exemplar).

Stenichnus.

263. *Neuraphes Thomson*.

angulatus Müll. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Siechhofberg, Südalhang, unter Laub, c. a.).

clongatulus Müll. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Malomviz, Topánfalva (Erzgebirge), Büdös, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Porumbacher Geb., Präsbe, Gyógy (Ormay); Kronstadt (Zinne), Rodnagelbirge (Deubel).

(Paraphes.)

coronatus Sahlb. Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs (c. a., aus Laub und Grasbüscheln und gesiebt); Schulergebirge (Deubel).

Deubeli Ganglb. Negoi (Umgebung der Schutzhütte gesiebt, Deubel).

(Scydmorephes.)

leptocerus Reitter. Hätzeg (c. a.).

Dieneri Csiki. Anal. mus. hung. VIII. 1910, Rotenturm (c. a., ung. Nat. Mus., col. Diener).

gelicus Sauley. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Ormay); Hätzeg (c. a.).

subparallelus Sauley. Kronstadt, Alsó-Rákos (Teppe, Deubel); Schässburg (c. a.).

latitans Sauley. Kronstadt (Bielz); Gyógy-Bad, Ormay; Schässburg (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen des *Neuraphes latitans* in Kronstadt, was vielleicht nicht gerechtfertigt ist, da Reitter als Fundort die „transsylvanischen Alpen“ angibt.

nigrescens Reitter. Schässburg (c. a., vidit Reitter).

264. *Stenichnus Thomson*.

(*Scydmaenus* auct.)

(*Cyrtoscydmus*.)

Godardi Latr. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Szurduk-l'ass, Alsó-Rákos (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*), Rotenturm (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

scutellaris Müll. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Witeberg, aus Laub gesiebt, c. a.); Hätzeg, Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).

collaris Müll. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Borszék, Schässburg (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Rodnagelbirge, Nagybagymás (Deubel).

pusillus Müll. Schässburg (Breite, in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Kronstadt (Ameisenhaufen, Deubel).

(*Stenichnus* s. str.)

exilis Er. Kerzer Gebirge (Bulca), Schässburg (Breite in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Alsó-Rákos, Kronstadt (Deubel).

265. *Euconus Thomson*.

(*Napochus*.)

claviger Müll. Hermannstadt, Schässburg (Klossel unter Eichenrinde bei Ameisen, c. a.).

Maeklini Mannh. Götzenberg (Bielz).

(*Spanioconus*.)

Wetterhali Gyllh. Hätzeg, Hermannstadt, Unter-Kerz (Bielz); Karlsburg, Schässburg (unter Laub und Gras im Frühjahr besonders häufig); Rotenturm (Ormay); S.-Regen, Bistritz (Müller).

nanus Schaum. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Breite, in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.).

(*Euconus* i. sp.)

Molschulskyi Strm. Durch das ganze Gebiet verbreitet in Wäldern unter Laub, Rinde, oft in Gesellschaft von *Lasius brunneus*.

var. **rufescens** Ganglb. (Kiesenwetteri Reitter). Zusammen mit der Stammform.

denticornis Müll. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge (Bielz);

Gyógy (Ormay); Karlsburg, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Rodnagerbirge, Kronstadt, Alsó-Rákos (Deubel).

rutilipennis Müll. Kronstadt (Gespreng, an den Wurzeln der Sumpfpflanzen, Deubel).

hirticollis Ill. Hermanns'adt, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Fuchsloch aus Laub, Kokelufur aus Geniste gesiebt, c. a.). (Tetramelus.)

transsylvanicus Sauley. Durch das ganze Gebiet in Wäldern unter Laub, Rinde, in alten von Ameisen bewohnten Bäumen.

oblongus Sturm. Gross-Scheuern, Neudorf b. H. (Bielz).

Ich habe diese Art nie gesammelt und glaube kaum, dass sie bei uns vorkommt; jedenfalls muss sie neuerdings nachgewiesen werden.

pubicollis Müll. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz).

Dasselbe gilt von *E. pubicollis* Müll., der bei uns durch den *E. transsylvanicus* vertreten zu sein scheint.

styriacus Grim. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Präsbe, Porumbacher Gebirge (Ormay); Balánbánya (Egyeskő), Borszék, Ratosnya, Schulergebirge (c. a.); Rodnagerbirge, Nagyhagymás (Deubel).

Scydmaenini.

266. *Scydmaenus Latreille*.

(*Scydmaenus* s. str.)

tarsatus Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (im Gärten unter faulenden vegetabilischen Stoffen oft in grosser Zahl, namentlich im ersten Frühjahr, c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

(Cholerus.)

rufus Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (im Holze und unter der Rinde alter Eichen und anderer Bäume in Kolonien der *Lasius brunneus*, c. a.); Kronstadt (Deubel).

pcrrisi Reitter. Schässburg (in alten Eichen, wie der vorige, oft mit ihm zusammen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hellwigi Herbst. Hermannstadt, Holzmenzen, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Előpatak, Schässburg, Alsó-Rákos (wie die beiden vorigen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Clidicini.

267. *Leptomastax Pirazzolli*.

mehadiensis Friv. Rotenturm (Lautertal und im Tale des Riu vadului in 2 Exemplaren aus Laub gesiebt, einmal Anfang Juni, das zweitemal April, c. a. Deubel).

XI. Silphidae.

Leptoderinae.

Pholeuonini.

268. *Pholeuon Hampe*.

(*Parapholeuon*.)

hungaricum Csiki. Lucia-Höhle bei Szohadol (Unterweissenburger Komitat, Ung. Nat. Museum).

Oryotini.

269. *Drimeotus Müll.*

Ormayi Reitter. Bedelö-Höhle bei Szent-György im Erzgebirge (c. a.). Die Tiere krochen auf feuchten Tropfsteinen und Höhlenwänden herum.

Bathyscelini.

270. *Bathyseia Schiöcdte*.

Merkli Friv. Malonviz (Lunka negru unter einem tief eingebetteten Steine, Deubel).

Cholevinae.

271. *Choleva Latreille*.

spadicea Sturm. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchsloch aus Laub gesiebt, c. a.).

oblonga Latr. (intermedia Kr.). Hermannstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Marosujvár (Ormay); Schulergebirge, Zernest (Deubel).

Sturmi Bris. Rotenturm (c. a.).

elongata Payk. (angustata Sturm). Hermannstadt, Neudorf b. H. (Bielz).

cisteloides Fröhl. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (c. a.); Bistritz (Müller).

oresistropa Ganglb. Rodnagerbirge (von Ganglbauer und Deubel auf der höchsten Spitze des Kuhlhorn aus abgehackten, dann längere Zeit liegen gelassenen Grasbüscheln gesiebt, c. a.).

272. *Nargus Thomson*.

velox Spenze. Michelsberg (Bielz); Schässburg (Türkenhill an einem verpilzten Weidenstumpf, Oktober, c. a.); Klausenburg (Müller).

badius Sturm. Zibinsgebirge (Bielz).

Witkini Spence. Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Csukás, Schässburg (aus Laub gesiebt, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

brunneus Sturm. Schässburg (aus Laub gesiebt im Klossel, Fuchsloch und Scherkes, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

anisotomoides Spence. Schässburg (Fuchsloch, aus Laub gesiebt, c. a.).

273. *Catopomorphus Aubé*.

(*Attaphilus*.)

arenarius Hampe. Hammersdorf (Bielz). (Soll bei *Aphaenogaster structor* Latr. leben und zur heissen Mittagszeit um die von ihm bewohnten Erdlöcher schwärmen).

274. *Catops Payk.*

(*Sciodrepa*.)

umbrinus Er. Hermannstadt, Grossscheuern (Bielz); Schässburg (Kälbertritt an einer Hecke aus Laub gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Walsoni Spence. Hermannstadt, Grossscheuern, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Michelsberg, Kerzer Gebirge (Ormay); Ompolyizatal (Karlsburg); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Lasiocatops*.)

alpinus Gyll. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Malomviz, Rotenturm (bei einem Hundekadaver, c. a.); Schulergebirge, Zernest (Deubel); Kelemengebirge (Müller).

Reps und Schässburg als Fundorte sind zu streichen.

(*Catops s. str.*)

picipes F. Götzenberg (Bielz); Rotenturm, Csukás, Schässburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

fuscus Panz. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.).

nigricans Spence. Schässburg (unter Laub), Rotenturm (bei einem Hundekadaver, c. a.); Bucsecs (Valca Jeppi, Deubel).

fuliginosus Er. Schässburg, Rotenturm, Szováta (c. a.); Negoi, Rodnagebirge, Hátszeg (Deubel).

grandicollis Er. Rotenturm, Schässburg (Kälbertritt in Hecken aus Laub gesiebt, c. a.); Bereczk (Ojtos-Pass Méhely).

nigrita Er. (? *affinis* Steph.). Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Malomviz, Schulergebirge, Csukás, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Michelsberg, Rotenturm (Ormay); Hátszeg (Deubel).

coracinus Kellner. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Reissel aus Laub gesiebt), Rotenturm, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

morio F. Csukás (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

neglectus Kr. Hátszeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

chrysomeloides Panz. Kronstadt (Zinne), Honigberg (Deubel).

longulus Kelln. Schulergebirge (an feuchter Stelle unter Gras, c. a.).

tristis Panz. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne), Nagybagymás, Schulergebirge (Deubel).
var. **ventricosus** Weise. Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Kronstadt (c. a.).

275. *Anemadus Reitter*.

strigosus Kr. Hermannstadt, Grossscheuern (Bielz); Baassen (c. a.).

276. *Nemadus Thoms.*

colonoides Kr. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

277. *Ptomaphagus Illig.*

varicornis Rosenb. Hermannstadt (an ausgelegtem Fleischköder gefangen, Ormay); Schässburg, Büdös (aus verpilztem Laube gesiebt, c. a.); Vargastal, Schulergebirge (Deubel).

subvillosus Goeze (*sericeus* Panz.). Grossscheuern, Kronstadt, S.-Regen (Bielz). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

sericatus Chaud. Hermannstadt, Schässburg, Baassen (c. a.), aus Laub gesiebt; Kronstadt (Deubel).

278. *Colon Herbst.*

(*Mylococcus*.)

latum Kr. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Borszék, Bülös, Csukás, Schässburg (Witeberg, Fuchsloch aus Laub, Kokelufer aus angeschwemmtem, schimmeligem Detritus gesiebt, c. a.); Bucsecs, Dees, Rodnagebirge, Nagybagymás (Deubel).

affine Sturm. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne), Bucsecs (subalpin, Deubel).

fuscicornis Kr. Rátosnya, Schässburg (Fuchsloch, auf einer Wiese am Waldrande gegen Abend gestreift, 30. Juli c. a.); Kronstadt (Schneckenberg, Deubel).

dentipes Sahlb. Königstein (Crepatura, Deubel); Borszék (c. a.). Das Borszéker Exemplar meiner Sammlung ist ganz hellrötlich-gelb mit etwas dunklerem Kopf.

brunneum Latr. Hermannstadt (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

denticulatum Kr. Schässburg (Kokelufer unter dem Witeberg, 2 ♂♂ aus Laub gesiebt, 6. August 1910, c. a.).

(*Colon l. sp.*)

fusculum Er. (*serripes* Ganglb.). Grossscheuern (Bielz); Kronstadt (Zinne), Schulergebirge, Nagybagymás (Deubel); Borszék (c. a.).

Wir besitzen nur *C. fusculum* Er., der früher als Synonym zu *C. serripes* Sahlb. gehörte. Letzterer ist gegenwärtig Synonym des *C. viennense* Hbst.

Silphinae.

279. *Necrophorus Fabr.*

germanicus L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

var. *speciosus* Schulze. Kronstadt (Deubel).

humator Goeze. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

interruptus Steph. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Kronstadt, Balánbánya (c. a.); Zoodtal (Ormay).

investigator Zett. Präsbe, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

vespilloides Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

vespillo L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

vestigator Herschel. Mediasch, Mezöség (Záh, Bielz).

280. *Necrodes Leach.*

littoralis L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Előpatak (c. a.).

281. *Tanatophilus Samouelle.*

sinuatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

rugosus L. Ebenso verbreitet wie der vorige.

282. *Oeceoptoma Samouelle.*

thoracicum L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

283. *Blitophaga Reitter.*

alpicola Küst. Zibins-Gebirge, Kristest, Sterpu (Dealul negru), Surul, Fogarascher Gebirge, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Retjezat, Paringul, Rodnagelbirge (c. a.).

(Aclypea.)

undata Müll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

284. *Xilodrepa Thoms.*

4-punctata Schreber. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet auf Gebüsch, zuweilen unter Laub.

285. *Silpha Linné.*

carinata Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet, besonders in Gebirgswäldern.

oblonga Küst. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (?), Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hammersdorf, Salzburg (Ormay); Retjezat, Torockó, Rodnagelbirge (c. a.).

obscura L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

orientalis Brull. Bistra, Torockó (Erzgebirge), Dees, Bucsecs (c. a.).

granulata Thunbg. (tristis Ill.). Schulergebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

tirolensis Laich.

var. *nigrita* Creutz. Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz).

286. *Ablattaria Reitter.*

laevigata F. Kronstadt, Mediasch, Vásárhely, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár, Tinód (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg, Baassen (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

287. *Phosphuga Leach.*

atrata L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auch in den Gebirgswäldern.

a. *brunnea* Herbst. Kronstadt, Tusnád, Rodnagelbirge, wohl überall, wo die Stammform sich findet.

Agyrtini.

288. *Necrophilus Latr.*

subterraneus Dahl. Präsbe (Bielz); Frecker Gebirge (Ormay); Rodnagelgeb., Kerzer Gebirge (Bulea, am häufigsten in den Gehäusen von *Helix arbustorum* und *aethiops*, c. a.); Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

289. *Agyrtes Fröhl.*

bicolor Lap. Rotenturm (unter Moos an einem Baumstamm, Deubel).

XII. Liodidae.

Liodini.

290. *Triarthron Schmidt.*

Maerkeli Schmidt. Kronstadt (Zinne, Deubel).

291. *Hydnobius Schmidt.*

multistriatus Gyll. Rodnagelbirge, Oberkerz (Glashütte, c. a.); Kronstadt (Schneckenberg, nicht selten, Deubel).

punctatus Sturm. Schässburg (c. a., Türkenhill, an sumpfiger Stelle); Kronstadt (Deubel).

var. *punctatissimus* Steph. Schulergebirge (Deubel).

punctulatus Hampe. Siebenbürgen (Catalogus Coleopt. Europae Heyden 1906. c. 251).

292. *Llodes Latreille.*

- cinnamomea* Panz. Zibinsgebirge, Marosgebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch aus Laub gesiebt, 13. Juli, c. a.).
- sllesiaca* Kr. Rodnagebirge (c. a.); Schulergebirge (Deubel); Zibinsgeb. (Müller).
- macropus* Rye Kronstadt (Deubel).
- picea* Illig. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).
- brunnea* Sturm. Schässburg (Schleifengraben, 30. Juli, c. a.); Schulergebirge (Deubel).
- dubia* Kugel. Kerzergebirge (Bielz); Schässburg (Witeberg, aus Laub gesiebt, 2. Juli, c. a.); Nagybagymás, Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).
- a. *bicolor* Schmidt. Schässburg (c. a.).
- var. *obesa* Schmidt. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- flavescens* Schmidt. Kronstadt (Zinne, Schulergebirge (Deubel)).
- curta* Fairm. Stolzenburg (Ormay).
- calcarata* Er. Präshe (Bielz); Borszék, Schässburg (Kokehuf, Weidengebüsch unter Laub, 21. Mai, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. *picta* Reiche. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- ovalis* Schmidt. Balánbánya, Retjezat, Schässburg (15. Juni, c. a.); Zernest (Deubel).
- rugosa* Steph. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- Skalitzkyi* Ganglb. Bucsecs, Königstein (Crepatura, Deubel).
- (Pteromerula.)
- rotundata* Er. Retjezat (c. a.).
- (Oosphæcula.)
- badia* Strm. Kerzer Gebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Rotenturm (aus Blättern gesiebt, c. a.).
- carpathica* Ganglb. Rodnagebirge (aus abgehackten und längere Zeit liegen gelassenen Grasbüscheln gesiebt, Ganglbauer, Deubel).
- parvula* Sahlb. Schässburg Schleifengraben, aus Laub gesiebt, 30. Juli, Borszék, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- flavicornis* Bris. Schässburg (Türkenhill, an sumpfiger Stelle, 24. Oktober, c. a.).
- (Orosphaerula.)
- nilida* Reitter. Rodnagebirge (alpin, Deubel).

293. *Agaricophagus Schmidt.*

- cephalotes* Schmidt. Kronstadt (Hangenstein, Deubel).

294. *Colenis Erichs.*

- immunda* Sturm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet unter Laub.

295. *Cyrtusa Erichs.*

- Fussi* Seidl. Hermannstadt (Seidlitz); Kronstadt (Florisas, Deubel).
- minuta* Ahrens. Marosujvár (Mai, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- pauvilla* Schmidt. Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässburg (29. Juli, Fuchsloch, aus Laub und Moos gesiebt, c. a.).

Agathidini.

296. *Anisotoma Illig.*

- humeralis* F. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Schauta (Ormay); Schässburg (Breite, Eichenschwämme, c. a.).
- var. *clavipes* Herbst. Rotenturm (c. a.).
- var. *globosa* Payk. Zalatna (c. a.); Hát-szeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).
- axillaris* Gyll. Götzenberg, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Bistra, Előpatak, Nussbach (c. a.); Kronstadt, Nagybagymás (Deubel).
- glabra* Kugel. Zibinsgebirge, Kronstadt, Kerzer Gebirge, Hargita (Bielz); Bistra, Előpatak, Ober-Kerz, Schässburg, Bükszád (c. a.); Nagybagymás (Deubel).
- orbicularis* Herbst. Marpod, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Unterkerz, Hát-szeg, Szováta, Büdös, Schässburg (c. a.); Porumbacher Gebirge (Ormay).
- caslanea* Herbst. Kerzer Geb., Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Nagybagymás, Bucsecs (Deubel).
- serricornis* Gyll. Schässburg (Breite, alte Eiche, Mai, c. a.).

297. *Amphicyllis Erichs.*

- globus* F. Branischwald b. H., Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Heltau, Gyógy (Ormay); Schässburg, Rotenturm, Büdös, Ratosnya, Rodnagebirge (c. a.); Nagybagymás, Hát-szeg (Deubel).
- var. *ferrugineus* Strm. Kerzer Geb., Gyógy (Ormay); Schässburg, Ober-Kerz (Glashütte), Ratosnya, Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- glohimermis* Sahlb. Hermannstadt (Ormay); Büdös (c. a.); Hát-szeg (Deubel).

298. *Cystoplastus Reitter.*

- seriepunctatus* Bres. Kronstadt? (Deubel).

299. *Agathidium Illig.*

- Die Arten leben an abgestorbenen, verpilzten Baumstämmen und in verpilztem Laub.
- (Cyphocle.)

- nigripennis* F. Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Malomviz (Lunka negra), Schässburg (Atelshill auf Eiche, welche von *Lasius brunneus* bewohnt war, c. a.); Königstein, Schuler-Gebirge, Bucsecs, Nagybagymás, Rodnagebirge (Deubel).

atrum Payk. Holzmengen, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Oláhfalú, Borszék (Bielz); Rotenturm, Csukás, Büdös, Ratosnya, Bükszád, Szováta, Baassen (c. a.); Hátszeg (Deubel); Hermannstadt, Heltau (Ormay).

seminulum L. S.-Regen, Borszék (Bielz); Rotenturm, Malomviz, Büdös, Szováta, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

laevigatum Er. Reys (Bielz); Schässburg, Büdös, Ratosnya (c. a.); Nagybagymás, Vargyastal, Bucsecs (Deubel); Hermannstadt (Ormay).

badium Er. Kerzer Gebirge, Sachs.-Regen (Bielz); Bistra, Präsaka (Zalatna), Büdös, Alsó-Rákos, Schässburg, Szováta, Rodnagelirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schuler-Gebirge, Bucsecs (Deubel); Präsbe, Schanta (Ormay).

(Neocleble.)

banaticum Reitter. Rodnagelirge, Büdös, Balánbánya, Rotenturm, Bistra (c. a.).

nudum Hampe. Kronstadt, Zernest (Deubel).

marginatum Strm. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

varians Beck. (pallidum Gyll.). Kerzer Gebirge, Präsbe (Ormay); Präsaka (Zalatna), Büdös, Schässburg (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

rotundatum Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Balánbánya, Bistra (c. a.); Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

bescidicum Reitter. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.), 1 Exemplar, das sich tatsächlich nur durch die helle, rötlich-gelbe Färbung von *A. rotundatum* Gyll. zu unterscheiden scheint; die Absonderung des Clypeus ist auch wahrnehmbar, zwar fein, aber ebenso sichtbar, wie bei manchen Exemplaren des *A. rotundatum*.

mandibulare Strm. Schielthal, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Csukás, Rotenturm, Büdös, Schässburg (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).

confusum Bris. Büdös, Schuler-Gebirge (c. a.).

polonicum Wank. (piceum Bielz teste Seidlitz). Hátszeg (Bielz).

Nach Seidlitz (F. trans. 316) soll das von Bielz angeführte *A. piceum* Er. gleich *A. polonicum* Wank. sein. Nachdem jedoch *A. polonicum* Wank. nach dem Kataloge (Catalogus col. Europae etc. 1906, c. 254) gleich *A. piceum* Thoms. nec Erichs. ist, so wäre *A. piceum* Er. aus unserer Fauna zu streichen. Uebrigens ist im Kataloge anstatt *A. piceum* Thoms. zu setzen *A. polonicum* Wank., da der Name *piceum* bereits von Erichson vergeben ist.

plagiatum Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Csukás (c. a.); Bodzaer Gebirge, Rodnagelirge (Deubel).

(Saccoceleble.)

nigrinum Sturm. Schässburg (1 Exemplar, c. a.); Nagybagymás (Deubel).

Deubel teilt mir mit, dass sein von Nagybagymás stammendes Exemplar von Dr. Krauss mit Bestimmtheit als *A. nigrinum* Strm. von Dr. Holdhaus jedoch als *A. rhinoceros* Sharp. determiniert worden sei.

discoideum Er. Michelsberg, Kerzer Geb. (Bielz); Csukás (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).

XIII. Clambidae.

300. Calyptomerus Redtenb.

alpestris Redtenb. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, April, c. a.); Bucsecs, Schulergebirge, Rodnagelirge (Deubel).

dubius Marsh. Hátszeg (1 Ex., c. a.).

301. Clambus Fischer.

Die Arten werden aus verwesenden Pflanzenstoffen; Laub gesiebt.

minutus Strm. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyastal, Rodnagelirge (Deubel).

punctulum Beck. Schässburg (Kokelufer, Hattertgraben), Rodnagelirge (c. a.); Hátszeg (Deubel).

armadillo Deg. (atomarius Sturm). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Atelshill, Kokelufer), Rotenturm (c. a.).

pubescens Redtenb. Rotenturm (Altuf, Bielz); Schässburg (20. Februar in grösserer Anzahl aus verwesenden Pflanzenstoffen im Hausgarten gesiebt, c. a.).

XIV. Leptinidae.

302. Leptinus Müll.

testaceus Müll. Klausenburg, Schässburg (am Fusse alter Eichen, wahrscheinlich in den Gängen der Haselmaus); Königstein (Ru-Schlucht, unter einem Steine, unter welchem sich ein Mausnest befand, Deubel).

XV. Corylophidae.

303. Sarcinus Leconte.

pusillum Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz).

brunneum Bris. Kerzer Gebirge (Bielz); Hátszeg, Rotenturm, Schässburg (unter verwesenden Pflanzenstoffen, c. a.).

304. *Arthrolips Wollaston.*

obscurus Sahlb. Előpatak, Rotenturm (Ormay, im Mulm eines Buchenstumpfes); Előpatak (1 ♀, bei welchem die zwei letzten und die Hälfte des drittletzten Abdominalsegmentes vorragen unter den Flügeldecken, wodurch das Tier an gewisse Nitulinen erinnert).
piceus Comolli. Siebenbürgen (nach Seidlitz von Reitter aus Laub gesiebt).

305. *Sericoderus Steph.*

lateralis Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt, Tartlau (Deubel); Schässburg, Rotenturm (c. a.).
Revelieri Reitter. Schässburg, Rotenturm, Hátzeg (c. a.).

306. *Corylophus Stephens.*

cassidoides Marsh. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (Kokelufer im angeschwemmten Geniste, c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

307. *Orthoperus Stephens.*

punctatus Wankow. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne), Alsó-Rákös (Deubel).
punctulatus Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Búdös, Hátzeg, Schässburg (Atelshill, Kokelufer in angeschwemmtem Geniste, c. a.); Honigberg (Altufér, Deubel).
brunnipes Gyll. Hermannstadt (Bielz); Alsó-Rákös, Schässburg (in morschem Lindenholz, Fuchslotch und Breite in Eichenmulm, 15. April, c. a.).
atomus Gyll. Baassen, Schässburg (Atelshill, Kokelufer, 13. Mai, c. a.); Honigberg (Altufér, Deubel).
anxius Rey. Hermannstadt (Bielz).

XVI. *Sphaeriidae.*

308. *Sphaerlas Walll.*

acaroides Walll. Schässburg (Atelshill, Kokelufer im Geniste, 3. November), Unter-Kerz (Klosterteich, ein Pärchen aus Grasbüscheln in Copula gesiebt, 10. August, c. a.).

XVII. *Trichopterygidae.*

Diese kleinen Käfer leben in verwesenden Tier- und Pflanzenstoffen, schwärmen aber bei Sonnenuntergang und können auch im Fluge gefangen werden.

Ptenidini.

309. *Nossidium Erichs.*

pilosellum Marsh. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (aus Eichenmulm gesiebt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

310. *Ptenidium Erichs.*

(Gressnerium.)

Gressneri Er. Kerzer Gebirge (Bielz).
(Matthewsium.)

turgidum Thoms. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagelbirge, Schässburg (Nester der *Formica rufa*, c. a.).
myrmecophilum Motsch. Torockó (Erzgebirge), Baassen, Schässburg (in morschem, von *Lasius brunneus* bewohntem Lindenholz, c. a.); Kronstadt (Deubel).

pusillum Gyll. (evanescens Marsh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Maros-ujvár, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rodnagelbirge (Deubel).

Reitteri Flach. Schässburg (Kokelufer, aus Geniste gesiebt, 3. November, c. a.).
nitidum Heer. Schässburg (c. a.); Tartlau (Deubel).

Ptilini.

311. *Euryptilium Matthews.*

marginatum Aub. Unter-Kerz (c. a.).

312. *Ptiliolum Flach.*

Kunzei Heer. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
fuscum Er. Schässburg (Bielz).

313. *Ptilinum Erichs.*

(Millidium.)

minutissimum Web. Hermannstadt (Bielz).

Ptinellini.

314. *Ptinella Motsch.*

(Neuglenes Thoms.)

aptera Guer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz).

tenella Er. Schässburg (Breite, aus dem morschem Holze und der Rinde eines Eichenstumpfes gesiebt, c. a.).

var. *biimpressa* Reitter. Schässburg (zusammen mit der Stammform, c. a.).

315. *Pteryx Matthews*

(Aderces Thoms.)

suturalis Heer. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Baassen, Karlsburg, Hátzeg, Schässburg (Kokelufer aus Geniste im November, Witeberg im März, Siechhofberg im Mai aus Laub gesiebt, c. a.).

Trichopterygini.

316. *Nephanes Thomson.*

Titan Newm. Búdös, Csukás, Unter-Kerz, Schässburg (Oktober, aus morschem Holze alter Eichen gesiebt, c. a.).

317. *Trichopteryx Kirby.*

(Ctenopteryx.)

grandicollis Mannh. Schässburg (Fuchsloch, 18. Mai, c. a.).

Montandoni Allib. Hermannstadt (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

(*Trichopteryx* i. sp.)

thoracica Waldl. Unter-Kerz, Rodnagebirge (c. a.).

atomaria Dey. Hermannstadt, Kronstadt, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg, Bistra, Rotenturm (c. a.).

intermedia Gillm. Rodnagebirge, Schulergebirge, Schässburg (Siechhofberg, 18. Februar aus Laub gesiebt, c. a.).

fascicularis Herbst. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

suffocata Hallid. Rodnagebirge (c. a.).

brevipennis Er. (*longicornis* Matth., *pumila* Er.). Harbachufer, S.-Regen, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Michelsberg (Ormay); Schässburg (Kokeluf, aus Geniste gesiebt, 3. November, c. a.).

sericans Heer. Schässburg (Atelshill aus Laub, Garten, aus verwesenden Pflanzen in grosser Anzahl gesiebt, c. a.).

dispar Matth. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

XVIII. Scaphidiidae.

Die Arten leben vorwiegend auf Baumpilzen.

Scaphidiini.

318. *Scaphium Kirby.*

immaculatum Oliv. Präse (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay).

319. *Scaphidium.*

4-maculatum Oliv. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Scaphisomini.

320. *Scaphisoma Leach.*

agaricinum L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

subbalpinum Reitter. Kronstadt (Bielz); Zalatna, Schässburg (c. a.); Kerzer Gebirge, Zoodgeb. (Ormay); Kelemengebirge (Müller).

assimile Er. Retjczat, Kerzer Geb. (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

boleti Panz. Kronstadt (Bielz); Búdös (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Vargyas-Tal (Deubel); S.-Regen (Müller).

(Caryoscapa.)

limbatum Er. Hätzeg, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glas-hütte), Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Schanta (Ormay).

XIX. Histeridae.

Holopletini.

321. *Holopleta Payk.*

plana Sulz. Zibins-Gebirge, Kronstadt (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde einer abgestorbenen Espe in grosser Anzahl, Mai, c. a.); Bodola (unter Pappelrinde, Deubel).

322. *Platysoma Leach.*

frontale Payk. Hätzeg, Gross-Scheuern, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék, S.-Regen, Borgoer Pass (Bielz); Schässburg (in morschem Eichenholz, Bükszád (c. a.).

compressum Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet, unter Baumrinden.

323. *Cylistosoma Levis.*

oblongum F. Talmatschel (Bielz).

angustatum Hoffm. Borszék, Borgoer Pass (Bielz).

324. *Hister Linné.*

Die Arten leben auf verwesenden tierischen und pflanzlichen Stoffen, einige in Ameisennestern. (*Heterognathus*.)

inaequalis Oliv. Hermannstadt, Kronstadt?, S.-Regen (Bielz); Előpatak (Ormay); Szunyokszék, Karlsburg (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

4-maculatus L. Hätzeg, Déva, Gross-Scheuern, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Nagyenyed, Nagylak, Tinód, Magyarforró (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Marosujvár (c. a.).

helluo Truqui. Zood (Bielz); Hätzeg (Deubel).

unicolor L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Szunyokszék (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

cadaverinus Hoffm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

striola Sahlb. (*succicola* Thoms.). Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Noa), Beczk (Méhely).

terricola Germ. Hermannstadt, Dees (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

stercorarius Hoffm. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

bipustulatus Schrank. (*fimetarius* Herbst). Hammersdorf, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

purpurascens Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

ruficornis Grimm. Bálványos bei Torja (Méhely); Kronstadt (Deubel).

- marginatus* Er. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz).
neglectus Germ. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Klausenburg (c. a.).
ventralis Marsh. Hätzeg (Bielz); Rossenau (Deubel).
carbonarius Hoffm. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Bükszád (Bielz), Klausenburg, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Nagyenyel, Szamosujvár (Ormay).
quadrinotatus Scrib. Hätzeg, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Klausenburg, Schässburg, Nieker-Eidisch (c. a.).
sinuatus Illig. Dusch (Zibinsgebirge), Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay).
sepulchralis Er. Stolzenburg (Zakelsberg, Ormay); Schässburg (c. a.).
funestus Er. Hermannstadt, Stolzenburg (Zakelsberg, Ormay); Krizba (Burzenland Méhely).
bisexstriatus F. Unter-Kerz, Sächs.-Regen (Bielz); Kronstadt (c. a.); Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay) (Atholus).
12-striatus Schrank. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
 var. *14-striatus* Gyll. Schässburg (c. a.).
bimaculatus L. Hätzeg, Marktscheiken, Tarlau, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt (Deubel).
corvinus Germ. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kastenholz, Marpod, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Klausenburg (c. a.).

325. *Epierus* Erichs.

Lebt unter Baumrinde.

- italicus* Payk. Rotenturm (Ormay)

326. *Dendrophilus* Leach.

- punctatus* Herbst. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Hätzeg, Marosujvár (in alten Eichen bei Ameisen, c. a.); Kronstadt (Deubel); Brad (Ormay).
pygmaeus L. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos, Szurdok-Pass (c. a., in den Nestern der Formica rufa); Kronstadt (Deubel).

327. *Paromalus* Erichs.

Die Arten leben unter Baumrinden.

- complanatus* Panz. Hätzeg (Bielz).
parallelepipedus Herbst. Gross-Scheuern, Talmesch, S.-Regen, Borgoer Pass (Bielz); Kronstadt (c. a.); Nagyagy-más (Deubel); Kerzer Geb. (Ormay).
havicornis Hbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, namentlich unter Eichenrinde.

Hetaerini.

328. *Hetaerius* Erichs.

- lerrugineus* Ol. Hätzeg (Bielz); Schässburg (aus dem Neste der Formica rufa gesiebt, c. a.); Honigberg (Deubel); Ratosnya (bei Ameisen, Müller).

Saprinini.

329. *Gnathonus* Duval.

- rotundatus* Kugel. Hätzeg, Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gycke, Bielz); Kronstadt (Deubel).
punctatus Thoms. Klausenburg (c. a.).

330. *Saprinus* Erichs.

- semipunctatus* F. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).
concinus Motsch. Hermannstadt (Ormay, an Fleischköder).
semistriatus Scrib. (nitidus F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
politus Brahm. (speculifer Latr.). Hätzeg (Bielz).
aeneus F. Hätzeg, Talmesch, S.-Regen (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
 var. *immundus* Gyll. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).
sparsutus Salsky. Schässburg (c. a.).
rufipes Payk. Hermannstadt (Bielz).
conjungens Payk. Hätzeg, Hermannstadt, Poplaka, Reys, Marienburg b. Kr., Kronstadt, Mediasch (Bielz); Karlsburg (c. a.).
rugiceps Duft. (quadristriatus Hoffm.). Szakadát (Altufer, Bielz); Schässburg (c. a.).
rugifrons Payk. Talmesch (Bielz); Rotenturm (c. a.).

Abnethini.

331. *Teretrinus* Erichs.

- picipes* F. Dobra, Gross-Scheuern (Bielz); Malomviz (c. a.); Dees, Alsó-Rákos (unter Weidenrinde, Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

332. *Plegaderus* Erichs.

Die Arten leben unter Baumrinden.

- vulneratus* Panz. Törzburger Pass, Borgoer Pass (Bielz); Borszék (Bielz, c. a., unter Fichtenrinde), Schulergerbühle (Deubel).
caesus Herbst. Dobra, Hermannstadt, Kastenholz (Bielz); Baassen, Szováta, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
dissectus Er. Hätzeg, Fogarasch (Bielz); Schässburg (Eiche, Breite), Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

333. *Oonthophilus Leach.*

striatus Forster. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

334. *Abraeus Leach.*

Die Arten leben unter Baumrinden und in altem morschem Holz.

globulus Creutz. Kerzer Gebirge, Marktschellen, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Zoppae. Siebenbürgen.

parvulus Aub. Schässburg (in alten Eichen, c. a.).

granulum Er. (punctatissimum Reitter). Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenauer Gebirge, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

globosus Hoffm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Rotenturm, Szováta (c. a.).

335. *Aeritis Leconte.*

Die Arten leben wie die der vorigen Gattung.
minutus Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kastenholz, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

homoeopathicus Woll. (rhenanus Fuss.). Kerzer Gebirge (Bielz).

nigricornis Hoffm. (seminulum Küst.). Hätzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge Kronstadt (Deubel); Schässburg (Garten, 1. März, in vorjährigen Krautstrünken, c. a.).

var. *microscopicus* Reitter. Kerzer Geb. (Bielz).

Palpicornia.

XX. Hydrophilidae.

Helophorinae.

336. *Helephorus Fabr.*

(Empleurns.)

nubilus F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Girelsau, Mediasch, Reys, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz, Baassen, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Trichelophorus.)

micans Fald. Déva, Deesakna (c. a.).

(Megalephorus.)

aquaticus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *aequalis* Thoms. Schässburg, Kronstadt (c. a.).

(Atractelophorus.)

avernicus Muls. Kerzer Gebirge (Lakuz, Bielz).

Wahrscheinlich ist *H. avernicus* Muls. des Bielz'schen Verzeichnisses nichts anderes als *A. brevitarsis* Kuw., da ich letzteren auf dem Frecker

Gebirge und auch im Kerzer Gebirge in grösserer Anzahl sammelte, während Bielz denselben nicht anführt, wohl weil er den Käfer noch nicht kannte. Wahrscheinlich kommt *H. avernicus* Muls. bei uns nicht vor.

brevitarsis Kuw. (Deubel Krauss.). Paringul (Vurfu Mandru), Frecker Geb. (Serbota), Kerzer Gebirge (Vunetoarc, aus Grasbüscheln gesiebt), Rodnagerbirge (c. a.); Hätzeg Geb. (Deubel).

glacialis Villa. Zibinsjäser, Präsbe (Bielz); Negoi (Ormay); Hätzeg Geb. (alpin, Deubel); Pietrosul (Müller).

confrater Kuw. Transsylvanische Alpen (südliche Gebirgskette, Ganglbauer); Nagybagymás (Deubel); Präsbe (Deubel, c. a.).

brevipalpis Bed. Héviz, Topánfalva (Erzgebirge), Baassen, Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *montenegrinus* Kuw. Baassen, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Altfluss, Gespreng, Deubel).

(Helophorus s. str.)

affinis Marsh. Héviz, Baassen (c. a.).

griscus Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

granularis L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Sächs.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg, Halvelagen b. Sch., Topánfalva (Erzgebirge), Klausenburg, Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

viridicollis Steph. (aeneipennis Thoms.). S.-Regen (Bielz).

Zoppae Ganglb. Mezőség (Ganglbauer).

quadrisignatus Bach. Oláhfalva, Schässburg, Baassen, Unter-Kerz (c. a.).

pumilio Er. Hermannstadt (Bielz); Brennendorf (Altufer beim Priesterhügel, Deubel).

nanus Sturm. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz).

337. *Hydrochus Leach.*

elongatus Schaller. Hermannstadt, Nussbach, Schässburg (Bielz); Halvelagen b. Sch., Kronstadt (c. a.); Mezőség (Müller).

carinatus Germ. Dobra (Bielz); Kronstadt (c. a.); Várhegy (Deubel).

brevis Herbst. Dobra, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

angustatus Germ. Dobra (Bielz); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Altufer, Deubel).

338. *Ochthebius Leach.*

(Henicocerus.)

exsculptus Germ. Hätzeg (Bielz); Csukás, Szurdok-Pass (c. a.); Vargyas-Fluss (Deubel).

gibbosus Germ. Hätzeg (Bielz).

(Aulacochthebius.)

exaratus Muls. Klausenburg (Szamosfalva, Bielz).**narrentinus** Reitter. Schässburg (Atelsbill, Kokelufer an einer sumpfigen Stelle im Geniste, c. a.).

(Hemalochthebius.)

impresus Marsh. Déva, Sabenicza (S.-Regen), Klausenburg (Szamosfalva), Mezöség (Záh, Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Gespreng), Honigberg (Altfluss, Deubel).

(Eothochius.)

punctatus Steph. Déva, Salzburg b. H., Torda, Szamosfalva (Bielz).

(Hymenodes.)

foveolatus Germ. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).**caudatus** Friv. Baassen, Szováta (im Schlamm der salzigen Quellen zahlreich, c. a.).

(Ochthebius i. sp.)

pusillus Steph. Salzburg, Sabenicza (S.-Regen, Bielz); Halvelagen bei Sch., Baassen (in Süßwassertümpeln oberhalb des Bades, c. a.).**marinus** Payk. Déva, Salzburg, Sabenicza (S.-Regen, Bielz).

339. *Hydraena Kugelann.*

(Hydraena i. sp.)

riparia Kug. Hermannstadt (Bielz); Retjezat (c. a.); Kronstadt, Krizba (Deubel).**morio** Kiesenw. Siebenbürgen (Ganglb.).**nigrita** Germ. Bükszád, Alsó-Rákos (c. a.); Krizba, Vargyasfluss (Deubel).

(Haenhydra.)

gracilis Germ. Hermannstadt (Bielz), Borszék, Alsó-Rákos, Csukás (c. a.), Kronstadt, Krizba, Deubel).

(Hadrenya.)

atricapilla Waterh. Krizba (Deubel).**pygmaea** Waterh. Csukás, Borszék (c. a.).

Spercheinae.

340. *Spercheus Kugelann.*

emarginatus Schall. Dobra, Salzburg, Hermannstadt, Fogarasch, Nussbach, Bozauer Pass (Bielz); Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Hydrophilinae.

Berosus.

341. *Berosus Leach.*

(Enoplurus.)

spinus Stev. Déva, Salzburg, Neudorf b. H., Schässburg, Kolos, Sabenicza (S.-Regen, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nieder-Eidisch (c. a.).

(Berosus i. sp.)

signaticollis Charp. Déva, Hermannstadt, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).**luridus** L. Hätzeg, Hermannstadt, Mezöség (Gyeke, Bielz); Szamosujvár (Ormay); Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hydrophilini.

342. *Hydrous Dahl.*

piceus L. Hermannstadt, Kerz, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Tinód (Unterweissenburger K., Ormay).**aterimus** Esch. Hermannstadt, Neudorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Karlsburg (c. a.); Mezö-Bánd (Maros-Torda), Tinód (Ormay).

343. *Hydrophilus Degeer.*

caraboides L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.var. **smaragdinus** Bach. Déva, Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Priesterhügel an Allufer, Deubel).**flavipes** Stev. Salzburg b. H., Hermannstadt, Girelsau, Fogarasch, Krisba, S.-Regen (Bielz); Miriszló (Ormay); Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Hydrobiini.

344. *Limoxenus Rey.*

oblongus Herbst. Klausenburg (Bielz); Marosujvár (c. a.); Szamosujvár (Ormay).

345. *Hydrobius Leach.*

fuscipes L. In Tümpeln durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Es ist wahrscheinlich, dass die Stammform bei uns gar nicht vorkommt, sondern nur die Varietäten.

var. **Rollenbergi** Gehrhardt. Schässburg, Előpatak (c. a.); Hermannstadt (Ormay).var. **subrotundatus** Steph. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

346. *Anacaena Thomson.*

(Creniphilus Thomson.)

globula Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Unter-Kerz, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.); Maaren (Ormay).**limbata** Fr. Hätzeg, Reys, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Maaren (Or-

may); Baassen (in Süßwassertümpeln, auch an feuchten Stellen unter Laub, c. a.); Kronstadt (Deubel).

347. *Paracymus Thomson.*

aeneus Germ. Szamosfalva, Déva (Bielz, c. a.); Gross-Scheuern (Bielz).

348. *Philydrus Solier.*

Die Arten leben teils im Süß-, teils im Salzwasser.

(*Enochrus*.)

melanocephalus Ol. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., S.-Regen, Sabenicza, Mezöség (Záh, Bielz); Stolzenburg (Zakelsberg), Maaren (Ormay).

(*Methydrus*.)

minutus F. (affinis Thunbg.). Halvelagen b. Sch. (c. a.); Hermannstadt, Maaren (Ormay); Kronstadt (Deubel).

(*Philydrus* i. sp.)

frontalis Er. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (c. a.).

fuscipennis Thoms. Kronstadt, Schässburg (c. a.).

4-punctatus Herbst. Halvelagen b. Schässburg, Baassen, Klausenburg, Malomvitz (c. a.); Kronstadt (Deubel).

bicolor F. (griseus Gyll., maritimus Thoms.). Déva, Torda, Nieder-Eidisch, Baassen (c. a.).

testaceus F. Déva, Salzburg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Persány, Gross-Schenk, Sächs.-Regen, Mezöség (Záh, Gyeke), Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár, Maaren (Ormay); Kronstadt (Deubel).

349. *Helochaeres Muls.*

griseus F. (lividus Steph. nec Forster). Salzburg, Hermannstadt, Fogarasch, Nussbach, Schässburg (Bielz); Maaren, Kákova (Ormay); Alsó-Rákos, Klausenburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

350. *Cymbiodyta Bedel.*

marginella F. Déva, Hermannstadt (Bielz); Brenndorf (Tümpel am Altfluss, Deubel).

351. *Laccobius Erichs.*

minutus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

nigriceps Thoms. Héviz, Kronstadt, Unter-Kerz, Baassen, Torda, Klausenburg, Deesakna (c. a.).

sinuatus Motsch. Unter-Kerz, Schässburg (Kokelufer unter Geniste, c. a.).

scutellaris Motsch. (atralis Rottenb.). Salzburg b. H. (Ormay); Ilvamika (Naszód). Rotenturm, Balánbánya (c. a.); Nagyhagymás (Öcsém, Deubel).

alutaceus Thoms. Baassen (Salzquelle, c. a.).

var. *laevicollis* Ganglb. Baassen (c. a.).

gracilis Motsch. Schässburg (Kokelufer unter Geniste), Héviz, Unter-Kerz (c. a.).

Chaetarthriini.

352. *Chaetarthria Steph.*

seminulum Hbst. Hermannstadt (Bielz); Unter-Kerz, Balánbánya, Schässburg, Halvelagen b. Sch., Tordaer Schlucht (an sumpfigen Orten unter Moos und Pflanzenmoder, c. a.); Vargyas-Fluss (Deubel).

Limnebiini.

353. *Limnebius Leach.*

Die Arten leben in Tümpeln.

(*Limnebius* i. sp.)

truncatellus Thunbg. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Kákova (Ormay).

papposus Muls. Maaren (Ormay); Honigberg (Altufer), Kronstadt (Gespreng, Deubel).

truncatulus Thoms. Schässburg (c. a.).

crinifer Rey. Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos (c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

slagnalis Quilleb. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.).

? *nitidus* Marsh. Unter-Kerz (c. a.).

alula Bedel. Kronstadt (Gespreng, Deubel). (*Bolimnius*.)

picinus Marsh. Hermannstadt (Bielz); Halvelagen (c. a.); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Sphaeridiinae.

354. *Coelostoma Brullé*

orbiculare F. Hälzseg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Ilvamika, Naszód, Rodnagelberge, Retjezat, Déva (an feuchten Orten unter Moos, Laub, Geniste, c. a.); Nagyenyed, Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

355. *Sphaeridium Fabr.*

Die Arten leben im Dünger.

scarabaeoides L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *lunatum* F. Hermannstadt (Ormay); Baróth-Méhely; Königstein (Crepatura, Deubel).

bipustulatum F. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

- var. *marginatum* F. Schässburg, Marosujvár (c. a.), Hermannstadt (Ormay), Kronstadt (Gespreng), Krizba, Ober-Komana, Sósmező (Méhely).
var. *substriatum* Fald. (semistriatum Lap.). Oláhfalu (c. a.).

356. *Cercyon Leach.*

Die Arten leben in verwesenden Pflanzen- und Tierstoffen, werden aber oft auch im Fluge gefangen.

(*Diystocercyon*.)

- ustulatus* Preysl. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Baassen, Oláhfalu (c. a.).

(*Cercyon* i. sp.)

- lugutris* Oliv. (obsoletus Gyll.). Mühlbach, Hermannstadt, Fogarasch (Bielz), Kerzer Gebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- impressus* Sturm. Bistra, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Schulergebirge, Buceacs, Nagyagyinás (Deubel).

- haemorrhoidalis* F. (*flavipes* F.). Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalu, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Szováta, Naszód, Borszék (c. a.); Michelsberg, Kerzer Gebirge, Remete (Nagyenyed), Kakova (Ormay).

- var. *erythropterus* Muls. Schässburg, Hermannstadt, Szunyokszék (Kronstadt, c. a.).

- melanocephalus* L. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch (Bielz); Remete (Nagyenyed), Gyógy (Ormay); Buceacs (Deubel).

- marinus* Thoms. Präsbe (Bielz).

- lateralis* Marsh. Tartlau, Schässburg (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea), Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- unipunctatus* L. Hermannstadt, Fogarasch, Előpatak, Schässburg, Csáki-Gorbo (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- quisquilius* L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Unter-Kerz, Fogarasch (Bielz); Klausenburg (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

- terminalis* Marsh. Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

- pygmaeus* Illig. Tartlau, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Krizba (Méhely); Kronstadt, Vargyastal (Deubel); Schässburg (c. a.).

- var. *merdarius* Sturm. Schässburg Fuchsloch, in Dünge, c. a.).

- nigriceps* Marsh. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Malomviz (c. a.).

- trilis* Illig. Hermannstadt (Bielz); Hátzseg (Deubel).

- granarius* Er. Schässburg (c. a.); Rotenturm, Schanta (Ormay); Kronstadt (Gespreng, Deubel).

(*Paracercyon*.)

- flavipes* Thunbg. (analisis Payk.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Unter-Kerz, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen, Mezőség (Záh), Schässburg (unter verwesenden Pflanzen in Gärten im Frühjahr häufig, Bielz); Präsbe, Gyógy (Ormay).

357. *Megasternum Muls.*

- boletophagum* Marsb. Rodnagebirge, Oláhfalu, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Retjezat, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

358. *Cryptopleurum Muls.*

In Dünger und verwesenden Pflanzenstoffen.

- minufum* F. (atomarium Oliv.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

- crenatum* Panz. Schässburg (Fuchsloch, c. a.).

Cantharoiidea.

XXI. Cantharidae.

Homalisini.

359. *Homalisus Geoffroy.*

Auf blühenden Pflanzen; namentlich Schirmblüten, auch in morschem Holze.

- lonisbellaquei* Geoffr. (suturalis Oliv.). Hátzseg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Marosgeb. (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Hermannstadt (Albrecht); Bistritz (Müller).

Lycini.

360. *Dictyopterus Latreille.*

Auf blühenden Pflanzen.

- Aurora* Herbst. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Buceacs (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

- rubens* Gyll. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

361. *Pyropterus Muls.*

Auf blühenden Pflanzen.

- affinis* Payk. Bistra, Rodnagebirge, Schässburg (Fuchsloch, 18. Juni, c. a.); Rodnagebirge (Deubel); Székajai (Kovácsnaer Gebirge, Méhely).

362. *Platycis Thomson.*

- Cosnardi* Chev. Zibinsgebirge (Bielz); Rodna Gebirge (Deubel); Hermannstadt (Müller).

minuta F. Surul, Borszék (Bielz); Bistra (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

363. *Lygistopterus Muls.*

sanguineus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Lampyridini.

364. *Lampyris Geoffr.*

noctiluca L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

365. *Phausis Leconte.*

(*Lamprorhiza* Motsch.)

splendidula L. Heltau, Girelsau, Kronstadt (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt, jedoch wohl mit Unrecht.

366. *Phophaenus Laporte.*

Unter Laub und in morschem Holz in Laubwäldern.

hemipterus Goeze. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Vargyastal, Honigberg (Alt- ufer, Deubel).

367. *Luciola Laporte.*

mingreluca Men. Hätzeg, Kronstadt (Bielz).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

Cantharini.

368. *Podabrus Westwood.*

alpinus Payk. Zibins-Gebirge, Kronstadt (Bielz); Balánbánya, Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Schässburg, Borszék (c. a.).

var. *lateralis* Er. Kerzergebirge (Bielz).

var. *rubens* F. Frecker Gebirge (Serbota), Bucsecs (c. a.).

369. *Cantharis Linné.*

(*Ancistronycha*.)

abdominalis F.

var. *cyanipennis* Bach. Kronstadt, Előpatak (Bielz).

violacea Payk. Schulergebirge (Bielz); Balánbánya (Egyeskő, c. a.); Rodnageb., Nagyhagymás (Deubel); Rátosnya, Klausenburg (Müller); Bodzaer Geb. (Méhely).

var. *figurina* Dietr. Rodnagebirge (c.), (Deubel).

Das in der Sammlung Deubels befindliche ♂ weicht von der normalen Form ab durch schwarzen Hinterkopf, dunkeln Halsschild mit rötlich durchscheinenden Rändern und mit Ausnahme der Vorderhüften ganz schwarze Beine. An den Fühlern ist nur die Unterseite des ersten Gliedes gelb. Die Krallen aller Beine sind gelb.

Erichsoni Bach. Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat, Rodnagebirge (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

(*Cantharis* i. sp.)

fusca L. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

rustica Fall. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

tristis F. Retjezat, Kerzer Gebirge (Bielz); Surul (Albrecht); Rodnagebirge (Deubel).

obscura L. Hätzeg, Götzenberg, Talmatschel, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Gyeke (Bielz); Schanta (Ormay); Alsó-Rákös (c. a.); Paringul (Deubel).

pulicaria F. Hätzeg, Zibinsgebirge, Kronstadt, Záh (Mezőség, Bielz); Kalán, Alsó-Rákös (c. a.).

nigricans Müll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pellucida F. Hätzeg, Neudorf b. H., Fogarasch, Héviz, Kronstadt (Bielz); Götzenberg (Ormay); Vargyastal, Nagyhagymás, Paringul (Deubel); Detunata (Mallász).

livida L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Oláhfalva, Záh, Gyeke (Bielz); Schanta (Ormay); Karlsburg, Borszék (c. a.).

var. *scapularis* Redt. Tartlau (Bielz).

var. *rufipes* Herbst (dispar F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

longicollis Kiesenw. Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt (c. a.); Rodnagebirge, Vargyastal, Nagyhagymás (Deubel).

quadripunctata Müll. (assimilis Payk.). Práshe, Hosszufalu (Bielz); Szurdok-Pass, Schässburg, Schulergebirge (c. a.); Vargyastal (Deubel); Remete (Nagyenyed, Ormay).

sudetica Letzn. Fogarascher, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Nussbach, Klausenburg (c. a.).

rufa L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Héviz, Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel); Schässburg, Klausenburg (c. a.).

pallida Goeze. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

fulvicollis F. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Petrozsény, Malomviz, Előpatak (c. a.).

bicolor Herbst (thoracica Oliv.). Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Borszék (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

lateralis L. (oralis Germ.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Baassen, Marosújvár, Karlsburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Metacantharis*.)

discoidea Ahr. Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel); Borszék (c. a.).

var. *liturata* Redtenb. Mediasch (Bielz); Fogarascher Gebirge (c. a.); S.-Regen (Müller).

haemorrhoidalis F. Hátszeg, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Hops, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Götzenberg, Remete (Nagynyed, Ormay).

turcica Marsh. Kerzer Gebirge (Bielz).

370. *Absidia Mulsant*.

pilosa Payk. Dees, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Borszék (c. a.); Bucsecs, Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).

prolixa Märk. Kronstadt, Rodnagebirge, Bucsecs (♂ ♀, c. a.); Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).

rufotestacea Letzn. Schuler Gebirge, Szováta (c. a.); Zernest, Rosenau (Deubel).

371. *Rhagonycha Eschsch.*

translucida Kryn. Rodnagebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

nigricreps Waltl. Zibinsgebirge, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Bistra, Retjezat, Schässburg, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Paringul (Deubel).

var. *nigricornis* n. v. Rodnagebirge (c. a.).

Im Rodnagebirge kommt eine Varietät vor mit ganz schwarzen Fühlern und schwarzen oder braunen Schenkeln, für welche ich den Namen *nigricornis* vorschlage.

fulva Scop. Hátszeg, Déva, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Klausenburg (Bielz).

var. *usta* Germ. Schässburg (Bielz).

opaca Muls. Kronstadt (Bielz).

Die Art gehört dem südwestlichen Europa an, so dass ihr Vorkommen bei uns eines weiteren sicheren Nachweises bedarf.

maculicollis Märk. (Meisteri Grell.). Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Szamosújvár (Ormay); Paringul, Bucsecs, Csukás, Rodnageb., Bistritz (c. a.).

testacea L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előpaták, Schässburg, Szováta, Gycke, Záh (Bielz).

limbata Thoms. Hermannstadt (c. a.); Kronstadt, Bucsecs (Deubel).

Deubeli n. sp. Schässburg, Kronstadt (c. a., Deubel).

Rhagonycha Deubel.

Niger vel nigropiceus, mandibulis, elytris, tibiis tarsisque rufotestaceis, antennae corporis dimidium superantes, prothorax subquadratus, angulis anterioribus subrotundatis, posterioribus acutis, subobtusis vel rectangulatis.

Schwarz oder dunkelpschbraun, Mandibeln, Schienen, Tarsen und Flügeldecken hellgelb, zu-

weilen das zweite Fühlerglied an der Wurzel etwas heller. Kopf beim ♂ etwa so breit als der Halsschild, mit ebenso grossen, vorgequollenen Augen wie bei *Rh. pallipes*, beim ♀ viel schmaler als der Halsschild mit kleineren wenig vorquellenden Augen, fein zerstreut, etwas rauch punktiert, zwischen den Augen leicht, zuweilen obsolete eingedrückt. Fühler in beiden Geschlechtern länger als der halbe Körper, das dritte Glied fast doppelt so lang als das zweite und um $\frac{1}{4}$ kürzer als das vierte Halsschild beim ♂ fast so lang als breit, nach vorne etwas verengt, beim ♀ sehr wenig kürzer als breit, fast quadratisch, mit schwach gerundeten Seiten und schwach gerundetem Vorderrand, die Vorderecken stumpf, aber deutlich, die Hinterecken fast rechtwinklig, ziemlich scharf, Vorder- und Hinterrand deutlich, der Seitenrand kaum aufgebogen, fast verflacht, Scheibe mit den gewöhnlichen Eindrücken, glänzend, glatt, höchstens in den Vorderwinkeln und an den Seiten undeutlich punktiert. Schildchen dunkel. Flügeldecken vier- bis fünfmal länger als der Halsschild, dicht, etwas runzlig punktiert, mit zwei mehr oder weniger deutlichen, erhabenen Linien auf der innern Schebenhälfte, dicht gelblichgrau niederliegend behaart. Unterseite ganz schwarz. Der Rh. femoralis Brüllé nahestehend, aber grösser, anders gefärbt und punktiert, mit längeren Fühlern und weniger querm glänzendem Halsschild.

femoralis Brüll. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Paringul, Bucsecs, Nagyhagymás (Deubel).

var. *nigripes* Redtenb. Zibinsgebirge, Präsbe, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Bucsecs, Rodnagebirge (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

var. *fuscitibla* Rey. Retjezat, Paringul (c. a.).

lignosa Müll. (*pallipes* F., *pallida* F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland bis ins Gebirge verbreitet.

straminea Kiesenw. Schanta, Stolzenburg (Ormay).

banatica Rosenh. Déva, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hammersdorf, Baassen, Schässburg (c. a., von Graspisen geköschert).

viduata Küst. Hermannstadt (Ormay).

rorida Kiesenwetter. Hermannstadt (Bielz); Hátszeg, Puj (b. Hátszeg), Bucsecs, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

elongata Fall. Hátszeg, Zibinsgebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Szováta (c. a.).

carpathica Ganglb. (? morio Miller). Rodnagebirge (Ganglbauer).

atra L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Borszék (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

var. *rhaetica* Stierl. Vargyastal (Deubel).

372. *Pygidia Muls.*

denticollis Schumm. Klausenburg, Bihar-gebirge (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

373. *Silis Latreille.*

- nitidula* F. Mühlbach, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Reps, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz).
ruficollis F. Gross-Scheuern (Bielz).

Malthinini

Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen, werden mit dem Streifsack von niederen Pflanzen und durch Klopfen von Laub- und Nadelhölzern gesammelt.

374. *Malthinus Kiesenwetter.*

- demissus* Kiesenw. Hermannstadt (Seidlitz); Baassen, Schässburg (c. a.).
sinuaticollis Kiesenw. Hermannstadt (Seidlitz); Kerzer Gebirge (Bielz).
nigrinus Schanf. Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Hátszeg, Schässburg (c. a.).

375. *Malthinus Latreille.*

- biguttulus* Payk. Buceacs, Schulergebirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
flaveolus Payk. Gross-Scheuern (Bielz); Klausenburg, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
fasciatus Oliv. Kerzer Gebirge (Bielz); Michelsberg (Ormay); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).
facialis Thoms. Seidl. Schässburg (Wietenberg, 4. Juli, c. a.).
glabellus Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a.).
maritimus Pic. Kronstadt (Honterusplatz, 1 ♂, Deubel).
frontalis Marsh. Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Honigberg (Deubel).

376. *Malthodes Kiesenwetter.*

- marginatus* Latr. Gross-Scheuern, Neudorf (Bielz); Kronstadt, Előpatak, Borszék, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); S.-Regen (Müller).
trifurcatus Kiesenw. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
 var. *atramentarius* Kiesenw. Kronstadt (♂, Deubel).
guttifer Kiesenw. Buceacs, Frecker Geb. (Serbota, Nagybagymás, Kronstadt, Borszék (c. a.).
sprefus Kiesenw.
 var. *apiceguttatus* Ganglb. Kronstadt (Deubel).
 Liegeli Weise. Kronstadt (Zinne, ♂, Deubel).
brevicollis Payk. (*nigellus* Kiesenw.). Kerzer Gebirge (Bielz); Paringul (c. a.).

- minimus* L. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Ompolyiczatal (bei Zalátna), Baassen, Schässburg (c. a.).
fuscus Waltl. (*pellucidus* Kiesenw.). Hermannstadt, Schässburg (c. a.).
debilis Kiesenw. Bozauer Gebirge (Méhely).
 var. *transsylvanicus* Ganglb. Kronstadt (Zinne, ♂ ♀, Deubel).
dispar Germ. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Balánbánya, Szováta, Bistra, Retjezat (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
maurus Cast. Hermannstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).
 var. *misellus* Kiesenw. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Szováta, Borszék, Schässburg (Kokelufer auf Weiden, c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).
fibulatus Kiesenw. Kronstadt (Deubel).
hexacanthus Kiesenw. Retjezat (c. a.).
dimidiaticollis Rosenh. (*pulicarius* Redt.). Hermannstadt, Baassen, Schässburg (♂, c. a.).
spathifer Kiesenw. Kronstadt (♂ ♀, Deubel).
serbotae Petri Frecker Gebirge (Serbota, oberhalb der Baumregion im Grase unter Steinen, ♀, c. a.).
Holdhausi Ganglb. Kronstadt (♂ ♀, Deubel).
Deubeli Ganglb. Siebenbürgen.

Drillini.377. *Drillus Olivier.*

- concolor* Ahr. Grosspold, Gross-Scheuern, Kronstadt (Kapellenb., Bielz); Baassen, Schässburg (c. a.). Die Larven der flügellosen Weibchen leben in verschiedenen Landschnecken, *Helix vindobonensis*, *Helix lutescens*, *vicina*; Entwicklung der Männchen noch unbekannt; Hermannstadt (Albrecht); Bistritz, S.-Regen (Müller).

Malachiini.378. *Troglops Erichs.*

- albicans* L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Reps, Unter-Kerz, Csukás (c. a.).

379. *Charopus Erichs.*

- thoracicus* Moraw. Csukás, Bozauer Gebirge (Deubel).
livipes Payk. Fogarasch, Klausenburg, Bibargebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pallipes Oliv. Hátzeg, Hermannstadt, Holz-
mengen, Előpatak, S.-Regen (Bielz).
concolor F. Hátzeg, Hermannstadt, Gross-
Scheuern, Girelsau, Fogarasch, Elő-
patak, Schässburg, S.-Regen (Bielz);
Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

380. *Hypebaeus Kiesenw.*

(*Alloceps*.)

flavipes F. Mühlbach, Mediasch (Bielz);
Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Hát-
szeg (Deubel).

381. *Ebaeus Erichs.*

pedicularius Schrank (*praecoccupatus* aut.).
Hermannstadt, Gross-Scheuern, Schäss-
burg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Stol-
zenburg, Salzburg (Ormay); Hátzeg
(c. a.).

ater Kiesenw. Bucsecs (Deubel, subalpin).
appendiculatus Er. Hermannstadt, Neudorf
b. H., Holzmengen, S.-Regen (Bielz);
Hátzeg (c. a.).

flavicornis Er. Hammersdorf, Előpatak
(Bielz); Schässburg (c. a.); Törzburg
(Deubel).

mediterraneus Ab. Kronstadt (Rosenauer
Burgberg, Méhely).

coerulescens Er. Gross-Scheuern (Bielz);
Hátzeg (c. a.).

(*Sphinginus*.)

coarctatus Er. Kronstadt, Schässburg
(Bielz); Zajzon (Deubel).

382. *Attalus Erichs.*

(*Abrinus*.)

analís Panz. Hermannstadt, Marpod, Fo-
garasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz);
Stolzenburg, Resinar (Ormay); Ham-
mersdorf, Rotenturm, Hátzeg, To-
roczkó (Erzgebirge), Tordaer Schlucht,
Baassen, Borszék (c. a.).

383. *Axinotarsus Motsch*

ruficollis Oliv. Hermannstadt, Neudorf bei
H. (Bielz); Schässburg (c. a.); Kron-
stadt (Deubel).

pulicarius F. Durch das ganze Berg- und
Hügelland verbreitet.

marginalis Lap. Hátzeg, Déva, Hermann-
stadt, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz);
Baassen, Schässburg, Reps (c. a.).

384. *Malachius Fabr.*

scutellaris Er. Hermannstadt, Birtihalm,
Schässburg, Reps (Bielz); Vargyastal
(Deubel).

rubidus Er. Talmatschel (Bielz).

aeneus L. Durch das ganze Berg- und
Hügelland verbreitet, auch im Gebirge.
Retjezat (c. a.).

margineus Oliv. Durch das ganze Berg-
und Hügelland verbreitet bis in das
Gebirge (Rodnagebirge, Koronjis, c. a.).

dilatatorius Germ. Gross-Scheuern, Ham-
mersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz);
Alsó-Rákos (Tepehegy, c. a.). In
Hammersdorf sammelte ich diese Art
auf *Crambe tartarica*.

bipustulatus L. Durch das ganze Berg-
und Hügelland verbreitet.

affinis Mém. Hátzeg, Oláhfalú (Bielz); Her-
mannstadt, Hammersdorf (Ormay).

spinipennis Germ. Hátzeg, Retjezat, Her-
mannstadt, Fogarasch (Bielz); Stolzen-
burg, Rotenturm (Ormay).

elegans Oliv. Rotenturm (Bielz); Ham-
mersdorf (Ormay).

falcifer Abeille. Schässburg (2 ♂, c. a.);
Rosenau, Untertörmös (Méhely); Kron-
stadt (Zinne, Deubel).

geniculatus Germ. Mühlbach, Fogarasch,
Záh (Bielz); Hermannstadt, Hammers-
dorf, Stolzenburg (Ormay); Marosuj-
vár, Schässburg (c. a.); Hátzeg (Deubel).

385. *Anthocomus Erichs.*

(*Celidus*.)

rufus Herbst. Hammersdorf, Grossscheuern
(Bielz); Schässburg (c. a., Oktober
im Röhrich einer feuchten Stelle).

(*Neotrotus*.)

bipunctatus Harrer (*equestris* F.). Durch
das ganze Berg- und Hügelland ver-
breitet.

(*Parembalus*.)

fasciatus L. Hátzeg, Retjezat, Gross-
Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt,
Schässburg, S.-Regen (Bielz); Her-
mannstadt, Stolzenburg (Ormay); Kron-
stadt (Deubel).

Dasytinae.

386. *Dasytes Fabr.*

niger L. Hátzeg, Gross-Schenk, Fogarasch,
Kronstadt, Mediasch, S.-Regen; Her-
mannstadt (Ormay); Schässburg,
Baassen, Dees (c. a.); Nagybagmäs
(Deubel).

alpigradus Kiesenw. Petrosény, Kronstadt
(Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bu-
secs (c. a.); Hátzeg (Deubel).

(*Hypodasytes*.)

subalpinus Baudi. Rosenau (Bucsecs-Gie-
biet, Deubel).

obscurus Gyll. (*rugipennis* Thoms.). Gross-
Scheuern, Kerzer Gebirge, Gross-
Schenk, Fogarasch, Büdös, Oláhfalú,
S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Or-
may); Schässburg (c. a.); (? *rugipen-
nis* Thomson), Büdös (Bálványos), Tö-
möser Pass (Méhely).

(Metadasytes.)

coeruleus Deg. Ober-Sches, Kerzer Geb. (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurdok-Pass, Retjezat, Schässburg (Gross-Alischer Kupa, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Bistritz (Müller).

(Mesodasytes.)

aerosus Kiesenw. Riu Sad, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz, S.-Regen (Müller).

plumbeus Müll. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (c. a.); Salzburg (Ormay).

(Hapalogluta.)

fuscus Illig. Gross-Scheuern, Holzmeugen, Zood, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

subaeneus Schönh. Girelsau, Kerzer Geb., Fogarasch, Gyeke (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

387. *Dolichosoma Stephens.*

lineare Rossi. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Balánbánya, Szováta, Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge (Valca vinului), Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

388. *Haplocnemus Stephens.*

pini Redt. (impressus aut.). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

nigricornis F. Hermannstadt (Ormay).

tarsalis Sahlb. Tordaer Schlucht, Rodnagelbirge (c. a. ♂ ♀).

389. *Trichoceble Thomson.*

(Julistus Kiesenw.)

lloalis Oliv. Grosspold, Schässburg, Borszék (Bielz); Rosenau (Deubel); Bistritz (Müller).

fulvohirta Bris. Hátszeg (c. a.); Rosenau? (Deubel).

390. *Dasytiscus Kiesenw.*

impressicollis Reitter (graminicola Kiesenw.). Gross-Scheuern (Bielz).

391. *Danacaea Laporte.*

Die Arten leben auf verschiedenen niedern Pflanzen.

Reyi Proch. Kronstadt (Deubel).

pallipes Panz. Hátszeg, Gross-Scheuern, Neudorf h. H., Mediasch, Gyógy (Bad), Stolzenburg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rotenturm (c. a.).

serbica Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Salzburg, Karlsburg, Schässburg, Borszék (c. a.); Mezőség (Gyeke, Mchely).

morosa Kiesenw. Rosenau (Bucsecs-Gebiet, Deubel).

nigritarsis Küst. Gross-Scheuern, Fogarasch, Reys, Záh (Bielz); Klausenburg, Nagyenyed, Rotenturm, Zalatna, Hátszeg, Puj (b. Hátszeg), Petrozsény (c. a.); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XXII. Cleridae.

Clerini.

392. *Denops Steven.*

albofasciatus Charp. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz).

var. **longicollis** Stev. Siebenbürgen (Catalog. Col. Europae, Heyden 1906).

393. *Tillus Olivier.*

Die Arten werden in der Regel an gefällten Holzstämmen oder in altem Holze gesammelt.

elongatus L. Hátszeg, Zood, Kerzer Geb., Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Előpatak, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes, Schulergebirge, Bucsecs, Bodzaer Gebirge (Deubel).

♂ var. **comma** n. v. Zalatna (1 Ex. c. a.).

Tillus elongatus var. **comma** weicht in Grösse, Gestalt und Färbung von normalen Männchen nicht ab, besitzt aber auf dem vierten Zwischenraume der Flügeldecken in der Basalhälfte einen schmalen, lebhaft rot gefärbten, kielförmig erhöhten, kommaförmigen Strich.

unifasciatus F. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Götzberg, Zood, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed (c. a.).

pallidipennis Bielz. Gross-Schenk, Szombat, Schässburg, Csiker Geb. (Bielz).

394. *Tarsostenus Spinola.*

univittatus Rossi. Hammersdorf, Sächs.-Regen (Bielz).

395. *Opilo Latreille.*

domesticus Sturm. Fogarasch, Kronstadt (? Deubel); Hosszufalu (Bielz); Schässburg (c. a.).

mollis L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rotenturm, Remete (Nagyenyed, Ormay); Kronstadt (Deubel).

396. *Clerus Fabr.*

(Cleroides Schaffer.)

mutillarius F. Hátszeg, Hermannstadt, Zood.
Mediasch, Dees, Klausenburg (Bielz);
Schässburg (c. a.); Háromszék (Deu-
bel).

397. *Thanasimus Latreille.*

rufipes Brahm.

var. *femoralls* Zett. (pectoralis Fuss.).
Präse, Kerzer Gebirge (Bielz).

formicarius L. Hátszeg, Hermannstadt,
Hammersdorf, Präse, Kerzer Gebirge,
Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch,
Birihalm, Schässburg, S.-Regen (Bielz);
Bistra (Ormay).

398. *Trichodes Herbst.*

apiarius L. Durch das ganze Berg- und
Hügelland bis in die Gebirge ver-
breitet, auf blühenden Pflanzen.

favarius Illig. Csiker Gebirge (Bielz); Var-
gyastal (Deubel).

irkutensis Laxm. (bifasciatus F.). Gyergyó,
Rodna (Bielz); Bistra (Ormay);
Rodnagebirge (Vale vinului, Deubel).

Enopliini.

399. *Orthopleura Spinola.*

(Dermestoides Schaffer.)

sanguinicollis F. Fogarasch, Kronstadt, Me-
diasch, Klausenburg, Gyala (Bielz);
Hermannstadt (Ormay); Henigberg,
Nussbach (Deubel, an Eichenstämmen).

Corynetini.

400. *Corynetes Herbst.*

coeruleus Degeer. Gross-Scheuern, Botberg
b. H., Kronstadt (Bielz); Schässburg
(c. a.).

var. *ruficornis* Sturm. Marktschelken, Me-
diasch, Schässburg, Héviz (Bielz);
Marosujvár (c. a.).

401. *Necrobia Latreille.*

violacea L. Durch das ganze Berg- und
Hügelland verbreitet.

rufipes Degeer. Mühlbach, Klausenburg
(Bielz).

402. *Opetiopalpus Spinola.*

scutellaris Panz. Gross-Scheuern, Dees
(Bielz); Klausenburg (c. a.).

XXIII. Derodontidae.

403. *Derodontus Leconte.*

macularis Fuss. Kerzer Gebirge (Bielz).

404. *Laricobius Rosenhaner.*

Erichsoni Rosenh. Buceacs (Deubel, alpin,
aus Grasbüscheln gesiebt; ich sammelte
diese Art in Böhmen bei Franzens-
bad durch Klopfen von Gesträuch).

XXIV. Byturidae.

405. *Byturus Latreille.*

fumatus F. Durch das ganze Berg- und
Hügelland verbreitet, namentlich auf
den Blüten des Löwenzahn.

tomentosus F. Durch das ganze Gebiet
verbreitet, namentlich auf Himbeer-
blüten.

a. *flavescens* Marsh. Mit der Stamm-
form.

XXV. Ostomidae.

Nemosomini.

406. *Nemosoma Latreille.*

elongatum L. Gross-Scheuern, Birihalm, S.-
Regen (Bielz); Nagybagymás, Kron-
stadt (Zinne, Deubel).

407. *Tenebrioides Piller.*

mauritanicus L. Durch das ganze Gebiet
unter der Rinde von Laub- (auch
Obst-)Bäumen.

Leperluini.

408. *Calytis Thomson.*

(Nosodes Leconte.)

scabra Thunbg. Borszék (Bielz).

Ostomini.

409. *Ostoma Laicharting.*

(Zimioma.)

grossum L. Kerzer Gebirge, Kronstädter
Gebirge, Piatra mare, Bükszád, Ber-
szék, Marosgebirge, S.-Regen (Bielz);
Bistra, Rodnagebirge (c. a.).

(Ostoma i. sp.)

ferrugineum L. In unsern Gebirgen unter
Fichtenrinde.

(Grynocharis.)

oblongum L. Hátzeg, Präsbe, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Bozauer Pass, Marosgebirge, Dees (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm, Brád, Szamosujvár (Ormay); Csukás (Deubel).

410. *Tymalus Latreille*.

limbatus F. In allen Gebirgswäldern unter Baumrinde (Rotbuche, Fichte).

XXVI. Sphaeritidae.

411. *Sphaerites Duftschmid*.

gabratus F. Präsbe, Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Zernest (Deubel).

XXVII. Nitidulidae.

Cateretini.

412. *Cateretes Herbst*.

(*Cercus Latreille*.)

pedicularius L. Mezőség (Záh, Bielz).
bipustulatus Payk. Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).
 a. **suturalis** Murray.) mit der
 a. **ochraceus** Murray.) Stammform.

(Pulion.)

rufilabris Latr. Dobra (Bielz).

413. *Heterhelus Duval*.

scutellaris Heer. (sambuci Er.). Kronstadt, Schulergebirge, Borszék (c. a.).

solani Heer. (rubiginosus Er.). Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Reljezat, Bistra, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Resinar, Gyergyó-Tölgyes, Schanta (Ormay); Nagybagymás (Deubel).

414. *Brachypterus Kugelann*.

glaber Steph. Zibinsgebirge (Bielz).

urticae F. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge, Balánbánya, Schulergebirge, Előpatak, Bükszád, Retjezat (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay); Detunata (Mallász).

415. *Heterostomus Duval*.

pulicarius L. (gravidus Illig.). Hátzeg, Hermannstadt, Zood, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz).

var. **cinereus** Heer. Zibinsgebirge (Bielz).

var. **linariae** Steph. Előpatak, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

Carpophilini.

416. *Carpophilus Leach*.

(Ecnomorphus.)

sempustulatus F. Gross-Scheuern, Holzmengen (Bielz); Schässburg (unter Eichenrinde und am ausfliessenden Saft der Buche, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne).

Nitidulini.

417. *Ipidia Erichs*.

4-maculata Quens. (4-notata F.). Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Borszék, Gyergyó (Toplitz, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Nagybagymás, Kronstadt (Deubel); Szováta (c. a.).

418. *Amphotlis Erichs*.

marginata F. Dobra, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter der Rinde und im Holze alter Weissbuchen in den Nestern der *Formica fuliginosa*, c. a.); Honigberg (unter Eichenrinde, Deubel); Szováta (Rotbuchenstumpf, 5. Juni, c. a.).

419. *Soronia Erichs*.

punctatissima Illig. Hermannstadt, Götzenberg, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz).
grisca L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, im Holze alter Eichen, unter der Rinde und am ausfliessenden Saft der Buchen und anderer Laubbäume).

420. *Epuraea Erichs*.

(Dadopora.)

decemguttata F. Hátzeg, Hermannstadt, Präsbe, Gross-Scheuern, Holzmengen, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (in Baumpilzen, besonders der Eiche, c. a.); Detunata (Mallász).

(*Epuraea* i. sp.)

silacea Herbst. Präsbe, Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **fagi** Bris. Bucsecs (Malajester Schlucht, Méhely).

depressa Gyll. (aestiva Er., ochracea Er.). Hermannstadt, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Michelsberg, Schanta (Ormay); Unterkarz (c. a.).

- a. *bisignata* Sturm. Präsbe, Götzberg, Hammersdorf, Neudorf b. H. (Bielz); Heltau, Kerzer Geb. (Ormay); Schässburg, Kronstadt (c. a.).
- melina* Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Kronstadt (c. a.); Schulergeb. (Deubel).
- deleta* Er. Rodnagebirge (c. a.); Zernest (Deubel).
- terminalis* Mannh. (immunda Er.). Zibinsgebirge (Ormay); Hargitta (Méhely); Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Balánbánya (Egyeskő, c. a.).
- a. *nigricans* Schilsky. Schulergebirge (c. a.).
- a. *Seidlitzii* Schilsky. Schulergebirge, Balánbánya (Egyeskő, c. a.); Zernest (Deubel).
- nana* Reitter. Rodnagebirge (c. a.); Negoi (subalpin, Deubel).
- neglecta* Herr. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Freck, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Ober-Kerz (Glashütte), Schässburg (c. a.); Bistra, Gyógy (Ormay); Zernest (Deubel).
- rufomarginata* Steph. Kerzer Geb. (Bielz).
- castanea* Duft. Hätzeg (Bielz).
- nobilis* Reitter. Schässburg (am ausfließenden Saft eines Buchenstumpfes, März, c. a.), 5 Exemplare).

Die Art erinnert in der Färbung an *E. rufomarginata* Steph., für die ich sie anfänglich auch hielt. Da jedoch die ♂ erweiterte Mittelschienen besitzen, die Punktierung entschieden gröber und körniger als bei *E. obsoleta*, die Färbung ähnlich der *E. nobilis* ist, so habe ich die Schässburger Tiere als *E. nobilis* Reitter determiniert. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass wir in unserer *E. nobilis* eine neue Art zu erblicken haben, da der wesentliche Unterschied zwischen ihr und *E. obsoleta* im Fühlerbau besteht, den Reitter nicht erwähnt. Die Fühlergeißel ist viel schlanker und länger, das mittlere Glied der Keule deutlich breiter als die beiden einschliessenden und gebräunt. Doch ist es immerhin möglich, dass Reitter diese Unterschiede, da ihm nur ein Exemplar vorlag, übersehen hat.

- variegata* Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Annen-See (Tusnád). Schässburg, Schulergebirge (c. a.); Rosenau (Bucsecs-Gebiet, Deubel).
- a. *monochroa* Reitter. Kronstadt (Deubel).
- obsoleta* F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Talmesch, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Oláhfalú (Bielz); Schässburg, Hätzeg (c. a.).
- longula* Er. Hermannstadt (Bielz); Petrosény, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- a. *Erichsoni* Reitter. Petrosény (c. a.).
- boreella* Zetterst. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Rodnagebirge (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt, Zernest (Deubel).
- angustula* Strm. Präsbe (Bielz).
- pygmaea* Gyll. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Schulergeb., Frecker

- Gebirge (Serbota), Oláhfalú, Rodnagebirge (c. a.).
- pusilla* Illig. Hätzeg (Bielz); Schulergeb. (c. a.); Rodnagebirge, Tusnád (Deubel).
- abielina* J. Sahlb. Schulergebirge, Alsó-Rákos (Deubel).
- oblonga* Herbst. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge, Nagyhagymás (Deubel).
- Fussi* Reitter. Frecker Gebirge, Oláhfalú (c. a.); Bucsecs, Nagyhagymás (Deubel).
- florea* Er. Zibinsgebirge, Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Puj (bei Hätzeg), Malonviz (c. a.); Götzberg, Kleinpöld (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- laeviuscula* Gyll. Ober-Kerz (Glashütte, c. a., 1 Ex., vidit Ganglbauer).
- Deubeli* Reitter. Schulergebirge (von Deubel gesammelt, c. Reitter?).

421. *Micrurula* Reitter. (*Micruria* Reitter ol.)

- melanocephala* Marsh. Zibinsgebirge, Hermannstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Schulergebirge, Bülös (c. a.); Kronstadt, Bucsecs (subalpin, Deubel).

422. *Omosiphora* Reitter.

- limbata* Oliv. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a., im Moos eines vertrockneten Ahorn); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Honigberg (Deubel).

423. *Omosita* Erichs.

- depressa* L. Gross-Scheuern, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).
- colon* L. Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (an tierischen Stoffen, verfaultem Obst etc.); Kronstadt (Deubel).
- discoidea* F. Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz). In Schässburg unter Baumrinden gesammelt, c. a.).

424. *Nitidula* Erichs.

- bipunctata* L. Durch das ganze Berg- und Hügelland an tierischen Stoffen, oft in Vorratskammern.
- rufipes* L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Bistritz (Bielz); Honigberg, Neustadt bei Kr. (Deubel).
- carnaria* Schall. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (an den getrockneten Ueberresten eines Fuchses, c. a.); Kronstadt (Gesprenk, Deubel).

425. *Pria Stephens.*

dulcamarae Scop. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Marienburg b. Sch. (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

426. *Meligethes Stephens.*

Blütenkäfer.

(*Odontogethes*.)

hebes Er. Zibinsgebirge, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Borszék, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).

(*Meligethes* i. sp.)

rutipes (Gyll. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Zernest (Deubel).

lumbaris Sturm. Hätzeg (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Försteri Reitter. Kronstadt (c. a.).

rubripes Muls. (*fulvipes* Bris.). Kronstadt (Zinne), Bucsecs (subalpin, Deubel).

coracinus Strm. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Előpatak, Oláhfalú, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Bükszád, Schässburg, Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Gyógy (Bad, Ormay).

a. *epuraeoides* Reitter. Előpatak (c. a.).

var. *pumilus* Er. Baróth, Kisszéktó (Méhely); Kronstadt, Előpatak, Schässburg (c. a.).

var. *decoloratus* Först. Baróth, Kronstadt (Zinne, Méhely).

var. *aenescens* Ganglb. Kronstadt (Ganglbauer); Alsó-Rákos, Schässburg, Hätzeg, Előpatak (c. a.); Vargyastal (Deubel).

Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa. III. 504) führt diese Varietät, die sich vielleicht als selbständige Art herausstellen dürfte, ausdrücklich für Kronstadt an. Sie ist im Catalogus col. Europae, Heyden etc. 1906 geblieben. Die Art kommt auch mit dunklen Beinen und Fühlern vor, die Flügeldecken sind bei den Weibchen etwas runzlig punktiert.

subaeneus Sturm. Hätzeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Előpatak, S.-Regen, Oláhfalú (Bielz); Schässburg, Szoráta, Alsó-Rákos (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

aeneus F. (*brassicae* Reitter). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, besonders auf Löwenzahn).

var. *dauricus* Motsch. Balánbánya (c. a.).

a. *coeruleus* Reitter. Bistritz, Dees (c. a.).

viridescens F. Götzenberg, Talmesch (Bielz); Balánbánya (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

Czwainae Reitter. Königstein (Crepatura), Bucsecs (Deubel); Zibinsklamm (Albrecht).

humerosus Reitter. Rodnagebirge, Nagy-hagymás (Deubel).

symphyti Heer. Hätzeg, Hermannstadt, Mediasch, Rebs, Előpatak (Bielz); Schäss-

burg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Rosenau (Deubel).

M. corvinus Er. ist aus dem Verzeichnis siebenbürgischer Käfer zu streichen, da er durch einen Irrtum meinerseits aufgenommen wurde.

subrugosus Gyll. Neppendorf, Kerz, Kerzer Gebirge, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Resinar, Schanta (Ormay); Borszék, Alsó-Rákos (Tepe, c. a.); Schulergebirge, Rosenau (Deubel).

var. *substrigosus* Er. Előpatak (Bielz).

serripes Gyll. Neppendorf, Sachs.-Regen, Gyeke (Bielz); Gyógy (Ormay); Schässburg (c. a.).

nanus Er. Hermannstadt (Bielz).

obscurus Er. Előpatak, Oláhfalú (Bielz); Hätzeg, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.).

var. *parallelus* Reitter. Rosenauer Geb., Baróth (Méhely); Előpatak (c. a.).

bidens Bris. Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Rebs, Schässburg (c. a.).

umbrosus Sturm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Nagy-hagymás, Kronstadt (Zinne, Deubel).

transsylvanicus u. sp. Rebs, Héviz, Oláhfalú, Bükszád, Ober-Kerz, Ilvamika (Naszód), Ratosnya, Schässburg (c. a.).

Meligethes transsylvanicus n. sp.

Von der breiten Gestalt und der Grösse. Färbung und Punktierung des *M. umbrosus* Sturm und demselben jedenfalls nahestehend, jedoch durch die Bewaffnung der Vorderschienen und die männlichen Geschlechtsauszeichnungen sicher verschieden. Die Vorderschienen sind bis zum Spitzendrittel erweitert und sehr fein gekerbt. Im Spitzendrittel befinden sich zwei grössere Zähne, die in der Regel durch ein oder zuweilen noch zwei kleinere getrennt sind. Beim Männchen ist das Metasternum in der Mitte der hinteren Hälfte tief dreieckig eingedrückt, am Vorderrande des Eindruckes befindet sich ein breiteres Doppelhöckerchen und an seinem Hinterrande ein einfaches scharfes Körnchen. Das vierte Ventralsegment ist in der Mitte des Hinterrandes schmal geglättet, das fünfte vor dem Hinterrande vertieft, und dieser etwas aufgebogen. Im übrigen scheint die Art vollständig dem *M. umbrosus* zu gleichen, auch die Schenkellinie der Hinterbeine hat einen ähnlichen Verlauf.

Die bei Bielz für *M. umbrosus* angeführten Lokalitäten sind zum grössten Teile auf die neue Art zu beziehen. Ich streiche jedoch nur jene Orte, von denen mir *M. transsylvanicus* bekannt geworden ist, die übrigen belasse ich als zweifelhaft bei *M. umbrosus*, der bei uns wahrscheinlich durch die neue Art ersetzt wird.

afer Bris. Kerzer Gebirge (Bielz).

maurus Sturm. Hätzeg, Götzenberg, Rebs (Bielz); Bükszád, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

incanus Strm. Rebs, Oláhfalú (Bielz); Borszék (c. a.).

ovatus Sturm. Hätzeg (c. a.); Rosenau (Deubel).

brachialis Er. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

picipes Sturm. Hermannstadt, Oláhfalú (Bielz); Rebs (c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

flavipes Sturm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).
var. moestus Er. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz).
memnonius Er. Reys (Bielz); Kronstadt (c. a.).
niger Bris. Szováta (c. a.).
ochropus Sturm. Mediasch (Bielz); Reys (c. a.); Schanta (Ormay); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).
brunnicornis Slrm. Reys (Bielz); Bodzaer Gebirge (Méhely); Kronstadt (Deubel).
angustus Küst. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.).
haemorrhoidalis Först. Oláhfalú, Borszék, Héviz, Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
atramentarius Först. Schässburg (c. a.).
difficilis Heer. Héviz, Oláhfalú (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Hermannstadt, Schulergebirge, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hálszeg (Deubel).
Kunzei Er. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Noa, Deubel).
morosus Er. Kronstadt Tömöscher Pass (Bielz); Retjezat (c. a.).
 Bei dieser Art, ferner bei *M. tristis*, *exilis* und *brevis* wurden einige Fundorte des Bielzschen Verzeichnisses, die sich nachträglich als irrthümlich herausgestellt haben, fortgelassen.
viduatus Sturm. Hermannstadt (Bielz); Kerzer Gebirge, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosennau, Zernest (Deubel).
pedicularius Gyll. Kerzer Gebirge, Reys (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Héviz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
sulcatus Bris. Siebenbürgen (Ganglb. K. v. M. 516).
assimilis Sturm. Schässburg (c. a.); Baróth, Gyeke, Záh (Méhely); Kronstadt (Deubel).
distinctus Sturm. Oláhfalú (Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg, Szováta (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
lepidii Mill. Gyeke, Záh (Bielz); Gross-Scheuern (Ormay); Bükszád (c. a.).
Frivaldszky Reitter. Siebenbürgen (Ganglbauer).
tristis Sturm. Bükszád (Bielz); Balánbánya, Schässburg, Rátosnya (c. a.).
planusculus Heer. Bükszád, Oláhfalú, Előpatak (Bielz, c. a.); Hálszeg, Rátosnya, Szováta (c. a.).
acicularis Bris. Siebenbürgen (Ganglbauer K. v. M. III. 533).
lugubris Sturm. Hermannstadt (Bielz); Tesla (Bodzaer Gebirge), Baróth (Méhely); Borszék (c. a.).
var. gagatinus Er. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Zinne), Ober-Komana, Baróth (Méhely); Hálszeg (c. a.).
egenus Er. Kerzer Gebirge, Előpatak, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

exilis Sturm. Kerzer Gebirge (Bielz).
fumatus Er. Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz).
bidentatus Bris. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
erythropus Gyllh. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Ober-Komana, Baróth (Méhely); Alsó-Rákos, Bükszád, Előpatak, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne).
 (Acanthogethes.)
solidus Kugel. Hermannstadt (Bielz); Gyógy (Ormay).
brevis Sturm. Schässburg (Bielz); Kronstadt, Petersberg b. Kr. (Falinenberg, Deubel); Borszék (c. a.).

427. *Thalyera* Erichs.

fervida Oliv. Hermannstadt (am ausfließenden Saft einer Eiche, Ormay); Schässburg (c. a.); Hálszeg, Kronstadt (Deubel).

428. *Pocadius* Erichs.

ferrugineus F. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Mediasch, Reys, S.-Regen (Bielz); Resinar (Ormay); Balánbánya, Ober-Kerz (Glashütte), Klausenburg, Schässburg (c. a.), in Eichenschwämmen und in Bovisten; Kronstadt (Deubel).

429. *Cychramus* Kugelann.

Die Arten leben auf verschiedenen Pilzen.

4-punctatus Herbst. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Annensee (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Schanta, Bistra (Ormay).
luteus F. (alutaceus Reitter). Hálszeg, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Héviz, Oláhfalú, Borszék, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Schässburg, Rodnaggebirge (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Detunata (Mallász).
var. fungicola Heer. Neudorf b. H., Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalú, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt Gölzenberg, Schanta, Heltau (Ormay); Schässburg, Rodnaggebirge (c. a.).

430. *Cyllodes* Erichs. (*Strongylus* Herbst.)

Die Art lebt unter Baumrinde, namentlich aber in Baumpilzen.

ater Herbst. Hermannstadt, Retjezat, Paringul, Gross-Scheuern, Präsbe, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Remete (Nagyenyed, Ormay); Malomviz, Alsó-Rákos (c. a.).

Cypocephalini.

431. *Cybocephalus Erichs.*

pulchellus Er. Schässburg (30. April, Hecke unter Blättern, c. a.).

politus (Germ. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz)).

Cryptarchini.

432. *Cryptarcha Shuckard.*

strigata F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Eichenschwämme, c. a.); Honigberg (Deubel); Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

(*Cryptarchula* Ganglb.)

imperialis F. Präsbe, Götzenberg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzungen, Gross-Scheuk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (an Eichen, c. a.).

433. *Glischrochilus Murray.* (Ips F.)

Die Arten leben namentlich unter Baumrinden. (Librodor.)

quadriguttatus Oliv. Kerzer Geb., Brenndorf, Marosgebirge, Schässburg (Bielz).

a. *10-guttatus* Oliv. Kronstadt, Keisd b. Schässburg (Deubel); Schässburg (c. a.).

(*Glischrochilus* i. sp.)

quadripustulatus L. Kerzer Geb., Götzenberg, Marosgeb., Präsbe, Ober-Sebes, Fogarasch, Kronstadt, Piatra mare (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota); Marosgebirge (unter Espenrinde, c. a.); Rodnagebirge, Zernest (Deubel).

434. *Pityophagus Shuckard.*

laevior Abeille.

var. *Deubeli* Ganglb. Siebenbürgen.

Ganglbauer führt (Käfer von Mitteleuropa. III. 556) *P. quercus* Reitter nach 1 ♂, welches von Deubel gesammelt wurde, für Siebenbürgen an; später hat er dasselbe Exemplar als Varietät des *P. laevior* Ab. erkannt; daher kann *P. quercus* nicht in unser Verzeichnis aufgenommen werden. In wessen Besitz sich das Exemplar befindet, ist mir nicht bekannt.

ferrugineus L. Surul, Kerzer Geb., Kronstadt, Schulergeb., Bihargebirge (Bielz); Malomviz, Bistra (auf frisch gesägten Fichtenbrettern), Frecker Geb. (Serbota, unter Fichtenrinde), Szurdukpass (an frisch geschälten Fichtenstämmen), Borszék (c. a.).

435. *Rhizophagus Herbst.*

Die Arten leben unter Baumrinden, an gefälltem Holz, zuweilen in morschem Holz, faulenden Vegetabilien etc.

depressus F. Hosszufalu (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

ferrugineus Payk. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge, Rosenau (Bucsecsgebiet, Deubel).

perforatus Er. Bodzaer Gebirge (Méhely); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

parallelocollis Gyll. Hätzeg (Bielz); Kronstadt (Zinne), Mezösámsond (Méhely); Marosujvár, Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

Brancsiki Reitter. Hermannstadt (junger Wald, 6 Exemplare, c. a.).

Rh. *Brancsiki* Reitter. Länge 3'4—3'9 mm. (♂ ♀.)

Statura Rh. *parallelocollis*, sed praesertim antice latior, testaceus, caput prothorace saepe paulo obscuriora. Caput prothorace angustius, post oculos breve, parallelum, retroversum haud angustatum, punctatum, nitidum, vertice transversim nonnihil impressum; oculi sat convexi, prominenter; antennarum articulum tertium secundo sesquilinguis. Prothorax latus, medio nonnihil depressus, latitudine paulo longior, obovatus, lateribus rotundatis, postice paulum modo magis angustatis quam apicem versus, angulis anterioribus rotundatis, medio disci disperse sat valde punctatus. Elytra prothorace nonnihil angustiora, lateribus medio nonnihil rotundato-ampliat, pone medium rotundato-angustata, striatopunctata, subtilissime coriacea, minus nitida. Corpus subtus medio subtiliter desperse punctulatum.

Mas: abdominis segmento primo medio depresso.

Von Rh. *parallelocollis* Gyll. unterscheidet sich die neue Art durch etwas gewölbtere Gestalt, in beiden Geschlechtern kleineren, weniger dicht punktierten Kopf; der Halsschild ist fast ebenso groß, aber weniger dicht, die Streifen der Flügeldecken auf der Basis etwas stärker punktiert, das dritte Fühlerglied etwas kürzer als bei Rh. *parallelocollis*, die Vorderecken des Halsschildes vollkommen abgerundet. Von Rh. *perforatus* Er. unterscheidet sie sich ausser durch die Halsschildform durch stärker vorquellende Augen, nach hinten nicht verengten und nicht eingeschnürten, vollkommen parallelen Hals, kürzeres drittes Fühlerglied.

Von Rh. *nitidulus* F. weicht die neue Art ab durch geringere Grösse, flacheren Körper, weniger dicht punktierten Halsschild, in beiden Geschlechtern schmälere Kopf, stärker gewölbte Augen, stärker punktiertgestreifte Flügeldecken, weniger starke Aussenecke der Vorderschienen etc.; von Rh. *bipustulatus* F. durch breitere Gestalt, parallele Schläfen, gröbere Halsschildpunktuierung, breiteren Halsschild etc.; von Rh. *dispar* Payk. durch breitere, flachere Gestalt, in beiden Geschlechtern kleineren Kopf mit kürzeren parallelen Schläfen, etwas weniger gewölbten, breiteren, nach hinten verengten, auf der Scheibe flacheren, gröber und zerstreuter punktierten Halsschild, gröbere Punktstreifen der Flügeldecken, hellere Färbung etc. Unbekannt blieben mir die wohl nahe verwandten Rh. *Habnenfeldi* Tourn aus Russland und Rumänien und Rh. *Brancsiki* Reitter aus Bosnien und Herzegowina.

Herr Reitter, dem ich die neue Art zusendete, war zuerst der Ansicht, es dürfte die neue Art (die ich als Rh. *brevicornis* beschrieben hatte) Rh. *dispar* v. Gyllenhal Thoms. sein. Ich kann mich dieser Ansicht aus den oben angeführten Gründen nicht anschliessen. Später hat Reitter (Wiener Z. XXIX, 206. 1910) die neue Art mit Rh. *Brancsiki* Reitter identifiziert, welche Mequignon (L'Abeille XXXI. 1909, 103—119, also nach dem Erscheinen des Catalogus Col. Eur. Heyden etc. 1906) als Synonym des Rh. *dispar* v. Gyllenhal Thoms. eingezeichnet hatte, und seine Art nach nochmaliger Untersuchung seines aus der Herzegowina und Bosnien stammenden Materials und der sieben-

bürgerlichen Stücke als gute Art aufrecht erhalten, worin ich ihm beipflichten muss, wenn unsere sichtenb. Tiere tatsächlich mit seinen Tieren von obgenannter Herkunft übereinstimmen. Ich habe auf diese Untersuchungen hin meiner Art den Namen Rh. Branesiki Reitter substituiert und die Beschreibung stehen lassen, weil ohnehin nicht Jedem Reiters Beschreibung zur Verfügung stehen wird.

nitidulus F. Fogarasch (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rorszék, Schulergebirge, Ober-Kerz (Glashütte, c. a.).

dispar Payk. Hermannstadt, Präße, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Resinar, Götzenberg (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagelbirge (c. a.); Detunata (Mallász).

bipustulatus F. Hátzeg, Gross-Scheuern, Götzenberg, Porcest, Surul, Kerzer Gebirge, Hosszufalu, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagel., Rotenturm, Malomviz, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

politus Hellw. Hátzeg, S.-Regen, Does (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Marosujvár (c. a.); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

parvulus Payk. Schielthal, Zibinsgebirge (Bielz); Götzenberg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Zernest (Deubel).

(Anomophagus.)

cribratus Gyll. Zibinsgebirge, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Buesses (alpin, in der Nähe von Krummholz aus Grasbüscheln gesiebt, Deubel).

(Cyanostolus.)

aeneus Richter. Hermannstadt (j. W., Bielz).

XXVIII. Cucujidae.

Monotomini.

436. *Monotoma Herbst.*

(Gyrocecis.)

quadrioveolata Aub. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz).

conicicollis Guer. Kronstadt (Deubel); Klausenburg (bei formica rufa, Müller).

angusticollis Gyll. Schässburg (in den Nestern der formica rufa und pratensis, c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Monotoma s. str.)

spenicollis Aub. Hátzeg (Bielz).

picipes Herbst. Hátzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Arpascher Gebirge, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

var. **cavicular** Reitter. Baassen (c. a., auf Salzboden).

quadridentata Thoms. (brevicollis Aub.) Schässburg (c. a., Fuchsloch an Holzspänen); Kronstadt (Deubel).

bicolor Villa (quadricollis Aub.). Hátzeg (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Várhegy (Deubel).

longicollis Gyll. Hermannstadt (Bielz); Rodnagelbirge (alpin, 1 Exemplar aus Grosbüscheln gesiebt, Deubel).

Silvanini.

437. *Silvanus Latreille.*

(Orizaephilus.)

surinamensis L. Hermannstadt (Bielz); Bistritz (c. a., in einem Hause mit Kornspeichern auf dem Aufboden in ungeheurer Menge).

(Silvanus i. sp.)

bidentatus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a., unter Eichenrinde).

unidentatus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, unter Baumrinden.

fagi Guer. Schässburg (Fuchsloch, gesiebt, März 1898, c. a.).

438. *Chatartus Reiche.*

advena Waitl. Várhegy (Deubel).

Psammoecini.

439. *Psammoeceus Latreille.*

bipunctatus F. Kronstadt (Gespreng, von Sumpfpflanzen geköschert oder gesiebt, Deubel).

var. **Boudieri** Luc. Schässburg (Mündung des Schustergrabens in die Kokel aus Blättern gesiebt, c. a.); Kronstadt (mit der Stammform, Deubel).

Uleiotini.

440. *Uleiota Latreille.*

(Hylliota Reitter, Hyleota Seidl.)

planata L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, unter Baumrinde.

441. *Dendrophagus Schönherr.*

crenatus Payk. Hátzeg (Malomviz), Kronstadt (Bielz); Bistra (unter Fichtenrinde, selten, c. a.); Schulergebirge (Deubel).

Cucujini.

442. *Cucujus Fabr.*

cinnaberinus Scop. (sanguinolentus L.). Schässburg (Hattergraben, April, unter Eichenrinde), Borszék, Rodnagelbirge (Bielz); Nussbach (10. Mai), Tusnád (11. September, unter Birken- oder Espenrinde, Deubel); Ratosnya (Müll.).

haematodes Er. Tusnád (Bielz, Deubel, unter Fichtenrinde); Schulergeb. (Juni, Deubel).

443. *Pediaceus Shuckard.*

depressus Herbst. Fogarasch (Bielz); Schässburg (Bielz, im Holze alter Eichen, c. a.); Hätzeg (c. a.); Klausenburg (Müller).

dermestoides F. Gross-Scheuern. Neudorf b. H., Holzmengen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.); Götzenberg (Ormay); Nussbach (Deubel).

fuscus Er. Hermannstadt (Bielz).

444. *Phloeostichus Redtenbacher.*

denicollis Redt. Kerzer Gebirge (Bielz).

Laemophloeini.

445. *Laemophloeus Stephens.*

(Leptus.)

monilis F. (denticulatus, Preysl.). Gross-Schenk (Bielz); Kronstadt (Zinne). Szováta, Schässburg (unter Buchenrinde und an trockenen Buchenästen, c. a.).

testaceus F. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Gyógy (Ormay); Schässburg (unter Weiden- und Eichenrinde), Rotenturm (c. a.).

(Cryptolestes.)

bimaculatus Payk. Holzmengen (Bielz).

duplicatus Walll. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg (unter Eichenrinde, Bielz); Nussbach, Honigberg (Deubel).

minutus Oliv. (pusillus Schönh.). Hermannstadt (Bielz).

ferrugineus Steph. Kronstadt (Noa, Deubel).

ater Oliv. Gross-Scheuern, Präsbe, S.-Regen (Bielz).

clematidis Er. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Talmesch (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); S.-Regen (Müller).

corticinus Er. Hermannstadt (Bielz).

Passandriini.

446. *Prostomis Latreille.*

mandibularis F. Hermannstadt, Kastenholz b. H. (Bielz); Schässburg (Langheltgraben, in mullig zerfallenden Eichenstämmen im Mai in grosser Anzahl samt den weissen, zarten, flachen Larven, c. a.).

XXIX. Cryptophagidae.

Telmatophilini.

447. *Telmatophilus Heer.*

sparganii Ahrens. Kronstadt (Gespreng, von Schilf gekötschert, Deubel).

caricis Oliv. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Kokelufer gekötschert, Mai, c. a.); Kronstadt, Honigberg (Deubel).

brevicollis Aubé. Hätzeg (Bielz).

typhae Fall. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **pumilus** Reitter. Zusammen mit der Stammform.

Schönherri Gyll. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

Cryptophagini.

448. *Paramecosoma Curtis.*

melanocephalum Herbst. Hermannstadt, Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (Kokelufer im Geniste häufig, c. a.); Kronstadt, Vargastal (Deubel).

449. *Henoticus Thomson.*

serratus Gyll. Zood, Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge, Nagygyűmäs, Kronstadt (Deubel).

450. *Pteringium Reitter.*

crenatum Gyll. Bistra (wahrscheinlich unter Fichtenrinde, c. a.); Bodzaer Gebirge, Schulergebirge (Deubel).

451. *Micrambe Thomson.*

vini Panz. Hermannstadt, Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (Fuchslotch unter Weissbuchenrinde, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

abietis Payk. Zibinsgebirge (Bielz); Borszék, Balánbánya (Egyeskö, c. a.).

452. *Cryptophagus Herbst.*

Die Arten führen sehr verschiedene Lebensweise in und auf pflanzlichen und tierischen Stoffen. einige leben in Ameisenkolonien und Wespen-nestern.

(Micrambinus.)

bimaculatus Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Cryptophagus i. sp.)

pubescens Strm. (lapponicus Reitter). Hammersdorf (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Gespreng), Wolkendorf bei Kr. (Deubel).

C. lapponicus Gyll. ist eine gute Art und nicht Synonym des C. pubescens; er gehört dem Norden Europas an und kommt bei uns wohl nicht vor.

subdepressus Gyll. Topánfalva (siebenb. Erzgebirge, c. a.).

scanicus L. Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen (Bielz); Malomviz, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Rodnagelb., Bodzaer Gebirge (Deubel).

a. **patruelis** Strm. Schässburg (Fuchsloch, Gross-Alischer Kuppen von Gesträuch geklopft, c. a.).

Thomsoni Reitter. Baassen, Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

cylindrus Kiesenw. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

saginitus Strm. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (in alten Eichen bei *Lasius brunneus*, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

subfumatus Kr. Torockó, Schässburg (in Eichenmulm, c. a.).

dentatus Herbst. Kerzer Gebirge, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Ratosnya, Schässburg (in Eichenmulm), Bistra (c. a.); Hermannstadt (auf blühendem *Crataegus* und an Weinfässern, Ormay); Rodnagelb., Kronstadt (Deubel).

pallidus Strm. Kronstadt (Zinne), Büdös, Schässburg (c. a.); Bucsecs-Gebiet (Deubel).

inaequalis Reitter. Büdös (c. a.).

labilis Er. Hätzeg (Bielz); Rodnagelb., Schässburg (Fuchsloch, gekötschert, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

scutellatus Newm. Hermannstadt (Bielz); Ober-Komana (Méhely); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

pumilio Ganglb. Schässburg (Fuchsloch, 1 Exemplar gekötschert, c. a.).

dorsalis Sahlborn. Kronstadt (Bielz); Nagyhagymás (Deubel).

distinguendus Strm. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a., Holzkeller).

fumatus Marsh. Hätzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).

quercinus Kr. Büdös, Schässburg (c. a.); Rodnagelb., Bucsecs (Deubel).

hamatus Ganglb. Schässburg (in einer alten von *Lasius brunneus* bewohnten Eiche), Baassen (c. a.).

posticus Reitter. Bistra, Csukás (c. a., vidit Reitter).

C. posticus Reitter hat nach meinen Exemplaren die Grösse und Form des *C. reflexicollis* und die Färbung des *C. axillaris* Reitter, weicht von beiden ab durch hellere, rötlichgelbe Färbung und die Lage des Lateralzähnechens dicht hinter der Mitte der Halsschildseiten. In der Punktierung der Oberseite stimmt er ebenfalls mit meinem *C. axillaris* überein, ebenso in der Form des Halsschildes und der Flügeldecken. Der Halsschild meines *C. posticus* ist am Hinterrande deutlich breiter als lang. Seine gegenwärtige Stellung im Katalog ist nach meinen Exemplaren nicht richtig, er gehört unzweifelhaft, nach dem Vorgehen Ganglbauers, zwischen *C. axillaris* und *reflexicollis* als ein echter *Minionemus*. Reitter, dem ich das Exemplar vorlegte, teilte mir mit, dass er die Art nicht besitze, dass jedoch das vorliegende Stück *C. posticus* sein könne.

fuscicornis Strm. Hätzeg, Rotenturm, Schässburg (c. a.).

badius Strm. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg, Büdös (c. a.).

acutangulus Gyll. Hätzeg, Kerzer Gebirge (Bielz); Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

cellaris Scop. Hermannstadt, Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Schulergebirge, Alsó-Rákös (Deubel).

affinis Strm. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt, Nagyhagymás (Deubel).

Skalitzkyi Reitter. Schässburg (2 Exemplare in Lindenmulm, c. a.).

Milleri Reitt. Balánbánya (Egyeskő, c. a.); Rodnagelb., Kronstadt (Deubel).

pilosus Gyll. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

lycoerdi Herbst. Hätzeg (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, am Waldrande unter Laub, 28. Juli, c. a.).

setulosus Strm. Rotenturm (c. a.); Hermannstadt (Alter Berg, Ormay); Kronstadt (Deubel).

Schmidt Strm. Karlsburg, Alsó-Rákös, Schässburg (1 Exemplar im Hausgarten, 1 Exemplar im Reissel, c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Minionemus*.)

nifidulus Mill. Hermannstadt (Bielz); Baassen, Schässburg (Fuchsloch, von einer Hecke geklopft, Breite aus Eichenholz oder Mulm gesiebt, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel, Méhely).

axillaris Reitter. Kerzer Gebirge (Buleatal), Schässburg, Frecker Geb. (Serbota, c. a., vidit Reitter); Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

reflexicollis Reitter. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Malomviz (Lunka negru, c. a.); Rodnagelb. (Deubel); Götzenberg (Ormay).

Deubeli Ganglb. Bucsecs, Rotenturm, Schässburg, Büdös, Torockó, Borszék (c. a.); Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).

C. baldensis Er. den Bielz aus dem Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, aus Fogarash und Kronstadt, anführt, ist jedenfalls aus unserem Käferverzeichnis zu streichen, da diese Art den Pyrenäen und den italienischen Alpen (Monte Baldo) angehört. Bielz kannte die beiden von Ganglbauer erst 1897 beschriebenen neuen Arten *C. Deubeli* und *transsylvanicus* nicht. Nach Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa III, 695) Anmerkungen von *C. baldensis* bis jetzt nur vier Exemplare bekannt zu sein. Die Bielzischen Fundorte des *C. baldensis* gehören zu Deubeli und dem selteneren *transsylvanicus*.

transsylvanicus Ganglb. Schässburg (c. a.); Bucsecs (Deubel)

453. *Spaniophaeus* Reitter.

laticollis Mill. Surul (Bielz).

454. *Antherophagus Latreille.*

Die Arten dieser Gattung leben auf den Blüten niederer Pflanzen, ihre Larven in Hummelnestern.

nigricornis F. Schieltal, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Bistra, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne), Zernest (Deubel).

silaceus Herbst. Kronstadt (Bielz); Nagyenyed (c. a.); Schulergebirge ((Deubel)).

pallens Oliv. Zibinsgebirge, Zood, Kronstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.); Borszék (c. a.).

Atomariini.

455. *Caenoscelis Thomson.*

ferruginea Sahlb. Präße, Fogarasch (Bielz); Schässburg (Scherkes, c. a.).

Fleischeri Reitt. Hätzeger Gebirge (subalpin, Deubel).

456. *Grobenia Holdhaus.*

finetarii Herbst. Schässburg (NE-Abhang der Breite, gesiebt, 13. April, c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).

457. *Atomaria Stephens.*

Die Arten leben unter verwesenden Pflanzenstoffen.

(*Atomaria* s. str.)

Wollastoni Sharp. Karlsburg (Bielz).

carpathica Reitter. Csukás (c. a.).

umbrina Gyll. Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

acutifrons Ganglb. Schässburg (Schleifengraben, Juli, c. a.).

bella Reitt. Búdös (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

nigriventris Steph. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Hätzeg, Kronstadt (Deubel); Unter-Kerz, Előpatak, Schässburg (c. a.).

linearis Steph. Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Bielz).

diluta Er. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Atels-hill, an feuchten Stellen unter Laub, c. a.).

alpina Heer. (*elongatula* Er.). Gross-Scheuern (Bielz); Balánbánya (Egyeskő), Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schulergebirge, Zernest (Deubel).

procerula Er. Kerzer Gebirge (Bielz).

prolixa Er. Schässburg, Búdös (c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Zinne, Deubel).

pulchra Er. Búdös (c. a.); Hätzeg, Kronstadt, Bucsecsgebiet (Deubel).

impressa Er. Schässburg (Türkenhill, Kokelufer oder Röhricht an sumpfiger Stelle, 24. Oktober, c. a.).

fuscicollis Mannh. Hermannstadt, Talmesch, Baumgarten (Ormay); Präz-

már, Obervenezie (Méhely); Maros-ujvár, Schässburg (c. a.); Rodnageb., Kronstadt (Deubel).

munda Er. Kronstadt (Deubel).

unifasciatus Er. Rotenturm (Altufer unter Steinen, nicht selten, c. a.).

grandicollis Bris. Rodnagebirge (Deubel).

mesomelaena Herbst. Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).

gutta Steph. Gross-Scheuern (Bielz).

gravidula Er. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (Kokelufer im Geniste, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

fusca Schönh. Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (c. a.); Hätzeg, Kronstadt, Zernest, Rodnagebirge (Deubel).

atricapilla Steph. Kronstadt (Zinne), Schulergebirge, Rodnagebirge (Deubel).

Zetterstedti Zett. Baróth (Méhely); Honigberg (Altufer, Deubel).

peltata Kr. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Siechhofberg, c. a.); Honigberg (Altufer, Deubel).

fuscipes Gyll. Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pusilla Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kastenholz, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Alsó-Rákos, Hätzeg (c. a.); Gyógy (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).

nigripennis Payk. Repts (Bielz)

Afila Reitter. Rotenturm (c. a.).

turgida Er. Hätzeg, Vargyastal, Honigberg, Erösd (Altufer), Rodnageb. (Deubel).

apicalis Er. Hammersdorf, Grossscheuern, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Marosujvár, Rotenturm (c. a.).

ruficornis Marsh. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

analis Er. (*testacea* Bielz nec Steph.). Hermannstadt (Bielz); Baumgarten, Talmesch (Ormay); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

Deubeli Holdhaus. Rodnagebirge (Kuhhorn, alpin aus Grashüscheln gesiebt, Deubel).

cognata Er. Schässburg (c. a.).

var. **rubida** Reitter. Schässburg (c. a.).

var. **formosa** Reitter. Rotenturm (c. a.).

gibbula Er. Gross-Scheuern, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **mehadiensis** Ganglb. Hätzeg (Deubel).

458. *Ootypus Ganglbauer.*

globosus Walld. (*nigriclavus* Reitter). Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Schässburg (Kokelufer, c. a.).

459. *Ephistemus Stephens.*

(Ephistemus s. str.)

globulus Payk. Kronstadt (Bielz); Malomviz, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rodnagelbirge (alpin, Deubel).
 var. **dimidiatus** Sturm. Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

(Curelius.)

exiguus Er. Hermannstadt (Bielz).XXX. *Erotylidae.*460. *Tritoma Fabr.*

(Cyrtotriplax Crotch.)

bipustulata F. Hätzeg, Götzenberg, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Marosgeb., Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (an verpilzten Eichenstumpfen, c. a.); Resinar (Ormay).

461. *Triplax Paykall.*

Die Arten leben auf Baumpilzen.

aenea Schall. Durch das ganze Gebiet verbreitet.**elongata** Lac. Schässburg (Witeberg, c. a.).

russica L. Hätzeg, Retjezat, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Csukás (c. a.); Rotenturm (Deubel).

pygmaea Kr. Schässburg (Kokelufer im Deutritus, c. a.).

(Platychna.)

scutellaris Charp. Bistra, Rotenturm, Csukás, Zalatna (c. a.); Kronstadt (Deubel); Marosgebirge (Müller).

var. **Gyllenhali** Crotch (bicolor Gyll.). Retjezat, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Piatra mare, Bozauer Pass, Marosgebirge (Bielz).

carpathica Reitter. Csukás (zusammen mit *T. scutellaris* auf Baumpilzen, 1 Ex, c. a.).

lepidula Fabl. Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hätzeg, Rosenau (Deubel).

rufipes F. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm (Ormay, Deubel, c. a.); Marosgebirge (Müller).

collaris Schall. Rotenturm (c. a.).

Daenini.

462. *Daene Latreille.*

Die Arten leben wie die vorigen.

notata Gmel. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Csukás (c. a.); Honigberg (Deubel).

rufilabris F. Rotenturm, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Kronstadt, Csukás (c. a.).

bipustulata Thunberg. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

463. *Combocerus Bedel.*

glaber Schall. Hätzeg, Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Stolzenburg, Hermannstadt (Ormay); M.-Vasárhely (Müller).

Diphyllini.

464. *Diphyllus Stephens.*

lunatus F. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt, Hätzeg (Deubel); Ober-Komana (unter Rotbuchenrinde, Méhely).

465. *Diplocoelus Guérin.*

fagi Chev. Kronstadt (Zinne, Bielz, Deubel, c. a.); Rotenturm (Ormay); Szováta, Schässburg (c. a.).

XXXI. *Phalacridae.*466. *Phalacrus Paykull.*

grossus Er. Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).

hybridus Flach. Siebenbürgen.

limbatus F. (corruscus Panz.). Hätzeg, Círeksau, Marpod, Reps, Balánbánya, S.-Regen, Záh (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Kronstadt, Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.).

var. **Humberti** Rye. Kronstadt (Zinne, Méhely).

caricis Sturm. Szamosujvár (Méhely); Honigberg (Altuf, Deubel).

467. *Olibrus Erichs.***aeneus** F. Kronstadt (Zinne, Méhely).

mitellifolii Payk. Neudorf b. H., Mediasch (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Borszék (c. a.).

corticis Panz. Frecker Gebirge (Leitatal bei der Sägemühle in Sägespänen, Schässburg (Fuchsloch, c. a.).

Gerhardtii Flach. Zalatna, Schässburg (Breite, auf Senecio (c. a.).

aeneus Küst. Szamosujvár (Méhely); Schulergebirge (Deubel).

Das Vorkommen dieser Art bei uns ist näher zu prüfen, da sie dem westlichen Europa angehört.

bisignatus Men. Déva, Karlsburg (c. a.).
flavicornis Sturm. Hermannstadt (Ormay); Hätzeg (c. a.).

liquidus Er. Hätzeg (Bielz); Rotenturm, Hermannstadt (J. W., c. a.).

affinis Sturm. Mühlbach, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Záh (Bielz); Gyógy (Ormay); Schässburg, Ober-Kerz (Glaslütte), Retjezat (c. a.); Hätzeg, Rosenau, Törzburg (Deubel).

- bicolor** F. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Zood, Schässburg, Repts, Előpatak, S.-Regen, Záh (Bielz); Rotenturm, Hammersdorf, Klausenburg, Alsó-Rákös, Borszék, Ratosnya (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- bimaculatus** Küst. Repts, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

468. *Stilbus* Seidlitz.

- testaceus** Panz. Neudorf b. H., Holzmen-gen, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Déva (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- atomarius** L. Marpod (Bielz); Prázsmár, Szamosujvár (Móhely); Schässburg, Balánbánya (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. **picatus** Flach. Kronstadt (Deubel).
- oblongus** Er. Hermannstadt, Baumgarten (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XXXII. Latridiidae.

Dasycerini.

469. *Dasycerus* Brongniart.

- sulcatus** Brongn. Klausenburg (Bielz).

Lathridiini.

470. *Lathridius* Herbst.

Die Arten leben in verwesenden organischen Stoffen, in Pilzen, unter Baumrinden etc.

- lardarius** Dey. Schanta (Ormay).
- angusticollis** Gyll. (angulatus Mannh.). Retjezat, Fogarasch (Bielz); Unter-Kerz, Zalatna, Baassen, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rodnagelbirge, Kronstadt, Zernest (Deubel).
- Pandellei** Bris. Balánbánya (auf frisch gesägten Fichtenbrettern), Oláhfalú (c. a.).
- campicola** Gerhardt, d. ent. Z. 1911. 283. Schässburg (c. a.).
- alternans** Mannh. Porcest, Surul (Bielz); Büdös, Csukás, Rotenturm (c. a.).
- rugicollis** Oliv. Hermannstadt, Neudorf b. H., Girelsau (Bielz); Oláhfalú (c. a.); Rodnagelbirge, Bucsecs, Schulergebirge (Deubel).

471. *Enicmus* Thomson.

Die Arten leben wie die vorigen. (Conithassa.)

- hirtus** Gyll. Präsbe, Freck, Kerzer Geb., Schässburg (Bielz); Rodnagelbirge, Büdös, Előpatak, Csukás, Malomviz (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- minutus** L. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Harbachufer, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz,

Előpatak, Balánbánya, Baassen (c. a.); Rotenturm, Szamosujvár (Ormay); Rodnagelbirge, Kronstadt, Zernest (Deubel).

- consimilis** Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Rotenturm, Zood (Ormay); Rosenau (Bucsecs-Gebiet, Deubel).

brevicollis Thoms. Kerzer Gebirge (Bielz). (Enicmus i. sp.)

testaceus Steph. Kronstadt (Deubel).

rugosus Herbst. Hátszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Előpatak, Rodnagelbirge (c. a.).

transversus Oliv. Hátszeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Balánbánya, Schässburg, Rodnagelbirge, Zalatna, Puj (b. Hátszeg, c. a.); Michelsberg, Rotenturm (Ormay).

brevicornis Mannh. Kronstadt (Zinne, Deubel).

472. *Cartodere* Thomson.

Die Arten leben wie die vorigen, zuweilen auch in Ameisennestern.

elongata Curtis. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Karlsburg, Előpatak, Baassen (c. a.); Hátszeg, Alsó-Rákös (Tepe, Deubel).

ruficollis Marsh. Hermannstadt (Bielz).

filiformis Gyll. Hátszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Corticarini.

473. *Corticaria* Marsham.

Die Arten leben wie die vorigen, auch unter Laub.

(Brevina.)

sylvicola Bris. Kronstadt (Bielz).

Der Catalogus col. Europae 1906 weist die Art nur aus den Pyrenäen nach, Bielz's Angabe bedarf daher der Bestätigung. (Corticaria i. sp.)

pubescens Gyll. Retjezat, Hátszeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Kokel unter Geniste), Unter-Kerz (Altufer, ebenso, c. a.); Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagelbirge (Deubel).

fulva Com. Kronstadt, Érösd (Altfluss), Zaizon (Deubel).

umbilicata Beck. Schässburg (Fuchsloch), Alsó-Rákös (Tepe, c. a.); Kronstadt (Deubel).

impressa Oliv. (denticulata Gyll., badia Mannh.). Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schanta, Rotenturm (Ormay); Schässburg (Fuchsloch, c. a.).

abietum Motsch. (interstitialis Reitter). Balánbánya, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay); Paringul, Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).

- robusta** Ganglb. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Deubel).
linearis Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagebirge, Deubel).
Eppelsheimi Reitter. Frecker Geb. (Serbota, c. a.).
foveola Beck. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).
longicollis Zett. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Elöpatak, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.); Rotenturm, Präbe (Ormay); Kronstadt (Deubel).
serrata Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Schässburg, S.-Regen (Bielz); Zalatna, Balánbánya (c. a.); Hätzeg (Deubel).
saginata Mannh. Baassen (c. a.); Schulergebirge, Erösd (Altfluss, Deubel).
obscura Bris. Schässburg (Reissel, c. a., 1 Ex.).
Pietschi Ganglb. Schässburg (Mühlenham, 1 Ex. im Fluge gefangen, c. a.).
elongata Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Hätzeg, Karlsburg, Elöpatak, Schässburg (in alten Eichen bei Lasius brunneus, c. a.); Kleinpold (Ormay); Kronstadt (Deubel).
terruginea Marsh. (fenestralis Reitter). Kerzer Gebirge (Bielz); Elöpatak, Frecker Gebirge (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

474. *Melanophthalma Motschulsky.*

- transversalis** Gyll. (crocata Mannh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel); Bistritz (Müller).
var. sericea Mannh. (albopilis Reitter). Gyke (Méhely); Kronstadt (Deubel).
distinguenda Com. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).
fuscipennis Mannh. Kerzer Gebirge (Bielz); Unter-Kerz, Schässburg (c. a.). (Corticarina.)
gibbosa Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland.
similata Gyll. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
fuscula Gyll. Hermannstadt, Kerzer Geb., S.-Regen (Bielz); Gross-Scheuern, Hammersdorf (Ormay); Unter-Kerz (c. a.); Rodnagebirge, Nagybagymás (Deubel).
var. trifoveolata Redt. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
fulvipes Com. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Scherkes, c. a.).

truncatella Mannh. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Kokeluf, im Geniste, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Holoparamecini.

475. *Holoparamecus Curtis.*

caularum Aub. Hermannstadt (Bielz); Unter-Kerz (wahrscheinlich am Klosterweiher aus Grasbüscheln geseiht, c. a.).

XXXIII. Mycetophagidae.

Mycetophagini.

476. *Pseudotriphyllus Reitter.*

suluralis F. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

477. *Triphyllus Latreille.*

bicolor F. (punctatus F.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Kleinpold, Gyögy (Ormay); Büldös, Schässburg (Baumpilze), Hätzeg, Elöpatak, Baassen (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).

478. *Mycetophagus Helwig.*

Die Arten leben auf Baumpilzen, oft trifft man sie unter Baumrinde.

(Tritoma Müll. Reitter.)

quadripustulatus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

- a. antemacularis** Torre (bipustulatus Schilsky). Tuszád, Kukuklegy (Erdővidék, Méhely); Fogarascher Gebirge, Csukás, Schässburg, Szurdokpass (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
var. erythrocephalus Er. (impustulatus Schilsky). Sósmező (Méhely); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Bistritz, S.-Regen (Müller).
piecus F. Präzsmár (Méhely); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).
a. sexpustulatus F. Schässburg, Kronstadt (Zinne, Deubel).
a. lunaris F. Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).
a. undulatus Marsh. Honigberg (Deubel).
a. punctulatus Schilsky. Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).
a. humeralis Schilsky. Honigb. (Deubel).
decempunctatus F. Hätzeg, Zibins-Gebirge, Fogarasch, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
atomarius F. Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Unter-Kerz, Bükszád, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Csukás, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Präbe (Ormay); Kronstadt (Deubel).

quadriguttatus Müll. Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

multipunctatus F. Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Präsbe (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).

fulvicollis F. Hermannstadt, Präsbe, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schässburg (c. a., Eiche); Rosenau (Deubel).

var. **Deubeli** Méhely. Kronstadt (Méhely). (Philomyces.)

populi F. Hermannstadt, Präsbe, Sächs.-Regen (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

479. *Litargus Erichs.*

connexus Geoffr. (bifasciatus F.). Hätzeg, Gross-Scheuern, Holzmengen, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Präsbe (Ormay); Alsó-Rákos, Büdös, Schässburg, Klausenburg (c. a., unter Baumrinde, namentlich Espen- und Weidenrinde); Rosenau, Kronstadt (Deubel).

480. *Typhaea Curtis.*

stercorea L. (fumata L.). Klein-Cserged (b. Blasendorf), Neudorf b. H., Gross-Schenk, *Mediasch, S.-Regen (Bielz); Baumgarten, Michelsberg, Rotenturm (Ormay); Klausenburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

XXXIV. Sphindidae.

481. *Sphindus Chevrolat.*

dubius Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Előpatak, Schässburg (c. a.).

grundis Hämpe. Klausenburg (Bielz).

482. *Aspidiphorus Latreille.*

orbiculatus Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Csukás, Schässburg (c. a., auf Pilzen); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Von der Beschreibung Kiesenwetters (Naturg. d. Ins. Deutschlands, Anobiidae. p. 200) weicht unsere Art durch unpunktierten Kopf und durch die Fühlerbildung ab, indem das erste Glied der Fühlerkeule deutlich länger als breit, das zweite mindestens so lang als breit ist.

XXXV. Cisidae.

483. *Hendecatomus Muls.*

reticulatus Hbst. Kronstadt (Deubel).

484. *Xylographus Mellié.*

bostrichoides Dufour. Alsó-Rákos (Tepe, Mai, c. a., Deubel).

485. *Cis Latreille.*

Die Arten leben in Baumschwämmen. (Hadræule.)

striatulus Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.).

comptus Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Rosenau (Deubel).

(Eridaulus.)

lineatocribratus Mell. Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

nitidus Hbst. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Frecker Gebirge (Serbota), Alsó-Rákos, Rodnagebirge (c. a.); Tusnád, Bucsecs-Gebiet (Deubel).

Jacquemarti Mell. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos, Balánbánya (c. a.); Schuler-Gebirge (Deubel).

var. **glabratus** Mell. Kerzer Geb. (Bielz); Rodna-Gebirge, Alsó-Rákos (c. a.); Schulergebirge (Deubel); Marosgebirge (Müller).

(Cis i. sp.)

boleti Scop. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **caucasicus** Men. Hätzeg, Schässburg (c. a.).

setiger Mell. (villosulus aut nec Marsh.). Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Rodnagebirge (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

micans F. Hätzeg, Götzenberg, Ober-Sebes, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.).

hispidus Gyll. Hätzeg, Zibinsgeb., Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Resinar (Ormay).

quadrifidus Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Zalatna (c. a.).

fissicollis Mell. Kronstadt (Bielz).

Perrisi Abeille. Schässburg, Malomviz (c. a.).

alni Gyll. Neudorf b. H., Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt, Büdös (c. a.); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

bidentatus Oliv. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge, Schässburg, Balánbánya (c. a.); Resinar (Ormay).

festivus Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Hätzeg, Neustadt b. Kr. (Deubel).

oblongus Mell. (pygmaeus aut.). Kronstadt (Bielz).

vestitus Mell. Kerzer Gebirge (Bielz).

castaneus Mell. Hätzeg, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Előpatak (c. a.); Hermannstadt (Ormay).
punctulatus Gyll. Schulergebirge (Deubel).
fissicornis Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Baassen, Hätzeg (c. a.); Wolken Dorf b. Kr. (Deubel).

486. *Rhopalodontus Mellié.*

Rh. valachiae Reitter, den Bielz anführt, ist nach Seidlitz (Fauna transs. p. 530) unaufgeklärter nomen in litteris (Sammlungsnamen).
fronticornis Panz. Hätzeg, Grossscheuern, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Balánbánya (c. a.); Resinar (Ormay); Kronstadt, Nussbach (Deubel).
perforatus Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Nussbach (Deubel).

487. *Emnearthron Mellié.*

Wagae Mell. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).
affine Gyll. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Bodnagebirge (c. a.); Rotenturm (Ormay).
cornutum Gyll. Gross-Scheuern, Ober-Sebes, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Marosgeb. (Müll.).
laricinum Mell. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

488. *Octotemnus Mellié.*

glabriculus Gyll. Hätzeg, Zibinsgebirge, Ober-Sebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Retjezat, Ober-Kerz (Glashütte), Karlsburg, Schässburg (c. a.).
 (Orophilus.)
mandibularis Gyll. Zibius-Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Götzenberg (Ormay).

XXXVI. *Colydiidae.*

Die Arten sind Holz- und Rindentiere.

Colydiini.

489. *Colidium Fabr.*

elongatum F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
filiforme F. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

Aglenini.

490. *Aglenus Erichs.*

brunneus Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H. (Bielz).

Ditomni.

491. *Ditoma Herbst.*

(Synchitodes Crotch.)

crenata F. Durch das ganze Gebiet verbreitet unter Baumrinde.

492. *Colobicus Latreille.*

marginatus Latr. (emarginatus Er.). Gross-Scheuern, Rotenturm, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Nussbach, Honigberg (Deubel).

493. *Synchita Helwig.*

(Ditoma Crotch. Reitter.)

humeralis F. (juglandis F.). Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Burg, im Fluge gefangen, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

494. *Cicones Curtis.*

variegatus Hellw. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).
pictus Er. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (von Hecken geklopft), Búdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

495. *Endophloeus Erichs.*

Markovichiana Pill. (spinulosus Latr.). Präsbe, Fogarascher Gebirge (Bielz); Rotenturm (aus einem verpilzten Rotbuchenstamm, c. a.).

Orthocerini.

496. *Orthocerus Latreille.*

clavicornis L. (muticus L.). Präsbe (Bielz); Borszék, Schässburg (Breite, unter Moos, c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

Corticini.

497. *Corticus Latreille.*

tauricus Germ. Kerzer Gebirge (Bielz);
tuberculatus Germ. In allen Gebirgswäldern unter Baum-, namentlich unter Tannensrinde, aber auch im Bergland, so in Schässburg unter Eichen- und Buchensrinde.

Apistini.

498. *Apistus Motsch.*

Rondanii Villa. Hätzeg (Paros, Bielz)

Coxellini.

499. *Diodesma Latreille.*

subterranea Duponch. Zibinsgeb. (Bielz).

Tarphlini.**500. Laugelania Aubé.**

anophthalma Aub. Gross-Scheuern (Bielz).

Pycnomerini.**501. Dechomus Duval.**

sulcicollis Germ. Ober-Sebes, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Schässburg (im Holz und unter der Rinde alter Eichen und Eichenstümpfe).

502. Pycnomerus Erichs.

lerebrans Ol. Hermannstadt, Holzmengen, S-Regen (Bielz); Honigberg, Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

Myrmecoxenini.**503. Myrmecoxenus Chevrolat.**

subterraneus Chevr. Schässburg (Kronberg, im Neste der *Formica pratensis*, c. a.); Kronstadt (Deubel).
vaporiorum Guer. Kronstadt (Bielz).

Deubel bezweifelt das Vorkommen dieser dem Süden Europa's angehörigen Art in Kronstadt, wo er nur den *M. subterraneus* sammelte.

Deretaphrini.**504. Oxylaemus Erichs.**

cylindricus Panz. Dobra, Hermannstadt (Bielz); Hätzeg (c. a.); Zernest, Honigberg (Deubel).

505. Teredus Shuckard.

opacus Hahelm. Zibinsgebirge (Bielz).

Anommadini.**506. Anommatus Wesmael.**

12-striatus Müll. Dobra, Gross-Scheuern, Neudorf b. H. (Bielz).

Bothriderini.**507. Bothrideres Erichs.**

contractus F. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Dees, Záh, Schässburg (unter Weidenrinde, Bielz).

Cerylonini.**508. Cerylon Latreille.**

Die Arten leben unter Baumrinde.

evanescens Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

fagi Bris. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Csukás,

Előpatak, Baassen, Schässburg, Bor-szék, Rodnagelbirge (c. a.); Gölsen-berg (Ormay); Alsó-Rákos, Kronstadt (Deubel).

histeroides F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

ferrugineum Steph. Reljezat, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Rotenturm, Präszaka (Zalatna, c. a.); Zood (Ormay); Zernest (Deubel).

impresum Er. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

deplanatum Gyll. Hätzeg, Porcesest, Kerzer Gebirge, Tartlau, S-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte), Rotenturm, Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.); Tusnád (Deubel).

XXXVII. Endomychidae.**Sphaerosominae.****509. Sphaerosoma Leach.**

(Alexia Steph.)

Die Arten werden aus Moos und Grashüscheln gesiebt.

glabrum Reitter. Hammersdorf, Kerzer Gebirge (Ormay); Kronstadt (Deubel).

globosum Strm. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. *rubrum*. Rotenturm (c. a.).

Im Rotenturm sammelte ich in grosser Anzahl eine etwas kleinere, stets rötlichgelbe, also ausgefärbte Form von mehr rundlicher, aber weniger hochgewölbter Form, die ich als lokale Abänderung bezeichne mit dem Namen *rubrum*. Aus unserem Verzeichnis sind wohl zu streichen: *Sph. pubescens* Friv. die im Schielthal pilifera, die in Hermannstadt, und pilosissima, die in Kronstadt vorkommen soll.

punctatum Reitter. Frecker Gebirge (Serbota, 1 Ex., c. a.).

laevicollis Reitter. Negoi (Deubel); Paringul, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

carpathicum Reitter. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Bistra, Búdös, Torockó, Topánfalva, Schulergebirge (c. a.); Bucsecs, Nagyhagy-más (Deubel).

pilosum Panz. Kerzer Geb., Kronstadt (?) (Bielz); Zalatna (c. a.).

Reitteri Ormay. Frecker Gebirge, Kronstadt, Schässburg, Rodnagelbirge, Rotenturm, Búdös (c. a.).

Mycetaeinae.**Mycetaeini.****510. Clemmus Hampe.**

troglodytes Hampe. Hermannstadt (Bielz).

511. *Symblotes Redtenbacher.*

gibberosus Luc. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (im Holze alter, von *Lasius brunneus* bewohnter Eichen, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

512. *Mycetaea Stephens.*

hirta Marsh. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Leiestini.

513. *Leiestes Redtenbacher.*

seminigra Gyll. Gross-Scheuern, Präshe, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.).

Trochoideinae.

514. *Pleganophorus Hampe.*

bispinosus Hampe. Hermannstadt (j. W. an alten, von *Lasius brunneus* bewohnten Eichen).

Endomychinae.

Dapsini.

515. *Dapsa Latreille.*

denticolis Germ. Hermannstadt, Hammersdorf, Heltau, Michelsberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Baassen, Schässburg, Hätzeg (unter Laub und verwesenden Pflanzenstoffen, c. a.); Bistritz (Deubel); Görgény - Szt. - Imre (Müller).

516. *Lycoperdina Latreille.*

bovistae F. Hermannstadt (Bielz). (Golgia.)

succinea L. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Hammersdorf, Poresest, Reys, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Rotenturm, Zalatna (in kleinen Bo-visten auf Hutweiden, c. a.).

var. *disca* Gerst. Schässburg, Karlsburg (c. a.).

crassicornis Reitter. Ober-Kerz (Reitter).

517. *Mycetina Mulsant.*

cruciata Schall. Retjezat, Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Tömöcher Pass, Rotenturm, Schässburg (Bielz); Hätzeg (Deubel); Szurdokpass (c. a.).

a. *calabra* Costa. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Bucsecs, Balánbánya, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. *Fussi* Csiki. Ober-Kerz (Glashütte, c. a.); Hätzeg (Deubel).

Bei der Farbenänderung *Fussi* Csiki sind die Flügeldecken einfarbig gelb, nur ein blauer Schattenfleck zu beiden Seiten in der Mitte derselben deutet die Seitenflecken der a. *calabra* an, die Naht ist schmal gebräunt, ebenso die blaue Querfurche des Halsschildes; im übrigen kann die en Farbenänderungen nicht der Rang der Subspecies (Varietät) zuerkannt werden.

Endomychini.

518. *Endomychus Panzer.*

coccineus L. Zibinsgebirge, Götzenberg, Präshe, Holzungen, Poresest, Ober-Sebes, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Csukás, Bükszád, Előpatak, Malomviz, Borszék (c. a., unter Baumrinden, wie der folgende).

a. *Biehli* Reitter. Siebenbürgen.

thoracicus Charp. Retjezat, Hätzeger Geb., Zibinsgebirge, Götzenberg, Präshe, Fogarascher Gebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Bucsecs, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass, Marosgebirge (Bielz); Rotenturm, Balánbánya, Bistra, Karlsburg, Paringul, Alsó-Rákos, Szurdok-Pass, Tereczkő, Előpatak, Zalatna, Malomviz (c. a.).

XXXVIII. Coccinellidae.

Epilachninae.

519. *Subcoccinella Huber.*

24 - *punctata* L. Hätzeg, Hermannstadt, Holzungen, Reys, Héviz, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S. Regen, Dees, Gyeke (Bielz); Gyógy, Szamosujvár (Ormay); Tordaer Schlucht (c. a.).

var. *meridionalis* Motsch. Kronstadt (Bielz); Naszód, Tordaer Schlucht, Déva, Tereczkő, Topánfalva, Klausenburg, Schässburg (c. a.).

a. *4-notata* F. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. *limbata* Moll. (saponariae Muls.). Hätzeg (Deubel).

520. *Cyanegetis Redtenbacher.*

impunctata L. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Zood, Kronstadt, S. Regen (Bielz); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Hätzeg (Deubel); Szováta (auf Salzhoden zwischen Röhricht, 5. Juni, c. a.).

var. *palustris* Redt. Hätzeg.

Coccinellinae.

Hippodamini.

521. *Hippodamia Mulsant.*

fredecimpunctata L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Freck, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Gycke (Bielz); Schässburg (c. a.).

7-maculata Deg. Neudorf b. H., Girelsau, Kronstadt (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

522. *Adonia Mulsant.*

variegata Goeze. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Hosszufalu, Predaal, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gycke, Záh (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Annen-See (c. a.); Hätzeg (Deubel).

a. *constellata* Laich. Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

a. *neglecta* Wse. Dees, Kronstadt (c. a.); Bonc-Nyires, Mezö-Samsond (Méhely).

a. *carpini* Geoffr. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt, Bodzaer Gebirge (Deubel).

a. *5-maculata* F. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. *turcmenica* Zubk. (maculiger Wse.). Hermannstadt (Ormay).

a. *ustulata* Ws. Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. *corsica* Reiche (transsylvanica Pencke). Schulergebirge (Deubel).

523. *Anisosticta Duponchel.*

19-punctata L. Gross-Scheuern, Reps, Kronstadt, Dees, Gycke, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Szováta (auf Sumpfpflanzen, c. a.).

524. *Semiadalia Crotch.*

notata Laich. Neudorf b. H., Porcesest, Borszék (Bielz); Rodnagelbirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

11-notata Schneid. Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Borszék, Gycke, Záh (Bielz); Tordaer Schlucht, Reps (c. a.).

a. *cardui* Brahm. Bodzaer Geb. (alpin), Kronstadt (Deubel).

a. *9-punctata* Fourc. Baróth, Bonc-Nyires (Méhely); Bodzaer Gebirge (alpin), Kronstadt, Hätzeg (Deubel).

Coccinellini.

525. *Aphidecta Weise.*

obliterata L. (livida Deg.). Präse, Kronstadt (Bielz); Schulergebirge (c. a.); Schanta (Ormay).

a. *sexnotata* Thunb. Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

526. *Adalia Mulsant.*

conglomerata L.

a. *bothnica* Payk. Nagyhagymás, Schässburg (Deubel).

bipunctata L. (dispar Schneid.). Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Iléviz, Oláhfalú (Bielz); Stolzenburg, Kerzer Gebirge (Ormay); Hätzeg (Deubel).

a. *annulata* L. Kerzer Geb. (Ormay).

a. *pantherina* L. Kronstadt (Méhely).

a. *6-pustulata* L. Kronstadt, Hätzeg (Deubel).

a. *4-maculata* Scop. Oláhfalú, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

alpina Villa. Fogarascher Gebirge (Bielz); Rodnagelbirge, Schulergebirge (Deubel).

Revelierei Muls. Siebenbürgen.

527. *Coccinella Linné.*

7-punctata L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. *5-notata* Haw. Schulergebirge (Deubel).

5-punctata L. Schieltal, Gross-Scheuern, Talmesch, Marpod, Fogarasch, Nussbach, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Dees (Bielz); Schässburg, Tordaer Schlucht (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

distincta Fald.

a. *magnifica* Redtenb. Porcesest, Surul (Bielz); Kronstadt (c. a.).

a. *domiduca* Ws. Kronstadt (Méhely).

hieroglyphica L. Hermannstadt (Bielz).

a. *flexuosa* F. Schässburg (c. a.).

10-punctata L. Hätzeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Talmesch, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Oláhfalú (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

a. *pellucida* Ws. Karlsburg (c. a.).

a. *lutea* Rossi. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *subpunctata* Schrank. Kronstadt (Deubel).

a. *lateralis* Ws. Alsó-Rákos (c. a.).

a. *6-punctata* L. Hermannstadt (Ormay); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

a. *8-punctata* Müll. Schässburg (c. a.); Rodnagelbirge, Kronstadt (Deubel).

a. *centromaculata* Ws. Kronstadt (Deubel).

a. *humeralis* Schall. Hermannstadt, Schanta (Ormay); Schässburg (Mai, auf Himbeeren, c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *bella* Ws. Kronstadt (Deubel).

a. *bimaculata* Pont. (bipustulata Hbst.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *lateripunctata* Gradl. Kronstadt (Deubel).

- a. **10-pustulata** L. (guttatopunctata L.) Kronstadt (Tömös, Bielz. Mhely); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Hätzszeg (Deubel).
- 11-pustulata** L. Hätzszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Repts, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gycke, Záh (Bielz); Paringul, Balánbánya (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
- (Synharmonia.)
- conglobata** L. (18-punctata Scop.). Schässburg, Klausenburg (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- a. **gemella** Hbst. Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. **impustulata** L. Gross-Scheuern, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Birtihalm, Dees (Bielz).
- var. **caucasica** Motsch. (viridula Hampe). Siebenbürgen.
- (Harmonia.)
- 4-punctata** Pont. Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (auf Kiefern häufig, Deubel).
- a. **16-punctata** F. Kronstadt (Deubel).

528. *Micraspis Redtenbacher.*

- sedecimpunctata** L.
- a. **12-punctata** L. Hätzszeg, Grossscheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt (?), Mediasch, S.-Regen, Dees, Gycke, Záh, Nagyenyed (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Repts, Schässburg (c. a.).

529. *Misia Mulsant.*

- oblongoguttata** L. Surian, Präsbe, Talmesch, Fogarascher Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Rodna-Gebirge (auf Erlen, c. a.); Schulergebirge, Borszék (auf Fichte und Tanne, Deubel); Marosgebirge (Müller).

530. *Anatis Mulsant.*

- ocellata** L. Surul, Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Schulergebirge, Rodnagebirge (Deubel); Marosgebirge (Müller); Borszék (c. a.).

531. *Halictia Mulsant.*

- sedecimguttata** L. Hätzszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszafalu (Bielz); Heltau (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Karlsburg, Szováta (c. a.).

532. *Vibidia Mulsant.*

- 12-guttata** Poda. Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Ormay); Petrozsény, Malomvíz (c. a.); Hätzszeg (Deubel).

533. *Myrrha Mulsant.*

- 18-guttata** L. Kronstadt (Zinne, Deubel)

534. *Thea Mulsant.*

- 22-punctata** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
- a. **20-punctata** F. Kronstadt (Bielz); Hätzszeg, Vargyas (Deubel).
- a. **signifera** Ws. Schässburg (c. a.).

535. *Calvia Mulsant.*

- 10-guttata** L. Kronstadt, Tartlau (Bielz); Hermannstadt, Retjezat, Schässburg (c. a.).
- 15-guttata** F. Fogarasch, Kronstadt (?), Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Bistritz (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hätzszeg (Deubel).
- 14-guttata** L. Hätzszeg, Hermannstadt, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Gycke (Bielz). Alsó-Rákös (c. a.).

536. *Sospita Mulsant.*

- 20-guttata** L. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
- a. **tigrina** L. Fogarasch, Kronstadt, Dees (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).
- a. **Linnei** Ws. Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Alsó-Rákös (c. a.); Hätzszeg (Deubel).

537. *Propylaea Mulsant.*

- 14-punctata** L. Hätzszeg, Hermannstadt, Héviz, Nussbach, Kronstadt, Schässburg, Oláhfalú, Bistritz, Gycke, Záh (Bielz); Stolzenburg, Baumgarten, Kerzer Gebirge (Ormay).
- a. **tetragonata** Laich. Kronstadt (Deubel).
- a. **parumpunctata** Sajo. Kronstadt (Deubel).
- a. **suturalis** Ws. Kronstadt (Deubel).
- a. **biflexuosa** Ws. Hermannstadt (Ormay).
- a. **12-pustulata** Pont. Baróth, Kronstadt (Zinne), Mezőség (Gycke, Samsond, Mhely).
- a. **perlata** Ws. Kronstadt, Alsó-Rákös, Nagyagymás (Deubel).

Chilocorini.

538. *Chilocorus Leuch.*

- renipustulatus** Scriba (nec similis Rossi). Hätzszeg, Hermannstadt, Grossscheuern, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Borszék (c. a.).
- bipustulatus** L. Hätzszeg, Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Záh (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

539. *Exochomus Redtenbacher.*

4 - *pustulatus* L. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S. - Regen, Dees (Bielz); Stolzenburg, Resinar, Kerzer Gebirge, Nagyenyed (Ormay).

var. *floralis* Motsch. Hermannstadt (j. W.), Karlsburg (c. a.).

flavipes Thunb. (nigromaculatus Ws., auritus Scriba). Hermannstadt, S. - Regen (Bielz); Hátszeg (Bielz, c. a., Deubel).

var. ♀ *collaris* Küst. Hátszeg (c. a.).

540. *Platynaspis Redtenbacher.*

lulcorubra Goeze. Salzburg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Baassen, Kronstadt, Rotenturm (c. a.); Szamosujvár (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).

Hyperaspini.541. *Hyperaspis Redtenbacher.*

repensis Herbst. Hátszeg, Dobra, Mühlbach (roter Berg), Gross - Scheuern, Schässburg (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *Teinturierii* Muls. Alsó-Rákos (c. a.).

campestris Hbst. Hátszeg, Dobra, Hermannstadt, Záh (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Klausenburg (c. a.); Götzenberg (Ormay); Kronstadt (Deubel).

concolor Suffr. Hátszeg (Bielz).

Scymnini.542. *Pullus Mulsant.*

ferrugatus Moll. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

haemorrhoidalis Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

auritus Thunb. (capitatus F., minimus Rossi). Hátszeg, Hammersdorf, Gross - Scheuern, Neudorf b. H., Schässburg, Héviz (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

subvillosus Goeze. Hátszeg, Hammersdorf, Schässburg, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel).

a. *pubescens* Panz. Kronstadt (Zinne, Méhely, Deubel).

testaceus Motsch.

a. *scutellaris* Muls. Unter - Kerz, Schässburg (c. a.).

suturalis Thunb. Gross - Scheuern, Tahnesch, Tartlau (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

pallidivestis Muls.

var. *nanus* Muls. Zernest, Kronstädter Gebirge, Bucsecs (Deubel).

ater Kugel. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Alsó - Rákos (Deubel).

543. *Scymnus Kugelann.*

nigrinus Kugel. Gross - Scheuern, Mediasch, S. - Regen, Bielz); Kronstadt (Deubel).

ahielis Payk. Kerzer Gebirge, Schuler - Gebirge (Bielz); Bucsecs (c. a.); Schaula (Ormay); Rodnagebirge, Kronstadt, Paringul (Deubel).

rufipes F. Schässburg (c. a.).

frontalis F. Hermannstadt, Grossscheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Hátszeg (c. a.); Hammersdorf (Ormay).

a. 4 - *pustulatus* Hbst. Déva, Hátszeg, Schässburg, Kronstadt, Rotenturm (c. a.); Nagyagymás (Deubel).

a. *immaculatus* Suffr. Schuler - Gebirge (Deubel).

Apetzi Muls. Mezőség (Gyeke, Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyastal, Rodnagebirge (Deubel).

interruptus Goeze. Hátszeg, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Hosszufalu, Tartlau (Bielz).

rubromaculatus Goeze. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Girelsau, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, S. - Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

544. *Nephus Mulsant.*

4 - *maculatus* Hbst. (pulchellus Herbst.) Hermannstadt, Gross - Scheuern (Bielz); Klein - Pold (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *obliguus* Ws. Kronstadt (Deubel).

bipunctatus Kugel. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Deubel).

var. *nigrinus* Ws. Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

Redtenbacheri Muls. Rodnagebirge, Schässburg, Unter - Kerz (Altuf, c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

545. *Stethorus Weise.*

punctillum Ws. Schässburg, Rotenturm, Malomviz (c. a.).

Rhizobini.546. *Rhizobius Stephens.*

lilura F. Schässburg (c. a.).

547. *Coccidula Kugelann.*

scutellata Hbst. Klausenburg, Záh (Bielz); Kronstadt (Gesprenge, Deubel).

rufa Hbst. Hermannstadt, Gross - Scheuern, Záh (Bielz); Schässburg, Kronstadt (c. a.).

XXXIX. Dascilloidea.

Helodiidae.

Cyphonini.

548. *Helodes Latreille*.

minuta L. Gross-Scheuern, Hahnbach b. H., Kronstadt, Tartlau (Bielz); Karlsburg, Hammersdorf, Előpatak, Bucecs (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel); Marosgebirge (Müller).

var. *laeta* Panz. Bucecs (c. a.).

elongata Tourn. Szurdokpass, Hammersdorf, Szováta (c. a.).

flavicollis Kiesenw. Kronstadt (Zinne, Deubel).

marginata F. Rodnagebirge (Valea Vinului, Deubel).

549. *Microcara Thomson*.

testacea L. Götzenberg, S.-Regen (Bielz); Vargastal, Honigberg (Deubel); Szováta (Quelle auf Sumpfpflanzen, 5. Juni, c. a.).

550. *Cyphon Payk.*

variabilis Thunb. Hermannstadt, Fogarasch, Tartlau, Oláhfalva, Gyeké (Bielz); Marosujvár, Előpatak, Schässburg, Szováta, Kronstadt (c. a.); Michelsberg, Baumgarten (Ormay).

padi L. Kronstadt, Záh (Bielz); Schässburg, Oláhfalva (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *discolor* Panz. Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

coarctatus Payk. Hermannstadt, Fogarasch, Tartlau, Oláhfalva, Záh (Bielz); Szováta, Alsó-Rákos (c. a.); Hätzszeg, Törzburg (Deubel).

Paykulli Guer. Rotenturm, Borszék (c. a.); Schulergebirge, Noa (Deubel).

var. *macer* Kiesenw. Kronstadt (Zinne, Deubel).

551. *Prionocyphon Redtenbacher*.

serricornis Müll. Rotenturm (unter der Rinde eines Haselnussknüppels, der tief in Laub eingebettet war, c. a.); Kronstadt (Zinne, gekötschert, Deubel).

552. *Hydrocyphon Redtenbacher*.

deflexicollis Müll. Topánfalva, Balánbánya (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

553. *Scirtes Illiger*.

hemisphaericus L. Hätzszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg (am Ufer eines Quellabflusses auf Sumpfpflanzen in ausserordentlich grosser Menge), Kronstadt (c. a.); Hermannstadt (Lazaret, Ormay); Schulergebirge (Deubel).

Eubrilul.

554. *Eubria Latreille*.

palustris Germ. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Paringul (an einer Quelle im Moos, nahe der Schutzhütte), Előpatak (c. a.); Kronstadt, Törzburg, Zernest (Deubel).

Eucynetinae.

555. *Encyretus Germar*.

haemorrhous Duft. Gross-Scheuern (Bielz); Schässburg (an feuchten Stellen, Atelschill, Gross-Altscher Kuppen, unter dem Wietenberg aus Moos und Laub gesiebt, c. a.); Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).

XL. Dryopidae.

Potamophilini.

556. *Potamophilus Germar*.

acuminatus F. Dobra, Mediasch (Bielz); Schässburg (Kokel, an Eichenbohlen, welche im fließenden Wasser standen, Juli, c. a.); S.-Regen (Müller).

Dryopini.

557. *Dryops Olivier*. (Parnus F.)

Die Arten leben an Gewässern unter Steinen und Gersten.

striatopunctatus Heer. Hätzszeg, Dobra (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm (c. a.); Bistritz, Vargyas, Kerzer Gebirge (Deubel).

viennensis Heer. Schässburg (Bielz); Bistritz, Rotenturm, Kronstadt (c. a.); Dörs (Deubel).

lufulentus Er. Hätzszeg, Hermannstadt (Bielz); Vargyas (Deubel).

auriculatus Geoffr. (prolifericornis F.). Hermannstadt, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

luridus Er. Hätzszeg, Rebs (Bielz).

rufipes Kryn. (pilosellus Er.). Schieltal, Dobra (Bielz).

Ernesti Gozis (auriculatus Panz.). Durch das ganze Berg- und Hügel land verbreitet.

nitidulus Heer. Rebs (Bielz); Schässburg, Naszód, Petrosény (c. a.); Hätzszeg, Törzburg (Deubel).

558. *Helichus Erichs.*

(*Dryops* Leach., *Potaminus* Strm.)

substriatus Müll. Tahmesch (Altufer, Bielz); Kronstadt (Ragado, Deubel).

Helminthini.

559. *Esolus Mulsant.*

angustatus Müll. Balánbánya, Csukás, Elő-patak (an klaren Quellrieseln unter Steinen, c. a.); Kronstadt (Ragadó, Deubel).

paralelepipedus Müll. Skore (Altufer), Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Ragadó, Deubel).

560. *Latelmis Reitter.*

Perrisi Dufour (Germari Er.). Balánbánya (Quelle unter Steinen, c. a.); Nagyhagymás (Ocsém), Zernest, Kronstadt (Ragadó, Deubel).

Volkmar Panz. Porcsest (Bielz); Alsó-Rákos (Tepe-Bach), Kronstadt (Ragadó, c. a., Deubel).

opaca Müll. Csukás (c. a.).

561. *Riolus Mulsant.*

cupreus Müll. Kronstadt (?) (Bielz); Salzburg (Ormay).

subviolaceus Müll. Kronstadt (Ragadó, Zernest (Deubel).

562. *Helmis Latreille.*

Latreillei Bedel (Mangeli Er.). Csukás (c. a.); Nagyhagymás, Bucsecs, Zernest (Deubel).

Maugei Bedel.

var. *Megerlei* Duft. Alsó-Rákos (Tepe-Bach, c. a.).

var. *aenea* Müll. Michelsberg, Ober-Sebes, Unter-Kerz, Héviz, Kronstadt (Bielz); Bucsecs, Balánbánya, Csukás, Schässburg (c. a.); Heltau (Ormay).

XLI. Georyssidae.

563. *Georyssus Latreille.*

Die Arten leben an Gewässern im Uferschlamm, im Sonnenschein kriechen sie, mit einem Erdklümpchen bedeckt, auf den Letten umher.

crenulatus Rossi (pygmaeus F.). Schielthal, Hermannstadt, Hammersdorf, Schässburg (Kokel, Schaasbach, Bielz); Honigberg (Deubel); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); S.-Regen (Müller).

substriatus Heer. Klausenburg (Bielz).

laesicollis Germ. Dobra (Mietesch), Rotenturm (Altufer, Bielz); Schässburg (Kokelufer, c. a.).

caelatus Er. Hátszeg (Bielz).

XLII. Heteroceridae.

564. *Heterocerus Fabr.*

Die Arten graben an Gewässern im Uferschlamm.

H. bicornis Curtis? Fuss ist nicht aufgeklärt; vielleicht bezieht sich diese Art auf *H. fossor* Kiesenw., dessen ♂ gehörte Mandibeln besitzt.

fossor Kiesenw. Déva, Gross-Schenk, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (Altufer), Rotenturm, Schässburg, Halvelagen b. Sch. (c. a.); Dees, Krizba, Honigberg (Deubel).

flexuosus Steph. (femoralis Kryn). Torda, Déva, Marosujvár, Malomviz (Lunka negru, c. a.).

Das Vorkommen dieser auf Salzhoden lebenden Art in Malomviz lässt sich nur so erklären, dass sich daselbst eine mir unbekannte Salzquelle befindet.

obsoletus Curtis. Salzburg, Záh (Bielz); Kronstadt, Schässburg (c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

marginatus F. Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Hátszeg, Rotenturm, Karlsburg, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Nagyenyed (Ormay); Baróth (Méhely); Honigberg (Deubel); Klausenburg (Müll.).

fenestratus Thunb. (laevigatus Panz.). Rotenturm, Fogarasch (Bielz); Déva, Unter-Kerz (c. a.); Hátszeg, Honigberg (Deubel).

(Littorinus.)

hispidulus Kiesenw. Dobra (Bielz); Hammersdorf, Remete (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Unter-Kerz, Karlsburg (c. a.).

pruinosis Kiesenw. Unter-Kerz (Altufer, c. a.); Dees, Kronstadt (Gespreng, Deubel).

crinitus Kiesenw. Schässburg (c. a.).

marmota Kiesenw. Schässburg, Karlsburg (c. a.); Várhegy (Deubel).

sericans Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Dees, Honigberg (Deubel).

565. *Micilus Mulsant.*

murinus Kiesenw. Hátszeg (Bielz).

XLIII. Dermestidae.

Dermestini.

566. *Dermestes Linné.*

Die Arten leben auf tierischen Stoffen, oft in Häusern, selten in Ameisennestern.

vulpinus F. Hermannstadt (Bielz).

Frischi Kugel. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

murinus L. Marpod, Szakadat, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Schanta, Szamosujvár, Salzburg (Ormay).

lanarius Illig. Kronstadt (Umgebung, auf Feldwegen, Deubel); Klausenburg (Müller).

undulatus Brahm. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay).

atomarius Er. (tessellatus Gyll.). Schässburg (1. März, c. a.).

Erichsoni Ganglb. (tessellatus Er.). Salzburg, Marpod, Mediasch (Bielz).

bicolor F. Hermannstadt, Schässburg (1. Mai, von einem blühenden Kirschbaum geklopft, c. a.); Bistritz (Müller).

lardarius L. Durch das ganze Gebiet, namentlich in Häusern und Vorratskammern).

(Monta, doct.)

latissimus Bielz. Michelsberg, Götzenberg, Zood, Präshe, Porcesst, Surul, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Szurdokpass (c. a.); Schanta (Ormay); Rotenturm, Schulergebirge (Taminaschlucht, Deubel).

Attagenini.

567. *Attagenus Latreille*.

Die Arten leben ähnlich wie die vorigen, häufig finden sie sich auf Blüten.

Schäffleri Herbst. Hätzeg, Borszék, Schässburg (Bielz).

piceus Oliv. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfal. S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed, Gyógy, Szamosujvár (Ormay); Puj (b. Hätzeg, c. a.).

var. **dalmatinus** Küst. (marginicollis Küst.). Königstein (Méhely); Hermannstadt (c. a.).

pellio L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, oft in Häusern, oft auf Blüten.

(Lanorus.)

punctatus Scop. (vigintiguttatus F.). Hermannstadt (Bielz).

pantherinus Ahr. Hammersdorf, Girelsau, Unter-Kerz, Schässburg (Bielz, soll in den Nestern von Erdbienen vorkommen, ich sammelte eines meiner Exemplare an einer Hausmauer).

Megatomini.

568. *Megatoma Samouelle*.

undata L. Hätzeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Girelsau, Holzungen, Gross-Schenk, Marienburg b. Kr., Gyeke, (Bielz); Schässburg (Kokelufer, unter der Rinde eines abgestorbenen Weidenbaumes, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

569. *Globicornis Latreille*.

(Hadratoma.)

marginata Payk. Hermannstadt (Ormay); Erdővidék (Méhely); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Globicornis s. str.)

nigripes F. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Eichenschwamm oder aus Blättern gesiebt, 20. April, c. a.).

570. *Trogoderma Latreille*.

versicolor Creutz. Dobra (Bielz); Karlsburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

nigrum Herbst. (glabrum Herbst, elongatum F.). Hermannstadt, Holzungen, S.-Regen (Bielz); Schässburg (an einer Hausmauer, 1. Juli, c. a.); Kronstadt (in der Schmetterlingssammlung, Deubel).

571. *Ctesias Stephens*. *Tiresias Er.*

serra F. Hermannstadt, Gyeke (Bielz); Schässburg, (Breite, aus dem Holze einer alten Eiche, c. a.).

Anthrenini.

572. *Anthrenus L.*

Die Arten leben auf Blüten, in Häusern, die Larven einiger Arten in Tiersammlungen als Zerstörer.

pimpinellae F. Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schanta, Kerzer Geb. (Ormay).

scrophulariae L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Nathrenus.)

verbasci L. Hermannstadt, Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a.).

Deutel bezweifelt, dass A. verbasci in Burzenlande (Kronstadt, Tartlau) und in Fogarasch vorkomme.

(Florilinus.)

muscorum L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Balánbánya, Puj (bei Hätzeg, c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

(Helocerus.)

fuscus Oliv. Hätzeg, Hermannstadt, Schässburg (auf Blüten und in Sammlungen als Zerstörer derselben, Bielz); Rotenturm, Baassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Trinodini.

573. *Trinodes Latreille*.

hirtus F. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altufer, Deubel).

Orphidini.

574. *Orphilus Erichs*

niger Rossi (glabratus F.) Hermannstadt (Bielz); Zood (Ormay); Kronstadt (Deubel).

XLIV. Nosodendridae.

575. *Nosodendron Latreille.*

fasciculare Oliv. Präsbe, Holzmengen, Marosgebirge (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (am ausfliessenden Safte der Eichen, Mai, c. a.); Várhegy (Deubel); Hermannstadt (Albrecht); S.-Regen (Müller).

XLV. Byrrhidae.

Limnichini.

576. *Pelochares Mulsant.*

versicolor Waltl. Hätzeg, Dobra, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Rotenturm (Altner, c. a.); S.-Regen (Müller).

577. *Limnichus Latreille.*

Die Arten leben wie die vorigen am Ufer der Gewässer.

pygmaeus Sturm. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

sericeus Duft. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Tartlau, Schässburg (Bielz); Nagyenyed, Bistritz (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Byrrhini.

578. *Simplocaria Marsham.*

Bielz führt *S. maculosa* Er. für Siebenbürgen an; es ist aber wahrscheinlich, dass diese Art bei uns nicht vorkommt, indem sie bei uns vertreten wird durch *S. Deubeli*, welche Bielz nicht kannte.

metallica Strm. Hätzeg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Deubeli Ganglb. Bucsecs, Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Buleatal), Schässburg (Citendell), Retjezat (unter Moos, besonders Baummoos, c. a.).

semistriata F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Alsó-Rákos, Balánbánya, Rodnagelbirge, Előpatak, Schässburg, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rotenturm (Ormay); Bodzaer Gebirge (Deubel).

acuminata Er. Rodnagelbirge (oberhalb der Baumregion aus Grashüscheln gesiebt, c. a.); Rotenturm (Ormay); Hätzeg (Deubel).

(Trinaria.)

carpathica Hamepe. Präsbe (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea), Paringul, Malomviz, Bistra (c. a.).

579. *Morychus Erichs.*

aeneus F. Schielthal, Zibinsgebirge, Rotenturm, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Zernest, Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).

580. *Pedilophorus Steffalmi.*

(Lamprobyrrhulus.)

nifidus Schall. (nitens Panz.). Hätzeg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg (Kokelfer unter Blättern), Baassen (c. a.).

(Pedilophorus s. str.)

auratus Duft. Retjezat, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bucsecs (Bielz); Alsó-Rákos, Búdös, Frecker Gebirge (Serbota), Malomviz, Topánfalva, Schässburg, Előpatak, Paringul (c. a.); Schanta (Ormay); Schulergebirge (Deubel); Bistritz (Müller).

581. *Carpathobyrrhulus Ganglbauer.*

transsylvanicus Suffr. Rodnagelbirge, Fogarascher Gebirge (Bielz, c. a., Deubel); Klausenburg (Müller).

582. *Cytilus Erichs.*

(Cistela Geoffr. Seidl.)

sericeus Forster (varius F.). Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Königsstein, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Schanta, Porumbacher Geb., Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Balánbánya (c. a.).

583. *Byrrhus Linné.*

fasciatus Forst. Zibins-Gebirge, Ober-Sebes, Surul, Bucsecs, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Porumbacher Gebirge (Ormay); Retjezat, Paringul, Rodnagelbirge (c. a.).

arietinus Steff. Hätzeg, Broos (Bielz); Bucsecs, Paringul, Retjezat (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

pustulatus Forst. Dusch, Götzenberg, Präsbe, Kronstadt, Bozauer Pass (Krasna, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Tordaer Schlucht, Bükszád, Rodnagelbirge, Szurdokpass (c. a.); Paringul (Deubel).

pilula L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. *aurato-punctatus* Reitt. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

a. *aurofuscus* Reitt. Hermannstadt (Ormay).

Ganglbauer (Käfer von Mitteleuropa, IV. 71) zieht diese beiden Aberrationen als Synonyme ein.

var. *regalis* Steff. In allen höheren Gebirgen unseres Gebietes.

var. *laevigatus* Ganglb. Rodna-Gebirge (hochalpin, c. a., Deubel); Pietrosul (Deubel).

var. *herculeanus* Ganglb. Szurduk-Pass (c. a.).

luniger Germ. Zibinsgebirge, Hosszufalu (Bielz); Kronstadt (Deubel, c. a.); Schullergebirge, Hátszeg (Deubel); Szurduk-Pass, Rotenturm, Borszék (c. a.).

glabratus Heer. *ornatus* Panz.). Zibinsgebirge, Fogarasch, Kronstadt, Königstein, Maros-Gebirge (Bielz); Rodnaggebirge (Deubel).

584. *Porcinolus Mulsant.*

murinus F. Freck (Bielz); Schässburg (bei einer Ueberschwemmung der Kokel in Anzahl gesammelt, c. a.); Hátszeg (Deubel).

585. *Urimus Erichs.*

decorus Steph. Schielthal, Dobra (Bielz); Schanta (Ormay); Retjezat, Rodnaggebirge (c. a.); Schullergebirge, Rosenu, Kerzer Gebirge (Deubel).

Erlchsoni Reitter. Kronstadt, Zalutna, Torockó, Rodnaggebirge (c. a.); Nagy-hagymás, Hátszeg (Deubel).

erinaceus Duft. Erzgebirge (Boicza, Bielz).

586. *Syncalypta Stephens.*

Die Arten leben unter Moos und Blättern. (Crimopsis.)

paleata Er. Hátszeg, Rotenturm (Altuf), Schässburg (Kokeluf, Bielz); Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

setosa Walil. Kerzer Gebirge (Bielz); Unter-Kerz (Altuf, c. a.).

setigera Illig. Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátszeg, Karlsburg, Topánfalva, Előpatak, Schässburg, Borszék (c. a.); Nagy-hagymás, Kronstadt (Deubel).

(*Syncalypta* i. sp.)

spinosa Rossi. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Rodnaggebirge, Kronstadt (Deubel).

XLVI. Dasciliidae.

Dascillini.

587. *Dascillus Latreille.*

cervinus L. Zibinsgebirge, Götzenberg, Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Csukas, Bozauer Pass, Marosgeb. (Bielz); Retjezat, Paringul, Schullergebirge, Borszék (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).

XLVII. Eiateridae.

Agrypnini.

588. *Adelocera Latreille.*

punctata Hbst. (atomaria F.). Klausenburg, S.-Regen (Bielz).

lepidoptera Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz); Bistra (unter Fichtenrinde, c. a.); Kelemengebirge, Kovászna (Deubel).

fasciata L. Zibinsgebirge, Negovan, Sterpu, Fogarasch, Tusnád, Gyergyó, Borszék, Marosgebirge, Borgoer Pass (Bielz); Rodnaggebirge, Bistra, Balánbánya (unter Fichtenrinde, c. a.); Kelemengebirge (Deubel).

quercea Hbst. Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, März, unter Eichenrinde, c. a.); Nussbach (Deubel).

589. *Brachylacon Motschulsky.*

murinus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Luditiini.

590. *Dima Eschscholtz.*

elateroides Charp. Retjezat, Heltan, Götzenberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Bielz, c. a., von Erlengebüsch geklopft, Mai); Rotenturm (Ormay); Zernest (Deubel).

591. *Corymbites Latreille.*

virens Schrank *signatus* Schrank). Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schullergeb., Balánbánya (Öcsém, Bielz); Szurduk-Pass, Schässburg Breite, Rothuche, wenn sich ihr Laub eben entwickelt hat, c. a.); Zibinsgebirge (Ormay).

pectinicornis L. Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Marosgebirge (Bielz); Zibinsklausen, Paringul, Rosenauer Gebirge, Szurduk-Pass, Schässburg (c. a.); Resmar, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Heyeri Saxon. Retjezat (Bielz); Rodnaggebirge (c. a.); Zernest (Crepatura, Deubel).

capreus F. Michelsberg, Götzenberg, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz), Bucecs, Rodnaggebirge (Deubel).

var. *aeruginosus* F. Retjezat, Schielthal, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Bistritz, Dees (Bielz); Götzenberg, Schanta, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnaggeb., Borszék, Balánbánya, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Pietrosul (Deubel).

var. **transsylvanicus** Szombathy. Vulkan-Pass, Fogarascher Gebirge, Biharer Gebirge (Szombathy).

(Anostirus.)

purpureus Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. **atropilosus** Buyss. Schulergebirge (c. a.).

haemapterus Illig. Rotenturm, Rodnageb. (Bielz); Schanta, Remete (Nagyenyed, Ormay); Bucsecs (subalpin), Zernest (Deubel); Szurdukpass (Deubel, c. a.); Vulkánpass (Csiki).

castaneus L. Hermannstadt, Holzmengen, Zood, Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf blühendem Ahorn, c. a.); Rodnagebirge (subalpin, Deubel).

testaceipennis Duf. (sulphuripennis Germ.). Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Vargyastal (auf Blumen in der Nähe der Almascher Höhle, Deubel).

(Actenicerus.)

sjaelandicus Müll. (tessalatus F. nec L.). Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Stolzenburg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurdukpass, Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

var. **assimilis** Gyll. Heltan, Nendorf bei H., Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Klausenburg, Paringul (c. a.); Kronstadt (Deubel).

592. *Selatosomus Stephens.*

(Metanomus.)

montivagus Rosenh. Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge (Bielz); Nagyhagymás, Bucsecsgebiet, Schulergebirge (Deubel).

(Selatosomus s. str.)

impressus F. Klausenburg (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

nigricornis Panz. Dobra (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Ujszékely b. Sch. (c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).

melancholicus F. Hermannstadt (Bielz); Schanta, Präsbe (Ormay); Schässburg (c. a.).

ampliocollis Germ. var. Buyssoni Szombathy. Kronstadt (Bielz); Schulergeb. (Deubel); Rotenturm, Pilis (bei Nagyenyed, c. a.).

aeneus L. Hátszeg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Marosgebirge, Borszék (Bielz); Rotenturm, Schanta, Bistra (Ormay); Pilis (Nagyenyed, Szurduk-Pass, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kelmengeb., Nagyhagymás (Deubel).

a. **germanus** L. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Csiker Gebirge, Balánbánya (Bielz); Pilis (Nagyenyed), Rodnagebirge, Tordaer Schlucht (c. a.).

a. **coeruleus** Schilsky. Pilis (Nagyenyed), Rotenturm (c. a.).

latus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

cruciatus L. Gyeke, Záh (Bielz).

globicornis Germ. Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Calambus.)

hipustulatus L. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Reps, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rodnagebirge, Alsó-Rákos (Deubel).

(Haplotarsus.)

affinis Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Kronstadt, Bucsecs (c. a.); Nagyhagymás, Schulergebirge (Deubel).

Ganglbaueri Rybinski. Frecker Geb. (Serbota, c. a.).

(Neopristilophus.)

depressus Germ. (insitivus Germ.). Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (c. a.).

(Paranomus.)

guttatus Germ. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Arpascher Gebirge (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Paringul, Rodnagebirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Csukás), Schulergebirge, Königstein (Deubel).

593. *Prosternon Latreille.*

tessellatus L. (holosericeus Oliv.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. **bifasciatus** Küst. Kerzer Geb. (Bielz).

594. *Orithales Kiesenwetter.*

serraticornis Payk. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Papolci hegység (Méhely).

595. *Hypoganus Kiesenwetter.*

cinctus Payk. Dees (Bielz); Alsó-Rákos (in einer alten Eiche), Schässburg (aus einem Eichenpfahl, c. a.); Kronstadt (Deubel).

596. *Sericus Eschscholtz.*

S. subaeneus Redt. ist aus dem Verzeichnis gestrichen, da er irrtümlich in dasselbe aufgenommen worden ist.

brunneus L. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Szunyokszék (Burzenland, c. a.); Nagyhagymás, Schulergebirge, Bodzaer Gebirge (Deubel).

597. *Dolopius Eschscholtz.*

marginatus L. Durch das ganze Gebiet auf Gesträuch.

598. *Agriotes Eschscholtz.*(*Ectinus*.)

aterrimus L. Grossscheuern, Kronstadt (?), (Bielz); Frecker Gebirge Serbota, c. a.); Bodnagebirge, Bucecs (Deubel).

(*Agriotes* s. str.)

gallicus Lac. Döblény-Tal, Ober-Tömösch (Méhely).

Schässburg als Fundort dieser Art ist zu streichen; vielleicht beruht auch Méhely's Angabe auf einem Irrtum. Ich habe den echten *A. gallicus* erst später in natura vor mir gehabt.

ustulatus Schall. (*blandus* Germ.). Durch das ganze Gebiet verbreitet, auf Schirmlumen gemein.

var. **flavicornis** Panz. Rotberg, Mediasch, Schässburg, Borgoer Pass, Klausenburg, wohl überall mit der Stammform zusammen.

var. **sputator** Redt. Mit der Stammform.

pilosus Panz. *pilosellus* Schönh.). Hätzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Präshe, Schässburg, S.-Regen, Dees, Kronstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta, Stolzenburg (in Holzschlägen auf Gesträuch, auch auf Schirmlumen).

acuminatus Steph. (*sobrinus* Kiesenw.). Kerzer Gebirge (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Hätzeg, Hermannstadt, Schässburg (von blühendem Ahorn geklopft, c. a.); Kronstadt (Deubel).

pallidulus Illig. Zibinsgebirge (Bielz).

sputator L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

sordidus Illig. Kerzer Gebirge (Bielz).

Das Vorkommen dieser dem Südwesten Europas angehörigen Art bei uns ist kaum anzunehmen; vielleicht wurde der Käfer mit *A. obscurus* verwechselt, dem er ähnlich ist.

lineatus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

obscurus L. Kerzer Gebirge (Leita-Tal). Fogarasch, Kronstädter Gebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay); Schanta, Szunyokszék, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

599. *Ludius Latreille.*(*Steatoderus* Eschscholtz.)

ferrugineus L. Hermannstadt, Neppendorf Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hätzeg (Hasschagen, c. a.); Schulergebirge (Deubel); Lotru-Tal (Csiki).

600. *Synaptus Eschscholtz.*

Auf Gebüsch und Strauchwerk.

filiformis F. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

601. *Adrastus Eschscholtz.*

limbalus F. (*nitidulus* Marsh.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen

(Bielz). Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Előpatak (c. a.).

var. **axillaris** Er. Repts, Schässburg (Bielz). Borszék, Balánbánya, Kronstadt (c. a.). Nagyhagymás (Deubel); Szováta (Csiki).

luculentus Er. Küküllőszeg, Dicsőszentmárton (Csiki).

nitidulus Marsh.

Die Nomenclatur des *Adrastus nitidulus* Marsh., der als Synonym zu *A. limbalus* gestellt wird, ist von Szombathy folgendermassen geändert worden:

pallens F. (*pusillus* Herbst). Zibinsgebirge, Fogarasch, Repts, Schässburg (Bielz); Hätzeg, Kronstadt, Vargastal (Szombathy).

var. **lateralis** Herbst. Szurdokpass (Csiki).

var. **Paykulli** nom. nov. (*limbalus* Payk nec F.). Dicsőszentmárton (Csiki).

a. **pallens** Er. Zibinsgebirge, Fogarasch, Repts, Schässburg (Bielz); Hätzeg, Kronstadt, Vargastal (Deubel).

rachifer Geoffr. (*nanus* Herbst, *minutus* Oliv.). Puj (b. Hätzeg), Karlsburg, Kronstadt (Zinne), Repts, Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Gyógy (Ormay); Dicsőszentmárton (Csiki).

montanus Scop. (*humilis* Er.). Grossscheuern (Bielz); Schässburg, Repts (c. a.); Hammersdorf, Gyógy (Ormay).

*Cardiophorini.*602. *Cryptohypnus Eschscholtz.*

riparius F. Kerzer Gebirge (Bielz).

frigidus Kiesenw. Surul (Bielz); Rodnagebirge (oberhalb der Baumregion auf kiesigem Grasboden, c. a., Deubel); Bucecs, Schulergebirge (Deubel).

603. *Hypnoidus Stephens.*(*Hypnoidus* s. str.)

tenuicollis Germ. Schässburg (Kokelufer, gekötschert, 29. Mai, c. a.).

4-pustulatus F. Hätzeg, Gross-Schenk, Törzburg, S.-Regen (Bielz).

(*Negastrius*.)

pulchellus L. Hätzeg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz).

var. **exiguus** L. (♀ *sabulicola*, Boh.). Repts (Altufer, Bielz); Schässburg (Kokelufer im Geniste, c. a.); Honigberg (Deubel).

(*Zorocheus*.)

dermestoides Hbst. Hätzeg, Kerzer Geb. (Leita-Tal), Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Bucecs, Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

var. **tetragraphus** Germ. (*1-guttatus* Lap.). Dobra (Bielz); Hermannstadt, Csukás, Balánbánya (auf Feuchten, sandigem Boden, c. a.); Baumgarten, Kakova (Ormay); Rodnagebirge, Zernest (Deubel).

meridionalis Lap. Hätzeg, Rotenturm, Porumbach, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Flussufer im Sande, c. a.).

(*Quasimus*.)

minutissimus Germ. Gross-Scheuern, Rotberg b. H., Girelsau, Kerzer Gebirge, S.-Regen, Schässburg (auf Gesträuch); Michelsberg, Rotenturm, Präsche, Gyógy (Ormay); Kronstadt (Deubel).

604. *Cardiophorus* *Eschscholtz.*

gramineus Scop. Hätzeg, Hermannstadt, Girelsau, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Dees, Maros-Gebirge, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Rakovicza, Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay).

ruficollis L. Déva, Gross-Pold (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Nagybagyniás (Deubel, von Fichte geklopft).

rufipes Geoffr. (*vestigialis* Er.). Déva, Hätzeg, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf blühender Ulme und Eiche, c. a.).

nigerrimus Er. Rotenturm (Ormay); Hermannstadt (a. Berg, c. a.).

atramentarius Er. Mediasch (Bielz).

(*Platynychus*.)

cinereus Hbst. Neudorf, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Alsó-Rákos, Kronstadt (c. a.).

var. *testaceus* F. Hätzeg (Bielz).

equiseti Herbst. Hermannstadt, Rothberg b. H., Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

rubripes Germ. Kronstadt (Bielz); Schässburg (Wietenberg, von Eichen geklopft, April, c. a.).

Elaterini.

Elaterina.

605. *Melanotus* *Eschscholtz.*

rufipes Herbst (*castanipes* Payk, *longipennis* Küst.). Hätzeg, Hermannstadt, Kronstadt, Hosszufalu, Előpatak, Bük-szár, Schässburg, Záh (Bielz); Salzburg (Ormay); Csukás, Karlsburg, Rotenturm, Schanta, Bistra, Borszék (c. a.); Tudnád (Deubel).

a. *subrufus* Schwz. Ober-Kerz (Glashütte, c. a.).

crassicollis Er. S.-Regen, Dees (Bielz); Klausenburg, Karlsburg, Schässburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

punctolineatus Pelerin (*niger* F.). Mühlbach, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Regen, Dees, Gyeke, Záh (Bielz); Klausenburg, Karlsburg, Hammersdorf, Szováta (c. a.); Stolzenburg, Schanta, Rotenturm (Ormay).

brunnipes Germ. Kerzer Gebirge, Előpatak, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Klausen-

burg, Schässburg, Tordaer Schlucht, Hermannstadt, Kronstadt (c. a.); Stolzenburg (Ormay).

lenebrosus Er. Hätzeg (Deubel, c. a.).

monticola Mén. Rosenau (Burgherg, Juli, Méhely).

606. *Idolus* *Desbrochers.*

picipennis Bach. Schielthal, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Schässburg, Balánbánya, Alsó-Rákos, Frecker Gebirge (Serbota), Nagyenyed (c. a.); Rosenau (Burgherg, Méhely); Rodnagelbirge (Deubel).

Méhely muss übersehen haben, dass Bielz und Ormay den *Betharmon picipennis* Bach unter dem Subgenus-Namen *Idolus picipennis* Bach in der Gattung *Agriotes* auführen, da er behauptet, dass Seidlitz (Fauna transs.) zwar den Käfer aus Siebenbürgen anführe, aber Fundorte desselben nicht bekannt seien (Erdély új és ritka bogárfajai 1895. II.).

607. *Betarmon* *Kiesenwetter.*

ferrugineus Scop. (*bisimaculatus* Schönh.). Zibins-Gebirge, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Rotenturm, Nieder-Eidisch (c. a.); Hermannstadt (Ormay). Ich sammelte die Art auf Gebüsch an Flussufern.

608. *Drasterius* *Eschscholtz.*

Auf trockenen, sandigen Grasplätzen und an sandigen Flussufern.

bimaculatus Rossi. Hätzeg, Hermannstadt, Neppendorf, Porumbach, Gross-Schenk, Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz).

609. *Portmidius* *Germar.*

ausfriacus Schrank. Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.).

610. *Anchastus* *Leconte.*

acuticornis Germ. Hermannstadt, Mediasch (Bielz).

611. *Megapenthes* *Kiesenwetter.*

lugens W. Redtenb. Hermannstadt (Bielz).

612. *Procræus* *Reitter.*

fibialis Lac. Hätzeg, Dees (Bielz); Schässburg (Fuchslotz, Gross-Alischer Kupen, im Holz alter Eichen, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

613. *Isehnodes* *Germar.*

sanguinicollis Panzer. Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz).

614. *Elater* Linné.

cinnabarinus Esch. Hätzeg, Götzenberg, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Klausenburg (Bielz); Borszék, Szováta, Schässburg (im Holze eines alten Apfelbaumes, c. a.).

sanguineus L. Hätzeg, Hermannstadt, Götzenberg, Talmesch, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schulergebirge, Hosszufalu, Bozauer Pass, Mediasch, Marosgebirge, Schässburg, Rodnaggeb. (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

var. **rubidus** Cand. Schässburg (in morschem Eichenholz).

praeustus F. Tartlau, Kerzer Gebirge, Piatra mare, Mediasch, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); in morschem Eichenholz).

pomoneae Steph. Schässburg (in morschem Eichenholz), Előpaták (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

sanguinolentus Schrank (ephippium Oliv.). Hätzeg, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Marosujvár, Schässburg (morsches Eichenholz (c. a.); S. Regen, Marosgebirge (Müller).

ferrugatus Lac. (pomorum auct.). Unterkerz, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rodnaggebirge (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

elongatus F. Hätzeg, Talmatschel, Rotenturm, Schässburg, Záh (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Szunnyokszék, Kronstadt (Zinne, c. a.).

balteatus L. Präsche (Bielz); Borszék (in Fichtenstümpfen), Gyergyó-Szt.-Miklós (c. a.); Rodnaggebirge (subalpin, Deubel); Bistritz (Müller).

nigroflavus Goeze (croceatus Lac.). Präsche, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay); Schässburg (31. Januar, in einem Erlenstumpf am Mühlkanal, c. a.).

quadrisignatus Gyll. Schässburg (auf der Burg einmal im Fluge gefangen, c. a.); S.-Regen (Müller).

satrapa Kiesenw.

var. **dibaphus** Schioedte. Schässburg (zwei Exemplare, Fuchslotz, 14. Mai im Holze eines Apfelbaumes, c. a.).

Szombathy (Annal. mus. hung. VIII. 1910) bezeichnet *Elater forticornis* Schwarz als Synonym des *Elater satrapa* var. *dibaphus* Schioedte. Die Varietät unterscheidet sich von der Stammform durch die schwarze Behaarung der Ober- und Unterseite. Ich betone hier ausdrücklich, dass meine Exemplare nicht etwa Dimorphe ♂♂ des *Elater pomoneae* sind, die ich auch besitze, denn das dritte Fühlerglied ist ebenso gross und fast so breit wie das vierte.

elegantulus Schönh. Hätzeg, Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm (Ormay).

sinuatus Germ. Déva, Gross-Pold (Bielz); Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

iristis. Borszék (im modernden Holze alter Fichtenstümpfe, ♂ und ♀, c. a.).

? ♀ var. **basalis** Mannh. Borszék (mit dem vorigen, c. a.).

erythrogonus Müll. Zibins-Gebirge, Talmatschel, Girelsau, Gross-Schenk, Hosszufalu, Bozauer Pass (Bielz); Königstein (Crepatura, 21. Juni, von Gerstränch geklopft, Deubel).

ruficeps Muls. Hermannstadt (Bielz).

nigrinus Payk. Götzenberg (Bielz); Kerzer Gebirge (Bulea, Ormay); Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Malomviz, Bucsecs, Balánbánya (c. a.); Papole (Méhely); Paringul (Deubel).

nigerrimus Lac. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Präsche, Bistra (Ormay); Schässburg (in morschem Eichenholz, c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

(Ectamenogenus.)

Megerlei Lac. Hermannstadt (Bielz); Resinar (Ormay); Schässburg (c. a.); Keresztényhavas (Méhely); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Atholna.

615. *Limoni* Eschscholtz.

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen.

pilosus Leske. Hätzeg, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Bistritz, Dees, Záh (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Szamosujvár (Ormay); Karlsburg, Szurduk-Pass, Szunnyokszék (c. a.).

aeruginosus Oliv. Gross-Scheuern, Holzungen, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel); Szurduk-Pass (c. a.).

minutus L. Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

purvulus Panz. Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Bistritz (Bielz); Hermannst. (Ormay); Szunnyokszék, Gross-Alisch bei Sch., Alsó-Rákös (c. a.); Hätzeg (Deubel).

616. *Phelotes* Kiesenwetter.

acneoniger Degeer. (Bruckteri Panz.). Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat (c. a.); Nagybagymás, Negoi, Paringul, Hätzeg, Kronstadt, Vargyastal (Deubel).

quercus Oliv. (lythodes Germ.). Porcest (Bielz); Retjezat, Malomviz (c. a.); Rotenturm (Ormay); Hätzeg (Deubel).

617. *Harminius Fairmaire.*

(Diacanthus Reitter.)

undulatus Degeer. Kerzer Gebirge, Maros-Gebirge (Bielz); Retjezat, Bistra, Kronstadt, Rodnagebirge (c. a.); Zernest Bodzaer Gebirge, Schulergeb. (Deubel).

a. **bifasciatus** Gyll. Zoodgebirge, Präsbe, (Bielz).

a. **limbaticollis** Motsch. Siebenbürgen.

618. *Athous Eschscholtz.*

(Stenagostus.)

villosus Geoffr. (rhombus Oliv.). Oláh-falu, Oláhlaposbánya (Strimbul, Bielz); Schässburg (Breite, 29. Juni, unter der Rinde einer gestürzten Eiche, c. a.); S.-Regen (Müller).

(Athous s. str.)

birtus Hbst. (porrectus Thoms.). Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Előpatak, Mediasch, Borszék (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Karlsburg, Schässburg (auf wildem Wein, c. a.); Nagyhagymás, Rodnagebirge (Deubel).

niger L. (alpinus Redt.). Götzenberg, Kronstadt (Bielz); Bistra, Kerzer Gebirge (Ormay); Balánbánya, Retjezat, Bucsecs, Rodnagebirge, Előpatak, Rosenau, Schässburg (auf Gebüsch, besonders auf Himbeergesträuch, c. a.).

var. **scrutator** Hbst. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg (Bielz); Zernest (Deubel).

(Grypocarus.)

vittatus F. Hátszeg, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Hermannstadt, Magyar-Bükkös (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Klausenburg (c. a., auf Gebüsch, namentlich in Holzschlägen); Vargyastal (Deubel).

var. **Ocskayi** Kiesenw. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (c. a.).

haemorrhoidalis F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Záh (Bielz); Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Szunyokszék, Klausenburg (c. a.); auf Gebüsch wie der vorige.

(Anathrotus.)

subfuscus Müll. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schulergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Szurduk-Pass, Retjezat, Balánbánya, Szunyokszék, Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel).

Zebel Bach. Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Mediasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

A. Zebei Bach findet sich in meinem gesammelten, ziemlich reichen, von Reitter revidierten Materiale nicht. Er gehört den mitteleuropäischen Gebirgen an, und ich besitze ihn z. B. aus dem böhmisch-sächsischen Erzgebirge. Da von Reitter viele neue Arten beschrieben worden sind, dürfte das Vorkommen des A. Zebei bei uns sehr fraglich sein, jedenfalls empfiehlt sich eine diesbezügliche Revision der Fundorte.

mollis Reitter. Tesla (Bodzaer Gebirge, Méhely); Rodnagebirge, Schässburg, Kronstadt (Zinne), Retjezat, Balánbánya, Borszék (c. a., ♂ ♀); Hátszeg, Nagyhagymás (Deubel).

carpathicus Reitter. Klausenburg, Rotenturm (c. a.).

austriacus Desbr. (circumscribitus Reitter). Puj (b. Hátszeg), Rotenturm, Borszék, ♀ Előpatak (c. a.).

circumductus Men. Schiefthal (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Bodzaer Gebirge (Deubel).

(Enplathous.)

diformis Lac. Zibins-Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay).

A. Dejeani Lap. dürfte bei uns nicht vorkommen und verwechselt worden sein mit A. carpathophilus Reitter, den ich aus Klausenburg besitze, woher Bielz seinen A. Dejeani anführt. Zweifelhafte ist auch das Vorkommen des A. difformis bei uns, wenigstens bedarf dasselbe weiterer Nachweise.

(Grypathous.)

longicollis Oliv. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (?), Tartlau (?), S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Götzenberg, Stolzenburg (Ormay); Karlsburg (c. a.); Vargyastal (Deubel).

picipennis Reitter. Schässburg, Ratosnya (c. a.).

carpathophilus Reitter. Klausenburg, Rotenturm (c. a.).

plagipennis Reitter. Schässburg (Fuchsloch, 18. Juni, c. a.).

circumscriptus Cand. Kerzer Geb. (Bielz); Hátszeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

Denticollini.619. *Denticollis Piller.*

rubens Piller. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Maros-Gebirge (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Hermannstadt, Retjezat, Balánbánya (c. a.); Rodnagebirge, Zernest, Bodzaer Gebirge, Schulergebirge (Deubel).

linearis L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

XLVIII. Cerophytidae.

620. *Cerophytum Latreille.*

elateroides Latr. Schässburg (Witenberg, 3. April, an einem Ahornstamm unter Rinde, c. a.).

XLIX. Eucnemidae.

Melasiini.

621. *Melasis Olivier.*

buprestoides Lap. Zood, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Zinne), Mediasch (Bielz); Resinar (Ormay); Előpatak, Schässburg (Siechhofberg, 1. Mai, aus dem morschem Holz einer Weissbuche, c. a.); Alsó-Rákos (Magy. Tepe, Deubel).

622. *Isorhipis Lacordaire.*

(*Pharops* Laporte.)

melasoides Lap. Hátaszeg (Páros, Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Eucnemini.

623. *Eucnemis Ahrens.*

capucina Ahn. Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

624. *Dirrhagus Latreille.*

(*Merorrhagus*.)

lepidus Rosenh. Rotenturm (Bielz); Honigberg (Deubel).

pygmaeus F. Iléviz, Rotenturm (Bielz); Kronstadt, Balánbánya, Rátosnya unter Blättern des in büschelförmigen Gruppen stehenden Haselgesträuches, 18. Juli, c. a.).

(*Dirrhagus*.)

clypeatus Hampe. Hermannstadt (Bielz).

attenuatus Mäkl. (longicornis Hampe). Hermannstadt (Bielz).

625. *Hypocoelus Lacordaire.*

procerulus Mannh. Borgoer Pass (Bielz); Előpatak (im Holze eines gefällten, morschen Weidenstammes, Juli, c. a.).

Trixaglini.

626. *Trixagus Kugelann.*

Die Arten finden sich unter Reisighaufen, unter Blättern, in und am Holz.

brevicollis Bonv. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rátosnya (c. a.); Kronstadt (Deubel).

dermestoides L. Hátaszeg, Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Rotenturm, Schässburg

(einmal in grosser Menge unter Reissig auf der Breite, c. a.).

carinitrons Bonv. Hátaszeg, Hermannstadt (Bielz); Rodnagelberge, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Rátosnya (Müller, c. a.).

elateroides Heer. Dobra, Hátaszeg, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm, Bistra, Karlsburg (c. a.).

var. *Bonvouloiri* Desbr. (modestus Weise) Hermannstadt (Bielz).

exul Bonv. Kronstadt (Deubel).

Duvali Bonv. Boncz-Nyires (Méhely); Schässburg in Baummulm, Kokufler unter Geniste, c. a.).

obtus Curt. Mezőség (Gyke, Záh, Bielz); Marosujvár, Karlsburg, Schässburg (Witenberg, Atelshill, c. a.); Kronstadt, Hammersdorf (Deubel).

627. *Drapetes Redtenbacher.*

biguttatus Piller (mordelloides Host.). Klausenburg (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg, Előpatak (in jungen Holzschlägen auf Eichentrieben, c. a.); Kronstadt, Honigberg, Nussbach (Deubel).

L. Buprestidae.

628. *Chalcophora Solier.*

mariana Lap. Talmatschel (Bielz).

629. *Perotis Spinola.*

(*Aurigena* Laporte.)

lugubris F. Mühlbach, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyke, Záh), Hermannstadt, Buzi (Unterweissenburger Komitat), Nagyenyed, Magyarforró (Unterweissenburger Komitat), Haró (Hunyader Komitat), Schässburg (an Obstbäumchen, c. a.); Dieső-Szt. Márton (Csiki).

630. *Capnodis Eschscholtz.*

tenebrionis L. Reussmarkt, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Tartlan, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Szamosujvár (Ormay); Karlsburg (Weingärten, c. a.).

631. *Dicerea Eschscholtz.*

aenea L. Mühlbach, Reussmarkt, Hermannstadt, Zood, Unter-Kerz, Kronstadt (Bielz); Tusnád (Deubel).

berolinensis Hbst. Karlsburg, Mühlbach, Gross-Pold, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Schrankel, 6. Mai, c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

632. *Poecilnota Eschscholtz.*

- variolosa* Payk. Zood (Bielz); Hermannstadt (j. W., c. a.).
rutilans F. Hermannstadt, Neudorf bei H., Kerzer Gebirge, Klausenburg (Bielz); Schässburg (2. Juni, c. a.); Rosenau (Deubel).

633. *Buprestis Linné.*

- aurulenta* L. (splendida Payk). Zibinsgebirge (Bielz).
rustica L. Talmesch, Zood, Kerzer Geb., Törzburg, Kronstadt, Hosszufalu, Tusnád, Borszék, Marosgebirge (Bielz); Bistra (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota). Schässburg, Rodnagelberge (auf frisch geschnittenen Brettern c. a.); Schulergebirge (Deubel).
haemorrhoidalis Herbst. Rodnagelberge (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel); Tusnád (Müller).

634. *Eurythyrea Sol.*

- austriaca*. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tusnád, Marosgebirge (Bielz); Rodnagelberge (auf frisch gesäten Fichtenbrettern, c. a.).
scutellaris Oliv. Hermannstadt, Zood, Kerzer Gebirge (Bielz).
marginata Oliv. (micans F.). Talmatschel (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (untere Wench, August, c. a.).

635. *Melanophila Eschscholtz.*

- acuminata* Deg. Zood, Kronstadt (Bielz); Rodnagelberge, Kovászna (Deubel).

636. *Phaenops Lacordaire.*

- cyanea* F. Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Gyergyó, Marosgebirge (Bielz).

637. *Anthaxia Eschscholtz.*

Die Arten findet man in den Blüten niederer Pflanzen bei Sonnenschein, besonders der Compositen.

- olympica* Kiesenw. Hammersdorf auf Wucherblumen, Chrysanthemum, 3. Juli, Ormay).
cichorii Oliv. Hátszeg, Rothberg b. H., Schässburg (Bielz); Baassen (c. a.); Gyógy (Bad), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).
millefolii F. Vásárhely, Nyáradtal (Bielz).
inculta Germ. (? umbellatarum F.). Gross-Pold (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Puj (bei Hátszeg), Schässburg (c. a.).
aurulenta F. Déva (Bielz).
manca F. Gross-Pold, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.).

Hackeri Friv. Siebenbürgen.

salicis F. Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Szunyokszék b. Kr., Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas (Deubel).

var. *speciosa* Csiki. Siebenbürgen.

fulgurans Schrank. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet auf Blüten.

grammica Lap. Gross-Scheuern (Bielz); Vargyasbach (Almásér Höhle, Deubel).

nitidula L. Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyke, Bielz); Gyógy (Ormay).

var. *signaticollis* Kryn. Gross-Scheuern, Rothberg b. H., Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

funerula Ill. Kronstadt (Zinne, Deubel).
morio F. Keresztényhavas, Schulergebirge (Méhely); Hátszeg (Deubel).

plicata Kiesenw. Siebenbürgen (Bielz).

sepulchralis F. Klausenburg (Bielz); Balánbánya, Borszék (c. a.).

quadripunctata L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

Polycestini.

638. *Ptosima Solier.*

- 11-maculata* Herbst. Hermannstadt, Hammersdorf, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záb, Bielz); Baassen (unter den Weingärten am Stamme eines Pflaumenbaumes, 11. Juni, c. a.).

639. *Acmæodera Eschscholtz.*

convolvuli Waltl. (cylindrica auct.). Fogarasch (Bielz).

degener Scop. (18-guttata Piller). Gross-Scheuern, Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Baassen (unter den Weingärten gekötichert, c. a.).

pilosellae Bon. Klausenburg (Bielz).

flavofasciata Pill. Hermannstadt, Rothberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Tartlau, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf Chrysanthemum-Blüten am Wietenberg), Baassen (ebenso), Vargyasbach (Almásér Höhle, Deubel); Sachs.-Regen (Müller).

640. *Sphenoptera Solier.*

- antiqua* Illig. Hermannstadt, Unter-Kerz, S.-Regen, Mezőség (Záb, Bielz); Nagylak (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

Chrysobothrini.

641. *Chrysobothris Eschscholtz.*

- chrysostigma* L. Gyergyó, Borgoer Pass (Bielz); Rodna-Gebirge (auf abgehauenen Tannenstämmen, c. a.).

affinis F. In unsern Vorgebirgen und im Bergland verbreitet.

Solieri Lap. Marosgebirge (Bielz).

Ch. Solieri Lap. ist dem Ch. *affinis* sehr ähnlich, durch weniger breites Hals-schild, schmälere, zur Spitze gerade vereinigte Flügeldecken, deren Grütlchen breiter sind, verschieden. Das Vorkommen dieser Art bei uns erscheint mir nicht ausser allem Zweifel.

Trachydini.

642. *Coraeus Laporte*.

lampsanae Bon. (elatus F.). Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neulorf, Mezöség (Gyeke, Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

643. *Agrilus Curtis*.

Die Arten finden sich auf verschiedenen Holzarten, in denen ihre Larven leben, auch auf Blüten.

sexguttatus Brahm. (*biguttatus* Rossi). Gross-Pold, Gross-Schenk, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier ein Irrtum eingeschlichen ist zwischen A. *biguttatus* Rossi = *sexguttatus* Brahm und *biguttatus* F.; Schässburg wenigstens ist aus der Reihe der Fundorte gestrichen.

biguttatus F. (*pannonicus* Piller). Hermannstadt, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau (Bielz); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller); Klausenburg (Deubel).

sinuatus Oliv. Hätzeg, Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Kronstadt (Zinne, c. a.).

subauratus Gchl. Hammersdorf (Bielz).

viridis L. Kronstadt, Schässburg (Deubel); Hermannstadt, Gyögy (Bad), Buleasee Kerzer Gebirge (Ormay).

var. *novicus*. Ratzeburg, Schässburg (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Borszék, Nussbach (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. *fagi* Ratzeb. Hermannstadt (Bielz); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel); Borszék (c. a.).

coeruleus Rossi. Hammersdorf, Rotenturm, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

? *fissifrons* Ab. Borszék (3 Exemplare, c. a.).

Roberti Chev. Hammersdorf (Deubel, 22. Juni).

elongatus Herbst. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg (Bielz).

angustulus Hlig. Grossau, Gross-Schenk, Hosszufalu, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.); Hermannstadt (c. a., Ormay); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

var. *rugicollis*. Dobra (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Remete (Nagyenyed, Ormay).

laticornis Hlig. Honigberg (Altfluss, 21. Juni, Deubel).

olivicolor Kiesenw. Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

hastulifer Ratzeb. Kronstadt (Zinne, Deubel).

graminis Lap. Schässburg (1 Exemplar, c. a.); Reps (Seidlitz).

derasolasciatus Lac. Gross-Scheuern, Girelsau (Bielz); Klausenburg, Baassen (c. a.).

antiquus Muls. Hermannstadt (von Eichen geklopft, Ormay); Kronstadt, Erösd (Alt, Deubel).

sericans Kiesenw. Boncz-Nyires (Méhely); Torda (Deubel).

aurichalceus Redtenb. Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

integerrimus Ratz. Klausenburg, Borszék (c. a.).

hyperici Crtz. Zibinsgebirge (Bielz); Hammersdorf, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

obscuricollis Kiesenw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

Trachyini.

644. *Trachys Fabr.*

minuta L. Durch das Berg- und Hügel-land verbreitet.

pygmaea F. (*corusca* Panz.). Zood (Bielz).

trogodytes Gyll. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Gyergyó (Ormay); Kronstadt (Deubel).

pumila Hlig. Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Előpatak, Schässburg (Bielz); Hätzeg (c. a.); Kronstadt Erösd (Altfluss, Deubel).

645. *Habroloma Thomson*.

nana Herbst. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Ll. Lymexylidae.

646. *Hylocoetus Latreille*.

(*Elatroides* Schäffer.)

dermestoides L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

var. ♂ *Marci* L. Rodnagebirge (Deubel).

var. ♂ *Morio* F. Rodnagebirge (Deubel).

647. *Lymexilus Fabr.*

In altem Holze.

navale L. Hermannstadt, Götzenberg, Zood, Gross-Schenk, Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Zernest (Deubel).

LII. Bostrichidae.

Psoini.

648. *Psoa Herbst.*

viennensis Herbst. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Vajda-Hunyad, Schässburg (von Hecken geklopft und aus alten Weinrebentrieben gesiebt, c. a.).

Bostrichini.

649. *Stephanopachys Waterhouse.* (*Dinoderus* Kiesenw., Seidlitz.)

substriatus Payk. Hermannstadt, Zood, Präsbe, Sterpu, Girku, Kronstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay).

650. *Bostrichus Geoffroy*

capucinus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

651. *Xylonites Lesne.*

(*Xylopertha* Kiesenw., Seidlitz.)

retusus Oliv. (♀ *sinuatus* F.). Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz); Haró (Hunyader Komitat), Remete (Nagyenyed, Ormay); Schässburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

652. *Sinoxylon Duftschmid.*

perforans Schrk. (*hispinosum* Oliv.). Klausenburg (Bielz); Schässburg (Fuchsloch von einer Hecke geklopft, c. a.).

LIII. Lyctidae.

653. *Lyctus Fabr.*

linearis Goeze. (*unipunctatus* Hbst.). Fogarasch, Retjezat, Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Bistritz, Mezöség (Záh, Bielz).

Nach meinem Material erhalte ich die Ueberzeugung, dass *L. linearis*, dessen Fühlerkeule so lang sein soll, als die übrigen Glieder zusammen, bei uns gar nicht vorkommt, sondern nur *L. pubescens*. Besonders machen mich die zahlreichen Fundorte, die Bielz für diese Art angibt, stutzig, während er für *L. pubescens*, der nicht selten vorkommt, nur wenige Fundorte angibt.

pubescens Panz. Hátszeg, Retjezat, Schässburg, Mezöség (Gyeke, Bielz); Alsó-Rákos, Előpatak (auf frisch geschältem Weidenholz oder auf frischen Wunden der Weiden, auch an Telegraphenstangen (c. a.); Kronstadt, Honigberg (an Eichenstämmen, Deubel).

LIV. Ptinidae.

Gibbini.

654. *Gibbium Scopoli.*

psylloides Czempinski. Hermannstadt (Lazareth), Klausenburg (auf Sumpfpflanzen, Bielz); Hammersdorf, Salzburg (Ormay).

Ptinini.

655. *Niptus Boieldieu.*

hololeucus Faldern. Kronstadt (Deubel, aus dem Kehrlicht einer Spezereihandlung, vielleicht importiert).

656. *Ptinus Linné.*

(*Pseudoptinus*.)

lichenum Marsh. Zibinsgebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay).

coarcticollis Sturm. Schässburg (Wieteburg, 25. Februar, wahrscheinlich an einer alten Eiche, c. a.); Rotenturm, Busecs (subalpin, Deubel).

(*Bruchoptinus*.)

rufipes Oliv. Hátszeg, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Marosujvár, Hammersdorf, Vajda-Hunyad (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(*Ptinus* i. sp.)

fur L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pusillus Sturm. Schässburg (30. März Wieteburg, 11. April Breite, wahrscheinlich aus alten Eichen, c. a.).

bicinctus Strm. Kronstadt (Bielz).

Der Fundort Schässburg ist aus dem Verzeichnis zu streichen.

latro F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

brunneus Duft. Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

villiger Reitter. Hermannstadt (Februar), Kerzer Gebirge (Juli, Ormay); Unterkers, Bistra, Baassen, Schässburg, Hátszeg (in Eichen, c. a.).

perplexus Rey. Hermannstadt (8. März), Klein-Pöld (24. Oktober, Ormay); Frecker Gebirge (Scribota), Hátszeg, Schässburg (März, unter alten Reben, c. a.).

pilosus Müller. Hátszeg (Bielz); Klein-Pöld (Ormay); Schässburg (c. a.); Hátszeg, Kronstadt, Rotenturm (Deubel).

subpilosus Strm. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Busecs (subalpin, Deubel).

(*Gynopterus*.)

dubius Sturm. Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz).

variegatus Bossi. S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (c. a.)

(*typhoderes*.)

raptor Sturm (hidens Sturm). Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz), Hermannstadt, Heltau, Schanta (Ormay); Paringul, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge (alpin), Rosenau (Deubel).

Pt. bidens Oliv. scheint bei uns nicht vorzukommen.

Schlerethi Reitter. Hermannstadt (17. Mai, Ormay); Schässburg (April, Eichenmuhl (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

LV. Anobiidae.

Die Arten leben grösstenteils in altem Holz.

Hedobitini.

657. *Hedobia* Sturm.

imperialis L. Michelsberg, Schässburg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Hammersdorf, Kronstadt (c. a.); Schulergebirge, Zinne (Deubel).

regalis Duft. Gross-Scheuern (Bielz).

658. *Dryophilus* Chevrolat.

pusillus Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.); Schuler (Pojana, von Fichten geklopft, Deubel).

659. *Gastrallus* Duval.

immarginatus Müll. Gross-Scheuern (Bielz); Hätzeg (Deubel).

laevigatus Oliv. Hermannstadt (Ormay).

660. *Xestobium* Motschulsky.

(*Hyperisus*.)

plumbeum Ill. Paringulgebirge, Kronstadt (Zinne), Rosenau (Deubel); Szováta (5. Juni, c. a.).

(*Xestobium* i. sp.)

rufovillorum Deg. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

austriacum Reitter. Negoi (1 Exemplar, c. a.).

661. *Ernobius* Thomson.

Kiescnwetteri Schilsk. (pini Muls). Paringulgebirge (subalpin, Deubel).

nigrinus Strm. Hätzeg, Kronstadt (Zinne, Deubel).

var. **politus** Redtb. Rodnagebirge (c. a.).
abietinus Gyll. Kronstadt, Borszék (Bielz); Schanta (Ormay); Rodnagebirge, Paringulgebirge, Schulergebirge, Bucecs (alpin, gesiebt, Deubel).

abietis F. Schanta (Ormay); Schulergeb., Königstein (Crepatura, Deubel).

mollis L. Zibinsgebirge, Sächs.-Regen (Bielz); Baassen, Schässburg, Borszék (c. a.).

662. *Anobium* Fabricius.

Die Arten leben in altem Holz.

(*Dendrobium*.)

denticolle Panz. S.-Regen, Dees (Bielz), Kerzer Gebirge, Gyögy (Bad, Ormay); Kronstadt (Deubel).

pertinax L. In unseren Gebirgen und im Berglande verbreitet.

(*Anobium* s. str.)

striatum Oliv. (domesticum Geoffr.). Hätzeg, Hermannstadt, Unter-Kerz, Fogarasch, Tartlau (Bielz); Schässburg, Oláhfalú, Hévíz, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne), Paringul (subalpin, Deubel).

(*Hedrobregmus*.)

rufipes F. Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (in altem Weissbuchenholz), Szováta, Kronstadt (c. a.).

nitidum Hbst. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg (Peissel 25. Juli, in altem Lindenholz, c. a.).

fulvicorne Strm. Fogarasch (Bielz); Kronstadt (c. a.); Hätzeg (Deubel); Klausenburg (Müller).

var. **rubrum** Reitter. Hätzeg (Deubel).

var. **rufipenne** Duft. Götzenberg (Ormay).

tagi Muls. Kronstadt (Zinne, Deubel).

663. *Oligomernus* Redtenbacher.

ptilinoides Woll. (Reyi Bris.). Hermannstadt (Mai, Ormay).

brunneus Oliv. Hätzeg, Präsbe, Kronstadt (Zinne, Bielz); Hammersdorf (Ormay); Baassen, Schässburg (Lattenzaun, 6. Juli, c. a.).

664. *Sitodrepa* Thomson.

panicea L. Hermannstadt, Gross-Schenk, Kronstadt (Zinne), S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Karlsburg, Schässburg (Wohnhaus, 6. August, c. a.); Schulergebirge (Deubel).

Xyletinini.

665. *Trypopyty* Redtenbacher.

carpini Herbst. Zood (Bielz); Schässburg (im Hause), Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); S.-Regen (Müller).

666. *Ptilinus* Geoffroy.

pectinicornis L. Hätzeg, Götzenberg, Zood, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Malomvitz (c. a.).

fuscus Geoffr. (costatus Gyllh.). Hätzeg, Präsbe, Tartlau (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Schässburg, Kronstadt, Frecker Gebirge (Serbota), Malomvitz, Alsó-Rákos (c. a.).

667. *Xyletinus Latreille*.

maculatus Kiesew. Siebenbürgen (Catalog. col. Europae 1906, 131).

afer Panz. Rotenturm (Juli, Ormay); Rodnagebirge, Schässburg (Scheuereberg, gekötschert, Mai, Breiße, 1. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

brevitarsis Schilsky. Hermannstadt (2 Ex. c. a.).

pectinatus F. Hermannstadt, Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Wolkendorf (Deubel).

laticollis Duft. Gross-Scheuern (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kalán, Schässburg (Scheuereberg 23. Mai, gekötschert, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

oblongulus Muls. Schässburg (1 Exempl. c. a.).

668. *Lasioderma Stephens*.

obscurum Solsky. Baassen (Juli, 1909, c. a.).

669. *Ochina Stephens*.

Latreillei Bon. Klausenburg (Bielz).

Dorcatomini.

670. *Dorcatoma Herbst*.

flavicornis F. Holzmengen (Bielz); Wolkendorf (Deubel).

chrysomelina Sturm. Hermannstadt (Bielz); Schässburg, Előpatak (c. a.); Hammersdorf (Ormay).

dresdensis Herbst. Schielthal, Petrozsény, Fogarasch (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

671. *Coenocara Thomson*.

bovistae Hoffm. Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

subglobosa Muls. Schässburg (Siechhofwald, 20. Juli, auf Bovist, c. a.).

Heteromera.

LVI. Oedemeridae.

Calopini.

672. *Calopus Fabricius*.

serraticornis L. Gyergyó (Bielz); Kis-Somlyó (Méhely); Schuler (oberhalb der Wolfsschlucht unter Fichtentrinde), Präsbe (oberhalb der Schutzhütte von trockenen Fichten geklopft, Deubel).

673. *Sparedrus Serville*.

testaceus Andersch. Gross-Pold (Bielz); Bistritz (Müller).

Oedemerini.

674. *Anoncodes Duponchel*.

Auf blühenden Pflanzen: Disteln, Schirmblüten etc.

(Nacorda.)

mehanura L. Hätzeg (Bielz).

(Anoncodes.)

rufiventris Scop. Dobra, Kerzer Gebirge, Borgoer Pass, Dees (Bielz); Balánbánya, Arpascher Gebirge, Rotenturm, Baassen, Malomvz, Rodnagebirge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

ustulata F. Talmatschel, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg, Baassen, Kronstadt (Gesprenge), Busecs, Retjezat (c. a.); Vargyas (Almáser Höhle), Hätzeg (Deubel).

fulvicollis Scop. Dobra (Bielz); Nagybagymás, Schuler (Varna im Tömös-Tal, Deubel).

(Pachychirus.)

adusta Panz. Gross-Scheuern, Mediasch, Borszék, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Hätzeg (Deubel).

675. *Ischnomera Stephens*.

sanguinicollis F. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Bosszufalu (Bielz); Schulergebirge, Malomvz, Schässburg (Eichrücken, c. a.).

coerulea L. Zibinsgebirge, Präsbe, Kerzer Gebirge, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

676. *Chrysanthia Schmidt*.

viridissima L. Fogarasch, Sächs.-Regen, Gyergyó (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Hätzeg, Nagybagymás (Öcsém), Zernest (Plaju foi, Deubel).

viridis Schmidt. Zibinsgebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Tartlau, Oláhfal, Borszék, Borgoer Pass, Kerzer Geb. (Bulea, Bielz); Balánbánya, Borszék, Schässburg (c. a.); Nagybagymás (Öcsém, Deubel).

677. *Oncomera Stephens*.

(Dryops Fabr.)

femorata F. Kronstadt (Deubel, Zinne, geklopft, Abend ans Licht geflogen im Schützenhaus).

678. *Oedemera Olivier*.

Auf blühenden Pflanzen.

(Oedemeronia.)

flavipes F. Hätzeg (2 ♀♀, c. a.).

(Oedemerastra.)

podagrariae L. Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfal, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Retjezat, Előpatak (c. a.).

(Oedemerella.)

croceicollis Gyllh. Gross-Scheuern (Bielz), Schässburg (Scheuereberg, 13. Mai, auf Schilfrohr, c. a.).

(Oedemera i. sp.)

lavescens L. (femorata Ganglb.). Hermannstadt, Zibinsgebirge, Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Schässburg, Oláhfalv, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg, Bistra (Ormay); Hätzeg, Előpatak, Nagyenyed (c. a.).

subulata Oliv. Gross-Scheuern, Rotenturm, Oláhfalv (Bielz); Schässburg, Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

tristis Schmidt. Rodnagebirge (Deubel).

Deubeli Ganglb. Kronstadt (Zinne, Deubel, c. a.).

(Oedemerina.)

virescens L. Hermannstadt, Marpoil, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, Oláhfalv, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Zood, Resinar (Ormay).

lurida Marsh. Hermannstadt, Kerzer Geb., Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).

LVII. Pythidae.

Pythini.

679. *Pytho Fabricius*.

depressus L. Zood, Präsbe, Fogarascher, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schulergeb., Görgényer Tal und Gebirge, Marosgebirge (Bielz).

Salpingini.

680. *Lissodema Curtis*.

4-pustulatum Marsh. Karlsburg (unter den Weingärten aus abgeschnittenen alten Reben in grosser Anzahl gesiebt, 28. Mai), S.-Regen, Vajda-Hunyad (c. a.).
cursor Gyll. Schässburg (aus Aststückchen, 28. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne), Honigberg (23. Juni, Deubel).

681. *Spaeriestes Stephens*.

Was für eine Art Bielz mit *Salpingus* (Colposist) *ruficollis* Panz. meint, kann ich nicht eruieren; nachdem er auch Schässburg unter den Fundorten aufzählt, hat es den Anschein, dass mit dieser Art *Rhinosimus ruficollis* L. gemeint ist.

foveolatus Ljungh. Fogarasch (Bielz); Szováta, Schässburg (Februar und April, Wietberg, aus morschem Weissbuchenholz, c. a.).

682. *Rhinosimus Latreille*.

Die Arten leben im Holz, namentlich in den Ästen verschiedener Bäume.

viridipennis Latr. Rotenturm, Schässburg (Musler, Fuchstoch, Buche, c. a.); Kronstadt, Hätzeg, Schuler (Deubel), Bistritz (unter Eichenrige, Müller).

ruficollis L. Gross-Scheuern, Götzenberg, Kronstadt, Gyergyó (Bielz); Csukás, Büdös, Schässburg (in Weissbuche), Rodnagebirge, Retjezat (c. a.); Tusnád (Deubel).

planirostris F. Grossscheuern, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Retjezat, Gross-Alischer Kuppen bei Sch., Torockó, Klausenburg, Bucsecs (c. a.); Bistritz (Müller).

Mycterini.

683. *Mycterus Olivier*.

curculionoides F. S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

umbellatarum F. Talmatschel, Sächs.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

LVIII. Pyrochroidae.

684. *Pyrochroa Geoffroy*.

coccinea L. Durch das Bergland verbreitet.

serraticornis Scop. (purpurata Müll.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Holzungen, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Maros-Gebirge (Bielz); Schässburg, Hammersdorf, Rotenturm (c. a.); Vargyashach (Almáser Höhle, Deubel).

pectinicornis L. Retjezat, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Hermannstadt (c. a.); Schulergebirge, Rodnagebirge (Deubel).

LIX. Hylophilidae.

(Pedilidae.)

685. *Phytobaenus Sahlberg*.

amabilis Sahlb. Klausenburg (Bielz).

686. *Hylophilus Berthold*.

(Englenes Westwood.)

(Aderus.)

populneus Panz. Schässburg (im Holze alter Eichen), Klausenburg, Előpatak (c. a.); Rosenau (Deubel); S.-Regen (Müller).

pygmaeus Degeer. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

var. **oculatus** Panz. Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Baassen, Schässburg (c. a.).

LX. Anthicidae.

687. *Notoxus Geoffroy.*

- biinterruptus** Pic. Rotenturm (auf Weiden am Alt), Kronstadt (c. a.).
- monoceros** L. Hätzeg, Hermannstadt, Neppendorf, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Ratosnya (c. a.).
- brachycerus** Fald. Hermannstadt, Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Bistritz (Müller).
- cornutus** F. (trifasciatus Rossi). Hätzeg, Előpatak, Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Rotenturm, Nagyenyed (c. a.).
- miles** Schmidt. Előpatak (c. a.); Kronstadt (Bielz).

688. *Mecynotarsus Laferté.*

- serricornis** Panz. Hermannstadt, Holzmen-gen (Bielz).

689. *Formicomus Laferté.*

- pedestris** Rossi (formicarius auct.). Hermannstadt, Schässburg, Dees, Mezőség (Gyeke, Bielz); Déva, Nagyenyed (c. a.); Vajda-Hunyad (Deubel).

690. *Anthicus Payk.*

- humilis** Germ. Déva, Salzburg, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Dees-akna, Baassen (c. a.).
- floralis** L. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Kronstadt, Schässburg, Szováta (c. a.); Hermannstadt, Remete (Nagyenyed, Ormay).
- var. **formicarius** Goeze. Kronstadt, Schässburg, Klausenburg (c. a.).
- gracilis** Panz. Hermannstadt, Mezőség (Záh, Bielz); Kronstadt, Schässburg (c. a.).
- hispidus** Rossi. Schässburg (einmal im Körper einer abgestorbenen *Sitaris muralis*, 1. Oktober, c. a.); Hätzeg (Deubel).
- antherinus** L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
- bifasciatus** Rossi. Hätzeg, Neudorf bei H., Gross-Schenk, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed, Karlsburg (c. a.).
- ater** Panz. Rotenturm (c. a.).
- fenestratus** Schmidt. Hermannstadt (Bielz).
- flavipes** Panz. Rotenturm (Altufer, Bielz); Kronstadt (c. a.).
- axillaris** Schmidt. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz); Unter-Kerz, Nagyenyed, Schässburg (c. a.); Breindorf (Priesterhügel, Deubel).

sellatus Panz. Honigberg (Altfluss, Deubel).

unicolor Schmidt. Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).

691. *Ochthenomus Schmütt.*

tenuicollis Rossi. Fogarasch (Altufer, Bielz).

LXI. Meloidae.

Meloini.

692. *Meloë Linné.*

Die Käfer findet man unter Blättern und im Gras, die Larven leben parasitisch in verschiedenen Bienenestern.

(Proscarabaeus.)

proscarabaeus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

violaceus Marsh. Wie der vorige verbreitet.

autumnalis Oliv. Neudorf, Hosszufalu, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay).

(*Meloë* i. sp.)

hungarus Schrnk. Hermannstadt (a. B.), Hammersdorf, Mediasch, Torda, Mezőség (Gyeke, Bielz); Salzburg, Buzd (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Schässburg (in Weingärten, c. a.).

uralensis Pall. Zibinsgebirge (Bielz); Salzburg (Ormay).

decorus Brandt. (pygmaeus Redtenb.). Präsbe, Fogarascher Gebirge, Marienburg, Hätzeg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt, Schässburg (c. a.).

cicatricosus Leach. Gross-Scheuern, Neudorf, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

coriarius Brandt. Hammersdorf, Resinar (Ormay).

variegatus Donovan. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marienburg b. Kr., Mediasch, Dees (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Honigberg (Deubel); Klausenburg (Müller).

brevicollis Panz. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Szunyoksók b. Kr., Karlsburg (c. a.); Bodola (Deubel).

rugosus Marsh. Hätzeg, Déva, Talmatschel, Fogarasch, Hosszufalu, Schässburg, Mezőség (Záh, Bielz); Nagylak (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt (c. a.); Klausenburg (Müller).

scabriusculus Brandt. Zood, Marienburg b. Kr., Schässburg (Bielz); Karlsburg, Hammersdorf, Orlat (c. a.); Stolzenburg, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Lydini.

693. *Cerocoma Geoffroy.*

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen an sonnigen Bergabhängen.

Schreberi F. (Gross-Scheuern (Bielz), Hätzszeg (c. a.).

Schäfferi L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Mediasch (Bielz).

Mühlfeldi Gyll.

var. *Kunzei* Friv. Klausenburg (Bielz)

694. *Zonabris Harold.*

variabilis Pallas. Gross-Scheuern (Bielz); Mezöség Gyke, Méhely).

floralis Pallas. Poplaka, Resinar, Repts. Mezöség Záh, Gyke, Bielz); Rejczat auf einer Bergwiese im Tale des Riu mare auf blühenden Pflanzen, wenn ich mich recht erinnere, vornehmlich Scabiose, c. a.).

var. *spartii* Germ. Gross-Scheuern (Bielz, 1 Ex. aus der Fuss'schen Sammlung, c. a.).

695. *Lydus F.*

trimaculatus. Neudorf b. H. (Bielz); Mezösámsond (Méhely).

(Halosimus.)

collaris F. Gross-Scheuern (Zakelsberg? Bielz).

chalybaeus Tausch. Mezöség Gyke, Bielz).

Lyttini.

696. *Lytta Fabr.*

vesicatoria L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

697. *Zonitis Fabr.*

immaculata Oliv. (mutica Scriba). Mediasch (Bielz).

698. *Enzonitis Semenow.*

sexmaculata Oliv. Gross-Scheuern (Bielz); Hätzszeg Yurfu Urlea. Bergabhang oberhalb des Bahnhofes Váralja-Hätzszeg auf blühenden Pflanzen, c. a.).

fulvipennis F. Klausenburg (Bielz).

699. *Stenodera Eschscholtz.*

caucasica Pall. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, S.-Regen, Mezöség (Záh, Nagyenyed, Bielz); Hahnbach (Albrecht).

Deufel bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Kronstadt.

700. *Hapalus Fabr.*

bipunctatus Germ. Mediasch, Klausenburg (Bielz).

bimaculatus L. S. Regen Bielz); Nagyenyed, Szamosujvár (Ornay).

necydaleus Pall. Schässburg (Bielz).

Das Tier befindet sich gegenwärtig nicht mehr in meiner Sammlung, weshalb auch eine nochmalige Ueberprüfung unmöglich ist. Da die Zeit der Bestimmung des Tieres in die ersten Jahre meiner Sammeltätigkeit fällt, ist immerhin das Vorkommen dieser Art bei uns nicht sicher gestellt.

creticus Friv. S.-Regen (Bielz).

Das Vorkommen dieser Art erscheint sehr fraglich, eher dürfte B. spectabilis bei uns zu finden sein.

701. *Sitaris Latreille.*

muralis Forst. Mediasch, S.-Regen (Bielz);

Schässburg (ich sammelte diese Art mehreremale an Häusern, deren Dächer mit Schindeln gedeckt und innen mit Wespen-Nestern besetzt waren im August, c. a.); Hermannstadt (Albrecht); S.-Regen (Müller).

LXII. Rhipiphoridae.

Pelecotomini.

702. *Pelecotoma Fischer.*

fennica Payk. Klausenburg, Gyalu (Bielz); Hätzszeg (an einem geschälten alten Weidenstamm, c. a.); Kronstadt (Burzen, Viehweide, Deubel).

Rhipiphorini.

Die Arten leben parasitisch in den Nestern einer Erdwespe.

703. *Metocens Gerstaecker.*

paradoxus L. Kronstadt, Schuler Gebirge (Bielz); Pojane (Schulerau, von einer Fichte geklopft, Deubel).

LXIII. Mordellidae.

Scaptiini.

704. *Scaptia Latreille.*

fuscata Müll. Holzmengen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt, Broos (Ornay); Baassen (im morschen Holze eines alten Nussbaumes, c. a.).

705. *Tomoxia Costa.*

biguttata Gyll. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Büdös (Bielz); Borszék (Fichtenstumpf), Szováta (aus einem verpilzten Rothbuchen-Stumpf herausgehauen, 5. Juni, c. a.).

706. *Mordella Linné.*

perlata Sulz. Kronstadt (c. a.).

maculosa Naezen. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk (Bielz); Frecker Gebirge (an den Wurzeln einer Fichte), Bistra, Borszék, Rotenturm (an den Schwämmen, welche an den Fichtenstämmen der Uferbefestigung wuchsen, in Mehrzahl, c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).

aurofasciata Comoll. Baróth (Méhely).

bisignata Rdtb. Gross-Scheuern, Reps (Bielz); Schässburg, Rotenturm (c. a.).

fasciata F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

aculeata L. Durch das ganze Gebiet, wie die vorige Art auf blühenden Pflanzen.

707. *Conalia Mulsant.*

Baudii Muls. Rotenturm (an Schwämmen der Uferbefestigung, wie *Mordella maculosa*, Ende Juni, c. a.).

708. *Mordellistena Costa.*

abdominalis F. Kronstadt, Zernest, Vargyastal, Hátszeg (Deubel); Szováta (auf Schirmpflanzen des Bachufers, 5. Juni, c. a.).

Das ♂, welches ich mit zahlreichen normal gefärbten Weibchen bei Szováta sammelte, ist bis auf die Dornen der Hinterschienen ganz dunkel: die Fühler sind vom vierten Gliede an der Unterseite dicht, kurz, weiss gewimpert.

a. *maculicollis* Schilsky. Szováta (c. a.).

humeralis L. Zood, Fogarasch (Bielz).

a. *axillaris* Gyll. Porumbach, Kerzer Gebirge (Bielz).

lateralis Oliv. Girelsau, Marpod, Kronstadt (Bielz).

neuwaldeggiana Panz. (brunnea F.). Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

nana Motsch. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

parvula Gyll. Hátszeg, Neudorf b. H., Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay); Schässburg (c. a.); Nagybagymás, Kronstadt (Deubel).

a. *inaequalis* Muls. Klausenburg (Bielz); Schässburg (18. August, c. a.).

episternalis Muls. Dees, Szamosujvár, Gyeke (Méhely).

brevicauda Boh. Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Reps (Seidlitz); Baassen, Schässburg, Alsó-Rákos, Borszék (c. a.).

micans Germ. Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Salzburg, Gyógy (Bad, Ormay); Kronstadt, Hátszeg, Schuler-Gebirge (Deubel).

pumila Gyll. Hátszeg, Gross-Scheuern, Mediasch, Kronstadt, Hosszufalu (Bielz);

Hermannstadt (Ormay); Schässburg Baassen, Borszék (c. a.).

stenidea Muls. Hermannstadt (Seidlitz); Borszék, Petrozsény (c. a.).

*Anaspini.*709. *Pentaria Mulsant.*

badia Rosenh. Hátszeg, Zibins-Gebirge (Bielz).

710. *Cyrtanaspis Emery.*

phalerata Germ. Kronstadt (im Flieder-gässchen und auf der Zinne geklopft, (Deubel).

711. *Anaspis Geoffroy.*

frontalis L. Retjezat, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Előpatak, Bükszád, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Borszék, Balánbánya, Rotenturm, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

a. *lateralis* F. Puj (bei Hátszeg, c. a.).

a. *verticalis* Fald. Kronstadt (Deubel).

pulicaria Costa. Hermannstadt (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

thoracica L. Retjezat, Mühlbach (roter Berg), Gross-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).

ruficollis F. Zibinsgebirge (Bielz); Puj (b. Hátszeg), Schässburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas (Deubel).

Kiesenwetteri Em. Schanta (auf blühender Spirea und Astrantia, Ormay); Bistra, Retjezat, Borszék (c. a.); Kronstadt, Hátszeg, Nagybagymás, Zernest (Deubel).

(Nassipa.)

flava L. Hátszeg, Negovan, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, S.-Regen (Bielz); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel); Bistritz (Müller); Szováta (c. a.).

rufilabris Gyll. Hátszeg, Gross-Scheuern, Marktschelken, Előpatak, Bükszád (Bielz); Schanta, Gyógy (Ormay); Retjezat, Schuler-Gebirge, Schässburg, Kronstadt (c. a.); Zernest (Deubel).

melanostoma Costa. Schulergebirge, Schässburg, Szováta (c. a.).

(Spania.)

subtilis Hampe. Siebenbürgen.

(Laricia.)

palpalis Gerhardt. Hátszeg, Schässburg (c. a.).

(Silaria.)

brunnipes Muls. Petrozsény, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hátszeg (Deubel).

varians Muls. Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).
a. collaris Muls. Borszék, Rotenturm (c. a.).

LXIV. Melandryidae.

Tetratomini.

712. *Tetratoma* Fabr.

fungorum F. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, S.-Regen (Bielz); Präsbe (Ormay); Kronstadt (Zinne, Deubel).
ancora F. Präsbe, Porumbach, Surul, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz, besonders auf getrockneten, verpilzten Buchenästen); Rodnagelirge, Csukás, Büdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Eustrophini.

713. *Eustrophus* Latreille.

dermestoides F. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Fogarasch, Görgény-Gebirge (Bielz); Schässburg (am Fusse alter Eichen unter Moos, entschlüpfen sehr leicht durch ihre parzelnden raschen Bewegungen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

714. *Hallomenus* Panzer.

hinotatus Quens. Negoi (unterhalb der Schutzhütten, an Pilzen, Deubel); Bistra (an den Wurzeln eines verpilzten Fichtenstumpfes, c. a.); Nagybagymás (von einer Fichte geklopft, Deubel).
axillaris Illig. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Orchesini.

715. *Orchesia* Latreille.

Die Arten leben an vertrockneten und verpilzten Aesten und Baumstämpfen.

micans Panz. Zibinsgebirge, Neudorf, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).
acicularis Reitter (picea Seidlitz nec Herbst). Rotenturm, Büdös, Schässburg, Oláhfalú, Rosenau b. Kr. (c. a.).

Die 7 Exemplare meiner Sammlung konnte ich mit *Orchesia micans* Panz. aus Dessau vergleichen. Sie stimmen mit den Merkmalen, welche Seidlitz F. transs. 569 von *O. picea* Herbst hervorhebt, vollkommen überein. Da *O. picea* Herbst jedoch zu *O. micans* Panz. als Synonym gebürt, habe ich zu *O. acicularis* als synonym gesetzt *O. picea* Seidl. Dagegen ist mir *O. micans* Panz. aus Siebenbürgen nicht vorgekommen.

(Cicoca a.)

minor Walk (epico'a Rosenh.) Schässburg, Büdös, Bistra, Kronstadt (c. a.); Schanta (Ormay) Bucsecs (subalpin), Nagybagymás, Zernest (Deubel).

undulata Kr. Ritivoi b. Kr., Büdös, Schässburg (c. a.); Zernest, Kronstadt, Rodnagelirge (Deubel).

fasciata Payk. Götzenberg, Anna-See (Bielz); Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.); Bucsecs (subalpin, Deubel).

blandula Braunsik. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz). Bucsecs (subalpin, Deubel); Ratosnya, Borszék (c. a.).

var. transsylvanica Reitter. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta, Gyógy (Bad, Ormay); Schässburg, Büdös (c. a.).

var. carpathica Reitter. Schulergelirge, Csukás (c. a.).

grandicollis Rosenh. Kerzer Gebirge, Kronstadt (?) (Bielz).

716. *Abdera* Stephens

(Cicoca a.)

affinis Payk. Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

flexuosa Payk. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Abdera i. sp.

quadrifasciata Curt. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Praszaka (bei Zakatna aus verpilztem Buchenholz gesiebt, c. a.); Zinne (Deubel).

717. *Direaea* Fabr.

australis Fairm. 4-guttata Reichenb. nec Payk.). Oláhfalú, Oláhlaposhánya (Bielz).

Seidlitz (F. transs. p. 571) hält für wahrscheinlich, dass sich die Angabe Bielz's, welcher die 11. 4-guttata Payk. für Siebenbürgen anführt, auf 4-guttata Reichenb. beziehe; ihm folgend, nehme ich daher nur letztere in unser Verzeichnis auf.

718. *Phloeotrya* Stephens.

rufipes Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz).

scabra n. sp. Schässburg (Breite, 2 Ex., c. a.).

Phloeotrya scabra n. sp. Länge 9—10 mm.

Dem *Ph. rufipes* ähnlich, aber grösser, mehr cylindrisch, Oberseite mit weniger dichter, feinerer und kürzerer gelblich-brauner Behaarung. Kopf bis über die Augen in den Halsschild einziehbar. Stirne mässig fein und dicht, in der Mitte sparsamer punktiert, glänzend, heller oder dunkler bräunlichgelb, Oberlippe im letzteren Falle heller, Augeninnenrand sehr leicht ausgerandet, am Augenunterrande eine seichte Fühlerfurche. Fühler schlanker als bei *Ph. rufipes* und etwas länger als Kopf und Halsschild zusammen, bei *Ph. rufipes* etwas kürzer, das dritte Glied mehr als 1¹/₂, so lang als das zweite und so lang als das vierte, die fol-

genden etwas kürzer, aber alle fast doppelt so lang als breit, hell rötlichgelb so wie die Taster, deren messerförmiges, gerades Endglied etwa so lang ist als das zweite und dritte Glied zusammen. Halsschild dunkelbraun, fast so lang als hinten breit, die Seiten gerundet, nach hinten wenig mehr als nach vorn verengt, der Vorderrand stark gerundet vorgezogen, der Hinterrand ist gegen das Schildchen etwas vorgezogen und gegen die Hinterecken schief, aber geradlinig abgeschnitten, die Hinterecken dadurch sehr stumpfwinklig, etwas abgerundet. der Seitenrand bis in die sehr stumpfen Vorderecken deutlich, die Scheibe gewölbt, vor dem Hinterrand schwach quer niedergedrückt und mit einer seichten, nach vorn abgekürzten Mittelfurche und jederseits derselben mit seichten Längsrillen, ziemlich dicht grob, rauhkörnig querrunzelig punktiert, matt. Die Flügeldecken dunkelbraun, an der Basis kaum breiter als der Halsschildhinterrand, cylindrisch, mit kaum angedeuteten Streifen, wesentlich feiner und sparsamer, querrunzelig rauh punktiert, glänzender als der Halsschild. Die Unterseite bei dem einen Exemplar samt den Beinen hell rötlichgelb, bei dem andern Exemplar mehr hell bräunlichgelb.

Demnach unterscheidet sich die neue Art von *Ph. rufipes* durch bedeutendere Grösse, mehr cylindrische Gestalt, wesentlich gröbere und rauhere Punktierung der Oberseite, die auf den Flügeldecken merklich feiner ist als auf dem Halsschild, hellere Färbung, längere und schlankere Fühler, längeres Maxillartasterendglied usw.

Ich sammelte zwei Stück dieser Art, das eine unter Eichenrinde, das andere an einem Weissbuchenstumpf, letzteres am 12. August.

719. *Xylita Paykull*.

buprestoides Payk. (*laevigata* Panz.). Klausenburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a., 3 Ex.); Rodnagebirge (Valea Vinului, Deubel); Marosgebirge (Müller).

livida Sahlb. Königstein (Juli, unterhalb Kápu-Tamács von Fichten geklopft, Deubel).

720. *Serropalpus Hellenius*.

barbatus Schall. Hermannstadt, Zibinsgeb., Kronstadt, Hosszufalu, Marosgebirge (Bielz); Schässburg (im Zimmer eines neugebauten Hauses, dessen Fussboden vor kurzem gelegt worden war, daher wahrscheinlich im Fichtenholz lebend, 24. Juni 1897); am Gyilkostó im Fluge gefangen. Nagyhagymás und Schulergebirge geklopft (Deubel).

Hypulini.

721. *Hypulus Paykull*.

quercinus Quens. Hermannstadt, Neudorf b. H., Götzenberg, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (im Moos alter Eichen, wie der folgende), Alsó-Rákos (c. a.).

bifasciatus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Resinar (Ormay); Rotenturm, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); S. Regen (Müller).

722. *Marolia Mulsant*.

variegata Bosc. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezal, Bucsecs, Prásbe, Paringul (von Latschen und Fichten geklopft, Deubel).

723. *Zilora Mulsant*.

sericea Sturm (Eugeniae Ganglb.). Schulergeb. (Ganglb., Deubel, an Schwämmen und unter der Rinde gestürzter Fichten); Zernest (Königstein 30. Mai 1891 am Kämme der Spirle, ebenfalls unter Fichtenrinde, Deubel).

Melandryini.

724. *Melandrya Fabr.*

Die Arten leben in verpilztem, morschem Holz, namentlich der Weissbuchen.

dubia Schall. Prásbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Szováta (c. a.); Bodzaer Gebirge (Agárka), Rosenauer Gebirge (Götzentempel, Deubel).

caraboides L. Ilátszeg, Zibinsgeb., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Görgénygebirge, Dees (Bielz); Rosenauer Gebirge, Honigberg, Szurdok-Pass, Schässburg, Szováta (c. a.); Rodnagebirge (Deubel).

barbata F. (*flavicornis* Duft., rufibarbis Seidl. nec Schall.). Götzenberg (Bielz); Csukás (aus dem Holze einer gestürzten Rotbuche unter einem Schwamm herausgehauen, c. a.); Schässburg (einmal aus einem Weissbuchenstumpf, einmal aus Espenholz gewonnen, c. a.); Bucsecs (Valea Jeppi, Deubel).

coerulescens n. sp. Schässburg (1 Exemplar Langheltgraben unter Espenrinde, ein 2. Exemplar Mühlenham aus einem verpilzten Weissbuchenstumpf, c. a.).

Melandria coerulescens n. sp.

Melandriae barbatae Fabr. proxima, colore, prothorace medio elytrisque non sulcatis et statura angustiore sat diversa. Nigra, palpi tarsorumque articuli ultimi testacei, elytra coerulescentia. Angusta, apicem versus haud ampliata. Frons dense subtiliter punctata medio fovea rotunda instructa. Antennarum articulus 3. quarto nonnihil brevior. Prothorax convexus, basi elytris vix angustior, lateribus usque ad medium parallelus, abinde ad apicem rotundat-angustatus, nitidus, modice punctatus, medio sublaevigatus, ante basin utrinque fovea subrotunda impressus. Elytra parallela, dense punctata, striata, haud sulcata, striis basin versus apice obsoleteioribus. Länge 10—11 mm.

Durch die schmale, parallele, nach hinten nicht erweiterte Körperform der *Melandria barbata* F. nahestehend, von ihr jedoch unterschieden durch noch schmalere Gestalt, durch schwarze Fühler, an denen höchstens die Spitze des letzten Gliedes heller ist, schwarze Beine mit rötlichgelbem dritten und vierten Tarsenglied, erst von der Mitte nach vorn verengtes Halsschild, dessen Mittellinie höchstens in der Mitte schwach geglättet ist, kürzere etwas rundliche, tiefe Basalgrüben am Halsschildhinterrand, weniger tief gestreifte bläulichschwarze Flügeldecken, deren Streifen gegen Basis und Spitze seichter werden, verschieden.

Verglichen mit *Melandria barbata* F. vom Csukás; *M. caraboides* L. von verschiedenen Fundorten und mit *M. dubia* Schall. aus Szováta. Zwei Exemplare, das eine jedoch nicht ausgefärbt, ganz braun mit bläulichem Schimmer auf den Flügeldecken, aber auch bei diesem sind Fühler und Beine bis auf die beiden letzten Tarsenglieder dunkelbraun gefärbt und nicht hellrötlichgelb, wie bei *M. barbata* F.

725. *Pryganophilus Sahlb.*

ruficollis F. Kerzer Gebirge (Bielz).

Osphrini.

726. *Osphyia Illiger.*

bipunctata F. (♂ *clavipes* Oliv.). Kronstadt (Zinne), Mediasch, Klausenburg (Bielz); Reps (c. a.).

LXV. Lagriidae.

Lagriini.

727. *Lagria Fabr.*

atripes Muls. Hermannstadt (Bielz); Dees, Szamosújvár (Méhely); Bistritz (Deubel).

hirta L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auf Gebüsch nicht selten.

Agnathini.

728. *Agnathus Germ.*

decoratus Germ. Hätzeg (Bielz).

LXVI. Alleculidae.

Alleculini.

729. *Allecula Fabr.*

morio F. Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

(*Upinella*.)

aterrima Rosenh. Hermannstadt, Gross-Schenern, Zood, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Gross-Schenk, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).

730. *Prionychus Solier. Eryx*

ater F. Salzburg, Hermannstadt, Heltau, Zood (Bielz); Schässburg (Juli, Breite, unter der Rinde eines Eichenstumpfes, c. a.); Kronstadt (Hornissenest), Honigberg (angeflogen an einem Hause), Nussbach (im Walde unter Spänen, Deubel).

Fairmairei Reiche (laevis Seidl.). Marosgebirge (Hatosnya, Bielz).

731. *Hymenalia Mulsant.*

rufipes F. Erzgebirge (Boholt). Kronstadt (Zinne); Nussbach, Krizba (Bielz); Puj (bei Hätzeg, c. a.).

732. *Gonodera Mulsant.*

(*Pseudocistela*.)

ceramboides L. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Tömöser Pass, Predeal, S.-Regen (Bielz); Nagyenyel (c. a.).

var. *serrata* Chevr. Hosszufalu (Bielz); Előpatak, Schässburg, Borszék (c. a.); Tusná, Büdös (Méhely); Rodnagel, Kronstadt, Nussbach (Deubel).

(*Gonodera* i. sp.)

luperus Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(*Isomira*.)

antennata Panz. Kronstadt (Bielz).

murina L. Hermannstadt, Kronstadt, Tömöser Pass, Klausenburg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Erzgebirge (Müller).

a. *evonymi* F. Kronstadt (Zinne), Honigberg (Deubel).

a. *maura* F. Rosenauer Burgberg (Méhely); Puj (bei Hätzeg), Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. *thoracica* F. Kronstadt (Méhely); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).

733. *Mycetochara Berthold.*

Die Arten leben an Pilzen in altem Holz.

(*Mycetophila*.)

livipes F. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstädter Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Paringul (subalpin, Deubel).

axillaris Payk. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).

var. *morio* Redt. Zalatna, Schässburg (Breite, auf Eichenschwämmen, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(*Ernobius*.)

humeralis F. (*bipustulata* Illig.). Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Szováta (c. a.); Klausenburg (Müller).

graciliformis Reitter. Zalatna, Paringul, Rejczat (♂, ♀, c. a., vidit Reitter).

linearis Ill. Hätzeg, Poplaka, Resinar, Götzenberg, Talmesch, Girelsau, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Karlsburg, Baassen (c. a.).

pygmaea Redt. Kronstadt (Deubel); Hätzeg (c. a.).

Omophlini.

734. *Podonta Mulsant.*

nigrita F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Gyergyó-Tölgyes, Nagyenyed (Ormay).

735. *Cteniopus Solier.*

sulphureus L. Mühlbach (r. Berg), Nependorf, Kronstadt (Zinne), Hargitta, Schässburg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kerzer Geb. (Ormay); S.-Regen (Müller).

a. *sulphuratus* Gmel (bicolor F.). Kronstadt (Zinne, Méhely, Deubel).

736. *Omophlus Solier.*

(*Odontomorphus*.)

lepturoides F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Michelsberg, Gölzenberg, Talmatschel, S.-Regen, Dees, Mezöség (Gyeke, Bielz); Alsó-Rákos, Karlsburg, Nagyenyed, Szurduk-Pass (Pilis, c. a.).

(*Omophlus* i. sp.)

rugosicollis Brull. Ober-Komana (Méhely, 11. Mai).

LXVII. Tenebrionidae.

Blaptini.

737. *Blaps Fabricius.*

lethifera Marsh. (similis Latr.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

mortisaga L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

mucronata Latr. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

halophila Fisch. (*longicollis* Slev., *confusa* Men.). Kronstadt (Bielz); Karlsburg (c. a.).

Platyscelini.

738. *Platyscelis Latreille.*

gages Fischer. Torda (Bielz); Klausenburg (Müller).

Pedinini.

739. *Pedinus Latreille.*

temoralis L. Déva, Csib (Erzgebirge), Hammersdorf, Gross-Scheuern, Zood, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Rehó b. H. Nagyenyed (Remete), Gyógy (Bad, Ormay); Pilis (Nagyenyed), Karlsburg (an trockenen

Bergabhängen unter Steinen und im Grase, c. a.).

Opatrinl.

740. *Melanimum Steven*

(*Microzoum* Redt.)

tibiale F. Kronstadt (Bielz).

741. *Opatrum Fabricius.*

sabulosum L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, an trockenen, sandigen Orten.

742. *Opatroides Brullé.*

punctulatus Brull. Szombat (Bielz).

743. *Lichenum Blanchard.*

pictum F. Hammersdorf (Bielz).

Crypticini.

744. *Crypticus Latreille.*

quisquilius L. Im Berg- und Hügelland auf trockenen Grasplätzen.

Boletophagini.

745. *Boletophagus Illig.*

reticulatus L. Durch das ganze Gebiet in Baumschwämmen.

interruptus Illig. Retjezat, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (Breite, Eichenschwamm, 1. Mai, c. a.).

armatus Panz. Rotenturm (Deubel).

746. *Eledona Latreille.*

agaricola Herbst. Hermannstadt, Reys, Kronstadt, Hosszufalu, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Marosujvár, Schässburg (in trockenen Eichenschwämmen, c. a.); Nussbach (Deubel).

Diaperini.

747. *Scaphidema Redtenb.*

metallicum F. Hátszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Alsó-Rákos, Klausenburg, Ober-Kerz (Glashütte), Rotenturm (unter Baumrinden, c. a.).

748. *Diaperis Müll.*

An Baumschwämmen.

boleti L. Präsbe, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Borszék, Bükszád, Mediasch, Schäss-

burg, S.-Regen, Borszék (Bielz); Balánbánya (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

749. *Platydema* Lap.

violacea F. (dytiscoides Rossi?). Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt, Klausenburg, Schässburg (unter Baumrinden, Zwetschken, Maulbeerbaum), Rotenturm (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel); Bistritz (Müller).

Dejeani Lap. Hermannstadt, Grossscheuern, Präsbe, Ober-Seles, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád, Schässburg (Bielz, unter der Rinde und an den Wurzeln alter Hollundersträucher, in morschem Eichenholz); Alsó-Rákos, Rotenturm, Szurdok-Pass (c. a.); Sächsisch-Regen (Müller).

750. *Arrhenoplita* Kirby.

(*Haplocephala* Laporte.)

haemorrhoidalis F. ent. Syst. Zibinsgeb., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád (Bielz); Rotenturm, Bistra, Alsó-Rákos (in einem alten Buchenschwamm, c. a.).

751. *Alphitophagus* Stephens.

bifasciatus Say (4-pustulatus Steph.). Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Karlsburg (c. a.); Bistritz (Müller).

752. *Pentaphilus* Latreille.

testaceus Hellw. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a., im Holze alter, kranker Eichen); Kronstadt (Deubel).

Ulomini.

753. *Hypophloeus* Fabr.

(*Corticeus* Crotch).

unicolor Piller (castaneus F. Unter Baumrinden durch das ganze Gebiet verbreitet.

(*Paraphloeus*.)

pini Panz. Retjezat, Borszék, Borgóer Pass (Bielz).

suturalis Payk. (bivittatus Reitter). Siebenbürgen.

bicolor Oliv. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (unter der Rinde der Eiche und der italienischen Pappel, des Maulbeerbaumes, des Ahorns, c. a.).

fasciatus F. Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.); Neustadt, Honigberg (Deubel).

linearis F. Kronstadt, Tömöser Pass (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Baassen (c. a.).

versipellis Baudi. Schässburg (Hainbuche, Oktober, c. a.).

754. *Caenocorse* Thomson.

(*Palorus* Duval).

depressus F. Hätzeg, Zibinsgebirge, Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Baumgarten (Ormay); Baassen, Alsó-Rákos, Schässburg (im Holze alter Eichen, c. a.).

755. *Tribolium* Mac Leay.

navale F. (ferrugineum F.). Hermannstadt, Zood, Fogarasch, S.-Regen (Bielz).

756. *Melasia* Mulsant.

(*Uloma* Lap.)

culinaris L. Hätzeg, Talmatschel, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Schässburg, Harigitta, Oláhfal, Kérol, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Perroudi Muls. Oláhfal, Kronstadt (c. a.); Zernest (Collius-Chililor, Méhely).

757. *Alphitobius* Stephens.

piceus Ol. (diaperinus Panz.). Zibinsgebirge, Bükszád (Bielz).

ovatus Hbst. (diaperinus Muls., Seidl.). Klausenburg (Bielz).

testudineus Piller (chrysomelinus Hbst.). Hätzeg, Zibinsgebirge, Csiker Gebirge (Bielz).

Tenebrionini.

758. *Menephilus* Mulsant.

cylindricus Hbst. (curvipes F.). Gross-Scheuern, Hammersdorf, Talmatschel, Bükszád, Mezőség (Gy'e. Bielz); Hermannstadt (Ormay); Persäner Gebirge (Deubel).

759. *Tenebrio* Linné.

opacus Duft. Retjezat (Bielz); Schässburg (im trockenen, mehligem Holz einer alten Eiche in Mehrzahl, c. a.).

obscurus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

molitor L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

picipes Herbst. Salzburg, Hermannstadt, Kronstadt, Mezőség (Záh, Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.); Brád (Ormay); S.-Regen (Müller).

760. *Bius Mulsant.*

thoracicus F. Kovászna (Juli 1893, beim Sägewerk Gyulafalva unter trockenen Fichten? oder Tannenrinne 2 Exempl., Deubel).

761. *Boros Herbst.*

Schneideri Panz. Kronstadt (in der Stadt im Flüge gefangen, Deubel).

Helopinae.

762. *Laena Latreille.*

viennensis Sturm (pimelia F.). Hätzeg. Heltau, Michelsberg, Kronstadt (Bielz).
Ormayi Reitter. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Königstein, Kronstadt, Tömöser Pass (Bielz); Schässburg, Borszék, Ratosnya, Frecker Gebirge (Serbota), Rotenturm, Hermannstadt, Toroczko, Szováta, Szurduk-Pass (c. a.); Baumgarten, Michelsberg, Heltau, Gyógy (Bad), Felső-Orbó (Ormay); Klausenburg (Müller).

L. Reitteri Wse. wurde nicht in das Verzeichnis aufgenommen, da Bielz die *L. Ormayi* Reitter nicht kannte, welche die in Ungarn vorkommende *L. Reitteri* zu vertreten scheint.

Hopfgarteni Weise. Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm (c. a.); Szurduk-Pass (Deubel).

763. *Enoplopus Solier.*

(*Acanthopus* Latr.)

velikensis Piller (caraboides Petag., dentipes Rossi). Hätzeg, Déva, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Sächs.-Regen (Bielz); Hätzeg (an Eichenstümpfen, c. a., Deubel); Schässburg (c. a.).

764. *Helops Fabr.*

Helops badius Redt. scheint irrtümlich in unser Verzeichnis aufgenommen worden zu sein, da Deubel erklärt, die Art nur in Herkulesbad gesammelt zu haben, nicht aber in Kronstadt. (*Stenomax.*)

lanipes L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

(*Nalassus.*)

laevicostriatus Goeze (striatus Geoffr. Fourcr., caraboides Panz.). Hätzeg. Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz).

quisquilius Sturm (Fabricii Gemm. Bielz). Hätzeg, Neudorf b. H., Holzmengen, Talmatsch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Kronstadt (Deubel).

picipes Küst. Kronstadt (Bielz).

Auch *Helops picipes* Küst. ist Deubel aus Kronstadt nicht bekannt; demnach ist das Vorkommen auch dieser Art in Siebenbürgen zweifelhaft.

Phytophaga.

LXVIII. Cerambycidae.

Spondyliini.

765. *Spondylis Fabr.*

buprestoides L. Heltau, Bükszád (Bielz).

Prionini.

766. *Prionus Geoffroy.*

Auf Weidengebüsch.

coriarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

767. *Aegosoma Serville.*

scabricorne Scop. Erzgebirge (Guraszada, Bielz).

Lepturini.

768. *Rhagium Fabricius.*

sycophanta Schnk (mordax F.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Holzmengen, Heltau, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Nagyenyed (an Eichen und auf Gebüsch in der Nähe alter Eichen, c. a.).

mordax Deg. Schielthal, Hermannstadt, Götzenberg, Präshe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Görgény (Bielz); Rotenturm, Bistra (Ormay); Szováta, Rodnagerbirge (c. a.).

(*Rhagium* s. str.)

bifasciatum F. Klausenburg (Bielz).

(*Hargium.*)

inquisitor L. In unseren Gebirgen auf Fichten.

769. *Rhamnusium Latreille.*

bicolor Schnk. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Klausenburg, Mezőség (Záh, Bielz); Rodnagerbirge (Kiságpatak, Deubel).

770. *Xylostens Frivaldszky.*

Spinolae Friv. Präshe, Kronstadt (Zinne, Zaison, Kirschgärten an einer alten Fichte, Scheeser, c. a.); Königstein (Propaster Schlucht an den Steinwänden und auf Buchen), Görgénygeb. (Bielz); Rodnagerbirge (Teszla, Deubel).

771. *Oxymirus Mulsant.*

- cursor* L. Retjezat, Zibinsgebirge, Kerzer, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Bistra, Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg (auf trockenem, abgestorbenen Holz, Reisig etc., c. a.).
 var. *Verneuli* Muls. Rodnagebirge (Deubel).

772. *Stenochorus Fabr.*

- (*Stenochorus* s. str.)
meridianus L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
 (Anisotus.)
quercus Goetz. Gross-Pold, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. Il., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Tinód (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

773. *Pachyta Stephens.*

- lamed* L. Kerzer, Fogarascher, Kronstädter Gebirge, Bükszád, Csiker Geb., Gyergyó (Bielz); Balánbánya (Deubel); Bistra (Ormay, c. a.); Marosgebirge (Müller).
quadrimaculata L. (*bisbignata* Bielz). In unseren Gebirgen verbreitet.
 a. *bimaculata* Schönh. Bistra (c. a.); Hátszegger Gebirge, Lunka negru (Deubel).

774. *Evodinus Leconte.*

(Brachyta Fairmaire).

- clathratus* F. Zibins-Gebirge, Präsbe, Retjezat, Frecker Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Hosszufalu (Bielz); Maloniviz, Schulergebirge (c. a.); Götzenberg, Bistra (Ormay); Rátosnya (Müller).
 var. *brunnipes* Muls. (*nigrescens* Grell.). Präsbe, Kronstädter Gebirge (Bielz).
 var. *reticulata* F. Kronstadt (Zinne, Deubel).

775. *Acmacops Leconte.*

- pratensis* Laich. Zibinsgebirge (Tomnatik, Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Bistra (Ormay).
septentrionis Thoms. Gyulafalva (Papolezi hegység, Méhely); Kronstadt (Hangenstein, Deubel).
 (Dinoptora.)
collaris L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auf blühenden Pflanzen.

776. *Gaurotes Leconte.*

- virginea* L. (*nigricollis* Bielz). In unseren Gebirgen verbreitet.
excellens Brancsik. Siebenbürgen (Catalog. col. Europ. etc. 1906, p. 505).

777. *Cortodera Mulsant.*

- femorata* F. Kronstadt (Hangenstein, Deubel).
humeralis Schall. Déva (Bielz); Hátszeg (Bergabhang oberhalb der Bahnstation Hátszeg-Váralja, c. a.); Vajda-Hunyad (Deubel).
 a. *suturalis* F. Schässburg (c. a.).
holoserica F. Klausenburg (Bielz).

778. *Pidonia Muls.*

- lurida* F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
 a. *Ganglbaueri* Ormay. Mit der Stammform.

779. *Nevellia Mulsant.*

- sanguinosa* Gyll. Maloniviz (Lunka negru, Deubel); Rodnagebirge (Scheeser).

780. *Leptura Linné.*

(Anoplodora.)

- rufipes* Schall. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch, Mezöség (Záh, Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.).
sexguttata F. Kronstadt (Bielz); Schässburg (Fuchsloch auf Schirmblüten); Vargyas (Almäser Höhle, Deubel).
 a. *exclamationis* F. Neudorf, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
nigroflava Fuss. Zibinsgebirge (Dusch, Bielz).
 (Vadonia.)
unipunctata F. Fogarasch, Csiker Geb., S.-Regen (Bielz).
 Ormay (Adatok Erdély bogárfaunájához, 1888) bemerkt in der Fussnote p. 46, es sei im Bielz'schen Verzeichnis statt *L. unipunctata* F. „*impunctata* F.“ zu setzen, ohne jedoch seine Notiz näher zu begründen. Welche Art er mit *L. impunctata* F. meint, kann ich nicht enträtseln mit Hilfe der mir zu Gebote stehenden Literatur; vielleicht *L. tesserula* Charp var. *impunctata* Heyden nec F., die bei uns auch vorkommen soll?

- bisignata* Brull. Mediasch, S.-Regen (Bielz).
livida F. Hermannstadt, Kronstadt, Bükszád, Mediasch, S.-Regen, Mezöség (Záh, Bielz); Hátszeg, Schässburg (c. a.).

- var. *bicarinata* Arnold. Hammersdorf (Ormay).

(Leptura i. sp.)

- erythroptera* Hagenb. Zood, Csiker Gebirge, S.-Regen (Bielz); Nussbach (c. a.).
rufa Brull. Kerzer Gebirge (Bielz).

- maculicornis* Deg. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Marosgebirge, Kronstadt (Bielz); Retjezat, Balánbánya (c. a.).

- ? *tesserula* Charp. Siehe die Note oben!

rubra L. (testacea L., rubrotestacea Ill.).
In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

scutellata F. Zibinsgebirge, Dusch, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád, Tusnád, Schässburg, Marosgebirge, Malomviz, Rotenturm, Nussbach, Rodnagebirge.

var. **ochracea** Faust. Bodzaer Gebirge (Agárka, Magura), Sósmező (Méhely und Deubel); Vargyas bei der Almascher Höhle zusammen mit der Stammform (Deubel).

var. **ochraceipennis** Pic. Bükszád (c. a.).

virens L. In unseren Gebirgen verbreitet.

sanguinolenta L. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Predeal, Oláhfalú, Gyergyó, Borszék, Rodnagebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Bistra, Retjezat, Balánbánya (c. a.).

dubia Scop. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tusnád, Gyergyó, Borszék, Maros-Gebirge, Rodna-Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay); Bistra, Balánbánya (c. a.).

a. **chamomillae** F. Retjezat (c. a.).

(Pachytodes.)

cerambyciformis Schrnk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **transsylvanica** Csiki.

erratica Dalm. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Záh), Hammersdorf, Stolzenburg (Bielz); Schässburg, Klausenburg, Torockó (c. a.); Kovászna (Gyulafalva, Deubel).

(Judolia.)

sexmaculata L. Kronstadt (Bielz); Bistra (Ormay, c. a., auf Schirmpflanzen); Borszék (c. a.); Nagygyémás, Kovászna (Gyulafalva, Deubel).

(Sphenalia.)

revestita L. Gross-Pold (Bielz); Hátszeg (Bergabhang oberhalb der Station Hátszeg-Váralja, c. a.); Kronstadt (Zinne, von Haselgesträuch geklopft, Deubel).

pubescens F. Zibinsgebirge (Bielz); Götzenberg b. Hermannstadt (Albrecht).

nigripes Deg. Klausenburg (Bielz).

aurulenta F. Zibinsgebirge, Kerzer, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Dongókő, Bükszád, Oláhfalú, Schässburg (Bielz).

quadrifasciata L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

maculata Poda. Retjezat, Zibinsgebirge, Talmatschel, Kerzer Geb., Kronstadt, Dongókő, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge, Rodnageb. (Bielz); Rotenturm, Malomviz (c. a.).

arcuata Panz. Präsbe, Talmatschel, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád, Mediasch, Oláhfalú, Marosgebirge (Bielz); Schässburg, Rodnagebirge (c. a.).

aethiops Poda. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Marosgeb.,

Hermannstadt, Michelsberg (Bielz); Schässburg (c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).

melanura L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

bifasciata Müll. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

nigra L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

septempunctata F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Resinar (Ormay); Rotenturm, Malomviz, Schässburg, Baassen (c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel); Sächs.-Regen (Müller).

a. **quinquesignata** Küst. Hátszeg (Deubel).

(Typocerus.)

attenuata L. Hermannstadt, Neudorf, Talmatschel, Leschkirch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, Sächs.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Baassen, Frecker Geb. (Serbota), Rotenturm (c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).

781. *Allosterna Mulsant.*

tabacicolor Deg. (chrysomeloides Schrank.).
Durch das ganze Gebiet verbreitet.

782. *Grammoptera Serville.*

ustulata Schall. Heltau, Götzenberg (Bielz); Schässburg (c. a.).

ruficornis F. Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Szurduk-Pass (c. a.).

variegata Germ. (femorata Muls.). Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Honigherg (Altfluss, Deubel).

Necydalini.

783. *Necydalis Linné.*

major L. Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a., Lazareth); Salzburg (Ormay); Kovászna (an Weidenbäume angefliegen), Kronstadt (aus Löchern alter Weiden, Deubel); S.-Regen (Müller).

ulmi Chev. (Panzeri Harold). Karlsburg, Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

784. *Caenoptera Thomson.*

minor L. Hermannstadt, Girelsau, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Birtihalm, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Schullergebirge, Rodnagebirge, Szurduk-Pass (auf Fichtenholz, frisch geschnittenen Brettern, c. a.); Sächs.-Regen (Müller).

(Linomius.)

umbellatarum Schrb. (minima Scop.). Hermannstall, Gross-Scheuern, Kronstall, Schässburg, S. Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Baassen, Szováta, Borszék (c. a.).

Kiesenwetteri Muls. Schässburg (c. a.); Vajda-Hunyad (Deubel, c. a., unter den Weingärten von Reising geklopft).

Cerambycini.

785. *Stenopterus Stephens.*

flavicornis Küst. Mühlbach, Klausenburg (Bielz).

rufus L. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, S. Regen, Hätzeg, Nussbach, Schässburg (Bielz); Szováta, Baassen (c. a.); Remete (Nagyenyed, Ormay); Zernest (Deubel).

ater L. (praecustus F.). Hermannstadt (Bielz).

786. *Dilus Serville.*

fugax Oliv. Gross-Pold, Gross-Scheuern, Götzenberg (Bielz); Schässburg (auf blühender *Euphorbia cyparissiae*, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Rossenu, Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).

787. *Callimus Mulsant.*

angulatus Schrank. Zibinsgebirge, Csiker Gebirge, Balánbánya (Bielz).

788. *Obrium Curtis.*

cantharinum L. Baróth (Méhely).

brunneum F. Héviz, Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Retjezat, Schulergebirge (c. a.); Zernest (Crepatura, Deubel).

789. *Cerambyx Linné.*

cerdo L. (heros Scop.). Durch das ganze Gebiet in Eichenwäldern.

miles Bon. Gross-Pold, Hermannstadt (Bielz).

Scopoli Füssl. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

790. *Saphanus Serville.*

piceus Luch. Götzenberg, Kronstadt, Klausenburg (Bielz); Retjezat, Rotenturm (auf Rothuche, c. a.); Vargyas (Almásér Höhle, abends an den Lichtgapparat angefliegen, Deubel).

791. *Criocerphalus Mulsant.*

rusticus L. Talmatschel, Kronstädter Gebirge, Bükszá, Olálfalu, Marosgeb. (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Balánbánya (c. a.); Nagybagmás, Kovászna (Gyulafalva, Deubel).

792. *Asemum Eschscholtz.*

striatum L. Hätzeg, Talmatschel, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay, an Kieferstämmen und deren Wurzeln).

793. *Tetropium Kirby.*

castaneum L. Bistra (c. a.).

var. luridum L. Zibinsgebirge, Gurariu, Präsbe, Sterpu, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge, Bihar-Geb. (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

var. fulcratum F. Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bozauer Pass, Görgény, Marosgeb. (Ratosnya, Bielz); Schanta (Ormay); Borszék, Balánbánya (c. a.).

var. aulicum F. Zibinsgebirge, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge (Bielz); Balánbánya, Paringul, Borszék, Rodnagebirge (c. a.).

fusum F. Bistra (2 Ex., c. a.); Schulergebirge, Königstein (Koltzu Chililor, Deubel).

794. *Anisarthron Redtenb.*

barbipes Schrank. Rotenturm (Ormay, Juli); Bistritz (Müller); Heltau (an einer lebenden Buchenhecke, Albrecht).

795. *Phymatodes Mulsant.*

(Lioderes.)

Kollari Redtenb. Kronstadt (Zinne, von Bäumen geklopft, auch auf Blumen, Deubel, c. a.).

(Protecallidium.)

angustus Kriechb. Borszék (Ormay); Tusnád (Méhely); Bereczk (im Ojtoz-Tal bei der Säge auf Brettern, Deubel).

(Phymatodes Muls.)

glabratus Charp. Klausenburg (Bielz).

pusillus F. (abdominalis Bon.). Hammersdorf, Reps (Bielz).

testaceus L. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz, auf Eichenholz); Schässburg (a. c.).

a. variabilis L. Hätzeg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Mezőség (Gyeke, Bielz); Salzbürg, Nagyenyed (Ormay).

a. similis Küst. Schässburg (c. a.).

a. praecustus F. Kronstadt, Schässburg (c. a.).

(Poecilum.)

alni L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Nagyenyed (Ormay); Szunyokszék (c. a.).

rutipes F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Sächs.-Regen, Dees, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz);

Reps, Klausenburg, Schässburg (Scheuereberg, von Zwetschenbäumen geklopft, c. a.).

796. *Pyrrhidium Fairmaire.*

sanguineum L. In Eichenwäldern durch das ganze Gebiet.

797. *Callidium Fabr.*

aeneum Deg. Zibinsgebirge (Mai, Ormay); Schulergebirge, Schässburg, Klausenburg (c. a.).

violaceum L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

coriaceum Payk. Präsbe (Bielz); Bucsecs (c. a.); Egyeskö bei Balánbánya. Kovászna (Deubel).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu streichen.

798. *Semanotus Mulsant.*

undatus L. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (2 Ex. im Zimmer, wohl vom Brennholz, 1. März, c. a.); Schuler-Gebirge (an das Schutzhaus angefliegen, Deubel).

799. *Hylotrupes Serville.*

bajulus L. Hätzeg, Salzburg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Frecker Geb. (Serbota), Karlsburg, Torockó, Abrudbánya (c. a.); Kerzer Gebirge, Gyógy (Bad), Nagyenyed (Ormay).

800. *Rhopalopus Mulsant.*

hungaricus Herbst. Klausenburg (Bielz).
clavipes F. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees, Mezöség (Gyeke, Záh, Bielz); Rotenturm (Ormay); Klausenburg, Retjezat, Schässburg (Hennerberg auf Zwetschenholz, c. a.).

macropus Germ. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Holzungen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schässburg, Szurdok-Pass, Klausenburg (c. a.); Nagyagymás (Deubel).

femoratus L. Heltau (Bielz); Vajla-Hunyad (Deubel).

801. *Rosalia Serville.*

alpina L. Retjezat, Schielthal, Zood, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Vister Tal, Kronstadt, Tusnád, Marosgebirge, Dees, Bolkatsch (Bielz); Bemete (Nagyenyed), Szamosujvár, Baassen (Ormay); Rotenturm, Malomviz (auf gefälltem Rothuchenholz), Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).

a. *prolongata* Reitter. Siebenbürgen.
a. *transsylvanica* Csiki Siebenbürgen.

802. *Aromia Serville.*

moschata L. Im Berg- und Hügelland verbreitet.

803. *Purpuricenus Fischer.*

Kaehleri L. Broos (Rumes), Grossscheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Girelsau, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (auf Buche), S.-Regen (Bielz); Salzburg, Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay); Haschag (Haschagen), Karlsburg (c. a.).

Clytini.

804. *Plagionotus Mulsant.*

detritus L. Karlsburg, Mühlbach, Zood, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Seps-Sz.-György, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Dees (auf Eichenholz, Bielz).

arcuatus L. Durch das ganze Gebiet in Eichenwäldern.

floralis Pall. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., S.-Regen, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Juli, auf Schirnbüthen, c. a.).

805. *Xylotrechus Chevrolat.*

rusticus L. Götzenberg, Zood, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Resinar, Rotenturm (Ormay); Nussbach, Schässburg, Bistra (c. a.); Hätzeg (Deubel).

pantherinus Saven. Siebenbürgen (Catalogus col. Eur. p. 513).

arvicola Oliv. Hätzeg (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay).

antilope Zett. Kronstädter Geb., Schulergebirge (Bielz); Schässburg (auf *Achillea millefolium*, c. a.).

806. *Clytus Laicharting.*

tropicus Panz. Hermannstadt, Neudorf, S.-Regen (Bielz); Schässburg (von einem Schüler gesammelt, c. a.); Kronstadt (Deubel).

arietis L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Zood, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen, Dees (Bielz); Karlsburg, Rotenturm, Marosujvár (auf Blüten, c. a.).

a. *gazella* F. S.-Regen (Bielz).

tama Muls. Schanta (7. August, Ormay); Schässburg, Rodnaggebirge (c. a.); Papolcz, Keresztény-Gebirge (Méhely); Schulergebirge (Deubel).

rhamel Germ. Neudorf, Zood, Fogarasch, Kronstadt (?), Wolkendorf b. Kr., Tartlau, Tusnád, Mediasch (Bielz); Ratosnya Müller).

a. *temesiensis* Germ. Neudorf, Zood, Gross-Schenk (Bielz).

807. *Cyrtoclytus Ganglb.*

capra Germ. Schielthal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Zood, Kerzer Gebirge, Klausenburg (Bielz); Retjezat, Nussbach (c. a.); Vargastal (bei der Almäser Höhle, Deubel, c. a.); Csukás (Deubel); Marosgebirge (Müller).

808. *Glythanthus Thomson.*

Die Arten leben auf blühenden Pflanzen.

varius F. (*verbasci* L., *ornatus* Herbst). In Berg- und Hügelland verbreitet.

Herbsti Brahm (*verbasci* F.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

sartor F. (*massiliensis* L.). Mühlbach, Salzburg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Nagyenyed, Baassen (c. a.); Kovászna (Deubel).

figuratus Scop. Hätzeg, Gross-Scheuern, Girelsau, Talmatschel, Marpod, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Karlsburg, Baassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay).

speciosus Schneid. Hätzeg, Karlsburg, Mühlbach, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Salzburg, Gyógy (Bad, Ormay); Puj (b. Hätzeg), Topánfalva (c. a.).

809. *Anaglyptus Mulsant.*

mysticus L. Gross-Scheuern, Michelsberg, Götzenberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Hosszufalu, Tusnád, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Hammersdorf, Rotenturm (Bielz); Szurdok-Pass, Malomviz, Szunyokszék (b. Kr., c. a.).

a. *hieroglyphicus* Herbst. Michelsberg, Kronstadt (Bielz); Hammersdorf, Rotenturm, Reschinar, Karlsburg (c. a.).

Lamini.

810. *Neodorcadion Ganglb.*

Die Art lebt auf kiesigem Grasboden, Hutweiden, auf Salzboden.

bilineatum Germ. Déva, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Repts, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Marosujvár, Kalán, Karlsburg (c. a.); Salzburg (Albrecht).

811. *Dorcadion Dalman.*

Die Arten leben auf Grasboden, namentlich Hutweiden.

aethiops Scop. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

fulvum Scop. Mühlbach, Hammersdorf, Repts, Klausenburg, Torda, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz).

Murrayi Küst. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Repts, Kronstadt, Mediasch (Bogeschdorf), Schässburg, Dees (Bielz); Pilis (Nagyenyed), Kalán, Karlsburg (c. a.).

Scopoli Herbst. Mühlbach, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasch, Mediasch, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Marosujvár, Klausenburg, Schässburg, Kalán (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Honigberg (Altfluss, Deubel).

decipiens Germ. Hätzeg (Bielz).

arenarium Scop. Hammersdorf, Örményszékes (Unterweissenburger Komitat), Nagyenyed, Fogarasch (Ormay).

Sollte hier nicht etwa eine Verwechslung vorliegen mit *D. pedestre* var. *gogium* Thomson, da an diesen Orten auch viele andere gesammelt haben?

equestre Laxm. Hermannstadt, Rotenturm (Bielz).

a. *transsylvanicum* Ganglb. Wohl an denselben Lokalitäten.

pedestre Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. *austriacum* Ganglb. (*molitor* Redtenb.). Gross-Scheuern, Hammersdorf, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Salzburg b. Hermannstadt (Deubel); Kalán (c. a.).

var. *gogium* Thomson. Schässburg, Kalán (c. a.); Salzburg bei Hermannstadt (Deubel).

812. *Morimus Serville.*

Man findet die Arten unter Baumstämmen und Holzstücken.

funereus Muls. Hätzeg, Karlsburg, Resinar, Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay); Marosvásárhely (Müller).

asper Sulz. Karlsburg (Bielz, c. a.).

813. *Lamia Fabricius.*

texlor L. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Freck, Kronstadt, Mediasch, Oláhfalva, Görgéuy, Klausenburg (Bielz); Michelsberg, Reschinar, Miriszló (Unterweissenburger Komitat), Tinód (Unterweissenburger Kom., Ormay); Borszék, Karlsburg (c. a.).

814. *Monachamus Curtis.*

Die Arten leben auf gestürzten Fichten, fliegen bei Sonnenschein gern an den Holzvorräten der Sägemühlen an; doch finden sie sich auch auf anderen Holzarten, z. B. Buchen.

Mulsanti Sdl. Paringul, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Bistra, Rodnagebirge, Borszék (c. a.).

sutor L. Zibinsgebirge, Dusch, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Sepsiszentgyörgy, Mediasch, Marosgeb., Borszék, Gyergyó (Bielz); Bistra (Ormay).

Die ♂♂ unseres *M. sutor* besitzen auf den Flügeldecken in der Regel nur sehr spärliche, kleine, weisse Haarflecken, namentlich an den Seiten und auf der Spitze, reichlicher finden sie sich bei den ♀♀, vollständig scheinen sie nie zu fehlen. Doch besitzen beide Geschlechter einen dunkelbraunen Toment, der bei der Stammform weniger bemerkbar ist, da die Härchen zerstreut sind; bei der Varietät *fuscomaculatus* jedoch sind die Härchen, wie bei *M. saltuarius*, zu zahlreichen grösseren und kleineren Flecken (Bürstflecken) verdichtet, im übrigen haben die Tiere ganz die Körperform, Grösse und Flügeldeckenskulptur des typischen *M. sutor*, können also nicht mit *M. saltuarius* verwechselt werden. (Vielleicht passt auf diese Varietät *Lamia sutor* Celerh.) Bemerkenswert ist ein sonst normales Exemplar von der Bistra, welches deutlich geteilten Scutellartoment; sehr spärliche kleine Flecken auf den Flügeldecken und nur fein verteilten braunen Toment, aber einen ebenso deutlichen, tiefen Quereindruck im ersten Drittel der Flügeldecken besitzt wie *M. Mulsanti*; ich bezeichne sie als Kreuzungsform zwischen *M. Mulsanti* und *sutor* mit den wesentlichen Merkmalen des letzteren, *M. sutor* v. *hybrida*.

var. **fuscomaculatus** n. Rodna-Gebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Borszék (c. a.).

var. **hybrida** n. Bistra (c. a., ♂).

galloprovincialis Oliv. Gyergyó, Borszék (Bielz); Bistra (Ormay).

var. **nitidior** Abeille. Bistra (c. a.).

saltuarius Gebl. Rodnagebirge (Bielz); Zernest (Plaju foi, Deubel).

815. *Acanthoderes Serville.*

clavipes Schrank. Zibinsgebirge, Zood, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Nussbach, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Retjezat, Rodnagebirge, Rosenau (c. a.).

816. *Acanthocinus Stephens.*

Die Arten leben auf gefälltem Holz, Reisig etc.

aedilis L. Hermannstadt, Zibinsgebirge, Tushád, Girku, Kronstadt, Schässburg, Marosgeb., Marosujvár (Bielz); Rodnagebirge (Valea Vinului), Nagyhagymás (Deubel).

griseus F. Mediasch, Görgény, Marosgebirge (Bielz); Bistra, Borszék (c. a.); Kronstadt, Bodzaer Gebirge, Kovászna (Gyulafalva, Deubel).

817. *Liopus Serville.*

nebulosus L. Hermannstadt, Grossscheuern, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt, S.-Szt.-György, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Baassen (c. a.); Hammersdorf (Ormay, auf Eichenholz und Reisig, Reisigzäunen).

818. *Hoplosia Mulsant.*

fennica Payk. Kronstadt (Zinne, Deubel, Méhely); Schässburg (c. a.); Tordaer Schlucht (Deubel).

819. *Exocentrus Mulsant.*

adpersus Muls. Fogarasch, Héviz, S.-Regen (Bielz); Malomviz, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hátszeg (Deubel).

lusitanus L. (*balteatus* Gyll.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Arpascher Gebirge, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Retjezat (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Stierlini Ganglb. Unter-Kerz, Schässburg (c. a.); Hátszeg (Deubel).

820. *Pogonochaerus Gemminger.*

Die Arten leben auf gefälltem Holz, Reisig etc.

hispidulus Pill. (*bidentatus* Thomson). Klausenburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel); Szurdok-Pass, Rotenturm, Schässburg (c. a.).

Eugeniae Ganglb. Kronstadt (Deubel, auf Fichten-Scheitholz).

hispidus L. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Stolzenburg, Mezőfele (Torda), Maros-Ludas (Ormay); Alsó-Rákös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

fasciculatus Degeer. Zibinsgeb., Stirpu, Csik, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Hermannstadt (Ormay).

ovatus Goeze. Kronstadt, Wolkendorf (Deubel).

821. *Deroplia Rosenhauer.*

(*Belodera* Thomson.)

Genel Arag. Hermannstadt, Michelsberg (Bielz).

822. *Haploenemia Stephens.*

(*Mesosa* Serville.)

curculionoides L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., S.-Szt.-György, Mediasch, Schässburg, Bistritz, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay); Kronstadt, Tartlau, Präsbe (Deubel).

nebulosa F. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Geb., Gross-Schenk, Kronstadt, Hoszufalu, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Klausenburg (Bielz); Szunyokszék b. Kr., Szurduk-Pass (c. a.); Hátszeg (Deubel).

823. *Anaesthetis Mulsant.*

testacea F. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, Sächs.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Retjezat, Klausenburg, Szunyokszék b. Kr. (c. a.); Salzburg (Ormay).

824. *Calamobis Guerin.*

lilum Rossi (gracilis Creutz). Klausenburg (Bielz).

825. *Agapanthia Serville.*

asphodeli Latr. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch (Bielz).

Dahli Richter Gyllenbali Ganglb., carlui F., S.-Regen, Mezőség (Gyeke), Klausenburg (Bielz); Bistritz Müller; Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

villosoviridescens Degeer (lineatocollis Dou.) Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz); Resinar, Zibinsgebirge, Szamosujvár (Ormay); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

maculicornis Gyll. Kronstadt? (Bielz); Kerzer Gebirge (Stina ursulea, Ormay).

violacea F. (cyanea Hbst.). Gross-Scheuern, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Klausenburg (Müller); Miriszló (Unterweissenburger Komitat), Mühlbach (Ormay); Torda (Deubel); Vajda Hunyad (Deubel, c. a.).

(*Calamobiomorphus*.)

leucaspis Stev. Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.).

826. *Saperda Fabricius.*

(*Anaerea*.)

carcharias L. Nagyág, Hermannstadt, Heltau, Götzenberg, Gross-Schenk, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (auf Espen, c. a.); Szamosujvár (Ormay).

(*Amilia*.)

similis Laich. Gross-Schenk (Scheeser).

(*Campsidia*.)

populnea L. Hammersdorf, Rothberg (b. H.). Talmesch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay).

(*Saperda* i. sp.)

scalaris L. Hermannstadt, Hammersdorf, Präbse, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge,

Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Götzenberg, Zibinsgebirge, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Szurduk-Pass (in Eichenholz, c. a.).

perforata Pall. Fogarasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

(*Argalia*.)

8-punctata Scop. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

827. *Menesia Mulsant.*

bipunctata Zoubk. Hammersdorf, Mediasch, Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz).

828. *Tetrops Stephens.*

praeusta L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

a. *nigra* Kr. Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässburg, Szurduk-Pass, Retjezat (c. a.).

829. *Stenostola Mulsant.*

hirsutula Fröl. Déva, Klausenburg (Bielz). stadt (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg, Szurduk-Pass, Retjezat (c. a.); Klausenburg, Bistritz (Müller).

830. *Pilemia Fairmaire.*

hirsutula Fröl. Déva, Klausenburg (Bielz). *tigrina* Mulsant. Dees, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz).

831. *Phytoecia Muls.*

(*Corderia*.)

scutellata F. Hermannstadt (A. B.), Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Nagyenyed (Ormay).

(*Musaria*.)

Argus Fröl. Kronstadt, Honigberg (Altfluss, Deubel).

rubropunctata Goeze. Mühlbach (r. B.), Hammersdorf (Bielz).

Deubel teilt mir, dass er diese Art in Kronstadt nicht gesammelt habe, der Fundort Kronstadt daher zu streichen sei.

affinis Harzer. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Marpol, Kronstadt, Unter-Kerz, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Karlsburg, Szurduk-Pass (c. a.).

(*Phytoecia* i. sp.)

virgula Charp. Hátszeg, Gross-Scheuern, Mediasch, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Schässburg, Karlsburg, Előpatak (c. a.); Bistritz, Törzburg (Deubel).

pustulata Schrank. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a., von niederen Pflanzen durch Kötschern erhalten); Kronstadt (Deubel).

rufimana Schrank. Klausenburg, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Karlsburg (c. a.).

- ephippium** F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Rotenturm, Marpod, Fogarasch, Klausenburg, Mezöség (Záh, Bielz); Szováta, Marienburg, Schässburg (c. a.).
- geniculata** Muls. Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).
- cylindrica** L. Mühlbach, Hermannstadt, Neppendorf, Gr.-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Mezöség (Gyeke, Záh, Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg, Baassen, Marienburg b. Sch., Szováta (c. a.).
- nigricornis** F. Gross-Pold, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel); Borszék, Szardukpass (c. a.).
- (Opsia.)
- coerulescens** Scop. (virescens F.). Hátszeg, Rotenturm, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Borszék, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg, Bistritz (Müller).
- a. **obscurus** Bris. Schässburg (Siechhofberg, 25. Mai gekötschert, c. a.).
- uncinata** Redtenb. Schässburg (c. a., Fuchslöcher von einer Hecke geklopft).
- molybdaena** Dalm. Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz).

832. *Oberca Mulsant.*

- pupillata** Gyll. Klausenburg, Mezöség (Záh), Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (auf *Lonicera* häufig), S.-Regen (Müller).
- oculata** L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (von einer alten Weide geklopft), Schässburg (Mühlenham von Weidenschösslingen geklopft, Diesö-Szent-Márton (c. a.).
- linearis** L. Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gross-Schenk (Bielz); Kronstadt (Ragado-Tal), Baassen, Schässburg (Postland, von Weidenschösslingen geklopft, c. a.); S.-Regen (Müller).
- euphorbiae** Germ. Gross-Pold, Marpod (Bielz).
- erythrocephala** Schrank. Hátszeg, Girelsau, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Wolkendorf Grund, von *Euphorbia amygdaloides* gekötschert, c. a.); S.-Regen (Müller).

LXIX. Chrysomelidae.

Eupodae.

Donaciini.

833. *Donacia Fabricius.*

- crassipes** F. S.-Regen (Bielz); Nagy-hagymás (Deubel).

- semicuprea** Panz. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Unter-Kerz, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék (Bielz); Maros-ujvár (Ormay).
- dentata** Hoppe. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).
- versicolore** Brahm. Hermannstadt (Bielz).
- Malinovskiyi** Ahr. Honigberg (Altfluss, Deubel).
- aquatica** L. Gross-Scheuern, Hahnbach, Branisch-Wald, Unter-Kerz, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
- brevicornis** Ahr. Hermannstadt (Bielz).
- impressa** Payk. Mediasch, S.-Regen (Bielz).
- marginata** Hoppe (limbata Panz.). Gross-Scheuern, Branischwald, Tartlau, Mediasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- bicolora** Zschach. Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
- obscura** Gyll. Mediasch (Bielz).
- antiqua** Kunze. Kronstadt (Deubel).
- thalassina** Germ. Gross-Scheuern, Branisch-Wald (Bielz); Klausenburg (bot. Garten, Müller).
- vulgaris** Zschach. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (c. a.).
- simplex** F. Gross-Scheuern, Branischwald (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- cinerea** Herbst. Zood, Mezöség (Gyeke, Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

834. *Platynmaris Thomson.*

- sericea** L. Hermannstadt, Neudorf, Kronstadt, Bistritz, Mezöség (Gyeke, Bielz); Schässburg (c. a.).
- discolor** Panz. Kerzer Gebirge, Mezöség (Gyeke, Bielz); Klausenburg (Deubel).
- braccata** Scop. Klausenburg (Bielz); Szováta (c. a.); Mezö-Záh (Deubel, c. a.).
- consimilis** Schrank. Neudorf b. H., Girelsau, Kerzer Gebirge, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Klausenburg, Retjezal, Balánbánya, Rodnagebirge, Szováta (c. a.).
- var. **variabilis** Kunze. Bucsecs, Bodzaer Gebirge (Méhely).
- affinis** Kunze. S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Honigberg (Altfluss, Deubel).

Orsodacnini.

835. *Orsodacne Latreille.*

Die Tiere leben auf Gesträuch.

- cerasi** L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Klausenburg, Zibinsgebirge (Bielz); Bor-

- szék, Schullergebirge, Bistra, Retjezat (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. *limbata* Ol. Schässburg, Héviz (Bielz); Kronstadt (Deubel).
- a. *glabrata* Panz. Kronstadt (Deubel).
- a. *cantharoides* F. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. *Duffschmidtii* Ws. (glabrata F.). Zibinsgebirge (Ormay, auf Spiraea). Kronstadt (Deubel).
- lineola* Panz. (nigriceps Latr.). Hermannstadt (Ormay); Schässburg (von Schlehe geklopft, c. a.); Klausenburg (Bielz).
- a. *nigricollis* Oliv. Gross-Scheuern, Kronstadt (?) (Zinne, Bielz).
- a. *coerulescens* Duft. Hermannstadt, Mediasch (Bielz); Schässburg (auf Schlehe, c. a.).

836. *Zeugophora* Kunze.

- subspinosa* F. Girelsau, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Schässburg (Kokel-ufer auf Weiden, 11. Mai, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).
- flavicollis* Marsh. Hätzeg, Mühlbach (r. B.), Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Borszék, Schässburg (Kokel-ufer auf Weiden und Schwarzpappel, 11. Juli, c. a.).
- a. *australis* Weise. Schässburg (Kokel-ufer auf Weiden, 11. Juli, c. a.).

Criocerini.

837. *Lema* Lacordaire.

Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen.

- puncticollis* Curt. Gross-Scheuern, Neudorf b. Il., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Grossau (Ormay).
- Erichsoni* Suffr. Hätzeg, Schielthal, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt, Malomviz, Puj (bei Hätzeg, c. a.).
- septentrionis* Weise. Hätzeg (Deubel).
- cyanella* L. (lichenis Voet.). Kronstadt (Bielz); Schässburg, Petrozsény, Puj (bei Hätzeg, c. a.).
- var. *abseura* Steph. Kronstadt, Zernest, Hätzeg (Deubel).
- tristis* Herbst (flavipes Suffr.). Hermannstadt, Neppendorf, Hosszufalu (Bielz); Schässburg (c. a.).
- melanopus* L. Hätzeg, Mühlbach, Hermannst., Götzberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Balánbánya, Sächs.-Regen, Bistritz, Dees, Klausenburg, Mezőség (Gyke, Záh, Bielz); Hammersdorf, Grossau, Stolzenburg (Ormay); Baasen, Hätzeg, Rotenturm, Unter-Kerz, Karlsburg, Borszék (c. a.).
- var. *afra* Waltl. Zernest, Rosenau (Deubel).

838. *Crioceris* Geoffroy.

- lilii* Scop. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Héviz, Kronstadt?, Tartlau, S.-Regen (Bielz).
- merdigera* L. Grossau, Neudorf b. Il., Götzberg, Unter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Zibinsgebirge, Nagyenied, Ezerpatak (Háromszék), Szamosujvár (Ormay); Präsaka (Zalana), Klausenburg (auf Türkenbund in Schässburg, Gärten, c. a.).
- 12-punctata* L. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Klausenburg (Schässburg auf Spargel, Bielz).
- 14-punctata* Scop. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyke, Bielz); Karlsburg (c. a.).
- 5-punctata* Scop. Hermannstadt, Leschkirch, Hosszufalu, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Várhegy (Deubel).
- asparagi* L. Bistritz (Müller).

Camptosomata.

Clytrini.

839. *Labidostomis* Redtenb.

Auf verschiedenen Pflanzen, namentlich Weiden.

- tridentata* L. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Petrozsény, Hätzeg (c. a.).
- humeralis* Schneid. Déva, Gross-Pold, Gross-Scheuern, Mediasch, Borszék, Mezőség (Gyke, Záh, Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Klausenburg (c. a.); Paringul (subalpin, Deubel).
- lucida* Germ. Schässburg (Bielz); Unter-Kerz, Karlsburg, Nagyenied (c. a.); Gyógy (Ormay).
- var. *axillaris* Lac. Unter-Kerz (Altufer), Nagyenied (c. a.).
- longimana* L. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Talmatschel, Fogarasch, Kronstadt, Nussbach, Előpatak, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Oláh-falu, S.-Regen (Bielz); Gyógy (Ormay); Dees, Malomviz, Ponor bei Hätzeg (c. a.).
- var. *dalmatina* Lac. Unter-Kerz (Altufer auf Weiden, c. a.).
- var. *pilicollis* Lac. Klausenburg (Bielz).
- cyanicornis* Germ. Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

840. *Tituboea* Lacordaire.

- macropus* Illig. Gross-Scheuern, Klausenburg (Bielz); Schässburg (Sülabhang der Breite, 12. August gekötschert, 1 ♂ und ♀).

841. *Lachnaea Redtenb.*

sexpunctata Scop. Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Dees, Klausenburg (Bielz); Nagyenyed, Karlsburg (c. a.); Tinód (Unterweissenburger Komitat), Szamos-ujvár (Ormay); Hátszeg (Deubel).

842. *Clytra Laicharting.*

quadripunctata L. Hermannstadt, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees (Bielz); Talmesch, Zood (Ormay).

appendicina Lac. Kronstadt, Mezöség (Gyeke, Záh, Bielz); Karlsburg, Klausenburg (c. a.).

laeviuscula Ratzeburg. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

843. *Gynandrophthalma Lacord.*

cyanea F. (*salicina* Lef.). Hátszeg, Hermannstadt, Neppendorf, Grossschauern, Neudorf b. H., Holzungen, Uter-Kerz, Fogarasch, Reps, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék, Mezöség (Gyeke, Bielz); Karlsburg (c. a.).

transsylvanica Frivaldszky. Siebenbürgen.

flavicollis Charp. Bodzaer Geb. (Döblény, Méhely); Retjezat, Rotenturm (c. a.).

diversipes Letze. Schulergebirge (Deubel).

aurita L. Kerzer Gebirge, Mediasch (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt, Bistritz (Deubel).

affinis Hellw. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Schauern, Kronstadt, Schässburg, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

xanthaspis Germ. Hátszeg, Gross-Pold, Gross-Schauern, Götzenberg, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyógy (Ormay); Karlsburg (c. a.).

844. *Chilotoma Redtenb.*

muscifformis Goeze. Déva, Mezöség (Záh, Bielz); Schässburg (Wietberg, Fuchsloch, auf niedern Pflanzen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

erythrostoma Fald. Karlsburg (1 ♂, c. a.).

845. *Coptocephala Chevrolat.*

chalybaea Germ. Déva, Mühlbach (r. B.), Gross-Schauern, Rothenberg, Marpod (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

unifasciata Scop. Hátszeg, Gross-Schauern, Fogarasch, Kronstadt, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Ormay); Petrozsény, Puj (bei Hátszeg, c. a.).

a. *femoralis* Kr. (nec Küster). Kronstadt (Bielz); Hátszeg (Deubel).

Scopolina L. Mühlbach (Szászcsor), Marpod, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay);

rubicunda Laich. Klausenburg (Bielz); Schässburg, Hátszeg, Oláhfalú (c. a.).

846. *Cryptocephalus Geoffroy.*

Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen.

(Homalopus.)

Coryli L. Hátszeg, Gross-Schauern, Thalheim, Reps, Uter-Kerz, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

Alle vier Exemplare meiner Sammlung gehören der Varietät *temesiensis* an; da Bielz die Varietät gar nicht anführt und auch Deubel die Stammform nicht gesammelt hat, so will mir scheinen, als ob die letztere, falls sie bei uns zu finden sein sollte, überaus selten sei.

a. *temesiensis* Suffr. Kronstadt, Schässburg, Borszék, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

cordiger L. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, Mezöség (Gyeke, Bielz); Kronstadt (Deubel).

octopunctatus Scop. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Karlsburg, Klausenburg, Szurdok-Pass (c. a.); Kerzer Gebirge (Ormay).

sexpunctatus L. Gross-Pold, Hermannstadt, Gross-Schauern, Kronstadt, Nussbach, Tartlau, Mediasch (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Schässburg (c. a.).

signatus Laich. (*5-punctatus* Seidl.). Talmesch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Schanta (Ormay).

distinguendus Schneid. Hátszeg (Bielz).

albolineatus Suffr. Fogarasch (Bielz).

Das Vorkommen dieser seltenen, den Alpen eigentümlichen Art wäre näher zu prüfen.

laevicollis Gebl. Alsó-Rákos (1 Ex., c. a.).

a. *viennensis* Ws. Vajda-Hunyad (c. a.).

imperialis Laich. Gross-Pold (Bielz).

bipunctatus L. Mühlbach, Hermannstadt, Rotenturm, Marpod, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Nussbach, Bükszád, Mediasch, Schässburg S.-Regen, Borszék, Dees, Mezöség (Záh, Bielz); Előpatak, Hátszeg, Petrozsény, Puj b. Hátszeg (c. a.).

a. *sanguinolentus* Scop. (*lineola* F.). Fogarasch, Kronst., Balánbánya (Öcsém), Gyergyó (Bielz); Petrozsény, Karlsburg, Előpatak (c. a.).

biguttatus Scop. Zibinsgebirge, Gross-Schauern, Neudorf b. H., Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schässburg, Mezöség (Gyeke, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagyenyed, Baassen (c. a.).

14-*maculatus* Schneid. (*coloratus* Suffr.). Klausenburg (Bielz).

gamma H. Schöff. Boncz-Nyires (sós-völgy, Méhely); Torda (9. Juni. Deubel).

apicalis Gebl. Dobra (Bielz).

(Proctophysus.)

Schäfferi Schrank. Déva, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Mediasch, Dees (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

cyanipes Suffr. Keresztényhavas (Méhely).

villosulus Suffr. Mühlbach (Rekete), Gross-Pold, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Deubel).

aureolus Suffr. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád (Bielz); Schässburg, Oláh-falu, Klausenburg, Rodnagerbirge (c. a.).

a. **coerulescens** Schilsky. Zinne, Tömösch-er Pass (Vladez, Méhely).

sericeus L. Hátszeg, Schiellthal, Hermannstadt, Neudorf, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Bükszád, Schässburg, Oláh-falu, S.-Regen, Borszék (Bielz); Zibinsgebirge, Bistra, Gyógy (Bad, Ormay); Nagyenyed, Klausenburg, Rodnagerbirge (c. a.).

a. **coeruleus** Weise. Előpatak, Nagyenyed, Klausenburg (c. a.); Hátszeg, Rosenau (Deubel).

cristula Duft. (hypochoeridis Suffr.). Mühlbach (Szászcsor), Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Borszék, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Bistra, Gyógy (Bad, Ormay); Malomviz, Előpatak, Bükszád, Rodna-Gebirge, Nussbach, Oláh-falu, Klausenburg (c. a.).

a. **frigidum** Jacobs. (cyanescens Wse.). Kronstadt (Stehil, Méhely).

violaceus Laich. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Götzenberg, Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Hammersdorf, Salzburg, Stolzenburg (Ormay); Nussbach, Schässburg, Balánbánya, Baassen, Klausenburg, Nagyenyed, Karlsburg, Borszék (c. a.).

a. **smaragdinus** Suffr. Előpatak (c. a.).

virens Suffr. Hátszeg, Záh (Bielz).

elongatus Germ. Déva (Bielz); Schässburg (c. a.).

nilidulus F. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Klausenburg, Borszék, Schässburg (c. a.).

nitidus L. Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátszeg, Salzburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

parvulus Müll. Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Schässburg (c. a.).

concinuus Suffr. Siebenbürgen (wohl Hátszeg-er Tal).

Seidlitz (F. transs. 1891, p. 763) führt diese Art für Siebenbürgen an ohne eine nähere Fundortangabe zu machen, während er das Vorkommen des *C. marginatus* nicht als vollkommen sichergestellt betrachtet.

marginatus F. Talmesch, Talmatschel, Rotenturm (Bielz).

frenatus Laich. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Nussbach, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (c. a.).

a. **flavescens** Schneil. Gross-Pold, Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.); Hátszeg (Deubel).

Moraei L. Durch das ganze Gebiet verbreitet (auch im Rodnagerbirge c. a.).

a. **bivittatus** Gyll. Puj (b. Hátszeg), Schässburg, Unter-Kerz (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. **arquatus** Ws. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

octacosmus Bedel (6-pustulatus Rossi, Weise nec Villers). Hátszeg, Mühlbach, Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod, Fogarasch, Reys, Kronstadt, Tömösch-er Pass, Nussbach, Mediasch, Dees, Mezőség (Gyeke, Bielz); Baassen, Schässburg, Karlsburg, Nagyenyed, Hermannstadt (c. a.).

4-guttatus Richter. Dobra, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Roßberg b. H., Girelsau, Marpod, Fogarasch, Héviz, Tartlau, Előpatak, Mediasch (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

4-pustulatus Gyllh. Rodnagerbirge (Koronis, c. a.).

a. **rhaeticus** Heyd. Kronstadt, Retjezat (c. a.).

var. **c.** Weise. Retjezat (c. a.).

flavipes F. Hátszeg, Hermannstadt, Holzungen, Marpod, Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Nussbach, Tartlau, Előpatak, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Gyógy (Bad, Ormay); Karlsburg, Schässburg, Klausenburg (c. a.).

a. **nigrescens** Grall. Retjezat, Előpatak, Schässburg (c. a.).

vittatus F. Hátszeg, Talmesch, Porcest, Fogarasch, Előpatak, Bükszád, Oláh-falu (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Ormay); Petrosény, Malomviz, Retjezat (Zenoga), Puj (b. Hátszeg), Rotenturm, Kronstadt, Brassó, Ratosnya, Schässburg (c. a.).

bilineator L. Hátszeg, Mühlbach (Szászcsor), Gross-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay);

- Rotenturm, Puj (b. Hátzeg, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. *moestus* Ws. Rotenturm, Baassen (c. a.).
- a. *armeniacus* Fald. Hátzeg, Puj (bei Hátzeg), Schässburg, Retjezat (c. a.); Nagybagymás (Deubel).
- elegantulus* Grav. Dobra, Gross-Scheuern (Bielz); Déva, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- strigosus* Germ. Schässburg (Wietenberg, 1 ♂, Juli, c. a.).
- chrysopus* Gmel. Hátzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rotberg b. H., Holzmengen, Girelsau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Resinar, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Nagyenved, Klausenburg, Vajda-Hunyad (c. a.).
- frontalis* Marsh. Hermannstadt (Bielz); Hátzeg, Rodnagelbirge (Koronis, c. a.); Kronstadt (Deubel).
- ocellatus* Drap. Hátzeg, Hermannstadt, Girelsau, Porcest, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Nussbach, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Resinar, Rotenturm (Ormay); Malomviz, Hammersdorf (c. a.).
- carpathicus* Friv. Hammersdorf, Balánbánya (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
- labiatus* L. Gross-Scheuern, Marpod, Fogarasch (Bielz); Előpatak, Schässburg, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Nagybagymás, Kronstadt, Schulergebirge (Deubel).
- a. *diagrammus* Suffr. Előpatak, Büdös, (Bielz); Schässburg, Karlsburg, Baassen (c. a.); Vargyas (Deubel).
- pygmaeus* F. Michelsberg, Talmesch (Bielz); Gyógy (Bad, Ormay).

Wahrscheinlich sind auch die Fundorte von Bielz und Ormay für die Stammform, welche nach Weise dem südlichen Europa angehören soll, auf die beiden Varietäten zu beziehen.

a. *amoenus* Drap. (vittula Suffr.). Schielthal (Bielz); Petrozsény, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hátzeg (Deubel).

a. *orientalis* Weise. Schässburg (c. a.).

connexus Oliv. Hátzeg, Talmesch, Girelsau, Freck, Klausenburg (Bielz); Gyógy (Ormay); Petrozsény, Schässburg (c. a.).

var. *fasciatus* n. Petrozsény (c. a.).

Cryptocephalus *connexus* var. *fasciatus*. Der schwarze Nahtfleck hinter der Mitte der Flügeldecken verbindet sich nicht nur mit der schwarzen Längsbinde, sondern auch mit dem schwarzen Seitenrande, so dass von der gelben Färbung der Flügeldecken nur 6 gelbe isolierte Makeln übrig bleiben, je eine längliche neben der vorderen Nahthälfte und über den Epigleuren und je eine quere vor der Spitze. Der gelbe Halschildrand ist ziemlich schmal, aber nicht scharf begrenzt, die Stirne trüb rötlichgelb mit der wenig scharfen Zeichnung der Männchen.

fulvus Goeze (minutus F.). Grossscheuern, Michelsberg, Talmatsch, Tartlau (Bielz); Ratosnya, Frecker Gebirge (Leitatal bei der Sägemühle), Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne), Törzburg (Deubel).

- populi* Suffr. Fogarasch (Bielz); Karlsburg, Schässburg (Kokel, 26. Juli auf Schwarzpappel, c. a.).
- pusillus* F. Neudorf b. H., Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz).
- a. *Marshami* Weise. Schässburg (Breite, Juli), Toroczkó (c. a.).
- rufipes* Goeze. Hátzeg, Hosszufalu, Tartlau (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

847. *Pachybrachys Redtenbacher.*

Die Arten leben auf Gesträuch, besonders Weiden. (Pachystylus.)

- hieroglyphicus* Laich. Hátzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmengen, Girelsau, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Karlsburg, Ratosnya (c. a.).
- a. *ictericus* Wse. Schässburg, Ujszéke (b. Keresztur, c. a.).
- a. *tristis* Laich. Vargyas (Almásér Höhle, Deubel); Borszék (c. a.).
- carpathicus* Rey. Schässburg, Ratosnya (c. a.).

Ich beziehe auf *P. carpathicus* Rey, dessen Beschreibung mir unbekannt ist, dem *P. hieroglyphicus* Laich. sehr ähnliche Tiere mit ganz schwarzem Pygidium.

- haliciensis* Mill. (sinuatus Seidl. nec Muls.). Hátzeg, Petrozsény, Karlsburg, Kronstadt, Baassen, Schässburg, Nagyenved, Ratosnya, Rodnagelbirge (c. a.); Vidombák, Tömös, Prázmár (Méhely).
- a. *rufimana* Wse. Hátzeg, Karlsburg (c. a.).

hypophaes Suffr. Fogarasch, Kronstadt (?) (Bielz).

tesellatus Oliv. Hátzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Salzburg (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Baassen, Klausenburg (c. a.).

picus Weise (histrio Redtenb.). Siebenbürgen.

Seidlitz (F. transs. 1896, p. 767) führt diese Art für Siebenbürgen ohne nähere Fundortsangabe an.

timbriolatus Suffr. Hátzeg, Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Stolzenburg (Ormay); Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

a. *pteromelas* Mars. Hammersdorf, Schässburg (c. a.).

Cyclica.

Lamprosomini.

848. *Lamprosoma Kirby.*

concolor Sturm. Kerzer Gebirge, Héviz, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Gyógy

(Ormay); Rotenturm, Hermannstadt (c. a.).

Eumolpini.

849 Pachnephorus Redtenb.

Die Arten leben am Ufer stehender und fließender Gewässer.

pilosus Rossi. Fogarasch, Nussbach, Schässburg (Bielz); Gyógy (Ormay); Marosujvár, Oláhfaln. Kronstadt (c. a.).

tesselatus Duft. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz).

a. **sabulosus** Gebl. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Porumbák, Reys, Mediasch, S.-Regen (Bielz).

villosus Duft (nec Redt. nec Fairm.). Schässburg, Hermannstadt (c. a.); Várhegy (Deubel).

850. Bromius Redtenb.

(Adoxus Baly.)

obscurus L. Nagyág, Fogarasch, Kronstadt, Sächs.-Regen, Gyergyó, Borgóer Pass (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Zibinsgebirge (Ormay); Schässburg (c. a.).

a. **villosulus** Schrk. (vitis auct.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Karlsburg, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Alle Tiere meiner Sammlung besitzen bei hellrötlichbraunen Flügeldecken ganz schwarze Beine.

851. Chrysochus Redtenb.

aselepiadeus Pall. (pretiosus F.). Retzezt, Mühlbach, Gross-Scheuern, Marpod, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Dees, Gyalu, Mező-ég (Záh), Hasság, Schässburg (Wietberg (c. a.); Torockó, Zool (Ormay).

852. Eupales Lefevre.

ulema Germ. Gross-Pold (Bielz); Vajda-Hunyad (c. a., Deubel).

Chrysomelini.

853. Colaphus Redtenb.

sophiae Schall. Durch das Berg- und Hügel-land verbreitet.

854. Gastroides Hope.

viridula Dey. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

polygoni L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

855. Entomoscelis Chev.

adonidis Pall. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasch, Persaner Gebirge (Oberkomana). Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Klausenburg, Nagyenyel (c. a.); Buzd, Miriszló (Unterweissenburger Komitat), Torockó (Ormay).

sacra L. Fogarasch, Mediasch, Klausenburg, Mezőség (Nagyenyel, Gyeke, Záh, Czege, Bielz).

856. Timarcha Latreille.

T. tenebricosa F., welche von Bielz für Schässburg und Kronstadt angeführt wird, ist wohl aus unserem Verzeichnis zu streichen. In Schässburg ist sie von mir nie gesammelt worden, sondern nur *coriaria* Laich., ebensowenig hat Deubel das wegen seiner bedeutenden Grösse kaum zu übersehende Tier in Kronstadt aufgefunden.

pratensis Duft. Hátszeg, Schielthal, Stolzenburg, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Götzenberg, Rotenturm, Riu Sat, Remete (Nagyenyel). Szamosujvár (Ormay).

coriaria Laich. (violaceonigra auct.). Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Rakovicza, Szamosujvár (Ormay).

rugulosa H. Schäff. Surul, Frecker Geb., Fogarascher Geb., Kronstadt, Schulergebirge Tömöser Pass, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Pilis (b. Nagyenyel), Schässburg, Rotenturm, Előpatak, Petrozsény, Hátszeg, Karlsburg (c. a.).

var. **lomnickii** Mill. Porumbach, Surul, Kronstadt (Bielz); Rotenturm, Hermannstadt, Baassen, Schässburg, Tordae Schlucht (c. a.).

metallica Laich. Retzezt, Zibinsgebirge, Präshe, Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Fogarascher Geb., Kronstadt, Schulergebirge, Piatra mare, Tesla, Dongókő, Bozauer Pass (Bielz); Götzenberg (Ormay); Balánbánya, Schässburg, Nagyenyel (c. a.).

gibba Hoppe. Kerzer Gebirge (Bielz).

T. gibba Hoppe, welche auch von Bielz nur vom Kerzer Gebirge angeführt wird, ist seither nicht mehr gesammelt worden; ihr Vorkommen erscheint daher fraglich.

857. Timarchida Ganglbauer.

Deubeli Ganglb. Schulergebirge (Deubel, c. a.).

858. Chrysomela Linné.

fimbrialis Küst. Hátszeg (Bielz).

var. **hungarica** Fuss. Mühlbach, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bucsecs, Tesla,

Csukás, Birthälm, Dees (Bielz); Hermannstadt, Grossan, Örményszékes (Unterweissenburger Komitat), Nagyenyed, Magyar-Forró (Unterweissenburger Komitat), Felső-Orló (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Előpatak, Marosujvár, Szováta (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

cribrosa Ahr. Mezőség (Gyeke, Bielz).

Weisei Friv. Balánbánya (c. a.); Hátzseg (Deubel).

coerulea Oliv. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **globipennis** Suffr. Präsbe, Előpatak, (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Rodnagebirge (c. a.); Pietrosul, Nagy-hagymás (Deubel).

lichenis Richt. Fogarascher Geb., Bucsecs (Bielz); Schulergebirge (Deubel).

a. **nigerrima** Weise. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Bucsecs (alpin, Deubel).

var. **rhypaea** Wse. Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

carpathica Fuss. Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge (Bielz); Nagyagymás, Bucsecs, Rodnagebirge (Deubel).

var. **Hopfgarteni** Wse. Siebenbürgen.

rufa Duft. (opulenta Suffr., menthae Duft.). Erzgebirge, Nagyág, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Talmesch, Retjezat, Bistra, Rotenturm, Rodnagebirge (c. a.).

marcesitica Germ. Retjezat, Zibinsgebirge, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Schulergebirge, Bucsecs, Oláh-falu, Borgóer Pass (Bielz); Porkovitza (Zoodgebirge, Ormay); Bistra, Schässburg, Nagyenyed, Rotenturm, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **turgida** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Nagyenyed, Schuler-Gebirge, Schässburg, Bucsecs, Borszék, Retjezat (c. a.).

a. **pannonica** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).

purpurascens Germ. Bistra, Nagyenyed, Topánfalva (Erzgebirge), Alsó-Rákos (c. a.); Rodnageb., Nagyagymás, Piatra mare (Tamina-Schlucht, Deubel).

crassimargo Germ. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

a. **viridis** Ws. Siebenbürgen.

hemisphaerica Germ. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm, Porkovitza (Zoodgebirge, Ormay); Rodnagebirge (c. a.); Zernester Gebirge (Deubel).

crassicolis Suffr. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Bistra (Ormay); Borszék, Ober-Kerz (Glas-

hütte), Zibinsklamm, Előpatak, Schässburg, Retjezat, Nagyenyed (c. a.).

olivacea Suffr. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Rodnageb. (Bielz); Schanta (Ormay); Klausenburg (c. a.); Marosgebirge (Müller).

a. **umbratilis** Wse. Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

globosa Panz. Zibins-Gebirge (Bielz); Schanta (Ormay).

vernalis Brull. Fogarascher Geb., Kronstadt (Bielz).

var. **Heeri** H. Schaeff. Hátzseg, Fogarascher Gebirge (Bielz).

haemoptera L. Hátzseg, Petrozsény, Hunyad, Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Holzmeugen, Talmesch, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Oláh-falu, Dees (Bielz); Rotenturm, Salzbürg, Zibins-Gebirge, Talmesch, Szamosujvár (Ormay); Puj (b. Hátzseg, c. a.).

var. **unicolor** Suffr. Kronstadt (Zinne, Deubel).

goettingensis L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **Sturmi** Westhl. Fogarascher Gebirge, Kronstädter (?) Gebirge (Bielz).

a. **polonica** Wse. Kerzer Gebirge (Bielz).

limbata F. Salzbürg, Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Ober-Kerz, Mihályfalva (Grosskokler Komitat), Nagyenyed, Mirszló (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Puj (b. Hátzseg, c. a.).

lurida L. Hátzseg, Salzbürg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Remete (Ormay); Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

staphylaea L. Hátzseg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Oláh-falu, S.-Regen, Borszék, Bistritz, Dees, Mezőség (Záh, Bielz); Rotenturm, Tordaer Schlucht (c. a.).

gypsophilae Küst. Déva, Neudorf b. It. (Bielz); Schässburg, Nagyenyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).

sanguinolenta L. Hátzseg, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Orlat, Poplaka, Ober-Kerz (Ormay).

marginalis Duft. Hátzseg, Mezőség (Záh, Bielz).

carnifex F. Hermannstadt, Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Szamosujvár (Ormay).

marginata L. Hátzseg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmeugen, Márpod, Fogarasch, Kronstadt, Hossz-falu, Nussbach, Mediasch, Schässburg, Oláh-falu, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

- orlichalcea** Müll. (bulgarensis Schrnk.). Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).
- a. **lamina** F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmingen, Sächs.-Liegen (Bielz).
- morio** Kryn. Neudorf b. H. (Bielz); Hát-szeg (c. a.).
- chalcites** Germ. Alsó-Rákos (c. a. 4 Ex.).
- geminata** Payk. Gross-Scheuern, Marosgebirge (Bielz); Schanta, Bistra (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. **cuprina** Duft. Klausenburg (Bielz); Kronstadt, Vidombák, Keresztényhavas (Méhely); Schässburg, Retjezat (c. a.).
- quadrigemina** Suffr. Kronstadt, Rosenau (Deubel).
- hyperici** Forst. (gemellata Geoffr.). Hát-szeg, Gross-Pold, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Schanta (Ormay).
- americana** L. Klausenburg, Kronstadt (Bielz).
- cerealis** L. Salzburg, Gross-Scheuern, Zood, Fogarasch, Kronstadt (?), Mediasch (Bielz); Hát-szeg, Pilis (b. Nagyenyed), Klausenburg (c. a.).
- a. **alternans** Panz (Megerlei F.). Hunyad, Salzburg, Hammersdorf, Zood, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
- a. **ornata** Ahr. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hát-szeg (Deubel).
- a. **mixta** Küst. (violacea Schall). Fogarasch, Marosgebirge (Bielz); Talmesch, Rotenturm, Torockó, Remete (Nagyenyed, Ormay).
- aurichalcea** Mannb.
- var. **asclepiadis** Villa. Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt, Schulergebirge, Hát-szeg (Deubel).
- coeruleans** Scriba (violacea Panz.). Déva, Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch, (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Pilis (b. Nagyenyed), Klausenburg (c. a.).
- fastuosa** Scop. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- a. **speciosa** L. (galeopsidis Schrk.). Kronstadt, Rodna-Gebirge, Schuler-Geb. (Deubel).
- graminis** L. Mediasch, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay).
- menthastris** Suffr. Durch das ganze Gebiet verbreitet.
- a. **rugicollis** Weidb. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
- varians** Schaller. Hát-szeg, Retjezat, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Rodna-Gebirge, Ilvamika (Naszó), Előpatak (c. a.).
- a. **centaura** Herbst (centaurei F.). Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
- a. **pratensis** Wse. Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
- a. **aethiops** F. Rodnagebirge (Deubel).

polita L. Hát-szeg, Schielthal, Unter-Kerz, Kerzer Gebirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Retjezat (c. a.).

859. *Chrysochloa Hope.*

(Orina Motsch.)

(Allorina.)

- trialis** Fabr. (luctuosa Oliv.). Zibinsgeb., Galbina, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Rodnagebirge (Bielz); Baassen, Schässburg, Malomviz, Retjezat (c. a.); Schulergebirge (Deubel).
- rugulosa** Suffr. Retjezat, Zibinsgebirge, Galbina, Rodnageb. (Kuhhorn, Bielz); Götzenberg (Ormay); Héviz, Baassen, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.).

(Romalorina.)

- intricata** Germ. Kronstädter Geb., Schulergebirge, Héviz, Schässburg, Borszék, Borgoer Pass (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge, Malomviz (c. a.).
- var. **Anderschi** Duft. Retjezat, Zibinsgebirge, Resinar, Götzenberg, Surul, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Hargitta, Oláhfalú, Borgoer Pass, Rodnagebirge (Kuhhorn, Bielz); Bistra, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schulergebirge (c. a.).
- alpestris** Schumm. Kerzer Gebirge (Ormay); Schulergebirge, Borszék (c. a.); Nagy-hagymás, Paringulgebirge (Deubel).
- a. **rivularis** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (Deubel).
- a. **fontinalis** Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Hát-szeg (Deubel).
- a. **bicolora** Ws. Fogarasch, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergeb. (Deubel).
- var. **punctatissima** Suffr. Surul (Bielz); Schässburg (c. a.); Hát-szeg (Deubel).
- a. **anthrisci** Ws. Schulergebirge, Vargyas (Almásér Höhle, Deubel).
- a. **Bodemeyeri** Kr. Schulergeb. (Deubel).
- var. **polymorpha** Kr. Kronstädter Geb. (?), Bozauer Pass, Bihargebirge (Piatra arsa, Bielz); Rodnagebirge (c. a.).
- var. **nigrina** Suffr. Hát-szeg (Deubel).
- gloriosa** F. Fogarascher Gebirge (Bielz).
- a. **pretiosa** Suffr. Rodnagebirge (Kuhhorn, Bielz).
- a. **venusta** Suffr. Zibinsgebirge, Galbina, Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).
- variabilis** Wse. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (c. a.).
- villigera** Suffr. Zibinsgebirge, Galbina, Rodnagebirge (Kuhhorn, Bielz).

- bifrons* F. (*monticola* Duft.). Bihargebirge (Bielz); Bucsecs (alpin, Deubel).
 var. *decora* Richt. Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnagebirge (Deubel).
viridis Duft. Zibinsgebirge, Dusch, Zibinsjäser, Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).
 var. *Merkli* Wse. Kronstadt (Deubel).
 a. *transsylvanica* Wse. Paringul, Rodnagebirge (c. a.); Hätzeger Gebirge (Deubel).

(Protorina.)

- plagiata* Suffr. Retjezat, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Schulergebirge, Bucsecs, Gyergyó, Marosgeb., Rodnagebirge (Koronjis), Borgoer Pass (Bielz); Schanta (Ormay).
 var. *commutata* Suffr. Kronstädter Geb., Csiker Gebirge, Balánbánya (Öcsém, Nagyhagymás, Bielz); Rodnagebirge, Topánfalva (Erzgebirge, c. a.).

Jedenfalls bezieht sich Bielz's Ch. *melanocephala* Duft. (= *Peeroleri* Bassi, *commutata* Suffr.) auf var. *commutata* Suffr. mit einfärbig roten Flügeldecken, während *melanocephala* Duft. aus unserem Verzeichnis zu streichen ist.

(Chrysocloa i. sp.)

- virgulata* Germ. Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Zeidner Berg, Héviz, Borgoer Pass (Bielz); Schanta, Bisztra (Ormay); Schulergebirge, Retjezat (c. a.).
 a. *serena* Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).
 a. *candens* Ws. Tesla, Keresztényhavas (Méhely); Kerzer Gebirge, Zoodgeb. (Ormay); Schulergebirge (Deubel).
 a. *praefica* Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Zernester Gebirge (Deubel).
cacaliae Schrank. Zibinsgebirge, Galbina, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Hargitta, Oláhfalva, Borszék, Borgoer Pass (Bielz); Rodnagebirge, Schulergebirge (c. a.).
 a. *sumptuosa* Redt. (*tristis* Duft.). Retjezat, Galbina, Schulergebirge (Bielz).
 var. *tussilaginis* Suffr. Hätzeg (Deubel).
 var. *senecionis* Schumm. Retjezat, Galbina, Kerzer Gebirge, Tesla, Hargitta, Borszék (Bielz); Zibinsgebirge, Bisztra (Ormay); Rodnagebirge (c. a.); Pietrosul, Nagyhagymás (Deubel).
 a. *iristicula* Ws. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (Deubel).
 a. *fraudulenta* Ws. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz); Schulergebirge (Deubel).
speciosissima Scop. Rodnagb. (Deubel).
 a. *nigrescens* Letrn. Bucsecs (Deubel).
 var. *juncorum* Suffr. Retjezat, Präsbe, Kerzer Gebirge, Vistertal, Fogarascher Gebirge, Hargitta, Oláhfalva (Bielz); Kronstadt (c. a.); Bisztra, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Rodnagebirge, Bucsecs (Deubel).

- a. *carpathica* Kraatz. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm, Rodnagebirge, Bisztra (c. a.).

860. *Phytodecta Kirby*.

- viminalis* L. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge, Dees, Nagyenyed, Mezőség (Záh, Bielz); Szamosujvár, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
 a. *10-punctatus* L. Kronstadt, (Méhely, c. a.); Schässburg (c. a.).
 a. *Baaderi* Panz. Kronstadt (Méhely, Deubel).
rufipes Deg. Rothberg, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Dees (Bielz); Herinannstadt (Ormay, c. a.); Borszék (c. a.).
flavicornis Suffr. Marosgebirge (Bielz); Schässburg (Kokeluf, auf Weiden, c. a.).
Linnaeanus Schrank. (*triandrae* Suffr.). Freck (Rakovitz, Bielz); Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Méhely).
fornicatus Brüggm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
5-punctatus F. Rosenauer Gebirge (Deubel); Klausenburg (Müller).
 a. *unicolor* Ws. Rosenauer Gebirge (Deubel); Rátosnya, Hermannstadt, Rotenturm (c. a.).
 a. *padi* Penecke. Schulergebirge (Deubel).
 a. *obscurus* Grimmer Piatra mare (Deubel).
pallidus L. Piatra Csaki, Gross-Scheuern, Götzenberg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Héviz, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Rotenturm, Retjezat, Bisztra, Bucsecs (c. a.); Zibinsgebirge (Ormay).
 a. *nigripennis* Wse. Nagykőhavas (Méhely); Bisztra (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

861. *Phyllodecta Kirby*.

(Chaetocera.)

- vulgatissima* L. Hätzeg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
 (Phyllodecta i. sp.)
tibialis Suffr. (*viennensis* Wse.). Unterkerz, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
 a. *Cornelii* Wse. Krizba, Kronstadt, Baróth (Méhely).
vitellinae L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
 a. *brevicollis* Motsch. Kronstadt (Deubel).
laticollis Suffr. Kronstadt (Méhely); Előpatak, Retjezat, Schässburg (c. a.).
atrovirens Cornel. Kronstadt (auf Crataegus, Méhely); Retjezat, Unterkerz, Rodnagebirge (c. a.).

862. *Hydrothassa Thomson.*

- aucta* F. S.-Regen (Bielz).
a. glabra Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Hammersdorf, Stolzenburg (Ormay); Előpatak, Schässburg, Baassen, Borszék, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).
marginella L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mezőség (Gyeke), Inter-Kerz (Altfer, Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel); Borszék, Ratosnya, Schässburg, Szováta (c. a.).
a. germanica Wse. Hermannstadt (Ormay); Balánbánya (c. a.).

863. *Prasocuris Latreille.*

- phellandri* L. Hermannstadt, Reussener Teiche, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt, Szováta (c. a.).
junci Brahm. Hermannstadt, Grossscheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Mediasch, S.-Regen (Bielz); Heltau, Michelsberg (Ormay); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).
vicina Luc. Michelsberg, Klausenburg (Bielz); Hátzeg, Kronstadt, Előpatak (c. a.).

864. *Sclerophaedon Weise.*

- Kenderesyl* Kiesenw. Retjezat, Hátzegger Gebirge (Bielz); Balánbánya (c. a.).
a. carpathicus Wse. Rodnagerbirge, Borszék, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schullergebirge, Nagybagymás (Deubel).
carinolicus Germ. Kronstadt, Paringul, Zibinsgeb., Gölzenberg, Präse, Kerzer Gebirge, Fogarascher Geb., Mediasch, Oláhfalú, S.-Regen, Bistritz (Bielz); Schullergebirge, Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Balánbánya (c. a.).
a. transsylvanicus Fuss. Kerzer Gebirge, Kronstädter Gebirge, Bucsecs, Hargitta (Parajd), Oláhfalú (Bielz); Schanta, Porkovitz (Zoolgeb., Ormay); Rodnagerbirge, Balánbánya (c. a.).
orbicularis Suffr. Hátzeg, Hóviz (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Paringul (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

865. *Phaedon Latreille.*

(Stenoplatys.)

- segnis* Ws. Rodnagerbirge (Ganglbauer).
Deubeli Weise. Rodnagerbirge, Bucsecs (alpin, Deubel).
 (Neophaedon.)
pyritosus Rossi. Gross-Scheuern, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Schässburg (c. a.); Miriszló (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt (Deubel).

(Phaedon i. sp.)

- laevigatus* Duft. (galeopsis Seidl., sabulicola Suffr.). Neudorf b. H., Schässburg? (Bielz); Bredndorf, Honigberg (Altfluss, Deubel).
grammiceus Duft. Gross-Scheuern, Neudorf, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).
cochleariae F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Hátzeg, Marienburg b. Kr., Tordaer Schlucht, Borszék (c. a.); Rodnagerbirge, Nagybagymás (Deubel).
a. neglectus Sahlb. Klausenburg (Bielz).
armoraciae L. (parvulus Duft.). Gölzenberg, Mezőség (Záh, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Klausenburg (c. a.); Kronstadt, Schullergebirge (Deubel).
var. salicinus Heer. Hermannstadt (Bielz).

866. *Plagiodera Erichson.*

Auf Erlen und Weiden.

- versicolor* Laich. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

867. *Melasoma Stephens.*

(Linnaeidea.)

- aenea* L. Durch das Bergland verbreitet.
a. haemorrhoidalis L. Kerzer Gebirge (Ormay); Retjezat, Schässburg, Bistritz, Rodnagerbirge (c. a.).
 (Microdera.)
cupreum Hátzeg, Hermannstadt, Rothberg b. H., Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Gyógy, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg, Hudegszamos (c. a.).
20-punctatum Scop. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Ormay); Borszék (c. a.).
collaris L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.
alpinum Zett. Hátzeg (Bielz).
 Das Vorkommen dieser Art bedarf der Bestätigung, zumal dieselbe nur von einem einzigen Fundorte angeführt wird; eher dürfte *M. lapponicum* L. bei uns vorkommen.
 (Melasoma i. sp.)
populi L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
tremulae F. longicollis Suffr.). Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
saliceti Wse. Bodzaer Gebirge, Kronstadt, Baróth (Méhely); Klausenburg, Nagyenyed (c. a.).

Galerucini.

Galerucae.

868. *Agelastica Redtenb.*

Auf Erlen.

alni L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

869. *Phyllobrotica Redtenb.*

quadrimaculata L. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen (c. a.); Honigberg (Deubel).

adusta Crenz. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Rotenturm, Holzmengen, Marjót, S.-Regen, Schässburg (Bielz, auf Malve); Kronstadt (Deubel).

870. *Luperus Geoffroy.*

(Calomicrus.)

circumfusus Marsh. (nigrofasciatus Wse.). Hátszeg, Mühlbach (r. B.), Talmesch, Girelsau, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Gyógy (Bad, Ormay); Rosenauer Gebirge (Deubel, c. a.); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).

pinicola Duft. Hátszeg (Csopca, Bielz); Kronstadt (Deubel).

(Luperus i. sp.)

xanthopus Schrank (rufipes Scop., xanthopoda Schrank, Seil.). Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Holzmengen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mező-ész (Gyeke, Záh, Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Szováta (c. a.).

L. rufipes Scop. kann zu xanthopus Schrank oder zu longicornis F. gezogen werden; in Schässburg habe ich bis jetzt nur longicornis gesammelt; welche Art Bielz mit seinen rufipes meint, kann ich nicht entscheiden; sein rufipes findet sich bei Hátszeg, Kronstadt und Sächsisch-Regen.

rugifrons Wse. Hermannstadt (Seidlitz); Schässburg (c. a.).

longicornis Fabr. (rufipes Scop.). Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

niger Goeze. Rotenturm (auf Erle, Alnus glutinosa, Ormay); Marosgeb. (Müller).

flavipes L. Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Szurdok-Pass, Schulergebirge, Borszék (c. a.).

cyanipennis Küst. Kronstadt (Deubel); Klausenburg (c. a.).

viridipennis Germ. Paringul, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

871. *Lochmaea Wse.*

capreae L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *pallidipennis* Küst. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

suturalis Thoms. Baróth (Méhely); Rotenturm (c. a.).

crataegi Forst. Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm (Ormay); Klausenburg (c. a.).

a. ♂ *binolata* Duft. Mit der Stammform.

872. *Galerucella Crotch.*

(Pyrrhalta.)

viburni Payk. Hátszeg, Gross-Scheuern, Heltau, Götzenberg, Mediasch, Schässburg, Borszék (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt, Noa (Deubel).

(Galerucella i. sp.)

nymphaea L. Kronstadt (Bielz).

lineola F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

luteola Müll. (xanthomelaena Schrank). Kronstadt, Weidenbach, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Hátszeg (c. a.).

calmariensis L. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay); Bistritz (c. a.).

pusilla Duft. Mezőség (Gyeke, Méhely); Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

tenella L. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Heltau, Kerzer Geb., Kronstadt (Bielz); Tordaer Schlucht, Dees, Karlsburg (c. a.).

873. *Galeruca Geoffroy.*

(Galeruca i. sp.)

tanacetii L. Durch das Berg- und Hügelland, im Grase und an Wegen.

pomoniae Scop. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Dahli Joann. Kronstadt (Méhely).

(Emarhopa.)

rufa Germ. Mühlbach, Mediasch, Kronstadt (Bielz); Nagy-Lak (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

(Haptoscelis.)

melanocephala Ponza. Hátszeg, Gross-Scheuern, Mediasch, Dees, Mezőség (Gyeke, Bielz); Örményszékes (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg (c. a.); Klausenburg (Müller).

874. *Euluperus Weise.*

xanthopus Duft. Gross-Scheuern, Holzmengen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

Schässburg ist vorläufig aus der Reihe der Fundorte zu streichen, ebenso Kronstadt.

major Wse. (cyaneus Bielz). Kronstadt, Rosenau auf Weide häufig (Deubel); Buceacs (c. a.).

Halticae.

875. *Podagrica Foudras*.

fuscipes L. Hätzeg, Hermannstadt, Holz-mengen (Bielz).

malvae Illig. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Salzburg, Fogarasch, S.-Regen (Bielz).

Schässburg ist aus der Reihe der Fundorte vorläufig zu streichen.

a. *aenescens* Ws. Vajda-Hunyad (c. a.).

fuscicornis L. Hätzeg, Neudorf, Talmesch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezöség (Gyöke, Záh, Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Karlsburg (c. a.).

876. *Derocrepis Weise*.

rufipes L. Gross-Scheuern, Neudorf bei Il., Fogarasch, Tartlau, Előpaták, Schässburg, Mezöség (Záh, Bielz); Gyógy (Bad, Ormay); Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).

877. *Crepidodera Chevrolat*.

femorata Gyllh. Retjezat, Rodnagelberge (c. a.); Zornest, Kronstadt (Deubel).

transsylvanica Fuss. Präsbe, Kerzer Geb. (Bielz); Schulergebirge, Rodnagelberge (c. a.); Rotenturm (Ormay); Bodzagebirge (Deubel).

corpulenta Kutsch. Paringul, Präsbe, Porcesst, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Retjezat, Bistra, Schulergebirge, Balánbánya, Szováta (c. a.); Buceacs, Nagygyémás (Deubel).

a. *opaca* m. Frecker Gebirge (Serhota, 2 Ex., c. a.).

Cr. corpulenta a. *opaca* unterscheidet sich von der Stammform durch feiner punktiertgestreifte Flügeldecken mit fast flachen, fein gerunzelten Zwischenräumen der Punktstreifen, wodurch die Flügeldecken ganz matt, glanzlos erscheinen.

melanostoma Redtenb. Klausenburg (Biharar Gebirge, Bielz).

cyanescens Duft. Frecker Gebirge, Frecker Jäser, Kerzer Gebirge (Bielz); Buceacs (c. a.).

picea Petri. Kerzer Gebirge (Ufer des Bulea-Sees, aus Grasbüscheln gesiebt, c. a.).

Dr. Heldhaus hat (Unters. über die Zoogeogr. d. Karpathen, K. k. zool. bot. Ges. Wien VI. 1) *C. picea* m. schlechthin als Synonym der *Cr. cyanipennis* Kutsch. erklärt. Ich kann mich seiner Ansicht nach nochmaliger Überprüfung und Vergleichung der drei gegenwärtig in meiner Sammlung befindlichen Stücke vom Bulea-See mit *Crepidodera cyanipennis* Kutsch. sowohl, als mit der in der Gestalt ähnlicheren *Crep. cyanescens* Duft, den ich aus Steier-

mark besitze, nicht anschliessen und erhalte das Artrecht der *C. picea* m. aufrecht aus folgenden Gründen:

1. Unter den 3 Stücken ist ein Weibchen vollkommen ausgefärbt und ganz pechbraun. Tibien, Tarsen und die ersten Fühlerglieder etwas heller; die beiden anderen Exemplare erinnern in ihrer Färbung mehr-weniger an *C. ferruginea* Scop.; von Blau keine Spur.

2. Die Grösse ist geringer als die der kleinsten *C. cyanipennis* Kutsch.

3. Der Körper ist gedrungen, erinnert mehr an den der *Cr. cyanescens*, mit der sie auch in der Halsschildpunktierung mehr übereinstimmt. Ein Stück der *Cr. cyanipennis* von Balánbánya besitzt eine ähnliche Halsschildpunktierung, aber viel gestrecktere Gestalt, anders geformten Halsschild, viel längere Fühler und die normale Färbung der *Cr. cyanipennis*.

4. Die Fühler sind kräftiger, kürzer als bei *Cr. cyanipennis* oder irgend einer andern Art der Gruppe.

5. Der Halsschild ist am Seitenrande vor den Hinterwinkeln deutlich, wenn auch schwach ausgeschweift, wodurch die Hinterwinkel spitzer und fast rechtwinklig werden, was bei *Cr. cyanipennis* nie der Fall ist; auch die Schwiele in den Vorderwinkeln ist mehr-weniger obsolet und weniger lang.

6. Auch in der Punktierung der Unterseite finden sich kleine Unterschiede, denen ich jedoch weniger Gewicht beilege.

7. Die Fältchen an der Halsschildbasis sind viel weniger tief und scharf begrenzt, die Querfurchen zwischen denselben wenig vertieft.

Ich glaube diese Merkmale genügen, um das Artrecht der *Cr. picea* aufrecht zu erhalten und sie von allen Verwandten der Gruppe zu unterscheiden.

Ich war früher geneigt, kleine Stücke einer bläulichgelben *Crepidodera* vom Buceacs auch für *Cr. picea* zu halten, und ich glaube zwei solcher Tiere auch als *Cr. picea* versendet zu haben, eines auch steckte noch als fraglich bei *Cr. picea* in meiner Sammlung. Bei nochmaliger Untersuchung dieses zweifelhaften Stückes stellte ich jedoch fest, dass es nicht zu *Cr. picea*, sondern zu *Cr. cyanescens* gehörte, nur ist es etwas kleiner als die Stücke meiner Sammlung.

cyanipennis Kutsch. Kerzer Gebirge (Ormay); Kronstadt, Schulergebirge, Balánbánya (c. a.).

nigritula Gyllh. Hermannstadt, Heltau, Gyógy (Bad, Ormay); Schässburg, Baassen, Topánfalva, Unter-Kerz (c. a.); Szurdok-Pass (Deubel).

transversa Marsh. (*impressa* Duft.). Hätzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Kronstadt (Deubel); Schässburg, Malomváz, Hätzeg, Rátosnya, Karlsburg (c. a., auf Disteln).

impressa F. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Schanta, Gyógy (Bad, Ormay).

Ich habe nach Untersuchung meines Materials und Vergleichung desselben mit spanischen *impressa* den Eindruck erhalten, als ob *impressa* bei uns nicht vorkomme, indem Individuen der *transversa* nur mit einigen wenigen Punkten auf der Mitte des Halsschildes vor dem Quereindruck, die aber größer sind als die des *impressa*, irrtümlich als *impressa* bestimmt worden seien; solche Exemplare besitze ich aus Karlsburg, aber auch aus Ungarn und aus Süd-deutschland (Pfalz).

ferruginea Scop. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Götzenberg, Fogarasch, Rejs, Héviz, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Oláhfalva, Sächs.-Regen (Bielz); Baassen, Rátosnya,

Torda, Előpatak, Puj (b. Hátszeg, c. a.); Nagybagymás, Schuler-Gebirge (Deubel).

878. *Lythraria Bedel.*

salicariae Payk. Neudorf b. H. (Bielz); Schässburg (Kokelufer, gekötschert, 16. Mai), Rotenturm (c. a.); Honigberg (am Altflusssufer, Deubel).

879. *Epithrix Foudras.*

pubescens Koch. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Histriz (Müller).

atropae Foudr.

a. *4-maculata* Ws. Kronstädter Gebirge (Deubel).

880. *Chalcoides Foudras.*

Die Arten leben meist auf Weiden, auch auf Erlenbusch finden sie sich.

nitidula L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schanta (Ormay); Borszék (c. a.).

aurea Geoffr. (metallica Duft., splendens Wse.). Oláhfalva (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Papolecz (Háromszék, Méhely).

a. *laeta* Ws. Kronstadt (Deubel).

a. *cyanea* Marsh. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

tulvicornis F. (helxines Ws.). Schässburg, Előpatak, Rátosnya, Borszék (c. a.); Hátszeg, Hermannstadt, Grossscheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mező-ég (Gyeke, Záh, Bielz); Götzenberg, Schanta, Szamosujvár (Ormay).

aurata Marsh. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

Plutus Latr. (chloris Foudr.). Nagyenyed, Karlsburg (c. a.).

881. *Hippuriphila Foudras.*

Modeeri L. Hátszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Marpod, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Petrozsény, Karlsburg, Rotenturm (c. a.).

882. *Orestia Germ.*

alpina Germ. Surian, Präsche, Kerzer Gebirge, Hargita, Borszék (Bielz).

arcuata Mill. Kerzer Gebirge (Bielz); Schulergebirge, Balánbánya, Bodzaer Gebirge, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs, Königstein (Deubel).

carpathica Reitter. Malomviz (Hátszeg), Rotenturm, Alsó-Rákos, Szováta, Schässburg (c. a.).

puncticollis Reitter. Kerzer Gebirge, Borszék (c. a.).

O. *puncticollis* Reitter fehlt im Catalogus col. Europae etc. 1906.

Aubei All. Schielthal, Kerzer Geb. (Bielz); Rotenturm (c. a.); Teipe bei Alsó-Rákos (Deubel).

883. *Minota Kutschera.*

(*Hypnophila Foudras.*)

obesa Walld. Frecker Gebirge (Serbota), Paringul, Rotenturm, Kronstadt (Kapellenberg), Topánfalva (Erzgebirge), Rodnagebirge (c. a.).

a. *carpathica* Heikertinger. Balánbánya, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagebirge (c. a.).

884. *Mantura Stephens.*

oblusata Gyll. Hátszeg (Bielz); Kronstadt, Rátosnya (c. a.).

chrysanthemi Koch. Hátszeg (Bielz).

rustica L. Hermannstadt, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

885. *Chaetocnema Stephens.*

(*Tlanoma.*)

semicoerulea Koch. Hátszeg, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

concinna Marsh. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

tibialis Illig. Karlsburg (c. a.); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

(*Chaetocnema* i. sp.)

compressa Letzn. Schässburg (c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).

meridionalis Foudr. Hátszeg (Bielz); Grossau (Ormay); Honigberg (Altfluss, Deubel).

Mannerheimi Gyllh. Hátszeg, Gross-Scheuern, Girelsau (Bielz); Honigberg (Deubel).

aridula Gyll. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Oláhfalva (Bielz); Grossau, Orlat (Ormay); Unter-Kerz, Karlsburg, Petrozsény, Baassen (c. a.).

arida Foudr. Rosenau-Gebirge (von Weise bestimmt, Deubel).

hortensis Geoffr. (*aridella* Payk.). Gross-Scheuern, Marpod, Oláhfalva, S.-Regen, Mező-ég (Gyeke, Záh, Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Unter-Kerz, Hátszeg, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Rodna-Gebirge, Kronstadt (Deubel).

886. *Psyllodes Berthold.*

(*Psyllomima*.)

cucullata Illig. Klausenburg (Bielz); Nagy Hagymás (Deubel); Schässburg (Breite, 12. August, c. a.).

(*Psyllodes* l. sp.)

Schwarzi Ws. Paringulgebirge? (c. a.); Rodnagebirge, Schuler (Deubel).

Frivaldszkyi Ws. Schulergebirge, Csukás, Paringul, Rodnagebirge (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).

subaenea Kutsch. Frecker Gebirge (Serbota, Kerzer Gebirge (Bulea), Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs, Königstein (Deubel).

affenuata Koch. Hätzszeg, Gross-Scheuern, Holzmeugen, Marpod, Girelsau, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Vajda-Hunyad, Nagenyed, Baassen, Rodnagebirge, Szováta (c. a.); Bucsecs (Deubel).

chrysocephala L. Hätzszeg (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay).

var. **nucea** Hl. Ratosnya (c. a.).

cyanoptera Illig. Götzenberg, Fogarasch (Bielz).

napi Fabr. Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Borszék, Präszaka (bei Zalatna, c. a.); Vargyas (bei der Altmäser Höhle, Deubel).

thlaspi Foudr. Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

picipes Redtenb. Kronstadt (Bielz).

cuprea Koch. Rotberg b. Hl., Freck, S.-Regen (Bielz).

pyritosa Kutsch. Vajda-Hunyad (c. a.).

affinis Payk. Hätzszeg, Neudorf bei Hl., Tartlau, Mediasch (Bielz); Kronstadt (Bielz, c. a.); Borszék (c. a.).

dulcamarae Koch. Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

hyoscyami L. Nagy-hagymás (Deubel).

a. **chalcamera** Illig. Karlsburg, Hermannstadt, Schässburg, Balánbánya (auf Disteln, c. a.).

luteola Müller. Hammersdorf, Előpatak Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Baassen, Büdös (c. a., auf Weiden); Erösd (am Altfluss, Deubel).

picina Marsh. Klausenburg (Bielz); Oláh-falu (c. a.).

a. **melanophthalma** Duft. Götzenberg, Fogarasch, S.-Regen (Bielz).

887. *Haltica Geoffroy.*

quercetorum Foudr. (eruae Oliv.). Hermannstadt (a. B.), Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hahnbach b. H. (c. a.).

lythri Aub. Hätzszeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg (c. a.).

amaricis Schrank. Hätzszeg, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Unter-Kerz (c. a.).

fruticosa Ws. Schässburg, Klausenburg, Dees, Rodnagebirge (c. a.).

oleracea L. Durch das ganze Gebiet verbreitet, auch in allen Gebirgen.

888. *Hermacophaga Foudras.*

mercurialis F. Schielthal, Götzenberg (Bielz); Topánfalva (Erzgebirge). Alsó-Rákos, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).

889. *Batophila Foudras.*

rubi Payk. Hermannstadt, Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Zibinsgebirge, Zool (Ormay); Paringul, Rotenturm, Balánbánya, Alsó-Rákos, Schässburg, Zalatna, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

890. *Phyllotreta Foudras.*

armoraciae Koch. Mühlbach, Grossscheuern (Bielz); Ilva mica (Naszód, c. a.).

exclamans Thunbg. (brassicae Illig.). Hätzszeg, Gross-Scheuern, Säch.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Hammersdorf, Szováta (c. a.).

ochripes Curt. Hosszufalu, Tartlau, Schässburg (Bielz); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **cruciata** Ws. Schässburg (c. a.).

letrastigma Con. Kronstadt, Szováta, Borszék (c. a.); Bucsecs (Deubel).

flexuosa Illig. Hammersdorf, Holzmeugen, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).

Schässburg ist irrtümlich unter die Fundorte der *flexuosa* aufgenommen worden also zunächst zu streichen.

a. **fenestrata** Ws. Kronstadt (Mit der Stammform Deubel).

sinuata Steph. Hätzszeg, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Rodnageb. (c. a.); Kronstadt (Deubel).

var. **monticola** Ws. Hätzszeg (c. a.).

undulata Kutsch. Fogarasch, Mezőség (Záh, Bielz); Hätzszeg, Kronstadt (Gespreng, Zimmer), Schässburg, Borszék, Ilva mica (Naszód), Zalatna (c. a.); Rodnageb., Bodzaer Gebirge (Deubel); Erzgebirge (Müller).

vittula Redtenb. Hätzszeg, Kronstadt (Gespreng, Bielz). Schässburg, Ratosnya, Klausenburg, Bistritz, Rodnagebirge, Tordaer Schlucht (c. a.).

nemorum L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

atra F. (aterrima Schrank, punctulata Marsh.). Hätzszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmeugen, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Baumgarten, Klein-Pold, Szamosujvár (Ormay); Karlsburg (c. a.); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

- cruciferae** Goeze (*obscura* Illig.). Holzmengen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Unterkerz, Kronstadt (Gespreng), Schässsburg, Dees (c. a.); Rodnagebirge, Bistritz (Müller).
- aerea** All. (*punctulata* Foudres.). Unterkerz, Schässsburg (c. a., in Gärten jungen Pflanzen schädlich, Erdflöhe),
- diademata** Foudr. Unterkerz, Schässsburg, Ilvamika (Naszód, c. a.); Schulergeb., Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).
- procera** Redtenb. Retjezat, Hermannstadt, Klausenburg (c. a.).
- nigripes** F. Gross-Scheuern, Mezöség (Záh, Bielz); Vajda-Hunyad, Marosujvár (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

891. *Aphthona Chevrolat*.

Aphthona cyparissiae, Koch, ist aus unserem Verzeichnisse zu streichen, da die Art durch einen Irrtum meinerseits in dasselbe gekommen ist.

- abdominalis** Duft. (*albinea* Thoms.). Hátszeg (Bielz); Kronstadt (Deubel); Schässsburg (c. a.).
- pallida** Bach. Kronstadt (Zinne, Méhely).
- lutescens** Gyllh. Schässsburg (Fuchsloch, c. a.); Honigberg am Altfluss (Deubel).
- violacea** Koch. Gross-Scheuern, Marpod (Bielz); Honigberg am Altfluss (Deubel).
- venustula** Kutsch. Hátszeg (Bielz); Hermannstadt, Schässsburg (c. a.); Schulergebirge, Rosenauegebirge, Tepe bei Alsó-Rákos (Deubel); Torda (Müller).
- pygmaea** Kutsch. (*atrocoerulea* Thoms.). Kronstadt, Tartlau (Bielz).
- cyanella** Redtenb. Vajda-Hunyad, Tordaer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- coerulea** Geoffr. (*nonstriata* Harold). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Marpod, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Deubel).
- euphorbiae** Schrank. (*hilaris* All.). Hátszeg, Gross-Scheuern, Zood, Präsbe, Nussbach, Schässsburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (c. a.); Erzgebirge (Müller).
- ovata** Foudr. Tartlauer Wald (Méhely); Schässsburg, Alsó-Rákos (c. a.); Bucecs, Schuler, Rosenau, Kronstadt (Deubel).
- Stussineri** Ws. Schulergebirge (Deubel, c. a.).
- atrata** All. Kronstadt (Bielz); Vajda-Hunyad (c. a.).
- herbigrada** Curt. Schässsburg (Bielz); Gyógy (Ormay); Rosenauegebirge (Deubel).
- lacertosa** Rosenh. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Rotberg b. H., Kronstadt, Tartlau, Előpatak, Mezöség (Gyeke, Záh), Stolzenburg, Gyógy (Bad, Ormay); Vajda-Hunyad, Zalatna, Schässsburg, Baassen (c. a.).

892. *Longitarsus Latreille*.

- echii** Koch. Hermannstadt, Neppendorf, S.-Regen, Mezöség (Gyeke, Bielz); Schässsburg (April, Wieteburg, c. a.).
- Linnaei** Duft. Schässsburg, Karlsburg, Rotenturm (c. a.).
- anchusae** Payk. Hátszeg, Neudorf b. H., Mediasch, Schässsburg, Mezöség (Záh, Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).
- obliteratus** Rosenh. Rosenau (Deubel).
- niger** Koch. Hermannstadt (Ormay, 2. Aug.); Rotenturm (c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).
- parvulus** Payk. (ater Laesh.). Hátszeg (Bielz); Schässsburg (17. Mai, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel); Klausenburg (Müller).
- holsaticus** L. Holzmengen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- quadriguttatus** Pontopp. Tartlau, Schässsburg (Bielz); Reps (c. a.).
- apicalis** Beck. Gross-Scheuern, Héviz, Oláhfalú (Bielz); Rotenturm (c. a., Ormay); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel); S.-Regen (Müller).
- brunneus** Duft. Retjezat (Bielz); Hermannstadt, Baumgarten bei H. (Ormay); Schässsburg, Búdös (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- rubellus** Foudr. (*gravidulus* Kutsch.). Kronstadt, Zinne (Deubel); Csukás (c. a.).
- luridus** Scop. Gross-Scheuern, Tartlau, Reps, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Búdös, Schässsburg, Rátosnya (c. a.); Schulergebirge, Kronstadt (Deubel).
- var. cognatus** Ws. Kronstadt (Zinne), Dees (Méhely); Karlsburg (c. a.).
- a. **4-signatus** Duft. Felső-Venice (Méhely).
- stragulatus** Foudr. Schässsburg, Hátszeg (c. a.).
- lateripunctatus** Rosenh. var. **personatus** Wse.). Schässsburg (Wieteburg, 1. Ex. gesiebt, 11. April, Schrankel, 20. Mai, c. a.).
- nasturtii** F. Mühlbach, Fogarasch, Kronstadt, Schässsburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schulergebirge (Deubel); Baassen, Szováta (c. a.).
- suturalis** Marsh. Kronstadt (Deubel).
- atricillus** L. Schässsburg (Schulberg, 11. April, c. a.); Kronstadt, Honigberg (Deubel).
- suturillus** Duft. Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Borszék, Balán, Schässsburg (aus Kokegeniste gesiebt 11. November); Schulergebirge, Rodnagebirge, Rosenau (Deubel).
- curtus** All. (*pratensis* All.). Mezöség (Gyeke, Bielz).

- var. *monticola* Kutsch. Kronstadt, Zinne (Deubel).
- melanocephalus* Deg. (atricapillus Duft.). Kronstadt (Bielz); Schässburg Fuchsloch, 16. Oktober). Szováta, Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Heltau, Michelsberg, Schanta (Ormay).
- var. *atriceps* Kutsch (atricillus Foudr.). Hätzszeg (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Baumgarten (Ormay); Kronstadt, Zinne (Deubel).
- nigrofasciatus* Goeze (lateralis Illig.). Karlsburg, Schässburg, Alsó-Bákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- tabidus* F. (verbasci Panz.). Neudorf b. H., Holzungen, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Schulberg, 24. März), Hätzszeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- a. *vulgaris* Ws. (verbasci Illig.). Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hätzszeg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- lycoperi* Foudr. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Wolkendorf (Deubel).
- pratensis* Panz. (pusillus Gyll.). S.-Regen (Bielz); Grossau (Ormay); Weidenbach (Méhely); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- var. *medicaginis* Ak. Schässburg, Borszék (c. a.).
- exoletus* L. (femoralis Marsh.). Hermannstadt, Grossau (Juni—August, Ormay); Puj (b. Hätzszeg), Karlsburg, Schässburg, Balánbánya, Borszék, Ilva mică (Naszód, c. a.).
- pectoralis* Foudr. Hätzszeg, Kerzer Gebirge, Mezőség (Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg (c. a.); S.-Regen (Müller).
- pellucidus* Foudr. Karlsburg, Klausenburg, Nagyenyed, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Hätzszeg (Deubel).
- aeruginosus* Foudr. Schässburg (c. a.).
- jaeobaea* Waterh. (laevis Duft.). Borszék (c. a.); Kronstadt, Hätzszeg (Deubel).
- ochroleucus* Marsh. Schässburg (Bielz, c. a.); Hermannstadt (Ormay); Hätzszeg, Ober-Kerz (Glashütte), Baassen, Szováta (c. a.); S.-Regen (Müller).
- caneescens* Foudr. Hermannstadt (Juni, Ormay).

893. *Dibolia Latreille.*

- Schillingi* Letzn. Hätzszeg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- femoralis* Redtenb. Mezőség (Záh, Bielz); Schässburg (c. a.).
- Försteri* Bach. Hätzszeg (Bielz); Hermannstadt, Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- carpathica* Ws. Borszék, Schässburg (c. a.).
- depressiuscula* Letzn. Hätzszeg (Bielz).
- rugulosa* Redtenb. Kronstadt (Zinne, Deubel).
- cynoglossi* Koch. Hermannstadt, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Stolzenburg, Gyógy (Bal, Ormay).
- occultans* Koch. Königstein (Crepatura, Deubel).

894. *Apteropoda Chevrolat.*

- globosa* Illig. Gross-Scheuern (Bielz).
- orbiculata* Marsh. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).
- a. *aurichalcea* Ws. Malomviz (Hätzszeg), Baassen (c. a.).

895. *Mniophila Stephens.*

Lebt in Moos.

- muscorum* Koch. Schielthal, Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagel, Balánbánya (c. a.); Kronstadt (Deubel).

896. *Argopus Fischer.*

(Dicherosia.)

- Ahrensii* Germ. Götzenberg, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Baassen (c. a.).

(Argopus s. str.)

- bicolor* Fisch. (discolor Bielz). Klausenburg (Heuwiesen, Bielz).

897. *Sphaeroderma Stephens.*

- testaceum* F. (cardui Gyll.). Mühlbach, Freck, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.). Ich sammelte die Art auf Carduus acanthoides. Hätzszeg, Zernest (Deubel).

Cryptostoma.

Hispini.

898. *Hispella Chapuis.*

- atra* L. Hätzszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Marod, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz). Hammersdorf, Grossau (Ormay); Marosujvár, Baassen (c. a.); Várhegy, Törzburg, Persáner Gebirge (Deubel); Bistritz (Müller).

Cassidini.

899. *Hypocassida Weise.*

- subferruginea* Schrank. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kron-

stadt, Tartlau, Mediasch, Dees, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

900. *Cassida* Linné.

(Odontionycha.)

fastuosa Schall. Hátszeg, Mühlbach, Heltau, Girelsau, Unter-Kerz, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).

(Odontionycha i. sp.)

canaliculata Laich. (austriaca F.). Mühlbach, Klausenburg (Bielz); Schässburg (c. a.); Mező-Záh (Deubel).

vividis L. (equestris F.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

hemisphaerica Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Talmesch, Schässburg (Bielz).

(Mionycha.)

azurea F. (ornata Creutz, lucida Suffr.). Gross-Scheuern, Tartlau (Bielz); Schässburg (c. a.); Vargyas, Mező-Záh (Deubel).

splendidula Suffr. (subreticulata Suffr.). Hátszeg, Holzmengen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

margaritacea Schall. Hátszeg, Hermannstadt (a. B.), Talmesch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Pnj (b. Hátszeg), Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Deubel).

(Cassida i. sp.)

Murraea L. Retjezat, Mühlbach, Hammersdorf, Porcest, Surul, Kerzer Gebirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Míriszló (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Karlsburg, Schässb., Baassen (c. a.); Hohe Rong, Babarunka-Tal (Deubel).

atrata F. Hátszeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt, Rakovitza (Ormay); Rotenturm, Baassen (c. a.); Bistritz (Müller).

denticollis Suffr. Zalatna, Schässburg (c. a.).

rufovirens Suffr. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau (Bielz); Zalatna, Klausenburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

stigmatica Suffr. Mezőség (Gyeke, Bielz); Hermannstadt, Klein-Pöld, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

sanguinolenta Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Schässburg (c. a.).

prasina Illig. (chloris Suffr.). Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

sanguinosa Suffr. Hátszeg, Holzmengen, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz).

rubiginosa Müll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Záh, Bielz); Hammersdorf, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel).

ferruginea Goeze. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Freck, Előpatak, Schässburg, S.-Regen (Bielz).

vibex L. Mühlbach, Hermannstadt, Hammersdorf, Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Schässburg, Oláhfalú, Dees (Bielz); Klein-Pöld (Ormay); Reps (c. a.).

a. **pannonica** Suffr. Kronstadt (Deubel).

nebulosa L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, S.-Regen, Dees, Mezőség (Gyeke, Záh, Bielz); Kleinpöld, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Marosujvár, Klausenburg (c. a.).

flaveola Thunb. Hátszeg, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

nobilis L. Durch das Berg- und Hügel-land verbreitet.

vittata Villers (oblonga Illig.). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Rodnagebirge (Deubel).

LXX. Lariidae.

Lariini.

901. *Spermophagus* Steven.

sericeus Geoffr. (cardui Boh.). Durch das ganze Berg- und Hügel-land, namentlich auf Disteln.

Küsteri Schilsky. Karlsburg (c. a.).

variolosopunctatus Gyll. Hermannstadt (Bielz).

902. *Laria* Scopoli.

(Mylabris Geoffr., Bruchus L.)

loti Payk. Hátszeg, Girelsau, Marpod (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Torda (Müller).

pallidicornis Boh. Hátszeg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Alsó-Rákös (Tepe, c. a.).

tristicula Fahr. Gross-Scheuern (Bielz); Puj (b. Hátszeg, c. a.).

atomaria L. (seminaria Bach, granaria L.). Girelsau, Marpod, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záh), Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Schässburg, Szováta (c. a.).

rufimana Boh. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Girelsau (Bielz); Schässburg (c. a.).

affinis Fröhlich. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Szováta, Nagyenyed, Hátszeg (c. a.).

pisorum L. (pisi L.). Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Klausenburg (Bielz); Salzburg (Ormay); Nagyenyed (c. a.).

viciae Oliv. Mezőség (Gyeke, Záh). Kronstadt (Deubel). Hátszeg, Baassen, Szováta, Schässburg (c. a.).

nubila Boh. (rufipes Baudi). Grossscheuern, Holzungen (Bielz); Kronstadt (Deubel); Hátszeg, Klausenburg, Schässburg (c. a.).

luteicornis Illig. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

903. *Bruchidius Schilsky.*

marginalis F. Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod (Bielz); Hammersdorf, Kronstadt (Deubel); Szováta, Schässburg, Baassen, Borszék (c. a.); Maros-Vásárhely (Müller).

unicolor Oliv. (olivaceus Germ., canus Germ.). Neppendorf, Gross-Scheuern, Marpod (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

var. *debilis* Gyll. (canus Seidl.). Baassen (c. a.).

var. *miscellus* ♂ Boh. Hátszeg (Deubel).

bimaculatus Oliv. (♀ *dispergatus* Gyll., *variegatus* Germ.). Fogarasch, Grossscheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Bistritz (Deubel); Baassen (c. a.).

imbricornis Panz. Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyözy (Bal, Ormay); Kronstadt (Deubel); Schässburg, Baassen, Karlsruhe (c. a.).

varius Oliv. Hátszeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátszeg, Rosenau, Kronstadt (Deubel).

pauper Boh. Talinenberg bei Kronstadt (Deubel); Baassen (c. a.).

cisti F. (villosus Bach, ater Redtenb.). Girelsau, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Zinne), Mezőség (Gyeke, Mähely); Schässburg, Borszék (c. a.); Rotenturm (Deubel).

Rhynchophora.

LXXI. Anthribidae.

Urodoninae.

904. *Urodon Schönh.*

suturalis F. Mühlbach (roter Berg, Bielz). *pygmaeus* Gyll. Klausenburg (Bielz).

Anthribinae.

Tropiderini.

905. *Platyrhinus Clairville.*

resinosus Scop. (latirostris F.). Zibinsgebirge, Gölzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Oláhfa. Maros-Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Oler-Kerz (Glashütte), Rodnagelirge (c. a.).

906. *Tropideres Schönh.*

bilineatus Germ. Zibinsgebirge, Holzungen, Frecker Gelirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.).

albistrois Herbst. In den Gebirgen und im Bergland verbreitet.

dorsalis Thnb. Kronstadt (an einer Hausmauer, Mähely).

marchicus Herbst. (cinctus Payk.). Kerz (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Bodna, Hátszeg, Kronstadt (Deubel); Marosujvár, Schässburg, Borszék (c. a.).

niveirostris F. Gross-Scheuern, Präsbe, Mediasch (Bielz); Kronstadt, Hátszeg (Deubel); Schässburg, Marosujvár (c. a.).

sepicola F. Hermannstadt, Kronstadt (Deubel).

(*Enedreutes*.)

oxyacanthae Bris. Hermannstadt (Bielz).

Anthribini.

907. *Platystomus Schneider.*

Macrocephalus Oliv., *Anthribus* auct.)

albinus L. Hátszeg, Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Marienburg b. Kr., Nussbach, Bükszád, Mediasch, Schässburg, Marosgebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Retjezat, Rodnagelirge (c. a.); S.-Regen (Müller).

908. *Anthribus Geoffroy.*

fasciatus Forst. Zibinsgebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Zinne (Deubel); Schässburg (c. a.).

variegatus Geoffr. (varius F., *nebulosus* Seidl.). Gross-Scheuern, Präsbe, Kerzer Gebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Schanta (Ormay); Parin-gul-Gebirge, Schulergebirge, Kronstadt (Deubel); Frecker Gebirge (Serbota), Bistra, Schässburg, Borszék (c. a.).

fessellatus Boh. Klausenburg (Bielz); Zinne (Deubel).

nchulosus Küst. Hermannstadt (Bielz); Rossau, Schulergebirge (Deubel); Klausenburg (Müller).

Choragini.

909. *Choragus Kirby*.

Sheppardi Kirby. Torockó, Baassen (c. a.); Kronstädter Gebirge (Deubel).

Unsere Art weicht von *Ch. piceus* Kirby der Beschreibung nach ab, ebenso nach der Vergleichung mit zwei Exemplaren von Nord-Ungarn (Brancsik), stimmt aber auch mit der Beschreibung des Sheppardi nicht ganz überein, so dass die Annahme einer neuen Art vorliegt.

piceus Schaum. Zinne (Deubel).

LXXII. Curculionidae.

Otiorrhynchinae.

910. *Otiorrhynchus Germ*

(Dodekastichus.)

geniculatus Germ. Oláhfalva (Bielz); Klausenburg (c. a., am Fuss einer Erle unter Laub).

pulverulentus Germ. Schiellthal, Hunyad, Fogarascher Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schanta, Bistra (Ormay); Schulergebirge (Deubel).

a. **periscelis** Gyllh. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schuler-Gebirge, Hosszufalu (Bielz); Porkovitz (Zood-Gebirge), Bistra (Ormay); Retjezat (c. a.).

a. **conspurcatus** Stierl. Zibinsgebirge, Torockó, Topánfalva, Bistra, Vajda-Hunyad (c. a.).

a. **rumicis** Apfelb. Ober-Kerz (Glashütte), Topánfalva, Schulergebirge, Bistra (c. a.).

contractus Stierl. Rotberg b. H., Kerzer Gebirge (Bielz); Bucsecs, Bistra, Paringul (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

moldoviensis Apfelb. Paring (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

(*Otiorrhynchus* i. sp.)

1. **latissimus** Stierl. Kronstadt (Bielz).

Aus der ersten Gruppe der *Otiorrhynchus* i. sp. führt Bielz auch *O. multipunctatus* Stierl. an, doch scheint dieser den Alpen eigentümliche Rüssler in Kronstadt nicht vorzukommen.

2.

bisulcatus F. Déva, Grosspold, Fogarasch, Kronstadt (Zinne), Schulergeb. (Bielz); Klausenburg (Bükkwall), Torockó, Vajda-Hunyad (c. a.).

a. **longicollis** Gyll. Kronstadt (Bielz).

irritans Herbst. Torockó, Girelsau, Talmesch, Rotenturm, Kronstadt, Mediasch, Görgöny-Tal, Dees (Bielz); Götzenberg, Nagyág (Ormay); Klausenburg, Klausenburg, Borszék, Hátzeg,

Szurduk-Pass, Vajda-Hunyad (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

O. griseopunctatus Boh., den Bielz für Kronstadt anführt, scheint bei uns nicht vorzukommen.

hungaricus Germ. Déva, Vidra (Aranyos-Tal), Rotberg b. H., Kerzer Gebirg., Fogarasch, Mediasch, Dees (Bielz); Magyar-Forró u. M. Bükkös (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay); Klausenburg, Schässburg, Schulergebirge, Kronstadt (Zinne, c. a.).

Bielz führt auch *O. clavipes* Bond. (*tenebricosus* auct. non Herbst) für Kronstadt und Schulergebirge an; doch scheint diese Angabe auf einer Verwechslung mit *O. hungaricus* Germ. zu beruhen; bedarf jedenfalls einer neuerlichen Bestätigung, da mein Exemplar, das von der Zinne stammt, ein Weibchen des *O. hungaricus* ist.

niger F. Zibinsgebirge, Seliste, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Hosszufalu, Borszék, Maros-Gebirge, (Bielz); Bucsecs, Rodnagebirge (Koronis, c. a.); Nagybagymás (Deubel).

a. **villosopunctatus** Gyll. Kerzer Gebirge (Bielz).

a. **montanus** Boh. Kerzer Geb., Schulergebirge (Bielz).

a. ♂ **coecus** Germ. Zibinsgebirge (Bielz).

haematopus Boh. Bihargeb. (Bielz); Kronstadt (c. a.).

fuscipes Oliv. Schiellthal, Mühlbacher Geb. (Verfu lui Petru), Zibinsgebirge, Seliste, Surul, Frecker Gebirge, Negoi, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Schulergeb., Rodnagebirge (Kuhhorn, Bielz); Borszék, Bucsecs (c. a., auf Fichten häufig); Nagybagymás (Deubel).

a. **fagi** Gyllh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz).

laevigatus F. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Rodnagebirge (Koronis, Bielz); Hermannstadt, Hammerslof (Ormay); Előpatak, Schässburg (c. a.); Vargyas (Deubel).

3.

morio F. Schiellthal, Kronstädter Gebirge, Königstein, Bucsecs, Tesla, Marosgeb. (Bielz); Paringul, Rodnagebirge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

var. **ebeninus** Gyllh. Kronstadt, Schulergebirge (Bielz).

var. **memnonius** Gyll. Bucsecs (Bielz).

6.

crinipes Mill. Tömöcher Pass (Bielz).

7.

raucus F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

comatus n. sp. Zernerster Gebirge (Deubel).

Otiorrhynchus comatus n. sp. Länge 5 mm. ohne Rüssel. Ein Weibchen.

Die Art gehört in die siebente Gruppe Stierlins in die Nähe des *O. lanuginosus*, von dem sie sich durch gedrungeneren Körperbau, kürzeren und dickeren Rüssel, kürzere Fühler, feiner punktierten Halsschild, deutliche Punktstreifen der Flügeldecken mit gewölbten Zwischenräumen, längeres, größeres und anders gefärbtes Haarkleid usw. unterscheidet. Dunkelbraun. Fühler

und Beine rötlichgelb. Rüssel dick, kaum länger als der Kopf, konisch, kräftig gekielt. Augen klein wenig gewölbt, Stirne gewölbt, doppelt so breit als ein Auge, kaum breiter als der Rüssel zwischen der Fühlerinsertion. Fühler kurz, kräftig, der Schaft gegen die Spitze wenig verdickt, kaum kürzer als die Geissel, welche zur Spitze kaum merklich verdickt ist; die beiden ersten Glieder derselben gleich lang und dick, jedes etwa doppelt so lang als breit, das dritte Glied kurz, verkehrt konisch, so lang als breit, die folgenden quer, die letzten nahezu $1\frac{1}{2}$ so breit als lang. Halsschild fast etwas länger als breit, an den Seiten schwach gerundet, nach hinten wenig, nach vorne stark verengt, stark convex, mässig fein und tief, dicht, fast runzlig punktiert, etwas glänzend, mit gelbbraunlichen, schwach metallisch glänzenden, anliegenden Haaren bedeckt, die sich nicht zu Längsbinden verdichten. Flügeldecken regelmässig oval, etwa anderthalbmal länger als breit, fein chagriniert, matt, deutlich punktiert gestreift, die Streifen vertieft, die Zwischenräume mässig gewölbt, mit heller und dunkler braunen, anliegenden, schwach metallischen Haaren etwas fleckig bekleidet. Beine kräftig, rötlichgelb, die Schienen gerade, die Vorder-schienen am Innenrande schwach zweibuchtig, an der Spitze nur nach Innen erweitert, an der Innenkante nicht gekerbt.

Deubel sammelte diese Art in einem Exemplar im Zerneschter Gebirge.

Die Art hat im Habitus auch Ähnlichkeit mit der zweiten Gruppe des Subgenus *Tournieria*, da jedoch der Unterkörper verhältnismässig weniger gross, die Vorderbeine kaum kräftiger entwickelt und der Rüssel etwas länger als der Kopf ist, halte ich seine Stellung in der 7. Gruppe des Subgenus *Otiorynchus* für die natürlichere. In dieser Gruppe nähert er sich in Form, Grösse und Habitus am meisten dem *O. rancus* F., von dem er aber durch längeres, punktiertes Halsschild, dünnere und feinere Behaarung und kleinere Augen verschieden ist.

8.
perdix Oliv. Retjezat, Talmatschel, Rotenturm, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Arpascher Gebirge, Schauta (Ormay); Zibinsklamm, Retjezat (c. a.); Hát-szeg, Szurdok-Pass (Deubel).

10.
banaticus Stierl. Zibins-Gebirge (Vle-gyásza, c. a.).

chrysomus Boh. Klausenburg (Bielz).
remotegranulatus Stierl. (Peterfi Mallász);
Delunala, Bihar Gebirge (Mallász).

12.
consensus Germ. Gross-Scheuern, Birt-halm (Bielz); Rotenturm (vidi).

13.
juglandis Apfelb. Rotenturm (Deubel, c. a.).
Apfelbeck (Mit. Bosn. 1896, 548) bezeichnet die Schenkel als ungezähnt. Mein Exemplar aus dem Rotenturm und ein zweites von Rhodus besitzen an den Vorderchenkeln zwei dicht nebeneinander liegende, zwar sehr kleine, aber deutliche, scharfe Körner.

14.
ormayi Stierl. (Schweizer ent. Ges. Bd. 8. H. 1.). Porumbacher Gebirge (Sereci, hochalpin, Ormay).

mandibularis Redtenb. Örkény (Unter-weissenburger Komitat, c. a.).

var. granulatus Boh. Klausenburg (Bielz).

16.
dacicus Dan. (*costipennis* Stierl.). Zibins-gebirge (Zibinsjäser, Sterpu), Kerzer Gebirge (Bielz); Präsbe, Arpascher

Gebirge (Ormay), Retjezat, Bistra, Frecker Gebirge (Serbota), Ober-Kerz (Glasbütte), Buceces, Rotenturm (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

Nach den Untersuchungen Dr. Daniels (Stadien 2) kommt *O. costipennis* Rosenh. bei uns nicht vor, da Stierlin denselben nicht gekannt hat. Es gehören also die Fundorte des *O. costipennis* Rosenh. bei Bielz zu *O. costipennis* Stierl. = *O. dacicus* Dan.

albensis n. sp. Ompolyztatal bei Zalutna (c. a.).

Otiorynchus albensis n. sp. Länge 6 mm.
O. dacicus Dan. proximus et similis, sat tamen differt rostro tenuiore, longiore, subcylindrico, antennis longioribus, gracilioribus, funiculi articulis ultimis haud transversis, oculis paulo minoribus, prothorace haud sulcato, minus dense aequaliter granulato, granulis paulo majoribus, elythrorum interstitio 2^o et 4^o a sutura plano, ceteris omnibus costatis, setulis costarum suberectis, reclinatis, fere spatuliformibus, pedibus gracilioribus, longioribus.

1 specimen. Habitat valle ompolyzense prope locum transylvanicum Zalutna.

Einem kleinen *O. dacicus* Dan., der mir von verschiedenen Orten (Buceces, Retjezat, Kerzer Gebirge, Bistra, auch von den Banater Bergen (Merk!) vorliegt, recht ähnlich, aber meiner Ansicht nach wegen der obigen Unterschiede kaum als Varietät des *O. dacicus* anzusehen, wie Dr. Karl Daniel, dem ich ein Exemplar der Varietät dieser Art zur Ansicht vorlegte, vorgeschlagen hat.

Der Käfer ist pechschwarz, matt, die Fühler, Schienen und Tarsen rötlichgelb. Rüssel und Fühlerschaft sind mit kurzen, dicken Schuppenborsten nicht sehr dicht bedeckt, der letztere ausserdem mit ziemlich langen etwas abstehenden Borsten. Alle Geisselglieder der Fühler sind mindestens so lang als breit, das erste und zweite an Länge kaum verschieden, jedes von ihnen etwa doppelt so lang als breit, das dritte etwas kürzer als das zweite, aber nicht dicker und viel länger als breit, die folgenden etwas kürzer, aber nicht dicker werdend, absteehend behaart. Kopf und Rüssel sind weniger dick als bei *O. dacicus*, der letztere auch länger und von den Augen bis zu den Pterygien äusserst schwach konisch, sein Rücken flach geführt, in der ebenen Furche fein gekielt, die Seitenränder der Furche an den Seitenrand des Rüssels gerückt, so dass derselbe dreikeilig erscheint. Die Stirne ist schwach vertieft an der Rüsselbasis, wenig gewölbt und deutlich breiter als das flache Auge. Der Halsschild ist dem des *O. dacicus* ähnlich, aber etwas weitläufiger mit etwas grösseren Körnern von gleicher Grösse bedeckt, eine Mittelfurche nicht erkennbar, jedes Korn trägt ein niedergebogenes dickes Schuppenborstchen, die zusammen die schwarze Grundfarbe nicht beeinträchtigen. Die Flügeldecken sind mit vereinzelten runden grauen Schuppen bedeckt, auf den erhabenen Zwischenräumen befindet sich eine einfache, regelmässige Körperreihe und jedes Körnchen trägt ein an der Spitze schwach spatelförmig erweitertes, rückwärts gebogenes Borstchen. Nur der zweite und vierte Zwischenraum (der Nahtzwischenraum mitgerechnet) ist vollkommen flach und vollkommen ungekört, die übrigen alle gleichmässig rippenförmig erhaben. Die Beine sind schlanker und deutlich länger als bei *O. dacicus*.

Ein zweites Exemplar aus Topánfalva im Erzgebirge, welches Dr. K. Daniel ebenfalls als Varietät zu *O. dacicus* stellte, betrachte ich als Varietät dieser Art. Durch die dicke, graue, äusserst schwach metallische Beschuppung der Oberseite gewinnt sie grössere Ähnlichkeit mit ähnlich beschuppten *O. dacicus*, aber in der Rüsselform, den schlanken Fühlern und Beinen dem kleinere Kopf und in dem Fehlen der Halsschildmittelfurche stimmt sie mit der neuen Art vollkommen überein. Ich führe sie als Varietät **obductus** m. ein. Auch bei der Va-

rietät ist nur der zweite und vierte Zwischenraum der Punktreifen auf den Flügeldecken flach, die übrigen gerippt, aber ausser der Körnchenreihe auf den Rippen sind Körnchen auch in den Punktstreifen, vereinzelt auch noch auf den flachen Zwischenräumen bemerkbar.

var. **obductus** n. Topánfalva (c. a.).

antennatus Stierl. Paringul, Surian, Mühlbacher Gebirge (V. l. Petru.). Zibinsjäser, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

var. **Rosenhaueri** Stierl. Frecker Gebirge (Serbota), Kerzer Gebirge (Vunetoare), Negoi (Schutzhütte, Deubel).

aratus Dan. Bucsecs (c. a.).

cosmopterus Dan. Zernestgebirge, Königstein (Deubel).

scaher L. (septentrionis Hbst.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

proximus Stierl. (atricus Reitter). Frecker Geb. (Serbota), Balánbánya, Schulergebirge, Borszék, Paringul, Rodnageb. (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

Da Bielz den nahe verwandten *O. carpathicus* Daa. nicht kannte und daher Fundorte des *O. carpathicus* und *proximus* durcheinander geworfen sein dürften, führe ich nur die seit Bekanntwerden der neuen Art festgestellten Fundorte für beide an.

carpathicus Dan. Bucsecs, Frecker Geb. (Serbota), Kerzer Gebirge (Bulea-Tal, c. a.); Bodzaer Gebirge, Schulergeb. (Deubel).

hypsiatus Ganglb. Rodnagebirge (Deubel, c. a.); die Art wird oberhalb der Baumregion aus Grashüscheln gesiebt; Schulergebirge (Deubel).

18. **dubius** Ström (maurus Gyll.). Schanta (Ormay); Rodnagebirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Bodzaer Gebirge, Negoi (Schutzhütte), Bucsecs (Deubel).

19. **lithanhracius** Boh. Zibinsgebirge (Bielz); Hätzeger Gebirge (alpin, Deubel).

denigrator Boh. Zibinsgebirge (Zibinsjäser, Negovan, Bielz); Bucsecs, Paringul, Retjezat (c. a.).

var. **Ocskayi** Stierl. Siebenbürgen.

glabratus Stierl. Schielthal, Măda, Torda, Marosgebirge, Cibiles, Surian, Zeidner Berg, Kronstadt, Rosenau, Bucsecs, Piatra mare, Tesla (Bielz); Zalatna, Topánfalva, Retjezat, Schuler-Gebirge, Alsó-Rákos (c. a.).

20. (Dorymerus.)

rotundatus Siebold (seductor Stierl.). Schässburg (Schulberg, Siechhofwald, Fuchsloch unter Laub), Vajda-Hunyad, Alsó-Rákos (c. a.); Karlsburg (von Hauptmann Zellich, Deubel).

Die Vergleichung eines aus Danzig stammenden *O. rotundatus* mit dem siebenbürgischen *O. seductor* Stierl. hat die Identität der beiden Arten ergeben, da ich zwischen denselben keinen Unterschied auffinden konnte; die Art besitze ich auch aus Kärnten von Herrn Stierlin.

22. **Kollari** Gyll. Zibinsgebirge, Kerzer Geb., Kronstadt, Csiker Geb. (Balánbánya),

Borszék (Bielz); Retjezat, Rotenturm (c. a.).

a. **Küsteri** Stierl. Kronstädter Gebirge (Bielz); Kerzer Geb. (Ormay); Bistra (c. a.).

a. **Bielzi** Küst. Präsbe, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgeb. (Bielz).

Deubeli Ganglb. Rodnagebirge (Deubel, Ganglbauer, c. a.); der Käfer scheint im Juni nicht selten zu sein.

Kuenhurgi Stierl. Kronstädter Gebirge, Königstein (Bielz).

Schaumi Stierl. Kerzer Gebirge, Csiker Gebirge (Balánbánya, Öcsém, Bielz); Arpascher Gebirge (Ormay); Rodnagebirge, Schulergebirge (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

equestris Richter (aerifer Germ.). Nagybagymás, Kronstadt (Deubel); Klausenburg, Borszék (c. a.).

austriacus F. Schielthal, Godinest, Csib, Vidra (Aranyostal), Zood, Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Bad, Ormay).

var. **carinatus** Gyllh. Klausenburg (Bielz).

Méhelyi Stierl. (Schweizer Mitt. 1895, 300). Hermannstadt, Tordaer Schlucht, Szurdak-Pass (c. a., am letzteren Orte an den Steinen der Strassenstützmauern gesammelt).

O. Méhelyi Stierl. scheint sich von *O. austriacus* F. nur durch dickere, kürzeren, nach vorne konisch vereingten Rüssel und etwas bedeutendere Grösse zu unterscheiden; dann dürfte *O. austriacus* bei uns gar nicht vorkommen und die Fundorte des *austriacus* wären auf *O. Méhelyi* zu übertragen.

amplus Petri. Kronstadt (c. a.).

obtus Boh. Rosenauer Geb. (c. a.).

Mein Exemplar wurde von Herrn Ganglbauer als *O. graniventris* Mill. bestimmt, dessen Beschreibung aber durchaus nicht passt.

graniventris Mill. Csiker Gebirge (Balánbánya, Öcsém, Nagybagymás, Bielz).

23. **longiventris** Küst. Zibinsgebirge (Zibinsjäser, Sterpu), Surul, Frecker Geb., Kerzer Gebirge, Arpascher Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Marosgebirge (Bielz, c. a.).

Schon K. Fuss stellte fest (Verh. v. M. s. V.), dass die subalpine Form des *O. longiventris* in der Regel mehr-weniger beschuppt sei, während die Tiere oberhalb der Baumregion in der Regel unbeschuppt seien, fand jedoch keine weiteren Unterschiede. Meine Untersuchungen ergaben zwar einige Unterschiede, die jedoch nicht bei allen Tieren in gleichem Masse zur Entwicklung gelangen, sondern einen deutlichen Übergang von der alpinen zur subalpinen Form erkennen lassen.

Oberseite der alpinen Form in der Regel unbeschuppt, aber immer mit spärlichen, feinen Börstchenreihen auf den Zwischenräumen, ausserdem zuweilen mässig dicht behaart, gegen die Basis etwas sparsamer, aber die Haare kaum schuppenförmig, oder gegen die Spitze zerstreut schuppenförmig behaart, die Schuppen aber viel schmaler, sehr selten fast so gross (Paringul), wie bei der subalpinen Form.

♂. Beine kürzer, kräftiger, stärker keulig verdickt, Hinterschienen breiter und kürzer. Innenrand im Basisviertel stark, im 2. und 3. Viertel

schwächer, aber deutlich gebuchtet, der Ausschnitt vor der Spitze wie bei der subalpinen Form.

♀. Kopf und Rüssel dicker, letzterer bis zu den Pterygien stärker verjüngt, Hinterschienen breiter, zur Spitze bald stärker, bald schwächer allmählich erweitert und bald deutlich bald schwächer gegen die Spitze nach hinten gebogen.

Csiki hat Weibchen mit stark gebogenen und erweiterten Hintertibien als *O. Fussianus* beschrieben, die allerdings grosse Ähnlichkeit mit den Hinterschienen des Weibchens von *O. Riessi* und *O. graniventris* besitzen, doch sind die Hinterschienen des ersteren und die Beine überhaupt bei den Weibchen viel kürzer und kräftiger, die Fühler deutlich kürzer und kräftiger, die letzten Geisselglieder nicht länglich wie bei *longiventris*, sondern rundlich; doch ist immerhin die Unterscheidung der Weibchen beider Arten schwierig.

Die alpinen Tiere meiner Sammlung stammen vom Bala-See und der Vunetare im Kerzer Gebirge und von Karsin im Paringulgebirge, die subalpinen aus der nächsten Umgebung der Kerzer Glashütte. Die alpinen Tiere wurden aus Grasbüscheln gesiebt oder unter Steinen gesammelt, während die subalpinen auf Brennesseln leben.

Riessi Fuss. Kronstädter Gebirge, Bucsecs, Csiker Gebirge (Bielz).

25. **corruptor** Host. (giraffa Germ.). Kronstadt (Bielz).

polycoccus Gyllh. Balánbánya (Vigyázókő, 1 ♀, Mchely).

curvipes Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

rugosus Hummel. Kronstadt (Bielz).

26. **alpigradus** Miller. Borszék, Czibles (Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

granicollis Boh. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge (Bielz).

a. **pictus** m. Retjezat.

O. granicollis a. **pictus** kommt mit der Stammform vor, ist aber an den Seiten der Flügeldecken, namentlich gegen die Spitze hin, mit Gruppen oder einzelnen weissen, schmalen schuppenförmigen, anliegenden Haaren gezeichnet.

var. **Paringii** n. Paringulgebirge (c. a.).

O. granicollis var. **Paringii** (♂♀) ist kleiner und schlanker als die Form vom Retjezat, die Flügeldecken sind deutlicher gestreift und gegen die Spitze mit vereinzelt runden Schuppen gezeichnet, die breiter sind als bei a. **pictus** oder *O. longiventris*, in dem Streifen gekörnt, die Hinterschenkel etwas stärker gezähnt. Von dem ♀ des *O. longiventris*, für welche Ganglbauer diese Form irrthümlich hielt und dem sie sich in der Skulptur der Flügeldecken nähert, unterscheidet sich die Form und Skulptur des Rückens, des Rüssels, kräftigere Fühler, viel kürzeres 2. Geisselglied, schwächere Bezeichnung der Vorderschenkel, runzig granuliertes Abdomen und den Mangel der sexuellen Auszeichnung der Hinterbeine. Die Form der weiblichen Hinterschienen nähert sich der des weiblichen *O. Fussianus*.

Kratleri Boh. Kerzer Gebirge, Kronstadt, Rodnagebirge (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Bucsecs, Schulergeb. (c. a.); Nagyagyomás (Deubel).

var. **egregius** Mill. Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Schuler-Gebirge (Bielz); Nussbach, Rodna-Gebirge, Bucsecs (c. a.).

corvus Boh. Siebenbürgen (Stierlin).

Moesaryi Csiki (montigena Friv.). Görgegy, Oláhfalv (c. a.).

asplenii Mill. Hargita (Mezőhavas, Bielz); Rodnagebirge (c. a.).

var. **seriepunctatus** m. Rodnagebirge (c. a.).

O. Asplenii var. **seriepunctatus**. Der an dem kurzen, konischen Rüssel und der rechtwinkligen Aussackung der Vorderschienen am sichersten erkennbare *O. Asplenii* ist in der Skulptur der Flügeldecken variabel. Bei unseren *O. Asplenii* ist die Stierlin'sche Skulptur selten deutlich ausgeprägt. Besonders auffallend ist eine Form mit fast vollkommen ebenen, glatten Flügeldecken (c. a.) mit Reihen länglicher, tiefer, scharf begrenzter Punkte, deren Zwischenräume sehr breit und vollkommen eben sind. Ich habe sie mit dem obigen Namen belegt.

obsidianus Boh. Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Persanyer Gebirge, Kronstadt, Schulergebirge, Tömöschers Pass, Piatra mare, Hosszufalu, Dongókő, Kelemengeh., Borgoer Pass, Rodnagebirge (Koronjs), Laposcher Gebirge (Oláh-Laposbánya, Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Nagyagyomás (Deubel).

27. **dives** Germ. Retjezat, Zibinsgebirge, Galbina, Götzenberg, Präse, Surul, Frecker Gebirge, Kerzer Gebirge, Marosgebirge, Gyalu (Bielz); Rotenturm (Ormay); Bistra, Malomviz, Girbova, Topánfalva, Puj (bei Hätzeg, c. a.).

Die 4 Arten der 27. Gruppe, welche durch Bielz wohl nur irrthümlich durch *O. gemmatus* Scop. vermehrt wurde, da diese Art dem Alpengebiet angehört, lassen sich als solche nicht, auch kaum als Varietäten aufrecht erhalten, da die Uebergänge von der einen zur anderen so mannigfaltig sind, dass sich typische Stücke für die einzelnen Arten selten rein finden. *O. cymophanus* Germ. basiert wohl auf grösseren Weibchen des *dives* mit weniger gewölbtem Rücken der Flügeldecken. Die Skulptur des Rückens, der Flügeldecken und des Abdomens variiert, ebenso die Stärke des Vorderschenkelzahnes, welche beim ♀ immer schwächer ist als beim ♂; in der Penisform finde ich keine Verschiedenheit. Es wird sich wohl empfehlen, als Stammform *O. dives* Germ. anzunehmen, mit mehr-weniger dicht beschuppten Halsschild- und Flügeldecken-seiten und mit undeutlich punktierten Flügeldeckenstreifen; dazu gehört als Synonym *O. cymophanus* Germ. Als Varietät kann *O. Fussi* Küster aufgefasst werden mit sparsam und gleichmässig beschupptem Halsschild, auf den Flügeldecken bilden die Schuppen zerstreute, kleine Flecken; die Streifen der Flügeldecken sind deutlicher und tiefer punktiert, die Vorderbeine etwas kräftiger und ihre Schienen beim ♂ tiefer zweibuchtig, so dass sie am Innenrande oft stumpf gezähnt erscheinen. Der Rüssel ist bald flach, bald gefurcht mit oder ohne Ktl. Ebenso beschuppte Stücke mit tieferen, fast vollständig isolierten, grubenartigen Punkten in den Streifen bilden die Subvarietät *O. opulentus* Germ., wie es scheint stets ♂♂ des *O. Fussi*. Nach den Vertretern meiner Sammlung findet sich *O. dives* Germ. mit seinen Varietäten an folgenden Orten:

dives Germ. (1. *cymophanus* Germ.). Retjezat, Malomviz, Puj b. Hätzeg, Bistra, Szurdok-Pass, Rotenturm, Kerzer Gebirge, Topánfalva, Girbova (Zibinsgebirge).

var. **Fussi** Küster. Rotenturm, Zibinsklamm, Arpascher Gebirge, Kronstadt, Schuler Geb., Thordaer Schlucht, Szováta, Borszék, Rodnagebirge.

a. **opulentus** Germ. Retjezat, Arpascher Geb., Szurdokpass, Malomviz, Rodnageb., Borszék.

cymophanus Germ. Zibinsgebirge, Kerzer gebirge, Oláhfalv (Bielz).

opulentus Germ. Alsó-Grohot, Oláhfalva (Bielz); Arpascher Gebirge, Rodnagel., Retjezat, Borszék, Szurduk-Pass (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

Fussi Küst. Schiethal, Kerzer Geb., Kronstadt, Schulergebirge, Piatra mare, Borszék, Marosgebirge, Borgoer Pass, Klausenburg (Bielz); Götzenberg, Schanta (Ormay); Szováta, Tordaer Schlucht, Zibinsklamm, Rodnagel., Borszék (c. a.).

28.

populeti Boh. Kerzer Gebirge (Bielz).

O. sulcatus F., der in diese Gruppe gehört, ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da die Anführung desselben für Schässburg auf einem Irrtum beruht.

auricapillus Germ. Bihargebirge (Bielz).

tristis Scop. (nigrita F.). Klausenburg (Bielz); Miriszló (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay).

32.

squamosus Mill.

a. squamulatus Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

salicis Ström. (lepidopterus F.). Mühlbacher Gebirge (Slmor), Präsbe, Borgoer Pass (Bielz); Schanta, Bistra, (Ormay); Borszék, Retjezat (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

tenuicornis Mill. Siebenbürgen.

Dieser Käfer ist seit Bielz in Siebenbürgen nicht mehr konstatiert worden, so dass sein Vorkommen bei uns zweifelhaft erscheint.

33.

Reichei Stierl. Zood, Kronstadt (Salomons-Felsen, Bielz).

34.

fusciventris Fuss. Bucsecs (Bielz); Königstein (Deubel).

var. Scribae Klement. Bucsecs (scheint Katalogsname zu sein, da mir eine Beschreibung dieser Varietät unbekannt ist).

rufomarginatus Stierl. Siebenb. (Stierlin).

36.

Hampel Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

37.

marmota Stierl. Paringul, Retjezat (c. a.); Bucsecs.

O. rugifrons Gyll.; welcher der 38. Gruppe angehört, ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da er irrthümlich in dasselbe gekommen ist. (Tithonus.)

chrysocomus Germ. Präsbe, Kerzer Geb. (Bielz); Frecker Gebirge, Retjezat (c. a.).

(Cryphiphorus.)

Ilgustici L. (subrotundatus Stierl.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

a. agnatus Gyll. Unter-Tömös (Méhely). **edentatus** Seidl. Schässburg, Előpatak, Schulergebirge (c. a.); Balánbánya (Deubel).

cuprifer Stierl. Előpatak, Schässburg.

bicostatus Boh. Kronstädter Geb. (Bielz).

orbicularis Hbst. Ilátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Kronstadt, Schulergebirge, Königstein, Me-

diasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Bielz); Nagyenyed, Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Marosujvár, Karlsburg (c. a.).

(Tournieria.)

velutinus Germ. Siebenb. (Bielz); Karlsburg (Zellich).

fullo Schrank. (Zebra F.). Schiethal, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg, Hermannstadt, Klausenburg (c. a.).

subsetulosus Stierl. Siebenb. (Stierlin).

coarctatus Stierl. Hermannstadt, Kronstadt, Schulergebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Klausenburg, Alsó-Rákos, Topánfalva (c. a.).

scopularis Hochh. Alsó-Rákos (c. a.).

pauxillus Rosenh. In allen Gebirgen im Moos, namentlich unter Fichtenreisig). **var. rugirostris** Stierl. (Mazuræ Formanek.) Retjezat (c. a.).

maxillosus Gyll. Klausenburg (Bielz).

Nicht zu deuten vermag ich den **O. imitatus** Tourn., den Bielz vom Kerzer Gebirge anführt.

transylvanicus Stierl. Siebenbürgen (Stierlin).

ovatus L. Im ganzen Berg- und Hügelland verbreitet.

Schusteri Stierl. Schulergebirge (oberhalb der Baumregion an trockenen, sandigen Stellen unter Steinen, Deubel, c. a.); Bucsecs (Deubel).

911. Stomodes Schönh.

gyrosicollis Boh. Schiethal, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., S.-S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Bad), Kakova (Ormay); Schässburg, Repts, Ilátszeg, Vajda-Hunyad (c. a.); Kronstadt (Deubel).

912. Peritelus Germ.

leucogrammus Germ. Hammersdorf, Klausenburg (Bielz); Kronstädter Gebirge (c. a.); Petersberg b. Kr. (Talinenberg, Deubel).

familiaris Boh. Kronstadt (Bielz).

913. Mylaeus Schönh.

seminulum F. Fogarasch, Repts, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Nussbach (auf Ilmbeergesträuch, c. a.).

rotundatus F. Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Mezőség (Gyeke, Záb, Bielz); Stolzenburg (Ormay); Petersberg b. Kr. (Talinenberg, Deubel).

914. Argoptochus Weise.

bisignatus Germ. Klausenburg (Bielz).

bifoveolatus Stierl. Schulergebirge (besonders auf einer Umbellifere, Deubel, c. a.).

subsignatus Boh. Mezőség (Gyeke, Méhely). (Henschia.)

periteloïdes Fuss. Gross-Scheuern, Marjöl, Mezőség (Záh, Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg (Scheuereberg im Juni gekötschert (c. a.); Hátszeg (Deubel).

915. *Phyllobius Schönk.*

glaucus Scop. (calcaratus F.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

urlicae Degeer. Hátszeg, Retjezat, Kerzer Gebirge, Szombat, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees, Gyeke (Bielz); Hermannst. (Ormay); Schässburg, Malomviz (c. a.).

var. **nudus** Westh. Kronstadt.

transylvanicus Stierl. Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Schuler-Gebirge, Bucsecs, Borszék, Balánbánya (c. a.); Nagyhagymás (Deubel).

pilicornis Desbr. Rotenturm (Ormay, von Nussbäumen); Hátszeg, Schässburg (c. a.).

hungaricus Stierl. Rotenturm, Schässburg (c. a.).

piri L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

contemptus Stev. Fogarasch (Bielz).

incanus Gyllh. Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Hermannst. (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

scutellaris Redtb. Klausenburg (Bielz); Hermannstadt (a. Bg., c. a.); Kronstadt (Deubel).

alpinus Stierl. Bucsecs, Rodnagebirge (Koronj, c. a.).

maculicornis Germ. Kerzer Gebirge, Fogarasch (Bielz); Zalatna, Szováta (c. a.); Kronstadt (Deubel).

argentatus L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. **viridans** Boh. Hermannstadt (Ormay). **psittacinus** Germ. Kronstadt (Deubel).

aurifer Boh. (breviatus Desbr.). Hátszeg, Schässburg, Marienburg bei Sch., Héviz (c. a.); Kronstadt (Deubel).

lateralis Reiche. Kronstadt (Zinne, Deubel).

betulae F. Hátszeg, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. **trivialis** Boh. Schässburg (c. a.).

oblongus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, auf Obstbäumen, namentlich Zwetschen und Pflaumen, häufig.

pictus Stev. Klausenburg (Bielz).

sulcirostris Boh. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

viridicollis F. Präsbe, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Borszék, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pomonae Oliv. Rotberg, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay); Klausenburg (c. a.).

viridiaeris Laich. Zibinsgebirge (Bielz). (Pseudomylocerus.)

cinerascens F. Zibinsgeb. (Bielz); Schässburg (c. a.).

sinuatus F. Klausenburg (c. a.).

Brachyderinae.

916. *Polydrosus Germ.*

Bielz führt einen *P. croaticus* Stierl., der sich in keinem Kataloge vorfindet, für Kronstadt an. (Metalites.)

impar Gozis. Rodnagebirge (Deubel, c. a.). (Chlorodrosus.)

amoenus Germ. Zood, Kerzer Geb., Harigita (Bielz); Rodnagebirge, Borszék, Paringul, Frecker Geb. (Serbota, c. a.); Bodzagebirge (Deubel).

(Eudipnus.)

mollis Stroem. Durch das ganze Berg- und Hügelland auf Gesträuch.

(Thomsononymus.)

sericeus Schall. Hátszeg, Götzenberg, Rotenturm, Gross-Schenk, Bucsecs, Mediasch, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Deubel).

thalassinus Gyll. Fogarascher Gebirge (c. a.).

(Eustolus.)

flavipes Deg. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

confluens Steph. Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay); Hammersdorf (auf Kleearten, c. a.).

Bielz führt auch *P. chrysomela* Oliv. für Klausenburg an, doch dürfte hier ein Irrtum vorliegen, da die Art dem westlichen und südwestlichen marinen Gebiete angehört.

cervinus L. Zibinsgebirge, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pilosus Gredler (binotatus Thoms., melanostictus Chev.). Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Polydrosus i. sp.)

tereticollis Deg. (undatus F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland in Wäldern auf Gesträuch.

ruifcornis Bond. Rotenturm (c. a.); Zernest, Kronstadt, Rosenau (Deubel).

picus F. Durch das ganze Gebiet auf Gesträuch.

(Tylosdrosus.)

pterygomalis Boh. Hátszeg, (Götzenberg?), Szombat, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schässburg, Dees, Mezőség (Záh, Bielz).

subalpinus n. sp. Csukás, Rodnagebirge.

Polydrosus (Tylosdrosus) **subalpinus**. *P. pterygomali* Boh. similimus, sed magis elongatus, angustior, magis parallelus, minus convexus, im-

primis antem forma clavae antennarum elongata diversus. Länge $4\frac{1}{2}$ mm. 3 Exemplare.

Dem *P. pterygomalis* Boh. ausserordentlich ähnlich, aber deutlich flacher, gestreckter und mit mehr parallelen Seiten. Behaarung und Beschuppung wie bei diesem, erstere auf dem Kopfe und Halsschilde weniger lang. Fühler und Beine gelb. Das sicherste Unterscheidungsmerkmal jedoch bildet die Fühlerkeule der schlanken Fühler, welche deutlich gegliedert und wesentlich gestreckter, etwa viermal länger als dick ist, während dieselbe bei *P. pterygomalis* höchstens dreimal länger als dick ist.

Die Punktstreifen der Flügeldecken sind bei zwei Exemplaren ebenso fein wie bei *pterygomalis*, beim dritten Exemplar erscheinen die Flügeldecken etwas stärker punktiert gestreift, wodurch sich die Art dem *P. caucasicus* nähert; doch ist bei allen drei Exemplaren die absteigende gelbweisse Behaarung ebenso lang und aufrecht wie bei *P. pterygomalis*.

corruscus Germ. Hätzeg, Grossscheuern, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg (Ormay); Salzburg, Nagyenyed, Klausenburg (c. a.).

viridicinctus Gyll. Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Baassen, Előpatak, Nussbach (c. a.).

917. *Stasiodis Gozis.*

parvulus F. Oberkomana (Méhely).

918. *Sciaphobus Daniel.*

barbatulus Germ. Hätzeg (Bielz, c. a., in einem Kleefeld gekötschert).

caesius Hampe. Schässburg, Baassen, Präszaka (Zalatna, von Steinklee? geklopft, c. a.); Gyógy (Bad, Ormay); Dees (Méhely); Kronstadt (Deubel).

var. **Merkli** Stierl. Karlsburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

squalidus Gyll. Mediasch (Bielz); Karlsburg, Baassen, Schässburg (auf Obstbäumen, Ahorn, Schlehcn etc. schädlich, c. a.); Nagylak (Unterweissenburger Komitat), Remete (Nagyenyed, Ormay).

919. *Scythropus Schönk.*

mustela Herbst. Zibinsgebirge, Talmatschel (Bielz).

920. *Chilouens Schönk.*

setosulus Germ. Gross-Scheuern, Girelsau, Marpod, Mezőség (Gyeke, Bielz); Hätzeg (Deubel).

921. *Sciaphilus Stephens.*

Bielz führt für Siebenbürgen auch *Sc. costulatus* Kiesenw. an, was wohl auf einem Irrtum beruht.

asperatus Bonsdorf (*muricatus* F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, unter Laub.

922. *Paophilus Faust.*

Hampei Seidl. Hammersdorf, Hermannstadt, Marpod, Freck, Porumbach, Fogarasch, Schässburg, Klauseuburg (Bielz).

afflatus Boh. Siebenbürgen (Besitzt gelbe Schienen und Tarsen, bei Hampei sind sie schwarz).

923. *Brachysomus Stephens.*

(*Platytarsus* Schönk.)

Unaufgeklärt bleibt Br. Hopffgarteni Tourn. welchen Bielz für Siebenbürgen anführt.

transsylvanicus Seidl. Hermannst., Heltau, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Schulergebirge, Alsó-Rákos, Schässburg, Előpatak (c. a.).

setiger Boh. Kronstadt, Kronstädter Gebirge (Bielz); Rotenturm (Ormay); Hätzeg, Előpatak, Schässburg (c. a.).

villosulus Germ. Hammersdorf (Bielz); Kalán, Karlsburg, Schässburg, Vajda-Hunyad (unter den Weingärten aus alten Rebenhaufen gesiebt).

hirtus Boh. (*setulosus* Boh.). Gross-Scheuern, Marpod, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay); Hammersdorf, Alsó-Rákos, Schässburg, Hätzeg (c. a.).

echinatus Bonsd. Gross-Scheuern, Fogarasch, Előpatak, Schässburg (Bielz); Alsó-Rákos (c. a.); Rotenturm (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Zellichi Formanek. Karlsburg (c. a.).

hispidus Redtenb. Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.); Schuler (Deubel).

924. *Pseudoptochus Formanek.*

aurohirtus Seidl. Hermannstadt (Ormay).

925. *Foucartia Duval.*

squamulata Herbst. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz).

926. *Barypithes Duv.*

globus Seidl. (♂ *sphaeroides* Seidl.). Klausenburg (Bielz); Rotenturm (aus dem Wurzelwerk einer Labiate (*Melissa*) gesiebt, c. a., Ormay).

armiger Dan. Hammersdorf (unter Laub, c. a.); Wolkendorf b. Kr., Kronstädter und Rosenauer Gebirge, Alsó-Rákos (Tepe, Deubel).

Chevrolati Boh. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Gyógy (Bad, Ormay).

Da Bielz und Ormay den nahe verwandten *B. armiger* Dan. nicht kannten, ist es sehr wahrscheinlich, dass *B. Chevrolati* bei uns gar nicht, sondern nur ersterer vorkommt.

molicomus Ahr. Kronstadt (Bielz).

927. *Ombas Schönherr.*

Hanaki Friv. Schässburg, Rodnagelbirge (c. a.).

var. *montanus* n. v. Borszék, Ratosnya, Balánbánya (Egyeskő, c. a.).

O. Hanaki v. *montanus* n. v. Bei der Varietät, die ich in etlichen 40 Exemplaren sammelte, sind an sämtlichen Tarsen zwei sehr ungleiche Krallen bald mehr, bald weniger deutlich zu beobachten. Da diese Varietät im Penistau mit *Ombas Braudisi* Apfelb. übereinstimmt, liegt die Vermutung nahe, dass letzterer nur eine Rasse des O. Hanaki sei, da meine Tiere sich im übrigen von der Stammform wenig unterscheiden.

mollinus Boh. Paringul, Rodnagelbirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

pyrorhinus Dan. Hermannstadt (Ormay).

maxillosus Petri. Schässburg, Karlsburg, Szováta, Präszka (Zalatna), Topánfalva (c. a.).

928. *Strophosomus Stephens.*

melanogrammus Forster (coryli F.). Durch das ganze Gebiet auf Gebüsch und unter Laub.

(*Nelocarus*.)

lateralis Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz).

929. *Eusomus Germar.*

ovulum Germ. Durch das ganze Berg- und Hügelland.

930. *Mesagroicus Schönh.*

obscurus Boh. Hätzeg, Mühlbach, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Holzmeigen, Fogarasch, Mediasch, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Stolzenburg (Ormay); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

931. *Sitona Germar.*

cambricus Steph. Neudorf b. H. (Bielz). *regensteiniensis* Herbst. Reys, Bükszád (Bielz).

tibialis Herbst. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Bükszád, Schässburg, Oláhfalva (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Előpatak, Rodnagelb., Karlsburg (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

a. *umbiguus* Gyllh. Előpatak, Hermannstadt, Oláhfalva, Bükszád, Schässburg, Borszék, Rodnagelbirge (c. a.).

elegans Stierl. (nec Gyllh., Flecki Csiki), Schässburg (Siechenberg, 2. April, c. a.).

Sitona elegans Stierl. (Flecki Csiki).

Diese Art sammelte ich in fünf Exemplaren unter Laub. Sie ist sicher zu unterscheiden von *S. tibialis* Hbst. Der Kopf ist stets wesentlich kleiner, schmaler, mit den Augen kaum breiter als der Halsschildvorderrand; die Stirne ist deutlich vertieft, bei *tibialis* flach und in einer Ebene mit dem oberen Augenrand, bei dieser Art überragt der obere Augenrand deutlich die Stirne. Der Rüssel ist schmaler und

besitzt auf der Spitzenhälfte eine glänzende, in der Mitte fein punktierte und gekielte Area, welche bei *tibialis* kleiner, grob punktiert und ungekielt ist. Die Flügeldecken sind an den Seilen parallel oder (c.) schwach nach hinten verengt, die Schultern eckiger, schärfer vortretend, die Punktstreifen feiner, weniger vertieft und viel feiner punktiert, die Zwischenräume flach, die Schuppen der Flügeldecken wesentlich feiner, gleichmässiger und dichter verteilt, weisslich oder schmutzig weiss, schwach metallisch, auf dem vierten Zwischenraume und seitlich wenig dichter und heller. Die Beine gelb, die Schenkel wenig dunkler.

Der Vorderrand der Vorderschenkelhöhle ist nur undeutlich von der Halsschild einschnürung getrennt.

lincatus L. Gross-Scheuern, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

suturalis Steph.

a. *elegans* Gyllh. Kronstadt (Deubel).

a. *lateralis* Gyllh. Hätzeg, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Unter-Kerz (c. a.); Zaizon, Vargyas (Deubel).

sulcifrons Thunberg.

Bei uns kommt *S. sulcifrons* Thunbg. in der Stammform mit flacheren Augen und vertiefter Stirne nicht vor; Herr Dr. Krauss aus Marburg hebt als Unterschied von *sulcifrons* nur die stärker gewölbten Augen hervor, erwähnt jedoch die ganz ebene Stirne nicht, welche bei belgischen, böhmischen, auch noch ungarischen Stücken tief ausgehöhlt ist und zur Benennung Anlass gegeben hat. Uebrigens halte auch ich die siebenbürgischen Tiere nur für eine scharf ausgeprägte Varietät. Unausgefärbte Stücke sind ganz rötlichgelb. Weissgefleckte Tiere, welche die a. *campestris* Herbst vertreten, kommen auch vor; ich schlage für diese den Namen a. *pictus* vor.

var. *Deubeli* Krauss. Fogarasch, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyögy-Bal, Ormay; Petrozsény, Előpatak, Oláhfalva (c. a.); a. *pictus* m. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.).

puncticollis Steph. Gyeke (Méhely); Puj (Hätzeg, c. a.); Kronstadt (Deubel).

flavescens Marsh. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

a. *cinnamomeus* All. Kis-széki tó (Méhely).

longulus Gyll. Puj bei Hätzeg, Unter-Kerz, Zalatna (c. a.).

lincellus Bond. Gross-Scheuern, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Előpatak, Rodnagelbirge (c. a.).

Waterhousei Walton. Hermannstadt (Seidlitz); Karlsburg (c. a.); Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

crinitus Hbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kronstadt (Bielz); Karlsburg, Unter-Kerz (c. a.).

a. *albescens* Steph. Schässburg (c. a.).

hispidulus F. Girelsau, Kronstadt, Tarlau, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Hammersdorf, Tordaer Schlucht (c. a.); Schulergebirge (Deubel).

- a. *tibiellus* Gyll. Gross-Scheuern, Michelsberg, Holzmengen, Kronstadt, Reps, Schässburg (Bielz).
cylindricollis Fahr. Schässburg (Siechhofferg, c. a.).
a. *varians* Desbr. Unter-Kerz (c. a.).
humeralis Steph. Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, Oláhfalú, Gyeke, Záh, Előpatak (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hammersdorf (c. a.).
a. *maculatus* Motsch. Kronstadt (Méhely); Nussbach, Előpatak, Schässburg (c. a.).
inops Gyll. Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

932. *Trachyploeus* Germar.

- parallelus* Seidl. Schässburg, Marosújvár (c. a.).
laticollis Boh. Schässburg (vidi).
alternans Gyll. (scaber Redtenb.). Schässburg, Torockó, Baassen (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Erösd, Kronstadt, Hátszeg (Deubel).
spinimanus Germ. Hermannstadt, Kronstadt, Birtihalm (Bielz); Schässburg (c. a.); Talinenberg, Zinne, Deubel).
scabriculus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Oláhfalú, Sächs.-Regen (Bielz); Michelsberg, Rotenturm (Ormay).
ventricosus Germ. Schässburg (3 Exempl. am Wieterberg, 1. März und im Juni. c. a.); Karlsburg (von Hauptmann Zellich, Deubel).
bifoveolatus Beck. (scaber aut., nec L.). Gross-Scheuern, Holzmengen, Reps, Schässburg, S.-Regen (Bielz).
aristatus Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Porumbach (Bielz); Schässburg, Alsó-Rákos, Oláhfalú, Borszék, Előpatak, Unter-Kerz, Frecker Geb. (c. a.); Erösd, Kronstadt (Deubel).
Olivieri Bedel (squamulatus Oliv.). Hermannstadt (Bielz).

933. *Psolidium* Illiger.

- maxillosum* F. Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Meliasch, Reps, Záh (Bielz); Nagylak (Unterweissenburger Komitat), Szamosújvár (Ormay); Hammersdorf, Hátszeg, Karlsburg, Kalán (c. a.).

Cneorrhininae.

934. *Liophloeus* Germar.

Die für Siebenbürgen angeführten Arten dieser Gattung bedürfen sehr der Revision. Um diese anzubahnen, gebe ich im folgenden eine kurze Uebersicht der mir bekannt gewordenen Arten:

Nach dem in meiner Sammlung befindlichen Material besitzen wir wohl nur drei Arten. Zunächst scheint *L. Schmidt* Boh. unserer Fauna fremd zu sein, in Schässburg wenigstens kommt er nicht vor, und wenn nach Seidlitz *L. Herbsti* und *obsequiosus* Synonyme des *L. gibbus* sind,

was ich für wahrscheinlich halte, *L. lentus* Germ. unseres Verzeichnisses aber mit *L. liptoviensis* Ws. identisch ist, den ich nur als die Gebirgsform des *L. gibbus* auffassen kann, da sich stichhaltige Unterschiede nicht vorfinden, so reduziert sich die Zahl unserer *Liophloeus*-Arten, einschliesslich der neuen, vielleicht guten Art, auf drei Arten mit vier Varietäten. Dieselben lassen sich nach folgender Uebersicht aneinander halten:

1. Metasternum zwischen den Mittelhüften fast so breit wie die Mittelhüften, Körper gestreckt, länglich eiförmig oder länglich, Flügeldeckenbasis stets gerade abgestutzt, Schultern fast rechtwinklig vortretend, aber abgestumpft. Oberseite dicht mit gelben und braunen, oft etwas metallischen ziemlich grossen Schuppen fleckig bekleidet. *tesselatus* Müll.

Oberseite etwas glänzend, mit kleinen, wenig bemerkbaren, grauen Schuppen, die nur ein Drittel so gross sind als bei *tesselatus*, ziemlich undicht bedeckt, so dass das matt glänzende Tegument überall sichtbar wird; Flügeldecken kürzer, seitlich weniger gerundet.

aquisgranensis Först. *L. aquisgranensis* dürfte identisch sein mit *S. chrysopterus* Friv. oder ihm sehr nahe stehen.)

Oberseite durchaus matt, fein und dicht granuliert, mit ebenso kleinen aber dunkelbraunen Schuppchen sparsam bekleidet.

var. maurus Marsh. Metasternum wesentlich kürzer als die Mittelhüften, Körper gedrungen, kurz eiförmig.

2. Flügeldecken an der Basis mehr-weniger tief angerandet, Stirne stets deutlich dicht, oft runzlig punktiert, Halsschild quer, $1\frac{1}{2}$ bis doppelt so breit als lang, an den Seiten stets deutlich gerundet, nach vorne stärker als nach hinten verengt, zuweilen mit seichter Mittelfurche, nie gekielt.

Stirne mit kleinem, strich- oder punktförmigem Grübchen, Flügeldecken dicht mit heller und dunkler braunen oder grauen, selten einfärbig grauen oder grauweissen Schuppen bekleidet, Rüssel mehr-weniger deutlich fein gekielt oder ungekielt, an der Spitze halbkreisförmig eingedrückt, der Eindruck kahl und ungekielt. Form des Berg- und Hügellandes.

gibbus Boh. Oberseite sparsam mit dunkelgrauen oder bräunlichen Schuppen bedeckt so dass die Grundfarbe sichtbar wird, Halsschild im allgemeinen etwas schmaler. Gebirgsform. Die Tiere vom Retjezat haben in der Regel runzlig punktierte, matte, die vom Schnallergebirge und Fogarascher Gebirge glänzendere, aber stets dicht und deutlich punktierte Stirn.

var. liptoviensis Weise. Beschuppung und Punktierung der Stirne wie beim vorigen, aber letztere tief gefurcht. Rüssel mit glatter Mittellinie, die kaum erhoben ist, ♂ sehr robust, die Schienen der Vorderbeine sehr breit, am basalen Viertel plötzlich verengt, im breiten Teile innen gerade, Vordertarsen aussergewöhnlich stark erweitert.

v. sulcifrons n. Flügeldecken an der Basis gerade abgestutzt, breiter als der Halsschild. Die Schultern seitlich ziemlich scharf vortretend, Rüssel kaum länger als der Kopf, der Länge nach mit der Stirne in einer Flucht gewölbt, die Stirne mit runderlichem Grübchen, wie lackiert glänzend, ausserordentlich fein und ziemlich zerstreut punktiert, ebenso die Rüsselbasis. Augen vollkommen flach, aus der Wölbung des Kopfes nicht hervortretend. Halsschild quer, etwa $1\frac{1}{3}$ breiter als lang, an den Seiten etwas gerundet, nach vorne wenig stärker als nach hinten verengt, hinter dem Vorderrande schwach eingeschnürt mit feiner seichter Mittelfurche. Flügeldecken mit wenig auffallenden gelbbraunen, etwas metallisch schimmernden Schuppen bedeckt. Im übrigen dem *L. liptoviensis* ähnlich.

laevifrons n. sp. *tesselatus* Müll. Hátszeg (Retjezat), Götzenberg, Hammersdorf, Kerzer Gebirge?, Kronstadt, Előpatak, Mediasch, Schäss-

- burg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Szamosújvár (Ormay).
- var. *aquisgranensis* Först. Schässburg, Tor-daer Schlucht (c. a.).
- var. *maurus* Marsh. (c. *amplipennis* Tourn.). Kronstadt (Zinne, Méhely).
- Schmidtii* Boh. Homoród (Méhely).
- Herbstii* Gyllh. Hermannstadt, Hammersdorf, Gross-Schenk, Kerzer Gebirge (?), Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Borszék, Dees (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay).
- obsequolus* Gyll. Fogarasch (Bielz).
- lentos* Germ. Hátszeg, Retjezat (?), Neppendorf, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Dees (Bielz).
- gibbus* Boh. Malomviz, Rotenturm, Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Nagy-hagymás (Deubel).
- var. *liptoviensis* Weise. Kerzer Gebirge, Frecker Gebirge (Sorbota), Schulergebirge, Borszék (c. a.).
- var. *suleifrons* n. Rodnagelbirge (Deubel ♂, c. a.).
- laevifrons* n. sp. Bucsecs (c. a.).

935. *Barynotus* Germar.

- obscurus* F. (*murinus* Bond.). Hermannstadt, Tömöscher Pass, Mediasch (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, Hecke unter Blättern, 15. Mai, c. a.); Gyergyó-Tölgyes, Szamosújvár (Ormay); Hargita, Zinne bei Kronstadt (Deubel).

Tanymacinae.

Amomphini.

936. *Thylacites* Germar.

- pilosus* F. Schässburg (Breite und Wietenberg, 13. April, gesiebt, c. a.); Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Tahnenberg bei Petersberg (Deubel).

937. *Chlorophanus*.

- gibbosus* Payk. (*pollinosus* F.). Schässburg (auf Weiden, Kokelufer, c. a.).
- viridis* L. Hátszeg, Hermannstadt, Freck, Fogarasch, Kronstadt, Dees (Bielz); Malomviz, Retjezat, Újszékely (b. Sch.).
- Parigul* (c. a.).
- a. *salicicola* Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Neppendorf, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Dees, Klausenburg (Bielz); Retjezat (c. a.).
- graminicola* Gyll. Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagy-Ajta, Baróth (Méhely); Unter-Kerz, Karlsburg, Újszékely (b. Sch.), Hátszeg (c. a.).

Tanymecini.

938. *Tanymecus* Schönk.

- palliatu*s F. Durch das ganze Berg- und Hügelland (auf Brennessel).

Brachycerinae.

939. *Brachycerus*.

- foveicollis* Gyll. Mezőség (Gyeke, Bielz).

Cleoninae.

Lepirini.

940. *Lepyrus* Germar.

- palustris* Scop. (colon L.). Durch das ganze Berg- und Hügelland auf Weiden an süßen Gewässern.
- a. *asperatus* Schaaf. (Herbichi Zawodsky). Bolzaer Gebirge und Baróth (Méhely).
- capucinus* Schall (*binotatus* F.). Wie der vorige verbreitet.

Cleonini.

941. *Leucosomus* Motschulsky.

- pedestris* Poda (*1-punctatus* Schrank.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

942. *Conioleonus* Motschulsky.

- glaucus* F.
- a. *turbatus* Fahrs. Fogarasch (Bielz). Schässburg ist irrtümlich als Fundort dieser Art angegeben.
- exoriatu*s Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, (Bielz); Kronstadt (Rakadó, Deubel).
- nigrosuturatus* Goeze (*obliquus* F.). Mühlbach, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Gyeke, Záh (Bielz); Maros-Ludas (Ormay); Karlsburg (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

943. *Stephanocleonus* Motschulsky.

- microgrammus* Gyll. Klausenburg (Bielz). Das Vorkommen dieser Art bei uns scheint mir sehr fraglich, da sie dem südöstlichen Russland angehört; ich besitze dieselbe aus Uralsk.

944. *Pachycerus* Schönk.

- madidus* Oliv. (*segnis* Germ.). Gross-Scheuern, Gyeke, Záh (Bielz); Kronstadt (Deubel).

945. *Bothynoderes* Schönherr.

- albicans* Gyll. Klausenburg (Bielz, c. a.); S.-Regen (Zsahenitza?, Bielz).
- punctiventris* Germ. Déva, Salzburg, Dees Záh (Bielz).

946. *Mecaspis Schönh.*

alternans Herbst. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Kronstadt, Salzburg (Deubel).

caesus Gyll. Schässburg, Baassen, Hammersdorf (c. a.).

M. alternans Hbst. und caesus Gyll. sind oft schwer von einander zu trennen. Nach der weitläufigen Punktierung der Flügeldeckenstreifen und der Zeichnung der Flügeldecken dürfte M. alternans Herbst bei uns gar nicht vorkommen.

striatellus F. (coenobita Oliv.). Hammersdorf (Bielz); Schässburg (c. a.); Persaner Gebirge, Zernest, Kronstadt (Deubel).

947. *Pseudocleonus Chevrolat.*

cinereus Schrank. (costatus F.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Gyeke, Záh (Bielz); Pilis (Nagyenyed), Karlsburg, Marosujvár (c. a.).

grammicus Panz. Kronstadt (Krenzberg, 4. April, Deubel).

Ps. grammicus Panz. kommt in Schässburg nicht vor; die Angabe beruht auf einer Verwechslung mit einem abgeriebenen Ps. cinereus.

948. *Chromoderus Motschulsky.*

fasciatus Müll. (affinis Schrank). Hátszeg, Mühlbach, Hermannst., Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Záh (Bielz); Karlsburg (c. a.).

949. *Cyphocleonus Motschulsky.*

tigrinus Panz. Mühlbach, Gross-Schenk, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg, Záh (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Nagyenyed, Szamosujvár, Örményszékes (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Kronstadt (Deubel).

achates Fahrs. Siebenbürgen (Seidlitz).

morbillosus F. Kronstadt (Bielz).

trisulcatus Herbst. Kronstädter Gebirge, Königstein, Schässburg (Bielz); Szurdok-Pass (c. a.).

950. *Adosomus Faust.*

roridus Pall. (Fabricii Gemming). Hátszeg, Reps (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay).

951. *Cleonus Schönh.*

piger Scop. (sulcirostris L.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

952. *Lixus Fabricius.*

Ormay führt für Siebenbürgen L. sanguineus Rossi und Bielz, L. elongatus Germ. = fasciculatus Boh. an; ersterer soll bei Remete (Nagyenyed), letzterer in Klausenburg gesammelt worden sein. Ich halte das Vorkommen beider Arten bei uns für nicht wahrscheinlich.

paraplecticus L. Reussner Teiche, Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Gyeke, Záh (Bielz, auf Wasserpflanzen).

canescens Fischer. Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz, auf crambe tartarica); Mező-Záh (Deubel).

iridis Oliv. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg, Karlsburg (Larve lebt in den Wurzeln und Stengeln einer Umbellifera, c. a.); Mező-Záh, Honigberg (am Altfluss, Deubel).

myagri Ol. Hermannstadt, Holzmengen (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Reps 1908 (Deubel).

subtilis Sturm. Schässburg, Dees (c. a.).
difficilis Cap. (costirostris Seidl., transylvanicus Tourm., Bielz). Hermannstadt (a. B.), Hammersdorf (c. a.).

cylindricus L. Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz).

Ascanii L. Déva, Gross-Scheuern, Kronstadt, Dees (Bielz); Karlsburg, Schässburg (c. a.).

flavescens Boh. Karlsburg (Deubel, c. a.); Klausenburg, Baassen, Schässburg (auf Melde, c. a.).

punctiventris Boh. Schässburg (am Scheurenberg 1 ♀ gekötschert, 23. Mai, c. a.).

algius L. Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.); Torda (Deubel).

elongatus Goeze (filiformis F.). Auf Disteln durch das ganze Berg- und Hügelland.

cardui Oliv. Mit dem vorigen durch das ganze Berg- und Hügelland.

953. *Larinus Germar.*

vulpes Oliv.

var. *orientalis* m. Baassen (c. a., 1 ♂).
Mező-Záh (Deubel).

Als Stammform des L. vulpes Ol. sind Tiere aus Frankreich zu betrachten: Gyllenb. sind bei der Beschreibung seines L. reconditus Weibchen aus Frankreich vorgelegen (Schönh. 7. 2. 19), was hervorgeht aus „rostrum longitudine fere thoracis“, während er bei der Beschreibung seines L. maculosus (Schönh. III. 112) ♂♂ aus Frankreich, dem südlichen Russland und dem Kaukasus vor sich gehabt; dies beweisen die Worte „rostrum thorace brevius“. Die Vergleichung der französischen vulpes mit denen des südöstlichen Europa und aus Siebenbürgen ergeben einige erwähnenswerte Verschiedenheiten, welche mir genügend erscheinen für diese den Varietätsnamen L. v. orientalis in Vorschlag zu bringen. Durchschnittlich sind die osteuropäischen Tiere grösser, breiter, etwas weniger gewölbt, namentlich auf dem Halsschild; dieser ist etwas kürzer, stärker, runzlig punktiert und unebener; die Unebenheiten entstehen namentlich in der Mitte durch eine stark abgekürzte Mittelgrube hinter dem Vorderrande, die in der Regel im Grunde fein gekielt, oft aber auch obsolet ist, zwei Längsrinnen zu beiden Seiten der Mittellinie auf der Scheibe, die aber auch undeutlich werden können. Die Flügeldecken sind an der Basis zu beiden Seiten des Schildchen tiefer quer eingedrückt und die Tomentierung ist weniger zusammenhängend und mehr in einzelne Flecken aufgelöst. Gyllenb. in seiner

Beschreibung des *L. maculosus* bezeichnet die Zeichnung desselben treffend: „Elytra — timento flavescens variegato, vittam valde flexuosam in singula elytra formantem. Die zusammenhängende, bindenartige Zeichnung ist bei der Varietät undeutlich geworden durch Auflösung in Flecken.

brevis Herbst. Poresest, Szurul (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Nagybagymás (Deubel).

var. granicollis Boh. Schässburg (c. a.).

Da diese Varietät auch in Dalmatien und Illyrien vorkommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass *L. pollinis* Germ. (Ins. spec. I. p. 388 533) und Lich. (Tyr. Ins. I. p. 229, 21) identisch mit *granicollis* Boh. ist, umso mehr, da Germar den *L. sturnus* Schall. kannte, die Worte „macula scutellari grisea“ auch auf diese Art passte, und „prothro thoraci subaequali“ etwa auf $\frac{1}{2}$ dieser Varietät noch angewendet werden kann.

latus Herbst. Kronstadt, S.-Regen. Klausenburg, Fogarasch (Bielz).

L. cynarae F. wird von Bielz für Kronstadt, Sächs.-Regen und Klausenburg angeführt, jedenfalls irrtümlich; dafür dürfte *L. latus*, der oft schwer von *L. cynarae* F. zu trennen und im südöstlichen Europa verbreitet ist, auch in Siebenbürgen verbreitet sein, obgleich er nur aus Siebenbürgen nicht vorliegt. Ich beziehe die Fundorte des *cynarae* auf *latus*, bis das Vorkommen des *L. cynarae* erwiesen ist.

obtus Gyllh. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Előpatlak, Gölzenberg, Oláhfalva, Gyek (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Puj (Hätszeg), Rotenturm, Frecker Geb. (Leita), Schässburg, Baassen (c. a.); Zernest (Deubel).

minutus Gyll. Siebenbürgen (Bielz).

Ich führe diese Art mit einigem Zweifel an, obgleich Bielz keinen bestimmten Fundort angibt; doch halte ich ihr Vorkommen bei uns nicht für ausgeschlossen.

turbatus Gyllh. Mezőség, Záh (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Schässburg, Baassen, Balánbánya Puj (Hätszeg. c. a.); Kronstadt (Deubel).

sturnus Schall. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Michelsberg (Ormay). Déva, Klausenburg, Dees, Bistritz, Rodnagerge, Balánbánya (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

planus F. (carlinae Oliv.). Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt, Zernest (Deubel).

jaceae F. Hermannstadt, Hammersdorf, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Murosdéese (Torda), Szamosujvár (Ormay); Déva, Nagyenyel (c. a.).

Beckeri Petri (ungulatus aut. nec Gyllh.). Karlsburg (von Herrn Major Zellich gesammelt, c. a.); Neudorf, Mediasch, Dees (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

L. longirostris Gyllh. kommt bei uns nicht vor, mir ist er nur aus den westlichen Mitteleländern bekannt geworden, während *L.*

Beckeri nicht nur in Russland verbreitet ist, sondern mir seit dem Erscheinen meiner Bestimmungstabelle des Genus *Larinus* 1907 auch aus Ungarn (Acs) bekannt geworden ist (Vergl. Bestimmungstabelle des Gen. *Larinus* pag. 123 und 124).

954. *Lachnaeus Schönh.*

(*Stolatus* Mulsant.)

crinitus Boh. Karlsburg (von Hauptmann Zellich, Deubel).

955. *Rhinocyllus Germ.*

conicus Fred. (odontalgicus Oliv.). Hätszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Marktschelken, Mediasch, Gross-Scheuern (Bielz); Karlsburg, Schässburg, Balánbánya (auf *carduus acanthoides*, c. a.); Kronstadt (Deubel).

Tropiphorinae.

956. *Tropiphorus Schönherr.*

micans Boh. Kronstadt (Bielz).

var. obesus Fauv. Szováta, Schässburg (c. a.); Tushád, Alsó-Rákös (Deubel).

tomentosus Marsh. Zinne (Kronstadt, Deubel).

obtus Borsd. Fogarascher Geb., Kronstädter Gebirge, Buesees (Bielz).

carinatus Mull. Fogarascher, Frecker und Kronstädter Gebirge, Zibinsgebirge und Zibinsjäser, Gölzenberg, Präsbe, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Tömöscher Pass, Mediasch, Birtihalm, Rodnagerge (Bielz); Rejczat, Topánfalva, Unter-Kerz (Klosterteich, c. a.); Nagybagymás (Deubel).

transsylvanicus Dan. (♀ rotundatus Dan.). Frecker Gebirge (Serbota), Buesees, Schulergebirge, Csukás (c. a.).

T. styriacus Bedel kommt in Siebenbürgen nicht vor, da das von Fauvel als *T. styriacus* bestimmte Männchen der Seidlitz'schen Sammlung ebenfalls ein *T. transsylvanicus* ist.

Rhytirrhininae.

Rhytirrhini.

957. *Minyops Schönherr.*

carinatus L. Schässburg, Hermannstadt, Rotenturm (c. a.); Mezőég (Záh, Bielz), Hammersdorf, Honigberg, Kronstadt (Deubel).

var. variolosus F. Hätszeg, Hermannstadt, Marpod, Gölzenberg, Predeal, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.).

costalis Schönh. Hermannstadt, Schässburg, Pilis (Nagyenyel), Kalán, Szurduk-Pass (c. a.).

958. *Dichotrachelus Stierlin.*

Unter Steinen, selten im Moos.

Kimakovicii Flach. Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Paringul, Präsbe, Negoi, Bucsecs, Nagybagymás (Deubel).

Alophini.

959. *Alophus Schönh.*

triguttatus F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. *vau* Schrank. Hammaersdorf, Schuler, Crepatura bei Zernest (Deubel).

a. *Weberi* Penecke. Siebenbürgen.

a. *subcarinatus* Reitter. Schässburg, Rodnagelberge (c. a.).

a. *pseudelegans* Reitter. Schässburg, Karlsburg, Klausenburg, Hammersdorf (c. a.); Várhegy (Deubel).

Kaufmanni Stierlin. Retjezat, Hermannstadt, Hammersdorf, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *Stierlini* Reitter. Porumbacher Geb. (Strunga dracului, Ormay).

a. *elegans* Stierl. Marosujvár (c. a.).

960. *Hylobius Schönherr.*

piceus Degeer. Bihar Gebirge, Fogarascher Gebirge, Marosgebirge, Borgoer Pass (Bielz); Kronstadt (c. a.); Präsbe (bei dem Höhlenkloster), Bucsecs (Deubel).

abietis L. In unseren Gebirgen und im Bergland verbreitet.

pinastri Gyll. Kerzer Gebirge, Bistra, Szurdok-Pass (c. a.).

fatus Rossi. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Karlsburg (c. a.); Honigberg am Altfluss (Deubel).

var. *rugicollis* Mannh. Hermannstadt (Bielz, c. a.); Marosvásárhely (Bielz).

961. *Liparus Oliv.*

L. germanus L. wurde bis jetzt bei uns nicht gefunden, ebenso fehlt *L. dirus* Herbst; alles, was als *L. germanus* in den Sammlungen steckte, war *L. glabriorstris* Küst.; das, was als *L. dirus* Herbst angesehen wurde, war zum Teil *L. transylvanicus* Petri, zum Teil abgeriebene *L. glabriorstris*.

glabriorstris Küster (carinaerostis Küster). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

coronatus Goeze. Zibinsgebirge, Schässburg (Bielz); Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).

transylvanicus Petri. Karlsburg, Hosszufalu, Schässburg (c. a.); Hammersdorf, Vargyas, Kronstadt (Deubel).

962. *Plinthus Germ.*

Meleus Lacordaire, Reitter.

In meiner Monographie der Gattung *Plinthus* habe ich nachgewiesen, dass unserer Fauna nicht angehören *Pl. Megertei*, *Pl. Findeli*; dafür treten neu in unsere Fauna *Plinthus Parayssi* Boh. und *Pl. Elekeschi* Ormay.

Pareysii Boh. Kronstadt, Rotenturm (c. a.).

Elekesi Ormay. Remete (Nagyenyed), Szamosujvár (Ormay); Schässburg, Dees (c. a.).

Sturmi Germ. In unsern Gebirgen und im Bergland verbreitet.

Tischeri Germar. In unsern Gebirgen und im Berglande verbreitet.

963. *Neopliothus Bedel.*

tigratus Rossi. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

porcatus Panz. Zibinsgebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstädter Gebirge, Schulergebirge (Bielz).

964. *Liosoma Stephens.*

Bielz führt auch *L. robustum* Seidl. von der Hargita an, wozu jedoch Seidlitz (F. tr. 672. Anm. 5) die Bemerkung macht, dass der Käfer nur aus Versehen in unser Verzeichnis gekommen sein könne.

deflexum Panz. (ovatum Clairv.). Retjezat, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Klausenburg (Bielz).

oblongum Boh. Kronstadt, Schulergebirge, Schässburg, Rodnagelberge (c. a.); Zernest (Deubel).

Bei den Vertretern dieser Art aus Siebenbürgen sind die seitlichen Punkt-Streifen der Flügeldecken schwach vertieft, während bei Exemplare aus Görz die seitlichen Punkte der Flügeldecken nur gereiht sind und nicht in Streifen liegen.

♂ var. *Hopfgarteni* Stierl. Bistra, Malomviz, Borszék (c. a.).

cribrum Gyll. Kronstadt (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota), Schässburg, Alsó-Rákös, Piatra mare (Méhely); Nagybagymás (Deubel).

carpathicum Brancs. Előpatak, Borszék (c. a.).

bosnicum K. Daniel. Csukás (c. a.); Rodnagelberge, Schulergebirge, Zernester Gebirge, Zinne (Deubel).

965. *Aparopion Hampe.*
(*Stereus* aut. nec Motschulsky.)

costatum Fahr. Michelsberg, Kerzer Gebirge (Bielz); Rotenturm, Porumbacher Gebirge (Ormay); Hätzseg, Karlsburg, Hammersdorf (c. a.).

966. *Adexius Schönh.*

scrobipennis Schönh. Kronstadt (Bielz); Rotenturm (Ormay); Hammersdorf, Szováta, Schässburg, Topánfalva (c. a.).

967. *Trachodes Germar.*

hispidus L. Präsbe, Holzungen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay); Frecker Gebirge (Serbota), Retjezat, Hätzseg, Schässburg, Alsó-Rákös, Búdös (c. a.).

Heydeni Stierl. Kronstadt (Bielz, c. a.); Retjezat, Schässburg (c. a.).

968. *Hypera Germ.*

H. oblonga Boh., die im Schieltal, segnis Cap., welche im Zibinsgebirge vorkommen sollen, die Stammform der *H. comata* Boh. sowie der *H. palumbaria* Germ. sind bei uns nicht nachgewiesen.

oxalidis Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

var. **ovalis** Boh. Zibinsgebirge, Kronstadt (Bielz); Kerzer Gebirge (Ormay); Schulergebirge, Balánbánya, Rodnageb. (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

intermedia Boh. Paringul, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Mediasch, Záh (Bielz); Kerzer Gebirge, Porumbacher Gebirge (Ormay); Bucsecs (Deubel).

var. **marmorata** Cap. Karlsburg, Baassen, Rotenturm (c. a.); Zibinsgeb. (Bielz).

elegans Boh. Zibinsgebirge, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg (c. a.).

var. **Bonvouloiri** lap. Schässburg, Hammersdorf, Malomviz, Bibargebirge (c. a.).

palumbaria Germ.

var. **coarcticollis** Krauss. Burzenländer Gebirg (Deubel); Borszék (c. a.).

comata Boh.

var. **biharica** Petri. Bihar Gebirge (c. a.).

var. **carpathica** Petri. Fogarascher Geb., Rodnagebirge (c. a.).

velutina Boh. Schulergebirge, Borszék (c. a.); Nagybagymás (Deubel).

rubi Krauss. Borszék (c. a.).

pusilla m. Kerzer Gebirge (Vunetoare), Rodnagebirge (Kuhhorn, c. a.); Bucsecs (Leonhardt, Blasewitz), Königstein, Nagybagymás (Deubel).

H. pusilla n. sp. Länge ♂ 5 mm., ♀ 5½ mm. Zur Vergleichung liegen mir vor 5 Stück des *H. rubi* Krauss vom Bachergebirge, von Dr. Krauss selbst determiniert.

Grösse konstant geringer als die des *H. rubi*, die Form schmaler und schlanker, der Halsschild stets und stärker nach hinten verengt, die Oberseite glänzender, die feine Punktierung nur schwach runzig, besonders auf dem Halsschild, der Rüssel in beiden Geschlechtern kürzer, stärker gebogen und an der Basis durch eine tiefere Einsenkung von der Stirne getrennt, letztere merklich breiter, die punktiertgestreiften Flügeldecken sind in beiden Geschlechtern seitlich weniger stark erweitert, die Zwischenräume der Streifen gewölbt, gleichartig, der fünfte Zwischenraum bildet keine Schwiele vor der Spitze, während eine solche bei den steirischen Stücken schwach, aber deutlich entwickelt ist.

Der Penis dieser Art ist fast symmetrisch, gleich hinter der Basis deutlich verengt, dann bis hinter die Mitte parallel, darauf gerundet verengt, der Apex ist abgerundet, nicht abgestutzt, der Seitenrand der Penisfurche an der Basis stärker und breiter nach innen umgebogen. Der Penis der *H. rubi* aus Steiermark ist von der Basis an allmählich zuerst schwächer, dann stärker verengt, deutlich asymmetrisch, der Apex schieb abgestutzt, der Seitenrand der Penisfurche kaum eingebogen.

minuta Petri Rodnagebirge (c. a.).

tessellata Herbst. Hátszeg (Bielz, c. a.); Hermannstadt (a. B.), Orlat (c. a.).

969. *Phytonomus Schönherr.*

(Antidonus.)

punctatus F. An Wasserpflanzen durch das ganze Gebiet.

fasciculatus Herbst. Mada (Erzgebirge, Bielz); Karlsburg (c. a.); Rothbach (Deubel).

(Eirrhinomorpha.)

adpersus F. (pollux F.). Talmatschel, Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.); Honigberg (am Altfluss, Deubel).

rumicis L. Hermannstadt, Mediasch, Gyeke (Bielz); Stolzenburg, Kleinpold, Kerzer Gebirge (Ormay); Honigberg (am Altfluss, Deubel).

arundinis Payk. Dobra (Bielz).

(Hapalinus.)

striatus Boh. Fogarasch (Bielz).

contaminatus Herbst. Zibinsgebirge (Bielz).

Mir sind *Ph. striatus* Boh. und *Ph. contaminatus* Herbst aus Siebenbürgen nicht zu Gesicht gekommen, wohl verwechselt mit *Ph. meles* F. und *denominandus* Cap.

meles F. Durch das ganze Berg- und Hügel-land auf Klee.

(Phytonomus i. sp.)

nigrirostris F. Hátszeg, Hermannstadt, Rotberg b. H., Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Nagybagymás, Kronstadt, Vargyas (Deubel).

dentatus Petri. Rodnagebirge (von Deubel gesammelt).

carinicollis Stierl. Kerzer Gebirge (Ormay); Paringul, Malomviz (c. a.); Paj (Hátszeg, vidi).

a. **obscurus** Petri. Paringul (c. a.).

arator L. (polygona L.). Unter-Kerz (c. a.).

pedestris Payk. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, Sächs.-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg, Szováta, Bükszád (c. a.); Honigberg, Rosenau, Kronstadt (Deubel).

elongatus Payk. Schiethal (Cimpu micului), Kronstadt (Bielz); Grossau (Ormay); Schässburg, Rodnagebirge (Kuhhorn, c. a.).

denominandus Cap. Karlsburg, Bistritz, Schässburg (Fuchsloch, 24. Mai gekötschert, c. a.).

murinus F. Héviz (Bielz); Honigberg (am Altfluss, Rosenau, Deubel).

Ich habe einen *Ph. murinus* F. aus Siebenbürgen noch nicht gesehen.

plantaginis Degeer. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Kronstadt, Karlsburg, Baassen, Rotenturm (c. a.).

transylvanicus Petri. Durch das ganze Berg- und Hügel-land, namentlich auf Klee.

Die in Siebenbürgen vorkommende, bisher allgemein als *Ph. variabilis* Herbst bezeichnete

Ptytonomus-Art weicht wesentlich von den süd-europäischen, namentlich den dalmatinischen *Ptytonomus variabilis*, die ich als Stammform betrachte, ab: der Halsschild ist in beiden Geschlechtern stark gerundet, der Rüssel stärker gebogen, die Flügeldecken kürzer beim ♂ von der Basis ab nach hinten verengt etc. Er erinnert oft stark an *Ph. denominandus*. Im übrigen siehe meine Monographie der Hyperiden p. 183.

viciae Gyllh. Neudorf b. H., S.-Regen (Bielz); Schässburg (vidi), Honigberg (am Altfluss, Deubel).

trilineatus Marsh. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz); Hammersdorf, Grossau (Ormay); Nagybagymás, Kronstadt (Deubel).

970. *Limobius Schönherr*.

borealis Payk. (dissimilis Herbst. Hampei Cap.). Gross-Scheuern, Zibinsgebirge, Szurul (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Honigberg am Altfluss (Deubel).

971. *Coniatus Germar*.

splendidulus F. Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

Erirrhiniinae.

Acentrini.

972. *Acentrus Schönherr*.

histrion Boh. Gross-Scheuern (Bielz).

Pissodini.

973. *Pissodes Germ.*

piceae Ill. Héviz (Bielz).

pini L. Kerzer Gebirge (Bielz); Retjezat (c. a.); Kronstadt (Deubel).

notatus F. Fogarascher Gebirge (Bielz); Kronstadt (Bielz, c. a.).

validirostris Gyllh. Talmatschel (Bielz); Buceacs (Deubel).

scabricollis Mill. Präsbe (Bielz).

harcyniae Herbst. Schuler (Deubel).

Erirrhiniini.

974. *Grypoidius Stephens*.

equiseti F. Hátszeg, Hermannstadt, Marpod, Fogarasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Gyergyó-Tölgyes, Krizba (Deubel).

975. *Pachytychius Jekel*.

sparsutus Oliv. Mühlbach, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg, Gyógy (Bad, Ormay); Hátszeg, Schässburg (auf einer Kleeart, c. a.); Kronstadt (Deubel).

976. *Erirrhinus Schönk*

festucae Herbst. Gross-Scheuern, Záh (Bielz); Baassen (auf Schilfrohr, c. a.).

Nereis Payk. Hermannstadt (Bielz).

scirrhosus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

977. *Notaris Stephens*.

bimaculatus F. Hammersdorf, Fogarasch, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

scirpi F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Gyeke (Bielz); Schässburg, Marosujvár (auf Wasserpflanzen, c. a.); Kronstadt (Deubel).

acridulus L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

var. *monlanus* Tourn. Kerzer und Frecker Gebirge, Kronstadt, Rodnag Gebirge (c. a.).

Maerkeli Boh. Topánfalva, Schässburg, Tordaer Schlucht, Alsó-Rákos (c. a.); Rodnag Gebirge (Deubel).

aterrimus Hampe. Frecker Gebirge (Serbota), Balánbánya, Rodnag Gebirge (c. a.); Paringul-Gebirge, Nagy-Bagymás (Deubel).

978. *Icaris Tournier*.

sparganii Gyllh. Nussbach (Bielz).

Schässburg als Fundort des *I. sparganii* Gyllh. ist zu streichen.

979. *Dorytomus Stephens*.

longimanus Forster (vorax F.). Schässburg, Rotenturm (c. a.); Hermannstadt, Freck, Kronstadt, Klausenburg (Bielz).

a. *macropus* Redt. Hermannstadt, Gyeke (Bielz).

a. *ventralis* Steph. Siebenbürgen (Bielz). *Schönherri* Faust. Schässburg (c. a.).

tremulae Payk. (variegatus Gyllh., armatus Petri). S.-Regen, Klausenburg, Záh (Bielz); Kronstadt (Deubel).

tortrix L. (pectoralis Panz.). Hátszeg, Klausenburg (Bielz); Rotenturm, Büdös, Előpatak, Schässburg (c. a.); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

validirostris Gyll. Hermannstadt, Kerzer Gebirge (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

hirtipennis Bedel. Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

var. *taeniatus* Faust. Karlsburg, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

flavipes Panz. (suratus Gyllh.). Hátszeg, Kronstadt, Hermannstadt, Fogarascher Gebirge, Dees (Bielz); Rotenturm, Marosujvár, Karlsburg (c. a.).

filirostris Gyll. Schässburg, Fogarasch (Bielz); Ujszékely b. Sch. (c. a.).

Dejeani Faust (*costirostris* Gyll.). Déva, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

taeniatus F. (*bituberculatus* Zett.). Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Karlsburg, Előpatak, Schässburg, Borszék (c. a.).

affinis Payk. Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Előpatak, Torockó, Schässburg (c. a.); Szamos-ujvár (Ormay).

ocalescens Gyllh. Schässburg (c. a.).

melanophthalmus Payk. (*punctator* Herbst, *agnathus* Boh.). Rotenturm, Schässburg, Kronstadt (c. a.); Hermannstadt, Stolzenburg, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

a. clivellarius Boh. Hermannstadt (Bielz).

majalis Payk. Schässburg (Kokelufer, c. a.); Kronstadt (Deubel).

salicinus Gyllh. Schässburg (Kokelufer, c. a.).

villosulus Gyll. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz).

rufulus Bedel. Kronstadt (Zinne, Deubel)?

Reussi Formanek. Rotenturm (c. a.).

dorsalis L. Borszék (auf Sahlweide in grösserer Zahl und verschiedener Färbung, c. a.).

Das Männchen besitzt auf dem letzten Ventralsegment eine Grube, welche beiderseits von einem Höcker begrenzt wird. Diese sexuelle Auszeichnung finde ich nirgends erwähnt.

Smieronychini.

980. *Smieronyx* Schönh.

jungermanniae Reich. (*ricur* Gyllh., *variegatus* Gyll.). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

coccus Reich (*politus* Boh.). Schässburg (Bielz, c. a.); Reys (c. a.).

Tanysphyrini.

981. *Tanysphyrus* Germar.

lemnae Payk. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg (Weiher auf der Breite, 26. April, c. a.).

982. *Bagons* Schönh.

(*Lyprus*.)

cylindrus Payk. Hätzeg, Hermannstadt (Bielz); Kronstadt (Deubel, c. a.).

Frivaldszkyi Tourn. Schässburg (Fuchsloch, c. a.).

(*Bagons* i. sp.)

nodulosus Gyllh. (*binodulus* Thoms. nec Herbst). Kronstadt (Gespreng, Deubel, Méhely, c. a.).

frit Herbst (*subcarinatus* Bris.). Hermannstadt (Bielz).

tempestivus Herbst. Kronstadt (Gespreng, Deubel).

lutosus Gyll. Hermannstadt (Ormay); Baróth (auf feuchten Wiesen, Méhely); Schässburg (Kokelufer, c. a.).

glabrirostris Herbst (*colliguensis* Herbst, *lutescentus* Gyllh.). Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Unter-Kerz, Karlsburg, Zalatna, Halvelagen b. Sch., Schässburg (Kokelufer, c. a.).

subcarinatus Gyllenb. Mezöség (Bielz).

983. *Hydronomus* Schönh.

alimalis Marsh. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).

984. *Orthochaetes* Germ.

setiger Beck. Schiellthal, Gross-Scheuern (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Bucsecs (Deubel).

(*Styphlus* Schönh.)

subsetosus n. sp. Kerzer Gebirge (Buleatal, am Flussufer gesiebt, 2 Exempl.).

Orthochaetes (*Styphlus*) *subsetosus*. Lg. 1'8 mm. (sine rostro).

Forma et colore *O. setigeri*, sed dimidio minor. Fuscus, opacus, tibiis, tarsis, antennis testaceis. Rostrum valde arcuatum, crassum, thorace vix brevius, subcarinatum, apice nitidum. Antennae funiculo septemarticulato, funiculi articulum I obconicum, latitudine dimidio longius, secundum gracilius, cylindricum, latitudine aequilongum, cetera transversa, clava ovalis, scapus oculum non attingens. Oculi distantes, vix prominentes, frons rostro aequilata. Prothorax subcylindricus quadratus, lateribus medio paulum rotundatus, pone apicem vix constrictus, dorso paulum convexus, opacus, squamulis dispersis minutis adpersus. Elytra oblonga, basi thorace latiora, truncata, humeris rotundatis, sulcata, interstitiis convexis, tertio et quinto, praesertim basin versus, costatis, striis vix punctatis, interstitiis setis brevibus reclinatorum seriatis obtectis. Pedes breves, femoribus clavatis, tibiis apicem versus ampliatas, rectis, apice truncatis, tarsorum articulum III transversum latum apice bipartitum, unguculi liberi.

Der Käfer hat ganz die Gestalt des *O. setiger*, ist aber viel kleiner, der Rüssel kürzer, die Fühlergeissel 7gliedrig, weniger schlaak, die Basis der Flügeldecken gerade abgestutzt, nicht wie bei jenem schwach ausgerandet, die Schultern abgerundet vortretend, die Streifen der Flügeldecken kaum sichtbar punktiert, die laterstien derselben glanzlos. Es fehlen ihm ferner die langen abstehenden aufrechten Haare, statt deren er kurze, an der Spitze keulenförmig schwach verdickte, nach hinten geneigte Börstchen auf den Zwischerräumen zeigt. Auch auf dem Halsschild befinden sich nur sehr schwer sichtbare, anliegende Schüppchen, an den Schienen anliegende längere Börstchen.

(*Paraphilarus*.)

alpinus Penecke. Bucsecs, Honigberg (Deubel).

Cossoninae.

985. *Dryophthorus* Schönh.

corticis Payk. (Iymexylon F.). Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg (im mul-

migem Holze einer alten Eiche in grosser Anzahl); Kronstadt (Warte, Deubel).

986. *Cossonus Clairville*.

parallelepipedus Herbst. Klausenburg (Bielz); Schässburg (im Mulme einer hohlen Weide, c. a.); Kronstadt (Deubel).

linearis F. Hermannstadt, Zibinsgebirge (Bielz); Marosujvár (unter der Rinde und an den Wurzeln einer abgestorbenen Zitterpappel in grosser Anzahl, c. a.); Kronstadt (Méhely).

cylindricus Sahlb. Hätzeg (Bielz); Schässburg (Bielz, c. a., im Mulme einer hohlen Weide).

987. *Eremotes Wollaston*.

elongatus Gyll. Präsbe, Kerzer Gebirge, Borszék (Bielz).

ater L. Götzenberg, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Oláhfalú (Bielz); Bistra, Frecker Gebirge (Serbota); Rodnagebirge (unter Fichtenrinde, c. a.).

punctatulus Boh. Retjezat, Baassen, Schässburg (in Nussbaumholz, c. a.).

Unsere Art wurde mit Vertretern des *E. punctatulus* aus Frankreich und Sizilien verglichen.

reflexus Boh. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz).

(*Brachytemmus*.)

porcatus Germ. Hermannstadt, Marosgebirge (Bielz).

988. *Rhyncolus Germar* — *Stephens*.

(*Hexarthrum*.)

culinaris Germ. Hätzeg, Hermannstadt, Kronstadt (Bielz); Schässburg (c. a.).

(*Stereocorynes*.)

truncorum Germ. Hammersdorf, Fogarasch, Borszék (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Unter-Kerz (aus Weidenholz); Baassen, Schässburg (aus Eichenrinde, c. a.); Rosenau, Kronstadt (Deubel).

(*Rhincolus*.)

lignarius Marsh. Zibinsgebirge (Bielz); Kronstadt (Deubel).

cylindricus Boh. Kerzer Gebirge, Sächs.-Regen, Borszék (Bielz).

turbatus Schönh. Kronstadt (Bielz); Hätzeg, Baassen, Schässburg (aus Lindenrinde, c. a.).

Cryptorrhynchinae.

989. *Camptorrhinus Schönh.*

statua Rossi. Csáki-Gorbó (Salomon, Bielz); Schässburg (auf Eichenholz von Prof. C. Höchsmann gesammelt, c. a.).

990. *Gasterocercus Laporte*.

depressirostris F. Hermannstadt (j. W., Bielz).

991. *Cryptorrhynchus Illiger*.

lapathi L. Hätzeg, Hermannstadt, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen (Bielz); Borszék (auf Weiden nicht selten, c. a.).

992. *Acalles Schönh.*

denlicollis Germ. Durch das ganze Gebiet verbreitet (unter Laub).

variolosus Stierl. Kronstadt, Tartlau, Bodzaer Pass (Kraszna, Bielz); Előpaták (Clement).

camelus F. Zibinsgebirge, Mediasch (Bielz); Búdös, Topánfalva (c. a.).

ptinoides Marsh. Zibinsgebirge (im Tale des Schanta-Baches, Ormay).

roboris Curtis. Präsbe, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Borszék (Bielz); Schanta (Ormay); Előpaták, Alsó-Rákös, Torockó (c. a.).

pyrenaeus Boh. Rotenturm, Búdös (c. a.); Bucsecs, Schuler (Deubel).

hypocrita Boh. Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Kronstadt, Piatra mare, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Gyógy (Bad, Ormay); Ober-Kerz (Glashütte), Torockó, Präszaka (Zalatna), Búdös (c. a.).

ovalipennis n. sp. Rotenturm, 1 Exempl.

Acalles ovalipennis n. sp. Länge 3'8 mm. *A. hypocrita* Boh. similis, sed forma elytrorum ovali, elytris sulcatis, tuberculis quattuor prothoracis bene distinctis.

Die Art ist kleinen Exemplaren des *Acalles hypocrita* Boh. auf den ersten Blick ähnlich, bei genauerer Vergleichung unterscheidet sie sich durch längere, regelmässig ovale Flügeldecken mit tiefen Furchen, welche auf dem Rücken weniger deutlich, an den Seiten aber grubig punktiert sind. Die ganze Oberseite ist dunkelbraun beschuppt, auf dem Halsschild befinden sich zwei schmale, undeutliche hellere Seitenbinden, auf den Flügeldecken ähnlich wie bei *A. hypocrita*, eine gerade schmale Querbinde hinter der Mitte und vor derselben zahlreiche kleine, isolierte, bindenartig geordnete, hellere, gelblich-weiße Punkte. Auf dem Halsschild fehlen die aufgerichteten Schüppchen des *A. hypocrita*, während je eine Reihe derselben auf den Zwischenräumen der Flügeldecken vorhanden sind, aber nicht so dicht gedrängt und undeutliche Büschel bildend wie bei *A. hypocrita*; dagegen bemerkt man auf der Mitte des Halsschildes in einer Querreihe vier Höckerchen (zwei jederseits), welche aus solchen Schüppchen gebildet sind. Der Rüssel ist etwas dünner, weniger dicht und etwas feiner punktiert, glänzend, an der Basis ohne kielartige Runzeln. Der Halsschild ist fast so lang als breit, von der Basis nach vorne verjüngt, die Seiten schwach gerundet und hinter dem Vorderende kaum bemerkbar eingeschnürt. Die Flügeldecken sind viel weniger robust, länglicher, oval, mit flachverrundeten Schultern. Die Beine ähnlich denen des *A. hypocrita*. Von *A. caucasicus* Reitter, der mir übrigens nur aus der Beschreibung bekannt ist, unterscheidet sich die Art durch die vier Borstenbüschel des Halsschildes und die gerade schmale Dorsalbinde.

variegatus Boh. Kronstadt (Bielz).

Nachdem Deubel die Art bei Kronstadt nicht wieder gefunden hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihre Anführung bei Bielz auf einem Irrtum beruht, auf einer Verwechslung mit einem grossen *A. validus* Stampe, der zuweilen eine Grösse von 3 mm. erreicht, während P. Meyer die Grösse nur auf 2—2½ mm. angibt.

validus Hampel. Im ganzen Waldgebiet unter Laub.

lemur Germ. Kronstadt, Bükszád, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Rotenturm, Gyógy (Bad, Ormay); Búdös, Alsó-Rákös, Rátosnya, Schässburg (c. a.).

echinatus Germ. Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

misellus Boh. (ptinoides Gyll.).

v. *furbatus* Boh. Gross-Scheuern, Holzungen, Kerzer Gebirge, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Michelsberg, Schanta, Porumbacher Gebirge, Gyógy (Bad, Ormay).

Papei Solari.

var. *balkanicus* Solari. Baassen (4 Exemplare), Alsó-Rákös (1 Exemplar c. a.).

Ceutorrhynchinae.

Ceutorrhynchini.

993. *Mononychus Germar.*

punctum-album Herbst (pseudacori F.). Michelsberg, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

a. *salviae* Germ. Mező-Záh (Deubel).

994. *Coeliodes Schönh.*

rubricus Gyll. (Hoffmanni Weise). Előpatak (c. a.).

ruber Marsh. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

erythroleucus Gmel. (subrufus Herbst). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Hátzeg, Kronstadt (Deubel).

dryados Gmel. L. (quercus F.). Hammersdorf, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Klein-Pold (Ormay); Maros-Ujvár, Schässburg, Kronstadt, Előpatak (c. a.).

irrfasciatus Bach. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

proximus Schultze. Hátzeg (Deubel).

rubicundus Herbst. Hermannstadt, Klausenburg (Bielz).

995. *Stenocarus Thomson.*

cardui Herbst. Hammersdorf, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Alsó-Rákös (c. a.); Rosenau, Erősd (Deubel).

996. *Craponius Leconte — Seidlitz.*

epilobii Payk. Hermannstadt, Zibinsgeb. (Ormay); Borszék (c. a.); Hátzeg, Kronstadt (Deubel).

997. *Cidnorrhinus Thomson.*

4-maculatus L. (urticae Scop.). Durch das ganze Gebiet auf Brennnesseln.

998. *Coeliastes Weise.*

lamii F. Kerzer Gebirge, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Kleinpold (Ormay); Karlsburg, Schässburg, Alsó-Rákös (c. a.); Kronstadt (Deubel).

999. *Allodactylus Weise.*

exiguus Ol. Gyll. Kalán, Alsó-Rákös (c. a.).

affinis Payk. (geranii Payk.). Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Előpatak, Schässburg, Baassen, Rodnag Gebirge (c. a.); Bistritz (Deubel).

1000. *Pseudophytobius Desbrochers.*

veronicae Friv. Karlsburg (von Zellich gesammelt, c. a.).

1001. *Scleropterus Schönh.*

serratus Germ. Ober-Seles, Kerzer Geb. (Bielz); Schanta (Ormay); Schuler-Gebirge, Balánbánya, Kalán, Paringulgebirge, Rodnag Gebirge (c. a.).

offensus Boh. Kerzer Gebirge, Kronstadt (Bielz); Bucsecs (c. a.).

1002. *Rhytidossoma Stephens.*

Rh. globulus Herbst fehlt unserer Fauna.

fallax Otto. Frecker Gebirge (Serbota); Schuler-Gebirge, Csukás, Balánbánya, Borszék (c. a.); Kreputura bei Zernest (Deubel).

monticola Otto. Hermannstadt, Előpatak, Schässburg (c. a.); Schuler, Nagy-Hagymás, Kronstadt, Erősd (Deubel).

1003. *Brachyodontus Schultze.*

Reitteri Weise. Rodnag Gebirge (c. a.).
Deubeli Ganglb. Bucsecs (c. a.).

1004. *Amalus Schönherr.*

haemorrhous Herbst (scortillum Herbst). Hermannstadt, Neppendorf, Gross-Scheuern, Girelsau, Kronstadt (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schuler-Geb., Schässburg (c. a.).

1005. *Rhinocnus Stephens.*

castor F. Hammersdorf (Ormay); Frecker Gebirge (Leitha); Schässburg (c. a.); Ober-Komana (Méhely); Hátzeg (Deubel).

a. **flavipes** Steph. Schässburg (c. a.).

bruchoides Herbst. Hermannstadt, Hammersdorf, Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Ober-Kerz (Glashütte); Előpatak, Bistritz (c. a.); Hátzeg, Kronstadt (Deubel).

inconspectus Herbst. Girelsau, F. arasch (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Rh. *inconspectus* Herbst ist im Katalog der europäischen Käfer von Heyden etc. wohl aus Versehen ausgeblieben.

pericarpus L. Hátzeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Fogarasch, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Helfau (Ormay); Retjezat, Malomviz, Schässburg, Szováta, Rodnagebirge (c. a.); Kronstadt (Deubel).

perpendicularis Reich. (guttalis Grav.). Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Hammersdorf, Helfau (Ormay); Unter-Kerz, Reps, Bistritz (c. a.); Kronstadt, Schuler, Hammersdorf, Nagy-Hagymás (Deubel).

albicinctus Gyllh. Hermannstadt (Bielz).

1006. *Phytobius Schönh.*

canaliculatus Fabrs. Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

Waltoni Boh. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (c. a.); Hátzeg, Kronstadt (Deubel).

comari Herbst. Hermannstadt (Ormay, c. a.); Kronstadt (Deubel).

4-tuberculatus F. Zibinsgebirge (Bielz); Talmesch (Ormay); Schässburg (Kokelufer c. a.); Kronstadt (Deubel).

granatus Gyll. (Brisouti Seidlitz). Zibinsgebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátzeg, Schässburg (Kokelufer, c. a.); Honigberg (Deubel).

4-cornis Gyll. Hermannstadt, Kerzer Geb. (Bielz); Kronstadt (Deubel).

(Litodactylus).

leucogaster Marsh. Kronstadt (Deubel).

(Eubrychius.)

velatus Beck. Gross-Scheuern (Bielz).

1007. *Marmaropus Schönh.*

Besseri Gyll. Puj (bei Hátzeg, c. a.).

1008. *Phrydiuchus Gozis.*

topiarius Germ. Gross-Scheuern (Bielz); Felső-Orbó (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Hátzeg, Schässburg (c. a.).

Spelseri Schultze. Schässburg (bei einer Ueberschwemmung der Kokel 1890, c. a.).

1009. *Ceutorhynchidius Duv.*

horridus Panz. (spinosus Gemm.). Reps, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt, Nagy-Hagymás (Deubel).

troglyodytes F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Karlsburg, Kronstadt, Alsó-Rákos, Schässburg, Baassen (c. a.); Nagy-Hagymás (Deubel).

1010. *Ceutorhynchus Germ.*

(Sirocalus.)

terminatus Herbst. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg, Kalán (c. a.); Kronstadt, Törzburg (Deubel).

quercicola Payk. Crepatura bei Zernest (Deubel) det. von Fornanek.

nigrinus Marsh. Kronstadt (Zinne, Méhely); Vajda-Hunyad (c. a.).

floralis Payk. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

pyrrhorhynchus Marsh. (achilleae Gyll.). Hermannstadt, Neppendorf (Bielz).

pulvinatus Gyll. Salzburg b. Hermannstadt (c. a.); Rodna, Kronstadt (Deubel).

rhenanus Schultze. Kronstadt (Zinne), Rossenau (Deubel), Hammersdorf (c. a.).

Hampei Bris. Reps (Seidlitz, 1864).

carniolicus Schultze. Schuler (Deubel).

(Thamioecolus.)

viduatus Gyll. Hermannstadt, Klausenburg Schässburg (c. a.).

pubicollis Gyll. Hermannstadt (j. W.); Baassen, Schässburg (c. a.).

Da es nicht sicher ist, welche von beiden Arten Bielz meint, C. pubicollis Gyllh. oder signatus Gyllh., die beide bei uns vorkommen, führe ich nur die mir bekannten Fundorte an.

virgatus Gyll. Honigberg am Altfluss (Deubel); Vajda-Hunyad (c. a.).

signatus Gyll. Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Kraatzi Bris. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Fuchsloch, 6. Mai, zusammen mit C. trimaculatus F. von Distel, c. a.).

(Ceutorhynchus i. sp.)

abbreviatus F. Gross-Scheuern, Marpod, Kerz, Fogarasch (Bielz); Hammersdorf, Hátzeg, Rotenturm, (c. a.); Honigberg (Deubel).

geographicus Goetze. Rotenturm, Hammersdorf, Előpatak, Bükszád, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hátzeg, Puj (bei Hátzeg), Petrozsény (c. a.).

radula Germ. Kronstadt, Klausenburg (Bielz).

crucifer Oliv. (cruciger Herbst). Hermannstadt, S.-Regen (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Aubel Boh. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Marpod (Bielz).

Sollte C. Aubel Boh. vielleicht ein Druckfehler für Andrea Germ. sein, der sich im Verzeichnis nicht findet, obgleich er bei uns vorkommt? Es liegt diese Annahme um so näher, da Aubel nur aus dem südlichen Europa und dem Kaukasus nachgewiesen wurde.

angulicollis Schultze. Kalán (c. a.); Rosenau, Honigberg (Deubel).

ornatus Gyllh. (Andreae Germ. Seidl.). Karlsburg (c. a.); Rosenau, Kronstadt (Zinne, Deubel).

larvatus Schultze. Schässburg, Baassen, Szováta (c. a.); Rosenau, Krepatura (Deubel).

gibbicollis Schultze. Kronstadt (Kapellenberg, Deubel, c. a.).

litura F. Hermannstadt, Sächsisch-Regen (Bielz).

trimaculatus F. Hammersdorf (Bielz); Schuler-Gebirge, Balánhanya, Schässburg (auf Distel, c. a.); Zernest, Kronstadt, Nagy-Hagymás (Deubel).

asperifoliarum Gyll. Héviz, Oláhfalú (Bielz); Héviz, Schässburg, Kronstadt, Szováta (c. a.); Hammersdorf, Rosenau (Deubel).

cognatus Schultze. Siebenbürgen (Catalogus Col. Eur., 671).

pallidicornis Bris. Zibinsklamm (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

urticae Boh. Kronstadt (Zinne, Deubel).

euphorbiae Bris. Schuler-Gebirge, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

ampliennis Schultze. Schässburg (c. a.).

austriacus Bris. Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

transsylvanicus Schultze. Siebenbürgen.

symphyti Bod. (?raphani F.). Hermannstadt, Girelsau, Freck (Bielz); Honigberg (Deubel).

angulosus Boh. Schässburg (c. a.).

suturalis F. Neudorf b. H. (Bielz); Schässburg, Előpaták (c. a.); Hammersdorf (Deubel).

arquatus Herbst. Rotenturm (c. a.); Bistritz, Rosenau, Kronstadt (Deubel).

campestris Gyll. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Itátszeg, Szováta, Schässburg (c. a.).

chrysanthemi Germ. Kronstadt, Wolkendorf (Bielz); Schässburg (c. a.).

figuratus Gyll. Fogarasch (Bielz).

triangulum Boh. Schässburg, Borszék (c. a.); Schuler, Wolkendorf (Deubel).

rugulosus Herbst. Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Schässburg, Oláhfalú (c. a.).

melanostictus Marsh. Karlsburg, Schässburg (Türkenhill, 24. Oktober), Kodelufer oder im Böhricht einer sumpfigen Stelle, c. a.); Krepatura, Kronstadt (Deubel).

macula-alba Herbst. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz).

albovittatus Germ. Itátszeg, Hermannstadt,

Kronstadt, Mediasch, S.-Regen. Záh (Bielz).

marginatus Payk. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Schässburg (Bielz); Stolzenburg (Ormay).

Möller Thoms.

a. rotundatus Bris. Kronstadt (Zinne, Deubel).

punctiger Gyllh. Puj (b. Itátszeg), Karlsburg, Schässburg, Borszék (c. a.); Hermannstadt (Seidlitz); Kronstadt (Deubel).

pilosellus Gyll. Schässburg (c. a.).

inhumeralis Schultze. Rotenturm, Schässburg (c. a.).

pollinarius Forst. Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (Kroeberg, Mai, c. a.).

pleurostigma Marsh. Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Schässburg, Kronstadt, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Kleinpöhl (Ormay); Karlsburg, Schellenberg, Salzburg b. H. (c. a.).

Roberti Gyll. Hermannstadt (Bielz); Kalán (c. a.).

a. alliariae Bris. Vargyas bei der Almäser Höhle (Deubel).

puncticollis Boh. Karlsburg, Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.); Vargyas b. d. Höhle (Deubel).

obsoletus Germ. Hermannstadt, Kronstadt (Bielz).

faeculentus Gyll. Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

rapae Gyll. Záh (Mezőség, Bielz); Hermannstadt (Ormay).

borraginis F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

syrites Germ. Klausenburg (Bielz); Hammersdorf (Ormay, c. a., auf cranhe tartarica); Stolzenburg (Ormay; Kronstadt (c. a.); Nagy-Hagymás (Deubel).

arator Gyll. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf (Bielz, c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel).

assimilis Payk. Kronstadt (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schässburg (c. a.); Zernest (Deubel).

constrictus Marsh. Kronstadt, Schuler, Vargyas bei der Höhle (Deubel); Schässburg (c. a.).

cochleariae Gyll. Előpaták (Bielz); Schuler-Gebirge, Schässburg (c. a.); Rodnagab. (Deubel).

Schönherri Bris. Előpaták (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

similis Bris. Kronstadt (Zinne, Deubel).

parvulus Bris. Schässburg, Vajda-Hunyad (c. a.).

nanus Gyll. Kalán (c. a.); Hammersdorf, Kronstadt, Honigberg (Deubel).

angustulus Gyll. Kronstadt (Zinne, Deubel).

sophiae Stev. Kronstadt (Zinne, Deubel).

querceti Gyll. Hermannstadt (Bielz).
consputus Germ. Hátszeg (c. a.).
coarctatus Gyll. (granulicollis Thoms.). Siebenbürgen (Bielz).
quadridens Panz. Hermannstadt, Gyeke, Záh (Bielz); Kronstadt (Deubel).
sulcicollis Payk. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Kronstadt, Gyeke (Bielz); Schässburg (c. a.); Heltau, Kleinpold (Ormay); Alsó-Rákos (Deubel).
scapularis Gyll. Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).
ignitus Germ. Schässburg, Alsó-Rákos, V.-Hunyad (c. a.); Kronstadt (Deubel).
barbareae Suffr. Hermannstadt (Bielz).
 C. barbareae Suffr. ist irrthümlich für Schässburg angeführt.
pervicax Wse. Karlsburg (c. a.).
erysimi F. Im ganzen Gebiete verbreitet, auch im Gebirge (Retjezat).
 a. **subniger** Gerh. Schuler-Gebirge (c. a.).
contractus Marsh. Wie der vorige verbreitet.
hirtulus Germ. Schüttal (Bielz); Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
aeneicollis Germ. Hermannstadt (Bielz); Hammersdorf, Schässburg (c. a.).
canaliculatus Bris. Siebenbürgen (Catalogus Col. Europ., 677).

1011. *Poophagus Schönh.*

sisymbrii F. Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altfluss, auf Sumpfpflanzen, Deubel, c. a.).

1012. *Tapinotus Schönh.*

sellatus F. Hermannstadt (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).

1013. *Orobitis Germar.*

cyaneus L. Déva, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Klausenburg (Bielz); Hátszeg, Oláhfalú (Bielz, c. a., Waldrand unter Moos); Hermannstadt (Ormay); Rosenu (Deubel).

Coryssomerini.

1014. *Coryssomerus Schönh.*

capucinus Beck. Kronstadt (Zinne, Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.).

1015. *Baris Germar.*

artemisiae Herbst. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hammersdorf, Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.).

spitzyi Hochh. Baassen (c. a.).

a. **nesapia** Faust. Baassen (c. a.).

sulcata Boh. Klausenburg (Bielz); Szamosujvár (Ormay).

analis Oliv. Hátszeg, Zeilner Berg (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

laticollis Marsh. (picina Germ., glabra Bedel ol. nec. Herbst). Hammersdorf, Mediasch (Bielz); Schässburg (c. a.).

atramentaria Boh. Karlsburg (Zellich, c. a.).

carbonaria Boh. Gross-Scheuern (Bielz); Hammersdorf (Bielz, c. a., auf den Wurzeln des Crambe tatarica).

timida Rossi. Karlsburg (unter den Weinbergen gekötschert in 2 Exemplaren, c. a.); Mezöség (Gyeke, Bielz).

scolopacea Germ. Schässburg, Klausenburg (Bielz); Karlsburg (c. a.).

janthina Boh. Hátszeg (Bielz); Schässburg (c. a.).

lepidii Germ. Gross-Scheuern, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

coerulescens Scop. Mühlbach, Rothberg b. H., Michelsberg, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

abrotani Germ. (picicornis aut. nec Marsh.). Gross-Scheuern, Tartlau (Bielz).

Villae Comolli. Hátszeg, Gross-Scheuern (Bielz).

chlorizans Germ. Gross-Scheuern, Holzmengen, Fogarasch (Bielz); Előpatak (c. a.); Rodnagebirge, Kronstadt (Deubel).

1016. *Limnobaris Bedel.*

T-album L. Hátszeg, Gross-Scheuern, Gyeke (Bielz); Kronstadt (Deubel).

pusio Boh. Baassen (Bachufer oberhalb des Bades, 14. Juni c. a.).

Calandrinae.

1017. *Sphenophorus Schönh.*

piceus Pall. Záh (Bielz); Karlsburg (c. a.).

abbreviatus F. Hátszeg (Bielz); Karlsburg Baassen (c. a.); Szamosujvár (Ormay). (Ich sammelte den Käfer auf sumpfigem Boden zwischen Sumpfpflanzen.)

Offenbar hat Bielz nicht Sph. abbreviatus F., sondern wie Seidlitz ganz richtig bemerkt. Sph. abbreviatus Redt. = striatopunctatus Goeze gemeint, denn dieser kommt ziemlich häufig, jener sehr selten vor.

striatopunctatus Goeze (mutilatus Laich). Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Birtäl, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Dees, Záh (Bielz); Klausenburg, Kronstadt (c. a.).

1018. *Calandra Clairville.*

granaria L. Durch das ganze Gebiet, oft in Scheuern und auf Fruchtböden.

orizae L. Hermannstadt (Bielz); Karlsburg, Klausenburg, Schässburg (im Reis); Kronstadt (Deubel).

Tychiinae.

Tychlini.

1019. *Balaninus Samouelle*.

elephas Gyll. Hätzeg, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

Im Bielz'schen Verzeichnis fehlt *P. pellitus* Boh., der bei uns vorkommt, wodurch die Vermutung begründet wird, dass *P. elephas* durch Irrtum in unser Verzeichnis gekommen sei.

pellitus Boh. Schässburg (c. a.); Schuler, Kronstadt (Deubel).

venosus Grav. (glandium Desbr.). Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm (Ormay).

villosus F. Hätzeg, Neudorf b. H., Kronstadt (Bielz); Schässburg (auf Eichen im Frühjahr, c. a.).

nucum L. Hermannstadt, Sächsisch-Regen, Klausenburg (Bielz); Schässburg, Szurdok-Pass, Hammersdorf, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

glandium Marsh. (turbatus Gyll., tessellatus Desbr.). Hätzeg, Fogarasch, Kronstadt, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Schässburg, Baassen, Alsó-Rákös (c. a.).

cerasorum Herbst. (Herbsti Gem.). Hermannstadt (Ormay); Rotenturm (c. a.).

rubidus Gyll. Kronstadt (Gespreng, von Sumpfpflanzen gekötschert, Deubel).

1020. *Balanobius Jekel*.

crux F. Durch das ganze Berg- und Hügel-land auf Weiden.

salicivorus Payk. Wie der vorige.

pyrrhoceras Marsh. Hätzeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

1021. *Anthonomus Germar*.

varians Payk. Hätzeg (Bielz); Retjezat (c. a.); Bucecs (Deubel).

a. **perforator** Herbst. Gyógy (Bad, Ormay); Kronstadt (Deubel).

rubi Herbst. Hätzeg, Hermannstadt, Kronstadt, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Puj (Hätzeg), Karlsburg, Schuler-Gebirge, Alsó-Rákös, Schässburg, Borszék, Rodnagebirge (c. a.).

pubescens Payk. Schauta (Ormay, Fichten); Retjezat, Balán (c. a.); Schuler (Deubel).

cinctus Kollar. (piri Boh.). Schässburg, Hätzeg (c. a.).

inversus Bedel (ulmi Desbr.). Karlsburg, Schässburg (c. a.); Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Resinar (Ormay); Kronstadt, Zernest (Deubel).

pedicularius L. Hermannstadt, Stolzenburg (Ormay, auf Crataegus); Hätzeg, Bucecs, Schässburg, Rotenturm, Balánbánya (c. a.); Kronstadt (Zinne, Méhely).

rufus Gyll. Baassen (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pomorum L. Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Ober-Sebes, Kerzer Geb., Schässburg, S.-Regen (Bielz); Heltau, Michelsberg (Ormay); Kronstadt (Deubel). Grosser Schädling auf Apfelbäumen (Apfelblütenstecher).

(Furcipes.)

rectirostris L. (druparum L.) Gyógy, Nagyág (Ormay); Kronstadt (Méhely); Malomviz, Schässburg (von Zwetschenbäumen, c. a.).

1022. *Bradybatus Germar*.

Creutzeri Germ. Heltau (Ormay); Hammersdorf (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Kellneri Bach. Hammersdorf, Schässburg (c. a.).

tomentosus Desbr.? Rotenturm, Kronstadt (c. a.).

Dieser langgestreckte *Bradybatus*, dessen Beschreibung ich nicht kenne, hat vollständig ungezähnte Schenkel, der Rüssel ist nach vorne verengt, die Flügeldecken sind dicht grau behaart, nur eine Querbinde hinter der Mitte beinahe unbehaart, glänzend; auf den Zwischenräumen der Punktreifen erheben sich längere weisse Börstchen, die in einer Reihe angeordnet und nach rückwärts geneigt sind. Der Halsschild ist gleichmässig grau behaart. Sollte diese Art mit *tomentosus* nicht identisch sein, so schlage ich für sie den Namen *Bradybatus seriesetosus* vor.

1023. *Acalyptus Schönh.*

carpini Herbst. Fogarasch, Schässburg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Kronstadt (Deubel).

a. **sericeus** Gyll. Schässburg (Bielz).

a. **alpinus** Villa (rufipennis Gyll.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Holzmen- gen, Marpod, Schässburg, Fogarasch (Bielz); Vargyas, Kronstadt (Deubel).

1024. *Elleschus Stephens*.

scanicus Payk. Schässburg (Bielz, c. a.); Búdös (c. a.); Hermannstadt, Szamos-ujvár (Ormay).

a. **pallidesignatus** Gyllh. Schässburg, Elő-patak (c. a.).

bipunctatus L. Schässburg (Bielz, c. a.); Stolzenburg (Ormay); Búdös, Borszék (c. a.); Schässburg im April von Sahlweiden geklopft; Rosenau (Deubel).

salicis Petri. Schässburg (Kokelufer auf Weiden, nicht selten); Rosenau (Deubel).

Diese Art hat mit *E. infirmus* Herbst (Schönh. III. 300) grosse Aehnlichkeit, ist aber durch ungezähnte Schenkel und ganz schwarzen Rüssel von ihm verschieden. Desbrochers scheint ebenfalls eine andere, aus Südrussland stammende Art vorgelegen zu haben, wenigstens passt nicht auf unsere Art, dass die zwei ersten Geisselglieder der Fühler verlängert seien, ferner, dass die Flügeldecken nach hinten nicht erweitert und die vorderen Tibien schwach gebogen seien.

1025. *Lignyodes Schönh.*

enucleator Panz. Hermannstadt (Bielz); Schässburg (Schulberg, c. a.).

1026. *Tychius Germar.*

quinquepunctatus L. Durch das ganze Gebiet.

v. **tauni** Frick. Dees (Méhely); Honigberg am Altfluss (Deubel).

polylineatus Germ. Hammersdorf, Girelsau, Rotenturm (Bielz); Hátzeg, Schässburg (c. a.).

lineatulus Steph. (Schneideri Gyll.). Hátzeg, Schässburg, Baassen (c. a.).

Schneideri Herbst (lineatulus Boh.). Hammersdorf (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

flavicollis Steph. (squamulatus Gyll.). Schässburg (c. a.); Boncz-Nyires (Méhely).

venustus v. **genistae** Boh. Schässburg (Bielz) ist aus unserem Verzeichnis zu streichen, da ihre Aufführung auf einer Verwechslung mit *Sibinia vittata* Germ. beruhte.

Kiesenwetteri Tourn. Schässburg (c. a.).

crassirostris Kirsch. Schässburg (c. a.).

aureolus Kiesenw. Kronstadt, Schässburg (c. a.).

v. **medicaginis** Bris. Zalatna, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

haematopus Gyll. (juncus Boh.). Hátzeg, Schässburg (c. a.); Zinne (Deubel).

femoralis Bris. Schässburg, Alsó-Rákos (c. a.); Kronstadt (Deubel).

juncus Reich (curtus Bris.). Gross-Scheuern, Mediasch, Záh (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Gyógy (Ormay); Schässburg, Rotenturm (c. a.); Kronstadt (Deubel).

meliloti Steph. Schässburg (Bielz, c. a.); Reys, Előpatak (c. a.); Kronstadt, Hátzeg (Deubel).

tomentosus Herbst. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Micotrogus.)

picrostris F. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

cuprifer Panz. Hátzeg, Gross-Scheuern, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf, Grossau, Stolzenburg (Ormay); Előpatak, Alsó-Rákos, Schässburg (c. a.); Alsó-Rákos, Kronstadt (Deubel).

1027. *Sibinia Germar.*

Beckeri Tourn. Karlsburg (c. a.).

fugax Germ. Schässburg (Fuchsloch, 3. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

signata Gyll. (?primita Herbst). Gross-Scheuern (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

vittata Germ. Schässburg, Karlsburg (c. a.).

cana Herbst (?pellucens Scop.-Bedel). Hermannstadt, Hammersdorf (Bielz); Baassen, Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Méhely); Zinne (Deubel).

viscaria L. (var. Roelofsi Desbr., var. Emeryi Tournil). Hermannstadt (Bielz); Schässburg (auf einer Silene, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Orchestini.

1028. *Anoplus Schönh.*

plantaris Naezen. Hátzeg, Michelsberg, Kerzer Gebirge, Büdös, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Schanta (Ormay); Malomviz (c. a.); Rosenau (1 Exempl., Deubel).

roboris Suffr. Rosenau (häufig, Deubel).

1029. *Orchestes Illiger.*

Die Arten leben auf Bäumen und Sträuchern.

quercus L. Fogarasch, Kronstadt, Brennendorf, Előpatak (Bielz); Hermannstadt, Klein-Pold (Ormay); Hátzeg (Deubel).

pilosus F. (ilicis F.). Präbe (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz, Kronstadt (Deubel).

sparsus Fahr. Hátzeg (Bielz).

fagi L. In Buchenwäldern durch das ganze Gebiet.

testaceus Müller (scutellaris F.). Zibinsgebirge, Fogarasch, Tartlau, Schässburg (Bielz); Rotenturm, Kerzer Gebirge (Ormay); Bucsecs (c. a.); Szurduk-Pass, Hátzeg (Deubel).

v. **semirufus** Gyll. Rotenturm (c. a.); Kronstadt, Ober-Venice (Méhely).

lonicerae Herbst. Schässburg (c. a.).

rusci Herbst. Hátzeg, Zibins-Gebirge (Bielz); Bükszád (c. a.).

avellanae Donov. Kronstadt, Hammersdorf (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Breite, 2. Mai, Haselnussstrauch, c. a.).

(Pseudorchestes.)

pratensis Germ. Hermannstadt, Oláhfalú (Bielz); Schässburg, Szováta (c. a.).

cinereus Fahr. Schässburg (Schneureberg, 23. Mai, gekötschert, c. a.); Hátzeg (Bielz).

(Tachyerges.)

decoratus Germ. Hátzeg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék, Schässburg (Kokelufer, auf Weiden, 12. Mai); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

- rufilarsis** Germ. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Rosenau (Deubel).
salicis L. Hermannstadt, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Salzburg (Ormay); Schässburg, Borszék (auf Weiden, c. a.).
stigma Germ. Mühlbach, Héviz, Schässburg, Oláhfalva (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Borszék, Klausenburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

(Isochnus.)

- populi** F. Hätzeg, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächsisch-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Nagynyed, Kakova (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Nagy-Hagymás (Deubel); Borszék (c. a.).
foliorum Müll. (saliceti F.). Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Rosenau, Bucsecs (Deubel).

1030. *Ramphus Clairville.*

- pulicarius** Herbst (flavicornis Clairv.). Hätzeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Rotberg b. H. (Bielz); Schässburg (c. a.); Rosenau (Deubel).

Mecynini.

1031. *Mecynus Germar.*

Die Arten leben auf Wiesenpflanzen, von denen sie geküsst werden.

- collaris** Germ. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf (Bielz); Stolzenburg, Rotenturm (Ormay); Schässburg, Gross-Alisch b. Sch. (c. a.); Karlsburg, Nagy-Hagymás, Kronstadt (Deubel).
pyraster Herbst. Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Talmesch, Kerzer Geb., Fogarasch (Bielz); Hermannstadt, Stolzenburg, Szamosujvár (Ormay); Karlsburg, Baassen, Schässburg, Előpatak, Kronstadt (c. a.).
circulatus Marsh. Hammersdorf (Bielz).

1032. *Gymnetron Schönh.*

Die Arten leben auf verschiedenen krautartigen Pflanzen.

- (Gymnetron s. str.)
labile Herbst. Hätzeg, Gross-Scheuern, Girdsau, Marpod, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.).
latiusculum Duv. Siebenbürgen (Catalog. col. Eur. Heyden, 1906, col. 690).
rostellum Herbst. Kronstadt (Zinne, Deubel).
mefanarium Germ. Schässburg (Fuchsloch, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
villosulum Gyll. Hätzeg (Bielz); Hermannstadt (a. B. Ormay); Kronstadt (Deubel).

- beccabungae** L. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kronstadt (Deubel).
v. veronicae Germ. Kronstadt, Hätzeg (Deubel); Rátosnya (c. a.).

(Rhinusa.)

- asellus** Grav. Rotenturm (Ormay); Kronstadt, Vajda-Hunyad, Gyalärer Tal auf Verbascum, c. a.); Sósmező, Gyimescher Pass (Méhely).
v. plagiatum Gyll. Hätzeg, Neudorf b. H., Holzmengen (Bielz).
letum F. Hermannstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Gyógy Bal, Ormay; Hätzeg, Nagynyed (c. a.); Kronstadt (Deubel).
a. plagiellum Rosensch. Kronstadt (Zinne, Deubel); Vajda-Hunyad (c. a.).
v. subrotundatum Reitter (antirrhini Germ.). Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Gyógy (Bad, Ormay); Thoräer Schlucht, Zalatna, Kronstadt (c. a.).
antirrhini Payk. noctis auct.). Előpatak (c. a.); Kronstadt (Zinne); Erösd (Deubel).
hispidum Brullé (pilosum Gyll.). Hermannstadt, Előpatak, S.-Regen (Bielz).
melas Boh. Kronstadt (Deubel).
netum Germ. Neudorf, S.-Regen (Bielz); Kronstadt, Rosenau (Deubel).
 G. collinum Gyll. ist aus dem Verzeichnis zu streichen, da der Käfer irrtümlich aufgenommen wurde.
bipustulatum Rossi. Gross-Scheuern, Neudorf, Schässburg, Záh (Bielz); Hermannstadt (Ormay).
a. fuliginosum Rosenh. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel); Schässburg, Szováta (c. a.).
linariae Panz. Neudorf b. H., Schässburg (Bielz).

1033. *Miarus Stephens.*

- longirostris** Gyll. Fogarasch, Tartlau (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
graminis Gyll. Hätzeg, Neppendorf, Neudorf bei H., Fogarasch, Reys, Sächs.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Gyógy (Bad, Ormay); Klausenburg, Előpatak (c. a.); Kronstadt (Deubel).
distinctus Boh. Borszék (c. a.).
campanulae L. Hätzeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Fogarasch, Mediasch, Előpatak, S.-Regen, Gyeke, Záh (Bielz); Stolzenburg, Kerzer Gebirge (Ormay); Malomviz, Puj (bei Hätzeg); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
a. ursinus Ab. Puj bei Hätzeg, Schässburg (c. a.).
v. rotundicollis Desbr. Puj bei Hätzeg (c. a.).

v. monticola n. v. Bucsecs, Frecker Gebirge (Serbota); Borszék, Balánbánya, Schässburg (c. a.).

Miarus campanulae v. monticola lässt sich nur im männlichen Geschlecht vom typischen *Miarus campanulae* unterscheiden. Während beim ♂ des letzteren das letzte Abdominalsegment tief eingedrückt ist und die seitlichen Ränder der Grube sich in Form zweier kräftigeren, nach abwärts gerichteten und durch eine im Grunde gerundete, tiefe Ausbuchtung von einander getrennten Zähne erheben, ist bei der Varietät *monticola* das letzte Abdominalsegment nur leicht eingedrückt und die Seiten des Eindrucks hinten in ein wenig über das Niveau des Segmentes erbobenes, schwaches Zähnchen erweitert. Bei der Stammform ist die Grube geglättet, glänzend, wenig dicht, grob punktiert, bei *monticola* ist die Punktierung etwas feiner und dichter, der Glanz geringer. Da sich keine sonstigen konstanten Unterschiede vorfinden, geschlechtliche Unterschiede auch sonst sehr verschieden stark ausgeprägt sind, halte ich *monticola* nur für eine lokale, vielleicht auch nur individuelle Abweichung, die ich jedoch erwähnen zu müssen glaubte.

Clonul.

1034. *Cionus Clairville*.

Die Arten leben namentlich auf Verhasenm.

tuberculosis Scop. (verhasci F.). Hätzeg, Retjezat, Gross-Scheuern, Neudorf bei H., Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Zibins-Gebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

scrophulariae L. Retjezat, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Zibinsgebirge, Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

thapsi F. (similis Gemm.). Hätzeg, Neudorf bei H., Tartlau, Bükszád, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Rotenturm, Ober-Forumbach, Zibinsgebirge, Gyógy (Bad), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Retjezat, Puj (bei Hätzeg), Nagyenyei, Karlsburg (c. a.).

Olivieri Rosensch. (Clairville Boh.). Hermannstadt, Fogarasch, Bükszád, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Hätzeg (c. a.).

hortulanus Geoffr. Hermannstadt, Fogarasch, Bükszád, Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Hätzeg, Oláhfalú, Reps, Rodnagebirge (c. a.).

olens F. Holzmengen (Bielz); Schässburg (Schulberg, c. a.).

alauda Herbst (Mattariae F.). Hätzeg, Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Zibinsgebirge (Ormay); Kronstadt (Deubel).

(Cleopus.)

solani F. Schässburg (Schulberg April, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

Nanophynial.

1035. *Nanophyes Schönherr*.

circumscripтус Aubé. Schässburg (Scheureberg, 23. Mai, gekötschert).

globulus Germ. Hätzeg, Hermannstadt (J. W.), Fogarasch (Bielz); Haimmersdorf (Deubel).

gracilis Redtenb. Hätzeg (Bielz).

marmoratus Goeze (lythri F.). Durch das ganze Gebiet an sumpfigen und feuchten Orten auf *Lythrum*.

Magdalini.

1036. *Magdalis Germ.*

(Tanmophilus.)

phlegmatica Herbst. BIRTHÄLM (Bielz); Kronstadt (c. a.).

nitida Gyll. Hermannstadt (Bielz); Bucsecs, Schulergebirge, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

violacea L. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay, auf getrockneten Fichtenästen); Frecker Gebirge (Serbota); Elöpaták, Karlsburg (von Eiche), Schässburg (Scheureberg von Ulmen, 23. Mai, c. a.); Nagybagymás (Deubel).

frontalis Gyll. Klausenburg (Bielz); Zernest (Coltin Chitilor, Méhely); Kronstadt (Deubel).

duplicata Germ. (?punctipennis Küster). Kronstadt, Rosenau (Deubel).

Weisei Schreiner. Honigberg (am Altfluss, Deubel, det. Formanek).

striatula Desbr. Siebenbürgen (Bielz).

armigera Geoffr. (aterrima F.). Dobra, Schässburg (Bielz); Hahubach b. H. (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

carbonaria L. Szurdukpass (c. a., von Fichten geklopft).

asphaltina Boh. Klausenburg (Bielz).

(Panus.)

cerasi L. Hätzeg, Hermannstadt, Holzmengen, S.-Regen (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

barbicornis Latr. Schässburg (Birnbäum, Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Edo.)

ruficornis L. (pruni L.) Hätzeg, Gross-Scheuern, Girelsan, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Szováta, Baassen (c. a., auf Birnbäum); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel).

(Panopsis.)

flavicornis Gyllh. Hermannstadt (Ormay).
quercicola Weise. Hätzeg, Kronstadt (Deubel).

Aploninl.

1037. Apion Herbst.

(Onychapion.)

tamarisci Gyll. Siebenbürgen (Bielz).

A. tamarisci Gyll. gehört dem Süden Europas an. Ihr Vorkommen bei uns bedarf noch der Bestätigung, zumal Bielz keinen näheren Fundort angibt und die Art seit Bielz nicht gesammelt wurde. Auch Seidlitz (F. transs.) äussert seinen Zweifel. (Ceratapion.)

sulcifrons Herbst. Déva, Gross-Scheuern (Bielz); Talinberg bei Petersberg (Deubel).

confluens Kirby. Hátszeg, Marpod (Bielz); Schässburg (c. a.).

stolidum Germ. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch, Oláhfalú (Bielz); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel).

armatum Gerst. Schässburg (c. a.).

carduorum Kirby (basicoe Illig.). Hátszeg, Gross-Scheuern, Marpod, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

onopordi Kirby. Hátszeg, Mühlbach, Gross-Scheuern, Neppendorf, Hammersdorf, Mediasch, Schässburg, Repts, Oláhfalú, S.-Regen, Gyeke (Bielz); Rotenturm, Előpatak, Déva (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákös (Deubel).

penetrans Germ. Hátszeg, Neppendorf, Előpatak (Bielz); Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

transsylvanicum Schilsky. Siebenbürgen (Schilsky).

(Exapion.)

compactum Desbr. (genistae auctorum). Hátszeg, Mühlbach (r. B.), Torda (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.).

hilfi v. Deubel Wagner. Hátszeg, Kronstadt (Zinne, Deubel). Ent. Mitt. I. 1, p. 19.

corniculatum Germ. (difficile auctorum nec Herbst). Schässburg (c. a.); Erös, Kronstadt (Deubel).

hungaricum Desbr. Schässburg, Alsó-Rákös, Előpatak, Borszék (c. a.); Schuler, Kronstadt, Rosenau (Deubel).

difficile Herbst. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Torda (Bielz); Schässburg, Hátszeg (Bielz, c. a.); Kronstadt, Keisd (Deubel).

(Oxystoma.)

ochropus Germ. Hátszeg (Bielz).

A. ochropus Germ. ist bis jetzt in Schässburg nicht gefunden worden.

pomoniae F. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

cracca L. Hátszeg, Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, Schässburg, Sächsisch-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Malomvizi, Retjezat, Karlsburg, Borszék (c. a.); Kronstadt.

cerdo Gerst. Hátszeg, Freck, Héviz, Nussbach, Előpatak (Bielz); Hermannstadt,

Hammersdorf, Kerzer Gebirge, Szamosujvár (Ormay); Malomvizi, Schässburg, Klausenburg, Zalatna (c. a.); Hátszeg, Kronstadt (Deubel).

opeticum Bach. Előpatak, Schässburg, Borszék (c. a.); Kronstadt (Deubel).

subulatum Kirby. Kronstadt (Bielz); Malomvizi, Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Ormay).

(Aspidapion.)

aeneum F. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

radiolus Kirby. Hátszeg, Gross-Scheuern, Neudorf (b. H.); Fogarasch, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Repts (c. a.); Kronstadt (Deubel).

validum Germ. Neudorf b. H., Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Gyeke (Bielz).

(Synapion.)

ebeninum Kirby. Fogarasch, Repts (Bielz); Heltau (Ormay); Hermannstadt, Előpatak, Schässburg, Vajda-Ilunyad (c. a.); Rotenturm-Pass, Zernest (Deubel).

(Alacentron.)

curvirostre Gyllh. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Hátszeg, Déva, Schässburg (c. a.); Algyógy (Ormay).

(Omphalapion.)

laevigatum Payk. Hermannstadt, Fogarasch (Bielz).

A. laevigatum Payk. ist dem *A. Hookeri* Kirby sehr ähnlich und wahrscheinlich beziehen sich auch die Bielz'schen Fundorte auf letztere Art, da erstere nicht mehr aufgefunden wurde.

Hookeri Kirby. Grossau (Ormay); Kronstadt (Zinne, Königstein), Baróth (Méhely); Héviz, Előpatak, Alsó-Rákös, Schässburg (c. a.); Hammersdorf (Deubel).

(Taeniapion.)

urticarium Herbst. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Kalcapion.)

flavofemoratum Herbst. Gyógy (Ormay); Hátszeg (c. a.); Keisd (Deubel).

pallipes Kirby. Hátszeg, Fogarasch (Bielz); Porumbacher Gebirge (Ormay).

(Rhopalapion.)

longirostre Oliv. Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Sächs.-Regen, Gyeke (Bielz); Vajda-Ilunyad (Gyalärer Tal, c. a., auf Malven und Lavatera in Gärten); Karlsburg, Hátszeg (Deubel).

(Pseudapion.)

rufirostre F. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Záh (Bielz); Schässburg (Bielz, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

(Catapion.)

pubescens Kirby. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Repts, Oláhfalú (Bielz).

seniculus Kirby. Gross-Scheuern, Hammersdorf, Rotenturm, Kronstadt, Előpatak, Oláhfalú, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Grossau (Ormay); Schässburg, Borszék (c. a.).

vleinum Kirby. Hátszeg, Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Hammersdorf (Ormay); Kronstadt (Deubel).

atomarium Kirby. Gross-Scheuern, Héviz, Bükszád, Oláhfalva (Bielz); Zalatna, Ratosnya, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Schuler (Deubel).

serpyllicola Desbr. Schässburg (c. a., vidit Schilsky).

millum Bach (annulipes Wenck.). Ratosnya (3 Exemplare, ♂♂, c. a.).

flavimanum Gyll. Oláhfalva (Bielz); Schässburg (c. a.); Hermannstadt, Talmesch, Szamosujvár (Ormay).

elongatum Germ. (millum Gyll. nec Bach). Nagyenyed (c. a.).
(Erythrapion.)

sanguineum Deg. Bodzaer Gebirge, Ober-Komana (Méhely); Kronstadt (Deubel).

frumentarium Payk. Gross-Scheuern, Kerzer Geb. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Puj (bei Hátszeg), Schässburg, Baassen, Ratosnya (c. a.); Zernest, Kronstadt (Deubel).

v. **cruentatum** Waltl. Kronstadt, Bükszád, Schässburg, Rodnagebirge (c. a.); Bucsecs (Deubel).

miniatum Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Rotenturm, Kerzer Geb., Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Fuchsloch auf rumex pratensis), Klausenburg (Bielz); Karlsburg, Szováta (c. a.); Zernest, Schuler (Deubel).
Bükszád ist zu streichen.

(Podapion.)

filirostre Kirby. Reps (Bielz); Schässburg (c. a.).
Oláhfalva ist zu streichen.

nigritarse Kirby. Hátszeg, Gross-Scheuern, Rotenturm, Fogarasch, Nussbach, Schässburg, Oláhfalva, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Grossau, Gyógy (Ormay); Kronstadt (Deubel).

flavipes Payk. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

v. **Lederi** Kirsch. (♂ apicirostre Desbr., ♀ coxale Deshr.). Schässburg (c. a.); Nagy-Hagymás, Keisd, Rotenturm, Rossenau (Deubel).

dissimile Germ. Hátszeg (Bielz).

ononicola Bach. Schässburg, Frecker Gebirge (Serbota? Leita?, c. a.); Ober-Komana (Méhely).

assimile Kirby. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Schässburg (Bielz); Topánfalva, Borszék (c. a.); Kronstadt, Tohán (Deubel).

apricans Herbst. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Mediasch (Bielz); Gyógy, Michelsberg, Szamosujvár (Ormay); Előpatak, Schässburg, Dees, Karlsburg (c. a.); Kronstadt, Vargyas bei der Höhle, Nagy-Hagymás (Deubel).

varipes Germ. Hátszeg, Hermannstadt, Fogarasch, Reps, Héviz, Előpatak, Schässburg, Oláhfalva, S.-Regen, Záh (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Rotenturm, Alsó-Rákos (Deubel).

aeotivum Germ. (trifolii Bach). Durch das ganze Gebiet verbreitet.

v. **ruficrus** Germ. Mit der Stammform. (Apion i. sp.)

malvae F. Déva, Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Kronstadt (Zinne, Deubel).

curtirostre Germar (humile Germ.). Hermannstadt, Girelsau (Bielz).
Előpatak ist zu streichen.

simum Germ. Hermannstadt, Neppendorf, Schässburg (Bielz); Előpatak, Borszék, Oláhfalva (c. a.); Kronstadt (Deubel).

sedi Germ. Salzburg (Ormay).

brevirostre Herbst. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg, Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

marchicum Herbst (? aterrimum L.). Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Ratosnya, Schässburg (c. a.); Keisd (Deubel).

violaceum Kirby. Hátszeg, Neudorf b. H., Girelsau, Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Rotenturm, Schässburg, Nagyenyed, Topánfalva, Rodnagebirge (c. a.).
Reps ist zu streichen.

hydrolapathil Marsh. Hátszeg, Fogarasch (Bielz).

minimum Herbst. Hátszeg, Fogarasch, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, Oláhfalva (Bielz); Hermannstadt, Talmesch (Ormay); Ratosnya (c. a.).

holosericum Gyll. Kleinpöld, Gyógy (Ormay); Rotenturm, Schässburg (c. a.); Hátszeg (Deubel).

Gyllenhali Kirby (unicolor Kirby). Hátszeg, Fogarasch (Bielz); Kronstadt (Zinne, Méhely); Hermannstadt (c. a.); Várhely (Deubel).

Spencei Kirby. Hátszeg, Fogarasch (Bielz); Nagy-Hagymás (Deubel).

vorax Herbst. Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt (c. a.).

amethystinum Mill. Hermannstadt (c. a.).

viciae Payk. Gross-Scheuern, Fogarasch (Bielz); Schässburg (c. a.); Bucsecs, Tohán (Deubel).

var. **Griesbachi** Steph. Hammersdorf, Hátszeg, Retjezat, Schässburg, Ratosnya, Borszék (c. a.).

pisi F. Rotenturm, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

aestimatum Faust. Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

- punctigerum** Payk. Gross-Scheuern, Kronstadt, Mediasch (Bielz); Rotenturm, Schässburg, Reps, Dees (c. a.); Hát-szeg (Deubel).
- aethiops** Herbst. Hermannstadt, Fogarasz (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- immune** Kirby. Keisd (Deubel).
- pavidum** Germ. Hátzeg (Bielz); Zalatna, Kronstadt, Schässburg, Nagyenyed (c. a.).
A. **striatum** Kirby ist durch Irrtum in unser Verzeichnis gekommen und daher zu streichen.
- ervi** Kirby. Hátzeg, Gross-Scheuern, Előpatak (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Thordauer Schlucht (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).
- simile** Kirby. Retjezat (c. a.).
- melancholicum** Wenck. Kronstadt (Deubel).
- ononis** Kirby. Marpod (Bielz); Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gyögy (Ormay).
Nussbach und Előpatak sind als Fundorte des A. ononis zu streichen.
- elegantulum** Germ. Hátzeg, Gross-Scheuern, Előpatak, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Zalatna, Borszék (c. a.); Kronstadt, Tóhán (Deubel).
- astragali** Payk. (saeculare Gozis). Hátzeg, Gross-Scheuern (Bielz); Hermannstadt, Hammersdorf (Ormay); Előpatak (c. a.); Örkény (Zellich, Deubel).
- virens** Herbst. Hátzeg, Porcesst, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Előpatak, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Balánbánya, Reps, Ratosnya, Borszék, Rodnagerbirge (c. a.).
- tenuis** Kirby. Hermannstadt, Gross-Scheuern (Bielz); Hátzeg, Bükszád, Kronstadt, Schässburg, Előpatak (c. a.).
- meliloti** Kirby. Marpod, Reps (Bielz); Hermannstadt, Schässburg, Oláhfalú (c. a.).
- loti** Kirby (angustatum Kirby). Hermannstadt, Előpatak (Bielz); Hátzeg, Nussbach, Schässburg (c. a.); Kronstadt, Alsó-Rákos, Nagy-Hagymás, Rotenturm (Deubel).
- columbinum** Germ. Hátzeg, Gross-Scheuern, Fogarasz, Mediasch, Schässburg, Oláhfalú (Bielz); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).
- punctirostre** Gyll. (Schmidt Bach.). Hátzeg (Bielz).
- reflexum** Gyll. (livescerum Gyll.). Reys (Bielz); Hermannstadt (c. a.).

Rhynchitinae.

1038. *Auletes* Schönh.

- basilaris** Gyll. Gross-Scheuern, Kerzer Gebirge (Bielz); Hermannstadt (Ormay).

1039. *Rhynchites* Schönh.

(Deporaus.)

- betulae** L. Götzenberg, Holzmengen, Gross-Schenk, Léviz, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz); Stolzenburg, Rotenturm (Ormay, auf Gesträuch in lebenden Hecken, an Waldrändern, auf Waldblossen und in Holzschlägen).

- Mannerheimi** Hummel (megacephalus Germ.). Hermannstadt (Bielz).

Schässburg war irrthümlich als Fundort dieser Art angegeben, doch ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich noch wird auffinden lassen.

(Pselaphorhynchites.)

- nanus** Payk. (planirostris F.). Gross-Scheuern, Neppendorf, Hammersdorf, Neudorf b. H., Michelsberg, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Bükszád (c. a.); Kronstadt, Rosenau (Deubel).

- tomentosus** Gyll. Schässburg, Unter-Kerz, Borszék (c. a.); Bodzaer Gebirge, Prázmár (Méhely).

(Lasiorrhynchites.)

Rh. **coeruleocephalus** Schall. (cyanocephalus Herbst) ist in unser Verzeichnis irrthümlich hineingekommen. Da sich die Art in den Nordkarpathen findet, ist ihr Vorkommen bei uns nicht ausgeschlossen.

- olivaceus** Gyll. (comatus Gyll.). Schässburg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

- cavifrons** Gyll. (pubescens Herbst.). Gross-Scheuern, Marpod, Sächs.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Schässburg (Wieleberg, c. a.); Hátzeg, Alsó-Rákos (Deubel).

- sericeus** Herbst. Déva, S.-Regen, Schässburg (Bielz); Stolzenburg (Ormay); Hátzeg (c. a.).

(Coenorrhinus.)

- germanicus** Herbst. Hátzeg, Déva, Gross-Scheuern, Girelsau (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- aenooirens** Marsh. Hátzeg, Gross-Scheuern, Schässburg, Dees (Bielz); Hermannstadt (Ormay, c. a.); Baassen (c. a.); Kronstadt (Deubel).

- interpunctatus** Steph. (Alliariae Seidl.). Gross-Schenk, Marpod, Sächs.-Regen (Bielz); Hermannstadt, Salzburg, Szamosújvár (Ormay).

- pauillus** Germ. Hermannstadt, Neudorf b. H., Schässburg, S.-Regen, Záh (Bielz); Hammersdorf, Kronstadt (Deubel). (Ein Schädling, namentlich auf Apfelbäumen, sticht junge Triebe ab).

- aequatus** L. (purpureus Goeze). Hátzeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Schässburg, Sächs.-Regen, Gyögy (Bielz); Klausenburg (c. a.); Alsó-Rákos (Deubel).

(Invalvulus.)

aethiops Bach. Hermannstadt, Reys (Seidlitz, 1864); Kronstadt (Zinne, Deubel); Schässburg (c. a.).

cupreus L. Neudorf, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Hätzeg (c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

coeruleus Degér (conicus Gyll.). Gross-Scheuern, Kronstadt, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Stolzenburg (Ormay).

pubescens F. (parellinus Gyll.). Rothberg (Bielz); Honigberg (Altfluss, Deubel).

(Merhynchites.)

hungaricus Herbst. Klausenburg (Bielz).

(Rhynchites s. str.)

auratus Scop. Hätzeg, Neppendorf, Gross-Scheuern, Unter-Kerz, Kronstadt, Mediasch, Dees (Bielz); Klausenburg, Nagyenyed, Schässburg (c. a.).

versicolor Costa. Mező, Záh (Deubel).

Bacchus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch, S.-Regen, Klausenburg (Bielz); Stolzenburg, Nagylak (Unterweissenburger Komitat), Szamosujvár (Ormay); Hätzeg, Schässburg, Szováta (c. a.); Várhegy (Deubel).

1040. *Byctiseus* Thomson.

(Rhinomacer Geoffroy)

populi L. Hermannstadt, Hammersdorf, Reys, Kronstadt, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Schässburg (c. a.).

betulae L. (alni Müll., betuleti F.). Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Dees (Bielz). Rehenstecher, sticht die Blätter von Reben und Birnbäumchen an und rollt die Eier in dieselben ein.

1041. *Attelabus* Linné.

(Cyphus Thunberg.)

nitens Scop. (curculionoides L.). Hätzeg, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf b. H., Girelsau, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Oláhfalú (Bielz); Magyar-Bükkös (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Schässburg (c. a.).

1042. *Apoderus* Oliv.

(Attelabus auct.)

coryli L. Durch das ganze Gebiet verbreitet auf Gesträuch.

a. **collaris** Scop. Kronstadt (Pojana, Méhely).

erythropterus Zschach. Kerzer Gebirge, Fogarasch, Oláhfalú, Oláh-Laposbánya (Bielz).

LXXIII. Nemonychidae.

1043. *Nemonyx* Redtenb.

lepturoides F. Klausenburg (Bielz); Klausenburg (von Sumpfpflanzen geküschert, Juli, c. a.); Gyeke (Méhely).

1044. *Rhinomacer* Fabricius.

(Cimberis Gozis.)

attelaboides F. Kerzer Gebirge (Bielz); Rodnagelbirge (Deubel); Borszék (c. a.).

LXXIV. Ipididae.

Eccoptogastrini.

1045. *Eccoptogaster* Herbst.

(Scolytus auct.)

scolytus F. (Ratzeburgi Seidl., Geoffroyi Goeze.). Kronstadt (Bielz); Schässburg (Mai, am Stamme einer abgestorbenen Ulme in grosser Anzahl, c. a.).

laevis Chap. Baassen (11. Juni, c. a.); Kronstadt (Zinne, Deubel).

pygmaeus F. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Kronstadt, Bodzaer Pass (Bielz). Soll auf Aesten der Ulme hausen.

mali Bechst. (pruni Ratzeb.). Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hammersdorf, Neudorf, Fogarasch, S.-Regen (Bielz); Bistritz, S.-Regen (Müller).

carpini Ratzeburg. Schässburg, Klausenburg (in der Rinde gefällter Hainbuchenstämme, Bielz); Káisd, Kronstadt (Zinne, Deubel).

intricatus Ratzeb. Hermannstadt, Neppendorf (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

rugulosus Ratzeburg. Hätzeg, Hermannstadt, Holzmengen, Hosszufalu, Sächs.-Regen (Bielz); Schässburg (gefällter Stamm eines Apfelbaumes, c. a.).

multistriatus Marsh. Hermannstadt, Schässburg (Bielz); Unter-Kerz (c. a.).

Hylesnini.

1046. *Phloeophthorus* Wollaston.

rhododactylus Marsh. (spartii Nördl.). Kerzer Gebirge (Bielz).

1047. *Phthorophloeus* Rey.

spinulosus Rey. Retjezat, Kronstadt (c. a.); Schulergebirge, Bucsecs (Deubel).

1048. *Hylesinus Fabricius.*

- crenatus* F. Zibinsgebirge (Bielz).
oleiperda F. Karlsburg (Deubel, von Hauptmann Zellich gesammelt).
fraxini Panz. Hermannstadt, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Schässburg (21. April auf frisch abgeschnittenen Syringentangen in ausserordentlich grosser Zahl anschwärmend).

1049. *Pteleobius Reitter.*

- vittatus* F. Zibinsgebirge, Sächs.-Begen, Bistritz (Müller); Schässburg (Bielz). In der Rinde kranker und gefällter Ulmen, im Zimmer oft schon im Februar schwärmend.

1050. *Myelophilus Eichhoff.*

- piniperda* L. Talmatschel, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz).

1051. *Dendroctonus Erichs.*

- micans* Kugelann. Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Propáste (bei Zernest, Deubel).

1052. *Kissophagus Chapuis.*

- (*Xylechinus*.)
pilosus Ratzebg. Schanta (auf gefälltem Fichtenholz, Ormay); Schuler, Kronstadt (Deubel).

1053. *Polygraphus Erichs.*

- polygraphus* L. Frecker Gebirge (Serbota); Rodnagebirge (c. a.); Bistra (Ormay); Schuler, Bucsecs (Deubel).

Hylastini.

1054. *Hylastes Erichs.*

- Die Arten leben in der Rinde von Nadelhölzern.
ater Payk. Retjezat, S.-Regen, Borszék, Gyeké (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota); Schulergebirge, Balánbánya (c. a.); Erzgebirge (Müller).
cunicularius Er. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge, Kronstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Retjezat, Schässburg (c. a.); Rodnagebirge, Schuler, Nagy-Ilagymás (Deubel).
var. brunneus Er. Zibinsgebirge (Bielz).
angustatus Herbst. Kronstadt (Bielz).
v. attenuatus Er. Talmatschel (Bielz); Kronstadt (Deubel).
(*Hylurgops*.)
glabratus Zettel (decumanus Er.). Präse, Kronstadt (Bielz); Schuler-Gebirge, Rodnagebirge, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Kerzer Gebirge, Schanta (Ormay); Nagy-Ilagymás (Deubel).

- palliatu*s Gyll. Präse, Kronstadt, Borszék (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schulergebirge, Balánbánya (c. a.).

1055. *Crypturgus Erichs.*

- pusillus* Gyll. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Oláhfalú, Borszék (Fichtenrinde, c. a.); Marosgebirge (Müller).
cinereus Herbst. Kronstadt, Bodzaer Pass (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Rodnagebirge, Bucsecs (Deubel).

1056. *Thamnurgus Eichhoff.*

- varipes* Eichh. Rosenau, Alsó-Rákos (Deubel).

Ipini.

1057. *Cryphalus Erichs.*

- (*Cryphalus* s. str.)
piceae Ratzebg. Kerzer Gebirge (Bielz); Kronstadt (c. a.); Schuler (Deubel).
abietis Ratzebg. Zibinsgebirge (Bielz); Schuler, Bucsecs (Deubel).
saltuarius Weise. Bucsecs (Deubel).
(*Ernoporus*.)
fagi F. Schuler, Kronstadt (Zinne, Deubel).
tiliae Panz. Gross-Scheuern, Birtzhalm (Bielz); Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel); Klausenburg (Müller).
(*Trypophloeus*.)
asperatus Gyllh. Kerzer Gebirge (Bielz).
(*Hypothenemus*.)
Hampei Ferrari. Siebenbürgen (importiert).

1058. *Pityophthorus Eichhoff.*

- micrographus* L. Zibinsgebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota, c. a.); Schuler, Bucsecs (Deubel).

1059. *Pityogenes Bedel.*

- chalcographus* L. In unseren Gebirgen verbreitet.
v. sexdentatus Oliv. Kronstadt (Deubel).
bidentatus Herbst. Zibinsgebirge, Negovan, Kronstadt, Marosgebirge (Bielz).
quadridens Hartig.
v. bistridentatus Fichh. Hátszegi Geb. (Alpin, Deubel).

1060. *Ips Degeer.*
(*Tomicus* Latreille.)

- amitinus* Eichh. Kerzer Gebirge (Bielz); Schuler, Krepatura bei Zernest (Deubel).
typographus L. In unseren Gebirgen verbreitet.

laricis F. Borszék, Borgoer Pass (Bielz).
suturalis Gyll. Talmatschel (Bielz);
 Gyergyó-Tölgyes (Ormay).
curvidens Germ. Zibinsgebirge, Mediasch
 (Bielz); Borszék (c. a.).
Vcrentzowi Jakobs. Kronstadt (Deubel).

1061. *Taphrorychus Eichhoff.*

bicolor Herbst. Götzenberg, Kronstadt
 (Bielz); Hätzeg, Schässburg (c. a.);
 Rotenturm (Ormay).

1062. *Xylocleptes Ferrari.*

bispinus Duft. Gross-Scheuern, Talmatsch,
 Birthälm, Schässburg (Bielz); Michels-
 berg, Hammersdorf (Ormay); Kronstadt
 (Zinne, Deubel); Bistritz, S.-Regen
 (Müller).

1063. *Dryocoetes Eichhoff.*

autographus Ratzebg. In unseren Gebirgen
 verbreitet.
villosus F. Präsbe, Kerzer Gebirge, Kron-
 stadt (Bielz); Balánbánya, Frecker Ge-
 birge, Oláhfalú (c. a.); Klausenburg
 (Müller).
 (Limantor.)
coryli Perris. Kronstadt (Zinne, Deubel).

1064. *Xyleborus Eichhoff.*

eurygraphus Ratzebg. Kronstadt (Méhely).
Saxesenii Ratzebg. Gross-Scheuern, Ham-
 mersdorf, Holzmuengen, Poresest, Kron-
 stadt, Schässburg (vom Nussbaum,
 Bielz); Alsó-Rákos, Rosenau (Deubel);
 S.-Regen (unter Rotbuchenrinde, Mül-
 ler).
dryographus Ratzebg. Schässburg (c. a.);
 Rosenau, Neustadt (Deubel).
monographus F. Hermannstadt, Neudorf b.
 H., Brenndorf, Marosgebirge (Bielz);
 Retjezat, Schässburg, Oláhfalú (c. a.);
 Honigberg (Deubel); Klausenburg, S.-
 Regen (Müller).
 (Anisandrus.)
dispar F. Talmatschel, Marosgeb. (Bielz);
 Hammersdorf, Schässburg, Grossalisch
 bei Sch., Karlsburg (c. a.); Kronstadt
 (Zinne, Deubel); Bistritz (Müller).

1065. *Xyloterus Erichs.*

(Trypodendron Stephens. pars.)

domesticus L. Retjezat, Zibins-Gebirge,
 Kerzer Gebirge, Kronstadt, Sächs.-
 Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay);
 Retjezat, Schässburg (c. a.); Zernest,
 Schuler (Deubel).
signatus F. Hätzeg (Bielz); Hermann-
 stadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).

lineatus Oliv. Hätzeg, Retjezat, Hermann-
 stadt, Zood, Präsbe, Kerzer Gebirge
 (Bielz); Frecker Gebirge (Serbota),
 Schässburg, Balánbánya, Borszék,
 Schulergebirge, Rodnagebirge (c. a.);
 Kronstadt (Deubel); Bistritz (Müller).
v. melanocephalus Eichh. Kronstadt, Zer-
 nest, Schuler (Deubel).

Platyplui.

1066. *Platypus Herbst.*

cylindrus F. Hätzeg, Petrozsény, Hermann-
 stadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Brenn-
 dorf, S.-Regen, Csákgörbő (Salamon,
 Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Ro-
 tenturm, Schässburg (im Holze ab-
 sterbender Eichen, c. a.).

Lamellicornia.

LXXV. Lucanidae.

Lucanini.

1067. *Lucanus L.*

cervus L. Durch das ganze Berg- und
 Hügelland, wo Eichenwälder vorhanden
 sind.

Die Larve, welche im Mulme alter Eichen
 lebt, macht sich einen Cocons von Eigrösse
 aus lehmiger Erde, in welchem sie sich verpuppt.
v. capreolus Fuessl. Zusammen mit der
 Stammform.

1068. *Dorcus.*

parallelepipedus Mac. Leay. Durch das ganze
 Gebiet im Mulme alter Bäume und
 Baumstümpfe, auch in vermodernem
 altem Holz.

1069. *Systenocerus Weise.* (*Platycerus* auct.)

caraboides L. In Eichen- und Buchen-
 wäldern durch das ganze Gebiet.
v. rufipes Herbst. Zusammen mit der
 Stammform.

Sinodendriini.

1070. *Ceruchus Mac. Leay.*

chrysomelinus Hochw. Kerzer Gebirge,
 Kronstadt, Hosszufalu, Bodzaer Pass,
 Görgényer Gebirge, Marosgeb. (Bielz);
 Rodnagebirge, Bucsecs, Borszék (c. a.);
 Negoj (Albrecht); Marosgebirge (Mül-
 ler).

1071. *Sinodendron Hellwig.*

cylindricum L. Durch das ganze Gebiet,
 namentlich in den Buchenwäldern der
 Gebirge in mulmigem Rotbuchenholz.

Aesallni.**1072. AesaIus Fabr.**

scarabaeoides Panz. Hermannstadt, Götzenberg, Kronstadt, Schässburg, Marosgebirge, S.-Regen (Bielz); Rotenturm (Ormay). Im muhnigen Holze alter Eichen.

LXXVI. Scarabaeidae.**Troginae.****1073. Trox Fabr.**

Die Arten leben unter verwesenden Tierstoffen.

sabulosus L. Hermannstadt, Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.).

hispidus Laichart. Hátszeg, Hermannstadt, Mediasch, Schässburg, Záh (Bielz); Hammersdorf (Ormay).

scaber L. Hátszeg, Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, Schässburg, Gycke, Záh (Bielz); Klausenburg, Thor-daer Schlucht (c. a.).

Coprophagi.**Aphodilni.****Psammobllna.****1074. Prammobius Heer.**

sulcicollis Illig. Hátszeg, Törzburger Pass, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Karlsburg (c. a.); Honigberg (Altfluss, Deubel). Ich sammelte die Art in Schässburg am Kokelufer in feuchtem Sande).

laevipennis Costa. Schässburg (einmal im Fluge gefangen, c. a.); Honigberg (Deubel).

1075. Rhyssemus Mulsant.

asper F. (germanus auct.). Hátszeg, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Héviz, S.-Regen, Dees (Bielz); Kalán, Unterkerz, Schässburg (Kokelufer im Gemiste, Fuchsloch. Wietenberg unter Laub); Kronstadt (Deubel).

1076. Diastictus Mulsant.

vulneratus Sturm. Hermannstadt, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf (c. a.); Rosenau (Deubel).

1077. Pleurophorus Mulsant.

caesus Panz. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Platytomus.)

sabulosus Muls. Gross-Schenk, S.-Regen (Bielz).

Aphodilina.**1078. Oxyomus Laporte.**

silvestris L. Durch das ganze Gebiet in verwesenden Tier- und Pflanzenstoffen, auch in Exkrementen.

1079. Aphodius Illiger.

Die Arten leben in tierischen Excrementen.

(Copriformus.)

scrutator Herbst. In den Gebirgen und im Bergland verbreitet.

(Colobopterius.)

erraticus L. Hátszeg, Hermannstadt, Neudorf b. H., Kronstadt, Mediasch, Olábfalu (Bielz); Hammersdorf, Nagyenyed (Ormay); Malomviz, Schässburg, Csukás, Halvelagen b. Sch., c. a.).

(Eupleurus.)

subterraneus L. Neudorf b. H., Persány, Kronstadt, Mediasch, Sächsisch-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Karlsburg, Schässburg, Marosujvár, Kerzer Gebirge (c. a.); Alsó-Rákös (Deubel).

(Teuchestes.)

fossor L. Im Berg- und Hügelland verbreitet.

a. sylvaticus Ahr. Paringulgebirge (Deubel).

(Otophorus.)

haemorrhoidalis L. Neudorf, Mediasch, Reps, Olábfalu, Dees (Bielz); Nagyenyed, Intra-Gáld (Unterweissenburger Komitat, Ormay); Előpatak (c. a.); Bistritz, S.-Regen (Müller).

a. sanguinolentus Herbst. Krepatura, Schuler (Deubel).

(Amoecius.)

brevis Er. Hammersdorf, Talmatsch, Gycke (Bielz); Hermannstadt, Kakova (Ormay); Kronstadt (c. a.); Klausenburg (Müller).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu streichen.

(Aphodius.)

conjugatus Panz. Déva, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Thalheim, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Kronstadt (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg (c. a.); Krizba (Deubel).

foetens F. Hermannstadt, Hammersdorf, Kronstadt, Tartlau (Bielz); Kerzer Gebirge, Rodnagebirge (c. a.).

timetarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Loraspis.)

suleatus F. Hátszeg, Rotenturm (Bielz).

(Calamosternus.)

granarius L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

(Bodilms.)

sordidus F. Baróth (Méhely).

rufus Moll. Kerzer Gebirge, Mediasch, Hargita, Kelemengebirge, S.-Regen (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Klausenburg, Kronstadt, Malomviz, Paringul (c. a.); Zernest (Deubel).

nitidulus F. Hermannstadt, Sächs.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Schässburg (c. a.).

immundus Creutz. Hátszeg, Hermannstadt, Marienburg b. Kr. (Bielz); Marosujvár, Schässburg (c. a.).

(Agrilinus.)

gibbus Germ. (transsylvanicus Küst.). In unseren Gebirgen verbreitet.

ater Deg. Gross-Scheuern, Neudorf b. H., Gross-Schenk, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Schanta, Remete (b. Nagyenyed, Ormay); Kronstadt (Deubel).

Schässburg ist als Fundort dieser Art zu streichen.

constans Duftsch. Déva, Erzgebirge (Vormága, Bielz); Szováta (c. a.).

putridus Herbst. Hermannstadt (Bielz); Ratosnya (c. a.).

(Oromus.)

alpinus Scop. Zibins-Gebirge, Surul, Fogarascher, Kerzer, Arpascher Gebirge, Bucsecs (Bielz); Paringul-, Rodnagerbirge, Retjezat, Frecker Gebirge (Serbota, c. a.).

corvinus Er. Bucsecs (Deubel).

(Nialus.)

lividus Oliv. Hátszeg, Hammersdorf, Girelsau, Hosszufalu (Bielz); Bistra, Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

Sturmi Harold. Zibinsgebirge, S.-Regen (Bielz).

variatus Duft. (bimaculatus F.). Hátszeg, Ober-Sebes, Kronstadt, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Bistra, Schässburg, Marosujvár, Oláhfalú (c. a.); Hermannstadt, Hammersdorf, Szamosujvár (Ormay); Dees (Deubel).

a. **ambiguus** Muls. Alsó-Rákös, Kronstadt (Deubel).

plagiatus L. Zibins-Gebirge (Bielz); Petrosény (c. a.); Schuler (Deubel).

niger Panz. Hátszeg, Neudorf b. H., Kerzer Gebirge, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch (Bielz).

(Plagiogonus.)

Kronstadt, Schässburg (c. a.).

rhododactylus Marsh. (arenarius Oliv.).

(Esimus.)

merdarius F. Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt (Bielz); Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Schuler (Deubel).

(Trichonolus.)

scrofa F. Mediasch (Bielz).

(Orodalus.)

tristis Panz. Zibinsgebirge (Bielz); Schässburg, Pilis (bei Nagyenyed), Karlsburg (c. a.); Gyergyó-Tölgyes (Ormay).

pusillus Herbst. Ober-Sebes, Mediasch, Gyeke, Záh (Bielz); Hermannstadt, Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Kronstadt (Deubel); Szováta (c. a.).

v. **rufulus** Muls. Kronstadt, Schuler (Deubel).

quadriguttatus Herbst. Ober-Sebes (Bielz); Marosujvár (c. a.).

quadrinaculatus L. Rotenturm, Ober-Sebes, Marktschelken (Bielz).

biguttatus Germ. Hermannstadt, S.-Regen (Bielz).

(Amidorus.)

obscurus F. Kerzer Gebirge, Bucsecs (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Paringul, Balánbánya (c. a.); Schuler, Bodzaer Gebirge (Deubel).

thermicola Er. Neudorf b. H. (Bielz).

porcus F. Thalheim, Mediasch (Bielz).

(Volinus.)

pictus Sturm. Rotenturm (Bielz, c. a.); Kronstadt (Méhely).

sticticus Panz. Neudorf, Holzmengen, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay); Hermannstadt, Schässburg (c. a.); Hammersdorf, Keisd, Kronstadt (Deubel).

melanostictus Schmidt. Neudorf b. H., Tömöser Pass, Predal (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Hammersdorf, Klausenburg, Karlsburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

inquinatus Herbst. Im Berg- und Hügelland verbreitet.

tessulatus Payk. Neudorf b. H. (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Kronstadt, Schässburg (c. a.); Rotenturm (Deubel).

(Nimbis.)

obliteratus Panz. Hermannstadt, Neudorf b. H., Mediasch (Bielz).

(Melinopterus.)

prodromus Brahm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

punctatosulcatus Sturm. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

consputus Creutz. Mediasch (Bielz); Rotenturm (c. a.).

serotinus Panz. Hátszeg, Thalheim (Bielz).

(Melaphodius.)

limbatus Germ. Siebenbürgen (Seidlitz).

(Limarius.)

maculatus Sturm. Zibinsgebirge, Sterpu (Dealu negru), Kerzer Gebirge, Kelemengebirge (Bielz); Retjezat (c. a.).

(Agolius.)

mixtus Villa. Kerzer Gebirge, Porumbacher Gebirge, Präsbe (Ormay); Retjezat, Paringul, Frecker Gebirge (Serbota), Rodnagerbirge (c. a.); Schuler, Bucsecs (Deubel).

(Biralus.)

montanus Er. (Deuteli Reiter). Schulergebirge (Deubel).

(Acrossus.)

satellitius Herbst. Reys, Marienburg bei Kr., Bistritz (Bielz); Marosujvár (c. a.).**rufipes** L. Im Gebirge und im Bergland verbreitet.**luridus** F. Im Berg- und Hügelland verbreitet.a. **nigripes** F. Kronstadt (Ziune, Méhely); Marosujvár (c. a.).a. **variegatus** Herbst. Klausenburg, Pilis, Marosujvár (c. a.).**depressus** Kugel. Surul, Zibinsgebirge, Hermannstadt, Gr.-Scheuern, Fogarascher Gebirge, Kerzer Gebirge (Bielz); Paringulgebirge (c. a.); Rosenau (Deubel); Marosgebirge (Müller).a. **atramentarius** Er. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

1080. *Heptaulacus Mulsant.*

villosus Gyll. Kronstadt (Deubel).**sus** Herbst. Zood (Bielz).

Aegialini.

1081. *Aegialia Latreille.*

(Psammoporus.)

sabuleti Payk. Bucsecs (Deubel).

Hybosorini.

1082. *Ochodaenus Serville.*

chrysomeloides Schrank. Schässburg (c. a.).

Geotrupini.

1083. *Bolboceras Kirby.*

unicorna Schrank. Nagyág, Mediasch (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Schässburg (c. a.); Bistritz (Müller).

1084. *Odontaeus Klug.*

armiger Scop. Mediasch (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg (Fuchsloch, bei Sonnenuntergang schwärmend, 30. Juni), Wench (August, Sepsiköröspatak (von Direktor Both gesammelt, c. a.); Kronstadt (Méhely); Kaisd, Kronstadt, Bodzaer Gebirge, Zernest (Deubel); Bistritz, Sachs.-Regen (Müller).

Die Tiere, welche im Juni schwärmend gesammelt wurden, sind ganz rötlichgelb gefärbt, während das im August gesammelte, ebenso das aus Sepsiköröspatak stammende Thier ganz schwarz ist.

1085. *Geotrupes Latreille.*

Die Tiere leben im Dünger, schwärmen nach Sonnenuntergang.

mutator Marsh. Hammersdorf, Héviz, Kronstadt, Tarlau (Bielz); Hermannstadt, Talmesch (Ormay); Schässburg (c. a.).**spiniger** Marsh. Kronstadt (Bielz); Schässburg, Karlsburg (c. a.); Hermannstadt (Albrecht).**stercorarius** Scriba. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

(Anoplotrupes.)

stercorosus Scriba (silvaticus Panz.). Durch das ganze Gebiet verbreitet, namentlich in Gebirgswäldern.

(Trypocopsis.)

vernalis L. Retjezal, Hermannstadt, Grützenberg, Kronstadt, Mediasch, Marosgebirge, Bistritz (Bielz); Poplaka, Remele (b. Nagyenyed), Gyergyó-Tölgyes (Ormay); Klausenburg, Hiedg-szamos, Balánbánya (c. a.).Nach Bielz soll auch *G. alpinus* Hagenb. auf dem Kerzer Gebirge, Bucsecs, Schulergeb., Tömöcher Pass und Piatra mare vorkommen, was mir nicht wahrscheinlich vorkommt; vielleicht ist der Irrtum durch die geringe Grösse des an diesen Lokalitäten vorkommenden *G. vernalis* veranlasst worden. Jedenfalls ist eine Feststellung notwendig.a. **autumnalis** Heer. Kronstadt, Tömöcher Pass, Bodzaer Pass, Hargita, Csiker Gebirge, Nagyhagymás (Bielz).

Coprini.

1086. *Scarabaeus Linné.*

pius Illig. Oláh-Laposhánya (Bielz).

1087. *Gymnopleurus Illiger.*

Mopsus Pall. (Geoffroyi Fucssl.). Hátszeg, Déva, Gross-Scheuern (Bielz); Elisabethstadt (Ormay); Hahnbach (Albrecht).**Sturmi** Mac Leay. Kronstadt (Bielz); Puj (b. Hátszeg, c. a.).

1088. *Sisyphus Latreille.*

Schaefferi L. Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Mediasch, Záh (Bielz); Szamosujvár (Ormay); Klausenburg (c. a.).

1089. *Oniticellus Latreille.*

fulvus Goeze (flavipes F.). Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

1090. *Onthophagus Latreille.*

Die Arten leben in tierischen Excrementen.

Amyntas Oliv. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Hosszufalu, S.-Regen, Dees (Bielz); Szamosujvár (Or-

may); Pilis (bei Nagyenyed), Karlsburg, Klausenburg (c. a.); Honigberg (Deubel).

taurus Schreber. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

ovatus L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

furcatus F. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern, Holzmengen, Marpod, Mezőség, S.-Regen (Bielz); Unter-Kerz (c. a.); Salzburg (Albrecht).

semicornis Panz. Hátszeg, Déva, S.-Regen (Bielz); Rotenturm, Nagyenyed (Ormay); Klausenburg (c. a.).

verticicornis Laich. Hátszeg, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Repts, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Marosujvár (c. a.).

vitulus F. (camelus F.). Hermannstadt, Schässburg, Záh (Bielz); Klausenburg (c. a.).

fracticornis Preysl. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

coenobita Herbst. Michelsberg, Götzenberg, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg (Bielz); Hermannstadt, Szamosujvár (Ormay); Klausenburg (c. a.); Bistritz (Müller).

austriacus Panz. Hermannstadt, Fogarasch, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Pilis (bei Nagyenyed, c. a.); Klausenburg (Müller).

lemur F. Hátszeg, Hammersdorf, Gross-Scheuern (Bielz); Rotenturm (Ormay); Pilis (b. Nagyenyed), Schässburg (c. a.); Kronstadt (Deubel).

vacca L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

v. **medius** Panz. Hermannstadt, Mediasch, S.-Regen, Dees (Bielz); Marosujvár (c. a.).

nuchicornis L. Dusch, Zibinsgebirge (Bielz); Intra-Gáld (Unterweissenburger Komitat, Ormay).

1091. *Caccobius* Thoms.

Schreeberi L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

1092. *Copris* Geoffroy.

lunaris L. Durch das ganze Berg- und Hügelland in Rinderdünge.

Sericinae.

Sericini.

1093. *Serica* Mac. Leay.

brunnea L. Schiellthal, Hermannstadt, Michelsberg, Rotenturm, Kronstadt, Hosszufalu, Mediasch (Bielz); Schässburg, Balánbánya, Rodnaggebirge (Hochalm, c. a.); Nagy-Ilagymás (Deubel).

1094. *Maladera* Mulsant.

holosericea Scop. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet. Ich sammelte den Käfer oft in Maulwurfshäufen.

1095. *Homaloplia* Stephens.

ruricola F. Gross-Scheuern, Kerzer Geb., Kronstadt, Hosszufalu (Bielz); Hermannstadt (Ormay); Schässburg, Ratosnya (c. a.); S.-Regen (Müller).

erythroptera Friv. (transsylvanica Bielz). Schiellthal, Déva, Reussner Teiche, Gross-Scheuern, Marpod, Szombat, Kronstadt, Schässburg (Bielz); Hátszeg (c. a.).

v. **carbonaria** Blanch. Mit der Stammform.

Melotonthinae.

1096. *Rhizotrogus* Latreille.

(Miltotrogus.)

aequinoctialis Herbst. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

vernus Germ. Kronstadt, Schässburg (Bielz); Bozdaer Gebirge (Deubel).

(Rhizotrogus s. str.)

maculicollis Villa. Talmatsch, Rotenturm (Bielz).

aestivus Oliv. Hammersdorf, Birtthalm (Bielz).

1097. *Amphimallus* Latreille.

solstitialis L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

ruficornis F. Fogarasch (Bielz).

assimilis Herbst. Déva, Götzenberg, Porcest, Kronstadt (Bielz); Präsbe, Előpatak, Rotenturm (c. a.); Bodzaer Gebirge (Deubel); Marosgebirge (Müller).

1098. *Melolontha* Fabr.

hippocastani F. Hermannstadt, Hammersdorf, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen (Bielz); Borszék (auf Sahlweide), Klausenburg (c. a.); Talmes (Landskrone), von Csiki erhalten (Deubel).

melolontha L. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet.

pectoralis Germ. S.-Regen (Bielz).

1099. *Polyphylla* Harris.

fullo L. Hátszeg, Karlsburg, Mühlbach, Reussmarkt, Hermannstadt, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen, Bistritz, Záh (Bielz); Salzburg, Nagyenyed (Ormay).

1100. *Anoxia Laporte*.

- orientalis* Kryn. Karlsburg, Hermannstadt (Bielz).
pilosa F. Klausenburg, Mediasch, Tartlau (Bielz).

Hoplinae.

1101. *Hoplia Illig.*

- praticola* Duft. Fogarasch, Mediasch, Birt-halm, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Klausenburg (c. a.).
philanthus Füssl. Zibinsgebirge (Bielz).
farinosa L. Michelsberg, Götzenberg, Krizba, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Talmesch (Ormay); Kalán, Vajda-Hunyad (c. a.); Hátszeg (Deubel).
graminicola F. Rotenturm, Mediasch, Dees (Bielz); Nagyenyed, Szamosújvár, Hermannstadt (Ormay); Kronstadt (Deubel).
hungarica Burm. Schässburg (c. a.); Kronstadt, Bucsecs (Méhely).

1102. *Anomala Samouelle*.

- aurata* F. (auricollis Lap.). Götzenberg, Präsbe, Kerzer Gebirge, Fogarascher Gebirge, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay).
aenea Degeer. Auf Weidengebüsch durch das Berg- und Hügelland verbreitet.
a. bicolor Torre. Retjezat (c. a.).
a. maculata Schilsky. Nagyenyed (c. a.).
a. cyanea Torre. Retjezat (c. a.).
oblonga F. Hermannstadt, Mediasch (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Fogarascher Gebirge, Schässburg (c. a.).
a. bicolor Schilsky. Rotenturm (c. a.).
vitis F. Kovászna (Méhely).

1103. *Phyllopertha Kirby*.

- horticola* L. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

1104. *Anisoplia Serville*.

- segetum* Herbst. Szombat, Fogarasch, Kronstadt (Bielz).
agricola Poda (villosa Geoffr.). Gross-Scheuern, Mediasch (Bielz); Hátszeg, Rosenau (Deubel); S.-Regen (Müller).
bromicola Germ. Kerzer Gebirge, Gyeke, Záh (Bielz); Rotenturm (Ormay, c. a.); Retjezat (c. a., auf Roggenähren).
austriaca Herbst. Kerzer Gebirge, Szombat, S.-Regen (Bielz).
gramnivora Dufour (tempestiva Er.). Salzburg (Ormay).
cyathigera Scop. Hammersdorf, Gross-Scheuern, Bükszúd, S.-Regen (Bielz);

- Salzburg, Stolzenburg (Ormay); Hosszufalu (c. a.).

- lata* Er. Hosszufalu? (Bielz); Karlsburg (c. a.); Gyeke (auf Hafer, Mélély).

Ich besitze vier Exemplare aus Hosszufalu, welche aber cyathigera sind; daher erscheint mir das Vorkommen des *A. lata* in Hosszufalu fraglich.

- flavipennis* Brull. Mezöség, Gyeke (Bielz).
dispar Er. Salzburg (Ormay).

Dynastinae.

1105. *Oryctes Illig.*

- nasicornis* L.
 var. *grypus* Illig. Hátszeg, Karlsburg, Hermannstadt, Neudorf bei H., Gross-Scheuern, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Nagyenyed (Ormay); Grosspöchl (Albrecht).

1106. *Pentodon Hoppe*.

- idiota* Herbst. Bistritz, Magyar-Lapos (Bielz).

Valginae.

1107. *Valgus Scriba*.

- hemipterus* L. Durch das ganze Berg- und Hügelland, auf Blüten, aber auch nicht selten an Hausmauern.

Trichiinae.

1108. *Osmoderma Serville*.

- eremita* Scop. Hátszeg, Déva, Hermannstadt, Girelsau, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz); Orlat (Ormay).

1109. *Gnorinus Serville*.

- variabilis* L. Karlsburg, Hermannstadt, Gross-Schenk, Tartlau, Mediasch, Csiker Gebirge, S.-Regen (Bielz); Tartlau (Deubel).

- nobilis* L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

1110. *Trichius Fabr.*

- fasciatus* L. Durch das ganze Gebiet verbreitet.

- abdominalis* Mén. Götzenberg, Girelsau, Vistertal, Héviz, Kronstadt, Hosszufalu, S.-Regen (Bielz); Hammersdorf, Schanta, Kerzer Gebirge (Ormay); Illaság bei Kleinkopisch (c. a.).

Cetoniinae.

1111. *Tropinota Mulsant.*
(*Epicometis* Burmeister.)

hirta Poda. Durch das ganze Berg- und Hügelland verbreitet, namentlich auf *Leontodon taraxacum*.

1112. *Oxythyrea Mulsant.*
(*Leucoscelis* Burmeister.)

funesta Poda. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

1113. *Cetonia Fabr.*

aurata L. Durch das ganze Gebiet auf verschiedenen blühenden Pflanzen und am ausfliessenden Saft der Bäume.

1114. *Liocola Thomson.*

marmorata F. Durch das Berg- und Hügelland verbreitet.

1115. *Potosia Mulsant.*

aeruginosa Drury (*speciosissima* Scop.). Hermannstadt, Hammersdorf, Girelsau, Zood, Fogarasch, Kronstadt, Tartlau, Mediasch, Schässburg, S.-Regen (Bielz).

affinis Andersch. Karlsburg, Kronstadt (Bielz).

cuprea F. (*floricola* auct.). Hermannstadt, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, S.-Regen, Bistritz (Bielz); Salzburg, Michelsberg, Riu Szat (Ormay); Előpatak, Schässburg (c. a.).

v. *metallica* Herbst. Hátzeg, Déva, Hermannstadt, Gross-Scheuern, Girelsau, Kerzer Gebirge, Gross-Schenk, Fogarasch, Kronstadt, Hosszufalu, Tartlau, S.-Regen, Dees (Bielz); Schässburg, Oláhfalú (c. a.).

hungarica Herbst. Karlsburg, Reussner Teiche, Stolzenburg, Gross-Schenk, Tömöscher Pass, Előpatak, Klausenburg Oláhfalú, Sächs.-Regen, Klausenburg (Bielz).

Uebersicht unserer Käferfauna nach Familien, Gattungen, Arten und Varietäten.

Familien	Gat- tungen	Arten	Varie- täten	Subvarie- täten	Familien	Gat- tungen	Arten	Varie- täten	Subvarie- täten
1. Cicindelidae	1	9	1	10	39. Helodidae	8	14	3	
2. Carabidae	70	460	109	42	40. Dryopidae	7	19	2	
3. Halipilidae	2	10	1	—	41. Georyssidae	1	4	—	—
4. Dytiscidae	19	78	4	—	42. Heteroceridae	2	11	—	—
5. Gyrinidae	2	5	1	—	43. Dermestidae	9	28	1	—
6. Rhysodidae	1	2	—	—	44. Nosodendridae	1	1	—	—
7. Staphylinidae	144	852	50	8	45. Byrrhidae	11	27	3	2
8. Pselaphidae	18	72	6	—	46. Dascillidae	1	1	—	—
9. Clavigeridae	1	2	—	—	47. Elateridae	32	126	15	7
10. Scydmaenidae	9	48	1	—	48. Cerophytidae	1	1	—	—
11. Silphidae	22	66	2	1	49. Eucnemidae	7	16	1	—
12. Liodidae	10	53	6	—	50. Buprestidae	18	67	5	—
13. Clambidae	2	6	—	—	51. Lymexylidae	2	2	2	—
14. Leptinidae	1	1	—	—	52. Bostrichidae	5	5	—	—
15. Corylophidae	5	12	—	—	53. Lyctidae	1	2	—	—
16. Sphaeriidae	1	1	—	—	54. Pinidae	3	18	—	—
17. Trichopterygidae	9	25	1	—	55. Anobiidae	15	39	3	—
18. Scaphidiidae	3	7	—	—	56. Oedemeridae	7	21	—	—
19. Histeridae	15	60	3	—	57. Pythidae	5	9	—	—
20. Hydrophilidae	23	93	11	—	58. Pyrochroidae	1	3	—	—
21. Cantharidae	33	139	16	—	59. Hylophilidae	2	3	1	—
22. Cleridae	11	18	3	—	60. Anthicidae	5	20	1	—
23. Derodontidae	2	2	—	—	61. Meloidae	10	30	1	—
24. Byturidae	1	2	—	1	62. Rhipiphoridae	2	2	—	—
25. Ostomidae	5	7	—	—	63. Mordellidae	8	34	—	6
26. Sphaeritidae	1	1	—	—	64. Melandriidae	15	31	2	—
27. Nitidulidae	24	125	12	10	65. Lagriidae	2	3	—	—
28. Cucujidae	12	33	2	—	66. Alleculidae	8	19	2	4
29. Cryptophagidae	13	92	4	1	67. Tenebrionidae	28	51	—	—
30. Erotylidae	6	16	1	—	68. Cerambycidae	68	188	13	19
31. Phalacridae	3	18	2	—	69. Chrysomelidae	68	419	34	92
32. Lathridiidae	7	44	2	—	70. Lariidae	3	20	2	—
33. Mycetophagidae	5	12	2	6	71. Anthribidae	7	18	—	—
34. Sphindidae	2	3	—	—	72. Curculionidae	133	783	47	48
35. Cisidae	6	30	2	—	73. Nemonychidae	2	2	—	—
36. Colydiidae	20	29	—	—	74. Ipidae	22	57	5	—
37. Endomychidae	10	19	1	4	75. Lucanidae	6	6	2	—
38. Coccinellidae	29	63	8	52	76. Scarabaeidae	43	148	6	10
					1117	4763	402	324	

Index alphabeticus Generum.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Abacopercus . . .	31	Aleochara . . .	102	Anthophagus . . .	55	Batriscus . . .	106
Abax . . .	31	Aleuonota . . .	91	Anthracus . . .	28	Baudia . . .	24
Abdera . . .	228	Alexia . . .	178	Anthrenus . . .	192	Bembidium . . .	14
Abattaria . . .	118	Allecula . . .	231	Anthribus . . .	288	Berosus . . .	131
Abemus . . .	75	Allodactylus . . .	324	Aparopion . . .	314	Bessobia . . .	93
Abraeus . . .	129	Allosterna . . .	242	Aphidecta . . .	181	Bessopora . . .	101
Absidia . . .	139	Alophus . . .	313	Aphodius . . .	352	Betarman . . .	202
Acalles . . .	322	Alpacus . . .	10	Aplithona . . .	281	Biblopectus . . .	106
Acalyptus . . .	332	Alphitobius . . .	236	Apimela . . .	91	Biblioporus . . .	106
Acanthocinus . . .	249	Alphitophagus . . .	235	Apion . . .	339	Bidessus . . .	43
Acanthoderes . . .	249	Amalus . . .	324	Apistus . . .	176	Bisnius . . .	71
Acanthopus . . .	237	Amara . . .	29	Apoderus . . .	345	Bius . . .	237
Acentrus . . .	317	Amarochara . . .	99	Apteropoda . . .	284	Blaps . . .	233
Achenium . . .	67	Amauronyx . . .	106	Aptinus . . .	42	Blechrus . . .	40
Acidota . . .	54	Amblistomus . . .	24	Archontas . . .	196	Bledius . . .	59
Acilius . . .	48	Amblystus . . .	26	Areopagus . . .	108	Blediodes . . .	59
Aclypea . . .	117	Amoecius . . .	352	Argoptochus . . .	298	Blethisa . . .	11
Acmaeodera . . .	210	Amphichroum . . .	54	Argopus . . .	284	Blitophaga . . .	117
Acmaeops . . .	239	Amphicyllis . . .	120	Argutor . . .	33	Bolhoceras . . .	355
Acritus . . .	129	Amphimalus . . .	358	Arrhenoplita . . .	235	Boletophagus . . .	234
Acrognathus . . .	56	Amphotis . . .	150	Aromia . . .	246	Bolitobius . . .	82
Acrolocha . . .	52	Anacaena . . .	132	Arpedium . . .	54	Bolitochara . . .	90
Acrodon . . .	30	Anaesthetis . . .	251	Arthrolips . . .	123	Boopinus . . .	57
Acrulia . . .	52	Anaglyptus . . .	247	Asaphidion . . .	13	Borboropora . . .	91
Actephilus . . .	27	Anaspis . . .	226	Asemum . . .	244	Boros . . .	237
Actobius . . .	71	Anatis . . .	183	Aspidiphorus . . .	173	Bostrychus . . .	213
Acupalpus . . .	27	Anaulacaspis . . .	90	Astenus . . .	63	Bothrideres . . .	177
Acylophorus . . .	80	Anchastus . . .	202	Astilbus . . .	97	Botriopterus . . .	33
Adalia . . .	182	Anchomenus . . .	37	Astrapaeus . . .	80	Bothynoderes . . .	308
Adelocera . . .	196	Anchus . . .	38	Astynomus . . .	249	Brachida . . .	86
Adelosia . . .	32	Ancistronycha . . .	137	Atemeles . . .	98	Brachycerus . . .	308
Aderces . . .	124	Ancyrophorus . . .	56	Atheta . . .	91	Brachygluta . . .	107
Adexius . . .	314	Anemadus . . .	116	Athous . . .	205	Brachylacon	
Adimonia . . .	274	Anisarthron . . .	244	Atomaria . . .	165	(Lacon) . . .	196
Adonia . . .	181	Anisodactylus . . .	28	Attagenus . . .	191	Brachynus . . .	42
Adosomus . . .	309	Anisoplia . . .	359	Attalus . . .	143	Brachyodontus . . .	324
Adoxus . . .	263	Anisosticta . . .	181	Attelabus . . .	345	Brachypterus . . .	149
Adrastus . . .	199	Anisotoma . . .	120	Auletes . . .	343	Brachysomus . . .	302
Aegialia . . .	355	Anobium . . .	216	Aurigena . . .	208	Brachyta . . .	239
Aegosome . . .	238	Anodus . . .	76	Autalia . . .	90	Brachytarsus . . .	288
Aetophorus . . .	41	Anolisus . . .	137	Axinotarsus . . .	143	Brachyteimnus . . .	321
Aesalus . . .	351	Anomala . . .	359			Bracteon . . .	14
Agabus . . .	46	Anomatus . . .	177			Bradibatus . . .	332
Agapanthia . . .	251	Anoncodes . . .	218	Badister . . .	24	Bradycellus . . .	28
Agaricochara . . .	87	Anophthalmus . . .	21	Bagous . . .	319	Bradytus . . .	30
Agaricophagus . . .	119	Anoplopera . . .	240	Balaninus . . .	331	Bromius . . .	263
Agathidium . . .	120	Anopleta . . .	93	Balanobius . . .	331	Broscus . . .	13
Agelastica . . .	273	Anoplus . . .	334	Baptolinus . . .	70	Bruchidius . . .	287
Aglenus . . .	175	Anotylus . . .	58	Baris . . .	329	Bruchus . . .	286
Agnathus . . .	231	Anoxia . . .	359	Barynotus . . .	307	Bryaxis . . .	107
Agonum . . .	37	Anthaxia . . .	209	Baryodina . . .	103	Bryobius . . .	35
Agrius . . .	211	Anthrophagus . . .	165	Barypithes . . .	302	Bryocharis . . .	83
Agriotes . . .	199	Anthicus . . .	221	Batenus . . .	38	Bryoporus . . .	82
Agyrtes . . .	118	Anthobium . . .	51	Bathyscia . . .	114	Buprestis . . .	209
Alaobia . . .	93	Anthocomus . . .	144	Batophila . . .	280	Byctiscus . . .	345
Alconotha . . .	92	Anthonomus . . .	331	Batrisodes . . .	106	Byrrhus . . .	194

	Seite		Seite		Seite		Seite
Bythinus . . .	108	Chaetocnema . . .	278	Coprophilus . . .	56	Dapalinus . . .	316
Byturus . . .	148	Chalcoides . . .	277	Coproporus . . .	85	Dapsa . . .	179
Caccobius . . .	357	Chalcophora . . .	208	Coptocephala . . .	257	Daptus . . .	24
Caccoporus . . .	58	Charopus . . .	142	Coraeus . . .	211	Dascillus . . .	195
Caenocara . . .	217	Chatartus . . .	160	Corylophus . . .	123	Dasycerus . . .	169
Caenocorse . . .	236	Cheporus . . .	35	Corticaria . . .	170	Dasytes . . .	144
Caenoptera . . .	242	Chilocorus . . .	184	Corticarina . . .	171	Dasytiscus . . .	145
Caenoscelis . . .	165	Chiloneus . . .	301	Corticeus . . .	235	Dechomus . . .	177
Calamobius . . .	251	Chilopora . . .	99	Corticus . . .	176	Delester . . .	56
Calandra . . .	330	Chilotoma . . .	257	Corylophus . . .	123	Deltomerus . . .	22
Calathus . . .	37	Chlaenites . . .	23	Corymbites . . .	196	Demetrius . . .	41
Calitys . . .	148	Chlaenius . . .	23	Corynetes . . .	147	Demosoma . . .	101
Caliusa . . .	91	Chloridium . . .	14	Coryphiodes . . .	56	Dendrobium . . .	216
Callicerus . . .	97	Chlorophanus . . .	307	Coryssomerus . . .	329	Dendroctonus . . .	347
Callidium . . .	245	Choleva . . .	114	Cossonus . . .	321	Dendrophagus . . .	160
Callinus . . .	243	Cholerus . . .	113	Craponius . . .	324	Dendrophilus . . .	127
Callipora . . .	2	Choragus . . .	289	Cratararea . . .	102	Denops . . .	146
Callistus . . .	23	Chromoderus . . .	309	Creniphilus . . .	132	Denticollis . . .	206
Callistocarabus . . .	4	Chrysanthia . . .	218	Creophilus . . .	76	Deporaus . . .	344
Calodera . . .	99	Chrysobothris . . .	210	Crepidodera . . .	275	Dermestes . . .	190
Calopterus . . .	36	Chrysocarabus . . .	4	Criocephalus . . .	243	Derocrepis . . .	275
Calopus . . .	217	Chrysochloa . . .	268	Crioeris . . .	256	Derodontus . . .	148
Calosoma . . .	2	Chrysoschus . . .	263	Cryphalus . . .	348	Deroneetes . . .	43
Calpusa . . .	88	Chrysomela . . .	264	Cryphiphorus . . .	297	Deroplia . . .	250
Calvia . . .	184	Cicindela . . .	1	Cryptarcha . . .	157	Deropoda . . .	101
Calyptomerus . . .	122	Cicones . . .	176	Crypticus . . .	234	Deubelia . . .	100
Calytis . . .	148	Cidnorrhinus . . .	324	Cryptobium . . .	67	Deuterocharabus . . .	8
Camptorrhinus . . .	321	Cionus . . .	337	Cryptocephalus . . .	258	Dexiogyra . . .	102
Campylus . . .	206	Cis . . .	174	Cryptohypnus . . .	200	Diachromus . . .	28
Cantharis . . .	137	Cistela . . .	194	Cryptophagus . . .	162	Dialycera . . .	52
Canodis . . .	208	Clambus . . .	122	Cryptopleurum . . .	136	Dianous . . .	63
Carabus . . .	3—5	Claviger . . .	110	Cryptorrhynchus . . .	322	Diaperis . . .	234
Cardiola . . .	91	Clemmus . . .	178	Cryptotrichus . . .	36	Diastictus . . .	351
Cardiophorus . . .	201	Clemmys . . .	178	Crypturgus . . .	348	Dibolia . . .	283
Carpalimus . . .	57	Cloeocharis . . .	66	Ctenopus . . .	233	Dicerca . . .	208
Carpathobirrhulus . . .	194	Cleonus . . .	309	Ctenistes . . .	109	Diechirotrichus . . .	28
Carpathophilus . . .	8	Cleopus . . .	336	Ctesias . . .	192	Diechotrachelus . . .	313
Carphacis . . .	82	Clerus . . .	147	Cucujus . . .	160	Dictyopterus . . .	136
Carpophilus . . .	150	Clibanarius . . .	39	Curimus . . .	195	Dilacra . . .	91
Cartodera . . .	340	Clivina . . .	12	Cybister . . .	49	Dilus . . .	243
Cartodero . . .	170	Clytanthus . . .	247	Cybocephalus . . .	157	Dima . . .	196
Cassida . . .	285	Clytra . . .	257	Cychramus . . .	156	Dimetrota . . .	95
Cateretes . . .	149	Clytus . . .	246	Cychrus . . .	2	Dinaraea . . .	92
Cathartus . . .	160	Cnemidotus . . .	42	Cyclonolum . . .	134	Dinarda . . .	102
Cathusia . . .	91	Coecidula . . .	186	Cylistosoma . . .	126	Dinoderus . . .	213
Catopomorphus . . .	115	Coccinella . . .	182	Cyllodes . . .	156	Dinodes . . .	23
Catops . . .	115	Coelambus . . .	43	Cymbiodyta . . .	133	Dinopsis . . .	85
Celia . . .	30	Coeliastes . . .	324	Cymindis . . .	41	Diodesma . . .	176
Cephalotes . . .	13	Coeliodes . . .	323	Cynegetis . . .	180	Diphyllus . . .	168
Cephennium . . .	110	Coelostoma . . .	134	Cyphea . . .	88	Diplocampa . . .	18
Cerambyx . . .	213	Colaphus . . .	263	Cyphoeleonus . . .	309	Diplocoelus . . .	168
Ceranota . . .	103	Colenis . . .	119	Cyphon . . .	187	Dircaea . . .	228
Cercus . . .	149	Colobicus . . .	176	Cyphus . . .	345	Dirrhagus . . .	207
Cereyon . . .	135	Colon . . .	116	Cyrtanaspis . . .	226	Ditoma . . .	176
Ceroeoma . . .	223	Colydium . . .	175	Cyrtoclytus . . .	247	Dodecastichus . . .	289
Cerophytum . . .	207	Colymbetes . . .	48	Cyrtotylus . . .	30	Dolicaon . . .	67
Ceruchus . . .	350	Combocerus . . .	168	Cyrtoscydmus . . .	112	Dolichosoma . . .	145
Cerylon . . .	177	Conalia . . .	225	Cyrtotriplax . . .	167	Dolichus . . .	37
Cetonia . . .	361	Coniatus . . .	317	Cyrtusa . . .	120	Dolopius . . .	198
Centorrhynchidius . . .	326	Conioeleonus . . .	308	Cystoplastus . . .	120	Donacia . . .	253
Centorrhynchus . . .	326	Conosoma . . .	83	Cytilus . . .	194	Dorcadion . . .	248
Chaetarthria . . .	134	Conurus . . .	83	Dacne . . .	167	Dorcatoma . . .	217
Chaetocarabus . . .	4	Copelatus . . .	47	Dadobia . . .	97	Dorcus . . .	350
		Cophosus . . .	34	Dadopora . . .	150	Dorymerus . . .	293
		Copris . . .	37	Danaceae . . .	145	Dorytomus . . .	318
		Coprochara . . .	103			Dracica . . .	92

	Seite		Seite
Drapetes . . .	208	Eumicrus (Scyd-	
Drasterius . . .	202	maenus . . .	113
Drilus . . .	142	Eumolpus . . .	263
Drimeotus . . .	114	Eupales . . .	263
Dromius . . .	40	Euplectus . . .	104
Dropephila . . .	52	Europhilus . . .	39
Drusilla . . .	97	Eurymniusa . . .	102
Dryocoetes . . .	349	Euryporus . . .	80
Dryomorphus . . .	85	Euryptilium . . .	124
Dryophilus . . .	215	Eurythyrea . . .	209
Dryophthorus . . .	320	Euryusa . . .	89
Dryops . . .	188	Eusomus . . .	3 3
Drypta . . .	41	Eusphalerum . . .	51
Duvalius . . .	21	Eustilbus . . .	169
Dyschirius . . .	12	Eustrophus . . .	227
Dytiscus . . .	48	Euthia . . .	110
		Euthiconus . . .	110
		Euzonitis . . .	223
		Evodinus . . .	239
		Exocentrus . . .	250
		Exochomus . . .	185
Ebaeus . . .	143	Falagria . . .	90
Eccoptogaster . . .	346	Faronus . . .	104
Ediquus . . .	76	Formicomus . . .	221
Edo . . .	338	Foucartia . . .	302
Elaphrus . . .	11		
Elater . . .	203	Gabrius . . .	74
Elbidus . . .	59	Galeruca . . .	274
Eledona . . .	234	Galerucella . . .	274
Elleschus . . .	332	Gasterocerius . . .	322
Elmis . . .	189	Gastrallus . . .	215
Empleurus . . .	129	Gastroidea . . .	263
Emus . . .	76	Gastrophysa . . .	263
Encephalus . . .	86	Gaurodytes . . .	46
Endomachus . . .	180	Gauropterus . . .	70
Endophloeus . . .	176	Gaurotes . . .	239
Engis (Daene) . . .	167	Geadromicus . . .	55
Eniemus . . .	169	Georyssus . . .	189
Ennearthron . . .	175	Geostiba (Sipalia) . . .	96
Enoplopus . . .	237	Geotrupes . . .	356
Enoplurus . . .	131	Gibbium . . .	214
Entomoscelis . . .	264	Glischrochilus . . .	157
Epaphius . . .	22	Glossola . . .	92
Ephistemus . . .	167	Globicornis . . .	191
Epicometis . . .	361	Glyptomerus . . .	67
Epierus . . .	127	Gnathonus . . .	128
Epithrix . . .	277	Gnorinus . . .	360
Epomotylus . . .	58	Gnypeta . . .	91
Epuraea . . .	150	Goerius . . .	75
Eremotes . . .	321	Gonodera . . .	232
Eridaulus . . .	174	Gonioctena . . .	270
Erigenus . . .	47	Grammoptera . . .	242
Eriirrhino-		Groptodytes . . .	44
morphus . . .	316	Grophoderes . . .	48
Eriirrhinus . . .	318	Grobenia . . .	165
Ernobius . . .	215	Grynocharis . . .	149
Eros (Dietyp-		Grypoidius . . .	317
terus) . . .	136	Gymnetron . . .	335
Eryx . . .	231	Gymnopleurus . . .	356
Esolus . . .	189	Gynandroph-	
Euaesthetus . . .	63	thalma . . .	257
Eubria . . .	188	Gyrinus . . .	49
Eucinetus . . .	188	Gyrophypnus . . .	68
Eucnemis . . .	207	Gyrophaeia . . .	87
Eucninus . . .	112		
Eudectus . . .	55		
Eudipnus . . .	300		
Euglenes . . .	220		
Euluperus . . .	274		

	Seite		Seite
Habrocerus . . .	85	Hydrophilus . . .	132
Habroloma . . .	212	Hydroporus . . .	43, 44
Hadraule . . .	174	Hydrosmeeta . . .	91
Haliphus . . .	42	Hydrosmeetina . . .	91
Hallomenus . . .	227	Hydrothassa . . .	271
Haltica . . .	279	Hydrous . . .	132
Halyzia . . .	183	Hygroecia . . .	92
Hapaloderus . . .	57	Hygronoma . . .	86
Hapalaraea . . .	52	Hygrotus . . .	43
Hapalus . . .	224	Hylastes . . .	347
Haplocephala . . .	235	Hylecoetus . . .	212
Haplocnemia . . .	250	Hylesinus . . .	347
Haplocnemus . . .	45	Hyllota . . .	160
Haptoderus . . .	34	Hylobius . . .	313
Harminius . . .	205	Hylophilus . . .	220
Harpalophonius . . .	25	Hylotrupes . . .	245
Harpaloxys . . .	26	Hymenalia . . .	232
Harpalus . . .	25	Hypebaeus . . .	143
Hedobia . . .	215	Hypera . . .	315
Helichus . . .	188	Hyperaspis . . .	185
Helmis . . .	189	Hyphydrus . . .	43
Helobia . . .	10	Hypnoideus . . .	200
Helochares . . .	133	Hypnophila . . .	278
Helodes . . .	187	Hypocassida . . .	284
Helophorus . . .	129	Hypocoelus . . .	207
Helops . . .	237	Hypoelyptus . . .	85
Hemistenus . . .	62	Hypogonus . . .	198
Hendecatomo . . .	173	Hypophloeus . . .	235
Henoticus . . .	162	Hyssonothrus . . .	56
Heptaulacus . . .	355	Hypostenus . . .	62
Hermacophaga . . .	280	Hypulus . . .	229
Hesperophilus . . .	59	Hypurus (Pseudo-	
Hesperus . . .	71	phytobius, Seidl) . . .	324
Hetaerius . . .	128		
Heterhelus . . .	149	Icaris . . .	318
Heterothops . . .	80	Idalia (Adalia) . . .	182
Heterocerius . . .	190	Idochroma . . .	39
Heterostomus . . .	149	Idolus . . .	202
Hexatrichus . . .	28	Ilybius . . .	47
Hippodamia . . .	181	Ilyobates . . .	99
Hippuriphila . . .	277	Ipidia . . .	150
Hispa . . .	284	Ips . . .	348
Hispella . . .	284		
Hister . . .	126	Ischnodes . . .	202
Holobus . . .	86	Ischnoglossa . . .	102
Holopleta . . .	126	Ischnomera . . .	218
Holoparamerus . . .	172	Ischnopoda . . .	91
Homalisus . . .	136	Ischnosoma . . .	81
Homalium (Oma-		Isorhipis . . .	207
lium) . . .	53		
Homalopia . . .	358	Judolia . . .	241
Homalota . . .	88		
Homoeochara . . .	103	Kissophagus . . .	347
Homoeusa . . .	102		
Hoplia . . .	359	Labidostomis . . .	256
Hoplosia . . .	250	Laccobius . . .	133
Hygrocarabus . . .	4	Laccophilus . . .	46
Hydaticus . . .	48	Lachnaea . . .	257
Hydnobius . . .	118	Lachnaeus . . .	312
Hydraena . . .	131	Lacom (Adelocera) . . .	196
Hydrobius . . .	132	Laemophloeus . . .	161
Hydrochara (Hy-		Laemostenus . . .	36
drophilus) . . .	132	Laemosthenes . . .	36
Hydrochus . . .	130	Laena . . .	237
Hydrocyphon . . .	187	Lagarus . . .	32
Hydronomus . . .	320	Lagelandia . . .	177
		Lagria . . .	231

	Seite		Seite		Seite		Seite
Lania . . .	248	Lithocharis . . .	65	Miarus . . .	336	Neorescius . . .	24
Lamprias . . .	39	Lixus . . .	309	Micetotrogus . . .	333	Nephanes . . .	124
Lamprinodes . . .	83	Lobrathium . . .	66	Micilus . . .	190	Nephus . . .	186
Lamprinus . . .	83	Lochinacea . . .	274	Micrambe . . .	162	Nestus . . .	60
Lamprorhiza . . .	137	Lomechusa . . .	98	Micraspis . . .	183	Neuraphes . . .	111
Lamprosoma . . .	262	Longitarsus . . .	282	Microcara . . .	187	Niphethodes . . .	56
Lampyrus . . .	137	Lopha . . .	17	Microderes . . .	27	Niptus . . .	214
Langelandia . . .	177	Loricera (Luro- cera) . . .	12	Migrogloosa . . .	102	Nitidula . . .	152
Larcynia . . .	189	Lorocera . . .	12	Microlestes . . .	40	Nivellia . . .	240
Laria . . .	286	Lucanus . . .	350	Micropeplus . . .	50	Nosodendron . . .	193
Laricobius . . .	148	Luciola . . .	137	Microsaurus . . .	77	Nosodes . . .	148
Larinus . . .	310	Ludius . . .	199	Microtherium . . .	111	Nossidium . . .	123
Lasia (Subcoeci- nella) . . .	180	Luperus . . .	273	Microzoum . . .	234	Notaphus . . .	15
Lasioderma . . .	217	Lycoperdina . . .	179	Micrurula . . .	152	Notaris . . .	318
Lasioharpalus . . .	26	Lyctus . . .	213	Minota . . .	278	Noterus . . .	44
Latelmis . . .	189	Lydus . . .	223	Minyops . . .	312	Notiophilus . . .	11
Lathridius . . .	69	Lygistopterus . . .	137	Mniobates . . .	99	Notothecta . . .	97
Lathrinacum . . .	54	Lymexylon . . .	212	Mniophila . . .	284	Notoxus . . .	221
Lathrobium . . .	66	Lyperosomus . . .	3	Mniusa . . .	100	Nudobius . . .	70
Lathropus 361, 362	362	Lyprus (Bagous) . . .	319	Molops . . .	31		
Lebia . . .	39	Lythraia . . .	277	Molorehus . . .	242	Oberea . . .	253
Leiestes . . .	179	Lytha . . .	223	Molytes . . .	313	Obrium . . .	243
Leiosoma . . .	314			Monochamus . . .	249	Ocalea . . .	100
Leirides . . .	30	Magdalis . . .	338	Mononychus . . .	323	Ochina . . .	217
Leistidius . . .	10	Malachius . . .	143	Monotoma . . .	159	Ochodacus . . .	355
Leistotrophus . . .	76	Maladera . . .	358	Montandonia . . .	190	Ochthebius . . .	130
Leistus . . .	9	Malchinus . . .	141	Mordella . . .	225	Ochthenomus . . .	222
Lema . . .	255	Malthinus . . .	141	Mordellistena . . .	225	Ochthephilus (Perileptus) . . .	19
Leptacinus . . .	68	Malthodes . . .	141	Morinus . . .	248		
Leptinus . . .	122	Mantura . . .	278	Morphocarabus . . .	6	Octowennus . . .	175
Leptomastax . . .	113	Marmaropus . . .	325	Morychus . . .	193	Ocybus . . .	76
Leptura . . .	240	Marolia . . .	230	Mycetaea . . .	179	Ocyusa . . .	100
Leptusa . . .	88	Mecaspis . . .	309	Mycetina . . .	179	Odacantha . . .	41
Lepyus . . .	308	Mecanotarsus . . .	221	Mycetochara . . .	232	Odontaeus . . .	355
Lesteva . . .	54	Mecinus . . .	335	Mycetodrepa . . .	101	Oecoeptoma . . .	117
Leucocelis (Oxy- thraea) . . .	361	Medon . . .	66	Mycetophagus . . .	172	Oedemera . . .	218
Leucoparyphus . . .	85	Megacronus (Brio- charis) . . .	83	Mycetoporos . . .	81	Olibrus . . .	168
Leucosomus . . .	308	Megalodorus . . .	110	Mycterus . . .	220	Oligomerus . . .	216
Licinus . . .	24	Megalopenthes . . .	202	Mielophilus . . .	347	Oligota . . .	86
Lichenium . . .	234	Megarthus . . .	50	Mylabris . . .	286	Olisthaerus (Stilbus) . . .	169
Liesthes . . .	179	Megasternum . . .	136	Mylacus . . .	298	Olistherus . . .	50
Lignyodes . . .	333	Megatoma . . .	191	Myllaena . . .	86	Olisthopus . . .	37
Limnebius . . .	134	Megodontus . . .	3	Myrmecoxenus . . .	177	Olophrum . . .	54
Limnichus . . .	193	Melandrya . . .	230	Myrmecodia . . .	98	Omalium . . .	53
Limnobaris . . .	330	Melaninon . . .	234	Myrmoeccia . . .	98	Omaseus . . .	33
Limnocarabus . . .	5	Melanophila . . .	209	Myrrha . . .	184	Omasia . . .	303
Limnoxenus . . .	132	Melanophthalma . . .	171	Mysia . . .	183	Omglymnus . . .	49
Limobius . . .	317	Melanotus . . .	201	Nacerda . . .	218	Omophilus . . .	233
Limodromus . . .	38	Melasia . . .	236	Nalassus . . .	237	Omophron . . .	10
Limonus . . .	204	Melasis . . .	207	Nanophyes . . .	338	Omosiphora . . .	152
Limoxenus . . .	132	Melasoma . . .	272	Napochus . . .	112	Omosita . . .	152
Lina . . .	272	Melous . . .	313	Nargus . . .	114	Oncomera . . .	218
Liocola . . .	361	Meligethes . . .	153	Nebria . . .	10	Oniticellus . . .	356
Liodes . . .	119	Meloe . . .	222	Necrobia . . .	147	Ontholestes . . .	76
Lionychus . . .	40	Melolontha . . .	358	Necrodes . . .	117	Onthophagus . . .	356
Liophloeus . . .	305	Menophilus . . .	236	Necrophilus . . .	118	Onthophilus . . .	129
Liophterus . . .	47	Menesia . . .	252	Necrophorus . . .	117	Oodes . . .	23
Liopus . . .	250	Mesagroicus . . .	303	Necydalis . . .	242	Oospaerula . . .	119
Liosoma . . .	314	Mesosa . . .	250	Neja . . .	14	Ootypus . . .	166
Liotrichus (Haplo- tarsus) . . .	198	Metaxya . . .	92	Nemadus . . .	116	Opatrum . . .	234
Liparus . . .	313	Metopsia . . .	50	Nemosoma . . .	148	Opatroides . . .	234
Lissodema . . .	219	Metabletus . . .	40	Nemonyx . . .	346	Opetiopalpus . . .	147
Litargus . . .	173	Metallina . . .	14	Neobisnius . . .	71	Ophonus . . .	24
		Metococcus . . .	224	Neodreodion . . .	247	Opilo . . .	146
				Neoplinthus . . .	314	Orchesia . . .	227

	Seite		Seite
Orchestes . . .	334	Percosia . . .	31
Orectochilus . . .	49	Perileptus . . .	19
Oreobius . . .	9	Periphus . . .	15
Oreodytes . . .	43	Peritelus . . .	298
Oreophilus . . .	35	Perotis . . .	208
Oreostiba . . .	92	Petrophilus . . .	35
Orestia . . .	277	Phaedon . . .	271
Orina . . .	268	Phaenops . . .	209
Orinocarabus . . .	8	Phaganthus . . .	55
Orithales . . .	198	Phalacrus . . .	168
Orites . . .	34	Phausis . . .	137
Orobitis . . .	330	Phelates . . .	204
Orophius . . .	175	Philochthus . . .	18
Orphilus . . .	192	Philonthus . . .	71
Orsodacne . . .	251	Philorinum . . .	54
Orthocerus . . .	176	Philydrus . . .	133
Orthochaetes . . .	320	Phloeobium . . .	50
Orthoperus . . .	123	Phlococharis . . .	50
Orthopleura . . .	147	Phloeodroma . . .	99
Oryctes . . .	360	Phloeonomus . . .	53
Osmoderma . . .	360	Phloeopara . . .	99
Ospya . . .	231	Phloeophthorus . . .	346
Ostoma . . .	148	Phloeostiba . . .	53
Othius . . .	70	Phloeostichus . . .	161
Otiorrhynchus . . .	289	Phloeostrya . . .	228
Oxylaemus . . .	177	Pholeuon . . .	114
Oxymirus . . .	239	Phosphaenus . . .	137
Oxyomus . . .	352	Phosphuga . . .	117
Oxinoptilus . . .	43	Phratora (Phyllo-	
Oxypoda . . .	100	decta) . . .	270
Oxyporus . . .	60	Phricocarabus . . .	9
Oxytelus . . .	57	Phrydiuchus . . .	325
Oxythyraea . . .	361	Phryganophilus . . .	231
		Phthorophloeus . . .	346
Pachnephorus . . .	263	Phyllobius . . .	299
Pachnida . . .	92	Phyllobrotica . . .	273
Pachybrachus . . .	262	Phyllopecta . . .	270
Pachycerus . . .	308	Phyllocladepa . . .	52
Pachygluta . . .	88	Phyllocladepoidea . . .	53
Pachyta . . .	239	Phyllopertha . . .	359
Pachytichius . . .	317	Phyllotreta . . .	280
Paederidius . . .	64	Phymatodes . . .	244
Paederus . . .	64	Phymatura . . .	89
Palorus . . .	236	Phytobaenus . . .	220
Panagaeus . . .	23	Phytobius . . .	325
Paophilus . . .	302	Phytodecta . . .	270
Paracymus . . .	133	Phytoecia . . .	252
Paramecosoma . . .	162	Pythonomus . . .	316
Parastenus . . .	62	Pidonia . . .	240
Pardileus . . .	25	Pilemia . . .	252
Parnus (Dryops) . . .	188	Pisalia . . .	89
Paronalus . . .	127	Pissodes . . .	317
Parophonus . . .	25	Pityogenes . . .	348
Pasilia . . .	88	Pityophagus . . .	157
Patrobus . . .	22	Pityophthorus . . .	348
Padiacus . . .	161	Placusa . . .	87
Pedilophorus . . .	114	Plagiodera . . .	272
Pedinus . . .	233	Plagionotus . . .	246
Pedius . . .	32	Planeustomus . . .	56
Pelecotoma . . .	224	Plataraea . . .	93
Pella . . .	98	Platambus . . .	47
Pelochares . . .	193	Plataphodes . . .	15
Peltis . . .	117	Plataphus . . .	15
Pentaria . . .	226	Plateumaris . . .	251
Pentaphyllus . . .	235	Platycarabus . . .	4
Pentodon . . .	360	Platydis . . .	136

	Seite		Seite
Platydemia . . .	235	Pseudolimnaeum . . .	15
Platydomene . . .	66	Pseudophonus . . .	25
Platyderus . . .	36	Pseudoptochus . . .	302
Platydracus . . .	75	Pseudotriphilus . . .	172
Platynaspis . . .	185	Pseudophytobius . . .	324
Platynus . . .	38	Psoa . . .	213
Platyola . . .	101	Psylliodes . . .	279
Platypus . . .	350	Pteleobius . . .	347
Platyrhinus . . .	288	Ptenidium . . .	124
Platyseelis . . .	233	Pterostichus . . .	32
Platysma . . .	33	Pteryngium . . .	162
Platysoma . . .	126	Pteryx . . .	124
Platystethus . . .	58	Ptilinus . . .	216
Platystomus . . .	288	Ptilium . . .	124
Platytrichus . . .	302	Ptilium . . .	124
Phlectophloeus . . .	104	Ptinella . . .	124
Plectroscelis . . .	278	Ptinus . . .	214
Plegaderus . . .	128	Ptomaphagus . . .	116
Pleganophorus . . .	179	Ptosima . . .	210
Pleurophorus . . .	351	Pullus . . .	185
Plinthus . . .	313	Purpuricenius . . .	246
Pocadius . . .	156	Pycnomerus . . .	177
Podabrus . . .	137	Pycnocraerus . . .	58
Podagrica . . .	275	Pygidia . . .	140
Podonta . . .	233	Pyrochroa . . .	220
Poecilnota . . .	209	Pyropterus . . .	136
Poecilus . . .	32	Pyrrhidium . . .	245
Pogonidium . . .	14	Pytho . . .	219
Pogonistes . . .	22		
Pogonocerus . . .	250	Quedionuchus . . .	78
Pogonochaerus . . .	250	Quedius . . .	76
Pogonophorus . . .	9		
Pogonus . . .	22	Rabigus . . .	74
Polychara . . .	103	Reichenbachia . . .	107
Polydrosus . . .	300	Rhagium . . .	238
Polygraphus . . .	347	Rhagonycha . . .	139
Polyphylla . . .	358	Rhamnusium . . .	238
Polystichus . . .	41	Rhamphus . . .	335
Poophagus . . .	329	Rhantus . . .	47
Porcinolus . . .	195	Rhinocyllus . . .	3
Porthmidius . . .	202	Rhinomacer . . .	34
Potamophilus . . .	188	Rhinomias . . .	
Potosia . . .	362	(Omias) . . .	303
Prasocuris . . .	271	Rhinoncus . . .	325
Pria . . .	153	Rhinosimus . . .	220
Princidium . . .	14	Rhizobius . . .	186
Prionocyphon . . .	187	Rhizophagus . . .	157
Prionus . . .	238	Rhizotrogus . . .	358
Pryonchus . . .	231	Rhopalodontus . . .	175
Pristilophus (Neo-		Rhopalopus . . .	245
pristilophus) . . .	198	Rhynchaenus . . .	334
Pristonychus . . .	36	Rhynchites . . .	344
Procerus . . .	2	Rhyncolus . . .	321
Procraterus . . .	202	Rhysodes . . .	49
Procrustes . . .	3	Rhyssemus . . .	351
Pronomaea . . .	86	Rhytidusoma . . .	324
Propylaea . . .	184	Riolus . . .	189
Prosternon . . .	198	Rosalia . . .	245
Prostomis . . .	161	Rybaxis . . .	107
Proteinus . . .	51		
Psallidium . . .	305	Sacium . . .	122
Psammobius . . .	351	Saperda . . .	251
Psammodes . . .	351	Saphanus . . .	243
Psammococcus . . .	160	Saprinus . . .	128
Pselaphus . . .	109	Saulcyella . . .	104
Pseudocleonus . . .	309	Scaphidema . . .	234

	Seite		Seite
Scaphidium . . .	125	Sphenoma . . .	101
Scaphium . . .	125	Sphenoptera . . .	210
Scaphosoma . . .	125	Sphenophorus . . .	330
Scarabaeus . . .	356	Sphindus . . .	173
Sciaphobus . . .	301	Sphodrus . . .	36
Sciaphilus . . .	301	Spondylis . . .	238
Scimbalium . . .	67	Staphylinus . . .	74
Sciodrepa . . .	115	Stasioidis . . .	301
Scirtes . . .	187	Stenichnus . . .	112
Sclerophaedon . . .	271	Stenodera . . .	223
Scleropterus . . .	324	Stenolophus . . .	27
Scolytus . . .	346	Stenochorus . . .	339
Scopaeus . . .	65	Stenopterus . . .	243
Scryptia . . .	224	Stenostola . . .	252
Scydmaenus . . .	113	Stenus . . .	60
Scymbalium . . .	67	Stenusa . . .	88
Scymnus . . .	186	Stephanocleonus . . .	308
Scythropus . . .	301	Steropus . . .	34
Scytodytes . . .	47	Stethorus . . .	186
Selatosomus . . .	197	Stichoglossa . . .	102
Semanotus . . .	245	Stillicus . . .	65
Semiadalia . . .	181	Stilbus . . .	169
Seminolus . . .		Stomis . . .	31
(Byrrhus) . . .	194	Stomodes . . .	298
Serica . . .	357	Strangalia . . .	
Sericoderus . . .	123	(Leptura) . . .	240
Sericus . . .	198	Strophosomus . . .	303
Serropalpus . . .	229	Styphlus . . .	320
Siagonium . . .	49	Subcoccinella . . .	180
Sibinia . . .	334	Sunius . . .	63
Silaria (Anaspis) . . .	226	Symbiotes . . .	179
Silis . . .	141	Synaptus . . .	199
Silpha . . .	117	Syncalypta . . .	195
Silusa . . .	88	Synchita . . .	176
Silvanus . . .	160	Synechostictus . . .	17
Simplocaria . . .	193	Synharmonia . . .	183
Sinodendron . . .	350	Synoxylon . . .	213
Sinoxylon . . .	213	Syntomium . . .	56
Sitona . . .	96	Synuchus . . .	37
Sitona . . .	356	Systenocerus . . .	350
Sitona . . .	224		
Sitona . . .	216	Tachynus . . .	84
Sitona . . .	303	Tachyerges . . .	334
Sitona . . .	303	Tachyophonus . . .	25
Sitophilus . . .	330	Tachyporus . . .	83
Smicronyx . . .	319	Tachypus . . .	13
Soronia . . .	150	Tachys . . .	18
Sospita . . .	184	Tachyta . . .	19
Spaniophaeus . . .	164	Tachyura . . .	18
Sparedrus . . .	217	Tachyusa . . .	91
Spercheus . . .	131	Tachyusida . . .	89
Spermophagus . . .	286	Tactocomus . . .	198
Sphaeridium . . .	134	Taeniosoma . . .	57
Sphaeriestes . . .	219	Talanes . . .	17
Sphaerites . . .	149	Tanatophilus . . .	117
Sphaerius . . .	123	Tanymecus . . .	308
Sphaeroderma . . .	284	Tanyeraerus . . .	58
Sphaerosoma . . .	178	Tanygnathus . . .	81
Sphaerula . . .	338	Tanysphyrus . . .	319

	Seite		Seite
Taphrorhynchus . . .	349	Trichochele . . .	145
Tapinotus . . .	329	Trichoderma . . .	74
Tarsoslenus . . .	146	Trichodes . . .	147
Tasgius . . .	76	Trichonyx . . .	106
Telephorus . . .	137	Trichophya . . .	85
Telmatophilus . . .	162	Trichopteryx . . .	125
Tenebrio . . .	236	Trichotichnus . . .	27
Tenebrioides . . .	148	Trimium . . .	104
Teredus . . .	177	Trinaria . . .	193
Teretrius . . .	128	Trinodes . . .	192
Tesnus . . .	62	Trimyllus . . .	172
Testediolum . . .	17	Triplax . . .	167
Testedium . . .	14	Tritoma . . .	167
Tetratoma . . .	227	Trixagus . . .	267
Tetropium . . .	244	Trogoderma . . .	192
Tetrops . . .	252	Trogophloeus . . .	57
Thalassophilus . . .	19	Troglöps . . .	142
Thalycra . . .	156	Troginus . . .	57
Thamaraea . . .	97	Tropideres . . .	288
Thamnurgus . . .	348	Tropinota . . .	361
Thanasimus . . .	147	Tropiphorus . . .	312
Thanatophilus . . .	117	Trox . . .	351
Tharops . . .	207	Trypopytis . . .	217
Thea . . .	184	Tychius . . .	333
Thectura . . .	88	Tychus . . .	109
Thiasophila . . .	102	Typhaea . . .	173
Thinobius . . .	56	Tyrus . . .	100
Thinodromus . . .	57		
Thinophilus . . .	56	Uleiota . . .	160
Thoracophorus . . .	50	Ulema (Lema) . . .	255
Throscus . . .		Uloma . . .	236
(Trixagus) . . .	207	Urodon . . .	287
Thylacites . . .	307		
Thymalus . . .	149	Vadonia . . .	240
Tillus . . .	146	Valgus . . .	360
Timarcha . . .	264	Velleius . . .	80
Timarchida . . .	264	Vibidia . . .	183
Tiresias . . .	192	Xantholinus . . .	68
Tithonus . . .	297	Xestobium . . .	215
Tituboea . . .	256	Xyleborus . . .	349
Tomicus . . .	347 348	Xylechinus . . .	217
Tomocarabus . . .	4	Xyletinus . . .	217
Tomoglossa . . .	97	Xylita . . .	229
Tumoxia . . .	224	Xylocleptes . . .	349
Tournieria . . .	298	Xylodrepa . . .	117
Toxotus . . .	339	Xylodromus . . .	53
Trachodes . . .	314	Xylographus . . .	174
Trachycarabus . . .	8	Xylonites (Xylo-	
Trachyploeus . . .	305	pertha) . . .	213
Trachys . . .	212	Xylosteus . . .	238
Traumoeia . . .	93	Xylostiba . . .	53
Trechoblemus . . .	19	Xyloterus . . .	349
Trechus . . .	19	Xylotrechus . . .	246
Trepanes . . .	17		
Triena . . .	29	Zahrus . . .	28
Triarthron . . .	118	Zengophora . . .	255
Tribolium . . .	236	Zilora . . .	230
Trichelophorus . . .	129	Zonabris . . .	223
Trichius . . .	360	Zonitis . . .	223
		Zyras . . .	98