

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenckling.

---

Pars 54:

E. Csiki

Rhipiphoridae.



Einzel-Preis: Mark 2.80

Subscriptions-Preis: Mark 1.85

---

W. Junk  
Berlin W. 15.  
2. VI. 1913.

Verlag von J. F. SCHREIBER, Esslingen und München

Ein einzigartiges Prachtwerk für den Käfersammler!

Heyne-Taschenberg

# Die exotischen Käfer in Wort und Bild

40 feine Farbendrucktafeln mit nahezu 2000 prachtvollen naturgetreuen Käferabbildungen und 320 Seiten Text in Großquart-Format nebst alphabetischem Generalregister sämtlicher Artnamen.

Preis jetzt: Broschiert M. 40.—, eleg. Leinwbd. M. 45.—  
Früher kostete das Werk broschirt M. 108.—, gebunden M. 116.—

Durch vorteilhaften Kauf der noch vorhandenen Vorräte war es möglich, den Preis für tadellose Exemplare wie oben herabzusetzen.



Dem Sammler, dem Liebhaber, wie jedem Naturfreund überhaupt, bietet die wirkliche Brauchbarkeit des Buches höchsten Genuss.

Sammler und Liebhaber der farbenprächtigen, formenreichen exotischen Käferwelt werden die Gelegenheit, dieses Prachtwerk um so billigen Preis ersteilen zu können, mit Freude begrüßen. Jahrelange, mühevole Arbeit haben hier ein Käferbuch gezeitigt, wie die entomol. Literatur kein zweites aufzuweisen hat, ein Werk, dem nach Inhalt und Ausstattung der ungeteilte Beifall der entomologischen Kreise des In- und Auslandes zuteil geworden.

Ausführlichen illustrierten Spezialkatalog kostenlos.

W. JUNK, Berlin W. 15.

## Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nillionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.  
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.  
(Mark 5.25) Mk. 3.50





1913  
**Coleopterorum Catalogus**

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 54:

*Dietl afterwards*  
**E. Csiki** *x ref*

Rhipiphoridae.



**W. Junk**  
Berlin W. 15.  
1913.

*S. africana* sp. n. Cros, Bull Soc. Hist. Nat. Alger. II. 1920. p. 56. 70.

Algerian 1920. " " 12. 1921. N. 19.

Zoogesq. Schelde Ent Bl. 22. 1926. p. 114.

N. & C. America Rivnay, 1929. Mem. Amer. Ent. Soc. 6: 1-68. + Pl.

# Fam. Rhipiphoridae.

Auct. E. Csiki.

*Rhipiphoridae* C. G. Thomson, Skand. Col. VI, 1864, p. 346. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1891), p. XLIX; Fauna Transsylv. 1888—1891 (1891), p. LXIX. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Käf. 1897, p. 254. — Stierlin, Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 188 et I, 1900, p. 16. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 21 et II, 1903, p. 305. — Reitter, Fauna Germ. III, 1911, p. 327, 381. — Kuhnt in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 85, f. 207, 208; Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 23, f. 224, 225 et p. 709. — Schaufuss in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 758. — Fowler, Fauna of Brit. India, Col. Gen. Introd. et Cicind. 1912, p. 168. *Rhipiphorides* Gerstaeker, Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 1. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245. — Mulsant, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 320, 452. — Lacordaire, Gen. Col. V, 1, 1859, p. 616. — Redtenbacher, Fauna Austr. ed. III, I, 1874, p. LIII. — Broun, Man. New Zealand Col. 1888, p. 416.  
Kataloge: Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, Cat. p. 194. — Gemminger & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2117—2124. — Henshaw, List Col. Amer. North of Mexico 1885, p. 132. — Champion, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 39—43. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. ross. ed. II, 1906, p. 452—453.

## 1. Pelecotomini.

*Evaniocerides* Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 618.  
*Evaniocerites* Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 409, 417.  
*Pelecotomini* Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schaufuss in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759.  
*Ptilophorini* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 2.

## Ctenidia Cast.

Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 264. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1885, p. 13. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619.

*mordelloides* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 264. — Südafrika — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 620.

**Rhipistena** Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XV, 1878—79 (1878), p. 81. — Broun, Man. New Zealand Col. 1888, p. 416 (*Rhipisterna*).

- cryptarthra* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, Neuseeland p. 58.  
*lugubris* Sharp, Ent. Monthly Mag. XV, 1878—79 (1878), p. 81. — Broun, Man. N. Zealand Col. 1888, p. 417. " "  
*sulciceps* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 59. "  
 3

**Sharpides** Kirkaldy.

Kirkaldy, Canad. Ent. XLII, 1910, p. 8.

*Sharpia* Broun, Man. N. Zealand Col. 1888, p. 417 (nec Tourn., nec Boc.).

- hirtella* Broun, Man. N. Zealand Col. 1888, p. 418. Neuseeland  
 1

**Dunbrodianus** Pic.

Pic, Echange XX, 1905, p. 66.

- longicollis* Pic, Echange XX, 1905, p. 66. Kapkolonie  
 1

**Madrasindus** Pic.

Pic, Echange XXVII, 1911, p. 157.

- lineatus* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 157. Madras  
 var. *obscuriventris* Pic, l. c. Chambaganur  
*sikkimensis* Pic, l. c. p. 158. Sikkim  
 2

**Setosicornia** Pic.

Pic, Echange XXVII, 1911, p. 117.

- argentina* Pic, Echange XXVII, 1911, p. 118. Argentinien  
 1

**Pelecotomoides** Cast. [emend.]

Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263 (*Pelecotoides*). — Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2118. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 350. — Schäffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 231.

*Caspypria* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 194, 248.

- Trigonodera* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 2. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619.  
 Geocothus = 1945  
 schilderach. 39.1945  
 Caspypria Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 194, 248.  
 Trigonodera Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 2. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619.  
 angulata J. G. Wood, Insects Abroad 1874, p. 186, Patria?  
 f. 88 (*Trigonodera*).









- aureotineta* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 39.  
*bioculata* Shuckard, Ent. Mag. V, 1838, p. 512.  
*bistriata* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 6 (*Trigonodera*).  
*bivittata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, 352.  
*brevicornis* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 20.  
*conicollis* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1885, p. 7 (*Trigonodera*). — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 623, nota.  
*Fischeri* Shuckard, Ent. Mag. V. 1838, p. 511.  
*fulvosericans* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876—79 (1878), p. 279; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 285.  
*Gerstaecherii* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 309 (*Trigonodera*).  
*Gounellei* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 30.  
*holosericea* Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1855, p. 35.  
*impressithorax* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 29.  
*latelineata* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 94.  
*Latreillei* Lep. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32 (*Pelecotoma*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263.  
*Le Moulti* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 20.  
*lineata* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, t. 16, f. 3.  
*lutea* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 7 (*Trigonodera*).  
*luteopubens* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 29.  
*maeulata* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 5 (*Trigonodera*).  
   var. *helva* Perty, Del. anim. art. Bras. 1830—34, p. 66, t. 13, f. 13 (*Pelecotoma*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 5 (*Trigonodera*).  
*maculipennis* Luc. Ent. Voyage Castelnau 1859, p. 143.  
*malaceana* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 93.  
*marmorata* M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 321.  
*Mastersi* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 310 (*Trigonodera*).  
*minor* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 340.  
*murina* Blanch. Voyage Pôle Sud IV, 1853, p. 187, t. 12, f. 13.  
*nebulosa* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, 352, t. 16, f. 4.  
*niasensis* Pic, Bull. Soc. Ent. France 1913, p. 94.  
*nubila* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 4 (*Trigonodera*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 351, t. 16, f. 1—2. — Schäffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 231, 232.  
*nuda* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 4 (*Trigonodera*).  
*pallipes* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 6 (*Trigonodera*).
- Queensland  
 Brasilien  
 Peru  
 Mexiko  
 Argentinien  
 Neuholdland  
 Brasilien  
 Ins. Tonga  
 Gayndah  
 Brasilien  
 Ins.  
 Woodlark  
 Java  
 Argentinien  
 Brasilien  
 Guyana  
 Mexiko  
 Neuholdland  
 Brasilien  
 "  
 "  
 Malakka  
 Queensland  
 Gayndah  
 Madagaskar  
 Neuguinca  
 Panama,  
 Kolumbien  
 Ins. Nias  
 Peru,  
 Panama,  
 Nikaragua,  
 Mexiko  
 Neuholdland  
 Brasilien

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>pruinosa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883,<br>p. 32 ( <i>Trigonodera</i> ).   | Neu-<br>britannien |
| <i>senilis</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 6 ( <i>Trigonodera</i> ).  | Neuholland         |
| <i>sericea</i> Gerst. l. c. p. 7.  | "                  |
| <i>serraticornis</i> M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II,<br>1887, p. 321.   | Queensland         |
| <i>signaticollis</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 3 ( <i>Tri-<br/>gonodera</i> ).  | Brasilien          |
| <i>simplicicornis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896,<br>p. 359.   | Madagaskar         |
| <i>Perrieri</i> Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 195,<br>248 ( <i>Caspypria</i> ).  |                    |
| <i>succincta</i> Germ. Ins. spcc. nov. 1824, p. 168 ( <i>Rhipi-<br/>phorus</i> ). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855,<br>p. 3, f. 1 ( <i>Trigonodera</i> ).  | Brasilien          |
| ♀ — var. <i>gigantea</i> Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840,<br>p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855,<br>p. 3 ( <i>Trigonodera</i> ).   | "                  |
| ♂ — var. <i>Leachi</i> Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. 2.<br>ed. XXV, 1817, p. 135, f. 25 ( <i>Pelecotoma</i> ). —<br>Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825,<br>p. 32 ( <i>Pelecotoma</i> ). — Cast. Hist. Nat. Ins.<br>Col. II, 1840, p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp.<br>syst. 1855, p. 3 ( <i>Trigonodera</i> ). | "                  |
| ♀ — var. <i>strigata</i> Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840,<br>p. 263. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 3<br>( <i>Trigonodera</i> ).   | "                  |
| <i>sulcata</i> Pic, Echange XXVI, 1910, p. 29.   | "                  |
| <i>sulcicollis</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 4 ( <i>Tri-<br/>gonodera</i> ).  | "                  |
| <i>vittata</i> Gerst. l. c. p. 5.  | "                  |

### Subgen. *Micropelecotomoides* Pic [emend.].

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21 (*Micropelecotoides*). v. 39, 1924 (ver.)

|   |         |
|---|---------|
| <i>japonica</i> Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21. | Japan   |
| <i>Rouyeri</i> Pic, l. c. p. 21.                | Java    |
| <i>sumatrensis</i> Pic, l. c. p. 21.            | Sumatra |
| — var. <i>obscuricolor</i> Pic, l. c. p. 21.    |         |
| — var. <i>pallidicolor</i> Pic, l. c. p. 21.    |         |
| — var. <i>rubrithorax</i> Pic, l. c. p. 21.     |         |

44

### Scotoscopus Reitt.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 92. — Seidl. Fauna  
Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transssylv. 1888—91  
(1891), Gatt. p. 142. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759.

*carbonarius* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, Griechenland  
1884, p. 93, t. 2, f. 20, 20 a.

1

### Geoscopus Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1885, p. 7. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859,  
p. 619, 622. (*acuminis*)

~~languidus~~ Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 286. / Ceylon  
Bdr. T.E.S. 1921. p. 280.

~~schaefferi~~ 1929 nomen. Am. Ent. Soc. 67: 118. Tex.

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| <i>M. collaris</i> Pic Ech. 39. 1924. p. 17.   |       | Dutch E Ind. |
| <i>capitalis</i>                               |       | "            |
| <i>atrospinus</i>                              |       | "            |
| <i>rufiventris</i>                             |       | "            |
| <i>parallelus</i> Pic                          | p. 31 | Borneo.      |
| <i>sharpius</i> Pic Mel. 45. 1926. p. 22.      |       | R.J.         |
| <i>m. celebensis</i> Pic Mel. 36. 1922. p. 21. |       | Celebes.     |
| <i>atriceps</i> Pic                            | f.c.  | Madura.      |
| <i>madurensis</i> Pic                          | f.c.  | "            |
| <i>buncicola</i> Pic                           | f.c.  | Borneo.      |
| <i>major</i> Pic                               | f.c.  | Tonkin.      |
| <i>minutus</i> Pic                             |       | Java.        |
| <i>irregularis</i> Pic                         |       | Java.        |
| <i>lineatus</i> Pic                            |       | Java.        |
| <i>corporalis</i> Pic Mel. 39. 1923 p. 14      |       | Sumatra      |
| <i>surficolor</i> Pic                          |       | "            |
| <i>andaiensis</i> Pic                          |       | N. Sumatra   |
| <i>infuscatus</i> Pic                          |       | Timor        |
| <i>roonensis</i> Pic                           |       | Roon.        |
| <i>auratae</i> Pic                             |       | Kina Balu.   |
| <i>dohertyi</i> Pic                            |       | Malacea      |
| <i>atriicolor</i> Pic                          |       | Kina Balu.   |
| <i>terratenuis</i> Pic                         |       | Terrate.     |

*G. megalophthalma* Schilder, Sch., 39, 1924, p. 1 (holotype) W Afr.

*guineensis*

*subnigra*

Jangunjika

Pars 54

Geoscopus. — Clinops.

7

— *murinus* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8, f. 2 a—c. Kapkolonie  
  *capensis* Bates, Trans. Ent. Soc. London 1868,  
  p. 325.

Subgen. **Indiogeoscopus** Pic.

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21.

*multilineatus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21. Vorderindien  
3

**Pelecotoma** Fisch.-Waldh.

Fisch.-Waldh. Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1809, p. 293; Entomogr. Russ. II,  
1823, p. 170. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32. — Gerst.  
Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mittel-  
deutschl. III, 1856, p. 245, 254. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 619, 622.  
— Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 409, 418. — Redtb.  
Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 166. — Seidl. Fauna  
Balt. ed. II, 1887—97 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91  
(1891), Gatt. p. 142. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schauf.  
in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912. n. 759. — Kühnt. Illustr. Best.-Tab.

*Pelecotoma*

*zonalis* (fennica var.) Heischer, 2. t. 35. 1916. p. 120.

d'Hist. Nat. 2. éd. XXV, 1817, p. 135. — Lepelet.  
& Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32.

*flavipes* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 318. — Karolina  
Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9.

2

**Clinops** Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859,  
p. 619, 623.

*badia* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9, f. 4. Kaffrarien  
*spectabilis* Schauf. Nunquam otiosus II, 1872, p. 276. Antiochica

2

*g. megalophthalma* Schilder, 39. 1924. p 1 (hostish) W Afr.

guineensis

subnudis

Janganga

Pars 54

Geoscopus. — Clinops.

7

— *murinus* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8, f. 2 a—c. Kapkolonie  
*capensis* Bates, Trans. Ent. Soc. London 1868,  
 p. 325.

### Subgen. *Indiogeoscopus* Pic.

Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21.

*multilineatus* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 21. Vorderindien  
 3

### **Pelecotoma** Fisch.-Waldh.

Fisch.-Waldh. Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1809, p. 293; Entomogr. Russ. II, 1823, p. 170. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 254. — Lacord. Gen. Col. V, I, 1859, p. 619, 622. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 409, 418. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXCV et II, p. 166. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—97 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.

*fennica* Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 178 (*Ripiphorus*). Nord- u.  
 — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 621 (*Ripiphorus*). Mittel-  
 — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262. europa

— Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 8, f. 3. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 254. — Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 647; l. c. ed. III, 1874, II, p. 166. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1858—63, p. 410, t. 91, f. 453 ♂. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Arten p. 540; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 581. — Schilsky, Käf. Eur. 37, 1901, p. 34. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382, t. 127, f. 2. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 760, t. 23, f. 32. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710, f. 2.

Biologie: Schumann, Illustr. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 154.

*Latreillei* Fisch.-Waldh. Ent. Russ. II, 1823, p. 172, t. 38, f. 9, a—f.

*mosquensis* Fisch.-Waldh. Mém. Soc. Nat. Moscou II, 1809, p. 293, t. 18, f. 1. — Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. 2. éd. XXV, 1817, p. 135. — Lepelet. & Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 32.

*flavipes* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 318. — Karolina Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9.

2

### **Clinops** Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9. — Lacord. Gen. Col. V, I, 1859, p. 619, 623.

*badia* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 9, f. 4. Kaffrarien  
*spectabilis* Schauf. Nunquam otiosus II, 1872, p. 276. Antiochien

2

**Ancholaemus** Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 10. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859,  
p. 619, 624.

*acuminatus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 155. Brasilien  
*attenuatus* Pic, Le Naturaliste XXXI. 1909, p. 34.  
*lyciformis* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 10, f. 5. — „  
Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 624.

3

**Toposcopus** J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 54.

— *Wrighti* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 54. Neumexiko  
— Schäff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904,  
p. 232.

1

**Euctenia** Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 10. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859,  
p. 619, 625.

*occidentalis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 51. West-  
australien  
— *sericea* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 11, f. 6. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 625. Neuholland

2

**Evaniocera** Guér.

Guér. Gen. Ins. 1835, fasc. 1, nr. 2, t. 2. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859,  
p. 619, 625. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 410, 418.  
— Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 166. — Seidl.  
Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsyrv.  
1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl.  
1912, p. 759.

*Ptilophorus* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 11. — Muls.  
Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 468. — Schäff. D. E. L.  
1915. 1. 34 (kein)

*capensis* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 13 (*Ptilo-*  
*phorus*). Kapkolonie

— *Dufouri* Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. ed. II, XXV,  
1817, p. 135 (*Pelecotoma*). — Lepelet. & Serv.  
Encycl. méthod. X, 1825, p. 32 (*Pelecotoma*).  
— Guér. Gen. Ins. I, 1835, nr. 2, t. 2. — Cast.  
Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 (*Peleco-*  
*toma*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855,  
p. 12, f. 7 (*Ptilophorus*). — Muls. Ann. Soc.  
Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 469 (*Ptilophorus*).  
— Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63,  
p. 411, t. 91, f. 454 ♂. — Redt. Fauna Austr.  
ed. II, 1858, p. 647 (*Ptilophorus*); l. c. ed. III,  
1874, II, p. 167. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.  
XXII, 1903, p. 238. — Schilsky, Käf. Eur.  
XXXV, 1908, p. 99.

Europa,  
Algier,  
Kleinasien

*Eucnemis*

*megaloptera* Tsa Trans. R. Soc. S. Aust., 41. (1917.) p. 265. W. Aust.  
" " 266. Queensl. Pd.

*E. atricornis* Pi Mel. 39. 1923 p 16 Rhodessa

*Planicollis* Schubel. D. & Z. 1925. p 136 Australia

*rufipennis* " " n. S. W.

*signatus* " " "



*Fivaldszkyi* Guér. (scr. *Fivaldzkii*) Icon. règne anim. 1829—38, p. 130, t. 34, f. 6 (*Pelecotoma*).

*Steveni* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou I, 1829, p. 288 et 369, t. 6, f. 3.

var. *Boryi* Luc. Expl. sc. d'Algérie, Art. II, 1849, p. 382, Col. t. 32, f. 9. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 12 (*Ptilophorus*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 468 (*Ptilophorus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 238. — Schilsky, Käf. Eur. XXXXV, 1908, p. 99.

var. *striolata* Nowicki, Beschr. neuer Käf. Krakau, 1873, p. 5. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 435.

*Fischeri* Ménétr. Mém. Ac. Petrop. VI, 1849, p. 245. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 13 (*Ptilophorus*). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 237.

*Gerstaekeri* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 310. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 98. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 273.

*Hauseri* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 238.

*Meyricki* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 52.

*minuta* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XVI, 1893, p. 178.

*nervosa* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 12 (*Ptilophorus*).

*novemflabellata* J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLV, 1902—03, nr. 10, p. 34.

*pallidipennis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 99.

*persimilis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 60.

*perthensis* Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 53.

*plumicornis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 349; Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 238.

*pruinosa* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 12 (*Ptilophorus*).

Algier,  
Süd-  
frankreich

Kalabrien

Sibirien

Gayndah

Persien  
West-  
australien

Australien

Neuholland

Transcaspien

Australien

Victoria

West-  
australien

Kleinasien

Neuholland

## 2. Rhipiphorini.

*Macrosiagonini* Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759, 761.

*Myoditides* Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 618, 630.

*Myoditini* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 15.

*Rhipiphorides vrais* Lacord. Gen. Col. V, I, 1859, p. 618, 626.

*Rhipiphorini* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382, 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 759, 760 (part.).

*Rhipiphorites* Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 411, 417.

**Macrosiagon Hentz.**

Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 462, t. 15, f. 3 a—d. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382, 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761, 762. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.

*Emenadia* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 261. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 627. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 353. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz II, 1898, p. 188.  
*Rhipiphorus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 109, part. (*Ripiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 19. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 255. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 456. — Jacque du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 413, 418. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 168. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 121.

|  |  |
|--|--|
| <i>abyssinicum</i> Pic, Echange XXV, 1909, p. 148.   | Abessinien   |
| <i>acuminatum</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 20<br>( <i>Rhipiphorus</i> ).   | Brasilien  |
| <i>affine</i> Gerst. l. c. p. 21 ( <i>Rhipiphorus</i> ).   | "  |
| <i>argentinum</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 252 ( <i>Rhipiphorus</i> ).  | Argentinien  |
| <i>armatum</i> C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 280.  | Vorderindien   |
| <i>attenuatum</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 29<br>( <i>Rhipiphorus</i> ).   | Brasilien  |
| <i>axillare</i> Gerst. l. c. p. 31 ( <i>Rhipiphorus</i> ).   | Guinea   |
| <i>Baeri</i> Pic, Le Naturaliste XXVIII, 1906, p. 175.   | Argentinien  |
| <i>basale</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 21 ( <i>Rhipiphorus</i> ).  | Brasilien  |
| <i>basicolle</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. 98<br>( <i>Rhipiphorus</i> ).   | Caracas  |
| <i>Benschi</i> Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 322.  | Madagaskar   |
| <i>bicolor</i> Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 ( <i>Emenadia</i> ). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 189.  | Senegal,<br>Ägypten  |
| <i>nigripenne</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 24 ( <i>Rhipiphorus</i> ).  |  |
| <i>bifasciatum</i> Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 478.<br>var. <i>reductum</i> Pic, Echange XXV, 1909, p. 147.  | Japan<br>China<br>Nord-  |
| <i>bifoveatum</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 121, 123 ( <i>Rhipiphorus</i> ). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 354, t. 16, f. 6. | amerika:<br>Illinois,<br>Mexiko,<br>Guatemala,<br>Nikaragua<br>Ternate |
| <i>biguttatum</i> Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 188, t. 12, f. 14.  | Brasilien  |
| <i>biguttulum</i> Gemm. Col. Hefto VI, 1870, p. 123.<br><i>biguttatum</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 22 ( <i>Rhipiphorus</i> ) [nec Blanch. 1853].                       | Kostarika<br>Bengalen  |
| <i>Biolleyi</i> Pic, Echange XXII, 1906, p. 56.  |  |
| <i>bipartitum</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 35 ( <i>Rhipiphorus</i> ).   |  |

*Maurriagon (Emenadra)*

|  |   |             |                |
|--|---|-------------|----------------|
| <i>lequaerti</i> Pic (axillare var.)     | Rev. Zool. Afr. III.                    | p. 162      | Congo          |
| <i>maculaticeps</i> Pic                  | P. c.                                   | "           |                |
| <i>hiinterruptus</i> Pic (vittatus var.) | Mélanges V.                             | 1913. p. 18 | Brazil         |
| <i>minasensis</i> Pic                    | P. c.                                   | "           |                |
| <i>corrukti</i> Pic (tripunctatus var.)  | P. c.                                   |             | ala            |
| <i>luteonotatus</i> Pic                  | P. c.                                   | "           |                |
| <i>bahiensis</i> Pic (vittatus var.)     | P. c.                                   |             | Brazil.        |
| <i>nigroapicalis</i> Lea.                | Trans. R. Soc. S. Afr. 41. 1917. p. 258 |             | W. & S. Africa |
| <i>rufol. ciata</i> Lea                  | "                                       | 259.        | Queensld.      |
| <i>paucicervs</i> Lea                    | "                                       | 260.        | N. Queensland  |
| <i>crassipes</i> Lea                     | "                                       |             | Queensld.      |
| <i>setipennis</i> Lea                    | "                                       | 262         | N. Queensland  |
| <i>excavatipenne</i> Pic                 | Mel. 46. 1926. p. 16                    |             | Argentina      |





...  $\lambda$   $\nu$  0  $\sigma$  3  $\tau$   $\sigma$

- **bipunctatum** F. Syst. El. II, 1801, p. 120 (*Ripiphorus*).  
 — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 24 (*Ripiphorus*). — Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1897, Käfer p. 255.  
**apicale** Westw. in Royle, Illustr. Himal. Mount. Ent. 1835—39, p. 55, t. 19, f. 11 (*Ripiphorus*).  
**tropicum** Nienh. Journ. Asiat. Soc. Beng. 1856, p. 392. — Gerst. Arch. Naturg. XXIII, 1857, II, p. 360.
- bisbinotatum** Pic, Le Naturaliste XXXI, 1909, p. 30 (? *limbatum* F. var.).
- brasiliense** Pic, Le Naturaliste XXVIII, 1906, p. 176.
- **caffrum** Fähr. Öfv. Vet. Akad. Förh. XXIX, 1870, nr. 4, p. 340 (*Emenadia*).
- **capito** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 57.
- carinicolle** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 242.
- **carinipenne** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 355, t. 16, f. 9.
- **Championi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 56.
- cordigerum** Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 30 (*Ripiphorus*).
- **eruentum** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 168 (*Ripiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 27 (*Ripiphorus*). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122, 124 (*Ripiphorus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 357, t. 16, f. 12 (*Emenadia*).  
 var. **rufum** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 225 (*Ripiphorus*). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 125 (*Ripiphorus*).
- **cucullatum** M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 32.
- **cyaniveste** Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 479 (*Ripiphorus*).
- **difficile** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1889, p. 55.
- **dimidiatum** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 332; Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 112; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 (*Ripiphorus*). — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 8, t. 1, f. 8, a—b: Encycl. méthod. X, 1825, p. 291 (*Ripiphorus*). — Hentz, Trans. Amer. Phil. Soc. (2) III, 1830, p. 464. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 21 (*Ripiphorus*). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 121, 122 (*Ripiphorus*).
- marginale** J. Lec. New spec. N. Amer. Col. I, 1863—66 (1866), p. 154.
- **discicolle** Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 32 (*Ripiphorus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 358, t. 16, f. 17, 18 (*Emenadia*).
- Vorderindien,  
 Ceylon,  
 Afrika
- Xanthier I 12 18
- Brasilien
- „
- Kaffrarian *bipunctatum* (new)
- Australien
- Neukaledonien
- Mexiko
- Australien
- Brasilien
- Nordamerika,  
 Mexiko
- Kalifornien
- Queensland
- Japan
- Australien
- Nordamerika:  
 New York,  
 Florida,  
 Missouri
- Brasilien,  
 Kolumbien,  
 Mexiko

- var. *melanopterum* Chevrol. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. IX. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 359.
- var. *mutilatum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 (*Rhipiphorus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 359 (*Emenadia*).
- var. *quadrimaculatum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 (*Rhipiphorus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 359 (*Emenadia*).
- Vitraci* Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 432.
- dispar* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 32 (*Rhipiphorus*).
- *diversiceps* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 55.
- Doneceeli* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 60.
- *elegans* Mars. Abeille XIV, 1876, Descr. nouv. p. 27 (*Rhipiphorus*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 187.
- *excavatum* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 354, t. 16, f. 7, 8 (*Emenadia*).
- *fenestratum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 26 (*Rhipiphorus*).
- *ferrugineum* F. Syst. Ent. 1775, p. 262 (*Mordella*); Mant. Ins. I, 1787, p. 217; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 110; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 118. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 26 (*Rhipiphorus flabellatus* var.). — Fowler, Fauna British India, Col. Introd. et Cicind. 1912, p. 169, f. 73. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 191.
- var. *flabellatum* F. Spec. Ins. II, 1781, App. p. 501; Mant. Ins. I, 1787, p. 218 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111 (*Ripiphorus*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 (*Ripiphorus*). — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 4, t. 1, f. 2, b—c. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 244. — Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXI, 1818, p. 303. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 (*Emenadia*). — Costa, Fauna Regn. Napoli, Mordellides 1853, p. 7, t. 19, f. 3 (*Emenadia*). — Küst. Käf. Eur. XIII, 1842, p. 77. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 26 (*Rhipiphorus*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 461. — Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, 1897. Käf. p. 255. — Bed. Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 191.
- Biologie: Chobaut, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 181; Mém. Acad. Vaucluse X, 1891, p. 83, tab.; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 447; Journ. Microgr. XV, 1891, p. 89; Compt. rend. CXII, 1891, p. 350; Ann. Sc. Nat. Zool. (7) XII, 1891, p. 97. — Jakobson, Col. Ross. fasc. I, 1905, p. 57, f. 150.
- pectinatum* Vill. Linn. Ent. I, 1789, p. 408, t. 2, f. 51 (*Mordella*).
- undulata* Hope

Fernaldia (B) 1930 number 6161 26

leselenui

v. Vitalisi Pic, Mil 37.1922. p. 21.

v. imapicalis Pic ... l.c.

Laos -

"

longirostris Pic, Ann. Mag. N. H. (10) VIII. 1931. p. 555

Uganda

- var. *uniforme* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, III, p. 127 (*Rhipiphorus*).  
*flavipenne* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 153. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 121, 122 (*Rhipiphorus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 354, t. 16, f. 5, 5 a (*Emenadia*).  
Biologie: Fall & Cockerell, Trans. Am. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 211. — Webster, Proc. Ent. Soc. Amer. 1897, p. 155.  
*abdominale* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 154.  
**Fortieri** Chob. Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 97 (*Emenadia*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 188. — Pic, Bull. Soc. Ent. d'Egypte 1911, p. 73.  
**Gayi** Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 27 (*Rhipiphorus*).  
*rufipenne* Sol. in Gay, Hist. fis. pol. Chile, Zool. V, 1851, p. 275, t. 21, f. 9 [nec Chevr. 1838]. — Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 258 (*Rhipiphorus*).  
*Gerstaeckeri* Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 82.  
**Grombezewskii** A. Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890, p. 377 (*Emenadia*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 191.  
*infernum* Schauf. Nunquam otiosus II, 1872, p. 277.  
*interiore* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 58.  
*Leseleuci* Pic, Echange XXII, 1906, p. 44.  
*limbatum* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 112; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 121 (*Ripiphorus*). — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 6, t. 1, f. 5 a, b. (*Ripiphorus*). — Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 189; Complete Writings II, 1859, p. 660 (*Rhipiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 30 (*Rhipiphorus*). — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122—125 (*Rhipiphorus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 358, t. 16, f. 13—16.  
var. *angustissimum* Pic, Le Naturaliste XXVIII, 1906, p. 175.  
*lineare* J. Lec. New spec. Col. 1866, p. 154. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122, 125.  
*lugubre* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 304 (*Rhipiphorus*).  
*luteipenne* J. Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia 1865, p. 97; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210.  
*Lyauteyi* Alluaud, Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 323.  
*Mac Leayi* nov. nom. <sup>not yet described</sup>  
*luteipenne* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1867—73 (1873), p. 310 [nec J. Lec. 1865]. — Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 274.  
*maeulicolle* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 107.  
*Marcelli* Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 324.  
*medianum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 86.  
*melanurum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 303. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 189.
- Ver. Staaten von N. Amerika, Mexiko  
Ägypten  
Chile  
Japan = cya  
Turkestan  
Kafferland Australien  
Andamanen Nordamerika, Mexiko, Guatamala, Kostarica, Panama  
Brasilien  
Kentucky  
Sansibar  
N.-York, N. Mexiko, Madagaskar, Gayndah  
Sydney Elfenbeinküste Sumatra Arabien

- meridionale* Costa, Fauna Regno di Napoli, Suppl. 1859, p. 20. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 192.  
*bipunctatum* Costa, Fauna Regno di Napoli, Col. Mordell. 1853, p. 5, t. 19, f. 4—5 [nec F.].  
*italicum* Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 186.
- Morawitzia* A. Semen. Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1890—1891 (1890), p. 376.
- multinotatum* Pic, Le Naturaliste XXVIII, 1906, p. 175.
- nasutum* Thunbg. Diss. Nov. Ins. spec. III, 1784, p. 66, f. 77 (*Mordella*). — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 217; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792 (*Rhipiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 29 (*Rhipiphorus*). — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 479. — Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 82.
- nigronotatum* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 86.
- Novae-Hollandiae* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 24 (*Rhipiphorus*).
- Oberthüri* Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) VII, 1879, p. 200 (*Rhipiphorus*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—1896 (1895), p. 185, 190.
- obscuricolor* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 69.
- oetomaeculatum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 22 (*Rhipiphorus*). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122, 123 (*Rhipiphorus*). — Fleut. & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 432. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 356, t. 16, f. 10 (*Emenadia*).  
var. *puncticeps* J. Lec. Journ. Acad. Sc. Philad. (2) IV, 1858, p. 20. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 123.  
var. *Sayi* J. Lec. Journ. Acad. Sc. Philad. (2) IV, 1858, p. 21. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 123.
- bicolor* Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1823, p. 275 (*Rhipiphorus*); Complete Writings II, 1859, p. 162 [nec Ol., Cast.].
- peetinatum* F. Syst. Ent. 1775, p. 263 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111 (*Rhipiphorus*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 (*Rhipiphorus*). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1875), p. 122, 124 (*Rhipiphorus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 357, t. 16, f. 11 (*Emenadia*).
- ambiguum* Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 317 (*Rhipiphorus*).  
*dubium* Melsh. l. c. p. 316.  
*fasciatum* Melsh. l. c. p. 317.  
*nigrum* Melsh. l. c. p. 317.  
*sexmaculatum* F. Syst. Ent. 1775, p. 263 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 (*Rhipiphorus*). — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 7, t. 1, f. 6 (*Rhipiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 (*Rhipiphorus*).

-obscureolus v. semiobscurus Pic Niel. 39. 1923 p. 15. Sumatra

obscure v. m. obscurum E. 1920 n. a. Ind Soc. 6 13 1920, 72

lecturale Pic Niel. 39. 1923 p. 15

Chidi



|  |   |
|--|---|
| ab. <i>humeratum</i> F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119<br>( <i>Rhipiphorus</i> ).  | Carolina  |
| ab. <i>impressum</i> Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 316 ( <i>Rhipiphorus</i> ).  | Pennsylvanien   |
| ab. <i>longipes</i> Melsh. l. c. p. 317.   | "   |
| ab. <i>maxillosum</i> Melsh. l. c. p. 316.   | "   |
| ab. <i>nigricorne</i> F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119<br>( <i>Rhipiphorus</i> ).   | Carolina  |
| ab. <i>sanguinolentum</i> Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 169 ( <i>Rhipiphorus</i> ).   | "   |
| ab. <i>thoracicum</i> Melsh. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. II, 1846, p. 317 ( <i>Rhipiphorus</i> ).   | Pennsylvanien   |
| ab. <i>triste</i> F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 ( <i>Ripiphorus</i> ).   | Carolina  |
| ab. <i>varicolor</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 25 ( <i>Rhipiphorus</i> ).   | "   |
| ab. <i>ventrale</i> F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 ( <i>Ripiphorus</i> ).   | "   |
| <i>pictipenne</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 97 ( <i>Emenadia</i> ). <i>Brid. Mus.</i>   | Australien<br>Sardinia  |
| <i>praeustum</i> Gebl. in Ledeb. Reise II, 3, 1830, p. 133; Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 290. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Europe III, 1859—63, p. 413, t. 92, f. 456. — Bedel, Abcille XXVIII, 1892—96 (1885), p. 185, 190.                      | Südeuropa,<br>Sibirien,<br>Kaukasus,<br>Turkestan,<br>Syrien,<br>Algier |
| <i>apicale</i> Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 79 ( <i>Ripiphorus</i> ). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 27 ( <i>Rhipiphorus</i> ).  |   |
| <i>fulvipenne</i> Küst. Käf. Eur. V, 1846, p. 71 ( <i>Ripiphorus</i> ).  |   |
| <i>rufipenne</i> Chevr. in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1838, p. 129, t. 34, f. 4, a—b ( <i>Ripiphorus</i> ). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 27 ( <i>Ripiphorus</i> ). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 463 ( <i>Ripiphorus</i> ). |   |
| <i>suleatum</i> Ménatr. Cat. rais. Cauc. 1832, p. 205. — Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 429, t. 5, f. 8.  |   |
| <i>punctatum</i> F. Mant. Ins. I, 1787, p. 218; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 ( <i>Ripiphorus</i> ). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 33 ( <i>Ripiphorus</i> ).  | Cayenne   |
| <i>punctulatum</i> Blackb. Trans. R. Soc. S. Australia XXIII, 1899, p. 57.   | Australien  |
| <i>pusillum</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 32 ( <i>Ripiphorus</i> ).   | Ostindien   |
| <i>Raffrayi</i> Fairm. Rev. Zool. 1873, p. 342. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 184, 185.  | Algier,<br>Tunis  |
| <i>rubropictum</i> Perty, Del. anim. art. Bras. 1830, p. 66, t. 13, f. 12 ( <i>Ripiphorus</i> ). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 22 ( <i>Ripiphorus</i> ). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 357.                        | Brasilien,<br>Panama  |
| <i>scutellare</i> Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 24 ( <i>Ripiphorus</i> ).   | Ostindien   |
| <i>semipunctatum</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 97.  | Australien  |
| <i>signaticolle</i> Pic, Echange XXIII, 1907, p. 183.<br>var. <i>usambarensis</i> Pic, Echange XXV, 1909, p. 147.  | Dahomey<br>Usambara   |

- ~~sobrinum~~ Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 281. Victoria
- ~~sodale~~ Waterh. l. c. p. 279. Madagaskar  
sordidum Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 28 (*Rhipiphorus*). — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 1880, Proc. p. XII (*Rhipiphorus*). Brasilien,  
var. major Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 128 (*Rhipiphorus*). Guatemala,  
spinicolle Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 38. Illinois  
spinipenne Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 20, t. 1, f. 11o (*Rhipiphorus*). Puerto Rico  
spinosum F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 126; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 (*Ripiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 20 (*Rhipiphorus*). Indochina  
sumatrense Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 69. Brasilien,  
tarsatum F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 (*Rhipiphorus*). Inseln von Südamerika  
— Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 29 (*Rhipiphorus*). Sumatra  
terminatum Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 Nord- u.  
(*Emenadia*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 Südamerika  
(1895), p. 184, 188. Senegal,  
var. *fasciatum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, Guinea  
p. 25 (*Ripiphorus*). Barbarei  
var. *gibbiferum* Abeille, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse XIV, 1880, p. 233. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 188. Argentinien  
testaceicorne Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 69. Neuholland  
tricolor Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 28 (*Rhipiphorus*). — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI, 1883, p. 280. Mittel- u.  
tricuspidatum Lepechin, Tageb. 1774, I, t. 19, f. 8 (*Mordella*). — Gmelin, Linn. Syst. Nat. I, 4, 1792, p. 2024 (*Mordella*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1895), p. 185, 189. — Südeuropa,  
Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762, t. 23, f. 34. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710, f. 3, A, B. Süd-  
larvatum Schrank, Naturf. XXIV, 1789, p. 90 russland,  
(*Mordella*). — Scriba, Journ. I, 1790, p. 35 Kaukasus,  
(*Mordella*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1894), p. 155. — Stierl. Käf.-Fauna Schweiz II, 1898, p. 188. Turkestan,  
ab. *angustulum* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 429, t. 5, f. 7. Ägypten  
XXII, 1849, III, p. 128. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.  
ab. *apicale* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 429, t. 5, f. 7.  
ab. *bicolor* Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 5, t. 1, f. 3 (*Ripiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 23 (*Ripiphorus*). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.  
ab. *bimaculatum* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 218 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 112 (*Ripiphorus*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 (*Ripiphorus*). — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 5, t. 1, f. 4, a—b (*Ripiphorus*). — Latr. Nouv. Dict. Hist. Nat. XXI, 1818, p. 303 (*Ripiphorus*); Hist. Nat. X, 1804, p. 411, t. 10, f. 9 (*Ripiphorus*).





- phorus).* — Ill. Magaz. III, 1804, p. 177 (*Ripiphorus*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 81 (*Ripiphorus*). — Duméril, Consid. gén. Ins. t. 2, f. 4; Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 375, t. 13, f. 4 (*Ripiphorus*). — Fisch.-Waldh. Ent. Russ. II, 1823, p. 222, t. 38, f. 2 (*Ripiphorus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 260 (*Emenadia*). — Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, p. 78 (*Rhipiphorus*). — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIII, 1849, III, p. 128 (*Rhipiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 23, t. 1, f. 11 (*Rhipiphorus*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 456, 458 (*Rhipiphorus*). — Bach, Käf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 256. — Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 413, t. 92, f. 456 bis. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 168. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1894), p. 155. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.
- ab. *binotatum* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 427, t. 5, f. 5. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.
- ab. *carinthiacum* Panz. Fauna Germ. 22, nr. 7 (1794) (*Ripiphorus*). — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.
- lituratum* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 127; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 120 (*Ripiphorus*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 23 (*Rhipiphorus*).
- ab. *nigricolle* Bettal [? i. l.]. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.
- ab. *nigrithorax* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 428, t. 5, f. 6. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.
- ab. *quadrinaculatum* Gyllh. in Schönh. Syn. Ins. III, 1817, App. p. 36.
- ab. *suturale* Bettal [? i. l.]. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762.
- Biologie u. Morphologie:** Farines, Ann. Sc. Nat. VIII, 1826, p. 244. — Serv. Bull. de Fé russac XIV, 1828, p. 292. — Westw. Introd. mod. class. Ins. I, 1839, p. 295. — Kempers, Tijdschr. Ent. XLIV, 1901, p. 35. — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 270, fig. (triungul.). — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 762. — *Crois. Bull. Soc. Hist. Nat. Alg. II. 1920. p. 56. 70.*
- trisignatum* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 30 (*Ripiphorus*). — Brasilien
- tucumanense* Pic, Echange XXV, 1909, p. 147. — Argentinien
- variabile* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 31 (*Ripiphorus*). — Brasilien
- variicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, I, p. 34. — Bengalien
- var. *tonkineum* Pic, Echange XXII, 1906, p. 44. — Tonking
- vittatum* Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 123. — Peru
- vittula* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 28 (*Ripiphorus*). — Brasilien

## Subgen. Siagonadia Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 131.

pallidipenne Reitt. Wien. Ent. Zcit. XXIX, 1910, p. 131. Spanien  
97

## Metoecus Gerst.

Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17. — Bach, Käferfauna f. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 245, 255. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 453. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 412, 418. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV; I. c. II, p. 168. — Stierl. Käferf. d. Schweiz II, 1898, p. 188. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 382. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.

*Rhipiphorus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 109 (*Ripiphorus*) [nec Boscl. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 261. — Lacord. Gen. Col. V, I, 1859, p. 627, 629. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 346. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylyv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 142. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 305. — Schönh. (1824) p. 237.

Antoniae Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 157 (*Myiodes*). — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 223.

— paradoxus L. Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 228 (*Mordella*); Syst. Nat. ed. XIII, 1767, I, 2, p. 682 (*Mordella*). — Ph. L. St. Müll. Linn. Natursyst. V, I, 1774, p. 385 (*Mordella*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 262 (*Mordella*); Spec. Ins. I, 1781, p. 332 (*Mordella*); Mant. Ins. I, 1787, p. 218 (*Mordella*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 111 (*Ripiphorus*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 119 (*Ripiphorus*). — Goczc, Ent. Beytr. I, 1777, p. 708 (*Mordella*). — Villers, Linn. Ent. I, 1789, p. 405 (*Mordella*). — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 224 (*Mordella*). — Gmel. Linné's Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1792, p. 2022 (*Mordella*). — Frolich, Naturf. XXVI, 1792, p. 164 (*Mordella*). — Ol. Encycl. méth. VII, 1792, p. 737 (*Mordella*); Ent. III, 1795, 65, p. 7, t. I, f. 7 ♂ (*Ripiphorus*); Nouv. Dict. Hist. Nat. XIX, 1803, p. 407 (*Ripiphorus*). — Herbst, Natursyst. VI, 1795, p. 181 (*Mordella*). — Panz. Faun. Ins. Germ. 26, 1796, p. 14 ♂; Index Ent. I, 1813, p. 149 (*Ripiphorus*). — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 177 ♂ ♀ (*Ripiphorus*). — Latr. Hist. Nat. Ins. Col. X, 1804, p. 411 (*Ripiphorus*); Nouv. Dict. Hist. Nat. XXIX, 1819, p. 303 (*Ripiphorus*). — Ill. Magaz. III, 1804, p. 177; I. c. V, 1806, p. 234 (*Ripiphorus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 2, 1810, p. 619 (*Ripiphorus*). — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 79 (*Ripiphorus*). — Lam. Hist. Nat. Anim. sans Vertébrés IV, 1817, p. 424 (*Ripiphorus*). — Lepel. & Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 291 (*Ripiphorus*). — Dum. Dict. Sc. Nat. XLV, 1827, p. 373 (*Ripiphorus*). — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 51 (*Ripiphorus*); Man.

*Meteocetus*

- javanicus Pic (Rhipiphorus) Mélanges v. 1913 p. 17. Java.  
✓ satanas Schilder, D. E. Z. 1920. p. 238 Tibet  
morawitzi Sem. (Rhipiph.) Sem. Rev. Russ. Ent. 21. 1927. p. 233.



Brit. Col. 1839, p. 334 (*Ripiphorus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 261, t. 20, f. 3 (*Ripiphorus*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 612; l. c. ed. II, 1858, p. 649; l. c. ed. III, 1874, II, p. 168. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 18, t. 1, f. 10. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 255. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 453. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 629. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 412, t. 91, f. 455 ♀. — C. G. Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 347. — Seidl. Fauna Balt. 2. Aufl. 1887—91 (1890), Art. p. 540; Fauna Transsyrv. 1888—91 (1891), Art. p. 581. — Stierl. Käf.-Fauna d. Schweiz II, 1898, p. 35. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 35. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 307, fig. 95. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383, t. 127, f. 4. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761, t. 23, f. 33. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710, f. 4.

**Biologie:** Ramdohr in Germ. Magaz. I, 1813, p. 137. — Bond, Ent. Mag. IV, 1837, p. 225. — Hope, Zool. Journ. V, 1835, p. 606. — Westw. Introd. mod. Class. Ins. I, 1839, p. 294; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864—66 (1864), Proc. p. 49. — Hampe, Wien. Ent. Monatschr. III, 1861, p. 69. — Stone, Ent. Monthly Mag. I, 1864—65, p. 118; Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1864—66 (1864), Proc. p. 48. — Fr. Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 393; l. c. (4) V, 1870, p. 198. — A. Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 346; l. c. (4) V, 1870, p. 83. — Chapman, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 191; l. c. (4) VI, 1870, p. 314, t. 16; Ent. Monthly Mag. (2) II (XXVII), 1891, p. 18; Ent. Rec. 1897, p. 321. — A. Rouget, Mém. Ac. Sc. Dijon (2) IV, 1855, p. 113; l. c. (2) VI, 1856, p. 1; l. c. (2) VII, 1858—59, p. 1; l. c. (3) I, 1873, p. 229; Pet. Nouv. Ent. I, 1869—75 (1873), p. 336, 351; Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. VII. — Dubois, Bull. Soc. Linn. N. France IV, 1879, p. 362; Bull. Ins. agr. Paris V, 1880, nr. 2. — Gradl, Ent. Nachr. V, 1879, p. 224, 326; l. c. VIII, 1882, p. 323; l. c. IX, 1883, p. 68. — Erné, Mittb. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76 (1876), p. 556. — Hoffer, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 45; l. c. XI, 1885, p. 33. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 94. — Everts, Tijdschr. v. Ent. XXVII, 1884, Versl. p. 88; Col. Neerl. II, 1903, p. 306. — Delaby, Bull. Soc. Linn. N. France VII, 1885, p. 198. — Fricken, Natur u. Offenb. XXXVI, 1890, p. 193. — E. A. Butler, Ent. Monthly Mag. XXX, 1894, p. 235. — Tuck, Ent. Monthly Mag. XXXIII, 1897, p. 59; Ent. Rec. X, 1898, p. 23. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 268. — Bag-nall, Ent. Monthly Mag. XL, 1904, p. 159. — Crawshaw, Ent. Monthly Mag. XLI, 1905, p. 45.

- Elliot et Morley, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 7. — Reineck, Ent. Rundschau XXVII, 1910, p. 89. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761. — Fowler, Fauna Brit. Ind. et Ceyl. Col. Introd. et Cicind. 1912, p. 169.  
*affinis* Fisch.-Waldh. Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 1832, p. 427, t. 5, f. 3—4.  
*angulatus* Panz. Faun. Ins. Germ. 90, 1805, p. 3 (*Ripiphorus*).  
*erythrogaster* Froel. Naturf. XXVI, 1792, p. 163 (*Mordella*).  
ab. *abdominalis* Gradl, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 326. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVII, 1901, p. 35. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 306. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.  
ab. *apicalis* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.  
ab. *flavoniger* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.  
ab. *Gradli* Schilsky, l. c. p. 35. — Kuhnt, l. c. p. 710.  
ab. *macularis* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761.  
ab. *nigrescens* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.  
ab. *nigriventris* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.  
ab. *notiventris* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.  
ab. *semiflavus* Gradl, l. c. p. 326. — Schilsky, l. c. p. 35. — Everts, l. c. p. 306. — Schauf. l. c. p. 761. — Kuhnt, l. c. p. 710.

<sup>2</sup> var. *Schuldes*, 1924 (beer)

### Rhipiphorus Bosc.

Bosc, Journ. Hist. Nat. II, 1792, p. 293. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 383.

*Dorthesia* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 274; Complete Writings II, 1859, p. 162.

*Myodes* Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. éd. II, XXII, 1818, p. 130.

*Myodites* Latr. l. c. XXIX, 1819, p. 302 nota. — Gerst. Rhipiph.

disp. syst. 1855, p. 15. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III,

1856, p. 465. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 630. — Jacq.

du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 414, 418. — Redtb.

Fauna Austr. ed. III, 1874, I, p. CXXV et II, p. 167. — J. Lec.

Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Seidl. Fauna Balt.

ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsyrv. 1888—91

(1891), Gatt. p. 143.

*Myodites* (Röhrs)

- maynei Schout. Rev. Zool Afr. 10. 1913. p. 117. Congo.  
turcicus Pie (Syrriacus var.) Echauge 30. 1917. p. 42.  
distinctithorax Pie Mélanges 9. 1914. Tonkin.  
† buonaiensis Cockll. Ann. Ent. Soc. Amer. 11. 1917. p. 22. (amber)  
tuberculatus Pie Ech 39. 1924. p. 21. Tonkin  
boucheti Pie. Mel. Hb. 1926. p. 17. Argentine.  
v. diversipes Pie l.c.

as number 3291 in 2nd lot. T. &  
12 Nov. 1929. A. E. G. M. T. & C.

as above. R. 1397 in 3rd lot. T. &

convergatus Heller. Tyd. v. Ent. 1920 p. 171. fig 2 Phil. Isd.

ciliatus Heller. (Rhombus) loc. 172. f 3 Habel

Idem. R. 1920 31. 21 Oct. 1929. T.

Krause Peck, Ent. News 31. 1920 p. 279

Utah. = Metocetus T. & C. 1929

[Morawitz Sem.

] Metocetus q.v.

seen in Museum

as above. R. 1929 p. 21. No. 250. No. more

no. 1. No. 1. 0

st Alabama

no. 1. No. 1. 0

st Nevada

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <i>Rhipidophorus</i>    | Gemm. & Harold, Cat. Col. VII, 1870, p. 2123<br>[emend.] — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93<br>(1891), p. 359.   |                     |
| <i>acutipennis</i>      | Pierce, Stud. Univ. Nebraska IV, 1904, p. 163.  | Nordamerika         |
| <i>apicalis</i>         | Waterh. Cist. Ent. I, 1869—76 (1875), p. 370<br>( <i>Myodites</i> ).  | Bombay              |
| <i>Bequaerti</i>        | Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13<br>(1913), p. 163.  | Kongo               |
| <i>Büttikoferi</i>      | Rits. Not. Leyd. Mus. X, 1890, p. 12 ( <i>Myodites</i> ). — Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 166.   | Liberia             |
| <i>caffer</i>           | Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 16 ( <i>Myodites</i> ). — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, 1896, p. 456. — Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 166.       | Kafferland,<br>Aden |
| <i>californicus</i>     | J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210, 211 ( <i>Myodites</i> ).   | Kalifornien         |
| <i>coniceps</i>         | Pic, Échange XXIX, 1913, p. 99. — Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 165, 166.  | Chari-Tchad         |
| <i>Davidis</i>          | Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 124 ( <i>Myodites</i> ).   | China               |
| <i>fasciatus</i>        | Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 274 ( <i>Dorthesia</i> ). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17 ( <i>Myodites</i> ). — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. | Nordamerika         |
|                         | <i>americanus</i> Guér. Dict. class. d'Hist. nat. XI, 1844, p. 369; Icon. règne anim. 1829—44, t. 34, f. 5 ( <i>Myodites</i> ).   |                     |
|                         | var. <i>brunneus</i> Pierce, Stud. Univ. Nebraska IV, 1904, p. 160.   | "                   |
| <i>flavicornis</i>      | Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 274 ( <i>Dorthesia</i> ); Complete Writings II, 1859, p. 162. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17 ( <i>Myodites fasciatus</i> var.).    | Pennsyl-vanien      |
| <i>flaviventris</i>     | Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 361, t. 16, f. 21.   | Guatemala           |
| <i>hyalinus</i>         | Champ. l. c. p. 363, t. 16, f. 24.  | Mexiko              |
| <i>laevicollis</i>      | Champ. l. c. p. 360, t. 16, f. 20.  | "                   |
| <i>minimus</i>          | Pierce, Stud. Univ. Nebraska IV, 1904, p. 159.  | Nebraska            |
| <i>nevadicus</i>        | J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210, 211.   | Nevada, Neumexiko   |
| <i>niger</i>            | C. O. Waterh. Cist. Ent. I, 1869—76 (1875), p. 396 ( <i>Myodites</i> ). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 362, t. 16, f. 23.                                 | Mexiko, Guatemala   |
| <i>Popenoei</i>         | J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210.  | Kansas              |
| <i>rex</i>              | Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 360, t. 16, f. 19.   | Mexiko              |
| <i>Rodhaini</i>         | Schouteden, Rev. Zool. Afric. II, 1912—13 (1913), p. 163, 166.  | Kongo               |
| <i>rugosus</i>          | C. O. Waterh. Cist. Ent. I, 1869—76 (1875), p. 369 ( <i>Myodites</i> ).   | Kolumbien           |
| <i>Saneti-Vincentis</i> | Champ. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 51 ( <i>Saneti-Vicentis</i> ).   | St. Vincent         |
| <i>scaber</i>           | J. Lec. Proc. Acad. Sc. Philad. VI, 1852, p. 67; l. c. 1865, p. 96; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 17 ( <i>Myodites</i> ).         | Neumexiko           |

- Schwarzii** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210, 211 (*Myodites*); l. c. Proc. p. XXIII.  
**Zeschi** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210, 211 (♀); Bull. Buff. Soc. IV, 1881, p. 28, t. 1, f. 3—4.
- ? — **semiflavus** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1865, p. 97; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210.
- **simplex** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—93 (1891), p. 363, t. 16, f. 25.
- solidaginis** Pierce, Canad. Ent. XXXIV, 1902, p. 293. Biologie: Pierce, Stud. Univ. Nebraska IV, 1904, p. 183, t. 1—2. — Silvestri, Redia III, 1905, p. 323, t. 20, f. 17, 18.
- **stylopides** Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 376 (*Myodites*). — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210.
- **subdipterus** Bosc, Journ. d'Hist. Nat. II, 1792, p. 293. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 109 (*Ripiphorus*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 118 (*Ripiphorus*). — Ol. Ent. III, 1795, 65, p. 4, t. 1, f. 1, b—c ♂, d—e ♀. — Panz. Fauna Ins. Germ. 97, 1809, nr. 7. — Blanch. Règne anim. Ins. t. 53 bis, f. 6. — Schönh. Syn. Ins. III, 1817, p. 79. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 292 (*Myodites*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 262 (*Myodites*). — Küst. Käf. Eur. XIX, 1849, p. 61. — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 16, t. 1, f. 9 (*Myodites*). — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) III, 1856, p. 465 (*Myodites*). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe III, 1859—63, p. 414, t. 92, f. 457 ♂, f. 458 ♀. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 167. — Pic, Échange XXI, 1905, p. 165. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 761, t. 23, f. 35 ♂, f. 36 ♀.
- Biologie: Fabre, Compt. R. Acad. Sc. Paris 1889, p. 1081; Ann. Sc. Nat. Zool. (6) IX, 4, 1879, p. 27; Souvenirs III, 1886, p. 220. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 14. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 223, 240, f. A—E. — Escal. Assoc. Espan. Zaragoza, 4. Sec. III, 1910, p. 352.
- ambiguus** Giorna, Mem. Accad. Torino VII, 1791, p. 223, t. 2, f. 3, 4 (*Mordella*).
- Dorthesi** Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXII, 1818, p. 131 (*Myodes*); l. c. ed. II, XXIX, 1819, p. 302 (*Myodites*).
- var. **Babadjanidesi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 43 (*Myoides*).
- var. **caucasicus** Reitt. Cat. Col. Eur. Cauc. et Arm. ross. ed. II, 1906, p. 453.
- Antoniae** Pic, Échange XXI, 1905, p. 165 (non Reitt.); l. c. XXIII, 1907, p. 122.
- var. **Clermonti** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 224; l. c. 1907, p. 154. — Pic, Échange XXIII, 1907, p. 122.
- var. **pallescens** Solsky, Trudy Soc. Ent. Ross. XIII, 1881, p. 57. — Chob. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 42; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 154.

Florida,  
New York

Maryland

Mexiko

Nebraska

Nordamerika

Südeuropa

Trans-  
kaukasus  
Kaukasus

Turkestan

*sentellaris* Heller. Tyd. Ent. 1920. p. 173. fig. 4. Phil. Jds.

*Hemirhipidium*

Heller Tijdschr. v. Ent. 1920. p. 168.

*Hemirhipidius* Heller I.c., Ent. Mitt. 10. 1921. p. 196. (to Melordae)

*H. nigroapicalis* Heller P.c. fig. 1 n. A. w.

Pars 54

Rhipiphorus. — Rhipidius.

23

|  |  |
|--|--|
| var. <i>syriacus</i> Pic, Échange XX, 1904, p. 90; l. c.<br>XXI, 1905, p. 165. — Chob. Bull. Soc. Ent.<br>Fr. 1906, p. 224.  | Syrien   |
| — <i>tuberculatus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—<br>93 (1891), p. 362, t. 16, f. 22.  | Mexiko   |
| — <i>valdivianus</i> Philippi, Anal. Univ. Santiago 1861, p. 742.<br><i>chilensis</i> Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent.<br>Fr. (4) III, 1863, p. 258 ( <i>Myodites</i> ).<br>Vierecki Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907,<br>p. 259. | Chile  |
| Walshi J. Lee. Proc. Acad. Philad. 1865, p. 97; Trans.<br>Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210.  | Neumexiko,<br>Arizona<br>Illinois,<br>New York |

32

### 3. Rhipidiini.

- Rhipidioides* Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 632.  
*Rhipidiini* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14. — Seidl. Fauna  
Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv.  
1888—91 (1891), Gatt. p. 142.  
*Rhipidioides* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 415, 417.

#### *Rhipidioides* P.

- Caticollis* Pic, Rev. Zool. Afr. III. 1913. p. 162 Congo.  
*guttatus* Pic (Rhipiphorus) Melanges V. 1913. p. 17 Java.  
 no. Lee, Trans. R. Soc. S. Afric. H. 1917. p. 253 Queenld.

Hemithipidiinae  
Heller Tijdschr. v Ent. 1920. p. 168.  
Hemithipidius Heller sp. n., Ent. Mitt. 1921. p. 196. (f. Meloidae)  
H. nigroapicalis Heller sp. n. fig. 1 n. sp.

|  |  |
|--|--|
| var. <i>syriacus</i> Pic, Échange XX, 1904, p. 90; l. c.<br>XXI, 1905, p. 165. — Chob. Bull. Soc. Ent.<br>Fr. 1906, p. 224.  | Syrien   |
| — <i>tuberculatus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 2, 1889—<br>93 (1891), p. 362, t. 16, f. 22.  | Mexiko   |
| — <i>valdivianus</i> Philippi, Anal. Univ. Santiago 1861, p. 742.<br><i>chilensis</i> Fairm. & Germain, Ann. Soc. Ent.<br>Fr. (4) III, 1863, p. 258 ( <i>Myodites</i> ).<br>Vierecki Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907,<br>p. 259. | Chile  |
| Walshi J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1865, p. 97; Trans.<br>Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 210.  | Neumexiko,<br>Arizona<br>Illinois,<br>New York |

32

### 3. Rhipidiini.

*Rhipidiides* Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 632.

*Rhipidiini* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14. — Seidl. Fauna  
Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Gatt. p. 142; Fauna Transsylv.  
1888—91 (1891), Gatt. p. 142.

*Rhipidiites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 415, 417.

#### Blattivorus Chob.

Chob. Le Coléoptériste I, 1891, p. 237; Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894,  
p. 145; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230.

*lusitanicus* Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 15 (*Rhi-*  
*pidius*). — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230.  
*madagascariensis* Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 203.

2

#### Rhipidius Thunb. [emend.]

Thunb. Vet. Ak. Nya Handl. XXVII, 1806, p. 5 (*Ripidius*). — Gerst.  
Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14. — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III,  
1856, p. 245, 254. — Redtb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 647; l. e. ed. III,  
1874, I, p. CXXV et II, p. 167. — Lacord. Gen. Col. V, 1, 1859, p. 632.  
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 415, 418. — Gemm. &  
Har. Cat. Col. VII, 1870, p. 2123. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1887—91  
(1890), Gatt. p. 143; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 143.  
— Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 145; Bull. Soc. Ent. Fr.  
1904, p. 230. — A. Semen. Rev. Russe d'Ent. II, 1902, p. 258. — Reitt.  
Fauna Germ. III, 1911, p. 384. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl.  
1912, p. 760. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 709.

*Rhipiphorus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, App. p. 427.  
*Symbius* Sundevall, Isis XI, 1831, p. 1222.

Abeillei Chob. Le Coléoptériste I, 1891, p. 235, tab.;  
Mém. Acad. Vaucluse XI, 1892, p. 219; Ann.  
Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 149; Bull.  
Soc. Ent. Fr. 1904, p. 232. — Kraatz, Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1891, p. 358, t. 5, f. 3.

apicipennis Kraatz, Deutsche Ent. Ztschr. 1891, p. 358,  
t. 5, f. 1. — Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV,  
1894, p. 148; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 231.  
— Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 384. —  
Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 760.

Thüringen

- Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710.
- Australasiae** Blackb. Trans. R. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 59.
- Boissyi** Ab. Compt. rend. Soc. Biol. LXVII, 1909, p. 854.  
— Roubal, Acta Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 59.
- Fairmairei** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1894, p. CI; l. c. 1904, p. 230; Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148.
- Guignoti** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 228, 232, 284.  
**kabylianus** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 89; l. c. 1904, p. 231.
- natalensis** Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 15. — Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 231.
- parisiensis** Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 182; Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 422, f. 3—4. — Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 231.
- pectinicornis** Thunbg. Vet. Ak. Nya Handl. XXVII, 1806, p. 5, t. 2, f. 1—5 (*Ripidius*). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 416, t. 92, f. 459. — Redtb. Fauna Austr. ed. III, 1874, II, p. 167. — Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 349. — Seidl, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1890), Art. p. 540; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 581. — Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 232. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 269. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 384, t. 127, f. 3. — Schauf. in Calwer's Käferb. 6. Aufl. 1912, p. 760. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 710, fig.
- anceps** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, App. p. 427 (*Ripiphorus*).
- blattarum** Sundevall, Isis XI, 1831, p. 1222, fig. (*Symbius*). — Gerst. Rhipiph. disp. syst. 1855, p. 14, f. 8 (*Ripidius*). — Redt. Fauna Austrica 1849, p. 612 (*Ripidius*). — Bach, Käferf. Nord- u. Mitteldeutschl. III, 1856, p. 255. — Seidl, Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Art. p. 581 nota (? spec. propria).
- Biologie:** Sundevall, Isis XI, 1831, p. 1222. — Westw. Introd. mod. class. Ins. I, 1839, p. 295, f. 32 (20—22). — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 149.
- quadriceps** Ab. Étud. Col. Cavern. 1872, p. 36; Abeille XII, 1875, p. 81. — Chob. Le Coléoptériste I, 1891, p. 236, tab.; Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 148; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 231 (*quadraticeps*). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 360, t. 5, f. 2. — Lesne, Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 422, f. 1—2.
- thoracicus** Waterh. Cist. Ent. I, 1869—76 (1875), p. 370. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 252; Échange XXVI, 1910, p. 63.
- Vaulogeri** Chob. Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 99; Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 149; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 232, 284.

Australien

Provence

Sansibar

Seascalpen  
Algier

Natal

Frankreich

Europa,  
Ostindien

Frankreich

Java

Algier

*R. collaris* Skell. Tijdschr. v. Entom. 63. 1920. p. 172. fig. Makal  
semibellaris Skell. " 173 " Luzon.



Pars 54

Pseudorhipidius. — Nephrites.

25

**Pseudorhipidius** Chob.

Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, p. 145 (*Rhipidius* subg.); Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230.

**canaliculatus** Chob. Ann. Mus. Genova XXXIV, 1894, Birma  
p. 145; Bull. Soc. Ent. Fr. 1904, p. 230.  
1

**Trichopleurias** J. Sahlbg.

J. Sahlbg. Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XLV, 1902—03, nr. 10, p. 35.  
**deserti** J. Sahlbg. l. c. p. 36. Transcaspien  
1

**Rhizostylops** Silvestri.

Silvestri, Redia III, 1905, p. 315.

**inquirendus** Silvestri, l. c. III, 1905, p. 315, 322, t. 20, Italien  
f. 1—8 ♀, f. 9—16 triung. — Porta, Riv. Col.  
Ital. V, 1907, p. 23.

1 R. 80 inquirendus

**Aporrhipis** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 18.

**flexilis** Pasc. l. c. p. 18, t. 1, f. 1. Brasilien  
1

**Nephrites** Shuck. = Nephrites Bla

Shuckard, Ent. Mag. V, 1838, p. 512.

**nitidus** Shuck. l. c. p. 513. Tasmanien

1  
232

S.

*Rhipiphoridae* Pl. 54

## Index.

### Tribus, Genera, Subgenera.

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| • <i>Ancholaemus</i> Gerst. 8      | • <i>Pelecotoides</i> Cast. 4          |
| • <i>Aporrhipis</i> Pasc. 25       | • <i>Pelecota</i> Fisch. 7             |
| • <i>Blattivorus</i> Chob. 23      | • <i>Pelecotomini</i> 3                |
| • <i>Caspyria</i> Fairm. 4         | • <i>Pelecotomoides</i> Cast. 4        |
| • <i>Clinops</i> Gerst. 7          | • <i>Pseudorhipidius</i> Chob. 25      |
| • <i>Ctenidia</i> Cast. 3          | • <i>Ptilophorus</i> Gerst. 8          |
| • <i>Dorthesia</i> Say 20          | • <i>Rhipidiini</i> 23                 |
| • <i>Dunbrodianus</i> Pic 4        | • <i>Rhipidius</i> Thunbg. 23          |
| • <i>Emenadia</i> Cast. 10         | • <i>Rhipidophorus</i> Gemm. & Har. 21 |
| • <i>Euctenia</i> Gerst. 8         | • <i>Rhipiphorini</i> 9                |
| • <i>Evaniocera</i> Guér. 8        | • <i>Rhipiphorus</i> Bosc. 20          |
| • <i>Geoscopus</i> Gerst. 6        | • <i>Rhipiphorus</i> F. 10, 18         |
| • <i>Indiogeoscopus</i> Pic 7      | • <i>Rhipistena</i> Sharp 4            |
| • <i>Macroscagon</i> Hentz 10      | • <i>Rhizostylops</i> Silv. 25         |
| • <i>Madrasindus</i> Pic 4         | • <i>Rhypisterna</i> Broun 4           |
| • <i>Metoeetus</i> Gerst. 18       | • <i>Ripidius</i> auct. 23             |
| • <i>Micropelecotoides</i> Pic 6   | • <i>Ripiphorus</i> auct. 20           |
| • <i>Micropelecotomoides</i> Pic 6 | • <i>Scotoscopus</i> Reitt. 6          |
| • <i>Myodes</i> Latr. 20           | • <i>Setosicornia</i> Pic 4            |
| • <i>Myodites</i> Latr. 20         | • <i>Sharpia</i> Broun 4               |
| • <i>Nephrites</i> Shuck. 25       | • <i>Sharpides</i> Kirk. 4             |
|                                    | • <i>Siagonidia</i> Reitt. 18          |
|                                    | • <i>Symbius</i> Sund. 23              |
|                                    | • <i>Toposcopus</i> J. Lec. 8          |
|                                    | • <i>Trichopleurias</i> Sahlbg. 25     |
|                                    | • <i>Trigonodera</i> Gerst. 4          |

### Species, Varietates.

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <i>abdominale</i> J. Lec. 13 | • <i>acutipennis</i> Pierce 21 |
| <i>abdominalis</i> Gradl 20  | • <i>affine</i> Gerst. 10      |
| <i>Abeillei</i> Chob. 23     | • <i>affinis</i> Fisch. 20     |
| <i>abyssinicum</i> Pic 10    | • <i>ambiguum</i> Melsh. 14    |
| <i>acuminatum</i> Gerst. 10  | • <i>ambiguus</i> Giorna 22    |
| <i>acuminatus</i> Fairm. 8   | • <i>americanus</i> Guér. 21   |

*Hemirhynchius* Heller. ~~Erectil.~~ 23.



*anceps* Steph. 24  
*angulata* Wood 4  
*angulatus* Panz. 20  
*angustissimum* Pic 13  
*angustulum* Motsch. 16  
*Antoniae* Pic 22  
*Antoniae* Reitt. 18  
*apicale* Fisch. 16  
*apicale* Küst. 15  
*apicale* Westw. 11  
*apicalis* Gradl 20  
*apicalis* Waterh. 21  
*apicipennis* Kraatz 23  
*argentina* Pic 4  
*argentinum* Fairm. 10  
*armatum* Waterh. 10  
*attenuatum* Gerst. 10  
*attenuatus* Pic 8  
*aureotincta* M'Leay 5  
*Australasiae* Blackb. 24  
*axillare* Gerst. 10

*Babadjanidesi* Reitt. 22  
*badia* Gerst. 7  
*Baeri* Pic 10  
*basale* Gerst. 10  
*basicolle* Fairm. 10  
*Benschi* Alluaud 10  
*Bequaerti* Schout. 21  
*bicolor* Cast. 10  
*bicolor* Ol. 16  
*bicolor* Say 14  
*bifasciatum* Mars. 10  
*bifoveatum* Horn 10  
*biguttatum* Blanch. 10  
*biguttatum* Gerst. 10  
*biguttulum* Gemm. 10  
*bimaculatum* F. 16  
*binotatum* Fisch. 17  
*bioculata* Shuck. 5  
*Biolleyi* Pic 10  
*bipartitum* Fairm. 10  
*bipunctatum* Costa 14  
*bipunctatum* F. 11  
*bisbinotatum* Pic 11  
*bistriata* Gerst. 5  
*bivittata* Champ. 5  
*blattarum* Sund. 24  
*Boissyi* Ab. 24  
*Boryi* Luc. 9  
*brasiliense* Pic 11  
*brevicornis* Pic 5  
*brunneus* Pierce 21  
*Büttikoferi* Rits. 21  
  
*caffer* Gerst. 21  
*caffrum* Fähr. 11  
*californicus* J. Lec. 21  
*canaliculatus* Chob. 25

*capensis* Bat. 7  
*capensis* Gerst. 8  
*capito* Blackb. 11  
*carbonarius* Reitt. 6  
*carinicollis* Fauv. 11  
*carinipenne* Champ. 11  
*carinthiacum* Panz. 17  
*caucasicus* Reitt. 22  
*Championi* Blackb. 11  
*chilensis* Fairm. & Germain 23  
*Clermonti* Chob. 22  
*coniceps* Pic 21  
*conicollis* Cast. 5  
*cordigerum* Gerst. 11  
*cruentum* Germ. 11  
*cryptarthra* Broun 4  
*cucullatum* M'Leay 11  
*cyaniveste* Mars. 11  
  
*Davidis* Fairm. 21  
*deserti* Sahlbg. 25  
*difficile* Blackb. 11  
*dimidiatum* F. 11  
*discicolle* Gerst. 11  
*dispar* Gerst. 12  
*diversiceps* Blackb. 12  
*Donceeli* Pic 12  
*Dorthesi* Latr. 22  
*dubium* Melsh. 14  
*Dufouri* Latr. 8  
  
*elegans* Mars. 12  
*erythrogaster* Froel. 20  
*excavatum* Champ. 12  
  
*Fairmairei* Chob. 24  
*fasciatum* Gerst. 16  
*fasciatum* Melsh. 14  
*fasciatus* Say 21  
*fenestratum* Gerst. 12  
*fennica* Payk. 7  
*ferrugineum* F. 12  
*Fischeri* Mén. 9  
*Fischeri* Shuck. 5  
*flabellatum* F. 12  
*flavicornis* Say 21  
*flavipenne* J. Lec. 13  
*flavipes* Melsh. 7  
*flaviventris* Champ. 21  
*flavoniger* Gradl 20  
*flexilis* Pasc. 25  
*Fortieri* Chob. 13  
*Frivaldszki* Guér. 9  
*Frivaldszkyi* Guér. 9  
*fulvipenne* Küst. 15  
*fulvosericans* Fairm. 5  
  
*Gayi* Gerst. 13  
*Gerstaekeri* Harold 13

- Gerstaeckeri* M'Leay (Evan.) 9  
*Gerstaeckeri* M'Leay (Pelecot.) 5  
*gibbiferum* Ab. 16  
*gigantea* Cast. 6  
*Gounellei* Pic 5  
*Gradli* Schilsky 20  
*Grombczewskii* Semen. 13  
*Guignoti* Chob. 24
- Hauseri* Reitt. 9  
*helva* Perty 5  
*hirtella* Broun 4  
*holosericea* Montrz. 5  
*humeratum* F. 15  
*hyalinus* Champ. 21
- impressithorax* Pic 5  
*impressum* Melsh. 15  
*infernum* Schauf. 13  
*inquirendus* Silv. 25  
*interiore* Blackb. 13  
*italicum* Bed. 14
- japonica* Pic 6
- kabylianus* Chob. 24
- laevicollis* Champ. 21  
*languidus* Walk. 6  
*larvatum* Schrnk. 16  
*latelineata* Pic 5  
*Latreillei* Fisch. 7  
*Latreillei* Lep. & Serv. 5  
*Leachi* Latr. 6  
*Le Moulti* Pic 5  
*Leseleuci* Pic 13  
*limbatum* F. 13  
*lineare* J. Lec. 13  
*lineata* Champ. 5  
*lineatus* Pic 4  
*lituratum* F. 17  
*longicollis* Pic 4  
*longipes* Melsh. 15  
*lugubre* Fairm. 13  
*lugubris* Sharp 4  
*lusitanicus* Gerst. 23  
*lutea* Gerst. 5  
*luteipenne* J. Lec. 13  
*luteipenne* M'Leay 13  
*luteopubens* Pic 5  
*Lyanteyi* Alluaud 13  
*lyciformis* Gerst. 8
- Mac Leayi* Csiki 13  
*macularis* Gradl 20  
*maculata* Cast. 5  
*maculicolle* Boh. 13  
*maculipennis* Luc. 5  
*madagascariensis* Chob. 23
- major* Quedenf. 16  
*malaccana* Pic 5  
*Marcelli* Alluaud 13  
*marginale* J. Lec. 11  
*marmorata* M'Leay 5  
*Mastersi* M'Leay 5  
*maxillosum* Melsh. 15  
*medanum* Pic 13  
*melanopterum* Chevrol. 12  
*melanurum* Fairm. 13  
*meridionale* Costa 14  
*Meyricki* Blackb. 9  
*minimus* Pierce 21  
*minor* Fairm. 5  
*minuta* Blackb. 9  
*Morawitzi* Semen. 14  
*mordelloides* Cast. 3  
*mosquensis* Fisch. 7  
*multilineatus* Pic 7  
*multinotatum* Pic 14  
*murina* Blanch. 5  
*murinus* Gerst. 7  
*mutilatum* Gerst. 12
- nasutum* Thunbg. 14  
*natalensis* Gerst. 24  
*nebulosa* Champ. 5  
*nervosa* Gerst. 9  
*nevadicus* J. Lec. 21  
*niasensis* Pic 5  
*niger* Waterh. 21  
*nigrescens* Gradl 20  
*nigricolle* Betta 17  
*nigricorne* F. 15  
*nigripenne* Gerst. 10  
*nigrithorax* Fisch. 17  
*nigriventris* Gradl 20  
*nigronotatum* Pic 14  
*nigrum* Melsh. 14  
*nitidus* Shuck. 25  
*notiventris* Gradl 20  
*Novae-Hollandiae* Gerst. 14  
*novemflabellata* Sahlbg. 9  
*nubila* Gerst. 5  
*nuda* Gerst. 5
- Oberthüri* Fairm. 14  
*obscuricolor* Pic (Macros.) 14  
*obscuricolor* Pic (Pelecot.) 6  
*obscuriventris* Pic 4  
*occidentalis* Blackb. 8  
*octomaculatum* Gerst. 14
- pallidicolor* Pic 6  
*pallidipenne* Reitt. 18  
*pallidipennis* Lea 9  
*pallipes* Gerst. 5  
*paradoxus* L. 18





- parisiensis* Lesne 24  
*pectinatum* F. 14  
*pectinatum* Vill. 12  
*pectinicornis* Thunbg. 24  
*Perrieri* Fairm. 6  
*persimilis* Blackb. 9  
*perthensis* Blackb. 9  
*pictipenne* Lea 15  
*plumicornis* Reitt. 9  
*Popenoei* J. Lec. 21  
*praeustum* Gebl. 15  
*pruinosa* Fairm. 6  
*pruinosa* Gerst. 9  
*punctatum* F. 15  
*puncticeps* J. Lec. 14  
*punctulatum* Blackb. 15  
*pusillum* Gerst. 15  
  
*quadraticeps* Chob. 24  
*quadriceps* Ab. 24  
*quadrimaculatum* Gerst. 12  
*quadrimaculatum* Gyllh. 17  
  
*Raffrayi* Fairm. 15  
*reductum* Pic 10  
*rex* Champ. 21  
*Rodhaini* Schout. 21  
*Rouyeri* Pic 6  
*rubri thorax* Pic 6  
*rubropictum* Perty 15  
*rufipenne* Chevrol. 15  
*rufipenne* Sol. 13  
*rufum* J. Lec. 11  
*rugosus* Waterh. 21  
  
*Sancti-Vincentis* Champ. 21  
*sanguinolentum* Germ. 15  
*Sayi* J. Lec. 14  
*scaber* J. Lec. 21  
*Schwarzii* J. Lec. 22  
*scutellare* Gerst. 15  
*semiflavus* Gradv. 20  
*semiflavus* J. Lec. 22  
*semipunctatum* Lea 15  
*senilis* Gerst. 6  
*sericea* Gerst. (Euct.) 8  
*sericea* Gerst. (Pelecot.) 6  
*serraticornis* M'Leay 6  
*sexmaculatum* F. 14  
*signaticolle* Pic 15  
*signaticollis* Gerst. 6  
*sikkimensis* Pic 4  
*simplex* Champ. 22  
*simplicicornis* Fairm. 6  
*sobrinum* Waterh. 16  
  
*sodale* Waterh. 16  
*solidaginis* Pierce 22  
*sordidum* Gerst. 16  
*spectabilis* Schauf. 7  
*spinicolle* Fairm. 16  
*spinipenne* Gerst. 16  
*spinosum* F. 16  
*Steveni* Fisch. 9  
*strigata* Cast. 6  
*striolata* Now. 9  
*stylopides* Newm. 22  
*subdipterus* Bose 22  
*succincta* Germ. 6  
*sulcata* Pic 6  
*sulcatum* Mén. 15  
*sulciceps* Broun 4  
*sulcicollis* Gerst. 6  
*sumatrense* Pic 16  
*sumatrensis* Pic 6  
*suturale* Betta 17  
*syriacus* Pic 23  
  
*tarsatum* F. 16  
*terminatum* Cast. 16  
*testaceicorne* Pic 16  
*thoracicum* Melsh. 15  
*thoracicus* Waterh. 24  
*tonkinum* Pic 17  
*tricolor* Gerst. 16  
*tricuspidatum* Lepech. 16  
*trisignatum* Gerst. 17  
*triste* F. 15  
*tropicum* Nietn. 11  
*tuberculatus* Champ. 23  
*tucumanense* Pic 17  
  
*uniforme* Motsch. 13  
*usambarensis* Pic 15  
  
*valdivianus* Philippi 23  
*variabile* Gerst. 17  
*varicolor* Gerst. 15  
*variocolle* Fairm. 17  
*Vaulogeri* Chob. 24  
*ventrale* F. 15  
*Vierecki* Fall 23  
*Vitraci* Fleut. & Sallé 12  
*vittata* Gerst. 6  
*vittatum* Er. 17  
*vittula* Gerst. 17  
  
*Walshi* J. Lec. 23  
*Wrighti* J. Lec. 8  
  
*Zeschi* J. Lec. 22



**W. JUNK, Berlin W. 15.**

**W. JUNK**, Berlin W. 15.

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Pars 63:

E. Csiki

Mordellidae.

---

Einzel-Preis: Mark 7.90

Subscriptions-Preis: Mark 5.30



W. Junk  
Berlin W. 15.  
10. IV. 1915.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Entomologie Coleoptera](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [0061](#)

Autor(en)/Author(s): Junk W., Schenkling Sigmund, Csiki Ernst  
[Ernö]

Artikel/Article: [Coleopterorum Catalogus Pars 54: Rhipiphoridae](#)  
[1-29](#)