

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI
* I C O N E S
INSECTORVM
CIRCA R ATISBONAM
INDIGENORVM
COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.

VOLUMEN TERTIVM ET VLTIMVM.

CVM INDICE.

Natürliche ausgemahlte

A b b i l d u n g e n
Regensburgischer
Infecten.

Dritter und letzter Band.

Mit dem Register.



84L
466
S330
1779x
V.3
SCNH.2B

I N S E C T A
R A T I S B O N E N S I A.
VOL. III.

Regensburgifche
Infecten.
Dritter Band.

TABVLA CCI.
Zweyhundert und erste Tafel.

Fig. I. COPRIS corniger DECIMVS. MAS.
Zehender gehörnter Aftermaulwurfskäfer. Männchen.

Fig. II. COPRIS corniger VNDECIMVS. FEMINA.
Elfster gehörnter Aftermaulwurfskäfer. Weibchen.

Fig. III. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS SEXTVS.
Sechs und dreysigster Maulwurfskäfer mit dreypaltigen Fühlhörnern.

Fig. IV. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA SEXTA.
Sechszebender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschild.

Fig. V. LEPTVRA thorace plano DECIMA NONA.
Neunzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschild.

Fig. VI. LEPTVRA thorace plano VICESIMA.
Zwanzigster Afterholzkäfer mit flachem Brustschild.

TABVLA CCT.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



I G. Friedrich ex. Kadiz.

TABVLA CCH.




Fig. I.



Fig. II.




Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.

Lobistus pinnæ R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CCII.
Zweyhundert und zweyte Tafel.

Fig. I. PHALAEENA pedinicornis alis patentibus VNDECIMA.
Eilster Nachtfalter mit gekrümmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. II. III. a. b. MVSCA spathula antennarum rotunda QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis TRICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und dreysigster Maulwurfskäfer mit dreyfältigen Fühlhörnern.

Fig. V. CARABVS oblongus VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

TABVLA CCHI. Zweyhundert und dritte Tafel.

Fig. I. II. PHALAE NA *feticornis alis deflexis* TRICESIMA NONA.
Neun und dreysigster Nachtfalter mit borßigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.



Fig. III. SPHINX *alis angulatis* SEPTIMA.
Siebender Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA *thorace globoſo* DECIMA QVINTA.
Funzehender Afterholzkäfer mit kugelichem Brustsilde.

Fig. V. CERAMBYX DECIMVS NONVS.
Neunzehender Holzkäfer.

Fig. VI. STENOCORVS *thorace armato* SEPTIMVS.
Siebender Stutzkäfer mit stachelichem Brustsilde.

TABVLA CCIII.



Lacelit pinnata R.

I. G. E. sc. R.

TABVLA CCIIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Loisel pinxe. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CCIV.
Zweyhundert und vierte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus alis integris DECIMVS SEXTVS.*
Sechszebender vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. EPHEMERA *SEPTIMA.*
Siebende Vferaasfliege.

Fig. IV. a. b. BVPRESTIS *DECIMA SEPTIMA.*
Siebender Stinkkäfer.

Fig. V. BVPRESTIS *DECIMA OCTAVA.*
Achtzehender Stinkkäfer.

TABVLA CCV.
Zweyhundert und fünfte Tafel.

Fig. I. VROCERVS QVARTVS.
Vierte Schwanzfliege.

Fig. II. VROCERVS QVINTVS.
Fünfte Schwanzfliege.

Fig. III. VROCERVS SEXTVS.
Sechste Schwanzfliege.

Fig. IV. V. PHALAEENA *seticornis* alis *planis* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreysigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON OCTOGESIMVS QVARTVS.
Vier und achtzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCV.




Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.

Fig. VI.



Lepidoptera R.

LEPIDOPTERA R.

TABVLA CCVI.



Fig. I.




Fig. II.




Fig. IV.




Fig. III.



Fig. V. a



Fig. V. b.

Loibeli pinc R.

I.G. F. sc. R.

TABVLA CCVI. Zweyhundert und sechste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus DECIMA NONA.*
Neunzehendes Lüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. LIBELLVLA alis *patentibus VICESIMA.*
Zwanzigstes Lüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. III. LIBELLVLA alis *patentibus VICESIMA PRIMA.*
Ein und zwanzigstes Lüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *plano VICESIMA PRIMA.*
Ein und zwanzigster Afferholzkäfer mit flachem Brustsilde.

Fig. V. a. b. MVSCA spathula antennarum *rotunda QVADRAGESIMA QVINIA.*
Fünf und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CCVII.
Zweyhundert und siebende Tafel.

Fig. I. SPHEX OCTAVA.
Achte Afterwespe.

Fig. II. a. b. STRATIO MYS VNDECIMA.
Eilfste Waffenfliege.

Fig. II. IV. PAPILIO tetrapus alis integris DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. V. VI. VRROCERVS SEPTIMVS.
Siebende Schwanzfliege.

TABVLA CCVII.

Fig. I. a.



Fig. I. b.



Fig. II. a.



Fig. III




Fig. IV.



Fig. II. b.




Fig. V.



Fig. VI.



Lobat. pince. R.

I. i. F. sc. R.

TABVLA CCVIII.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. V. a.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V. b.



Fig. VI.





Fig. VII.



L. v. bel. pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CCVIII.
Zweyhundert und achte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS NONVS.
Neunzehender vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. V. a. b. ATTELABVS TERTIVS.
Dritter Schildkrötenkäfer.

Fig. VI. VII. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS.
Zehender sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

TABVLA CCIX.
Zweyhundert und neunte Tafel.

Fig. I. II. PHALAE NA *pectinicornis* alis *planis DECIMA QVARTA.*
Vierzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. III. a. b. NEMOTELVS *VICESIMVS TERTIVS.*
Drey und zwanzigste Stiletfliege.

Fig. IV. V. PHALAE NA *seticornis* alis *planis TRICESIMA QVARTA.*
Vier und dreysigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. VII. TIPVLA alis *incumbentibus PRIMA.*
Erste Erdfliege mit aufliegenden Flügeln.

TABVLA CCLIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a



Fig. IV



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Lobelia pinx. R.

T. G. F. sc. R.

TABVLA CCX.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.




Fig. V.



Loibel pinx. R.

T.G. Fsc. R.

TABVL A CCX. Zweyhundert und zehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS.
Zwanzigster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. a. b. CIMEX *quatuor antennarum articulis* TRICESIMVS SECUNDVS.
Zwey und dreysigste Wanze mit viergliederigen Fühlhörnern.

Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA.
Vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

TABVLA CCXI.
Zweyhundert und eilfte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis ocellatis VNDECIMVS.
Eilster sechsfüssiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAE NA seticornis alis planis TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreysigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAE NA pedlincornis alis deflexis TRICESIMA SECUNDA.
Zwey und dreysigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

TABVLA CCXI.




Fig. I.

Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CCXII.



Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.




Fig. IV.




Fig. V.

Löbel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CCXII.
Zweyhundert und zwölfe Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SEPTIMVS.
Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. III. PHALAEENA *peñinicornis* alis *patentibus* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAEENA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA CCXIII.
Zweyhundert und dreyzehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO tetrapus alis integris VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. a. b. SCATOPSE PRIMVM.
Erste Fadenfliege.

Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreysigster Blattkäfer.

Fig. V. a. b. PODVRA PRIMA.
Erster Wasserfloh.

TABVLA CCXIII.

Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. I.




Fig. IV. a.



Fig. IV. b.




Fig. II.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



Foibel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CCXIV.

Fig. I.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. II.




Fig. V.




Fig. VI.



TABVLA CCXIV.
Zweyhundert und vierzehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis ocellatis DVODECIMVS.
Zwölfter sechsfüßiger Tagfalter mit geängelten Flügeln.

Fig. III. PHALAE^NA feticornis alis patentibus DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln,

Fig. IV. PTEROPHORVS TERTIVS.
Dritter Fächerfalter.

Fig. V. PHALAE^NA pectinicornis alis deflexis TRICESIMA TERTIA. MAS.
Conf. Tab. CCXIX. Fig. I. II.
Drey und dreysigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern
und abhangenden Flügeln. Männchen. Vergl. Tab. CCXIX. Fig. I. II.

TABVLA CCXV.
Zweyhundert und funfzehende Tafel.

Fig. I. II. PHALAE^NA *pe^ttinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreysigster Nachtfalter mit *gekümmtten* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. a. b. BVPRESTOIDES PRIMVS.
Erster Afterstinkkäfer.

Fig. IV. V. PHALAE^NA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SECUNDA.
Zwey und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

TABVLA CCXV

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V



Loibel Pinus Rott.

1. v. Tridrich sc. Rot

TABVLA CCXVI.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.




Fig. V.



Fig. IV.a.



Fig. IV.b.



Loibel *Finx. Rat.*

L. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CCXVI. Zweyhundert und sechzehende Tafel.

Fig. I. PHALAENA *seticornis* als **planis TRICESIMA SEXTA.**
Sechs und dreysigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. II. III. PHALAENA *seticornis* als **eretis PRIMA.**
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *aufrechten* Flügeln.

Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA **TRICESIMA SEXTA.**
Sechs und dreysigster Blattkäfer.

Fig. V. MUSCA *spathula antennarum oblonga* **VICESIMA QUINTA.**
Fünf und zwanzigste Haustfliege mit *länglichem* Spatel.

TABVLA CCXVII.
Zweyhundert und siebenzehende Tafel.

Fig. I. DYTICVS SEPTIMVS. MAS.
Siebender Schwimmkäfer.

Fig. II. DYTICVS OCTAVVS. Femina.
Achter Schwimmkäfer, Weibgen.

Fig. III. IV. PAPILIO tetrapus alis angulatis NONVS.
Neunter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

TABVLA CCXVII.

Fig. I.




Fig. III.




Fig. IV.



Fig. II.



Loisel pinx. Rat.

T. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CCXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibl pinx. Rat.

I.G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CCXVIII.
Zweyhundert und achtzehende Tafel.

Fig. I. SILPHA SECUNDA.
Zweyter Aaskäfer.

Fig. II. III. STRATIO MYS DVODECIMA.
Zwölfe Waffenfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA feticornis alis deflexis QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. VI. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VII. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CCXIX. Zweyhundert und neunzehende Tafel.

Fig. I. II. **PHALAENA pedinicornis alis deflexis TRICESIMA QVINTA.**
*Fünf und dreysigster Nachtfalter mit gekrümmten Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

Fig. III. a. b. **CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS SEPTIMVS.**
Sieben und zwanzigste Wanze mit fünfgliederigen Fühlhörnern.

Fig. IV. V. **MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA OCTAVA.**
Acht und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. VII. **MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA NONA.**
Neun und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CCXIX.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Löbel pinn. Rat

I. G. Friedrich sc. Rat

TABLEA CCXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



Loibl pinx. Rat.

I.G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CCXX. Zweyhundert und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAEINA *seticornis* als *deflexis* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. a. b. MVS CA *spathula antennarum oblonga* TRICESIMA.
Dreysigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. a. b. DERMESTOIDES PRIMVS.
Erster Afterspeckkäfer.

Fig. V. a. b. NEMOTELVS VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigste Stiletfliege.

TABVLA CCXXI. Zweyhundert ein und zwanzigste Tafel.

Fig. I. a. b. MVSCA spathula antennarum oblonga TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreysigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. II. a. b. CVRCVLIO femoribus dentatis OCTAVVS.
Achter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.

Fig. III. ICHNEVMON octogesimus QVINTVS.
Fünf und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. LEPTVRA thorace plano VICESIMA SECUNDA.
Zwey und zwanzigster Afterschädelkäfer mit flachem Brustschild.

Fig. V. a. b. CVRCVLIO femoribus dentatis NONVS.
Neunter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.

Fig. VI. a. b. CARABVS oblongus VICESIMVS QVARTVS.
Vier und Zwanzigster länglicher Laufkäfer.

TABVLA CCXXI.

Fig. I. a.



Fig. II. a.



Fig. I. b.



Fig. III.




Fig. II. b.



Fig. V. b.



Fig. V. a.



Fig. VI. a.



Fig. VI. b.



TABVLA CCXXII.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. a.



Fig. VI. b.



Loisel pinx R.

I. G. Friedrich sc. R.

TABVLA CCXXII. Zweyhundert zwey und zwanzigste Tafel.

Fig. I. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA OCTAVA.

Acht und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. II. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA NONA.

Neun und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS OCTAVVS.

Acht und dreysigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.

Fig. IV. V. APHIS PRIMA. MAS.

Erste Blattlausfliege. Männchen.

Fig. VI.a.b. APHIS SECUND A. FEMINA.

Zweyte Blattlausfliege. Weibchen.

TABVLA CCXXIII.
Zweyhundert drey und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. MVSCA spathula antennarum *oblonga* TRICESIMA SECUNDA.
Zwey und dreysigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. III. IV. PHALAEENA seticornis alis *planis* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreysigster Nachtfalter mit borßigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V. VI. MVSCA spathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VII. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SEXTVS.
Sechs und achtzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCXXIII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Lacithina R.

I. G. Friedrich ex Rat

TABVLA CCXXIV.




Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. VI.




Fig. IV.



Fig. VII.




Fig. VIII.



Fig. V.



Fig. IX.



Fig. X.



Treibel proprix R.

I. G. Frédrich sc. R.

TABVLA CCXXIV. Zweyhundert vier und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis integris cauda pilosa QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanz,

Fig. III. IV. APIS QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigste Biene.

Fig. V. VI. PHRYGANEA DVODECIMA, FEMINA?
Zwölfta Frühlingsfliege. Weibgen?

Fig. VII. PHRYGANEA DECIMA TERTIA, MAS?
Dreyzehende Frühlingsfliege. Männgen?

Fig. VIII. IX. NEMOTELVS VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Stiletfliege.

Fig. X. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und achtzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCXXV.
Zweyhundert fünf und zwanzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum oblonga TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreysigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig II. III. PHALAEENA seticornis alis planis TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreysigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. IV. ICHNEVMON OCTOGESIMVS OCTAVVS.
Acht und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. V. PHALAEENA seticornis alis patentibus DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. VI. PHALAEENA seticornis alis patentibus DECIMA SEXTA.
Sechzender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. VII. ASILVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Raubfliege.

TABVLA CCXXV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Löwel proprex R.

I. G. Friedrich sc. R.

TABVLA CCXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Lcibel pinx R.

I G. F. sc. R.

TABVLA CCXXVI.

Zweyhundert sechs und zwanzigste Tafel.

Fig. I. FORMICA SECVNDA. FEMINA?
Zweyte Ameife. Weibgen?

Fig. II. III. FORMICA TERTIA. MÄS.
Dritte Ameife. Männgen.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum oblonga TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreysigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. V. ARANEA oculorum situ trium linearum SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen in drey Reihen.

Fig. VI. ARANEA oculorum situ quadrato DECIMA TERTIA.
Dreyzehnende Spinne mit Augen im Vierecke.

Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CCXXVII.
Zweyhundert sieben und zwanzigste Tafel.

Fig. I. VOLVCCELLA NONA.
Neunte Federbuschfliege.

Fig. II. ARANEA oculorum situ semilunato VICESIMA TERTIA. MAS.
Drey und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde. Männchen.

Fig. III. ARANEA oculorum situ semilunato VICESIMA QVARTA. FEMINA.
Vier und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde. Weibchen.

Fig. IV. a.b. CISTELA TERTIA.
Dritter Kegelkäfer.

Fig. V. FORMICA QVARTA. FEMINA.
Vierte Ameise. Weibchen.

Fig. VI. VII. FORMICA QVINTA. MAS.
Fünfte Ameise. Männchen.

TABVTA CCXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.



Fig. III.




Fig. IV. a.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Lobeli pmax R.

L.G. F. & R.

TABVLA CCXXVIII.





Fig. VIII.



Loibel pinx: R.

L. G. F. sc. R.

TABVLA CCXXVIII.
Zweyhundert acht und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VNDECIMVM.
Eilfste Schnarrheuschrecke.

Fig. III. CICINDELA SEXTA.
Sechster Zangenkäfer.

Fig. IV. V. PHALAEENA seticornis alis planis TRICESIMA NONA.
Neun und dreysigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM DVODECIMVM.
Zwölftes Schnarrheuschrecke.

Fig. VIII. ASILVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Raubfliege.

TABVLA CCXXIX. Zweyhundert neun und zwanzigste Tafel.

Fig. I. **PHALAEONA seticornis** alis *patentibus DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. II. III. **EPHEMERA OCTAVA.**
Achte Uferaasfliege.

Fig. IV. V. a. b. **APHIS TERTIA. FEMINA.**
Dritte Blattlausfliege. Weibgen.

Fig. VI. a. b. **APHIS QVARTA. MAS.**
Vierte Blattlausfliege. Männigen.

TABVLA CCXXIX.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V. a



Fig. V. b.



Löbbed p. 22. R

Fig. VI. a.



Fig. VI. b.



L. G. F. 22. R.

TABVLA CCXXX.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.




Fig. VII.





Fig. V.



Lorbel pinx. R.

I.G. Fsc. R.

TABVLA CCXXX.
Zweyhundert und dreysigste Tafel.

- Fig. I. PHALAE NA *seticornis* alis *patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. II. MVS CA *spathula antennarum oblonga* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreysigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. III. MVS CA *spathula antennarum oblonga* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreysigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. V. PHALAE NA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. VII. PHALAE NA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA.
Vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CCXXXI.
Zweyhundert ein und dreysigste Tafel.

Fig. I. II. a. b. APIHS QVINTA. FEMINA.
Fünfte Blattlausfliege. Weibgen.

Fig. III. a. b. APHIS SEXTA. MAS.
Sechste Blattlausfliege. Männigen.

Fig. IV. V. PHALAE NA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SEXTA.
*Sechs und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

Fig. VI. VII. APHIS SEPTIMA. FEMINA.
a. b. *Siebende Blattlausfliege. Weibgen.*

Fig. VI. a. b. APHIS OCTAVA. MAS.
Achte Blattlausfliege. Männigen.

TABVLA CCXXXI.

Fig. I.




Fig. II. a.



Fig. III. a.



Fig. II. b.



Fig. III. b.




Fig. VIII. a.



Fig. VI.



Loisel pionx. R.

Fig. VII. a.



I. Keller fec. Nbg

TABVLA CCXXXII.

Fig. II.



Fig. I. a.



Fig. III.




Fig. I. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VI.





Fig. VII.



L. v. p. min. R.

Fig. VIII. a.



I. Kellner fcc. Nbg.

TABVLA CCXXXII.
Zweyhundert zwey und dreysigste Tafel.

Fig. I. a.b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster Fallkäfer.

Fig. II. III. ACRIDIVM DECIMVM TERTIVM.
Dreyzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. IV. V. TENTHREDO antennis clauatis VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern,

Fig. VI. VII. ACRIDIVM DECIMVM QVARTVM.
Vierzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. VIII. a.b. CVRCVLIO femoribus dentatis DECIMVS.
Zehender Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.

TABVLA CCXXXIII.
Zweyhundert drey und dreysfigste Tafel.

Fig. I. CVLEX QVARTVS.
Vierte Schnaackenfliege.

Fig. II. III. PHALAEENA seticornis alis deflexis QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

Fig. IV. TIPVLA TRICESIMA.
Dreysfigste Erdfliege.

Fig. V. ICHNEVMON OCTOGESIMVS NONVS.
Neun und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. VESPA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Wespe.

Fig. VII. CHRYSIS QVINTA.
Fünfte Goldwespe.

TABVLA CCXXXIII.

Fig. I. a.



Fig. I. b.



Fig. II.



Fig. IV.




Fig. III.




Fig. V.

Fig. VI.



Fig. VII.

Zoibet pionx. R.

Tyreff pio. Ntg.

TABVLA CCXXXIV.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Larbel pinnæ. R

D. Kœffer se. № 3.

TABVLA CCXXXIV.
Zweyhundert vier und dreysigste Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Afterholzkäfer mit *flachem Brustsilde*.

Fig. II. III. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigster Nachtfalter mit *borsigen Fühlhörnern und flachen Flügeln*.

Fig. IV. a. b. COCCINELLA VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Blattlausküfer.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* QVARTVS.
Vierter sechsfüssiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

Fig. VII. MVSCA spathula antennarum *oblonga* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreysigste Hausfliege mit linglichem Spadel.

TABVLA CCXXXV.
Zweyhundert fünf und dreysigste Tafel.

Fig. I. a. b. APHIS NONA. MAS.
Neunte Blattlausfliege. Männchen.

Fig. II. a. b. APHIS DECIMA. FEMINA.
Zehende Blattlausfliege. Weibchen.

Fig. III. IV. PHALAEENA *feticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

Fig. V. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS.
Neunzigste Schlupfwespe.

Fig. VII. TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehnende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

TABVLA CCXXXVII.





Fig. III.




Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII. R

Fig. IX. Nbg.

TABVLA CCXXXVI.




Fig. I.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. III.




Fig. IV.

Loisel pinxit R.

Tyroff sc. Ntg.

TABVLA CCXXXVI.
Zweyhundert sechs und dreysigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA VNDECIMA. FEMINA.
Eilfte Heuschrecke. Weibgen.

Fig. III. IV. LOCVSTA DVODECIMA. MAS.
Zwölftes Heuschrecke. Männigen.

Fig. V. VI. PHALAEENA seticornis alis deflexis QVADRAGESIMA NONA.
*Neun und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhangenden Flügeln.*

TABVLA CCXXXVII.

Zweyhundert sieben und dreysigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAE NA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SECUNDA.
Zwey und vierzigster Nachtfalter mit *borsigen* Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. III. IV. VROCERVS OCTAVVS.
Achte Schwanzfliege.

Fig. V. CARABVS *oblongus* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und Zwanzigster länglicher Laufkäfer.

Fig. VI. CICADA QVARTA.
Fünfte Schaumfliege.

Fig. VII. a. b. MVSCA *spathula* antennarum *oblonga* TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreysigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCXXXVII.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII. a.



Fig. VII. b.



Lor. b. l. p. in x R.

Tyrgoff sc. Nbg.

TABVLA CCXXXVIII.



Fig. I.

Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.




Fig. V.

Fig. VI.



Fig. VII.

Fig. VIII.



L. v. L. pinx. R.

P. Krißner sc. Mbg.

TABVLA CCXXXVIII. Zweyhundert acht und dreysigste Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *globoſo* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Aſterholzkäfer mit kugelichem Brustſchilde.

Fig. II. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster Fallkäfer.

Fig. III. APIS QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigste Biene.

Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigter Nachtfalter mit borſigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. CISTELA QVARTA.
Vierter Kegelkäfer.

Fig. VII. VESPA VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigste Wespē.

Fig. VIII. MVSCA *spathula antennarum truncata* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit abgeſtutztem Spadel.

TABVLA CCXXXIX.

Zweyhundert neun und dreysigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO tetrapus alis integris VICESIMVS SECUNDVS.
Zwey und zwanzigster vierfüsiger Tag falter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. a. b. COCCINELLA VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Blattlausläufer.

Fig. IV. EPHEMERA NONA.
Neunte Uferaasfliege.

Fig. V. EPHEMERA DECIMA.
Zehende Uferaasfliege.

TABVLA CCXXXIX.



Fig. III. a.




Fig. III. b.



Fig. II.



Loibl Finz. R

I. C. Bock fcc. Nbg

TABVLA CCXL.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.




Fig. VIII.



TABVLA CCXL.
Zweyhundert und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHEX NONA.
Neunte Aflerwespe.

Fig. III. IV. MVSCA spathula antennarum rotunda QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. V. MVSCA spathula antennarum oblonga TRICESIMA NONA.
Neun und dreysigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. NEMOTELVS VICESIMVS SEXTVS..
Sechs und zwanzigste Stiletfliege.

Fig. VII. VIII. PHALAE NA seticornis alis deflexis QVINQVAGESIMA.
Funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

TABVLA CCXLI.
Zweyhundert ein und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. **PHALAEENA seticornis alis deflexis QVINQVAGESIMA PRIMA.**
*Ein und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

Fig. III. IV. **SPHEX DECIMA.**
Zehende Afterwespe.

Fig. V. VI. **ACRIDIVM DECIMVM QVINTVM.**
Funfzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. VII. VIII. **APIS QVINQVAGESIMA.**
Funfzigste Biene.

TABVLA CCXL1.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Lobelia innoxia, R.

Trochif' se. Nbg.

TABVLA CCXLII.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Löbel pinx R.

Troyff' sc. Nbg.

TABVLA CCXLII.

Zweyhundert zwey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO tetrapus alis integris VICESIMVS TERTIVS.

Drey und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III.

ICHNEVMON NONAGESIMVS PRIMVS.

Ein und neunzigste Schlupfwespe.

Fig. IV.

MVSCA spathula antennarum sufformi QVINTA.

Fünfte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.

Fig. V. VI.

LOCVSTA DECIMA TERTIA.

Dreyzehn Heuschrecke.

TABVLA CCXLIII.
Zweyhundert drey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIUM DECIMVM SEXTVM.
Sehzehnende Schnarrheuschrecke.

Fig. III. IV. ACRIDIUM DECIMVM SEPTIMVM.
Siebenzehnende Schnarrheuschrecke.

Fig. V. VI. ACRIDIUM DECIMVM OCTAVVM.
Achtzehnende Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCXLIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Lubel pinnæ R.

1 Kolorat für Nbg.

TABVLA CCXLIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

Vreoff sc. Nbg.

TABVLA CCLXIV.

Zweyhundert vier und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAEENA *seticornis* als *deflexis QVINQVAGESIMA SECUNDIA*.
Zwey und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. III. IV. CIMEX *quinqe antennarum articulis VICESIMVS OCTAVVS*.
Acht und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. ICHNEVMON *NONAGESIMVS SECUNDVS*.
Zwey und neunzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. ICHNEVMON *NONAGESIMVS TERTIVS*.
Drey und neunzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCXLV.
Zweyhundert fünf und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM DECIMVM NONVM.
Neunzehende Schnarrheuschrecke.

Fig. III. IV. STOMOXOIDES TERTIVS.
Dritte Taschenmesserfliege.
a. b.

ICHNEVMON NONAGESIMVS QVARTVS.
Fig. V. VI. *Vier und neunzigste Schlupfwespe.*

TABVLA CCXLV.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Locusta pinæ. R.

Tyrophilus sc. Nob.

TABVLA CCXLVI.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Lorbel pīce. R.

P.Küffner sc. Nbg.

TABVLA CCXLVI.

Zweyhundert sechs und vierzigste Tafel.

Fig. I. TIPVLA TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreysigste Erdfliege.

Fig. II. ICHNEVMON NONAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und neunzigste Schlupfwespe.

Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und neunzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. APIS QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigste Biene.

Fig. V. MVSCA spathula antennarum *truncata* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit abgesetztem Spadel.

Fig. VI. MVSCA spathula antennarum *truncata* SEXTA.
Sechste Hausfliege mit abgesetztem Spadel.

Fig. VII. MVSCA spathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA.
Vierzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CCXLVII.
Zweyhundert sieben und vierzigste Tafel.

Fig. I. APIS QVINQVAGESIMA SECUND A.
Zwey und funfzigste Biene.

Fig. II. III. PHALAE NA *seticornis alis conuolutis OCTAVA.*
Achter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

Fig. IV. V. LOCVSTA DECIMA QVARTA.
Vierzehende Heuschrecke.

TABVLA CCXLVII.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.

Fig. V.

TABVLA CCXLVIII.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



L. oibet pinx. R.

H. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCXLVIII.

Zweyhundert acht und vierzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *feticornis* als *deflexis* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. IV.

CIMEX *quatuor antennarum articulis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreysigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern,

Fig. V.

APIS QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigste Biene.

Fig. VI.

APIS QVINQVAGESIMA QVARTA.
Vier und funfzigste Biene.

Fig. VII. VIII.

TENTHREDO *antennis filiformibus* SEPTIMA.
Siebende Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

TABVLA CCXLIX.
Zweyhundert neun und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA QVINTA.
Funfzehnende Heuschrecke.

Fig. III. IV. ACRIDIVM VICESIMVM.
Zwanzigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCXLIX.

Fig. I.




Fig. III.




Fig. II.





Fig. IV.



Lorbel pux. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCL.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



L. vesp. Pince. R.

Tyrrh. sc. N. b. o.

TABVLA CCL. Zweyhundert und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA QVARTA.
Vier und funfzigster Nachtfalter mit *boigigen* Fühlhörnern und
abhangenden Flügeln.

Fig. III. MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVADRAGESIMA OCTAVA,
Acht und vierzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. APIS QVINQVAGESIMA QVINTA.
Fünf und funfzigste Biene.

Fig. V. VI. CIMEX *quinqe antennarum articulis* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigste Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. APIS QVINQVAGESIMA SEXTA.
Sechs und funfzigste Biene.

TABVLA CCLI.
Zweyhundert ein und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. APIS QVINQVAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und funfzigste Biene.

Fig. III. a.b. STOMOXOIDES QVARTVS.
Vierte Taschenmesserfliege.

Fig. IV. V. PHALAEENA *seticornis* alis *diflexis* QVINQVAGESIMA QVINTA.
*Fünf und funfzigster Nachtfilter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

Fig. VI. APIS QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigste Biene.

Fig. VII. APIS QVINQVAGESIMA NONA.
Neun und funfzigste Biene.

TABVLA CCLI.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.

Fig. III. b.



Fig. VI.







Fig. VII.

Löbel pinx R.

Tyrriff sc. Nbg.

TABVLA CCLII.



Lorbel pinn. R.

H. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLII.

Zweyhundert zwey und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. A CRIDIVM VICESIMVM PRIMVM.
Ein und zwanzigste Scharrhuschrecke,

Fig. III. IV. P HALAENA seticornis alis planis DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V. T ENTHREDO antennis filiformibus OCTAVA.
Achte sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

Fig. VI. N EMOTELVS VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigste Siletfliege.

TABVLA CCLIII.

Zweyhundert drey und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIUM VICESIMVM SECUNDVM.
Zwey und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

Fig. III. IV. PHALAEENA *seticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SEXTA.
Sechs und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.

Fig. V. VI. ACRIDIUM VICESIMVM TERTIVM.
Drey und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCLIII.





Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibeli pinæ. R.

I. Kellner pœ. Nt.

TABVLA CCLIV.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III. ♂.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Lobel pinn. R.

Tyriff sc. Nbg.

TABVLA CCLIV.

Zweyhundert vier und funfzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS QVARTVS.

Vier und zwanzigster vierfüsiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III.a. b.

COCCINELLA VICESIMA QVARTA.

Vier und zwanzigster Blattlausküfer.

Fig. IV.

MVSCA *spathula antennarum truncata* SEPTIMA.

Siebende Hausfliege mit abgestutztem Spadel.

Fig. V.

PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA QVARTA.

Vier und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. VII.

APIS SEXAGESIMA.

Sechszigste Biene.

TABVLA CCLV.
Zweyhundert fünf und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA SEXTA.
Sechzehnē Heuschrecke.

Fig. III. STOMOXIS PRIMA.
Erste Stechfliege.

Fig. VI. V. PAPILIO hexapus alis ocellatis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehnē sechsfüssiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. VI. ARANEA oculorum situ semilunato VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CCLV.




Fig. I.



Fig. III.




Fig. V.



Fig. IV.




Fig. II.




Fig. VI.



Loisel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLVI.



Loisel pinx. R.

I.C. Bock fec. Nbg.

TABVLA CCLVI.
Zweyhundert sechs und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAE NA *peñinicornis* alis *planis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAE NA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V. VI. TABANVS DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Bremenfliege.

TABVLA CCLVII.
Zweyhundert sieben und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAEENA seticornis alis planis QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. III. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreysigster Blattkäfer.

Fig. IV. EMPIS QVINTA.
Fünfte Schneepfenfliege.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis clauatis VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Sägfliege mit käuförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CCLVII.




Fig. I.



Fig. II.

Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. III. b.



Fig. V.



Fig. VI.

Lecidell picea R.

Tryphon Nig.

TABVLA CCLVIII.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. VIII.




Fig. II.

— T. o. h. p. m. — R.

Tyrophilus. Nbg.

TABVLA CCLVIII.
Zweyhundert acht und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehnende Heufchrecke.

Fig. III. IV. STRATIO MYS DECIMA TERTIA.
Dreyzehnende Waffenfliege.

Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VII. VIII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CCLIX.

Zweyhundert neun und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAE NA *seticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und funfziger Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. a. b. SCOLYTUS PRIMVS.
Erster Kolbenkäfer.

Fig. IV. V. PHALAE NA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS NONVS.
Neun und dreysigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühl-
hörnern.

Fig. VII. SPHEX VNDECIMA.
Elfte Afterwespe.

TABVLA CCLIX.



Löbel. *Pinx. R.*

Tyrgoff sc. *Nbg.*

TABVLA CCLX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Larvæ pinnæ. R.

Tigrifrons. Ntq.

TABVLA CCLX.
Zweyhundert und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis obliquis QVINTVS.
Fünfter sechsfüssiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

Fig. III. a.b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster Fallkäfer.

Fig. IV. V. APIS SEXAGESIMA PRIMA.
Ein und sechzigste Biene.

TABVLA CCLXI.
Zweyhundert ein und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAEINA *seticornis* als planis QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. III. STOMOXOIDES QVINTVS.
Fünfte Taschenmesserfliege.

Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigste Fliege mit länglichem Spadel.

Fig. V. VI. APIS SEXAGESIMA SECUNDA.
Zwey und sechzigste Biene.

TABVLA CCLXI.




Fig. IV.



Löbel pinx R.

Troyeff sc. Ntg.

TABVLA CCLXII.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III. a



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Lob. p. orx R.

I. Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCLXII.

Zweyhundert zwey und sechzigste Tafel.

Fig. I. SPHEX DODECIMA.
Zwölfe Afterwespe.

Fig. II. SPHEX DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Afterwespe.

Fig. III. a. b. MVSCA spathula antennarum rotunda QVINQVAGESIMA.
Funfzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA feticornis alis planis QVINQVAGESIMA.
Funfzigster Nachtfalter mit borßigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. VII. APIS SEXAGESIMA TERTIA.
Drey und sechzigste Biene.

TABVLA CCLXIII.

Zweyhundert drey und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Heuschrecke.

Fig. III. PHALAE NA *feticornis* alis *patentibus* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAE NA *feticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und neunzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCLXIII.




Fig. I.




Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Loibl pux R.

Tyroff sc. Nbq

TABVLA CCLXIV.



Fig. I.




Fig. II.


Fig. III. a.




Fig. III. b.



Fig. IV.



Loibel primæ. R.



TABVLA CCLXIV.

Zweyhundert vier und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAE NA *seticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfziger Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. III.a.b. MELOLONTA VNDECIMA.
Elfster Sägenblattkäfer.

Fig. IV. V. ACRIDIUM VICESIMVM QVARTVM.
Vier und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCLXV.
Zweyhundert fünf und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM QVINTVM.
Fünf und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

Fig. III. APIS SEXAGESIMA QVARTA.
Vier und sechzigste Biene.

Fig. IV. V. ACRIDIVM VICESIMVM SEXTVM.
Sechs und zwanzigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCLXV

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibl pinx. R.

I. Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCLXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V.





Fig. VI.



Lobel pinx R

Groff sc. Ndg.

TABVLA CCLXVI.

Zweyhundert sechs und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. **PHALAEENA seticornis** alis *convolutis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit borßigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

Fig. III. a. b. **COCCINELLA VICESIMA QVINTA.**
Fünf und zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. IV. a. b. **CIMEX quatuor antennarum articulis TRICESIMVS QVARTVS.**
Vier und dreysigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

Fig. V. VI. **PHALAEENA seticornis** alis *deflexis* QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigster Nachtfalter mit borßigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

—

TABVLA CCLXVII.
Zweyhundert sieben und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM SEPTIMVM.
Sieben und zwanzigste Scharrheuschrecke.

Fig. III. a. b. c. APIS SEXAGESIMA QVINTA.
Fünf und sechzigste Biene.

Fig. IV. V. ACRIDIVM VICESIMVM OCTAVVM.
Acht und zwanzigste Schnarrkeuschrecke.

TABVLA CCLXVII.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. c.



Fig. III. b.



Fig. IV.





Fig. V.



Larbel pinnæ. R.

I. Kellner sic Nbg.

TABVLA CCLXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII



Lobelia pinx R.

Tyrogift sc. Nbg.

TABVLA CCLXVIII.

Zweyhundert acht und sechzigste Tafel.

Fig. I. STRATIOMYS DECIMA QVARTA.
Vierzehende Waffenfliege.

Fig. II. SPHEX DECIMA QVARTA.
Vierzehende Afterwespe.

Fig. III. PHALAENA seticornis alis *patentibus* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. IV. LAMPYRIS PRIMA.
Erster Leuchtkäfer.

Fig. V. STOMOXIS SECUNDA.
Zweyte Stechfliege.

Fig. VI. MVSCA spathula antennarum *oblonga* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VII. MVSCA spathula antennarum *rotunda* QVINQVAGESIMA SECUNDA.
Zwey und funfzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CCLXIX.

Zweyhundert neun und sechzigste Tafel.

Fig. I. II.

MVSCA spathula antennarum rotunda QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. III.

PHALAEONA seticornis alis patentibus VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit bonfigen Fühlhörnern und
offenen Flügeln.

Fig. IV. a.b.

TERMES PRIMVS.
Erste Todtenuhr.

Fig. V. VI.

ACRIDIVM VICESIMVM NONVM.
Neunte Schnarrheuschrecke.



TABVLA CCIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.





Fig. VI.



Zoobel pinx. R

Tyroff s. Nbg.

TABVLA CCLXX.




Fig. III.



Fig. IV.a.



Fig. V.



Fig. VI.



Loisel pinx. R

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLXX.

Zweyhundert und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. **PHALAENA seticornis** alis *convolutis DECIMA.*
Zehender Nachtfalter mit *borsigen* Fühlhörnern und *zusammengerollten*
Flügeln.

Fig. III. **TIPVLA TRICESIMA SECVNDA.**
Zwey und dreysigste Erdfliege.

Fig. IV. a,b. **THRIPS PRIMA.**
Erste Blasenfußfliege.

Fig. V. **APIS SEXAGESIMA SEXTA.**
Sechs und sechzigste Biene.

Fig. VI. **ICHNEVMON NONAGESIMVS OCTAVVS.**
Acht und neunzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCLXXI.
Zweyhundert ein und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAE NA *pefunicornis* alis *deflexis* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreysigster Nacht falter mit gekämmten Fühlhörnern und
abhangenden Flügeln.

Fig. III. PHALAE NA *seticornis* alis *patentibus* VICESIMA SECUND A.
Zwey und zwanzigster Nacht falter mit borßigen Fühlhörnern und
offenen Flügeln.

Fig. IV. V. CHERMES PRIMVM.
Erste Blattsaugerfliege.

Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVADRAGESIMA SECUND A.
Zwey und vierzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CCLXXI.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Löbel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLXXII.

Fig. III.




Fig. I.

Fig. IV.



Fig. V.



Fig. II.

Fig. VI.



Loisel pinxit. R

C. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLXXII.
Zweyhundert zwey und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis ocellatis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender sechsfüßiger Tagfalter mit gelungelten Flügeln,

Fig. III. IV. CIMEX quinque antennarum articulis TRICESIMVS.
Dreyssigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

Fig. V. VI. CIMEX quinque antennarum articulis TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyssigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA CCLXXIII.
Zweyhundert drey und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris VICESIMVS QVINTVS.*
Fünf und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. APIS *SEXAGESIMA SEPTIMA.*
Sieben und sechzigste Biene.

Fig. IV. a. b. LVPERVS PRIMVS.
Erster Fadenkäfer.

Fig. V. PAPILIO *tetrapus* alis *integris VICESIMVS SEXTVS.*
Sechs und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. VI. PAPILIO *tetrapus* alis *integris VICESIMVS SEPTIMVS.*
Sieben und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CCLXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.




Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.




Fig. VI.



TABVLA CCLXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.




Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.




Fig. VI.



Lobelia pinnx. R.

Tyrraff sc. Nbg

TABVLA CCLXXIV.
Zweyhundert vier und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis obliquis SEXTVS.
Sechster sechsfüssiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS NONVS.
Neun und neunzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. a.b. ASELLVS PRIMVS.
Erste Wafferrassel.

Fig. V. VI. PAPILIO tetrapus alis integris VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CCLXXV.
Zweyhundert fünf und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis caudatis SEPTIMVS.
Siebender sechsfüssiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. III. PHALAEENA seticornis alis patentibus VICESIMA TERTIA.
*Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
offenen Flügeln.*

Fig. IV. a. b. PVLEX PRIMVS.
Erster Floh.

Fig. V. VI. PHALAEENA seticornis alis planis QVINQVAGESIMA TERTIA.
*Drey und funfziger Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.*

TABVIA CCLXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. b.



Fig. IV. a.



Fig. V.




Fig. VI.



Lorbel pinx. R.

TABVLA CCLXXVI.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. IV. b.





Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Lohel pinx R.

Fig. VI.



C. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLXXVI.
Zweyhundert sechs und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II.

PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender sechsfüssiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. III.

PHALAEENA *seticornis* alis *patentibus* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. IV. a. b. PEDICVLVS PRIMVS,
Erste Laus.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* SEPTIMVS.
Siebender sechsfüssiger Tagfalter mit schiefen Flügeln.

TABVLA CCLXXVII.
Zweyhundert sieben und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetratus* alis *integris* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. PHALAEINA *feticornis* alis *patentibus* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. IV. a. b. CASSIDA SEPTIMA.
Siebender Schildkäfer.

Fig. V. VI. ACRIDIUM TRICESIMVM.
Dreysigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCLXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.

Fig. V.





Fig. VI.



Loebel pinx. R.

C. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Löisel pīnx. R.

I. C. Beck pīx. Nbg.

TABVLA CCLXXVIII.
Zweyhundert acht und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAE^NA *pe^tinicornis* alis *planis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nacht falter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen
Flügeln.

Fig. III. a.b. MVSCA *spathula* *antennarum oblonga* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. IV. V. PHALAE^NA *seticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA QVARTA FEMINA?
Vier und funfzigster Nacht falter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln. Weibgen?

Fig. VI. VII. PHALAE^NA *seticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA QVINTA MAS?
Fünf und funfziger Nacht falter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln. Männgen?

TABVLA CCLXXIX. Zweyhundert neun und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. **PHALAEONA pettinicoris** alis *planis DECIMA OCTAVA.*
Achtzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. III. **STENOCORVS thorace inermi DECIMVS SEXTVS.**
Sechzehnder Stutzkäfer mit stachellosem Brustsilde.

Fig. IV. V. **PHALAEONA seticornis** alis *deflexis QVINQVAGESIMA NONA.*
Neun und funfzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Elügeln.

Fig. VI. a. b. **BVPRESTIS DECIMA NONA.**
Neunzehender Stinkkäfer.

Fig. VII. a. b. **ELATEROIDES PRIMVS.**
Erster Afterspringkäfer.

TABVLA CCLXXIX.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. VI. a



Fig. VII. b.



Fig. VII. a.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI. b.




Loibel pinx. R.

TABVLA CCLXXX.




VIRGIL.

CLAVDITE IAM RIVOS - SAT
PRATA BIBERVNT.



Lcibel pinx. R.



I. Kellner fec. Ntg.

TABVLA CCLXXX.
Zweyhundert und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO hexapus alis ocellatis DECIMA SEXTA.
Sechzehender sechsfüßiger Tagfalter mit geängelten Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO hexapus alis ocellatis DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

INDEX.

Tom. I. II. III.

Register.

Band I. II. III.

Aaskäfer. *siehe SILPHA.*
ACARVS.

ACRIDIVM.

No.	Tab.	Fig.
1.	27.	1. a. b.
2.	—	2. a. b.
3.	—	3. a. b. c.
4.	146.	4. a. b.
1.	27.	6. 7.
2.	—	8. 9.
3.	—	10. 11.
4.	136.	4. 5.
5.	137.	4. 5.
6.	141.	2. 3.
7.	—	4. 5.
8.	142.	5. 6.
9.	154.	9. 10.
10.	161.	2. 3.
11.	228.	1. 2.
12.	—	6. 7.
13.	232.	2. 3.
14.	—	6. 7.
15.	241.	5. 6.
16.	243.	1. 2.
17.	—	3. 4.
18.	—	5. 6.
19.	245.	1. 2.
20.	149.	2. 4.
21.	252.	1. 2.
22.	253.	1. 2.
23.	—	5. 6.
24.	264.	4. 5.
25.	265.	1. 2.
26.	—	4. 5.
27.	267.	2. 2.
28.	—	4. 5.
29.	269.	5. 6.
30.	277.	5. 6.

L 2

Asterbienenkäfer. *siehe CLEROIDES.*
Afterfrühlingsfliege. f. PERLA.
Afterjungferchen. f. LIBELLOIDES.
Afterholzkäfer. f. LEPTVRA.
Aftermaulwurzkäfer. f. COPRIS.
Afterrußelkäfer. f. RHINOMACER.
Afterspeckkäfer. f. DERMESTOIDES.
Afterspinne. f. PHALANGIVM.
Afterspringkäfer. f. ELATEROIDES.
Afterstinkkäfer. f. BVPRESTOIDES.
Afterwaferwanze. f. NAVCORIS.
Afterwespe. f. SPHEX.
ALTICA.
Ameise. f. FORMICA.
Ameisenlöwe. f. FORMICALEO.
ANTHRENVS.
ANTHRIBVS.
APHIS.

No.	Tab.	Fig.
3.	229.	4. 5. a. b.
4.	—	6. a. b.
5.	231.	1. 2. a. b.
6.	—	3. a. b.
7.	—	6. 7. a. b.
8.	—	8. a. b.
9.	235.	1. a. b.
10.	—	2. a. b.
11.	22.	2. 4.
12.	—	5. 6.
13.	—	7. 8. 9.
14.	—	10. 11.
15.	—	12. 13.
16.	—	14.
17.	—	15.
18.	—	16.
19.	32.	2.
20.	—	3.
21.	—	4.
22.	—	5.
23.	—	6. 7. 8.
24.	—	9. 10.
25.	—	11. 12.
26.	—	13.
27.	—	14.
28.	—	15.
29.	69.	16.
30.	—	17.
31.	—	18.
32.	—	19.
33.	—	20.
34.	—	21.
35.	—	22.
36.	—	23.
37.	—	24.
38.	—	25.
39.	—	26.
40.	—	27.
41.	—	28.
42.	160.	29.
43.	190.	30.
44.	192.	31.
45.	195.	32.

No.	Tab.	Fig.		No.	Tab.	Fig.
8.	67.	4.		9.	—	3.
9.	—	5.		10.	—	4.
10.	—	6.		11.	—	5.
11.	—	7.		12.	65.	1.
12.	—	8.		13.	123.	1.
13.	—	9.	CEROCOMA.	14.	124.	3.
14.	109.	6.		15.	145.	1.
15.	128.	3.		16.	153.	4. a. b.
16.	157.	1.		17.	176.	5. a. b.
17.	204.	4. a. b.		18.	152.	6.
18.	—	5.		19.	203.	5.
19.	279.	6. a. b.		20.	53.	8.
21.	215.	3. a. b.		21.	—	9. a. b.
			CHELIIFER.	22.	134.	3. a. b.
			CHERMES.	23.	271.	4. 5.
			CHRYSYSIS.	24.	42.	5. 6.
1.	47.	1.		25.	74.	7. 8.
2.	52.	7.		26.	81.	5.
3.	55.	7.		27.	115.	5.
4.	59.	1.		28.	233.	7.
				29.	1.	3.
1.	3.	1.	CHRYSOMELA.	30.	3.	4.
2.	—	2.		31.	—	3.
3.	11.	1.		32.	21.	1. 2.
4.	—	2.		33.	—	1.
5.	15.	1.		34.	—	3.
6.	—	2.		35.	—	4.
7.	—	2.		36.	—	5.
8.	—	4.		37.	—	6.
9.	—	5.		38.	—	7.
10.	—	6.		39.	—	8.
11.	—	7.		40.	—	9.
12.	—	9.		41.	—	10.
13.	36.	1.		42.	—	11.
14.	35.	3.		43.	—	12.
15.	51.	1.		44.	—	13.
16.	88.	1.		45.	—	14.
17.	105.	5.		46.	—	15.
18.	109.	5.		47.	—	16.
19.	137.	3.		48.	—	17.
20.	141.	4.		49.	—	18.
21.	156.	4.		50.	—	19.
22.	194.	7.		51.	—	20.
23.	202.	5.		52.	—	21.
24.	221.	6. a. b.		53.	44.	2.
25.	237.	5.		54.	47.	4. 5.
26.	—	13.		55.	51.	7.
27.	—	13.		56.	65.	7.
28.	—	13.		57.	—	8.
29.	18.	8.		58.	—	9.
30.	31.	13.		59.	—	10.
31.	41.	14.		60.	84.	7.
32.	66.	6.		61.	112.	3.
33.	—	7.		62.	126.	1.
34.	27.	4. a. b.		63.	161.	4. a. b.
35.	—	5.		64.	173.	4. a. b.
36.	36.	2.		65.	194.	4.
37.	40.	5. 6.		66.	213.	4. a. b.
38.	96.	6.		67.	216.	4. a. b.
39.	142.	7. a. b.		68.	257.	3. a. b.
40.	277.	4. a. b.		69.	96.	2.
41.	—	1.		70.	—	3.
42.	10.	1.		71.	—	7.
43.	11.	7.		72.	—	8.
44.	14.	7.		73.	—	9.
45.	—	8.		74.	4.	8.
46.	—	9.		75.	34.	8.
47.	55.	1.		76.	—	9.
48.	—	2.		77.	35.	10.
49.	—	2.		78.	86.	4.
50.	—	2.		79.	86.	4.

CIMEX.

Fam. I. Art. quatuor.

No.	Tab.	Fig.	
6.	228.	3.	CISTELA.
1.	11.	15. 16. 17.	
2.	12.	1.	CLEROIDES.
3.	—	2.	
4.	—	3.	CLERVS.
5.	—	4.	
6.	—	5.	
7.	—	6. 7.	
8.	—	8.	
9.	—	9.	COCCINELLA.
10.	—	10.	
11.	—	11.	
12.	—	12.	
13.	41.	4. 5.	
14.	—	6. 7.	
15.	42.	12.	
16.	43.	7. 8.	
17.	48.	8.	
18.	57.	9.	
19.	—	4.	
20.	—	5.	
21.	87.	12.	
22.	112.	7.	
23.	119.	7.	
24.	128.	2. 3.	
25.	169.	7.	
26.	170.	4. 5.	
27.	183.	1.	
28.	185.	4. a. b. 5.	
29.	199.	1. 2.	
30.	—	4. 5.	
31.	—	6. 7.	
32.	210.	3. a. b.	
33.	248.	3. 4.	
34.	266.	4. a. b.	
1.	2.	3.	COCCVS.
2.	5.	9. 10.	COPRIS.
3.	—	11.	Fam. I. Cornig.
4.	11.	10. 11. 12.	
5.	41.	1. 2. 3.	
6.	—	8. 9.	
7.	42.	11.	
8.	43.	3. 4.	
9.	—	15. 16.	
10.	46.	1. 2.	
11.	—	3.	
12.	—	4. 5.	
13.	—	6.	
14.	—	7. 8.	
15.	51.	4.	
16.	57.	1. 2.	
17.	—	3.	CORIXA.
18.	—	6.	CRAERO.
19.	—	7. 8.	
20.	—	9.	
21.	—	10.	
22.	—	11.	
23.	60.	10.	
24.	79.	10.	
25.	82.	4.	
26.	—	6.	
27.	109.	8. 9.	
28.	219.	3. a. b.	
29.	244.	3. 4.	
30.	250.	3. 6.	
31.	272.	3. 4.	
	—	5. 6.	

No.	Tab.	Fig.
1.	95.	3.
2.	158.	3. a. b.
3.	227.	4. a. b.
4.	238.	6.
5.	186.	4.
6.	—	5.
7.	60.	2.
8.	86.	5.
9.	151.	3.
10.	166.	4. a. b.
11.	1.	2.
12.	9.	7.
13.	—	8.
14.	—	9.
15.	—	10.
16.	—	11.
17.	—	12.
18.	30.	9.
19.	9.	10.
20.	—	11.
21.	—	12.
22.	—	13.
23.	—	14.
24.	—	15.
25.	—	16.
26.	—	17.
27.	45.	6.
28.	51.	6.
29.	62.	6.
30.	171.	1. a. b.
31.	—	2. a. b.
32.	234.	4. a. b.
33.	239.	3. a. b.
34.	254.	3. a. b.
35.	266.	3. a. b.
36.	111.	4.
37.	63.	2.
38.	—	3.
39.	—	4.
40.	—	5.
41.	—	2.
42.	73.	2.
43.	6.	3.
44.	—	4.
45.	96.	1.
46.	201.	1.
47.	—	2.
48.	3.	7.
49.	—	8.
50.	73.	6.
51.	97.	2.
52.	111.	3.
53.	—	4.
54.	44.	7. 8.
55.	90.	8. 9.
56.	103.	2. 3.
57.	104.	1. 2.
58.	—	4.
59.	34.	5.
60.	52.	4.
61.	—	5.
62.	30.	4.
63.	—	5.
64.	—	4.
65.	—	4.
66.	—	4.
67.	—	5.

No.	Tab.	Fig.		No.	Tab.	Fig.
6.	—	6.		7.	50.	4.
7.	—	7.		8.	221.	2. a b.
8.	—	8.		9.	—	4.
9.	65.	2.		10.	232.	5. a b.
10.	—	3.	CYNIPS.	1.	134.	4. a b.
11.	—	4.	Dämmerungsfalter. f. SPHINX.	2.	143.	5. a b.
12.	—	5.	DERMESTES.			
13.	—	6.		1.	42.	1. 2.
14.	77.	7.		2.	—	3.
15.	—	8.		3.	—	4.
16.	86.	6.		4.	118.	1.
17.	—	7.		5.	157.	7. a b.
18.	—	8.		6.	167.	1.
19.	87.	5.	DERMESTOIDES.	7.	220.	4. a b.
20.	—	6.		8.	77.	6.
21.	102.	5.	DIAPERIS.	9.	3.	3.
22.	109.	7.		10.	8.	7.
23.	114.	6. a. b.	DTYICVS.	11.	—	8.
24.	157.	4.		12.	—	9.
25.	198.	6.		13.	90.	10.
26.	232.	1. a. b.		14.	217.	1.
27.	235.	2.		15.	—	2.
28.	260.	2. a. b.		16.	—	
1.	147.	5.	ELATER.	17.	—	
2.	—	6.	Fam. I. Peffir.	18.	2.	5.
3.	188.	6. 7.		19.	—	6.
4.	233.	1. a. b.	Fam. II. Serrat.	20.	—	8.
				21.	—	9.
				22.	—	10.
				23.	—	11.
				24.	—	12.
				25.	19.	1.
				26.	—	3.
				27.	—	4.
				28.	31.	1.
				29.	—	2.
				30.	—	3.
				31.	—	6.
				32.	151.	5. 6.
				33.	199.	8.
				34.	19.	2.
				35.	—	5.
				36.	—	6.
				37.	—	7.
				38.	—	7.
				39.	31.	5.
				40.	—	6.
				41.	—	6.
				42.	—	7.
				43.	—	8.
				44.	—	9.
				45.	45.	5.
				46.	4.	6.
				47.	—	7.
				48.	II.	8.
				49.	—	9.
				50.	19.	1.
				51.	—	3.
				52.	—	4.
				53.	—	5.
				54.	—	6.
				55.	—	7.
				56.	—	7.
				57.	77.	1.
				58.	—	2.
				59.	104.	6. a. b.
				60.	174.	4.
				61.	194.	1.
				62.	279.	7. a. b.
				63.	147.	7. 8.
				64.	192.	1.
				65.	—	2.
				66.	—	3. a. b.
				67.	237.	4.
				68.	9.	5. 6.
				69.	42.	7.
				70.	154.	1. 2.
				71.	156.	2. 3.
				72.	175.	1. 2.
				73.	—	3.
				74.	234.	3.
				75.	229.	2. 3.
				76.	235.	4.

CVLEX.
CVRCVILIO.
Fam. I. Motic.

Fam. II. Dentat.

Erdfliege, f. EPHEMERA.
Fächerflüter, f. PTEROPHORVS.
Fadenfliege, f. SCATOPSE.
Fallkäfer, f. CRYPTOCEPHALVS.
Federbüschelfliege, f. VOLVCELLA.
Feuerkäfer, f. PYROCHORA.
Fliegenkäfer, f. NECYDALIS.
Floh, f. PVLEX.
Flohkäfer, f. MORDELLA.
FORFICULA.

FORMICA.

Frühlingsfliege, f. PHRYGANEA.
Fühlspitzenkäfer, f. MYLABRIS.
Gallaspelzfliege, f. CYNIPS.
Geiferkäfer, f. PEL'TIS.
Goldwespe, f. CHRYSIS.
Grille, f. GRYLLVS.
GRYLLOPS.

GYRINVS.

Hausfliege, f. MVSCA.
HEMEROBIVS.

HEPA.

Herzkäfer, f. DIAPERIS.
Heuschrecke, f. LOCUSTA.
HIPPOBOSCA.

Holzkäfer, f. CERAMBYX.
HYDROPHILVS.


ICHNEVMON.

I. 41. 12. 13.
2. 144. 3. 4.
I. 5. 3. 4.
2. 226. 1.
3. — 2. 3.
4. 227. 5.
5. — 6. 7.
I. 22. 1. 2.
2. 74. 1. 2.

I. 37. I.
2. 157. 2. 3.
3. — 4.
I. 134. 5. a. b.

I. 11. 5. 6.
2. 53. 1. 2.
3. 179. 8. 9.

I. 33. 1. 2.
2. — 10.
I. 1. 10.
2. 5. 2.
3. 6. 11.
4. — 12.
5. — 13.
6. 20. 2. 3.
7. — 4. 5.
8. — 6.
9. — 7.
10. — 8.
11. — 9.
12. — 10.
13. — 11.
14. — 12.
15. — 13.
16. — 14.
17. 38. 1.
18. 41. 10. 11.
19. 43. 1. 2.
20. — 5. 6.
21. 45. 7.
22. 49. 4.
23. 50. 5.
24. 52. 4.



No.	Tab.	Fig.
25.	—	5.
26.	60.	4.
27.	61.	3.
28.	—	4.
29.	—	5.
30.	—	6.
31.	—	7.
32.	—	8.
33.	—	9.
34.	—	10.
35.	70.	6.
36.	72.	4.
37.	—	5.
38.	73.	1.
39.	—	9.
40.	74.	4.
41.	80.	2.
42.	—	3.
43.	81.	4.
44.	82.	3.
45.	83.	1.
46.	—	6.
47.	—	7.
48.	—	8.
49.	84.	5.
50.	—	9.
51.	101.	4.
52.	103.	1.
53.	—	5.
54.	105.	4.
55.	107.	5.
56.	110.	3.
57.	111.	1.
58.	114.	1.
59.	116.	5.
60.	—	6.
61.	119.	4.
62.	—	5.
63.	120.	7.
64.	—	8.
65.	126.	8.
66.	128.	5.
67.	—	6.
68.	130.	4.
69.	132.	4.
70.	135.	3.
71.	—	4.
72.	168.	8.
73.	175.	4.
74.	—	5. 6.
75.	—	7.
76.	176.	6.
77.	177.	4.
78.	—	5.
79.	180.	6.
80.	183.	7.
81.	187.	1.
82.	195.	3. 4.
83.	198.	3.
84.	205.	6.
85.	221.	3.
86.	223.	7.
87.	224.	10.
88.	225.	4.
89.	233.	5.
90.	235.	5. 6.
91.	242.	3.

JVLVS.
 Jüngferchen, f. *LIBELLVLA*.
 Käneeliege, f. *RAPHIDIA*.
 Kammkäfer, f. *PLATYCEVRIS*.
 Kegelkäfer, f. *CISTELA*.
 Kolbenliege, f. *CABRO*.
 Kolbenkäfer, f. *SCOLYTUS*.
 Kronenkäfer, f. *CEROCOMA*.
 LAMPYRIS.
 Laufkäfer, f. *CARABVS*.
 Laus, f. *PEDICVLVS*.
 LEPISMA.
 LEPTVRA.

Fam. I. *Thor. cylindr.*

No.	Tab.	Fig.	(I)
92.	244.	5.	
93.	—	6.	
94.	245.	5. 6.	
95.	246.	2.	
96.	—	3.	
97.	262.	6.	
98.	270.	6.	
99.	274.	5.	
1.	55.	3.	

Fam. IV. *Thor. plan.*

No.	Tab.	Fig.
15.	65.	II.
16.	112.	4.
17.	126.	7.
18.	152.	4.
19.	198.	7.
1.	4.	12.
2.	—	13.
3.	34.	5.
4.	55.	7.
5.	63.	6.
6.	64.	4.
7.	—	5.
8.	—	6.
9.	—	7.
10.	68.	1.
11.	69.	1.
12.	55.	7.
13.	94.	6.
14.	—	7.
15.	—	8.
16.	103.	5.
17.	—	6.
18.	108.	1.
19.	201.	5.
20.	—	6.
21.	206.	4.
22.	221.	4.
23.	234.	1.
1.	50.	I. 3.
2.	—	2.
3.	—	—
4.	—	—
5.	—	—
6.	—	—
7.	—	—
8.	—	—
9.	—	—
10.	55.	—
11.	64.	—
12.	107.	—
13.	—	—
14.	151.	—
15.	203.	—
16.	235.	—
1.	39.	2.
2.	—	3.
3.	—	4.
4.	—	5.
5.	—	6.
6.	—	7.
7.	—	5.
8.	—	9.
9.	—	10.
10.	—	11.
11.	58.	5.
12.	—	9.
13.	—	10.
14.	59.	6.

N

Lilienkäfer, f. CRIOCERIS,
LOCVSTA.

LVPERVS.
Marcusfliege, f. BIBIO,
Maulwurfskäfer, f. SCARABAEVS,
Mayenwurmkäfer, f. MELOE,
Mehlkäfer, f. TENEBRO,
MELOE.

MELOLONTA.

Milbe, f. ACARVS,
MORDELLA,
MVSCA.

Fam. I. Spath, rot.

No.	Tab.	Fig.
20.	206.	2.
21.	—	3.
1.	62.	1. 2.
2.	—	3. 4.
3.	—	5.
4.	91.	6.
5.	158.	1. 2.
6.	—	3.
7.	—	4. 5.
8.	159.	3.
9.	—	4. 5.
10.	150.	1. 2.
11.	256.	1. 2.
12.	—	3. 4.
13.	242.	5.
14.	247.	4. 5.
15.	249.	1. 2.
16.	255.	1. 2.
17.	258.	1. 2.
18.	263.	1. 2.
19.	273.	4. a. b.

Fam. II. Spath. oblong.

No.	Tab.	Fig.
27.	165.	7. 8.
28.	167.	2. 3.
29.	170.	6. 7.
30.	—	8. 9.
31.	172.	3.
32.	—	4. 5.
33.	173.	1.
34.	177.	1.
35.	—	2. 3.
36.	179.	1. 2.
37.	180.	3.
38.	181.	4.
39.	193.	4. 5.
40.	—	6. 7.
41.	195.	1. 2.
42.	197.	7. 8.
43.	200.	5. 6.
44.	202.	2. 3. a. b.
45.	206.	5. a. b.
46.	223.	5. 6.
47.	240.	3. 4.
48.	250.	3.
49.	253.	7. 8.
50.	262.	3. a. b.
51.	263.	6.
52.	—	7.
53.	269.	1. 2.
54.	36.	9. IO.
55.	37.	12.
56.	40.	1. 2.
57.	54.	1.
58.	—	2.
59.	—	3.
60.	—	4.
61.	—	5.
62.	—	8.
63.	—	9.
64.	—	9.
65.	—	9.
66.	—	5.
67.	—	6.
68.	—	6.
69.	—	6.
70.	—	7.
71.	—	6.
72.	—	7.
73.	—	7.
74.	—	1.
75.	—	4.
76.	107.	5.
77.	—	6.
78.	—	7.
79.	—	7.
80.	113.	1.
81.	120.	3.
82.	124.	5.
83.	129.	3.
84.	—	4.
85.	—	5.
86.	—	2.
87.	130.	5.
88.	146.	5.
89.	—	6.
90.	156.	1.
91.	161.	5. a. b. c.
92.	164.	1.

No.	Tab.	Fig.		No.	Tab.	Fig.
41.	261.	4.		6.	146.	1. 2.
42.	271.	6.		7.	147.	3. 4.
43.	—	7.		8.	148.	1. 2.
44.	273.	3. a. b.		9.	151.	3. 4.
1.	17.	4.		1.	7.	1. 2.
2.	—	5.		2.	55.	2. 3.
3.	105.	6.		3.	75.	1. 2.
4.	235.	8.		4.	82.	1. 2.
5.	246.	5.		5.	97.	3. 4.
6.	—	6.		6.	—	5. 6.
7.	254.	4.		7.	127.	1. 2.
8.	73.	5.		8.	—	4. 5.
9.	87.	4.		9.	143.	1. 2.
10.	91.	7.		10.	148.	3. 4.
11.	104.	2.		11.	152.	1. 2.
12.	242.	3.		12.	—	3.
13.	169.	1. 2. 3.		13.	153.	1. 2.
14.	95.	6.		14.	164.	2. 3.
15.	—	7.		15.	153.	2. 3.
16.	12.	10.		16.	204.	1. 2.
17.	—	11.		17.	207.	3. 4.
18.	—	12.		18.	208.	1. 2.
19.	—	5.		19.	—	3. 4.
20.	95.	4.		20.	210.	1. 2.
21.	—	—		21.	213.	1. 2.
22.	—	11.		22.	239.	1. 2.
23.	—	12.		23.	242.	1. 2.
24.	52.	3.		24.	254.	1. 2.
25.	53.	3.		25.	273.	1. 2.
26.	76.	6.		26.	—	5.
27.	—	7.		27.	—	6.
28.	—	8.		28.	274.	5. 6.
29.	—	9.		29.	277.	1. 2.
30.	91.	8.		31.	14.	1. 2.
31.	94.	3.		32.	29.	5. 6.
32.	114.	7.		33.	45.	1. 2.
33.	137.	2. a. b.		34.	—	5. 4.
34.	146.	4.		35.	143.	3. 4.
35.	166.	1. 2.		36.	155.	4. 5.
36.	168.	4. 5.		37.	212.	1. 2.
37.	179.	6. 7.		38.	275.	1. 2.
38.	185.	1. 2.		39.	29.	3. 4.
39.	191.	1.		40.	36.	4. 5.
40.	—	5. 6.		41.	95.	3. 4.
41.	—	7. 8.		42.	—	5. 6.
42.	200.	1.		43.	—	7. 8.
43.	209.	3. a. b.		44.	—	9.
44.	220.	5. a. b.		45.	165.	1. 2.
45.	224.	8. 9.		46.	165.	6. 7.
46.	240.	6.		47.	185.	1. 2.
47.	252.	6.		48.	205.	6. 7.
48.	—	5. 6.		49.	211.	1. 2.
49.	—	7. 8.		50.	214.	1. 2.
50.	200.	1.		51.	255.	4. 5.
51.	209.	3. a. b.		52.	272.	1. 2.
52.	220.	5. a. b.		53.	276.	1. 2.
53.	224.	8. 9.		54.	280.	1. 2.
54.	240.	6.		55.	—	3. 4.
55.	252.	6.		56.	35.	1. 2. 3.
56.	—	5. 6.		57.	120.	1. 2.
57.	14.	3. 4.		58.	34.	6. 7.
58.	—	5. 6.		59.	40.	5. 4.
59.	155.	1.		60.	79.	2. 3.
60.	85.	6.		61.	91.	1. 2.
61.	—	7.		62.	—	3.
62.	132.	1. 2.		63.	97.	7.
63.	142.	1. 2.		64.	—	8. 9.

Fam. III. *Spath. trunc.*

Fam. IV. *Spath. fus.*

Nachtflöter, f. PHALAENA,
NAVCORIS,
NECYDALIS.

NEMOTELVS.

NOTONECTA.

NOTOKVVS.
OESTRVS,
Ohrkäfer, f. FORFICVLA.
ONISCVS.

PANORPA.

Fam. I. *Tetr. Al. angul.*

PAPILIO.

Fam. II. *Tetr. Al. integr.*

Fam. III. *Tetr. Al. integr.*

Fam. III. *Hex. Al. caudat.*

Fam. IV. *Hex. Al. ocell.*

Fam. V. *Hex. Al. angul.*

Fam. VI. *Hex. Al. integr.*

Fam. VII. *Hex. Al. obliqua.*PEDICVLVS.
PEL'IS.

PERLA.

Pferdefliege f. HIPPOBOSCA,
Pflasterkäfer, f. CANTHARIS,
PHALAENA.
Fam. I. *Pell. Al. defl.*

Fam. II. *Pell. Al. plan.*

No.	Tab.	Fig.	
8.	97.	11. 11.	
9.	140.	2. 3.	
10.	—	4. 5.	
11.	149.	1. 2.	
12.	—	3.	
13.	—	4. 5.	
14.	172.	1. 2.	
15.	184.	2. 3.	
1.	162.	1. 2.	
2.	—	3. 4.	
3.	—	7. 8.	
4.	234.	5. 6.	
5.	260.	1. 2.	
6.	274.	1. 2.	
7.	276.	5. 6.	
1.	276.	4. a. b.	
1.	40.	7.	
2.	75.	3.	
3.	—	4.	
4.	—	5.	
5.	—	6.	
6.	95.	4.	
7.	—	5.	
8.	—	6.	
1.	37.	2. 3.	
2.	—	4. 5.	
3.	160.	2. 3.	

Fam. III. *Pell. Al. pat.*Fam. IV. *Setic. Al. defl.*

No.	Tab.	Fig.
2.	43.	11. 12.
3.	68.	2. 3.
4.	—	4. 5.
5.	85.	4. 5.
6.	—	6.
7.	87.	1. 2.
8.	—	3.
9.	88.	4.
10.	—	5.
11.	89.	2. 3.
12.	—	4. 5.
13.	130.	1.
14.	209.	1. 2.
15.	252.	3. 4.
16.	256.	1. 2.
17.	275.	1. 2.
18.	279.	1. 2.
1.	17.	1.
2.	—	2.
3.	58.	1.
4.	—	4.
5.	69.	6.
6.	111.	7.
7.	122.	4.
8.	—	5.
9.	135.	1.
10.	—	2.
11.	202.	1.
12.	212.	5.
1.	19.	16.
2.	24.	6. 7.
3.	31.	8. 9.
4.	37.	7. 8.
5.	41.	17. 18.
6.	43.	13. 14.
7.	47.	2. 3.
8.	51.	8. 9.
9.	—	11. 12.
10.	60.	5. 9.
11.	66.	8. 9.
12.	64.	5. 6.
13.	92.	4.
14.	95.	8. 9.
15.	101.	2. 3.
16.	105.	3. 4.
17.	106.	2. 5.
18.	—	4. 5.
19.	113.	5. 6.
20.	114.	2. 3.
21.	—	4. 5.
22.	115.	1. 2.
23.	116.	2. 3.
24.	117.	7. 8.
25.	118.	2. 3.
26.	—	5. 6.
27.	119.	7. 8.
28.	122.	1.
29.	125.	2. 3.
30.	129.	1. 2.
31.	—	6. 7.
32.	134.	1. 2.
33.	154.	7. 8.
34.	156.	5. 6.
35.	164.	4. 5.
36.	165.	5. 6.
37.	179.	4. 5.
38.	189.	4. 5.

Fam. V. *Setic. Al. plan.*

No.	Tab.	Fig.
39.	203.	1, 2.
40.	210.	4-5.
41.	212.	4-5.
42.	215.	4-5.
43.	218.	4-5.
44.	220.	1, 2.
45.	230.	4-5.
46.	231.	4-5.
47.	233.	2, 3.
48.	235.	2, 3.
49.	236.	5, 6.
50.	240.	7, 8.
51.	241.	1, 2.
52.	242.	1, 2.
53.	243.	1, 2.
54.	250.	1, 2.
55.	251.	4-5.
56.	253.	5-6.
57.	259.	1, 2.
58.	266.	5, 6.
59.	279.	4-5.
1.	1.	5, 6.
2.	9.	14, 15.
3.	12.	1, 2.
4.	—	7, 8.
5.	19.	14, 15.
6.	24.	10, 11.
7.	25.	7, 8.
8.	29.	1, 2.
9.	67.	1, 2.
10.	72.	1, 2.
11.	76.	4-5.
12.	77.	3-4.
13.	80.	6, 7.
14.	92.	3.
15.	112.	1.
16.	119.	1, 2.
17.	126.	2.
18.	—	3.
19.	129.	1, 2.
20.	151.	1, 2.
21.	159.	6, 7.
22.	163.	2, 3.
23.	—	4-5.
24.	164.	6, 7.
25.	173.	2, 2.
26.	173.	2, 2.
27.	180.	4-5.
28.	182.	5, 6.
29.	194.	5, 6.
30.	195.	5, 6.
31.	196.	1, 2.
32.	197.	3-4.
33.	205.	4-5.
34.	209.	4-5.
35.	211.	3-4.
36.	216.	1.
37.	222.	3-4.
38.	223.	2, 3.
39.	225.	4-5.
40.	230.	6, 7.
41.	234.	2, 3.
42.	237.	1, 2.
43.	238.	4-5.
44.	239.	5.
45.	236.	3-4.
46.	237.	1, 2.



PLATYCYERVS.
PODVRA.
O

Fam. VI. *Setic. Al. pat.*

No.	Tab.	Fig.
47.	258.	5, 6.
48.	259.	4-5.
49.	261.	1, 2.
50.	262.	4-5.
51.	263.	4-5.
52.	264.	1, 2.
53.	275.	4-6.
54.	278.	4-5.
55.	—	6, 7.
1.	12.	3.
2.	—	4.
3.	—	5.
4.	—	6.
5.	17.	3.
6.	51.	10.
7.	65.	8.
8.	112.	9.
9.	123.	5.
10.	—	6.
11.	125.	4.
12.	193.	1.
13.	200.	4.
14.	214.	3.
15.	225.	5.
16.	—	6.
17.	229.	1.
18.	250.	1.
19.	263.	3.
20.	268.	3.
21.	269.	3.
22.	271.	3.
23.	275.	3.
24.	276.	3.
25.	277.	3.
1.	29.	9, 10.
2.	59.	8, 9.
3.	102.	1, 2.
4.	145.	2, 3.
5.	—	4.
6.	—	5, 6.
7.	—	7, 8.
8.	247.	2, 3.
9.	266.	1, 2.
10.	270.	1, 2.
11.	159.	1, 2.
12.	173.	5, 6.
13.	216.	2, 3.
14.	39.	1.
15.	3.	10, 11, 12.
16.	37.	9, 10.
17.	44.	4-5.
18.	90.	5, 6.
19.	109.	3-4.
20.	122.	2, 3.
21.	157.	5, 6.
22.	165.	2, 3.
23.	174.	4-5, 6.
24.	180.	1, 2.
25.	196.	4-5.
26.	224.	5, 6.
27.	—	7.
28.	63.	7.
29.	75.	7.
30.	133.	1.
31.	—	2.
32.	213.	5, a, b.

PRIONVS.

PTEROPHORVS.

PVLEX.

PVROCHORA.

RAPHIDIA.

Raubfliege, f. ASILVS.

Raubkäfer, f. STAPHYLINVS.

RHINOMACER.

Rücken schwimmer, f. CORIXA.

Rüsselfliege, f. BOMBYLIVS.

Rüsselkäfer, f. CVRCVLIO.

Sägenblattkäfer, f. MELOLONTHA.

Sägenholzkäfer, f. PRIONVS.

Sägfliege, f. TENTHREDO.

SCARABAEVS.

Fam. I. Lam. tres.

No.	Tab.	Fig.
1.	9.	1.
2.	67.	3.
1.	93.	7.
2.	159.	4.
3.	214.	5.
1.	273.	4. a. b.
1.	50.	4.
1.	93.	1.
2.	—	2.

Fam. II. Lam. septem.

SCATOPSE.
Schabe, f. BLATTA.
Schaumfliege, f. CICADA.
Schildkäfer, f. CASSIDA.
Schildkrötenkäfer, f. ATTELABVS.
Schildlausfliege, f. COCCVS.
Schlupfwespe, f. ICHEVNON.
Schnaatenfliege, f. CYLEX.
Schnarrheuschrecke, f. ACRIDIVM.
Schneckenfliege, f. EMPIS.
Schwanzfliege, f. VROCEVRVS.
Schwimmkäfer, f. DYTICVS.
SCOLYPTVS.
Scorpionfliege, f. PANORPA.
Scorpionspinne, f. CHELIFER.
SILPHIA.

Singfliege, f. TETIGONIA.
SPHEx.

I.	I.	4.
2.	5.	1.
3.	23.	1.
4.	—	3.
5.	—	4.
6.	—	5.
7.	—	6.
8.	—	7.
9.	—	8.
10.	—	9.
11.	26.	1.
12.	—	2.
13.	—	3.
14.	—	4.
15.	—	5.
16.	—	6.
17.	—	7.
18.	—	8.
19.	—	9.
20.	46.	10. II.
21.	50.	8.
22.	—	9.
23.	53.	4.
24.	63.	1.
25.	66.	4.
26.	—	5.
27.	74.	3.
28.	—	6.
29.	95.	3.
30.	144.	5.
31.	—	6.
32.	—	7.
33.	—	8.
34.	151.	4.

Fam. II. Al. int. Caud. simpl.

Fam. III. Al. int. Caud. pil.

No.	Tab.	Fig.
35.	198.	8.
36.	201.	3.
37.	202.	4.
38.	222.	3.
39.	239.	6.
1.	23.	2.
2.	93.	1.
3.	—	2.
4.	102.	3.
5.	—	4.
1.	213.	3. a. b.
I.	46.	I2.
I.	259.	3. a. b.
I.	9.	4.
2.	218.	1.
I.	81.	2. 3.
2.	85.	1. 2.
3.	94.	4. 5.
4.	132.	6.
5.	147.	1. 2.
6.	177.	6. 7.
7.	—	8. 9. a. b.
8.	207.	1. 2.
9.	240.	3. 4.
10.	241.	7.
11.	259.	1.
12.	262.	2.
13.	—	2.
14.	268.	2.
I.	99.	5. 6.
2.	100.	1.
3.	—	2.
4.	—	3. 4.
5.	—	5.
6.	—	6.
7.	203.	3.
1.	1.	8. 9.
2.	16.	4. 5.
3.	—	6. 7.
4.	69.	4. 5.
5.	71.	1.
6.	78.	1. 2.
7.	80.	4. 5.
8.	96.	4. 5.
9.	98.	1. 2.
10.	99.	1. 2.
11.	—	3. 4.
12.	110.	1. 2.
13.	165.	3. 4.
1.	16.	1.
2.	—	2. 3.

No.	Tab.	Fig.		No.	Tab.	Fig.
6.	55.	10. 11.		27.	196.	9.
7.	—	12. 13.		28.	222.	1.
8.	68.	9.		29.	—	2.
9.	—	10.		30.	273.	4.
10.	71.	7.		31.	246.	1.
11.	109.	2.		32.	270.	3.
12.	114.	8.		1.	209.	6. 7.
13.	125.	5.		2.	24.	2.
14.	—	6.		3.	—	3.
15.	130.	3.		4.	—	4.
16.	131.	5. 6.		5.	35.	5.
17.	186.	2.		6.	—	5.
18.	—	3.		7.	52.	2.
19.	190.	4. 5.		8.	53.	5.
20.	194.	2. 2.		9.	—	10.
21.	200.	2.		10.	70.	3. 4. 5.
22.	232.	4. 5.		11.	71.	2.
23.	257.	5. 6.		12.	74.	5.
1.	—	7.		13.	81.	6.
2.	56.	1.		14.	91.	5.
3.	65.	7. 8.		15.	93.	8.
4.	70.	7. 8.		16.	113.	8.
5.	116.	4.		17.	117.	2.
6.	126.	5. 6.		18.	—	3.
7.	154.	3. 4.		19.	122.	6.
8.	—	5. 6.		20.	127.	3.
9.	159.	3. 4.		21.	—	6.
1.	269.	4. a. b.		22.	136.	3.
2.	—	14.		23.	190.	7.
3.	121.	1. 2.		24.	233.	6.
4.	153.	3.		25.	238.	7.
5.	270.	4. a. b.				
			Vformasfliege, f. EPHEMERA. Viehfliege, f. OESTRVS. Vielflüs, f. SCOLOPENDRA. VOLVCELLA.			
1.	15.	3.		1.	10.	4. 5.
2.	—	4.		2.	—	6.
3.	—	5.		3.	—	7.
4.	—	6.		4.	—	8.
5.	—	7.		5.	—	9.
6.	—	8.		6.	36.	7. 8.
7.	—	9.		7.	80.	1.
8.	32.	1.		8.	113.	3.
9.	48.	7.		9.	127.	1.
10.	106.	5.		1.	4.	9. 10.
11.	—	6.		2.	10.	2. 3.
12.	111.	5.		3.	121.	6.
13.	—	6.		4.	205.	1.
14.	115.	5.		5.	—	2.
15.	—	6.		6.	—	3.
16.	117.	6.		7.	207.	5. 6.
17.	126.	4.		8.	237.	3. 4.
18.	156.	7.				
19.	161.	1.				
20.	162.	5.				
21.	—	6.				
22.	151.	1.				
23.	—	2.				
24.	—	3.				
25.	153.	4.				
26.	—	5.				
			Waffenfliege, f. STRATIOMYS. Wanze, f. CIMEX. Wafferfotel, f. ASELLVS. Wafferfloh, f. PODVRA. Wespe, f. VESPA. Zangenkäfer, f. CICINDELA. Zuckergaßt, f. LEPISMA.			

