


IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

S. S. THEOLOGIAE ET PHILOSOPHIAE DOCTORIS
ECCLES. EVANGEL. RATISBON. PASTORIS ET SVPERINTENDENTIS
VEN. CONSIST. ASSESS. PRIMARIJ
SER. AC POTENT. REGI DANIAE NORVEGIAE A CONSILII AC PROFESSORIS
ACADEM. IMP. NATVR. CVRIOS. PETROPOL. LOND. BEROL. VPSAL.
ROBOR. MONACH. ET MANHEM.
SOC. LITT. DVISB. HIST. GOETT. BOTAN. FLORENT. PATRIOT. SVECIC.
PHYSIOGRAPH. LVNDINENS. GOTHOR.
OEC. CELL. BERN. LVSAT. STYR. LVRGHV. AC PLVR. TEVTON. MEMBRI
ACADEM. SCIENT. PARISIENS. AB EPISTOLARVM COMMERCIO

ICONES
INSECTORVM
CIRCA RATISBONAM
INDIGENORVM
COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.

VOLVMEN PRIMVM.



Natürlich ausgemahlte

Abbildungen
Regensburgischer
Infecten.

Erfter Band.



RATISBONAE

TYPIS, BREITFELDIANIS. MDCCLXXIX.

8 9L
466
5330
1779X
V.1
SCNH123

INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. I.

Regensburgische
Insecten.
Erfter Band.

TABVLA I.

Erſte Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX PRIMVS.
Erſter Holzkäfer.
- Fig. II. COCCINELLA PRIMA.
Erſter Blattlauskäfer.
- Fig. III. CHRYSOMELA PRIMA.
Erſter Blattkäfer.
- Fig. IV. SARABAEVS tribus antennarum lamellis PRIMVS.
Erſter Maulwurfskäfer mit dreyſpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VI. PHALAENA ſeticornis alis planis PRIMA.
Erſter Nachtfalter mit borſtigen Fühlhörnern und ſachen Flügeln.
- Fig. VII. STENOCORVS thorace inermi PRIMVS.
Erſter Stutzkäfer mit ſachelloſem Bruſtſchilde.
- Fig. VIII. IX. SPHINX alis integris cauda ſimplici PRIMA.
Erſter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. X. ICHNEVMON PRIMVS.
Erſte Schlupfwefpe.
- Fig. XI. a. b. CVRCVLIO femoribus dentatis PRIMVS.
Erſter Rüſſelkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. XII. a. b. CVRCVLIO femoribus dentatis SECVNDVS.
Zweyter Rüſſelkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. XIII. CARABVS ouatus PRIMVS.
Erſter eyrunder Laufkäfer.

TABULA I.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.

Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. IIX.



Fig. X.




Fig. IX.



Fig. XI




Fig. XIII.



Fig. XII.



TABULA II



Libellula pum. Rat.

Trachusa sc. *Norimb.*

TABVLA II. Zweyte Tafel.

- Fig. I. *BVPRESTIS PRIMA.*
Erster Stinkkäfer.
- Fig. II. *STAPHYLINVS PRIMVS.*
Erster Raubkäfer.
- Fig. III. *CIMEX quinque antennarum articulis PRIMVS.*
Erste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern. *
- Fig. IV. *LIBELLVLA alis patentibus PRIMA.*
Erstes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. V. *ELATER antennis pectinatis PRIMVS.*
Erster Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VI. *ELATER antennis pectinatis SECVNDVS.*
Zweyter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VII. *LEPTVRA thorace globoso PRIMA.*
Erster Aetherholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VII. *LEPTVRA thorace globoso SECVNDA.*
Zweyter Aetherholzkäfer mit kugeligem Brustschilde
- Fig. IX. *LEPTVRA thorace globoso TERTIA.*
Dritter Aetherholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. X. *STENOCORVS thorace armato PRIMVS.*
Erster Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. XI. *CVRCVLIO femoribus muticis PRIMVS.*
Erster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. XII. *CVRCVLIO femoribus muticis SECVNDVS.*
Zweyter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA III. Dritte Tafel.

- Fig. I. CARABVS *oblongus* PRIMVS.
Erster länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CARABVS *oblongus* SECUNDVS.
Zweyter länglicher Laufkäfer.
- Fig. III. DYTICVS PRIMVS.
Erster Schwimmkäfer.
- Fig. IV. CHRYSOMELA SECUNDA.
Zweyter Blattkäfer.
- Fig. V. MELOE PRIMVS.
Erster Mayenwurmkäfer.
- Fig. VI. MELOE SECUNDVS.
Zweyter Mayenwurmkäfer.
- Fig. VII. COPRIS *muticus* PRIMVS.
Erster ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VIII. COPRIS *muticus* SECUNDVS.
Zweyter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. IX. ATTELABVS PRIMVS.
Erster Schildkrötenkäfer.
- Fig. X.XI.XII. PHRYGANEA PRIMA.
Erste Frühlingsfliege.
- Fig. XIII. STENOCORVS *thorace inermi* SECUNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABVLA III.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. V.

Fig. IIX.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI




Fig. XIII.



Fig. XII.



TABVLA IV.



TABVLA IV. Vierte Tafel.

- Fig. I. **LIBELLVLA** *alis patentibus* **SECUNDA.**
Zweytes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. **LEPTVRA** *thorace globoso* **QUARTA.**
Vierter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. III. **LEPTVRA** *thorace globoso* **QUINTA.**
Fünfter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IV. **CRIOCERIS** **PRIMA.**
Erster Lilienkäfer.
- Fig. V. **CRIOCERIS** **SECUNDA.**
Zweyter Lilienkäfer.
- Fig. VI. **ELATER** *antennis ferratis* **PRIMVS.**
Erster Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. **ELATER** *antennis ferratis* **SECUNDVS.**
Zweyter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. **CICINDELA** **PRIMA.**
Erster Zangenkäfer.
- Fig. IX. X. **VROCERVS** **PRIMVS.**
Erste Schwanzfliege.
- Fig. XI. **STAPHYLINVS** **SECUNDVS.**
Zweyter Raubkäfer.
- Fig. XII. **LEPTVRA** *thorace plano* **PRIMA.**
Erster Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. XIII. **LEPTVRA** *thorace plano* **SECUNDA.**
Zweyter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. XIV. **TETIGONIA** **PRIMA.**
Erste Singfliege.

TABVLA V. Fünfte Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SECVNDVS.
Zweyter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. ICHNEVMON SECVNDVS.
Zweyte Schlupfwespe.
- Fig. III. IV. FORMICA PRIMA. FEMINA ET MAS.
Erste Ameise. Weibgen und Männgen.
- Fig. V. VI. HEPA PRIMA.
Erster Wafferfcorpion.
- Fig. VII. VIII. HEMEROBIVS PRIMVS.
Erster Blattlauslöwe.
- Fig. IX. X. CIMEX *quinque* antennarum articulis SECVNDVS.
Zweyte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. CIMEX *quinque* antennarum articulis TERTIVS.
Dritte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABULA V.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VII.



Fig. VI.




Fig. IX.



Fig. IX.




Fig. X



Fig. XI.



TABULA VI.



TABVLA VI. Sechste Tafel.

- Fig. I. MELOLONTHA PRIMA.
Erster Sägenblattkäfer.
- Fig. II. MELOLONTHA SECUNDA.
Zweyter Sägenblattkäfer.
- Fig. III. MELOLONTHA TERTIA.
Dritter Sägenblattkäfer.
- Fig. IV. RHINOMACER PRIMVS.
Erster Afterrüffelkäfer.
- Fig. V. LIBELLVLA alis patentibus TERTIA.
Drittes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. VI, VII. MELOLONTHA QVARTA.
Vierter Sägenblattkäfer.
- Fig. VIII. PLATYCERVS PRIMVS.
Erster Kammkäfer.
- Fig. IX. STENOCORVS thorace inermi TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschild.
- Fig. X. LIBELLVLA alis patentibus QVARTA.
Viertes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. XI. ICHNEVMON TERTIVS.
Dritte Schlupfwespe.
- Fig. XII. ICHNEVMON QVARTVS.
Vierte Schlupfwespe.
- Fig. XIII. ICHNEVMON QVINTVS.
Fünfte Schlupfwespe.


TABVLA VII. Siebende Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris PRIMVS.*
Erster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *TENTHREDO antennis clauatis PRIMA.*
Erste Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *TENTHREDO antennis clauatis SECUNDA.*
Zweyte Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *TENTHREDO antennis clauatis TERTIA.*
Dritte Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *TENTHREDO antennis filiformibus PRIMA.*
Erste Sägfliede mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. VII. *TENTHREDO antennis pectinatis PRIMA.*
Erste Sägfliede mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *TENTHREDO antennis clauatis QVARTA.*
Vierte Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *TENTHREDO antennis clauatis QVINTA.*
Fünfte Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *TENTHREDO antennis setaceis PRIMA.*
Erste Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *TENTHREDO antennis setaceis SECUNDA.*
Zweyte Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *TENTHREDO antennis filiformibus SECUNDA.*
Zweyte Sägfliede mit fadenähnlichen Fühlhörnern.

TABULA VII.



TABULA VIII.




TABVLA VIII. Achte Tafel.

- Fig. I. TABANVS PRIMVS.
Erste Bremsenfliege.
- Fig. II. STENOCORVS thorace armato SECVNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace armato TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. IV. V. VI. TABANVS SECVNDVS.
Zweyte Bremsenfliege.
- Fig. VII. DYTICVS SECVNDVS.
Zweyter Schwimmkäfer.
- Fig. VIII. DYTICVS TERTIVS.
Dritter Schwimmkäfer.
- Fig. IX. DYTICVS QVARTVS.
Vierter Schwimmkäfer.
- Fig. X. DYTICVS QVINTVS.
Fünfter Schwimmkäfer.
- Fig. XI. ASILVS PRIMVS.
Erste Raubfliege.
- Fig. XII. ASILVS SECVNDVS.
Zweyte Raubfliege.
- Fig. XIII. ASILVS TERTIVS.
Dritte Raubfliege.
- Fig. XIV. ASILVS QVARTVS.
Vierte Raubfliege.
- Fig. XV. ASILVS QVINTVS.
Fünfte Raubfliege.

TABVLA IX. Neunte Tafel.

- Fig. I. PRIONVS PRIMVS.
Erster Sägenholzkäfer.
- Fig. II. III. HEMEROBIVS SECVNDVS.
Zweyter Blattlauslöwe.
- Fig. IV. SILPHA PRIMA.
Erster Aaskäfer.
- Fig. V. VI. EPHEMERA PRIMA.
Erste Uferaasfliege.
- Fig. VII. COCCINELLA SECVNDA.
Zweyter Blattlauskäfer.
- Fig. VIII. COCCINELLA TERTIA.
Dritter Blattlauskäfer.
- Fig. IX. COCCINELLA QVARTA.
Vierter Blattlauskäfer.
- Fig. X. COCCINELLA QVINTA.
Fünfter Blattlauskäfer.
- Fig. XI. COCCINELLA SEXTA.
Sechster Blattlauskäfer.
- Fig. XII. COCCINELLA SEPTIMA.
Siebender Blattlauskäfer.
- Fig. XIII. LIBELLVLA alis *potentibus* QVINTA.
Fünftes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. XIV. XV. PHALAENA *seticornis* alis *planis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABULA IX.



TABVLA X.



Fig. VII.



Fig. IX.



TABVLA X. Zehende Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX SECVNDVS.
Zweyter Holzkäfer.
- Fig. II. III. VROCERVS SECVNDVS.
Zweyte Schwanzfliege.
- Fig. IV. V. VOLVCELLA PRIMA.
Erste Federbuschfliege.
- Fig. VI. VOLVCELLA SECVNDA.
Zweyte Federbuschfliege.
- Fig. VII. VOLVCELLA TERTIA.
Dritte Federbuschfliege.
- Fig. VIII. VOLVCELLA QVARTA.
Vierte Federbuschfliege.
- Fig. IX. VOLVCELLA QVINTA.
Fünfte Federbuschfliege.
- Fig. X. XI. NECYDALIS PRIMVS.
Erster Fliegenkäfer.

TABVLA XI. Eilfte Tafel.

- Fig. I. CARABVS *oblongus* TERTIVS.
Dritter länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CARABVS *oblongus* QVARTVS.
Vierter länglicher Laufkäfer.
- Fig. III. CRABRO PRIMVS.
Erste Kolbenfliege.
- Fig. IV. CRABRO SECVNDVS.
Zweyte Kolbenfliege.
- Fig. V. VI. HIPPOBOSCA PRIMA.
Erste Pferdfliege.
- Fig. VII. CERAMBYX TERTIVS.
Dritter Holzkäfer.
- Fig. VIII. ELATER *antennis serratis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. ELATER *antennis serratis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.
- Fig. X. IX. XII. CIMEX *quinque antennarum articulis* QVARTVS.
Vierte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XIII. CARABVS *ovatus* SECVNDVS.
Zweyter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XIV. CARABVS *ovatus* TERTIVS.
Dritter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XV. XVI. CIMEX *quatuor antennarum articulis* PRIMVS.
XVII. Erste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABULA XI.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.




Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. XIII.



Fig. XIV.



Fig. XV.



Fig. XVII.



Fig. XVI.



TABULA XII.

Fig. III.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



TABVLA XII.

Zwölfte Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. IV. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. V. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VI. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VII. VII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IX. LIBELLVLA alis *erectis* PRIMA.
Erstes Jüngerchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. X. NEMOTELVS PRIMVS.
Erste Stiletfliege.
- Fig. XI. NEMOTELVS SECYNDVS.
Zweyte Stiletfliege.
- Fig. XIII. NEMOTELVS TERTIVS.
Dritte Stiletfliege.


TABVLA XIII. Dreyzehende Tafel.

- Fig. I. *CIMEX quatuor antennarum articulis SECUNDVS.*
Zweyte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. II. *CIMEX quatuor antennarum articulis TERTIVS.*
Dritte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *CIMEX quatuor antennarum articulis QVARTVS.*
Vierte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *CIMEX quatuor antennarum articulis QVINTVS.*
Fünfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis SEXTVS.*
Sechste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. *CIMEX quatuor antennarum articulis SEPTIMVS.*
Siebende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *CIMEX quatuor antennarum articulis OCTAVVS.*
Achte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *CIMEX quatuor antennarum articulis NONVS.*
Neunte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS.*
Zehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *CIMEX quatuor antennarum articulis VNDECIMVS.*
Eilfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *CIMEX quatuor antennarum articulis DVODECIMVS.*
Zwölfte Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA XIII.



TABVLA XIV.




TABVLA XIV. Vierzehende Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis caudatis PRIMVS.*
Erster Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. III. IV. *ONISCVS PRIMVS.*
Erste Affel.
- Fig. V. VI. *ONISCVS SECVNDVS.*
Zweyte Affel.
- Fig. VII. *CERAMBYX QVARTVS.*
Vierter Holzkäfer.
- Fig. VIII. *CERAMBYX QVINTVS.*
Fünfter Holzkäfer.
- Fig. IX. *CERAMBYX SEXTVS.*
Sechster Holzkäfer.
- Fig. X. *STRATIOMYS PRIMA.*
Erste Waffenfliege.
- Fig. XI. *STRATIOMYS SECVNDA.*
Zweyte Waffenfliege.
- Fig. XII. XIII. *STRATIOMYS TERTIA.*
Dritte Waffenfliege.
- Fig. XIV. *STRATIOMYS QVARTA.*
Vierte Waffenfliege.
- Fig. XV. *STRATIOMYS QVINTA.*
Fünfte Waffenfliege.

TABVLA XV. Funfzehende Tafel.


- Fig. I. II. BIBIO PRIMVS.
Erste Marcusfliege.
- Fig. III. TIPVLA alis patentibus PRIMA. MAS.
Erste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. IV. TIPVLA alis patentibus SECUNDA. FEMINA.
Zweyte Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. V. TIPVLA alis patentibus TERTIA.
Dritte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. VI. TIPVLA alis patentibus QVARTA.
Vierte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. VII. TIPVLA alis patentibus QVINTA.
Fünfte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. VIII. TIPVLA alis patentibus SEXTA.
Sechste Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. IX. TIPVLA alis patentibus SEPTIMA.
Siebende Erdfliege mit offenen Flügeln.

TABVLA XV.



G. P. Tru. tuer. 202. N. 1. 1. 1.

TABVLA XVI.



TABVLA XVI. Sechzehende Tafel.

- Fig. I. SPHINX *alis integris cauda pilosa f. barbosa* PRIMA.
Erster Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem oder bärtigem Schwanze.
- Fig. II. III. SPHINX *alis integris cauda pilosa* SECUNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze
- Fig. IV. V. SPHINX *alis integris cauda simplici* SECUNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. VII. SPHINX *alis integris cauda simplici* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VIII. TELEPHORVS *oblongus* PRIMVS.
Erster länglicher Warzenkäfer.
- Fig. IX. TELEPHORVS *oblongus* SECUNDVS.
Zweyter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. X. TELEPHORVS *oblongus* TERTIVS.
Dritter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XI. TELEPHORVS *oblongus* QVARTVS.
Vierter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XII. TELEPHORVS *oblongus* QVINTVS.
Fünfter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XIII. TELEPHORVS *oblongus* SEXTVS.
Sechster länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XIV. TELEPHORVS *oblongus* SEPTIMVS.
Siebender länglicher Warzenkäfer.
- Fig. XV. TELEPHORVS *oblongus* OCTAVVS.
Achter länglicher Warzenkäfer.

TABVLA XVII. Siebenzehende Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *peñnicornis* alis *patentibus* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. II. PHALAENA *peñnicornis* alis *patentibus* SECUNDA.
Zweiter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* QUINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum truncata* PRIMA.
Erste Hausfliege mit *abgestutztem* Spadel.
- Fig. V. MVSCA *spatula antennarum truncata* SECUNDA.
Zweite Hausfliege mit *abgestutztem* Spadel.
- Fig. VI. ASILVS SEXTVS.
Sechste Raubfliege.
- Fig. VII. ASILVS SEPTIMVS.
Siebende Raubfliege.
- Fig. VIII. IX. MVSCA *spathula antennarum rotunda* PRIMA.
Erste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABULA XVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. IIX.



Fig. V.




Fig. VII.



Fig. IX.



TABVLA XVIII.



TABVLA XVIII. Achtzehende Tafel.

- Fig. I. CARABVS *oblongus* QVINTVS.
Fünfter länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CARABVS *oblongus* SEXTVS.
Sechster länglicher Laufkäfer.
- Fig. III. CARABVS *oblongus* SEPTIMVS.
Siebender länglicher Laufkäfer.
- Fig. IV. CARABVS *oblongus* OCTAVVS.
Achter länglicher Laufkäfer.
- Fig. V. CARABVS *oblongus* NONVS.
Neunter länglicher Laufkäfer.
- Fig. VI. CARABVS *oblongus* DECIMVS.
Zehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. VII. CARABVS *oblongus* VNDECIMVS.
Eilfter länglicher Laufkäfer.
- Fig. VIII. CARABVS *ouatus* QVARTVS.
Vierter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. IX. CARABVS *oblongus* DVODECIMVS.
Zwölfter länglicher Laufkäfer.
- Fig. X. XI. TELEPHORVS *ouatus* PRIMVS.
Erster eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. XII. XIII. TELEPHORVS *ouatus* SECVNDVS. •
Zweyter eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. XIV. TELEPHORVS *ouatus* TERTIVS.
Dritter eyrunder Warzenkäfer.

TABVLA XIX. Neunzehnde Tafel.

- Fig. I. ELATER antennis *ferratis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. II. ELATER antennis *setaceis* PRIMVS.
Erster Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. III. ELATER antennis *ferratis* SEXTVS.
Sechster Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. ELATER antennis *ferratis* SEPTIMVS.
Siebender Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. V. ELATER antennis *setaceis* SECVNDVS.
Zweyter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VI. ELATER antennis *setaceis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. ELATER antennis *setaceis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen im *halben Monde*.
- Fig. IX. ARANEA oculorum situ *quadrato* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. X. ARANEA oculorum situ *quadrato* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XI. ARANEA oculorum situ *quadrato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XII. ARANEA oculorum situ *quadrato* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen im *Vierecke*.
- Fig. XIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen im *halben Monde*.
- Fig. XIV. XV. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. XVI. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

TABULA XIX.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. XI.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XIII.



Fig. XV.



Fig. XIV.



Fig. XVI.



TABULA XX.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XIII.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. XIV.



TABVLA XX. Zwanzigſte Tafel.




- Fig. I. STAPYLINVS TERTIVS.
Dritter Raubkäfer.
- Fig. II. III. ICHNEVMON SEXTVS.
Sechſte Schlupfwefpe.
- Fig. IV. V. ICHNEVMON SEPTIMVS.
Siebende Schlupfwefpe.
- Fig. VI. ICHNEVMON OCTAVVS.
Achte Schlupfwefpe.
- Fig. VII. ICHNEVMON NONVS.
Neunte Schlupfwefpe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON DECIMVS.
Zehende Schlupfwefpe.
- Fig. IX. ICHNEVMON VNDECIMVS.
Elfte Schlupfwefpe.
- Fig. X. ICHNEVMON DVODECIMVS.
Zwölfte Schlupfwefpe.
- Fig. XI. ICHNEVMON DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Schlupfwefpe.
- Fig. XII. ICHNEVMON DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Schlupfwefpe.
- Fig. XIII. ICHNEVMON DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehende Schlupfwefpe.
- Fig. XIV. ICHNEVMON DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Schlupfwefpe.

TABVLA XXI.


Ein und zwanzigste Tafel.

- | | |
|-------------|--|
| Fig. I. II. | CHRYSOMELA TERTIA.
<i>Dritter Blattkäfer.</i> |
| Fig. III. | CHRYSOMELA QVARTA.
<i>Vierter Blattkäfer.</i> |
| Fig. IV. | CHRYSOMELA QVINTA.
<i>Fünfter Blattkäfer.</i> |
| Fig. V. | CHRYSOMELA SEXTA.
<i>Sechster Blattkäfer.</i> |
| Fig. VI. | CHRYSOMELA SEPTIMA.
<i>Siebender Blattkäfer.</i> |
| Fig. VII. | CHRYSOMELA OCTAVA.
<i>Achter Blattkäfer.</i> |
| Fig. VIII. | CHRYSOMELA NONA.
<i>Neunter Blattkäfer.</i> |
| Fig. IX. | CHRYSOMELA DECIMA.
<i>Zehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. X. | CHRYSOMELA VNDECIMA.
<i>Eilfter Blattkäfer.</i> |
| Fig. XI. | CHRYSOMELA DVODECIMA.
<i>Zwölfter Blattkäfer.</i> |
| Fig. XII. | CHRYSOMELA DECIMA TERTIA.
<i>Dreyzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XIII. | CHRYSOMELA DECIMA QVARTA.
<i>Vierzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XIV. | CHRYSOMELA DECIMA QVINTA.
<i>Fünfzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XV. | CHRYSOMELA DECIMA SEXTA.
<i>Sechzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XVI. | CHRYSOMELA DECIMA SEPTIMA.
<i>Siebenzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XVII. | CHRYSOMELA DECIMA OCTAVA.
<i>Achtzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XVIII. | CHRYSOMELA DECIMA NONA.
<i>Neunzehender Blattkäfer.</i> |
| Fig. XIX. | CHRYSOMELA VICESIMA.
<i>Zwanzigster Blattkäfer.</i> |
| Fig. XX. | CHRYSOMELA VICESIMA PRIMA.
<i>Ein und zwanzigster Blattkäfer.</i> |

TABULA XXI.



TABULA XXII.



A. N. Mang. sculpsit.

TABVLA XXII.

Zwey und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. FORMICALEO PRIMVS.
Erfter Ameifenlöwe.

Fig. III. IV. APIS PRIMA.
Erste Biene.

Fig. V. VI. APIS SECUNDA.
Zweyte Biene.

Fig. VII. APIS TERTIA.
VIII. IX. *Dritte Biene.*

Fig. X. XI. APIS QVARTA.
Vierte Biene.

Fig. XII. XIII. APIS QVINTA.
Fünfte Biene.

Fig. XIV. APIS SEXTA.
Sechste Biene.

Fig. XV. APIS SEPTIMA.
Siebende Biene.

Fig. XVI. APIS OCTAVA.
Achte Biene.

TABVLA XXIII.

Drey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis PRIMVS.
Erster Maulwurfskäfer mit siebenpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVARTVS.
Vierter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVINTVS.
Fünfter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEXTVS.
Sechster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEPTIMVS.
Siebender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis OCTAVVS.
Achter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis NONVS.
Neunter Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS.
Zehender Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

TABVLA XXIII.



I. G. Friedrich sc. Ratub

TABULA XXIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



TABVLA XXIV.

Vier und zanzigfte Tafel.

- Fig. I. *TELEPHORVS oblongus* NONVS.
Neunter länglicher Warzenkäfer.
- Fig. II. *VESPA PRIMA*.
Erste Wespe.
- Fig. III. *VESPA SECVNDA*.
Zweyte Wespe.
- Fig. IV. *VESPA TERTIA*.
Dritte Wespe.
- Fig. V. *VESPA QVARTA*.
Vierte Wespe.
- Fig. VI. VII. *PHALAENA feticornis* alis *deflexis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. VIII. XI. *PHALAENA peñtinicornis* alis *deflexis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. X. IX. *PHALAENA feticornis* alis *planis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA XXV. Fünf und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus *dentatis* TERTIVS.
Dritter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVARTVS.
Vierter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. III. CVRCVLIO femoribus *muticis* TERTIVS.
Dritter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVARTVS.
Vierter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. V. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVINTVS.
Fünfter Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVINTVS.
Fünfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VII. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEXTVS.
Sechster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SEXTVS.
Sechster Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. IX. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEPTIMVS.
Siebender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. X. CVRCVLIO femoribus *muticis* OCTAVVS.
Achter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA XXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



TABVLA XXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



J. W. Mangelorati.

TABVLA XXVI.

Sechs und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VNDECIMVS.
Eilfter Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DVODECIMVS.
Zwölfter Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS NONVS.
Neunzehender Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

TABVLA XXVII. Sieben und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. a. b. ACARVS PRIMVS.
Erste Milbe.
- Fig. II. a. b. ACARVS SECVNDVS.
Zweyte Milbe.
- Fig. III. a. b. c. ACARVS TERTIVS.
Dritte Milbe.
- Fig. IV. a. b. CASSIDA PRIMA.
Erster Schildkäfer.
- Fig. V. CASSIDA SECVNDA.
Zweyter Schildkäfer.
- Fig. VI. VII. ACRIDIVM PRIMVM.
Erste Schnarrheuschrecke.
- Fig. VIII. IX. ACRIDIVM SECVNDVM.
Zweyte Schnarrheuschrecke.
- Fig. X. XI. ACRIDIVM TERTIVM.
Dritte Schnarrheuschrecke.

TABULA XXVII



Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. VIII.




Fig. IX.



Fig. V.



Fig. XI.

I. G. Fiedrich sc. Ratish.

TABULA XXVIII.



TABVLA XXVIII.

Acht und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* PRIMA.
Erfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.


Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA XXIX. Neun und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA feticornis* alis *planis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus* alis *ocellatis* PRIMVS.
Erster *sechsfüssiger* Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.
- Fig. V. VI. *PAPILIO hexapus* alis *caudatis* SECVNDVS.
Zweyter *sechsfüssiger* Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln.
- Fig. VII. VIII. *PHALAENA peñnicornis* alis *deflexis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. IX. X. *PHALAENA feticornis* alis *conuolutis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *zusammen gerollten* Flügeln.

TABULA XXIX.



TABVLA XXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. XIII.



Fig. XIV.



Fig. XV.



Fig. XVI.



Fig. XVII.






TABVLA XXX. Dreysigste Tafel.

- Fig. I. CRYPTOCEPHALVS PRIMVS.
Erster Fallkäfer.
- Fig. II. CRYPTOCEPHALVS SECVNDVS.
Zweyter Fallkäfer.
- Fig. III. CRYPTOCEPHALVS TERTIVS.
Dritter Fallkäfer.
- Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS QVARTVS.
Vierter Fallkäfer.
- Fig. V. CRYOTOCEPHALVS QVINTVS.
Fünfter Fallkäfer.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS SEXTVS.
Sechster Fallkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHMLVS SEPTIMVS.
Siebender Fallkäfer.
- Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS OCTAVVS.
Achter Fallkäfer.
- Fig. IX. COCCINELLA OCTAVA.
Achter Blattlauskäfer.
- Fig. X. COCCINEELA NONA.
Neunter Blattlauskäfer.
- Fig. XI. COCCINELLA DECIMA.
Zehender Blattlauskäfer.
- Fig. XII. COCCINELLA VNDECIMA.
Elfter Blattlauskäfer.
- Fig. XIII. COCCINELLA DVODECIMA.
Zwölfter Blattlauskäfer.
- Fig. XIV. COCCINELLA DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Blattlauskäfer.
- Fig. XV. COCCINELLA DECIMA QVARTA.
Vierzehender Blattlauskäfer.
- Fig. XVI. COCCINELLA DECIMA QVINTA.
Fünfzehender Blattlauskäfer.
- Fig. XVII. COCCINELLA DECIMA SEXTA.
Sechzehender Blattlauskäfer.


TABVLA XXXI. Ein und dreysigste Tafel.

- Fig. I. ELATER antennis *ferratis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. II. ELATER antennis *ferratis* NONVS.
Neunter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. III. ELATER antennis *ferratis* DECIMVS.
Zehender Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. ELATER antennis *pectinatis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *gekämmten* Fühlhörnern.
- Fig. V. ELATER antennis *setaceis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VI. ELATER antennis *ferratis* VNDECIMVS.
Elfter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. ELATER antennis *setaceis* SEXTVS.
Sechster Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. XII. BVPRESTIS SECVNDA.
Zweyter Stinkkäfer.
- Fig. XIII. CARABVS *ouatus* QVINTVS.
Fünfter *eyrunder* Laufkäfer.
- Fig. XIV. ARANEA oculorum situ *femilunato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

TABVLA XXXI.



TABULA XXXII.



TABVLA XXXII.

Zwey und dreyßsigste Tafel.

- Fig. I. TIPVLA alis *patentibus* OCTAVA.
Achte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. II. APIS NONA.
Neunte Biene.
- Fig. III. APIS DECIMA.
Zehende Biene.
- Fig. IV. APIS VNDECIMA.
Eilfte Biene.
- Fig. V. APIS DVODECIMA.
Zwölfte Biene.
- Fig. VI. VII. APIS DECIMA TERTIA.
VIII. *Dreyzehende Biene.*
- Fig. IX. X. APIS DECIMA QVARTA.
Vierzehende Biene.
- Fig. XI. XII. APIS DECIMA QVINTA.
Fünfzehende Biene.
- Fig. XIII. APIS DECIMA SEXTA.
Sechzehende Biene.
- Fig. XIV. APIS DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Biene.
- Fig. XV. APIS DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Biene.
- Fig. XVI. APIS DECIMA NONA.
XVII. *Neunzehende Biene.*
- Fig. XVIII. APIS VICESIMA.
Zwanzigste Biene.
- Fig. XIX. APIS VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Biene.
- Fig. XX. ARANEA oculorum situ *trium linearum* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen in drey Reihen.

TABVLA XXXIII.
Drey und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. HYDROPHILVS PRIMVS.
 Erster Wafferkäfer.

Fig. III. IV. NAVCORIS PRIMVS.
 Erste Afterwanze.

Fig. V. VI. NOTONECTA PRIMA.
 Erste Wafferwanze.

Fig. VII. VIII. HEPA SECVNDA.
 IX. *Zweyter Wafferfcorpion.*

Fig. X. HYDROPHILVS SECVNDVS.
 Zweyter Wafferkäfer.

TABVLA XXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. VI.




Fig. X.



Fig. IX.



TABVLA XXXIV.



Loebel p. R.

A. L. e. Naag sc. Ratibonæ.

TABVLA XXXIV.

Vier und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* NONVS.
Neunter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS.
Zehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. III. CVRCVLIO femoribus *muticis* VNDECIMVS.
Eilfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. IV. CRIOCERIS TERTIA.
Dritter Lilienkäfer.
- Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* TERTIA.
Dritter Aetherholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VI, VII. PAPILIO *hexapus* alis *integris* PRIMVS.
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. VIII. CICINDELA SECUNDA.
Zweyter Zangenkäfer.
- Fig. IX. CICINDELA TERTIA.
Dritter Zangenkäfer.
- Fig. X. APIS VICESIMA SECUNDA.
Zwey und zwanzigste Biene.
- Fig. XI. APIS VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Biene.
- Fig. XII. STENOCORVS thorace *inermi* QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit flachellosem Brustschilde.

TABVLA XXXV.

Fünf und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. III. *PAPILIO hexapus alis angulatis PRIMVS.*
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. IV. *VESPA QVINTA.*
Fünfte Wespe.

Fig. V. *VESPA SEXTA.*
Sechste Wespe.

Fig. VI. *BVPRESTIS TERTIA.*
Dritter Stinkkäfer.

Fig. VII. *BVPRESTIS QVARTA.*
Vierter Stinkkäfer.

Fig. VIII. *ARANEA oculorum situ semilunato QVARTA.*
Vierte Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. IX. *STAPHYLINVS QVARTVS.*
Vierter Raubkäfer.

Fig. X. *CICINDELA QVARTA.*
Vierter Zangenkäfer.

TABVLA XXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.




Fig. IX.



Fig. X.



TABVLA XXXVI.



L. p. R.

I G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA XXXVI. Sechs und dreyßigste Tafel.


- Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. CASSIDA TERTIA.
Dritter Schildkäfer.
- Fig. III. STOMOXOIDES PRIMVS.
Erste Taschenmesserfliege.
- Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- Fig. VI. STAPHYLINVS QVINTVS.
Fünfter Raubkäfer.
- Fig. VII. VIII. VOLVCELLA SEXTA.
Sechste Federbuschfliege.
- Fig. IX. X. MVSCA *spathula antennarum oblonga* PRIMA.
Erste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. XI. XII. MVSCA *spatula antennarum rotunda* SECVNDA.
Zweyte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. XIII. MELOLONTHA QVINTA.
Fünfter Sägenblattkäfer.
- Fig. XIV. MELOLONTHA SEXTA.
Sechster Sägenblattkäfer.

TABVLA²XXXVII.

Sieben und dreyßigte Tafel.

- Fig. I. GRVLLVS PRIMVS.
Erste Grille.
- Fig. II. III. PERLA PRIMA.
Erste Afterfrühlingsfliege.
- Fig. IV. V. PERLA SECUNDA.
Zweyte Afterfrühlingsfliege.
- Fig. VI. TENEBRIO antennarum articulis *lentiformibus* PRIMVS.
Erster Mehlkäfer mit linfenförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IX. X. PHRYGANEA SECUNDA.
Zweyte Frühlingsfliege.
- Fig. XI. ARANEA oculorum situ *femilunato* QVINTA.
Fünfte Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. XII. MVSCA *spathula* antennarum *oblonga* SECUNDA.
Zweyte Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. XIII. RHINOMACER SECUNDVS.
Zweyter Afterrüffelkäfer.


TABVLA XXXVII.



Loibel p. R.

Ch. & Maas sc. Ratibon. p.

TABVLA XXXVIII.



TABVLA XXXVIII.

Acht und dreyfsigste Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Schlupfwespe.
- Fig. II. ELATER antennis *peñinatis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. III. CARABVS *oblongus* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. LEPTVRA thorace *cylindraceo* SECVNDA.
Zweiter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace *globoso* SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VII. LEPTVRA thorace *globoso* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. VIII. LEPTVRA thorace *globoso* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA thorace *globoso* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. X. XI. PHALAENA *peñinicornis* alis *deflexis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA XXXIX.

Neun und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace *cylindraceo* TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. II. LEPTVRA thorace *conico* PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. III. LEPTVRA thorace *conico* SECUNDA.
Zweiter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace *conico* TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. LEPTVRA thorace *conico* QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace *conico* QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VII. LEPTVRA thorace *conico* SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VIII. LEPTVRA thorace *conico* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA thorace *conico* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. X. LEPTVRA thorace *conico* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. XI. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. XII. STAPHYLINVS SEXTVS.
Sechster Raubkäfer.
- Fig. XIII. PHALANGIVM PRIMVM.
Erste Afterspinne.

TABVLA XXXIX.



S. L. p. R.

I. G. Fridrick sc. Rat.

TABVLA XL.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.




Fig. IX.



L. F. R.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA XL. Vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *MVSCA* *spathula antennarum oblonga* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis integris* SECUNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. V. VI. *CASSIDA* QVARTA.
Vierter Schildkäfer.
- Fig. VII. *PELTIS* PRIMA.
Erster Geißerkäfer.
- Fig. VIII. IX. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* PRIMVS.
Erster vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

TABVLA XLI.

Ein und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. III. *CIMEX quinque* antennarum articulis *QVINTVS*.
Fünfte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. *CIMEX quatuor* antennarum articulis *DECIMVS TERTIVS*.
Dreyzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. *CIMEX quatuor* antennarum articulis *DECIMVS QVARTVS*.
Vierzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. IX. *CIMEX quinque* antennarum articulis *SEXTVS*.
Sechste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. XI. *ICHNEVMON DECIMVS OCTAVVS*.
Achtzehende Schlupfwespe.
- Fig. XII. XIII. *FORFICVLA PRIMA*.
Erster Ohrkäfer.
- Fig. XIV. *CARABVS ouatus* *SEXTVS*.
Sechster eyrunder Laufkäfer.
- Fig. XV. XVI. *TELEPHORVS ouatus* *QVARTVS*.
Vierter eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. XVII. XVIII. *PHALAENA feticornis* alis *deflexis* *QVINTA*.
Fünfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABULA XLI.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. XIII.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. XV.



Fig. XIV.



Fig. XVII.




Fig. XVI.



Fig. XVIII.



TABVLA XLII.



TABVLA XLII.


Zwey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *DERMESTES PRIMVS.*
Erfter Speckkäfer.
- Fig. III. *DERMESTES SECVNDVS.*
Zweyter Speckkäfer.
- Fig. IV. *DERMESTES TERTIVS.*
Dritter Speckkäfer.
- Fig. V. VI. *CHRYISIS PRIMA.*
Erste Goldwespe.
- Fig. VII. *EPHEMERA SECVNDA.*
Zweyte Vferaasfliege.
- Fig. VIII. IX. *TENTHREDO antennis setaceis TERTIA.*
Dritte Sägfiege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *ATTELABVS SECVNDVS.*
Zweyter Schildkrötenkäfer.
- Fig. XI. *CIMEX quinque antennarum articulis SEPTIMVS.*
Siebende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.*
Fünfzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XIII. *ARANEA oculorum situ semilunato SEXTA.*
Sechste Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA XLIII. Drey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. ICHNEVMON DECIMVS NONVS.
Neunzehende Schlupfwespe.
- Fig. III. IV. CIME X *quinque* antennarum articulis OCTAVVS.
Achte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VI. ICHNEVMON VICESIMVS.
Zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. VIII. CIME X *quatuor* antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. CVRCVLIO femoribus muticis DVODECIMVS.
Zwölfter Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. X. CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. XI. XII. PHALAENA *feticornis* alis planis SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. XIII. XIV. PHALAENA *pestinicornis* alis deflexis SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. XV. XVI. CIME X *quinque* antennarum articulis NONVS.
Neunte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA XLIII



TABVLA XLIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. X.



TABVLA XLIV.

Vier und vierzigste Tafel.


- Fig. I. CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. CHRYSOMELA VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. III. APIS VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Biene.
- Fig. IV. V. PHRYGANEAE TERTIA.
Dritte Frühlingsfliege.
- Fig. VI. LIBELLVLA alis erectis SECVNDA.
Zweytes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VII. VIII. CRABRO TERTIVS.
Dritte Kolbenfliege.
- Fig. IX. X. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. XI. ARANEAE oculorum situ *quatuor linearum* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen in vier Reihen.

TABVLA XLV.


Fünf und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis caudatis TERTIVS.*
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis caudatis QVARTVS.*
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. V. *ELATER antennis peñinatis QVINTVS.*
Fünfter Springkäfer mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VI. *APIS VICESIMA QVINTA.*
Fünf und zwanzigste Biene.
- Fig. VII. *ICHNEVMON VICESIMVS PRIMVS.*
Ein und zwanzigste Schlupfwespe.

TABULA XLV.



TABVLA XLVI.



TABVLA XLVI.


Sechs und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *CIMEX quinque* antennarum articulis DECIMVS. .
Zehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *CIMEX quinque* antennarum articulis VNDECIMVS.
Elfte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. *CIMEX quinque* antennarum articulis DVODECIMVS.
Zwölfte Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *CIMEX quinque* antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. VIII. *CIMEX quinque* antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. BOMBYLIVS PRIMVS.
Erste Rüsselfliege.
- Fig. X. XI. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS.
Zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. SCOLOPENDRA PRIMA.
Erster Vielfuß.


TABVLA XLVII. Sieben und vierzigste Tafel.

- Fig. I. CANTHARIS PRIMA.
Erster Pflasterkäfer.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. V. CHRYSOMELA VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VI. STRATIOMYS SEXTA.
Sechste Waffenfliege.
- Fig. VII. VIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* SEPTIMA.
Siebende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. IX. X. ASILVS OCTAVVS.
Achte Raubfliege.

TABULA XLVII.



TABULA XLVIII.



TABVLA XLVIII.

Acht und vierzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis erectis TERTIA.
Drittes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. LIBELLVLA alis erectis QVARTA.
Viertes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. III. LIBELLVLA alis erectis QVINTA.
Fünftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace cylindraceo QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. LEPTVRA thorace cylindraceo QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. COCCINELLA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Blattlauskäfer.
- Fig. VII. TIPVLA alis patentibus NONA.
Neunte Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. VIII. CIMEX quatuor antennarum articulis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. ASILVS NONVS.
Neunte Raubfliege.
- Fig. X. ASILVS DECIMVS.
Zehende Raubfliege.
- Fig. XI. CLERVS PRIMVS.
Erster Bienenkäfer.

TABVLA XLIX. Neun und vierzigste Tafel.

- Fig. I. *BVPRESTIS QVINTA.*
Fünfter Stinkkäfer.
- Fig. II. III. *STOMOXOIDES SECVNDVS.*
Zweyte Tafchenmefserfliege.
- Fig. IV. *ICHNEVMON VICESIMVS SECVNDVS.*
Zwey und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. *ARANEA oculorum situ semilunato OCTAVA.*
Achte Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. VI. *ARANEA oculorum situ semilunato NONA.*
Neunte Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. VII. *ARANEA oculorum situ duarum linearum PRIMA.*
Erste Spinne mit Augen in zwey Reihen.
- Fig. VIII. *ARANEA oculorum situ duarum linearum SECVNDA.*
Zweyte Spinne mit Augen in zwey Reihen.
- Fig. IX. *ARANEA oculorum situ quatuor linearum SECVNDA.*
Zweyte Spinne mit Augen in vier Reihen.

TABVLA XLIX.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. IX.



Fig. VIII.

TABULA L.



TABVLA L.



Funfzigste Tafel.

- Fig. I. III. LIBELLOIDES PRIMVS. FEMINA.
Erstes Afterjüngferchen. Weibgen.
- Fig. II. LIBELLOIDES SECVNDVS. MAS.
Zweytes Afterjüngferchen. Männgen.
- Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SEPTIMVS.
Siebender Rüsselkäfer mit gezähnten Schenkeln.
- Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. TENTHREDO *antennis setaceis* QVARTA.
Vierte Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. BVPRESTIS SEXTA.
Sechster Stinkkäfer.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster Maulwurfskäfer mit drey-spaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Maulwurfskäfer mit drey-spaltigen Fühlhörnern.
- Fig. X. APIS VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Biene.


TABVLA LI. Ein und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. II. ASILVS VNDECIMVS.
Eilfte Raubfliege.
- Fig. III. TENEBRIO antennarum articulis *clauatis* PRIMVS.
Erfter Mehlkäfer mit käulenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. MELOLONTA SEPTIMA.
Siebender Sägenblattkäfer.
- Fig. VI. COCCINELLA DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Blattlauskäfer.
- Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. X. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. XI. XII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABULA LI.



TABULA III.



TABVLA LII.

Zwey und funfzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* SEXTA.
Sechstes Jüngerchen mit *offenen* Flügeln.
- Fig. II. VESPA SEPTIMA.
Siebende Wespe.
- Fig. III. NEMOTELVS QVARTVS.
Vierte Stiletfliege.
- Fig. IV. ICHNEVMON VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. APIS VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Biene.
- Fig. VII. CANTHARIS SECVNDA.
Zweyter Pflasterkäfer.
- Fig. VIII. LEPTVRA thorace *cyindraceo* SEXTA.
Sechster Aetherholzkäfer mit *walzenähnlichem* Brustschilde.
- Fig. IX. X. CRIOCERIS QVARTA.
Vierter Lilienkäfer.
- Fig. XI. XII. MELOLONTHA OCTAVA.
Achter Sägenblattkäfer.
- Fig. XIII. MVSCA spathula antennarum *rotunda* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. XIV. ASILVS DVODECIMVS.
Zwölfte Raubfliege.

TABVLA LIII.

Drey und funfzigte Tafel.

- Fig. I. II. HIPPOBOSCA SECUNDA.
Zweyte Pferdfliege.
- Fig. III. NEMOTELVS QVINTVS.
Fünfte Stiletfliege.
- Fig. IV. SCARABAEVS tribus antennarum lamellis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. VESPA OCTAVA.
Achte Wespe.
- Fig. VI. RHINOMACER TERTIVS.
Dritter Afterrüsselkäfer.
- Fig. VII. BVPRESTIS SEPTIMA.
Siebender Stinkkäfer.
- Fig. VIII. CEROCOMA PRIMA. MAS.
Erster Kronenkäfer. Männchen.
- Fig. IX. CEROCOMA SECUNDA. FEMINA.
Zweyter Kronenkäfer. Weibchen.
- Fig. X. VESPA NONA.
Neunte Wespe.
- Fig. XI. APIS VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigste Biene.

TABULA LIII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.




Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. X.



Fig. XI.



TABULA LIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. X.



TABVLA LIV.

Vier und funfzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. II. MVSCA *spathula antennarum oblonga* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. III. MVSCA *spathula antennarum oblonga* SEXTA.
Sechste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum oblonga* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum oblonga* OCTAVA.
Achte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. VI. VII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. VIII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* NONA.
Neunte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. IX. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA.
Zehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. X. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. XI. MVSCA *spathula antennarum rotunda* SEXTA.
Sechste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA LV. Fünf und funfzigste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX SEPTIMVS.
Siebender Holzkäfer.
- Fig. II. CERAMBYX OCTAVVS.
Achter Holzkäfer.
- Fig. III. CERAMBYX NONVS.
Neunter Holzkäfer.
- Fig. IV. CERAMBYX DECIMVS.
Zehender Holzkäfer.
- Fig. V. CERAMBYX VNDECIMVS.
Elfter Holzkäfer.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace cylindraceo SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VII. LEPTVRA thorace plano QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VIII. LEPTVRA thorace globoso DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA thorace cylindraceo OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. X. XI. TENTHREDO antennis clauatis SEXTA.
Sechste Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Egi. XII. TENTHREDO antennis clauatis SEPTIMA.
XIII. *siebende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.*

TABULA LV.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. XIII.



TABVLA LVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



TABVLA LVI. Sechs und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. TENTHREDO *antennis pectinatis* SECUNDA.
Zweyte Sägfliche mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. II. TENTHREDO *antennis filiformibus* TERTIA.
Dritte Sägfliche mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. III. TENTHREDO *antennis filiformibus* QVARTA.
Vierte Sägfliche mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. IV. RHINOMACER QVARTVS.
Vierter Afterrüffelkäfer.
- Fig. V. VI. RHINOMACER QVINTVS.
Fünfter Afterrüffelkäfer.
- Fig. VII. RHINOMACER SEXTVS.
Sechster Afterrüffelkäfer.
- Fig. VIII. RHINOMACER SEPTIMVS.
Siebender Afterrüffelkäfer.
- Fig. IX. RHINOMACER OCTAVVS.
Achter Afterrüffelkäfer.
- Fig. X. RHINOMACER NONVS.
Neunter Afterrüffelkäfer.

TABVLA LVII.

Sieben und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. *CIMEX quinque* antennarum articulis *DECIMVS SEXTVS*.
Sechzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *CIMEX quinque* antennarum articulis *DECIMVS SEPTIMVS*.
Siebenzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *CIMEX quatuor* antennarum articulis *DECIMVS OCTAVVS*.
Achtzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. *CIMEX quatuor* antennarum articulis *DECIMVS NONVS*.
Neunzehende Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *CIMEX quinque* antennarum articulis *DECIMVS OCTAVVS*.
Achtzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. VIII. *CIMEX quinque* antennarum articulis *DECIMVS NONVS*.
Neunzehende Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IX. *CIMEX quinque* antennarum articulis *VICESIMVS*.
Zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *CIMEX quinque* antennarum articulis *VICESIMVS PRIMVS*.
Ein und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XI. *CIMEX quinque* antennarum articulis *VICESIMVS SECVNDVS*.
Zwey und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. XII. *CIMEX quatuor* antennarum articulis *VICESIMVS*.
Zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA LVII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



TABVLA LVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



TABVLA LVIII.

Acht und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *peñnicornis* alis *patentibus* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. II. III. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* SECVNDVS.
Zweyter vierfüßiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.
- Fig. IV. PHALAENA *peñnicornis* alis *patentibus* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VNDECIMA.
Eilfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DVODECIMA.
Zwölfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. VII. CANTHARIS TERTIA.
Dritter Pflasterkäfer.
- Fig. VIII. LEPTVRA *thorace conico* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.
- Fig. IX. LEPTVRA *thorace conico* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.
- Fig. X. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.

TABVLA LIX.

Neun und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. CANTHARIS QVARTA.
Vierter Pflasterkäfer.
- Fig. II. III. STRATIOMYS SEPTIMA.
Siebende Waffenfliege.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ *femilunato* DECIMA.
Zehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

TABULA LIX.




Fig. IV.



Fig. V.



TABVLA LX.



L. v. R.

I. G. Friedrich sc. Rat.



TABVLA LX. Sechzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA *alis patentibus* SEPTIMA.
Siebendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. CLERVS SECVNDVS.
Zweyter Bienenkäfer.
- Fig. III. TENEBRIO *antennarum articulis lentiformibus* SECVNDVS.
Zweyter Mehlkäfer mit linsenförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. ICHNEVMON VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. CVRCVLIO *femoribus muticis* DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehnder Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. VII. PHALAENA *pedinicornis alis deflexis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis alis deflexis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. X. CIMEX *quinque antennarum articulis* VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA LXI. Ein und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *peñicornis* alis *deflexis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden*
Flügeln.
- Fig. III. ICHNEVMON VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. ICHNEVMON VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. ICHNEVMON TRICESIMVS.
Dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. ICHNEVMON TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. IX. ICHNEVMON TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyßigste Schlupfwespe.
- Fig. X. ICHNEVMON TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyßigste Schlupfwespe.

TABVLA LXI.



TABVLA LXII.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.




Fig. VI.



Fig. V.




Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. IX.



TABVLA LXII.

Zwey und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. *LOCVSTA PRIMA.*
Erste Heuschrecke.
- Fig. III. IV. *LOCVSTA SECVNDA.*
Zweyte Heuschrecke.
- Fig. V. *LOCVSTA TERTIA.*
Dritte Heuschrecke.
- Fig. VI. *COCCINELLA DECIMA NONA.*
Neunzehender Blattlauskäfer.
- Fig. VII. *MELOLONTHA NONA.*
Neunter Sägenblattkäfer.
- Fig. VIII. IX. *TENTHREDO antennis setaceis QVINTA.*
Fünfte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS SEXTVS.*
Sechzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. XI. *CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS SEPTIMVS.*
Siebenzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA LXIII. Drey und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. COPRIS *corniger* PRIMVS.
Erster gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. III. COPRIS *corniger* SECVNDVS.
Zweyter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. IV. COPRIS *corniger* TERTIVS.
Dritter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. V. COPRIS *corniger* QVARTVS.
Vierter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VI. LEPTVRA *thorace plano* QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VII. PLATYCERVS SECVNDVS.
Zweyter Kammkäfer.
- Fig. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA LXIII

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABULA LXIV.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.

Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. VII.

TABVLA LXIV.


Vier und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA peñnicornis* alis *deflexis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. III. *LEPTVRA* thorace *globoso* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *kugeligem* Brustschilde.
- Fig. IV. *LEPTVRA* thorace *plano* SEXTA.
Sehster Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.
- Fig. V. *LEPTVRA* thorace *plano* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.
- Fig. VI. *LEPTVRA* thorace *plano* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.
- Fig. VII. *LEPTVRA* thorace *plano* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.
- Fig. VIII. *ARANEA* oculorum situ *quadrato* QVINTA.
Fünfte Spinne mit Augen *im Vierecke*.

TABVLA LXV. Fünf und sechzigste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX DVODECIMVS.
Zwölfter Holzkäfer.
- Fig. II. CRYPTOCEPHALVS NONVS.
Neunter Fallkäfer.
- Fig. III. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS.
Zehender Fallkäfer.
- Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS VNDECIMVS.
Elfter Fallkäfer.
- Fig. V. CRYPTOCEPHALVS DVODECIMVS.
Zwölfter Fallkäfer.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Fallkäfer.
- Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VIII. CHRYSOMELA VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. IX. CHRYSOMELA VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. X. CHRYSOMELA VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. XI. LEPTVRA thorace conico DECIMA QVINTA.
Fünfzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.

TABULA LXV



TABULA LXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



TABVLA LXVI. Sechs und fechzigste Tafel.

- Fig. I. TENEBRIO antennarum articulis *lentiformibus* TERTIVS.
Dritter Mehlkäfer mit linsenförmigen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. CARABVS *ouatus* SEPTIMVS.
Siebender eyrunder Laufkäfer.
- Fig. VII. CARABVS *ouatus* OCTAVVS.
Achter eyrunder Laufkäfer.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VNDECIMA.
Elfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA LXVII. Sieben und sechzigste Tafel.

- Fig. I, II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. PRIONVS *secvndvs*.
Zweyter Sägenholzkäfer.
- Fig. IV. BVPRESTIS OCTAVA.
Achter Stinkkäfer.
- Fig. V. BVPRESTIS NONA.
Neunter Stinkkäfer.
- Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA.
Zehender Stinkkäfer.
- Fig. VII. BVPRESTIS VNDECIMA.
Eilfter Stinkkäfer.
- Fig. VIII. BVPRESTIS DVODECIMA.
Zwölfter Stinkkäfer.
- Fig. IX. BVPRESTIS DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Stinkkäfer.
- Fig. X, XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

TABULA LXVII.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. IX.



TABVLA LXVIII.



Loubd p. R.

J. K. Maagse Rat

TABVLA LXVIII. Acht und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. *LEPTVRA thorace plano DECIMA.*
Zehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde,
- Fig. II. III. *PHALAENA peñinicornis alis planis TERTIA.*
Dritter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln,
- Fig. IV. V. *PHALAENA peñinicornis alis planis QVARTA.*
Vierter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln,
- Fig. VI. *MVSCA fpathula antennarum rotunda SEPTIMA.*
Siebende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. VIII. *TENTHREDO antennis peñinatis TERTIA.*
Drite Sägfliche mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. IX. *TENTHREDO antennis clauatis OCTAVA.*
Achte Sägfliche mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. X. *TENTHREDO antennis clauatis NONA.*
Neunte Sägfliche mit käulförmigen Fühlhörnern,

TABVLA LXIX. Neun und sechzigste Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace *plano* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.
- Fig. II. III. PHALAENA *peñnicornis* alis *deflexis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängen-*
den Flügeln.
- Fig. IV. V. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.
- Fig. VI. PHALAENA *peñnicornis* alis *patentibus* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. VII. APIS VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigste Biene.
- Fig. VIII. APIS TRICESIMA.
Dreßsigste Biene.
- Fig. IX. APIS TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreßsigste Biene.

TABVLA LXIX.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. VIII.



TABULA LXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Loebel p. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA LXX.
Siebenzigste Tafel.

Fig. II. II. PAPILIO *tetrapus alis angulatis* SECVNDVS.
Zweyter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. VESPA DECIMA.
V. Zehende Wespe.

Fig. VI. ICHNEVMON TRICESIMVS QVINTVS.
Fünf und dreyszigste Schlupfwespe.

Fig. VII. VIII. TENTHREDO *antennis pectinatis* QVARTA.
vierte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.

TABVLA LXXI. Ein und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. SPHINX *alis integris cauda simplici* QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. II. VESPA VNDECIMA.
Eilfte Wespe.
- Fig. III. STAPHYLINVS SEPTIMVS.
Siebender Raubkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pestinicornis* *alis deflexis* DECIMA QVINTA.
Fünfzehnder Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum rotunda* OCTAVA.
Achte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA.
Zehende Sägfiege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. ARANEA *oculorum situ femilunato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA LXXI



Fig. II.



Fig. IV.




Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VIII.



TABVLA LXXII



TABVLA LXXII.
Zwey und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAEANA *seticornis* *alis planis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. STENOCORVS *thorace inermi* QUINTVS.
Fünfter Stuzkäfer mit *flachellosem* Brustschild.

Fig. IV. ICHNEVMON TRICESIMVS SEXTVS.
Sechs und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. V. ICHNEVMON TRICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. VI. VII. TABANVS TERTIVS.
VIII. *Dritte* Bremsenfliege.

TABVLA LXXIII.
Drey und fiebenzigste Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON TRICESIMVS OCTAVVS.
Acht und dreyszigste Schlupfwespe.
- Fig. II. COPRIS *corniger* QVINTVS.
Fünfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. III. COPRIS *corniger* SEXTVS.
Sechster gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. IV. COPRIS *corniger* SEPTIMVS.
Siebender gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. V. COPRIS *corniger* OCTAVVS.
Achter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VI. COPRIS *muticus* TERTIVS.
Dritter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. VII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* NONA.
Neunte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VIII. MVSCA *spathula antennarum fusiformi* PRIMA.
Erste Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.
- Fig. IX. ICHNEVMON TRICESIMVS NONVS.
Neun und dreyszigste Schlupfwespe.

TABULA LXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



TABULA LXXIV.



Fig. VI



Loebel p. R.

S. L. Magn. ec. Rat.

TABVLA LXXIV.

Vier und siebenzigste Tafel.

- Fig. I, II. FORMICALEO SECVNDVS.
Zweyter Ameisenlöwe.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühl-
hörnern.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS.
Vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. VESPA DVODECIMA.
Zwölfte Wespe.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühl-
hörnern.
- Fig. VII, VIII. CHRYSIS SECVNDA.
Zweyte Goldwespe.

TABVLA LXXV.

Fünf und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus* *alis integris* TERTIVS.
Dritter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. *PELTIS* SECVND^A.
Zweyter Geißerkäfer.

Fig. IV. *PELTIS* TERTIA.
Dritter Geißerkäfer.

Fig. V. *PELTIS* QVART^A.
Vierter Geißerkäfer.

Fig. VI. *PELTIS* QVINT^A.
Fünfter Geißerkäfer.

Fig. VII. *PLATYCERVS* TERTIVS.
Dritter Kammkäfer.

Fig. VIII. *RHINOMACER* DECIMVS.
Zehender Afterrüßelkäfer.

TABULA LXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA LXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



TABVLA LXXVI.

Sechs und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. RHINOMACER VNDECIMVS.
Eilfter Afterrüffelkäfer.
- Fig. II. RHINOMACER DVODECIMVS.
Zwölfter Afterrüffelkäfer.
- Fig. III. RHINOMACER DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Afterrüffelkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *planis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit borftigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. NEMOTELVS SEXTVS.
Sechste Stiletfliege.
- Fig. VII. NEMOTELVS SEPTIMVS.
Siebende Stiletfliege.
- Fig. VIII. NEMOTELVS OCTAVVS.
Achte Stiletfliege.
- Fig. IX. NEMOTELVS NONVS.
Neunte Stiletfliege.

TABVLA LXXVII. Sieben und fiebenzigfte Tafel.

- Fig. I. ELATER *antennis fetaceis* SEPTIMVS.
Siebender Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. II. ELATER *antennis fetaceis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. III. IV. PHALAENA *feticornis* *alis planis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. V. MELOLONTHA DECIMA.
Zehender Sägenblattkäfer.
- Fig. VI. DIAPERIS PRIMA.
Erster Herzkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Falkkäfer.
- Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender Falkkäfer.

TABULA LXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.





Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA LXXVIII.



TABVLA LXXVIII.

Acht und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* SEXTA.
Sechster Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem
Schwanze.
- Fig. III. BOMBYLIVS SECVNDVS.
Zweyte Rüsselfliege.
- Fig. IV. APIS TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyßigste Biene.
- Fig. V. APIS TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyßigste Biene.
- Fig. VI. ASILVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Raubfliege.

TABVLA LXXIX.

Neun und fiebenzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. III. PAPILIO hexapus alis integris TERTIVS.
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. CIMEX quinque antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. V. BOMBYLIVS TERTIVS.
Dritte Rüsselfliege.
- Fig. VI. BOMBYLIVS QVARTVS.
Vierte Rüsselfliege.
- Fig. VII. STENOCORVS thorace inermi SEXTVS.
Sechster Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABULA LXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VII.



TABULA LXXX.



Loibl p. R

I. G. Endrich sc. Rat.

TABVLA LXXX.
Achtzigfte Tafel.

- Fig. I. VOLVCELLA SEPTIMA.
Siebende Federbuschfliege.
- Fig. II. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS PRIMVS.
Ein und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. III. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. SPHINX alis *integris cauda simplici* SEPTIMA.
Siebender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. VII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA LXXXI.

Ein und achtzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA.
Zehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. SPHEX PRIMA.
Erste Afterwespe.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS TERTIVS.
Drey und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. CHRYSIS TERTIA.
Dritte Goldwespe.
- Fig. VI. VESPA DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Wespe.
- Fig. VII. APIS TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyßsigste Biene.

TABULA LXXXI.



TABVLA LXXXII.



Fig. III.



Fig. VI.



TABVLA LXXXII.
Zwey und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* QVARTVS.
Vierter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS QVARTVS.
Vier und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. STENOCORVS thorace *inermi* SEPTIMVS.
Siebender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. V. STENOCORVS thorace *armato* QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. VI. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA LXXXIII. Drey und achtzigste Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* OCTAVVS.
Achter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace *armato* QVINTVS.
Fünfter Stutzkäfer mit stachelichem Brustschilde.
- Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und vierzigste Schlupfwespe.

TABVLA LXXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA LXXXIV.



TABVLA LXXXIV. Vier und achtzigste Tafel.

- Fig. I. STENOCORVS thorace *inermi* NONVS.
Neunter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS.
Zehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* VNDECIMVS.
Elfter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. IV. STENOCORVS thorace *inermi* DVODECIMVS.
Zwölfter Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.
- Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigster Blattkäfer.
- Fig. VIIl. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS NONVS.
Neun und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. IX. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS.
Fünfzigste Schlupfwespe.

TABVLA LXXXV.

Fünf und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. *SPHESSE* *SECUNDA*.
Zweyte Afterwespe.
- Fig. III. *STAPHYLINVS* *OCTAVVS*.
Achter Raubkäfer.
- Fig. IV. V. *PHALAENA peñnicornis* *alis planis* *QVINTA*.
Fünfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. *PHALAENA peñnicornis* *alis planis* *SEXTA*.
Sechster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VII. *LEPTVRA* *thorace plano* *DVODECIMA*.
Zwölfter Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VIII. IX. *TABANVS* *QVARTVS*.
Vierte Bremsenfliege.

TABULA LXXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



TABULA LXXXVI.




Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.

Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.

TABVLA LXXXVI.

Sechs und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *pedinicornis* alis *deflexis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängen-*
den Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *pedinicornis* alis *deflexis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängen-*
den Flügeln.
- Fig. IV. CICINDELA QUINTA.
Fünfter Zangenkäfer.
- Fig. V. CLERVS TERTIVS.
Dritter Bienenkäfer.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Fallkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Fallkäfer.
- Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Fallkäfer.

TABVLA LXXXVII.
Sieben und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *peñinicornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *peñinicornis* alis *planis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum fusiformi* SECUNDA.
Zweyte Hausfliege mit *spindelförmigem* Spadel.
- Fig. V. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS NONVS.
Neunzehender Fallkäfer.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS.
Zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VII. CIMEX *quatuor antennarum articulis* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigste Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

TABULA LXXXVII.



TABVLA LXXXVIII.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA LXXXVIII.

Acht und achtzigste Tafel.

Fig. I.

CARABVS *oblongus* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. II. III.

BLATTA PRIMA.
Erste Schabe.

Fig. IV.

PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V.

PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. VI.

PANORPA PRIMA.
Erste Scorpionfliege.

Fig. VII.

PANORPA SECUNDA.
Zweite Scorpionfliege.

Fig. VIII.


IVLVS PRIMVS.
Erster Taufendfuß.

TABVLA LXXXIX.

Neun und achtzigste Tafel.

- Fig. I. BOMBYLIVS QVINTVS.
Fünfte Rüffelfliege.
- Fig. II. III. PHALAENA *peñinicornis* alis *planis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit borßigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *peñinicornis* alis *planis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. ANTHRIBVS PRIMVS.
Erfter Bürstenkäfer.
- Fig. VII. OESTRVS PRIMVS.
Erste Viehfliege.
- Fig. VIII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABULA LXXXIX.



TABULA XC.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Loebel p. R.

I. G. Friedrich sc. Rat

TABVLA XC. Neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *peñinicornis* alis *deflexis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängen-*
den Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *peñinicornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängen-*
den Flügeln.
- Fig. IV. PYROCHORA PRIMA.
Erster Feuerkäfer.
- Fig. V. VI. PHRYGANEA QVARTA.
Vierte Frühlingsfliege.
- Fig. VII. DITYCVS SEXTVS.
Sechster Schwimmkäfer.
- Fig. VIII. IX. CRABRO QVARTVS.
Vierte Kolbenfliege.

TABVLA XCI.

Ein und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis integris* QVARTVS.
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *PAPILIO tetrapus alis integris* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. *MVSCA spathula antennarum rotunda* VNDECIMA.
Eilfte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. V. *VESPA DECIMA QVARTA.*
Vierzehende Wespe.
- Fig. VI. *LOCVSTA QVARTA.*
Vierte Heuschrecke.
- Fig. VII. *MVSCA spathula antennarum fusiformi* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.
- Fig. VIII. *NEMOTELVS DECIMVS.*
Zehende Stiletfliege.

TABVLA XCI.



TABVLA XCII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA XCII.

Zwey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLULA alis patentibus OCTAVA.
Achtes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SECUNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VII. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.

TABVLA XCIII. Drey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis SECVNDVS.
Zweyter Maulwurfskäfer mit siebenfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigster Maulwurfskäfer mit dreyfpaltigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. PELTIS SEXTA.
Sechster Geiferkäfer.
- Fig. V. PELTIS SEPTIMA.
Siebender Geiferkäfer.
- Fig. VI. PELTIS OCTAVA.
Achter Geiferkäfer.
- Fig. VII. PTEROPHORVS PRIMVS. *pt. Mantodea Latr.*
Erster Fächerkäfer.
- Fig. VIII. VESPA DECIMA QVINTA.
Fünfzehende Wespe.

TABULA XCIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA XCIV.




Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA XCIV.

Vier und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus* *alis angulatis* TERTIVS.
Dritter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. *NEMOTELVS VNDECIMVS.*
Elfte Stiletfliege.
- Fig. IV. V. *SPHEX TERTIA.*
Dritte Aferwespe.
- Fig. VI. *LEPTVRA thorace plano* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Aferholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VII. *LEPTVRA thorace plano* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Aferholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VIII. *LEPTVRA thorace plano* DECIMA QVINTA.
Fünfzehender Aferholzkäfer mit flachem Brustschilde.

TABVLA XCV.
Fünf und neunzigste Tafel.

- Fig. I. RAPHIDIA PRIMA.
Erste Kameelfliege.
- Fig. II. RAPHIDIA SECUNDA.
Zweyte Kameelfliege.
- Fig. III. CISTELA PRIMA.
Erfter Kegelkäfer.
- Fig. IV. NECYDALIS SECUNDVS.
Zweyter Fliegenkäfer.
- Fig. V. NECYDALIS TERTIVS
Dritter Fliegenkäfer.
- Fig. VI. MYLABRIS PRIMA.
Erfter Fühlspitzenkäfer.
- Fig. VII. MYLABRIS SECUNDA.
Zweyter Fühlspitzenkäfer.
- Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden*
Flügeln.

TABVLA XCV.



TABULA XCVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



TABVLA XCVI.

Sechs und neunzigste Tafel.

- Fig. I. *COPRIS corniger* NONVS.
Neunter gehörter Aftermaulwurfskäfer.
- Fig. II. *CICADA PRIMA.*
Erste Schaumfliege.
- Fig. III. *CICADA SECVNDA.*
Zweyte Schaumfliege.
- Fig. IV. V. *SPHINX alis integris cauda simplici* OCTAVA.
Achter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. VI. *CASSIDA QVINTA.*
Fünfter Schildkäfer.
- Fig. VII. *CICADA TERTIA.*
Dritte Schaumfliege.
- Fig. VIII. *CICADA QVARTA.*
Vierte Schaumfliege.
- Fig. IX. *TENTHREDO antennis setaceis* SEXTA.
Sechste Sägfleie mit borstigen Fühlhörnern.

TABVLA XCVII.
Sieben und neunzigste Tafel.

- Fig. I. NOTONECTA SECUNDA.
Zweyte Waſſerwanze.
- Fig. II. CORIXA PRIMA.
Erſter Rückenschwimmer.
- Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus alis integris* QUINTVS.
Fünfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. V. VI. PAPILIO *tetrapus alis integris* SEXTVS.
Sechster vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. VII. PAPILIO *hexapus alis integris* SEPTIMVS.
Siebenter ſechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. VIII. IX. PAPILIO *hexapus alis integris* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. X. XI. PAPILIO *hexapus alis integris* OCTAVVS.
Achter ſechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABULA XCVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. IV.






Fig. XI.



TABULA XCVIII.



TABVLA XCVIII.

Acht und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHINX *alis integris cauda simplici* NONA.
Neunter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus alis ocellatis* TERTIVS.
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus alis ocellatis* QVARTVS.
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. VII. VIII. PAPILIO *hexapus alis ocellatis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

Fig. IX. PAPILIO *hexapus alis ocellatis* SEXTVS.
Sechster sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.

TABVLA XCIX.
Neun und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. SPHINX *alis integris cauda simplici* DECIMA.
Zehender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. III. IV. SPHINX *alis integris cauda simplici* VNDECIMA.
Eilfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. V. VI. SPHINX *alis angulatis* PRIMA.
Erfter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

TABULA XCIX



Loebel p. R.

MG. sc. R.

TABVLA C.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.





Fig. IV.



Loebel p. R

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA C. Hunderfte Tafel.

- Fig. I. SPHINX *alis angulatis* SECUNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. II. SPHINX *alis angulatis* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. IV. SPHINX *alis angulatis* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. V. SPHINX *alis angulatis* QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. VI. SPHINX *alis angulatis* SEXTA.
Sechster Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.