


D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI
I C O N E S
I N S E C T O R V M
CIRCA RATISBONAM
I N D I G E N O R V M
COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.

VOLVMEN II.



Natürlich ausgewahlte

A b b i l d u n g e n
Regensburgischer
I n f e c t e n .

Zweyter Band.



RATISBONAE
TYPIS BREITFELDIANIS. MDCCLXXIX.

89L
466
S330
1779X
VZ
SCHHRB

INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. II.

Regensburgische
Infecten.
Zweyter Band.

TABVLA CI. Hundert und erste Tafel.

- Fig. I. *LEPTVRA thorace cylindraceo NONA.*
Neunter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. II, III. *PHALAENA peñinicornis alis deflexis DECIMA QUINTA.*
Fünfzehnder Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. *ICHNEVMON QVADRAGESIMVS PRIMVS.*
Ein und vierzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. *LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA.*
Zehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. *CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS NONVS.*
Neunzehnder Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VII. *ARANEA oculorum situ semilunato DVODECIMA.*
Zwölfte Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CI.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



L'oidel pux Rat.

L. M. Friedrich sc Rat

TABULA CII.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. I II



Fig. VIII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CII.

Hundert und zweyte Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *convolutis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *zusammengerollten* Flügeln.
- Fig. III. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis QVARTVS. MAS.
Vierter Maulwurfskäfer mit *sieben-spaltigen* Fühlhörnern. *Männchen*.
- Fig. IV. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis QVINTVS. FEMINA.
Fünfter Maulwurfskäfer mit *sieben-spaltigen* Fühlhörnern. *Weibchen*.
- Fig. V. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VI. MVSCA *spathula* antennarum *oblonga* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Hausfliege mit *länglichem* Spatel.
- Fig. VII. VIII. APIS TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreysigste Biene.

TABVLA CIII. Hundert und dritte Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. III. CRABRO QVINTVS.
Fünfte Kolbenfliege.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS TERTIVS.
Drey und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. LEPTVRA thorace plano DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace plano DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VII. a. b. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS.
Zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. a. b. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII. a.



Fig. VIII. a.



Fig. VII. b.



Fig. VIII. b.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. b.



Fig. VI. a.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



Loidel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CIV. Hundert und vierte Tafel.

- Fig. I. II. CRABRO SEXTVS.
Sechste Kolbenfliege.
- Fig. III. MVSCA spathula antennarum fusiformi QVARTA.
Vierte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.
- Fig. IV. RHINOMACER DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Afterrüffelkäfer.
- Fig. V. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. a. b. ELATER antennis setaceis NONVS.
Neunter Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. IX. BIBIO SECVNDVS.
Zweyte Marcusfliege.
- Fig. X. XI. BIBIO TERTIVS.
Dritte Marcusfliege.

TABVLA CV.
Hundert und fünfte Tafel.

- Fig. I. II. *APIS TRICESIMA SEXTA.*
Sechs und dreyszigste Biene.
- Fig. III. IV. *PHALAENA feticornis alis deflexis DECIMA SEXTA.*
Sechzehender Nachtfalter mit vorstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. V. *ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVARTVS.*
Vier und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. *TENTHREDO antennis setaceis SEPTIMA.*
Siebende Sägfliege mit vorstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. *TENTHREDO antennis filiformibus QVINTA.*
Fünfte Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. a. b. *CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS QVARTVS.*
Vier und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. IX. a. b. *TELEPHORVS ouatus QVINTVS.*
Fünfter eyrunder Warzenkäfer.

TABVLA CV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII. a.



Fig. IX. a.

Fig. VIII. b.



Fig. IX. b.



TABVLA CVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CVI. Hundert und sechste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* NONA.
Neuntes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. APIS TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyßigste Biene.
- Fig. III. ASILVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Raubfliege.
- Fig. IV. ARANEA oculorum situ *duarum linearum* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen in zwo Reihen.
- Fig. V. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA. MAS.
Zehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.
- Fig. VII. TIPVLA alis *patentibus* VNDECIMA. FEMINA.
Eilfte Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

TABVLA CVII. Hundert und siebende Tafel.

- Fig. I. *HEMEROBIVS TERTIVS.*
Dritter Blattlauslöwe.
- Fig. II. *LEPTVRA thorace globoso DVODECIMA.*
Zwölfter Afterholzhäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. III. *LEPTVRA thorace globoso DECIMA TERTIA.*
Dreizehender Afterholzkäfer mit kugeligem Brustschilde.
- Fig. IV. *ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVINTVS.*
Fünf und fünfzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. *MVSCA spathula antennarum rotunda DVODECIMA.*
Zwölfte Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. *MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA TERTIA.*
Dreizehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. *MVSCA spathula antennarum rotunda DECIMA QVARTA.*
Vierzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABULA CVIII.

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Frösch sc. Rat.

TABVLA CVIII. Hundert und achte Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Afterholzbock mit flachem Brustschilde.
- Fig. II. III. PHALAFNA *feticornis* alis *deflexis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängen-
den Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängen-
den Flügeln.
- Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum truncata* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit abgesetztem Spadel.
- Fig. VII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA QVINTA.
Fünfzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VIII. CARABVS *oblongus* DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender länglicher Laufkäfer.

TABVLA CIX.
Hundert und neunte Tafel.

- Fig. I. TENTHREDO *antennis fetaceis* OCTAVA.
Achte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. II. TENTHREDO *antennis clauatis* VNDECIMA.
Elfte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. III, IV. PHRYGANEA QVINTA.
Fünfte Frühlingsfliege.
- Fig. V. CARABVS *oblongus* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA QVARTA.
Vierzehender Stinkkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VIII, IX. CIMEX *quinque antennarum articulis* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Wanze mit fünfgliedrigen Fühlhörnern.

TABULA CIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. IV.




Fig. VIII.



Fig. IX.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABULA CX.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Loibel pinx Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CX.
Hundert und zehende Tafel.

Fig. I. II. SPHINX *alis integris cauda simplici* DVODECIMA.
Zwölfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem
Schwanz.

Fig. III. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und funfzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. V. STRATIOMYS OCTAVA.
Achte Waffenfliege.

Fig. VI. TENTHREDO *antennis setaceis* NONA.
Neunte Sägfiege mit borstigen Fühlhörnern.

TABVLA CXI. Hundert und eilfte Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. III. SPHINX *alis integris cauda pilosa* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.
- Fig. IV. COCCVS PRIMVS. FEMINA.
Erste Schildlausfliege. Weibgen.
- Fig. V. TIPVLA *alis patentibus* DVODECIMA. MAS.
Zwölftte Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VI. TIPVLA *alis patentibus* DECIMA TERTIA. FEMINA.
Dreyzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VII. PHALAENA *pedimicornis* *alis patentibus* SEXTA.
Sechstter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABULA CXI.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. VII.



Loibl pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CXII.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.

Loebel pinx. Rat.

I. C. Frödrick sc. Rat.

TABVLA CXII. Hundert und zwölft e Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA QVINTA.
Fünfzehnder Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. CHRYSOMELA TRICESIMA.
Dreysigster Blattkäfer.
- Fig. IV. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA SEXTA.
Sechzehnder Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.
- Fig. V. APIS TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreysigste Biene.
- Fig. VI. BOMBYLIVS SEXTVS.
Sechste Rüsselfliege.
- Fig. VII. CIMEX *quatuor antennarum articulis* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigste Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.
- Fig. VIII. ARANEA *oculorum situ semilunato* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Spinne mit Augen im *halben* Monde.
- Fig. IX. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

TABVLA CXIII. Hundert und dreyzehende Tafel.

- Fig. I. *MVSCA* *spathula antennarum rotunda* DECIMA QVINTA.
Funfzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. *APIS* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyssigste Biene.
- Fig. III. *VOLVCELLA* OCTAVA.
Achte Federbuschfliege.
- Fig. IV. *LIBELLVLA* *alis patentibus* DECIMA.
Zehendes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. *PHALAENA* *feticornis* *alis deflexis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VII. *TENTHREDO* *antennis setaceis* DECIMA.
Zehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *VESPA* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Wespe.
- Fig. IX. *ARANEA* *oculorum situ duarum linearum* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen in zwei Reihen.

TABULA CXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibl pinx. Rat.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXIV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI. b.



Fig. VI. a.

Fig. V.



Fig. VII.

Fig. VIII.



Loübd pinx. Rat.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXIV.

Hundert und vierzehende Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigster Faltkäfer.
- Fig. VII. NEMOTELVS DVODECIMVS.
Zwölfte Stiletfliege.
- Fig. VII. TENTHREDO *antennis clauatis* DVODECIMA.
Zwölfte Sägliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXV.

Hundert und funfzehende Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA feticornis* alis *deflexis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. *CHRYISIS* QVARTA.
Vierte Goldwespe.
- Fig. IV. *TENTHREDO* antennis *setaceis* VNDECIMA.
Eilfte Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. V. *TIPVLA* alis *patentibus* DECIMA QVARTA. MAS.
Vierzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männchen*.
- Fig. VI. *TIPVLA* alis *patentibus* DECIMA QVINTA. FEMINA.
Funfzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibchen*.
- Fig. VII. *STENOCORVS* thorace *inermi* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

TABULA CXV.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. V.




Fig. VI.




Fig. VII.



Lothel pinæ. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Frödrich sc. Rat.

TABVLA CXVI.

Hundert und feczehende Tafel.

- Fig. I. *LBELLVIA* *alis erectis* SEXTA.
Sechstes Jüngerchen mit *aufgerichteten* Flügeln.
- Fig. II. III. *PHALAENA feticornis* *alis deflexis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. *TENTHREDO* *antennis pectinatis* QUINTA.
Fünfte Sägfliege mit *gekämmten* Fühlhörnern.
- Fig. V. *ICHNEVMON* *quinquagesimus nonus*.
Neun und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. *ICHNEVMON* *sexagesimus*.
Sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. *STENOCORVS* *thorace inermi* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

TABVLA CXVII.

Hundert und siebenzehende Tafel.

- Fig. I. *LIBELLVLA* alis *erectis* SEPTIMA.
Siebendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. *VESPA DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehende Wespe.
- Fig. III. *VESPA DECIMA OCTAVA.*
Achtzehende Wespe.
- Fig. IV. *LIBELLVLA* alis *erectis* OCTAVA.
Achtes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. *LIBELLVLA* alis *erectis* NONA.
Neuntes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VI. *TIPVLA* alis *patentibus* DECIMA SEXTA. FEMINA.
Sechzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VII. *PHALAENA feticornis* alis *deflexis* VICESIMA QVARTA.
*Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

TABULA CXVII.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXVIII.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXVIII.

Hundert und achtzehende Tafel.

Fig. I. DERMESTES QVARTVS.
Vierter Speckkäfer.

Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und ab-
hängenden Flügeln.

Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und ab-
hängenden Flügeln.

Fig. VII. STENOCORVS *thorace inermi* DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender Stutzkäfer mit stachellosen Brustschilde.

TABVLA CXIX.

Hundert und neunzehende Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA feticornis* alis *planis* DECIMA SEXTA.
Sechzehnder Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. *CIMEX* *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. *ICHNEVMON* SEXAGESIMVS PRIMVS.
Ein und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. *ICHNEVMON* SEXAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. *STRATIOMYS* NONA.
Neunte Waffenfliege.
- Fig. VII. VIII. *PHALAENA feticornis* alis *deflexis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

TABVLA CXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABULA CXX.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXX.

Hundert und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis angulatis* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. *MVSCA spathula antennarum rotunda* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. *LIBELLVLA alis erectis* DECIMA.
Zehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. *LIBELLVLA alis erectis* VNDECIMA.
Eilftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VI. *LIBELLVLA alis erectis* DVODECIMA.
Zwölftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VII. *ICHNEVMON sexagesimus tertius.*
Drey und sechszigste Schlupfwespe.
- Fig. VIII. *ICHNEVMON sexagesimus quartus.*
Vier und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXI.

Hundert ein und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. TETIGONIA SECVNDA.
Zweyte Singfliege.
- Fig. III. BOMBYLIVS SEPTIMVS.
Siebende Rüsselfliege.
- Fig. IV. LIBELLVLA alis erectis DECIMA TERTIA.
Dreyzehendes Jüngerchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. LIBELLVLA alis erectis DECIMA QVARTA.
Vierzehendes Jüngerchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VI. VROCERVVS TERTIVS.
Dritte Schwanzfliege.

TABULA CXXI.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loisel pinx. R.

L.G. F. sc. R.

TABVLA CXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loebel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXXII.

Hundert zwey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *ab-*
hängenden Flügeln.
- Fig. II. III. PHRYGANEIA SEXTA.
Sechste Frühlingsfliege.
- Fig. IV. PHALAENA *peñinicornis* alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. V. PHALAENA *peñinicornis* alis *patentibus* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. VI. VESPA DECIMA NONA.
Neunzehende Wespe.
- Fig. VII. TABANVS QVINTVS.
Fünfte Bremsenfliege.

TABVLA CXXIII.

Hundert drey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Holzkäfer.
- Fig. II. III. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. V. PHALAENA feticornis alis patentibus NONA.
Neunter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. VI. PHALAENA feticornis alis patentibus DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABULA CXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABULA CXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXIV.

Hundert vier und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *pedinicornis* alis *deflexis* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. III. CERAMBYX DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Holzkäfer.
- Fig. IV. TABANVS SEXTVS.
Sechste Bremsenfliege.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ *quadrato* SEXTA.
Sechste Spinne mit Augen im *Vierecke*.

TABVLA CXXV.

Hundert fünf und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* VNDECIMA.
Eilftes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.
- Fig. II. III. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. VI. TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Sägfliede mit *käulförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Sägfliede mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

TABVLA CXCV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXXVI.

Hundert sechs und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. *CHRYSOMELA TRICESIMA PRIMA.*
Eiu und dreyßigster Blattkäfer.
- Fig. II. *PHALAENA seticornis alis planis DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. III. *PHALAENA seticornis alis planis DECIMA OCTAVA.*
Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. *TIPVLA alis patentibus DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehende Erdfliege mit offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. *TENTHREDO antennis pectinatis SEXTA.*
Sechste Sägfleie mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VII. *LEPTVRA thorace conico DECIMA SEPTIMA.*
Siebenzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VIII. *ICHNEVMON SEXAGESIMVS QVINTVS.*
Fünf und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXVII.

Hundert sieben und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris SEPTIMVS.*
Siebender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. *VESPA VICESIMA.*
Zwanzigste Wespe.

Fig. IV. V. *PAPILIO tetrapus alis integris OCTAVVS.*
Achter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. VI. *VESPA VICESIMA PRIMA.*
Ein und zwanzigste Wespe.

Fig. VII. *MORDELLA PRIMA.*
Erster Flohkäfer.

TABULA CXXVII.

I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Leibol pum R.

I. M. F. sc. R.

TABULA CXXVIII.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CXXVIII.
Hundert acht und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen*
Flügeln.
- Fig. III. BVPRESTIS DECIMA QVINTA. Vid. TAB. XLIX. Fig. I.
Fünfzehender Stinkkäfer.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* VNDECIMA.
Eilfter Aetherholzbock mit *walzenähnlichem* Brustschilde.
- Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXIX.
Hundert neun und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA.
Dreßsigster Nachtfalter mit borßigen Fühlhörnern und abhangenden
Flügeln.
- Fig. III. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA NONA.
Neunzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* VICESIMA.
Zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. VII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreßsigster Nachtfalter mit borßigen Fühlhörnern und ab-
hangenden Flügeln.

TABULA CXXIX.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.

TABULA CXXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loebel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXXX.

Hundert und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. *PHALAENA pectinicornis* alis planis DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und flachen
Flügeln.
- Fig. II. *MUSCA spathula antennarum rotunda* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. III. *TENTHREDO antennis clauatis* DECIMA QUINTA.
Fünfzehende Sägfleie mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *ICHNEVMON SEXAGESIMVS OCTAVVS.*
Acht und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. *TENEBRIO antennarum articulis lentiformibus* QVARTVS.
Vierter Mehlkäfer mit linsenförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *TABANVS SEPTIMVS.*
Siebende Bremsenfliege.

TABVLA CXXXI.

Hundert ein und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. TABANVS OCTAVVS.
Achte Bremsenfliege.

Fig. IV. TABANVS NONVS.
Neunte Bremsenfliege.

Fig. V. TABANVS DECIMVS.
Zehende Bremsenfliege.

Fig. VI. TABANVS VNDECIMVS.
Elfte Bremsenfliege.

TABULA CXXXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R

L.M.F. sc. R.

TABVLA CXXXII.

Hundert zwey und dreyßigste Tafel.

Fig. I II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* QVARTVS.
Vierter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. *APIS QVADRAGESIMA.*
Vierzigste Biene.

Fig. IV. V. *ICHNEVMON SEXAGESIMVS NONVS.*
Neun und sechzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. *SPHEX QVARTA.*
Vierte Afterwespe.

TABVLA CXXXIII.
Hundert drey und dreyßigste Tafel.

Fig. I. PLATYCERVS QVARTVS. MAS.
Vierter Kammkäfer. Männgen.

Fig. II. PLATYCERVS QVINTVS. FEMINA.
Fünfter Kammkäfer. Weibgen.

Fig. III. IV. PHALAENA *pettinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SEXTA.
*Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*

TABVLA CXXXIII.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABULA CXXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. V. a.



Fig. III. b.



Fig. IV. b.



Fig. VI. a.



Fig. V. b.



Fig. VI. b.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXXIV.

Hundert vier und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyßigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. a. b. CHELIFER PRIMVS.
Erste Scorpionspinne.
- Fig. IV. a. b. CYNIPS PRIMA.
Erste Gallapfelfliege.
- Fig. V. a. b. GYRINVS PRIMVS.
Erster Taumelkäfer.
- Fig. VI. a. b. LEPISMA PRIMA.
Erster Zuckergast.

TABVLA CXXXV.

Hundert fünf und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *pestinicornis* alis *patentibus* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. II. PHALAENA *pestinicornis* alis *patentibus* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. III. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS.
Siebenzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS PRIMVS.
Ein und siebenzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. VI. SPHINX alis *integris* cauda *pilosa* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

TABULA CXXXV.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.




Fig. V.



Fig. VI.



Loibd pux. R.

I. M. F. sc. R.

TABULA CXXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXXVI.

Hundert fechs und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHALAENA pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. *VESPA VICESIMA SECVNDA.* Vid. TAB. LIII. Fig. V.
Zwey und zwanzigste Wespe.
- Fig. IV. V. *ACRIDIVM QVARTVM.*
Vierte Schnarrheuschrecke.
- Fig. VI. *APIS QVADRAGESIMA PRIMA.*
Ein und vierzigste Biene.

TABVLA CXXXVII.

Hundert sieben und dreyßigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA *alis patentibus* DVODECIMA.
Zwölftes Jüngerchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. a, b. NEMOTELVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Stiletfliege.

Fig. III. CARABVS *oblongus* DECIMVS NONVS.
Neunzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. IV. V. ACRIDIVM QVINTVM.
Fünfte Schnarrheuschrecke.

TABULA CXXXVII.



Fig. II. a.



Fig. II. b.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Loibel pinx. R.

I. G. Friedrich sc. R.

TABULA CXXXVIII.



Leibcl pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXXXVIII.
Hundert acht und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA QVINTA. MAS.
Fünfte Heuschrecke. Männchen.

Fig. III. LOCVSTA SEXTA. FEMINA.
Sechste Heuschrecke. Weibgen.

Fig. IV. LOCVSTA SEPTIMA.
Siebende Heuschrecke.

TABVLA CXXXIX.

Hundert neun und dreysigfte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pettinicornis* alis *deflexis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. III. LOCUSTA OCTAVA. FEMINA.
Achte Heuschrecke. *Weibgen.*

Fig. IV. V. LOCUSTA NONA. MAS.
Neunte Heuschrecke. *Männchen.*

TABVLA CXXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.





Fig. V.



Loibel pinx. R.

I G. F. sc. R.

TABVLA CXL.



Loibel pinx R.

I. G. F. sc R.

TABVLA CXL.

Hundert und vierzigste Tafel.

- Fig. I. STENOCORVS thorace armato sextvs.
Sechster Stutzkäfer mit stachellichem Brustschilde.
- Fig. II. III. PAPILIO hexapus alis integris nonvs.
Neunter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. V. PAPILIO hexapus alis integris decimvs. Vid. Tab. XL. Fig. III. IV.
Zehender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CXLI.

Hundert ein und vierzigste Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* VICESIMVS. Vid. TAB. XXXVI, Fig. I.
Zwanzigster länglicher Laufkäfer.

Fig. II. III. ACRIDIUM SEXTVM.
Sechste Schnarrheuschrecke.

Fig. IV. V. ACRIDIUM SEPTIMVM.
Siebende Schnarrheuschrecke.

TABVLA CXII.




Fig. I.



Fig. II



Fig. III.




Fig. IV




Fig. V

Loibel pinx R

I. G. F. sc R

TABVLA CXLI.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.

Fig. VII. a.



Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII. b.



TABVLA CXLII.

Hundert zwey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* QVINTVS.
Fünfter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. *MVSCA spathula antennarum oblonga* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. IV. *MVSCA spathula antennarum oblonga* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. V. VI. *ACRIDIVM OCTAVVM.* Vid. TAB. XXVII. Fig. VI. VII.
Achte Schnarrheuschrecke.

Fig. VII. a. b. *CASSIDA sexta.*
Sechster Schildkäfer.

TABVLA CXLIII.
Hundert drey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. . *PAPILIO tetrapus alis integris* NONVS.
Neunter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis caudatis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. V. a. b. *CYNIPS SECVNDA.*
Zweyte Gallapfelfliege.

TABULA CXLIII.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



L. p. p. p. R.

L. G. F. sc. R.

TABVLA CXLIV.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXLIV.

Hundert vier und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *peñnicornis* alis *deflexis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. III. IV. FORFICVLA SECUNDA.
Zweyter Ohrkäfer.
- Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS.
Dreyssigster Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyssigster Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyssigster Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyssigster Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

TABVLA CXLV.
Hundert fünf und vierzigste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Holzkäfer.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten
Flügeln.
- Fig. IV. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten
Flügeln.
- Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten
Flügeln.
- Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten
Flügeln.

TABULA CXLV.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loëbel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXLVI.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III. b.




Fig. III. a.

Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibol pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXLVI.

Hundert sechs und vierzigste Tafel.


- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* *SEXTVS.*
Sechster vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln,
- Fig. III. a. b. *ACARVS QVARTVS.*
Vierte Milbe.
- Fig. IV. *NEMOTELVS DECIMVS QVARTVS.*
Vierzehende Stiletfliege.
- Fig. V. *MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA SECVNDA.*
Zwey und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. *MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA TERTIA.*
Drey und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CXLVII.

Hundert sieben und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. SPHEX QVINTA.
Fünfte Aterwespe.
- Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* SEPTIMVS.
Siebender vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. V. CVLEX PRIMVS. FEMINA.
Erste Schnaakenfliege. Weibgen.
- Fig. VI. CVLEX SECVNDVS. MAS.
Zweyte Schnaakenfliege. Männgen.
- Fig. VII. VIII. EMPIS PRIMA.
Erste Schnepfenfliege.

TABVLA CXLVII.



Loebel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXLVIII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Lobelia pinn. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXLVIII.
Hundert acht und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* OCTAVVS.
Achter vierfüßiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integræ* DECIMVS.
Zehender vierfüßiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

TABVLA CXLIX.

Hundert neun und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis integris VNDECIMVS.*
Eilfter sechsfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *PAPILIO hexapus alis integris DVODECIMVS.*
Zwölfter sechsfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. *PAPILIO hexapus alis integris DECIMVS TERTIVS.*
Dreyzehender sechsfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CXLIX.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



I. M. Friedrich sc. Rat.

Loibel pinx. Rat.

TABVLA CL.



Loibel pinx. R.

I. G. Frölich sc. R.

TABVLA CL.

Hundert und funfzigfte Tafel.

Fig. I. II. III. *BRANCHIPVS cancriformis PRIMVS.*
Erfter krebsartiger Kiefenfufs.

Fig. IV. a. b. *BRANCHIPVS cancriformis SECVNDVS.*
Zweyter krebsartiger Kiefenfufs.

Fig. V. a. b. *BRANCHIPVS conchiformis PRIMVS.*
Erfter muschelartiger Kiefenfufs.

TABVLA CLI.

Hundert ein und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit *vorstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. CLERVS QVARTVS.
Vierter Bienenkäfer.
- Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyßigster Maulwurzkäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.
- Fig. V. VI. ELATER *antennis ferratis* DVODECIMVS.
Zwölfter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. LEPTVRA *thorace globofo* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit *kuglichem* Brustschilde.

TABVLA CLI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat

I. M. Friedrich sc. Rat

TABVLA CLII.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Loibel pinx. Rat

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLII.

Hundert zwey und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris VNDECIMVS.*
Elfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *PAPILIO tetrapus alis integris DVODECIMVS*
Zwölfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. *LEPTVRA thorace cylindraceo DVODECIMA.*
Zwölfter Afterholzhäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.

TABVLA CLIII.

Hundert drey und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis integris* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *TETIGONIA TERTIA.*
Dritte Singfliege.
- Fig. IV. a. b. *CERAMBYX DECIMVS SEXTVS.* Vid. TAB. I. Fig. I.
Sechzehender Holzkäfer.
- Fig. V. *LEPTVRA thorace cylindraceo* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit walzenähullichem Brustschilde.
Vid. TAB. XXXIX. Fig. I.

TABVLA CLIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Loebel pux. Rat.

L. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. X.



Libellula pinx. Rat.

I. M. F. sc. Rat.

TABVLA CLIV.

Hundert vier und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. EPHEMERA TERTIA.
Dritte Vferaasfliege.

Fig. III. IV. TENTHREDO antennis *peñinatis* SEPTIMA. MAS.
Siebende Sägfliche mit *gekämmten* Fühlhörnern. *Männen*.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *peñinatis* OCTAVA. FEMINA.
Achte Sägfliche mit *gekämmten* Fühlhörnern. *Weibgen*.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyſſigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.

Fig. IX. X. ACRIDIUM NONVM.
Neunte Schnarrheufchrecke.

TABVLA CLV. Hundert fünfund funfzigfte Tafel.

- Fig. I. ONISCVS TERTIVS.
Dritte Affel.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.
- Fig. III. a. b. BRVCHVS PRIMVS.
Erfter Buckelkäfer.
- Fig. IV. a. b. BRVCHVS SECVNDVS.
Zweyter Buckelkäfer.
- Fig. V. a. b. BRVCHVS TERTIVS.
Dritter Buckelkäfer.
- Fig. VI. BLATTA SECVNDA.
Zweyte Schabe.
- Fig. VII. BLATTA TERTIA.
Dritte Schabe.

TABVLA CLV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. III. b.



Fig. IV. b.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



Fig. VI.



Fig. VII.

Loibel pinx. Rat.

I M. Friedrich sc. Rat

TABVLA CLVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.

Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLVI.

Hundert sechs und funfzigste Tafel.

- Fig. I. *MVSCA* *spathula* antennarum *rotunda* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. *EPHEMERA* QVARTA.
Vierte Uferaasfliege.
- Fig. IV. *CARABVS oblongus* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster länglicher Laufkäfer.
- Fig. V. VI. *PHALAENA feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVARTA.
*Vier und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.*
- Fig. VII. *TIPVLA* alis *patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Erdfliege mit offenen Flügeln.

TABVLA CLVII.

Hundert sieben und funfzigste Tafel.

Fig. I. BVPRESTIS DECIMA SEXTA.
Sechzehender Stinkkäfer.

Fig. II, III. GRYLLVS SECVNDVS. MAS.
Zweyte Grille. Männgen.

Fig. IV. GRYLLVS TERTIVS. FEMINA.
Dritte Grille. Weibgen.

Fig. V, VI. PHRYGANEAE SEPTIMA.
Siebende Frühlingsfliege.

Fig. VII. a, b. DERMESTES QVINTVS.
Fünfter Speckkäfer.

TABVLA CLVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII. a.



Fig. VI.



Fig. VII. b.



Loibel pinx. Rat

I. M. F. sc. Rat.

TABULA CLVIII.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



L. orbis pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLVIII.

Hundert acht und funfzigfte Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit walzenählichem Brustschilde.
- Fig. II. BLATTA QVARTA.
Vierte Schabe.
- Fig. III. a. b. CISTELA SECVNDA.
Zweyter Kegelkäfer.
- Fig. IV. V. PAPILIO hexapus alis caudatis SEXTVS.
Sechster sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ quadrato SEPTIMA.
Siebende Spinne mit Augen im Vierecke.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ quadrato OCTAVA.
Achte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CLIX.

Hundert neun und funfzigte Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *peffinicornis* alis *erectis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und aufrechten
Flügeln.
- Fig. III. IV. TENTHREDO *antennis peffinatis* NONA.
Neunte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. V. PTEROPHORVS SECVNDVS.
Zweyter Fächerfalter.
- Fig. VI. VII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und fla-
chen Flügeln.

TABULA CLIX.



TABVLA CLX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.

Fig. VI.



Lobel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. R.

TABVLA CLX.

Hundert und sechzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA TERTIA.
Dreyzehendes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. III. PERLA TERTIA.
Dritte Afterfrühlingsfliege.
- Fig. IV. V. APIS QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigste Biene.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXI.

Hundert ein und fechszigfte Tafel.

- Fig. I. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA NONA. MAS.
Neunzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.
- Fig. II, III. ACRIDIVM DECIMUM.
Zehende Schnarrheufschrecke.
- Fig. IV. CHRYSOMELA TRICESIMA SECUNDA.
Zwey und dreyßigster Blattkäfer.
- Fig. V. MVSCA spathula antennarum *rotunda* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ *femilunato* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CLXI.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V. b.



Fig. V. a.



Fig. V. c.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat.

l. M. Friedrich sc. Rat

TABVLA CLXII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Loisel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLXII.

Hundert zwey und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis obliquis PRIMVS.*
Erfter sechsfüßiger Tagfalter mit ſchiefen Flügeln.
- Fig. III. IV. *PAPILIO hexapus alis obliquis SECVNDVS.*
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit ſchiefen Flügeln.
- Fig. V. *TIPVLA alis patentibus VICESIMA. FEMINA.*
Zwanzigſte Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VI. *TIPVLA alis patentibus VICESIMA PRIMA. MAS.*
Ein und zwanzigſte Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VII. VIII. *PAPILIO hexapus alis obliquis TERTIVS.*
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit ſchiefen Flügeln.

TABVLA CLXIII. Hundert drey und sechzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. III. PHALAENA feticornis alis planis VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA feticornis alis planis VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CLXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Loebel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLXIV.

Hundert vier und sechzigste Tafel.

- Fig. I. *MVSCA* *spathula* antennarum *rotunda* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. *PAPILIO* *tetrapus* alis *integris* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. V. *PHALAENA* *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. VII. *PHALAENA* *feticornis* alis *planis* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CLXV.

Hundert fünf und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus* alis *ocellatis* SEPTIMVS.
Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit gezügelten Flügeln.
- Fig. III. IV. *SPHINX* alis *integris* cauda *simplici* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.
- Fig. IV. *PHALAENA feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreßsigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VII. VIII. *MVSCA spatula* antennarum *rotunda* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABULA CLXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



TABVLA CLXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V. b.



Fig. V. a.



TABVLA CLXVI.

Hundert sechs und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehende Stiletfliege.
- Fig. III. a. b. CVRCVLIO femoribus muticis TRICESIMVS.
Dreysigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. a. b. CLERVS QVINTVS.
Fünfter Bienenkäfer.
- Fig. V. a. b. ALTICA PRIMA.
Erster Hüpfkäfer.

TABVLA CLXVII.

Hundert sieben und sechzigste Tafel.

- Fig. I. *DERMESTES* *sextus*.
Sechster Speckkäfer.
- Fig. II. III. *MUSCA* *spathula antennarum rotunda* *VICESIMA OCTAVA*.
Acht und zwanzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spatel.
- Fig. IV. *LIBELLULA* *alis patentibus* *DECIMA QVARTA*.
Vierzehendes Jüngerchen mit *offenen* Flügeln.
- Fig. V. VI. *TENTHREDO* *antennis setaceis* *DVODECIMA*.
Zwölfte Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.
- Fig. VII. *ARANEA* *oculorum situ semilunato* *DECIMA QVINTA*.
Fünfzehende Spinne mit *Augen im halben Monde*.

TABVLA CLXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loebel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABULA CLXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loebel pinx. Rat.

L. F. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLXVIII.

Hundert acht und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. BOMBYLIVS OCTAVVS.
Achte Rüffelfliege.
- Fig. II. III. PHRYGANEA OCTAVA.
Achte Frühlingsfliege.
- Fig. IV. V. NEMOTELVS DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Stiletfliege.
- Fig. VI. VII. PAPILIO hexapus alis ocellatis OCTAVVS.
Achter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- Fig. VIII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und siebenzigfte Schlupfwespe.

TABVLA CLXIX.

Hundert neun und sechzigste Tafel.

- Fig. I. II. III. *MVSCA* *spathula antennarum quadrata* PRIMA.
Erste Hausfliege mit viereckigem Spadel.
- Fig. IV. V. *MVSCA* *spathula antennarum oblonga* DECIMA NONA.
Neunzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VI. a. b. *CVRCVLIO* *femoribus muticis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyßigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VII. *CIMEX* *quatuor antennarum articulis* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABVLA CLXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. a



Fig. VI. b



Fig. VII.



Loebel pinx. Rat.

L. M. Friderich sc. Rat.

TABVLA CLXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLXX.

Hundert und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus muticis TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyßigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. III. TENTHREDO antennis setaceis DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. V. CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. VII. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VIII. IX. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA.
Dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CLXXI.

Hundert ein und fiebenzigfte Tafel.

Fig. I. a. b. COCCINELLA VICESIMA.
Zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. II. a. b. COCCINELLA VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. III. a. b. RHINOMACER DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehnder Asterrüffelkäfer.

Fig. IV. V. VI. PHRYGANEA NONA.
Neunte Frühlingsfliege.

TABULA CLXXI.

Fig. I. a.



Fig. II. a.

Fig. I. b.



Fig. III. a.



Fig. II. b.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CLXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. R.

TABVLA CLXXII.

Hundert zwey und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis integris* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. *MVSCA spathula antennarum rotunda* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. V. *MVSCA spathula antennarum rotunda* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. *ARANEA oculorum situ semilunato* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. VII. *ARANEA oculorum situ quadrato* NONA.
Neunte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CLXXIII.

Hundert drey und siebenzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. II. III. PHALAENA *feticornis alis planis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.

Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyßigster Blattkäfer.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis alis erectis* SECUNDA.
Zweyter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und aufrechten Flügeln.

TABULA CLXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV. b.



Loibel pinx. Rat.

L. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V. b.



Fig. V. a.



Loebel pinx. Rat.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CLXXIV.

Hundert vier und siebenzigste Tafel.


- Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA QVINTA.
Fünfzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. ARANEA oculorum situ *semilunato* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. III. ARANEA oculorum situ *quadrato* DECIMA.
Zehende Spinne mit Augen im Vierecke.
- Fig. IV. ELATER antennis *setaceis* DECIMVS.
Zehender Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. V. a. b. CVRCVLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyssigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXXV.

Hundert fünf und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. EPHEMERA QUINTA. MAS.
Fünfte Uferaasfliege. Männchen.
- Fig. III. EPHEMERA SEXTA. FEMINA.
Sechste Uferaasfliege. Weibgen.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS TERTIVS. FEMINA, aptera.
Drey und siebenzigste Schlupfwespe. Weibgen, ohne Flügel.
- Fig. V. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVARTVS. MAS, alatus.
Vier und siebenzigste Schlupfwespe. Männchen, mit Flügeln.
- Fig. VII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und siebenzigste Schlupfwespe.


TABVLA CLXXV.



Loibel pux. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CLXXVI.



Loibel pux. R.

I G. F. sc. R.

TABVLA CLXXVI.

Hundert fechs und fiebenzigste Tafel,

- Fig. I. *LIBELLVLA* alis *erectis* DECIMA QVINTA.
Fünfzehendes Jüngerchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. III. *PHALAENA feticornis* alis *planis* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. a. b. *ANTHRENVS PRIMVS.*
Erster Blumenstaubkäfer.
- Fig. V. a. b. *CERAMBYX DECIMVS SEPTIMVS.*
Siebenzehender Holzkäfer.
- Fig. VI. *ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEXTVS. FEMINA, aptera.*
Sechs und siebenzigste Schlupfwespe. Weibgen, ohne Flügel.

TABVLA CLXXVII.

Hundert sieben und siebenzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum *rotunda* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum *rotunda* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyßigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. V. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. VII. SPHEX SEXTA.
Sechste Afterwespe.

Fig. VIII. IX. SPHEX SEPTIMA.
Siebende Afterwespe.
a. b.

TABULA CLXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. IX. a.



Fig. IX. b.



Leibel pinx. R.

I. M. F. sc. Rat.

TABULA CLXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Loebel pinx. R.

I. M. Friedrich sc. R.

TABVLA CLXXVIII.

Hundert acht und fiebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. *MVSCA* *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyßigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. III. IV. *PHALAENA peñinicornis alis deflexis* TRICESIMA MAS.
Dreyßigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhängenden*
Flügeln. *Männchen*.
- Fig. V. VI. *PHALAENA peñinicornis alis deflexis* TRICESIMA PRIMA. FEMINA.
Ein und dreyßigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln. *Weibchen*.

TABVLA CLXXIX.

Hundert neun und fiebenzigste Tafel.

- Fig. I. *TENTHREDO* *antennis filiformibus* *SEXTA*.
Sechste Sägfliede mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.
- Fig. II. III. *MVSCA* *spathula antennarum oblonga* *VICESIMA*.
Zwanzigste Hausfliede mit *länglichem* Spadel.
- Fig. IV. V. *PHALAENA* *feticornis* *alis deflexis* *TRICESIMA SEPTIMA*.
Sieben und dreyszigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und
abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. VII. *NEMOTELVS* *DECIMVS SEPTIMVS*.
Siebenzehende Stiletfliede.
- Fig. VIII. IX. *HIPPOBOSCA* *TERTIA*.
Dritte Pferdfliede.

TABULA CLXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. VIII.



Fig. IX.



TABULA CLXXX.



Loibel pinæ R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CLXXX.

Hundert und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PHRYGANEA DECIMA.*
Zehende Frühlingsfliege.
- Fig. III. *MVSCA* *spathula antennarum rotunda* *TRICESIMA SEPTIMA.*
sieben und dreysigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
Vid. TAB. CLXXIII. Fig. I. II.
- Fig. IV. V. *PHALAENA feticornis alis planis* *VICESIMA SEPTIMA.*
Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.
- Fig. VI. *ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS NONVS.*
Neun und siebenzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXXXI.

Hundert ein und achtzigste Tafel.

- Fig. I. TIPVLA alis patentibus VICESIMA SECUNDA. FEMINA.
Zwey und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. II. TIPVLA alis patentibus VICESIMA TERTIA. FEMINA.
Drey und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. III. TIPVLA alis patentibus VICESIMA QVARTA. MAS.
Vier und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. IV. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreysigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. V. VI. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA SEXTA.
Sechzehende Sägfleie mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABULA CLXXXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Libellula pinnata R.

I. M. F. sc. R.

TABULA CLXXXII.



Loebel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CLXXXII.

Hundert zwey und achtzigste Tafel.

- Fig. I. *LIBELLVLA* alis *patentibus* DECIMA SEXTA.
Sechzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. III. *TABANVS* DVODECIMVS.
Zwölfte Bremsenfliege.
- Fig. IV. *LEPTVRA* thorace *conico* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Aferholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. V. VI. *PHALAENA feticornis* alis *planis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CLXXXIII.
Hundert drey und achtzigste Tafel.

- Fig. I. *CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS SEPTIMVS.*
Sieben und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. *PAPILIO tetrapus alis integris DECIMVS QVINTVS.*
Fünzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. *TIPVLA alis patentibus VICESIMA QVINTA. FEMINA.*
Fünf und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. V. *TIPVLA alis patentibus VICESIMA SEXTA. MAS.*
Sechs und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VI. *ASILVS DECIMVS QVINTVS.*
Fünzehende Raubfliege.
- Fig. VII. *ICHNEVMON OCTOGESIMVS.*
Achtzigste Schlupfwespe.

TABULA CLXXXIII.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.





Fig. VI.



Fig. VII.



TABULA CLXXXIV.



Loibel pinx. R.

L.G.F.sc. R.

· TABVLA CLXXXIV.

Hundert vier und achtzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis erectis DECIMA SEXTA.
Sechzehendes Jüngerchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. III. PAPILIO hexapus alis integris DECIMVS QVINTVS
Fünfzehender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. V. TABANVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Bremsenfliege.
- Fig. VI. VII. TABANVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Bremsenfliege.

TABVLA CLXXXV.

Hundert fünfund achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus* alis *ocellatis* NONVS.
Neunter sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- Fig. III. *ASILVS DECIMVS SEXTVS.*
Sechzehende Raubfliege.
- Fig. IV. a.b.V. *CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS OCTAVVS.*
Acht und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

TABULA CLXXXV

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABULA CLXXXVI.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Libellula pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CLXXXVI.

Hundert sechs und achtzigste Tafel.

- Fig. I. *LIBELLULA* alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehendes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. *TENTHREDO* antennis *setaceis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. III. *TENTHREDO* antennis *clauatis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. *CLEROIDES PRIMVS.*
Erster Aterbienenkäfer.
- Fig. V. *CLEROIDES SECVNDVS.*
Zweyter Aterbienenkäfer.

TABVLA CLXXXVII.
Hundert sieben und achtzigste Tafel.

- Fig. I. a. b. ICHNEVMON OCTOGESIMVS PRIMVS.
Ein und achtzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. V. ARANEA oculorum situ quatuor linearum TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ quatuor linearum QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABULA CLXXXVII.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Leibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABULA CLXXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Scibcl pinx. R

I. G. F. sc. R

TABVLA CLXXXVIII.
Hundert acht und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Stiletfliege.

Fig. III. a. b. NOTOXVS PRIMVS.
Erster Brufthornkäfer.

Fig. IV. V. MVSCA spathula antennarum *oblonga* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. VII. CVLEX TERTIVS.
Dritte Schnaakenfliege.

TABVLA CLXXXIX.

Hundert neun und achtzigste Tafel.

- Fig. I. *BOSTRICHVS PRIMVS.*
Erster Capuzkäfer.
- Fig. II. *LEPTVRA thorace cylindraco DECIMA QVINTA.*
Fünfzehender Aetherholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. III. a. b. *TELEPHORVS ouatus SEXTVS.*
Sechster egerunder Warzenkäfer.
- Fig. IV. V. *PHALAENA seticornis alis deflexis TRICESIMA OCTAVA.*
Acht und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI. *ARANEA oculorum situ quatuor linearum QVINTA.*
Fünfte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VII. *ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA NONA.*
Neunzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABULA CLXXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. M., F. sc. R.

TABULA CXC.



Loebel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXC.

Hundert und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *LOCVSTA DECIMA. MAS.*
Zehende Heuschrecke. Mäungen.
- Fig. III. *LIBELLVLA alis patentibus DECIMA OCTAVA.*
Achtzehendes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. IV. V. *TENTHREDO antennis clauatis DECIMA NONA.*
Neunzehende Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *APIS QVADRAGESIMA TERTIA.*
Drey und vierzigste Biene.
- Fig. VII. *VESPA VICESIMA TERTIA.*
Drey und zwanzigste Wespe.

TABVLA CXCI.

Hundert ein und neunzigste Tafel.

- Fig. I. NEMOTELVS DECIMVS NONVS.
Neunzehende Stiletfliege.
- Fig. II. III. TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Sägfleie mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. ARANEA *oculorum situ quadrato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit Augen im Vierecke.
- Fig. V. VI. NEMOTELVS VICESIMVS.
Zwanzigste Stiletfliege.
- Fig. VII. VIII. NEMOTELVS VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigste Stiletfliege.

TABVLA CXCI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Loibl pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXCI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Lobol. pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXCII.

Hundert zwey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. EMPIS SECVNDA.
Zweyte Schnepfenfliege.
- Fig. II. EMPIS TERTIA.
Dritte Schnepfenfliege.
- Fig. III. a. b. EMPIS QVARTA.
Vierte Schnepfenfliege.
- Fig. IV. V. APIS QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigste Biene.
- Fig. VI. CERAMBYX DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Holzkäfer.

TABVLA CXCIH.

Hundert drey und neunzigste Tafel.

- *
Fig. I. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* DODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. II. III. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA NONA.
Neun und dreysigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. VII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA.
Vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CXCVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

L. M. F. sc. R.

TABVLA CXCIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXCIV.

Hundert vier und neunzigste Tafel.

- Fig. I. ELATER *antennis setaceis* VNDECIMVS.
Eilfter Springkäfer mit borftigen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. TENTHREDO *antennis clauatis* VICESIMA.
Zwanzigfte Sägfliede mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CHRYSOMELA *tricesima* QVARTA.
Vier und dreyßigfter Blattkäfer.
- Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis alis planis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigfter Nachtfalter mit borftigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.
- Fig. VII. CARABVS *oblongus* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigfter länglicher Laufkäfer.

TABVLA CXCV.

Hundert fünf und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *MVSCA* spathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. III. IV. *ICHNEVMON* OCTOGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und achtzigste Schlupfweife.
- Fig. V. VI. *PHALAENA feticornis* alis *planis* TRICESIMA.
Dreyßigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. VII. VIII. *APIS* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigste Biene.

TABVLA CXCV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loebel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXCVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXCVI.

Hundert sechs und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *sticornis* alis *planis* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyßigster Nachtfalter mit vorstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. III. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln.

Fig. IV. V. PHRYGANEA UNDECIMA.
Elfte Frühlingsfliege.

Fig. VI. ARANEA *oculorum situ quadrato* DODECIMA.
Zwölfte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CXCVII.

Hundert sieben und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. TENTHREDO antennis *setaceis* DECIMA QVINTA.
Funfzehende Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.


Fig. III. IV. PHALAENA *feticornis* alis *planis* TRICESIMA SECVNDA.
*Zwey und dreyßsigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und
flachen Flügeln.*

✱

Fig. V. VI. APIS QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigste Biene.

Fig. VII. VIII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABULA CXCVII.



TABULA CXCVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Leibel pux R.

L. G. F. sc. R.

TABVLA CXCVIII.

Hundert acht und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. APIS QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigste Biene.
- Fig. III. ICHNEVMON OCTOGESIMVS TERTIVS.
Drey und achtzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. STRATIOMYS DECIMA.
Zehende Waffenfliege.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VII. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA NONA.
Neunzehender Afterholzkäfer.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis* TRICESIMVS QVINTVS.
*Fünf und dreyßigster Maulwurfskäfer mit drey spaltigen Fühl-
hörnern.*

TABVLA CXCIX.

Hundert neun und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. *CIMEX quatuor antennarum articulis VICESIMVS NONVS.*
Neun und zwanzigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

Fig. III. *ARANEA oculorum situ semilunato VICESIMA.*
Zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. IV. V. *CIMEX quatuor antennarum articulis TRICESIMVS.*
Dreysigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. *CIMEX quatuor antennarum articulis TRICESIMVS PRIMVS.*
Ein und dreysigste Wanze mit viergliedrigen Fühlhörnern.

Fig. VIII. *ELATER antennis serratis DECIMVS TERTIVS.*
Dreyzehender Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXCIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CC.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CC. Zweyhundertfte Tafel.

- Fig. I. NEMOTELVS vicesimvs secvndvs.
Zwey und zwanzigste Stiletfliege.
- Fig. II. TENTHREDO antennis clauatis vicesima prima.
Ein und zwanzigste Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. III. TENTHREDO antennis setaceis decima sexta.
Sechzehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. PHALAENA seticornis alis patentibus decima tertia.
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. MVSCA spathula antennarum rotunda quadragesima tertia.
Drey und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato vicesima prima.
Ein und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.