

Verzeichnifs
meiner
Infecten - Sammlung.

Gefammelt und herausgegeben

von

I a k o b S t u r m.

135

- Mit vier Kupfertafeln.

Nürnberg, 1796.
gedruckt auf Kosten des Verfassers.

HRB

Vorbericht.

Die Begierde, meine wenigen
Kenntnisse in einer meiner Lieb-
lingswissenschaften, der Entomolo-
gie, zu erweitern, und zu diesem
Behuf Insecten aus verschiedenen
Gegenden durch Tausch, oder an-
dere Bedingnisse zu erhalten, be-
wog mich, meinen kleinen Vor-
rath von mehrentheils um Nürn-
berg gesammelten Insecten zur be-

A 2 que-

1522

quemern Uebersicht in alphabetischer Ordnung zusammen zu stellen. Allein ein solches Verzeichniß öfters abzuschreiben, was doch nöthig gewesen wäre, wenn ich es nur einigermaßen hätte verbreiten wollen, wäre nicht nur eine verdrüßliche Arbeit, sondern mir auch bey meinen häufigen Arbeiten unmöglich gewesen. Ich entschloß mich daher, dieses *Verzeichniß meiner Insectensammlung* drucken zu lassen, und benutzte dabey die längst gesuchte Gelegenheit, dem entomologischen Publikum eine Probe von

DSI

Insec-

Insectenabbildungen vorlegen zu können, wie ich wünschte, dass solche durchgehends, in Ansehung der richtigen Zeichnung, ohne übermässige Vergrösserung, und der Reinheit der Illumination behandelt werden möchten. Ich suchte zu dieser Absicht einige, vom Herrn Prof. Fabricius beschriebene, aber mehrentheils noch nirgends abgebildete Arten, aus meiner Sammlung aus, und stellte solche so genau und deutlich, als ich nur konnte, auf vier Täfelchen vor, besorgte auch selbst die Illumination mit eigner Hand, um

6

zu zeigen, wie sehr solche Abbildungen, bey denen es so oft auf Kleinigkeiten ankommt, und die gewöhnlich Personen, welche gar keinen Begriff von diesen Geschöpfen haben, anvertraut werden, durch nachlässige Behandlung entstellt werden können. Es zerfiel daher dieses Verzeichniß in zwey Abschnitte. Der erste enthält das Verzeichniß, und der zweyte die Definition und Synonymie der abgebildeten Arten, nebst kurzen Bemerkungen darüber.

Sollte

Sollte es nun hie und da einem
Freunde der Insectenkunde gefallen,
meine kleine Sammlung durch ge-
fällige Beyträge zu bereichern, so
bin ich erbötig, für eine jede mir
noch fehlende Art ein schön aufge-
stecktes Exemplar der aus meiner
Sammlung dafür ausgesuchten Art
dagegen zu geben; oder, wenn dies
nicht hinlänglich wäre, mir auch
andere annehmliche Bedingnisse ge-
fallen zu lassen.

Endlich muss ich noch erinnern,
dass ich die Anzahl meiner Dublet-
ten zu bemerken deswegen unter-

A 4

lassen

8

lassen habe, weil solche bey meinem steten Fortsammeln immer unbeständig bleiben muß. Da aber gerade ein solches Insect verlangt werden könnte, wovon ich zur Zeit nur *Ein* Exemplar besitze, so setzte ich, um solches zu verhindern, den Arten, die ich nur einmal habe, ein. * vor.

Nürnberg, im Julii 1796.

Sturm.

I. Ab-

I. Abschnitt.

Alphabetisches Verzeichniß meiner Insecten - Sammlung.

ACANTHIA

**Betulae*
lectularia

ACARUS

seminulum *Block.*

ACHETA

campestris
**Gryllotalpa*

ACRYDIUM

bipunctatum
subulatum

AESHNA

forcipata
grandis

AGRION

puella
Virgo

ANDRENA

spiralis
**succincta*

ANISOTOMA

**corrusca* *Kuge-*
lann.
**glabra* *Kugel.*
**testacea* *Kugel.*

ANOBIUM

Boleti
festivum *Block.*

10

ANOBIUM

- *micans
- molle
- pertinax
- striatum
- *tessellatum

ANTHRAX

- hottentotta
- *maura
- Morio

ANTHRENUS

- *hirtus
- Museorum
- Scrophulariae

ANTHRIBUS

- *albinus
- *scabrosus
- varius

APIS

- agrorum
- centuncularis
- *equestris
- *Hypnorum

APIS

- *lagopoda
- lapidaria
- mellifica
- muscorum
- *pilipes
- *punctata
- *ruderata
- *rupestris
- terrestris

ARANEA

- *diadema
- *faccata
- *scenica

ASCALAPHUS

- *italicus

ASILUS

- crabroniformis
- Ephippium
- foeni
- gilvus
- tipuloides

ATTELABUS

- aequatus

ATTE-

DS

ATTELABUS

Bacchus
*Betuleti
 β) caeruleus
Coryli
Craccae
cupreus
curculionoides
cyaneus
flavipes
frumentarius
Populi
Sorbi

BEMBEX

rostrata

BIBIO

anilis
plebeja

BLAPS

mortisaga

BLATTA

lapponica
marginata
orientalis

BOMBYLIUS

ater
* pictus *Panz.*
BOMBYX

bucephala
* Caja
* chrysorrhoea
* coeruleocephala
* dispar

* Dominula
* fuliginosa
* Hebe

* Hera
* Iacobaeae
* lugubris
* monacha
* Mori

* neustria
Pavonia minor

* Pini
* Plantaginis

* potatoria
* pudibunda
* purpurea
quercifolia

BOM-

12

BOMBYX

- **Quercus*
- Salicis*
- Ipreta*
- **versicolora*
- **vinula*

BOSTRICHUS

- cylindrus*
- Laricis*
- **monographus*
- piniperda*
- Typographus*

BRUCHUS

- **granarius*
- villosus*

BUPRESTIS

- **chrysostigma*
- linearis*
- mariana*
- minuta*
- nitidula*
- **octoguttata*
- **pygmaea*
- quadripunctata*

BUPRESTIS

- **rufica*
- rutilans*
- **Salicis*
- viridis*

BYRRHUS

- ater*
- **fasciatus*
- **minutus*
- Pilula*
- **varius*

CALLIDIUM

- **Alni*
- **arcuatum*
- arietis*
- Bajulus*
- **detritum*
- femoratum*
- fennicum*
- **fulcratum*
- **Gazella*
- **hafniense*
- mysticum*
- **Salicis*
- sanguineum*

CALLI-

CALLIDIUM

striatum
triste
Verbasci
violaceum

CALOPUS

* ferraticornis

CANTHARIS

biguttata
fulvicollis
fusca
livida
melanura
obscura

CARABUS

anthracinus
Panz.
* apricarius
aterrimus
* auratus
* auronitens
* bipustulatus
brevicollis
* catenulatus

CARABUS

* cephalotes
cisteloides *Hell-*
wig.
cyanocephalus
communis *Ku-*
gelann.
* coriaceus
* crepitans
crux major
* cyaneus
Doris *Kugelann.*
fulvus *Kugelann.*
granulatus
* griseus *Kugel.*
helopioides
hirtipes *Kugel.*
* hortensis
* inquisitor
* irregularis
* leucophthalmus
marginatus
melanocephalus
minimus
* multipunctatus
* nigricornis

CARA.

14

CARABUS

- * pilicornis
- * planus
- prasinus
- pulchellus, *Kugelann.*
- ruficornis
- sexpunctatus
- * strenuus *Kugel.*
- fycophanta
- taeniatus *Hellwig.*
- tardus *Kugel.*
- vernalis *Panz.*
- * violaceus

CASSIDA

- * affinis
- * ferruginea
- nobilis
- tigrina *Deger.*
- viridis

CERAMBYX

- * alpinus
- * Cердо
- fasciculatus

CERAMBYX

- * Heros
- hispidus
- molchatus

CERCOPIS

- * bifasciata
- coleoptrata
- * sanguinolenta

CERIA

- * clavicornis

CEROCOMA

- Schäfferi

CETONIA

- aurata
- * fastuosa
- hirta
- marmorata
- * stictica

CHALCIS

- minuta

CHRYSIS

- * aenea

CHRY-

CHRYYSIS

aurata
*cyanea
fervida
ignita
lucidula
regia

CHYSOMELA

*Adonidis
aenea
Armoraciae
*aucta
cerealis
*collaris
coriaria
*cuprea
decempunctata
fastuosa
*gloriosa
*graminis
haemoptera
hottentotta
*lamina
*lapponica
*limbata

CHYSOMELA

litura
marginella
*pectoralis
polita
Populi
sanguinolenta
*Schach
*scutellata
Staphyleae
Tenebricosa
tremula
*varians
violacea

CICADA

*lanio
viridis

CICINDELA

campestris
germanica
hybrida
sylvatica

CIMEX

acuminatus
baecarum

CIMEX

CIMEX

- * bicolor
- coeruleus
- diffimilis
- festivus
- [flavicornis]
- griseus
- * Lynx
- maurus
- * Morio
- nigricornis
- nigrolineatus
- oleraceus
- perlatus
- prasinus
- rufipes

CISTELA

- bipustulata Hell-
wig.
- * ceramboides
- cervina
- cinerea
- * Evonymi
- fulvipes
- fusca Hellwig.

CISTELA

- opaca Hellw.
- sulphurea
- * thoracica

CLERUS

- alvearius
- apiarius
- formicarius
- * mutillarius
- * unifasciatus

COCCINELLA

- * analis
- * biguttata
- bipunctata
- bipustulata
- * bisbipustulata
- * bisbiverrucata

Panz.

- * biverrucata
- Panz.
- conglobata
- conglomerata
- decempustulata
- * duodecimpun-
ctata

COCCI-

COCCINELLA

- * *nigrina* Panz.
- ocellata*
- parvula*
- * *pubescens* Panz.
- quadripustulata*
- quatuordecim-*
 guttata
- quatuordecim-*
 pustulata
- renipustulata*
 Müll.
- septempunctata*
- sexpunctata*
- sexpustulata*
- * *tigrina*
- tredecimpun-*
 ctata
- * *vigintiguttata*
- vigintipunctata*
- vigintiquatuor-*
 punctata

COREUS

- marginatus*
- * *quadratus*

COREUS

- * *scapha*

COSSUS

- * *Ligniperda*

CRABRO

- clypeatus* masc.
- — foem.
- * *cribrarius* masc.
- * — — foem.
- labiatus*
- * *mucronatus*
- * *pictus*
- scutatus* masc.
- subterraneus*

CRIOCERIS

- Asparagi*
- duodecimpun-*
 ctata
- flavipes*
- melanopa*
- merdigera*
- Phellandryii*
- rufipes*
- * *subspinosa*

CRYPTOCEPHALUS CURCULIO

LUS

* auritus	Abietis
bipustulatus	albidus
cyaneus	Alneti
flavipes	Apsinthii <i>Panz.</i>
* gracilis	argentatus
hieroglyphicus	Artemisiae
Hübneri	• <i>Hellw.</i>
labiatus	* Bardanae
longimanus	* bimaculatus
* longipes	catenulatus
minutus	<i>Panz.</i>
Moraei	Chloris <i>Panz.</i>
nitens	* cloropus
obscurus	Colon
quadripunctatus	Coryli
sericeus	Drüparum
vittatus	* gemmatus

CUCUIUS

* flavipes	* glaucus
* pallens	* grammicus <i>Panz.</i>

CULEX

* pipiens	granarius
* trifurcatus	incanus

Lapathi

Ligustici

Linariae *Panz.*

CUR-

CURCULIO

- lineatus
- * marmoratus
- micans
- * Morio
- muralis Reich.*
- nebulosus
- niger
- * nigrirostris
- * Nucum
- oblongus
- * Oryzae
- ovatus
- * parallelus Panz.
- paraplecticus
- Pini
- Populi
- * Pruni
- Pseudacori
- Pyri
- Salicariae
- Salicis
- Scrophulariae
- * Sisyphus
- fulcirostris
- * futuralis

CURCULIO

- Thapsus
- * villosus
- viridis

CYMOPTHOA

- aquatica

CYNIPS

- Rosae

DERMESTES

- * bicolor
- catta Panz.
- cellaris
- fumatus
- fungorum Panz.
- lardarius
- * longicornis
- Panz.
- * murinus
- Pellio
- picipes
- porcatus Panz.
- rufitarsis Creuzer.

20

DERMESTES

- * semicoleoptratus *Panz.*
violaceus

DIAPERIS

- * Boleti

DONACIA

- * clavipes
dentipes
* discolor *Hoppe.*
Festucae
Hydrocharis
micans *Panz.*
micans *Hoppe.*
Nymphaeae
Sagittariae
semicuprea
Panz.
* simplex
* striata *Panz.*
vittata *Panz.*

DYTISCUS

- arcuatus *Panz.*
bipustulatus

DYTISCUS

- * chalconatus *Kugelann.*
chrysomelinus
* cinereus
collaris *Panz.*
* fuscus
* impressus
inaequalis
lacustris *Kugel.*
* latissimus masc.
* — — foem.
lituratus
marginalis masc.
— — foem.
obscurus *Panz.*
* Roefelii
fulcatus masc.
— — foem.
* trifidus *Panz.*
uliginosus

ELAPHRUS

- aquaticus
riparius
* striatus

ELA-

ELATER

aeneus
aterrimus
balteatus
* bructeri *Hellw.*
caftancus
* cruciatus
haematodes
holescriceus
linearis
* mesomelus
murinus
niger
pectinicornis
* ruficollis
sanguineus
striatus
tesselatus
thoracicus
* vittatus

ELOPHORUS

aquaticus
elongatus

FORFICULA

auricularia

FORFICULA

minor

FORMICA

* caespitum
herculeana
rufa

GALLERUCA

Alni
* Beccabunga
Hellw.
* Capreæ
* coccinea
* Erucae
* Euphorbiae
exoleta
haemisphaerica
Helxines
Hyoscyami
* Modeeri

Napi
Nymphaea
nemorum
nigripes
nitidula
oleracea

22

GALLERUCA

- * praten sis *Hellw.*
ruficollis
* ruficornis
rufipes
rustica
Salicis *Degeer.*
Tanaceti
testacea
Verbasci *Hellw.*
* vigintipunctata
Vitellinae

GERRIS

- lacustris
stagnorum

GRYLLUS

- biguttulus
coerulefcens
fridulus

GYRINUS

- natator

HALLOMENUS

- * micans *Hellw.*

HELOPS

- * ater
caraboides *Panz.*
laticollis *Cren-*
tzer.
ferratus

HEMEROBIUS

- perla
* phalaenoides

HESPERIA

- * Cyllarus
* Fritillum
* Malvae
* Rubi

HIPPOBOSCA

- avicularia
equina

HISPA

- atra

HISTER

- * aeneus
bimaculatus

HISTER

HISTER

- depressus
- * *purpurascens*
Herbst.
- * *quadratus Kuge-*
lann.
- quadrimacula-*
tus
- sinuatus*
- * *fulcatus*
- unicolor*

HYDROPHILUS

- caraboides*
- orbicularis*
- * *piceus*
- scarabaeoides*

HYPOPHLOEUS

- * *depressus*

ICHNEUMON

- Bedeguaris*
- * *crispatorius*
- * *delusor*
- * *denigrator*
- desertor
- globatus*
- initiator*
- * *irrigator*
- laetatorius*
- luteus*
- manifestator*
- * *sponsor*
- sputator*

IPS

- * *ferruginea*
- * *humeralis*
- quadriguttata*
- quadripustulata*

IULUS

- terrestris*

LAGRIA

- * *atra*
- * *caerulea*
- hirta*
- nigra*
- * *pallipes Panz.*

B 4 LAMIA

24

LAMIA

- aedilis
- * atomaria
- * curculionoides
- * Fuliginator
- * Morio
- * rusipes
- textor
- * varia

LAMPYRIS

- * italica
- splendidula

LEPISSMA

- saccharina

LEPTURA

- atra
- attenuata
- calcarata
- collaris
- laevis
- limbata *Lai-*
chard.
- * lurida

LEPTURA

- maculicornis
- Panz.
- melanura
- meridiana
- nigra
- octomaculata
- Pastrinaceae Panz.
- * quadrifasciata
- quadrimaculata
- rubra
- ruficornis
- sanguinolenta
- subspinosa
- testacea
- * villica
- virginea

LIBELLULA

- * acnea
- depressa
- * quadrimaculata

LOCUSTA

- * varia
- verrucivora
- viridissima

LUCA.

LUCANUS

caraboides
Cervus
* parallelipedus

LYCTUS

bipustulatus
* canaliculatus
crenatus
histeroides

LYCUS

sanguineus

LYGAEUS

apterus
equestris
gothicus
Hyoscyami
Pini
faxatilis
scriptus

LYMEXYLON

* dermestoides

LYTTA

yescatoria

MALACHIUS

aeneus
* angulatus
bipustulatus
equestris
* fasciatus
flavipes
pulicarius

MELLINUS

fabulosus

MELOE

* brevicollis *Hell-*
wig.
* maialis
* Proscarabaeus
tecta *Hellw.*

MELOLONTHA

agricola
argentea
* brunea
Frischii
Fullo
horticola
Iulii

26

MELOLONTHA	MUSCA
* ruricola	Caeſar
. solstitialis	carnaria
squamosa	- cupraria
* variabilis	domestica
* villosa	* femorata <i>Panz.</i>
vulgaris	* grossificationis
MEMBRACIS	lateralis
cornuta	* maculata
Génistae	* nobilitata
MOLORCHIUS	rotundata
* abbreviatus	* stellata <i>Geoffr.</i>
dimidiatus	tremula
	vomitoria
MORDELLA	MYCETOPHAGUS
aculeata	* bifasciatus
atra	* quadrimaculatus
* dorsalis <i>Panz.</i>	
* fasciata	
frontalis	
thoracica	
MUSCA	MYLABRIS
* albifrons	* Fueslini <i>Panz.</i>
aurata	
MYOPA	
* atra	
	* buccata
MYO-	

MYOPA

ferruginea
testacea

MYRMELEON

* formicarium

NAUCORIS

* cimicoides

NECYDALIS

* flavicollis *Panz.*
melanura
* Podagrariae
simplex
ustulata
* virescens

NEPA

cinerea

NICROPHORUS

* germanicus
* humator
vespillo

NITIDULA

* aenea

NITIDULA

aestiva
bipustulata
varia

NOCTUA

* Atriplicis
* chrysitis
* fimbria
* Gamma
* glyphica
* libatrix
* maura
* meticulosa
 Perficulariae
* Psi
* Psi
* quadra
* Ruminis
* Verbasci

NOTONECTA

glauca
* minutissima

NOTOXUS

* calycinus

NOTO-

28

NOTOXUS

- * minutus
- mollis
- monoceros

ONISCUS

- Agilis Persoon.*
- Armadillo
- Afellus
- * maculatus

OPATRUM

- fabulosum
- tibiale

OXYPORUS

- * lunulatus
- * rufus

PAEDERUS

- dimidiatus *Panz.*
- * elongatus
- riparius

PANORPA

- communis

PAPILIO

- * Antiopa
- Apollo
- * Atalanta
- * Brassicæ
- * Cardamines
- * Cardui
- * Crataegi
- * Galathea
- * Hyale
- * Hyperanthus
- * Ianira
- * Ilia
- * Io
- * Iris
- * Lathonia
- Machaon
- * Napi
- * Panphilus
- * Paphia
- Rhamni
- * Sinapis
- * Urticae

PHALAENA

- * farinalis

PHA-

PHALAENA

- * grossulariata
- * papilionaria
- * pinicaria
- * sambucaria

PHALANGIUM

- cornutum
- Opilio

PHILANTHUS

- laetus
- quinquecinctus

PHRYGANEA

- grandis
- * reticulata

PRIONUS

- coriarius

PTEROPHORUS

- * didactylus

PTILINUS

- * muticus
- pectinatus

PTINUS

- Fur
- * imperialis
- Scotias
- * sexpunctatus
Panz.

PULEX

- irritans

PYROCHROA

- coccinea
- pectinicornis
- * rubens

RANATRA

- * linearis

RAPHIDIA

- Ophiopsis

REDUVIUS

- * annulatus
- personatus

RHAGIO

- scolopaceus
- tringarius

RHA.

30

RHAGIUM

- indagator
inquisitor
* mordax
* Noctis

RHINGIA

- rostrata

RHINOMACER

- curculioides

SAPERDA

- * Carcharias
* Cardui
* linearis
* nigripes
 occultata
 populnea
 praeusta
* scalaris
 tremula

SCAPHIDIUM

- agaricinum
* scutellatum Panz.

SCARABAEUS

- * austriacus masc.
 Schneider,
* austriacus foem.
* Capra masc.
 Coenobita masc.
 — — foem.
conflagratus
conspurcatus
contaminatus
emarginatus
erraticus
fimetarius
flavipes
Fosfor
fracticornis
 masc. Preyfler.
fracticornis
 foem.
* haemorrhoidalis
 inquinatus
* Lemur
 lunaris masc.
 — — foem.
* nasicornis masc.
 niger Kugelann.
 SCA-

SCARABAEUS

nigripes
nuchicornis
 masc.
nuchicornis
 foem.
nutans masc.
 — foem.

ovatus
porcatus
quisquilius
rufipes
Schaefferi
Schreberi
fordidus
stercorarius
subterraneus
Taurus masc.
 — foem.
testudinarius

* Typhoeus masc.
 — — foem.
vernalis
Xiphias masc.
 — foem.

SCARITES

arenarius
* gagates Hellw.
gibbus

SCOLIA

* quinquepunctata

SCOLOPENDRA

coleoptrata
forficata
* morsitans

SCOLYTUS

limbatus

SCORPIO

canceroides

SEMMLIS

Iutaria
viridis

SESIA

stellatarum

SIGARA

striata

SIL.

32

SILPHA

- atrata
- ferruginea
- littoralis
- obscura
- quadripunctata
- reticulata
- rugosa
- sinuata
- thoracica

SINODENDRON

- * cylindricum
- masc.

SIREX

- * gigas
- * mariscus
- * spectrum

SPHAERIDIUM

- bicolor
- * bipustulatum
- crenatum *Kuge-*
lann.
- fimetarium
- * marginatum

SPHAERIDIUM

- Scarabaeoides
- unipunctatum

SPHEX

- arenaria
- fusca
- lutaria
- * maculata
- sabulosa

SPHINX

- * Atropos
- * Convolvuli
- * Elpenor
- Euphorbiae
- * Ligustri
- * ocellata
- * Pinastris
- * Populi
- Tiliae

SPONDYLIS

- buprestoides

STAPHYLINUS

- * biguttatus

STA-

STAPHYLINUS

canaliculatus
clavicornis
erythropterus
floralis
*fuscipes
hirtus
maxillofus
murinus
*olens
politus
*rivularis *Paykull.*

STOMOXYS

calcitrans
grisea
fiberita

STRATIOMYS

*chamaeleon
*clavipes
*furcata
Hydroleon
Hypoleon

SYRPHUS

arbustorum
arcuatus
*elongatus
floreus
*intricarius
*oestraceus
pellucens
pendulus
pipiens
Pyrasti
*sepulchralis
*spinipes
tenax
*tristis

TABANUS

bovinus
caecutiens
pluvialis
tropicus

TENEBRI

molitor

C

TEN.

34

TENTHREDO

- albicornis
- *atra
- coerulescens
- flavicornis
- *germanica
- *Juniperi
- luteicornis
- *marginella
- Morio
- ovata
- punctum
- *Rapae
- Rosae
- *rufiventris
- ustulata
- viridis

TINEA

- *Pinetella

TIPULA

- hortulana
- *pratenis

TRAGOSITA

- *caraboides

TRICHIUS

- *Eremita
- fasciatus
- hemipterus
- *nobilis

THIRIPS

- *fasciata
- *Ulmi

TRITOMA

- bipustulata

TINEA

- *evonymella

TROX

- arenarius
- fabulosus

TROM.

35

TROMBIDIUM

- * *geographicum*
- * *holofericeum*

VESPA

- saxonica*
- vulgaris*

VESPA

- * *coarctata*
- Crabro*
- gallica*

ZYGAENA

- * *Filipendula*
 - * *Scabiosae*
 - Statices*
-

C 2

II. Ab-

Summa 624.

II. Abschnitt.

Beschreibungen nebst Abbildungen
einiger Insecten aus meiner
Sammlung.

I. HELOPS *ater*.

Tab. I. fig. 1.

H. *ater* elytris striatis. *Fabric.* Ent.
Syft. T. I. n. 21. p. 121. Spec. Inf.
T. I. n. 11. p. 326. Mant. Inf. T. I.
n. 15. p. 214.

Panzer Ent. germ. I. n. 6. p. 43.

Pimelia atra *Linn.* Syft. Nat. ed. XIII.
n. 75. p. 2011.

Pyrochroa (nigra) nitida, corpore ova-
to, thorace convexo, antennis pedi-
busque fuscis. *Degeer* Inf. 5. n. 4.

Bey Erlangen nicht gar selten, wo-
her ich ihn der Güte meines unschätz-
baren

baren Freundes, des Herrn Dr. Hoppe,
zu danken habe.

Nicht die ganzen Fühlhörner, son-
dern nur die Spitzen davon, und die
Fussblätter sind braun!

Tab. I. a. Eine vordere vergrößerte
Fressspitze. *b.* Ein vergrößertes Fühl-
horn.

2. *EEAPHRUS striatus.*

Tab. I. fig. 2.

E. aeneus elytris striatis, pedibus fla-
vescentibus. *Fabric.* Ent. Syst. T. I.
n. 3. p. 179.

Panzer Ent. germ. I. n. 3. p. 69.

Selten. Ich habschte ihn erst ein ein-
ziges mal auf einer feuchten Wiese.

Tab. I.c. Maassstab der natürlichen Gröfse.

3. *MALACHIUS angulatus.*

Tab. I. fig. 3.

M. ater nitidus thoracis limbo tibiisque
anticis rufis. *Fabric.* Ent. Syst. T. I.
n. 9. p. 223.

38

Panzer Ent. germ. I. n. 5. p. 93.

Selten. Ich habe ihn erst ein paarmal auf einer Linde gehascht. Das Männchen ist vom Weibchen durch einen breitern Saum am Brustschild, und einen grossen rothgelben Flecken, welcher sich beynahe über den ganzen Kopf ausbreitet, — da hingegen der Kopf des Weibchens ganz schwarz ist — unterschieden. Unsere Figur stellt das Männchen vor.

Tab. I. d. Maassstab der natürlichen Grösse.

4. *MALACHIUS flavipes.*

Tab. I. fig. 4.

M. niger antennarum basi tibiisque flavis. Fabric. Ent. Syst. T. I. n. 15.
p. 225.

Panzer Ent. germ. I. n. 11. p. 94.

Hin und wieder auf Blüthen, aber sehr selten.

Variat rarius forte sexu puncto elytrorum parvo apicis ferrugineo. Fabr.

Tab. I. e. Maassstab der natürlichen Grösse.

5. GAL-

5. - GALLERUCA *ruficollis*.

Tab. I. fig. 5.

G. viridi aenea thorace pedibusque rufis. *Fabric.* Ent. Syft. T. I. P. II. n. 4. p. 13. Spec. Inf. I. n. 69. p. 128. Mant. Inf. I. n. 89. p. 72. et p. 92. n. 22. *Erotylus flavipes*.

Chrysomela ruficollis. *Linn.* Syft. Nat. ed. XIII. n. 81. p. 1668.

Geoffr. Inf. par. I. n. 16. p. 263.

In manchen Jahren nicht selten; manches Jahr aber ganz unsichtbar. Das Weibchen schwilzt zu einer außerordentlichen Dicke auf, wenn es trächtig ist. In des Hr. Dr. *Panzers* Ent. germ. vermissé ich diese Gallèruca.

Tab. I.f. M assstab der natürlichen Grösse.
g. Ein vergrößertes Fühlhorn.

6. CRYPTOCEPHALUS *nitens*.

Tab. I. fig. 6.

C. viridis nitens ore pedibusque testaceis. *Fabric.* Ent. Syft. T. I. P. II.

40

n. 57. p. 64 Spec. Inf. I. n. 33. p. 144.
Mant. Inf. I. n. 44. p. 82.

Panzer Ent. germ. I. n. 21. p. 196.

Chrysomela nitens. Linn. Syst. Nat. XII.
2. n. 84. p. 598. ed. XIII. n. 44. p.
1706. Fn. suec. 551.

Degeer inf. 5. n. 38. p. 334.

Ich finde ihn gewöhnlich zu Ende des Mai's, auf der rundblätterigen Werftweide (*Salix aurita* L.), auch auf anderem Gesträuche. Grün fand ich diesen Fallkäfer bisher noch nicht; alle Exemplare, die ich davon besitze, sind schwarzblau, stark glänzend. Die grüne Spielart mag daher seltener seyn, als die blaue.

Tab. I. h. Maassstab der natürlichen Grösse.
i. Der Kopf von vornen, vergrößert.

7. CRYPTOCEPHALUS *labiatus*.

Tab. I. fig. 7.

C. ater nitidus ore pedibus basique antennarum lutescentibus. Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 62. p. 65. Spec. Inf.

Inf. I. n. 49. p. 146. Mant. Inf. I.
n. 65. p. 84.

Panzer Ent. germ. I. n. 23. p. 197.
Chrysomela labiata. Linn. Syst. Nat.
XII. 2. n. 87. p. 598. ed. XIII. n. 66.
p. 1709. Fn. suec. 553*.

Nicht gar selten: an Hecken etc.
Die gestreift punktirten Flügeldecken,
und zwey gelbe Punkte an der Stirn,
find ein schönes Kennzeichen an ihm,
das ihn vor allen ähnlichen *Fallkäfern*
hinlänglich unterscheidet.

Tab. I. k. Maassstab der natürlichen Grösse.
1. Der Kopf von vornen, vergrößert.

3. CRYPTOCEPHALUS *flavipes*.

Tab. I. fig. 8.

C. ater nitidus capite pedibusque luteis.
Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 64.
p. 65. Spec. Inf. I. n. 50. p. 146.
Mant. Inf. I. n. 68. p. 84.

Panzer Ent. germ. I. n. 25. p. 197.
Cryptocephalus flavipes. Linn. Syst. Nat.
ed. XIII. n. 63. p. 1709.

42

Cryptocephalus parenthesis Schrank.

Nicht selten, und an den nehmlichen Stellen mit dem vorhergehenden. Die Flügeldecken sind sparsam punktiert, und haben am Grunde einen gelben Saum.

Tab. I. m. Maassstab der natürlichen Größe. *n.* Der Kopf von vorne, vergrößert.

9. CRYPTOCEPHALUS *Hübneri*.

Tab. I. fig. 9.

C. niger capite elytrorum apicibus pedibusque flavis. *Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 66. p. 65.*

Panzer Ent. germ. I. n. 27. p. 198.
Fauna Inf. germ. XXXIX. 16.

Etwas selten, an Hecken, auf Weiden etc.

Tab. I. o. Maassstab der natürlichen Größe. *p.* Der Kopf von vorne, vergrößert.

10. CRY-

10. CRYPTOCEPHALUS *minutus*.

Tab. I. fig. 10.

C. thorace fulvo, clytris striatis testaceis immaculatis. Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 87. p. 70.

Panz. Ent. germ. I. n. 38. p. 200.
Fauna Inf. germ. XXXIX. 18.

Nicht gemein, hin und wieder auf Gräsern in Aeckern.

Tab. I. q. Maafstab der natürlichen Grösse. r. Der Kopf von vorne, vergrößert.

11. CRYPTOCEPHALUS *gracilis*.

Tab. I. fig. 11.

C. ater capite thoraceque fulvis, elytris linea marginali baseos alba. Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 88. p. 70.

Cryptocephalus rufipes: niger striatus, thorace pedibusque rufis. Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 38. p. 1711.

Geoffr. inf. par. I. n. 11. p. 236.

Ich finde dieses niedliche Käferchen sehr selten, und doch habe ich schon zwey

zwey Varietäten davon entdeckt: nehmlich eine, die an den Spitzen der Flügeldecken zwey gelbe Flecken hat; und eine, der diese Flecken mangeln, die aber dafür am Grunde des Brustschildes zwey schwarze Flecken hat.

Herr D. Panzer hat diesen Fallkäfer in seine *Ent. germ.* noch nicht aufgenommen.

Tab. I. s. Maassstab der natürlichen Größe. *t.* Das vergrößerte Brustschild der erwähnten Varietät.

12. *HISPA atra.* 5485.

Tab. I. fig. 12.

H. antennis fusiformibus, thorace elytrisque spinosis. Fabric. *Ent. Syft. T. I. P. II. n. 1. p. 70.* Spec. Inf. I. n. 20. p. 83. Mant. Inf. I. n. 9. p. 47.

Panzer Ent. germ. I. n. I. p. 200.

Linn. Syft. Nat. ed. XIII. n. 1. p. 1732.

Crioceris atra spinis horrida. Geoffr. inf. par. I. n. 7. p. 243.

Schr. der berl. Naturf. Ges. 4. t. 7. f. 6.

Roff. Faun. etrusc. 52. 129.

Etwas

Etwas selten; gewöhnlich finde ich ihn im August und September auf Wiesen, auf der Erde, oder an Grashalmen sitzend.

Tab. I. u. Maafsstab der natürlichen Grösse. v. Ein vergrössertes Fühlhorn.

13. CUCUIUS *flavipes*.

Tab. II. fig. 1.

C. thorace denticulato nigro, pedibus flavescentibus, antennis filiformibus longitudine corporis. *Fabric.* Ent. Syst. T. I. P. II. n. 8. p. 95. Spec. Inf. I. n. 4. p. 257. *Mant. Inf. I.* n. 6. p. 156.

Panzer Ent. germ. I. n. 5. p. 207.

Cerambyx planatus: thorace scabro anterius dentato, corpore nigro, antennis pedibusque ferrugineis. *Linn.* Syst. Nat. ed. XIII. n. 17. p. 1819.

Cucujus planatus. *Herbst.* Archiv. II. p. 7. t. 1. f. 7. 8.

Diesen und den folgenden Rindenkäfer fand ich erst ein einzigesmal in hie-

hiesiger Gegend, unter der Rinde eines faulenden Stockes; wahrscheinlich machen diese beyden Käfer nur Eine Art aus, da man sie gewöhnlich beysammen antrifft; sie wären also nur dem Geschlechte nach verschieden.

Tab. II. a. Maassstab der natürlichen Grösse.

14. *CUCUIUS pallens.*

Tab. II. fig. 2.

C. thorace ferrato obscuro, elytris stria-
tis, abdomine pedibusque testaceis.
Fabric. Ent. Sylt. T. I. P. II. n. 9.
p. 96.

Panzer Ent. germ. I. n. 6. p. 207.

An gleicher Stelle mit dem vorher-
gehenden. Vielleicht das Weibchen.

Tab. II. b. Maassstab der natürlichen Grösse.

15. *PYROCHROA rubens.*

Tab. II. fig. 3.

P. nigra capite thorace elytrisque san-
guineis immaculatis. *Fabric.* Ent.
Sylt. T. I. P. II. n. 2. p. 105.

Pan-

Panzer Ent. germ. I. n. 2. p. 210.

Lampyris rubens. Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 35. p. 1886.

Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. I. p. 301.

Pyrochroa Satrapa. Schrank. inf. aust. n. 324. p. 174.

Dieser Feuerkäfer ist gewiss nichts weniger, als Abart von *P. coccinea*; denn sogar wo letztere gemein ist, wird er nicht angetroffen. So sahe ich auch bey *Herfspruk*, wo ich meinen Käfer in Gesellschaft der *P. pectinicornis* fieng, nicht eine einzige *P. coccinea*.

Tab II. c. Ein vergrößertes Fühlhorn.

16. BUPRESTIS *pygmaea.*

Tab. II. fig. 4.

B. elytris integris cyaneis, capite thoraceque aeneis nitidis. *Pabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 110. p. 211. Mant. Inf. I. n. 78. p. 183.*

Panzer Ent. germ. I. n. 26. p. 232.

Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 92. p. 1936.

Man

Man findet diesen kleinen *Pracht-käfer* hin und wieder in Deutschland an Hecken, Dorngebüschen etc.; in hiesiger Gegend habe ich ihn noch nicht angetroffen.

Kopf und Brustschild ist glänzend goldfarbig. Die Flügeldecken blau, punktirt. Körper und Füsse dunkel Bronzefarbig.

Tab. II. d. Maassstab der natürlichen Gröfse.

17. BUPRESTIS *linearis*.

Tab. II. fig. 5.

B. elytris integris linearibus viridibus, capite thoraceque obscure aureis. Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 116. p. 213.

Panzer. Ent. germ. I. n. 30. p. 233.

Hier um Nürnberg ist dieser *Pracht-käfer* nicht selten; gewöhnlich finde ich ihn auf der rundblätterigen Werftweide (*Salix aurita* L.) häufig.

Tab. II. e. Maassstab der natürlichen Gröfse.

18. ELA-

18. ELATER *vittatus*.

Tab. II. fig. 6.

E. fuscus elytrorum vitta pedibusque testaceis. Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 36. p. 224.

Panzer Ent. germ. I. n. 14. p. 237.

Auf dem Michaelsberg bey Herspruck haschte ich diesen Springküfer verschiedenmale auf Wachholderstauden, worunter ich öfters Exemplare bekam, welche beynahe ganz einfärbige röthlich-braune Flügeldecken hatten.

Tab. II. f. Maassstab der natürlichen Grösse.

19. ELATER *ruficollis*.

Tab. II. fig. 7.

E. niger thorace postice rubro nitido. Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 52. p. 227. Spec. Inf. I. n. 33. p. 270. Mant. Inf. I. n. 37. p. 173.

Panzer Ent. germ. I. n. 30. p. 240.

Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 14. p. 1905.
Fn. suec. 724.

50

Elater gramineus. Scop. ent. carn. 290

Oliv. Inf. 31. t. 6. f. 61.

Geoffr. inf. par. 1 n. 5. p. 132.

Degeer inf. 4. n. 16. p. 153.

Raj. inf. n. 8. p. 92.

Ein in hiesiger Gegend seltener Springkäfer! Ich traf ihn erst ein einzigesmal an einer Hecke an.

Tab. II. g. Maassstab der natürlichen Gröfse.

20. SAPERDA nigripes.

Tab. II. fig. 8.

S. cylindrica nigra thoracis lineis duabus scutelloque cinereis, pedibus nigris. Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 13. p. 310.

Herr Prof. Fabricius giebt a. a. O. Ungarn zum Wohnort dieses Schneckenküfers an; ich habe ihn bisher nur einmal in hiesiger Gegend gefunden. Hr. Dr. Panzer hat ihn auch noch nicht in seine Insectenfaune Deutschlands aufgenommen.

Der

Der ganze Käfer ist dünn behaart und schwarz, nur die Flügeldecken haben einen blauen Schimmer, und sind stark punktiert; auf dem Brustschilder befinden sich zwey weisgraue Längslinien, welche Farbe auch das Schildchen hat.

21. LEPTURA *ruficornis*.

Tab II. fig. 9.

L. nigra antennis pedibusque rufis. Fabric. Ent. Syst. T. I. P. II. n. 25. p. 344. Spec. Inf. I. n. 11. p. 147. Mant. Inf. I. n. 18. p. 159.

Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 35. p. 1870.

Ich traf diesen Schmalbock sonst in hiesiger Gegend nur selten auf Doldengewächsen an; nur im Iunius dieses Jahrs fand ich ihn einmal in Menge auf der Blüthe des Weißdorns (*Crataegus Oxyacantha* L.).

Der ganze Käfer ist schwarz, aber dicht mit goldgelben Häärchen überzogen, so dass er in gewisser Richtung gegen das Licht ganz gelb erscheint. Kopf, Brustschild, und Flügeldecken sind stark

D 2

punk-

punktirt; Fühlhörner und Füsse ziegelroth, und die Gelenke der ersten an ihren Spitzen schwarz; auch die zwey paar Hinterfüsse sind an ihren Spitzen schwarz. Das Männchen ist um ein Drittel kleiner, als das Weibchen. Auch diesen Käfer hat Herr D. Panzer noch nicht in seine Ent. germ. aufgenommen.

Tab. II. b. Maassstab der natürlichen Grösse des Männchens, i. des Weibchens.

22. BRUCHUS granarius.

Tab. II. fig. 10.

B. elytris nigris: atomis albis, femoribus posticis unidentatis. *Fabric.* Ent. Syft. T. I. P. II. n. 15. p. 372. Spec. Inf. I. n. 11. p. 76. Mant. Inf. I. n. 15. p. 42.

Panzer Ent. germ. I. n. 4. p. 291.

Bruchus elytris nigris: atomis albis, pedibus anticis rufis, posticis dentatis. *Linn.* Syft. Nat. XII. 2. n. 5. p. 605. ed. XIII. n. 5. p. 1736. Fn. suec.

628. Curculio atomarius.

Nicht

Nicht gemein. Man findet ihn vom Julius bis September auf Doldengewächsen, und zur Zeit der Saubohnenblüthe (*Vicia Faba L.*) legt das Weibchen in die Blüthen dieser Pflanzen ihre Eyer. Mit dem Wachsthum der Bohnen wird auch die Larve gross, verpuppt sich, und der Käfer frisst sich noch im Herbst, oder im kommenden Frühjahr durch.

Tab. II. k. Maassstab der natürlichen Grösse. *l.* Ein vergrösserter Hinterfuss.

23. *BRUCHUS villosus.*

Tab. II. fig. 11.

B. villosus cinereus immaculatus. Fabric.

Ent. Syst. T. I. P. II. n. 20. p. 373.

Panzer Ent. germ. I. n. 8. p. 291.

Im ganzen Sommer hindurch auf verschiedenen Pflanzen, besonders auf Doldengewächsen, gemein.

Das ganze Käferchen ist schwarz, und überall mit feinen aschgrauen Härchen überzogen.

Tab. II. m. Maassstab der natürlichen Grösse.

D 3

24. *CUR-*

54

24. CURCULIO *futuralis.*

Tab. II. fig. 12.

C. longirostris ovatus fuscus: linea longitudinali alba. Fabric. Ent. Syft. T. I. P. II. n. 80. p. 412.

Panzer Ent. germ. I. n. 40. p. 306.

Ich fand ihn erst ein einzigesmal,
im April auf einer Weide.

Tab. II. n. Maassstab der natürlichen
Gröfse.

25. TENTHREDO *germanica.*

Tab. III. fig. 1.

T. antennis septemnodiis, corpore nigro, thorace antice abdomineque rufis. Fabric. Ent. Syft. T. II. n. 43. p. 116. Spec. Inf. I. n. 29. p. 412. Mant. Inf. I. n. 31. p. 254.

Linn. Syft. Nat. ed. XIII. n. 68. p. 2659.

Sehr selten. Ich habe ihn einmal
im May, bey Herspruck gehafcht.

26. SPHEX

26. SPHEX *maculata*.

Tab. III. fig. 2.

S. atra thorace albo maculato, abdominis segmento primo rufo, reliquis utrinque linea transversa alba. Fabric. Ent. Syft. T. II. n. 70. p. 215.

Ich fand diese *Grabwespe* erst ein einzigesmal hier um Nürnberg in einer sandigen Gegend.

Tab. III. a. Maassstab der natürlichen Grösse.

27. SCOLIA *quinquepunctata*.

Tab. III. fig. 3.

S. nigra abdomine medio rufo apice nigro: punctis quinque albis. Fabric. Ent. Syft. T. II. n. 27. p. 235. Spec. Inf. I. n. 14. p. 453. Mant. Inf. I. n. 18. p. 282.

Linn. Syft. Nat. ed. XIII. n. 18. p. 2737.

Diese *Drehwespe* ist gleichfalls in hiesiger Gegend selten, und ist mir bisher nur einmal zu Gesichtte gekommen.

Tab. III. b. Maassstab der natürlichen Grösse.

D 4 28. MEL-

56

28. MELLINUS *sabulosus.*

Tab. III. fig. 4.

M. ater nitidus abdomine fasciis tribus albidis: anticis interruptis, pedibus rufis. Fabric. Ent. Syst. P. II. n. 2. p. 286. Mant. Inf. I. n. 17. p. 296.
Crabro sabulosus.

Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 113. p. 2764.
Vespa sabulosa.

Ein in hiesiger Gegend seltenes Insect! Ich habe es noch nicht öfter als einmal finden können.

Tab. III. c. Maassstab der natürlichen Grösse. d. Der Kopf von vorne, vergrössert.

29. PHILANTUS *quinquecinctus.*

Tab. III. fig. 5.

P. niger thorace maculato, abdomine fasciis quinque flavis continuis, ano nigro. Fabric. Ent. Syst. T. II. n. 9. p. 291. Mant. Inf. I. n. 11. p. 295.
Crabro quinquecinctus.

Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 108. p. 2762.
Vespa cingulata.

In

In dem nassen Sommer 1795 traf ich diese Wespē in einem Steinbruch hinter Mögeldorf bey Nürnberg ziemlich häufig an.

Tab. III. e. Der Kopf von vorne, vergrössert.

30. PHILANTUS *laetus.*

Tab. III. fig. 6.

P. niger thorace maculato, abdominis primo segmento punctis duobus, reliquis fascia flavis. Fabric. Ent. Syst. T. II. n. 10. p. 291.

An gleicher Stelle, und in gleicher Menge mit dem vorhergehenden im erwähnten Sommer gehäuft. Er siehet dem *P. quinquecinctus* vollkommen ähnlich, nur ist er viel grösser, und durch andere Merkmale, die man in den beygefügten Abbildungen deutlich angezeigt findet, von jenem hinlänglich verschieden.

Tab. III. f. Ein wegen seines merkwürdigen Baues vergrösserter Vorderfuß.
g. Der letzte Einschnitt des Hinterleibs von oben. h. von unten, vergrössert vorgestellt.

31. CRABRO *labiatus.*

Tab. III. fig. 7.

C. thorace maculato, abdomine atro:fasciis quinque flavis; anticis quatuor interruptis, antennis rufis, labio cornuto. *Fabric. Ent. Syst. T. II. n. 11. p. 296.*

Ich haschte diese *Horneisse* an dem nehmlichen Ort mit den zwey vorhergehenden; sie ist aber viel seltener, als jene.

Tab. I' I. i. Stellt den Kopf in Profil, vergrössert, vor, damit man das kurze hervragende Horn über dem Munde deutlich sehen kann.

32. CRABRO *mucronatus.*

Tab. III. fig. 8.

C. sentello bidentato mucronatoque niger abdominis segmentis omnibus utrinque macula transversa flava. *Fabric. Ent. Syst. T. II. n. 25. p. 300.*

Dieses niedliche Geschöpf habe ich erst ein einzigesmal hier um Nürnberg, an einer Hecke gehascht.

Tab.

Tab. III. k. Maassstab der natürlichen Gröfse. l. Das Schildchen mit dem zu beyden Seiten befindlichen gelben Zahn, und dem darunter hervorragen- den rinnenartig ausgehöhlten schwar- zem Dolche, vergrößert.

33. ONISCUS *maculatus*.

Tab. IV. fig. 1.

O. cauda obtusa mutica, corpore plum-
beo: lineis punctatis albis. Fabric.
Ent. Syst. T. II. n. 1. p. 396. Spec.
Inf. I. n. 20. p. 378. Mant. Inf. I.
n. 21. p. 242.

Linn. Syst. Nat. ed. XIII. n. 23. p. 3012.

Herr Prof. *Fabricius* giebt a. a. O. Italien zum Wohnorte dieses Affels an. Ich fand ihn bey *Herspruck*, auf einem Berge unter modernden Pilzen.

Das ganze Insect ist bleyfahl, und über den Rücken laufen sieben aus bleichen Puncten bestehende Längslinien.

Tab IV. a. Ein einziger Einschnitt des Körpers vergrößert vorgestellt, damit man die Lage der sieben Puncte deutlich sehen kann. b. Ein vergrößertes Fühlhorn.

34. *CIMEX maurus.*

Tab. IV. fig. 2.

C. scutellaris cinereus scutelli basi punctis duobus albis. *Fabric. Ent. Syft. T. IV. n. 30. p. 87.* *Spec. inf. II. n. 20. p. 342.* *Mant. Inf. II. n. 23. p. 282..*

Linn. Syft. Nat. ed. XIII. n. 5. p. 2130.

Fn. suec. 913.

Scop. ent. carn. 352.

Fueffli inf. helv. n. 476. p. 25.

Sulzers Kennz. der Inf. tab. II. fig. d.

Diese Wanze ist bey uns nicht selten, auf verschiedenen Gewächsen. Sie ändert in Ansehung der Grösse und Farbe öfters ab.

35. *CIMEX perlatus.*

Tab. IV. fig. 3.

C. griseus capite nigro, scatello utrinque puncto albo. *Fabric. Ent. Syft. T. IV. n. 177. p. 125.*

Herr Dr. Panzer hat in der *Fauna Inf. germ.* im 33 Heft n. 24. eine Wanze abbilden lassen, die den *C. perlatus Fabric.* vorstellen sollte. Allein dass diese Wanze ganz anders aussehen muss, wenn sie

sie mit der *Fabricius'schen* Beschreibung übereinkommen soll, davon kann man sich leicht durch Vergleichung der Abbildung in der Fauna mit der hier gegebenen überzeugen. — Sie ist übrigens nicht gemein. Ich fieng sie manchmal schon im April auf verschiedenen Gewächsen.

Tab. IV. c. Maassstab der natürlichen Gröfse.

36. *COREUS scapha.*

Tab. IV. fig. 4

C. thorace obtuse spinoso, abdomine marginato acuto albo maculato, capite antice bispinoso. *Fabric.* Ent. Syst. T. IV. n. 2. p. 127.

Er sieht beynahe dem *C. marginatus* völlig gleich; ist aber überall schwarzbraun, nur auf der Unterseite etwas heller, und oben am Rande des Hinterleibs weisgefleckt. Das erste Gelenk der Fühlhörner ist grau, das zweyte ganz, und das dritte am Grunde Blutroth: an der Spitze aber, so wie das vierte schwarz. Der Kopf hat zu beyden Seiten vor den Fühlhörnern einen star-

starken, scharfen, weissen Dorn. Das Brustschild hat einen aufgeworfenen einwärtsgebogenen Rand, und ist hinterwärts etwas ausgerandet. Ich treffe diesen Coreus zuweilen, aber sehr selten, in Gesellschaft mit dem C. marginatus an.

Tab. IV. d. Der Kopf stark vergrößert, dass man die beschriebenen Dornen daran deutlich sehen kann. $\alpha. \alpha.$ Das erste Gelenk der Fühlhörner.

37. LYGAEUS *scriptus*.

Tab. IV. fig. 5.

L. ater thorace lineolis tribus albis, elytris albo lineatis apice rubris. *Fabric.* Ent. Syft. T. IV. n. 171. p. 182.

Diesen Lygaeus treffe ich in Wäl dern sehr Phäufig auf blühenden Ge wachsen, besonders auf Spartium sco parium an.

Tab. IV. e. Maafsstab der natürlichen Gröfse.

38. STRATIOOMYS *furcata*.

Tab. IV. fig. 6.

S. scutello bidentato nigro: margine flavo, abdomine atro: lateribus flavo maculatis. *Fabric.* Ent. Syft. T. IV. n. 5. p. 264.

Sie

Sie siehet der *S. chamaeleon* ähnlich, ist aber etwas kleiner, und hat drey weisse Striche auf der Unterseite des Hinterleibs. Ich habschte diese Waffenfliege erst ein einzigesmal im Walde an einer Föhre.

Tab. IV. f. Das Schildchen, vergrössert.

39. CERIA *clavicornis*.

Tab. IV. fig. 7.

Fabric. Ent. Syst. T. IV. n. 1. p. 277.

Diese in Hinsicht ihrer sonderbaren Fühlhörner, merkwürdige Fliege, fand ich ein einzigesmal in hiesiger Gegend, an einem Lindenstamm sitzend. Herr Prof. Fabricius hat a. a. O. eine ausführliche Beschreibung von ihr gegeben, welche ich nachzulesen bitte.

Tab. IV. g. habe ich den Kopf mit seinen merkwürdigen Fühlhörnern, von vornen, stark vergrössert, und b. die Fühlhörner allein, unter einer noch stärkern Vergrösserung, vorgestellt.

40. SYRPHUS *spinipes*.

Tab. IV. fig. 8.

S. antennis setariis tomentosus abdomine atro: lineolis albis, segmento primo rufo,

rufo, femoribus posticis dentatis. *Fabric.* Ent. Syft. T. IV. n. 66. p. 296.

Sehr selten. Ich habschte ihn ein einzigesmal auf einer Wiese um Nürnberg.

Tab. IV. i. Ein vergrössertes Fühlhorn.

k. Ein vergrösserter Hinterfuß, an welchem man den Zahn deutlich sehen kann.

41. *SYRPHUS elongatus.*

Tab. IV. fig. 9.

S. antennis setariis nudus thorace aeneo, abdomine clavato nigro: fasciis duabus flavis. *Fabric.* Ent. Syft. T. IV. n. 76. p. 299.

Selten. In Gärten, auf Wiesen.

Tab. IV. l. Maafsstab der natürlichen Grösse.

42. *SYRPHUS trifisi.*


Tab. IV. fig. 10.

S. antennis setariis nudiusculus thorace nigro pallido lineato, abdomine aeneo nitidulo. *Fabric.* Ent. Syft. T. IV. n. 92. p. 303.


Selten. In Gärten.

Tab. IV. m. Ein vergrössertes Fühlhorn.









ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Entomologie Gemischt](#)

Jahr/Year: 1796

Band/Volume: [0059](#)

Autor(en)/Author(s): Sturm Jacob [Jakob] H. C. F.

Artikel/Article: [Verzeichniss meiner Insecten-Sammlung 1-71](#)