

1777.

Z.D.



# Insecten Cabinet

Nach der Natur gezeichnet  
und gestochen  
von Jacob Sturm Junior.

1791.  
11tes Stück.

---

Zu finden in Nürnberg bey dem Verfasser.



Stück 2, 1791.

1.




*Scarabaeus porcatus.*



Z.D.

Stück 2, 1791

2



*Hister unicolor*.



Z.D.

Stück 2, 1791.

3



*Dermestes violaceus.*



Z.D.

Stück 2, 1791

4



*Anthrenus scrophulariae.*



Z.D.

Stuk 2, 1791

5



*Ptinus imperialis.*



Z.D.

Stück 2, 1791.

6



*Ptinus Scotias.*



Z.L.

Stück 2, 1791.

7




*Nicrophorus tessellatus.*



Z.D.

Stück 2, 1791.

8



*Silpha obscura.*



Z.D.

Stück 2, 1791.

9



*Opatrum sabulosum*.



Z.D

Stück 2, 1791.

10



*Cassida grossa.*



Z.D.

Szück 2, 1791.

11



*Cryptocephalus sericeus.*




Z.D.

Stück 2 1791.

12



*Chrysomela speciosa.*



Z.D.

Stück 2



(Canis pet. A. n. H. Sch.)  
Lan. molanus. Helopris (Musquittius; ennuig  
o, das bekanntlich z. ist größtes, amero gesammelt  
es fügt eröffnet. H. glaber. Bom.  
Vest. aemula (die abgab ilorten g. nur  
zu einem alle für natürliche Hörsicht nicht  
der betrifft, so finden und die Grünflasche  
das, in grünlich grau, bei des Bom.  
ist Miffung in die Tiefen zu holen in den  
aemula in der grünflaschen am Versteck  
9. 5 Jän. 1793.

Circulio Scr.


25.



Z.D.

© Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/>, www.biodat.at  
 Abbildungen der frisch auf einjähnem Blättern einzeln geprägten Insekten aus allen  
 Jahren sind durchgängig sehr gut ausgeprägt; nur teils zu mitleben. Die Formen nation  
 ist mit unten beschriebenen überein. Weitgehend ist *H. Planiceps* aus dem Natur  
 eingesetzt als ein wortlosliches Insektenmuster bekannt, z. B. das Formen an den Farben  
 rissung fürs z. Dr. zu verabfolgen seien diejenigen, die man auf die Ausbildung des Fleins.  
 istan, als auf die Färbung zu präparieren; wenn nicht und sobald es die Färbung nicht  
 so sein mag, darf die abgebildeten Formen vielfach zu frisch, oder zu reiblich  
 aussehen, in alten im ersten Falle ist es eigentlich möglich, färbt noch nicht reiferen  
 entzünden die Farbe von selbst aufgeht haben. — Jan 13 B. sind vom Scarab.  
 glindicus flügeldecken u. Fuß. braun verändert, so sie doch in das Naturfarben  
 sind. — *Melolontha variabilis* ist Melolontha brünnea. an Aetoria  
 Pictica werden die Farben u. das Metamorphosen vom St. De unter den Namen  
 Dermestes sciaricus abgebildete Raupen ist die *Pissum humeralis* Fabr. u. eine  
 vermeidet. — *Hister unicolor*. Vom <sup>luminosus</sup> Teil des Naturmagazins, abz. Heft 5 S. 12 istia  
 fürs vorzuhalten. — *Ptinus imperialis* ist ebenfalls *Ceratophorus* nicht *Ceratophorus*  
 albicus; sondern als die Abbildung.

Der Mr. Scarabaeus festivarius ist Formales exspect. In Natur sind abgebildet,  
 spätestens mit Natur oder sehr bedingt gegen den Voraus; weil es die Flügel nicht ein-  
 farbig gelblichgrün vorstellen, was doch tatsächlich gegen die Natur ist; dann das Röhrchen  
 hat gerade Flügeldecken mit runden rotlichen Flecken. Scarabaeus quisque pulchri-  
 tissimulus. *Merdarius* *Dermestes merdarius* (ist offenbar dieser Raupen, den das Natur-  
 ganz anders bezeichnet). *Circotrichus fabricii* ist *Circus*. *Circus* Fabr. *Circus* fabricii ist god.  
 Bes., ist auch noch gelbe Flecken u. Spindelfüße. *Scarabaeus pictus* (genau nicht diese  
 Raupen, die im Jahre kleinere ist. Diese sind leichter zu unterscheiden. *Metaphysius* ist *Metaphysius*.



Z.D.

Stück 2 1791.




13.

den *Cerabus leucophtalmus* abbilden wollen. *Helops quisquilius*, <sup>(canipes, p. nocht et al.)</sup> ein weißer mit der aufgerollten Füße, das bräunlich ist großes, amboß geformt, metallfarbig ist. *Helops quisquilius* (fößt ungefertig. Et. glaber. *Bombyx argentina*; *Bom. compressa*); *Noct. aemula* (die abgabildet an den Füßen, glasartiges Dach) *Nymphaea* ist eine schwere alle übernatürliche Höhle ist nicht mehr besessen zu haben, da es die große Bevölkerung, so finden und die Gründung einer neuen Feuerstelle wird es verlassen, in grünlichgrün, bei den *Bom. compressa* kommt. Von mir die Blätter dieser in die Tiefenwirken in den malerischen plattan, in bei den *Noct. aemula* in Kalksofferten am Westenrand d. d. Oberdorff. Alex. Lit. Zeit 7. 5 Jän. 1793.

E.D.

Curculio Scrophulariae.





Z.D.

Stuk 2 1791.

14



*Curculio imperialis.*



Z.D.

Scük 2 1991.

15



*Curculio albinus*.



Z.D.

Stück 2 1791.

16.



*Curculio Morio.*



Z.D.

Stück 2 1791.

17.



*Clerus formicarius.*



Z.D.

Szük 2 1791

18



*Notoxus mollis.*



Z.D.

Stück 2, 1791.

19



*Notoxus monoceros*.



Z-D.

Stuk 21791

20



*Cerambyx alpinus.*



Z.D.

Stück 2 1791.

21.



*Saperda praeysta*.




Z.D.

Stück 2 1791.

22



*Lampyris corusca.*



Z.D.

Stuk 2 1791.

23.



*Elater thoracicus.*




Z.D.

Stück 21791

24



*Forficula minor.*



Z.D.

Stuk 2, 1991.

25



*Cimex lectularius.*



Z-D<sub>s</sub>





# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Entomologie Gemischt](#)

Jahr/Year: 1791

Band/Volume: [0067](#)

Autor(en)/Author(s): Sturm Jacob [Jakob] H. C. F.

Artikel/Article: [Insecten Cabinet. Nach der Natur gezeichnet und gestochen - II-tes Stük 1-58](#)