




ED. ANDRE
BEAUNE

Biodiversity Heritage Library, <http://www.biodiversitylibrary.org/>; www.zobodat.at

111-463 col 1

25



Carl J. Drake

111-463 col 1

1925

Carl J. Drake -

291

//

{

IOANNIS ANTONII SCOPOLI

MED. DOCT. S. C. R. ET APOST. MAIEST. MONTANÆ
CIVITATIS IDRIÆ PHYSICI

ENTOMOLOGIA

CARNIOLICA

EXHIBENS

INSECTA

CARNIOLIÆ INDIGENA

E T

DISTRIBUTA IN ORDINES, GENERA,

SPECIES, VARIETATES.


METHODO LINNÆANA.



VINDOBONAE,

TYPIS IO'ANNIS THOMAE TRATTNER,
CAES. REG. AVLAE TYPOGR. ET BIBLIOP.

MDCCLXIII.



PRAEFATIO.



*E*n observationes aliquas circa Insecta, in Ducatu Carnioliae, ab Anno 1759 ad 1762 a me primo collecta. Ex his patebit, qualiter nostra differant ab illis, quæ alibi detecta descriptaque fuerunt, quasque notas constantes in meis speciebus invenerim, ut genuini earum characteres ita sensim innotescant; raro enim perfecta

P R A E F A T I O.

*est differentia illa specifica, quæ ab unio
aliove specimine in Musæo viso, aut ab
.Amicis communicato desummitur, cum
idem in aliis regionibus alio modo se
habeat; unde insuperabiles difficulta-
tes in determinandis speciebus offend-
dunt illi, qui ex imperfectis illis de-
scriptionibus Insecta distinguere &
adgnoscere cupiunt. Et sane nihil ad
Historiæ Naturalis incrementum ma-
gis proficere posse putarem, quam, si
plures homines, in qualibet regione,
naturalia omnia sedulo describerent,
*posterioris characteres specificos statuen-
di jure relieto, quibus ignotis, nulla de*
*Generibus, imo neque de Classibus cer-
titudo; cum omnis vera cognitio, co-*
gnitioni specierum innitatur. LINN.*

Or-

P R A E F A T I O.

Ordines & Genera a Celeberr.

LINNÆO stabilita secutus sum, reformatis tamen characteribus, fixisque limitibus, quibus unum ab alio certius distingui possit. Ad hæc me nullus contradicendi pruritus, aut novitatis ardor impulit, sed ipsa rerum Natura, ad quam, notarum claritate & distinctione specierum, facilior aditus parari debet.

Nomina trivialia rebus a LINNÆO data retinui; differentias vero mutavi, quoties dubias notas pro certis assumptas, & in earum nomino-descriptionibus collocatas deprehendi; characterem enim specificum constituere debent certæ, nullisque Naturæ viribus mutabiles notæ, cæque solæ adsum-

*mendæ, quæcumque demum fuerint,
ut firmo tandem stet talo scientia.*

*Rariores novasque species animalium, quas delineare non licuit, breviter ecquidem, sed accurate descripsi, additis partium præcipuarum mensuris ex parisino pede petitis, ut propria-
tio partium inde pateat, quæ constan-
tissima semper, & aliis omnibus notis
perpetuo anteponenda. Utinam cu-
jusque speciei naturam, proprietates,
metamorphosēs, pabulum etiam adde-
re licuisset! Cum vero ejusmodi obser-
vationes secessum idoneum requirant
& otium, quod concrediti mibi mune-
ris ratio negat, ita paucas metamorpho-
ses, neque eas semper debita attentio-
ne, rimatussum; sic enim constitutum*

et

P R A E F A T I O.

est Genus humanum, ut plerisque scientias augendi voluntas, quibusdam vero occasio desit, nec semper tractare queat fabrilia faber.

Amavi ego a teneris annis studium Naturæ; peragravi plurimas alpes; deffudavi; cucurri; Carnioliae plantas, animalia, lapides primus investigavi; sed aliis laboribus panem quærere coetus, & absque ullo munificentiae lumine in tenebris cespitanus, impegi saepius, non malitia voluntatis, sed defetitu præsidiorum. Imprimis vero ad stirpes me mira vi traxit innocens voluptas, quarum gratia studium quoque Entomologicum bisce annis diligentius excolui, cum vix ullum folium vigeat, quod non arrodat aliqua larva, quot-

P R A E F A T I O.

*annis, ita constanter, ut Insectorum
observatio, sit altera via ducens Phi-
lobotanum ad cognitionem generum,
specierum, earumque adfinitatum.
Sphinx stellatarum Galii genus natu-
rale demonstrat; papilio Cratægi,
bujus cum Bruno adfinitatem indicat;
Papilio Napi, Chrysomela Brassicæ,
hoc idem Genus ostendit. En Lepi-
dopteris ovum, larvam, pupam, animal,
exutis involucris, ut in Plantis cotyle-
dones, herbam, florem, semen, conti-
nuata explicatione; en alarum debili-
tatem adjuvans elytrum, ut calyx pe-
tala fulciens; en denique Insecta, ala-
rum remigio ab uno loco ad alium vo-
litantia, ut semina plantarum per in-
undationes, commercia, intra viscera
ani-*

P R A E F A T I O.


animalium, pappo proprio, translata; sic enim in theatro Naturæ cuncta cohærent, ut veram voluptatem ex eo nemo percipiat, nisi qui omnia ab initio ad finem usque conspexerit.

Porro voluptas, quæ ex rerum naturalium contemplatione dimanat, perpetuo quoque summæ utilitatis satellitio stipata est, cum inde nobis omnia vitae subsidia oriantur. Quis Generi Humano noxia & utilia? quis alimenta, medicamenta, venena? quis Cannabis, Lini, Bombycis usum detexit? quam Naturæ curiosi. Cui naturam lapidum, metallorum, architecturam civilem & bellicam, commercia, navigationes debemus? quam scientiae Naturali, ut mirum sane, dari etiamnum

P R A E F A T I O.

*aliquos, qui sedulos Naturæ cultores
flocci facere & deridere non erubescunt,
Momi vecordes, ipsique plurimo risu
dignissimi. Nosse Naturam operæ
premium est, quo nullum majus LINN.
in introitu ad Syst. Nat.*

*Hæc ergo qualiacumque, sive sper-
nant ignari, sive suffocent malevoli, si-
ve invidæ arrodere conentur tineæ,
Historiæ tamen Naturalis incremento
dicata, ut benevole excipiatis obsecro,
Viri docti, & si quid auribus vestris mi-
nus dignum inveneritis memores es-
te semper; me, Naturæ theatrum,
non studii, sed animi causa colere, ad
lenienda nimirum tristissimæ vitæ fa-
stidia.*



INDEX

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

ORD. I. COLEOPTERA.
Alæ anticæ coriaceæ.
Lucanus. Antennæ denti-
culis transversis unila-
teralibus terminatæ.

 1. *Cervus.*

 2. *Caraboides.*
Scarabæus. Antennæ la-
mellis mobilibus termi-
natæ.

 3. *Solstitialis.*

 4. *Dubius.*

 5. *Fasciatus.*

 6. *Cyathiger.*

 7. *Funestus.*

 8. *Hirtus.*

 9. *Argenteus.*

 10. *Adiaphorus.*

 11. *Sylvestris.*

 12. *Fullo.*

 13. *Squallidus.*

 14. *Nasicornis.*

 15. *Eremita.*

 16. *Melolontha.*

 17. *Auratus.*

 18. *Nobilis.*

 19. *Oblongus.*

 20. *Fimetarius.*

 21. *Alpinus.*

 22. *Lunaris.*

 23. *Rugosus.*

 24. *Longipes.*

 25. *Illyricus.*

 26. *Stercorarius.*

 27. *Vernalis.*

 28. *Variegatus.*

 29. *Minimus.*
Hister. Antennæ capitu-
lo indiviso clavatæ.

 30. *Unicolor.*

 31. *Fimetarius.*

 32. *Apterus.*
Dermestes. Antennæ no-
dis tribus clavatæ.

 33. *Vespillo.*

 34. *Lardarius.*

 35. *Murinus.*

 36. *Scaraboides.*

 37. *Pellio.*

 38. *Carbonarius.*

 39. *Rosæ.*

 40. *Sambucci.*

 41. *Variegatus.*

| | | | |
|--|--------------|------|----------------|
| 42. | Cellaris. | 73. | Fagi. |
| 43. | Agaricinus. | 74. | Populi. |
| 44. | Boleti. | 75. | Pulverulentus. |
| 45. | Brassicæ. | 76. | Centaureæ. |
| 46. | Ciliatus. | 77. | Auratus. |
| 47. | Lepturoides. | 78. | Violaceus. |
| 48. | Lycoperdi. | 79. | Carbonarius. |
| 49. | Calthæ. | 80. | Tuberculosus. |
| 50. | Cærulescens. | 81. | Cariosus. |
| 51. | Violaceus. | 82. | Syngenesiæ. |
| 52. | Plicatus. | 83. | Urticæ. |
| <i>Silpha.</i> Antennæ subclavatae. Thorax clypeatus. Fulcrum femorale. | | 84. | Cerafi. |
| 53. | Rugosa. | 85. | Icosandriæ. |
| 54. | Thoracica. | 86. | Purpureus. |
| 55. | Littoralis. | 87. | Cærulescens. |
| 56. | Atrata. | 88. | Oleraceus. |
| 57. | Obscura. | 89. | Granarius. |
| 58. | Sabulosa. | 90. | Gemmatus. |
| 59. | Scabra. | 91. | Argentatus. |
| 60. | Ferruginea. | 92. | Anthracinus. |
| <i>Laria.</i> Antennæ subclavatae. Thorax pulvinatus. Femora non fulcrata. | | 93. | Tristis. |
| 61. | Hyoferis. | 94. | Infidus, |
| 62. | Dulcamaraæ. | 95. | Pruni. |
| 63. | Salicis. | 96. | Cœlestinus. |
| 64. | Sileris. | 97. | Glaucus. |
| <i>Curculio.</i> Proboscis cornæ, antennifera. | | 98. | Rufipes. |
| 65. | Piger. | 99. | C. album. |
| 66. | Albinus. | 100. | Sensitivus. |
| 67. | Resinosus. | 101. | Nemoreus. |
| 68. | Iners. | 102. | Momus. |
| 69. | Piceus. | 103. | Zoilus. |
| 70. | Erraticus. | 104. | Palustris. |
| 71. | Collaris. | 105. | Nucum. |
| 72. | Nitens. | 106. | Quercus. |
| | | 107. | Punctatus. |
| | | 108. | Fasciatus. |
| | | 109. | Præcox. |
| <i>Attelabus.</i> Caput pone attenuatum, thoracis crassitie. | | 110. | Apiarius. |
| | | 111. | Formicarius. |
| | | 112. | Lilii. |

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

113. Asparagi.
 114. Quinquepunctatus.
 115. Duodecimpunctatus
 116. Quatuordecim punctatus.
Cassida. Caput thoracis clypeo tectum.
 117. Viridis.
 118. Noctiluca.
 119. Sanguinea.
Cantharis. Caput prostans. Elytrum molle non truncatum.
 120. Fusca.
 121. Obscura.
 122. Livida.
 123. Testacea.
 124. Fulva.
 125. Caudata.
 126. Ænea.
 127. Bipustulata.
 128. Minima.
 129. Fasciata.
 130. Marginata.
 131. Pilosa.
 132. Squallida.
 133. Flava.
 134. Fraxinea.
 135. Serraticornis.
 136. Cærulea.
 137. Spadicea.
 138. Fulvicollis.
 139. Rufiventris.
 140. Ustulata
 141. Tenebricosa.
 142. Sericea.
 143. Parva.
 144. Phtysica.
 145. Femorata.
 146. Nobilis.
Leptura. Thorax subrotundus atterens absque sono. Antennæ subfasciæ.
 147. Aquatica.
 148. Rubra.
 149. Melanura.
 150. Sanguinolenta.
 151. Dubia.
 152. Oculata.
 153. Parallelæ.
 154. Quadrimaculata.
 155. Ruficrus.
 156. Bajula.
 157. Cylindrica.
 158. Cantharoides.
 159. Collaris.
 160. Cærulescens.
Cerambyx. Thorax attritus stridens. Antennæ attenuatae.
 161. Coriarius.
 162. Cerdo.
 163. Heros.
 164. Textor.
 165. Moschatus.
 166. Alpinus,
 167. Cursor.
 168. Arenarius.
 169. Æthiops.
 170. Fulvus.
 171. Timidus.
 172. Fasciatus.
 173. Nebulosus.
 174. Scabricornis.
 175. Scalaris.
 176. Figuratus.
 177. Quadricolor.
 178. Carbonarius.
Necydalis. Antennæ Cerambycinæ. Elytra di-midiata.
 179. Minor.
 180. Minima.
Cicindella. Maxillæ & oculari prominentes. Thorax capite tenuior. Lamella femoralis obtusa.

I N D E X

| | | |
|------|--|--|
| 181. | Campestris. | <i>Chrysomela.</i> Antennæ thorace longiores. Caput porrectum, nec adeo crassum. |
| 182. | Germanica. | |
| 183. | Hybrida. | |
| | <i>Meloë.</i> Caput inflexum. Thorax subrotundus. Elytra flexilia. | |
| 184. | Proscarabæus. | 211. Alni. |
| 185. | Vesicatorius. | 212. Oleracea. |
| 186. | Cinnaberinus. | 213. Chrysocephala. |
| | <i>Mordella.</i> Lamella lata femora tegens aut fulciens. | 214. Rufipes. |
| 187. | Gigantea. | 215. Nemorum. |
| 188. | Rustica. | 216. Ferruginea. |
| 189. | Serraticornis. | 217. Atricilla. |
| 190. | Rosacea. | 218. Truncata. |
| 191. | Cuprea. | 219. Lurida. |
| 192. | Aculeata. | |
| | <i>Buprestis.</i> Caput deflexum. Thorax pulvinateus. Abdomen obtusum. | <i>Coccinella.</i> Antennæ thorace vix longiores, dilatatae. Caput porrectum. |
| 193. | Syngenesiæ. | 220. Graminis. |
| 194. | Specularis. | 221. Betulæ. |
| 195. | Aquatica. | 222. Vulgatissima. |
| 196. | Umbellatarum. | 223. Riparia. |
| 197. | Miliaris. | 224. Vitellinæ. |
| 198. | Chrysocollis. | 225. Hæmorrhoidalis. |
| 199. | Salicina. | 226. Erratica. |
| 200. | Cærulescens. | 227. Rufipes. |
| 201. | Biguttata. | 228 Populi. |
| 202. | Moræi. | 229 Polita. |
| 203. | Sanguinolenta. | 230. Liturata. |
| 204. | Lunata. | 231. Speciosissima. |
| 205. | Unifasciata. | 232. Fastuosa. |
| 206. | Quadripunctata. | 233. Signata. |
| 207. | Quinquepunctata. | 234. Bipunctata. |
| 208. | Sexpunctata. | 235. Septempunctata. |
| 209. | Octopunctata. | 236. Novempunctata. |
| 210. | Fur. | 237. Decempunctata. |
| | | 238. Tredecimpunctata. |
| | | 239. Vigintiquatuorpunctata. |
| | | 240. Sedecimpunctata. |
| | | 241. Octodecimpunctata. |
| | | 242. Vigintipunctata. |
| | | 243. Tesselata. |

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIUM.

244. Quadripustulata.
 245. Sexpustulata.
 246. Quatuordecimpustulata.
 247. Fasciata.
 248. Quatuordecimguttata.
 249. Sexdecimguttata.
 250. Quadrimaculata.
 251. Decenmaculata.
Tenebrio. Antennæ moniliformes thorace longiores. Caput porrectum. Thorax marginatus planiusculus.
 252. Mortisagus.
 253. Ventricofus.
 254. Buprestoides.
 255. Æneus.
 256. Tristis.
 257. Pomona.
 258. Capreae.
 259. Molitor.
 260. Flavus.
 261. Boleti.
Carabus. Corpus agile. Caput longum. Lamina magna femoralis.
 262. Nitens.
 263. Granulatus.
 264. Catenulatus.
 265. Coriaceus.
 266. Leucophthalmus.
 267. Spinipes.
 268. Vulgaris.
 269. Elegans.
 270. Metallicus.
 271. Cordatus.
 272. Junceus.
 273. Germanus.
 274. Bimaculatus.
 275. Marginatus.
 276. Salicinus.
 277. Arenarius.
Elater. Sterni mucro e foramine abdominis refiliens.
 278. Pectinicornis.
 279. Nitens.
 280. Serricornis.
 281. Fasciatus.
 282. Thoracicus.
 283. Montanus.
 284. Obscurus.
 285. Sputator.
 286. Castaneus.
 287. Sanguineus.
 288. Adyena.
 289. Istriacus.
 290. Gramineus.
 291. Ferrugineus.
 292. Degener.
Dytiscus. Gens aquatica, segnis. Pedes postici ciliato-natatorii.
 293. Piceus.
 294. Marginalis.
 295. Punctatus.
 296. Uliginosus.
 297. Minimus.
 298. Rufus.
 299. Natator.
Staphylinus. Antennæ moniliformes. Elytra dimidiata, alas tegentia. Cauda inermis.
 300. Ophthalmicus.
 301. Fulvipes.
 302. Murinus.
 303. Clavicornis.
 304. Politus.
 305. Boleti.
 306. Eryopterus.

I N D E X.

307. *Rufus.* 331. *Spumaria.*
 308. *Gregarius.* 332. *Arunci.*
 309. *Brassicæ.* 333. *Marginalis.*
 310. *Arnicæ.* 334. *Bicordata.*
 311. *Hellebori.* 335. *Violacea.*
Forficula. Antennæ setaceæ. Elytra dimidiata, alas tegentia. Cauda forcipe armata. 336. *Oenotheræ.*
 312. *Auricularia.* 337. *Lineata.*
Blata. Thorax planiusculus marginatus. Cornicula duo supra caudam. 338. *Viridis.*
 313. *Orientalis.* 339. *Bipunctata.*
 314. *Sylvestris.* 340. *Cornuta.*
Gryllus. Caput nutans. Alæ plicatæ. Elytra flexilia. 341. *Nervosa.*
 315. *Religiosus.* 342. *Marginata.*
 316. *Bipunctatus.* 343. *Ocellata.*
 317. *Gryllotalpa.* 344. *Notata.*
 318. *Domesticus.* 345. *Plebeja.*
 319. *Campestris.* 346. *Orni.*
 320. *Viridissimus.* 347. *Hæmatodes.*
 321. *Verrucivorus.* *Notonecta.* Gens aquatica natans in dorso, pedibus posticis ciliatis.
 322. *Falcatus.* 348. *Glaуca.*
 323. *Migratorius.* 349. *Striata.*
 324. *Pellucens.* *Nepa.* Pedes antici cheliformes. Corpus depresso.
 325. *Cærulescens.* 350. *Cinerea.*
 326. *Stridulus.* *Cimex.* Gens terrestris, cursoria, plerumque fœtens. Antennæ thorace longiores.
 327. *Italicus.* 351. *Lineatus.*
 328. *Lunulatus.* 352. *Maurus.*
 329. *Rufus.* 353. *Exanthematicus.*
ORD. II. PROBOSCIIDEA. 354. *Lectularius.*
 Os proboscide inflexa. 355. *Dubius.*
Cicada. Antennæ thorace breviores. Alæ (4) membranaceæ. Gens stridula, terrestris. 356. *Biguttatus.*
 330. *Sanguinolenta.* 357. *Bicolor.*
 358. *Æneus.*
 359. *Juniperinus.*
 360. *Baccarum.*
 361. *Ornatus.*

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

362. Dominulus.
 363. Marginatus.
 364. Abietis.
 365. Denticulatus.
 366. Agilis.
 367. Rugosus.
 368. Pandurus.
 369. Speciosus.
 370. Apterus.
 371. Saxatilis.
 372. Tuberculosus.
 373. Nervosus.
 374. Maritimus.
 375. Alpinus.
 376. Collinus.
 377. Ferrugineus.
 378. Iracundus.
 379. Personatus.
 380. Hybridus.
 381. Gothicus.
 382. Meriopterus.
 383. Äquinoctialis.
 384. Pabulinus.
 385. Umbellatarum.
 386. Pratenis.
 387. Striatus.
 388. Fulvipes.
 389. Genistæ.
 390. Flavipes.
 391. Junceus.
 392. Riparius.
 393. Testaceus.
 394. Lacustris.
 395. Stagnorum.

Aphis. Antennæ thorace longiores. Alæ erectæ. Abdomen pone bicorne.
 396. Viburni.
 397. Aceris.
 398. Vitis.
 399. Ägopodii.
 400. Archangelicæ.

 401. Abiyuthii.
 402. Cirfii.
 403. Jaceæ.
 404. Leucanthemi.
 405. Scabiosæ.
 406. Pruni.
 407. Craccæ.
 408. Fabæ.
 409. Genistæ.
 410. Urticæ.

Chermes. Alæ deflexæ. Pedes saltatorii. Larva lanata.
 411. Evonymi.
 412. Cratægi.
 413. Senecionis.
 414. Pruni.
 415. Fraxini.
 416. Pyri.
 417. Alni.

Thryps. Alæ angustæ incumbentes. Corpus tenui flexili ab domine saltitans.
 418. Physapus.

ORD. III. LEPIDOPTERA.
 Corpus pilosum. Alæ squamulis coloratis testæ.

Papilio. Antennæ clavatae. Alæ erectæ. Pupa exposita, nuda.
 419. Antiopa.
 420. Polychloros.
 421. Urticæ.
 422. C. album.
 423. Jo.
 424. Atalanta.
 425. Hypermnestra.
 426. Cardui.
 427. Galathea.

I N D E X

| | | | |
|------|--|----------|------------------------|
| 428. | Fagi. | 467. | Tiliæ. |
| 429. | Dryas. | 468. | Convolvuli. |
| 430. | Iris. | 469. | Atropos. |
| 431. | Mæra. | 470. | Ligutri. |
| 432. | Ægeria. | 471. | Euphorbiæ. |
| 433. | Achinæ. | 472. | Elpenor. |
| 434. | Polymeda. | 473. | Pinastræ. |
| 435. | Jurtina. | 474. | Stellatarum. |
| 436. | Ligea. | 475. | Fuciformis. |
| 437. | Cinxia. | 476. | Culiciformis. |
| 438. | Paphia. | 477. | Scopigera. |
| 439. | Aglaia. | 478. | Carniolica. |
| 440. | Lathonia. | 479. | Filipendulæ. |
| 441. | Euphrosyne. | 480. | Phegea. |
| 442. | Prorsa. | 481. | Statices. |
| 443. | Rivularis. | | |
| 444. | Machaon. | Phalæna. | Antennæ extror- |
| 445. | Podalirius. | | fumi sensim attenuatæ. |
| 446. | Macaronius. | | |
| 447. | Apollo. | 482. | Pavonia. |
| 448. | Cratægi. | 483. | Pavoniella. |
| 449. | Mnemosyne. | 484. | Tau. |
| 450. | Brassicæ. | 485. | Quercifolia. |
| 451. | Rapæ. | 486. | Mori. |
| 452. | Sinapis. | 487. | Quercus. |
| 453. | Napi. | 488. | Vinula. |
| 454. | Cardamines. | 489. | Pudibunda. |
| 455. | Hyale. | 490. | Monacha. |
| 456. | Rhamni. | 491. | Dispar. |
| 457. | Amyntas. | 492. | Rubi. |
| 458. | Menalcas. | 493. | Chrysorrhæa. |
| 459. | Pruni. | 494. | Prælata. |
| 460. | Rubi. | 495. | Salicis. |
| 461. | Argus. | 496. | Antiqua. |
| 462. | Virgaureæ. | 497. | Genostigma. |
| 463. | Comma? | 498. | Pyri. |
| 464. | Morio. | 499. | Lanestræs. |
| | | 500. | Cossus. |
| | | 501. | Eremita. |
| | <i>Sphinx.</i> Antennæ medio crassiores, subprisina- ticæ. | 502. | Anostomosis? |
| | | 503. | Caia. |
| 465. | Ocellata. | 504. | Villica. |
| 466. | Populi. | 505. | Plantaginis. |
| | | 506. | Dominula. |

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

| | |
|---------------------|--------------------|
| 507. Alpicola. | 551. Chlorotata. |
| 508. Fuliginosa. | 552. Mucronata. |
| 509. Paeta. | 553. Variegata. |
| 510. Fulminea. | 554. Verberata. |
| 511. Jacobæa. | 555. Undulata. |
| 512. Meticulosa. | 556. Cratægata. |
| 513. Lubricipeda. | 557. Maculata. |
| 514. Pulchella. | 558. Ifoscellata. |
| 515. Bucephala. | 559. Contaminata. |
| 516. Libatrix. | 560. Mensurata. |
| 517. Chrysitis. | 561. Moeniana. |
| 518. Pronuba. | 562. Cruentata. |
| 519. Guadra. | 563. Laccata. |
| 520. Sannio. | 564. Ornata. |
| 521. Verbasci. | 565. Aurata. |
| 522. Brassicæ. | 566. Bilineata. |
| 523. Gamma. | 567. Ochrata. |
| 524. Aceris. | 568. Limitata. |
| 525. Rubiginosa. | 569. pennata. |
| 526. Clavipalpis. | 570. Spatacea. |
| 527. Deceptoria. | 571. Alpinata. |
| 528. Amataria. | 572. Murinata. |
| 529. Lactearia. | 573. Rivulata. |
| 530. Viridata. | 574. Litterata. |
| 531. Repandata? | 575. Lævigata. |
| 532. Nebulata. | 576. Inquinata. |
| 533. Corticalis. | 577. Tenebrata. |
| 534. Cervinalis. | 578. Signata. |
| 535. Fimbrialis. | 579. Despicata. |
| 536. Retialis. | 580. Nigrata. |
| 537. Punctinalis. | 581. Æthiopiata. |
| 538. Fenestrella. | 582. Obscurata. |
| 539. Niveata. | 583. Podana. |
| 540. Lineata. | 584. Bergmanniana. |
| 541. Strigata. | 585. Rubiana. |
| 542. Exanthemata. | 586. Fasciana. |
| 543. Punctata. | 587. Solandriana. |
| 544. Grossulariata. | 588. Cervana. |
| 545. Ornata. | 589. Lambergiana. |
| 546. Sylvata. | 590. Wulfeniana. |
| 547. Urticata. | 591. Rufana. |
| 548. Staphyllæata. | 592. Plumbana. |
| 549. Glaucata. | 593. Rusticana. |
| 550. Fasciata. | 594. Miscellana. |

I N D E X

| | | | |
|------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 595. | Montana. | 639. | Flavella. |
| 596. | Cana. | 640. | Gemmatarella. |
| 597. | Pedana. | 641. | Ecclypsella. |
| 598. | Umbriana. | 642. | Bicostella. |
| 599. | Formosana. | 643. | Mucronella. |
| 600. | Rivulana. | 644. | Scabiosella. |
| 601. | Gramineana. | 645. | Viridella. |
| 602. | Capillicina. | 646. | Barbatella. |
| 603. | Osleana. | 647. | Degeerella. |
| 604. | Pyraliana. | 648. | Crœfella. |
| 605. | Barbalis. | 649. | Rufimitrella. |
| 606. | Proboscidalis. | 650. | Hemerobiella. |
| 607. | Anthracinalis. | 651. | Vorticella. |
| 608. | Farinalis. | 652. | Obscurella. |
| 609. | Citrinalis. | 653. | Fenestrelia. |
| 610. | Trabealis. | 654. | Scallella. |
| 611. | Cristalis. | 655. | Punctella. |
| 612. | Lunalis. | 656. | Comella. |
| 613. | Viminalis. | 657. | Pusiella. |
| 614. | Extimalis. | 658. | Trafonella. |
| 615. | Sericalis. | 659. | Equitella. |
| 616. | Ruralis. | 660. | Aruncella. |
| 617. | Trivialis. | 661. | Alchimiella. |
| 618. | Nemoralis. | 662. | Auratella. |
| 619. | Maialis. | 663. | Æneella. |
| 620. | Perlella. | 664. | Leucocerella. |
| 621. | Pascuella. | 665. | Luridella. |
| 622. | Pinetella. | 666. | Zoologella. |
| 623. | Semirubella. | 667. | Rufella. |
| 624. | Rosella. | 668. | Murinella. |
| 625. | Viduella. | 669. | Vestianella. |
| 626. | Fuscella. | 670. | Arbustella. |
| 627. | Craterella. | 671. | Domesticella. |
| 628. | Chrysonuchella. | 672. | Didactyla. |
| 629. | Virginella. | 673. | Bipunctidactyla. |
| 630. | Culmella. | 674. | Ptero-Dactyla. |
| 631. | Evonymella. | 675. | Tridactyla. |
| 632. | Sadella. | 676. | Hexadactyla. |
| 633. | Cornutella. | | |
| 634. | Nisella. | ORD. IV. NEUROPTE- | |
| 635. | Marginella. | R.A. Alæ (4). Acu- | |
| 636. | Paliatella. | leus nullus. | |
| 637. | Cervinella. | Libellula. Appendices cau- | |
| 638. | Forficella. | dales foliaceæ. | |

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

| | |
|---|--|
| 677. Grandis. | 706. Fulvicephalus. |
| 678. Depressa. | 707. Flavus. |
| 679. Quadrimaculata. | 708. Chrysops. |
| 680. Vulgata. | 709. Perla. |
| 681. Virgo. | |
| 682. Puella. | <i>Panorpa</i> . Alæ planæ. Cauda uni sexui forcipata. |
| <i>Ephemera</i> . Alæ (4) eretæ: postice minimæ. | 710. Communis. |
| Volatus gravis. Vita brevis. | <i>Raphidia</i> . Collum longum. Antennæ breves. |
| 683. Vulgata. | 711. Ophiopsis. |
| 684. Gemmata. | 712. Mantispa. |
| 685. Albipes. | |
| 686. culiciformis? | ORD. V. ACULEATA. |
| 687. Parvula. | Alæ (4). Abdomen uni sexui aculeo armatum. |
| <i>Phryganea</i> . Antennæ longæ. Alæ posticæ pli-catæ. | <i>Cynips</i> Aculeus reconditus, spiralis? Larva intra Gallam. |
| 688. Striata. | 713. Rosæ. |
| 689. Albicornis. | 714. Hieracii. |
| 690. Ruficrus. | 715. Glechomæ. |
| 691. Ferruginea. | 716. Quercus pet. |
| 692. Eimaculata. | 717. Quercus tol. |
| 693. Variegata. | 718. Salicis strobili. |
| 694. Tineoides. | |
| 695. Offulcata. | <i>Tentredo</i> . Aculeus reconditus, cultriformis, serratus, simplex et duplex. |
| 696. Fuliginosa. | 719. Lutea. |
| 697. Testacea. | 720. Amerina. |
| 698. Pyralina. | 721. Nitens. |
| 699. Dubia. | 722. Rosæ. |
| 700. Pectinicornis. | 723. Melomela. |
| 701. Martia. | 724. Montana. |
| 702. Regelationis. | 725. Temula. |
| 703. Grammatica. | |
| 704. Tripunctata. | |
| 705. Maxima. | |
| <i>Hemerobius</i> . Alæ planæ, debiles, (4). | |

I N D E X

| | | | |
|------|---|------|--|
| 726. | Cingulata. | 766. | Globatus. |
| 727. | Fasciata. | 767. | Glomeratus. |
| 728. | Fulvipes. | | <i>Sphex.</i> Aculeus reconditus. Os muticum. Alæ planæ. |
| 729. | Atra. | | |
| 730. | Crassa. | | |
| 731. | Flava. | | |
| 732. | Signata. | 768. | Truncata. |
| 733. | Carbonaria. | 769. | Crafficornis. |
| 734. | Ribesii. | 770. | Sabulosa. |
| 735. | Cerafi. | 771. | Fuliginosa. |
| 736. | Fulviventris. | 772. | Hirsuta. |
| 737. | Impura. | 773. | Cincta. |
| 738. | Solitaria. | 774. | Æquinoctialis. |
| | <i>Ichneumon. Aculeus exserratus: vagina bivalvi.</i> | 775. | Profuga. |
| 739. | Gigas. | 776. | Furcata. |
| 740. | Spectrum. | 777. | Gregaria. |
| 741. | Juvencus. | 778. | Coarctata. |
| 742. | Camelus. | 779. | Anthracina. |
| 743. | Usurpator. | 780. | Viatica. |
| 744. | Gladiator. | 781. | Apiaria. |
| 745. | Incubitor. | 782. | Carbonaria. |
| 746. | Deceptor. | 783. | Versicolor. |
| 747. | Viator. | 784. | Nigerrima. |
| 748. | Excitator. | 785. | Vaga. |
| 749. | Terebrator. | 786. | Gibba. |
| 750. | Visitator. | 787. | Bilocularis. |
| 751. | Manifestator. | 788. | Abietina. |
| 752. | Cunctator. | 789. | Vespoides. |
| 753. | Speculator. | 790. | Tentredoides. |
| 754. | Inquisitor. | 791. | Ignita. |
| 755. | Vinulæ. | 792. | Nobilis. |
| 756. | Affectator. | 793. | Violacea. |
| 757. | Victor. | | <i>Apis. Os rostro deflexo, bivalvi.</i> |
| 758. | Impostor. | 794. | Longicornis. |
| 759. | Vagator. | 795. | Sordida. |
| 760. | Cannabis. | 796. | Florisomnis. |
| 761. | Tipulæ. | 797. | Atra. |
| 762. | Pavoniæ. | 798. | Globosa. |
| 763. | Pectinicornis. | 799. | Centuncularis. |
| 764. | Graminum. | 800. | Farfariæqua. |
| 765. | Antiopæ. | | |

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

- | | |
|--|--|
| 801. Sabulosa. | 836. Rufa. |
| 802. Riparia. | 837. Cespitosum. |
| 803. Calcarata. | <i>Mutilla.</i> Alæ nullæ. |
| 804. Præcox. | |
| 805. Calceata. | |
| 806. Montana. | 838. Saltatrix. |
| 807. Fulviventris. | |
| 808. Vespidiformis. | ORD. VI. HALTERATA. |
| 809. Ænea. | <i>Clavula</i> sub singulis alis. |
| 810. Fusca. | |
| 811. Mellifica. | |
| 812. Violacea. | <i>Tipula.</i> Os inerme: apice palpigerum, palpis (2) incurvis. |
| 813. Lapidaria. | |
| 814. Argillacea. | |
| 815. Terrestris. | 839. Pectinicornis. |
| 816. Rufa. | 840. Idriensis. |
| 817. Hortorum. | 841. Plumosa. |
| 818. Collaris. | 842. Lacustris. |
| 819. Pascuorum. | 843. Graminea. |
| 820. Hypnorum. | 844. Convallium. |
| 821. Nemorum. | 845. Crocata. |
| 822. Sylvarum. | 846. Rivosa. |
| 823. Collium. | 847. Lunata. |
| <i>Vespa.</i> Os muticum. Alæ super: subplicatae. | 848. Pratensis. |
| | 849. Annulata. |
| 824. Crabro. | 850. Cimicoides. |
| 825. Vulgaris. | 851. Chirothecata. |
| 826. Sylvestris. | 852. Lineata. |
| 827. Parietum. | 853. Ferruginea. |
| 828. Muraria. | 854. Oleracea. |
| 829. Tinniens. | 855. Fasciata. |
| 830. Coarctata. | 856. Inquieta. |
| 831. Maculata. | 857. Vibratrix. |
| <i>Formica.</i> Alæ neutris nullæ. | 858. Fenestralis. |
| | 859. Tremula. |
| 832. Herculeana. | 860. Degener. |
| 833. Vaga. | 861. Boleti. |
| 834. Nigra. | 862. Typhina. |
| 835. Libera. | 863. Hemerobioides. |
| | 864. Phalænoides. |
| | 865. Labacensis. |
| | 866. Quadrinodia. |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Musca.</i> Os vagina carno- | 906. Punctulata. |
| fa, retractili : apice | 907. Coleoptrata. |
| labiata : basi palpi- | 908. Muraria. |
| gera. | 909. Curforia. |
| | 910. Formosa. |
| 867. Meridiana. | 911. Cupraria. |
| 868. Carnaria. | 912. Rara. |
| 869. Variegata. | 913. Ferruginea. |
| 870. Maculata. | 914. Iridata. |
| 871. Cæsar. | 915. Violacea. |
| 872. Domestica. | 916. Bipunctata. |
| 873. Cæfarina. | 917. Spatula. |
| 874. Colosius. | 918. Albiseta. |
| 875. Martia. | 919. Spinipes. |
| 876. Tuguriorum. | 920. Buccata. |
| 877. Prostrata. | 921. Virens. |
| 878. Nigrita. | 922. Ornitovora. |
| 879. Corni. | 923. Strumosa. |
| 880. Angelicæ. | 924. Lacustris. |
| 881. Rufiventris. | 925. Hortulana. |
| 882. Tripunctata. | 926. Maritima. |
| 883. Rotundata. | 927. Meticulosa. |
| 884. Deceptoria. | 928. Merulina. |
| 885. Temula. | 929. Cannabina. |
| 886. Falcata. | 930. Palustris. |
| 887. Cæruleocephala. | 931. Pyrastri. |
| 888. Larvarum. | 932. Erratica. |
| 889. Alni. | 933. Libatrix. |
| 890. Roralis. | 934. Mellina. |
| 891. Pluvialis. | 935. Vacua. |
| 892. Doronici. | 936. Lucida. |
| 893. Vernicina. | 937. Chrysorrhæa. |
| 894. Præcps. | 938. Ænea. |
| 895. Flumipes. | 939. Vibrans. |
| 896. Scybalaria. | 940. Germinationis. |
| 897. Ruta. | 941. Arnicæ. |
| 898. Amentaria. | 942. Aphidoides. |
| 899. Unguicornis. | 943. Luteola. |
| 900. Fumigata. | 944. Oppidana. |
| 901. Coryleti. | 945. Umbellatarum. |
| 902. Longipes. | 946. Festinans. |
| 903. Fungorum. | 947. Cynipsea. |
| 904. Putris. | 948. Spoliata. |
| 905. Oenopota. | 949. Saltitans. |

Ceria.

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

| | |
|--|--|
| <i>Ceria</i> . Rostrum muscæ. An- | <i>Erax</i> . Rostrum trifidum: |
| teniae moniliformes. | vagina univalvi, capi- |
| | te non longiore. |
| 950. <i>Decennodia</i> . | 973. <i>Prostratus</i> . |
| 951. <i>Septemnodia</i> . | 974. <i>Crabroniformis</i> . |
| <i>Conops</i> . Rostrum quadrifidum: vagina retractili: apice labiata. | 975. <i>Forcipatus</i> . |
| 952. <i>Bifasciatus</i> . | 976. <i>Barbatus</i> . |
| 953. <i>Trifasciatus</i> . | 977. <i>Ferox</i> . |
| 954. <i>Pertinax</i> . | 978. <i>Conopoides</i> . |
| 955. <i>Bombilans</i> . | 979. <i>Tentredoides</i> . |
| 956. <i>Pennatus</i> . | 980. <i>Rufipes</i> . |
| 957. <i>Dryaphyllus</i> . | 981. <i>Niger</i> . |
| 958. <i>Leucorhæus</i> . | 982. <i>Aquaticus</i> . |
| 959. <i>Floreus</i> . | 983. <i>Puillus</i> . |
| 960. <i>Vulgaris</i> . | 984. <i>Maculatus</i> . |
| 961. <i>Fuscus</i> . | 985. <i>Inquinatus</i> . |
| 962. <i>Cupreus</i> . | 986. <i>Rufus</i> . |
| 963. <i>Femoratus</i> . | |
| 964. <i>Festivus</i> . | <i>Asilus</i> . Rostrum quadrifidum: vagina longa, attenuata, bivalvi. |
| 965. <i>Gemmatus</i> . | 987. <i>Mucronatus</i> . |
| 966. <i>Glaucus</i> . | 988. <i>Punctatus</i> . |
| 967. <i>Aeneus</i> . | 989. <i>Ferrugineus</i> . |
| 968. <i>Præcinctus</i> . | 990. <i>Lineatus</i> . |
| 969. <i>Pipiens</i> . | 991. <i>Setosus</i> . |
| 970. <i>Clavatus</i> . | 992. <i>Cinereus</i> . |
| <i>Anthrax</i> . Rostrum bifidum: vagina basi retractili: medio palpiger. | 993. <i>Aestivus</i> . |
| | 994. <i>Pennipes</i> . |
| | 995. <i>Flavipes</i> . |
| | 996. <i>Fulcratus</i> . |
| | 997. <i>Dubius</i> . |
| 971. <i>Morio</i> . | <i>Styrex</i> . Rostrum unifidum: vagina retractili palpiger. |
| <i>Rhingia</i> . Rostrum trifidum: vagina univalvi attenuata, canali oris adplicata. | 998. <i>Holofericeus</i> . |
| 972. <i>Rostrata</i> . | <i>Hirtea</i> . Rostrum unifidum: vagina retractili: apice |

apice labiata, basi pal- *Bombylius*. Rostrum bise-
pigera. tum: vagina bivalvi
porrecta, longa.

999. Longicornis.

Empis. Rostrum unisetum: vagina basi retractili,
attenuata longa.

1018. Maior.

1019. Medius.

1020. Minor.

1021. Ater.

1000. Petiolata.

1001. Calcitrans.

1002. Rufipes.

1003. Palustris.

Hippobosca. Rostrum uni-
setum: vagina bivalvi.
Pedes unguibus (4).

Sicus. Rostrum unisetum:
vagina e medio re-
fracta.

1022. Equina.

1023. Hirundinis.

1024. Corvi.

1004. Ferrugineus.

1005. Buccatus.

ORD. VII. PEDESTRIA.
Alæ nullaæ.

Tabanus. Rostrum quin-
quesetum: vagina u-
nivalvi, palpis basi
tecta.

Lepisma. Pedes (6). Os
palpis (2). Cauda se-
tosa non saltatrix.

1006. Bovinus.

1025. Longicornis.

1007. Autumnalis.

1026. Vulgaris.

1008. Tropicus.

Podura. Pedes (6). Cau-
da saltatrix.

1009. Ferus.

1027. Aquatica.

1010. Alpinus.

1028. Squamosa.

1011. Bromius.

1029. Terrestris.

1012. Pluvialis.

1030. Arborea.

1013. Rufus.

1031. Termiformis.

1014. Cæcutiens.

Termes. Os maxillosum.
Facies Pediculi.

1015. Salinarius.

1032. Pulsatorium.

1016. Maritimus.

1033. Sylvarum.

Culex. Rostrum quadrife-
tum: vagina longa,
basi palpis tecta.

1034. Florum.

1017. Pipiens.

Pedi-

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

Pediculus. Os aculeo exferendo. Habitatio in Animalibus. Pedes (6).

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1035. <i>Hematopus.</i> | <i>Accipitrum.</i> |
| 1036. <i>Maximus.</i> | <i>Falconis Buteo.</i> |
| 1037. <i>Coarctatus.</i> | <i>Larii Collur.</i> |
| 1038. <i>Ocellatus.</i> | <i>Corri Corax.</i> |
| 1039. <i>Dolichocephalos.</i> | <i>Coraciæ Orioli.</i> |
| 1040. <i>Fasciatus.</i> | <i>Cuculi canori.</i> |
| 1041. <i>Auritus.</i> | <i>Pici ma:</i> |
| 1042. <i>Dentatus.</i> | <i>Anatis.</i> |
| 1043. <i>Craßicornis.</i> | <i>Anatis Bosch.</i> |
| 1044. <i>Pilosus.</i> | <i>Fulicæ atræ.</i> |
| 1045. <i>Colymbinus.</i> | <i>Colymbi auriti.</i> |
| 1046. <i>Ardealis.</i> | <i>Ardeæ Ciconiæ.</i> |
| 1047. <i>Ovalis.</i> | <i>Scolopacis Arguatæ.</i> |
| 1048. <i>Iunceus.</i> | <i>Tringæ Vanelli.</i> |
| 1049. <i>Cuspidatus.</i> | <i>Ralli aquatici.</i> |
| 1050. <i>Bidentatus.</i> | <i>Columbæ Palumbi.</i> |
| 1051. <i>Albiventris.</i> | <i>Motacillæ Traglotid.</i> |
| 1052. <i>Rostratus.</i> | <i>G. Gryllo-Talpæ.</i> |
| 1053. <i>Coccineus.</i> | <i>Hemerobii.</i> |
| 1054. <i>Cerambycinus.</i> | <i>Apis violac.</i> |

Pulex. Rostrum inflexum, bivalve. Pedes saltatorii.

1055. *Irritans.*

Acarus. Pedes (8), cursorii.

1056. *Radiatus.*

1057. *Ricinus.*

1058. *Vespertilionis.*

1059. *Cornicis.*

1060. *Locusta.*

1061. *Colluricnis.*

1062. *Pici.*

1063. *Turdi.*

1064. *Coleopratorum.*

1065. *Coccinellæ.*

1066. *Muscarum.*

1067. *Formicarum.*

1068. *Holofericeus.*

1069. *Cancroides.*

1070. *Nepæformis.*

1071. *Muscorum.*

1072. *Agaricorum.*

1073. *Lichenum.*

1074. *Baccarum.*

1075. *Telarius.*

1076. *Piger.*

Aranea. Pedes (8). Oculi (6-8), Palpi (2) articulati.

1077. *Linnei.*

1078. *Reaumurii.*

1079. *Swamerdamii.*

1080. *Raii.*

1081. *Leuwenhækii.*

I N D E X

1082. *Adrovandi.* 1121. *Opilio.*
 1083. *Redii.*
 1084. *Merianæ.*
 1085. *De Geerii.*
 1086. *Frischii.*
 1087. *Roefslii.*
 1088. *Goedartii.*
 1089. *Albini.* 1122. *Europæus.*
 1090. *Clerkii.*
 1091. *Malpighii.*
 1092. *Schæfferi.*
 1093. *Listeri.*
 1094. *Rolandri.*
 1095. *Solandri.*
 1096. *Mouffetti.*
 1097. *Forskællii.*
 1098. *Petiverii.*
 1099. *Kleinii.*
 1100. *Osbekii.*
 1101. *Kalmii.*
 1102. *Hasselquistii.*
 1103. *Uddmanni.*
 1104. *Deerrhamii.*
 1105. *Jonstoni.*
 1106. *Wilkii.*
 1107. *Robertii.*
 1108. *Sloanii.*
 1109. *Catesbæi.*
 1110. *Rumpfii.*
 1111. *Marcgravii.*
 1112. *Blankardi.*
 1113. *Joblotii.*
 1114. *Ritteri.*
 1115. *Blearii.*
 1116. *Lyonetti.*
 1117. *R.P. Poda.*
 1118. *Knorii.*
 1119. *Hombergii.*
 1120. *Pluschii.*
- Phalangium.* Pedes (8).
 Papillæ textoriæ nul-
 læ. Oculi verticales
 (2-4).
- Scorpio.* Palpi duo che-
 lati. Peñines duo sub-
 tus inter abdomen et
 thoracem.
- Cancer.* Palpi (2) che-
 lati. Oculi (2). Cauda
 inermis.
1123. *Mænas.*
 1124. *Depurator.*
 1125. *Pagurus.*
 1126. *Maia.*
 1127. *Gammarus.*
 1128. *Astacus.*
 1129. *Squilla.*
 1130. *Bernhardus.*
 1131. *Diogenes.*
 1132. *Istrianus.*
 1133. *Nutrix.*
 1134. *Cruentatus.*
 1135. *Mantis.*
 1136. *Locusta.*
 1137. *Pulex.*
- Monoculus.* Pedes nata-
 torii. Oculi approxi-
 mati.
1138. *Apus.*
 1139. *Quadricornis.*
- Oniscus.* Corpus ovato-
 oblongum. Pedes (14).
1140. *Bicaudatus.*
 1141. *Tridens.*
 1142. *Asellus.*
- 1143.

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM.

-
- | | |
|------------------|--------------------|
| 1143. Asilus. | 1148. Nivea. |
| 1144. Armadillo. | 1149. Clavicornis. |
| 1145. Muscorum. | 1150. Iulacea. |
| | 1151. Marina. |

Scolopendra. Corpus planiusculum. Pedes eius singulis plerisque segmentis utrinque solitarii.

Julus. Corpus semicylindricum. Pedes eius singulis segmentis utrinque duo.

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1146. Forficata. | 1152. Terrestris. |
| 1147. Aranea. | 1153. Lagurus. |



EX-



EXPLICATIO

colorum, quibus usus sum in descriptionibus
Lepidopterorum.

Orbitulus ligneus, axi ossea instructus dividens in octo partes aequales, quarum numerus determinatus, binis, tribus aut pluribus coloribus primariis, obductus, adhibita celeri & aequali rotatione, colorem unicum indicabit.

Colores primarii in pingendis trochis adhibiti, sunt.

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Cinnaberinus. | Cinnaberis. |
| 2. Flavus. | Gummi güttae. |
| 3. Cæruleus. | Cærul. Berolin. |
| 4. Niger. | Atramentum indicum. |
| 5. Albus. | Cerusa. |
| 6. Viridis. | Compositus ex cæruleo & flavo. |

Ex his nati sequentes.

| <i>Compositi. Rosatus Partes</i> | 2 | Albi. | 6 | Rub. |
|----------------------------------|---|--------|---|--------|
| Russeus | 4 | Albi. | 4 | Rub. |
| Corallinus. | 6 | Rub. | 2 | Virid. |
| Hepaticus. | 4 | Rub. | 4 | Nigr. |
| Sanguineus. | 6 | Rub. | 2 | Nigr. |
| Pudorinus. | 6 | Rub. | 2 | Flav. |
| Minius. | 6 | Rub. | 2 | Cærul. |
| Aurantius. | 4 | Rub. | 4 | Flav. |
| Citrinus. | 6 | Flav. | 2 | Rub. |
| Luteus. | 6 | Flav. | 2 | Nigr. |
| Limoniatus. | 4 | Flav. | 2 | Virid. |
| Isabellæ. | 6 | Flav. | 2 | Alb. |
| Stramineus. | 6 | Flav. | 2 | Cærul. |
| Virescens. | 6 | Virid. | 2 | Nigr. |
| Viride mont. | 6 | Virid. | 2 | Alb. |
| Moschatinus. | 4 | Rub. | 4 | Virid. |
| Murinus. | 2 | Flav. | 6 | Nigr. |
| Offeus. | 4 | Flav. | 4 | Alb. |

De-

* (o) *

Decompositi.

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---|--------|---|------|
| Ochreaceus Partes. | 4 | Rub. | 2 | Flav. | 2 | Vir. |
| Hæmatiticus. | 4 | Cærul. | 2 | Rub. | 2 | Nig. |
| Vinaceus. | 4 | Rub. | 2 | Cærul. | 2 | Vir. |
| Capparinus. | 4 | Flav. | 2 | Virid. | 2 | Cær. |
| Caryophyllinus. | 4 | Virid. | 2 | Rub. | 2 | Nig. |
| Cinamomæus. | 4 | Flav. | 2 | Rub. | 2 | Nig. |
| Glaucus. | 4 | Cærul. | 2 | Flav. | 2 | Vir. |
| Castaneus. | 4 | Virid. | 2 | Rub. | 2 | Fla. |
| Viridanus. | 4 | Virid. | 2 | Cærul. | 2 | Fla. |
| <i>Supradecompositi.</i> | | | | | | |
| Umbrinus. | 4 | Nigr. | 1 | Cærul. | 1 | Vir. |
| | | | 1 | Flav. | 1 | Rub. |

Methodi Inventor R. & Doctiss. P. PODA &
Soc. JESU. Illustrator ego.

Plurimum interest observare colores rerum naturalium, eosque bene distinguere. Petrum ex imagine etiam optime delineata, quis adgnoscet, nisi colores habuerit, quos Petri vultus. Alæ Papil. *Machaonis Rhamni* &c. flavæ dicuntur, ac si eodem essent colore tinctæ, quod, nemo dicere poterit. Neque claram colorum ideam exhibent termini illi arbitrarii, v. g. subfuscus, subrubellus, griseo-albus, albo-luteus &c. Rogo itaque Eruditos, ut in his conveniamus, & color quilibet unico termino denotetur. Decem orbiculis sexaginta colores exprimi possunt, si orbiculi superna & inferna facies in tres partes concentricas dividatur, & harum quælibet, prædictis coloribus, diversimode tingatur. Si vero, hac methodo, colores non omnes exprimi possint, adhibeantur colores rerum usitatissimarum, quibus & ego usus sum; v. g.

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---------------------------|
| Aureus. | . | . | . | Aurum purum. |
| Argenteus. | . | . | . | Argentum. |
| Cupreus. | . | . | . | Cuprum. |
| Æneus. | . | . | . | Æs. |
| Plumbeus. | . | . | . | Plumbum. |
| Carneus. | . | . | . | Cutis junior fani Hominis |
| Cervinus. | . | . | . | Pili corii cervini. |
| Croceus. | . | . | . | Crocus Austr. |
| Corticinus. | . | . | . | Cortex Peruvianus. |
| Cupressinus. | . | . | . | Strobilus Cupressi. |

Caffea.

(o)

| | | | |
|--------------|---|---|---------------------|
| Caffæatus. | . | . | Pulvis Caffè tosti. |
| Cereus. | . | . | Cera alba. |
| Ferrugineus. | . | . | Rubigo ferri. |
| Nuceus. | . | . | Lignum Nucis. |
| Griseus. | . | . | Capilli cani. |
| Bolaris. | . | . | Bolus armena. |

Tres trinacrie Parthenz.

Lini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IN-



INSECTORUM CARNIOLIAE.

ORDO I. COLEOPTERA

ALÆ QUATUOR: SUPERIORES CRUSTACEÆ.

LINN. Syst. Nat. p. 345.

LUCANUS.

Antennæ apice dentibus 4 uno latere pectinatæ.
Maxillæ porrectæ.

I. LUCANUS *Cervus*.

Elytri longit. unc. 1. lin. 1. latit. lin. $4\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 352. Scarab. 58.

Faun. Svec. 2. 405.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl I. Tab. 5. fig.
7. 9. mas. fig. 8. fæm.

MERIAN. Europ. Tab. 168.

P. PODA. Mus. Græc. p. 21.

Carniol. Rogatsch.

C

Dia-

2 Scarabæus. ORDO I. Scarabæus.

Diagnosis. Maxillæ (arma) maris thorace duplo longiores, apice furcatæ: dente medio horizontali; villorum ruforum fasciculi bini inter palpos prominentes.

Habitat in putridis Quercubus. ROESEL. LINN.

Vesperi circumvolat post solstitium aestivum. Maxillæ masculæ porrectæ, lin. 9. longæ; feminae vero thorace & capite breviores.

2. LUCANUS *Caraboides.*

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 354. Scarab. 63.

Faun. Svec. 2. 407.

Diagn. Maxillæ porrectæ, lunatæ: apice truncato, 5-dentato, ut in Formicis plerisque.

In Carniola non rarus.

Totus punctatus, Carabisiformis. Capite, thorace, elytrisque obiter lineatis, atro-cæruleis. Abdomine supra ferrugineo. Corpore subtus atro.

SCARABÆUS. (†)

Antennæ articulo fissili majore clavatae.

(*) *Tibiis anticis unidentatis.*

3. SCARABÆUS *Solstitialis.*

El. long. lin. 5. lat. lin. $2\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 351.

Faun. Svec. 2. 393.

FRISCH Insect. 9. Tab. 15. fig. 3.

P. PODA. Mus. Græc. p. 21.

Dia-

(†) *Scarabæi Floræ famuli.*

Anthophylli nuptias plantarum promovent, *auratus*, *nobilis*, *maculatus*, *litoralis*, *figulus*, *argenteus*, *libator*, *squallidus*, *alpinus*, *variegatus*.

Phyllophagi larvas *Lepidopterorum* fugant, *melolontha*, *eremita*, *nasicornis*, *solstitialis*, *oblongus*, *minimus*.

Stercorei radices plantarum nutritunt, *stercorarius*, *vernalis*, *lunaris*, *finetarius*.

Scarabæus. COLFOPTERA. Scarabæus. 3

Diagn. Habitus Scarab. Melolonth. sed minor & pallidior. Antennæ trifidae (††). Nativitas aestiva, circa dies caniculares.

In sylvestribus locis, praesertim in Tiliis.

Elytrum pellucidum, margine exteriore ciliatum, nitens, plicis tribus parallelis striatum, flexile. Thorax & pectus tomentosum. Abdom. subtus albo prostrato villo pubescens, serie una transversa villorum aliorum erectorum & rufescens, in quilibet incisura. Pedes rufi.

Vidi circa Idriam, M. Junio, notabilem varietatem, elytris obscure lineatis, lin. 4 longis; abdom. sine pilis albis; tibiis anticis tridentatis.

4. SCARABÆUS Dubius.

El. long. lin. 4½. lat. lin. 2½.

Diagn. Thorax cum elytris striatis glabris punctatus. Corpus subtus saltem atro-ceruleum.

In Carniola calidore, anthophyllus.

Caput obtusum. Elytra ab domine breviora, ut in Solstitiali, quo minor, & varians imo. Elytris coloratis ut in priore. Thorace atro-ceruleo: margine dorsoque elytris concolore. 2do. Colore unico atro-ceruleo; thorace tamen & capite potius virescensibus.

(**) Tibiis anticis bidentatis.

5. SCARABÆUS Fasciatus.

El. long. lin. 3. lat. fere 2.

LINN. Syst. Nat. p. 352.

Faun. Svec. 2. 395. Var. alia.

P. PODA. Mus. Græc. p. 20.

Diagn. Caput, Thorax, Corpus rufescente dense villo tomentosa. Elytrum flavicans margine basi apice fasciaque abrupta nigri coloris. Ani regio macula subrotunda acuminata nigra.

In floribus Spireæ Arunci.

C 2

Fun.

(††) Scarabæorum divisio alia ex capitulo antenarum Bifido; Alpinus.

Trifido; omnes alii, sequentibus exceptis.

Multifido; Melolontha. Fullo.

4 Scarabæus. ORDO I. Scarabæus.

Fundus ubique niger. Abdom. supra nigrum, rugis transversis. Ad apicem nigrum elytris tumor lucidus ovatus. Vidi in uno specimine clavulas binas petiolatas deflexas in fronte.

Variat. 1. Elytris lin. $2\frac{1}{2}$. longis.

2. Iisdem basi semi-nigris.

3. Fascia ab uno ad alium marginem produeta.

4. Thorace in medio macula magna nigra.

6. SCARABÆUS Cyathiger.

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. fere 2.

P. PODA. Mus. Græc. p. 21. Agricola.

Diagn. Elytra paulo saturatiora quam in *Solstitiali*, margine nigra, si unita fuerint, maculam communem gerunt cyatho similem, atram.

In floribus & spicis *Cerealium*.

Statura prioris. Thorax fusco virens. Caput apice dilatatum sursum flexum. Corpus totum subitus, & ani regio, albido villo canescens. Elytra substriata, subdiaphana, margine externo magis nigricantia, & minutis transversis rugulis exasperata.

7. SCARABÆUS Funestus.

El. long. lin. 3. lat. lin. fere 2.

P. PODA. Mus. Græc. p. 20.

Diagn. Totus niger nitidulus, raris villis adspersus. Thorace punctorum alborum paribus tribus. Elytris albo-punctatis: punctis 4, ad marginem externum supra medium, majoribus.

Copiosus in floribus *Spartii Juncei*, circa *Tergestum*, prope Mare.

Statura prioris. Caput leuiter emarginatum. Puncta elytrorum sunt albæ cicatrices. Corpus subitus villosius. An *Variabilis* LINN. Faun. Svec. 2. 402?

8. SCARABÆUS Hirtus.

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. lin. $1\frac{7}{8}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 21.

Diagn. Totus fuscus. Caput antice excavatum. Thorax tomentosus, immaculatus. Elytra villosa: punctis aureis albisve.

In floribus *Spirææ Ulmarie.*

Sta-

Scarabæus. COLEOPTERA. Scarabæus. 5

Statura *funesti*. Thorax pubescens ut in *Fasciato* Elytra punctis plerumque repandis.

Variat. 1. tomento thoracis rufescente & albido.

2. Punctis pluribus paucisque, distinctis & confluentibus.

9. SCARABÆUS *Argenteus*.

El. long. lin. 3. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 20.

Diagn. Corpus totum subtus, & ani regio, argentei coloris.

Frequens in umbellis *Laserpitii*, *Siler*. & *Latifolii*, in floribus *Spirææ Arunci* & *Ulmariæ*.

Fundus elytri fusco-ferrugineus, assidua inter flores volutatione, tandem obducitur aliena pulvрulenta & ceracea crusta, quam antherarum pollen efficit, varii coloris, nempe sublutei, cærulescentis, aut virescentis. Corpus subitus & femora nigri coloris, tota teguntur squamulis argenteo-cærulescentibus. Caput antice truncatum. Abdom. superne fuscum.

10. SCARABÆUS *Adiaphorus*.

El. long. lin. 3. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 20.

Diagn. Totus pilosus. Caput & Thorax cæruleo-viridis coloris. Elytra diaphana saturatus colorata ac in *S. Melolontha*.

In floribus.

Statura *Fasciati*. Tardus valde. Tibiæ anticæ superior dens obtusus. Corpus subitus pedesque atro-cærulei. Thorax & caput magis villosa sunt, ac elytra, quæ non grisea ut in *S. Horticola*. LINN.

11. SCARABÆUS *Sylvestris*.

El. long. lin. 1 $\frac{1}{4}$. lat. lin. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Elytrum striis elevatis 10: areis interjectis transversim rugosis: octava tuberculis binis.

In sylvis reperitur.

Caput leniter emarginatum. Thorax capiti concolor, fuscus, punctatus, linea depressa dorsali, antico margine pallidiore. Spatia seu valleculæ inter strias elytri, foveolis transversis insculptæ.

12. SCARABÆUS *Fullo*.

El. long. unc. 1. lin. 4. lat. lin. 8.

ROESEL. Inf. 4. Tab. 30. fig. 1. 2. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 352.

Faun. Svec. 2. 394.

FRISCH. Inf. 11. Tab. 1. fig. 1. p. 23.

Diagn. Clavæ antenn. lamellæ plures quam res. Elytra nigra vel hepatica albo irrorata.

Apud nos rarer.

Caput obtusum cum thorace fuscum. Scutellum albido prostratis villis adspersum. Elytra exiguis crebris rugulis scabra, punctis lineisque repandis ramosis albis variegata. Pectus rufo villo tomentosum. Irritatus stridet, attritu abdominis ad Elytra. Vidi etiam tibiis anticis tridentatis.

13. SCARABÆUS *Squallidus*.

El. long. lin. 13. lat. lin. 14.

LINN. Sabulosus? sed Faun. Svec. 2. 390. alium indicare videtur.

Diagn. Toton niger, corpore subtilis, thorace, capiteque villosis.

Reperitur in hortis non frequens.

Thorax linea longitudinali dorsali elevata media. Elytrum margine externo prope basim leniter sinuatum.

(***) *Tibiis anticis tridentatis.*

14. SCARABÆUS *Nasicornis*.

El. long. lin. 19. lat. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 346.

Faun. Svec. 2. 378.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 7. fig. 8.

FRISCH. Inf. 3. Tab. 3. fig. 1. magna valde.

P. PODA. Mus. Græc. p. 17.

Diagn. Cornu trilineare, recurvum, totum caput basi sua occupans.

Circa *Labacum*, & alibi, non rarus.

Toton clypeus capitis elevatur in cornu dictum, ut ideo verticicornis potius dicendus esset, nisi maxima ex non necessaria nominum mutatione confusio oriretur. Caput emarginatum. Thorax

Scarabæus. COLEOPTERA. Scarabæus. ♀

mæsculus tuberculo triplici: medio minore, lin. fere 3 longus, semiunciam latus, cum capite niger. Elytra castanea punctata. Corpus subtus pedesque villosi, elytris concolores.

15. SCARABÆUS Eremita.

El. long. lin. 9. lat. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 3. fig. 6.

Diagn. Caput concavum: tuberculo utrinque marginali. Thorax rotundatus: fulco longitudinali medio.

Reperi in cavo trunco *Pyri communis* non semel; ROESEL. in ramo *Salicis*.

Statura S. *Nasicornis*. Tōtus niger. Caput subquadratum; margine laterali élatiore & tuberculo terminato. Thorax lin. 4. longus, 5. fere latus, dorso plicis binis antice auctioribus. Elytra scabruſcula. Abdomen lin. 8. crassum. Femora postica lia. 2. lata.

16. SCARABÆUS Melolontha.

El. long. lin. fere 7. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 351.

Faun. Svec. 2. 392.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 1. fig. 7. 9. 10. 11. 12.

SPECTACLE de la NATURE. Tom. 1.
page 8. fig. 2. 8. 11.

P. PODA. Mus. Græc. p. 19.

Carniol. Keber.

Diagn. Capitulum antenn. lamellis 6. 7. Abdom. acumine deflexo, obtuso; incisuris margine laterali macula alba subconica notatis.

Habitat in agris & hortis.

Clypeus capitidis subtetragonus, antice marginatus: margine pedibus concolore. Elytra subpellicula, lineis 4. parallelis elevatis, coloris ad ferrugineum tendentis. Variat tibiis anticis etiam bidentatis. Majo M. prodit, vesperi circumvolat, folia devastat, a *Vespertilione Murino* colligitur & devoratur, autumnales morbos copiosior sèpe prænuntiat, oleum infusum cimicifugum reddit.

17. SCARABÆUS *Auratus.*

El. long. lin. 7 lat. lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 352.

Faun. Svec. 2 400.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 2. fig. 8.

FRISCH. Ins 12. Tab. 1. fig 2 p. 25.

P. PODA. Mus. Græc. p. 19. conjugens
cum sequente*Diagn.* Thorax foveolarum paribus duobus.
Ani regio punctis binis prominentibus.Anthophyllus, congregatur in Quercubus, quo
loco, e læso contice humor exsudat. Coloris ænei
potius quam aurati. Thoracis ea parte, quæ scutel-
lo adjacet, rotunde excavata.

Variat. 1. Foveolis thoracicis albis.

2. Elytris immaculatis, nec non punctis li-
neolisque albis, transversis, irregularibus,
variegatis.
3. Pectore virescente.
4. Segmentis abdominis 3, 4, 5. uno pari
punctorum alborum.

18. SCARABÆUS *Nobilis.*El. long. lin. 6. lat. lin. 2 $\frac{2}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 353.

Faun. Svec. 2. 401.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 2.
fig. 4. 5*Diagn.* Col'or viridi-auratus. Caput leniter e-
marginatum Ani regio punctis binis albis remotis.In floribus *Cimolis*, *Umbellatis*, aliisque copiosus.Sub clypeo capitis lamina cordiformis, mar-
gine villoso. Maxillæ obtusæ edentatae. Penis ut
in *S. Melolontha*. Thorax absque foveis, nec mar-
gine postico prope scutellum ita excavatus ut in
priore.19. SCARABÆUS *Oblongus.*

El. long. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Facies *Tenebrion. Molitoris*. Caput ante-
tice rotundatum. Elytrum striis (9).

Circa oppida & pagos reperitur, non frequens.

Scarabæus. COLEOPTERA. Scarabæus. 9

Capitis clypeus prope basim dente utrinque instructus, antice rotundatus integer. Thorax capiti concolor, nigricans, levis, lin. $1\frac{2}{3}$. longus, $2\frac{1}{2}$. fere latus. Elytra fusco-castanea, striis novem non punctatis exarata.

20. SCARABÆUS Fimetarius.

El. long. lin. 2. lat. $1\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 18.

Faun. Svec. 2. 385.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. A.
fig. 3.

FRISCH. Ins. 4. Tab. 19. fig. 3. 4. p.
35. 36.

P. PODA. Mus. Græc. p. 18.

Diagn. Caput tuberculis tribus. Elytra stria-
ta. Corpus nigrum.

Habitat in stercore *Bovis, Equi, Porci.*

Caput truncatum. Thorax punctulatus, pedes-
que nigri; thoracis tamen margo lateralis sequi-
tur colorem elytri, quod striis longitudinalibus octo-
niis punctatis exaratum est, & modo *rubrum*, quod
indicant adducta Synonima, antennis quoque rubris,
thorace antice in medio foveolam gerente; in ca-
davere sicco, color ruber, in rufo-fulvum transit;
modo vero *griseum*, & *subfuscum*, quæ specimina
minora sunt, & fovea thoracis antica destituta.

21. SCARABÆUS Alpinus.

El. long. lin. $1\frac{2}{3}$. lat. 1.

Diagn. Capitulum antenn. bipartitum.

Reperi. A. 1761. 20. Julii, in alpibus *Vochi-*
nensibus, Carnioliae super.

Statura *Coccinellæ* 10. punctatæ. Color ubique
nigricans, sed elytra prope apicem fulvescentia,
striata: striis 10. punctatis. Thorax punctatus. Ca-
put tuberculorum trium rudimentis exasperatum,
ut ideo, a priore vere diversum esse, dubitem.

(*****) *Tibiis anticis quadridentatis.*

22. SCARABÆUS Lunaris.

El. long. lin. 5½. lat. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 346.

Faun. Svec. 2. 379.

ROESSEL. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 1. B.
fig. 2.

FRISCH. Ins. 4. Tab. 7. Fig. 1. p. 16.

PETIVER. Gazoph. Dec. I. Tab. 83. fig.
4. Rhinoceros.

P. PODA. Mus. Græc. pag. 18. Tab. 1.
fig. 1. bifidus.

Diagn. Caput planum, antice rotundatum, crenulatum, bifidum: vertice cornuto. Elytra striata.

Habitat in stercore *Equi, Bovis.*

Niger totus, verticicornis, latitudine capitinis fere dupla ad longitudinem; præterea huic thorax latrior est, quam utrumque elytrum simul junctum. Hujus speciei specimina quatuor habeo, quorum duo majora, alia vero minora sunt; majora minus lucida variant. 1. Thorace ad utrumque latus hemisphæricò scalpello veluti exciso, ita, ut deus unus utrinque in margine thoracis sit, dum medium segmentum crassius & fulco medio in duas partes æquales divisum est; in hac varietate thorax antice truncatus appetet. 2. Thorace rotundiore, antice non ita retuso, & absque dentibus, huic quoque cornu bifidum, & triplo brevius. Minora specimina lucidiora sunt, ac unum quidem thorace superne depresso & complanato, cornu conico integro vix lineam longo; alterum dorso thoracis nullibi depresso, bifidum, sed æque longum, cornu gerit.

23. SCARABÆUS Rügofus.

El. long. lin. 2. lat. lin. 1½.

P. PODA. Mus. Græc. p. 20.

Diagn. Caput rugis duabus transversis.

Habitat ruri in acervis fimi.

Totus niger, subtus lucidior. Capite antice rotundato. Thorace lævi punctulato. Elytris punctatis, striisque 7. punctatis.

Scarabæus. COLEOPTERA. Scarabæus. 11

24. SCARABÆUS *Longipes.*

El. long. lin. 2. lat. 1½. ad basim.

Diagn. Pedes postici corpore longiores. Ani regio marginata.

Habitus prioris, ut & color; sed diversus, capite emarginato, absque rugis, eodemque una cum thorace punctis eminentibus scabro, elytris substriatis, icabriusculis.

25. SCARABÆUS *Illyricus.*

El. long. lin. 2. lat. 1½.

Diagn. Nucha profert duo cornua setacea, incurva, deflexa.

Unicum cepi in via, inter fluvium *Idriam* & montem.

Caput declive, planiusculum, rotundatum, integrum, apice leniter acuminatum & adscendens. Thorax punctatus, lævis, tuberculum obsoletum habet in margine laterali. Elytra fusco-castanea, punctata, obiter striata. Alæ subhyalinæ. An mas S. *Rugosus?*

(*****) Tibiis anticis multidentatis.

26. SCARABÆUS *Stercorarius.*

El. long. lin. 6. lat. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 349.

Faun. Svec. 2. 388.

FRISCH. Inf. 4. Tab. 6. Fig. 3. p. 13-15.

P. PODA. Mus. Græc. p. 18.

Diagn. Caput pentagonum: grano medio notatum. Elytra striata.

Habitat in stercore *Bovis*, *Equi*, *Hominis*, vix excreto a longe advolans.

Var. 1. Elytris fusco-castaneis. Corpore subtus viridi-cæruleo.

2. Colore superne nigro, subtus violaceo.

3. Colore superne viridi, subtus viridi-aurato.

27. SCARABÆUS *Vernalis.*

El. long. lin. 5½. lat. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 349.

Faun. Svec. 2. 389. non idem cum nostro. P.

P. PODA. Mus. Græc. p. 19.

Diagn. Caput pentagonum: plica media longitudinali. Elytra lævia.

Supra virens, nitens, subtus violaceus. Femoribus virescentibus.

Variat. Elytris lin. 4. longis, 2 $\frac{1}{2}$. latis.

28. SCARABÆUS *Variegatus.*

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Albo nigroque varius est. Ani regio cinerea punctis binis atris.

Collegi 14. Maji in umbella *Chærophylli sylvi*.

Caput nigrum. Anten. nigrae: capitulo trifido. Caput postice denticulo marginali utrinque, occipite transversa villorum linea barbato. Thorax albidus, villosulus; in medio plicis duabus, binisque punctis atris in latere quolibet. Elytrum nigrum, striatum, planiusculum, abdomine brevius, basi & in medio punctis albis contiguis variegatum. Abdom. cinereum. Punctum album trigonum sub quolibet elytro inter pedes posticos mediosque. Pedes nigri. Tibiae anticæ 5-dentatae. Femora postica fasciis duabus albis. Accedit *Hemiptero* LINN. sed idem non est.

29. SCARABÆUS *Minimus.*

El. long. lin. 1 $\frac{1}{4}$. lat. lin. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Lucidus totus & levis Elytris substriatis, castaneis.

In foliis plantarum.

Omnium minimus, *Coccinellæ Saltatoriæ* L. facie. Anten. clava trifida. Caput, thorax punctatus, & corpus nigri coloris. Elytra subpunctata, obsolete striata.

H I S T E R.

LINN. *Syst. Nat.* p. 358.

Antennæ, articulo unico, indiviso, crassiore clavatae.

30. HISTER *Unicolor.*

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. I. c. Faun. Svec. 2. 44°.

Diagn.

Hister. COLEOPTERA. Dermetes. 13

Diagn. Niger, lucidus, glaber. Elytro striis 5 exterioribus obsoletis. Tibiis anticis multidentatis. Circa hortos.

Neglectis antennis a Scarabæo nemo distinguet. Caput deflexum, semi-retractum, obtusum. Thorax marginatus, punctatus. Elytra abbreviata. Abdom. punctatum. Anten. articuli capitulum inter & basim fulvi. Acaro Coleopt. infestatur. Elytra ad apicem punctata, supra striis quinque curvis, punctatis.

31. HISTER *Fimetarius.*

El. long. lin. 1. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger. Elytris apice rufis. Tibiis spinosis.

In fimo vaccino.

Ovatus, nitens. Elytrum striis 8. tenuibus exaratum.

32. HISTER *Apterus.*

El. long. lin. fere 1. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Fulvus est, & alis destitutus.

Vidi in scypho *Pezizæ campan*, villosæ 28. Septembris.

Pediculo humano minor, oblongus, fulvus. Antenn. clava acuta, villosa. Caput lateraliter utrinque corpus cornu simile obtusum, antennas clava longius, profert. Oculi nigri. Elytra dimidiata. Pedes glabri, crassiusculi. Cursus celer.

DERMESTES.

LINN. Syst. Nat. p. 354.

Antennæ tribus articulis crassioribus clavatæ.

33. DERMESTES *Vespillo.*

El. long. lin. 4. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 359. Silpha. 2.

Faun. Svec. 2. 444.

ROESEL. Suppl. Tom. 4. Tab. 1. fig. 1.

2. 3. 4.

FRISCH. Inf. 12. Tab. 2. fig. 1. p. 28.

P. PODA. Mus. Græc p. 23. Tab. 1. fig.
2. Silpha 4.

Diagn. Olet ut moschus, acaris infestatur, elytra truncata corpore breviora gerit.

Volat æstate circa hortos, domosque.

Totus niger. Anten. clava articulis subquaternis, primo nigro, cæteris elytri colore. Thorax obtuse tetragonus: margine aucto, lin. $2\frac{1}{2}$. longus & æque latus. Elytra fulva basi, apice, fasciaque media dentata, nigri coloris, apice adeo truncata, ut tria fere ultima abdominis segmenta nuda relinquat. Ad basim femorum posticorum, corpusculum acuminatum. Ambigit *Dermestem* inter & *Silpham*.

34. DERMESTES *Lardarius*.

El. long. lin. 3. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 354.

Faun. Svec. 2. 408.

FRISCH. Inf. 5. p. 25.

P. PODA. Mus. Græc. p. 22.

Diagn. Niger. Elytris basi fusco-cinereis aut rufescentibus, ibidemque punctis tribus atris.

In lardo, carnibus fumo & sale conditis, pane saccharato, insectis avibusque asservatis neque satis custoditis.

Maxillæ edentulæ. Thorax punctis 3. subcinereis. Scutello obtuso. Elytra subtus striata, ab domine longiora. Abdom. incisuræ 3. 4. subtus in medio foveolam habent, e cuius centro fasciculus pilorum ruforum conniventium oritur. Penis bifidus, subteres, convergens: segmentis pilo terminatis.

35. DERMESTES *Murinus*.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 355.

Diagn. Statura prioris. Habitatio in cadaveribus. Caput pilis fulvis pubescens.

Elytra subtus lucida striata. Abdom. subtus a pedibus mediis ad anum usque albicans: margine maculis punctisque nigris variegato. Anus niger.

Dermestes COLEOPTERA. Dermestes. 25

36. DERMESTES *Scaraboides*,

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 356.

Diagn. Fuscus est, & in quolibet elytro punctum subfulvum habet.

In donibus, & farciminibus allio & pipere conditis, (*cervelladi* Ital.) male compositis. Punctum elytri colore pedum.

37. DERMESTES *Pellio*.

El. long. lin. 2. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 355.

Faun. Svec. 2. 411.

FRISCH. Inf. 5. Tab. 8. fig. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 22.

Diagn. Puncta tria alba in thorace; unum in quolibet elytro, prope marginem internum.

In pellibus & vestimentis, quæ instrata papyri folia præservant. FRISCH. l. c. p. 33.

Anten. clava nigra: margine albo, stipite rufescente. Caput & thorax nigricant. Elytra nunc fusco-castanea, nunc fusca, nunc denique nigra.

38 DERMESTES *Carbonarius*.

El. long. lin. $\frac{3}{4}$. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Totus niger. Clavæ articulus quilibet pilum e latere proferens.

In corollis *Atropæ* 2. Fl. Carn. I.

Thorax & elytra marginata. *Iſylio* LINN. proximus est, sed elytri clava priorum.

39. DERMESTES *Rosæ*.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Ovatus, ferrugineus, villosulus. Oculis nigris.

Copiosum vidi in floribus Rosarum sylv. *Hellebori rosei*, *Scabiosæ rubræ*, *Laserpitii latifolii*.

Anten. clava nigra Thorax cum elytris marginatus & prostratis villis pubescens. Elytra ad lentem striis transversis exarata, margine saturatiore.

40. DERMESTES *Sambucci.*El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Corpus oblongum. Color ferrugineus. Occiput tuberculosum.In floribus *Sambucci nigrae.*

Color prioris. Caput minus. Oculi fusti. Occiput tuberculis binis, subfuscis, modice prominentibus. Conf. Derm. 432. Faun. Svec. 2.

41. DERMESTES *Variegatus.*El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Nigro-albo-rubroque varius.In floribus *Chærophylli silv.* & *Dauci carot*; sed & in cubilibus circumvolat ut *Pellio*.

Caput nigrum, deflexum, punctulis rubellis lateralibus. Antenn. clava nigra ovata, stipite, si luci oppositus fuerit, rubello. Thorax in medio niger linea dorsali longitudinali punctis albis facta, inter hanc & latus punctum rubellum utrinque, margo posticus rubellus, sed anguli ibidem albidi. Elytrum nigrum; margine, praesertim interiore, rubro; fasciis 2. dimidiatis albis; basi punctis pluribus, apice unico, coloris albi. Alæ hyaline puncto ad costam ferrugineo. Corpus supra nigrum, subtus pallide roseum, nigroque varium. Femora eodem modo variegata. Variat defectu rubri coloris.

42. DERMESTES *Cellaris.*El. long. lin. $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Rufus. Oculis fuscis. Thorace dentato.

In cellis vinariis ad cylindros cavos, unde vinum educitur, non rarus.

Linea paulo longior est, dimidiata crassus, villosulus, rufo-ferrugineus. Oculis fuscis. Anten. articulis 10. lateraliter acuminatis & pilo ibidem terminatis. Thorace marginato; angulis acutis parvoque dente in medio marginis lateralis. Elytris lucidioribus, ad lentem subrugosis, minime striatis. Alis brevibus debilibus.

43. DERMESTES *Agaricinus.*El. lin. $\frac{4}{5}$. long. $\frac{4}{5}$. lat. $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 360. Silpha.

Diagn.

Dermestes. COLEOPTERA. Dermestes. 17

Diagn. Niger est, gregarius, in fungis habitans; elytris brevibus; pedibus rufis.

In *Agaricis* putrescentibus.

Lineam vix longus, nitens, agilis, autumnalis, acaris propriis adfligitur. Thoracem & elytra marginata gerit; caput vero oculosque prominulos; ex antennis tamen huc retuli.

44. DERMESTES Boleti.

El. long. lin. $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger, villosulus, punctulatus, oblongus; maxillis exsertis, incurvis: apice bidentatis.

Habitat in *Boletis* & *Agaricis* sessilibus perennibus, cuniculos ibidem fodiens, & scobi immixtus latens.

Oculi prominuli pluribus veluti tuberculis facti. Palporum articulus ultimus crassior & longior. Pedes, antennae, & palpi rufescentes.

Varietatem fuscum, elytris lineam longis, *Lacu* misit R. P. WULFEN. S. J.

45. DERMESTES Brassicæ.

El. long. lin. $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Atro-ceruleus, lucidus, punctatus; pedibus subrufis.

Copiosus in floribus *Brassiacæ oleraceæ*, & congeneribus.

Thorax & elytra marginata, punctata: punctis exiguum villum proferentibus.

46. DERMESTES Ciliatus.

El. long. lin. $\frac{2}{3}$, lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Fuscus; thorace basi deflexo; oculis unico pilo ciliatis.

In floribus *Laserpitii filer.* 2. Junii.

Linea paulo longior. Caput inclinatum. Elytrum striis 10.

47. DERMESTES Lepturoides.

El. long. lin. $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{1}{4}$.

Diagn. Elytra truncata. Tibiae posticæ ciliatae.

Vidi in flore *Hellebori rosei*. 14. April. & in floribus *Pulmonariæ officin.*

48. DERMESTES. **ORDO I.** **Dermestes.**

Vix lineam longus, nigricans; thorace & elytris marginatis subvillosois; antennis ferrugineis. In flore *Pulmonariae* fuit lin. 1*4*. longus.

48. DERMESTES *Lycoperdi*.

El. long. lin. $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{1}{3}$.
Diagn. Villosum; thorace fusco; elytris castaneis.

Habitat in carne *Lycoperdi* 1. Var. f. *Fl. Carn.*

Larva alba, pilosa. Insectum linea vix longius; capite intra thoracem modice retractili; elytris marginatis, substriatis.

49. DERMESTES *Calthæ*.

El. long. lin. $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{1}{3}$.
Diagn. Fuscus, punctatus, nitens; abdominis apice pedibusque ferrugineis.

In flor. *Calthæ palustris* 13. April. non rarus.

Lineam longus, ovatus. Clavæ anten. articuli basi obscuriores, & ferruginei. Thorax cum elytris marginatus, punctatus. Pedes breves, crassissimuli.

50. DERMESTES *Cærulescens*.

El. long. lin. $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{1}{3}$.
Diagn. Atro-cæruleus; thorace lœvi; pedibus rufis.

Captus 17. April. in flore *Hyacinthi*.

Lineam longus, subovatus, nitens, thorace glabro.

51. DERMESTES *Violaceus*.

Fl. long. lin. 1\frac{1}{4}. lat. $\frac{2}{3}$.
An idem, qui LINN. Syst. Nat. p. 356?

Diagn. Violaceus; thorace elytrisque villosois. In floribus & plantis.

Caput deflexum. Palpi articulus ultimus major, subtriqueter. Anten. basi atro-violaceæ, villosofuscae: articulis inter basim & clavulam rufescientibus. Thorax cum elytris villosum: margine laterali subtrilobo: lobo medio majore. Corpus totum atro-cæruleum, sed manus sub-rufæ.

52. DERMESTES *Plicatus.*El. long. lin. 1. lat. $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Fuscus; elytris obiter striatis; plica frontali transversa bifida inter antennas collocata.

Habitat in hortis. Julio M.

Antennarum articuli tres ultimi pedesque rufi.

S I L P H A.

Antennæ extrorsum crassiores. Thorax clypeatus. Fulcrum acuminatum ad basim femoris postici.

53. SILPHA *Rugosa.*El. long. lin. $6\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 361.

Faun. Svec. 2. 455. ubi non videatur distinguere a mea *Scabra*.*Diagn.* Thorax leniter emarginatus. Elytrum lin. 3. elevatis: exteriore breviore.

In hortis & cadaveribus.

Tota nigra. Thoracis cum elytris punctati longitudo, elytri latitudini æqualis, aut fere æqualis, latitudo vero quasi dupla.

Variat 1. magnitudine elytri dicta. Anten. articulis (4) ultimis evidenter crassioribus.

2. Elytro lin. $4\frac{1}{4}$. longo. Anten. articulis insensibiliter extrorsum crassioribus.54. SILPHA *Thoracica.*El. long. lin. 5. lat. $2\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 360.

Faun. Svec. 2. 452.

P. PODA. Mus. Græc. p. 23.

Diagn. Thorax ferrugineus. Elytrum ruga una infracta, cui fracturæ inseritur linea media brevior, dum tertia a basi ad apicem elytri decurrit fere recta.

In hortis.

Antennæ nigræ, (4) articulis clavatæ. Occiput ferrugineis pilis pubescens. Thorax tenuissimo, ferrugineo, sericeo, prostrato, villo adspersus: angulis

anticis elatioribus, in medio ibidem recta excavatus. Elytrum rugulis transversis crispatum, nec punctatum; basi ferrugineo colore tinctum. Alæ apice rubellæ.

55. SILPHA *Littoralis.*

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 360.

Faun. Svec. 2. 450.

FRISCH. Inf. 6. Tab. 5. fig. 1.

Diagn. Nigra; anten. clava ferruginea; thorace orbiculato; elytris abdomine brevioribus.

In cadaveribus, circa ripas fluviorum.

Anten. articuli exteriores sensim crassiores, nigri: latere acuminati; sed tres ultimi ferruginei: latere rotundati. Thorax nitens, laevis, ad lentem punctatus, antice leniter excavatus. Elytrum punctatum, lin. 3. elevatis integris. Tuberulum inter duas elytri lineas positice collocatum.

56. SILPHA *Atrata.*

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 360.

Faun. Svec. 2. 451.

P. PODA. Mus. Græc. p. 23.

Diagn. Thorax antice rotundatus. Elytra rugulosa & lin. 3. elevatis rectis, ad apicem usque non extensis.

Pallidum occurrit.

Tota nigra est. Antennis articulis extrosum sensim dilatatis: tribus ultimis minus villosis. Thorax punctis confluentibus cicatrizatus. Elytra rugulis puncta referentibus exasperata.

57. SILPHA *Obscura.*

El. long. lin. 4. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 361.

Faun. Svec. 2. 45.

P. PODA. Mus. Græc. p. 23.

Diagn. Thorax antice subtruncatus. Elytra punctata: striis 3. obscuris elevatis: media longiore.

Nigra est, sed absque nitore. Anten. articulus ultimus ovatus, cæteri truncati. Thorax punctis crebrioribus minoribusque.

Silpha. COLEOPTERA. Laria 21

Variat elytro striis 2. utraque basi & apice de-
letis, statura minore; an hæc *Opaca LINN.*?

58. SILPHA *Sabulosa*.

El. long. lin. 3. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 361.

Faun. Suec. 2. 456.

Diagn. Thorax antice rotunde excavatus. Ely-
trum striis 3. elevatis: lateralibus ad apicem elytri
conunctis, omnibus utrinque tuberculosis.

In fabulosis, incultis.

Tota nigra. Anten. articulus ultimus obtusus.
Thorax punctulis eminentibus scaber. Elytrum
punctulis minoribus sparsis, & majoribus juxta la-
tera striarum positis, exasperatum.

59. SILPHA *Scabra*.

El. long. lin. 3½. lat. 1¾.

Diagn. Thorax subcinereus, tuberculis atris se-
riatis scaber. El. striis 3. elevatis ramosis.

Sæpe vidi in cadaveribus.

Anten. articulis tribus evidenter clavatae.
Frons pilis rufis pubescens. Thorax subvillosum,
antice (minus tamen ac in priore) excavatus.

60. SILPHA *Ferruginea*.

El. long. lin. 1½. lat. ¾.

LINN. Syst. Nat. p. 361.

Faun. Svec. 2. 458.

Diagn. Tota ferruginea; thorace in medio ely-
trisque nigro variegatis; striis 6. obsoletis in quo-
libet elytro.

In herbidis sylvestribus.

Thorax antice excavatus. Elytrorum striæ
villoſæ.

L A R I A.

Antennæ extrorsum crassiores. Thorax pulvi-
natus. Fulcrum femorale nullum, aut
obscurum.

61. LARIA *Hyoseris*.

El. long. lin. ¾. lat. ¼.

D 3

Diagn.

22 Laria. ORDO I. Laria.

Diagn. Nigra; tibiis ferrugineis.

In floribus *Lapsanae fætidæ Fl. Carniol.* quæ *Hypo-*
ser. LINN.

Lineam longa. Palpi sub-ferruginei. Thorax
angulis posticis acutis. Elytra marginata.

Alæ debiles. Pedes crassiusculi, non saltatorii.

62. LARIA Dulcamaræ.

El. long. lin. $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{1}{4}$.

Diagn. Thorax cum elytris punctatis, castanei
fere coloris.

In floribus *Solani dulcamare*, Aug. M.
Minor priore.

63. LARIA Salicis.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Caput deflexum. Thorax elytris concolor;
albo puncto in medio marginis postici. Elytra
striata, fusco-grisea, ab domine breviora; punctis
(5) posticis albis contiguis ad instar fasciæ transversæ.

Habitat in *Salice viminali*, Majo M.

Caput inclinatum, fuscescens. Anten. basis &
articuli primi tres rufi, alii nigri. Figura thoracis
quæ *Scarabæorum*; denticulo laterali obsoleto. Elytra
punctatim striata, uno puncto albo antico ad
marginem internum. Abdominis segmenta subtus
puncto albo utrinque notata. Anus albus; punctis
nigris duobus. Femora postica dente instructa.

64. LARIA Sileris.

El. long. lin. 1. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Fusca; elytris abbreviatis, immacula-
tis, striatis.

Habitat in floribus *Laserpitii sileris*.

Priore triplo fere minor, tota fusca & nigri-
cans, sine punctis albis & absque dente femorali.

CUR.

CURCULIO.

LINN. Syst. Nat. p. 377.

Proboscis antennifera. Thorax cotyleformis.

Manus 3 articulis. Corpus tardigradum, caddendo contractis artubus ab hoste fugiens.

* Recticornes.

(†) crassus & brevi rostro (x)

65 CURCULIO Piger.

El. long. lin. 5. lat. 2.

Diagn. Rostrum striis elevatis senis : lateralibus apice conjunctis. Femora antica clavata.

In Caricibus & Cirio 5. 6. Acanthoide Fl. Carniol.

Fuscus est, & superne ubique punctis elevatis scaber, subtus villosus. Elytra difficulter separabilia & fere coalita. Valleculae inter striae rostri rufo villo pubescentes, media vero omnium minus. Oculi margine albo. Femora omnia mutica (xx). Nunquam volat.

66. CURCULIO Albinus.

El. long. lin. 3. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 385.

Faun. Svec. 2. 632.

Diagn. Anten. corporis longitudine. Thorax tuberculis tribus.

In hortis & pomariis.

Supra murinus est, subtus albicans. Anten. lin. 4½. longæ, nigræ: articulorum apicibus albis, septimo infra medium albo. Proboscis & caput albi coloris. Oculi nigri. Elytrum apice, punctisque tribus albis, tuberculis 4. in seriem, margini interno parallelam, ordinatis: antico remotiore.

D 4

67.

(x) Proboscis *crassa* nobis dicitur illa, quæ femoribus crassior; *brevis* vero, quæ thoracis longitudinem non æquat (mensura ducta ab oculis exclusive ad apicem usque), & econtra.

(xx) In omnibus crassi - & brevirostribus nostris.

67. CURCULIO *Resinofus.*

El. long. lin. 3. lat. 2.

Diagn. Niger, scaber; abdomine subtus elytrisque apice albidis.Habitat in arboribus *resiniferis*, *Abiete*, *Pino*, *Picea*.

Antennæ nigræ. Thorax duas fere lineas longus, rotundatus; dorso planiusculo; lateribus obtusis. Elytra scabra, ut & Thorax, sed impressis punctis lineata; apicibus deflexis, albis. Pedes nigri. 2. Julii captus circa *Idriam*, in sylvis.

68. CURCULIO *Iners.*

El. long. lin. 4. lat. 1½.

Diagn. Rostrum linea unica elevata. Elytrum striis 10 punctatis.

Captus in via publica, 5. Maji.

Caput & thorax fusco-grisei coloris. Striga fusca in thorace, ab oculis ad basim usque utrinque decurrens. Elytra coadunata, obscuriora. Corpus subtus villosum. Pedes postici remotiores. Femora antica crassiora.

69. CURCULIO *Piceus.*

El. long. —. lat. —.

Diagn. Thorax & elytra picea. Abdomen nigrum: subtus albidum. Femora clavata.

Iconem & descriptionem misit R. P. WULFEN. S. J.

Parvus est, oblongus: subtus fuscus, sed albedo polline adspersus. Thorax elytris concolor, margine obscure flavescente, basi tuberculo oblongo lutescente. Elytra lineata. Alæ hyalinæ. Femora glabra. Proboscis medio obsolete sulcata, pedesque ad microscopium villofi.

70. CURCULIO *Erraticus.*

El. long. lin. 2. lat. ¾.

Diagn. Rostrum apice concavum. Elytrum villosulum, striatum: stria tertia tuberculata.

In aridis, incultis, ruri degit.

Supra fusco-ferrugineus, subtus albido prostrato villo canescens. Tibiae elytro concolores.

Curculio. COLEOPTERA. Curculio. 25.

71. CURCULIO Collaris.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. *Attelabus Coryli.*

Faun. Svec. 2. 638.

Diagn. Caput ovatum lucidum, nigrum collo instructum.

In *Corylo* saepe vidi.

Thorax ruber, nitens, laevis: puncto dorsali nigro. Elytrum rubrum: striis longitudinalibus punctatis decem. Femora basi & apice nigra, alibi rubra, crassa. Tibiae, abdomen, pectus, rostrum antennae, nigra.

72. CURCULIO Nitens.

El. long. lin. $1\frac{2}{3}$. lat. 1.

Diagn. Niger; thorace & elytris rubris.

Facies prioris, sed diversus anten. articulis tribus primis rubris; capite nec ovato nec collo impolito; thorace sine puncto nigro; elytro striis 8; femoribus nigris; domicilio incerto.

73. CURCULIO Fagi.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 381.

Diagn. Totus niger; femoribus posticis crassioribus.

In *Corylo* captus, 30. April.

Totus villo brevi pubescens. Caput gerit rostro nihilo brevius. Elytra striatim punctata. Femora postica elliptica. Alæ fuscescentes. Foveola ad marginem internum elytri, medio loco posita.

Maris femora crassiora sunt, nec pallidiora; sed neque dicendus *Longirostris*, noster saltem.

74. CURCULIO Populi.

El. long. lin. $1\frac{2}{3}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Color, facies, & omnia prioris, sed femora æqualia.

In *Pcpulo alba* captus 10. Maji.

Rostrum antice magis dilatatum, quam in priore. Fovea elytri nulla.

(†) crasso & longo rostro.

75. CURCULIO Pulverulentus.

El. long. lin. 5. lat. fere 2.

D 5

Diagn.

Diagn. Thorax punctis prominulis scaber. Elytra transversim rugosa.

Cum flores continuo frequentet, ita polline antherarum ubique adspersus occurrit.

Fuscus totus, & Gentis suae cunctator. Rostro tereti. Anten. rufescentibus. Elytris subcoadunatis, subtus tenui prostrato, subrufo villo pubescens. Femoribus muticis.

76. CURCULIO *Centaureæ.*

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Fuscus totus ovatus, tenui, subrufo villo adspersus; rostro deflexo, marginato: linea ad apicem elevata media.

Duos legi in floribus *Centaur. scabiosæ.*

Oculi nigri. Elytrum striis decem. Femora mutica. Vix dici potest, an rostrum thorace longius sit, aut eidem æquale.

77. CURCULIO *Auratus.*

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Totus viridi-auratus; antennis rostri-que apice dilatato nigris.

In plantis variis.

A *Cupreo* diversus est, cum neque obscure æneus, neque subitus obscurior sit, sed totus homogeneo aurato-viridi colore nitens, & villosus. Caput, thorax, & elytra congestis prominentibus punctis scabra. Oculi nigri. Rostrum basi sulco lateralí antenna terminato nigra. Femora mutica.

78. CURCULIO *Violaceus.*

El. long. lin. 2. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 378.

Faun. Svec. 2. 579.

P. PODA. Mus. Græc. p. 28.

Diagn. Totus ex cæruleo-violaceus; antennis nigris.

In agro *Vipacensi*, & alibi in vitibus.

Statura prioris. Proboscis thorace certe modice longior, sulco lateralí & apice dilatato ut in *Aurato*, seu *Cupreo* Cl P. PODA. Villosus superne non est, totus tamen ibidem punctatus: punctis prominulis, ad elytra quasi in lineas dispositis. Fe-

mora

Curculio. COLEOPTERA. Curculio. 27

moia mutica. In hac & priore specie folus apex rostri femoribus omnibus crassior est, non vero basis.

(†††) tenui et longo rostro.

(α) femoribus dentatis.

79. CURCULIO Carbonarius.

El. long. lin. 3. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 382.

Faun. Svec 2. 614. descriptio non
consentit.

Diagn. Toton niger & punctatus; elytris
apice albicantibus; rostro deflexo.

In Carniola super. non frequens.

Rostrum, caput & thorax, punctis prominulis scabra. Thorax dorsalibus transversis tribus papillarum fasciculis, tubercula referentibus. Elytra punctatim striata: punctis profunde insculptis. Femora omnia macula pallida, binisque dentibus.

80. CURCULIO Tuberculatus.

El. long. lin. 1 $\frac{2}{3}$. lat. 1.

Diagn. Niger; thorace lateribus albidis; elytro seriebus 4 tuberculorum.

Reperi in *Scrophularia nodosa*.

Globosus est, rostro inflexo, ut in *Hemipteris*. Femora postica unidentata. Pectus sub elytro maculis 2 lateralibus, marginis eiusdem concoloribus.

81. CURCULIO Cariosus.

El. long. lin. 1 $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. oblongus; rostro porrecto, tereti, nitidulo; elytris striatis; femoribus anticis crassioribus & majore dente notatis.

In truncis cariosis *Pyri communis*.

Fusco-rufescens. Elytrum striis 10 punctatis. Pedes fulvo-ferruginei.

82. CURCULIO Syngenesiae.

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Cervinus, brevissimis villis aspersus; rostro nigro: apice nitido.

In Floribus *syngenesiae*.

Ely-

28 Curculio. ORDO I. Curculio.

Elytra striata. Corpus subtus pallidius. Femora exiguo, obtusiusculo dente notata.

83. CURCULIO Urticæ.

El. long. lin. 1. lat. lin. $\frac{1}{2}$.

An *Curculio Ovatus* LINN.?

Diagn. Rostrum incurvum. Elytra nigra: puncto lineaque lunata ad apicem albis.

Inveni copula iunctos in *Urtica dioica*.

Totus fuscus, ovatus, niger. Elytra lucido exiguo villo adspersa, striata; puncto albo in medio lineaque alba arcuata ad apicem posita. Thoracis latera albo-argentea. Pedes nigri; femoribus omnibus unidentatis; tibiis, manibusque rufis.

(β) femoribus muticis.

84. CURCULIO Cerasi.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 378.

Faun. Svec. 2. 583.

Diagn. totus niger & opacus; thorace punctis scabro; elytris striatis scabriusculis.

In *Pruno ceraso* saepe vidi.

Rostrum deflexum. Elytrum striis 10. Corpus subtus punctatum.

85. CURCULIO Icosandriæ.

El. long. lin. $\frac{3}{4}$. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Color atro-cæruleus. Rostrum porrectum. Elytrum striis. 8.

In Arboribus, *calycifloris* ♂ *bacciferis*.

Oblongus est, & punctulatus, parvus, agilis, anten. basi ita adpressa rostro, ut recticornis videatur (*).

86. CURCULIO Purpureus.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 378.

Faun. Svec. 2. 585.

P. Po-

(*) Quod in *Curcul. Longi*-♂ *Tenuirostribus* omnibus facillime accedit, ut forte et mihi.

Curculio. COLEOPTERA. Curculio. 29

P. PODA. Mus. Græc. p. 29.

Diagn. Totus ruber; elytris striatis: striis 8 punctatis; oculis nigris.

In herbido colle 24. Aprilis aliquos reperi, circa Idriam.

Nostris nitor nullus. Caput & thorax punctatus. Rostrum apice modice nitens. Ungues nigri.

87. CURCULIO Cærulescens.

El. long. lin. 1*½*. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Color obscure cœruleus. Rostrum deflexum. Elytrum striis decem.

Inveni in *Pyro communis* 27. Aprilis.

Diversissimus a *Cure. Icosandriae*.

88. CURCULIO Oleraceus.

El. long. lin. 1. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Globosus est, nigricans; elytris puncto lineaque lunata ad apicem albi coloris.

In *Urtica dioica*.

Mas thoracis latere utroque unidentato. Fæm: thorace mutico; utrique Rostrum inflexum. Thorax, costæ, & corpus subtus grisei coloris, elytra striata: striis 10. Tibiæ ferrugineæ.

(**) *Infracticornes.*

† Crassirostres, calcarati.

89. CURCULIO Granarius.

El. long. lin. 1. lat. lin. $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 378.

Diagn. Totus piceus, punctatus, fere cylindricus; thorace longitudinem elytorum vix non æquante.

Habitat in grenis *Tritici* & *Avenæ*.

Longitudo animalis, non computato rostro, duas lineas; latitudo dimidiam habet.

Elytra connata video tam in propriis exemplaribus, quam in eo quod ex *Styria* misit R. P. PODA. Thorax densius punctatus. Elytra striatim punctata: margine exteriore pedibusque rufescentibus. Femora antica crassiora.

90. CURCULIO *Gemmatus*.

El. long. lin. 3. lat. 2.

Diagn. Apterous, niger; elytris coadunatis scabris maculatis: maculis argenteo-viridibus.

Frequens in plantis et fruticibus, sylvosis umbrosisque locis.

Mas minor; maculis cæruleoscentibus. *Fæmin.*
idi auratis.

Totus punctis scaber. Anten. villosæ, thorace duplo longiores. Caput villosulum. Rostrum lineam longum, apice dilatatum. Thorax punctulis parvis cæruleoscentibus variegatus. Corpus & femora villis prostratis adspersa, eaque omnia unidentata.

Variat thorace sine punctis cæruleis, iisdemque paucis & exiguis ad Elytra.

91. CURCULIO *Argentatus*.

El. long. lin. 3. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 384.

Faun. Svec. 2. 624.

P. PODA. Mus. Græc. p. 30.

Diagn. Niger est, sed villo tenui prostrato argenteo, præsertim subtus, adspersus; femoribus antennisque rufis.Reperi in *Corylo*, & alibi, sed in *Urtica* nondum.

Elytrum punctorum seriebus longitudinalibus novem lineatum, basi & apice magis quam in medio argenteo nitore fulgens. Anten. clava, una cum rostri apice, nigra. Femora postica unidentata: dente minus evidente, ac in priore.

92. CURCULIO *Anthracinus*.

El. long. lin. 2½. lat. 1.

Diagn. Totus niger. Elytra punctatim striata. Femora omnia unidentata.

In Carniola super.

Rostri apex villis paucis instrutus. Thorax punctis prominulis scaber. Elytra minime scabra, striis 9, fere coalita. Alæ vix ullæ. Antennæ villosæ.

93. CURCULIO Trifftis.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

Diagn. Fuscus. Elytra punctis scabra, substriata, villosula, coadunata.

Circa *Idriam* collegi.

Statura prioris, apterus, fusco-niger; thorace elytrisque scabris & ita villolis, ut nudo oculo inspecta, punctis pallidioribus variegata se prodant. Femora omnia dentata, lucidiora villosa.

94. CURCULIO Infidus.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

Diagn. Nudis oculis inspectus obsolete cupreus, ad lentem vero cærulecentibus nitidis prostratis villis superne adspersus adparet.

In plantis, rarer.

Oculi nigri. Antenn. clava fusca, cæteri vero articuli una cum pedibus rufescentes. Femora omnia dentata.

95. CURCULIO Pruni.

El. long. lin. 2. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Villosum, niger; antennis, elytris, pedibusque rufis.

Habitat in *Pruno domestica*, cuius folia crispat, convolvit, vitiat.

Oculi nigri. Caput & thorax punctis scabra. Elytrum pellucens, punctatim striatum: punctorum duplicatorum seriebus 9, margine externo nigricante. Femora omnia unidentata.

96. CURCULIO Coelestinus.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Totus cæruleus; antennis pedibusque ferrugineis.

In plantis & fruticibus non rarus.

C. Argentato proximus, sed in utroque sexu idem color. Femora subdentata.

97. CURCULIO Glaucus.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Fuscus est, sed glaucescente tenui prostrato

strato villo adspersus, nullibi icaber; elytris punctatim striatis.

In foliis arborum.

Statura Curc. Argentati. Elytrum humero prominulo & subdentato. Corpus alatum, subtus nigrum. Femora nitidula, crassa, magno dente notata.

98. CURCULIO *Rufipes.*

El. long. lin. 2. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Fuscus est, villosulus, parumper nitens; antennis pedibusque rufis.

In foliis *Pruni domesticæ.*

Caput & thorax punctis prominulis scabra. Elytra punctatim striata. Femora omnia dentata.

(††) crassirostres inermes.

99. CURCULIO *C. album.*

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. 2.

Diag. Cupreo-nigroque varius; angulo externo baseos elytri singuli linea arcuata alba, litteram C referente signato.

Habitat circa oppida & pagos. *Græcio* quoque misit Doctiss. & R. P. PODA.

Statura Gemmati. Corpus totum laxis villis adspersum & scabriuscum. Elytra coadunata; punctorum impressorum seriebus (7). Femora singula uno dente armata.

100. CURCULIO *Sensitivus.*

El. long. lin. 5. lat. $1\frac{3}{4}$.

Diagn. Niger est; femoribus fulvis: apice nigris.

Habitat in sylvis.

Elytra planiuscula, ubique striata. Rostrum indivisum. Alæ nullæ. Elytra coadunata.

Captus se valde torquet, & a longe ab hoste fugit, unde ratio nominis.

101. CURCULIO *Nemoreus.*

El. long. lin. $4\frac{5}{8}$. lat. 2.

Diagn. Apterous, niger, opacus; rostro bifido; capite glabro; thorace, elytrisque scabris, acuminatis.

Habi-

Habitat inter *Abietes*.

Antennæ elytri longitudine. Elytra apice duntatata striata, acutiuscula. Femora omnia clavata; neque tamen *Paraplecticus* LINN.

102. CURCULIO Momus.

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Proboscis superne sulcis duobus. Abdomen inter pedes posticos fulvo villo tomentosum. Femora antica crassiora.

In *Carniola calidio*re.

Totus fuscus est, sed cinereo-rufus, prostrato villo, pollinis in modum, ita tectus, ut cinerascens videatur. Antennæ thoracis longitudine. Thorax antice utrinque lineola una sublunata, postice vero punctis binis pallidioribus. Elytrum in medio macula rotunda, & ad apicem puncto pallidiore. Alæ nullæ.

103. CURCULIO Zoilus.

El. long. lin. 3. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Rostrum deflexum. Elytrum striatum, & punctis nigris variegatum: uno maiore communis ad apicem.

In *Austriaco Literali*.

Totus villosus, supra terrei coloris; lateribus lineisque elytorum pallidioribus. Striae elytri alternae nigris punctis variegatae: spatiis interiectis punctatis. Elytra coadunata. Alæ nullæ. Ingenium vecors.

104. CURCULIO Palustris.

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Proboscis thorace longior. Thorax linea laterali, pallidiore.

In aquosis locis & paludosis, supra *Carices*.

Rostrum apice dilatum. Thorax elytris obscurior: linea albida laterali. Elytra coadunata, cineracentia, albo puncto in medio signata. Abdomen subtus maculis (4) subluteis lateralibus. Femora annulo albo fasciata. Penis incurvus, bifidus.

(†††) Tenuirostres, calcarati.

105. CURCULIO Nucum.

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 383.

P. PODA. Mus. Græc. p. 29.

ROESEL. Suppl. Scarab. Terr. Cl. IV.

Tab. 67. fig. 5 6.

Diagn. Griseus, ovatus; rostro longitudine corporis.Habitat in *Coryli avellanae* nucleis.Rostrum lin. 3 $\frac{1}{2}$. longum, rubens, politum. Oculi nigri. Scutellum quadratum: angulis anticis obtusis.

106. CURCULIO Quercus.

El. long. lin. 1 $\frac{2}{3}$. lat. 1 $\frac{3}{4}$.*Diagn.* Niger; scutello trilobo: lobo antico minore albo; elytro unipunctato: puncto albo.Habitat in *Quercu robur*.

Rostrum nitens, nigrum, corpore paulo brevius. Elytra pallidiore villo pubescentia. Punctum album utrinque supra seniora media ad basim elytri.

107. CURCULIO Punctatus.

El. long. lin. 1 $\frac{3}{4}$. lat. 1.*Diagn.* Niger; thorace albido; elytro itris elevatis 5 nigris, albo punctatis.

Circa Idriam repertus 18. Maji.

Rostrum nigrum, deflexum, thorace longius, elytris brevius. Antennæ rufescentes. Caput nigricans. Thorax albidis villis pubescens. Elytra villosula. Abdom. supra rufescens. Pedes fusco-albo-que varii.

108. CURCULIO Fasciatus.

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* rufus, villosulus; elytro fasciis duabus obscurioribus, obsoletis.

In sylvis.

Oculi & apex rostri, nigri coloris. Pedes antici longiores & crassiores.

109. CURCULIO Praecox.

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. 1.*Diagn.* Ferrugineus; elytra striata, villosula. Nativitas sub finem Aprilis.

In

Curculio. COLEOPTERA. Attelabus. 35

In Salice *Viminali.*

Rostrum & caput coloris obscurioris. Thorax punctatus.

ATTELABUS.

Caput postice attenuatum, oculis prominentibus.

Thorax, diametro capitis (ab uno ad alium oculum desumpta) nihilo latior, & cylindraceus.

II. ATTELABUS *Aparius.*

El. long. lin. 5. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 388.

P. PODA. Mus. Græc. p. 31.

Diagn. Atro cœruleus, villosus; elytris rubris: apice fasciisque binis, atris.

In Floribus *Centaureæ jaceaæ*, *Cardui mariani*, *Achilleæ millefol.* aliorumque, quorum nectare, & semisoluto antherarum polline vicitat, vere *Anthophilus*.

Caput inclinatum: apice emarginatum. Maxillæ unidentatae. Palpi minores: articulis duobus ferrugineis: ultimo trigono. Antennæ ferrugineæ: articulis 3. fuscis majoribus clavatae. Elytra, apice dempto, ubique ejusdem latitudinis, ut in sequentibus etiam speciebus. Alæ fuscescentes. Abdomen supra rubrum, subtus una cum pedibus atro-cœruleum & nitens. Femora postica longiora, crassiora, curvula.

III. ATTELABUS *Formicarius.*

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. $\frac{5}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 387.

P. PODA. Mus. Græc. p. 31.

Diagn. Niger; elytro fasciis duabus albidis: basi rubro; corpore rubro; lingua longissima P. PODA.

Habitat ruri.

Thorax subcordatus. Elytri fascia una tenuior & subtus rubella; idem subtus nitens lineisque pallidioribus striatum. Manus rubellæ.

112. ATTELABUS *Lilii*,El. long. lin. 2 $\frac{2}{3}$. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. 375. Chrysom. Merdigera 62.

J. BAUCH. hist. plant. 2. p. 695. insecta rubella.

Diagn. Niger, nitens, thorace elytrisque rubris.In *Lilio chalcedonico*, *baccifero*, & *seciis*.

Thorax in medio leniter coarctatus, seu utrinque impressus. Elytrum striis 10. punctatis: punctis subtus flavicantibus punctoque nigro ocellatis.

113. ATTELABUS *Asparagi*.

El. long. lin. 2. lat. fere 1.

LINN. Syst. Nat. p. 375. Chrysom. 70.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. III. Tab. 4. fig. 3.

Diagn. Atro-cæruleus; thorace fulvo; elytro margine externo fasciis 2. dimidiatis, punctoque ad basim, aurei coloris.*Habitat* in *Asparago officin.* ROESEL. FRISCH.

Elytri fasciæ apice suo obtuso & dilatato non attingunt marginem oppositum. Thorax in hoc & sequentibus, latera impressa non habet.

114. ATTELABUS 5-Punctatus.

El. long. lin. 2. lat. $\frac{2}{3}$.*Diagn.* Niger; thorace fulvo; elytris pallidioribus; punctis 5: uno communi & majore.In *Austriaco Littorali*.

Elytri apex niger, punctum baseos minus, posticum majus, subrotundum, medium vero & commune maximum ovatum. Thorax ad basim puncto nigro notatus.

115. ATTELABUS 12-Punctatus.

El. long. lin. 2. lat. $\frac{2}{3}$.*Diagn.* Fulva sunt, caput, thorax & elytrum quodlibet punctis sex nigris.*Habitat* cum priore.

Flytri punctum baseos solitarium in angulo externo, hoc sequuntur duo opposita, alia vero alternantia sunt. Oculi, & antennæ nigri coloris.

Variat.

Attelabus. COLEOPTERA. Cassida. 37

Variat. 1. Pectore, pedumque geniculis nigris.
LINN. Syst. Nat. p. 376. Chrysom. 67.
2. Corpore toto subtus pedibusque nigris.

116. ATTELABUS 14. *Punctatus.*

El. long. lin. 2. lat. fere 1.

Diagn. Thorax fulvus punctis tribus nigris. Elvtrum pallidius punctis septem: uno in apice sito.

Ibidem.

Caput fulvum; macula verticis, oculis, antennis, palpisque nigris. Abdom. subtus fulvum. Femora fulva: basi & apice nigra.

C A S S I D A.

Caput sub thoracis clypeo plano reconditum.

117. CASSIDA *Viridis.*

El. long. lin. 3. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 362.

Faun. Svec. 2. 467.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. III. Tab. 6.
fig. 4. 5.

Diagn. Clypeus cum elytris virens. Corpus nigrum. Anten. infra medium, abdominis margo, pedesque ferruginei coloris.

Passim occurrit.

Antennæ extrorsum crassiores & obscuriores. Elytra punctata, subtus plica corpus protegente. Variat elytri angulo scutelli rubro.

118. CASSIDA *Noctiluca.*

El. long. lin. 5. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 400. Canth. 1.

Faun. Svec. 2. 699.

P. PODA. Mus. Græc. p. 39. Canth. 1.

Carniol. Kerschnitzia.

Diagn. Segmenta duo ultima abdominis alba lucem in tenebris spargunt.

Circumvolat noctu, circa solstitium æstivum.

Antenn. apice attenuatæ. Thorax subpellucens, elytris pallidior, antice rotundatus. Elytra

fuscescentia, flexilia, lin. 3. elevatis. Abdomen
marginē dentato.

119. CASSIDA Sanguinea.

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 401. Canth. 13.

Faun. Svec. 2. 704

FRISCH. Ins. 12. Tab. 7. fig. 2. p. 39.

P. PODA. Mus. Græc. p. 40. Canth. 3.

Diagn. Thorax & elytra coloris scarlatini, ali-
bi ubique nigra.

Inveni in *Fago*, & *Salice caprea*.

Thorax plicis quatuor in formam crucis. E-
lytrum lineis elevatis (4): binis seriebus puncto-
rum inter binas quasque lineas. Variat elytris lin.
 $2\frac{1}{2}$. longis.

CANTHARIS.

Thoracis clypeus convexus, caput minime te-
gens. Elytrum membranaceum, flexible, non
truncatum apice.

(*) *Thorace lateribus rotundatis.*

120. CANTHARIS Fusca.

El. long. lin. 5. lat. $1\frac{1}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 401.

Faun. Svec. 2. 700.

P. PODA. Mus. Græc. p. 40.

Carniol. Schuster.

Diagn. Anten. basis & thorax fulvi coloris.
Caput & elytra fusca.

Fulvum colorem habent basis antenn. harum-
que articuli 2, 3, 4, caput infra antennas, thorax,
abdomen, femorum pars maxima. Fusca vero sunt
alia omnia. In adultis clypeus maculam nigram
in medio gerit. Oris labium inferius integrum.
Penis ferrugineus: vagina bivalvi, terminatus glan-
de carnosa subumbilicata.

Variat 1. Thoracis macula ovata, transversa.

2. — — — obcordata.

3. Femoribus tibiisque fulvis.

— — — maxima parte fuscis.

121. CANTHARIS *Obscura.*

El. long. lin. $4\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 402.

Faun. Svec. 2. 706.

Diagn. Tota fuscæ est, sed thoracis & abdominis margo ruber.

In Carniola Istriaca.

Cæterum qui videt fuscam, & hanc videt. Ill.

LINNÆUS parvum specimen descripsit, quod & ego possideo, elytris lin. 3. longis, quæ tamen nigra dici non possunt.

122. CANTHARIS *Livida.*

El. long. lin. 4. lat. $\frac{3}{4}$

LINN. Syst. Nat. p. 401.

Faun. Svec. 2. 701.

Diagn. Tota testacea; thorace obscuro; oculis nigris.

In Carniola calidore.

Tota villosa. Palpi articulus ultimus apice niger

123. CANTHARIS *Testacea.*

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 22.

Faun. Svec. 2. 714.

Diagn. Elytra Livida. Thorax pallide luteus: macula nigra conica: apice bifida.

Thoracis macula nitens. Abdominis apex pedesque ferruginei. Antennæ fuscæ: articulis (5) primis ferrugineis.

124. CANTHARIS *Fulva.*

El. long. lin. $3\frac{1}{4}$. lat. $\frac{3}{4}$.

An eadem, quæ *Rufa* LINN. Syst. Nat. p. 401?

Diagn. Rufo-ferruginea, thorace fulvo, elytris apice oculisque nigris.

In floribus plantarum *Umbelliferarum*, præcipue *Athamantæ oreosel.*

Antennæ fuscæ. Palpi nigricantes. Caput fulvum & nitens, ut thorax. Elytra villosa. Alæ fuliginosæ.

125. CANTHARIS Caudata.

El. long. lin. 2. lat. $\frac{3}{2}$.*Diagn.* Abdomen terminatum cauda brevi bifida.

Circa aquas, in umbrosis.

Tota ferruginea. Oculis, abdomine elytrisque media parte aut fere penitus nigris. Thorax villosus, rufescens, immaculatus. Anten. articuli plerique nigri. Elytra villosa, pellucida.

126. CANTHARIS Aenea.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 402.

Faun. Svec. 2. 708.

P. PODA. Mus. Græc. p. 40.

Diagn. Viridi ænea; capite sub antennis, thoracis margine laterali, elytrisque margine externo apiceque rubris.In paniculis *Graminum*, & *Spinacea olerac.*

Maxillæ luteæ. Antennæ fuscæ, thorace duplo longiores, externo latere subdentatæ. Elytra subtus nigra sunt, ubi supra viridi-ænea.

127. CANTHARIS Bipustulata.

El. long. lin. 2. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 402.

Faun. Svec. 2. 709.

P. PODA. Mus. Græc. p. 40.

Diagn. Viridi-ænea; capite sub antennis flavescente, elytris apice rubris.In paniculis *Graminum*, non rara.

Ante inæ articuli duo primi fere omnino lutei. Capitis antica & flava portio punctis dyobus atris.

128. CANTHARIS Minima.

El. long. lin. 1. lat. $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 402.

Faun. Svec. 2. 713. nostræ Varietas.

Diagn. Nigra; thorace, antennis, elytrisque apice fulvis.

In paniculis Foæ.

Cantharis. COLLECTRA. Cantharis. 41

Antennæ elytro longiores, aut æquales. Thorax sine macula nigra. Abdomen macula laterali aliaque media subtus colore thoracis.

129. CANTHARIS Fasciata.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 402.

Faun. Svec. 2. 711.

Diagn. Nigra; elytri apice, & fascia abrupta, rubris.

Inveni in floribus *Scabiosæ officin.*

Hæc villosa non est. E nigro colore thoracis obscurus quidam viror translucet. Elytri fascia non attingit marginem oppositum. Duo prima abdominis segmenta margini in medio rubrum habent.

130. CANTHARIS Marginata.

El. long. lin. 2. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigra; elytris fulvis: margine interno nigris, punctorum impressorum seriebus 9.

In *Carnolia super.*

Antennæ villosulæ. Thorax in medio lævis, lucidior: margine scabriuscuso. Elytra raris, exiguis villis adspersa.

131. CANTHARIS Pilosa.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigra, longis pilis ubique pubescens; antennis extrorsum crassioribus.

Circa *Tergestum* in paniculis *Bromorum & Festucarum* copiosa Majo & Junio.

Anten. elytro breviores, subdentatae: articulo ultimo ovato. Eadem extrorsum dilatatae ut in *Silphis & Coccinellis*, sed elytra, thorax, habitus *Cantharidis*.

132. CANTHARIS Squallida.

El. long. lin. 2. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Fusca; antennis basi tibiisque ferrugineis.

Non rara in hortis, Aprili M.

Antennæ elytro breviores: articulis æqualibus. Thorax marginatus. Elytra villosula, punctata. Alæ fuscescentes.

E 5

Va-

42 **Cantharis** **ORDO I.** **Cantharis.**

Varietatem nigram, elytris testaceis, reperi in floribus *Cherophylli sylv.* ut & æneo fuscum, in *Iyri*, *Pomi* floribus.

133. CANTHARIS Flava.El long. 2 $\frac{3}{4}$. lat. 1.

Diagn. Flava; culis palporumque articulo ultimo nigris.

In floribus plantarum *Umbellatarum*, præsertim *Dauci carot*, & *Athamantæ oreoselini*.

Quo referrem, hæsitavi. Facies longa & thorax ut in *Carabo*, sed elytra flexilia. Thorax marginatus, victus ex floribus, lamellæ denique femoralis absentia *Carabis* propria, *Cantharidem* esse docent. Antennis elytro obscurioribus. Maxillis prominentibus, acutis, edentulis, elytris obiter striatis, ad lentem villosis. Manibus nigris: unguibus rufis.

134. CANTHARIS Fraxinea.El. long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; elytris subdiaphanis, striatis, fulvis.

Reperi in paniculis *Fraxini petal.* in M. *Nanas*, supra *Prewald*.

Agilis valde, facie *Carabi Minoris*, aut *Lepture Frischianæ* quintæ Ins. 12. Tab. 6. pag. 36. sed character *Cantharidis*. Subtus villosa, superne nitidula. Antennis exterrsum crassioribus. Palpis minoribus, triarticulatis: articulis æqualibus.

135. CANTHARIS Serraticornis.El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; capite, thorace orbiculato, elytrisque fulvo-rufis; antennis totis, vel apice uno latere ferratis.

Apud nos non rara, præsertim in hortis.

Si antennæ essent pectinatæ, *Pectinicornem LINNÆI* ex hac facerem.

Antennæ articuli (5-6) ultimi, uno latere, in dentem elongati. Thorax linea media depressa, posse in foveam trigonam desinente, sulcatus. Scutellum tuberculis tribus. Elytra, ad lentem magis augentem, villosula.

(**) Tho-

CANTHARIS. COLEOPTERA. CANTHARIS. 43

(**) *Thorace lateribus subparallelis.*

I36. CANTHARIS Cærulea.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 403?

Diagn. Caput, thorax utrinque, elytra coloris cærulei. Abdom. subitus æneo-virens lucidum.

Inveni in floribus *Menthæ spicatæ*, & *Dauci carot.*

Antennæ fuscæ. Elytrum tribus lineolis elevatis. Alæ hyalinæ. Pedes ferruginei; sed tibiæ posticæ semifuscæ.

I37. CANTHARIS Spadicea.

El. long. lin. $2\frac{2}{3}$. lat. 1.

Diagn. Nigra; elytris testaceis, pellucidis, pilosiss.

Circa *Tergestum*.

Antennæ extrorsum leniter dilatatae. Thoracis crassities, est dimidia pars latitudinis elytri.

I38. CANTHARIS Fulvicollis.

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Nigra; thorace fulvo; elytris fuscis.

In Floribus plantarum *Umbellatarum*.

Caput, thorax, corpus subtus, pedesque nitent. Elytrum opacum: lineis tribus elevatis striatum, ad lentem villosum. Abdominis apex thoraci concolor.

I39. CANTHARIS Rufiventris.

El. long. lin. 3. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Thorax rufescens: linea dorsali longitudinali nigra. Abdomen rufum.

Cum priore.

Antennæ cum capite nigri coloris. Alæ hyalinæ. Abdom. supra fuscæscens. Femora nigra.

Variat. 1. Elytris nigricantibus.

2. — testaceis.

3. — testaceo-fuscis.

I40. CANTHARIS Ustulata.

El. long. lin. $3\frac{2}{3}$. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn.

41 **Cantharis.** **ORDO I.** **Cantharis.**

Diagn. Nigra; thorace rufo: linea dorsali nigra; elytris nigricantibus: interno margine ferrugineo.

In Floribus *Dauci*.

Priore major, & omnino diversa. Variat thorace nigro, & minore statura.

141. **CANTHARIS Tenebricosa.**

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Nigricans; femoribus anticis ferrugineis.

In Floribus.

Antennæ elytro æquales. Thorax scaber. Elytrum villosum: linea una elevata. Femora media fascia ferruginea, aut rufa.

142. **CANTHARIS Sericea.**

El. long. lin. 2. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Fusca & sericeo prostrato brevi villo ubique adspersa; antennis ballo, femoribusque ballo rufis.

In plantis *Umbelliferis*.

Antennæ elytri longitudine, extrorsum leniter dilatatae.

143. **CANTHARIS Parva.**

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Ænœ-fusca, villosa; antennis elytro duplo brevioribus.

Inveni in floribus *Laserpitii latifolii*.

Thorax subrotundatus, hinc ambigens inter hunc & priorem ordinem. Anten. extrorsum dilatatae: articulis 8. Elytra absque lineis. Tibiae anticae subrufæ.

(***) *Elytris apice attenuatis.*

144. **CANTHARIS Pthyfica.**

El. long. lin. 3. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigra; elytris testaceis marginatis: marginé nigro.

In plantis *Umbellatis*.

Alæ hyalinæ. Subtus nitens corpus.

145. CANTHARIS Femorata.

El. long. lin. 3. lat. $\frac{3}{4}$.*Diagn.* Nigra; elytris spadiceis; femoribus posticis crassissimis, gibbis.

Cum priore.

Elytrum totum colore elytri Scarab. Melolonth. Femora distinguunt a priore.

146. CANTHARIS Nobilis.

El. long. lin. 3. lat. $\frac{3}{4}$.*Diagn.* Solo homogeneo cæruleo colore diversa a priore.

In Plantis.

LEPTURA.

Thorax subrotundus, attritu ad posticam subiectam laminam nullo, aut nullum sonum edente. Elytra rigida. (†)

(*) Elytris apice truncatis.

147. LEPTURA Aquatica.

El. long. lin. $2\frac{3}{4}$. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 397.

Faun. Svec. 2. 677.

P. PODA. Mus. Græc. p. 36-37.

Diagn. Femora postica dente notata.

In paludibus & lacubus.

Antennæ elytro breviores. Elytrum striis 9. punctatis, minutisque transversis rugulis ad lentem crispatum. Oculi nigri, prominuli. Diversimode coloratae in copula reperiuntur, nempe.

I. Cæ-

(†) Hos video limites separantes *Cantharides* a *Lepturis*, has vero a *Cerambycibus*; nec alias haec tenus detegere potui; sed & antennæ *Cerambycibus* evidenter attenuatae, quæ potius sectaceæ in *Lepturis*. Sic omnino insuperabilis est difficultas in statuendis essentiis eorum Generum, quas ineffabilis & occulta quædam habitui inhærens notarum determinat harmonia.

1. Cærulescens.
2. Aurato-virens.
3. — rubra.
4. — rufa.
5. Fusca.

6. Violacea. P. PODA. l. c.

Nihil obstaret esse speciem *Cicindellæ*, si lamelam femoralem hujus Generis (nostrarum) gereret.

148. LEPTURA Rubra.

El. long. lin. $5\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 397.

Faun. Svec. 2. 681.

FRISCH. Insect. 12. Tab. 6. fig. 6. p. 37.

Diagn. Nigra; thorace, elytris, tibiisque rubris.
In Carniola, non rara.

Occiput saepe rubrum. Pilis sericeis, subaureis, parvis ubique pubescens. Linea depressa in occipite & thorace per medium decurrit, obscura tamén. Thorax & elytra punctata. Feinora postica modice incurva.

149. LEPTURA Melanura.

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 397.

Faun. Svec. 2. 678.

Diagn. Nigra; elytris fordide flavescentibus: apice nigris.

In Floribus.

Caput, thorax, elytra punctata villosa.

Variat. 1. Elytris lividis: apice & externo margine nigris.

P PODA. Mus. Græc. p. 37.

Inveni in spica *Plantaginis majoris*.

2. Elytris obsolete lividis: apice nigris.

In umbellis *Athamantæ oreosel.* priore minor.

150. LEPTURA Sanguinolenta.

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. Faun. Svec. 2. 679.

Diagn. Nigra; elytris rubris.

In *Umbelliferis* plantis.

Leptura. COLEOPTERA. Leptura. 47

Differt a *Lept.* *Rubra* solis elytris rubris, defectu sulci occipitalis & lineæ thoracicæ, abdominis apice truncato, statura minore.

151. LEPTURA Dubia.

El. long. lin. 4. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Tota nigra, sed stria rubra per medium elytri longitudinaliter, a basi ad apicem usque producta.

Inveni in floribus *Spirææ arunci*.

An vere diversa a priore? an proles hybrida *Melanuræ* & *Vexillatæ*?

Variat elytro lin. 3. longo, margine interno apiceque nigro, alibi rubro.

152. LEPTURA Oculata.

El. long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 394. Cerambyx. 38.

Diagn. Rufa; capite, antennis, elytrisque nigris; thorace punctis duobus atris.

In floribus.

Caput inclinatum. Antennæ non evidenter attenuatae. Thorax an strideat, fateor, me nondum observasse. Elytrum seriebus novem punctorum impressorum: apice truncatum & fere bidentatum. Abdomen apice deflexo, truncato.

153. LEPTURA Parallelæ.

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Nigra; abdominis basi superne pedibusque flavescens.

Pariter Anthophila.

Capitis, thoracis, elytrorum, abdominisque latitudo ubique eadem fere. Antennæ elytro nihilo breviores, setaceæ. Caput inclinatum. Thorax subcylindricus. Elytrum seriebus (6) punctorum impressorum, margine baseos exteriore pedibus concole. Abdomen obtusum.

154. LEPTURA 4-Maculata.

El. long. lin. 3. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; elytro sordide flavescente: maculis 4. nigris.

Inveni in *Athamanta oreofel*.

An

48. **Leptura.** ORDO I. **Leptura.**

An Quadrivittata LINN. Syst. Nat. p. 397.

Maculae elytri anticæ duo binotatae, media duplo major solitaria, quarta apicem occupans.

Thorax subrotundus. Totum animal rufo sericeo tenui villo pubescens.

155. **LEPTURA Ruficrus.**

El. long. lin. $5\frac{1}{2}$ lat. lin. $1\frac{1}{2}$.

Diagn. Fusca; antennis basi, oculis, fenoribusque rufis.

Habitat in floribus. Eandem *Græcio* misit. R. P. PODA.

Antennæ elytro longiores. Maxillæ nigræ, nitidæ, prominentes. Oris labium superius hemisphericum, palpique rufi. Elytri margo exterior ad basim rufus, idem villo, lucido, albo pubescens. Thorax subtus & abdomen lucido pariter villo fulgent. Abdomen apice rufum. Genua nigra. Tibiae rufæ, apice nigræ.

(**) *Elytris apice rotundatis.*

156. **LEPTURA Bajula.**

El. long. lin. 5. lat. $2\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 396. Ceramb. 48.

Faun. Svec. 2. 672.

FRISCH. Infect. 13. Tab. 10. p. 17.

P. PODA. Mus. Græc. p. 36. Cer.

Diagn. Totus nigricans. Thorax tuberculis duobus lucidis atris, diametro sua latitudine capitatis fere duplo majore.

Fateor, ob elytri flexilitatem, malle me potius ad *Cantharides*, quam *Ceramlyces*, referre. Hic tamen posui ob elytra basi rigida, antennasque minime attenuatas, harumque articulum secundum primo & tertio breviorem. Huic caput & thorax magis villosa sunt quam elytra, quæ punctis prominulis scabra.

Variat elytro fusco-castaneo, macula subtriangularis cinerascente supra medium ad marginem internum.

157. **LEPTURA Cilindrica.**

El. long. lin. 3. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 394.

ROESEL.

Leptura. COLEOPTERA. Leptura. 49

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. II. Tab. 3. fig.
6. 7.

Diagn. Antennæ, caput, thorax linea alba, nigri coloris. Elytra & corpus subtus nigro-cinerea. Femora rufa.

In medulla ramorum *Coryli*. ROESEL. l. c. & ego in *Corylo* reperi.

Caput inclinatum. Antennæ toto corpore nihilo breviores, obscure attenuatae. Sub oculis macula albida. Elytra punctata. Femora rufa: basi nigra. Totum animal villosulum.

158. LEPTURA *Cantharoides*.

El. long. lin. 3. lat. 1.

Diagn. Nigricans; antennis, thorace rotundato, pedibusque fulvis.

In pratis subalpinis.

Caput antice fulvum, postice nigrum. Antennæ elytro longiores: articulis insensibiliter attenuatis: apice fuscis. Thorax capite amplior, ut in *Bajula*. Elytra fuscescentia, punctata, flexilia; hinc si quis hanc una cum *Bajula*, *Cantharidibus* adjungeret, non utique erraret. Abdomen nigrum: apice fulvum.

159. LEPTURA *Collaris*.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 398.

Diagn. Atro-cerulea; thorace globoſo abdomine neque fulvis.

In floribus *Chærophylli sylvestris*.

Thorax villosus, punctatus, capite paulo amplior. Elytrum punctatum villosum, subflexile.

160. LEPTURA *Cærulescens*.

El. long. lin. 3. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Thorax lineolis tribus pallidioribus.

In floribus.

Oculi nigri. Thorax cylindraceus. Elytrum striis duabus obsoletis, punctatum, subtus fuscum. Corpus antennis nihilo longius.

CERAMBYX:

Antennæ attenuatæ, graves. Thorax, attritu ad laminam posticam, stridorem edens.

(*) *Thorace dentato.*

161. CERAMBYX *Coriarius.*

El. long. lin. 9½. lat. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 389.

Faun. Svec. 2. 647.

ROESEL. Scarab. Terr. Cl. II. Tab. 1.

Fig. 1. 2.

FRISCH. Insect. 13. Tab. 9. p. 15.

P. PODA. Mus. Græc. p. 31.

Diagn. Thorax marginatus: dentibus tribus lateralibus: medio maiore. Antennæ breves: articulis subangulatis, semicordatis.

In putridis *Betulis*, *Quercubus*.

Palporum articuli apice ferruginei: ultimo truncato. Caput dente laterali utrinque infra maxillæ. Antennæ articuli plerique referunt valvam capsulæ *Thlaspi bursæ pastoris*, sed angulo superiore acutiore. Thorax lin. 2. longus, in utroque sexu utrinque tridentatus. Elytrum castanei coloris plus minus obscuri, lin. tribus elevatis obsoletis, antennis nihilo brevius. Femora articuli primi antennarum apice non crassiora.

162. CERAMBYX *Cerdo.*

El. long. lin. 7. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 392.

P. PODA. Mus. Græc. p. 33.

Diagn. Niger; thorace rugoso: rugis transversis.

In sylvis.

Definitio Celeberr. LINNÆI, huic & sequenti convenit, qui tamen conjungi nullo modo possunt; en notas diverlitatum. Præsens totus niger, duplo & triplo minor, habet antennæ articulos 4 primos cæteris breviores, & brevi villo canescentes; tarsum subtus albidum.

Cerambyx. COLEOPTERA. Cerambyx. 51

163. CERAMBYX *Heros.*

El. long. unc. 1. lin. 3. lat. lin. 4.

Diagn. Thorax nodosus; elytra castanea, basi obscuriora.

Circa *Labacum repertus.*

Antennæ articuli quatuor primi glaberrimi, politissimi: quarto exterioribus nihilo breviore. Alæ margo exterior fuscus, qui niger in priore. Abdom. apex villis rufis pubescens. Femora antica, exteriore latere, infra medium, transversis rugis lineata. Minus subtus fulvo-ferrugineæ. Tibiæ posticae dextra (in meo specimine) versus apicem, dente instructa; quibus notis differt a priore.

164. CERAMBYX *Textor.*

El. long. lin. 10. lat. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 392.

P. PODA. Mus. Græc. p. 33.

Diagn. Nigricans; punctis elevatis scaber; tibiis mediis obtuso dente notatis.

In putridis ædium antiquarum lignis abietinis, nec non in sylvis.

Oris labium superius mobile cordatum: margine lacero-ciliato. Maxillæ crassæ, edentatae. Antennæ articulis 10, de more gentis, teretiusculis, obtusis, glabris. Thoracis margo anticus pilis rufescentibus brevibus ciliatus. Elytra obtusa. Penis osseus, longus, linearis, terminatus corniculis membranaceis mobilibus, albidis, ligamento longo radicatus.

Variat 1. Elytro maculis subrotundis binis atris..

Huic elytra nigricantia aut cinerascentia, punctulis nigris elevatis. Antennæ corpore longiores; alias breviores.

2. Elytro immaculato.

Huic antennæ corpore nunquam longiores. Elytrum subtus lineis 4 ferrugineis.

165. CERAMBYX *Moschatus.*

El. long. lin. 10. lat. 2½.

LINN. Syst. Nat. p. 391.

Faun. Svec. 2. 652.

FRISCH. Insect. 13. Tab. II. p. 17-18.

P. PODA. Mus. Græc. p. 32.

Diagn. Elytra viridia. Odor moschi.

In falice viminali.

Totus nitens, & cæruleo-virens, elytris & quandoque etiam thorace virescentibus. Palpi articulus ultimus ad apicem canali insculptus. Elytrum tuberculofo-rugosum, subtus fuscum. Variat antennis corpore longioribus, brevioribusque.

166. CERAMBYX Alpinus.

El. long. lin. 10. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 392.

P. PODA. Mus. Græc. p. 32. pilosus, sed in Epist. alpinum vocat.

Diagn. Subcæruleus; antenn. articulis apice nigris, pilosis; elytris fascia media lata maculisque binis atris.

Apud nos non rarus, sed nunquam in alpibus a me visus.

Maxilla prope basim exterius dente notata. Antennæ cæruleæ: basi nitida, nigra, articulo primo basi nigro. Thorax antice macula hemisphærica, nigra; punctulis elevatis scabriusculus. Elytrum eodem modo punctatum; fasciæ & macularum margino lucidior elytri colore, idemque repandis. Antennæ corpore saepius longiores sunt.

167. CERAMBYX Cursor.

El. long. lin. 7. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 393.

Faun. Svec. 2. 658.

Diagn. Elytrum rufum: margine interno linea-que nigris.

In sylvestribus.

Antennæ rufæ, breves. Caput cum thorace nigricans, villosulum. Thorax prope marginem anticum & posticum leniter corrugatus, seu depresso, dorso longitudinali sulco exaratus. Ab elytri axilla tumida decurrit linea nigra, ad apicem usque non producta; apex elytri non est obtusus, sed mucronatus. Abdom. subtus rufum, villosum. Pedes abdomini concolores.

168. CERAMBYX *Arenarius.*

El. long. lin. 5. lat. 1 $\frac{2}{3}$.

LINN. In Epist. *Cerambyx Apterus*, quem ex *Hispania* & *Gallia* habui, apud nos non visus.

P. PODA. Mus. Græc. p. 34. pedestris.

Diagn. Niger, apterus; capite & thorace linea media longitudinali alba; elytris margine albo; antennis brevibus.

In viis & collibus arenosis *Carnioliae* calidioris.

Subtus cinereo veluti polline adspersus. Tibiæ mediae tuberculo instructæ.

Variat 1. Superficie supera lucidiore, antennis basi, pedibusque fulvis.

2. Superne opaco corpore, antennis pedibusque ubique nigris, occipite lineis binis lateribus cum intermedia, inter antennas, coeuntibus.

Retinuisse nomen *Apteri* ab Ill. LINNÆO datum, nisi binis etiam sequentibus conveniret.

169. CERAMBYX *Aethiops.*

El. long. lin. 6 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

Diagn. Totus niger, nitidulus, punctatus, apterus; antennis brevibus.

Circa *Labacum*.

Caput linea longitudinali, media, depressa exaratum. Abdomen villosum, præsertim apice.

170. CERAMBYX *Fulvus.*

El. long. lin. 5 $\frac{1}{4}$. lat. 1 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Fulva sunt elytra, antenn. bases, abdomen, femora & tibiæ; reliqua nigra.

In agro *Vipasenii*.

Apterus, punctatus; elytris subpellucidis, obtusis, nitidis, ab domine brevioribus.

171. CERAMBYX *Timidus.*

El. long. lin. 5 $\frac{1}{4}$. lat. 2.

Diagn. Niger; elytro flavescente: maculis binis atris.

In floribus *Laserpitii Latifolii*.

Facies *Lepturæ*. Caput antice elongatum, nitens, sub maxillis dente notatum, villosum. An-

tennæ breves. Thorax villosus. Elytra punctata, sordida, apice truncata. Corpus totum subtus rufo villo pubescens. Timidum dixi, cum a longe fugiat ab hoste, sub umbella se se recipiens.

172. CERAMBYX *Fasciatus.*

El. long. lin. 6 lat. 1 $\frac{1}{2}$.
LINN. Faun. Svec. 2. 687. 688. Leptura
4. fasciata & attenuata.

Diagn. Niger; thorace bidendato: dente uno medio laterali obsoleto, altero longiore ex angulo postico; elytris flavis, nigro fasciatis.

In umbellis *Athamantæ oreosel.*

Mas. Elytro flavo, apice fasciisque tribus atris.

Pedibus flavis; femoribus posticis antice nigris.

Fæmina. Elytro sordide flavo, maculis 5 nigris: una communi subcordata, nec non fascia apiceque nigris. Pedibus rufis, femoribus posticis antice nigris; tibiis posticis dente notatis. Variat elytro maculis tribus: una communi fasciisque binis atris. Quandoque maculæ duæ minores communes sunt, & econtra. Vidi etiam absque dentibus lateralibus.

Utrique sexui caput & thorax niger. Palpi flavi: articulo ultimo nigro. Antennæ flavæ: articulis apice nigris. Elytra lucida, apice truncata. Corpus subtus atrum.

173. CERAMBYX *Nebulosus.*

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 391.

Diagn. Cinereo nigroque varius; elytro fascia nigra.

Antennæ corpore longiores: articulis supra medium nigris, infra cinereis. Thorax niger: punctis albidis. Elytrum cinereum: punctis multis fasciaque nigris. Pedes cinereo-nigroque varii. Moriturum animal, in uno sexu saltem, exerit postice lamellam trilinearem, semilineam vix latam, apice truncatam, valva cinerea acuminata ad basim superne tectam. In hoc & sequente thorax angulos posticos dentatos habet, non vero latera.

174. CERAMBYX *Scabricornis.*

El. long. lin. 11. lat. 2 $\frac{1}{2}$.
Diagn.

Cerambyx. COLEOPTERA. Cerambyx. 155

Diagn. Fulco-ruficollis; antennis æqualibus, nitidis, interiore latere denticulatis, scabris: articulo primo longitudine secundi & tertii simul sumpta.

In Carniola media.

Antennæ articulus primus lin. 5. longus. Thorax marginatus, 3 lin. latus, 1 $\frac{1}{2}$. longus: angulis posterioribus dentatis. Elytrum lineis duabus, elevatis, tuberculosis, antice deletis: apice obtusum, thorace & capite pallidius. Pedes antennis concolores.

(*) Thorace mutico.

175. CERAMBYX- *Scalaris.*

El. long. lin. 5. lat. 1 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 394.

Faun. Svec. 2. 697. Leptura.

FRISCH. Ins. 12. Tab. 3. fig. 1. p. 29-30.

P. PODA. Mus. Græc. p. 34.

Diagn. Niger; capite flavo; oculis & triangulo ad nucham nigris. Elytro margine toto, punctisque, flavis.

In hortis.

Antennæ æquales flavæ: articulis apice nigris. Thorax latere & margine utroque flavis. Elytrum punctis 10 flavis, quorum quinque libera, cætera cohærentia cum margine interno scalam repræsentant; præter has maculas est & lineola flava versus apicem elytri posita. Corpus subtus nigrum, sed flavescente villo pubescens.

176. CERAMBYX *Figuratus.*

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Niger; elytri fascia, linea obliqua clavata curva, puncto que ad basim, albis.

In floribus plantarum *Umbellatarum*.

Thorax ovatus, villosus. Elytra apice truncata. Abdominis segmenta tria prima margine albo. Si ab uno angulo externo lineæ obliquæ elytri duceretur alia recta, tunc in elytris unitis resultaret rudis figura vultus. Elytri etiam apex albidus est.

Leptura Rustica LINN. Faun. Svec. 2. 692. huc pertinere videtur.

177. CERAMBYX *Quadricolor.*

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. Faun. Svec. 2. 693. *Leptura Myistica.*

Diagn. Niger; elytro coloribus quatuor tincto, nempe, rufo, albo, nigro, fucescente.

Cum priore captus..

Antennæ articuli (6.7.8.) albidi: apice nigro; cæteri toti nigri. Thorax prioris. Elytrum basi fulvo-rufum; denum lineola alba obliqua punctisque duobus & tribus albis; demum sequitur fascia alba repanda; inter hanc fasciam et lineam elytrum semi-nigrum est ad marginem internum; elytri apex fusco cinereus: antice pallidior; inter hunc & fasciam elytrum ubique nigrum est.

178. CERAMBYX *Carbonarius.*

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Niger totus & opacus; antennis brevibus.

In floribus.

Thorax cylindraceus, cum elytris villosulis. Elytra truncata.

N E C Y D A L I S.

LINN. Syst. Nat. p. 421.

179. NECYDALIS *Minor.*

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{5}{8}$.

LINN. Syst. Nat. p. 421.

Faun. Svec. 837.

P. PODA. Mus. Græc. p. 48.

Diagn. Lineola alba obliqua ad apicem elytri.

Habitat circa sepes.

Antennæ nigrae: articulis sensim brevioribus. Caput nigrum, deflexum. Thorax niger: tumore obsoleto, nitido utrinque. Scutellum apice albidis villis pubescens. Abdomen nitens: incisuris ad latera subtus margine albis. Femora clavata, nitida,

Necydalis. COLEOPTERA. Cicindella. 57

nitida, rufa: clava nigra; postica anticus duplo longiora.

180. NECYDALIS *Minima*.

El. long. lin. 1. lat. $\frac{1}{2}$.

SCHÄFFER. Ceramb. *spurii* alterius descriptio, in Epist. ad Cl. de REAUMUR. p. 12. data, huic magis, quam priori, convenit.

Differt a priore, antennarum articulis duobus (non computata basi) primis, aliis omnibus brevioribus. Thorace longiore prominentia lanceolata media, aliisque minoribus sparsis. Elytro rufo, testaceo, apice fusco, absque linea alba. Abdomine ubique nigro. Femoribus testaceis, clava non ovali ut in priore, sed oblonga. Utraque antennas gerit corpore longiores, alasque hyalinas.

Habitat ad sepes.

CICINDELLA.

LINN. Syst. Nat. p. 407.

Maxillæ prominentes, dentatæ. Oculi protuberantes. Thorax capite tenuior.

Lamella obtusa, oblonga, (nostris) ad basim femorum posticorum.

181 CICINDELLA *Campestris*.

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 407.

Faun. Svec. 2. 746.

Diagn. Rubro aurato colore fulgent antennæ infra medium, pectoris latera, femora & tibiæ; elytra viridia; thorax & caput viridis pariter coloris, sed aurato quodam rubore immixto.

In cavis viis, & fabulosis, sylvestribus in locis, aut inter prata steriliiora.

Labium superius & maxillæ, apud nos, aurei coloris: dentibus nigris. Thorax in latitudinem magis, quam longitudinem extensus; medio fulco longitudinali in duos veluti lobos divisus; inter marginem posticum & anticum, hosque lobos, depressa linea transversa exaratus. Elytrum punctis

exiguis prominulis, margine toto aureo, puncto que medio rotundo aureo, eoque modo unico, modo pluribus, nempe secundo ad angulum baseos, duobusque aliis minoribus in margine externo. Puncta quinque ponit illi. LINNÆUS, eaque alba, quæ in nostris a me visa nondum.

182. CICINDELLA Germanica.

El. long. lin. 3. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 407.

P. PODA. Mus. Græc p. 42.

Diagn. Viridis; puncto albo & lineola concolore in apice cuiusque elytri.

Habitat cum priore.

Labium superius album: punctis submarginalibus, impressis, fuscis, decem. Maxillæ albæ. Palpi albo-ferruginei, villoso: articulo ultimo nigro extorsum dilatato, truncato. Thorax in longitudinem magis, quam latitudinem extensus, absque lobis, nec adeo antice & postice marginatus. Corpus totum subitus obscure cœrulescens. Femora viridi-aurata. Tibiæ ferrugineæ. Variat elytris cyaneis.

183. CICINDELLA Hybrida.

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 407.

Faun. Svec. 2. 747.

Diagn. Elytrum punctis duobus, fascia repanda, & in apice linea conica capitulo concolore terminata, albi coloris.

Cum precedentibus copiosa.

Campestris perpetuo maior. Labium oris super. leniter repandum, acumine terminatum, albidum, marginatum: margine nigro. Palpi pilosi, pallide ferruginei: articulo ultimo atro-cœruleo, imberbi, lucido, obtuso. Caput aurato-virens, inter oculos depresso & villosum. Thorax æque latus ac longus, pilis erectis lateralibus albidis. Elytrum obscurius virens ad basim ac thorax, & versus apicem fere absque ullo viore, puncto uno in angulo baseos; altero in margine externo lineæ intervallo a priore distante; fascia media apice rotundata non attingit marginem oppositum elytri. Thoracis latera

sub-

Cicindella. COLEOPTERA. Meloe. 59

subtus aurato ruora, sternum & abdomen viridi-aurata. Femora aurato-rubra. Tibiae & manus viridi-auratae.

M E L O E.

LINN. Syst. Nat. p. 419.

Caput inflexum, pone dilatatum. Thorax basi & apice attenuatus. Elytra mollia.

184. MELOE Proscarabaeus.

El. long. lin. 5. lat. 2½.

LINN. Syst. Nat. p. 419.

Faun. Svec. 2. 826.

FRISCH. Ins. 6. Tab. 6. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 47.

Diagn. Apterous, atro-violaceus, unctuosus, mollis.

Caput pone rotundatum. Thorax in longitudinem magis, quam latitudinem extensus. Elytrum subtus inflexum, postice attenuatum. Pedes clytris longiores.

Femina maior, abdome seminudo crassiore. *Mas* elytris abdome longioribus, subtus introrsum magis inflexis, sicque abdomen protentibus. Hunc vidi in floribus *Sambucci ebuli*, illam in herbidis & circa domos Maio M.

185. MELOE Vesicatorius.

El. long. lin. 7. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 419.

Faun. Svec. 2. 827.

P. PODA. Mus. Græc. p. 47.

Diagn. Viridis totus & nitens.

In *Sambucco*, *Ligustrum*, *Syringa*.

Huic (& priori) antennarum articulus primus cæteris minor. Caput subcordatum, sulco medio ad nucham exaratum. Thorax fere æque latus ac longus: linea media dorsali depressa. Elytrum ubique æque latum, apice rotundatum, lineis binis elevatis. Alæ fuscescentes.

186. MELOE *Cinnaberinus.*

El. long. lin. 4. lat. 1.

Diagn. Elytra & caput utrinque, thorax superne, rubra. Oculi, antennæ, thorax subtus, abdomen totum, pedesque nigri.

Ostobri M. in *Brayfica oleracea* capitata reperitus & adlatus.

Habitus *Cantharidis*. Caput depresso & fere cordatum. Maxillæ nigræ, prominentes, apice bidentatæ. Palpi rubri (4): articulo extimo cuneiformi, obtuso, maiore. Antennæ moniliformes; articulis subovatis, æqualibus, villosis. Oculi prominentes. Thorax depresso, tetragonus, punctatus; margine laterali nigro, sulcis duobus parallelis in medio longitudinaliter exaratus, subtus macula rubra media notatus. Elytra coccinea, quasi holosericea, rigida, non punctata, plica una submarginali. Abdomen margine minime papillatum, villosulum. Femora clavata. Alarum costæ rubellæ.

M O R D E L L A.

Ad basim femorum posticorum lamina lata supera aut infera.

(*) *Lamina supera.*

187. MORDELLA *Gigantea.*El. long. lin. 8. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 408. Buprestis 1.

Diagn. Cuprea; elytris nigro-punctatis: apice rugoso, bidentato.

Tergeisti capta, & data mihi A. 1761.

Tota punctis prominulis & in rugulis confluentibus lucidis exasperata, cuprei coloris magis subtus quam supra. Elytrum nigris nitidis punctis variegatum, ad apicem striato-rugosum, apice ipso bidentato, subtus fuscum striatum. Abdomen supra virens, subtus cupreum. Thorax subtus e medio inserens sterno laminam subcanaliculatam.

Mordella. COLEOPTERA. Mordella. 61

188 MORDELLA *Rufica.*

El. long. lin. 6. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 409. Buprestis. 8.

P. PODA. Mus. Græc. p. 43. Bupr. 1.

Diagn. Caput & thorax punctata, elytrum striatum: apice oblique truncatum.

Habitat *Idriæ* in intimis cuniculis Fodinarum *Hydrarg*: dicta ab operariis *Schpanifcha mucha*; reperitur & alibi circa hortos, iino & sub arborum corticibus.

Maxillæ nigræ, edentatae, interne marginatae. Oculi igneo-aurati; a morte nigri. Thorax saepe virens, capiti concolor, marginatus, punctatus, subtus e medio mucronem proferens. Elytrum modo æneum, modo fuscum, modo æneo-virens, 10-striatum, apice truncatum. Abdomen supra violaceum, subtus violaceo-virens, punctatuni, nitens. Huic & priori, antenn. articuli semicordati, (12).

189 MORDELLA *Serraticornis.*

El. long. lin. 3 $\frac{2}{3}$. lat. 1.

Diagn. Tota punctata, supra punctis prominulis, corpore cylindraceo, colore metallico, elytris apice ferrulatis.

In *Salice viminali*.

Statura *Elateris Sanguinei*. Antennæ articulis trigonis, qui simul uniti ferrulæ dentes repræsentant. Oculi, in mortuo, nigri, oblongi. Thorax subtus mucrone plano. Alæ fusco-hyalinæ. Abdomen supra violaceum.

Variat 1. Elytris aurato-viridibus, corpore subtus cupreo.

2. Corpore supra aurato-rubro, subtus æneo.

190 MORDELLA *Rofacea.*

El. long. lin. 2 $\frac{1}{3}$. lat. 1.

Diagn. Thorax pone marginatus. Elytra marginata, apice rotundata. Abdomen supra æneo-fuscum.

In Floribus, quos Rofaceos dixit Tournef.

Tota

Tota punctata. punctis supra prominulis congestis, subtus impressis. Anten. articuli semicordati. Oculi & manus nigri coloris. Thorax latus, pro ratione corporis idemque planior quam in prioribus. Animal iners, anthophilum, diu in uno loco hærens.

Variat 1. Colore supra & infra viridi, abdominis superna parte tamen æneo-fusca. An hæc *Bubrefjis Viridis*. LINN.?

In floribus *Rosarum* hortensium.

2. Capite & thorace viridi, elytris fusco-cupreis, subtus æneo-virens.

3. Fusca tota, subtus lucidior.

In flore *Ranunculi flammulæ*.

4. æneo-fusca, subtus æneo-virens.

In flore *Anemones syr.*

191. MORDELLA Cuprea.

El. long. lin. 9. lat. $2\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 410.) Buprest.

P. PODA. Mus. Græc. p. 43.)

Diagn. Elytrum fuscum, rugosum, nitens, mucrone exiguo terminatum. Corpus totum subtus, pedesque, cuprei coloris.

Rarior apud nos, in Carniola calidiore. Græcio quoque misit Cl. P. PODA.

Caput, thorax, elytris concolor. Thorax lateribus scabriusculis. Caput rugoso punctatum. Antenn. articuli teretiusculi: apice dilatati. Scutellum est tuberculum planum, rotundatum, stipitatum. Elytrum margine externo ad basim duplicatura, dente utrinque terminata, auctum, apice mucronatum. Corpus subtus cuprei pulcherrimi coloris, foveis variolosis & excavatum cicatrizatum.

(**) *Lamina infera*.

192. MORDELLA Aculeata.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. vix. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 420.

Faun. Svec. 2. 832.

P. PODA. Mus. Græc. p. 47.

Diagn. Nigra; capite infexo; abdomine mucronato; pedibus saltatoriis. In

Mordella. COLEOPTERA. Buprestis. 63

In floribus apud nos, frequens.

Antenn. articuli (10.), quorum septem extei-
riores crassiores. Lamina femoralis, sub femori-
bus, & ultra eadem exorrecta. Corpus agile, sal-
tu sese in aera librans.

Variat 1. Statura fere decuplo minore.

2. Elytro macula media, tetragona, cane-
scenscentibus nitidis villis facta, alio in
situ oculi penitus evanescente.

BUPRESTIS.

Antennæ thorace nunquam breviores. Ca-
put deflexum, dimidio intra thoracem retractum.

Thorax pulvinatus. Abdomen obtusum.

(*) Unicolores. (†)

193. BUPRESTIS Syngenesiae.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

Diagn. Violacea aut virens, punctata; ely-
tris abdomine brevioribus; antennis nigris.

Caput, post mortem, totum retrahitur intra
thoracem. Antennæ thorace longiores dilatatae.

Thorax cum elytris punctatus, nitens: pun-
ctis impressis, angulo baseos tumido. Abdomen
villosum, sed magis postice. Sub abdomine ad
apicem foveola ovalis.

Variat 1. Colore ovato-aurato.

LINN. Syst. Nat. p. 370.

Faun. Svec. 2. 516.

Chrysom. Hypochæridis.

2. — Atro-cæruleo.

In floribus Gymnomonosp. Radiatis.

3. — Violaceo.

In floribus Buphthalmi salicifol.

4. — Viridi.

Ibidem.

194.

(†) Colore eodem capit is, thoracis, elytri.

194. BUPRESTIS *Specularis.*El. long. lin. 1½. lat. $\frac{3}{4}$.*Diagn.* Ovata, ænco-obscure virens, nitidissima, subtus ferruginea.Circa *Idriam* reperi, A. 1760.*Nihilo major* semine *Cannabis*, perfecte ovalis, superne *Dyisco Natatore* fere lucidior, & speculum referens, minutissimis punctulis impressis notata, subtus tota ferruginea.195. BUPRESTIS *Aquatica.*El. long. lin. $\frac{2}{3}$. lat. $\frac{1}{3}$.*Diagn.* Pulice minor, ovata, nigra; antennis tibiisque rufis.

Ad fontium scaturigines, sub faxis, in aqua degit.

Antennæ, huic uni, breves. Thorax cum elytris subvillosus. Elytrum binis tribusque lineolis elevatis striatum, subtus fuscum.

196. BUPRESTIS *Umbellatarum.*El. long. lin. 1½. lat. $\frac{3}{4}$.*Diagn.* Splendor & magnitudo *Specularis*, sed subtus atra.In floribus plantarum (*Umbelliferarum*, præferunt *Cari carvi*. Majo M.

Elytra punctatim striata.

197. BUPRESTIS *Miliaris.*El. long. lin. 1. lat. $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Ovata, nigra, nitens; antennis apice albidis.In floribus *Astrantiae acaulis*. Fl. Carniol.

Tota nigra, minime punctata. Antennæ thoracis longitudine.

(**) *Bicolores.*198. BUPRESTIS *Chrysocollis.*El. long. lin. 1½. lat. $\frac{2}{3}$.*Diagn.* Caput & thorax aureo-rubra. Elytra atro-cærulæ. Tibiæ ferrugineæ.

In floribus.

Oculi

Buprestis. COLEOPTERA. Buprestis. 65

Oculi nigricantes. Corpus oblongum. Thorax cum elytris marginatus. Elytra punctatim striata. Abdomen subtus lucidius. Pedes antici & medii toti, posticorum solae tibiæ, ferruginei coloris. Valde similis Chrysom. *Nitidulae* LINN. Faun. Svec. 542. sed non eadem.

199. BUPRESTIS *Salicina*.

El. long. lin. 1½. lat. fere 1.

Diagn. Atro-cærulea; antennis basi, thorace, abdomine supra, pedibusque rufis.

In *Salicilus* non rara.

Thorax & elytra punctata. Abdomen pone acutiusculum.

Chrysom. *Nitida* β. P. PODA. Mus. Græc. p. 27. huc pertinet.

200. BUPRESTIS *Cærulescens*.

El. long. lin. 2. lat. lin. 1.

Diagn. Tota cærulescens; elytris flavis.

Habitat in *Carnioliae* salicetis.

Tota villosula & nitens. Elytra minus villosa, punctata: punctis sparsis, excavatis.

(***) *Maculatae*.

201. BUPRESTIS *Biguttata*.

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Nigra, nitens; elytris substriatis punctatis: apice rubris.

Reperi in *Corylo*.

Antennæ elytri longitudine, basi rubræ. Thorax nitidior. Ad apicem elytri macula lunata rubra, in cadavere flavescens.

202. BUPRESTIS *Morœi*.

El. long. lin. 1½. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 374. Chrysom. 52.

Faun. Svec. 2. 550.

P. PODA. Mus. Græc. p. 28. hæc, vel prior.

Diagn. Nigra, oblonga, nitens; elytris apice & macula marginali rubris flavisve.

In *Dactyli glomerata*.

G

An.

Antennæ articuli primi tres subtus flavi, alibi, cum aliis omnibus ubique, nigri. In fronte punctata duo flava, basi coalita, ut sic cordis figuram referant. Thoracis margo anticus flavus, ut & anguli postici. Elytrum striatum: striis punctatis, apice flavis, macula marginali conica flava, apice suo baseos angulum contingente. Tibiae anticae luteæ. Variat statura duplo minore, cæterum eadem.

203. BUPRESTIS Sanguinolenta.

El. long. lin. 2 lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 371. Chrysom. 26.

Faun. Svec. 2. 529.

Diagn. Nigra; elytris fulvis, margine, medioque nigris.

Antennæ elytri longitudine. Elytrum striis decem punctatis, punctorum seriebus in media nigra parte senis, in fulva vero utrinque binis.

Habitatio in *Salice viminali*.

204. BUPRESTIS Lunata.

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Nigra, subopaca; linea frontali lunata elytrisque apice luteis; pedibus ferrugineis.

In *Salice viminali* copiosa, usque ad florescentiam *Scabiosæ succissæ*.

Elytrum punctatum, striis binis prope suturam exteriorem.

Variat 1. Thorace maculis binis luteis.

2. — — immaculato.

3. Elytro maculis binis.

4. — punctis in unum congestis lineaque antica, flavi coloris.

5. — — immaculato.

205. BUPRESTIS Unifasciata.

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Nigra; thorace fulvo; elytro flavo: binâ fascia nigra.

In *Salicibus*, & *Athamanta oreofel*.

Antennæ thoracis longitudine: articulis primis duobus minoribus & subrufis. Fascia elytri marginem utrumque intactum sinit, una cum macula ba-

Buprestis. COLEOPTERA. Buprestis. 67

baseos, quarum color non raro atro-cæruleus est. Elytra neque punctata, neque striata. Femorum apices & tibiæ totæ fulvæ.

206. BUPRESTIS Quadripunctata.

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 374. Chrylom. 50.

Faun. Svec. 2. 547.

Diagn. Nigra, nitens; elytro rubro: macula antica magna ovata utrinque obtusa punctoque ad angulum baseos, nigri coloris.

In Salicibus.

Caput scabriuscum. Antennæ longitudine thoracis. Thorax politissimus. Elytra punctata. Alæ fuscescentes. Corpus subtus villosum.

207. BUPRESTIS Quinquepunctata.

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Nigra; elytris fulvis, margine punctisque (5.) nigris: uno communi.

Cum priore.

Macula frontalis ovata, antennæ basis, margo lateralis, anticus, lineaque longitudinalis abrupta thoracis, fulvi coloris. Antennæ thorace longiores. Thorax & elytra punctata.

208. BUPRESTIS Sextipunctata.

El. long. lin. 4. lat. 1 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigro-cærulea, oblonga, villosoula; elytris flavis: punctis tribus atris.

In agro Vipacensi, circa vias publicas, ad frutices.

Antennæ thoracis longitudine. Elytri punctorum par unum anticum, aliud ad angulum baseos.

209. BUPRESTIS Octopunctata.

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Nigra; elytro fulvo punctis (4) nigris: interioribus minoribus.

In Salicetis.

In fronte macula ovata transversa fulvescens. Thorax nitens, margine antico lateralí lineaque media abrupta, fulvi coloris, alibi niger. Elvtrum punctatum, fulvum, margine nigro, duabusque partibus

68 Buprestis. ORDO I. Chrysomela.

ribus punctorum nigrorum, quorum interior minor est.

210. BUPRESTIS Fur.

El. long. lin. 1½. lat. ½.

LINN. Syst. Nat. p. 393. Cerambyx 33.

Faun. Svec. 2. 657.

Diagn. Thorax latere unidentatus: tuberculis posticis binis.

In herbariis, collectionibus insectorum & avium, nimium frequens; museorum pestis.

A Cerambycillus removent antennarum articuli æquales: primo basi minime dilatato, & caput intra thoracem semiretractum.

Color rufescens. Thorax pone plicis duabus mediis. Elytrum striatum: striis villosis, versus basim fascia alba, ad apicem vero puncto albo; idem subtus punctis ocellatis: pupilla lucida, iride obscuriore.

Variat 1. Colore ferrugineo, absque fasciis, & tuberculis thoracinis obscurioribus.

2: Fasciis elytri (2) albis.

CHYSOMELA.

Antennæ thorace etiam duplo longiores, articulis plerisque æqua'ibus. Caput porrectum, & nunquam adeo crassum, deflexum, & intra thoracem reconditum, ut in Buprestibus.

(*) Ambulatoriae.

211. CHYSOMELA Alni.

El. long. lin. 2½. lat. 1¼.

LINN. Syst. Nat. p. 369.

Faun. Svec. 2. 511.

FRISCH. Ins 7. Táb. 8. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 26.

Diagn. Punctata, oblonga, & homogeneo violaceo colore tincta.

In Alno.

Ca-

Chrysomela. COLEOPTERA. Chrysomela. 69

Caput in cadavere leniter deflexum, sed thorace duplo angustius, fronte impressa.

(**) *Saltatoria.*

212. CHRYSOMELA Oleracea.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 372.

Faun. Svec. 2. 534.

Diagn. Tota cæruleo-virescens.

In plantis variis.

Thorax punctulatus: fulco transverso prope marginem posticum. Elytrum punctis excavatis sparvis.

213. CHRYSOMELA Chrysocephala.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 372.

Faun. Svec. 2. 535.

Diagn. Atro-cærulea; capite antice, antennis infra medium, tibiisque rufis.

In plantis.

Elytrum tenuiter striatum, punctatum.

214. CHRYSOMELA Rufipes.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 373.

Faun. Svec. 2. 545.

Diagn. Elytra striata atro-cærulea. Thorax, antennæ, caput, pedesque rufi coloris.

In floribus, & plantis.

Oculi nigri, opaci. Antennæ villosulæ. Elytrum striis (10) punctatis. Abdomen supra rufum, apice subtusque nigricans.

215. CHRYSOMELA Nemorum.

El. long. lin. brevior. lat. $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 373.

Faun. Svec. 2. 543.

Diagn. Nigra; elytris linea media, longitudinali, testacea.

In floribus *Cardamines*, aliorumque *Nasturtium*, copiosa.

70 Chrysomela. ORDO I. Chrysomela.

Vere acrivora, infensa *Tetradynamiis*; thorace elytri que punctatis; varians clytri linea albida testacea ochroleuca.

216. CHYSOMELA *Ferruginea*.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Tota ferruginea; oculis nigris.

In Carniolia non rara, in plantis.

Elytra striata: striis punctatis. Alæ immaculatae, albo-hyalinæ.

217. CHYSOMELA *Atricilla*.

El. long. lin. 1. lat. $\frac{1}{2}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 537.

Diagn. Caput. corpus utrinque, & femora postica, nigro colore tincta; reliqua testacea.

In gramineis; Aprili. M.

Elytra margine nigro, ad lentem obiter punctata. Acu transfixa antennas in omnem partem continuo & celriter agitat.

218. CHYSOMELA *Truncata*.

El. long. lin. $\frac{3}{4}$. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; elytris truncatis: apice ferrugineis; pedibus antennisque rufis.

In corticibus arborum pomiferarum.

Tota alias nigra, lucida, ovata; elytris neque punctatis, neque striatis.

219. CHYSOMELA *Lurida*.

El. long. lin. $\frac{3}{4}$. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Fusco-rufa; abdomine oculisque nigris.

In *Salvia selarea*.

Stitura Chrys. Nemorum, habitus *Atricillæ*; sed caput & pedes omnes, una cum thorace, elytris concolores. Elytrum punctatum, subpellucens.

COCCINELLA.

Capite porrecto, thorace duplo angustiore,
convenit cum *Chrysomela*, a qua differt anten-
nis thorace vix longioribus, extrorsum
crassioribus.

(*) *Unicolores*.

220. COCCINELLA *Graminis*.

El. long. lin. 4. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 369. Chrysom. 4.

Faun. Svec. 2. 509.

Diagn. Viridis, nitens; alis rubellis.

In herbidis.

Aureus nitor, ex virore, præsertim elytri, trans-
lucet. Thorax, una cum elytris, punctatus, sed in
elytris puncta majora sunt. Abdomen supra ni-
grum. Alæ rubellæ: apice excolores. Antennæ
justo longiores, valde adfinem faciunt cum *Chrys.*
Alni, ut & ista, huc etiam trahi possit, *Chrysomelis*
Saltatoriis in unum gregem congregatis.

221. COCCINELLA *Betulae*.

El. long. lin. 3½. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 396. Chrysom. 7.

Faun. Svec. 2. 514.

P. PODA. Mus. Græc. p. 26.

Diagn. Tota violacea, ovata; antennis nigri-
cantibus.

In *Betula*.

Elytrum striatum, ne quidem lente, invenio;
sed punctis sparsis & majoribus insculptum ac tho-
rax. Venter pedesque pariter violacei. Antennæ
nigricantes. Alæ sine rubore.

222. COCCINELLA *Vulgatissima*.

El. long. lin. 2½. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 370. Chrysom. 13.

Faun. Svec. 2. 517.

Diagn. Obscure cœrulea, ovato-oblonga; an-
tennis basi ferrugineis; abdominis apice rubello.

In sylvestribus non rara.

Cavendum, ne confundatur cum *Coccin. Betule*,
a qua, ex data diagnosi, vere differt.

223. COCCINELLA *Riparia*.

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Oblonga, nitens, obscure cærulea tota;
elytris punctatim striatis.

Ad ripas fluviorum in *Salicibus*, non rara.

Chrysom. Service LINN. proxima est, non tam
enam eadem, ut ejus descriptio, in nova *Faun. Svecica*
data docet.

224. COCCINELLA *Vitellinae*.

El. long. lin. 3 $\frac{1}{4}$. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 370. *Chrysom.* 14.

Faun. Svec. 2. 519.

Diagn. Ovata, e rubro ænea, nitens.

In *Salice* & *Populo*.

Color æneus ad cupreum vergens, cum aliquo
rubore immixto. Elytra, thorax, & corpus subtus
punctatum.

225. COCCINELLA *Hæmorrhoidalis*.

El. long. lin. 3 $\frac{1}{4}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 369. *Chrysom.* 3.

Faun. Svec. 2. 508.

Diagn. Ovata, nigra, nitida; antennis basi flaves-
centibus; ano rubro. Ill. LINN. l. c. optime.

In *Salice viminali*. Aprili. M.

Elytrum seriebus novem longitu-inalibus pun-
ctorum excavatorum. Thoracis latera punctata.
Antennæ basis, una cum articulis tribus primis rufo-
flavescientibus. Anus quandoque fulvus.

226. COCCINELLA *Erratici*.

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Oblonga nitida viridi-ænea; elytris pun-
ctatim striatis.

In sylvis, & ruri degit, incertæ sedis animal.

Elytra pone dehiscensia.

227. COCCINELLA *Rufipes.*

El. long. lin. 1 $\frac{3}{4}$. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Oblonga, nigra, nitida; antennis pedibusque rufis.

Inveni in alpibus Carnioliae super. An. 1761.

Palpi pedibus concolores. Elytra ad lentem tenuissime punctulata.

(**) *Bicolores.*

228. COCCINELLA *Populi.*

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 370. Chrysom. 20.

Faun. Svec. 2. 523.

Diagn. Nostrarum gigas; elytris rubris: apice nigris; ano rubro; alibi atro-cerulea.

In *Salice viminali.*

Thorax elytris nitidior: lateribus punctatis. Elytra punctata, in cadavere rufescunt. Abdominis margo & apex, elytri colore tincti. Propriis acaris, effeta, infestatur, de quibus suo loco. In utroque sexu elytra rubra sunt.

229. COCCINELLA *Polita.*

El. long. lin. 3 $\frac{1}{4}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 370. Chrysom. 18.

Faun. Svec. 2. 522.

Diagn. Aurato-viridis; elytris rufis.

Ego in *Mentha aquatica* reperi.

Elytra punctata, fusco-ferruginei, & rufi coloris, in utroque sexu. Alæ rubræ.

230. COCCINELLA *Liturata.*

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. fere 2.

Diagn. Aurato-virens; thorace elytroque fasciis binis, longitudinalibus, violaceis.

In floribus *Veratri nigri.*

Oblonga. Caput virens. Oculi antennæque nigri coloris. Thorax violaceus, punctatus: margine laterali aurato-viridi. Elytrum punctis excavatis, nitidum, aurato-virens: fasciis (2) longitudinalibus fusco-violaceis, ad basim elytri liberis, nec eam penitus occupantibus, ad apicem, quem pariter non

attингunt, conjunctis & attenuatis. Alae rubrae: apice excolores. Abdomen subtus pedesque aurato-virides. Pectus obscure violaceum, & quasi nigricans. Aliam *Hemipteram*. LINNÆUS habet, sed ovatam, violaceam, & absque lituris.

231. Coccinella Speciosissima.

El. long. lin. 3. lat. 1. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Ovata; elytris auratis: margine lineaque media cærulei coloris.

In sylvis nostris, non rara.

Oculi nigri. Caput & thorax aurato-viridis coloris. Elytra punctata, splendidissima: linea mediae violaceæ margine cæruleo. Alæ absque rubore. Antennæ pedesque aurato-virides. Pectus & abdomen subtus sericeo-cærulefasciatis coloris.

232. Coccinella Faſtuosa.

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Ovato-oblonga, fulgida, aurato-virens; elytris aureis: margine lineaque viridibus; alis rubris.

Copula junctas, copiose reperi non semel in *Ga-leopsis tetrahit*, & quidem Variet. (a) *Floræ Carniol.* August. M.

Elytrum villis remotis adspersum.

Variat. 1. Colore ubique aureo.

2. Aurato-viridi.

3. Thorace aurato-viridi: margine laterali elytrisque aureis.

233. Coccinella Signata.

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Ovata, rubra; thorace punctis binis, capite, corpore subtus, pedibus nigris.

In Salicetis.

Elytra punctatim striata. Scutellum nigrum. Abdominis apex & margo elytri colore; alibi nigrum. Color ruber in cadavere transit in rufum.

Coccinellā. COLEOPTERA. Coccinella. 75

(**) *Maculatæ.*

(†) *Elytris rubris.*

234. Coccinella 2 - *Punctata.*

El. long. lin. 2½. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 364.

Faun. Svec. 2. 471.

FRISCH. Insect. 9. Tab. 16. fig. 4.

Diagn. Elytrum unico nigro puncto medio notatum.

In Salice, Alno, Frunis hortensibus.

Variat 1. Thorace in medio punctum oblongum album gerente, & maculam lunatam posticam.

2. — absque hoc puncto, &, loco maculae lunatae, punctis binis basi conjunctis.

3. — macula laterali alba, & flavescente.

4. — punctis (2) albis anticis, lineaque alba posterioria marginali.

5. Elytris flavescentibus FRISCH. l. c. sed rarissime.

235. Coccinella 7 - *Punctata.*

El. long. lin. 3. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 365.

Faun. Svec. 2. 477.

ROES. Scarab. Terr. Cl. III. Tab. 2. fig. 3.

P. PODA. Mus. Græc. p. 24. cum metamorphosi.

Diagn. In elytris sunt puncta nigra 6 distincta, septimum vero utriusque commune, ad angulum scutelli, reliquis maius.

In plantis variis.

In Svecicis speciminibus, puncta duo in fronte, & latera thoracis alba ponit III. LINNÆUS, quæ in nostris flaviant. Larva quoque LINN. cinerea, P. PODA cærulescens, apud nos nigricans, & in pupam fulvam transiens, nigro-maculatam.

236. COCCINELLA 9-Punctata.

El. long. lin. 2. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 365.

Faun. Svec. 2. 478.

Diagn. Elytra punctis (8) distinctis: nono communi prope scutellum.

In Salicibus.

Caput sub oculis macula flava utrinque, inter quas minor trigona frontalis. Palpi colore manuum. Thorax margine laterali & antico flavescens. Elytra ad angulum scutelli flava.

Variat 1. Thorace punctis binis flavescentibus.

2. — margine albo, maculisque duabus albis supra antennas.

3. elytro punctis tantum tribus liberis, seu absque puncto baseos.

237. COCCINELLA 10.-Punctata.

El. long. lin. 2½. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 371. Chrysom. 22.

Faun. Svec. 2. 525.

Diagn. Flytrum duobus paribus punctorum nigrorum, quinto solitario marginali.

Oblonga potius, quam ovata. Elytris punctatis punctis vagis, aliisque in lineas longitudinales dispositis.

Variat 1. Thorace toto nigro.

2. — lateribus foliis fulvis.

3. — lateribus & margine antico fulvis.

4. Elytro punctis binatis anticis, ad apicem binis oblongis alternis.

5. — punctis (5), sed duobus ad apicem majoribus & confluentibus.

Elytra huic fulva potius, quam rubra.

238. COCCINELLA 13.-Punctata.

El. long. lin. 2. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 366.

Faun. Svec. 2. 481.

Diagn.

Coccinella. COLEOPTERA. Coccinella. 77

Diagn. Thorax latere flavescens: puncto nigro ibidem. Elytrum punctis (6) liberis: septimo communi ad angulum scutelli.

Celeberr. LINNÆUS elytra rubra non vidit, ut ego nunquam flava.

239. Coccinella 24 - *Punctata*.

El. long. lin. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 366.

Faun. Svec. 2. 487.

Diagn. In quolibet elytro puncta (12), nigra.

Oculi nigri. Thorax puncto postico nigro. Puncta elytri, in nostris, ita se habent. Prope basim tria distincta: exteriore minore; in medio quatuor: tribus majoribus subæqualibus non semper coalitis; tria versus apicem: binis coalitis; duo ad apicem libera & coalita.

(††) Elytris flavis

240. Coccinella 16 - *Punctata*.

El. long. lin. — lat. —

LINN. Faun. Svec. 2. 483.

Diagn. Thorax flavus; punctis (6) atris. Elytra punctis nigris (16).

Descriptionem *Labaco* communicavit Amiciss. P. WULFEN S. J.

Antennæ & pedes flavi coloris. Corpus sub-tus atrum. Puncta ad elytri basim duo, dein tria, & denuo tria, oblique transversim sita.

241. Coccinella 18 - *Punctata*.

El. long. lin. 1 $\frac{3}{4}$. lat. 1.

Diagn. Puncta (8) nigra in quolibet elytro pleraque cohærentia.

Circa Idriam, in pomariis.

Caput flavum, oculis punctisque binis atris. Thorax flavus, punctis (7), inæqualibus, nigris. Elytri punctum apicis perpetuo liberum, cætera sa-pius coalita. Abdomen nigrum: apice fulvescente, pedibus concolore. Proxima est. *Coccinellæ 19-punct.*
LINN.

242. COCCINELLA 20-Punctata.

El. long. lin. 3. lat. 1½.

Diagn. Elytrum flavum; punctis oblongis, nigris (10).In *Salicibus*.

Oblonga magis, quam ovata, nigro-cærulescens, nitida. Caput in medio impressum. Thorax elytris lucidior, punctulatus: margine laterali flavo. Elytrum margine interno nigro, punctis excavatum, cujus margini toto adstant puncta octo, duobus aliis in medio horum sitis; punctum anguli baseos reliquis lucidius, punctum vero apicis sublunatum. Apex abdominis, tibiae, femorum bases fulvum colorēm habent.

243. COCCINELLA Tessulata.

El. long. lin. 2. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 366. 14-Punctata.

Faun. Svec. 2. 482.

P. PODA. Mus. Græc. p. 25.*Diagn.* Elytrum flavum: margine interno punctisque angulatis (7), plerisque contiguis.In *Salice*, & *Urtica dioica*.

Incertus punctorum elytri numerus horum cohæsio varians & etiam nulla, quadrata denique figura & unio sœpe talis, ut quadratae pariter & ejusdem magnitudinis sint areæ interiectæ flavæ, novum nomen generunt. Oculi nigri. Thorax flavus: macula nigra lata polita emarginata, aut lobata. Elytri futura interior nigra. Pedes flavi, femoribus exterius atris. Variat tribus paribus punctorum nigrorum in capite, femoribus apice nigris.

(††) Elytris nigris.

244. COCCINELLA 4-Pustulata.

El. long. lin. 2. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 367.

Faun. Svec. 2. 499.

Diagn. Nigra; clytro maculis binis, rubris: anteriore majore.In *Urtica*.

Anten-

Coccinella COLEOPTERA. Coccinella. 79

Antennæ rufescentes : apice nigræ. Thorax antice punctis duobus albidis, pone pari uno punctorum excavatorum.

- Variat 1. Thoracis margine lateralí albido.
2. — punctis anticis aureis.
3. Elytri macula baseos subquadrata, aut angulo scutellum respiciente de-
fluita, ejusque loco sinu excavata.
4. Abdom. apice rubro.

245. COCCINELLA 6-Pustulata.

El. long. lin. 2½. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 367.

Faun. Svec. 2. 500.

Diag. Nigra; elytro maculis tribus rubris: an-
teriore majore.

In *Salicibus*, & circa hortos.

Major priore est. Thorax margine lateralí ru-
bro. Caput prope oculos puncto flavo. Elytri ma-
cula apicis, & alia ei proxima, subrotundæ, antica
triplo minores, subæquales; macula antica, seu ba-
seos, subquadrata, & puncto nigro antice notata.
Abdominis margo ruber.

246. COCCINELLA 14-Pustulata.

El. long. lin. 2. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 368.

Faun. Svec. 2. 502.

P. PODA. Mus. Græc. p. 26. 14-maculata?

Diagn. Elytrum nigrum: macularum fulvarum
paribus tribus, impare septima ad apicem.

Ruri degit.

Maculæ vicinæ margini interno elytri subro-
tundæ sunt, his vero oppositæ potius hemisphæricæ.
thoracis margo lateralis simili macula utrinque
notatus, ejusdem margo anticus, nec non in fronte,
fulvo colore tinctus. Tibiarum apicibus, mani-
busque fulvis.

147. COCCINELLA Fasciata.

El. long. lin. 2½. lat. 1½.

LINN.

LINN. Syst. Nat. p. 371. Chrysomela 24.
Faun. Svec. 2. 527.

Diagn. Nigra; elytro fasciis binis repandis, maculaque in apice, fulvis.

Habitat in *Boleto salicis*.

Caput vertice depresso. Thorax punctatus, niger. Elytrum punctatim striatum: basi fascia integra latiore dentata; in medio alia fascia tenuiore, sed supra margines non extensa; in apice macula conica: elytri margine ibidem manente nigro. Abdomen supra fulvum, ut & caput subtus.

(†††) Elytris alterius coloris.

248. COCCINELLA 14-Guttata.

El. long. lin. 2½. lat. 1¼.
LINN. Syst. Nat. p. 367.

Faun. Svec. 2. 492. errore calami,
14-punctata dicta.

Diagn. Elytrum rufum, rubrum. LINNÆO, flavum P. PODA. Mus. Græc. p. 25. punctis septem albis.

In hortis, & pratis.

Statura Coccin. 2-Punct. Oculi fuscii. Thoracis latera alba. Elytri punctum unum in angulo scutelli, dein tria, mox duo, septimum vero impar prope apicem, omnia subrotunda, albida. Cadaver elytra ferruginea gerit.

249. COCCINELLA. 16-Guttata.

El. long. lin. fere 3. lat. 1½.

LINN. Faun. Svec. 2. 493.

Diagn. Elytrum rufum; maculis octo, albis.

Inveni in foliis *Pyri communis*.

Tota rufo-flava. Oculi nigri una cum postica capitis parte sub thoracis clypeo reconditi, & ex eo transparentes, ut ideo ad *Cassidas* etiam referri possit. Thorax est clypeus planiusculus, lucidus, antice emarginatus, maculis luteis sex, quarum tres posticæ. Elytra cum thorace punctata lucida. Palpi articulus ultimus hemisphæricus.

250. COCCINELLA 4-Maculata.

El. long. lin. 2½.

Diagn.

Coccinella. COLEOPTERA. Tenebrio. 81

Diagn. Elytrum fuscum; maculis fulvis.

Circa Idriam, reperta Majo M.

Caput nigrum, antico margine maculaque oculis adjacente fulvi coloris. Thorax niger: margine laterali fulvo. Elytrum tenuiter punctatum: basi macula magna tetragona fulva, aliaque rotunda infra medium, interno margini incumbente, minore. Corpus, pedesque nigri. Manus rufescentes. Valde dubito, esse varietatem *Coccinelle +pustulatae.*

251. Coccinella 10 - *Maculata.*

El. long. lin. 1 $\frac{4}{5}$. lat. 1.

Diagn. Elytrum fusco-rufum; maculis (5), flavicantibus.

In *Salicibus.*

Caput flavum. Oculi nigri. Thorax flavus. Duobus paribus punctorum nigrorum. Elytrum punctulatum, & maculis flavis ita variegatum, ut color tucus ab iis relictus crucem efformet basi latæ impositam. Corpus nigrum. Pedes elytris concolores:

TENEBRIÖ.

LINN. Syst. Nat. p. 417.

(*) *Apteri.*

252. TENEERIO *Mortifagus.*

El. long. lin. 8. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 418.

Faun. Svec. 2. 822.

FRISCH. Ins. 13. Tab. 25. p. 27.

P. PODA. Mus. Græc. p. 47.

Diagn. Niger, apterus; elytris latere inflexis & abdomen ibidem tegentibus, acuminatis: acumine trigono.

Inter hortorum rejectanea.

Statura & habitus *Carabi Majoris.* Antenn. articulus primus basi tuberosus, cæteris duplo certe longior. Caput punctatum. Thorax tetragonus, basi truncatus, latere antice rotundatus, antice leviter excavatus, punctatus, margine antico supra & infra villis parvis rufis ciliato. Elytra punctata,

connata: acuminis angulis obtusis & nodosis, subtus rugosis. Thorax subitus mucrone incurvo, inter duos tumores villosos, subrotundos, positos ad bases femorum anticum. In medio marginis incisuræ primæ abdominis subitus fasciculus pilorum ruforum.

253. TENEBRIO *Ventricosus*.

El. long. lin. 5. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Faun. Svec. 2. §24. gibbus? certe parum differt.

Diagn. Nigricans, apterus; elytris apice deflexis, connatis; abdomine ovato, turgido.

In suffocatis.

Autennæ villosulæ. Caput vertice depresso & complanato. Thorax cum capite punctatus, basi subrotunde truncatus, latere rotundatus, antice leniter excavatus. Elytra punctulata, opaca, latere inflexa, coalita, apice deflexa. Abdom. subitus atro-cæruleum: apice nudo, seu ab elytris minime tecto. Femorū nitida, cæruleo-violacea, subclavata. Manus subitus fuscescentes.

254. TENEBRIO *Buprestoides*.

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Apterous, atro-cærulescens, punctatus; capite deflexo; thorace lato, pone rotundato.

In arvis, & hortis, rarus.

Priore paulo minor, nitens. Caput nullibi depresso. Thorax latitudine dupla ad longitudinem, postice rotundatus, laterali margine crassiore & tunnidiusculo, antice emarginatus. Elytra non connati, ut in prioribus, abdomine longiora. Corpus subitus pedesque cæruleo-violacei, nitidi.

255. TENEBRIO *Aeneus*.

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Apterous, superne æneus; elytris mucronatis, striatis; manibus mediis ruto villo barbatis.

In Carnioliae suffocatis.

Palpi clavati articulo subtrigono. Thorax dense punctatus. Elytrum arcuatum, mucrone teretiusculo

Tenebrio. COLEOPTERA. Tenebrio. 33

culo terminatum, sub quo interne denticulus videntur. Antennae lineas quatuor longae, fuscescentes. Corpus subtus & femora fuscoc-rufa. Manus omnes pilosae, magis vero mediæ. Variat colore ad nigrum vergente.

(**) *Alati.*

256. TENEBRI^O *Triflisis.*

El. long. lin. 3½. lat. 1¾.

Diagn. Niger, subopacus, totus punctis excavatis variolosus.

In sylvestribus & apricis.

Thorax basi & apice truncatus. Scutellum obtusum. Elytra abdomine longiora.

257. TENEERI^O *Pomoneæ.*

El. long. lin. 3½. lat. 2.

Diagn. Supra piceus, infra niger; elytris striatis: striis elevatis, quinis.

In foliis *Pyri*, *Pomi*.

Habitus & statura prioris, pariterque punctatus, sed non unicolor. Elytrum striis (5) elevatis, quarum quatuor ad apicem elytri conniventes uniuntur, seu apicibus cohærent, una vero ad marginem internum, solitaria & brevior.

In folio convoluto latent larvæ duo tresve, reticulo laxo testæ, mutandæ in Pupas ovatas fuscescentes, verrucosas: verrucis pilosis, capite infexo, pedibus incurvis, abdomine acuto; unde, positis exuviis prodit animal totum pallide luteum; deum dictos colores acquirens.

258. TENEBRI^O *Capreæ.*

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Testaceo thorace & elytris; alibi niger; thorace punctis impressis, (4).

Circa fœniseicum, in *Salice caprea*, copiosus.

Thorax quatuor foveolis transversim variolosus. Elytrum punctatum, non striatum, subpellucidum, punctulis sanguineis vagis versum apicem adsperrum.

259. TENEBRI^O Molitor.

El. long. lin. 4. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 417.

Faun. Svec. 2. 815.

Diagn. Elytrum striatum: striis (10). Femora antica crassiora. Carabi minoris statura & habitus.

Habitat in molendinis, pistrinis, fermento panis, apud nos, plerumque ex farina Milii cum vino in grandes rotulas figurata, composito.

Larva uncialis, teres, rufa, fasciis saturatis, nitens, pedibus (6) pectoralibus, lin. 1½ crassa, agilis: maxillis apice nigris, gratissimi prandia Lusciniarum. Insector antennae articulis æqualibus, glabris, fusco-rufis. Caput punctatum, pone binis, parvis, oblongis prominatis. Thorax cum capite niger, & punctatus, fere æque latus ac longus. Elytrum nigrum, & castaneum, obiter tenuiterque punctatum. Corpus subtus fusco-rufum, magis nitens; Femora media tenuiora: postica fine laniina ad basim, ut in Carabis.

260. TENEBRI^O Flavus.

El. long. lin. 3. lat. 1½.

Diagn. Totus flavus; oculis nigris.

In umbellis Dauci Carotæ, & Athamante oreoselini, apud nos frequens.

Eset omnino Carabus, nisi antennæ attenuatae non forent, & careret lamina femorali Carabis propria. Huic antennæ extrorsum fuscescentes. Palpi articulus ultimus niger. Caput punctatum. Thorax punctatus, basi & apice truncatus, ad latus utrumque fovea notatus. Elytrum obsolete striatum, subpellucidum, flexible. Abdomen supra nigrum. Tibiae uno in latere spinoso-ciliatae.

261. TENEBRI^O Boleti.

El. long. lin. 2½. lat. lin. ¾.

Diagn. Ferrugineus; elytris nigris: margine undique ferrugineo.

Oculo reperi in aversa facie Boleti mei fuliginosi.

Oculi nigri, reniformes. Antennæ fusca: articulis subovatis: ultimo acuminato & rufescente. Inter oculos macula fusca, obsoleta. Thorax punctatus,

Etatus, in medio fuscescens & ellipticam foveam habens; lateribus rotundatis, angulis posticis acutis. Elytra punctata, substriata. Palpi duo, triarticulati, duo alii vix manifesti. Abdomen villosulum.

C A R A B U S. (x)

LINN. *Syst. Nat.* p. 413.

Caput elongatum, palpis agilibus. Thorax (clypeus) latus, aptice truncatus, marginatus. Elytra marginata. Ad basim femorum posticorum lamina magna Elliptica.

(*) *Majores*
feu

Lineis septem nunquam breviores.

262. CARABUS Nitens.

El. long. lin. 8 $\frac{1}{2}$. lat. 3 $\frac{3}{4}$.

LINN. *Syst. Nat.* p. 414.

Faun. Svec. 2. 785.

P. PODA. *Mus. Græc.* p. 45.

Diagn. Thorax subovatus: latere antico truncato capiti contiguo, altero subrotundato elytris adjacente porcatis, seu striis integerrimis scabriusculis elevatis, in quolibet (16).

In putridis hortorum, sepibus, truncis, nec non in sylvis intra ligna cariosa putrefacta.

Caput & thorax coloris atro-violacei. Thorax lin. 2 $\frac{1}{2}$. longus; 4. latus, absque fulco medio. Elytrum aurato-virens: striis nullibi interruptis, scabriusculis tamen, ut ideo medium locum teneat inter Nitentem & Auratum **LINN.** *Faun. Svec.* 2. Alæ nullæ. Corpus subtus, una cum antennis, nigrum, quandoque & atro-violaceum. Pedes colore corporis.

263. CARABUS Granulatus.

El. long. lin. 8. lat. 2 $\frac{3}{4}$.

LINN. *Syst. Nat.* p. 413.

Faun. Svec. 2. 781.

H 3

P. Po-

(x) Gens agilis, cursoria, timida, impatiens, *Lacertarum delitiae*.

P. PODA. Mui. Græc. p. 45. N. 4. non
hortensis.

Diagn. Elytrum striis longitudinalibus elevatis quatuor: binis mediis crassioribus; inter duas quasque striae est series punctorum elevatorum, (9-11), in quolibet ordine.

Habitat in putridis arboribus, et sepibus.

Mirum sane, quod Ill. LINNÆUS punctorum elytri quidem, linearum vero elevatarum iisdem interpositarum meminerit nihil. Thorax in hac specie lin. 2½ longus, 3 latus, basi, de more gentis, truncatus insensibiliter divergit, dein iterum convergit, antice leniter excavatus. Inter marginem elytri exteriorem & lineam ei proximam decurrit series alia punctorum minorum elevatorum multorumque. Antennæ, corpus, pedesque nigri coloris.

Variat 1. Capite, thorace, elytris æneis: ad marginem externum sub apice erosis.
Var. γ. LINN. Faun. Svec. l. c.

2. Simili colore, sed elytris virore aliquo tinctis, nec sub apice excisis.
Var. β. LINN. l. c.

264. CARABUS Catenulatus.

El. long. lin. 8½. lat. 3.

Diagn. Elytrum porcatum: striis tribus punctorum elevatorum, (in qualibet 15-16), quibus interjacent tres aliæ striæ elevatae scabriuscæ.

In putridis arborum truncis.

An sit *Carabus Intricatus* LINN. Faun. Svec. 2. 780, ex eius descriptione eruere non possum, *Hortensis* certe non est, ut striæ & puncta, minime excavata, sed elevata, & catenulis similia docent. Præterea huic thorax prioris, sed angulis posticis longioribus & dentiformibus. Inter marginem exteriorem & ei vicinam seriem punctorum, sunt plures quam tres lineæ longitudinales. Corpus pedesque nigri.

Variat 1. Capite, thorace, elytrisque atro-violaceis.

2. Colore ubique nigro, elytro versus apicem virescente.

265. CARAEUS *Coriaceus.*El. long. lin. $8\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{2}$.LINN. Syst. Nat. p. 413; ut arguo ex
descriptione.

P. PODA. Mus. Græc. p. 45.

Diagn. Niger; elytris punctatis: punctis pro-
minulis, confertis.In sylvis intra putridos *Abietum* truncos.III. LINNAEUS puncta excavata ponit, & sunt
etiam, si pro his summantur spatiola depressa pun-
ctulis eminentibus interjecta, alias minime. Margi-
nem elytri violaceum statuit P. PODA, quem in
speciminiibus meis etiam invenio. Huic quoque
thoracis anguli postici nihilo minus elongati, quam
in priore.266. CARAEUS *Leucophthalmus.*

El. long. lin. 5. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 413.

Faun. Svec. 2. 784.

Diagn. Niger, lucidus; elytro planiusculo, mi-
nus nitente, laevi: striis (3); tibiis spinosis.

Circa hortos, domosque.

Antennæ elytris breviores. Thorax *Car. Coriacei*,
sed pone truncatus angulisque minime dentatis, in-
ter thoracis lineam medianam depresso lateribus pa-
rallelam foveæ duo oblongæ ad marginem positiæ
pariter longitudinales. Elytri utriusque ad basim
latitudo simul sumpta, thoracis latitudinem vix
superat.(**) *Minores.*267. CARABUS *Spinipes.*El. long. lin. $4\frac{1}{2}$. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 415.

Faun. Svec. 2. 793..

Diagn. Caput, thorax, femora nigra, reliquæ
partes piceæ. Elytra striata: apice deflexa. Tibiæ
manusque spinosæ.Ruri degit, super tritici spicas frequenter
sedens.

Non totus hic spinipes; sed & ali Carabi ninores; hinc huius descriptio in *Pauna Svecica* merito desideratur. Antenn. fusco-ferrugineæ, villosulæ thoracis latitudinem longitudine lua vix æquantes. Thorax lineola excavata media longitudinali. Elytrum striis punctatis (9), latitudine æqua ad longitudinem thoracis, ad marginem exteriorem infra apicem leniter excisum. Infra apices tibiarum anticarum spina magna nigra.

268. CARABUS *Vulgaris.*

El. long. lin. 3—4. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 415.

Faun. Svec. 2. 799.

Diagn. Thoracis longitudine elytri latitudine major. Idem antice paulo latior quam postice. Corpus pedesque nigri.

Circa hortos paßim.

Quæso, ne in hac & in insequente specie ad colores attendant Curiosi, quibus nihil in his fane facilius. Nihil hoc Carabo frequentius, & tamen nigro-æneus nondum a me visus, sed 1. Totus niger. 2. æneo-virens. 3. elytris fusco-nigris. Omnes apteri.

269. CARABUS *Elegans.*

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

An *Cerulscens*. Celeb. Linnæi huc etiam revocandus?

Diagn. Thorax longitudine sua elytri latitudinem non superans, pone & antice æque latus. Pedes rufi. Corpus alatum.

Habitat cum priore.

Var 1. Colore supra viridi.

2. — violaceo. Cæterum priori similis.

270. CARABUS *Metallicus.*

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Supra æneus nitens; thorace lateribus conniventibus ut in *Scarabæis*; antennis basi fulvis.

In hortis.

Elytra levissima: lineolis excavatis longitudinalibus (9), linea prope marginem extenuum punctata. Corpus subtus pedesque nigri. Alæ hyalinae:

næ: macula conica, ferruginea, marginali. Tibiæ, manusque spinosæ, fusco-rufæ.

271. *CARABUS Cordatus.*

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Thorax vere obcordatus.

In pomariis.

Caput & thorax fusco-virent, & valde nitent. Antennæ basis fusco-rufa. Elytra striata ut in priore, æneo-virentia. Corpus subtus fusco-virens. Tibiæ fusco-rufescentes, spinoso-ciliatæ.

272. *CARARUS Junceus.*

El. long. lin. 3 $\frac{1}{4}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Statura vulgaris, sed Thorax pone angustior eodemque modo constructus, ut in *Granulato*.

In sylvestribus locis.

Sub nomine *Carabi* spinipedis minoris missus etiam a DOCTISS. & R. P. PODA. Antennis villosis, apice piceis. Elytris striatis; striis elevatis (9), infra apicem in margine externo obiter erosis. Tibiæ piceæ, spinosæ.

273. *CARABUS Germanus.*

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{8}$.

LINN. Syst. Nat. p. 415.

P. PODA. Mus. Græc. p. 46.

Diagn. Caput fulvum. Thorax atro-cæruleus. Elytrum subpellucens, testaceum: macula ovata, acuminata, atro cærulea, ad apicem.

In paniculis *Graminum*.

Caput utrinque fulvum punctatum, oculis nigris, antennis rufis capite duplo longioribus. Thorax punctatus, villosulus: soveolis binis posticis obsoletis. Elytrum testaceo-ferrugineum, villosulum, striatum: striis excavatis (9). Corpus subtus nigrum. Pedes thoraci concolores: tibiis manibusque ciliato-spinosis.

274. *CARABUS Bimaculatus.*

El. long. lin. 2. lat. 2.

Diagn. Niger, villosus, elytri gutta baseos palpis antennis basi tibiisque rufis.

Ruri degit.

Elytra punctatim striata. Lamina femoralis exigua.

275. CARABUS Marginatus.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

Diagn. Caput & thorax æneo-viridis coloris. Elytrum testaceum : margine toto fasciaque fuscis.

Inveni super fabulum prope torrentem *Idriam*.

Thorax elytri latitudine, linea longitudinali media exaratus, absque foveis posticis. Elytrum pellucens & coloratum ut in *Germano*, sed toto margine undique fasciaque media coloris fusco-caustanei. Ferruginei sunt palpi, bases antennarum, pedesque. Tibiæ & manus ciliato-spinosæ. Conf. *Carabum Ustulatum*. LINN.

276. CARABUS Salicinus.

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Niger, punctatus; elytris fuscis striatis; antennis pedibusque ferrugineis.

In *Salice*.

Ubi niger, ibi lucidior. Elytra villosoula, punctata, striataque. Tibiæ & manus spinosæ.

277. CARABUS Arenarius.

El. long. lin. — lat. —

Diagn. Æneo-fuscus; thorace subrotundo, posse dentato; pedibus rufis.

In arena.

Pediculo vix duplo major, nitidissimus. Antennæ villosoæ. Elytra punctatim striata. Tibiæ & manus ciliato-spinosæ.

ELA.

ELATER. (†)

LINN. *Syst. Nat.* p. 404.278. ELATER *Pectinicornis.*El. long. lin. $5\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{4}$.LINN. *Syst. Nat.* p. 406.

Faun. Svec. 2. 741.

Diagn. Color homogeneus fusco-viridi-aeneus.
Antennæ masculæ pectinatæ.In *Salice.*

Antennæ (maris) thorace duplo longiores, pectinatæ : dentibus octo. Caput & thorax villosa punctata. Thorax sulco longitudinali medio. Elytrum minus villosum, punctatum, striatum, accuminatum.

279. ELATER *Nitens.*El. long. lin. $4\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{3}$.*Aeneum LINNAEI* dicerem, si pedes effident sanguinei.*Diagn.* Toton nitens, aeneus, subtus fusco-virescens ; pedibus aeneis ; elytris striatis.In *Carniola super.*

Thorax punctatus ; elytri utriusque latitudine, antennis paulo brevior. Elytra punctata & striata.

289. ELATER *Serraticornis.*El. long. lin. $5\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{3}$.*Diagn.* Fuscus ; abdomine supra pedibusque fulvis.In *Salice.*

Caput cum thorace punctatum, raris villis adspersum. Thorax absque sulco. Elytrum punctatum : striis obsoletis elevatis, valleculis interjectis pun-

(†) *Elateres nostri*, thoracem ex angulis posticis dentatum habent, ultimo excepto.

Idem color capitis, thoracis, elytrorum, 266-271 capitis & thoracis, 272-276. aliter ac priores 277-280.

punctatis: punctis majoribus. Abdomen nigrae
fuscum, alibi supra fulvum. Pedes fusco-fulvi.

281. ELATER *Fasciatus*.

El. long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 406.

Faun. Svec. 2. 737.

Diagn. Niger, opacus; thorace sulco medio;
elytro fascia undata, albida.

In arboribus variis.

Thoracis latera parallela, apice convergentia,
anguli postici prominuli. Caput, thorax, elytra
punctis prominentibus exasperata. Elytra non striata,
versus apicem fascia, litteram S referente albi-
da, punctulisque similibus ad apicem usque ato-
mata. Abdomen supra fulvo-rufum, subtus nitore
aliquo praeditum.

282. ELATER *Thoracicicus*.

El. long. lin. 5. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 41. N. 5. non
obscurus.

Diagn. Fuscus, albidis punctulis variegatus;
thorace angulis posticis exstantibus obtusis.

In Salicibus non rarus.

Facies prioris, ut & statura, sed thorax abs-
que sulco. Elytra striata. Corpus villosum. Fa-
scia elytri nulla, sed punctula sparsa albida, ubi-
que aut versus apicem. Cæterum thorax pariter
æque latus ac elytrum utrumque, & abdomen su-
perne fulvo-rubrum. Conf. Elat. *Tesselatum*. LINN.

Variat 1. Colore nigricante, elytris apice solo
punctatis.

2. Thorace nigricante, elytris fuscescen-
tibus.

3. Punctis elytrorum cinereis, testaceis,
albidis.

283. ELATER *Montanus*.

El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Villosum, niger, nitens; antennis basi
tibiisque fulvis.

In floribus *Laserpitii* filer.
Elytra striata, punctata.

284. ELATER *Obscurus*.El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 406.

Faun. Svec. 2. 735.

Diagn. Corporis longitudo quadrupla ad crassitatem. Villosum totus, & fuscus; elytris obscure striatis: striis punctatis excavatis.

In *Salice*, & floribus *Pastinace*.

Antennae elytris duplo breviores. Thorax obscurior elytris & lucidior. Tibiae manusque rufescentes.

Var. 1. Colore fusco homogeneo.

2. Thorace elytris obscuriore.

3. Thorace minus villoso, elytrisque rufostaceis.

4. Antennis thorace duplo longioribus, elytrisque testaceis, statura minore.

285. ELATER *Sputator*.El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 405.

Faun. Svec. 2. 734.

Diagn. Facies prioris; sed Thorax niger lucidior crassior; elytra punctata & evidenter striata, ad apicem obscuriora, testacea.

In *Salicibus*.

Antennae longitudine thoracis pedesque rufi. Abdomen supra & infra nigrum.

286. ELATER *Castaneus*.El. long. lin. $5\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 405.

Faun. Svec. 2. 727.

P. PODA. Mus. Græc. p. 41. N. 1. non *Pectinicornis* LINN.

Diagn. Antennæ nigræ, (mari) pectinatæ. Caput & thorax fusco-viridis coloris. Elytra flavicantia: ad apicem macula lanceolata thoraci concolore.

In *Salicibus*, & pomiferis arboribus.

Crassior

Crasior & nihilo minor *Pectin.corn.*, quo cum
convenit antennis masculis pectinatis : pectinibus
octo, femineis vero dentatis. Thorax huic etiam
fusco majore medio longitudinaliter exaratus. Ely-
tra subpellucida, evidentius striata & punctata.
Thorace testaceo & corpore vere nigro nondum a
me visus est.

287. ELATER *Sanguineus.*

El. long. lin. 4. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 405.

Faun. Svec. 2. 731.

P. PODA. Mus. Græc. p. 41.

Diagn. Niger ; elytris scarlatinis, punctatis, stria-
tis.

In *Salice*, & *Pastinaca sativa*.

Thorax supra villosulus, subtus tenuiter pun-
ctatus. Elytrum striis elevatis punctatis, vallecu-
lis intermediis punctatis.

288. ELATER *Advena.*

El. long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger ; elytris testaceis : fasciis binis,
latis, castaneis.

In *Salicetis*, rarus.

Thorax villosus, antenpis paulo brevior. E-
lytrum striatum, villosulum : striis binatis excavatis ; una solitaria ; hujus color duplice sumi po-
test, vel enim talis, qualem dixi, vel inverso modo,
nempe castaneus : apice basi fasciaque media
repanda testaceis. Proximus. Elat. Syriaco. ill.
LINNAEI.

289. ELATER *Istriacus.*

El. long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger ; thorace elytrisque rubris.

In *Istria Austriaca*, & circa Tergestum.

Antennæ subpectinatae, thorace duplo longiores. Caput nigrum, oculis prominulis. Thorax in medio æque latus ac longus, sulco longitudinali, postice inter angulos dentatos nigredine inqui-
natus. villis adspersus. Scutellum nigrum. Ely-
trum pimelialis congestis prominulis scabrum, inter
quæ villi parvi adscendentibus prodeunt, idem tribus
lineis

lineis elevatis parallelis longitudinaliter striatum est margine utroque cuiusque lineæ excavata linea notato. Abdominis apex ruber. Corpus subitus pedesque nigri, nitore aliquo lucidi.

290. ELATER Gramineus.

El. long. lin. 3. lat. fere 1.

Diagn. Niger; thorace utrinque fulvo.

In *Graminibus* non rarus.

Sanguineo paulo minor, *Lepturam* referens, sed verissimus *Elater*. Totus niger, thorace excepto, qui tamen subitus in medio pariter nigricat, nec fulco superne exaratus sed convexus, minime punctatus, aut manifeste villosus. Elytra striata. Differt a *Ruficollis LINNAEI*, statura, thorace antice nunquam nigro, imo superne nullibi, ideoque fascia illa transversali, lata, rubra, lunulata: cavitate lunulae caput spectante, quam thoraci *Ruficollis* sui tribuit. Ill. LINNAEUS. Faun. Svec. 2. 724. minime nostrum indicat.

291. ELATER Ferrugineus.

El. long. lin. 2. lat. 2.

Diagn. Caput fuscum. Thorax corpus pedesque ferruginei. Elytrum testaceum: apice fascia que fuscis.

Ad littora fluviorum, rivorumque, circa *Salices*.

Antennæ ferrugineæ. Thorax villosus, rufus magis quam ferrugineus, absque fulco medio. Elytrum villosulum, punctatum & striatum: subitus septem seriebus longitudinalibus punctorum excavatorum lineatum.

292. ELATER Degener.

El. long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger; aureis punctis variegatus; thorace postice edentato.

Circa *Tergestum*.

Staturam *Elateris Sanguinei*, *Lacertæ Salamandri* colores habet, a sociis vere degener, ob thoracis angulos posticos rotundatos, non vero dentatos. Totus niger & villosus, antennas gerit dentatas, thorace vix longiores. Thoracem in latitudinem magis, quam longitudinem extensem. Elytrum striatum:

tum: striis (12.); valleculis interjectis punctatis. Corpus subitus modice nitens. Puncta flava in thorace tria, in quolibet elytro octo alterna subrotunda aureo colore, non vero nitore, praedita, æqualis magnitudinis, unico excepto, nempe antico penultimo prope marginem interiorem collocato.

D Y T I S C U S. (+)

LINN. Syst. Nat. p. 411.

293. DYTISCUS Piceus.

El. long. unc. 1. lin. 5. lat. 6 $\frac{1}{3}$.
LINN. Syst. Nat. p. 411.

Faun Svec. 2. 764.

Diagn. Antennæ palpis exterioribus breviores clavatae: stipite rufo articulis (4), clava obscuriore articulis (3) perfoliatis: ultimo ovato compresso, inferioribus uno latere dentatis.

In lacubus Carnioliae.

Maximus nostrorum, niger totus aut piceus, nitens, iners. Palpi ferruginei. Caput subitus basi villosum. Thorax basi lin 8 $\frac{1}{2}$. latus, 3 $\frac{2}{3}$. longus, subitus inter pedes medios & posticos rufo sericeo villo pubescens. Elytrum versus apicem striatum, ex apice denticulum proferens, subitus striis rutis integris & dimidiatis. Apex sterni mucronatus, integer, tres fere lineas longus. Abdomen nihilo magis mucronatum, quam in plerisque insequentibus.

Dytiscus. FRISCH. Ins. 2. Tab. 6. fig. 1. 5. p. 26. ratione apicis sterni hoc referri posset.

294. DYTISCUS Marginalis.

El. long. lin. 11 $\frac{1}{2}$. lat. 4 $\frac{3}{4}$.
LINN. Syst. Nat. p. 411.
Faun. Svec. 2. 769.

P. Po-

(+) *Dytisci* Genus naturale demonstrant metamorphosis, proprietates, habitus. Larva maxillosa Leo larvarum *Libellulae* aliarumque aquaticarum, Insectum interdu natit, noctu evolat. Corpus oblongum, capite obtuso.

P. PODA. Mus. Græc. p. 43.

ROESEL. Inf. aquat. Cl. I. Tab. 1. fig. 9.
IO. II.

Diagn. Fuscus, seticornis; thorace luteo margine cincto; elytris margine exteriore flavis.

In aquis stagnantibus.

Parvulus adhuc thoracem rufum habet macula media transversa fusca, & subtus ater est, pedibus anticis mediisque rufis. Adulto vero sunt antennæ setaceæ, thorace duplo longiores, attenuatæ: articulis (9). Caput fuscum: apice lineaque lunata frontali colore marginis thoracis. Elytrum fuscum: lineolis binis, obsoletis, punctatis. Corpus subtus maxima parte femorum colore. Pedes postici a reliquis remoti. Apex sterni bifidus.

Variat margine thoracis, & elytri, capite antice, femoribusque rufis.

295. DYTISCUS Punctatus.

El. long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger, seticornis; thoracis margine tota lineaque media transversa, frontisque linea trigona, rufis; elytris testaceis, subpellucidis: postice fascia abrupta punctisque plurimis atris.

In lacubus nostris, non rarus.

Corpus mediæ magnitudinis. Antennæ attenuatæ, articulis (9) rufis: apice fuscis. Palpi rufi, breves. Caput linea rufa terminatum: linea in fronte rufa (V). Thoracis linea transversa: apicibus dilatatis. Alæ hyalinæ. Apex sterni bifidus. Mari elytrum punctatum, absque sulcis & pilis, striis obscurissimis elevatis, tribus; punctorum majorum & nigrorum seriebus longitudinalibus tribus, quibus interjacent alia minora plurima congesta & in lineolas, gyrosque labyrinthiformes, confluentia. Fæmine e'ytrum lineis quatuor elevatis lucidioribus glabris, spatiis interjectis pilosis; punctorum majoribus seriebus tribus minus evidenter, punctisque aliis plurimis minoribus sparsis fuscenscentibus: plerisque distinctis. Pedes antici absque palmula.

Huic similem descripsit Cl. P. PODA sub nomine *Cinerei* LINN. qui noster non est, ut *Cinerei* descriptio novæ Faunæ Svecicæ docet. *Dyt. Sulcatus*

tus LINNÆI multa cum nostro similia gerit, sed *Minuto* minor cum non sit, nullaque punctatorum elytrorum mentio ibidem facta fuerit, ita nomine alio hunc ipsum donavi.

296. DYTISCUS *Uliginosus.*

El long. lin. 2. lat. 1.

LINN. Faun. Svec. 2. 776.

Diagn. Caput rufum; oculis & macula lunata postica nigri coloris, cavitate caput spectante. Elytrum fuscum, punctatum: margine exteriore ferrugineo.

In lacubus.

Nihilo major *Dyt. Natatore.* Thorax rufus: antico margine obscuriore. Antennæ setaceæ, palpi, pedesque rufi. Elytrum nigricans, punctulis excavatis notatum, margine externo ex rufo-ferrugineo, cui ad apicem immersa est linea fusca, margini parallela; fuscus elytri color ad apicem cum ferrugineo ita confusus est, ut dentes tres fuso-ferrugineum marginem penetrare videantur. Corpus nigrum. Sterni apex obtusus. Sed de *Dytiscis*, præcipue minoribus, difficile judicium est.

297. DYTISCUS *Minimus.*

El. long. lin. $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{1}{4}$.

Diagn. Statura *Chrysomelæ Nemorum*, ovatus, niger; elytris apice lineisque tribus albidis.

In stagnis, copiosus.

Vix lineam longus, agilis, fere gregarius. Antennæ setaceæ: apice obscuriores. Caput & thorax niger. Linca una elytri submarginalis, binæ ad basim. Corpus nigrum. Pedes rufi, tibiis anticis absque palmulis. Notoneptum non esse, docet defectus rostri.

298. DYTISCUS *Rufus.*

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Antennæ clavatæ. Elytra levissima obscuriora: margine exteriore albido binis dentibus antice instructa.

In lacubus.

Totus nitens & rufus, sed elytra obscuriora, neque punctata, nec lineata. Oculi fusi. Sterni apex

Dytiscus. COLEOPTERA Staphylinus. 99

apex obtusus. Elytri fascia marginalis antice bidentata.

299. DYTISCUS *Natator.*

El. long. lin. 2 $\frac{1}{3}$. lat. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 412.

Diagn. Super aquas citissime discurrit, ad solem speculi ad instar splendidissimo nitore fulgens.

In aquis stagnantibus.

Æneo-fuscus, nec apud nos niger. Pedibus & elytri margine externo deflexo rufi coloris. Elytrum punctorum seriebus (12). Pedes æquidistans. Apex sterni bifidus.

STAPHYLINUS. (+)

LINN. Syst. Nat. p. 421.

Antennæ moniliformes. Alæ elytris dimidiatis truncatis tectæ.

300. STAPHYLINUS *Ophthalmicus.*

Tot. long. lin. 7.

Diagn. Atro-ceruleus, punctatus, oculis macula pallidiore lunulata suffusa.

In fylvis nostris.

Capitis, thoracis, elytri eadem longitudo. Caput thorace crassius, thorax elytris; omnia haec confertim punctata. Pili pauci e margine capitis & thoracis. Abdomen villosum postice dilatatum.

301. STAPHYLINUS *Fulvipes.*

— long. lin. 5.

Diagn. Atro-ceruleus, palpis pedibusque fulvis.

In fylvis.

I 2

An-

(+) *Staphylini* unicolor, capite, thorace, elytris eodem colore tinctis. 287 - 292.

Non uno eodemque colore præditis.
293 - 298.

300 *Staphylinus.* ORDO I. *Staphylinus.*

Antennæ articulis (10) duobus primis, totidemque ultimis rufescentibus, cæteris atris. Caput, thorax & elytra villosa, punctata. Abdomen nigrum, villosum.

302. *STAPHYLINUS Murinus.*

—. long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 421.

Faun. Svec. 2. 840.

Diagn. Fimetarius, villosus, cinerascens nigro-nebulosus.

In itercore *Equi*, *Bovis*.

Caput thorace brevius, elytra longitudine thoracis. Fuscus apud nos & niger punctulis indistinctis cinerascentibus, quandoque & rufescens nebulosus.

303. *STAPHYLINUS Clavicornis.*

—. long. lin. 2.

Diagn. Niger antennæ articulis tribus ultimis crassioribus. Pedes rufi.

Inveni 7^{ma} April. sub cortice *Pyri mali*, prope radicem.

Antennæ semilineam longæ, articulo primo superioribus crassiore & lucido. Palpi clavati rufescentes. Caput & thorax punctis prominulis scabrum. Thorax subtus rufo villo pubescens. Altri non rudimenta. Abdomen villosum, elytris lucidius. Pedes rufi: genubus atris.

304. *STAPHYLINUS Politus.*

—. long. lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 422.

Faun. Svec. 2. 843.

Diagn. Thorax punctis nonnullis excavatis, una cum capite & elytris, marmoris politissimi in modum laevigatus, plerumque nigri coloris.

Passim in hortis, & sylvis.

Adeo variat, ut character specificus vix statui queat. Ill. LINNAEUS differentiam essentialem instituit in punctis decem thoracis excavatis, lente conspicuis. Ego etiam hæc puncta video sed numero variantia a 3-8., rarissime decem. Invenitur apud nos totus niger, & elytris rufis, nec non totus

Staphylinus. COLEOPTERA. Staphylinus. 101
totus ater pedibusque rufelcentibus. Antennæ articulis (10).

305. STAPHYLINUS Boleti.

—. long. lin. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 423.

Intra tubulos *Boleti* 3. Fl. Carniol.

Diagn. Fuscus, antennis lividis aut ferrugineis. Elytra marginata. Abdomen superne villosum.

306. STAPHYLINUS Erythropterus.

—. long. lin. 7 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 422.

Faun. Svec. 2. 842.

P. PODA. Mus. Græc. p. 48.

Diagn. Niger, elytris pedibusque rufis.

Variat 1. Elytris rufis: apice fuscouscentibus, thorace margine antico & postico nec non punctis duobus subaureo nitore lucidis.

In stercore *Bovis*.

2. Capite, thorace, elytris, tibiis manibusque rufis. Statura minore. Thorace nullibi aureo splendore fulgido. Antennis totis fuscouscentibus.

In sylvis abietinis, super *Muscos*, discurrit.

Utrique thorax antice subtruncatus, pone rotundatus, elytris nihilo brevior. Abdomen & corpus nigri coloris. Partes omnes villis lucidis pubescentes.

307. STAPHYLINUS Rufus.

—. long. lin. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 422.

Faun. Svec. 2. 844.

P. PODA. Mus. Græc. p. 49.

Diagn. Niger color capiti, elytrorum apicibus, abdominis apici, corpori sub elytris; fulvus thoraci, antennis, palpis, elytris, abdominis basi, pedibus.

Pasim occurrit.

Maxillæ porrectæ, validæ, cruciformiter in cadavere incumbentes. Lucidus totus. Antennæ elytris breviores, extrorsum crassiores. Thorax

102 *Staphylinus.* ORDO I. *Staphylinus.*

fulvus potius quam rufus. Elytra basi fulco uno aliove obsoleto exarata. Femora basi modo nigro-modo fusco-rufa.

308. *STAPHYLINUS Gregarius.*

—. long. lin. 3-4.

LINN. Syst. Nat. p. 422. riparius.

Faun. Svec. 2. 846.

Diagn. Caput, elytra, abdominis apex, femora apice, nigro-cæruleo colore tincta gerit, alibi fulvus.

Gregatim habitat in terra, ad arborum truncos in pomariis, circa sepes, prata apud nos frequens.

Priore duplo fere tenuior est, nec adeo longus. Antennæ rufæ, elytris longiores, articulis decem, non computata basi. Caput politum. Thorax pariter nitens, ovatus. Abdominis segmenta tria ultima elytri colore, horum primò cæteris omnibus longiore.

309. *STAPHYLINUS Brassicæ.*

—. long. lin. 1½.

Diagn. Ferrugineus; capite & corpore nigris. In floribus *Brassicæ oleraceaæ*.

Antennæ extrorsum crassiores, villosæ. Elytra punctata.

310. *STAPHYLINUS Arnice.*

—. long. lin. 1.

Diagn. Niger, thorace antennisque ferrugineis, pedibus testaceis.

Inveni in floribus *Arnicae scorpioidis*, summis in alpibus.

Palpi pedibus concolores. Antennæ thorace duplo longiores, articulis (10), apice truncatis, ultimo ovato. Alæ hyalinæ.

311. *STAPHYLINUS Hellebori.*

—. long. lin. 1½.

Diagn. Niger; elytris antennis pedibusque ferrugineis.

Magnitudo pediculi. Antennæ extrorsum crassiores. Thorax & elytra punctata.

FOR.

FORFICULA.

LINN. *Syst. Nat.* p. 423.

Antennis setaceis & cauda forcipata differt
a *Staphylino*.

312. FORFICULA Auricularia.

—. long. lin. —.

LINN. loc. cit.

Faun. Svec. 2. 860.

FRISCH. Inf. 8. Tab. 15.

Diagn. Forcipes incurvi, abdomine nihilo
breviores, uni sexui.

In plantis reperitur passim.

Thoracis clypeus antice truncatus, lateribus
parallelis, pone rotundatus, planus. Ultra elytri
apicem prominent alæ pluries complicatae & rubi-
neo colore interius fulgidæ, apex albidus, qui
facile incautos decipit præfiferens maculam albam
in apice elytri, qui tamen immaculatus. Forceps
supra basini, interno latere, dente iniructus, raro
muticus.

BLATTA.

LINN. *Syst. Nat.* p. 424.

313. BLATTA Orientalis.

El. long. lin. 6. lat. $2\frac{1}{2}$.

LINN. *Syst. Nat.* p. 424.

Faun. Svec. 2. 862.

FRISCH. Inf. 5. Tab. 3. fig. 1. 2.
p. 11-15.

P. PODA. Mus. Græc. p. 49. lucifuga.

I 4

Diagn.

Nymphææ albæ radix cum laetè cocta *Gryllos*, *Blat-*
tasque occidit. LINN. II. Svec. 2. 470. Idem
facit fumus Carbonum fossilium.

Diagn. Elytrum truncatum: apice rugosum, venis ramosis rugas distinguenteribus. Femora omnia spinosa.

Habitat in culinis, pistrinis, tuguriis rustico-rum, nimium frequens.

Gregaria, lucifuga, summo sensu, veloci cursu, fœcundatione nitra, difficulter extirpanda, statutram unciam attingit, raro superat, noctu *Carabi* ad instar prædam quærit, cibariis infensa, delectatur in primis caseo pane frina, ætate & sexu *Cuculi Canori* in modum variant 1°. Colore testaceo homogeneo. 2°. colore fuscescente, alis rufo-ferrugineis. 3°. Colore nigricante, pedibus fusco-rufis, corpore elytris aliquo destituto.

314. BLATTA *Sylvestris.*

El. long. lin. 5. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 50.

Diagn. Thoracis margo & elytra testacea. Antennæ, & corpus subtus, nigri coloris. Pedes saltatorii.

In sylvestribus, gramineis, apricis, inter frutices, passim obvia.

Mas longior, thorace nigro, elytris abdomine longioribus, alis elytro longioribus acutis. *Fæmina* brevior, crassior, thorace rufo, elytris abdomine, alis elytro brevioribus.

Junior aptera, elytrorum rudimentis, abdominis apice rotundato. Adulta frutices ascendit, currit velociter, saltu ab hoste fugit, elytrum gerit venuis pallidioribus anastomosantibus reticulatum, linea fusca prope basim margini exterio parallela variegatum, rugulisque parallelis obliquis ad marginem exteriorem crispatum, subpellucidum, acutiusculum. Femora media & postica binis remotis spinulis armata, pariter testacea. Corpus subtus nigrum, triplo certe minus, quam in priore. Primus hanc nominavit Cl. P. PODA.

GRYLLUS. (†)

LINN. Syst. Nat. p. 425.

315. GRYLLUS Religiosus.

El. long. unc. 1. lin. 4. lat. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 426.

ROESEL. Locust. Tab. 1. fig. 2. & Tab. 2.
fig. 5.

Diagn. Thoracis longitudo est elytri dimidia.
Elytrum & apices alarum viridi colore tincti.

Ab Ill. piæ memoriæ. Comite Carolo a Lambreg communicatus, qui ex Austria obtinuit, ubi inter vites spontaneum esse monuit, & vocari ibidem das wanderende blatt. Hoc unum non indigenum animal, inter mea collocatum, describere & proponere haud inutile visum est.

Caput incurvum, antice convergens, pone rotundatum & thorace latius. Thorax undique marginatus, postice obtusus, linea dorsali elevata, supra medium dilatatus ac demum convergens, latitudine summa lin. 2 $\frac{1}{2}$. Elytra pallidius virentia, quam in *Viridissimo*, exterius marginata, linea elevata recta longitudinali lineæ intervallo a margine exteriore distans. Inter hanc lineam & marginem sunt venulæ obliquæ, ramosæ : ramis anastomosantibus. Abdomen lanceolatum, antice rufescens, pone flavicans, subitus apice virens. Pedes antici sex linearum intervallo a mediis remoti, sub dilatata thoracis regione nati, femoribus triquetris, crassis, semiunciam longis, inflexis.

316. GRYLLUS Bipunctatus.

El. long. lin. 2 $\frac{1}{2}$. — 4. lat. 1.

I 5

LINN.

(†) *Gryllorum nostrorum* alæ posticæ, flabelli muliebris in modum plicatae. Absque his si foret Natura, inopiam graminis doleret agricola, nec garrulæ post fœniseccum *Monedulae* prata lustrarent.

LINN. Syst. Nat. p. 427.

Faun. Svec. 2. 864.

P. PODA. Mus. Græc. p. 50.

Diagn. Thoracis cucullus cuneiformis maculatus loco elytrorum.

In pratis, & circa hortos.

Cucullus modo abdominis longitudine, modo eo longior, maculis vel punctis binis albidis. Corpus, fulcum aut ferrugineum. Sed cavendum ne hoc referantur larvæ aliarum specierum.

317. **GRYLLUS** *Gryllotalpa*.

El. long. lin. 6. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 428.

Faun. Svec. 2. 866.

ROESEL. Locut. Germ. Tab. 15. fig. 7-8.
apterus. fig. 9. alatus.

FRISCH. Insect. 11. Tab. 5. fig. 1. 2. 3.

Spectacle de la Nat. Tom. I. Entret. 8.
p. 194. fig. G.

P. PODA. Mus. Græc. p. 50.

Carniol. Mramar.

Diagn. Pedibus anticis palmatis validis crassis, cuniculos sub terra culta fodit, globosum nidum ibidem exstruit.

Hortorum & olerum summa calamitas. Fimo equino allicitur, porcino pellitur.

Gryllotalpe nomen præstantissimum, ex felici connubio *Grylli* & *Talpe* natum, cuius naturam habet, ejus vero character. Ova ponit fere ducenta intra glebam terream, uni locularem, fossa vallatam, iis depositis ubique clausam. Tanta est sollicitudo matris a frigore & ab hoste nidum præservantis, ut proliis amore, & otii fuga formicis cedat nihil. Dantur apteræ & alatae, stridulæ & mutæ, iliaæ mares haæ fæminæ. Effœtæ propriis pediculis infestantur. Scrophulis discutiendis a nostratis applicantur.

Labium oris infer. carnosum emarginatum, superius sit lamina mobili obtuse conica. Maxillarum par primum edentatum. Palporum articulus ultimus obtusus: apice pallidior. Tubercula duo sphærica nigra inter oculos. Thorax pulvinatus
ova-

ovatus, fuscus, antice emarginatus, pone rotundatus, margine fulvo. Elytra corniculis caudalibus nihilo longiora. Manus antice digitis quatuor dentiformibus, ex palma pollicem biunguiculatum proferentes.

318. GRYLLUS *Domesticus.*

El. long. lin. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 428.

Faun. Suec. 2. 867.

ROESEL. Locust. Germ. Tab. 12.

P. PODA. Mus. Græc. p. 51.

Diagn. Corpus glaucescens. Alæ caudatæ, elytro longiores. Tibiæ posticæ spinosæ.

Habitat in hypocaustis rusticorum circa formam, toto anno stridens, præsertim instante pluvia. Notissimum animal descriptione non eget.

319. GRYLLUS *Campestris.*

El. long. lin. 6. lat. 3-4.

LINN. Syst. Nat. p. 428.

ROESEL. Locust. Germ. Tab. 13.

FRISCH. Inf. 1 Tab. 1.

P. PODA. Mus. Græc. p. 51.

Carniol. Murnz.

Diagn. Thoracis longitudo eadem, quæ capitis inter oculos. Elytrum testaceum, alis longius, venis fuscis. Femora postica subtus fulva. Alibi totus niger.

Habitat in collibus herbidis argillaceis. Stridet a prima die M. Maji, usque ad æquinoctium aestivum. *Domesticus* factus, pellit *Gryllum* priorem.

Antennæ corniculis caudalibus duplo certe longiores. Tibiæ anticæ, prope basim, macula argentea oblonga interne notatae. *Fæmina* abdomine ensata: ense recto *Ichneumonis* aculeum referente. *Mas* stridule cantillans, ab domine mutico.

320. GRYLLUS *Viridissimus.*

El. long. unc. 2. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 430.

Faun. Suec. 2. 869.

ROESEL.

ROESBL. Locust. Germ. Tab. 10.

FRISCH. Ins. 12. Tab. 2. fig. 1. p. 3-7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 51.

Diagn. Antennæ elytro longiores. Elytrum virens, salicis folium referens.

Habitat in pratis, post fœniseicum arva petens.

Maximus inter nostros. Capitis vertex elevatus in obtusum mucronem. Ensis *feminae* abdomen terminans fere uncialis rectus, attenuatus. Femora postica subtus canaliculata. Tibiae tetragonæ, spinosæ, fistulosæ, posticæ denticulis 4 terminatæ. Antennæ ferrugineæ. Strigæ (2) flavæ longitudinales sub abdome.

321. **GRYLLUS Verrucivorus.**

El. long. unc. 1. lin. 3. lat.—

LINN. Syst. Nat. p. 431.

Faun. Svec. 2. 870.

P. PODA. Mus. Græc. p. 52.

Diagn. Antennæ elytri longitudine. *Feminae* ensis compressus recurvus fuscus nitens, longitudine capitis.

Habitat in pratis.

Alæ non raro fuscæ, maculis pallidioribus. Vertex capitis puncto fusco notatus. Femora exterius in medio punctis binis fuscis.

322. **GRYLLUS Falcatus.**

El. long. lin. 9. lat. 2.

P. PODA. Mus. Græc. p. 52.

Diagn. Antennæ longissimæ. Elytrum viride alis brevius. Alæ margine exteriore versus apicem coleoptratæ. Abdomen *femineum* terminatum ense sursum inflexo ferrugineo quadruplici.

In sylvestribus Carnioliae, fruticibus passim insidet, minime rarus.

Thorax ut in *Viridiſſimo*, sed absque lineola elevata longitudinali media. Elytrum immaculatum. Alæ hyalinæ, elytris longiores, contra ac in *Viridiſſ.* Pedes postici antennis setaceis breviores.

323. **GRYLLUS Migratorius.**

El. long. unc. 2. lat. lin. 5.

LINN.

LINN. Syst. Nat. p. 432.

Faun. Svec. 2. 871.

ROESEL. Locust. Tab. 24. fig. 1. 2. 3.

FRISCH. Ins 9. Tab 1. fig. 8.

Diagn. Fuscus, digitii longitudine. Antennæ thorace longiores. Elytra circellis fuscis cœcis.

Apud nos rarer. Circa Goritiam invenit, & ejus descriptionem communicavit. R. P. WULFEN.

Maxillæ ferratae, apice nigrae. Thorax medio depresso, carina flava, fulcis tribus exaratus. Alæ hyalinæ. Corniculi parvi. Crura pottica hexagona, basi crassiora. Tibiae posticæ cœruleæ, denticulis albis : apice nigris.

Variat elytro modo circellis, modo maculis angulariatis, modo lineolis characteriformibus, variegato. Quo magis color æris decrescit, eo magis fuscus fit hic *Gryllus*.

324. *GRYLLUS Pellucens.*

El. long. lin. — lat. —

Diagn. Caput album, subpellucens. Thorax trapeziformis. Elytrum ovato - oblongum ; striis tribus cruciformiter sese secantibus.

Descriptionem *Goritia* misit Cl. P. WULFEN.

Oculi nigri. Antennæ corpore longiores, albidae. Palpi albi, tribus articulati. Thorax longitudine capitisi. Alæ corpore paulo longiores, albæ. Pedes albidi, subpellucidi. Cornicula caudæ alba.

Vesperi & tota nocte clamat, sub folio latet, adventantes observat, ad minimum strepitum tacet.

325. *GRYLLUS Cœrulescens.*

El. long. lin. $11\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{8}$.

LINN. Syst. Nat. p. 432.

ROESEL. Locust. Germ. Tab. 21. fig. 4.

P. PODA. Mus. Græc. pag. 52.

Diagn. Elytrum fuscescens, basi & fascia obscurioribus. Alæ fascia nigra, dein ad basim usque cœrulecentes.

In faxosis, apricis, sterilissimis collibus.

Fuscus;

Fuscus; thorace cucullato, antennis paulo breviore. Tibiae posticæ cærulescentes, dentum paribus decem: apicibus nigricantibus.

326. *GRYLLUS Stridulus.*

El. long. lin. 11 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 432.

Faun. Svec. 2. 872.

ROESEL. Locust Germ. Tab. 21. fig. 2.

Diagn. Alæ rubræ, extimo fuscæ, aut apice nigræ.

Habitat cum priore, tota die in seram noctem usque stridens, usque ad finem Septemb is.

Elytrum fuscum, pallidioribus punctis variegatum. Corpus subtus pedesque nigri, alba fascia prope genua, & prope bases tibiarum Rubor alarum fere idem, qui Santali rubri in ligno.

327. *GRYLLUS Italicus.*

El. long. lin. 9 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 432.

ROESEL. Locust. germ. Tab. 21. fig. 6.

Diagn. Alæ basi rubræ. Elytra fusa maculis testaceis variegata.

Habitat cum priore.

Specimina nostra non omnino convenient cum *Roeseliano* & cum differentia *Linnæana*, cum alas excolores, & basi tantum rubras gerant. Præterea minor est *Stridulo*, tibiis posticis rubris minime fasciatis.

328. *GRYLLUS Lunulatus.*

El. long. lin. 8. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

ROESEL. Locust. germ. Tab. 20. fig. 6. 7.

Diagn. Thorax subcucullatus; lineis tribus elevatis longitudinalibus: media recta lateralibus lunulatis: convexitate lineam medianam reipiciente.

In pratis non rarus.

Variat 1. Capite (excepta nucha), thoracis lateribus, pedibusque subrubris. Elytro margine interiore viridi, aliis fusco-nebuloso. Alis fuscescentibus.

2. Cor-

Gryllus. COLEOPTERA. Gryllus. 111

2. Corpore fusco. Abdomine subtus
viridi-flavo. Elytris superne ob-
scerioribus, introrsum albidis. A-
lis pallidioribus.

329. GRYLLUS Rufus.

LINN. Syst. Nat. p. 433.

Faun. Svec. 2. 876.

Diagn. Fuscus ; thorace & abdomine subtus
flavefcentibus ; antennis clavatis : clava acuta.

In pratis.

Non penitus convenit cum *Rufo* **LINN.** sepa-
rari tamen non potest.



OR-

ORDO II. PROBOSCIDEA.

HEMIPTERA. Linn. Syst. Nat.

OS TERMINATUM PROBOSCIDE, SUB
PECTORE INFLEXA. ALÆ SUPERIORES SEMI-
CORTIACEÆ, CORIACEÆ TOTÆ, MEMBRANA-
CEÆ, NULLÆ. (†)

CICADA.

LINN. Syst. Nat. p. 434

(*) *Elytris totis coriaceis.*

330. CICADA *Sanguinolenta.*

El. long. lin. 4. lat. 1½.

Diagn. Nigra, elytro fascia maculisque binis
rubris.

Inveni in *Salice* circa *Tergestum*, & in *Geni-
fla tinctoria* prope *Idriam*.

Antennæ sunt setulæ albidæ. Caput nigrum,
fronte convexa, temporibus 9-sulcatis. Thorax ni-
ger; punctis prominulis congestis; scutello acuto.
Elytrum coriaceum totum, nigrum, punctulatum,
deflexum, apice rotundatum, alas tegens, fascia an-
tica rubra supra marginem externum non extensa
maculisque duabus rubris variegatum, quarum me-
dia ovata, minor, altera basim occupans majorque.
Alæ margine exteriore rubro, apice obscuriores.
Abdomen mari rubrum, apice nigrum; fæmina ma-
xima parte nigrum. Pedes nigri; tibiis posticis bi-
dentatis.

331.

(†) Ars non imperet Naturæ, nomina arbitraria ce-
dant necessariis, nec sit fundamento iusido in-
ædificata domus.

331. CICADA *Spumaria*.El. long. lin. $3\frac{3}{4}$. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 437.

Faun. Svec. 2. 881.

FRISCH. Ins. 8. Tab. 12.

Diagn. Striae sub capite inter oculos utrinque (12), valleculis punctatis. Caput lamina subcordata terminatum. Puncta duo in fronte ænea, excavata.

In *Salice viminali* copiosissima, latens intra spumam, unde continuo eo tempore stillicidium.

Larva polita, nigricans, abdomine supra pallido & tandem flavescente, subtus lateraliter fulvo. Cæterum

Var. 1. Elytris puncto lucidiore, & margine exteriore ad basim ferrugineo.

2. Fascia albida, & macula lanceolata pariter albida marginali. Sexus alter abdomen subtus ensatum gerit: ense bivalvi valvis uno latere villosis.

Cicadæ Coleoptratæ Celeberr. LINNAEI differentiam certiorem expectamus, qua a *Spumaria* discerni queat, cum & ista elytris gaudeat coriaceis totis, alasque tegentibus, saltem apud nos.

332. CICADA *Arunci*.El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. 1.*Diagn.* Tota ferruginea; oculis fuscis.In panicula *Spireæ arunci*.

Incisuræ abdominalis lineolis nigris totidem distinctæ. Pedes villosuli. Alæ hyalinæ.

333. CICADA *Marginalis*.El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. 1.

Diagn. Fusca; elytri margine externo pedibusque flavescensibus; corpore luteo.

In *Carniola media* & super. non raro in *Syn. genetis*.

Proxima *Laterali* LINN. sed elytris neque nigris, neque latere albis.

K

Var.

Var. 1. Elytris fuscis, margine exteriore pallide luteo, capite fusco, linea media punctisque binis obscurioribus.

2. Elytris fuscis, latere ochroleucis, capite flavo, oculis fuscis.

3. Elytris flavescentibus.

334. CICADA *Bicordata*.

El. long. lin. 2. lat. $1\frac{1}{2}$.

Diagn. Elytrum nigrum; latere utroque lineaque media, nec non pedibus flavis.

In *Corylo* reperi.

Caput flavum; oculis nigris; in fronte macula media nigra, cuius extremitati cuilibet insidet macula nigra obcordata. Thorax niger totus. Abdomen nigrum, margine flavo. Pedes flavi.

Variat elytris flavis linea a basi ad medium usque producta, attenuata, aliaque simili ab apice antrorsum tendente, fusco colore tinctis; thorace macula flava, flavo margini postico imposita; an vere diversa sequens?

335. CICADA *Violacea*.

El. long. lin. 2. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Elytra fusco violacea; margine externo & alibi ubique lutei coloris.

In *Cirsio acanthoide* Fl. Carniol.

Hæc caret maculis nigris in capite, & elytra prædicta gerit.

336. CICADA *Oenotheræ*.

El. long. lin. $2\frac{1}{4}$. lat. 1.

Diagn. Fere tota flavescens; oculis nigris; elytro rivulis fuscis.

In aversa pagina foliorum *Oenotheræ biennis*.

Spumans, minor *Spumaria*; ore subtus fovea elliptica, ibidemque utrinque fulcis senis; abdomine supra nigro. Thorax foveolis binis posticis. Rostrum apice pilosum, nigricans.

337. CICADA *Lineata*.

El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigricans; elytris toto margine lineolisque tribus longitudinalibus luteis.

In

In fruticibus, non rara.

Circum oculos linea flava, frontem versus abrupta. Nucha notata macula bifida, furculam referente. Pedes elytris concolores; geniculis & tibiis infra medium luteis.

(**) *Elytris semicoriaceis.*

338. CICADA *Viridis.*

El. long. lin. 3. lat. 1.

Diagn. Elytrum virens: apice membranaceum. Caput flavum, punctis (4) nigris: duobus mediis majoribus, inter oculos.

In Salicetis, & alibi.

Oculi nigri. Thorax virens. Pedes flavi.

Var. *Elytris flavis:* venis viridibus; thorace viridi.

339. CICADA *Bipunctata.*

El. long. lin. 2½. lat. 1.

Diagn. Flavescentes; elytris pallidioribus; oculis punctisque binis in fronte nigris.

Circa fluvios, & inter frutices.

Abdomen subtus linea media nigra, & latere utroque versus basim pariter atro. Elytra polita, subhyalino splendore. Alæ hyalinæ.

(***) *Elytris membranaceis.*

340. CICADA *Cornuta.*

El. long. lin. 3. lat. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 435.

Faun. Svec. 2. 879.

Diagn. Thorax gibbus; angulis posticis valde mucronatis, in mucronem longum triquetrum apice deflexum pone productum.

In *Cirsii* reperi, & in *Salice* circa *Tergestum.*

Dentes dorsales postici ad angulum rectum cum corpore siti. Mucro thoracis in medio paucio crassior quam alibi, lineas duas longus. Alæ quatuor; superiores venis ferrugineis, inferiores abdominis longitudine venisque fuscis. Tibiae ferrugineæ. Corpus & thorax fusco colore tincta, canisque villis adpersa. Pedes saltatorii.

341. CICADA *Nervosa*.El. long. lin. 3. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 437.

Faun. Svec. 2. 882.

Diagn. Alæ (4), superiores nervosæ : nervis fuscopunctatis; ambo hyalinæ.

In Salice.

Frons plana ; marginibus lineaque media elevatis. Oculi fuscæ; margine rufo, postice abrupto. Sub oculis antennæ seu setulæ hemisphæricæ basi impositæ. Alæ superiores præter punctula in nervis, gerunt quoque fascias duas, obsoletas, rufofuscas; quarum prima ad basim alæ, alia circa medium jacet; in ejusdem alæ margine exteriore versus apicem sunt maculæ duo nigricantes parvæ.

342. CICADA *Marginata*.

El. long. lin. 2. lat. 1.

Diagn. Pallida tota, thoracem inter & alas nigra: macula alba acuminata. Thorax marginatus.

In Salicetis.

Caput leniter acuminatum. Ad basim rostri maculæ duo fuscæ dentiformes. Ad marginem thoracis anticum utrinque punctum nigrum.

343. CICADA *Ocellata*.El. long. lin. 1. lat. 1 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Elytrum albidum; lineis tribus ocellisque duodecim.

In Gramine capta 9. Jun. circa Idriam.

Os obtusum; subtus utrinque punctis senis, albido, in unam seriem ordinatis, inter quæ lineola concolor. Antennulæ albæ, thorace longiores. Caput alibi subferrugineum, ut & thorax. Elytrum membranaceo-coriaceum, apice rotundatum; ocellis (5), maculis oblongis, subovatis, majoribus & minoribus rufescensibus sed margine fusco cinctis, variegatum; idem versus marginem internum prope thoracem lineis tribus similiter coloratis & marginatis parallelis longitudinaliter striatum. Abdomen apice villosum. Tibiae posticæ ciliato-spinosæ.

344. CICADA *Notata*.El. long. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Caput, thorax, pedesque pallide flavicantes. Elytra albida, nigro-punctata.

In plantis variis.

Os punctis tribus, ferrugineis, trigonis. Scutellum lineola transversa, fusca. Abdomen nigricans, sed segmentorum marginibus supra lutescentibus. Tibiae spinoso-ciliatae.

345. CICADA *Plebeja*.

El. long. unc. 1. & lin. 7. lat. lin. 7.

MATTH. Diosc. p. 264.

Diagn. Maxima; corpore unciam & lin. (3) longo, (6) crassio. Alis (4) rugulofisis, nervosis nervis fuscis, dichotomis: ramulis supremis anastomosantibus.

In agro *Vipacensi*, *Goritiensi*, *Tergestino* & frequentissima, notissimaque.

Femora antica crassiora, bidentata.

Orum album, utrinque acutum (qualia etiam 700 una fæmina in ventre gerit) deponitur intra foramen in ligno antiquo, studio a matre excavatum, in quo ova ejusmodi multa deponit, dein claudit ostium succo proprio gummo. Hinc natati vermiculi erofo claustro, vicina loca perreptant, dein eodem aliove anno, intra terram se se recipiunt, ibique toto illo anno degunt; in hoc statu vivens pupa *Tettigometra* dicitur, pedibus anticis valde crassis & validis instructa, subtus dentatis, & forti pollice, cancri manus adinstar, terminatis. His, talpæ in modum fodit, terram perforat, ut inde prodeat, positis exuviis, *Cicadam* paritura.

Hujus binas species posuit ARISTOTELES *Hist. animal.* L. 5. Cap. 25. nempe majores, quas vocat $\alpha\chi\acute{\epsilon}\tau\alpha\varsigma$, & minores alias $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\epsilon}\eta\gamma\acute{\epsilon}\nu\alpha\varsigma$ appellatas, quas voces, contra veterum sententias, ad *Gryllos* transluit Ill. LINNÆUS. Mares affiduo teretismo, ad venerem mutas alliciunt fæmellas, ut solent *Grylli Campestres*.

346. CICADA *Orni*.El. long. unc. 1. & lin. 1. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

K 3

LINN.

LINN. Syst. Nat. p. 436.

Diagn. Minor priore. Alæ (4); venis fuscis; postice binis punctorum fuscorum ordinibus: in uno (4), in altero submarginali (7).

Diffr. a priore 1. *Alare & femina* eiusdem staturæ, & eodem modo coloratis. 2. Teretismo acutiore. 3. Thoracis linea media longitudinali indivisa, quæ priori apice bifida. 4. Scutello lineis duabus ferrugineis: basi hamo introrsum instructis. 5. Nervis alarum superiorum antice albidis aut flavicantibus. 6. Femoribus anticis muticis. In ala dextra puncta fusca octo, in sinistra septem.

347. CICADA *Hæmatodes*.

El. long. unc. 1. & lin. 3. lat. lin. 6.

Diagn. Alarum super. nervi, margo thoracis & lineæ in eodem quinæ, rubro colore tinctæ.

Habitat cum prioribus.

Nigra. Alis anticis minime punctatis. Abdomine incisuris omnibus utrinque margine rubris. Femora rubro-nigroque varia; antica crassiora & tridentata; dente supremo minore. Conf. ROESEL. Locust. Tab. 25. 26.

N O T O N E C T A.

LINN. Syst. Nat. p. 439.

348. NOTONECTA *Glaуca*.

El. long. lin. 5½. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 439.

Faun. Svec. 2. 903.

ROESEL. Suppl. Cim. Terr. Tab. 27. fig. 5-9.

FRISCH Inf. 6. Tab. 13. Fig. 1. 2.

Diagn. Elytrum apice bifidum. Abdomen apice triquetrum. Pedes postici corpore longiores.

In lacubus, non rara.

Var. 1. Oculis rufescensibus; elytris ferrugineis: margine exteriore punctis fuscis (7); abdome nigro: apice thoraci concolor. Huic proxima figura ROESELII.

2. Ocu-

2. Oculis fuscous; elytris ferrugineis: margine exteriore punctis fuscis (8); abdome fusco: apice ferrugineo.
3. Oculis fuscous; elytris fuscocastaneis: basi maculis binis, lanceolatis, testaceis: margine exteriore minime punctato; scutello nigro; abdome ferrugineo.

349. NOTONECTA *Striata*.

El. long. lin. 44. lat. $\frac{2}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 439.

Faun. Svec. 2. 904.

P. PODA. Mus. Græc. p. 45.

Diagn. Elytrum lineis transversis fuscis parallelis simplicibus raniosisque striatum.

Habitat cum priore.

Thorax lineis transversis fuscis (8). Scutellum natiforme. Abdomen apice bifidum.

N E P A.

LINN. Syft. Nat. p. 440.

350. NEPA *Civerea*.

El. long. lin. 5 $\frac{2}{3}$. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. I. c.

Faun. Svec. 2. 906.

ROESEL. Suppl. Cim. Aquat. Tab. 22. fig. 6. 7. 8.

FRISCH. Inf. 7. Tab. 15?

Diagn. Corpus oblongum, fuscescens; abdome supra rubro, terminato cauda biseta lineas quatuor longa.

In fossis circa *Tergeustum*.

Specimina nostra omnino convenient cum figuris *Roeselianis*, hinc corpus ovatum non potest dici. Prope oculos est tuberculum, quod microscopio visum, sustinet pilos duos tresve leniter deflexos, qui pro antennis habendi.

C I M E X.

LINN. *Syst. Nat.* p. 441.

(*) *Orati.*

(†) Scutellati LINN. l. c. Ord. b.*

351. CIMEX *Lineatus.*

El. long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. —

LINN. *Syst. Nat.* p. 442.

P. PODA. *Mus. Græc.* p. 55.

Diagn. Ruber; thorace lineis longitudinalibus (6), scutello (4) parallelis nigris; subtus punctis nigris.

Reperi *Lippizæ* in horto, supra folia *Ribesii rubri*.

Caput rubrum; lineis duabus, in ejus apice coeuntibus. Thorax punctis prominulis scaber: angulis posticis rotundatis, tres lineas latus, unam cum dimidia longus. Scutellum lin. 3. longum. Elytra rubra; membrana fuliginosa. Alæ margine exteriore rubro; apice fuscescente. Corpus subtus, apud nos, ubique rubrum. Pedes nigro-rubroque varii.

Variat lineis nigris in thorace (5-8).

352. CIMEX *Maurus.*

El. long. lin. $3\cdot4$. lat. —

LINN. *Syst. Nat.* p. 441.

Faun. Svec. 2. 913.

P. PODA. *Mus. Græc.* p. 55.

Diagn. Puncta duo pallidiora ad basim scutelli. Abdomen subtus punctis utrinque quinis, submarginalibus, ocellatis.

In Carniola calidiore.

Character specificus peti non debet a colore corporis, qui modo obscure ruber, modo rubro & flavicante varius, modo pallide ferrugineus; subtus autem in omnibus hisce meis varietatibus color unus & idem, nempe ferrugineus, punctis fuscis ubique variegatus. Puncta abdominis praedita sunt totidem, nigra, rotundata, apice umbilicata, & atmo-

mosphæra lucidiore cincta tubercula. Reperitur etiam ut plurimum lateribus abdominis fusco-variegatis.

353. CIMEX Exanthematicus.

Tot. long. lin. 4.

Diagn. Nigricans; supra punctis confertis albis.

Circa Tergestum. A. 1761.

Caput sine punctis albis; antennis articulo ultimo crassiore. Thorax linea media longitudinali & puncto utrinque albis. Scutellum punctis plurimis albis; praeter haec predicta loca tota punctis minoribus, nigris, excavatisque variolosa sunt. Corpus subtus & pedes nigri, sine punctis albis.

(††) Cucullati.

354. CIMEX Lectularius.

Tot. long. lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 441.

Faun. Svec. 2. 909.

MATTH. Diosc. p. 257.

Diagn. Rufus, compressus, domesticus, homini molestus.

Habitat in sedilibus, lectis, parietibus ligneis; nocturna calainitas humani generis.

In Carniola volatilis etiam occurrit, noctu domibus involans. Capitur foliis Phaseoli, Pulmonariæ, aliisque asperioribus; necatur oleo infuso Scarabæi Melolonthæ, Agarico muscario, Aëtea, Nicotiana. An vero ad hunc, vel priorem ordinem spectet, dubium adhuc.

355. CIMEX Dubius.

El. long. lin. 2. lat. —

Diagn. Atro-cæruleus, punctatus, nitens; thoracis elytrorumque margine exteriore albo.

In agro Tergelino.

Dubium voco, ob summam cum sequente similitudinem, a quo differt elytro sine puncto albo, & membrana albicante terminato.

356. CIMEX *Biguttatus*.

El. long. lin. 2. lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 446.

Faun. Svec. 2. 935.

Diagn. Niger; elytrorum & thoracis margine albo; puncto albo in quolibet elytro.In calycibus *Rhinanthi crista galli*.

Elytri membrana fuscescens.

357. CIMEX *Bicolor*.

El. long. lin. 3. lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 446.

Faun. Svec. 2. 936.

P. PODA. Mus. Græc. p. 57.

Diagn. Niger; maculis duabus albis, elytri extero margini incumbentibus.In monticulis *Adriatico mari* proximis.Habitus & nitor prioris, sed maior. *Bicolor* Svecicus antice ad marginem thoracis utrinque maculam albam habet, noster vero marginem eundem albuni.358. CIMEX *Aeneus*.

El. long. lin. 2. lat. —

Diagn. Pallide æneus, punctatus: punctis impressis nigris; scutello abdomen subæquante: basi punctis duobus albis.Circa *Idriam* in herbidis collibus.

Caput emarginatum. Thorax obtuse spinosus; punctis binis, albis, elevatis ad basim scutelli. Margo lateralis thoracis totus fere albicans. Elytri membranaceus apex lineolis (5) parallelis, ferrugineis. Abdomen subtus æneo-nitens; puncto eminente, nigro, utrinque in quilibet incisura Sexus alter abdomen emarginato tuberculo terminatum gerit.

359. CIMEX *Juniperinus*.

El. long. lin. 5. lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 445.

Faun. Svec. 2. 930.

Diagn. Viridis; thoracis margine laterali flavo; abdomine supra nigro.

Ruri

Ruri in plantis variis.

Maximus hujus ordinis, totus superne punctatus & virens; subtus tamen ex viridi flavicans. Thoracis margo lateralis & apex scutelli flavi coloris. Elytri apex membranaceus fusco-rufus. Abdomen apice subtus rubello, subquadridentato.

360. CIMEX Baccarum.

El. long. lin. 5. lat. —.

LINN. Syst. Nat. p. 445.

Faun. Svec. 2. 928.

P. PODA. Mus. Græc. p. 56. nebulosus.

Diagn. Thorax obtuse spinosus. Abdomen supra nigrum; maculis scutelli apicis colore tinctis, in margine variegatum, subtus e basi mucronem supra thoracem protendens.

In plantis, baccis, hortis, & circa domos.

Statura prioris, fœtor insignis. Apex scutelli, maculæ in margine abdominis, pedesque eodem colore tincti. Cæterum Mari antennæ unicolores, puncta marginalia abdominis flavicantia, abdomen subtus absque punctis; sed variat hic 1° elytris rubellis: apice fuscescentibus, antennis nigris, corpore subtus flavo; 2° elytris æneo-virentibus; apice immaculatis, thorace obscuro, scutelli apice fulvo, abdome subtus ferrugineo, alis obscurioribus. Fœminæ antenn. articuli duo ultimi basi flavescentes, thoracis latera obtusiora, elytrum apice fusco-punctatum. Thorax & abdomen subtus nigro-punctata.

361. CIMEX Ornatus.

El. long. lin. 4. lat. —.

LINN. Syst. Nat. p. 446.

Faun. Svec. 2. 937.

Diagn. Rubro-nigroque varius; thorace maculis duabus, nigris, semibifidis: segmentis elytra respicientibus.

Collegi in itinere Tergestino A. 1761. circa Lippiza.

Caput, antennæ, thorax subtus pedesque nigri. Elytrum puncto ad apicem corii libero; macula subovata, nigra, in margine externo versus basim; margo internus elytri niger profert maculas duas, nigras,

nigras: inferiore longiore & obtusa; membrana elytri nigricans: margine albido. Abdomen subtus rubrum, in medio maculis transversis (4), ad latus quodlibet binis ordinibus punctorum nigrorum, quorum unus marginalis puncta (5) subconica, alter interior puncta (6) subrotunda foveat, lucidore centro pupillata.

362. CIMEX Dominulus.

El. long. lin. 3. lat. —.

Diagn. Rubro-nigroque varius; thorace punctis (6) distinctis atris.

In pratis paludosis.

Mas. Caput nigrum; margine rubro; antennis nigris: articulis apice rubellis. Thorax ruber; punctis sex nigris, quorum quatuor postici. Scutellum rubrum; macula nigra, hemisphaerica, ad basim. Elytrum rubrum; apice membranaceo, nigro: marigne albido; maculis binis nigris ad marginem internum; puncto nigro ad apicem. Abdomen rubrum; in apice superne macula nigra, subtus utrinque maculis sex ovatis nigris. Pedes nigri.

Fæmina, eodem modo colorata, sed paulo maior.

(**) Oblongi.

(†) antenn. articulo ultimo crassiore.

363. CIMEX Marginatus.

El. long. lin. 5 $\frac{1}{3}$. lat. —.

LINN. Syst. Nat. p. 443.

Faun. Svec. 2. 923.

P. PODA. Mus. Græc. p. 55-56.

Diagn. Terreo-rufus. Thorax obtuse dentatus concavus. Antenn. articulus (2.3,) & abdomen supra rubro-fulvi coloris.

In *Mentha aquatica* copula junctos vidi.

Mari corpus magis fuscum. Penis crassus, obtusus; basi auriculatus. *Fæminæ* abdomen pone bicorne, genitale bivalve: valvis interne ad basim filamento instructis.

Uter-

Cimex. PROBOSCIDEA. Cimex. 125

Uterque sexus abdomine basi superne nigro; margine maculis fuscis, subtus utrinque tot punctis obscurioribus, quot segmenta, atmosphaera lucidiore cinctis, lucidis, umbilicatis. Elytri membrana, fusco-aurata. Femoribus omnibus subtus tuberculoso-dentatis.

364. CIMEX Abietis.

El. long. lin. 3. lat. —.

LINN. Syst. Nat. p. 450.

Faun. Svec. 2. 969.

Diagn. Rufus est, praesertim subtus. Abdomen & thorax superne canaliculata. Tibiae anticæ crassissimæ & subtus dentatæ; palmis uni-unguiculatis.

In *Viburni lantanæ* floribus, & in *Genista tinctoria*, reperi.

Antennæ, non computata basi, articulis tribus: extremo longiore. Rostrum breve. Caput apice bifidum. Thorax in medio concavus; lineis binis, elevatis, longitudinalibus, angulis anticis & posticis denticulo notatis, dente alio obtusiusculo prope angulum posticum. Abdomen margine obiter crenato, subtus ad basim albo, in qua albedine duo puncta nigra utrinque sepulta sunt.

Variat 1. Colore ubique rufo.

2. Capite, thorace, & abdomine anticæ fusco-rufis.

365. CIMEX Denticulatus.

El. long. lin. 3. lat. —.

Diagn. Thoracis margo lateralis denticulis crebris, parvis, undique armatus. Abdomen bidentatum. Femora postica spinosa.

Circa *Tergeflum*.

Fusco-rufus, subtus ferrugineus. Caput sub antennis denticulo utrinque instructum, & una cum thorace & elytris punctis confertis prominentibus scabrum. Antennæ villosæ; articulo ultimo nigricante. Abdomen superne rubrum, basi nigrum; macula nigra ad apicem in medio, apice bidentata. Femora postica spinulis tribus maioribus, nec non (3-4) minoribus, decrescentibus, inter spinam antican & genu, positis.

366. CIMEX Agilis.

El. long. lin. 4. lat. —;

Diagn. Aeneo-fuscus; punctis impressis; abdome supra rubro: apice emarginato.In *Austriaco Litorali*.

Rostrum albidum. Antennæ ex albo & fusco variæ. Thorax angulis posticis acutis, albidis. scutelli apex albidus. Elytri membrana fusco-rufa; venis longitudinalibus, simplicibus, ramosisque lineata, inter quas puncta confluentia obscuriora. Abdomen basi superne nigrum; apice fuscescente rotunde exciso, margine fusco, sed flavescensibus punctis variegato; subitus cano prostrato sericeo villo adspersum, punctis nigris utrinque duobus in qualibet incisura. Femora supra medium albida. Tibiæ albæ: basi & apice fuscae.

Cum *Cimice Indo* Ill. LINNAEI confundi non debet.

367. CIMEX Rugosus.

El. long. lin. 2. lat. —.

Diagn. Caput sub antennis dente utrinque instructum. Dorsum plicis quatuor longitudinalibus. Abdomen rubellum.In *Carniola super*.

Antennæ fuscae, longitudine sua latitudinem thoracis minime excedentes; articulo extremo secundo & tertio nihilo crassiore, brevioreque. Elytri membrana fusca; venulis albis. Abdomen membranaceum, depresso: apice albido emarginato; alibi rubellum.

368. CIMEX Pandurus.

El. long. lin. 5. lat. —.

Diagn. Rubro nigroque varius. Thorax ruber; lineis (2) nigris, longitudinalibus. Elytrum rubrum; macula media nigra, punctisque tribus albis ad basim apicis membranacci.Circa *Labacum*, & in *Carniola inferiore*.

Antennæ, rostrum, pedesque nigri. Caput nigrum; linea bifurca, rubra, litteram (V) referente in medio notatum. Thorax lin. $2\frac{1}{2}$ latus, $1\frac{1}{2}$ longus. Scutellum nigrum. Ad basim membranæ elytri

elytri est linea conica, obliqua, coriaceo margini basi imposita, cui infra apicem adjacet punctum album, dum alia duo puncta alba separant elytri corium a membrana. Alæ teneræ, subhyalinæ, rufescente lunulata macula externe notatae, infra quam margo alæ ad basim usque ruber est. Abdomen rubrum, carinatum; margine maculis (5), nigris, utrinque variegatum; incisuris basi fascia nigra; latere vero utroque puncto nigro maculatis. Pectus nigrum; maculis rubris, utrinque tribus.

369. CIMEX Speciosus.

El. long. lin. $4\frac{1}{2}$. lat. —.

P. PODA. Mus. Græc. p. 59.

Diagn. Rubro nigroque varius. Elytri membrana nigricans; punctis tribus albis: uno libero, rotundo.

In agro Tergestino.

Antennæ, rostrum, pectus, pedesque nigri. Caput nigrum; macula elliptica, rubra, postice acuminata, in medio posita. Thorax ruber; margine antico & postico nigris. Scutellum nigrum. Elytri corium rubrum; fascia & puncto subrotundo ad marginem interiorem, atris: eiusdem apex membranaceus ad originem puncta duo alba, lineolas referentia, & in medio guttam sphæricam albam gerens. Abdomen carinatum, rubrum; margine punctis utrinque (5), & subtus tribus paribus macularum nigrarum in medio, variegatum; ani regione nigra.

Variat pectore cinereo & tenuissimo veluti polline adsperso, punctisque lucidis nigerrimis utrinque (2-3); nec non margine membranæ elytri albo.

370. CIMEX Apterous.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. —.

LINN. Syst. Nat. p. 447.

P. PODA. Mus. Græc. p. 58.

Diagn. Rubro nigroque varius. Elytrum totum coriaceum, abbreviatum, rubrum; apice macula rotunda, punctoque ad basim atris. Alæ nullæ.

In Carniola non rarus, sed antennis apice setaceis nullibi.

LINNAEI descriptio bona est, cui adde. Caput cum thorace nitens. Rostrum nigrum; ad basim puncto rubro. Caput, antennae, pedesque nigros. Abdomen nigrum; margine & ani fascia rubris. Bene etiam hunc *Cimicem* descripsit Amiciss. P. PODA. l. c.

371. CIMEX SAXATILIS.

El. long. lin. $3\frac{2}{3}$. lat. —.

Diagn. Rubro nigroque varius. Elytri corium rubrum; margine undique maculaque nigris; membrana fusca immaculata.

Circa rupes, faxa, rudera, gregarius, florente *Farfara* jam exiens serenis diebus, circa meridiem; apud nos copiosus.

Antennæ, rostrum, pedesque nigri. Caput nigrum; macula rubra, antice bifida. Thorax niger; margine laterali lineaque media longitudinali elevata, rubris; spatia nigra inter has lineas punctata. Scutellum nigrum. Elytrum basi ad angulum scutelli rubrum, dein undique nigro margine septum, pagina intra marginem rubra sed macula nigra notata. Pectus nigrum; maculis utrinque tribus rubris ovatis. Abdomen carinatum, rubrum; subtus in medio fasciis quatuor, & margine utrinque maculis nigris variegatum.

372. CIMEX TUBERCULOSUS.

El. long. lin. $3\frac{2}{3}$. lat. —.

Diagn. Antennæ nodis binis: extremo longiore, clavato. Abdomen superne rufum.

Circa Idriam.

Antennæ nodis binis (non computata basi), caput, thorax, rostrum, pedesque, nigri. Thorax lin. $1\frac{2}{3}$ latus, non dentatus; punctis excavatis. Elytrum fuscum, punctatum; membrana fuscescente. Alæ hyalinæ, immaculatae. Abdomen superne rufo-fulvum, subtus fusco-rufum nitens. Tibiae posticæ fasciis duabus rufis.

Variat colore fuscescente, sed tubercula occipitalia speciem demonstrant.

373. CIMEX *Nervosus.*

El. long. lin. 2¹. lat. —

Diagn. Elytrum fere totum membranaceum; nervis tribus, fusco-punctatis, punctoque ferrugineo trigono marginali.

Circa fossorum, & rusticorum aedes.

Color subferrugineus. Antennæ articulus ultimus minor & obscurior. Oculi prominentes, fuscо-rufi. Ad marginem thoracis posticum tubercula duo, lucida, sphærica, rufa. Caput cum thorace punctis prominentibus scabrum. Scutellum thoraci concolor. Abdomen supra fuscum; punctis tribus, flavescentibus; subtus flavicans, nitidulum, punctis ferrugineis adspersum; margine fuscis punctis variegato. Pedes colore thoracis, punctis obscurioribus variegati; femoribus fasciatis: fasciis (3-4) fuscescentibus.

374. CIMEX *Maritimus.*

El. long. lin. 2. lat. —

Diagn. Nigricans; elytris testaceis, fusco-punctatis; macula cordata, nigra; antennis pedibusque ferrugineis.

Circa litora maris Adriatici.

Thorax margine postico ac lateralí testaceo, lineolis transversis, ferrugineis, postice variegatus. Elytri membrana umbrinis lineis repandisque maculata. Femora media & postica apicibus fuscis.

Est Cimex Cinereus. R. P. PODA. Mus. Græc. p. 59.

375. CIMEX *Alpinus.*

El. long. lin. 1¹. lat. —

Diagn. Nigricans; elytri corio punctis ferrugineis; membrana lineis (4) longitudinalibus fuscis; pedibus ferrugineis.

In Alpibus Vochinenibus Carn. super.

Oris apex, rostrum, & bases antennarum ferruginei coloris. Inter venulas fuscas parallelas membranæ elytri punctum ubique unum fuscum.

376. CIMEX *Collinus.*El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat. —

Diagn. Niger; elytro nucei coloris; puncto nigro, membrana fusca; femoribus anticis denticulato notatis.

In Carnioliae mediæ collibus apricis.

Thorax postice lineolis rubro-castaneis variegatus. Elytri corium nigro-punctatum; macula subtetragona, nigra. Abdomen subitus æneo nitore fulgens; segmento quolibet utrinque punctis impressis, binis. Alæ hyalinæ.

377. CIMEX *Ferrugineus.*El. long. lin. $1\frac{1}{2}$. lat. —

Diagn. Nigricans; elytris pedibusque ferrugineis.

Circa Idriam collegi.

Statura *Alpini*, *Lætulurio minor*, punctis impressis variolosus. Antennæ articuli (2-3), colore pedum, basi & apice nigri.

(++) antenn. articulo ultimo tenuiore.

378. CIMEX *Iracundus.*El. long. lin. $4\frac{3}{4}$. lat. —

P. PODA. Mus. Græc. p. 58.

Diagn. Niger; rostro arcuato; basi rubra; thorace macula rubra; elytri corio paucō rubro; femoribus anticis crassioribus, rubris, nigro-fasciatis.

Passim occurrit.

Diffrēt a *Cim. Annulato* LINN. 1. Corpore subtus nigro. 2. Abdomine non fasciato, sed maculis marginalibus, rubris. 3. Rostro basi rubro. 4. Tibiis nigris; fascia postica rubra, variegatis. 5. Femoribus primis non tribus annulis coccineis, sed rubra apice nigra, binisque fasciis nigris. 6. Femoribus mediis non coccineis totis, sed nigris fascia rubra.

379. CIMEX *Personatus.*El. long. lin. $5\frac{1}{2}$. lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 446.

Faun. Svec. 2. 942.

Diagn.

Diagn. Fuscus; rostro arcuato; nucha tuberculis binis.

Circa *Labacum*.

Celeberr. LINNÆUS, in *Fauna Svec.* descriptis larvam, non insectum; si vero differentia ab eo data sufficit ut adgnoscatur, certe noster idem erit, cui corium elytri paucum & postice alba linea terminatum, corpus totum villosum, Alæ hyalinæ, abdomen subtus nitens & acutius quam in priore. Pedum genicula pallidiora.

380. CIMEX Hybridus.

El. long. lin. 4. lat. —

Diagn. Niger; rostro arcuato; elytri corio rubro; maculis binis atris; membrana fuscescente, ad basim macula nigra notata; abdomine rubro; genitalium regione nigra.

In *Carnioliae collibus*.

Videtur proles hybrida *Cimicis Personati* & *Panduri*. Huic nucha tuberculis binis. Abdomen rubrum, immaculatum. Femora antica crassiora.

381. CIMEX Gothicus.

El. long. lin. 3 $\frac{2}{3}$. lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 447.

Faun. Svec. 2. 966.

Diagn. Niger, punctatus; setula antennæ, capite inter oculos elytroque corii apice coccineis; abdome subtus nitente.

Inveni in *Urtica dioica*, & alibi.

Variat 1. Scutello nigro.

2. — coccineo.

3. Elytri margine exteriore rubello.

— — — flavescente. LINN. Faun. Svec.

4. Thorace lateribus rubris.

5. — toto nigro.

Basis membranæ elytri macula albida, apici corii contigua. Antennæ articulus intermedius longior, apice dilatatus, villosus. Femora apice rubella. Tibiæ totæ sere rubellæ.

382. CIMEX Meriopterus.

El. long. lin. 2. lat. —

L 2

Diagn.

Diagn. Antennæ articulus secundus compres-
sus, villosus, terminatus articulis binis setaceis pal-
lidis. Rostrum pedesque citrini.

Vidi in floribus *Origani vulgaris*, & *Eupatorii cannabini*.

Species vere nova, rarisimaque; corpore nigri-
cante, nitido; antennis gravibus & duplo certe cras-
fioribus quam femora antica, articulis (1-2), fusco-ru-
bris, margine pilosis, dum (3-4) nigri sunt, sed basi
& apice citrini, setacei, æquales. Caput & thorax
fuscus. Elytrum angustum; nitido & fusco castaneo
corio; membrana hyalina, margine exteriore fusca.
ibidemque prope basim albido puncto notata. Alæ
rubelli vini colore. Pedes citrini & palleacei; po-
stici longiores & crassiores.

383. CIMEX Äquinoctialis.

El. long. lin. 1½. lat. —

Diagn. Elytrum villosum, coriaceum totum, al-
bidum, nervosum; nervis fusco-punctatis; femora
antica crassiora.

Circa æquinoctium vernum in floribus, præser-
tim *Cynoglosso omphalode*.

Antennæ articulus secundus longior, extror-
sum crassior, apice truncatus, sustinens articulum
tertium brevem pilosorem, & setula sese longiore
terminatum. Rostrum pallidum, biarticulatum. Ti-
biæ posticæ tribus denticulis subtus instructæ.

384. CIMEX Pabulinus.

El. long. lin. 3. lat. —

LINN. Faun. Svec. 2. 947.

Diagn. Color viresceus. Antennæ corporis
longitudine. Abdomen supra nigrum. Oculi fusco-
castanei. Corpus subtus flavo-virens.

In floribus *Gymnomonospermis*.

Variat 1. colore viridi homogeneo, subtus ta-
men flavescente, maculis nullis.

In disco *Chrysanthemi leucanth*: & *Buph-
talmi salicifolii*.

2. Colore viridi, thorace punctis binis atris, macula cordata nigra sub abdome, in cadavere sensim evanescente.

In floribus *Capitatis*.

3. Colore ex viridi-ferrugineo, capite macula fusca, scutello linea media obscuriore longitudinali.

Ibidem.

Huic thorax maculis binis fuscis aut ferrugineis. Elytrum in medio ferrugineum.

385. CIMEX Umbellatarum.

El. long. lin. $2\frac{1}{2}$. lat.—

Diagn. Ferrugineus; femoribus apice fusco fasciatis; abdome supra fuscum.

In floribus plantarum *Umbelliferarum*.

Non sine aliqua difficultate a *Pabulino* separavi, quocum habitu & magnitudine convenit, licet differat thorace punctato; scutello punctis binis fuscis. Variat thorace lineolis (3) scutelloque punctis totidem flavescens, & colore obscuriore.

386 CIMEX Pratensis.

El. long. lin. $1\frac{2}{3}$. lat.—

LINN. Syst. Nat. p. 448.

Faun. Svec. 2. 949.

Diagn. Elytrum testaceum; punctis duobus, fuscis. Scutellum macula cordata flava. Abdomen nigrum nitens, lateraliter subtus flavescens.

In pratis non rarus, etiam verno tempore.

Nitens, punctulatus. Thorax antice nigricans. Elytrum punctis (2) fuscis ad apicem corii, quorum interius inajus; membrana hyalina. Femora basi flava.

Variat 1. Pedibus totis flavis, femoribus tamen posticis & mediis apice fusco fasciatis.

2. Pedibus luteis, femoribus anticis basi fuscis, posticis semifuscis.

387. CIMEX Striatus.

El. long. lin. 4. lat.—

L. 2

Diagn.

Diagn. Niger, thorace in medio macula oblonga flava; scutello lineolis duabus flavis. Elytri corio striis flavis (4) elevatis: unica ramosa.

In *Erythronium* captus 37. Maij.

Nervuli membranæ elytri rubore quodam tinti. Macula flava puncto rubro variegata ad apicem corii. Alæ hyalinæ. Abdomen subtus ad basim lineis tribus, transversis, albidis.

388. CIMEX *Fulvipes*.

El. long. lin. 3. lat. —

Diagn. Niger; elytri corio fusco, basi apice que albo; pedibus fulvis.

In *Corylo*.

Antennæ basi fulvae. Alæ hyalinæ. Femora postica compressa. Larva nigra; antennis fulvis; apice nigris; elytro abbreviato, coriaceo, albo: fascia nigra; pedibus fulvis. Tales larvæ juxta ramulos arborum ambulantes, & manum hostis mire eludentes, særissime occurunt, apteræ semper, & elytris dimidiatis, quæ, ne pro veris speciebus adsuniantur, probe cavendum. Species hæc, ab aliis omnibus distinctissima, proxime accedit *Sylvestri LINNAEI* cum vero hujus antennæ minime attenuatae, & elytra versus basim alba, versus apicem vero fusca dicantur, ita a nostro diversum esse voluimus.

389. CIMEX *Genistæ*.

El. long. lin. 2. lat. —

Diagn. Totus fuscus, raro canescente brevissimo & decumbente villo adspersus; alis hyalinis.

In *Genista tinctoria*.

Huic nitor nullus. Antennæ articuli duo extini tenuiores: ultimo fulvescente.

390. CIMEX *Flavipes*.

El. long. lin. 2. lat. —

Diagn. Niger; antennis trinodiis; rostro pedibusque flavis.

In hortis.

Lucidus. Elytri corium fusco-castaneum; membrana basi fascia dimidiata, alba, acuminata, corio incumbente. Alæ violaceo-hyalinæ. Antennæ articulis

culis

culis tribus, non computata basi, corpori subæquales. Abdomen basi superne flavicans.

(***) *Lineares.*

391. CIMEX *Junceus.*

El. long. lin. 4. lat. —

Diagn. Elytri membrana oblonga, longitudine corii; femora postica subtus dentata.

Circa *Labacum* captus.

Niger, linea non crassior, septem longus. Oculi pallidiores, sub quibus lineola rufa. Thorax fusco-rufus, nitens. Elytrum corio fuscescente, antice attenuato, margine externo flavescente, rariss & brevissimis villis, ad lentem, adsperso, nihilo longiore membranacea ejus portione, quæ vere oblonga & apice obtusa est, nec non venis obliquis parallelis lineata. Abdomen nigrum; basi attenuatum ibique subtus in medio linea flava notatum; hujus margines elatiores sunt & punctis quatuor pallide luteis utrinque maculati. Antennæ lineas (5) longæ; articulo ultimo crassiore. Rostrum duas lineas longum, articulis tribus.

Cim. Calcaratum LINN. hunc non esse docet ejus descriptio in *Fauna Svec.-data.*

392. CIMEX *Riparius.*

El. long. lin. 3. lat. —

Diagn. Niger; capite punctis binis, flavis; thorace lateribus lineaque media flavis; scutello linea media, flava.

In *Salicibus*, secus rivos & torrentes, non rarus.

Antennæ nigrae, longitudine corporis. Elytri corium fusco-rufum; margine exteriore flavo; membrana margine obscuriore cincta. Abdomen subtus lateraliter flavicans aut rufescens; apice punctis binis, luteis. Tibiae rufescentes. Totus pilosus.

393. CIMEX *Testaceus.*

El. long. lin. 3 $\frac{1}{4}$. lat. —

Diagn. Totus testaceus; oculis nigris.

In *Salicibus*, post primum fœnifecium.

Antennæ, pedes, abdomen subtus, manifeste villosum. Femora postica subtus antice punctis fuscis, binis, notata, longitudine abdominis. Ab oculo quolibet per thoracem decurrit linea obscurior, obsoleta, recta. Elytri corium ad apicem obscuriore puncto notatum. Alæ hyalinæ. Verno tempore captus, femora obsoleto virore tincta possidet.

394. CIMEX *Lacustris.*

Tot. long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 450.

Faun. Svec. 2. 970.

Diagn. Cursitatis super aquas stagnantes, pedibus expansis; mediis posticisque corpore longioribus; antennis triarticulatis, in apice capitatis.

In lacubus.

Thorax subtus argenteo villo splendens. Elytrum coriaceum totum, vena bis dichotoma, nervoque, lineatum. Alæ hyalinæ. Pedes antici duplo breviores mediis.

395. CIMEX *Stagnorum.*

— long. lin. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 450.

Diagn. Linea dimidia vix latior, niger; thorace tuberculis binis, globosis.

Thorax tenuis, elongatus. Caput antennis setaceis terminatum. Abdomen lineis elevatis longitudinaliter striatum, semicylindricum. Pedes rufi.

APHIS.

LINN. Syst. Nat. p. 451.

396. APHIS *Viburni.*

Diagn. In umbellis *Viburni*, larvæ terreæ, dein nigræ; antennis longitudine abdominis; pedibus pallidioribus.

397.

Aphides in theatro Naturæ veste nova induiti sæpe, in scenam prodeentes, plantarum Parasitæ, Succifugi, Tyranni. Has amant Formicæ, eoque fine visitant, quo homo hominem hoc ævo fæcissime.

397. APHIS *Aceris.*

Diagn. Nigra, villosa; alis macula fusca submarginali.

In *Acere campestris*; larva nigricans: pedibus antennisque pallidioribus; corpore tubvilloso.

— — *platanoide*; antennis infra apicem fascia nigra in larva demum virescente; geniculis pedum nigris. Hinc *Aphis* antennis pilosis, abdomine longioribus; abdomine fusco-viridi; alis anticis lineola subferruginea, marginali.

398. APHIS *Vitis.*

Diagn. Virens; oculis nigris; ad latera abdominis punctulis nigris.

Habitat in *Vite vinifera*, sub foliis.

Larva virens ovata villosula; oculis fuscis. *Aphis* dorso demum fuscescente & nitido; puncto nigro utrinque retro antennas; alis vena una, ramis tribus instructa; oculis nigris; abdominis incisuris tribus mediis supra nigris.

399. APHIS *Ægopodii.*

Diagn. Nigra; abdomine pallido; pedibus pallidioribus, colore rostri.

Habitat in *Ægopodio podagraria*.

Larva nigra opaca; pedibus albidis. *Aphis* prædicta; incisuris abdominis postice ad marginem villosis.

400. APHIS *Archangelicae.*

Diagn. Caput & thorax niger, rostrum pallide virens, abdomen virens.

Habitat in *Angelica archangelica*.

Larva virens glabra; oculis & femoribus basi nigris. *Aphis* glabra.

401. APHIS *Absinthii.*

Diagn. Nigra, villosula; oculis fusco-fulvis; alis hyalinis: costa virescente.

Habitat in *Artemisia absinthio*.

Larva glauco-virens; antennis atris: basi pallidis; pedibus nigris; femoribus anticis pallidis totis. *Aphis* nondum adulta oculis fulvis, antennis

pedibusque nigris, thorace cinerascente: puncto nigro dorsali, abdomine virescente: setis posticis nigris pilosis.

402. APHIS *Cirsii Acanthoidis* Fl. Carn.

Diagn. Nigra glabra; pedibus rufescentibus; alarum venis atris.

Habitat in *Cirio* 5. 6. Fl. Carniol.

Larva nigra glabra; antennis pallidis; tibiis villosis.

403. APHIS *Jaceæ*.

Diagn. Nigra; abdomine rostroque villosis.

Habitat in *Centaurea jacea*.

Larva nigra nitens; abdominis incisuris pilosis: pilis parvis, erectis, remotis; femoribus pallidioribus.

404. APHIS *Leucanthemi*.

Diagn. Caput & thorax nigra, abdomen vires, rostrum pallide virescens: apice fuscum.

Habitat in *Matricaria* 1. Fl. Carniol.

Larva vires, demum nigra, glaberrima; abdome obtuso, subrotundo.

405. APHIS *Scabiosæ*.

Diagn. Larva glabra, vires; abdomine subvilloso; alis immaculatis.

Habitat in *Scabiosa* 2. Fl. Carniol. p. 351.

406. APHIS *Pruni*.

Diagn. Nigra; abdomine viridi-nigroque vario.

Habitat in foliis *Pruni hortensis*, quæ convolvit & vitiat.

Larva virescens, glabra. *Aphis* pedum articulis nigris.

407. APHIS *Craccae*.

Diagn. Larva tenui quadam lana canescens, hinc forte generis sequentis.

Habitat in *Vicia Cracca*.

Huc retuli LINNÆUM secutus. Syst. Nat. p.

408. APHIS Fabæ.

Diagn. Larva nigra, glaberrima.

Habitat in *Vicia faba*; unde læsa fæcunditas, imo & sterilitas.

409. APHIS Genistæ.

Diagn. Nigra; alis puncto fusco.

Habitat in *Genista tinctoria*.

Larva nigra, cinereo quasi polline adspersa, quem decutit paritura.

410. APHIS Urticæ.

Diagn. Caput & thorax nigra, rostrum excolor, abdomen viride.

Habitat in *Urtica dioica*.

Larva atro-virens glabra nitens; lateribus abdominis superne tot punctis excavatis utrinque, quot sunt eius incisuræ.

Species alias prætermitto a Celeberr. LINNÆO jam adnotatas.

C H E R M E S.

LINN. *Syst. Nat.* p. 453.

411. CHERMES Evonymi.

Diagn. Niger; pedibus pallidis.

In *Evonymo vulgaris*, cuius folia convolvit.

Larva nigra; seriebus quatuor pororum, umbilicatorum abdominis (†); thorace subviridi. *Chermes* alis (4) depresso, antennis tenuissimis.

412. CHERMES Cratægi.

Diagn. Larva plumbeo-virens; plica abdominalis longitudinali, media.

In convolutis & læsis foliis *Cratægi spinosæ*.

Insectum non vidi.

413.

(†) Unde *Aphides* fluidum nectar, *Chermes* vero glutinosum & in lanam concrecentem succum, plorant.

413. CHERMES *Senecionis*.

Diagn. Flavo-virens, antenn. articulo ultimo crassiore, duobusque pilis terminato.

In *Senecione* 3. *Fl. Carniol.*

Occiput maculis binis, fulvis. Thorax basi subtus spinulis duabus instructus. Oculi glauci. Alæ albidæ, deflexæ. Abdominis latera fusco-fasciata.

Larvam non vidi.

414. CHERMES *Pruni*.

Diagn. Abdomen rubrum: punctis fasciisque lateralibus fuscis.

In foliis *Pruni hortensis*, duo tresve simul.

Alæ anticae fusco-ferrugineæ. Antennæ pilis duobus divaricatis terminatae. Oculi fusti. Dorsum vix gibbuni.

Larva mihi ignota.

415. CHERMES *Fraxini*.

Diagn. Habitatio ad basim novorum ramorum *Fraxini orni* (apud nos), *excelsioris* LINN. Nam *Ornus* apetala est, *Fraxinus* vero MICHEL, in quo Insecta nostra degunt, corollam gerit.

Larva infans nuda, pallida; oculis fuscis, adolescens capite fuso, sex ordinibus pororum abdominalium, adulta ovato corpore.

Chermes flavo-nigroque varius; alis ad apicem puncto fuso, alioque inferiore marginali. Formicæ has quoque visitant, & maxillas luna nivea inquinatas inde reportant.

416. CHERMES *Pyri*.

Diagn. *Mas* nigricans, *fæmina* ab domine fulvo.

In foliis *Pyri comm.*

Antennæ 5-nodiæ: ultimo articulo duabus setulis terminato.

417. CHERMES *Alni*.

Diagn. Antennæ 7-nodiæ. Corpus virescens. Alæ immaculatae. Larvam tegit densa lana plumosa floccis longioribusque radiata.

Habitat in *Alno* de qua lege fusam Ill. LINN. descriptionem. Faun. Svec. 2. 1008.

THRIPS.

THRIPS.

LINN. *Syst. Nat.* p. 457.

418. THRIPS *Physapus.*

LINN. *Syst. Nat.* p. 457.

Faun. Svec. 2. 1027.

Diagn. Nigra; alis pallidioribus.

In flore *Ranunculi palustris*, fusca, raris pilis adspersa; antennis obscuris. Abdomen exiliens, flexible ut in *Staphylinis*; segmentis margine rufis.

In flore *Bellidis majoris*, copiosissima, nigra tota; antennarum articulis basi albidis; tibiis anticis crassioribus, compressis.

In flore *Hypochaeris maculatae*, tota nigra; pedum unguiculis albidis; alis margine pilosis. An species distinctæ?



OR-

ORDO III. LEPIDOPTERA.

LINN. *Syst. Nat.* p. 458.

ALÆ QUATUOR IMBRICATAE SQUA-
MIS. CORPUS PILOSUM.

PAPILIO.

LINN. *Syst. Nat.* l. c.

I. TETRAPLI. (†)

(*) *Alis angulatis.*

419. PAPILIO *Antiopa.*

Alæ ant. long. unc. 1. lin. $5\frac{1}{2}$. lat. lin. $11\frac{1}{2}$. (††)

LINN. *Syst. Nat.* p. 476-477.

Faun. Svec. 2. 1056.

ROES. Papil. Diurn. Cl. I. Tab. 1. fig. 5. 6.
P. PODA. Mus. Græc. p. 71.

Diagn. Nigricans; alarum limbo utrinque ali-
ter colorato, intra quem superne maculæ cœruleæ
in ala superiore octo, in inferiore septem, in unam
teriem ordinata. (†††)

Habitat in *Salice.*

Alæ

(†) Natura hos ordines instituit, nec frustra.

(††) Alæ longitudo a basi ad apicem latitudo ab
apice ad angulum posticum; quarum propor-
tio constans.

(†††) Colores ex cadaveribus, non vero ex vivis
animalibus, desumpti sunt; quorum prævalen-
tes primarii.

Alæ anticæ supra color

1. Caryophyllinus, a basi usque ad fasciam nigram extensus.
2. Albus aut isabellæ, limbi utrinque & macularum duarum margini crassiori antice adspicentium, nec non tibiarum.
3. Niger, fascia nempe nigra adjacens limbo.
4. Cæruleus, maculæ cæruleæ nigræ fasciæ impositæ.
5. Rosatus, accessorius, quo limbus in margine & præsertim circa posticum angulum adspersus, non perpetuus, & facile evanidus.

— — — infra color

1. Fuscus, & fuscae lineolæ punctaque in limbo.
2. Niger, lineolæ nigræ transversæ confertæ.
3. Albus aut isabellæ limbi, & punctum concolor in medio septem linearum intervallo a basi distans; maculæ marginis crassioris fusco-variegatae.

— posticæ supra anticis concolores, absque maculis in margine superiore fasciaque nigra septem maculis ovatis cæruleis variegata.

— — — subtus anticis concolores, puncto in medio colore limbi.

Antennæ alarum paginæ superiori concolores, clavæ apice fulvo.

Nigricans dicitur, quia a longe visus, totus niger appetet, proprius autem observatus non item. Color caryophyllinus est equidem sed obscurior. Verno tempore circumvolans limbum album semper habet, alio autem tempore sæpius isabellatum; adservatus limbum album quandoque acquirit qui talis non erat antea; idem punctis caryophyllinis sæpius variegatus.

Larva echinata, nigra. Pupa fusca, bicornis, postice adpensa. *Ichneumonis* puparum aptissimus nidus.

420. PAPILIO *Polychloros*.— long. unc. 1. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. lin. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 477.

Faun. Svec. 2. 1057.

ROESEL. Papil. Diur. Cl. I. Tab. 2. fig. 4. 5.

FRISCH. Insect. 6. Tab. 3. fig. 4. 5.

Diagn. Alæ supra corticinæ: anticæ maculis nigris, ovalibus, quatuor, liberis.Habitat in *Salice ceraso*.

Alæ anticæ supra color.

1. Corticinus.

2. Niger; fascia nigricans submarginalis; maculæ tres ad marginem superiore, quarum duo majores margini insidentes, alia minor libera anterior; in disco maculæ aliæ quatuor subovatae: anteriore majore;

3. Fuscus, margo exterior. (†)

infra —

1. Cupressinus.

2. Umbrinus, quo basis fasciatim variegata, & cupressinus alibi lineatim & punctatim dense maculatus; fascia ab angulo postico ad angulum alæ distans ab apice intervallo lin. 2 $\frac{1}{2}$.

— posticæ supra color

1. Corticinus.

2. Niger, macula semielliptica prope marginem superiore in medio posita, fascia obsoleta undata submarginalis.

3. Cæruleus, maculæ hemisphæricæ fascia nigra immersæ.

4. Fuscus, quo dentes colorati.

infra —

1. Umbrinus, ab alæ basi extensus per spatium lin. 6 $\frac{1}{2}$. longum: similes lineolæ transversæ crebræ alibi paginam cupressinam variegantes.

2. Cu-

(†) Alæ margo superior aut crassior a basi ad apicem, exterior ab apice ad angulum posticum, inferior ab angulo postico ad basim.

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 145

2. Cupressinum punctum in medio, inter-
vallo lin. $1\frac{1}{2}$ distans ab umbrino &
exteriore margine.

Var. 1. Inter maculas duas maiores margini ex-
teriori alæ anticæ incumbentes, colore
albido
2. — Citrino.
3. Maculis submarginalibus cæruleis in alæ
posticæ pagina superiore (3-4).
Antennæ clava recta: apice corticino.

421. PAPILIO Urticæ.— long. lin. 11. lat. $7\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 477.

Faun. Svec. 2. 1058.

ROESEL. Papil Diurn. Cl. I. Tab. 4. fig. 6-7.

FRISCH. Ins. 6. Tab. 3. fig. 5: 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 71.

Diagn. Alæ anticæ corticinæ fascia limbi macu-
lisque senis atris, quarum tres maiores margini su-
periori impositæ, aliæ in disco liberæ: antica duplo
& triplo majore.

Habitat in *Urtica urente*. LINN. sed etiam circa
Idriam, & alibi, ubi *Urtica urens* nulla.

Alæ anticæ color supra

1. Sature corticinus.
2. Niger in locis prædictis.
3. Cæruleus, maculæ aut puncta 5 - 8. in
fascia nigra limbi.
4. Albus, maculæ ad marginem superiorem,
inter fasciam & maculam proximam.

— infra

1. Cupressinus in limbo.
2. Umbrinus baseos, marginis exterioris,
& maculæ subconicæ magnæ basi sua
superiori margini imposita.
3. Niger, lineolis repandis transversis um-
brinani basim variegantibus.

— posticæ color supra

1. Niger a basi ad medium usque, fascia que
limbi.
2. Sature corticinus in area interjecta.
3. Cæruleus, maculæ hemisphæricæ 6-7.
fasciæ immersæ.

M

3. cæ-

— — — infra

1. Umbrinus a basi ad medium usque, nec non in limbo.

2. Cupressinus, areæ interjectæ, umbrinische lineoli transversis variegatae.

Variat 1. Lineola cupressina in medio alæ posticæ subtus,

2. Absque hac lineola, aut puncto.

Antennæ clava nigra; apice corticinio.

422. PAPILIO C album.

— long. lin. 10 $\frac{1}{2}$. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 477.

Faun. Svec. 2. 1059.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. I Tab. 5. fig. 5. 6.

FRISCH. Insect. 4. Tab. 4. fig. 5. 6. p. 6-9.

Diagn. Alæ sinuatæ, posticæ subtus in medio linea curva alba C latinum referente notata, cuius convexitas insecti corpus respicit.

Habitat in *Humulo* &c.

Alæ anticæ color supra

1. Corticinus.

2. Umbrinus limbi & macularum (7), quarum quinque liberæ, tres aliæ marginibus adjacentes.

— — — infra

1. Umbrinus fasciæ mediæ obtuse-angulatæ & macularum ad basim positarum, nec non limbi ab angulo alæ superiore ad ejus posticum.

2. Cupressinus inter fasciam & limbum, sed exiguis confertis umbrinis lineolis transversis variegatus.

3. Viridis, maculæ obsoletæ variantes versus limbum.

— posticæ color supra ut in anticis, sed margo undique umbrinus & tres maculæ umbrinæ in disco. versus basim liberæ.

— — — subtus ut in anticis, sed maculæ virides plures, & in medio alibi C.

Variat 1. Maculis binis alarum antifarum superiore paginam antice occupantibus liberis & coherentibus.

2. Ma-

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 147

2. Macula postica marginali ibidem manifesta, aut obsoleta.
3. Alis subtus non tam cupressino quam corticino colore tinctis.
4. Alis poiticis subtus maculis nonnullis virescentibus & subocellatis.

423. PAPILIO. Jo.

— long. unc. 1. & lin. $1\frac{1}{2}$. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 472.

Faun. Svec. 2. 1048.

ROESEL. Insect. Diur. Cl. I. Tab. 3. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 66.

Diagn. Ocellus magnus pavonio similis unus in qualibet alæ pagina superiore.

Habitat in *Urtica dioica* &c.

Alæ anticæ color supra

1. Fulvus.
2. Murinus limbi.
3. Niger, margo superior, maculæ duo magnæ ei impositæ & margo exterior ocelli.
4. Osseus, lineolæ transversæ in margine superiore usque ad maculam nigram majorem extensæ, maculæ tres ad marginem eundem.
5. Cæruleus, pollen adspersus spatio a linea nigra lunata ocelli & maculis osseis posticis intercepto.
6. Albus puncta quinque prope limbum, quorum tria cæruleo colori immersa.

— infra

1. Plumbeus.
2. Cupressinus limbi, punctorumque (6) versus marginem exteriorem.
3. Niger, lituræ transversæ ad basim, striæ confertæ transversæ in disco, maculæ lunulatæ 6-7 in limbo.

— posticæ color supra

1. Murinus.
2. Niger ocelli ovati lin. $3\frac{1}{2}$. longi, ejusque supercilii.
3. Cæruleus pupillæ ocelli abruptæ.

4. Osseus palpebræ utriusque, & pollinis
ad basim alæ.
— — — infra
1. Plumbeus.
2. Niger, lituræ transversæ repandæ, lineo-
læque plurimæ.
3. cupressinus, versus limbum intersper-
sus, punctoque in mediq alæ.

424. PAPILIO *Atalanta*.

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 478.

Faun. Svec. 2. 1060.

ROESEL. Papil. Diur. Cl. I. Tab. 6. fig. 6. 7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 72.

Diagn. Alæ supra nigræ; anticæ fascia media
minia, posticæ limbo minio.Habitat in *Urtica dioica*.

Alæ anticæ color supra

1. Niger.
2. Minius, vividior tamen quam trochus
exhibit.
3. Albus, maculæ (7), quarum sex inter fas-
ciam & limbum, una in ipsa fascia,
margo alæ albo nigroque varius.
4. Cærulescens, lineolæ convexæ (5) sub-
marginales.

— — — infra

1. Niger.
2. Minius, fascia ut supra.
3. Albus, maculæ ut supra, tribus extimis
subocellatis.
4. Cupressinus, inter apicem & maculam
albam majorem.
5. Cæruleus, linea conica ad basim, &
alia linea recurva (?) inter fasciam &
maculam majorem albam.
6. Isabellæ inquinans basim fasciæ rubræ.

— posticæ color supra

1. Niger; ut & puncta (4) in fascia linib.
2. Minius, fascia limb.
3. Albus nigroque varius margo exterior.
4. Cæruleus, maculæ duo didymæ ad an-
gulum ani, margine nigro.

— infra

— — — infra

1. Cupressinus sed obscurior.
2. Niger lineæ inæquales transversæ vagæ, ut & palpebræ ocellorum ad limbum.
3. Isabellæ, macula in medio marginis superioris nigro-nebulosa, conica, bases ocellorum, lineæ marginales (7).
4. Albus & nigro varius margo exterior.
5. Cæruleus, lineolæ hemisphæriçæ, pupillas ocellorum constituentes, nec non lineam submarginalem.

Antennæ lin. 7. longæ; stipite nigro: annulis albis, clava nigra: apice corticino. Oculi corticini; cruce nigra, punctis quinque facta, inscripti.

Larva echinata. Pupa antice bifida, maculæ auri nudi ad bases tuberculorum auctorū posticæ partis, evanescentes, cum ex pupa partui proxima alarum rubra fascia translucet.

(**) *Alis dentatis.*

425. PAPILIO Hypermnestra.

— long. unc. 1. & lin. $\frac{1}{2}$. lat. lin. 7.

ROESEL. Suppl. Tom. IV. Tab. 7. fig. 1. 2.

Diagn. Alæ supra isabellatæ; maculis, venis, fasciisque marginali pectinata, nigris.

Labaco missus, an indigena? in vineis *Austriæ* certe spontaneus.

Alæ anticæ color supra

1. Isabellæ.
2. Niger, maculæ (5) exteriori margini incumbentes; venæ nigræ; fascia marginalis dentibus octo pectinata, duplex.
3. Ruber, punctum intra maculam nigram extimam.

— — — infra

1. Cereus.
2. Niger, maculæ venæ fasciæque ut supra.
3. Cinnaberinus, maculæ alternæ marginales supra nigræ.
4. Minius, spatia dentibus fasciæ quinis aut senis duplicatis relicta.

— posticæ color supra

1. Isabellæ.

2. Niger, fascia limbi dentata duplex, venæ & maculæ his interpositæ.
 3. Cinnaberinus, maculæ (6).
 4. Cæruleus color squamarum alæ quarumdam infra basim maculæ cujusque cinnaberinæ ad limbum positæ.
- infra
1. Cereus.
 2. Niger, ut supra.
 3. Cinnaberinus, maculæ ut supra, & spatia inter dentium fasciæ duplicaturas.

Antennæ lineas quatuor longæ; stipite hepatico, clava nigra gibba. Circum oculos annulus cinnaberinus. Abdomen utrinque binis ordinibus punctorum cinnaberis colore.

Variat 1. Macula puncto nigra, vel maculis duabus nigris inter marginem inferiorem alæ anticæ & nervum secundum ibidem.

2. Maculis alternis nigris marginalibus ejusdem alæ subtus maxima parte nigra, aut totis fere cinnaberinis.
3. Area illa ovali ad basim alæ posticæ posita, ex qua fere parallelæ demum oriuntur decurrentque venæ, maculis (2) & puncto nigro, aut maculis (3), vel denique (4) parallelis notata.

426. PAPILIO Cardui.

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 8 $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 475.

Faun. Svec. 2. 1054.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. I. Tab. 10. fig. 6-7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 69.

Diagn. Alæ anticæ fuscæ; insulis tribus, ochreaceis in medio, albisque maculis quinis ad apicem, quarum tres sphæricæ: posticæ subtus ocellis quatuor.

In Carniola non rarus.

Alæ anticæ color supra

1. Fuscus.

2. Ochreaceus.

3. Albus, albæ quoque lineæ sublunatae (5) in limbo, versus apicem.

— infra

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 151

— infra

1. Nigricans, maculæ octo circiter inæquales angulatæ sparsæ a basi ad medium usque.
2. Albus, maculæ magnæ tres exteriori margini impositæ; aliæ tres multo minores rotundæ, ut supra; lineæ juxta totum limbum in fasciam quasi unitæ submarginales.
3. Ochreaceus in medio.
4. Corallinus versus basim.
5. Cervinus ad apicem.

— posticæ color supra

1. Ochreaceus insulæ in medio & limbi.
2. Murinus ubique alibi.
3. Fuscus, maculæ (5) subrotundæ, aliæ (7) submarginales; sex aliæ in margine.
4. Cæruleus, squamæ nonnullæ ad bases macularum fuscarum duarum cohærentium ad angulum ani.

— infra

1. Albus.
2. Cervinus, maculæ variæ, nebulosam reddentes albam paginam.
3. Cæruleus squamaruni, quæ pupillas efficiunt ocellorum.
4. Niger, annulus ultimus ocellorum lateralium.
5. Paleaceus annulus penultimus ocellorum lateralium.

Antennæ lin. (7) longæ. Ocelli, alarum posticarum subtus, intermedii minores.

427. PAPILIO Galathea.

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 474.

ROESEL. Suppl. Cl. II. Tab. 37. fig. 1.2. bene.

P. PODA. Mus. Græc. p. 68.

Diagn. Alæ supra fuscae albido maculatæ, posticæ subtus ocellis senis: ultimis binis coalitis minoribusque.

In gramineis subsylvestribus Carnioliae non rarus.

Alæ anticæ color supra

1. Fuscus.

M 4.

— infra

2. albus *femina*, illeilæ mari, nempe maculæ (13), majore ad basim.
 — — — infra
 1. Albus, maculæ magnæ, una ad basim, tribus in medio.
 2. Fuscus.
 3. Isabellæ ocelli fusco-punctulati, pupilla glauco-argentea.
 — posticæ color supra.
 1. Fuscus.
 2. Albus aut isabellæ, macula magna cu-neiformis ad basim, aliæ 8-9 in medio fasciam quasi efficientes, maculæ aliæ submarginales (3-6).
 — — — infra
 1. Albus.
 2. Isabellæ fusco-punctatus.
 3. Glauco-argenteus pupillarum.

Antennæ lin. (6.) longæ, clavæ ápice corticino. Abdomen nigrum. Volatus latus; infessus facilis.

428. PAPILIO *Fagi*.

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. 10.

Diagn. Fuscus; fascia communi, utrinque lucidiore, alis singulis subtus ocello.

Inter *Fagos*, & circa tuguria rusticorum.

Alæ anticæ color supra

1. Fuscus, fuscæ huius partis margine exteriore dentato; limbus fuscus, ocellus fuscus; pupilla alba fasciæ lucidiori impositus, una cum macula minore rotunda.

— — — infra
 ut supra, sed fascia lucidior, & ocellus maculaque nigra.

— posticæ color supra

1. Fuscus, pariter externe dentatus.
 2. Albus fasciæ, albo fuscoque varius marginis exterioris.

— — — infra

1. Fuscus.
 2. Albus fasciæ & pupillæ ocelli.

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 153

3. Niger litorarum trium dentatarum & transversarum.

Antennæ lin. $6\frac{1}{4}$. longæ, clava compressa obtusa gibba, subtus albida, basi corticina.

Corpus fuscum.

Variat 1. Macula ad apicem alæ supra ocellata & cœca.

2. Fascia alæ anticæ utrinque ossea.

3. Ala antica supra ocello parvo, aut puncto cœco notata.

4. Punctis tribus albis sub ala postica, in eadem cum ocello distantia a margine.

429. PAPILIO *Dryas*.

— long. unc. 1. & lin. 3. lat. 9.

Diagn. Alæ concolores; anticæ utrinque ocellis binis atris; pupilla glauca.

Inter Quercus.

Unus & idem alæ utriusque color, obscurior tamen fascia versus limbum sub alis posticis.

Variat 1. Colore murino, ocelli inferioris in alæ pagina inferiore, diametro lin. $2\frac{1}{3}$.

2. Ocellis iisdem subtus atmosphæra lucidiore.

3. Alæ longitudine unciali; ocello utroque cæcutiente & parvo.

4. Colore fusco: ocellis æqualibus.

5. Ocellis etiam æqualibus, sed alis posticis utrinque ocello exiguo.

Antennæ semiunciales, apice corticinae; clava tenui: apice curvula; volatus lentus; structura facies, proportio partium geometrica, locus natalis idem, speciem indicant.

430. PAPILIO *Iris*.

— long. unc. 1. lin. 4. lat. $10\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 476.

ROESPL. Papil. Diurn. Cl. I. fig. 3-4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 70.

Diagn. Alæ supra colore variantes pro vario oculi situ, singulæ subtus uni ocellatæ, anticæ supra ad apicem maculis binis, albis.

In Carniolia paucim occurrit, ætate.

- Variat 1.** Alis fuscouscentibus; anticis maculis (11) albis; posticis fascia alba ocelloque nigro cœco: iride ochreacea, qui sub alis anticis pupillam habet cœrulecentem, & maculas duas albas iridi immersas. Alæ posticæ subtus fascia alba dente exterius instrueta. Huic potissimum convenit differentia LINNÆANA.
- 2.** Alis fuscouscentibus; fascia maculisque ochreaceis; punctis binis albis ad apicem antistarum utrinque, quæ maculas albas subtus habent, & ocellum cœcum. Alæ posticæ subtus fascia albida non dentata; ocelli pupilla cœruleofuscante. Hanc pinxit ROESELIUS.
- 3.** Alis anticis supra, castaneis; maculis ochreaceis; fascia abrupta, paleacea, maculisque ad apicem tribus albis; posticis fascia paleaceo-ochreata, maculisque ochreaceis, subtus ocello obscuriore fasciaque albida obsoleta.

431. PAPILIO *Mæra*.

—. long. lin. 11. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 473.

Faun. Svec. 2. 1049.

P. PODA. Mus. Græc. p. 67.

Diagn. Ex notis constantibus hisce.

1. Ocellus magnus utrinque versus apicem, cui subtus adjacet exiguus alter.
2. Alæ anticæ subtus corticinæ; lineis transversis fuscis quatuor, quarum una a margine crassiore ad angulum posticum usque producta.
3. Alæ posticæ supra ocellis plerumque tribus.
4. Eadem alæ subtus aliter ac superiores coloratae; lineis repandis transversis binis obscurioribus anticis, & ocellis sex prope

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 155

prope limbum, quorum duo abdomini proximi in unum fere coaliti.

Passim in gramineis.

Variat. I. alis anticis supra

1. Nuceis.
2. Corticina macula cuneiformi magna postica, cuius basis ocellum continet.
3. Nigro ocello, cuius diameter lin. $1\frac{1}{2}$ pupilla alba parva.

— — infra

1. Griseis circumquaque & ad basim.
2. Corticinis alibi.
3. Macula, ut supra, ocellata sed paulo majore.

— posticis supra.

1. Nuceis.
2. Corticina atmosphæra ocellorum.
3. Nigra iride, ocelli, cuius pupilla alba.

— — infra

1. Griseis ubique, exceptis ocellis, & striis transversis.
- II. Alis anticis posticisque supra corticinis; fasciis, lineis, venisque fuscis; posticis ocellis quatuor.

— — — subtus corticinis; stria lineisque transversis fuscis.

— posticis subtus, ut in Varietate priori, sed ocellis (7), quorum duo ad angulum ani coaliti.

- III. Alis anticis corticinis; limbo, margine toto lineis fasciaque rivulosa fuscis; ocelli diametro linearie.

— — — subtus ut in Var. 2.

— posticis supra fuscis; fasciis binis obsoletis, corticinis; ocellis tribus.

— — — subtus, ut in priore.

- IV. Alis anticis posticisque ut in Var. 3. sed his supra ocellis quatuor; subtus ut in priore.

Larva virens, subvillosa. Pupa virescens, obtuse bifida, pone lateribus echinatis.

432. PAPILIO *Aegeria*.

— long. lin. 10. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 473.

ROESEL. Tom. IV. Tab. 33. fig. 3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 68.

Diagn. Alæ onines utrinque murinæ, anticæ ocello utrinque ad apicem maculisque paleaceis variegatæ; posticæ supra ocellis tribus; subtus punctis tribus, albidis, atmosphæra murina cinctis.

In sylvestribus herbidis, non rarus.

Ocellus alarum anticarum maculæ subovatæ, paleaceæ, saepius immersus.

Variat 1. Ocellis alæ posticæ supra atmosphæra corticina cinctis, aut paleacea, siisque plus minus evidentibus.

2. Ocello anticarum alarum macula una in apice, alia ab basim.

Hisce notis adgnosci & a priore facile distingui potest.

433. PAPILIO *Achne*. (†).

— long. unc. 1. lat. lin. 8.

Diagn. Alæ supra murinæ: anticæ ocellis cœcis (5), posticæ supra (4) cœcis, subtus (6) pupillatis.

In *Frangula ora solii integræ*, seu *Rhamno alpino*.

Alæ anticæ color supra

1. Murinus.

2. Niger macularum ocellarium; utrinque (5).

3. Paleaceus annuli ocelli cuiusque.

— — — infra

1. Murinus.

2. Paleaceus fasciæ & annuli cuiusque ocelli.

3. Griseus, lineolæ transversæ mediæ.

— posticæ color supra ut anticæ.

— — — — — infra

1. Murinus.

2. Al-

(†) Danai Regis mater, e quo filiæ quinquaginta natæ.

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 157

2. Albus lineolæ obliquæ & fasciæ.
3. Niger iridis ocellorum, pupilla alba parva: gemina in oculo ad angulum ani posito.
4. Paleaceus annulus ocelli singuli.

Palpi nigri rachi alba. Oculorum margo posterior albus. Antennæ lin. (5) longæ, nigræ albo-annulatae; clava tenui, sub apice corticina, extorsum deflexa. Corpus fuscescens.

434. PAPILIO *Polymeda*. (††).

—. long. lin. 11. lat. 7.

Diagn. Supra murinus, subtus nuceus; alis anticis supra ocellis binis, infra subternis, posticis supra binis, subtus quinis.

In *Caprifolio*, seu *Lonicera xylosteo*.

Alæ anticæ murinæ, singulæ supra ocellis binis, atris, parvis, quandoque cœcis.

Posticæ ocellis (5) annulo paleaceo cinctis, quorum duo in medio ad marginem superiorem, alii postici versus marginem interiorem.

Variat 1. Alis supra & infra murinis: anticis ad apicem subtus ocellis binis.

2. Alis omnibus subtus nuceis: anticis subtus ad apicem ocellis tribus.

435. PAPILIO *Jurtina*. (sexus unus.)

—. long. unc. 1. lat. lin. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 475.

Faun. Svec. 2. 1052.

ROESEL. Suppl. Cl. I. Tab. 34.

P. PODA. Mus. Græc. p. 69.

Diagn. Ala antica utrinque ad apicem ocello immerso maculæ alterius coloris, cui diameter linearis & pupilla excentrica; postica vero subtus fascia lata pallidiore.

In herbidis collibus Carnioliae frequens.

Variat

(††) Mater Jasonis, cui e Colcho reduci, *Æmona*, seu *Labacum*, suam debet originem anno ante Christum 1223, post diluvium 1174, ante Romanam conditam 472. SCHOENLEBEN.

- Variat 1. Alis supra murinis, anticis macula corticina, magna, cuneiformi.
 — anticis subtus corticinis; disco obscuriore.
 — — posticis supra murinis.
 — — subtus cervinis fusco-punctulatis; fascia pallidiore, subpaleacea, fusco punctulata, in qua puncta tria nigra: exterioribus binis, interiore & versus angulum ani, tertio.
 2. Alis singulis supra murinis, sed macula corticina obsoleta.
 — posticis subtus ut in Var. 1. sed punctis tantum binis, atris, in fascia.
 3. Alis singulis murinis; macula albida: basi corticina, utrinque.
 — posticis subtus fascia vix evidenter lucidiore, absque punctis nigris.
 4. Alis singulis cervinis; macula anticalrum utrinque alba.
 — posticis subtus fascia pallidiore, & unico, nigro, puncto interius notata.

435. PAPILIO *Janira*. (sexus alter).

— long. lin. 11. lat. 6 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 475.

Faun. Svec. 2. 1053.

P. PODA. Mus. Græc. p. 69.

Diagn. Alæ singulæ muriæ utrinque sed anticæ subtus corticinæ; limbo murino, ocelloque ad apicem utrinque parvo.

Una cum priore in copula visa.

Huic ocelli pupilla centralis, macula ocellum continens nulla, alæ posticæ versus limbum obscurissime pallidiores binisque punctis nigris atmosphæra corticina cinetis.

Variat 1. Ocello alirum anticarum subtus pupilla obscura.

2. Punctis posticarum exterioribus punctulo albo ocellatis.

436. PAPILIO *Ligea*.

— long. lin. 11 $\frac{1}{2}$. lat. 8.

LINN. Syst. Nat. p. 473.

Faun. Svec. 2. 1050.

Diagn.

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 159

Diagn. Alæ omnes utrinque fuscæ: anticæ utrinque versus apicem ocellis punctisve binis contiguis, intra fasciam aut maculam corticinam sepultis.

In sylvis nostris, pasim.

Notæ constantes in omni Varietate, præter totas, nullæ. Neque *Ligeam* II LINNÆI huc retulisse, nisi eius alas fuscæ; fascia fulva dixisset, quæ in omnibus fere varietatibus observantur, inter quas præcipuae sequentes.

Var. 1. Alis supra nigricantibus: anticis macula oblonga, corticina, in medio coarctata, in qua ocelli tres utrinque: posticis maculis tribus, corticinis, quarum exterior ocellum, aliæ punctum nigrum continent.

— infra pallidioribus; anticis ut supra maculatis posticis immaculatis.

2. Alis fuscis; anticis supra fascia corticina, in qua ocelli tres: infra eadem fascia cum ocellis tribus.

— — posticis supra fascia corticina, in qua ocelli quatuor minores: infra fascia pallidior, immaculata & cœca.

3. Alis fuscis: anticis supra fascia corticina, interrupta, in qua ocelli duo: infra, ut supra.

— — posticis supra ocellis quatuor, atmosphæra corticina: infra ocellis quinque; atmosphæra eadem.

4. Alis fuscis, anticis supra ocellis tribus; atmosphæra corticina: infra ocellis binis puncto que nigro.

— — posticis supra ocellis quatuor: exteriore cœcutiente: infra ocellis quatuor puncto que nigro exteriore.

5. Alis fuscis, anticis supra fascia corticina, in qua puncta tria nigra: subtus, ut supra.

— — posticis supra fascia corticina; punctis tribus atris: infra punctis tribus atmosphæra corticina cinctis.

437. PAPILIO *Cinxia*.— long. lin. 10. lat. 6 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 480.

Faun. Svec. 2. 1063.

ROESEL. Tom. IV. Tab. 13. fig. 6. 7. & Tab. 18. fig. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 73.

Diagn. Varietates nostræ hæcce notas communes habent.

1. Alæ supra corticinæ, fuscis maculis variegatæ;
2. Alæ utriusque margo albo-fuscoque varius;
3. Limbus alarum superne fuscus;
4. Alæ anticæ subtus corticinæ; apice posticis rūbtus cōcolore;
5. Posticæ subtus fasciis binis eiusdem sēpe coloris ac pagina inferior alæ anticæ;
6. Fascia antica alæ posticæ rivulosa.

In gramineis frequens.

Var. Alis posticis subtus

1. Paleaceis nigro maculatis; fasciis corticinis: anticæ insula unica.
2. —— nigro maculatis; fasciæ anticæ insula nulla.
3. —— nigro maculatis; fasciis abruptis.
4. Cereis, lineis transversis dentatis maculisque nigris.
5. —— fascia prima composita maculis (5) corticinis sublunatis, altera insulis binis.
6. —— fascia antica insulis tribus.
7. —— fascia antica insula nulla.
8. Paleaceis; fascia prima Var. 5. altera insulis binis.

438. PAPILIO *Paphia*.

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. lin. 10.

LINN. Syst. Nat. p. 481.

Faun. Svec. 2. 1064.

ROE-

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 161

ROESEL. Papil. Diur. Cl. I. Tab. 7. fig.

4. 5.

Diagn. Alæ corticinæ fusco-maculatæ: posticæ subtus virescentes; fasciis argenteis.

Passim circumvolat, etiam in sylvis.

Alæ anticæ in limbo binis ordinibus macularum fuscum, ad marginem superiorem rudi numerica inscriptione utrinque signatae, subtus ad apicem virescentibus maculis variegatae; posticæ supra binis ordinibus macularum liturisque fuscis; subtus limbo fasciisque tribus argenteis, quarum anticæ binæ pyramidatae & abruptæ.

Var. 1. Alis anticis apice supernæ immaculatis; margine parumper fuscescente; posticis subtus ordinibus binis macularum rotundarum fusco-virescentium; limbo rubore quodam suffuso.

2. Alis ubique fusco-maculatis; margine fuscō.

3. Alis singulis supra murinis, fusco-maculatis: anticis subtus apice flavicantibus alibi pallidis; singularis hæc varietas in sylvis reperta, circa Idriam.

439. PAPILIO Aglaja.

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. 8½

LINN. Syst. Nat. p. 481.

Faun. Svec. 2. 1065.

ROESEL. Tom. IV. Tab. 25. fig. 4. 5.

Qui ad solum numerum & nitorem macularum in his speciebus attenderit, is sane fallere & falli potest. Ego lubricas hasce notas expertus, limites dabo forte certiores, ne multiplicantur entia sine necessitate.

Diagn. 1. Ala antica ad marginem crassiorem lituris nigris quinque transversis, arabicas litteras referentibus, quarum quarta duplex.

2. Eadem venis parallelis fuscis striata.

3. Inter has venas maculæ rotundæ, liberæ sex, quarum unica punctum est.

N

4. Ma-

4. Maculæ aliæ quatuor nigræ pariter, sed totum spatum inter venas occupantes.
5. Eadem ala subtus maculis in disco septem nigris.
6. Ala postica supra maculis submarginalibus lunatis nigris septem, quibus proximæ sunt aliæ tres maculæ rotundæ, duoque puncta nigra.
7. — — infra maculis (7) argenteis aut pallidioribus in limbo, totidem in medio transversum seriatæ, totidemque ad basim.

In pratis.

P. Aglaja LINN. alas posticas subtus anterius virescentes, nullasque maculas inter seriem posticam & medium argenteam positas, gerit, & paulo major est.

P. Cydippe. LINN. Faun. Svec. 2. 1066. paulo minor, alas posticas subtus paleaceas, & maculas sature corticinas 4-5 inter duas posticas series argentearum locatas habet, quarum tres argenteum punctum in medio gerunt.

Hujus varietateni habeo, maculis alarum, quæ argenteæ sunt in aliis, in hac minime talibus & duntaxat pallidioribus.

440. PAPILIO *Lathonia*.

— long. lin. 11. lat. 7

LINN. Syst. Nat. p. 481. sed figura ROESELII hic citata non eit *Lathoniae*, sed *Euphrosynes* nieæ.

Faun. Svec. 2. 1068.

Diagn. Convenit cum priore alis corticinis nigro maculatis sed differt

1. Alis singulis ad limbum supra binis ordinibus macularum, quarum plures subrotundæ.
2. Alis anticis subtus ad apicem maculis parvis argenteis (6-8).
3. Alis posticis subtus ad marginem externum maculis argenteis (7, inaequalibus,

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 163

libus, quarum duo penultimæ ext-
riores majores sunt.

4. — — — ordine macularum
fuscotentium & argenteo centro no-
tatarum, (7).
5. — — — maculis aliis usque
(12) anterioribus argenteis sparsis in-
æqualibus, quarum ea quæ medium
alæ tenet omnium maxima est, & cu-
neiformis.

In pratis.

Variat colore corticino plus minus exaltafo, ma-
culis nigris & fuscis, nec non alæ anticæ
longitudine lin. (9).

441. PAPILIO *Euphrosyne*.

— long. a lin. $7\frac{1}{2}$. ad $11\frac{1}{2}$. lat. $4\frac{1}{2}$ - 6.

LINN. Syst. Nat. p. 481.

Faun. Svec. 2. 1069.

ROESEL. Suppl. Papil. Diurn. Cl. I. T. 10.

Diagn. Vere difficilis; mihi ex sequentibus no-
tis, quæ propriæ omnibus.

1. Si obversum adspicias animal, in ala
sinistra ad marginem crassiorem litu-
ras quatuor anteriores ita figuratas
habet ac si videres numerum (1071).
2. Ad limbum alæ utriusque supra series
duæ macularum, quæ in antica suo-
lunatae, in alia vero & interiore su-
rotundæ, nigrae.
3. Margo externus alæ utriusque niger.
4. Ala postica subtus maculis (7) margi-
nibus, pallidioribus, æqualibus.
5. — — — dein serie puncto-
rum (6).
6. — — — cui succedit fascia
pallida, constans maculis (8) inæqua-
libus & diversæ figuræ, quarum media
cuneiformis major, & sæpius argentea.
7. — — — supra hanc maculam
majorem est punctum nigrum vel ar-
genteum.

N 2

8. — ad

8. — — — ad basim maculæ (4)
pallidiores, intima & extima sæpius
argenteis.

In pratis, & collibus, frequens.

Aliæ omnes notæ fallaces & incertæ sunt, nam

Var. 1. Alis posticis maculis supra (7) albidis
marginalibus.

2. — iisdem subtus fature corticinis, aut
subrubentibus.

3. — — — maculis marginalibus
albis & argenteis.

4. — — — punctis limbi fuscis cœ-
cis, aut puncto lucidiore vel argenteo
ocellatis.

5. — — — fasciæ macula majore
sola argentea.

6. — — — macula majore,
una cum extima & intimâ, argenteis.

7. — — — omnibus albi-
dis, nec ulla argentea.

8. — — — puncto prope basim ni-
gro, aut nigro & margine paleaceo, vel
argenteo.

9. — — — maculis baseos dua-
bus tribus vel quatuor argenteis.

10. Habeo & bina specimina alis anticis
supra fuscis, postice corticino nebulosis.

11. — — specimen alis albo-fuscoque
variis: posticis subtus maculis fasciaque
griseis.

442. PAPILIO Prorsa.

— long. lin. $8\frac{1}{2}$. lat. lin. $5\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p 480.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. I. Tab. 8. fig.
6-7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 72.

Diagn. Alæ supra murinæ, subtus fusco-rufæ,
omnes utrinque fascia media alba, primoribus in-
terrumpita.

In Carniolia calidiore.

Utra.

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 165

Utraque ala, præter fasciam albam, punctis & lineolis pariter albis variegata est, sed in hac specie alæ posticæ superne lineolas corticinas, in duas series limbo parallelas ordinatas prope limbum habent; subtus vero, alæ omnes, ad basim, albis lineis fere reticulatæ sunt. Præterea huic ala antica utrinque inter fasciam & apicem exhibet puncta alba (6), quorum quartum (a costa deorsum numerando), reliquis majus est & rotundum. Definitio Papilionis hujus a LINNÆO data, etiam sequenti convenit, et si omnino diversus sit.

443. PAPILIO Rivularis.

— long. lin. 11. lat. lin. 7.

Diagn. Supra niger, subtus rufo-castaneus; alis posticis utrinque fascia alba, maculis distinctis, (6-7), oblongis & angulatis facta.

Circa rivulos & aquas in sylvis volitat, Augusto M.

Alæ anticæ utrinque maculis tribus approximatis albis, intervallo trium vel quatuor linearum ab apice, diffitis; nec non macula elliptica, pariter alba, in medio, utrinque, sed versus costam colligata.

Var. 1. Alis anticis, utrinquè, præter maculas quatuor dictas, aliis (4 & 8), inæqualibus, maculatis.

— posticis, fascia facta maculis septem, vel sex tantum cum punto intermedio, loco maculæ septimæ.

2. Alis posticis subtus basi duabus, albis, oblongis, contiguis maculis.

— — — — omnino albis; in qua varietate limbus alæ posticæ subtus puncta (7) nigra gerit.

3. Alis superne fuscouscentibus; macularum obscuriorum seriebus binis in limbo, subtus fusco-ferrugineis; maculis iisdem limbi. Alæ posticæ basi pallide cœruleæ; maculis nigris.

Varietas hæc major prioribus, nec adeo nigricans.

II. H E X A P I.

(‘) *Equites.*444. PAPILIO *Machaon.*— long. unc. 1. & lin. $5\frac{1}{2}$. lat. unc. 1.
LINN. Syst. Nat. p. 462.Faun. Svec. 2. 1031. cum optima
descriptione.ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 1,
fig. 4. 5.

FRISCH. Ins. 2. Tab. 10. fig. 2. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 61.

Diagn. Alæ luteæ; limbo superne fusco macu-
lis anticarum (8), posticarum (6) luteis; macula
rotunda croci austriaci ruditer pulverisati colore.Habitat in *Dauco carota*, *Ruta græveol.* &c.

Alæ anticæ color supra

1. Niger, ad basim & initium limbi luteo
polline adspersus.2. Luteus, maculæ (3) ad marginem su-
periorem, (8) in disco: interioribus
majoribus, (8) in limbo, quarum tres
versus apicem subrotundæ cæteræ fe-
re hemisphæricæ.

— — — infra

1. Luteus,

2. Niger; fasciæ duo parallelæ posterio-
res, ad angulum alæ posticum in u-
nam confluentes; nervi in disco; ma-
culæ (3-4) obsoletæ ad marginem
crassiorem.

— posticæ color supra

1. Luteus.

2. Niger limbi,

3. Cæruleus macularum obsoletarum (6)
in limbo.4. Crocatus maculæ ad angulum ani po-
sitæ; lunato nigro annulo circumdatae,
superne cærulescente polline, sub an-
nulo adspersæ.

— in.

infra

1. Luteus.
2. Niger, nervorum & liturarum transversarum, ac caudæ.
3. Cæruleus sub qualibet litura ordinis anterioris.
4. Crocatus maculæ ad angulum ani.

Antennæ, lingua, abdomen supra nigrum.

Variat alis anticis basi & fascia limbi nigris, luteo tamen polline adspersis.

445. PAPILIO *Podalirius*.

— long. unc. 1. & lin. 7. lat. unc. 1. & lin. 1.
ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 2. fig.

3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 62. Sinon. Tab.
2. fig. 1.

Diagn. Alæ supra albidae aut lutescentes; limbo fusco; anticæ fasciis inverse pyramidatis, fuscis, senis, alternis brevioribus; posticæ fasciis binis fuscis, tenuioribus.

Apud nos frequens, cœnosis in locis & circa aquas libenter sedens.

Alæ anticæ ad basim fasciis binis integris, cæteris ad oppositum marginem usque non productis.

— eadem subtus margine externo fasciisque (7) nigris, quarum media ad basim oblonga pallide lutea macula notata est; nulla harum fasciarum oppositum alæ marginem integre attingit.

— posticæ supra maculis lunatis cæruleis (4) limbo fusco immersis; margine dentato: dentium sinibus flavo margine præditis: dente quarto in caudam nigram lin. (7) longam: apice albida, producto. Ad angulum ani maculâ subrotunda nigra, puncto excentrico cæruleo ocellata, palpebra superiore crocata.

— subtus luteolæ fasciis (4) nigris, intermediis approximatis; maculæ (4) cæruleæ margine nigro; ocellus ad angulum ani ut supra.

(**) *Heliconii.*446. PAPILIO *Macaronius*. (†)

— long. lin. 10. lat.—

Diagn. Antennæ corpore nigro longiores, alæ luteæ: posticæ basi apiceque nigræ.Unicum cepi circa *Luriam*, in herbido colle.

Antennæ nigræ, longæ; clava lata, obtusa, brevi. Caput lin. (2) crassum, hirsutum.

Alæ integerimæ lanceolatæ, subtus quasi vernice lucida oblitæ; anticæ nervulis reticulatæ & seminudæ; maculis binis, fuscis, ex eo reticulo transparentibus; posticæ flavæ, lin. (8) longæ, latores anticis; apice nigro.

447. PAPILIO *Apollo*.

— long. unc. 1. & lin. 3½. ad lin. 7. lat. 11-12.

LINN. Syst. Nat. p. 465.

Faun. Svec. 2. 1032.

ROFSEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 45.
fig. 1. 2.

P. PODA. Mus. Græc. p. 66. Rhea.

Diagn. Albidus totus; alis anticis utrinque maculis (3-4), nigris, posticis utrinque ocellis binis cinnaberinis; pupilla alba; iride nigra.Habitat ad radicem alpium nostrarum, præsertim ad pedem *M. Greben*, *Grindoritz*, in *Kankerthall*, & supra *Gariutsche* inter *Veldes* & *Vochein*.Hic, præter dicta, propria sunt. 1. Facies *Papil. Cratægi*, quo paulo major. 2. Nativitas circa dies caniculares. 3. Volatus latus, quo captu facilis redditur. 4. Macula nigra alæ anticæ marginem inferiorem spectans subrotunda. 5. Alæ ejusdem limbus fore nudus. 6. Ala utraque pellucens, strepens, subtus lucida nudiuscula. 7. Antennæ lin. (5) longæ; clava nigra; stipite albo-nigroque vario. 8. Ad basim alæ posticæ subtus maculæ duæ, cinnaberinæ.

Hujus

(†) In honorem *Merlini Coceaji* Poëtæ Mantuani lepidissimi, edito *Macaronicorum* opere clari.

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 169

Hujus causa potissimum, *Danai candidi Europæi*
Heliconiæ gentis Novitii facti in Faun. Svecica 2.

- Variat 1. supra ocellis pallide cinnaberinis, & maculis binis atris ad angulum ani.
2. — ocellis cinnaberinis; pupilla excentrica, maculis ad angulum ani iisdem.
3. — ocellis iisdem, maculis ad angulum ani rubro puncto notatis.
4. — — — maculis hisce cinnaberinis; margine nigro.
5. — ocello postico antice obtuso aut emarginato.
6. — — eodem pupilla alba gemina.

Larvam & pupam descriptis ROESELIUS. l. c.
p. 29 - 36.

448. PAPILIO *Cratægi.*

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 467.

Faun. Svec. 2. 1034.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 3.
fig. 5. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 62-63.

Diagn. Albus totus; alarum venis, præfertim subtus, nigris.

Habitat in *Pruno domestica* & *Cratægo spin.*

Margo alarum anticarum sæpius denudatus, posticarum non item; lunula nigra ad costam primorum non semper adest. Conventicula instituit æstatae circa vias publicas, cœnosas, & circa rivulos. Delectatur floribus *Brafficæ* & *Salvia hortensis*.

Larva supra nigra, sub communi tentorio in societate vivens, quod deserit Majo M. integras arbores foliis suis sæpe denudans; maculis fulvis ad latus utrumque undecim. Pupa flavicans, nigromaculata, antice acuminata; hiuc natus *Papilio mœconium* roseum excernit, aut' bolarem. Femina antennæ clavam semialbam gerit.

449. PAPILIO *Mnemosyne*.

— long. unc. 1. & lin. $2\frac{1}{2}$. lat. lin. $8\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 465.

P. PODA. Mus. Græc. P. Cratægi β. in litteris vero *Mnemosyne*.

Diagn. Simillimus P. Cratægi, sed diversus maculis binis atris subangulatis in ala antica qualibet, in medio, prope costam.

Circa *Labacum* captum misit R. P. WULFEN.

Huic antennæ lineas quinque longæ, nigræ. Alæ subtus splendidæ ac si vernice oblitæ forent.

450. PAPILIO *Brassicæ*.

— long. unc. 1. & lin. 3. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 467.

Faun. Svec. 2. 1035.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 4. fig. 5. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 63.

Diagn. Albus; alis anticis supra costa apiceque nigris, subtus maculis binis nigris subrotundis.

Pallim reperitur.

Variat 1. alis anticis utrinque maculis binis nigris.

2. — — supra absque maculis.

3. — posticis in medio marginis superioris macula nigra.

451. PAPILIO *Rapæ*.

— long. lin. 11. lat. $6\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 468.

Faun. Svec. 2. 1036.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 5. fig. 3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 63-64.

Diagn. Ala antica uncia non longior, macula nigra saltē subtus notata; alæ posticæ subtus fere sulphureæ atomis fuscis adspersæ. Antennæ clava apice corticino.

Habitat in *Brassica oleracea*.

Variat 1. alis omnibus immaculatis, anticis subtus maculæ nigræ vestigium litteræ latinæ (V) simile gerentibus.

2. alis

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio 171

2. alis anticis apice fuscescente, supra macula una nigra, subtus binis: media nigra majore emarginata, altera obsoleta.
3. alis anticis apice maculaque una superne, subtus binis atris: media maiore.
4. — — apice, maculisque binis utrinque fuscis, subtus obsoletis.
5. — — apice fusco, maculis binis & qualibus nigris utrinque.
6. — — apice fere excolore, maculis binis nigris & qualibus utrinque.

Larva viridis, villofula, ocello luteo: pupilla nigra, utrinque in singulis segmentis. Pupa luteovirens, antice acuminata; linea dorsali eminentia & laterali pallidioribus; punctis luteis sub linea laterali tot quot segmenta posticæ partis. Post dies aliquot eadem albidiior redditur, & omnem sensim viorem exuit.

452. PAPILIO Sinapis.

— long. lin. 9½. lat. fere 6.

LINN. Syst. Nat. p. 468.

Faun. Svec. 2. 1038.

Diagn. Minor priore, albus totus; alis anticis absque maculis in medio & solis apicibus supra sspius fuscescentibus.

Ruri, & circa hortos, passim degit.

Variat 1. alis omnibus totis albis, nec apice fuscis.

2. — anticis apice supra fusco veluti polline leniter inquinatis.

3. — — apice toto fusco.

4. — — apice toto nigricante.

Antenn. capitulum apice nigrum, corticineo tamen punto notatum.

453. PAPILIO Napi.

— long. lin. 10. lat. 6.

LINN.

LINN. Syst. Nat. p. 468.

Faun. Svec. 2. 1037.

Diagn. Statura sequentis. Alæ subtus lineis obscurioribus juxta nervos decurrentibus variegatae.

In *Braffica*.

Variat 1. alis albis, basi nigricantibus: anticis apice fuscis; utraque subtus lituris longitudinalibus, juxta venas decurrentibus, glaucis.

2. alis supra offeis; lituris murinis; subtus albis; lituris fuscis.

454. PAPILIO *Cardamines*.

— long. lin. 9. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 468. mas.

Faun. Svec. 2. 1039. mas.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 8. fig. 5. 6. fæmina. 7. 8. mas.

Diagn. Alæ utriusque supra prævalens color albus; anticæ in medio versus marginem crassiorem macula alterius coloris utrinque; posticæ subtus viridi nebulosæ.

Habitat in *Nasturciis*, præsertim *Cardamine*.

Mas minor alis *anticis* basi albis, apice fuscis; spatio ab his coloribus relicto aurantio; macula sublunata parva nigra libera in medio posita intra aurantium colorem. Eadem ala subtus basi ifabellata; apice albido venuisque glaucis variegato, aliibi aurantiæ seu colore *Agarici chantarelli* cum macula nigra, ut supra.

— alis *posticis* supra albis, subtus pariter albis sed viridi nebulosis.

Variat 1. alis anticis apice superne fuscis; puncto utrinque medio senii ovali.

2. — — apice utrinque fuscis; puncto nigro subrotundo.

3. — — absque puncto utrinque.

Fæmina alas albas gerit, anticas ad apicem fusco-maculatas, absque aurantio colore; maculae illæ subtus

tus

tus virescentes sunt, ut & pagina inferior aīæ posticæ viridi-nebulosa.

Variat 1. alis anticis supra macula lunata libera apicibusque fuscis, posticis rivulose viridi-nebulosis.

2. alis anticis macula angulata libera apicibusque fusco-nebulosis, posticis subtus fasciatim viridi-nebulosis.

3. alis anticis macula angulata marginem proximum contingente fusca; apicibus fusco-nebulosis; posticis subtus ut in Var. 2.

4. alis anticis maculis binis didymis oblongis apicibusque fusco-nebulosis.

455. PAPILIO Hyale.

— long. unc. 1. lat. lin. 6 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 469.

Faun. Svec. 2. 1040.

ROESEL. Suppl. Cl. II. Pap. diur. Tab. 46.
fig. 4. 5.

Diagn. Alæ supra concolores: anticæ margine externo, apiceque supra nigris; macula media utrinque nigra; posticæ subtus ocello medio, subargenteo, cæco; omnes, præsertim subtus, rubella fimbria terminatæ.

In herbidis locis, & subsylvestribus non rarus.

Antennæ lin. 3 $\frac{1}{2}$. longæ; stipite rubello; clava obtusa, obscuriore. Alæ posticæ in medio macula aurantia, subtus limbo punctis (4-5) fuscescentibus, variegato. Volatus celer; inquietum animal it redditque sæpius eadem fere via, floribus non diu infidens.

Mas alis aurantiis, subtus pallidioribus; utriusque limbo superne nigro: anticis subtus punctis vel maculis tribus in limbo fuscis.

Variat 1. Maculis binis, flavis, alarum primorum fusco limbo immersis; alis posticis subtus ocello medio, cæco, sesquialtero, argenteo.

2. Alarum anticarum limbo fusco, absque maculis luteis; posticis ocello Var. 1.

3. Limbo alarum anticarum immaculato; ocello subtus posticarum unico tubargenteo.

Fæmina alis sulphureis: anticis limbo maculis sulphureis variegato; posticis absque limbo fuscō.

Variat 1. Alis posticis subtus ocello unico.

2. — — — — — sesquialtero.

3. Alis supra pallidioribus: posticis limbo subtusculo, subtusque ocello sesquialtero.

An ergo *Papil. Trite* Ill. LINNÆI huc referendus, examinent autoptæ.

456. PAPILIO *Rhamni*.

—. long. unc. 1. & lin. 2. lat. 7½.

LINN. Syst. Nat. p. 470.

Faun. Svec. 2. 1042.

ROESEL. Suppl. Cl. II. Papil. Diurn. Tab. 46. fig. 7. mas.
— fig. 2. fæmina.

P. PODA. Mus. Græc. p. 65.

Diagn. Alæ utrinque concolores, angulatæ: singulæ in medio puncto superne aurantio, subtus æneo-ferrugineo, notatae.

Passim occurrit, sed larvam in *Rhamno* nondum vidi.

Antennæ deflexæ, rubellæ, extrorsum crassiores; apice fuscō, lin. (4½) longæ. Thorax & abdomen basi albido sericeis longis villis pubescentia.

Mas alis sulphureis.

Fæmina — pallidioribus.

Martio & Aprili M. jam circumvolat.

457. PAPILIO *Amyntas*.

—. long. lin. 8. lat. lin. 5½.

R. P. PODA. Mus. Græc. p. 79.

Diagn. Alæ anticæ corticinæ; limbo fuscō, cui subtus immersus est unicus ocellus prope apicem. Posticæ fuscescentes; subtus fascia dentata alba & ocellis sex: quinis infra, uno supra fasciam.

Habitat in herbidis & subsylvestribus, non infrequens.

Alæ

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 175

Alæ poiticæ iupra ad angulum ani fulvo colore tintæ. Ante ocellum alæ anticæ subtus est macula albida. Fascia posticarum, apud nos, alba. Ocellus solitarius, sub alis posticis, adjacet margini superiori; ocellus anguli ani minimus, duo huic proximi maximi sunt.

458. PAPILIO *Menalcas.*

—. long. lin. 7. lat. lin. 4½.

P. PODA. Mus. Græc. p. 78.

Diagn. Alæ primores utrinque, posticæ supra tantum, pallide ochreaceæ. Ad apicem alæ anticæ est macula aut punctum nigricans, quod subtus ocellus est.

Habitat apud nos passim.

Alæ rotundatae, ut in priore; limbo plus minus fuscescente; fimbria cinerea. Alæ anticæ subtus apicem posticis alis concolorem habent. Ocelli pupilla est punctum album, iris nigra, quam ambit annulus alæ pagina pallidior. Ab alæ posticæ margine superiore descendit ad medium usque fascia repanda, supra quam ala eadem obscurior est, quam versus limbum.

Papiliones hi *Heliconiis* potius, quam *Ruralibus* adnumerandi.

(***) *Rurales.*

459. PAPILIO *Pruni.*

—. long. lin. 8. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 482.

Faun. Svec. 2. 1071.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 7.

fig. 4. 5.

Diagn. Alæ concolores supra fuscæ, subtus pallidiores: posticæ caudula nigra: apice alba, supra ad angulum ani maculæ colore gummi cerasorum, subtus linea transversa alba.

Reperitur etiam ubi *Prunus* nulla.

Papilio ROESELII omnino noster est a LINNAEO quoque citatus ibidem, et si alas posticas in *Fauna Svecica* aliter describat, ac ego coram habeo. Et sane, si unquam, certe in hac prosapia facilis est multiplicatio specierum, quoties ex una aliave

notula characteres speciei defumuntur. In nostris varietatibus haec notae communes sunt. 1. Antennae fuscæ, annulis albis variegatae; clava subtus & apice fulva. 2. Oculorum margo albus. 3. Pectus cinereo-cærulescens. 4. Alæ supra fuscæ, subtus pallidiores, & nunquam obscure-cinereæ. 5. Sub utraque ala linea alba constans lineolis in unam seriem dispositis. 6. Prope caudam alæ posticæ subtus maculæ duæ saltem saturato gummi cerasorum colore tinctæ, subhemisphæricæ: apice nigro.

Variat 1. Lineola sub alis posticis obsoleta, sub anticis fere nulla.

2. Maculis sub ala postica in limbo 3-5.

460. PAPILIO Rubi.

—. long. lin. $6\frac{1}{2}$. lat. $4\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 483.

Faun. Svec. 2. 1077.

Diagn. Alæ supra pallide cervinæ, subtus virgentes: posticæ semidentatae.

In Rubo.

Alæ posticæ subtus punctis (4-5) albis; intimo dente incurvo.

461. PAPILIO Argus.

Diagn. 1. Alæ supra concolores, sine maculis ocellaribus, margine obscuriore albaque fimbria terminato; subtus alio eoque pallidiore colore tinctæ; maculis ocellaribus multis atris plerumque rotundis, iisque pluribus sub posticis, quam sub anticis alis.

2. Alis posticis subtus basi cæruleis.

3. Maculis prope discum alæ anticæ subtus rotundioribus, senis.

4. Maculis prope discum alæ posticæ septem, in unam quasi seriem dispositis.

5. Antennis siipite nigro, annulis albis variegato; clava tenui.

6. Oculis fusco-caeruleis, ante & postice lineola alba notatis.

7. Margo superior seu crassior alarum antecarum albus.

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 177

8. Facies, volatus, alarum figura, propria partium, omnibus his eadem.

P. Arion.

— long. lin. 10. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 483.

Faun. Svec. 2. 1073.

ROESEL. Suppl. Papil. Diurn. Cl. II. Tab.
45. fig. 3. 4.

Diagn. Alæ fuscæ; disco cæruleo, fuscis maculis variegato.

In sylvestribus locis.

Ala antica subtus prope basim puncto nigro rotundo, dein macula subcordata, postea serie transversa repanda macularum (7); quarum extima punctum est, dein in limbo duo ordines punctorum (7).

— postica absque fascia maculisve fulvis ad limbum.

Variat statura minore, & macula ovata in medio alæ anticæ subtus, loco maculæ cordiformis.

P. Argus.

— long. lin. 6½. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 483.

Faun. Svec. 2. 1074.

Diagn. Alæ subtus canæ: posticæ fascia crocata, dentata, subtus prope limbum.

In herbidis collibus.

Alæ, apud nos, supra fuscæ, fimbria albo fuscoque varia terminata; anticæ maculis duabus cuneiformibus, cæruleis, longitudinalibus, contiguis, ad basim superne positis, quarum una altera duplo major; ad apicem maculæ cæruleæ majoris, macula nigra jacet. En Arionis in Argum degenerantis argumentum! Eadem ala subtus ordine interno macularum limbi in fasciam coeuntium. Ala postica subtus inter ordines binos macularum limbi crocato colore tincta. Nulla harum alarum macula iride lucidiore cincta est.

P. Argiolus.

— long. lin. 5. lat. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 483.

Faun. Svec. 2. 1076.

O

Diagn.

Diagn. Alæ supra cærueæ, alba fimbria terminatæ: posticæ punctis nigris & absque maculis crocatis aut fulvis in limbo.

Cum priore.

III. LINNÆUS posuit puncta nigra, parva, decem, sparsa, sub alis secundariis, quæ apud nos etiam duodecim occurunt.

Papilio ROESELII quartus Tab. 37. Cl. 2. Papil. diurn. huc pariter reduci possit, cum alæ ejus posticæ subtus careant maculis fulvis.

Varietatem habeo, alis supra fuscis, anticus uno ordine macularum in disco.

P. *Idas.*

—. long. lin. 6½. lat. 5.

LINN. Faun. Svec. 2. 1075.

Diagn. Alæ supra ut in *Argiolo*, sed posticæ subtus ordine macularum crocatarum in limbo.

Cum prioribus volitat, & circa rivulos congregatur.

Variat 1. Alis supra cœruleis: anticus fimbria alba nigro-punctata terminatis, punctis subtus ad basim tribus, dein unico oblongo, postea septem, denique binis ordinibus macularum fuscarum in limbo; posticis punctis tribus ad basim, dein (9) in disco, denique maculis limbi crocatis subhemisphaericis (9) margine nigro & ad basim nigra macula sub singulis.

2. Alis iisdem, sed fimbria anticus alba, iisque subtus macula nigra in medio, dein ordine uno macularum (6), denique limbo maculis (3-4), crocatis, obsoletis; quibus ad basim subjacet punctulum fuscum; posticarum maculis crocatis pariter ad basim puncto fusco notatis.

3. Alis iisdem, sed posticis subtus maculis crocatis (9) conicis, quarum quælibet, excepta extima & intima, maculam nigrum ad basim habet.

4. Alis iisdem, sed posticis ad limbum maculis crocatis obsoletis, fusca macula suffultis.

5. Alis

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 179

5. Alis supra fuscæ; posticis subtus cervinæ, supra maculis in limbo (3-4) crocatis, subtus maculis iisdem conicis (8), quibus ad basim punctum nigrum.
6. Alis iisdem, anticis supra in limbo maculis crocatis obsoletis (3-4); subtus (4-5) apice fuscis, basi puncto fusco notatis; posticis supra maculis crocatis submarginalibus (4-5), subtus (8) conicis, puncto fusco ad basim signatis.
7. Alis iisdem, subtus canis, omnibus in limbo utrinque maculis crocatis, in unam seriem dispositis.

P. Coridon.

— long. lin. 7. lat. $5\frac{1}{2}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 77-78.

Diagn. Alæ supra cœruleo-argenteæ, limbo fusco.

In Carniola calidiore.

Alæ anticæ subtus canæ; posticæ subtus cervinæ; maculis submarginalibus, crocatis, conicis (7).

P. Alexis.

— long. a lin. 6. ad 8. lat. $3\frac{2}{4}$ -5.

Diagn. Alæ supra fuscæ, fimbria alba: posticæ utrinque maculis crocatis.

in sylvestribus.

Variat 1. Alis anticis supra puncto in medio nigro & maculis crocatis in limbo (6).

— — subtus cinereis, maculis ocellaribus in disco (7), crocatis limbi (6) punctisque fuscis marginalibus totidem.

— posticis supra maculis crocatis, lunatis, in limbo, (4-5).

— — subtus cinereis; maculis crocatis in limbo (9); quarum tres ad angulum ani coalitæ.

2. Alis anticis supra, puncto medio obscuriore, maculisque limbi crocatis (3-4).

- Alis anticis subtus maculis ocellaribus (10), maculisque crocatis in limbo (6).
 — posticis supra maculis crocatis ocellaribus (4-5);
 — — subtus maculis iisdem (9).
 2. Alis anticis supra immaculatis, subtus maculis ocellaribus (9), tribusque crocatis, obsoletis in disco.
 — posticis supra maculis lunulatis, crocatis, in limbo (3-4), subtus (9).
 4. Alis anticis supra punctis obscurioribus in disco (9), crocatis nullis.
 — — subtus cinerascentibus maculis fuscis, subocellaribus in disco (11); binisque seriebus (in quilibet 6) similiter coloratis, in limbo, cum intermediis (3-4), crocatis.
 — posticis supra fusco-punctatis, maculis crocatis in limbo (3-4), obsoletis.
 — — subtus maculis disci subocellaribus (17), binisque seriebus punctorum fuscorum in limbo, quibus interjacent crocatæ maculæ (7).

An hic *Tityrus*. R. P. PODA. *Mus. Græc.*
p. 77. ? videtur utique.

462. PAPILIO *Virgaureæ*.

— long. lin. 6-8½. lat. 4½. — 5½.
LINN. Syst. Nat. p. 484.
 Faun. Svec. 2. 1079.

Diagn. Alæ anticæ fulvæ; margine externo, maculisque subtus atris; posticæ ad angulum ani binis dentibus instructæ.

In *Carniolie* pratis, non rarus.

Sexus unus, alis omnibus supra sericeo nitore fulvis; anticis margine crassiore & limbo nigris; posticis margine undique nigro.

ROESEL. Suppl. Cl. II. Tab. 45. fig.
5. 6.

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 181

Major, alis anticis subtus maculis nigris (11),
quarum octo transversim in unam fe-
riem ordinatæ,

— — posticis versus basim punctis (4)
nigris, postice serie una macularum
albarum nigro puncto terminatarum.

Sexus alter, alis anticis supra fulvis; margine
toto maculisque octo fuscis; quarum
tres posticæ sæpius conjunctæ; subtus
maculis ocellaribus (10): duabus infi-
mis in unam cohærentibus.

— — posticis murinis, punctis ad
(15) nigris, maculisque lunatis ful-
vis in limbo, (5 - 6); supra vero
fuscis, fascia limbi dentata fulva.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 37.
fig. 6. 7.

463. PAPILIO Comma?

— long. lin. 6½. lat. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 484.

Faun. Svec. 2. 1080.

P. PODA. Mus. Græc. Sylvestr.

Diagn. Alæ concolores corticinæ; limbo fu-
sco. Caput crassum; antennis unco terminatis.

In *Sylvestribus*.

Noster caret maculis pallidis albidisque, cæ-
terum idem cum *Linnæano*, juxta descriptionem da-
tam in *Fauna Svecica*.

Sexus unus habet lineam nigram obliquam in me-
dio paginæ superioris alæ anticæ cuiusque.

— alter caret hac linea, & pallidior est.

— Uterque sedens, gerit alas suberectas.

464. PAPILIO Morio.

— long. lin. 6-7. lat. 4-5.

Diagn. Fuscus totus; alis subtus maculis pal-
lidioribus.

Habitat cum priore.

Var. 1. Alis supra totis fuscis; punctis albidis,
marginalibus.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. III. Tab. 10.
fig. 5. 6.

2. Alis anticis supra albo punctatis; fimbria
albo fuscoque varia; subtus albo ma-
culatis, eademque fimbria; posticis u-
trinque simili fimbria, subtus albo for-
didoque variis.

ROESEL. l. c. fig. 7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 79. *Fritillarius.*

S P H I N X.

LINN. Syst. Nat. p. 489.

(*) *Metamorphosi occulta, sub terra.*

465. SPHINX Ocellata.

— long. unc. 1. lin. 4-6. lat. 9-9½.

LINN. Syst. Nat. p. 489.

Faun. Svec. 2. 1083.

ROESEL. Papil. Nocturn. Cl. I. Tab. 1.
fig. 3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 80.

Diagn. Alæ anticæ subangulatæ, posticæ ocel-
. lo magno superne notatæ. Os elingue.

Habitat in *Salice viminali.*

Alæ anticæ linea cana arcuata, una extremitate
apicem alæ, alia angulum posticum at-
tingente, alibi supra canæ lituris trans-
versis caffè colore variegatæ.

— — subtus disco baseos cinnaberino aut
vinoso; prope limbum fascia dupli-
fusca, margine caffato, præsertim in-
ter apicem & dentem alæ secunduni.

— posticæ supra vinosæ aut rubellæ, margine caff-
ato, maculaque ophthalmoidæ tres
lineas longa, pupilla fuscescente, iride
albida, atmosphera nigra.

— — subtus canescens, sed atomis caffè
colore ubique adspersæ, fasciisque bi-
nis canis.

Sphinx. LEPIDOPTERA. Sphinx. 183

Antennæ rufæ. Thorax macula dorsali, magna, caffea.

466. SPHINX *Populi.*

— long. unc. 1. & lin. 6. lat. 10.

LINN. Syst. Nat. p. 489.

Faun. Svec. 2. 1084.

Diagn. Corporis alarumque color primarius utrinque cinereus. Alæ omnes dentatae: anticæ supra puncto albo medio, posticæ basi moscatinæ. Antennæ osseæ.

Habitat in *Salice rubra.*

Corpus totum cinereum, sed oculi nigri & abdomen supra colore quodam moscatino inquinatum. Alarum fædoris situs peculiaris, nempe anticæ suberectæ & versus caput tendentes, posticæ deflexæ & posteriora corporis spectantes. Os bilingue.

467. SPHINX *Tiliæ.*

— long. unc. 1. & lin. 1½. — 3. lat. 6½. — 8.

LINN. Syst. Nat. p. 489.

Faun. Svec. 2. 1085.

Diagn. Alæ anticæ sinuato-dentatae; maculis duabus, obscurioribus, fasciam præferentibus: una majore, aliaque alba ad apicem basi dente notata.

Habitat in *Tilia* & *Salice.*

Var. 1. Corporis alarumque colore primario corticino utrinque.

2. Partium omnium colore primario ochreaceo; maculis cervinis.

3. Corporis alarumque supra colore primario osseo; maculis ferrugineis; subtus vero potius ferrugineo.

4. Alis anticis supra maculis umbrinis; disco subrubente; limbo utrinque fusco-limonio.

— — subtus basi ferrugineis; limbo virescente.

— posticis supra nuceis; subtus limbo virescente.

Huic proxima ROESELIANA. fig. 5. 6. Tab.
2. Papil. Noct. Cl. I. Huic etiam uni conveniret

descriptio Cel. LINNÆI. Faun. Svec. FRISCHII figura 3. Tab. 2 Inf. 7. alæ maculam majorem subcordatam habet, quam ego nondum vidi.

Sed & omnibus communis sunt antennæ supra albæ, subtus ochreaceæ; alæ posticæ fascia obcuriore obsoleta; larva virescens, calami scriptorii crassitie; lineis lateralibus obliquis lutescentibus; cornu ani cærulecente; maxillis nigris; quæ in pupam mutanda se se sepelit intra terram, altero anno insectum paritura. Sic brevis vitæ vermis, consummato humili vitæ cursu, sepultus obdormit, ut resurgat gloriosus.

468. *SPHINX Convolvuli.*

— long. unc. 2. lat. unc. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 490.

ROESEL. Pap. Noct. Cl. I. Tab. 7. fig. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 80.

Diagn. Lingua alarum anticarum longitudinem superans. Abdominis acuminati latera fasciis rubris & nigris alterne variegata.

Apud nos non rara.

Corporis alarumque color primarius supra cinereus est, licet alæ anticæ atomis lineisque nigris paßim nebulosæ, posticæ vero fasciis fuliginosis notatæ se prodant. Margo exterior alæ utriusque non penitus integer, sed lenissime ereratus & subrepandus. Ala utraque subtus unicolor & corpore obscurior, margine albis punctis variegato, nullisque fasciis posticarum. Antennæ apice subtus denticulatae. Abdomen utrinque fasciis lateralibus nigris (6), totidemque rubris interpositis. Sub abdomine griseo, duo puncta nigra sunt.

469. *SPHINX Atropos.*

— long. unc. 1. & lin. 11. lat. unc. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 490.

ROESEL. Suppl. Cl. I. Papil. Noct. fig. 5. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 81.

Diagn. Bicolor, nempe ochreacea & nigricans; antennæ tamen apex & punctum medium alæ anti-

Sphinx. LEPIDOPTERA. Sphinx. 185

ticæ supra alba sunt. Alæ posticæ ochreaceæ; fasciis binis, nigris, utrinque.

Irritata stridet ut *Cerambyx*.

Habitat in *Cannabi*, & *Erythronio*, in quibus larvas ipse vidi, iisque enutrivi. Visa etiam in *Pyro*.

Lingua antennis brevior, canaliculata, abdomen fere inane, cartilagineum, ochreaceum: fasciis nigris. In dorso macula ochreacea calvariam reffrens Sub alis anticis in medio fascia nigricans inferiorem marginem non attingens. Tibiæ spinosæ. Color ochreaceus idem, qui sub alis *Turdi Mysci*.

Larva irritata stridens, uncias tres longa, septem lineas crassa, flavescens; striis lateralibus, obliquis, cœrulecentibus; corniculo caudali flavis verrucis scabro; pedibus pectoralibus nigris: albo punctatis; 21. Septemb. se se sepeliit intra terram, sub qua fornicem proprio glutine parat, non vero folliculum, unde 10. Junii alterius anni prodiit animal.

470. SPHINX *Ligustris*.

— long. unc. 1. & lin. 8½. lat. lin. 11.

LINN. Syst. Nat. p. 490.

Faun. Svec. 2. 1037.

ROESEL. Suppl. Papil. Noct. Cl. I. Tab.

5. fig. 4. 5.

Diagn. Alæ posticæ supra rufæ; fasciis binis, nigris. Abdomen rosatum; linea dorsali & fasciis lateralibus utrinque quinis atris.

Habitat in *Salice*, *Fraxino*.

Antennæ supra albæ subtus fusceæ. Caput inter antennæ albidum, unde utrinque decurrit plaga alba thoracem inter & alæ basim. Thorax alibi niger. Abdomen subtus tribus lineis nigris longitudinalibus. Pedes fuliginosi.

Alæ anticæ supra obsolete rufæ; disco fuscescente; lineis nigris longitudinalibus, unaque media transversa. linea alia alba prope marginem exteriorem.

— — — subtus obscuriores; fasciis binis obsoletis, fuscescentibus, prope alæ marginem inferiorem in unam conjunctis,

186 *Sphinx.*

ORDO III.

Sphinx.

apice linea nigra, maculaque albida inter hanc lineam & marginem crassiore. Alæ ejusdem limbus pallidior.

Alæ posticæ supra præter fascias dictas, etiam tertiam habent prope basim sed ad marginem exteriorem usque non producuntam.

— — — subtus fascia fusca duplicita: antica obscuriore; pagina alæ inter has fascias albicante.

471. *SPHINX Euphorbiæ.*

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 492.

Faun. Svec. 2. 1086.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 3. fig. 4. 5.

FRISCH. Inf. 2. Tab. 11. fig. 7. p. 43-45.

Diagn. Dorsum nuceum; lateribus albis. Alæ omnes subtus, corpusque rosato colore tinctæ; posticæ supra basi fasciaque nigris; anticæ subtus macula disci nigra.

Habitat in *Euphorbia*.

Alæ anticæ supra subincarnatae macula ad basim, alia in medio, fasciaque pyramidalis nuceo colore tinctis; fascia hæc basi sua incumbit margini interiori, apex vero in apice alæ definit.

— posticæ supra rosatae, limbo pallidiore, margine interno inter fascias albo.

Abdomen supra nuceum, cingulis lateraliter albis, maculisque duabus ad basim lateralibus utrinque nigris.

472. *SPHINX Elpenor.*

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 491.

Faun. Svec. 2. 1089.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 4. fig. 5. 6.

FRISCH. Inf. 12. Tab. 1.

Diagn.

Sphinx. LEPIDOPTERA. Sphinx. 187

Diagn. Bicolor, paleaceo nempe & pudorino colore tinctus; alis posticis supra basi nigris.

Habitat in *Epilobio angustifolio*.

Pudorino colore tincta sunt, corpus totum subitus excepto abdominis medio, alæ posticæ supra, infraque pars maxima, dorsum postice, abdominis apex latera & linea dorsalis, thoracis linea a rostro per latus utrinque decurrentis, alarum anticarum fasciæ alternæ; reliqua paleacea sunt; sed punctum album in medio alæ anticæ supra, eiusque margo inferior pariter albus.

473. SPHINX *Pinastris*.

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 492.

Faun. Svec. 2. 1088.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 6. fig.

4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 80.

Diagn. Alæ canæ; anticæ in medio lineis tribus inæqualibus caffeatissimæ; cingulis abdominis lineisque lateralibus in dorso thoracis pariter caffeatissimæ.

Habitat in *Pino*.

Abdomen basi maculis albis lateralibus utrinque tribus; inter alas anticas & thorace in alba linea, antennæ ferrugineæ; rachi interdum albida.

474. SPHINX *Stellatarum*.

— long. lin. 9½. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 493.

Faun. Svec. 2. 1091.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 8. fig.

5. 6.

Diagn. Alæ anticæ supra umbrinæ; fasciis binis, obscurioribus; posticæ supra ochreaceæ basi & margine obscuriores. Pectus album. Volatus diurnus, rapidissimus.

Habitat in *Galio*.

Antennæ clavatae, umbrinæ, lingua breviores, aristatae: arista ad angulum rectum. Caput & dorsum umbrinum. Abdomen in medio thoraci concolor; ano barbato, obscuriore; lateribus albo-nigro-

groque variis barbatisque. Caput subtus album. Femora albida.

Alæ anticæ inter fascias puncto eisdem concolore, similiique macula versus apicem.

— — subtus ferrugineæ, limbo obscuriore.

— posticæ subtus totæ ferrugineæ; margine lucidore.

Expanse alis, nec sedens, exerta lingua, nectar florum haurit, autumno etiam circumvolans.

475. *Sphinx Fuciiformis.*

— long. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 493.

Faun. Svec. 2. 1092.

ROESEL. Suppl. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 38. fig. 3.

P. PODA. Mus. Græc. p. 82.

Diagn. Abdomen barbatum nigrum; fascia flavescente. Alæ hyalinæ venis & margine obscurioribus.

In *Lonicera, Scabiosa.*

Periit mihi hæc & sequens, hinc mensuras alarum, verosque colores, definire non licet. Statura tamen minor est quam in priore. Alæ pellucidae. Volatus diurnus. Metamorphosis occulta?

476. *Sphinx Culiciformis.*

— long. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 493.

Faun. Svec. 2. 1094.

P. PODA. Mus. Græc. p. 81.

Diagn. Alæ subnudæ: anticæ lanceolatae; margine fascia nigra. Abdomen barbatum pilis lateribus apice albis, atro-cæruleum; cingulo medio fulvo-rubro.

Inveni in floribus *Sambuc. ebuli*, sub *Arce Veldensi*. Julio M.

Corpus semiunciale. Volatus tardus, diurnus. Alarum margo pilosus.

477. *Sphinx Scopigera.*

Diagn. Statura Vespa Parietum. Abdominis segmenta margine flava, apex terminatus pilis rotundum ventilabrum præferentibus.

Ha-

Sphinx. LEPIDOPTERA. Sphinx. 189

Habitat in herbidis & sylvosis collibus Carnioliae super. interdiu nectar florum hauriens. Nigra. Inter caput & thoracem annulus flavus. Ad basim alae anticæ punctum flavum. Thorax villo Fordido pubescens. Alae margine fasciaque nigris; apice fulvo venisque nigris lineato. Abdomen nigrum; scopa terminali binis flavis lineolis in medio notata. Pedes nigri. Tibiae pilosæ; spinis fulvis.

An hæc *Sphinx Vespiiformis* LINN. Faun. Svec?

(**) *Metamorphosi manifesta*, supra terram.

478. SPHINX Carniolica.

— long. lin. 7. lat. 3.

Diagn. Nigra; alis anticis umbrinis; maculis (5) cinnaberinis: margine albo; posticis cinnaberinis, immaculatis.

In Carniola non rara.

Statura S. Filipendulæ. Inter caput & thoracem lineæ duæ transversæ albæ, linea alia in thoracis latere utroque. Maculæ alarum anticingarum una vel duæ connatæ cuneiformes ad basim, tres subrotundæ in disco, quinta in limbo oblonga transversa. Subtus ala eadem similiter maculata, sed albus margo macularum obsoletus. Alæ posticæ utrinque cinnaberinæ; margine nigro.

Folliculus ovatus, palleaceus, lævis, latere adhærens folio. Pupa, post partum, prominens ex apice trivalvi sui folliculi.

479. SPHINX Filipendulæ.

— long. lin. 7. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 494.

Faun. Svec. 2. 1097.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 57. fig. 5. 6. 7.

Diagn. Nigra; alis anticis cyaneis, rubro maculatis; posticis cinnaberinis, immaculatis.

In pratis nostris frequens.

Mas alis anticis maculis (6) cinnaberinis, absque iride alba; quarum duæ ad basim alæ, aliæ quatuor subrotundæ in disco. Huic convenit descriptio *Liniæana*.

190 Sphinx. ORDO III. Sphinx.

Variat thorace canis pilis tomentoso, maculisque duabus posticis alæ anticæ in unam coadunatis.

Fiemina; alæ anticæ maculis tribus, oblongis, longitudinaliter, variegatae.

Folliculus rugosus, oblongus, utrinque acuminatus, membranaceus.

480. SPHINX *Phegea*.

— long. lin. 8. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 494.

FRISCH. Insect. 6. Tab. 15. fig. 7.

Diagn. Atro cærulea; alis anticis maculis albis (5); abdominis macula baseos, cinguloque palleaceis.

In sylvestribus Carnioliae, umbrosisque locis.

Antennæ filiformes, nigræ, apice albæ. Macula in alis anticis una minor ad basim, duo in medio, tres prope limbum, utraque in pagina. Alæ posticæ utrinque maculis binis albis. Abdominis segmentum quartum superne & lateraliter palleaceo colore tinctum, macula simili superne ad basim abdominis, duæque aliæ utrinque ad latera pectoris, sub alis.

481. SPHINX *Statics*.

— long. lin. 6. lat. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 495.

Faun. Svec. 2. 1098.

P. PODA. Mus. Græc. p. 83.

Diagn. Alæ anticæ supra viridi-cærulecentes, subtus una cum posticis utrinque umbrinæ. Antennæ maris pectinatae.

In collibus herbidis, non rara.

Conjungit *Sphinges* cum *Phalenis Bombycibus*, quarum antennas habet; hic tamen relinquenda ex habitu, volatu gravi diurno, summaque cum tribus prioribus similitudine.

PHA.

PHALÆNA.

LINN. Syst. Nat. pag. 495.

I. Bombyces. Pupa intra folliculum.

(*) —— expositum.

A. Elingues.

482. PHALÆNA Pavonia.

— long. unc. 2. & lin. 8. lat. unc. 1. & lin. 8.

LINN. Syst. Nat. p. 496. 497.

Faun. Svec. 2. 1099.

ROESEL. Inf. Tom. 4. Tab. 16. 17.

SPECTACLE DE LA Nat. I. p. 62.

P. PODA. Mus. Græc. p. 83.

Diagn. Gigas nostrarum; alis omnibus utrinque limbo albo margine cervino, maculaque ophthalmoides, cui pupilla nigra, iris cervina, linea ciliaris alba, palpebra cinnamomæa, annulus communis niger.

Habitat in *Pyro*, & *Malo*.

Alæ anticæ supra caryophyllinæ, albis atomis tanquam polline adspersæ; basi fascia obscuriore, marginem crassiorem non attingente; stria dentata ab apice usque ad medium marginis inferioris fulminis ad instar decurrentis cervini coloris. Ad apicem, qui albo limbo caret, macula nigra insidens margini externo.

— subtus minus obscuræ, albis pilis antice atomisque similiter coloratis canescentes; fascia fulminante, ut supra.

— posticæ supra ad basim limbo conclores; fasciis duabus, caryophyllinis; fascia alia postica, undata, cervina, quam inter & limbum alæ pagina caryophyllina est.

— subtus albidis pilis atomisque canæ; fascia ad basim caryophyllina, marginem superiorem non attingente; fascia repanda, postica, ut supra, idemque color

color inter hanc & limbum, ut in pagina superiore, ibidem.

Mas antennis ferrugineis, bipectinatis; articulis (36).

Larva perfecta digitum longa, pollicis crassitie, sordide flava, verticillata verrucis in quolibet annulo (6) cæruleis, calyce quinque- & sexdentato exceptis, e quibus pili prodeunt simplices, nigri, longi, præsertim duo medii idemque mucoris adinstar cæpitati. Frons nigra, linea triquetra inscripta. Valvis caudalibus adnatum est scutellum hemisphæricum, rubrum: margine albo. Pedes pectorales acuminati, rubri; abdominales obtusa rubraque lamina terminati; caudales his similes.

Folliculus horizonti obliquus, fuscus, oblongus; filis rigidis, fragilibus, vix extricandis. Pupa atro-rubra, pone pilis rigidis brevibus hirta. Insectum per menses septem & octo latet intra pupam.

483. PHALÆNA Pavoniella.

— long. unc. 1. lin. 1. lat. lin. 8½.
LINN. Syst. Nat. p. 497. *Pavoniae* Var. minor.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 5.

Diagn. *Pavoniae* facies, sed diversa ocellis alarum primoruni maculæ albidae impositis, iisdemque pupilla nigra sed lineola cærulecente inscripta, iride ferruginea, linea ciliaris cærulecente, annuloque communi nigro latiore.

Rarior apud nos.

Alæ posticæ ferrugineæ; fascia limbi caryophyllina. Margo alarum umbrius. Macula laccata conica ad apicem alæ, ex qua fascia undata potius quam fulminans oritur, eadem alæ subtus disco albente, fascisque binis contiguis dentatis prope limbum. Alæ antice subtus ochreaceæ, absque fascia ad basim. Tuto itaque a *Pavonia* separari poterit in tanta copia diversitatum.

484. PHALÆNA Tau.

— long. unc. 1. & lin. 7. lat. 11.

LINN.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 193

LINN. Syst. Nat. p. 497.

Faun. Svec. 2. 1100.

ROESEL. Suppl. Tom. 4. Tab. 7. fig. 3. 4.

Diagn. Alæ paleaceæ; macula atro-violacea, sphærica, in cuius medio macula alba parva trigona, clavi capitulo similis.

In *Betula*.

Alæ anticæ ocello utrinque; posticæ tantum supra, sed macula trigona, alba, etiam subtus. Ala utraque supra, fascia linearis nigricante prope limbum. Posticæ subtus fascia media, ferruginea.

485. PHALÆNA Quercifolia.

— long. unc. 1. & lin. 7 lat. unc. 1. & lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 497.

Faun. Svec. 2. 1110.

ROESEL. Suppl. Papil. noct. Cl. II. Tab. 49.
fig. 5. 6.

FRISCH. Inf. 3. Tab. 1. fig. 4. p. 20-25.

P. PODA. Mus. Græc. p. 84.

Diagn. Tota corticina; alis dentatis, reversis: posticis, dum sedet animal, ultra marginem crassiorum anticarum exporrectis.

Habitat in *Amygdalo persico*, & *Pruno spinosa*.

Palpi porrecti, paralleli, fusco-cærulescentes. Alæ anticæ strigis tribus; posticæ binis, undatis, nigricantibus, fasciatæ.

Folliculus oblongus, tenuis. Pupa albida veluti farina adspersa.

486. PHALÆNA Mori.

— long. lin. $10\frac{1}{2}$. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 499.

ROESEL. Suppl. Papil. noct. Cl. I. Tab. 8.
fig. 19. 20.

Diagn. Alba; alis anticis obiter sinuatis.

Colitur *Goritiæ*, *Tergesti*, *Labaci* a paucis, ac utinam ab omnibus, non sine summo Patriæ & Principis emolumento.

Enutrivi hanc *Idriæ* An. 1760. omni diligentia, & sequentia observavi. 1. Decima Maji ex ovo genita larva, decima sexta Julii ex folliculo Phalæna. 2. Deponit involucra septem, unum ovi,

P

qua.

quatuor in statu larvæ, unum dum fit pupa, ultimum ex quo insectum. 3. Vix natæ larvæ pondus est decima pars grani, a primo somno quarta, a secunda ponderat grana tria, a tertio sex, a quarto & jani perfecta gr. (68). 4. Folliculum paratura excernit viginti circiter guttulas liquoris crassili gelatinosi, dein opus inchoat & perficit intra quatriuum. 5. Pupa cum folliculo ponderat grana circiter (50), sola vero pondus habet gran. (42). 6. Ex folliculis (55) prodierunt mares duodecim, reliquæ erant fæminæ. 7. Phalæna fæmina excreto mæconio ponderat grana (14). 8. Unica fæmella ponit ova (450) flava, denum fusca, dum adhuc alia (210) in ejus ventre latent, filo tenui, catenulæ adinstar, adhærentia.

Instante Epidemica Taurinensi constitutione, e bombycibus vix pauci nitidum de pectore filum, pretiosaque stamina edidere, haud modica etiam pars imperfictum opus reliquit. Car. RICHA. N. 16.

Hostes larvarum, sunt mures, fumus tabaci.

487. PHALÆNA Quercus.

— long. unc. 1. lat. lin. 8.

LINN. Syst. Nat. p. 498.

Faun. Svec. 2. 1106.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 35.
fig. 5. 6. 7.

Diagn. Alæ utrinque concolores: anticæ supra puncto albo; margine nigro, qui septem lineas ab apice distat; nec non fascia pallidiore, punctum album inter & apicem posita; posticæ fascia prope limbum, priori simili.

Habitat in *Salice viminali*.

Mas totus supra castaneus; fasciis pallide ochraceis; subtus cinnamomellus; fasciis fere pilaceous. Antennæ huic acinaciformes, (‡) lineæ crassiæ, (5) lin. longæ.

Fæmina pallidior; alis posticis limbo palleaceo utrinque. Antennis tenuioribus; deflexis.

Larva subvillosa, digitæ auricularis longitudine, calami scriptorii crassitie, segmentis atris, linea alba laterali, dorso maculis albis, inter folia arida aut cespiti.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 195

cespites, prope terram folliculum parans oblongum, filis fragilibus & digitis tenaciter adhaerentibus.

Vix inde natam fæminam, acu tabulae ligneæ adfixeram An. 1760., jam sexdecim mares e vicinia advolantes, & cubile ingressi, mira cupidine circa eandem vagabantur, quales annis prioribus nullibi videram. Quam stupendi sensus animalium! Quæ vis effluviorum!

Fæmina ponit ova fusca, puncto nigro & macula laterali notata, quæ in aere libero statim griseum colorem induunt. Ex his larvæ nigræ, pilosæ; fasciis flavicantibus.

488. PHALÆNA *Vinula*.

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 7½.

LINN. Syst. Nat. p. 499.

Faun. Svec. 2. 1112.

FRISCH. Inf. 6. Tab. 8. fig. 6. non bene.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 19. fig.

9. 19.

Diagn. Pilis albis densis lanatum corpus & bases alarum posticarum. Dorsum linea media punctisque nigris. Alæ anticæ punctis striisque nigris repandis dentatisque variegatae; venis ferrugineis.

In *Salice*.

Larva, *Camellus* ROESEL, iracunda; cauda dupli, unde exerit irritata corpora totidem flaccida retractilia, helicis tentaculorum adinstar. Hæc validis maxillis, scatulæ inclusa, durum quoque lignum rodit, imo & *Salicis* truncum, cuius scobe glutine proprio unita folliculum parat solidum, ovatum. *Ichneumoni* vix alia magis obnoxia.

489. PHALÆNA *Pudibunda*.

— long. lin. 9½. lat. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 503.

Faun. Svec. 2. 1118.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 38.

fig. 4. 5.

Diagn. Antennæ rufæ; rachi alba. Alæ albidæ: anticæ lineis tribus, repandis, umbrinis fasciatæ; pagina alæ inter fasciam medianam & posticam umbrina tota; posticæ subtus macula media, fusca.

Habitat in *Fago*, *Corylo*, & pomiferis arboribus.

Statura *Ph. Mori*. Oculi nigri. Antennarum pectines pilo terminati. Palpi fuscus: apicibus albis. Dorsi crista albo-nigroque varia. Maculae duo fuscae ad femora antica. Pedes albi, fusco-anulati.

Larva citrina, pilosa; segmentis nigerrimis; frontis latere utroque puncto fuscō-rubro notato; corporis segmentis omnibus puncto subocellato, laterali utrinque, segmentis (a capite deorsum numeratis) 4, 5, 6, 7 penicillum truncatum pallidius dorso gerentibus; 9, 10, puncto nigro laterali, 11, rubello penicillo, caudam referente. Hæc, leviter quoque tacta, contrahitur fere ut *Erinaceus*, & folliculum parat duplicem, tenuem, album, glutine pilisque propriis, rubros caudæ pilos ibi adglutinans, ubi *Phalæna* proditura.

Pupa lucida, nigricans, lin. (10) longa, (4) crassa; segmentis alternis ferrugineis; aliis vero infra medium pilosis rugosisque. Ex hac post mensē septem prodiit animal.

Larva variat colore albo, ex qua fæmina natata est, ponens ova albida, rotunda, puncto fuscō notata.

Lamina sulcata, rufa, dentiformis, ad genua antica, interius posita, in hac specie.

490. PHALÆNA *Monacha*.

— long. lin. 9. lat. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 501.

Diagn. Alæ albæ; maculis marginalibus striisque transversis, undatis, fuscis; posticæ fascia obsoleta obscuriore. Incisuræ abdominis rubræ. Antennæ nigræ.

Habitat in pomiferis arboribus.

Ad basim antennæ singulæ macula lutea. Oculi nigri. Thorax prope caput macula nigra transversa.

Decima Maji 1760 in cortice *Pyri mali* reperta larva, colore corticis, cui insidebat, subtus vero virescens, capite cinereo villosum, lateribus verrucosus: verrucis acutis pilosis. Hæc decima quarta laxis sparsisque filis constructo tenui folliculo

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 197

culo in pupam transiit lucidam fuscam, e qua vigeſima ſeptima, hora quarta vespertina *Phalæna* prodiit.

491. PHALÆNA *Disp̄ar*.

— long. lin. 9½. lat. 5½. mas.

LINN. Syst. Nat. p. 501.

P. PODA. Mus. Græc. p. 86.

Diagn. Mas alis pallide ochreaceis: anticis ſupra fuſco-nebuloſis; poſticis ſubtus macula fuſca. Fæmina alis albis; anticis lituris aliquot nigrican- tibus.

Habitat in *Tilia*, & pomiferis arboribus.

Mas alis anticis, limbo cervino; antennis ſimi- liter coloratis, latioribus; rachi albida.

Fæmina abdomen crallo, lanato, picta a ROE- SELIO Papil. Noct. Cl. II. Tab. 3. fig. 5. 7. alis ſubfasciatis.

492. PHALÆNA *Rubi*.

— long. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 498.

Faun. Svec. 2. 1103.

ROESEL. Suppl. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 49. fig. 5. 6.

Diagn. Alæ reverſæ, cervinæ, immaculatæ; ſtri- gis duabus albidis; ſubtus nullis LINN. l. c.

Habitat in pratis.

Larva Æſchimene, rigida, pilosa, fuſco-nigricans, pudibunda, metamorphoſis iniqua, caloris impatiens, omnivora, *Geniſtae ſagittalis* foliis facilius educanda, poſt primum & ſecundum foenifecium per prata re- pens, etſi quotannis ſedulo enutrita fuerit, nondum tamen optatam mihi *Phalænam* geruit.

493. PHALÆNA *Chrysorrhæa*.

— long. lin. 6. lat. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 502.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 22. fig.

4. 5.

Diagn. Alba; abdominalis apice barbato, flavo.

In arboribus pomiferis.

Antennæ cereæ; dentibus villosis binisque pilis divaricatis terminatis. Oculi nigricantes. Alæ anticæ margo crassior subtus fuliginosus, postice fuscens; eadem supra macula fusca obsoleta, ad angulum ani.

494. PHALÆNA *Prælata*.

— long. lin. 9½. lat. 4½.

Diagn. Alba; alis politis, abdominis apice barbato; tibiis fuscis, albo annulatis.

Habitat in *Salice*.

Subelinguis; corpore nigro, sed albis villis undique tecto. Antennæ fæminæ setaceæ, albidæ. Huc posui, ut distinguatur a *Chrysorrhæa*, & sequente.

495. PHALÆNA *Salicis*.

— long. lin. 10. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 502.

Faun. Svec. 2. 1129.

FRISCH. Ins. 1. Tab. 4. fig. 3. 4.

Diagn. Alba; antennis cervinis: rachi alba; pedibus nigris, albo annulatis.

Habitat in *Salice*.

Elinguis; alarum politura carens; abdominis apice non barbato. Antennis magnis pectinatis.

496. PHALÆNA *Antiqua*.

— long. lin. 7. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 503.

Faun. Svec. 2. 1120.

ROESEL. Pap. Noct. Cl. II. Tab. 39. 40.

Diagn. Antennæ longitudine est dimidia latitudinis alæ anticæ, quibus macula corticina alba linea terminata ad apicem, nec non lunula alba prope posticum anguluni.

In *Cratægo spinosa*.

Alæ anticæ supra corticinæ fuscoque variae & nebulosæ; punctis fuscis, marginalibus.

— — — subtus fuscæ; limbo cervino, macula que albida ad apicem.

— posticæ supra fuscæ; fimbria terminali, pallidiore.

— — — subtus, ut supra.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 199

Antennæ murinæ, pectinatae; rachi pallidiore.
Tibiæ cervinæ. Corpus nigrum.

Larva uncialis, pilosa, 16-pedibus; linea dorsali nigra; capite pilorum fasciculis binis, longioribus, alioque caudali. Folliculus duplex, ut in *Pulibunda*. Supra nigra, lucida.

497. PHALÆNA *Gonoſtigma*.

— long. lin. 6. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

ROESEL. Suppl. Tab. 13. fig. 3. 4.

Diagn. Ochreacea; alis anticis macula trigona, alba.

Circa *Labacum capta*.

Ill. LINNÆUS coniunxit cum priore, a qua differt, antenn. rachi ochreacea. Alis subtus concoloribus: primoribus supra fascia antica obsoleta obscuriore, atmosphæra fusca circa maculam albam.

498. PHALÆNA *Pyri*.

— long. lin. 7 $\frac{1}{2}$. lat. 5.

Diagn. Cinnanomæa; dorso tomentoso; alis anticis supra strigis duabus pallidioribus, posticis subtus limbo pallidiore.

In *Pyro* reperta larva, ejusque foliis enutrita, ut & foliis *Populi albæ*,

Antennæ alis concolores. Dorsum denso villo tomentosum, nec tamen cristatum. Alæ deflexæ: anticæ striis binis paleaceis. quarum postica margini externo parallela, margo idem lineolis binis albis notatus. Sub his alis striæ nullæ.

Larva superne nigra; linea dorsali & laterali glaucis, quibus adjacet linea alia fulva; capite glauco; punctis duobus nigris. Folliculus duplex, albus, tenuis, oblongus.

(**) Pupa intra folliculum *sepulcum*.

499. PHALÆNA *Laneſtris*.

— long. lin. 7. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 499.

Faun. Svec. 2. 1105.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 42.
fig. 4. 5.

P. FODA. Mus. Græc. pag. 86. 87.

P 4

Diagn.

Diagn. Cariophyllina; alis anticis striga maculisque duabus, albis.

Habitat in *Salice viminali*.

Specimina nostra non ferruginea, nec ano albido. *Mas* antennis pectinatis: rachi alba, minor. *Fæmina* major, antennis fere setaceis. Uterque sexus, macula alba ad basim alæ anticæ, alia in medio, & striga alba postica; subius macula albida ad marginem crassiorem, ubi supra initium suum striga dicit. Alæ posticæ margine superiore albo, fasciæ obsoleta pallidiore subtus.

Ova copiosa ponit circa ramulum, eaque lana densa cinerea tegit. Hinc larvæ nigræ, pilosæ; dorso lateribusque albo maculatis, cum penicillis pilorum rufescentium; harum plures habitant in societate sub tentoriis cellulosis, unde migrant pabulaturæ, redeuntque per foramina ramis parallela. Hæ satis enutritæ se se sepelunt, nent folliculos albidos, ovatos; coriaceos, e quibus alio demum anno *Phalæna* prodit.

500. PHALÆNA *Coffus*.

— long unc. 1. & lin. 5. lat. 9 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 504.

Faun. Svec. 2. 1114.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 18. fig. 6. 7.

FRISCH. Insect. 7. Tab. 1. fig. 2.

Diagn. Thorax antice linea transversa cerea, postice maculis binis nigris lateralibus. Alæ posticæ murinæ: basi albidæ, obscurioribus anastomofantibus lineis reticulatæ; anticæ basi & medio murinæ, alibi albæ, utrinque lituris strigisque transversis nigris lineolisque murinis ramosisque variegatae.

In semiputridis hortorum sepibus.

Thorax antice supra lineam cervinus, alibi murinus; alarum margines murinis maculis variegati, quarum (8) in anticis. Alæ anticæ subtus murinæ, interius albidæ, una insigni litura nigra in angulo postico desinente; posticæ subtus cinerascentes, macula murina in medio, murinisque transversis ramosis lineolis subreticulatæ. Abdomen supra fasciis albidis. Tibiae albidæ; annulis fuscis.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 201

Ova obtusa, striata: striis fuscis, tuberculosis.
Larva valida, superne rubens, subtus rufa; capite
fusco; maxillis nigris.

PLINII *Cossus*, an hæc larva, an pupa *Scarabæi Cervi* ROESEL. vel *Nasicornis* FRISCH. in-
certum adhuc?

501. PHALÆNA Eremita.

— long. lin. 9 $\frac{1}{2}$. lat. 6.

Diagn. Alæ cinereæ: anticæ atomis fasciisque
abruptis fuscis tribus, dorso fasciis tribus nigris.

Inveni 30. Aprilis in sylva *Idriensi*, insidentem
Ecclesiæ muro.

Statura *Phal. Disparis maris*. Antennæ (5) li-
neas longæ, fuscæ plumatae; apice absque denti-
bus. Oculi fuscæ. Dorsum tomentosum, non cri-
statum, cinereum fasciis tribus nigris: antica recta,
posticis binis arcuatis: convexitate caput spectante.
Abdomen murinum ano barbato. Alæ anticæ
subtus fasciis dimidiatis binis obsoletis, posticæ u-
nica pariter obsoleta.

502. PHALÆNA Anastomosis?

— long. lin. 6. lat. —

LINN. Faun. Svec. 2. 1125. juxta descri-
ptionem.

Diagn. Thorax cristatus; antice macula brun-
nea. Corpus & alæ cinerascentes; strigis subqua-
ternis albidis, maculaque corticina ad apicem mar-
gini insidente.

In sylvestribus locis.

Ala antica inter strigam tertiam & quartam po-
sticam subbruneo colore tincta, fasciæ adinstar; eæ
ipsæ striæ ad marginem alæ internum coniunguntur.
In limbo series punctorum fuscorum (7); margo
pariter fusco punctatus. Alæ posticæ supra fusce-
ntes immaculatae, subtus cinarescentes.

B. Spirilingues.

503. PHALÆNA Caja.

— long. unc. 1. lin. 1-3 $\frac{1}{2}$. lat. 6-8.

LINN. Syst. Nat. p. 500.

Faun. Svec. 2. 1131.

ROßEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. I.
fig. 4. 5.

FRISCH. Ins. 2. Tab. 9. fig. 3.

Diagn. Alæ anticæ caffeatæ; rivulis albis. Posticæ rubræ; maculis nigris.

Habitat in *Trifolio*.

Lingua alba, bifeta, palpis vix longior. Antennæ albæ, subtus obscuriores. Dorsum alis anticis concolor; linea antica, transversa, rubra. Abdomen rubrum; maculis dorsalibus transversis, nigris (3-6).

Alæ anticæ supra caffé colore, per quas a basi ad apicem fere usque rivus albus decurrit, in quem influunt tres alii a margine alæ inferiore nati, & alii duo a superiore, quos inter maculæ duo conicæ marginales.

— — — subtus pallidiores, basi rubellæ; fasciis binis, posticis, albis, literam X, fere referentibus, punctoque albo versus apicem.

— posticæ supra scarlatinæ quidem, sed flavi coloris parte aliqua immixta; maculis nigris, quarum duæ sphæricæ.

— — — subtus pallidiores; maculis cervinis, seu colore apicis alarum superiorum subtus.

Variat 1. Alis primoribus supra puncto albo prope apicem; posticis supra maculis nigris rotundis tribus in limbo, quarum duæ interiores sese fere contingentes, tertia nigræ basi imposita, nec non maculis binis pariter nigris in disco contiguis: una cordiformi.

2. Alis iisdem pallidioribus & fere cervinis; posticis, maculis limbi tribus sphæricis, sed interioribus remotioribus, aliis in disco ovatis unitis.

3. Alis iisdem cervinis, curva linea, ad apicem loco puncti, maculaque margi-

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 203

marginis antica in rivum mutata;
posticis macula unica disci, tribus
in limbo sed exteriore exigua.

504. PHALÆNA *Villica.*

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 7 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 501.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 28. fig. 2. &
Tab. 29. fig. 4.

FRISCH. Insect. 10. Tab. 2. fig. 1.

P. PODA. Mus. Græc. p. 88. Vidua.

Diagn. Alæ anticæ nigræ; maculis octo, isabellatis albisve. Posticæ flavæ ceræ colore; maculis apiceque nigris.

Habitat in *Urtica*.

Variat 1. Statura minore; alis anticis fuscis:
maculis albis; posticis fere paleaceis: maculis (7) apiceque nigris,
sed maculis ochreaceis (4) in
apice nigro, marginalibus.

2. Alis anticis nigris: maculis isabellatis,
posticarum maculis (8) nigris, macula punctoque ceræ flavæ
colore, marginali, in alæ apice
nigro.

Abdomen rubrum, punctorum nigrorum serie
una dorsali, aliaque utrinque lateralī.

Larva fulca, verrucosa; verrucis pilosis;
fronte maxillis pedibusque rubris.

505. PHALÆNA *Plantaginis.*

— long. unc. 1. lin. $\frac{1}{2}$. lat. 6 $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 501.

Faun. Svec. 2. 1132.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 28. fig. 3.

P. PODA. Mus. Græc. quadripunctaria.

Diagn. Alæ anticæ fuscæ cum obscuro quodam
translucente virore: margine inferiore, litura, fa-
sciaque bifida (Y) referente, cerei coloris; posti-
cæ scarlatinæ: supra maculis (4) subtus unica,
nigris.

In sylvis nostris faginis non rara, circa dies
caniculares, *Eupatorii cannab.* floribus libenter in-
sidens.

Ex

Ex sola definitione Ill. LINNÆI, apud nos, adgnosci omnino non posset, non enim elinguis est, nec alas anticas atras: rivulis flavis, nec posticas luteas (*Faun. Svec. 2.*) unquam habet: antennæ quoque setaceæ *Noctuam* potius, juxta principia Celeberr. Viri, quam *Bombycem* ostendunt. ROESELII figura magna nimis est, & sine historia.

Lingua simplex, ferruginea. Antennæ setaceæ pilosæ, semiunciales, fuscæ. Oculi brunnei. Frons fasciis alarum concolor: puncto nigricante. Thorax nigricans, lateribus albidos; valvulis nigricantibus: margine albido; inter caput & thoracem fovea, lineolis binis albidis longitudinalibus parallelis marginata. Abdomen rubens, quadruplici serie punctorum nigrorum, una dorsali, altera subtus in medio, aliis lateralibus.

Alæ anticæ supra, linea ad basim inferiori margini parallela subulata, fascia disci ad marginem inferiorem usque non producita, fasciæ alterius ypsilonis referentis pes maculis duabus rotundis nigris variegatus; subtus ad basim macula ovata nigra, cæterum ibidem scarlatinæ, fascia flavicans utraque, inter quas pagina tota fere nigra est, cum interjectis maculis (3) rubris.

Alæ posticæ utrinque scarlatinæ, supra maculis (2) subovatis liberis, aliaque magna oblonga ad apicem, cui minor adjacet & marginalis; subtus macula unica nigra.

Pedes supra nigricantes, annulis rubellis. Alæ sedentis planæ, non depressæ.

506. PHALÆNA *Dominula*.

— long. lin. 11 - unc. 1. lat. lin. 6-7.

LINN. Syst. Nat. p. 509.

ROESEL. Suppl. Papil. Noct. Cl. II. Tab.

47. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 89.

Diagn. Alæ ut supra, ita subtus coloratæ: anticæ nigræ cum translucente obscuro virore; maculis (10), plerisque albis; posticæ scarlatinæ, maculis binis apiceque nigris.

Habitat in Salice.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 205

Antennæ setaceæ, caput, thorax, alis anticis concolor, hic tamen maculis duabus dorsalibus albis aut ochreaceis. Abdomen supra alis posticis concolor; linea dorsali nigra; subtus nigrum; ita vidi semper, nec unquam fasciis nigris LINN.

Alæ antice ad apicem punctis (3) albis, dein maculis (2) magnis albis, mox binis aliis minoribus remotis, denique duabus fere contingentibus anticis; decima macula prope basim in margine inferiore; maculæ duæ anticæ & margini crassiori proximæ, una cum macula baseos marginali variant colore albo & ochreaceo, ut & maculæ thoracis. Alæ postice maculam & punctum scarlatinum in apice nigro gerunt.

Thorax sub alis anticis utrinque macula ochreacea.

Larva nigra, verrucis hemisphæricis nitidis pilosis aspera; pilis canescens, dorso lateribusque albo-flavoque punctatis. Pupa lucida, fusca.

507. PHALÆNA *Alpicola*.

— long. lin. $7\frac{1}{2}$. lat. 4.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 24. fig. 8. 9. 10.

Diagn. Fusca; alis anticis macula rivulisque albis; posticis limbo ochreaceo: maculis fuscis.

Inveni in gramineis alpium *Vochinenium*.

Thorax antice punctis duobus rubris. Abdominis latera rubra.

Alæ antice margo, ad basim, ruber; ex hac superne oritur rillus rectus attenuatus, apice bifidus, & in punto concursus aliorum trium transversorum rivulorum, unitus, ita ut hac unione una cum iis rivulis literam (X) representet; macula alba jacet in medio alæ versus marginem exteriorem; inferne deest rillus princeps, & ad apicem alæ duo tantum rivuli paleacei, numerum (4) suo concursu præferentes.

— postice ochreaceo-rubella fascia undata in limbo utrinque, cum insula nigra ovata, & maculis binis marginalibus nigris supra; subtus vero maculis tribus.

Lactucæ foliis alenda ex ovo genita larva.
ROESEL.

508. PHALÆNA Fuliginea.

— long. lin. $7\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{3}{4}$.
LINN. Syst. Nat. p. 509.

Faun. Svec. 2. 1159.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 43.
fig. 4. 5.

Diagn. Alæ anticæ obsure murinæ; punctis (2) fuscis, mediis, approximatis. Posticæ cinnaberinæ; punctis binis, mediis, maculisque marginalibus nigris.

Habitat in *Lapatho*.

Alas inferiores aliter describit **LINN.** in Fauna Svec. quæ, apud nos, perpetuo utrinque rubræ. & abdomini concolores, in quo triplex ordo punctorum nigrorum. Alæ anticæ subtus margine exterio & circa basim pariter cinnaberinæ.

509. PHALÆNA Paæta.

— unc. 1. & lin. 6. lat. $10\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 512.

Faun. Svec. 2. 1166.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 15.
fig. 4. 5.

Tom. 4. Tab. 19. fig. 3. 4.

Diagn. Alæ crenatæ: anticæ cinerascentes; fasciis undatis, fuscis: posticæ cinnaberinæ; fasciis duabus, nigricantibus.

In *Quercu*.

Caput & thorax antice murini coloris; corpus alibi cinereum. Alæ anticæ subtus albidae; fasciis tribus nigris: posticæ margine albo, subtus media exteriore parte alba, alia rubra; fasciis binis nigris.

510. PHALÆNA Fulminea.

— long. lin. $11\frac{1}{2}$. lat. $6\frac{1}{2}$.
ROESEL. Tom. 4. Tab. 18. fig. 1. 2. bene.

Diagn. Alæ anticæ pallide cervinæ; fascia, macula lunata media, lineaque transversa fulminis adinstar propagata, nigris; posticæ paleaceæ: fasciis duabus fuscis.

In

In Carniola calidiore.

Corpus totum utrinque pallide murinum. Alæ antice *jupra* basi obscuriores, punctis fuscis marginalibus (7); *subtus* fuscæ: fasciis binis paleaceis; posticæ subtus ut supra, sed fascia marginali non abrupta.

511. PHALÆNA Jacobæ.

— long. lin. 8. lat. 4 $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 511.

Faun. Svec. 2. 1155.

P. PODA. Mus. Græc. p. 89.

Diagn. Alæ antice canæ; linea maculisque binis cinnaberinis. Posticæ cinnaberinæ; fimbria fuscescente, terminali.

Habitat in *Senec. Jacobæa*.

Statura *Sphingis Phegeæ*. Caput, antennæ, thorax, nigro colore. Abdomen alis anticis concolor. Alæ utrinque concolores: antice linea juxta marginem crassiorum posita, lin. 5 $\frac{1}{2}$. longa, maculis subhemisphæricis externo margini impositis, quem fimbria obscurior terminat. Ill. LINN. alas nigras ponit, quas nondum vidi.

512. PHALÆNA 'Meticulosa'.

— long. lin. 11. lat. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 513.

Faun. Svec. 2. 1164.

ROESEL. Tab. 4. Tab. 9. fig. 4. 5.

Diagn. Alæ subdentatae: antice triangulo intra triangulum; utriusque basi crassiori margini imposta.

Circa *Labacum* capta.

Corpus supra & alæ osseæ; his *anticis* punctum nigrum inter basim & triangulum, & macula nigricans obsoleta ad apicem; margo trianguli interni totus osseus, externi vero majorisque tantum anticus; lituræ fuscescentes obsoletæ transversæ in limbo; alæ *posticæ* osseæ; macula media margineque fuscis. Abdomen subtus subochreaceum; punctorum fuscorum seriebus tribus.

His (503-512) ova perlata, rotunda.

513. PHALÆNA *Lubricipedæ*.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 505-506.

Faun. Svec. 2. 1138.

ROES. Papil. noct. 1ab. 46. fig. 7. 8.

Diagn. Alba; oculis antennisque nigris; alis deflexis: anticis nigro-punctatis; abdomine supra paleaceo; punctorum nigrorum ordinibus quinis.

Apud nos frequens.

Antennæ subtus dentatae, basi superne albæ. Lingua substraminea. Alæ anticæ punctis nigris (7-10). Tibiæ nigræ.

514. PHALÆNA *Tulchella*.

— long. lin. 7½. lat. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 534. Tinea. N. 238.

Diagn. Alba; alis anticis nigro-rubroque punctatis; posticis limbo fusco.Inveni in flore *Scabioſæ arvenſis*. Junio M.ILL. LINNÆUS, vidit forte in Museo specimen explicatum, in quo statu, adeo simile est *Tinea Eronimellæ* pariter expansæ, ut alio ordini adjungi nequeat, quam *Tinearum*. Si vero vivens fedens que animal intuearis, alas minime convolutas sed planissimas observabis.

Puncta duo nigra caput inter & thoracem, valvulae thoracis rubore suffusa punctisque duobus nigris. Abdomen album; punctis nigris lateralibus utrinque (4). Alæ anticæ punctis marginalibus nigris (7). Alæ posticæ supra glauco quodam nitore fulgidæ. Antennæ setaceaæ.

515. PHALÆNA *Bucephala*.

— long. lin. 9½. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 508.

Faun. Svec. 2. 1115.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 14. fig.

5. 6.

Diagn. Alæ subdentatae: anticæ linea c.ffeata, dupli antice, aliaque simili versus limbum fasciatæ: apice macula ovata magna occipiteque stramineo colore tinctis.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 209

Habitat in *Salice*.

Absque auxilio figurarum, ex sola definitione
Syst. Nat. difficillime adgnoscitur; nostræ enim, nec
alas cinereas, nec maculam apicis subocellarem fla-
vamque gerunt, multoque minus magnitudinem *Ph.*
Coffi (*Faun. Svec. I. c.*)

Statura *Ph. Mori*. Lingua brevis. Oculi nigri.
Antennæ pectinatæ. Alarum primorum dentes ca-
feato puncto notati, lineaque sublunatae similiter
coloratae (4-5) marginales. Maculae apicis portio
marginem dentatum spectans, macula pallide ochre-
acea: antice crenata, inquinata, est. Alæ eadem
subtus albidae, punctis lineisque ad marginem den-
tatum, ut supra, fasciaque tenui obsoleta fuscescente.

Larva nigra, pilosa, calami crassitie; lineis lon-
gitudinalibus transversisque luteis, punctisque al-
bis lateralibus; fronte (Y) flavo signata. Hæc
unica, mutanda in pupam, exit ex involucro, non
exuit, relinquens illud extensem & æque longum
ac erat larva. Pupa fusca; corniculis binis, spino-
fisis, posticis.

516. PHALÆNA *Libatrix*.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 507.

Faun. Svec. 2. 1143.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 20. fig. 3. 4.

Diagn. Alæ anticæ cervinæ; basi maculis (4)
ochreaceis: media longa prismatica; fasciis binis li-
nearibus pallidioribus: postica dupli, punctis duo-
bus albis, margine externo denticulato ita ut distan-
tia apicis a primo dente eadem sit, quæ ab eodem
dente ad angulum posticum.

Habitat in *Salice*.

Descriptio LINNÆI Faun. Svec. optima; cui
adde alas *anticas* atomis fuscis adspersas, punctum
nigrum fere in medio versus marginem crassiorem,
lineam repandam lucidiorem transversam in limbo
ab uno margine ad alium productam, venas alæ in
limbo albidas; alas *posticas* fulcescentes, basi palli-
diiores; margine nigricante. Tibias albas, fusco-
annulatas.

517. PHALÆNA *Chrysitis.*

— long. lin. 6½. lat. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 513.

Faun. Svec. 2. 1169.

Diagn. Alæ murinæ: anticæ fasciis binis, orichalceis.Habitat in *Galeopsis*.

Alæ supra murinæ, fimbria pallidiore terminata; anticæ supra inter fascias binis circulis obscurioribus, (2) referentibus; subtus murinæ; limbo paleaceo: posticæ supra murinæ totæ, subtus paleaceæ; lineola obscuriore, lunata, media.

518. PHALÆNA *Pronuba.*

— long. lin. 11. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 512.

Faun. Svec. 2. 1167.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 32. fig. 4. 5. 6.

FRISCH. Ins. 10. Tab. 15. fig. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 90.

Diagn. Alæ anticæ pallide-cervinæ; macula rotunda, media, fusca, punctisque binis didymis atris prope apicem; posticæ paleaceæ, fascia nigra submarginali.Habitat in *Senecione*, *Hieracio pilos.*

Caput & thorax alis anticis concolor; abdomen posticis, idemque sericeo nitore fulgens.

Alæ posticæ supra margine exteriore perlato. Alæ antice limbo postice fuliginosæ, margine inferiore pariter perlaceo nitore fulgidæ.

519. PHALÆNA *Quadra.*

— long. lin. 11½. lat. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 511.

ROESEL. Suppl. Papil. noct. Cl. II. Tab. 17. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 89. Tab. 2. fig. 8.

Diagn. Alæ unicolores; anticæ lanceolatae, rotundatae; maculis binis, cyaneis.In agro *Labacensi*.

Situs macularum alæ anticæ constans, nempe una incumbens margini crassiori & lineas quatuor cum

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 211

cum dimidia ab apice distans, altera in medio versus marginem inferiorem lineas sex ab apice remota.

- Variat 1. alis stramineis, antennis pedibusque cyaneis.
2. — cereis.
3. — albis.

520. PHALÆNA Sannio.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 506. sic puto.

Diagn. Alæ omnes macula media obscuriore: anticæ subtus, posticæ supra fascia fusca.

In Carniolia calidiore.

- Variat 1. alis anticis supra paleaceis; macula media rubro-fuscoque varia; margine undique rubro subtus disco fuscescente; limbo paleaceo; macula fusca reniformi, paleacea atmosphæra cincta.
— posticis supra albidis: fascia obsoleta maculaque fuscis; margine rubro.
— — — subtus paleaceis, absque macula & fascia.
2. alis iisdem, sed posticis subtus macula fusca media obsoleta.
3. alis cereis, absque margine rubro; anticis subtus fascia postica maculaque fuscis; posticis subtus immaculatis.
4. alis albis, absque margine rubro; anticis macula fusca obsoleta; posticis supra macula fasciaque fuscis obsoletis; subtus rudi maculæ mediæ vestigio.

521. PHALÆNA Verbasci.

— long. lin. 9. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 515.

Faun. Svec. 2. 1186.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 23.

fig. 4. 5.

212 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

Diagn. Lingua corporis longitudine. Thorax crista dupli. Alæ subdentatae, albo-cervinæ; margine fusco.

Habitat in *Scrophularia*.

Abdomen dorso acuminato, fusco. Alæ posticæ subtus puncto obsoleto, fusco medio. Femora puncto nigro notata. Lineolæ duo transversæ, lunate, pallidæ, parvæ, ad marginem internum alæ anticæ.

522. PHALÆNA Brassicæ.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 516.

Faun. Svec. 2. 1205.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 29. fig. 4-5.

Diagn. Alæ anticæ murinæ, fusco-nebulosæ, alba media linea ita flexa ut subcordatam figuram habeat, cui vicina macula subrotunda pallida.

Circa *Labacum*.

ROESELII figuræ certe hanc repræsentant, quid descriptio Linnæana dissentire quodammodo videatur. Huic lineolæ (8) fuscae curvæ ad marginem alæ anterioris, quæ subtus pallidior, & absque maculis. Alæ posticæ supra murinæ: margine lenissime crenulato & lucidiore fimbria terminato; subtus pallidiores; puncto fusco medio.

523. PHALÆNA Gamma.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 513.

Faun. Svec. 2. 1171.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 30. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 91.

Diagn. Alæ anticæ (γ) græco albo inscriptæ.

Habitat in *Origano majorana*, & *Trifolio prat.* sed copiosa in *Brassica oleracea*, quam devastat.

Alæ anticæ supra bruneæ; lineolis vagis pallidis & macula pallida obsoleta conica exteriori margini postice imposita; margine crenulato pallidiore; gamma græco cruribus eiusdem marginem respondentibus, basi iis multo crassiore & obtusa; subtus fusco & paleaceo variegata.

Alæ

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 213

Alæ posticæ supra basi murinæ, postice bruneæ, margine pallidiore; subtus anticis concolores, fimbria cinereo-fuscoque varia.

Dorsum pone triplici crista, abdomen autem unica: apice bifidum. Volatus rapidus, etiam diurnus.

Larva virens, villosula: lineis (2) dorsalibus pallidioribus. Pedibus pector. (6), abdom. (4), caudal. (2); sub *Geometra*.

524. PHALÆNA Aceris.

— long. lin. 7. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 514.

Faun. Svec. 2. 1179:

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 29.

Diagn. Alæ anticæ canescentes; lineis transversis, dentatis, annuloque ocellari nigris.

In *Acer*.

Sex circiter tales lineæ numerari possunt; inter quartam & quintam jacet ocellus canus iride pupillaque nigris, diametro sua lineam non attingens. Alæ posticæ utrinque pallide-murinæ, subtus macula fusca sublunata media.

525. PHALÆNA Rubiginosa.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ supra ferrugineæ, lunula media nigra.

In *Carniolie* herbidis.

Corpus utrinque ferrugineum. Oculi brunei. Alæ anticæ lunula cornibus suis crassiorem marginem respicit. Alæ posticæ supra murino-ferrugineæ, subtus magis ferrugineæ: fascia obsoleta maculaque media fuscis.

526. PHALÆNA Clavipalpis.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Alae anticæ cervinæ; margine crassiore punctis (4) nigris.

Habitat in agro *Labacensi*.

Alæ anticæ subfuscō leniter nebulosæ, puncto nigro versus basim; subtus pallidæ: margine inferiore sub-perlato; posticæ utrinque albidæ, imma-

214 Phalæna.

ORDO III.

Phalæna.

culatæ: margine obscuriore. Dorsum leve, valvis subtrigonis. Palpi clavati, compressi. Tibiæ supra fuscescentes, albidis annulis variegatae.

527. PHALÆNA *Deceptoria*.

— long. lin. 5. lat. 3.

Diagn. Alæ anticæ albæ; margini externo fasciaque lata media erosa fusca.

In sylvestribus circa Idriam.

Habitus *Ph. Tortricis*. Abdomen cristulis binis. Intra fasciam alæ anticæ, cuius margines crostæ sunt & tortuosæ, est annulus albus, eique vicinum punctum album; macula fusca infra apicem margini insidens. Alæ posticæ griseo-fuscæ, immaculatae.

II. Geometræ.

(a) *Alis posticis angulatis.*

528. PHALÆNA *Amataria*.

— long. lin. 7. lat. 4.

LINN. Faun. Svec. 2. 1223.

Diagn. Per alas expansas omnes utrinque ab apice primoris unius ad apicem alterius sociæ decurrent strigæ duo obscuriores; quarum postica tenuior & repanda, extremitates suas adnectit apicibus alarum antistarum, seu extremitatibus strigæ superioris.

In sylvestribus.

Amataria ill. LINNÆI solo colore a nostra differt; illa enim albida, apicibus alarum margine, rufis; nostra vero zinziberis colore, striga superiore fusco-ferruginea, altera fusca, eaque subtus evidentiore quam superior. Alarum pagina inferior atomis obscurioribus adpersa. Cæterum

Var. 1. *Alis anticis puncto fusco*, nec non omnibus margine externo simbriaque rubellis, margine, seu linea marginali eadem, subtus fuscescente.

2. *Alis anticis absque puncto fusco* simbriaque rubella, antennis pectinatis: apice setaceis.

529. PHALÆNA *Lactearia.*

— long. lin. 5. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 519.

Faun. Svec. 2. 1226.

Diagn. Alba; antennis pectinatis: pectinibus villosis, apice setaceis; alis posticis angulatis: omnibus strigæ transversæ vestigio.

In agro Labacensi.

Lingua paleacea. Oculi fuscescentes. Antennarum pectines pilosi, rachi obscuriores.

530. PHALÆNA *Viridata.*

— long. lin. 5 $\frac{1}{4}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 523.

Faun. Svec. 2. 1256.

Diagn. Alæ montano-viridi colore tinctæ; stigma fimbriaque pallidiore, margine crassiore flavecente.

10. Maji capta in herbido colie circa Idriam
Strigam quoque flavicantem ponit LINNÆUS,
quæ, apud nos, albida. Dorsum alis concolor,
Abdomen pedes & antennæ albo-paleaceæ.

531. PHALÆNA *Repandata.*

— long. lin. 7. lat. 4 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 524.

Faun. Svec. 2. 1260.

Diagn. Alæ albida utrinque; strigis fuscis, undatis, externo margini parallelis; punctoque fusco utrinque notatis.

In herbidis locis, non rara.

Mihi sane, juxta descriptionem in Faun. Svec. datam, videtur Repandata LINN. mera varietas. Alis omnibus punctulis numerosis fuscis adspersis; lineola fusca, marginem exteriorem alæ utriusque utrinque circumscribente, punctoque fusco non solum in inferioribus, sed etiam superioribus.

532. PHALÆNA *Nebulata.*

— long. lin. 5. lat. 3 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Alæ supra albido-cervinoque nebulosæ, subtus pallidiores; posticæ subangulatæ.

In agro Locopolitano.

Fimbria alarum pallidior, cervinis punctis variegata. Alæ subtus obsoletis, subferrugineis fasciis tribus. Antennæ setaceæ, ut in priore.

(b) *Alis posticis dentatis.*

533. PHALÆNA *Corticalis.*

— long. lin. 10 $\frac{1}{2}$. lat. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ ossæ; lineolis transversis parvis numerosis ferrugineis; linea crassiore utrinque pariter ferruginea, in singulis alis.

In agro Labacensi.

Alæ lineolis illis transversis, *Betulae* corticem quodammodo referunt; posticæ dentibus (5).

534. PHALÆNA *Cervinalis.*

— long. lin. 10. lat. 6 $\frac{1}{2}$.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. III. Tab. 3.
fig. 3?

Diagn. Alæ cervinæ: anticæ fasciis binis, fuscis, dentatis, lineaque alba undata submarginali; posticæ linea nigra, marginali.

In sylvis nostris, non rara.

Specimina mea majora Roeseliano, carent lineis albis transversis, alarum anticarum bases occupantibus. Alæ subtus fascia obsoleta dentata & puncto nigro evidenti. Sexus unus habet fasciam anticam magis conspicuam.

535. PHALÆNA *Fimbrialis.*

— long. lin. 6. lat. 5.

Diagn. Alæ capparinæ: anticæ strigis binis, albis; posticæ una; omnibus fimbria albida, ferrugineo punctata.

In agro Vipacensi, & interiori Carniolia.

Antennæ pectinatæ; rachi albida: pectinibus pallide ferrugineis. Alarum color supra pallidior designato; harum strigæ subrepandæ, subtus nullæ; dentes alarum posticarum ferruginei. Pedes ferruginei.

536. PHALÆNA *Retialis.*

— long. lin. 6. lat. 4.

Diagn. Alæ albæ, venis fasciisque (4) murinis reticulatæ.

Apud nos frequens.

Margo alæ anticæ crassior & externus pallide luteolus lineolisque crebris murinis transversis nebulosus; fascia ultima & penultima in medio alæ cohærent, fascia tertia ex apice superiore marginem contingente uncum demittit proximæ fasciæ seu penultimæ se se unientem. Fimbriaalarum albo murinoque varia; eadem subtus ut supra coloratæ, sed colore murino pallidiore. Antennæ setaceæ.

537. PHALÆNA *Punctinalis.*

— long. lin. 10 $\frac{1}{2}$. lat. 6.

Diagn. Alæ albæ; serie transversa punctorum fuscorum, fascia obsoleta submarginali atomisque fuscis.

In arboribus pomiferis.

Puncta (7). Maculæ duæ obsoletæ margini crassiori impositæ. Ala utraque subtus puncto fuscō. Alæ subdentatæ.

(c) *Alis omnibus dentatis.*

538. PHALÆNA *Fenestrella.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

Diagn. Alæ fuscescentes, erectæ, dentatæ; punctis rufis albisque.

Floribus involat, non frequens.

Tota subsufca est. Puncta alarum utrinque, alia rufa multa & opaca, alia vero argentea dia phana, majora, in qualibet ala duo & tria, medio loco posita. Abdomen annulis duobus albis fasciatur. Tibiæ posticæ uno latere barbatæ, basi & apice albo puncto notatae.

(d) *Alis omnibus rotundatis.*

539. PHALÆNA *Niveata.*

— long. lin. 7. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alba tota & immaculata.

In pratis.

Oculi nigricantes. Antennæ pedesque pallide cervini. *Mas* antennis pectinatis, alis simbria manifesta; *Fæmina* antenn. setaceis, alis manifesta simbria destitutis.

540. PHALÆNA Lineata.

— long. lin. 10. lat. 6.

Diagn. Alba tota; linea marginali venisque subtus fuscis.

In pomariis.

Margo superior alæ anticæ fuscus, eadem subtus fascia obsoleta maculaque fuscis. Antenn. setaceæ, cervinæ. Abdomen subtus lineis tribus, fuscis, longitudinalibus. Pedes cervini.

541. PHALÆNA Strigata.

— long. lin. 7. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alba; alis anticis strigis transversis tribus, posticis duabus subferrugineis.

In pratis humilioribus.

Antennæ pectinatae, apice setaceæ. Macula obsoleta, subferruginea, marginalis; prope apicem alæ anticæ punctum nigrum, sub ala qualibet.

542. PHALÆNA Exanthemata.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alba; strigis ut in priore, sed obsole-tissimis punctulisque copiosis ferrugineis utrinque variegatas alas gerens.

In salicetis.

In specimine, quod coram habeo, antennæ de-sunt; sed etiam si forent pectinatae, diversum vide-retur a priore, copia atomorum, statura &c.

Variat punto sub alis nigro.

543. PHALÆNA Punctata.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 3 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Alba; alis omnibus utrinque puncto nigro medio; anticis punctis (7) nigris marginem externum utrinque occupantibus.

In collibus herbidis, non rara.

An-

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 219

Antennæ setaceæ. Alæ anticæ striga una binisve obsoletissimis subferrugineis, minutisque punctulis raris fuscis variegatae, subtusque magis ferrugineæ. Puncta nigra marginalia in alæ singulæ inferiore pagina evidentiora quam in superiore.

544. PHALÆNA Grossulariata.

— long. lin. 9. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 525.

Faun. Svec. 2. 1261.

FRISCH. Ins. 3. Tab. 2. fig. 4. p. 13. 15.

P. PODA. Mus. Græc. p. 92. 93.

Diagn. Alba; alis fusco-maculatis: anticis supra basi fasciaque flavis.

In *Ribesio grossularia*.

Caput nigricans. Corpus flavum. Abdomen serie triplici punctorum nigrorum, nempe una dorsali, duabusque subtus. Alæ anticæ maculis in margine externo (7), quem numerum ponit etiam LINN. & figura FRISCH, in disco series duæ macularum, quas inter fascia flava; ad marginem crassiorem duo paria simillum macularum, invicem, & cum serie antica macularum disci, connexarum; inter basim & seriem dictam maculæ duæ parvæ liberæ; ad basim itidem maculæ aliæ septentes fere fasciam aliam flavam ibidem: posticæ maculis marginalibus (7), disci (8), dein tribus aliis, quarum una in medio, alia in margine inferiore, tertia est punctum basim occupans. Alæ subtus eodem modo maculatæ sunt, sed anticæ hic carent fasciis flavis.

545. PHALÆNA Ornata.

— long. lin. 6. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alba; alis omnibus supra fasciis binis limbi: antica undata.

In pratis Carnioliae super.

Ornatus limbi singularis huic uni proprius; nempe fascia fusco-cinerea, submarginalis, ex pluribus punctis conjunctis facta; aliaque fascia composita maculis binis convexis, cervinis, linea nigra testis, nec non maculis aliis duabus fusco-cinereis intermediis, sed inferioribus. Præterea ala quælibet supra fasciam gerit medium, subcervinam, obsoletam,

tam, cui vicinum, in alis tantum posticis, est punctum nigrum. Alæ anticæ subtus fasciis obsoletis fuscescentibus binis. Posticæ unica, singulæ puncto nigro notatæ. Antennæ setaceæ.

In hac specie alæ posticæ subdentatae sunt; hinc five ad priorem, five ad hunc ordinem reducantur, idem erit; margo alarum subtus linea nigra, aut lineolis nigris notatus.

546. PHALÆNA *Sylvata.*

— long. lin. 8½. lat. 5.

Diagn. Alba; alis anticis maculis fuscis subelutatis, basi tamen & prope angulum posticum macula majore obscuriore & colore ferrugineo inquinata; abdomine paleaceo: punctorum nigrorum seriebus (7).

Habitat in sylvis faginis, umbrosis.

Grossulariatæ proxima, non tamen eadem. Alæ posticæ margine fusco, subtus maculis in disco (6), tribus ad basim. Tibiae posticæ flavescentes; fascia fuscata. Ad basim alæ anticæ supra punctum nigrum.

547. PHALÆNA *Urticata.*

— long. lin. 6¾. lat. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 529. Hortulata.

Faun. Svec. 2. 1297.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. IV. Tab. 14.
fig. 7. 8.

Diagn. Alæ albæ; macularum fuscum ordinibus transversis binis posticis; thorace anōque flavis.

Habitat in *Urtica*, arboribus pomiferis, salicetis.

Macularum series submarginalis alarum superiorum, maculas (7), inferiorum vero (8), continet; alia series variat. Alæ super. ad basim maculis aliis fuscis (4-5); inferiores unica, aut nulla. Variat abdomine toto flavo; cingulis nigris.

Salicetariam Doctiss. P. PODA, hoc referri posse docet habitus, & numerus macularum seriei posticæ. Mus. Græc. Tab. 2. fig. 2.

548. PHALÆNA *Staphylæata.*

— long. lin. 5 $\frac{3}{4}$. lat. 3 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Alæ concolores albæ: anticæ limbo maculisque binis contiguis fuscis crassiori margini impositis.

Habitat in *Fago*, *Staphylæa*.

Lingua ferruginea. Antennæ setaceæ. Corpus totum maculis alarum concolor. Tibiae posticæ pallidæ.

Var. 1. Alis anticis; fascia abrupta fusca, maculisque marginalibus coalitis.

2. — — macula parva disci, maculisque marginalibus disjunctis.

3. — posticis limbo, & disco fusco-fasciato maculato.

4. — — limbo maculis tribus obsoletis, fascia nulla.

549. PHALÆNA *Glaucata.*

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 4.

Diagn. Alba; alis anticis fascia media subeluta fuscescente, ad marginem inferiorem glauco fuscoque varia.

In sylvis.

Caput fuscum. Antennæ setaceæ eo pallidiores. Abdomen fuscescens. Alæ anticæ binis ordinibus punctorum ad marginem externum supra; subtus margine eodem & crassiore nec non fasciata, fuscescentibus; posticæ supra limbo fuscescente, subtus albæ totæ.

550. PHALÆNA *Fasciata.*

— long. lin. 6. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alba; alis anticis supra basi fasciaque dentata fusco ferrugineoque variis.

In sylvestribus, umbrosisque locis.

Habitus & fasciæ figura, ut in *Phal.* FRISCH. Ins. 7. Tab. 19. fig. 2, sed colores alii. Cæterum

Var. 1. Basi alarum antistarum, fasciaque lineolis curvis cœruleofuscis variegata; punctis duobus nigris, duas lineas ab apic.

- apice remotis; limbo fuscous binis fasciolis ad alæ apicem non productis; abdominis incisuris singulis supra pari uno punctorum nigrorum; alis anticis subtus punctis (7) albidis in limbo, posticis lineola nigra media antica transversa, qualis etiam sub anticis prope marginem crassiore.
2. Fascia magis ferruginea, minusque fusca & absque lineolis cœruleiscentibus, subtus sine punctis albidis. Abdomine sine punctis nigris.
 3. Fascia punto nigro immerso, basi obiter fasciata. Abdomine punctato, ut in Var. I.
 4. Fascia obsoleta interrupta; abdominis incisuris supra bipunctatis.

551. PHALÆNA Chlorosata.

— long. lin. 7. lat. $5\frac{1}{2}$.

Diagn. Albida, seu colore eodem fere ut vultus in Cachexia virginea.

In pascuis.

Alæ anticis lineis rectis ferrugineis binis transversis, quibus interjacet punctum fuscum in sola pagina superiore conspicuum.

552. PHALÆNA Mucronata.

— long. lin. 8. lat. $5\frac{2}{3}$.

Diagn. Osseo-cinerea; alis anticis apice acuminatis lineaque fusca ibidem.

In salicetis.

Mucrone lineaque apicis a priore imprimis diversa, nec non alis omnibus subtus fuscouscentibus atomis adspersis, anticisque ibidem ubi supra puncto fusco notatis. Cæterum lineæ in alis anticis supra, cum interjecto punto, ut in priore.

553. PHALÆNA Variegata.

— long. lin. $6\frac{1}{2}$. lat. $4\frac{1}{2}$.

Conf. Geom. Immutata Celeberr. LINNÆI.

Diagn. Albida; atomis fasciisque undatis tenuibus fuscis variegata; alis omnibus punto medio margineque nigro punctato utrinque.

In

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 223

In herbidis.

Alæ *anticæ* supra strigis (4) una aliave obsoleta, punctis nigris marginalibus (8); *posticæ* strigis tribus, punctisque pariter (8). Subtus *anticæ* fuscantes; fascia albida in limbo; *posticæ* albæ striga transversa repanda fuscescente postica.

Variat statura fere duplo minore, alisque anticus subtus obscurioribus quam supra.

Sed neque hanc specie diversam arbitror

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{2}{3}$.

Alis anticis supra punctis (4) anticis nigris, postice serie punctorum in limbo nigrorum.

— posticis, eadem serie punctorum in limbo utrinque.

Conjungunt enim cum priore, color, habitus, oculi brunei, antennæ albidae, caput inter antennas album, puncta alarum marginalia, & punctum nigrum singulis utrinque in medio.

554. PHALÆNA Verberata.

— long. lin. 7. lat. 5.

Diagn. Albida; alis anticis strigis (5) undatis transversis fusco-ferrugineis: duabus posticis approximatis.

In sterilioribus pratis.

Antennæ dentatae. Oculi brunei. Tibiae fuscæ, albido annulatae. Margines externi alarum utrinque linea fusca, punctis contiguis facta, notati. Alæ posticæ utrinque striga obsoleta, punctoque subtus, fuscis.

555. PHALÆNA Undulata.

— long. lin. 7 $\frac{1}{2}$. lat. 5.

Diagn. Alæ cinereoæ; anticæ fascia lata fusco-cinereoque nebula dentata: punctis duobus nigris, undulisque obsoletis crebris obscurioribus transversim strigatae.

In sylvis.

Antennæ cervinæ, pectinatae: apice setaceæ. Fascia ibi lucidior ubi puncta duo nigra inimera gerit. Alæ anticæ limbus rugosus, vallecula qualibet nigro puncto signata; eadem subtus fuscescentes: fascia postica pallidiore obsoletaque.

Post-

Poſticarum margo leniter repandus, nigrisque lincolis notatus; Variat colore griseo.

556. PHALÆNA Crategata.

— long. lin. 9. lat. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 525. luteolata.

Faun. Svec. 2. 1283.

Diagn. Lutea tota; alis anticis margine ſuperiore maculis ferrugineis (5); antice minoribus: macula ocellari dentata alba: iride fulva, ferruginea ſecundæ adnata.

Inveni in M. Nanas, ſupra Trewald in itinere Botanico A. 1761, ſocio D. Doct. Carclo Krapf, Medico Tergeſtino.

Antennæ fulvo-ferruginea, ſuperne extroſum albidæ. Palpi colore baseos antennarum. Lingua ferruginea. Thoracis latus utrumque linea ferruginea a baſi alæ proxime nata. Pedum genicula ferruginea. Tibiæ albidæ. Alæ anticæ macula apicis conica major, baſi caput ſpectans. Puncta nonnulla ferruginea in margine alæ anticæ, verius apicem; ordo punctorum fulcorum obſoletorum transversus in aliis anticis ſupra. Alæ poſticæ ordine ſimili punctorum, punto alio maiore medio. Ex his patebit qualiter Specimen noſtrum diſterat a Linnæano Faun. Svec.

557. PHALÆNA Maculata.

— long. lin. 7. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 521. macularia, juxta descriptionem.

Diagn. Flava; alis omnibus utrinque fulvo maculatis.

In pratis noſtris non rara.

Antennæ ſetacea (†). Alarum bases punctis fulcbris obſitæ. Variat colore pallidiori, maculis

(†) Calamitas divisionis *Phal. Geometrarum* in pectini- & ſeticornis, haec eſt, 1. quod mas pectinicoris, femina ſeticornis; 2. quod ſexus uterque neque in indigenis facile habeatur; 3. quod *Phalæna* ejusmodi antenны mutilatae in Muſeis ſæpius occurrant.

culisque politis alarum anticarum in fasciam coadunatis.

558. PHALÆNA *Ioscelata*.¹

— long. lin. 6. lat. 3½.

Diagn. Alæ supra albæ; fasciis (4) lineolis que parvis transversis fuscis; subtus flavescentes.

In subsylvestribus *Carnioliae*.

Fascia baseos arcuata, alia huic proxima cum tertia apice in margine inferiore unita in triangulum *Iosceles*, fascia quarta abrupta; flavedo etiam aliqua circa has fascias observatur. Fimbria terminalis albo fusoque varia. Alæ posticæ tres fascias fuscas obsoletas habent, subtus binas. Antennæ setaceæ.

559. PHALÆNA *Contaminata*.

— long. lin. 6. lat. 4.

Diagn. Alæ utrinque fasciis cinereis & ferrugineis alternantibus coloratae, atomisque fuscis adspersæ.

In herbidis montanis *Carnioliae super*:

Dubium an prævaleat color cinereus vel ferrugineus. Alæ anticæ fasciis decem; alternis cinereis; posticæ octo: alternis quoque cinereis. Linea nigra marginalis utrinque. Antennæ setaceæ. Conf. LINN. *Atomaria*. Faun. Svec. 2. 245.

560. PHALÆNA *Mensurata*.

— long. lin. 6. lat. 5.

Diagn. Alæ cinerascentes, atomis fu'cis obsitæ: anticæ fasciis tribus lineaque apicis caffeatæ; margine paleaceo.

In siccis & apricis collibus.

Fascia tertia baseos modo evidens, modo fere nulla. Inter fasciam primam & secundam punctum fulcum. Alæ omnes supra lineola fasciis concolore terminali; posticæ sine fasciis; subtus omnes subferrugineæ. Antennæ mari pectinatae, fæminæ setaceæ. Ab alæ margine ad fasciam primam, ab hac ad secundam, indeque ad basim distantia eadem, seu tertia pars longitudinis totius alæ, mensura ducta circa medium.

561. PHALÆNA *Menita*.

— long. lin. 8½. lat. 6.

Diagn. Alæ anticæ albido-cinerascentes; fascia caffea lata dentata margine paleaceo.

In sylvis.

Fascia vertice propugnaculi in medio alæ posito in limbo, a cuius apice ad oppoitum marginem si ducatur linea recta, erit hæc quatuor lineas longa, dum eadem fascia in margine alæ inferiore lineas duas, in superiore vero quatuor pariter lineas lata est, eademque antrosum pallidior. Ad apicem alæ linea fasciæ concolor. Sub alis fasciæ nullæ. Antennæ mari pectinatæ. Corpus alæ anticæ limbo concolor.

562. PHALÆNA *Cruentata*.

— long. lin. 6. lat. 4½.

Diagn. Alæ supra osseæ; fascia communis finibriaque rusleis.

In agro *Labacensi*.

Antennæ pectinatæ. Alæ anticæ utrinque puncto rusleo. Alæ posticæ supra fascia magis obsoleta; omnes subtus maxima parte rusleæ, alibi paleaceæ.

563. PHALÆNA *Laccata*.

— long. lin. 5. lat. 3½.

Diagn. Alæ supra viridanæ; fasciis binis posticis primorumque margine crassiore laccatis.

In Juniperetis, verno tempore obvia.

Antennæ setaceæ. Fasciæ alarum posticarum minus conspicuæ, omnes subtus obsoletæ, & obscuriores, puncto fusco sub alis anticis.

564. PHALÆNA *Inflammata*.

— long. lin. 4½. lat. 3.

Diagn. Alæ anticæ hepaticæ: disco subtus nigrante; utrinque maculis quinis lineaque limbi aureis; posticæ fusce: fasciis binis maculaque aureis.

In pratis, tota æstate, frequens.

Aureæ fasciæ & maculæ quoad colorem, non vero nitorem. Fascia antica alarum posticarum alia

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 227

alia triplo crassior. Abdomen alis anticis concolor: cingulis aureis. Antennæ setaceæ. Ovum luteum, nitidum, sphæricum. Sedentis alæ non horizontales, ut in prioribus, sed adscendentes.

565. PHALÆNA Aurata.

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Habitus & colores ut in priore, sed alæ anticæ maculis (4); posticæ unica, utrinque aureis, fasciis nullis.

In montanis Carnioliae.

Nisi invenissem in copula utrinque sexum uniformem, cum priore facile conjunxit. Mas abdomen, canis longisque pilis, terminatum habet. Alarum sedentis situs prioris.

566. PHALÆNA Bilineata.

— long. lin. 6. lat. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 525.

Faun. Svec. 2. 1284.

Diagn. Alæ utrinque sulphureo ochreaceæ: anticæ supra lineis binis repando-dentatis fuscis albisque; omnibus subtus limbo fuscescente.

In pratis.

Descriptio *Ph. Bilineatae* LINN. nostræ quoque aptari potest, et si in alis superioribus supra fasciam latam ponat, quæ in meis exemplaribus non occurrit, elota sine dubio a climate, remanentibus tamen lineis strigis duabus albidis utrinque eandem distinguenteribus, dentatisque potius quam repandis. Præter lineas hasce, duas aliæ in nostris adsunt repandæ & albæ, sed obscuriores, una basim alæ ejusdem, altera limbum occupante. Sub alis lineæ equidem repandæ sed fuscæ, punctumque fuscum sub qualibet ala occurrit. Antennæ setaceæ sunt.

567. PHALÆNA Ochrata.

— long. lin. 5. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ ochræ colore, subtus obscuriores; utrinque strigis transversis repandis obscurioribus.

In montanis Carnioliae.

Antennæ mari leniter pectinatae, feni. setaceæ. Strigæ incerto numero, nempe (2-4). Sub aliis posticis punctum strigis concolor, basim versus.

568. PHALÆNA Limitata.

— long. lin. 8 lat. 5 $\frac{3}{4}$.' Conf. *Ph. Prosapiariam.* LINN. Faun. Svec. 2. 1252.*Diagn.* Alæ ferrugineæ: anticæ supra fascia lata nigro puncto signata, limboque cervinis.

In pratis nostris, etiam subalpinis.

Mas pectinicornis. Alæ anticæ venis limbi nigris, lineolas (5-6) æque distitas parallelas præfherentibus. Occurrit etiam alis iisdem supra cervinis; fasciis binis, ferrugineis. Alæ posticæ strigis repandis limboque obscurioribus. Sub alis anticis fascia nulla, limbis obscurior, punctumque fuscum in disco.

569. PHALÆNA Pennata.

— long. lin. 6 $\frac{1}{4}$. lat. 4 $\frac{3}{4}$.*Diagn.* Antennæ amplæ, deflexæ, ubique pectinatæ: pectinibus pilosis. Alæ pallide-ferrugineæ; fasciis obsoletis lineolisque plurimis confluentibus nebulosæ.Inter *Quercus* & *Corylos*.

Alarum fimbria albida obscurioribus punctis variegata. Anticæ utrinque limbo obscuriore. Antennæ fuscæ: rachi pallidiore. Alæ posticæ utrinque fasciis tribus obscurioribus.

570. PHALÆNA Spataceata.

— long. lin. 6. lat. 4.

Diagn. Alæ osseæ; strigis transversis obscurioribus repandis obsoletis, puncto nigro utrinque notatis.In agro *Labacensi*.

Seticornis, si lente observetur, punctulis rarissimis nigris hinc inde adspersa videtur, ad margines alarum puncta nigra. Alæ subtus pallidiores: anticæ strigis obsoletis fuscis binis fasciatæ; posticæ unica.

571. PHALÆNA Alpinata.

— long. lin. 5 $\frac{3}{4}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Fusco-cervina; thorace capiteque nigricantibus tomentosis.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 229

In summis herbidisque cacuminibus alpium
Vochinenium, Carnioliae super. abunde.

Hæc alas non penitus expandit, lente volat,
seticornis.

572. PHALÆNA *Murinata*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Murina tota, absque maculis fasciisque.

Circa *Labacum*.

Seticornis, pulchella, oculis fuscis.

573. PHALÆNA *Rivulata*.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Alba; alis anticis rivulis ferrugineis,
posticis fascia strigisque duabus transversis fuscis;
omnibus striga marginali utrinque ferruginea.

Copiosa apud nos in pratis, post primum fœ-
niseum.

Habitus *Pyralis*, sed alæ sedentis expansæ
Geometram indicant. Alarum primorum rivuli ita
sunt constituti ut tres albas insulas in disco effi-
cient; harum pagina inferior rivos fuscos gerit,
aut si velis, fusca est, maculis 4 in disco niveis,
octo in limbo in unam seriem ordinatis. Alæ po-
sticæ fascia limbi plerumque postico latere den-
tata, hujus lineæ nigricantes repandæ non attin-
gunt marginem alæ oppositum; macula ferruginea
imposita lineæ posticæ, in medio alæ. Corpus
album, antennis setaceis. Pedes postici alis lon-
giiores.

Variat, alis omnibus etiam subtus albis, rivis
obscurioribus, alisque posticis absque macula me-
dia ferruginea.

574. PHALÆNA *Litterata*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ cervinæ: anticæ linea transversa
postica, alia antica, hisque interjecta littera (V),
albis; posticæ fasciis binis angustis albis.

Habitat cum priore, copiosa pariter.

Linea alarum anticarum ad basim, subtus elo-
ta, ibidemque maculæ duæ albæ contiguæ loco
litteræ (V). Constantes sunt in omnibus. 1. Color
cervinus, 2. Alba linea transversa postica utrinque

230 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

in alis primoribus. 3. Falciołæ duæ albæ alarum posticarum utrinque, quarum postica arcuata natcitur e medio marginis externi & desinit in margine superiore intervallo lineæ unius ab apice.

575. PHALÆNA *Lævigata.*

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Cinereo-murina; alis subdentatis: denticulis puncto nigro notatis; anticis strigis punctatis duabus nigris.

In arbustis.

Strigæ dictæ fiunt punctis nigricantibus approximatis. Alæ posticæ binis obscurioribus strigis in medio fasciatæ, quas inter punctulum fuscum. Alæ omnes subtus concolores submuranæ, striga punctata obsoleta, puncto que fuso.

576. PHALÆNA *Inquinata.*

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Tota pallide ferruginea; àlis omnibus supra fasciis bilineatis fuscescentibus, subtus inmaculatis.

In pratis, non frequens.

Seticornis, ut prior. Alis margine externo fusco-punctato: anticis bifasciatis: fasciis bilineatis; harum posticæ linea extinia dentata, anticæ vero lineæ, ut serpens in Mercurii baculo, convolutis ita, ut duos annulos efficiant. Alæ posticæ fascia una bilinearis: linea postica dentata; linea alia antica obsoleta loco fasciæ secundæ.

577. PHALÆNA *Tenebrata.*

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Fuscescentes; alis anticis subtus macula flava; posticis utrinque fascia flava.

In montanis Carnioliae.

Seticornis & semigeomitra, seu alis semipatulis, nec tamen *Tortrix*. Alæ anticæ lineola alba prope apicem in margine crassiore, binisque similibus in fimbria terminali. Alæ posticæ albida fimbria terminata, subtus potissimum anticæ flavæ; limbo fusco; superne nigricantes; fascia flava non attingente marginem inferiorem.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 231

Variat lineolis alarum super. flavescenscentibus, alisque subtus flavo polline adspersis.

578. PHALÆNA Signata.

— long. lin. 5. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Albida; alis anticis supra strigis duabus obsoletis fuscescentibus, punctoque nigro utrinque.

In sylvis.

Seticornis; alis posticis subtus puncto fusco signatis.

579. PHALÆNA Despicata.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Alæ cervinæ aut murinæ: anticæ fascia postica maculisque binis marginalibus, posticæ fasciis binis ferrugineis.

In incultis, siccis, neglectisque locis.

Diagnosis data colores alarum supernos indicat, fasciis maculisque semper obsoletis. Alæ posticæ subtus ferrugineæ: fascia media punctoque baseos murinis. Margo quoque singulæ alæ externus, præsertim subtus, punctulis obscurioribus variegatus.

580. PHALÆNA Nigrata.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

Diagn. Fusca; alis omnibus fimbria fasciaque albis: anticis punctis binis albis.

In districtu Idriensi, non frequens.

Fascia sub alis posticis interrupta, puncto in eadem pagina maculaque antica inferiori margini imposita, albis. Posticæ alæ macula ad basim alba subtus notatae. Tibiae pallidæ.

581. PHALÆNA Æthiopata.

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Nigra; alis omnibus utrinque fascia albida.

In herbidis subsylvestribus.

Cum Albicillata LINN. Faun Svec. confundi nequit, juxta datam descriptionem. Nostræ enim alæ super. totæ nigrae sunt, ut & posteriores, quæ

232 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

puncto centrali & arcu fusco carent; fascia quoque in nostris angusta nimis, quam ut latissima diceretur.

582. PHALÆNA Obscurea.

— long. lin. 3. lat. 2.

Diagn. Fusco-nigra; Alis omnibus alba fimbria, maculaque flava.

In calidore Carniola.

Alæ anticæ margo inferior subtus albus.

III. Tortrices. (†)

583. PHALÆNA Podana.

— long. lin. 5 $\frac{1}{4}$. lat. 3.

Diagn. Alæ ochreaceæ: anticæ cinnamomeæ: atomis strigaque media fuscescentibus, apice caudatis

Habitat in *Rhododendro ferruginosum*, cujus dura folia cum torquere non possit, filis unit, metamorphosin subitura.

Alæ posticæ latere abdomen spectante fusco. Corpus supra alis anticis concolor, subtus ochreaceum. Lingua nulla.

Larva albida, capite castaneo lucido. Pupa fusca glabra.

543. PHALÆNA Bergmanniana.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 531.

Faun. Svec. 2. 1324.

Diagn. Alæ anticæ flavæ: nodulis binis, fasciisque (4) argenteis: margine fusco-ferrugineo.

Habitat in *Rosa hortensi* frequens, sed nunquam in nemoribus.

Rosana

(†) *Tortricum* alæ anticæ margo exterior totus curvus. cædemque semper & insigniter deflexæ. Palpi clavati, breves, obtusissimi: articulo ultimo tenui, pilis alterius, cui insidet vix longiore.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 233

Rosana. Cel. LINN. non est. *Bergmannianæ* descriptio huic etiam convenit. Alæ anticæ supra flavæ; nodulis binis parvis in medio, quorum unus nigricans. In singulis alis hisce fasciæ argenteæ: margine fusco-ferrugineo, quatuor: tertia bifida. Palpi, caput, thorax colore alarum superiorum. Oculi nigri. Antennæ supra flavæ, subtus obscuriores. Alæ anticæ subtus flavicantes: fasciis fuscis; posticæ utrinque pallide fuscæ.

Larva albida, agilis, capite nigro, linea prope caput transversa nigra, pedibus pectoralibus fuscis, postice pallidior.

585. PHALÆNA *Rubiana.*

— long. lin. 4 $\frac{1}{4}$. lat. 2 $\frac{1}{3}$.

Diagn. Alæ fuscescentes: anticæ supra cinerascentes: macula communi postica subovata brunea, macula apicis punctisque tribus posticis crassiori margini impositis bruneis.

Habitat in *Rubo fruticoso*.

T *Uddmanniana*, & *Aiströmiana* LINN. quasdam notulas cum nostra communes habent, an vero alterutra vere nostra, valde dubito. Metamorphosim subitura, summa folia complicat in nodum, indeque prodiit mihi 19. Iunii, antennis corpore duplo brevioribus, palpis clavatis, alis posticis fimbria pallidiore, anticis basi & apice obscurioribus, macula communi margine albido cincta.

586. PHALÆNA *Fasciana.*

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{3}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1304.

Diagn. Alæ anticæ supra fusco glaucoque variæ: fascia lata albida postica.

Habitat in *Pomis*, quorum folia convolvit.

Alas cinerascentes habet LINN. quæ tamen reversa glauco-cæruleæ sunt punctisque fuscis aut nigris nebulosæ, margo alæ posticus fuscescens, fascia alba summa latitudine, quæ est in margine alæ crassiore, æquat latitudinem paginæ proximæ glauco-fuscæ, eodemque in margine punctis fuscis (4) notata. Alæ posticæ utrinque subcinereæ. Tibiæ fasciæ concolores, fusco-annulatae.

587. PHALÆNA *Solandriana*.

— long. lin. 5. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 532.

Faun. Svec. 2. 1327.

Diagn. Macula media, communis, ovata, alterius coloris; alæ anticæ margo crassior apicem versus fusco-punctatus.

Cum sum in multiplicandis, absque summa necessitate, speciebus, certe non facilis, ita ex situ maculæ communis, *Phalenæ* huic uni propriæ, *Solandriana* LINNÆI facio; quidquid alas pallidas & maculam ferrugineam suæ tribuat Ill. Eques. Et nihil novi est variare colores in eadem specie; nostra enim 1. alis anticis nigro-cinereoque nebulosis: basi ferrugineis & fusco punctatis, macula cinerascente; 2. ferrugineo-fuscoque nebulosis, macula pallide straminea; 3. murinis atomisque fuscis, macula media albida.

588. PHALÆNA *Cervana*.

— long. lin. 5. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ cervinæ; limbo ferrugineo- & fusco-punctato; fascia fuscescente punctisque (3-4) glaucis variegata.

In Ericetis.

Ala eadem inter fasciam & basim pallidior. Lineolæ duæ tuscæ in limbo parallelæ longitudinales, punctaque tria fusca in margine exteriore versum apicem collocata.

589. PHALÆNA *Lambergiana*.

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ corticinæ; strigis transversis punctisque quatuor plumbeis.

Circa Idriam non rara.

Ala antica basi linea media longitudinali parva, aliaque ibidem marginali, e cujus apice brevior alia transversa nascitur, his succedit striga transversa prima, a qua intervallo lin. 1 $\frac{3}{4}$ distat secunda interrupta, angulum alæ posticum una extremitate respiciens sed non attingens; strigæ cætera binæ posticæ sunt, una in limbo, altera in apice. Inter strigam primam & interruptam secundam est macula ob-

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 235

oblonga parva nigra tria puncta plumbea fovea; prope hanc maculam est lineola ablida alæ medium occupans, longitudinalis, postice bifida. Alæ fimbria fusco-plumbea. Confer. *Phal. Arcuanam* LINN. *Faun. Svec.* 2 1317. huic similem.

Nomen imposui in honorem Ill. & Remi. D. D. Caroli S. R. J. Comitis à LAMBERG, p. m. Insectorum olim amantissimi, cuius benevolentiae collectio nostra sua debet incrementa.

590. PHALÆNA *Wulfeniana*.

— long. lin. 3. lat. 1½.

Diagn. Nigricans, alis anticis plumbeo-punctatis; subtus puncto albo, quo posticæ utrinque notatae.

In sylvestribus, circa Idriam.

Alæ anticæ margo inferior, basim versus, albidus, purèto albo subtus prope marginem crassiorem, distantia lineæ unius ab apice. Tibiæ anticæ albo annulatae.

A. R. P. Franc. Xav. WULFEN è S. J. ut omnium rerum naturalium, ita & Insectorum amantissimus, horum quoque specimina quædam & icones nonnullas, una cum optimis descriptionibus, communicavit.

591. PHALÆNA *Rufana*.

— long. lin. 4½. lat. 2½.

Diagn. Alæ anticæ ferrugineæ, glauco-punctatæ. In Salicetis, Majo M.

Puncta glauca numerosa, eaque postice quasi in strigas transverfas ordinata.

592. PHALÆNA *Plumbana*.

— long. lin. 3. lat. ½.

Diagn. Alæ anticæ basi fuscescentes; posticæ ferrugineæ, lituris transversis hamatis plumbeis, punctisque (2-3) nigris marginalibus ad angulum posticum.

In herbidis.

Palpi potissimum, lamella obtusa clavati, separant a *Tineis*, a quibus alias ægerrime distinguuntur. Alæ superiores antice fuscescentes, punctisque ferrugineis nebulosæ; fimbria ejusdem alæ plumbea

236 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

bea pariter, sed paulo obscurior, quam strigæ, quamrum hami oppositi.

593. PHALÆNA *Rusticana*.

— long. 4. lin. 1. lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ canescentes; maculis obsoletis fasciaque pallide caffeatæ.

Circa tuguria & possessiones Rusticorum.

Ad basim alæ maculæ dictæ duæ, fascia in medio, maculæ tres posticæ, puncta (4) postica crassiori margini imposita. Pectus argenteum. Tibiæ pallide fusco-annulatae.

594. PHALÆNA *Miscellana*.

— long. 4. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ cervinæ fusco-punctatae; striis transversis interruptis plumbeis, fasciaque media fuscescente: plumbeo puncto notata.

In nemoribus, hortis, pomariis, Majo M.

Miscella colorum fere indistinguibilium. Strigæ plumbeæ saepius abruptæ (5-6). Color alæ cervinus equidem sed leniter etiam ferrugineus. Puncta fusca (4), postica, in margine crassiore. Caput inter antennas cervino — ferrugineis villis tomentosum. Tibiæ fusco-annulatae.

595. PHALÆNA *Montana*.

— long. lin. 3. lat. 1.

Diagn. Alæ anticæ fuscæ, macula communis media marginaque crassiore postice ferrugineis; strigis binis posticis obliquis fimbriaque plumbeis.

In montanis Carniolie.

Margo alæ ubi ferrugineus, ibi & fusco-punctatus. Abdomen nigrum.

596. PHALÆNA *Canæ*.

— long. lin. 6. lat. 3.

Diagn. Alæ anticæ canescentes; fronte atomisque cervinis.

Inter Corylos.

Alæ super. punctis cervinis vagis variegatae. Pectoris latera & femora antica subtus subargentea.

597. PHALÆNA *Pedana.*

— long. lin. 5. lat. lin. $2\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ cinereo-fuscoque nebulosæ: apice striis obliquis ferrugineis.

Inter frutices.

Striæ posticæ subquaternæ, una cum fimbria, ferrugineæ. Puncta (5) castanea in margine crassiore versus apicem. Pedes subargentei: postici longi & crassi. Pectoris latera argentea. Tibiæ annulis nigricantibus,

598. PHALÆNA *Umbriana.*

— long. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Umbrina; alis anticis cinereis fascia punctisque marginalibus fuscescentibus.

In pratis.

Margo crassior, alæ superioris, posticæ albo-fuscoque punctatus. Fimbriæ margo albidus.

599. PHALÆNA *Formosana.*

— long. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ nigro-corticinoque variae: strigæ tribus submarginalibus obliquis plumbeis, punctisque albis marginalibus (8).

Circa *Idriam* reperta, in pomariis.

Color prævalens niger, corticino variegatus. Strigæ non attingunt marginem alæ crassiorem, cui proximæ; harum postica oritur e quintæ puncto albo (ab apice sursum numerando) & definit in margine alæ fimbriato lineæ fere distantia ab apice. In limbo ejusdem alæ puncta tria plumbea: binis submarginalibus. Inter bina puncta ex hisce sunt duæ parvæ parallelæ corticinæ lineolæ. Fimbria nigra, punctis tribus corticinis variegata.

600. PHALÆNA *Rivulana.*

— long. lin. 4 lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ murinæ; fascia rivulisque posticis, albidis.

In sylvis.

Fascia

Fascia antica & rivuli sunt lineis binis. Rivi ita siti, ut duas insulas murinas faciant, rempe unam subovatam inferiorique margini alæ ejusdem imposita, alteram subconicam obliquam duplo longiorem: convergente apice angulo postico proximo. In margine crassiore puncta murina (4) versus apicem polita. Alæ posticæ utrinque pallidæ; anticæ subtus fuscæ.

601. PHALÆNA *Gramineana*.

— long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{3}{4}$.

Diagn. Alæ anticæ atomis fasciisque binis obsoletis fuscescentibus.

In herbidis collibus.

Fasciæ undulatæ, non attingunt marginem alæ oppositum. Pectus & femora argenteis squamulis adspersa.

602. PHALÆNA *Capillitiana*.

— long. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ subferrugineæ; punctis marginalibus capite palpisque albidis.

In fylvestribus locis.

Ratio nominis ex denso pilorum capillitio capiti imposito. Oculi nigri. Alæ anticæ subtus fuscæ; posticæ utrinque pallide fuscæ. Pectus argenteum.

603. PHALÆNA *Osseana*.

— long. lin. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{2}$

Diagn. Alæ anticæ osseæ; atomis fulcis, punctoque apicis fuscescente.

In herbidis.

Palpi, caput, colore alarum superiorum, ut & thorax tibiæque. In medio ejusdem alæ, puncta duo obsoleta fusca. Oculi nigri.

604. PHALÆNA *Pyraliana*.

— long. lin. 3. lat. $1\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ ferrugineæ; limbo obscuriore, fasciisque binis fulcis.

In sylvis.

Pyrali proxima ob alas obliquius postice truncatas ac in omnibus aliis enumeratis. Palpi etiam

etiam articulus ultimus, alterius pilis paulo longior est.

IV. Pyrales (†).

(a) *Palpis recurvatis.*

605. PHALÆNA *Barbalis.*

— long. lin. $6\frac{3}{4}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1345.

Diagn. Alæ omnes utrinque cinerascentes; atomis strigisque tribus. Antennæ subpectinatae. Femora antica barbata.

Circa *Labacum.*

Palpi lin. 2. longi. Oculi fuscii. Margo alæ anticæ fusco-punctatus. Alæ posticæ striga limbi unica, subtus pallidiores.

606. PHALÆNA *Proboscidalis.*

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 533.

Faun. Svec. 2. 1346.

Diagn. Alæ anticæ supra cinereæ; fasciis tribus fuscis: margine utrinque ferrugineo; postica in alæ apice desinente. Antennæ subpectinatae.

In Carniola non rara.

Palpi subrecurvati, fuscii, lineam longi. Alæ super fimbria ferruginea. Alæ posticæ fuscescentes: limbo obscuriore; subtus striga obsoleta fuscescente.

607. PHALÆNA *Anthracinalis.*

— long. lin. $6\frac{1}{2}$.

Diagn. Tota nigra; alis anticis albo-maculatis. Antennæ mari pectinatae.

Circa

(†) Alæ leniter deflexæ, quarum latitudo summa est dimidia longitudinis; ab hoc autem puncto ducatur linea recta ad angulum posticum, aliaque opposita ab angulo postico ad apicem, sic triangulum rectum aut quasi rectum exsurget.

Circa torrentes, hinc forte in *Salicibus*.

Mas. Antennæ pectinatae, (4) lin. longæ; rachi alba nigro-annulata; pectinibus capillaceis fuscis pilosis sub antennis pili flavi, post antennas fasciculus pilorum flavorum utrinque. Palpi barbati, articulo ultimo recurvato, nec barbato, tenui. Alæ antice maculis niveis (10), punctisque niveis posticis (4); fimbria antice nigrante: punctis binis albis, posticarum albida. Alæ posticæ subtus macula alba media. Pedes nigri, tibiis albo-annulatis.

Fæmina. Antennæ fetaceæ. Caput totum nigrum; cæterum alia omnia, ut in mare.

608. PHALÆNA *Farinalis.*

— long. lin. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 523.

Faun. Svec. 2. 1348.

P. PODA. Mus. Græc. p. 94.

Diagn. Alæ antice basi & limbo caryophyllinis, media parte pallide cervina; marginibus repandis albidis.

Habitat in farina.

Talis certe nostra, qualem descripsi, parte media nunquam glauca; quandoque tamen loco coloris caryophyllini est fusco-ferrugineus, qualis etiam in alæ apice subtus. Vidi & in uno sexu antennas subpectinatas. Alæ posticæ, subtus faltem albidæ, punctis fuscis marginalibus.

609. PHALÆNA *Citrinalis.*

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ citrinae: posticæ pallidiores immaculatae; antice fascia submarginali & cratero sanguineo reticulatae.

Inveni circa *Idriam*, in Rosenberg. 4. Junii.

Palpi lin. 1½. longi. Oculi nigri. Antennæ fetaceæ. Nullæ maculæ sub alis anticis. Alæ antice lineolis depremis postice striatae.

610. PHALÆNA *Trabealis.*

— long. lin. 4½.

Diagn. Alæ antice paleaceæ; fasciis binis, trabe longitudinali miculisque (5) nigris.

Labaco

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 241

Labaco mortuam & expansam accepi, incertus ideo an vere *Pyralis*, quod suadent palpi, & alarum figura.

Margo alæ super. niger, fasciæ in limbo positaæ subundulataæ, trabs margini inferiori parallela, maculæ tres superiori margini adnatæ, palpi breves, alæ anticæ subtus fuscantes: margine paleaceo; posticæ supra fuscantes; subtus pallidiores: litura transversa punctoque medio fuscis.

611. PHALÆNA *Cristalis*.

— long. lin. 3½.

Diagn. Alæ fuscæ: anticæ supra ferrugineofuscoque nebulosæ, cristula nigricante in medio notatæ.

Circa *Idriam*.

Palpi lin. 1½ longi. Fimbria alis posticis concolor. Alæ subtus politæ.

Larva nuda, de cauda pendens, fulva cum partui proxima.

612. PHALÆNA *Lunalis*.

— long. lin. 6½.

Diagn. Alæ cervinæ: anticæ strigis tribus obsoletis lunulaque fuscis.

Labaci degit.

Palpi lin. 2 longi. Antennæ setaceæ. Alæ omnes utrinque lineola lunulata fusca, plus minusve conspicua in medio notatæ.

613. PHALÆNA *Viminalis*.

— long. lin. 5.

Diagn. Alæ murinæ; fascia obscuriore utrinque.

Habitat in, aut circa *Salicem viminalem*.

Palpi vix lineam longi. Alæ anticæ limbo obscuriore: posticæ subtus fascia punctoque fuscis.

(b) *Palpis porrectis*.

614. PHALÆNA *Extimalis*.

— long. lin. 5.

Diagn. Alba; alis anticis apice ferrugineis.

In agro Labacensi.

Oculi brunei. Alæ anticæ subtus etiam apice maculisque binis marginalibus ferrugineis; posticæ margine utrinque punctis ferrugineis.

615. PHALÆNA Sericealis.

— long. lin. 4.

Diagn. Tota subossea sed ferici in modum intens; alis anticis macula obsoleta fuscescente.

Habitat cum priore.

Oculi fuscæ.

616. PHALÆNA Ruralis.

— long. lin. 7.

Diagn. Alæ paleaceæ; strigis transversis, undulatis, obsoletis, fuscis.

Ruri degit, non rara.

Alæ anticæ supra strigis tribus, subtus limbo fuscescente; posticæ utrinque striga una & fascia limbi obsoletis fuscis. Oculi brunei. Corpus alis concolor. Pedes albidi. Variat strigis manifestis dentatisque.

617. PHALÆNA Trivialis.

— long. lin. 6.

Diagn. Alæ paleaceæ: anticæ supra fascia lineis tribus obscurioribus composita, ab alæ margine inferiore nata & in apicem desinente.

Vulgaris apud nos, in hortis, & pratis.

Supra hanc fasciam sunt etiam strigulæ duæ eidem parallelæ & concolores, alæ medium occupantes, neutrum vero marginem attingentes. Linea fusca in margine alarum omnium externo utrinque. Alæ posticæ utrinque punctorum obsoletorum & fuscentium serie transversa prope limbum; puncto que alio simili subtus prope basim.

618. PHALÆNA Nemoralis.

— long. lin. 5.

Diagr. Alæ anticæ basi ossæ; venuis paleaceis reticulatae; limbo paleaceo; parte intermedia vinaceæ; margine externo repando

In nemoribus frigidis, umbrosis.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 243

Alarum media pars obliquiore repandaque linea utrinque dividitur a coloribus bateos & limbi, ut in *Ph. Farinali*, & maculam obsoletam limbo concolorem in medio, versus marginem crassiorem habet, ejusdem color dictus postice dilutior est. Margo externus repandus, & quasi dentate in medio instructus, huic uni proprius; idem terminatus fimbria albo & paleaceo varia. Eadem ala subtus subpaleacea, striga fuscescente undulata abrupta. Poticæ alæ utrinque colore paginæ inferioris alarum superiorum, strigaque undulata postica fusca fasciatæ.

619. PHALÆNA *Mujalis*.

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ anticæ supra albæ; fasciis tribus, interruptis, fuscescensibus. Pectus pedesque argentei; tibiis fusco-annulatis.

In pratis Majo M.

Hælitavi an *Tineis* adnumerarem, sed palpi & alæ removent a consortio *Tinearum* & *Tortricum*. Huic, ut aliis non paucis hujus ordinis, palporum paria duo: antico albo & minore, inferiore vero nigricante & longiore. Alæ anticæ subtus fuscescentes; posticæ utrinque albidae: limbo obscuriore, subtus striga fuscescente fasciato.

V. *Tineæ* (†).(a) *Alis convolutis*.620. PHALÆNA *Perrella*.

— long. lin. 6.

Diagn. Alæ supra eodem prorsus, quo perla, colore fulgidæ; subtus fuscescentes.

S 2

In

(†) *Alæ* reversæ: margine interno longius fimbriato, praesertim ad angulum posticum, latitudine minus dimidia longitudinis parte. *Tinearum* copia, parvitas, pulchritudo stupenda, ut in his potissimum Natura thesauros suos effudisse videatur, tantaque in minimis hisce

ma-

244 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

In pratis, Majo M., non rara.

Palpi porrecti, leniter deflexi, lin. $1\frac{1}{2}$ longi.
Femora antica, subtus fusca.

621. PHALÆNA *Pascuella*.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 535.

Faun. Svec. 2. 1367. sic mihi vi-
detur.

Diagn. Alæ anticæ pallide aurantiae; linea alba
longitudinali, a basi fere ad limbuni usque pro-
ducta, utrinque acuminata, inferiore latere dente
in medio instructa; linea limbi transversa, aliaque
marginali argenteis: area his interjecta cinerea;
apice introrsum plicato.

In pratis.

Aurantius alæ color prope lineam argenteam
limbi evidentior. Maculæ duæ albæ oblongæ in-
ter limbum & apicem lineæ longitudinalis, quibus
maculis interjacet lineola argentea. Inter margi-
nem inferiorem & maculam albam lineolæ paral-
lelæ tres argenteæ jacent. Margo alæ sinu ex-
cavatus, ad apicem inflexum; ad marginem eun-
dem puncta (5) nigra; fimbria argentea inflexa.
Pagina plicati apicis binis maculis albis lateralibus
prædita. Ala antica subtus fusca, margine palli-
diore punctisque (5) nigris notato. Alæ posticæ
utrinque fuscescentes: fimbria lucidiore. Palpi
porrecti, fuscescentes, lineam longi.

622. PHALÆNA *Pinetella*.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 539. Finella.

Faun. Svec. 2. 1368.

Diagn. Alæ anticæ ut in priore; sed alba py-
ramide longitudinali fasciis binis colore alæ inter-
rupta.

In gramineis.

Dor-

majestas, ut admirari potius eam liceat, quam aptis
verbis indicare!

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 245

Dorsum, caput, palpi supra, albi coloris, ut & corpus subtus femoraque. Tibiae alis concolores. Puncta marginalia nigra plicis interjecta, in alis anticis.

623. PHALÆNA *Semirubella.*

— long. lin. 6.

Diagn. Alæ anticæ vinaceæ, semipaleaceæ.

Habitat cum priore.

Alæ superiores dimidia interna parte longitudinaliter paleaceæ. Palpi surrecti. Thorax paleaceus: latere vinosus.

624. PHALÆNA *Rosella.*

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ anticæ albæ, semiroseæ. Occiput aureum.

In herbidis collibus, rarer.

Palpi surrecti. Alarum margo utrinque nigricante linea signatus. Alæ fuscae: anticæ dimidia interna pagina longitudinaliter alba, altera rosea.

625. PHALÆNA *Viduella.*

— long. lin. 4½.

Diagn. Alæ anticæ albæ; linea fusca, a basi ad apicem prope marginem crassiorem decurrente.

In sylvis, rarer & solitaria.

Oculi nigri. Antennæ supra albæ, subtus fuscae. Caput cum thorace album. Alæ anticæ punctis binis nigris prope lineam fuscam, senisque minoribus in margine externo. Alæ posticæ utrinque fuscescentes.

626. PHALÆNA *Fuscella.*

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ canescentes, fusco-punctatæ.

In montanis nostris, paucim.

Tota unicolor, subcanescens, punctulis copiosis fuscis nebulosa.

627. PHALÆNA *Craterella*.

— long. lin. 5½.

Diagn. Alæ anticæ albidæ; lineis longitudinibus octo binisque transversis terruginejs.

In Gramine.

Palpi porrecti lin. 1½ longi; fimbria alæ super. argentea.

628. PHALÆNA *Chrysonuchella*.

— long. lin. 5½.

Diagn. Alæ albidæ; margine crassiore, punctulis sparatis, strigisque binis transversis fuscescentibus.

In pratis.

Differt a priore, occipite fulvo, alis fusco-punctatis. exterius ad marginem crassiorem fuscescentibus, striga postica arcuata, antica obsoleta. Cæterum & huic palpi lin. 1½ longi, alarumque superiorum fimbria argentea.

629. PHALÆNA *Virginella*.

— long. lin. 5.

Diagn. Pallida tota & albicans; alis anticis maculis duabus albissimis: anteriore conica, posteriore quadrata.

In nemoribus.

Maculæ albæ ut in *Ph. Pinetella*, sed colores alii, & linea nulla alba marginalis sub macula tetragona.630. PHALÆNA *Culmella*.

— long. lin. 4½.

LINN. Faun. Svec. 2. 1370.

Diagn. Albida tota & immaculata; alis posterioris fimbria argentea; oculis nigris.

In agro Labacensi.

Subtus paulo obscurior, quam supra. Alæ anticæ margo exterior punctis nigris notatus.

631. PHALÆNA *Eonymella*.

— long. lin. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 534.

Faun. Svec. 2. 1363.

Roe-

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 247

ROESEL. Papil. Noct. Cl. IV. Tab. 8.
fig. 4. 5.

Diagn. Alæ anticæ supra albæ; punctis nigris ad (27).

Habitat in *Erythronium vulgare*.

Antennæ albæ, subtus nigro-punctatæ. Palpi, pedes, caput, thorax, pariter alba. Thorax punctis binis nigris, valvulis puncto nigro notatis. Puncta nigra in singulis alis anticis (23-27): marginalibus minoribus magisque contiguis. Alæ eadem subtus fimbria marginaque toto albæ, alibi fuscæ; posticæ utrinque fuscæ, fimbria alba.

Larva pallide lutea, puncto nigro laterali in quolibet annulo, capite nigro: pedibus pectoralibus feminigris. Harum plures habitant in sociate sub communis tentorio, e quo, consumptis vicinis foliis emigrant & in superioribus ramis, aliud nent. Folliculos saepius parallelos construunt intra tentorium.

632. PHALÆNA *Padella*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 535.

Faun. Svec. 2. 1364.

Diagn. Similis priori, sed diversa 1. punctis paucioribus, nec ultra (20); 2. alis anticis minus albæ, subtus ubique fuscis; 3. alis posticis utrinque fuscis totis.

Habitat in pomiferis arboribus.

633. PHALÆNA *Cornutella*.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Tota ossea & polita; palpis erectis.

In pratis.

Oculi fuscæ. Palpi lineam longi, erecti, duo cornua referunt.

634. PHALÆNA *Nisella*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1377.

Diagn. Alæ anticæ canescentes; macula communis, ovata, nigricante.

In sylvis.

248 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

Tuncta (4) fulca in margine crassiore postice sita, quinto majore apicem occupante. Macula communis nigricans: margine erolo.

635. PHALÆNA Marginella.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Pallide caryophyllina; alis anticus margine crassiore pallidiore punctisque (6-7) caryophyllinis variegato, finibria subargentea.

In pomariis, circa Idriam, Majo M.

Palpi pallidi, articulo ultimo alis concolore.

(**) *Alis planiusculis.*

636. PHALÆNA Paliatella.

— long. lin. 7.

Diagn. Ossa tota; alis impositis; oculis nigris.

In nemoribus nostris, non rara.

Alæ anticæ una, in hac specie, supra alteram posita, quo sitū alarum convexa fit pars superior animalis. Alæ posticæ plicis duabus. Lingua ferruginea. Abdomen alis brevius.

637. PHALÆNA Cervinella.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ cervinæ: anticæ punctis posticis nigris (4) in margine crassiore, (7) in exteriore. Corpus subitus subargenteum.

In pratis, Junio M.

Oculi fusci.

638. PHALÆNA Forficella.

— long. lin. 5.

Diagn. Alæ anticæ fusco-ferrugineæ; capite, striga a basi ad angulum posticum extensa, maculaque obliqua postica marginis crassioris, subaurei coloris.

In sylvis.

Alarum situs ut in *Tyrali*, sed character *Tineæ*. Oculi nigri. Alæ posticæ tenuæ, anticæ subitus, fuscae. Corpus subauratum.

639. PHALÆNA *Flavella.*

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Caput, dorsum, alæ anticæ supra flavæ ferrugineo-subfasciatæ.

In nemoribus umbrosis.

Fasciarum trium, in singulis alis, rudera ferruginea. Palpi flavi, porrecti, lineam longi. Alæ omnes subtus fuscescentes.

640. PHALÆNA *Gemmella.*

— long. lin. 3 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Alæ anticæ flavescentes; fasciis ferrugineis punctisque argenteis variegatae.

In collibus nostris, non semel visa.

Fasciæ duo: postica subabrupta. Alæ basis fimbriaque fasciis concolor. Puncta lineaque argenteæ sparsæ, præsertim super paginam flavescensem. Alæ anticæ subtus fuscæ, albido-punctulatae; posticæ supra pallide fuscæ, lineis obscurioribus longitudinalibus striatae, subtus albo-fuscoque nebulosæ. Abdomen nigrum; cingulis pallidis. Tibiae pallidæ, fusco-annulatae; posticæ crassiores & pilosiores.

641. PHALÆNA *Eclipsella.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Obscure cana; alis anticis margine crassiore nigro-punctatis.

In pratis.

Alæ anticæ *Tortricium*, posticæ *Tinearum*; cum vero planæ penitus non sint, ita *Tineis* adnumera vi. Huic alæ anticæ obsoletissima obscuriore facia, punctisque fuscis sparsis exiguis variegatae. Pagina inferiorum earumdem alarum obscurior, quam eadem pagina posticarum.

642. PHALÆNA *Bicostella.*

— long. lin. 5.

LINN. Faun. Svec. 2. 1438.

Diagn. Caput, dorsum, alæ anticæ, alba; linea longitudinali ferruginea a basi ad apicem excurrens

250 Phalæna.

ORDO III.

Phalæna.

rente prope marginem crassiorem; disco punctis subternis atris.

Circa *Idriam* capta.

Palpi lamella lineam longa, pilosa, supra albicans, subtus fusca, articulo tenui fusco parvo, tanquam arista, terminata. Oculi nigri. Alæ antice margo posticus punctis (7) fuscescentibus; posticæ colore pedum posticorum. Abdomen superne uigris lineis transversis fasciatum.

643. PHALÆNA *Macronella*.

— long. lin. $6\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ omnes lanceolatæ, mucronatæ, nitidæ, concolores, pallidæ: antice longitudinaliter fusco-sublineatæ.

Unicam collegi A. 1759. circa *Idriam*.

Palpi porrecti. Lingua ferruginea.

644. PHALÆNA *Scabiosella*.

— long. lin. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 94. Metallica.

Diagn. Alæ antice auratae, margine subtusque una cum posticis utrinque hæmatiticæ lucidæ. Antennæ alis longiores, albæ, basi nigricantes.

Insidet perpetuo floribus *Scabiosæ officin.*

Pigrum, præter ingenium gentis suæ, animal. Sexus unus occipite aurato, antennisque semiuncialibus; alter occipite fusco, antennis lin. (10-11) longis. Femora aurata. Tibiae alis posticis concolores.

645. PHALÆNA *Viridella*.

— long. lin. $3\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ antice viridi-auratae. Femora postica barbata.

Habitat in Sylvis *Idriensibus* Majo M.

Sexus unus antennis, lin. $4\frac{1}{2}$ longis obscure violaceis: apice albis. Alæ postice subtus antennis concolores; postice supra obscure violaceæ, subtus limbo aurato-viridi. Sexus alter antennis fere uncialibus, albidis; pectore barbato; alis subtus obscurioribus.

646. PHALÆNA Barbatella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ glaucæ, aurato-punctatæ. Palpi barbati. Antennæ alis longiores; apice albidæ.

In collibus gramineis *Carnioliae* super.

Difserit a *Reaumurella* Ill. LINNÆI, corpore viridi-æneo, fronte nigra, alis antrosum magis auratis. Huic non pectus, non seniora ulla barbata; alæ etiam subtus nullæ tintura rubro-violacea fulgidæ, ut in priore.

647. PHALÆNA Degeerella.

— long. lin. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 540.

Faun. Svec. 2. 1393.

Diagn. Alæ nigræ; fascia argenteo-aurea. Antennæ longæ.

Labaco misit Amicissimus & R. P. WULFEN.

Ill. LINN. in Syst. Nat. fasciam argenteam, in Faun. Svec. 2. flavam, ponit; ego inter utrumque colorem medium video.

648. PHALÆNA Cræfella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ sature violaceæ: anticæ fascia, basi & apice, lineisque longitudinalibus (5-7) aureis. Antennæ longissimæ, albidæ.

In *Erythronio* vulg. capta circa Idriam.

Pulcherrima; alis ita coloratis, ac si argento lævigate sature violaceus color superinductus fuisset. Fascia alæ medium occupat, lineæ limbum: quarum mediæ longiores, ut fistulæ in organo. Ad basim alæ lineæ aliæ quinque longitudinales, pariter aureæ. Alæ eadem subtus fascia aurea, sed absque lineis. Dorsum aureum, præsertim anticæ. Caput rufis pilis pubescens. Antennæ lin. 6 $\frac{1}{2}$ longæ. Cræfæas ostentat opes, vanumque nitorem.

649. PHALÆNA Rufimittrella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Caput lana rufa vestitum. Corpus nigrum. Alæ fuscæ: anticæ supra fusco-viridi æneæ.

In

252

Phalæna.

ORDO III.

Phalæna.

In sylvestribus, non rara, in floribus Majo M.
Femora postica barbata & crassiora. Alæ posticæ fimbria alis anticis concolore. *Ph. Capitella* LINN. Faun. Svec. maculas tres albido-slavecentes in singulis alis superioribus habet, caput vero lana helvola vestitum, ergo non nostra, quæ *Calathellæ* LINN. proxima.

650. PHALÆNA *Hemerobiella*.

FRISCH. Inf. I. Tab. II. fig. 4. 6.

Diagn. Alæ anticæ canæ, fusco-punctulatæ. Tibiæ posticæ plumosæ.

Larva degit intra tubulum rufescens, apice trigonum, qui foliis perpendiculariter inpositus pallim appetet, & circumfertur a larva de loco in locum.

651. PHALÆNA *Vorticella*.

— long. lin. 2 $\frac{1}{4}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1381. *cinctella*.

Diagn. Nigra; alis anticis fascia alba, linearis.

In foliis fruticum, frequens.

Vorticellam dixi, quia sedens, circa idem punctatum, se se in circulum saepe gyrat. Huic præterea alæ sedentis planæ. Antennæ tibiæque posticæ albo-annulatæ.

652. PHALÆNA *Obscurella*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Fusca; alis anticis supra fusco-auratis, apice subhæmatiticis.

In Carniolia interiore.

Caput, thorax, pedes, colore alarum superiorum.

653. PHALÆNA *Fenestrella*.

— long. lin. 3.

Diagn. Alæ anticæ albidae; maculis punctisque nigris, postice nebula subaurata.

Circa fenestras occurrit, primo vere.

Hæc, cum sequentibus aliis quatuor, caput album habet. Puncta & maculae pleræque insident margini crassiori.

654. PHALÆNA *Scalella.*

— long. lin. 2.

Diagn. Alæ anticæ albæ; tribus paribus punctorum nigrorum, contiguorum, totidem obliquas æque distitas veluti fascias præferentium.

Majo M. reperitur, ruri.

Fasciolæ illæ scalam repræsentant, licet quandoque unicum punctum sit, cum aliis in unam longitudinaliæ quasi lineam coalescens. Palpi albi: articulo ultimo punctis binis atris.

655. PHALÆNA *Punctella.*— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ niveæ; punctis fuscescentibus, in apice confluentibus, variegatae.

Ruri degit, inter *Corylos*.

Antennæ albæ, fusco-annulatae. Oculi nigri. Caput cum thorace niveum. Alæ anticæ obsoleta fascia punctisque fuscescentibus: pluribus in apice. Tibiæ albæ, nigro-annulatae.

656. PHALÆNA *Comella.*— long. lin. 2 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Capillitium album, alba coma per marginem alæ internum decurrente auctum. Alæ anticæ ferrugineæ; fascia obscuriore, obsoleta, obliqua.

Circa domos & hortos volitat, Junio M.

Ubi definit coma, ibi incipit fascia, sub qua idem alæ margo denuo albicans est. Antennæ albæ, fusco-annulatae.

657. PHALÆNA *Pusiella.*— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ cauda repanda terminatae, posticæ lineares.

In pratis.

Hæc & tres sequentes, alas anticas caudatas habent.

Alæ osseæ, puncto fusco, caudæ imposito.

658. PHALÆNA *Thrafonella.*— long. lin. 2 $\frac{2}{3}$.

Diagn.

Diagn. Alæ anticæ fusco-auratæ, lineis strigisque transversis argenteis, macula nigra ad angulum posticum, in qua puncta tria argentea.

Habitat in herbidis paludosis.

Fascia una integra, tres abruptæ, strigæ duæ. Thorax antice argenteus. Punctum nigrum in cauda, seu lobo, alæ apicem terminante.

659. PHALÆNA *Equiteila.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ caudula e margine exteriore nata, loboque terminatæ: lituris in margine eodem quinis, in opposito vero binis argenteis.

Habitat cum priore.

Intra lobum alæ macula subovata nigra. Lineolæ duæ anticæ obliquæ in formam literæ (V), sed disjunctæ; in alæ limbo puncta tria argentea.

660. PHALÆNA *Aruncella.*

— long. lin. 1 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Alæ anticæ auratæ, cum intermixto violaceo-rubro colore; fronte aureis pilis pubescente.

Copiosa in paniculis *Asteæ*, *Arunci*.

Antennæ nigricantes. Mas fascia pallida linearis; Femina absque alarum fascia.

661. PHALÆNA *Alchimiella.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ aureæ; striga transversa, antica, maculaque lanceolata apicis, laccæ colore.

Circa Idriam reperta.

Oculi nigri. Palpi aurei: apice fusco-rubri. Antennæ subæquales. Frons & alæ auri colorem nitoremque æmulantes. Femora fusco-rubra. Tibiae argenteæ: annulis fuscis. Felices Alchemistæ si tinctura hac solari sua saturare metalla possent!

662. PHALÆNA *Aureatella.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ rubro-auratæ; fascia maculisque aureis.

In sylvestribus locis.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 255

Macula aurea in limbo & alia ad basim, fascia intermedia. Caput rufis pilis pubescens.
Oculi fusci.

663. PHALÆNA Æneella.

— long. lin. 3.

Diagn. Fusca tota; alis anticis æneo-fuscis.

In sylvis.

Statura, habitu, & defectu ruboris alarum superiorum, differt ab *Obscurella*.

664. PHALÆNA Leucocerella.

— long. lin. 2.

Diagn. Alæ anticæ aurato-rubræ; punctis binis, obsoletis, albis.

In sylvis.

Tota nigricans; antennis corpore longioribus: apice albis. Non debet confundi cum *Ph. Scabiosella*, ut ex dictis clare patet.

665. PHALÆNA Luridella.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ argenteæ, anticæ atomis punctisque fuscis inquinatae. Caput cum thorace album.

Circa *Labacum*.

Fimbria alarum posticarum iis latior pallideque rufa. Oculi nigri. Palpi argentei; articulo ultimo basi & apice fusco.

666. PHALÆNA Zolegella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Pallide cervina; alis anticis puncto postico nigro.

Habitat in Avium exuviis, & Insectis adversatis, praesertim *Cancris*.

Huic proxima, & forte eadem, *Phal. Pellionella*. Ill. LINNÆI. Sed nostra non est cana.

667. PHALÆNA Rufella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ griseo-cinereæ, corpore pedibusque rufis.

Cir-

Circa *Labacum*.

Alæ posticæ angustissimæ.

668. PHALÆNA *Murinella*.

— long. lin. 3.

Diagn. Alæ pallide murinæ.

In *Carriolæ* inferiore.

Caput, thorax, corpusque alis concolor.

669. PHALÆNA *Vestianella*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ cinerascentes; costa alba.

Habitat in *Vestimentis*, quæ destruit, ut invido dente rodunt malevoli aliena scripta.

Alæ atomis nigris adspersæ. Antennæ annulis albis. Ingenii ejusdem, quo impudens compilator.

670. PHALÆNA *Arbustella*.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ subargenteæ; puncto nigro.

Inter arbusta, frequens.

Vestianella duplo minor, subargentea, punctulisque obscurioribus irrorata.

671. PHALÆNA *Domicella*.

— long. lin. 3.

Diagn. Albida nitens; alis omnibus apice utrinque nigro nebulosis.

In *cubilibus*, non rara.

Alæ anticæ supra punctis sparsis fuscis.

VI. *Alucitæ*.

672. PHALÆNA *Diductyla*.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 542.

Faun. Svec. 2. 1453.

Diagn. Alæ fuscæ: anticæ semibifidæ: segmento inferiore falcato; omnibus rachi albida.

In pratis nostris frequens.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 257

Dorsum, abdomen, pedesque albidi. Alæ posticæ trifidæ.

673. PHALÆNA Bipuncti dactyla.

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ anticæ cinereæ; punctis tribus, nigris, lineaque fusca longitudinali in limbo.

In sylvestribus.

Alæ super. bifidæ: incisura lin. $1\frac{1}{2}$ longa, segmentis parallelis, supra pari uno punctorum nigrorum, intervallo lin. $1\frac{1}{2}$ ab alæ apice distantium, puncto que alio minore eodem intervallo, a basi aliisque punctis remoto. Alæ posticæ trifidæ, fusco-ferrugineæ nitidæ. Abdomen alis posticis concolor, lineis argenteis dorsalibus binis, lateralibus denuo binis sed ad medium usque non productis, infra item binis; præter has, est lineola nigra lateralis ad basim abdominis.

674. PHALÆNA Ptero-dactyla.

— long. lin. 4.

LINN. Faun. Svec. 2. 1455.

Diagn. Alæ anticæ bifidæ; divisura linearis, punto nigro medio notata.

In pratis steriliорibus.

Alæ apud nos albidae, sed posticæ obscuriores. Punctum antarum parvum valde utrinque conspicuum; sed & punctula alia nigra adhuc minora, lenite admota, observantur.

675. PHALÆNA Tri-dactyla.

— long. lin. 6.

Diagn. Nivea tota; alis anticis ultra medium bifidis; posticis trifidis.

In pratis non rara.

Segmenta alarum superiorum deflexa & falcata. Segmentum infimum alæ posticæ subdistinctum. Oculi nigri. Hanc exprimit Icon P: PODA. Mus. Græc. Tab. 2. fig. 14.

676. PHALÆNA *Hexa-dactyla.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 542.

Faun. Svec. 2. 1458.

FRISCH. Ins. 3. Tab. 7. fig. 2. 5. p. 19.

Diagn. Alæ singulæ sexpartitæ fuscæ, albis transversis lineolis fasciatæ.

Circa Labacum.

Ala antica profunde trifida, segmento extimo paulo magis quam semibifido segmento insimo solitario, hisce intermedio trisido: segmento inferiore duobus aliis longiore. Rachis horum digitorum albis punctis notata, quorum (5) in digito intimo.



OR-

ORDO IV. NEUROPTERA.

LINN. *Syst. Nat.* p. 543.

LIBELLULA.

LINN. l. c.

677. LIBELLULA *Grandis.*

Alæ ant. long. lin. 7.

LINN. *Syst. Nat.* p. 544.

Faun. Svec. 2. 1467.

ROESEL. *Ins. aquat.* Cl. II. Tab. 2. fig. 1. 2.

P. PODA. *Mus. Græc.* p. 96.

Diagn. Thorax pilosus; lineis sex flavis, quarum duo anticæ, totidemque in singulo latere.

Habitat in aquis stagnantibus.

Quisque sua specimina aliter describit, & in qualibet icone singulare quid, nec cæteri proprium observatur. Interim larva eadem, nascendi tempus idem, unaque semper & eadem proportio partium. Specimen nostrum exacte denuncians descriptio nulla hucusque data, cum tamen abdomen gerat attenuatum ex lato principio ut *L. Quadrimaculata*, thoracem abdomini concolorem hirsutumque, ut *L. Grandis*, maculasque flavas abdominales, ut *Forcipata*. Unde ego sane judico species spurias in hoc Generi vel admissas fuisse, vel earum historiam de novo inchoandam, cum differentiæ a coloribus petitæ non sufficient.

Nostræ orum orbiculatum, ferrugineum, subtus planum, supra convexum, apice perforandum a larva nigra, oblonga, pilosa; cauda bifeta, quam alio anno deponit, trivalvem anum induens; haec matura unciam & lin. tres longa, (rostro non computato); rostro inflexo sub thorace, decem lin. longo, biarticulato: articulo inferiore breviore & basi tetragono; superiore concavo, extrorsum dilatato, maxil-

lis terminato tridentatis: dente medio minimo. Hæc natat & ambulat sub aquis vietitans larvis aquaticis aliorum Insectorum, donec Junio M. *Equifeti* culmos adscendens, e dorso *Insectum* pariat, cui frons flava: linea fusca transversa; os apice flavum: linea media longitudinali nigra; caput pone oculos & nucha flavum; thorax fasciis flavis obliquis senis, quarum duæ anticæ. Alæ hyalinæ: basi puncto flavo marginali, alibi immaculatae, linea nigricante, aut rufo-nigra marginali versum apicem. Inter alas maculæ duæ flavæ dorsales: inferiore majore fere hemisphærica, marginata; abdomen nigrum, a basi convergens, postice denuo divergens, apice iterum convergente, quale *Libellula* suæ maxime N. 72. N. 2. tribuit R A J U S; idem fasciis (7) flavis, quibus interjacent lineæ flavæ transversæ totidem. Pedes nigri. Vidi larvam in stomacho *Alcedinis Hispidae*, 21. Nov.

678. LIBELLULA Depressa.

— long. unc. 1. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Abdomen lanceolatum triquetrum. Alæ singulæ ad apicem linea nigra; basi nigricante aut flava macula notatae.

Habitat in aquis stagnantibus.

Larva in humo spongiosa impalpabili lutescens, tardigrada, ore bivalvi: valvis virescentibus, rostro inflexo maxilloso, abdomine trigono: subtus fulvescente, pedibus ciliatis.

Insectum cui alæ anticæ latitudo in medio lineæ ad apicem collocatae desumpta, æqualis est latitudini abdominis segmenti quinti aut tertii.

Variat 1. *Libell.* ab domine lanceolato triquetro fusco: basi lateribusque flavescentibus.

LINN. Syst. Nat. p. 544. depressa.

Faun. Svec. 2. 1463.

ROESEL. Ins. aquat. Cl. II. Tab. 6. fig. 4.

Abdomen colore maculæ baseos alæ singulæ nigro variegatae, sed margine linea dorsali & segmentis (3-4) ultimis in medio nigricantibus. Alios colores habet **LINN.** sed maculæ & lineæ alarum nostram indicant.

LIBELLULA. NEUROPTERA. LIBELLULA. 261

2. *Libell.* abdomine lanceolato, triquetro, fusco; segmentis singulis macula fulva laterali. Maculæ alarum fuscæ, rufis venulis reticulatæ, lineaque rufa longitudinali.

3. *Libell.* abdomine lanceolato, triquetro, cærulecente.

ROESEL. Ins. aquat. Cl. II. Tab. 7. fig. 3.

Varietatem hanc ad *Libell.* suam *Depressam* retulit Ill. LINNÆUS, cui alarum maculæ ut in priore.

4. *Libell.* abdomine lanceolato, triquetro, cærulecente; segmentis, 3. 4. 5. fuscescentibus. Huic & priori abdomen pulviculo cærulecente adspersum; hæc vero segmentis tribus dictis macula laterali flavescente utrinque notatis.

679. LIBELLULA *Quadrimeaculata.*

— long. unc. 1. lin. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 543.

Faun. Svec. 2. 1459.

P. PODA. Mus. Græc. p. 95.

Diagn. Abdomen triquetrum; segmentis postice descrecentibus, appendicibus apice divaricatis. Alæ anticæ basi luteo-aurantiæ, posticæ basi macula nigra; singulæ macula media lineaque ad apicem fulcis marginalibus.

Habitat in fossis, circa *Labacum*.

Variat 1. abdomine basi aureo-fulva subpellicula lucida.

2. abdomine obscuriore opaco.

680. LIBELLULA *Vulgata.*

— long. unc. 1. & lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 543.

Faun. Svec. 2. 1461.

Diagn. Alæ basi immaculatæ; lineola flavescente marginali ad apicem. Abdomen triquetrum, postice attenuatum.

Circa aquas fluentes.

262 Libellula. ORDO IV. Libellula.

Variat 1. Thorace abdomineque cæruleis, hujus tamen apice nigro; linea marginalis marginibus nigris.

2. Thorace abdomineque flavescentibus; linea alarum concolore RAJI.
Inf. 49. n. 6.

681. LIBELLULA *Virgo*,

— long. unc. 1. & lin. 2.

Diagn. Abdomen lineare teres; particulis caudalibus superioribus incurvis. Alæ crecta, triplo latiores quam thorax.

Habitat in aquis fluentibus.

Var. a) Alis coloratis.

LINN. Syst. Nat. p. 545.

Faun. Svec. 2. 1470.

1. Alis violaceis; apice excolore.

Thorax & abdomen violaceo-cæruleo colore tincta.

2. Alis violaceo - evanidis, abdomen viridi.

Color alarum violaceus evanescit in alio oculi situ, & in fuscum transit.

3. Alis fusco violaceis: basi & apice excoloribus; abdom. violaceo-cæruleo.

ROESEL. Inf. aquat. Cl. II. Tab. 9. fig. 7.

4. Alis fusco-ferrugineis; puncto marginali albo ad apicem. Abdom. basi viridi.

ROESEL. I. c. fig. 6.

5. Alis fusco ferrugineis, absque puncto marginali, thorace abdomenque violaceis; apice obscure cæruleo.

Var. (b) Alis excoloribus.

6. Alis excoloribus: veni: viridibus: puncto albo marginali ad apicem.

Frons, thorax, abdomen aurato-virens.

682. LIBELLULA Puella.

— long. lin. 10.

Diagn.: Abdomen teres, lineare, alis longius; particulis caudalibus exiguis rectis. Alæ erectæ hyalinæ, nervis obscurioribus reticulatæ.

LINN. Syst. Nat. p. 546.

Faun. Svec. 2. 1471.

Habitat in aquis stagnantibus.

Var. (a) Alis puncto fusco marginali ad apicem.

1. Abdomine ferrugineo, dorso & capite maculis flavis.

2. — cæruleo maculisque cæruleis.

ROESEL. Ins. aquat. Cl. II. Tab. 10.

fig. 3. 5. Tab. 11. fig. 7.

3. — nigro: maculis albis.

4. — rufo-rubro: segmentis tribus ultimis virescentibus.

5. — rufo: linea dorsali segmentisque tribus ultimis virescentibus.

6. — fusco-viridi: subtus albo.

7. — segmentis 1-5 sanguineis: margine fusco.

(b) Alis absque puncto marginali.

8. Abdom. fusco: segmentorum marginibus albidis.

Omnibus larva ambulatoria; ligulis caudalibus fusco-fasciatis.

EPHEMERA. (+)

LINN. Syst. Nat. p. 546.

683. EPHEMERA Vulgata.

— long. lin. 8½.

LINN. Syst. Nat. p. 546.

Faun. Svec. 2. 1472.

Diagn.: Cauda trifeta. Alæ fusco-reticulatae maculataeque.

T 4

In

(+) Larva aquatica, vita brevis, antennæ sunt setulæ cylindris inarticulatae. Alæ erectæ: posticæ minimæ. Pedes antici porrecti.

264 Ephemera. ORDO IV. Ephemeræ.

In aquis fluentibus copiosior, quam in stagnantibus.

Nigricans; abdomine albido: incisuris singulis subtus lineolis binis longitudinalibus nigris. Sexu uni setæ caudales unciam cum dimidia longæ, alteri duplo breviores. Recens nata, alas fordide flavicantes habet. Meridie choreas aereas instituit, sursum recta tendens, rediensque eadem fere via. Hujus tanta copia, circa Laz, e rivo quodam, Junio M. nascitur, ut vicini Rustici exiguum messem se collegisse putent, nisi quilibet ultra viginti currus his insectis probe onustos, in agrum exoneraverit, stercoreationi optime inservientes.

684. EPHEMERA Gemmata.

— long. lin. $7\frac{1}{2}$.

Diagn. Tubercula tria frontalia, diaphana, crystallina, nigro-punctulata. Corpus rufum.

Habitat circa aqueductus Podiarum Ilriensium.

Hæc & sequentes caudam biforam gerunt. Incisuræ abdominis marginibus flavicantibus. Setæ caudales unciales.

685. EPHEMERA Albipes.

— long. lin. $3\frac{1}{2}$.

Diagn. Fusca; oculis rufescentibus; pedibus albidis.

In aquosis.

Oculorum ambitus pallidior. Alæ villosumæ. Setæ caudales albidæ, corpore duplo longiores.

686. EPHEMERA Culiciformis?

— long. lin. $4\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 547.

Faun. Svec. 2. 1475.

Diagn. Thorax linea longitudinali nigra. Oculi nigri, supra quos tubercula duo brunea.

Habitat circa aquas & paludes.

Corpus fuscum & alæ albidæ *Culiciformis* LINN. sed setæ caudales corpore fere duplo longiores in uno sexu saltem. Alæ hyalinæ, venosæ.

687. EPHEMERA Parvula.

— long. lin. 2.

Diagn.

Phryganea. NEUROPTERA. Phryganea. 265

Diagn. Alba; capite thorace abdominisque apice nigris.

In paludosis, Majo M.

Oculi rufi, alae hyalinæ. Setæ abdominales alis duplo longiores, albæ. Abdomen pellucens.

PHRYGANE A. (†)

LINN. *Syst. Nat.* p. 547.

(*) *Alis deflexis.*

688. PHRYGANE A. Striata.

— *long lin. 7.*

LINN. *Syst. Nat.* p. 547.

Faun. Svec. 2. 1483.

Diagn. Corpus nigricans. Alæ fusco-testaceæ, antennarum longitudine.

Circa aquæductus.

Mas. Alæ immaculatæ, pedibus concolores. Abdomen terminatum molli spinula utroque in latere.

Fæmina. Alæ obscuriores, testaceo-punctatæ; margine externo albis punctis variegato.

Uterque, oculis bruneis, occipite piloso, antennis fusco rufoque variis longitudine alarum.

689. PHRYGANE A. Albicornis.

— *long. lin. 8.*

Diagn. Alæ anticæ albidæ; linea media transversa venisque fuscis longitudinalibus. Nucha albis pilis pubescens. Antennæ albidæ, alarum longitudine.

Ad aquas.

Oculi nigri. Palpi lin. ($1\frac{2}{3}$) longi. Alarum superiorum apices testacei. Alæ posticæ fuscæ: venis obscurioribus. Corpus fuscum. Pedes alis anticis concolores.

(†) *Phrygan.* 1. ordinis, præsertim parvulæ, *Phal. Tineæ* ut ovum ovo similes, sed alæ pilosæ & palpi ad os incurvi detrahunt larvam.

266 Phryganea. ORDO IV. Phryganea.

690. PHRYGANEA *Ruficrus.*

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ fuscæ atro-rufæ; venis fusca scis. Femora rufa.

Habitat in aquis fluentibus.

Alæ fuscæ sunt si a longe observentur, sed luci oppositæ & propius inspectæ fusco rufæ videntur. Thorax, caput, antennæ, tibiæ, corpus totum, nigri coloris. Thorax caput inter & pedes anticos fulvus. Antennæ basim versus crassiores, quam in aliis omnibus nostris.

691. PHRYGANEA *Ferruginea.*

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Ferruginea tota; alis anticis fusco-obliterque reticulatis; oculis nigris.

In sylvis secus aquas; Majo M.

Abdomen punctis nigris lateralibus tot, quot ejus segmenta. Antennæ lin. (6) longæ, ferruginea. Sexus alter maculam albida rotundam communem, punctaque alba (5-6) in margine externo alarum anticarum.

692. PHRYGANEA *Bimaculata.*

— long. lin. 8 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ testaceæ nitidæ: macula fuscæ marginali.

Circa *Labacum* capta.

Corpus fuscum. Antennæ pedesque alarum super. colore. Macula harum dicta insidet margini superiori versus apicem. Alæ posticæ hyalinæ. Abdomen linea albida laterali.

693. PHRYGANEA *Variegata.*

— long. lin. 5.

Diagn. Alæ anticæ fuscæ; punctis ferrugineis. In aquosis, & circa torrentes.

Antennæ longitudine fere aliarum superiorum, ferruginea. Oculi, corpus, femora nigricantia. Caput ferrugineis villis pubescens. Tibiae ferruginea.

Phryganea. NEUROPTERA. Phryganea. 262

694. PHRYGANEA *Tineoides.*

— long. lin. 3 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Alæ anticæ fusco-ferrugineæ. Antennæ corpore triplo & ultra longiores, fuscæ, albo annulatæ.

In plantis lacustribus, Junio M. non rara.

Descriptio *Phr. Longicornis* LINN. huic minime apturi potest. Nostra *Phal. Tineam* longissimis antennis exacte refert. Alæ posticæ fuscæ. Pedes alis anticis concolores. Corpus fuscum, tres lineas longum.

695. PHRYGANEA *Obfuscata.*

— long. lin. 3 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Fuscescens tota; pedibus ferrugineis.

Circa lacus, & fontes, primo vere.

Antennæ crassissimæ, nigricantes, alis breviores.

696. PHRYGANEA *Fuliginosa.*

— long. lin. 3 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Supra lucida nigra; alis subtus fuscis; antennis nigris, albo-annulatis; pedibus albidis.

Circa aquas.

Corpus nigrum, lin. (2 $\frac{1}{2}$) longum. Alæ nigrae, sed cæruleo quodam aut viridi translucente colore, ut ideo non male ad *Phr. Nigram* LINN. reduci posset.

697. PHRYGANEA *Testacea.*

— long. lin. 3 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Fusco testacea; alis fimbriatis: posticis fuscescentibus.

Prope aqueductus.

Habitus, alarumque fimbria, ut in *Ph. Tinea*. Pedes subferruginei. Corpus alis anticis duplo brevius.

698. PHRYGANEA *Pyralina.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ fusco-hyalinæ, pilosæ. Pedes ferruginei.

268 Phryganea. ORDO IV. Phryganea.

Passim circa rivos, fontes, paludes.

Noctu cubilibus involat copiose & avide lumen appetens, hinc alia die in lucernis nocturnis immersæ plurimæ reperiuntur.

699. PHRYGANE A Dubia.

— long. lin. 5.

Diagn. Antennæ deflexæ, pectinatæ. Corpus nigrum, tomentosum.

Prodierunt mihi tres ex eo cylindro, ex quo *Phr. Rhombica LINN.*

CL. P. PODA, hanc ipsam descripsit & submisit sub nomine *Tentrelinis hirsutæ* Mus. Græc. p. 102. Quid ergo statuendum? An est proles parasitica *Phalæna Bombycis*? sed alæ pilosæ *Lepidoptero* nulli. Nigra est & valde tomentosa; alis nigricantibus pilosis deflexis: posticis plicatis. Os valde barbatum, aut palpos occultat, aut palpi sunt ita lanati, vel nulli prorsus.

700. PHRYGANE A Peclinicornis.

— long. lin. 5½.

Diagn. Antennæ deflexæ, pectinatæ. Alæ & dorsum canescens. Abdomen ferrugineum.

Natae mihi duæ ex eo cylindro, unde *Phr. Grandis LINN.*

Facies prioris, sed non nigra, major; thorace magis tomentoso.

(**) *Alis planiusculis.*

701. PHRYGANE A Martia.

— long. lin. 5.

Diagn. Alæ incubentes, hyalinæ, immaculatæ; venulis fuscis. Corpus fuscum. Pedes testacei.

Habitat in aquæductibus *Idriensis*, M. Martio circumvolans.

Antennæ nigrae, alarum longitudine. Frons tuberculis tribus. Thorax linea depressa, transversa, antica, sub qua foveolæ nonnullæ. Palpi colore pedum. Abdomen muticum, subtus fusco-testaceum.

Phryganea. NEUROPTERA. Phryganea. 269

702. PHRYGANEA *Regelationis.*

— long. lin. 4.

Diagn. Tota nigra; alis fuscous, incum-
bentibus, hyalinis.

Circa fluvios volitat etiam M. Februario.

Inter caput & thoracem plica transversa pal-
lida. Abdomen muticum, supra plicæ prædictæ
concolor.

703. PHRYGANEA *Grammatica.*

— long. lin. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 99.

Diagn. Flava; linea lunata, nigra, fronti in-
scripta; abdomine biseto.

In aquosis & paludosis.

Alæ hyalinæ, albidae, immaculatae, antennis
longiores. Antenn. basi flavæ, extrorsum fuscæ.
Oculi nigri. Abdomen supra nigricans, setis cau-
dalibus longius. Scutellum tuberculis binis.

704. PHRYGANEA *Tripunctata.*

— long. lin. 3½.

Diagn. Flava; tuberculis tribus, frontalibus,
oculisque nigris; abdomine biseto.

Majo M. capta in aquosis.

Diversa a priore, statura, colore homogeneo,
defectu lunulae frontalis.

705. PHRYGANEA *Maxima.*

— long. unc. 1. & lin. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 548. bicaudata.

Faun. Svec. 2. 1489.

P. PODA. Mus. Græc. p. 99.

Diagn. Gigas nostrarum; setis caudalibus an-
tennarum longitudine; capite fulvo: antice trunc-
ato, tuberculis quinque: lateralibus majoribus ful-
vis, intermediis tribus nigris.

Habitat in torrentibus, præsertim Idria.

Ovulum nigrum, quorum plurima in globum
unita fæmina sub ventre circumfert, ut aranea sac-
cifera suum saccum.

Lar-

Larva perfecta testacea, decem lin. longa, littera (π) nigra in occipite notata, dorso linea nigra undique submarginali, aliaque media longitudinali, puncto nigro utrinque inter lineam medium & marginem. Posticus thorax punctis nigris tribus, quorum medium tetragonum. Abdomen incisuris margine nigris. Pedes immaculati. Tibiæ externo latere ciliatae. Tales *larvas* integras eduxi ex ventriculo *Adeæ* cuiusdam. Parituræ deferrunt aquas, Aprili & Majo M; irrepunt *Salicibus*, vicinisque hortorum sepibus, unde nascitur

Insectum antennis nigris (6-7) lin. longis; oculis nigris. Thorace nigro, marginato, lateraliter cicatrizzato. Corpore subtus subferrugineo. Alis nitidis, albidois; venis fuscis ramosisque. Pedibus fuscis. Setis caudalibus fuscis: articulis (43-46): *Phryganeas* hasce prædantur *Lacertæ Agiles*.

HEMEROBIUS.

LINN. *Syst. Nat.* p. 549.

706. HEMEROBIUS Fulvicephalus.

— long. lin. 10.

Diagn. Alæ hyalinæ; maculis marginalibus venuisque fuscis reticulatae. Caput fulvum. Corpus nigricans.

Circa aqueductus *Fodinum Iりiensium*, non rarus.

Facies *Hem. Formicaleonis*, sed antennæ minime clavatae. Alæ acuminatae. Oculi fusco-virescentes. Collum utrinque dentatum. Caput fulvum; tuberculis tribus occipitalibus. Palpi fulvi. Abdomen inflexum, antennis longius. Corpus nigricans, lin. (5½) longum.

707. HEMEROBIUS Flavus.

— long. lin. 7½.

Diagn. Flavus; oculis nigris.

Circa aquas volitat, etiam primo vere

Antennæ quoque flavæ. Abdomen muticum. Alæ hyalinæ albæ; venuis pallide virescentibus.

708. HEMEROBIUS *Chrysops.*

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 549.

Faun. Svec. 2. 1505.

FRISCH. Ins. 4. Tab. 23. fig. 5. p. 40-41.

Diagn. Viridi nigroque varius. Alæ hyalinæ viridi-fuscoque reticulatæ.

Circa fluvios, & *Salices* volitat.

Vasorum trunci in alis, ut & primi rami, luteo-virentes; ultimi ramuli fasci.

709. HEMEROBIUS *Perla.*

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 549.

Faun. Svec. 2. 1504.

ROESEL. Suppl. Tab. 21. formical. fig. 4.

Diagn. Corpus virens. Oculi viridi-aurati. Alarium vasa viridia.

Habitat cum priore.

Dubito, num Synon. FRISCHII superioris speciei, huc referendus sit, cum dicat animal anno succum fundere stercoris humani odore.

P A N O R P A.

LINN. Syst. Nat. p. 551.

710. PANORPA *Communis.*

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 551.

Faun. Svec. 2. 1516.

FRISCH. Ins. 9. Tab. 14. fig. 1. mas.

P. PODA. Mus. Græc. p. 100.

Diagn. Alæ æquales; macula apicis, fascia obsoleta, vasisque fuscis.

Passim in hortis & pratis.

Rostrum corneum, subvillosum; plica laterali; apice lacero-papilloso, terminatum superne corporis duabus bifidis palpigeris: palpis 4-articulatis, subtus corpore oblongo obtuso sustinente maxillas edentatas: apice nigro.

R A P H I D I A.

LINN. Syst. Nat. p. 552.

711. RAPHIDIA *Ophiopsis*.— long. lin. 5 $\frac{2}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 552.

Faun. Svec. 2. 1517.

ROESEL. Suppl. Formic. Tab. 21. fig. 6. 7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 101.

Diagn. Corpus nigrum. Pedes æquedissiti.

Habitat etiam in sylvis.


Maxillæ tridentatae. Palpi (4); basi albis articulis (3-4). Antennæ lin. (2 $\frac{1}{2}$) longæ. Thorax longus, capite tenuior. Alæ hyalinæ; venis atris, pilosis reticulatae; macula fusca marginali. Abdomen segmentis subtus margine albido, supra punctis tribus albido. Femora nigra. Tibiae ferrugineaæ.

712. RAPHIDIA *Mantispa*.— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.P. PODA. Mus. Græc. pag. 101. Tab. 1.
fig. 15.

Diagn. Pedes antici, a reliquis remoti ex apice thoracis prope caput orti; tibiis fuscescentibus latis, subtus spinosis.

In Carniola calidiore, ad sepes.

Thorax, & femora antica flavescentia. Pedes alii pariter flavi. Alæ macula marginali ferruginea. Manuum anticarum loco uncus reflexus.



OR-

O R D O V.
A C U L E A T A.

H Y M E N O P T E R A.

L I N N. *Syst. Nat.* p. 553.

C Y N I P S .

L I N N. *Syst. Nat.* p. 553.

713. CYNIPS *Rosæ*.

Alæ anticæ long. — lat. —

L I N N. *Syst. Nat.* l. c.

Faun. Svec. 2. 1518.

F R I S C H. Inf. 6. N. 1. Tab. 1. N. 3.

Diagn. Abdomen ferrugineum; postice nigrum.
Pedes ferruginei.

Habitat in *hispida Galla Rosæ caninæ*, *Bedeguar.*
officin.

714. CYNIPS *Hieracii*.

— long. — lat. —

L I N N. *Syst. Nat.* l. c..

Faun. Svec. 2. 1519.

Habitat in *Hieracio murorum*, galla caulina,
hirsuta.

715. CYNIPS *Glechomæ*.

— long. — lat. —

L I N N. *Syst. Nat.* l. c.

Faun. Svec. 2. 1520.

Habitat in *Glechoma hederacea*, galla folii sub-
hirsuta.

716. CYNIPS *Quercus petioli*.

— long. — lat. —

U

L I N N.

274 Cynips. ORDO V. Tenthredo.

LINN. Syst. Nat. p. 554.

Faun. Svec. 2. 1523.

ROESEL. Suppl. Tab. 35. 36. fig. 16. 17.

Habitat in ramulo *Quercus*, gallamollis, rubella.717. CYNIPS *Quercus* folii.

— long. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 553.

Faun. Svec. 2. 1521.

FRISCH. Inf. 2. Tab. 3. fig. 3. 6. 7.

Habitat infra folia *Quercus*, galla rotunda 5.
locularis, cum Vitiolo soluto atramentum con-
stuenſ.718. CYNIPS *Salicis* strobili.

— long. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 554.

Faun. Svec. 2. 1532.

J. BAUCH. Hist. Plant. 1. p. 2. p. 313.

FRISCH. Inf. 12. Tab. 1.

Habitat in summitatibus virgarum *Salicis*, galla
strobiliformis.Aliæ gallæ multæ, unde species alia, ut in *Ge-
nistæ sagittalis* summitatibus, *Veronicae chamædr.* sum-
mitatibus, *Populo alba* ad originem petioli &c.

T E N T H R E D O.

LINN. Syst. Nat. p. 555.

(*) Antennis claratis.

719. TENTHREDO Lutea.

Alæ anticæ long. lin. 10½.

LINN. Syst. Nat. p. 555.

Faun. Svec. 2. 1534.

ROESEL. Vesp. Tab. 13. fig. 5.

FRISCH. Inf. 4. Tab. 25. fig. 3. 4.

Diagn. Nigra; antennis ferrugineis; abdom.
articulis primis duobus nigris, cæteris flavis.Habitat in *Salice*.Crassities abdominis superat longitudinem an-
tennarum. Tibiæ ferrugineæ. Aculei valvæ
pilosæ.

Tenthredo. ACULEATA. Tenthredo. 275

720. TENTHREDO Amerina.

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 555.

Faun. Svec. 2. 1536.

ROESEL. Vesp. Tab. 11. fig. 1.

Tab. 1. fig. 5. alter sexus?

Diagn. Nigra; albis villis tomentosa; antenn. clava, abdominis apice, tibiisque rufis.

Habitat in Salice.

Maxillæ magnæ, tridentatae, validæ, squama albida plana marginata obtusa seniunctæ. Alæ apicibus fuscis. Abdominis segmenta subtus pleraque rufa. Corpus cinereum ponit LINNAEUS, sed vere nigrum est.

721. TENTHREDO Nitens.

— long. lin. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 556.

Faun. Svec. 2. 1539.

P. PODA. Mus. Græc. p. 102.

Diagn. Tota viridi-cærulea, nitens; antennis ferrugineis; pedibus luteis.

Inveni in floribus.

Ante maxillas squama hemisphærica, ferruginea. Maxillæ basi unidentatae. Alæ superiores costa ferruginea; litura in medio transversa fusca, fasciam mentiente. Aculeus ferrugineus. II. LINN. specimen caput & thoracem nigra possidet, quæ in nostris abdominis colorem habent.

(**) Antennis filiformibus: articulis (7-8). (+)

722. TENTHREDO Rosea.

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 555.

Faun. Svec. 2. 1549.

U 2

Diagn.

(+) Metu percusse antennas deflectunt, coloribus variant ratione sexus; hinc specierum verarum hujus Generis cognitio etiamnum manca.

276 Tenthredo. ORDO V. Tenthredo.

Diagn. Corpus totum supra nigrum, subtus viridi-luteum. Antennæ, una cum costa alarum anticarum, nigrae.

Apud nos passim occurrit.

Caput nigrum, sub antennis nigris flavum. Thorax niger; linea laterali flava. Scutellum flavum. Adominis segmenta tria prima margine flavescentia; subtus omnia flava. Femora flava, cum aliquo virore. Tibiae apice nigricantes. Manus nigrae.

Variat statura minore, abdominis lateribus fasciis tot quod incisuræ, quæ supra subtusque nigrae; marginibus flavis. Manibus flavo-nigroque variis.

723. TENTHREDO *Mesomela*.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 557.

Faun. Svec. 2. 1549.

Diagn. Flava; vertice capitis thoraceque supra nigra. Sub scutello par unum punctorum flavescentium. Abdomen linea dorsali nigra a basi ad apicem producta.

In Carniola non rara.

Descriptio *T. Mesomelæ* Cel. LINNAEI huic magis, quam ulli aliæ convenit, licet in multis specimina nostra differant a *Linnæano*; iis enim antennæ supra nigrae, subtus flavæ. Caput flavum, oculis nigricantibus, macula nigra inter oculos in qua puncto duo flava cum intermedio tuberculo flavo. Thorax dorso nigro, flavo-variegato. Scutellum flavum sub quo utrinque punctum flavum. Abdomen flavum totum, sed linea longitudinali nigra in medio superne pictum. Thorax ad latera & subtus flavo-virens, immaculatus. Pedes flavo-virides; manus similiter coloratae, sed annulis nigris fasciatæ. Alæ ad apicem macula obsoleta, ferruginea; costa flavecente.

724. TENTHREDO *Montana*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; tuberculis binis, flavescentibus sub scutello; alis anticis costa nigrae.

Tenthredo. ACULEATA. Tenthredo. 277

In montanis districtus *Ibrienfis*, super umbellas floridas *Laserpitii filer.* in copula cuncta.

Mas inermis, totus niger; tuberculis scutello subditis albidis; lamina maxillotega alba; palpis albis; pedibus anticis mediisque totis pallide flavis: posicis femorum basi lutea; abdominis apice lineola alba terminata; ligulis binis albis genitalia protegentibus.

Femina aculeata major, linea thoracis utrinque flava a basi alae anticæ sursum tendente, lamella maxillotega flava, palpis albidis, pedibus flavis ubi in mare albidi, abdomine basi fascia flava maculisque binis lateralibus utrinque, tuberibus binis flavis genitale protegentibus.

725. TENTHREDO *Temula.*

— long. lin. $5\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra ore, punctis duobus sub scutello; abdominis cingulo tertio, tibiisque flavis.

In floribus *Petrofælini temuli*, frequens.

Abdomen subtus nullibi flavum; segmento quarto macula laterali, flava, cingulo adjacente. Femora antica & media supra flavescentia, subtus nigra; postica tota nigra. Alae anticæ linea nigra marginali; costa antice ferruginea.

Tenth. Campestris LINN. differt a nostra, antennis flavis, punto ferrugineo ante oculos, scutello flavo, abdome luteo: basi & apice nigro, alarum macula ferruginea.

726. TENTHREDO *Cingulata.*

— long. lin. $3\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigra; punctis binis sub scutello; abdominis basi macula trigona cinguloque quinto flavis.

Ruri degit.

Priore duplo fere tenuior; ore nigro; palpis flavis; cingulo abdomen totum adinstar annuli amplectente. Femora postica subtus nigra: supra flava. Tibiae rufæ.

Neque hæc *Tenth. Campestris LINN.* dici potest.

727. TENTHREDO *Fusciata*.

— long. lin. 4.

Diagn. Nigra; ore, abdominis cingulis duobus, pedibusque luteis.

In collibus & campis Carnioliae super.

Antennæ basi flavæ. Palpi flavi. Puncta duo lutea sub scutello. Linea thoracis utrinque alarum costis parallelæ. Fascia cinguli abdominis primi semicylindrica subtus non præsens, diniidium segmenti ejusdem occupans; fascia secunda occupat totum segmentum quintum supra & infra. Pedes toti lutei, sed genua postica nigra.

Tenth. *Rufipes* LINN. eadem fere, sed nomina rerum a fallacibus notis desumpta non placent.

728. TENTHREDO *Fulvipes*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; abdominis segm. 3, 4, 5, pedibusque fulvis.

In Salice capta, 3. May. M.

Antennæ supra nigræ, subtus fulvæ. Linea circa oculos, lamella maxillotega, palpi, & maxilla basi, pallide lutea. A basi alæ superioris ad apicem thoracis linea flava utrinque. Puncta duo flava sub scutello. Abdomen linea lutea laterali; segmentis diætis & diniidia parte sexti supra fulvis & subpellucidis. Femora tibieque fulvæ; manus nigrantes. Alæ antice puncto nigro aut fusco marginali. Inter femora antica & media punctum flavum utrinque.

729. TENTHREDO *Atra*.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 557.

Faun. Svec. 2. 1552.

Diagn. Nigra; ore flavo; pedibus ferrugineorufis.

Ruri degit.

Antennæ abdominis longitudine. Alarum anticarum bases pedibus concolores, in harum costa linea nigra. Thorax linea flava a basi alæ super ad apicem utrinque producta.

Tenthredo. ACULEATA. Tenthredo. 279

730. TENTREDO *Craffa.*

— long. lin. 6.

Diagn. Nigra; antenn. apice, costa alarum anticarum, tibiis, manibusque rufis.

In Carniolia calidiore.

Corpus crassum, nigrum. Maxillarum bases & palpi rufi. Tubercula duo rufa sub scutello. Ante bases femorum omnium macula albo-virens. Alæ apice fuscescentes.

731. TENTHREDO *Flava.*

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 103.

Diagn. Antennæ, costa alarum superiorum, abdom. articuli quatuor primi, pedesque rufi. Caput, thorax subitus, & abdominis apex, nigra.

Habitat in Carnioliae interioris apricis.

Os flavum. Thorax supra rufus. Alarum omnium apices fuliginosi. Ante femora postica macula flavescens.

Tenth. *Abietis.* LINN. definitio, huic quoque convenit, quæ *Pratensis.* Syst. Nat.

732. TENTHREDO *Signata.*

— long. lin. 4.

Diagn. Nigra; punctis infra scutellum binis, manibusque posticis flavescens.

Circa Idriam. Aprili. M. capta.

Tota nigra. Macula albida ad bases femorum posticorum. Tibiæ anticæ & posticæ flavescentes. Alæ hyalinæ; anticæ costa fusca.

733. TENTHREDO *Carbonaria.*

— long. lin. 3.

Diagn. Tota nigra, nitens; abdominis articulis singulis utroque latere puncto depresso superne notatis.

In floribus *Hellebori rosei*, copiosa, Aprili M.

Alæ fuscescentes, hyalinæ, puncto nigro marginali. Maxillæ apice bidentatae. Antennæ lin (1 $\frac{1}{2}$) longæ. Aculeus ferrugineus, rectus. Alæ ad lenticem punctulis obscurioribus, piliferis, adspersæ.

734. TENTHREDO *Ribesii*.

— long. lin. 2½.

Diagn. Nigra; abdomine subtus pedibusque flavescentibus.*Habitat* in *Ribesio rubro* & *Grossularia*.*Larva* pallide virens, tuberculis nigris parvis pilosis adspersa; capite nigro; folliculum paratura ponit exuvias, pallida immaculata glabra fit; oculis nigris; segmento corporis primo duobusque ultimis luteis; dein alia die in eodem ramulo folliculum parat, ovo formicæ similem, pallide luteum, unde post dies (14), orbiculariter exciso apice, nascitur*Insectum* nigrum, lin. (2½) longum; maxillis edentatis, abdomine pone dilatato, subangulato; alis hyalinis; puncto fusco marginali; pedibus flavescentibus; antennis longitudine abdominis, quod subtus plerunque flavescens.735. TENTHREDO *Cerasi*.

— long. lin. 2½.

LINN. Syst. Nat. p. 557.*Faun. Svec.* 2. 1547.*Diagn.* Nigra tota; pedibus luteis.*Habitat* in *Pruno ceraso*.*Habitus* & *statura* *Tenth. Ribesii*, sed *pedes* tantum *flavi*, & *scutellum quoque flavescens*.736. TENTHREDO *Fulviventris*.

— long. lin. 3½.

Diagn. Caput, antennæ, thorax subtus, femoraque nigra; abdomen fulvum.*Apud nos non rara.**Thorax* modo niger, modo fulvus, modo vero fulvo nigroque varius. *Pedes* colore abdominis, sed femora nigra. *Alæ* anticæ costa punctoque nigris.737. TENTHREDO *Impura*.

— long. lin. 5.

Diagn. Tota nigra; alarum costa, tibiis, manibus, antennarumque apicibus rufis; alis apice fuscis.

Circa

Tenthredo. ACULEATA. Ichneumon. 281

Circa *Tergetium* capta,
Corpus totum semiunciam longum, nitidulum,
atrum. Antenn. articuli tres ultimi rufi. Femora
postica longiora & crassiora.

738. TENTHREDO *Solitaria*.

— long. lin. 4 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigra; segmentis abdominis tribus me-
diis, tibiisque posticis rufis; punctis utrinque binis
ad basim femorum posticorum antennarumque api-
cibus albidis.

Rarior, in pratis montanis.

Os flavum. Antenn. articuli (3-4) ultimi al-
bo-lutei. Tibiae anticæ flavescentes, medio flavo-
rufæ. Alarum antecarum costa nigra.

ICHNEUMON.

LINN. Syst. Nat. p. 560.

Aculeus exsertus: vagina bivalvi.

(a) SIREX Linn. Faun. Svec. 2. p. 396.

Alis posticis plicatis; abdomine mucronato: acu-
leum subtus circa medium proferente.

739. ICHNEUMON *Gigas*.

— long. unc. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 560.

Faun. Svec. 2. 1573.

ROESEL. Vesp. Tab. 9. fig. 3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 104. Tab. 1.
fig. 6.

Diagn. Niger; abdominis incisuris, 1, 2, 7,
8, 9. superne: nona utrinque, ferrugineis.

Habitat in *Pino abiete* & *pinea*, qua fodinis
Idriensibus illatus, ibidem etiaminum vivit, a Fos-
foribus *Zuker* dictus, lampadibus involans easque
extinquens.

Caput cum thorace villosum, nigrum. Abdom.
incisuræ 3, 4, 5. 6. nigræ, holosericeo nitore ful-
gidæ; incisuræ reliquæ supra una cum maculis re-
tro oculos, antennis, tibiis, manibus, & mucrone

282 Ichneumon. ORDO V. Ichneumon.

abdominis, ferrugineæ. Alæ costa, venisque fulco-ferrugineis, ferruginea quoque tinctura ad basim inquinatæ. Ante mortem filum tenuissimum circumnatum ex aculeo promit, volans stridet, acu transfixus pulsus in collo conspicuum habet, tempore syloles succum e vulnere fundit; unguis basi dente instructos gerit.

Mas minor, inermis; abdomine extrorsum dilatato fulvo, tibiis fuscis: basi & apice ferrugineis.

740. ICHNEUMON *Spectrum.*

— long. lin. $7\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 560.

Faun. Svec. 2. 1574.

Diagn. Niger; litura ante alas lutea; pedibus ferrugineis; aculeo valvis longiore.

Habitat in semiputrido ligno.

Aculeus toto corpore longior. Mucro abdominis basi attenuatus. Locus, unde nascitur aculeus, ferrugineus in medio abdominis. Abdomen tenuius, quam in sequente.

741. ICHNEUMON *Juvencus.*

— long. lin. $8\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 560.

Faun. Svec. 2. 1575.

Diagn. Atro cœruleus nitens; thorace villoso; abdomine violacea tinctura decolore: mucrone conico.

Inveni circa Idriam, in nemore Weichenthal, insidente dejectæ Abieti.

Antennæ articulis (20). Alæ apicibus paulo obscurioribus. Pedes rufi. Aculeus lin. (4 $\frac{1}{2}$) longus. Abdominis acumen margine ad apicem denticulato.

742. ICHNEUMON *Camelus.*

— long. lin. $10\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 560.

Faun. Svec. 2. 1576.

Diagn. Niger; abdomine segmentis singulis utrinque macula alba, acuta, pedibus rufis.

Ex

ICHNEUMON. ACULEATA. Ichneumon. 283

EX intumis cuniculis foainarum Iiriensium ad me delatus.

Antennæ, quas Ill. LINNÆUS thorace breviores habet, nobis certe longiores & ubique nigrae. Longitudo totius a capite ad acumen abdominis unciam & lineas quatuor æquat; latitudo vero summa thoracis lin. (2). Oculi albida linea cincti. Thorax antice supra alas linea alba laterali; inter alas posticas punctum rotundum cum subiecta linea alba, basis ejusdem linea alba transversa puncto que notata. Aculeus corpore toto longior. Pedes toti rufi.

(b) *Alis omnibus planis, nec plicatis.*

(*) *Antennis fascia albida.*

743. ICHNEUMON *Usurpator.*

— long. lin. 6.

Diagn. Niger; abdomine fulvo: incisuris quatuor ultimis nigris; femoribus fulvis.

In *superiore Carniola.*

Scutellum thoraci concolor. Oculi rufi. Abdomen basi & apice nigrum. Aculeus rufus, lin. (6 $\frac{1}{2}$) longus. Mari alæ hyalinæ, statura minor, abdomen duplo tenuius.

744. ICHNEUMON *Gladiator.*

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger; femoribus fulvis; aculeo corpore duplo longiore.

Habitat in cultis.

Antennæ corporis longitudine: annulo albo. Scutellum thoraci concolor. Tibiæ nigræ. Palmæ posticæ albidæ; unguibus nigris. Abdomen petiolatum, lin. 2 $\frac{1}{2}$ longum non computato petiolo. Alæ hyalinæ.

745. ICHNEUMON *Incubitor.*

— long. lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 563.

Faun. Svec. 2. 1602.

Diagn. Abdomen ellipticum pedesque rufi. Aculeus abdomine brevior.

In

284 Ichneumon. ORDO V. Ichneumon.

In collibus sylvosis captus Augusto M.
Antennæ nigræ; fascia alba, corpore breviores. Caput nigrum. Thorax rufus, pone niger. Abdomen politum petiolatum, apice fuscum, punctoque albo terminatum. Abdomen subtus in medio tumorem gerit, e quo aculeus, ut in *Ichneumon*. Ordin. I. Specimen *Linnæanum* thorace toto nigro.

746. ICHNEUMON *Deceptor*.

— long. lin. 3.

Diagn. Niger; scutello punctoque sub alis anticis flavicante; abdomine fulvo: apice nigro, albidoque punto terminato.

Passim occurrit.

Pedes fulvi, sed femora nigra. Alæ anticae puncto marginali ferrugineo. Aculeus vix exterritus Entomologum facile decipit, ut pro *Sphege* adsumatur.

747. ICHNEUMON *Viator*.

— long. lin. 5.

Diagn. Totus niger; femoribus fulvis.

Habitat in calidore *Carniola*, inquietus & sape migrans de loco in locum.

Abdomen petiolatum, tres lineas longum, aculeo longius. Alarum anticarum costa nigra.

(**) Antennis totis nigris.

748. ICHNEUMON *Excitor*.

— long. lin. 8½.

P. PODA. Mus. Græc. p. 105.

Diagn. Niger; abdomine supra lineis quatuor transversis albidis, subtus lamina vomeriformi.

In interiore *Carniola*.

Caput & thorax villosus, absque maculis; punctum rufum ad basim thoracis. Palpi rufi. Alæ costa fuscescente lineaque rufa marginali. Squama concava, acuminata, vomeri similis, sub abdomine. Aculeus corpore brevior, lin. (9) longus. Pedes rufi: medii & antici basi nigri.

Ichneumon. ACULEATA. Ichneumon. 285

749. ICHNEUMON *Terebrator.*

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger; pedibus fulvis: posticis crassioribus fulcratisque; abdomine subtus spina canaliculata.

In Carniola media.

Scutellum nigrum. Aculeus abdomine gibbo lucido brevior. Femora postica crassu, longiora, nigræ basi imposita. Alarum apices fuliginosi.

750. ICHNEUMON *Visitator.*

— long. lin. 3.

Diagn. Niger; pedibus fulvis; aculeo longitudo abdominis: valvis pilosis.

Super arborum & plantarum folia jugiter discurrentes.

Abdomen apice subtus quasi dente notato. Femora æqualia. Scutellum nigrum.

751. ICHNEUMON *Manifestator.*

— long. lin. 8 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 563.

Faun. Svec. 2. 1608.

Diagn. Niger; abdomine sessili cylindrico; aculeo corpore longiore; pedibus fulvis.

In locis sterilibus.

Abdomen fere unciale, teres, immaculatum. Aculeus, in speciniae misso ab Amiciss. P. PODA, unciam & lin. novem longus. Intervallum, quod inter pedes anticos mediosque intercedit, æquale est longitudini segmenti ultimi abdominis. Alæ costa nigra, pallide rufo puncto interrupta.

752. ICHNEUMON *Cunctator.*

— long. lin. 5 $\frac{1}{4}$.

ROESEL. Vesp. Tab. 12. fig. 2. 3.

P. PODA. Mus. Græc. pag. 105. Brassicariæ.

Diagn. Niger villosus; antennis pedibusque rufis; aculeo brevi: valvis subclavatis.

Habitat in pupa *Papilionis Gratægi*.

Antennæ articulis non ultra (30). Totum corpus exiguis villis pubescens. Palporum articulus ultimus rufus. Scutellum albo puncto notatum. Abdomen subpetiolatum: aculeo lineas duas vix longo, cuius valvae villosæ & apice dilatatae.

Non potest confundi cum *Ichn. Compundore* LINN. qui minor, antennis corpore dimidio brevioribus, subtus luteis, &c.

753. ICHNEUMON *Speculator.*

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Totus rufus & nitens; aculeo abdomine duplo breviore.

Inventus in *Corylo*.

Ad lentem villosus. Femora postica clavata, longiora reliquis & crassiora. Antennæ abdomine longiores, toto corpore breviores. Alæ ferrugineæ.

754. ICHNEUMON *Inquisitor.*

— long. lin. 4.

Diagn. Niger; alis hyalinis; pedibus fulvis; tibiis posticis flavis, nigro-annulatis.

Vagatur ruri & circa hortos, domos etiam intrans, sub finem Octobris in fenestra mei Mureoli captus.

Antennæ totæ nigrae, abdome breviores. Alæ antice puncto ferrugineo-marginali. Abdomen subsestile: aculeo antennis breviore. Tibiae posticæ falcis binis atris.

755. ICHNEUMON *Vinulæ.*

— long. lin. 4 $\frac{2}{3}$.

An *Flavus* LINN.? Descriptio non recedit.

Diagn. Totus rufus; abdome falcato: aculeo brevi.

Habitat in larva *Thlaspiæ Vinulæ.*

Larva hæc matura rodit corticem *Salicis*, eaque scobe cum glutine proprio folliculum parat coriaceum oblongum pallidum. Huc si aperias post hebdomadam, videbis in eo cellulas (5-7) tenues oblongas, intra quas totidem larvæ albæ, flavo succo plene, unde altero anno, Mayo M. producent totidem *Ichneumones* non flavi, sed semper fer-

ICHNEUMON. ACULEATA. Ichneumon. 287

ferruginei, oculis nigris, antennis corpori æqualibus, abdomine falcato petiolato, apice truncato; aculeo lineam longo tenui: valvis villosis; alis hyalinis.

756. ICHNEUMON *Affector.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 566.

Faun. Svec. 2. 1627.

Diagn. Antennæ alis, alæ abdomine breviores; tibiæ posticæ crassæ, clavatæ: fascia flavescente.

Floribus involat, præcipue *Umbellatis*, quibus infidet porrecto abdomine.

Niger. Antennæ abdomine duplo breviores. Alæ hyalinæ; lineola nigra marginali. Pedes postici abdominis longitudine. Abdomen vix falcatum, lin. (3 $\frac{1}{2}$) longum extrorsum crassius, segmentis 1, 2, 3, latere fulvis. Aculeus lineam longus.

757. ICHNEUMON *Victor.*

— long. lin. 4.

Diagn. Niger; antennis longis, pedibus, segmentisque abdominis 2, 3, 4, fulvis.

Ruri degit, super folia discurrens, obvia infesta cuncta depellens.

Antennæ corpore longiores. Palpi longi, antennis concolores. Abdomen fulvum, basi & apice nigrum. Aculeus semilineam longus. Alæ hyalinæ, puncto nigro marginali. Femora postica nigricantia.

758. ICHNEUMON *Impostor.*

— long. lin. 4.

Diagn. Niger; alis fuscis; abdomine ovato rubro.

Circa *Labacum* captus.

Antennæ nigræ, alarum anticarum longitudine. Oculi fulvi. Thorax nitens, villosulus. Alæ omnies nigricantes: anticæ longitudine corporis. Abdomen miniatum, ovatum; aculeo brevi, nigro. Pedes nigri.

759. ICHNEUMON *Vagator.*

— long. lin. 1½.

Diagn. Niger; abdomine subtus fulvo; alis fuscouscentibus.

Inquietissimum animal super arborum folia continuo discurrit.

Antennæ corporis longitudine. Aculeus linearis longus. Abdomen ovatum, supra fuscum subtus fulvum. Alæ hyalinæ, fuscouscentes: apice pallidiores.

760. ICHNEUMON *Cannabis.*

— long. lin. 1½.

Diagn. Niger; scutello flavicante; abdomine basi pedibusque rufouscentibus.

Prodiit mihi ex pupa *Muscæ Cannabinæ.*

Thorax aculeo longior. Alæ hyalinæ: antice puncto marginali. Antennæ abdominis longitudine.

761. ICHNEUMON *Tipulae.*

— long. — —

Diagn. Niger; abdomine ovato, nitido: apice rufo; pedibus flavescentibus.

Natus mihi ex pupa *Tipulae Boleti.*

Antennæ alarum posticiorum longitudine. Abdomen subfusile, longitudine aculei.

762. ICHNEUMON *Pavoniae.*

— long. — —

Diagn. Niger; antennis basi pedibusque ferrugineis.

Prodiit ex larva *Ph. Favonie* in pupam mutantæ intra folliculum.

Vermiculus net sibi folliculum tenuem, oblongum, fusco-ferrugineum.

Idem natus mihi ex pupa *Phalene Tortricis* cuiusdam in *Mali* folio convoluto latentis.

763. ICHNEUMON *Pecliniornis.*

— long. — —

LINN. Syst. Nat. p. 568.

Faun. Svec. 2. 1647.

Diagn.

- Ichneumon. ACULEATA. Ichneumon. 289

Diagn. Antennæ (maris, quinquerodiæ: nodis primis tribus, ramos totidem proferentibus.

Ex larva *Phal.* nati vermiculi aliquot, demum involuti seorsim, unde totidem animalcula.

Huic caput & thorax viridi-aurata, scutello saturatiore. Abdomen æneo-nigrum, basi pedum colore. Pedes pallidissime lutei. Antennæ masculæ, basi pallide virescentes, glabræ; quæ in *femina* simplices sunt. *Ichn. Peñtinicornis LINN.* ab hoc forte diversus est.

764. ICHNEUMON *Graminum.*

— long. — —

Diagn. Æneo-fuscus; abdomine sessili acuminato nitente; oculis bruneis; tibiis albidis.

In culmis graminum, ac præsertim *Anthoxanthi*, supra medium, videtur crux albida, semiunciam longa, culmo circumposita; huic fundamento inædificat pupa cellulosum rete, oblongum, spongiosum, intra quod pupa, unde Junio M. circa æquinoctium prodit animal antennis abdomine brevioribus infraæctis: articulis supra fracturam (9) æqualibus, basi crassioribus, palpis tenuibus, thorace minus nitido; abdomine elliptico, aculeo non evidenti; alis hyalinis, immaculatis.

765. ICHNEUMON *Antiopæ.*

— long. — —

LINN. Syst. Nat. p. 567.

ROESEL. Inf. 1. p. 8.

Diagn. Viridi-auratus lucidus; pedibus ferrugineis.

Ultra (200) bis mihi prodierunt ex pupa *Papil. Antiopæ*; idem observavit & pinxit ROESEL. Sed etiam ex pupa *Papil. Sinapis* triginta circiter pati.

Antennæ nigrae, apice dilatatae, abdominis longitudine. Alæ puncto fusco notatae. Agile animal, continuo pedum posteriorum ad abdomen, & anteriorum ad antennas attritu, se se abstergens. Oculi brunei. Ill. LINN. in Syst. Nat. alium ROESELRI locum citat.

766. ICHNEUMON *Globatus.*

— long. — —

LINN. Syst. Nat. p. 568.

Faun. Svec. 2. 1645.

ROESEL. Vesp. Tab. 4. fig. 3. 4.

FRISCH. Ins. 6. Tab. 10.

Diagn. Niger; abdomine flavo: apice nigro.

Plantarum caulis adhærent globi sericei, cui
sæpe adhærent exuviae larvæ *Papil. Cratægi*, ex
qua nati vermiculi, intra eum globum latitantes,
cujus filamenta bombycinis cedunt nihil.

767. ICHNEUMON *Glomeratus.*

— long. — —

LINN. Syst. Nat. p. 568.

Faun. Svec. 2. 1646.

Diagn. Niger; pedibus flavescensibus.

Septembri M. in *Brassica oleracea* reperiuntur
larvæ flavo nigroque variæ, unde semper prodie-
runt mihi vermiculi multi, eodem momento flavum
folliculum sibi parantes, quorum multi in unum
aceratum congeruntur.

S P H E X.

LINN. Syst. Nat. p. 569.

Alæ absque plicis. Os sine proboscide.
Aculeus reconditus.

(*) Abdomine petiolato.

768. SPHEX *Truncata.*

Alæ anticæ long. lin. 7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 107.

Diagn. Ferruginea; abdomine falcato, compres-
so: apice truncato, dilatato, nigro.

Habitat in pupis *Phalænarum*, quæ in *Salice*
degunt; mihi ex pupa *Phal. Laneflris* orta.

Ambigit hoc inter & prædictum genus, cum
apices valvarum exserti, seta vero recondita.

Sphex. ACULEATA. Sphex. 291

Antennæ corporis longitudine. Oculi fuscæ.
Occiput tuberculis tribus nigris.

769. SPHEX *Crassicornis*.

— long. lin. 7.

Diagn. Ferruginea; antennis apice oculis ab-
dominisque apice nigris.

Habitat in pupis *Lepidopterorum*.

Var. 1. Alarum longitudine data; antennis ni-
gris: basi ferrugineis, alarum superio-
rum longitudine; oculis fuscis; tuber-
culis occipitalibus tribus nigris; thora-
ce nigro: scutello ferrugineo; alis api-
ce obscurioribus: costa ferruginea; ab-
domine lin. (6) longo, lanceolato fer-
rugineo: apice nigro; pedibus ferrugi-
neis: femoribus posticis apice fascia ni-
gra annulatis.

2. Statura eadem, sed antennis apice ni-
gris, thorace fuscescente, femoribus po-
sticis subtus ad apicem macula fusca;
cæterum eadem cum priore.

Habitat in pupa *Sphingis Tiliae*.

3. Antennis ferrugineis, medio pallidiori-
bus, apice nigris; statura minore; tho-
race abdomini concolore utrinque.

P. PODA. Mus. Græc. p. 107. Disparis.

Habitat in pupa *Phalæna Disparis*.

770. SPHEX *Sabulosa*.

— long. lin. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 569.

Faun. Svec. 2. 1648.

FRISCH. Insect. 2. Tab. 1. fig. 6. 7. 8.

Diagn. Nigra; abdome clavæformi, longitu-
dine pedum mediorum; petiolo biarticulato: arti-
culi secundi postica parte, segmento primo toto,
secundo vero dimidia parte, fulvo colore tintis.

Habitat in aridis, incultis, sabulosis.

• Huic quoque propria sunt. Caput crassum.
antennæ thorace non longiores. Alæ abdome
bre-

breviores. Rostrum bivalve: valvis palpigeris: palpis sexnodiis. Aculeus bifidus: seta una breviore & tenuiore.

771. SPHEX *Fuliginosa*.

— long. lin. $3\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; alis hyalinis: apice fuscescentibus; spinis tibiarum rufis.

Unguis *Pici atri* eripui, Augusto M. in sylva quadam.

Antennæ thoracis longitudine. Caput anticis pilis subargenteis pubescens. Abdomen subfalcatum, teres, nitens: petiolo subclavato.

772. SPHEX *Hirsuta*.

— long. lin. $5\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; capite thoraceque pubescentibus; abdomine antice fulvo.

Apud nos non rara in cavis semitis.

Antennæ lin. ($2\frac{2}{3}$) longæ. Maxillæ longæ, arcuatæ. Abdominis petiolus niger, lineam longus. Abdom. lin. ($3\frac{1}{2}$) longum, media parte fulva, altera eaque postica nigra. Femora pilosa. Tibiæ omnes spinosæ.

773. SPHEX *Cincta*.

— long. lin. 4.

Diagn. Nigra; abdominis segmentis 1, 2, tibiisque flavis.

Habitat in agro *Tergestino*.

Antennæ alis anticis longiores. Abdom. petiolus niger; segmentum primum flavum, sed superne macula nigra postice emarginata magna notatum, segmentum secundum totum flavum. Femora clavata. Tibiæ & palmæ flavæ.

774. SPHEX *Aequinoctialis*.

— long. lin. $2\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; abdomine subtus linea flava longitudinali; tibiis fulvis.

In collibus *Carnioliae* super. circa æquinoctium vernum.

An-

Sphex.

ACULEATA.

Sphex.

293

Antennæ lin. (2) longæ. Alæ hyalinæ: antice basi costaque puncto flavo notatæ. Abdomen nitens, aculeo fulvo.

775. SPHEX *Profuga*.

— long. lin. 4.

Diagn. Nigra; abdominis incisuris, 1, 2, tibiisque rufis, antennis longitudine corporis.

In incultis non raro obvia.

Antennæ totæ nigræ, lin. (5 $\frac{1}{2}$) longæ. Alæ hyalinæ; costa fusca; puncto ferrugineo. Abdominis petiolus niger; margine postico fulvo, segmentum tertium antice fulvum. Pedes antici & medii toti rufi, femora postica eorumque tibiæ apice nigræ. Frons flava.

776. SPHEX *Furcata*.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Thorax postice furcula terminatus. Abdomen ovatum, nitens, sursum flexum.

Inveni insidentem foliis *Origani vulg.* 3. Augusti.

Caput virens, ut & thorax. Abdomen nigrum splendens; petiolo capillari ferrugineo uniarticulato. Pedes ferruginei.

777. SPHEX *Gregaria*.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; abdomine cingulis fulvis; pedibus flavescentibus.

Harum plures choreas aeras ineuntes vidi, floribusque insidentes.

Antennæ alarum longitudine. Alæ hyalinæ; puncto nigro marginali.

778. SPHEX *Coarctata*.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; abdomine ad apicem petioli clavati coarctato: cingulis duobus apiceque rufis.

Rarior in pratis.

Antennæ basi flavæ, thorace breviores. Caput crassum. Thorax subrotundus. Abdominis petiolus infundibuliformis, segmentum tertium reliquis

294 Sphex. ORDO V. Sphex.

majus. Femora nigra: basi & apice flava; tibiæ flavæ, sed posticæ fulvæ & crassiores.

779. SPHEX *Anthracina.*

— long. lin. 5.

Diagn. Nigra, opaca, punctulisque confertis prominulis scabra; pedibus fulvis.

In hortis.

Antennæ fusco-ferrugineæ, lin. (3 $\frac{2}{3}$) longæ. Occipitis tubercula lucida. Alæ hyalino-ferrugineæ. Abdomen (absque petiolo) lineas tres longum.

(*) *Abdomine subfessili.*

780. SPHEX *Viatica.*

— long. lin. 4 $\frac{2}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 570.

Faun. Svec. 2. 1651.

FRISCH. Inf. 1. Tab. 1. fig. 13. absque cingulis anticis nigris,

Diagn. Nigra; abdominis dimidia parte antica superne fulva: cingulis duobus atris; pedibus æque dissitis: posticorum femoribus semi fulvis.

In hortis & circa vias, frequens.

Antennæ lin. (3) longæ. Caput & thorax pubescens. Pedes, abdomen apice subtusque, nigra. Varietas, aut sexus alter, ab domine antice fulvo & absque cingulis nigris, minus pubescens, & statura minoris, nec non pedibus posticis totis nigris, scilicet a me visa, qualem FRISCHIUS habet loc. cit.

781. SPHEX *Apriaria.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Nigra & pilosa tota; antennis thorace brevioribus.

In floribus nectar colligit passim.

Porrecto rostro caret, alasque rufo-fuscas lucidasque gerit.

782. SPHEX *Carbonaria.*

— long. lin. 3.

Diagn. Tota nigra; alis hyalinis.

In pratis, & circa sepes.

Pedes

Sphex. ACULEATA. Sphex. 295

Pedes huic quoque nigri, corpus vix pilosum, antennæ thorace longiores.

783. SPHEX *Versicolor*.

— long. lin. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 571.

Faun. Svec. 2. 1659.

Diagn. Nigra; abdomine maculis tribus albidis; alis apice fuscis; femoribus posticis fulvis.

Inveni in floribus *Pastinacæ* sat.

Statura *Viaticæ*, & etiam major, pilis paucis infra antennas & in apice abdominis adspersum corpus gerens, alibi glabra. Antennæ lin. (3) longæ. Abdomen fasciis obsolete admodum cinereis, quatuor, quarum prima maculas duas albidas, tertia unicam habet. Femora postica sola fulva; tibiis ibidem uno latere duplicato denticulatis; sed & aliæ pedes rufos gerunt.

784. SPHEX *Nigerrima*.

— long. lin. 3½.

Diagn. Atra tota; alarum apicibus fuscis.

Ruri habitat.

Antennæ abdomine longiores. Maxillæ tridentatae. Bases femorum mediorum & posticorum argenteo fere nitore fulgidæ. Abdomen oblongum, absque petiolo, lin. (2) longum.

Ex oblongo, cinerascente, antice dilatato folliculo nata mihi, e quo probabiliter *Musca* aliqua prodiisset.

785. SPHEX *Vaga*.

— long. lin. 2½.

LINN. Syst. Nat. p. 571.

Faun. Svec. 2. 1664.

Diagn. Nigra; thorace punctis binis, abdomine quatuor lateralibus, tibiisque flavis.

Circa *Idriam* capta.

Antennæ capitis longitudine, basi flavescentes. Thorax punto flavo laterali antico supra alas. Abdomen thorace tenuius, vix longius, nitens, latere singulo maculis quatuor flavis, quibus differt a *Linneana*, quæ fascias, loco macularum, habet, quamvis unicam integrum.

786. SPHEX *Gibba*.— long. lin. 2 $\frac{2}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 571.

Faun. Svec 2. 1658.

Diagn. Nigra; abdomine fulvo: apice nigro; alarum apicibus fuscescenscentibus.

In herbidis collibus Carnioliae.

Antennæ abdomine longiores. Alæ hyalinæ. Pedes nigri. Alæ anticæ puncto rotundo pallido intra apicem fuscum. Nec diversa videtur alia, paucim obvia; abdomine basi macula nigra; femoribus apice tibiisque totis fulvis. Invenitur & major; abdomine ferrugineo, gibboso, versus apicem nigro.

787. SPHEX *Bilocularis*.

— long. lin. 3.

Diagn. Abdomen subtus in duo loculamenta divisum; septo longitudinali tibiisque luteis.

In Districtu Idriensi.

Alæ hyalinæ; puncto nigro marginali. Antennæ abdomine longiores nigræ. Caput & thorax nigra. Abdomen supra nigrum, aut fulvum: basi nigrum. Pedes flavi, femoribus fulvis.

(***) Abdomine scissili.

788. SPHEX *Abietina*.— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Nigra; abdomine fulvo: basi nigro: alis anticis fasciis duabus, fuscis.

In nemoribus abietinis Carnioliae superioris.

Animal septem fere lineas longum; Antennis nigris, abdomine non longioribus, prope basim superne albis, ex antica capitinis parte prope maxillas prodeuntibus; lineola alba utrinque inter frontem & oculum. Tibiae superne maxima parte albæ. Aculei regio nigra.

789. SPHEX *Vespoides*.— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Nigra; abdomine basi segmentisque omnibus (secundo excepto) fascia flava marginali.

SpheX. ACULEATA. SpheX. 297

Duae mihi natæ, ex pupis *Phalænæ Laneftris*.

Antennæ nigræ, lin. ($4\frac{1}{2}$) longæ, crassiusculæ, apice attenuatæ. Maxillæ nigræ edentatæ. Frons lutea, linea media nigra. Palpi flavi, articulis (2-3): extremo nigro & crassiore. Thorax lineola flava lateraliter supra alas, postice punctis duobus flavis. Abdominis segmentum primum flavum, secundum nigrum, reliqua nigra sed cingulo flavo marginali distincta; abdom. longitudo qualis antennarum, superficies punctulato-rugosa ad apicem pilosa. Pedes antici & medii toti flavi: linea nigra subtus ad femora; postici flavi: femoribus seminigris. Alæ lucidae, subferruginosæ, ad apicem vinoſo-hyalinæ. Habitus *Vespæ Feneſtralis*.

790. SPHEX Tenthredoides.

— long. lin. 4.

Diagn. Nigra; alis hyalinis; pedibus albo-nigroque variis.

Antennæ in cadavere deflexæ, abdominis longitudine. Femora postica tota nigra, antica & media superne linea alba; tibiæ albæ. Punctum album ad basim femoris postici. Alæ hyalinæ. Aculeus non ferratus, sed genti suæ proprius.

791. SPHEX Ignita.

— long. lin. $2\frac{2}{3}$.

LINN. Syst. Nat. p. 571.

Faun. Svec. 2. 1665. Chrysis.

Diagn. Viridi-cærulea aut cyanea; abdome aurato-rubro: apice quadridentato.

Circa muros.

Caput & thorax punctis prominulis scabra. Tubercula tria fusca occipitalia. Oculi nigricantes. Antennæ fuscae, thoracis longitudine. Thorax sub alis utroque in latere dentibus binis. Abdomen flammeo-auratum, nitidissimum; subtus aureo-virens. Aculeo longo, planiusculo: apice piloso.

792. SPHEX Nobilis.

— long. lin. 2.

Diagn. Caput, pedes, thorax postice, colore viridi; abdomen aureo colore tintatum: apice rotundato edentato.

Inveni in floribus *Ptharmicæ millefolii*.

Thorax pallio aureo ad bases alarum usque producto tectus, alibi, capiti pedibusque concolor. Abdomine supra, nullum splendidius aurum. Alæ apice fuscescentes. Abdomen subtus fuscum. Aculeus setaceus, longus: valvis pilosis, quibus adjacent duo alia corpuscula pallida setacea incurva.

793. SPHEX *Violacea.*

— long. lin. 2.

Diagn. Tota violacea nitens; abdomine pone rotundato, edentato, subtus virente.

Unam cœpi, circa *Tergestum*.

Alæ apice fuscescentes. Corpus brevius quam priorum.

APIS. (+)

LINN. *Syst. Nat.* p. 574.

Rostrum porrectum, inflexum, mellisugum, bivalve, 1-3-setum.

(+) *Antennis rectis.*

794. APIS *Longicornis.*

Alæ anticæ long. lin. 3 $\frac{3}{4}$.

LINN. *Syst. Nat.* p. 574.

Faun. Svec. 2. 1684.

P. PODA. *Mus. Græc.* p. 109.

Diagn. Nigra, hirsuta; antennis longitudine corporis.

Pasim occurrit.

Anten-

(+) *Apes* indefessæ, anthophilæ, disperso polline antherarum Floræ regnum extendunt, sed & eodem alienis thalamis illato, plantarum varietates introducunt, Botanicorum syrtes. Sonus & hirsuties in his speciebus gradatim aucta, incertos reddit Ordines inde petitos, quos nobis antennæ suppeditarunt. Apes, quæ flores plantarum asperifoliarum sèpius frequentant, erosas acquirunt alas.

Apis. ACULEATA. Apis. 299

Antennæ nigræ, lin. ($5\frac{1}{2}$) longæ. Maxillæ apice obiter tridentatae. Caput antice flavescentes. Dorsum & abdomen antice hirsuta. Rostrum trifidum, præter valvas duas basi subtus palpigeras. Corpus nigrum.

Variat hirsutie thoracis abdominisque canescente, & rufa.

795. APIS Sordida.

— long. lin. $4\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; thorace hirsuto; ano tibiisque rufis.

Apud nos, non infrequens.

Paulo minor priore; antennis thorace brevioribus; alis anticis lineola ferruginea marginali, abdomine nitido; tibiis palmisque rufis.

796. APIS Florifomis.

— long. lin. $3\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 577.

Faun. Svec. 2. 1704.

Diagn. Nigra punctata; fronte albo-tomentosa; abdomine incurvo: segmento ultimo utrinque unidentato.

In collibus herbidis, sylvestribus.

Nostræ corpus æque longum ac in *A. Longirostris*. Abdominis anus non est dentatus, sed margo ultimi segmenti unum dentem utrinque habet, quo distinguitur a congeneribus.

797. APIS Atra.

— long. lin. $4\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigerrima tota; fronte & thorace antice ac postice albo-tomentosis; abdomine subrotundo; alis semifuscis.

In *Gariusche*, inter *Veldes* & *Vochein*, capta An. 1761. super flores *Laserepitii latifolii*.

Statura *Longicornis*, sed crassior. Antennæ lin. (2) longæ. Ad basim maxillæ cujusque tuberculæ tria: intermedio majore. Abdomen nitens, duas lineas longum & æque crassum. Alæ fuscescentes, basi excolores.

798. APIS *Globosa*.

— long. lin. 3.

Diagn. Nigra, rufo-pubescent; abdome subrotundo; segmentorum margine antico longioribus pilis ciliato.

In montibus circa Idriam.

Antennæ longitudine abdominis. Rostrum valde longum, ratione staturæ corporis. Alæ anticæ costa fusco-ferruginea.

799. APIS *Centuncularis*.— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 575.

Faun. Svec. 2. 1687.

Diagn. Abdomen subtus fulva lana testum.

Habitat intra terram.

Antennæ longitudine thoracis. Abdomen basi truncatum; segmentorum marginibus præsertim ad latera pilis pallide rufis ciliatis.

800. APIS *Farfariæqua*.

— long. lin. 4.

Diagn. Nigra, rufo-tomentosa; abdome ovato.

Conspicua dum floret *Tussilago farfara*, cuius floribus infidet, Aprili M.

Statura fere *Longicornis*. Antennæ lin. (1 $\frac{1}{2}$) longæ, sublucidæ. Maxillæ unidentatae, longæ, basi tuberculis duobus. Alæ anticæ lineola ferruginea, marginali.

801. APIS *Sabulosa*.— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Pubescens; antennis longitudine thoracis; abdome elliptico.

Aprili M. convenient in sabulo ab aquis disperso, ibique nuptias instituunt, de loco in locum continuo volitantes, zephyro plaudente choreis.

Mas. fronte barbata pilis flavefcientibus; thorace albido, pilis rufis utrinque pubescente.

Apis. ACULEATA. Apis. 301

Fæmina pigrior, crassior; fronte barbata pilis nigricantibus; maxillis longioribus; thorace rufo-pubescente; pedibus subtus longius barbatis.

802. APIS Riparia

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigerrima tota; capite thoraceque pubescentibus; abdomine lucido elliptico.

Duas inveni in floribus *Erysimi barbareæ*, prope litus fluvii *Idrie*.

Antennæ lin. (2 $\frac{1}{2}$) longæ. Alæ fusco-ferrugineaæ, nube in medio obductæ. Maxillæ apice bidentataæ.

803. APIS Calcarata.

— long. lin. 2 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigra; capite crasso, pubescente; femoribus posticis dente instructis.

Circa *Idriam* capta.

Antennæ extrorsum rufæ, thoracis longitudine. Caput thorace crassius, pilosum. Abdomen ovatum.

804. APIS Præcox.

— long. lin. 3.

Diagn. Caput, thorax, abdomen basi, albis villis pubescentia; antennæ longitudine abdominalis elliptici.

Primo vere, flores adit.

Nigra tota; maxillis longis: apice rufescensibus; capite crasso; alis hyalinis: linea ferruginea marginali. Variat fronte densis longioribusque villis barbata, qualis in amentis *Salicis* copiosa reperitur.

805. APIS Calceata.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 578. Cariosa?

Diagn. Nigra; oris apice tibiisque albidis; abdomine lucido cylindrico: antennarum longitudine.

In amentis *Salicis* frequens, etiam in sylvis. Vidi etiam in panicula *Poæ cœruleæ* plures simul.

Thorax cum capite villosum. Alæ hyalinæ; punto ferrugineo terminatae. Abdomen incurvum. Genua colore tibiarum.

806. APIS *Montana*.— long. lin. 3 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Nigra; antennis abdomine pedibusque fulvis.

Capta in floribus *Laserpitii sileris*.

Corpus lin. (4.) longum. Antennæ articuli (10); 7, 8, 9, nigricantibus. Tuberculum fulvum in singulo latere thoracis, supra alas. Scutellum fusco-fulvum. Thoracis latera sub alis, & ejusdem pars postica subargenteis villis pubescens. Alæ limbo obscuriore. Pedes fulvi; femorum basi nigra. Abdomen antennarum longitudine, ellipticum, nitens, fulvum, in singulo latere maculis tribus flavescentibus.

Variat, tuberculis thoracis anticis flavescentibus, unicoque puncto luteo in latere singulo abdominalis; nec non ore antice rufo, antennisque totis rufis.

807. APIS *Fulviventris*.— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; abdomine fulvo nitente: apice nigro.

In montanis *Carnioliae*.

Antennæ thorace breviores. Caput & thorax punctulis prominulis scabra. Alæ hyalinæ; puncto fusco marginali. Abdomen ellipticum, antennis longius. Palmæ pallide rufis villis adspersæ.

808. APIS *Vespiformis*.

— long. lin. 3.

Diagn. Nigra; antennis scutello pedibusque fulvis; abdomine supra cingulis flavis.

In floribus, præsertim *Umbelliferis*.

Lineas (3 $\frac{1}{2}$) longa. Maxillæ, linea circum oculos, punctum in medio frontis, & labii margo, fulvi coloris. Thorax latere singulo linea puncto que fulvis. Scutellum punctis binis fulvis contiguis signatum. Alæ hyalinæ; limbo obscuriore. Abdomen antennarum longitudine, ellipticum, nitens, glabrum; supra fasciis nigris flavis.

q1 e

Apis. ACULEATA. Apis. 303

que alternantibus, subtus fulvuni: cingulis anticis
tribus nigris. Femora postica nigra.

(**) *Antennis basi infraclisis.*

809. APIS Ænea.

— long. lin. 2.

LINN. Faun. Svec. 2. 1695.

Diagn. Ænea tota & villosa; antennis nigris.
In floribus passim occurrit.

Parva, abdomine ovato obtuso; segmentis
duobus ultimis margine flavescentibus. Alæ
hyalinæ.

810. APIS Fusca.

— long. lin. 3.

Diagn. Fusca, rufis villis adspersa abdomine
segmentis margine rufis.

Frequens in submontanis nostris.

Abdomen antennis longius, ellipticum, ni-
tens. Pedes rufo villo pubescentes.

811. APIS Mellifica.

— long. lin. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 576.

Faun. Svec. 2. 1697.

SPECTACLE de la NAT. Tom. I. Entr. VI.

Diagn. Thorax utrinque rufo-pubescentia, ab-
domen fuscum; segmentis margine rufis.

Copiose & sedulo culta in Carniola præsertim
superiore.

Fæmina. Regina, aculeata, raro feriens, ictu
sibi non lethali, spadonum mater, antennæ articu-
lis decem, tibiis ferrugineis: margine breviter ci-
liato, abdomine supra fusco, subtus rufescente,
Fucorum centuriis aliquot stipata evolat, fœcun-
datur in aere volans, Crabronis insidiis in itinere,
morti vero in redditu expolita, si alienum subierit
alveare. Hæc junior, per triduum, omni horæ
quadrante, stridorem quemdam edit, eoque admio-
net emigraturam gregem; propagatur ab operariis
seorsim propriis in cellulis ad favorum latera ex-
structis.

Fuci

Fuci crailliores quam Operariæ & villiosiores, inermes, otiosi, Reginæ mariti & comites, generantur ab operariis intra proprias & ampliores celas, absoluto vero fecundationis Reginæ munere occiduntur, ejiciuntur.

Operarie minores, mellisugæ, Reginæ filiæ, unius electores aliarumque carnifices, primo vere alvearia purgant a sordibus, mel & ceram colligunt, digerunt, conficiunt, multiplicatae migrant, infident arboribus in globuni unitæ, pulsatae tartaginis vano clangore stipatae, colligendæ vase idoneo melle obliito.

Flores apibus acceptos suppeditat apud nos princeps *Polygonum Fagopyrum*, ad quod ex montanis alvearia Auguito M. a Rusticis transferuntur.

Hostes sunt *Crabro*, *Hirundines*, *Tinea mellonella*, *Apes alienæ*, *Aranea Kleinii*.

Oeconomiam Apum promovent 1. Purgatio diligens alvearium a larvis *Tineæ mellonellæ*. 2. Reginæ deficientis substitutio alterius, cavea tamen per octiduum prius inclusæ. 3. Subministratio mellis in anonæ caritate. 4. Favi primi prope foramen alvearis exstructi. 5. Morbidarum, enervium Apum & Spadonum intersectorum expurgatio. 6. *Fagopyrum* in vicina satum. 7. Castratio favorum labi infectorum. 8. Debilium corroboratio electuarij cardiaco ex melle, vino malvatico & pulvere radicis Athamanthæ Mei. 9. Migrationis tempestiva observatio. 10. Migratarum collectio cauta.

Parvum animal, quam utile! *Politicis Monarchiæ præstantiam, Reipublicæ tranquillitatem, commercii culturam; Ethicis otii fugam, libidinis odium, curam prolis, amorem erga fratres; Oeconomics sobriam sedulitatem, innoxiam aliis industrias, occasionis captandæ modum, commendat; Medicis mel & ceram offert, simplicium usum suadet, aeris salubritatem indicat.*

812. APIS *Violacea.*

— long. lin. 8.

LINN. Syst. Nat. p. 573.

P. PODA. Mus. Græc. p. 110.

Diagn. Bombinatrix, nigra; alis violaceis.

Apud nos non rara.

Rostri feta media est fistula in medio excisa, laterales canaliculatae: basi pilosum palpum profrentes. Maxillæ edentatae. Aculeus rectus, ferrugineus, cui ad basim adjacent verrucæ papillæformes oblongæ, sub quibus aculei basis pedunculum educit capitulo deflexo terminatum. Antennæ articulis duobus penultimi fulvis. Vidi etiam thoracis dorso albido.

813. APIS *Lapidaria.*

— long. lin. 7½.

LINN. Syst. Nat. p. 579.

Faun. Svec. 2. 1712.

Diagn. Bomb. nigra; abdominis apice fulvo.

Habitat inter lapides, prædatur mel apum, plerumque infelicitter.

Var. 1. Corpore lin. (9) longo; alis apice obscurioribus; maxillis lineis tribus elevatis striatis, tibiis posticis subtus fulvis. Rostri feta media rufa, sub apice deflexo pilosa.

2. Duplo minor, alis apice non evidenter fuscescentibus, maxillis lœvibus, tibiis utrinque nigris. Hæc habitat in collibus lapidosis apricis, inter frutices.

An species diversæ?

814. APIS *Argillacea.*

— long. lin. 6½.

Diagn. Bomb. nigra; thorace rufo: fascia nigra.

Habitat in sylvestribus, imo & circa domos, favos struens cretaceos.

Statura *Violacea*, & quandoque major. Alæ fusco-rufæ. Corpus subtus totum nigrum.

815. APIS Terrestris.

— long. lin. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 578.

Faun. Svec. 2. 1709.

Diagn. Bomb. nigra; thorace antice flavo; abdomine antice nigro, dein flavo, in medio nigro: apice albo.

Habitat in terra.

Maxillæ apice dilatatæ, subtus cochlearis adin-
star excavatæ. Rostri seta media lin. (5) longa.

816. APIS Rufa.

— long. lin. 6.

Apis minima. R. P. PODA. Mus. Græc. p.
110. huc trahi potest.*Diagn.* Bomb. nigra; thorace abdominalisque
apice rufo.

In sylvis habitat.

Variat statura, nempe abdomine lin. (3-4) longo.

817. APIS Hortorum.

— long. lin. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 1710.

Diagn. Bomb. nigra; thorace antice flavo; ab-
domine fascia flava: apice albo.

In floribus paßim occurrit.

Variat fasciis albidis.

818. APIS Collaris.

— long. lin. 4.

Apis pratorum LINN. Faun. Svec. 2.
1711. huc pertinere videtur.*Diagn.* Bomb. nigra; thorace antice anoquæ
flavis.

Cum priore circumvolat, minus frequens.

Abdominis apex anticæ thoracis fasciæ con-
color.

819. APIS Pascuorum.

— long. lin. 5.

Diagn. Tonib. rufa; antennis pedibusque ni-
gris.

Habitat

Habitat in herbidis sterilibus.

Thorax & abdomen rufo-tomentosa ut & frons.
Alæ apice paulo obscuriores ; sed subtus thorax
albido pilo tomentosus ; abdomen yero nigrum.

820. APIS *Hypnorum*.

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 579.

Faun. Svec. 2. 1715.

Diagn. Bomb. nigra ; thorace rufo ; abdominis
apice albo.

821. APIS *Nemorum*.

— long. lin. 4.

Diagn. Bomb. thorace albido : fascia media ni-
gra, abdomine segmento 1 fusco, 2 fusco-ferrugi-
neo, 3 nigro , cæteris flavescentibus.

In nemoribus Districtus Idriensis, saepe vidi.

Inter meas minima ; pedibus nigris ; alis apice
obscurioribus.

822. APIS *Sylvarum*.

— long. lin. 5.

LINN. Faun. Svec. p. 2. 1713.

Diagn. Bomb. pallida ; thoracis fascia nigra ;
ano rubro vel rufo.

Habitat in sylvis.

Antennæ, caput, pedesque nigri. Abdomen
ovatum : apice rufum.

823. APIS *Collium*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Bomb. thorace rufo ; abdomine pallidis
villis tomentoso.

In collibus Carnioliae super.

Rostrum huic abdomine longius.

VESPA. (†)

LINN. Syst. Nat. p. 572.

824. VESPA *Crabro.*

Alæ anticæ long. lin. 10

LINN. Syst. Nat. I. c.

Faun. Svec. 2. 1670.

FRISCH. Inf. 9. Tab. II. fig. I.

Diagn. Abdominis segmentum primum rufum: margine flavo, secundum cæteris duplo longius fuscō-rufum: fascia flava sinuata marginali, reliqua flava: punctis duobus fuscis, sed tertium segmentum inter puncta habet maculam trigonam fuscām.

Nidificat in cavis arboribus, frequentat corticem *Quercus rob.* e quo exstilla nūt humorem lingit, una cum *Scarabæis Nobilibus & Auratis.*

Gigas nostrarum, horæis fructibusque maxime insensā, corpore sæpius unciali; maxillis apice tridentato nigro; thorace nigro: antice macula rufa laterali; aculeo recto, acutissimo, nigro; alis platicatis.

825. VESPA *Vulgaris.*

— long. lin. 6½

LINN. Syst. Nat. p. 572.

Faun. Svec. 2. 1671.

FRISCH. Inf. 9. Tab. 12. fig. I.

P. PODA. Mus. Græc. p. 108.

Diagn. Thorax antice utrinque macula trigona. Abdomen segmentis (5) flavis, nigro-bipunctatis, medioque semiabruptis.

Habitat sub tectis.

Maxillæ flavæ, tridentatæ: dentibus nigris. Frons flava, postice emarginata, punctulo nigro in medio

(†) Maledictæ terræ soboles invisa & audax aculeo exferendo cum *Api* convenit, differt vero ore mutico, absentia facci melliferi, cellulis squalidis inutilibus.

Vespa. ACULEATA. Vespa. 309

medio notata. Supra antenæ maculæ tres, contiguæ, flavæ, in unam seriem transversam ordinatæ: media antice emarginata. Retro oculos linea flava ad maxillas usque producta. Thorax ad basim alæ singulæ superioris tuberculo ovato flavo, ocellato: pupilla nigra; sub iisdem alis punctum triangulare; inter caput & alas macula trigona flava: angulo verticali saturatiore & costam respiciente; pars postica thoracis duo paria punctorum flavorum gerit. Abdomen segmento 1 flavo, subquadrata nigra macula in medio, puncto quo nigro laterali utrinque ad angulum anticum; 2, 3, 4, fascia lata flava marginali, in medio triquetro-excisa, & uno pari nigrorum punctorum; apice flavo: linea nigra longitudinali. Pedes flavi; femoribus mediis & posticis nigris: apice flavis. Pedibus anticis detergit antenæ & os, posticis abdomen.

826. VESPA Sylvestris.

— long. lin. 6.

Diagn. Thorax antice utrinque lineola flava. Abdomen segmentis margine flavo repando cingulo distinctis.

Habitat in sylvis, inter ramos arborum, ubi favum unum alteri inaedificat, nudum aut cortice tenui vestitum, cuius cellæ, cum larvæ perfectæ fuerint, operculo albo teguntur.

Diffr. a *Vulgari*; fronte flava absque punto medio nigro, linea nigra media ab apice ad medium usque producta; thorace antice lineola lateralí non vero maculis trigonis, abdomine punctis nigris nullis. Neque pro altero sexu prioris habeo, *Vulgaris* enim in hujus nido a me visa nondum.

827. VESPA Parietum.

— long. lin. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 572.

Faun. Svec. 2. 1673.

ROESEL. Vesp. Tab. 7. fig. 8.

Diagn. Abdomen cingulis quinque flavis: 1, 2, invicem remotioribus, spatio intercepto bipunctato: punctis flavis fulvisve.

310 Vespa. ORDO V. Vespa.

Habitat in trabibus antiquis, parietibus ligneis, fenestris, non rara.

Nidus expositus, nudus, orbiculatus, inaedificatus columnæ fuscæ, in quo cellulæ (40-60) quibus mater suos scutus concredit, excubias noctu & interdiu retro nidum agens; perfecta pupa tegitur cella operculo concolore, quod post dies 12-15, protrudit perfecta *Vespa*, cui macula frontis flava, subrotunda, macula nigra in medio notata; punctum flavum, unum utrinque inter oculos & eam maculam; lineola flava transversa supra antennas, aliaque retro oculos. Thorax antice linea terminatus flava, supra alas alia simili linea utrinque; postice tribus paribus punctorum flavorum, quorum ultimum sunt potius lineolæ quam puncta. Pedes flavi; femoribus nigris.

Variat 1. Antennis ferrugineis, macula frontis puncto nigro oblongo transverso inscripta, abdom. segmento secundo punctis duobus flavis.

2. Antennis nigris, maculæ flavæ frontalis puncto nigro postice trilobo, abdom. segmento secundo punctis binis fulvis.

3. Antennis nigris, maculæ frontalis puncto lunato, abdom. segmento secundo maculis binis fulvis.

Delitiæ *Vesparum* sunt fructus horæi, flores *Scrophulariæ*, *Cannæ*, *Indicæ*, *Mycæ*.

828. VESPA Muraria.

— long. lin. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 573.

Faun. Svec. 2. 1674.

Diagn. Abdomen fasciis quatuor flavis, secunda a prima remotiore & crassiore.

Habitat in trabibus, & parietibus.

Nidus involucro duplice: exteriore hemisphærico, altero rotundo in cuius sinu cellulæ paucæ.

Anten-

Vespa.**ACULEATA.****Vespa. 311**

Antennæ supra nigræ, subtus flavæ. Macula transversa flava oblonga in fronte. Thorax antice flava linea terminatus; puncto flavo utrinque sub alis anticis; linea flava transversa loco scutelli. Has maculas gerit quoque *Campestris* LINN. Faun. Svec. sed abdomen *Murariae* fasciis (4) flavis, prima remotiore. Pedes flavi, femoribus posticis nigris: apice flavis.

829. VESPA *Tinniens.*

— long. lin. 4½.

LINN. Faun. Svec. 2. 1679. parietina?

Diagn. Thorax pone punctis binis flavis, loco scutelli. Abdomen fasciis (5).

Habitat in sylvis, tinnitu singulari se manifestans.

Antennæ nigræ: basi subtus flava. Frons flava tota; maxillæ flavæ tridentatae. Inter antennas macula flava obcordata: basi puncto nigro notata, ad latus hujus maculæ utrinque lunula flava oculis inscripta. Retro oculos linea flava. Thorax linea laterali inter alas & caput. Sub alis anticis punctum trigonum, flavidum. Scutelli loco par punctorum flavorum. Abdominis fasciæ flavæ 2, 3, 4, uno latere repando, primæ a secunda, secundæ a tertia &c. distantia insensibiliter diminuta.

830. VESPA *Coarctata.*

— long. lin. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 573.

Faun. Svec. 2. 1676.

FRISCH. Inf. 9. Tab. 9. fig. 3.

Diagn. Abdomen petiolatum, ellipticum, acuminatum: petiolo infundibuliforme.

Circa *Labacum* &c.

Idem erit sive abdomen dicas petiolatum sive biarticulatum: articulo primo annulo flavo distinto a secundo, qui crassior & longior, antice duas maculas flavas in primo segmento gerit, cuius longitudine aliorum omnium longitudinem simul sumptam æquat aut superat. Thorax gibbus, antice linea flava terminatus; postice linea unoque pari punctorum flavorum, sub alis puncto utrinque uni-

co flavo. Antennæ nigræ: basi subitus flava. Frons flava. Tibiæ flavæ.

831. *Vespa Maculata.*

— long. lin. 2½.

Diagn. Abdomen punctorum flavorum paribus tribus: primo renotissimo.

Araneæ tela involutam cœpi, 15. Junii, in horto.

Caput totum nigrum. Thorax antice lineola terminatus, punctoque flavo laterali supra alas posito. Abdomen acumine deflexo, antice non truncatum, sed convergens, subitus immaculatum nitens. Thorax & caput punctis prominulis scabra, abdomen punctis imprellis. Pedes nigri.

F O R M I C A. (†)

LINN. *Syst. Nat.* pag. 579.

832. *Formica Herculeana.*

Abd. long. lin. 3.

LINN. *Syst. Nat.* p. 579.

Faun. Svec. 2. 1720.

Diagn. Nostrarum maxima, nigra; abdomine oblongo.

Habitat in cariosis putridisque arborum truncis.

Tria puncta impressa, seu foveolæ in vertice capitis. Maxillæ dentibus (5). Squama rotunda integræ. Femora modo nigra, modo plus minus rufescens, sed vere ferruginea nunquam.

833. *Formica Vaga.*

— long. lin. 1½.

Diagn. Nigra; abdomine ovato piloso.

Ha-

(†) Genus gregarium, satagens, inquietum, melliphagum, ferox, suæ iobolis amans, vindictæ cupidum, terram purgat a quisquiliis, resinam balsamicam congregat, scatet spiritu volatili nervino subacido; œconomiæ & sedulitatis humanae cathedra.

Formica. ACULEATA. Formica. 313

Habitat in putridis arboribus.

Puncta aut foveæ in capite nullæ. Thorax postice in singulo, latere duo parva tubercula gerit. Squama integrissima, rotundata. Abdomen pilosum.

834. FORMICA Nigra.

— long. lin. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 580.

Faun. Svec. 2. 1723.

Diagn. Nigra nitens; squamula integra.

Habitat in terra.

Minor priore; abdomine paucis pilis adsperso.

835. FORMICA Libera.

— long. lin. 1.

LINN. Obsoleta? Faun. Svec. 2. 1724.
descriptio certe in multis convenient.

Diagn. Nigra; antennis basi tibiisque rufis.

In terra degit, sine lege excurrens; nec cespites efficiens.

Squama integra, obtusa. Abdomen brevibus villis adspersum.

836. FORMICA Rufa.

— long. lin. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 580.

Faun. Svec. 2. 1721.

Diagn. Fusca; capite antice thoraceque rufis.

Habitat ad radices *Abietum*, *Betularum* &c. intra acervos vegetabilibus compositos.

Squama integra; apice nigricante. Pedes fulcescentes.

Harum ovulis seu embryonibus, pulli *Tetraonis Urogalli* & *Coturnicis* certo educantur.

837. FORMICA Cespitum.

— long. lin. ½.

LINN. Syst. Nat. p. 581.

Faun. Svec. 2. 1726.

Diagn. Abdominis petiolus nodis duobus alternis: posteriore majore.

In gramineis, tuberosis.

Thorax bispinosus, seu postice duabus spinis terminatus, quæ squamulæ loco sunt. Maxillæ dentibus sex. Abdomen nitidum, subrotundum.

Descriptiones neutrarum sunt.

M U T I L L A.

LINN. *Syst. Nat.* p. 582.

838. MUTILLA *Saltatrix.*

— long. — —

Huc refero animal 21. Martii cum floribus *Farfaræ* lectum, pediculo triplo minus, fuscum glabrum; maxillis pedibusque ferrugineis; antennis motatoriis, infraictis, thorace longioribus: articulo oblongo, acuto, fusco clavatis; stipite albido; abdome ovato, subtus jugo seu plica compressâ instructo. Hæc currit velociter, leviter tacta saltat, antennas aliquid agitat.



OR-

Tipula. HALTERATA. Tipula. 315

ORDO VI.
HALTERATA.
DIPTERA (†)
LINN. *Syst. Nat.* p. 584.

HALTERES CLAVATI SOLITARIIS PO-
NE SINGULAM ALAM.

OESTRUS.
LINN. *Syst. Nat.* l. c.

Cum speciem hujus generis nullam haec tenus examinaverim, ita de charactere generico nihil statuo. Ill. LINNAEUS OS absque proboscide aut rostro exerto ponit, FRISCHIUS autem in descriptione *Oestri Bovini*, ait habere rostrum retractile, ut *Musca Domestica*.

TI P U L A.

LINN. *Syst. Nat.* p. 585.

Os inerme, elongatum, antice palpiferum:
palpis duobus.

(*) *Antennis masculis compositis.*

839. TI P U L A *Pedlinicornis.*

Alæ long. lin. 6½.
LINN. *Syst. Nat.* p. 585.
Faun. Svec. 2. 1735.

Tipu-

(†) Ignota oris fabrica, nulla de his generibus certitudo.

Diagn. Thorax niger: dorso immaculato, politura nitente. Antennæ maris pectinatæ. Femora rufa.

Habitat in terra culta, circa hortos & pomaria volitans, Mayo M.

Mas. Antennæ rufæ, falcatae, pectinatum paribus decem; rachi subtus e quolibet articulo proferente clavulam rufam; basi nigrae. Caput nigrum, postice villosulum; palpis rufis. Thorax antice rufa transversa tumida linea terminatus; linea rufa laterali caput inter & alas, postice immaculatus, minusque nitens. Halteres rufi; capitulo luteo. Alæ patulæ, hyalinæ, basi rufæ; macula nigra costæ imposita iupra medium. Abdomen rufum; dorso macula nigra trigona, in singulo segmento; lateribus nigro-maculatis, nempe unica macula in segmento, 1, 3, 4, apice tuberoso sursum flexo ovato subbifido. Pedes femoribus rufis; genubus atris; tibiis fusco-rufis.

Fæmina. Seticornis; margine thoracis antico nigro, halteribus fuscis: capitulo apice luteo, abdome acuminato longiore nigro: basi, seu articulis 1, 2, rufis. Pedes ut in mare.

840. TIPULA *Idriensis.*

— *long. lin. 5.*

Diagn. Antennæ maris pectinatæ. Alæ fascia obsoleta lineaque media transverta fuscis. Femora rufa.

In pratis udis.

Mas. Antennæ nigrae, falcatae, absque clavulis e rachi genitis, ut in priore. Caput nigrum, palporum articulis binis tribusve primis luteis. Thorax niger, immaculatus: dorso nitente politissimo. Halteres nigri, basi rufi. Abdomen totum nigrum. Alæ hyalinæ, apice fusco, fascia antica obsoleta & puncto medio fuscis. Femora rufa; genubus nigris. Tibiae fusco-rufæ.

Fæmina. Antennæ setaceæ: articulis (14). Dorsum tuberculo rufo, loco scutelli. Alæ apice non fuscæ, linea in medio fusca. Abdomen apice rufum,

Tipulae in copula circumvolant, *fæmina* marem post se trahente.

Tipula. HALTERATA. Tipula. 317

fumi, basi nigrum; segmentis intermediis ruis, sed annulis fuscis invicem distinctis. Femora fusco ru- fa. Tibiae nigræ.

841. **TI P U L A** *Plumosa.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$

LINN. Syst. Nat. p. 587.

Faun. Svec. 2. 1758.

Diagn. Pallide virens; abdomine fasciis nigris; antennis fuscis, hyalinis, plumatis; alis hyalinis; puncto nigro.

Habitat in lacubus nostris copiosa.

Culice Pipiente paulo major, abdomine vero ex- que villoso & fasciato; nostræ præterea, oculi nigræ; thorax luteo-virens; antice lineis parallelis & macula laterali, rufis; alæ albidae, membranaceæ; margine villoso, puncto fusco. Pedes virescentes.

842. **TI P U L A** *Lacustris.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Nigra; antennis plumatis: extimo articulo crassiore albisque villis adsperso.

Circa lacus, Majo M.

Statura prioris, sed nigra tota. Alæ hyalinæ, absque puncto. Abdomen segmentis villosis, late- re pallidioribus. Femora rufescens. Recens na- ta, spumam albam pone thoracem, loco scutelli, gerit.

843. **TI P U L A** *Graminea.*

— long. lin. 1.

Diagn. Luteo-virens; antennis plumatis; alis pedibusque albidis.

In herbidis uidis, non rara, Aprili M.

Parvula; oculis fuscis; antennis albidis hyali- nis; alis immaculatis; abdomine villoso.

844. **TI P U L A** *Convallium.*

— long. lin. 1.

Diagn. Antennæ plumatæ, albidae. Thorax ru- fus. Abdomen fuscum, pilosum.

Secus rivulos, fruticibus infidet Jun'io. M.

Abdo-

318 *Tipula.*

ORDO VI.

Tipula.

Abdominis segmenta 1, 4, albida, colore pedum. Alæ hyalinæ, immaculatæ. Oculi nigri.

(**) *Antennis simplicibus in utroque sexu.*

845. **TIPULA Crocata.**

— long. lin. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 585.

Faun. Svec. 2. 1739.

Diagn. Nigra; alis macula fusca; abdomine basi cingulis senis flavis.

In pratis paludosis.

Fæminam describo, cui antennæ rufæ dentatae, seu articulis dentatis (10), basi villosa fuscescente. Caput nigrum; puncto flavo quadrato prope antennas; collari flavo. Thorax niger; linea flava laterali; puncto flavo in medio dorsi; lineola lutea sub alis utrinque. Halteres flavi. Abdomen acuminatum; distantia flavæ baseos a primo cingulo, æqualis distantiae primi cinguli a tertio; idem subtus pariter cingulis flavis (6). Pedes fulvi; geniculis fuscis. Alæ basi & costa fulvæ; macula nigricante marginali.

846. **TIPULA Rivosa.**

— long. unc. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 585.

Faun. Svec. 2. 1738.

P. PODA. Mus. Græc. p. 113. maxima.

Diagn. Alæ fuscæ: rivulo albo. Abdomen ferrugineum.

Habitat in aquæ fluentibus, æstate prodiens.

Maxima nostrarum. Antennæ articuli pilos duos longos e basi preferentes. *Mas* lineam semi-circularem nigram in dorso thoracis habet; alas ad costam maculis tribus fuscis magnis, quibus albidæ interjacent duæ uritæ rivulo ab apice alæ genito longitudinali. *Fæmina* alarum venis fuscis, maculis fere nullis. Pedes postici in mare etiam uncias duas & lineas quinque longi.

847. **TIPULA Lunata.**

— long. lin. $7\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 586.

Faun. Svec. 2. 1744.

Diagn. Alæ macula lunata alba marginali; venis fuscis. Oculi virescentes.

Habitat in lacubus.

Alæ macula fusca prope albam posita, & lineola transversa fusca ad basim. Halteres capitulo ovato, fuscescente. Frons & latera thoracis pallidiora. Abdomen maris macula fusca dorsali in quolibet segmento; fæminæ fuscum; linea dorsali & utrinque alia lateralí albidis. Femora rufa.

848. **TIPULA Pratensis.**

— long. lin. $6\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 586.

Faun. Svec. 2. 1745.

Diagn. Alæ macula lunata, fusca, marginali. Frons crocata. Thorax niger: punctis flavis variegatus.

In herbidis collibus, prope flumina, Aprili M.

Mas. Caput nigrum, tuberculo croceo in fronte supra antennas. Thorax niger; antice lineola flava & alas inter ac apicem punctis flavis in singulo latere (4); idem postice duobus paribus punctorum flavorum, alio lateralí utrinque inter alam & halterem. Halteres capituli apice flavo. Abdomen teres, apice crassius dorso glaucescens; latera maculis flavicantibus tot quot incisuræ nigris fasciis invicem distinctæ. Pedes nigricantes; femoribus posticis basi fulvis.

Fæmina a mare diversa abdome longiore crassiore acuminato, ponens ova nigerrima lucida oblonga, subtus planiuscula.

849. **TIPULA Annulata.**

— long. lin. $5\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 586.

Faun. Svec. 2. 1752.

Diagn. Alæ maculis punctisque fuscis variegatæ. Abdomen cinerascens: cingulis atris.

Circa fontes.

Alæ

520 Tipula. ORDO VI. Tipula.

Alæ patulæ: maculis fuscis prope coitam collocatis, alibi fusco-punctatæ: punctis plerisque subrotundis. Halteres pallidi, macula transversa obscuriore prope basim capituli subovati. Antennæ thorace breviores, attenuatæ, articulis (14): ultimo crassiore aliis binis tribusve subjacentibus. Abdominis segmenta 2, 3, 4, 5, 6, uno pari punctorum nigrorum notata. Femora rufescens: apice nigra. (Mas.)

Descriptio *Linnaea* non eadem, quæ data.

850. TIPULA Cimicoides.

— long. lin. 5.

Diagn. Antennæ articulis quatuor, longitudine corporis.

Non rara apud nos, in aquofisis.

Alæ patulæ, pallide fuscæ; vasis obscurioribus. Halteres petiolo cinereo; capitulo fuscenscente. Antennæ erectæ, setaceæ, nigræ, villosulæ, (4) lin. longæ; articulis quatuor. Thorax niger; lineis longitudinalibus cinereis. Abdomen nigrum, villosulum. Pedes nigri; femoribus rufescensibus.

851. TIPULA Chirothecata.

— long. lin. 5.

Diagn. Nigra; palmis pedum albis; alis fuscis, hyalinis.

In Carniolie superioris sylvestribus & aquofisis.

Antennæ tetaceæ. Thorax laterali linea pallida. Abdomen nigrum. Pedes an motatorii fuerint, non adnotavi, sed statura & habitus removet a motatricibus. *Tipula Vibratrix* LINN. pluribus notis a nostra dissert. (Mas.)

852. TIPULA Lineata.

— long. lin. 5.

Diagn. Flava; thoracis dorso lineis tribus astris; abdomine seriebus punctorum nigrorum quatuor lineato.

Circa Idriam. Maio M.

Fecissem ex hac *Cornicinam* aut *Flavescens* LINN. nisi harum descriptiones adeo dissentirent. Nostræ enim Caput flavum; occipite oculisque nigris.

Tipula. HALTERATA. Tipula. 321

nigris. Antennæ nigræ: articulis (10.). Thorax luteus; lineis seu maculis oblongis, atris, nitidis, longitudinalibus. Alæ hyalinæ; puncto parumper obscuriore, & nudis oculis vix distinguendo. Mari abdomen linea dorsali nigra, cæteris lineis ex punctis disjunctis factis. Fæmina abdominis lineæ omnes punctis nigris distinctis compositæ: laterales obscuriores. Pedes nigri.

853. TIPULA Ferruginea.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Tota ferruginea; oculis nigris; alis hyalinis: basi puncto ocellari.

Apud nos frequens.

Caput villosulum. Antennæ breves attenuatae. Abdomen subtusque punctis fuscescentibus in unam seriem dispositis lineatum. Alæ basi puncto oblongo, seu annulo fusco.

854. TIPULA Oleracea.

— long. lin. 8.

LINN. Syst. Nat. p. 585.

Faun. Svec. 2. 1740.

Diagn. Alæ hyalinæ; costa fusca.

Habitat in terra culta.

Mas cinerascens. Fæmina magis fusca. Alæ costa fuscescens, & alibi nullæ maculæ speciem demonstrant.

855. TIPULA Fasciata.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ hyalinæ; fasciis duabus fuscis, obsoletis. Abdomen nigrum.

In paludosis.

Antennæ utrique sexui setaceæ, quibus differt a T. Idriensi. Halteres pallidi. Femora flavescens.

856. TIPULA Inquieta.

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ hyalinæ; punctis (4) marginalibus, fuscescentibus. Pedes antici, longissimi motatorii.

322 **Tipula.** **ORDO VI.** **Tipula.**

In pratis paludois, umibrosis, iylvestribus.

Oculi nigri. Antennarum articuli apicibus nigris. Corpus ferrugineum. Pedes pallide ferruginei. Huic similis in omnibus, sed alis unico punto obsoleto, reperta circa aqueductus *Fedinarum Idriensis*, 14. Maii.

857. TIPULA Vibratrix?

— long. lin. $2\frac{1}{2}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1761. quodammodo eadem.

Diagn. Corpus albo-virens, alæ albæ, oculi nigri, pedes motatorii.

Habitat circa paludes.

Culice non major. Alæ albæ immaculatæ. Pedes corpori concolores.

858. TIPULA Fenestralis.

— long. lin. 3.

Diagn. Alæ hyalinæ fusco-maculatæ. Abdomen fasciis fuscis (6). Pedes ferruginei; geniculis fuscis.

In fenestris intra cubilia frequens, ex hortis involans.

Alæ costa, inter duas maculas fuscas marginales majores, flavescens. Oculi subvirides. Abdomen ferrugineum, fusco-fasciatum, villosulum.

859. TIPULA Tremula.

— long. lin. $3\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 587.

Faun. Svec. 2. 1762. eadem descriptione.

Diagn. Alæ vivido-hyalinæ, immaculatæ. Thorax maculis (2-3), obscurioribus.

Passim occurrit.

Nostræ, Antennæ articulis æqualibus: primo crassiore. Thorax rufescens; maculis duabus, fuscis. Abdomen fuscum. Pedes colore thoracis. An ergo vere *Tremula LINNAEI*? sit LINNAEUS ipse judex.

860. TIPULA Degener.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Antennæ articulis (24), pilosis.

In aquosis, Junio M.

Caput inflexum. Oculi nigri. Alæ immaculatæ, pallide ferrugineæ: costa pilosa. Color totius corporis lateritus.

861. TIPULA Boleti.

— long. lin. 2 $\frac{2}{3}$.*Diagn.* Testacea; abdomine fasciis fuscis; alis annulo marginali fusco.

Inter lobos & plicas *Boleti* cujusdam sessilis, Octobri M. Labaco adlati, erant larvæ quædam albidae, teretes, fere unciales, linea paulo crassiores, glabrae, glutine ubique madide, agilissimæ; capite ferrugineo: subtus emarginato; ore tribus foraminulis instructo: foramine medio majore; corpore, si luci oppositum fuerit, pellucido, in quo motus quidam peristalticus videbatur una cum binis catenulis. Hinc pupa flavescens, lineam crassam, tres fere longa, postice crassior, oris cute ferruginea retrorsum revoluta supra thoracem, abdominalis segmentis uno verrucarum pari exasperatis. Inde *Tipula* cui Caput subrotundum, nigrum; palpis longis, colore pedum; occipite piloso; antenuis attenuatis, thorace duplo longioribus, articulis (14): primis duobus crassioribus, secundo pilum e latere proferente, cæteris absque pilo. Thorax nigricans, gibbus, punctatus, antice pilosus. Abdomen fuscis testaceisque annulis alterne fasciatum. Alæ hyalinæ patentes. Halteres colore pedum. Pedes testacei, villosuli.

862. TIPULA Typhina.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Antennæ articulis (5). Abdomen nigricans; annulis albidis.

Circa lacus copiosa, Aprili. M.

Lin. tres longa. Thorax fuscus; linea lateralí pallidiore. Alæ patulæ. Abdomen villosum; villosis tuberculo innatis, unde scabriuscula fit abdo-

324 Tipula. ORDO VI. Tipula.

minis superficies. Femora tibiæque pallide luteæ. Per noctem relicta, in acu qua erat transfixa, altera die ex ano filum circinatum fuscum protulit, ut solet ideni facere *Ichneumon Gigas*.

863. TIPULA *Hemeroboides*.

— long. lin. 3 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigra; alis hyalinis, nigricantibus; ab domine linea fulva laterali.

In fruticibus non rara; *Hemerobio* similis.

Alæ immaculatæ. Femora atro-rufa. Succum fulvum læsa fundit.

864. TIPULA *Phalænoides*.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 588.

Faun. Svec. 2. 1771.

Diagn. Alis deflexis super folia assiduo cursu, parvula pilosaque tota.

Abunde & paßim.

Caput in cadavere valde inflexum. Antennæ articulis subovatis. Corpus totum pilosum, cinereum. Alæ pilosæ fusco-cinereæ, albo-punctatæ. Halteres fusti.

Variat alis pallidioribus, immaculatis: margine nigris punctis notato.

865. TIPULA *Labacensis*.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Flaya; thorace lineis tribus, longitudinalibus, nigris; abdomine fasciis (4), nigris: binis mediis approximatis.

R. P. WULFEN. *Labaco* misit.

Oculi nigri. Subtus tota flava. Alæ albidæ, immaculatæ. Pedes genubus palmisque nigris. Petitus ad latera punctis duobus atris.

866. TIPULA *Quadrinodia*.

— long. lin. 1.

Diagn. Virens; antennarum articulis quatuor; oculis nigris.

Musca. HALTERATA. Musca. 325

Circa hortos, Junio M.

Linea paulo longior. Alæ immaculatæ. Abdomen villosum.

M U S C A.

Os armatum rostro retractili: apice dilatato, basi palpigero: palpis clavatis. ROESEL.
Mus. Tab. 10. fig. 14.

I. Nobiles.

Alis situ suo triangulum efficientibus, seu divergentibus.

A. Plumatæ. Antennis plumula laterali.

(*) Abdomine basi truncato.

867. Musca Meridiana.

Alæ long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 595.

Faun. Svec. 2. 1827.

Diagn. Nigerrima; fronte lateraliter aurea; alis basi luteo-ferrugineis.

In sylvestribus locis reperitur; Ego in folio Aceris platanoid: & trunko Quercus rob. cum Scarabæis & Vespa Crabrone.

Major Carnaria; thorace piloso, pone setoso; abdome nitido; inter oculos & antennas macula aurea nitidissima, ad apicem oris usque producta. Alis basi, squama halterum, & accessoria luteo-ferrugineis; halteribus nigris: pedunculo fusco-ferrugineo.

868. Musca Carnaria.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 596.

Faun. Svec. 2. 1832.

FRISCH. Ins. 7. Tab. 14. fig. 1.

Diagn. Nigra; halterum squama margine alba; abdome cæruleo, nigro-teffulato.

Habitat in Mammalibus, Avibus, recenter occisis.

Celerrime & bombilando volat. Os tulvescens pilosum: pilis binis longioribus cruciformiter impositis. Thorax pilorum longiorum seriebus transversis quinis. Abdomen nitens, segmento penultimo pilis (34) longioribus ciliato.

869. *Musca Variegata.*

— long. lin. 4 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Cinerascens; thorace lineis tribus atris, abdomine nigro-tessulato.

In horto capta, *Idriæ*.

Antennæ nigræ. Linea nigra ab antennis ad occiput usque decurrentis. Scutellum lineola longitudinali nigra. Abdomen nitens, linea dorsali media, maculisque nigris, apice setosum; subtus nigris punctis adspersum. Halterum squama alba. Alæ immaculatæ.

870. *Musca Maculata.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Dorsum lineis duabus maculisque (5) nigris; Abdomen segmentis 2, 3, maculis quinque; apice binis punctis, nigris.

Frequentat flores plantarum *Umbelliferarum*.

Statura *Musca Cæsar*. Oculi brunei: margine albido. Scutellum puncto trigono nigro.

Variat 1. Lineis thoracis mediis in unam unitis cum altera, quæ apicem suum supra scutellum extendit; abdomine supra ferrugineo; halterum squama pallide ferruginea.

2. Thorace cinereo lineis (2) maculisque (5) nigris. Abdomine cinereo. Halterum squama alba. An sexus alius?

871. *Musca Cæsar.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 595.

Faun. Svec. 2. 1828.

Diagn. Viridi; vel aurato-viridi nitens pedibus nigris.

Frequens in floribus *Angelicae*, *Festinae* &c. Oculi

Musca. HALTERATA. Musca. 327

Oculi brunii. Thorax, abdomini concolor,
nitens.

- Variat 1. Colore viridi.
2. — aurato-viridi.

872. MUSCA Domestica.

— long. lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 596.

Faun. Svec. 2. 1833.

Diagn. Nigricans; thorace lineis (5) nigris;
abdomine subferrugineo, maculis nigris tessulato.

Habitat in fimo.

His venenum narcoticum est Agaricus Muscarius
lacti infusus, cuius parca dosis sopit unice
nec enecat animal, altero die evigilans & sanum
denuo.

873. MUSCA Cesarina.

— long. lin. 2½.

Diagn. Omnia ut in Musca Cesare, sed duplo
minor, sine puncto ferrugineo ad latera thoracis,
& halterum squama nivea.

Plures simul vidi in cortice Pyri com.

Nitidior Cesare, minusque setosa.

(* *) Abdomine orato.

874. MUSCA Colossus.

— long. lin. 6.

Diagn. Frons aurata. Oculi fulvi. Thorax
cinereus; lineis (3) dorsalibus, nigris, parallelis.
Abdomen thoraci subconcolor, nigro-tessulatum.

In hortis nostris; Majo M.

Maxima inter nostras. Os setis duabus, cru-
ciformiter incumbentibus, terminatum. Halterum
squama alba. Abdomen incurvum, apice magis
setosum. Pedes nigri.

875. MUSCA Martia.

— long. lin. 3½.

Diagn. Frons argentea. Thorax postice lineo-
lis (4), cinereis. Abdomen albidum, nitidum,
nigro-tessulatum.

Circa domos, reperitur, Martio M.

Major *Domestica*; thorace nitido, setoso & piloso; scutello cinerascente: puncto nigro; tuberculo rufu ad latera thoracis prope caput. Halterum squama alba. Pedes nigri.

876. MUSCA *Tuguriorum.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Thorax fusco-cinereus. Alæ linea puncto que fuscis: basi senioribusque mediis ac pollicis ferrugineis.

Circa æquinoctium vernum, prope Rusticorum tuguria, frequens.

Paulo major M. *Domestica*; proboscide apice palpisque basi ferrugineis; fronte colore thoracis; scutelli apice ferrugineo; abdomine cinerascente, nigro-tessulato, nitido.

877. MUSCA *Prostrata.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. *Domestica* simillima, celerrime avolans revolansque in eundem locum, pectori & abdomini infidet pedibus expansis, quorum ungulæ albæ.

Circa fenestras, & ruri, frequens.

Nigricans; abdomine tessulato. An hæc M. *Albifrons* LINN.? Non videtur.

878. MUSCA *Nigrita.*

— long. lin. 2.

Diagn. Nigerrima, nitens; alis costâ nigris; halterum squama alba.

In herbidis collibus circa Idriam.

Oculi fuscæ. Abdomen segmentis ciliatis. Alæ ad costam seminigræ. Halteres nigri: clavæ basi pallidiore puncto notata.

879. MUSCA *Corni.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; alis basi scutello pedibusque ferrugineis.

Reperta inter *Aphides Corni*.

Thorax lineis cinereis. Halterum squama ferruginea. Abdomen obcordatum.

880. **MUSCA Angelicæ.**

— long. lin. 3½.

Diagn. Cinerea; ocello quadrato occipitali; alis basi ferrugineis.Frequens in floribus *Angelicæ sylv.*Statura M. *Domesticæ*. Oculi brunei. Pedes ferruginei.881. **MUSCA Rufiventris.**

— long. lin. 3.

Diagn. Fusca; abdomine pedibusque ferrugineis. In *Carniola* calidore.

Magnitudo prioris. Halterum squama ferruginea. Abdomen nitens, subpellucidum.

(*** *Abdomine oblongo.*)882. **MUSCA Tripunctata.**

— long. lin. 1½.

Diagn. Alæ sedentis erectæ; punctis fuscis tribus.Martio M. capta circa *Idriam*.

Corpus agile, alarum longitudine. Caput ferrugineum. Oculi virescentes. Thorax antice gibbus. Halteres albidi, nudi. Abdomen oblongum, nitidum; ano piloso & fuscum sterlus facile fundente. Alæ patulæ & erectæ.

B. *Setariæ. Antennis feta lateralí.*(*) *Abdomine subrotundo.*883. **MUSCA Rotundata.**

— long. lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 596.

Faun. Svec. 2. 1838.

Diagn. Alæ basi ferrugineæ. Abdomen rufum; maculis longitudinalibus nigris.

In pratis non rara.

Generis etiamnum dubii ob rigidum & ore canaliculato exceptum rostrum, ut in *Rhingia nostra*. Sit itaque *Musca*, donec diligens examen rostri, dubium absterget.

Frons argentea. Oculi rufescentes. Antennæ nigræ, lineam longæ. Thorax niger. Halteres ferruginei, albidæ squama tecti. Alæ hyalinæ, parumper fuscantes: basi luteo-ferruginea. Abdomen ambitu subrotundo rufso, subtus immaculato. Pedes nigri.

Variat, maculis abdominis distinctis subrotundis, nec non cohærentibus & trigonis.

(**) *Abdomine ovato.*

884. MUSCA Deceptoria.

— *long. lin. 3½.*

P. PODA. Mus. Græc. p. 116.

Diagn. Abdomen ferrugineum, pellucidum, setosum; linea dorsali nigra.

In pratis.

Et ista dubia est, ob rostrum ut in priore. Antennæ rufescentes: apice obtuso nigro. Frons alba; retro oculos caput lana canescente pubescens. Thorax fuscus, lineis pallidioribus. Scutellum ferrugineum. Abdominis segmenta, præsertim postica, setulis nigris crebrioribus ciliata. Alæ basi & costa fere tota ferruginea. Halterum squama alba. Femora nigra. Tibiæ rufescentes, nigris pilis adspersæ. Conf. M. Feram. LINN. Faun. Svec. 2. 1836.

885. MUSCA Temula.

— *long. lin. 3½.*

Diagn. Nigerrima tota & nitens; alis basi halterumque squamula luteo-ferrugineis.

In floribus *Cherophylli temuli*.

Pili in fronte pro varia lucis incidentia argenteo nitore fulgent. Halteres pallide rufi. Abdomen setosum.

886. MUSCA Falcata.

— *long. lin. 3.*

Diagn. Alæ hyalinæ; costa fasciisque binis, arcuatis, ferrugineis.

In pratis.

Statura *Domesticae*. Oculi virides. Frons fulva. Thorax pallide ferrugineus; punctorum nigro-rum

Musca. HALTERATA. Musca. 331

rum ordinibus longitudinalibus (4): punctis tribus in singulo ordine lucidis. Scutellum punctis pilisque nigris (4). Abdomen basi bidentatum, segmento quodlibet punctis (4) nigris. Linea ferruginea juxta alae costam decurrentis, abrupta est inter fascias, quarum margo fascus; ad basim alae ruderis tertiae fasciae conspicuntur pariter ferruginea. Pedes ferruginei.

887. MUSCA *Ceruleophthalmica*.

— long. lin. 1½.

Diagn. Oculi cærulei. Frons pedesque flavi. In herbidis occurrit, Majo M.

Parva. Thorax villosum glaucescens. Abdomen basi bidentatum, fuscescens: apice flavo. Alæ hyalinæ: puncto fusco. Sed denuo observandæ alæ, an vere *nobiles*, in hac & priore.

(***) *Abdomine subovato.*

888. MUSCA *Larvarum*.

Diagn. Nigricans, pilosa; fronte subargentea; abdomine incisuris ciliatis.

Habitat intra larvas *Lepidopterorum*.

Habitus M. *Carnariae*, vel *Domesticae*. Oculi brunei. Frons albedine subargentea nitens. Antennæ nigræ, deflexæ. Thorax cinerascens; lineis nigris, vel e contra. Abdomen postice attenuatum; segmento primo nigro, cæteris pro varia lucis incidentia subargenteis, margine & linea dorsali nigris: setæ ex marginibus segmentorum abdominalis, ciliorum adinstar. Pedes nigri. Hujus varietates hasce vidi.

1. M. Larvæ *Ph. Pavonie*.

— long. lin. 4½.

Diagn. *Carnaria* nihilo minor. Scutelli puncto ferrugineo.

Ex larva involuta *Phalæna Pavoniae* viginti mihi natæ sunt.

Thorax cinereus: lineis nigris. Alæ non hyalinæ. Abdomen pallidius tessulatum.

Huic

Huic imprimis convenit definitio M. *Larvæ* ab Ill. LINNÆO data in Syst. Nat. p. 569. et si staturam *Musæ Domestice* non habeat.

2. M. Larvæ Papil. Fo.

— long. lin. 3.

Diagn. Statura *Carnarium* inter & *Domesticar* media. Scutellum thoraci concolor.

Alæ non hyalinæ, nec abdomen tessulatum.

3. M. Larvæ Phalænæ Quercus.

— long. lin. 3.

Foliiculi apicem protrusit & prodiit.

4. M. Larvæ Phalænæ Laneflris.

— long. lin. 2½.

Alæ hyalinæ.

889. MUSCA Alni.

— long. lin. 4.

Diagn. Nigricans; oculis ferrugineis; halterum squama lactea.

Habitare in *Alno*, retulit Ill. p. m. Comes CAR. a LAMBERG. Eq. Teut.

Carnariæ statura. Palporum clavæ ferrugineæ. Scutelli albidi apex ferrugineus. Abdomen segmentis argenteis: margine nigris, setosis. Pedes nigri.

890. MUSCA Roralis.

— long. lin. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 597.

Faun. Svec. 2. 1846.

Diagn. Tota nigra, nitida; alis hyalinis, immaculatis.

In floribus *Pastinace sativa*, copiosi.

Minor domestica, villosa; oculis bruneis.

891. MUSCA Pluvialis.

— long. lin. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 597.

Faun. Svec. 2. 1844.

Diagn.

Musca.

HALTERATA.

Musca. 323

Diagn. Cinerea; thorace maculis quinque; abd. segmentis 2, 3, punctis tribus atris.

Pasim in plantis occurrit.

Oculi fusco-castanei. Antennæ nigrae. Thorax punctis duobus anticus, tribusque posticus nigris: medio majore. Puncta tria conica nigra in finguo abdominis segmento secundo & tertio, quæ LINNÆO dicuntur maculae obsoletæ tridentatae. Alæ hyalinæ. Halterum squama alba: margine ferrugineo. Pedes nigri.

(****) *Abdomine oblongo.*

892. MUSCA Doronici.

— long. lin. 2.

Diagn. Tota nigra & pilosa, alis hyalinis; nervis fuscis, pilosis.

Inveni sedentem super florem *Arnicæ scorpioidis* LINN. in summo M. Dull.

Domestica paulo minor, nigerrima & fere tomentosa. Alæ immaculatae.

893. MUSCA Vernicina.

— long. lin. 1 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Nigerrima, politura nitens; tibiis rufis.

Habitat in *Carniola super.*

Antennæ porrectæ, obtusæ, seta propria breviores. Corpus villosulum. Abdomen acuminatum.

894. MUSCA Præceps.

— long. lin. 3 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Thorax cinereus; lineis (2), dorsalibus, nigris. Abdomen subcylindricum, fulvum; linea dorsali, nigra. Femora fulva.

In hortis, circa fenestras, non rara.

Continuo & celeriter cursitat, longis pedibus insistens, expansis alis, brevi tempore quiescens & tunc anticos pedes sepe fricans & adterens. Praeterea huic frons, certa lucis incidentia subargenteo nitore fulgens. Antennæ basi pilosæ & fulvae: articulo ultimo deflexo obtuso nigro. Palpi fulvi, thorax cinereo-albicans. lineis nigris; vel econtra. Alæ hyalinæ, immaculatae, basi ferrugineæ. Halterum

rum squama albida: margine ferrugineo. Abdomen porrectum, nitens, fulvum, subpellucens: segmentis quatuor laxe pilosis, prope marginem setis verticillatis, dorso macula nigra in lineam longitudinalem cum sociis confluente. Femora fulva; pedes alibi nigri.

Variat abdomine nigro; lateribus fulvis.

895. MUSCA *Plumipes.*

— long. lin. 2.

Diagn. Aenea; oculis viridibus; femoribus ferrugineis; palmis mediis plumosis.

In paludosis Majo M.

Antennæ porrectæ, ferrugineæ: apice nigræ; setula nigra. Frons, seu linea inter oculos, aurea. Oculi viridis-aeris colore elegantissimo tincti. Thorax & abdomen coloris ænei, aliquo virore immixti. Halteres ferruginei, subnudi. Alæ hyalinæ, immaculatae. Abdominis segmenta margine fusca. Genitale terminatum lamellis binis, albidis, ciliatis: ciliis nigris. Manus nigræ, sed mediae ad initium vere plumosæ. Tibiae posticæ imprimis spinosæ.

II. *Plebeja.*

Alarum incumbentium costis subparallelis.

A. *Plumatæ.*

896. MUSCA *Scybalaria.*

— long. lin. 4. (mas)

LINN. Syst. Nat. p. 599.

Faun. Svec. 2. 1860.

Diagn. Frons fulva. Thorax lineis longitudinalibus obscurioribus. Alæ ad costam subferrugineæ; puncto medio obscuriore. Antennæ subplumatae.

Habitat in stercore humano.

Mas ab domine, pectore, femoribusque rufo-tomentosis. Alæ domine oblongo; major, cui vere convenit definitio LINNÆANA *Musca scybalariae.*

Femina absque rufo-tomento, obscurior, minor; ab domine ovato; segmentis utrinque puncto late-

Musca. HALTERATA. Musca. 335

laterali nigro; cui convenit definitio LINNÆANA
Muscæ Stercorariæ. Sed & notæ clariores desiderantur quibus M. *Fimetaria* LINN. vere differat a fæmina *Scybalariae*.

Variat tomento, plus minus rufo, & densiore.

897. **Musca Rufa.**

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Tota rufa & nitens; oculis bruneis; nucha puncto nigro. Pedes corpore pallidiores.

Invenitur in hortis, Majo M.

Statura prioris. Occiput binis paribus pilorum nigrorum. Tubercula tria, pellucida, pallidiora, puncto nigro occipitali circumstantia. Antennæ deflexæ; plumula nigricante, quæ nudis oculis seta videtur. Palpi rostro obscuriores. Thorax dorso punctulato, raris pilis adsperso. Scutellum pilis duobus terninatum. Halteres nudi, colore pedum. Femora & tibiæ pallide flavescunt. Alæ puncto & maculis destitutæ.

898. **Musca Amentaria.**

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Abdomen æneo-fuscum: basi truncatum. Thorax fuscus, setosus.

Copiosa occurrit in amentis *Salicis* Martio M.

Statura M. *Cæsaris*, eademque crassitie. Antennæ deflexæ. Oculi castanei. Thorax pilis rufescentibus, setisque nigris. Halterum squama pallide ferruginea. Abdomen fuscum, æneum, nitens, villosum, ovo transversim per medium secco simile. Pedes nigri.

899. **Musca Unguicornis.**

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Caput supra, antennæ porrectæ, pedesque rufi. Alæ costa fusca & postice fuscō-reticulatae.

Habitat in *Carniolix* cultis, non rara,

Antennæ caput terminant porrectæ, cornuum adinstar: articulo primo compresso rufo pilisque nigris pubescente, secundo nigricante acuminato minore. Paria duo punctorum nigrorum inter nucham & antennas; puncto alio majore ad nucham,

tho-

thoraci contiguo. Thorax fuscus; linea fulva dorsali, & alia pariter fulva in singulo latere. Alæ hyalinæ: costa fusca, & obsolete fusco-reticulatae infra medium halteres subnudi, capituli latere fusco. Abdomen cylindraceum, nitens, fuscescens; linea longitudinali obscuriore. Pedes rufi; femoribus crassiusculis, pilosis.

900. MUSCA Fumigata.

— long. lin. 3.

Diagn. Nigricans. Oculi fasciis transversis binis rubris. Os album. Alæ costa nigra, alibi fusco-reticulatae alboque maculatae.

Apud nos non rara, in pratis.

Caput antennis terminatum porrectis fusco-ferrugineis; pluma alba. Maculæ duæ nigerrinæ, oculis interne adjacentes. Nucha albida: puncto medio lucido nigro. Os subargenteum. Rostrum apex palpique ferruginei. Thorax fusco-cinerascens; punctis nigris. Alæ ad apicem punctis albis, rotundis, distinctis variegatae, alibi fusco-reticulatae; margine crassiore nigro. Halteres nudi. Abdomen oblongum, lucidum, nigricans. Pedes nigri.

901. MUSCA Coryleti.

— long. lin. 2 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Ferruginea; Oculi fasciis duabus, fulvis. Alæ punctis strigisque fuscis variegatae.

Inter *Corylos*, non rara.

Antennæ porrectæ, caput terminantes, apice nigræ; plumula nigricante, basi pallide ferruginea. Os argenteum. Caput supra lucidum, rufum. Thorax pallide ferrugineus; lineolis dorsalibus binis saturatiорibus. Abdomen thoraci concolor, cylindraceum; segmentis margine obscurioribus. Pedes ferruginei.

902. MUSCA Longipes.

— long. lin. 2 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Fusca, nitens; fronte fulva; ore argenteo; pedibus ferrugineis, longis: femoribus posticis abdomine duplo longioribus.

Habitat in sylvis Majo M.

Musca. HALTERATA. Musca. 337

Lin. (3½) longa, dimidiā crassā; antennis rufis; halteribus pallidis, alis immaculatis: costa venisque ferrugineis, genubus fascia nigra.

903. Musca Fungorum.

— long. lin. 1½.

ROESEL. Musc. Tab. 8. fig. 3.

FRISCH. Inf. 3. Tab. 4. fig. 3. p. 15-16.

Diagn. Supra fuscescens, subtus, pedibusque pallidioribus; larva in *Agaricis* & *Boletis* habitans.

E *Boleto bovino* certius nascitur.

Larva albida, non saltatrix, capite fusco, abdominis apice bifido: segmentis decem, quorum margines pilis nigris brevibus ciliati; hinc *Musca parvula*, lineam & dimidiā longa, oculis castaneis, rostro halteribus concolore; occipitis tuberculo fusco; abdomine oblongo, nitido, fusco: segmentis margine ferrugineis; halteribus nudis; alis hyalinis corpore longioribus: margine crassiore, venisque fuscis.

904. Musca Putris. (Casei.)

— long. lin. 1½.

LINN. Syst. Nat. p. 597.

Faun. Svec. 2. 1850. β.

FRISCH. Inf. 1. Tab. 7. fig. 4.

Diagn. Nigrescens, glabra; oculis ferrugineis; larva saltatrix in Caseo butyraceo molli & humido degens.

Habitat in caseo, quocum avide voratur a multis, quibus has delicias non invideo.

905. Musca Oenopota.

— long. lin. 1½.

Diagn. Parvula, volitat circa orificia vasorum & doliorum vinariorum.

Habitat in cellis vinariis, & domibus advolans amphoris vino plenis, quo saepe immergitur, bibentium incommodo.

M. Cellarem LINNAEI esse nullus dubito, sed neque *setaria*, nec vere nigra. Oculi ferruginei & fere rubelli sunt, thorax æneo-fuscus: postice tri-

bus ordinibus longitudinalibus pilorum brevium; minor *M. Fungorum*.

906. **Musca Lunulata.**

— long. lin. 2.

Diagn. Oculi ferruginei : fasciis duabus fulvis. Alæ nigræ : punctis rotundis albis variegatae.

Circa Idriam capta.

Frons alba. Antennæ porrectæ, ferrugineæ, caput terminantes. Thorax pallide ferrugineus, punctulis fuscis sparsis minoribus, majoribusque in quatuor series longitudinaliter dispositis. Abdomen cinereum, oblongum, maculis nigris. Pedes pallidi : fascia obscuriore prope genua.

907. **Musca Coleoptrata.**

— long. lin. 1½.

Diagn. Alæ arcuatæ, fuscescentes. Corpus nigrum. Os, thorax subitus pedesque albidi.

In fenstra domus meæ capta 30. Aug.

Iners, superne nitens. Abdomen ellipticum. Alæ costa obscuriores, rigidulæ, arcuatæ, coleopteri adinstar. Genua postica nigra.

B. *Setariae.*

(*) *Seta terminali.*

908. **Musca Muraria.**

— long. lin. 1½.

Diagn. Nigra ; fronte pilosa ; setulis antennarum capite longioribus.

Cursitat super muros & turres, gregatim, Aprili M.

Duas lineas longa. Caput, parvum ; fronte & occipite erectis pilis barbato ; antennis obtusis, distinctis, brevibus ; thorace gibbo, non piloso ; halteribus pallide rufis : clava ovali ; alis hyalinis immaculatis ; cruribus nigris ; tibiis rufescentibus. Alas agilior, gracilior, in apice abdominalis duo corpora uncinata inflexa gerens.

909. **Musca Cursoria.**

— long. lin. 1½.

Diagn.

Musca. HALTERATA. Musca. 933

Diagn. Parva, vix volare potest, sed ceterime cursifast, femoribus anticis crassioribus.

In hortis.

Culice minor; capite parvo, rotundo; palpis albidis, pilo terminatis; rostri vagina apice ferruginea; alis immaculatis: nervis fuscis; thorace nigro; abdom. basi testaceo, apice fusco; pedibus anticis testaceis, crassioribus: posticorum femoribus apice nigris.

910. *Musca Formosa.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Oculorum dimidia portio virescens, altera fusca. Thorax lucidus vires. Abdomen lucidum violaceum: apice dilatum.

Floribus dum insidet alas patulas habet, alibi plebejas.

Antennæ setula basi villosa. Caput inter oculos nigrum, nitens. Thorax villosulus. Abdomen lateribus acutis: segmentis (5). Halteres nudi, albi. Rostrum apice albidum. Alæ hyalinæ ad apicem nulla anastomosi. Pedes nigri; geniculo primo albido.

911. *Musca Cupraria.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 598.

Faun. Svec. 2. 1853.

Diagn. Thorax viridis nitens. Abdomen pyritosum.

In pratis.

Oculi virides. Thorax villis subaureis pubescens. Abdomen pyritis flavi calore, nitens, villosum, oblongum. Subtus, pedibusque nigricantibus; genubus abdominis colore.

912. *Musca Rara.*

— long. lin. 3.

Diagn. Nigro-flavoque varia; scutello flavo, bispinoso.

In arboribus Carnioliae mediae, rarissime repetitur.

340 Musca. ORDO VI. Musca.

Antennæ ferrugineæ. Frons flava, in medio nigra. Thorax niger, lineis duabus dorsalibus & macula laterali flavis. Scutellum flavum; spinis duabus luteis. Abdomen ovatum, nigrum, maculis in singulo latere binis, aliaque terminali, flavis. Pedes flavi; femoribus basi nigris. Halteres flavi.

913. MUSCA Ferruginea.

— long. lin. $6\frac{1}{4}$.

Diagn. Magna, ferruginea; abdomine ovato; scutello bidentato.

Labaco accepi.

Antennæ erant mutilatæ, hinc certus non sum, an setula terminatæ an vero muticæ sint. Oculi fusci. Alæ nervis ferrugineis.

(**) *Seta laterali.*

(†) Antennis adscendentibus.

914. MUSCA Iridata.

— long. lin. $4\frac{1}{2}$.

Diagn. Oculi fascia iridiformi, seu cœrulea rubraque. Thorax virens nitidissimus. Abdomen lucidum, lanceolatum, æneo-violaceum.

In pratis non rara, mellisuga.

Antennæ nigræ, clavatæ, villosæ. Oculi nitentes, viridi-castanei. Rostrum labiis albidis. Tuberula tria parva ad nucham. Thorax subovatus, villosulus. Abdomen lineas tres longum, modice convexum, subtus nigricans. Pedes nigricantes. Alæ hyalinæ: linea fusca marginali.

915. MUSCA Violacea.

— long. lin. 3.

Diagn. Habitus prioris, sed duplo fere minor: oculis viridibus; fascia violacea.

Habitat cum priore.

Rostrum halteribus concolor. Caput inter oculos viridi-nitens. Thorax viridis. Halteres albi. Alæ nigredine in medio inquinatæ eaque fere fasciatæ. Abdomen violaceum totum. Dimidia oculi portio, supra fasciam, semicirculo violaceo cancellata. Puncta tria alba in fronte.

(†)

(††) Antennis porrectis.

916. MUSCA Bipunctata.

— long. lin. 4 $\frac{1}{4}$.*Diagn.* Lucida; thorace viridi; abdomine violaceo; punctis duobus albis in fronte.

Habitat cum prioribus.

Antennæ nigrae, vix villosæ. Rostrum ferrugineum. Oculi fusci. Thorax virens, lucidus, oblongus. Alæ basi ferrugineæ. Halteres pallide flavescentes, nudi. Abdomen lanceolatum, basi ferrugineum. Pedes ferruginei. Conf. *M. Glaucia*. LINN. Faun. Svec. 2. 1813.

917. MUSCA Spatula.

— long. lin. 5.

Diagn. Antennæ longitudo alæ latitudinem æquat. Scutellum bicorne. Abdomen spatulæ capitulo simile, thorace latius.

Inveni circa Idriam 23. Junii, in herbido colle.

Corpus nigrum, septem lineas longum. Antennæ nigrae, thorace vix breviores. Caput inter oculos flavum. Scutellum flavescentis; spinis duabus. Abdomen lineas tres latum, tres & dimidiadim longum, compressum, lateribus acutis, basi truncatum. Alæ ita impositæ, ut nuda sint latera abdominalis. Halteres lutei. Femora fusca. Tibiae ferrugineæ.

918. MUSCA Albifeta.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Rufescens; ore argenteo; antennis seta alba; oculis ferrugineis: fasciis duabus fulvis.

In pratis & hortis.

Similis *M. Unguicorni*. Antennæ basi ferrugineæ. Duo paria punctorum nigrorum inter antennas & nucham. Caput supra rufum; subtus tumidum, albo-argenteum. Thorax rufescens; lineis obscurioribus. Alæ basi & costa ferrugineæ, postice anastomosi flexuosa, litteræ (S) simili notatae, quale signum etiam habet *M. Cardui* LINN.; praeter hanc lineam, decurrunt longitudinaliter juxta venam medium, puncta tria vel quatuor fusca.

348 **Musca.** ORDO VI. **Musca.**

Rostrum & femora ferruginea. **Haltes albidi,**
nudi.

919. Musca Spiniipes.

— long. lin. 2½.

Diagn. Rufa; femoribus posticis crassioribus longioribus subtusque spinosis; punctis, duobus nigris supra, totidemque sub antennis.

Ruri capta 17. Aprilis.

Oculi fasciis duabus rufis. Alæ puncto medio, fusco. Pedes postici differentiam constituunt.

920. Musca Buccata.

— long. lin. 3½.

Diagn. Nigricans; facie tumida, albida; alis nigris; antennis rufis.

In sylvis. Majo M.

Caput supra planum, rufum. Oculi remoti. Antennæ obtusæ, clavatæ. Thorax fusco-rufescens. Ad basim alæ lineola alba lunata. Abdomen teres, cylindricum, villosum.

921. Musca Virens.

— long. lin. 3.

Diagn. Aurato-virens; thorace lineis nigris; pedibus longis.

In sylvestribus.

Antennæ nigræ, sub apice setam seipso longiorem proferentes. Tuberculum nigrum in occipite, e quo pili duo. Dorsum thoracis lineis longitudinalibus fuscis quatuor, quibus pilorum ordo interjacet. Alæ hyalinæ; puncto medio subferrugineo. Halteres flavi. Abdomen teres, pone attenuatum; marginibus segmentorum nigris. Pedes longi obscurius virides.

922. Musca Ornithovora.

— long. lin. 1½.

Diagn. Nigra; fronte pilosa, rostro pedibusque ferrugineis; antennis seta propria triplo brevioribus.

Habitat, in cadaveribus Avium & Piscium; Cibariae LINN. proxima.

Musca. HALTERATA. Musca. 343

Abdomen basi bidentatum, glabrum. Thorax absque pilis. Alæ immaculatæ, hyalinæ. Cursus celer. *Pupa* ferruginea; antice duobus corniculis setaceis, postice margine denticulato, linea longitudinali fuscescente.

923. Musca Strumosa.

— long. lin. 2.

Diagn. Corpus gracile longum; caput ovatum, basi subtus obesum; pedes longi, femoribus rufis: fascia fusca.

Super folia arborum, frequens.

Corpus nigricans. Rostrum albidum. Caput brevi collo, tanquam petiolo impositum; foveola in fronte. Thorax antice attenuatus. Alæ hyalinæ immaculatae. Abdomen imberbe. Halteres albidi, nudi. *Mas* abdomine tenuiore: postice dilatato, pene recto setaceo. *Femina* longior, abdomine acuminato.

924. Musca Lacustris.

— long. lin. 2½.

Diagn. Thorax æneus. Abdomen viridi-æneum. Ambulat super aquas stagnantes tanquam *Cinex Lacustris*.

Habitat in lacubus.

Frons subargentea. Oculi virides. Pili duo divaricati in occipite. Antennæ nigræ, clavatae, obtusæ. Rostrum palpis subvilloso, parvis. Thorax æneus, glaber. Alæ hyalinæ, immaculatae; costa antice ferruginea. Scutellum edentatum, rotundatum, pilosum. Abdomen lineam longum, viridi-æneum, albido villo adspersum, subtus subfuscum: segmentis lateraliter punctatis. Pedes longi: lamellis unguium pallidis.

(†††) Antennis deflexis.

925. Musca Hortulana.

— long. lin. 4½.

Diagn. Nigra, nitens; halterum squama albida.

In hortis & cultis.

Corpus lineas quinque longum, unam cum dimidia crassum, villosulum, atrum, nitens. Abdomen oblongum. Alæ immaculatæ.

926. Musca Maritima.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.
Diagn. Thorax æneus. Abdomen rufum: basi apice que nigrum. Femora postica denticulata.

Habitat circa Mare Adriaticum, prope Tercestrum.

Abdominis latera parallella, segmenta 2, 3, rufo-fulva; cætera nigra. Tibiae slavecentes. Femora polita crassiora, subtusque spinulis pluribus hirta. Thorax æneus. Halteres albidi. Abdomen basi subtus albidum.

927. Musca Meticulosa.

— long. lin. 2 $\frac{3}{4}$.
Diagn. Nigra, nitens; tibiis rufis: fascia nigra, posticis curvis.

In hortis, suspensa in aere ante florem, prius quam ei insidet, facillime inde fugiens.

Alæ immaculatæ. Halterum squama alba.

928. Musca Merulina.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.
Diagn. Tota nigra nitens; oculis rubellis; alis fuscouscentibus.

Habitat, ruri, anthophila.

Oblonga, duas lineas longitudine, dimidiata crassitie æquans, pilosa; abdome tereti, subcylindrico; segmentorum marginibus setoso-ciliatis. Pedes nigri.

929. Musca Cannabina.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.
Diagn. Thorax æneus. Abdomen pellucidum, flavum: fasciis nigris alterne angustioribus.

Habitat in Cannabi, sub cuius foliis, Augusto M. sunt pupæ glibræ, fusco-rubræ, antice crassiores, postice pallidiores; corniculo supra caudam parvo bifido subrecto.

Oculi castanei: margine albo. Antennæ slavecentes. Thorax lucidus, glaber. Alæ hyalinæ.

Scu-

Musca. HALTERATA. Musca. 345

Scutellum luteum. Halteres pallidi. Abdomen lanceolatum, compressum, tres lineas longum; fasciis nigris: binis ultimis solitariis, cæteris binatis. Linea nigra a basi ad apicem abdominis per medium superne decurrentis. Pedes flavescentes.

930. MUSCA Palustris.

— long. lin. 4 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Thorax æneus. Abdomen flavo-rufum; fasciis tribus, nigris.

Habitat in herbidis, paludosis, umbrosisque.

Larva lin. (5) longa, depressa, ferruginea; corniculo caudali bifido, lineis transversis nigris variegata, degens sub lignis dejectis. *Musca* lin. (4) longa; oculis bruneis; antennis rufis: seta nigra, apice fuscis; fronte nitida, flavescente, supra antennas villosa; thorax nitens, villosus; scutellum flavicans; halteres albidi; abdomen subtus rufum; alæ immaculatæ: pedes scutello concolores. Prodiit mihi 26. Aprilis.

931. MUSCA Pyrastris.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 594.

FAUN. SVEC. 2. 1817.

Diagn. Thorax villosus. Abdomen lunularum flavarum paribus tribus.

In Carniola, non rara.

Nihilo minor *Api Mellifica*. Antennæ clavatae, breves, obtusæ, nigrae. Frons sordide flava. Thorax & pectus villo griseo tomentosa. Scutellum lividum. Abdomen nigrum; supra tribus paribus linearum lunatarum flavarum, convexitate abdominis apice respicientium, idem subtus subdiaphanum, sordide flavum. Femora nigra. Tibiae & femora antica mediaque dimidia parte ferruginea. Alæ immaculatae; lineola marginali, ferruginea.

932. MUSCA Erratica.

— long. lin. 3.

Diagn. Thorax æneus. Scutellum atro-cæruleum. Abdomen nigrum: fascia rufa.

In sylvis, & ruri vagatur.

346 Musca. ORDO VI. Musca.

Frons atra, nitens. Antennæ nigricantes. Thorax nitens. Alæ hyalinæ, in medio fuscescentes. Halteres flavi. Abdomen nitens, comp̄ssum, lanceolatum, segmentis duobus ultimis margine glauco, fascia subabrupta fulva utrinque in secundo segmento. Pedes circa genua, una cum palmis ferruginei.

933. Musca Libatrix.

— long. lin. 3½.

Diagn. Thorax æneo-fuscus: scutello flavo. Abdomen nigrum: fasciis quatuor, quarum tres antice abruptæ.

Flores adit, libat, antequam sedeat.

Non confundenda cum *Musca Menthastri LINN.* quæ *Musca Domestica* dimidio minor, pedibus flavis. Thoracis lateribus linea lutea, abdomine lineis arcuatis. Nostra vero *M. Domestica* major, thorace immaculato, villoso, æneo-fusco; scutello villoso; abdomine tribus paribus macularum cinguloque postico, flavis; pedibus nigris, circa genua tantum flavescentibus.

934. Musca Mellina.

— long. lin. 2½.

LINN. Syst. Nat. p. 594.

Faun. Svec. 2. 1821.!

Diagn. Abdomen macularum fulvarum paribus quatuor: antico obsoleto.

In floribus sœpe obvia.

Thorax æneo-fuscus, nitens, una cum scutello. Abdominis maculæ trigonæ. Antennæ, halteres, pedesque flavi.

935. Musca Vacua.

— long. lin. 3½.

Diagn. Abdomen flavum; fasciis quatuor nigris, segmento primo pellucido albido: linea nigra longitudinali fasciæ primæ inserta.

In floribus neßtar haurit.

Neque *M. Inanis*, neque *Pellucens LINN.* huic similes. Thorax dorso fusco, alibi pallidior. Antennæ, pedes, abdomen subtus flavi coloris. Alæ unicolor, linea fusca marginali.

936. **Musca Lucida.**

— long. lin. 3.

Diagn. Thorax æneo-fuscus villosus. Abdomen compressum, lucidum, æneo-fuscum. Alæ fuscescentes.

In *Carnioliae* pratis.

Diffr. a *Meticulosa*. Alis fuscescensibus, pedibus omnibus nigris, antennis rufescensibus.

937. **Musca Chrysorrhæa.**— long. lin. 2 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Cinerea setosa; alis basi halteribusque luteo-ferrugineis.

In campis arenosis *Carnioliae superioris*.

Statura M. *Domestica*. Antennæ nigræ. Frons & linea circum oculos albo-argentea. Oculi brunnei. Alæ absque puncto & lineis: costa nigra, basi luteo-ferruginea. Halterum squama alba: margine ferrugineo, ciliato. Abdomen oblongum, acutum, stercus luteo-ferrugineum a morte fundens. Pedes nigri setoso-pilosæ. Ergo diversa ab omni alia hactenus numerata.

938. **Musca Ænea.**

— long. lin. 3.

Diagn. Æneo-fusca, nitens; tibiis rufis: fascia fusca.

In floribus reperitur.

Tota brevi, sericeo, aureo villo adspersa. Halteres capitulo ferrugineo. Palpi sub apice fascia nigra annulati, tenues. Halterum squama alba. Alæ costa subferruginea. Abdomen ovatum, obtusum. Genua rufa. Pedes alibi nigri.

939. **Musca Vibrans.**— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 599.

Faun. Svec. 2. 1867.

Diagn. Nigra nitens; capite inter oculos rubro; alis apice macula fusca.

Junio M. capta.

348 **Musca.** **ORDO VI.** **Musca.**

Minor Domestica. Antennæ clavatæ rufo-rubræ. Oculi rufo-aurei. Rostrum nigrum; palpis rufis. Abdomen basi bidentatum, ellipticum. Halteres albi. Alæ hyalinæ, puncto fusco ad apicem notatae. Pedes nigri; femoribus subtus magis ciliatis.

Melius diceretur *Rubrifrons*, quam *Vibrans*, cum alas vibret etiam M. *Cynipsea*.

940. MUSCA Germinationis.

— long. lin. 2:

LINN. Syst. Nat. p. 600.

Faun. Svec. 2. 1874.

Diagn. Frons fulva. Oculi virides. Corpus nigrum. Alæ costa lineisque binis transversis fuscis.

In foliis arborum.

Minor Domestica, nitens. Oculi margo argenteus. Halteres albi, subnudi. Caput & thorax postice fetulis nonnullis ciliata. Alæ hyalinæ: costa fusca, lineisque binis fuscis, quarum una costæ, altera margini interno imposita est. Abdomen basi bidentatum, subovatum, obtusum. Pedes nigri.

941. MUSCA Arnicae.

— long. lin. 2:

LINN. Syst. Nat. p. 600.

Faun. Svec. 2. 1872.

Diagn. Alæ fuscæ; maculis albis. Pedes rufi.

In thalamo florum *Arnicae*, & ad finium.

Ad costam alæ sunt maculæ duæ albæ magnæ, alibi vero puncta alba rotunda. Oculi virides. Rostrum cum antennis rufum. Abdomen ovatum, fuscum, immaculatum. Thorax fuscus, absque punctis. Pedes absque fasciis. Setæ nonnullæ ad posteriora capit is thoracisque.

Larva perforat discum floris *radiati*, vicina germina sterilia reddit, mutatur in pupam atram, unde Junio M. mihi tres prodierunt.

942. MUSCA *Aphidioides*.— long. lin. 1 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Statura *Aphidis*, nigra tota; alis cupreο-hyalinis; abdomine tereti, acuminato.

In hortis reperitur.

Parvitas animalculi non permisit ut rostrum examinarem. Tibiæ posticæ pilosæ. Oculi fusco-rufi: fascia transversa. Halteres albidi.

943. MUSCA *Luteola*.— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Flavescens; oculis viridibus; punctis tribus occipitalibus nigris.

In fenestra Museoli mei capta, 23. May.

Antennæ fetula nigra. Alæ immaculatæ, albidæ. Abdomen ovatum.

944. MUSCA *Oppidana*.— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Flava, ut prior; sed oculis violaceis; antennarum clava & tuberculo occipitali nigris.

Vagatur circa pagos, oppida, & tuguria rusticorum.

945. MUSCA *Umbelliferarum*.— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Flavo-nigroque varia, oculis fusco-virescentibus.

In floribus plantarum *Umbellatarum*, non rara.

Parvula, linea vix longior. Antennæ apice fuscæ. Nucha tuberculo nigro. Thorax maculis tribus dorsalibus, fuscis. Scutellum totum flavum. Sub alis utrinque macula ovata, nigra. Halteres capitulo albo. Abdomen obcordatum, flavum; segmentis mediis superne fuscis. Pedes flavi.

946. MUSCA *Festinans*.— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra, pilosa; fronte ferruginea.

Celeriter cursitat, saepius quiescens, hinc festinando defatigata.

Statura M. *Fungorum*. Antenn. clava rotunda-ta; setula longa. Alæ immaculatæ hyalinæ: costa pilosa. Halteres erecti, pallide-ferruginei. Pedes ad genua rufescentes.

947. **MUSCA Cynipsea.**

— long. lin. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 599.

Faun. Svec. 2. 1868.

Diagn. Abdomen postice coarctatum ut in *Vespa Coarctata*. Alæ ad apicem puncto nigro. Pedes rufi.

Passim in foliis arborum, fenestris &c.

Cursitans, alas erigit, vibrat, expandit; quiescens aut frigore contristata eas gerit incubentes. Abdomen nitens. Halteres albi, nudi.

C. *Muticæ.*

Absque plumula & feta.

948. **MUSCA Spoliata.**

— long. lin. 1 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Nigra, glabra; oculis fascia transversa. Junio M. in hortis occurrit.

Duas lineas longa. Fascia obscurior in quolibet oculo. Alæ abdomine non longiores. Halteres capitulo toto albo, ovato. Femora rufescencia.

949. **MUSCA Saltitans.**

— long. lin. 2.

Diagn. Oculi fusci, sine fascia. Alæ abdomine longiores.

Ruri degit, Junio M., non frequens, currens velociter, saltitando volans.

Antennæ biarticulatæ. Halteres supra nigri, subtus albidi.

CE-

C E R I A.

Rostrum Muscæ. Antennæ moniliformes: articulo ultimo crassiore.

950. CERIA Decemnodia.

— long. lin. 2.

Diagn. Antennæ articulis (10), subæqualibus.
In hortis & domibus, non infrequens.

Statura Muscæ Cynipseæ. Corpus nigrum, gracile. Caput parvum rotundum: tuberculis binis occipitalibus. Rostrum retractile: palpis nigris, pilosis. Thorax gibbus, subitus prope caput macula flava. Alæ hyalinæ, immaculatae, toto corpore longiores: nervis duobus nigris ad apicem alæ usque non productis, & infra medium unica anastomosi junctis. Halteres nudi, pallidi, subdiaphani: clavula subrotunda. Abdomen ovato-oblongum, nitens; basi utrinque puncto flavo lateraliter. Pedes nigri. Macula lateralis ad basim abdominis. Pedes postici longiores & crassiores.

951. CERIA Septemnodia.

— long. lin. 1 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Antennæ articulis (7) latere acuminate: ultimo majore, ovato.

In tubo corollæ *Hemerocallis luteæ* 23. Maji.
Tota nigra, glabra, vix lineam longa. Alæ hyalinæ. *Mas minor*; *Femina* abdomine crassiore, longiore, cylindraceo.

C O N O P S.

Os armatum rostro quadriseto: fetis binis longioribus, vagina retractili plus minus carnosa, apice labiata: labio superiore bilobo; inferiore bifido: segmentis acutis.

(*) *Antennis plumatis.*

952. CONOPS Bifasciatus.

— long. lin. 6.

P. Po-

P. PODA. Mus. Græc. p. 118. Zonarius.

Diagn. Maximus, abdomine flavo: cingulis nigris: supra binis, subtus tribus.

Flores frequentat, ego in cymis *Corni sanguinariae* reperi.

Definitio *Muscæ Inanis* LINN. huic convenit, non vero descriptio Faun. Svec. 2. 1825. Caput inter oculos flavum, apice elongato, quadridentato: dentibus duobus intermediis, minimis. Thorax nigricans; lateribus scutelloque fusco-rufis. Halteres capitulo albido, obtuso. Alæ ad costam fere semiferrugineæ, infra apicem nebula fusca. Abdomen subdiaphanum flavum, lin. (4) longum, paulo minus crassum, basi nigrum: segmento secundo rufo-ferrugineo, linea nigra media abrupto, fasciis binis nigris; subtus ubique flavum: fasciis nigris tribus, in medio abdominalis sepe contingentibus. Femora nigra: apice tibiisque fusco-rufis.

953. CONOPS Trifasciatus.

— long. lin. 5 $\frac{2}{3}$.

Diagn. Abdomen flavum pellucens: cingulis tribus nigris.

In sylvis, super fructus immatuos *Hederæ helicis* frequentior.

Caput & alæ, ut in priore. Thorax dorso fusco, scutello lineisque lateralibus flavis; macula flava sub alis. Halteres flavi. Abdomen basi nigrum; cingulis tribus, nigris, utrinque. Pedes ut in priore.

954. CONOPS Pertinax.

— long. lin. 4.

Diagn. Caput totum & thorax canis villis pubescentia. Abdomen nigrum: cingulis tribus flavescensibus maculisque binis conicis lateralibus in primo segmento.

Pasim adeat, redditque saepius ad plantam unde pulsus.

Statura *Muscæ Carnariae*. Thorax fuscus; scutello sordido. Maculæ conicæ primæ abdominalis incisuræ basi impositæ sunt margini ejusdem. Ale puncto costali obscuriore. Halterum squama alba: margine flavescente.

955. CONOPS *Bomilans.*

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 591. Musca n. 14.
definitio, nam descriptio
Faun. Svec. 2. 1792. non omnino
consentit.

Diagn. Nigerrimus; fronte pallide flavescente;
abdominis apice fulvo.

Apud nos non frequens.

Tomentosus; alæ macula media fuscescente in-
terrupta, seu potius linea transversa fusca larvam
Phalænæ Geometræ actu incidentem & contractam
referente.

Idem hic est *Conops Pocopyges* R. P. PODA.
Mus. Græc. p. 118-119. Sexus alter scutello for-
dido, abdominisque apice' flavicante.

956. CONOPS *Pennatus.*

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 118. Tricolor.

Diagn. Magnæ plumulæ antennarum. Frons,
latera thoracis & scute' lum flavo colore tincta.
Abdomen nigrum; angulis baseos apiceque albidis.

In *Carniola calidiore.*

In alis linea est fusca literæ (S) similis. Plu-
mulæ antenn. rachi flava: apice nigro. Totus sub-
tus niger.

957. CONOPS *Dryaphilus.*

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Abdomen nigrum basi maculis duabus,
pellucidis, fulvis: subtus albidis. Alæ macula me-
dia nigra: basi luteo-ferruginea.

In *Quercubus* stillantem lingit humorem cum
Scarabæis & *M. Crabrone.*

Caput inter oculos antennæque flavæ. Tho-
rax nigricans, linea laterali' scutelloque forside fla-
vis. Halteres albidi. Alæ basi ferrugineæ, macu-
la nigra in medio imposita costæ latiore sua basi,
ad apicem ejusdem alæ linea fusca longitudinali.

958. CONOPS *Leucorrhæus.*

— long. lin. 4.

Diagn. Abdomen nigrum: apice albo villo pubescente.

In sylvis.

Statura *Muscæ Carnariæ*. Frons albida: linea media lucida nigra sub antennis ad os usque. Occiput rufis pilis tomentosum, ut & thorax totus, qui fuscus: scutello sordide flavo. Abdomen nigrum, apice pilis albis pubescens. Alæ linea curva, fusco-ferruginea. Pedes nigri. Tibiis dimidia parte, versus genua, albis. M. *Intricaria* LINN. huic proxima, & forte eadem.

(**) *Antemis setariis.*

959. CONOPS *Floreus.*

— long. lin. 54.

LINN. Syst. Nat. p. 591. Musca n. 18.

Faun. Svec. 2. 1796.

P. PODA. Mus. Græc. p. 116. Musca florea. β.

Diagn. Thorax flavus: fasciis duabus nigris. Abdomen fasciis tribus abruptis: prima majore.

In floribus passim.

A nucha ad apicem oris linea nigra decurrit, quam inter & oculos flavum caput est. Scutellum fusco tordideque flavum, margine flavo. Abdomen basi linea albo lutea, scutello contigua transversa, post quam maculæ duæ conicæ flavæ: basi incumbentes margini abdominis; has sequuntur cingula duo interrupta, dein tertium & integrum. Pedes nigri: genubus tibiisque ferrugineis, aut lutco-ferrugineis.

960. CONOPS *Vulgaris.*

— long. lin. 54.

Diagn. Thorax fuscus, griseo rufove villo tomentosus. Scutellum sordidum. Abdomen basi fascia magna interrupta, seu maculis binis.

Ubique reperitur.

Frons

Conops. HALTERATA. Conops. 355

Frons sequitur colorem pilorum thoracis. Abdomen praeter maculas dictas, habet etiam cingulum unum & plura earum colore tincta.

961. CONOPS Fuscus.

R. P. PODA. Mus. Græc. Conops interrup tus. — long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Totus fuscus; scutello sordido.

Ad vias, & flores.

Statura *Apis Mellificæ*. Thorax subrufo villo tomentosus. Abdomen nitens, absque fasciis. Genua rufescentia.

962. CONOPS Cupreus.

— long. lin. 5.

Diagn. Abdomen cupreum. Antennæ pedes que ferruginei.

In sylvis, & Quercetis.

Caput ferrugineum. Oculi brunei. Antennæ seta nigra. Thorax fuscus, villosus, lateribus scutelloque fetosis, lineis longitudinibus cinereis (4). Scutellum sordidum. Abdomen cupreum, nitidum, aureo villo præsertim apice pubescens. Alæ apice obscuriores, maculis duabus fuscis parvis mediis. Halteres ferruginei; capitulo fusco truncato, squamula albida. Pedes toti ferruginei.

963. CONOPS Femoratus.

— long. lin. 4.

Diagn. Femora postica crassiora, spinosa. Thorax æneus. Abdomen fuscum, semicylindricum.

In sylvestribus. Majo M.

Antennæ rufescentes. Thorax rufo villo tomentosus. Alæ incumbentes, linea obliqua repanda media. Abdomen nitens.

964. CONOPS Festivus.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 592. Musca n. 33.

Faun. Svec. 2. 1812.

Diagn. Antennæ porrectæ, longæ, triarticulatæ, tuberculo impositæ. Abdomen marginatum: paribus quatuor linearum arcuatarum flavarumque.

Habitat in sylvis & nemoribus.

Niger, glaber, exiguis villis punctula referentibus adspersus. Antennæ nigræ, longitudine sua thoracis latitudinem æquantes, setula ex apice articuli medii, non vero terminali LINN. Frons flava, macula nigra sub antennis. Thorax in dorso lineis binis albidis approximatis, linea flava & macula cordiformi in singulo latere. Scutellum nigrum: margine flavo. Alæ macula fusca ad marginem crassiorem, infra quam ala ibidem ferruginea est. Halteres flavi; squamula ferruginea. Pedes ferruginei; tibiis flavescensibus.

965. CONOPS *Gemmatus*.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Thorax niger: linea laterali scutelloque flavis, maculis quatuor argenteis inter pedes & alas utroque in latere. Abdomen cingulis quatuor flavis: postico interrupto.

Floribus infidet.

Niger. Antennæ flavæ. Frons argentea: macula nigra supra antenas. Alæ hyalinæ. Halteres flavi. Abdomen subtus pedesque flavi.

966. CONOPS *Glaucus*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 593. Musca. n. 35.
Faun. Svec. 2. 1813.

Diagn. Abdomen cingulis tribus albidis interrumpitis.

Habitat in pratis montanis.

Frons flava. Thorax fuscus, rufo villo pubescens. Scutellum folidum. Abdomen nigrum, ribus paribus linearum albidarum. Pedes maxima parte ferruginei.

967. CONOPS *Aeneus*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Oculi cinerei, fusco-punctati. Abdomen æneum, nitens.

M. Aprilit 27. captus circa Idriam.

Statura M. Cæsar. Frons pallide-rufis pilis pubescens. Thorax niger: lineolis pallidis. Abdo-

Conops. HALTERATA. Conops. 357

domen ovatum, subtus obscurius. Halterum squama alba. Alæ immaculatæ, hyalinæ.

968. CONOPS *Præcinctus*.

— long. lin. 4.

Diagn. Abdomen nigrum : basi album. Alæ macula fusca.

In *Austriaco Litorali*.

Paulo major M. Cæsare. Antennæ nigrae. Frons albida, linea media longitudinali lucida nigra. Thorax fuscus, rufo villo tomentosus. Abdomen villosum, ovatum: basi utrinque album.

969. CONOPS *Pipiens*.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 594. Musca. n. 44.

Faun. Svec. 2. 1822.

Diagn. Nigra; thorace abdomineque utrinque lateraliter albido-maculatis, femoribus posticis clavatis dentatis.

Habitat ruri, Sonchi & Menthae floribus involvans.

Frons subargentea. Antennæ subrufæ. Oculi brunei. Thoracis latera albida. Alæ hyalinæ, immaculatae. Halteres albi; squama alba. Abdomen segmento primo prope squamulam halterum ciliato, ultimo utrinque nigro. Femora nigra: postica basi & macula utrinque rufis. Tibiae posticæ curvæ: annulo rufo. Rostri figuram elegantem subnifit demum R. P. PODA, quæ *Conopis* speciem esse confirmat.

970. CONOPS *Clavatus*.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Abdomen subpetiolatum, clavatum, subtus concavum, rectum, ferrugineum: cingulis binis fuscis.

In *Corylo captus*, Julio M.

Tres lineas longus, gracilis. Antennæ fuscae. Thorax fuscus. Abdomen flavicans: basi attenuatum, ac si petiolatum esset. Femora postica clavata, crassa, lutea: antice fusca, non dentata.

ANTHRAX.

Os armatum rostro bifeto: vagina basi car-
noſa retractili; apice dilatata, non labiata; me-
dio palpigera, univalvi.

971. ANTHRAX Morio.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 590. Musca n. 7.
Faun. Svec. 2. 1784.

Diagn. Nigra, hirta; alis corpore longioribus,
nigris: apice excolore.

Circa vias argillaceas fabulosas, & sepes.

Antennæ distinctæ, parvæ, teretes, biarticula-
tæ: articulo ultimo rotundato, compresso, majore,
terminato setula, apice pilosa nigra. Alarum color
niger versus apicem & marginem tenuiorem crenu-
latim evanescens; alæ eadem sedentis patulæ. Ab-
domen ovatum, basi ad latus singulum prope hal-
teres pilis albis variegatum; punctis binis, albis,
posticis.

RHINGIA.

Os armatum rostro trifeto: seta media lon-
giore bifida, lateralibus æqualibus minoribus acu-
minatis palpigeris: vagina attenuata applicata ca-
nali oris, eademque univalvi.

972. RHINGIA Rostrata.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.
Diagn. Antennæ, rostrum, scutellum, abdomen,
ferruginea. Thorax cinerascens: lineis nigris lon-
gitudinalibus.

Apud nos non rara, ruri, super arbores, herbas &c.

Statura Muscae Cesaris, quandoque etiam Domesticae. Antennæ deflexæ, subplumatæ. Rostrum oris,
seu facies in corneum convergens lucidum, apice
bifidum elongata, cuius averfa pars canalem habet,
qui rostrum excipit. Abdomen ovatum, subpellu-
cidum; linea dorsali, segmentisque margine fuscis.
Alæ incubentes: costa ferruginea, puncto medio
fuscō. Pedes nigro ferrugineoque varii. Cont. Co-
rops Rostrata LINN.

ERAX.

ERAX. (+)

Os armatum rostro trifeto: setis duabus brevioribus, saepius palpigeris: vagina univalvi longitudinem capitum non superante.

(*) *Fronte barbata.*

973. ERAX Prostratus.

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 605. Asilus ater.

Diagn. Niger, tumida fronte, barba albida.

Volat æstate circa sepes hortorum, & aquæductus, pectori, dum sedet, incumbens, expansis pedibus

Rostri vagina nigra: apice bifida, pilosa, præter setas tres dictas, etiam quartam foveat incubentem setæ longiori. Palpi nigri, clava pilosa. Abdomen nitens. Alæ incubentes. Lamellæ unguium pallide ferrugineæ. Antennæ erectæ, clavatae, muticæ.

974. ERAX Crabroniformis.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 605. Asilus n. 3.

FRISCH. Ins. 3. Tab. 8. fig. 3. p. 35.

Diagn. Abdominis segmenta tria nigra, reliqua flava. Alæ ferrugineæ: margine tenuiore maculis fuscis variegato.

In herbidis reperitur.

Antennæ porrectæ: clava oblonga, nigra, seta terminata. Frons ferruginea, barbata prope rostrum. Thorax fusco-ferrugineus, postice fetosus; scutello nigricante. Abdominis segmenta 1, 2, 3. nigra, reliqua flava, ultimo forcipe rufa nitida terminato. Pedes ferruginei.

975. ERAX Forcipatus.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

B b 4

LINN.

(+) Viicit rapina Dipterorum, præsertim Tipulorum.

LINN. Syst. Nat. 2. 606. Asilus n. 9.

Faun. Svec. 2. 1914.

FRISCH. Ins. 3. Tab. 7. fig. 3. p. 32-34.

Diagn. Rufescens; thorace linea dorsali & maculis utrinque tribus pedibusque fuscis; femoribus subtus spinosis.

Frequens in pratis, & collibus herbidis.

De scriptio ab illi **LINNAEO** data, nostro non convenit, & tamen idem qui a **FRISCHIO** pictus; nempe septem lineis nunquam brevior, cui antennae nigrae, ad cidentes: articulo ultimo longiore subulato, mutico. Frons rufa, nigris rufis deflexisque pilis barbata. Rostrum nigrum anterius vergens: vagina apice emarginata. Thorax gibbus. Alæ immaculatae. Halteres flavi. Abdomen supra, certa lucis incidentia fuscum: cingulis rufis. Pedes nigricantes. Fenora spinosa: spinis posticorum rufis, aliorum nigris.

976. ERAX *Barbatus.*

— long. lin. 5 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Fusco-cinereus; barba alba; alis puncto fuscō: apice fuscescētibus.

Habitat cum priore, et si rarior.

Cauda forcipata, antennae, femoraque spinosa ut in priori. Diversiss. barba alba, fronte pilosiore, rostri apice rufi, thorace linea e quidem dorsali obtcuriore, sed absque maculis fuscis, abdomine punctorum nigricantium seriebus tribus, halteribus capitulo fuscō, pedibus fuscō-ferrugineis, alijs puncto medio fuscō, & apice fuscescētente.

977. ERAX *Ferox.*

— long. lin. 7 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger; thorace postice rufis villis tomentolo; femoribus crassis; tibiis posticis curvis.

Habitat Junio M. circa aqueductus *Fodinarum Idriensis* in *Slovenia*.

Frons pilis rufis barbata. Antennae ad cidentes, clavatae, obtuse, muticæ. Dorsum in medio fere glabrum, postice tomentosum: pilis rufis aut fulvis. Halteres fulvi. Alæ incubentes, fuscescētentes: basi excolore. Abdomen supra antice glabriuscu-

ERAX. HALTERATA. ERAX. 361

briuscum, postice & lateraliter hirsutum, cylindraceum. Femora omnia crassa valde & pilosa. Tibiae posticæ arcuatæ. Abdomen terminatum laminationis tribus: apice rotundatis, subovatis, nigris. *Sexus unus* major, tomento fulvo abdominali, inter lamellas posticas foyens setam acuminatam, parvis lamellis binis munitam; alter tomento rufo, & inter lamellas caudales corpore molli albido ciliato, cui utrinque adjacet corpus aliud falcatum biforme: cornu inferiore basi dente notato.

978. ERAX *Conopoides*.— long. lin. 5 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Niger hirsutus; abdomine ovato: supra fulvo-tomentoso; femoribus posticis, clavatis; Tibiis omnibus cinerascente villo externe barbatis.

Rarior apud nos, submissus etiam a R. P. PODA.

Septem fere lineas longus. Halteres albidi. Abdomen inflexum, ovatum. Alis neque fuscis, neque maculatis. Diversissimus a *Crabroniformi*, & *Gilvo* Celeberr. LINNÆI: qui fuscas alas habet.

979. ERAX *Tenthredoides*.— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger, glaber; antennis, alis costa, femoribus, tibiisque ferrugineis.

Circa Labacum.

Frons pallide flavescens. Thorax linea laterali maculisque lateralibus aureo-nitore fulgidis, quarum una etiam utrinque distinguit segmenta abdominis; similiūm punctorum par sub scutello, nec non duo inter bases pedum mediorum & anticorum. Halteres ferruginei. Palmæ nigræ. Alarum nervi ferruginei. Abdomen cylindricum convexum, subitus concavum, glabrum, lin. 5 $\frac{1}{2}$ longum, 1 $\frac{3}{4}$ crassum.

980. ERAX *Rufipes*.

— long. lin. 6.

Diagn. Niger totus; fronte barbata; antennis pedibusque ferrugineis.

Ruri degit.

Antennæ articulus ultimus in setam continuatus. Dorsum & abdomen absque maculis. Halteres ferruginci. Pedes toti ferruginei. Alæ excolores: apice paulo obscuriores: nervis fuscis.

981. ERAX Niger.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger, fronte, halteribus, abdominisque incisuris margine aureis.

In floribus, Majo M.

Antennæ clavatae, muticæ. Aureus nitor frontis & marginis lateralis segmentorum abdominis in alio oculi situ fere evanescit. Abdomen semicylindricum. Oculi fusco-virescentes. Alæ subvioletaceæ: basi excolores.

992. ERAX Aquaticus.

— long. lin. 3.

Diagn. Niger; halteribus, abdominisque incisuris margine albis.

Ad aqueductus Idrienses, Majo M. nec alibi.

Quatuor lineas longus, totus niger. Halteres albi: capitulo compreslo. Alæ hyalinæ, sine maculis. Abdomen semicylindricum.

(**) *Fronte imberbi.*

983. ERAX Pusillus.

— long. lin. 2 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Nigricans, thorace cinerascente: lineis nigris, halteribus albis.

In sylvestribus, Majo M.

Corpus tres lineas longum. Oculi castanei. Alæ immaculatae, hyalinæ: venis fuscis, linea marginali nigra. Abdominis incisuræ margine albidæ.

984. ERAX Maculatus.

— long. lin. 6.

Diagn. Oculi subvirides. Thorax fuscus: lineis pallidioribus. Abdomen ferrugineum: linea laterali maculata dorsilibus nigris.

In sylvis & Ericetis, non rarus.

Antennæ articulus ultimus subrotundus, setula nigra terminatus. Oculi fusco virides. Pectus, cui pedes inseruntur, cinereum. Alæ, linea marginali ferruginea, venis fuscis, patentes. Femora ferruginea. Tibiae ferrugineæ: apice fuscæ. Palmæ fuscæ. *Mas* segmentis abdominis 2, 3, 4, 5, macula nigra tetragona, ceteris ubique nigris: margine ferrugineo. *Femina* maculis segmentorum abdominis prædictorum conicis contiguis, subtus vero tetragonis.

985. ERAX Inquinatus.

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ hyalinæ: apice, venisque fuscis; linea costali nigra.

In pratis.

Antennæ, abdomen, pedesque ferruginei. Thorax cinereus: lineis fuscis. Abdomen maculis triangulis dorsalibus. Alæ apice fuscescentes, sub quo in medio est punctum fuscum transversum, supra basim transversa serpentina linea decurrit. Variat statura majore, nempe alis lineas quinque longis.

986. ERAX Rufus.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Toton rufus. Thorax lineis dorsalibus fuscis tribus longitudinalibus. Abdomen dorso punctis (4) nigris.

In herbidis collibus.

Non debet confundi cum maculato, a quo pluribus notis differt, præsertim vero alis absque linea fusca marginali, iisdemque ad costam rufis, oculisque viridibus.

ASILUS. (+)

Os armatum rostro quadriseto: vagina porrecta, rigida, capite longiore, convergente bivalvi.

987. ASILUS Mucronatus.

— long. lin. 4.

Diagn.

(+) *Afili* capite parvo subrotundo, dorso gibbo, pedibus longis, imprimis autem rostro longo inflexo tenui dignoscuntur. Vivunt rapina Tipularum.

Diagn. Abdomen basi attenuatum, postice ovatum; apice mucronato. Femora & tibiæ ferrugineæ.

Per prata vagatur.

Abdominis portio ovalis, subtus plana est, supra convexa. Thorax dorso lineis tribus fuscis longitudinaliter striatus. Sexus alter mucrone abdominis caret.

988. *Asilus Punctatus.*

— long. lin. 4.

Diagn. Abdomen antice ad latera pilosum. Thorax lateribus scutelloque setosis.

Super plantas & arbores, non rarus.

Antennæ notabiliter divaricatae. Thorax lineis tribus dorsalibus obscurioribus, quarum media duas series pilorum continet, laterales autem tres. Abdomen villosum, sed magis antice ad latera. Alæ costa fusca. Halteres ferruginei. Femora ferruginea; genubus fuscis. Tibiæ ferrugineæ.

989. *Asilus Ferrugineus.*

— long. lin. 3*½*.

Diagn. Thorax & abdomen linea longitudinali fusca dorsali.

Ruri degit.

Corpus lineas tres longum. Oculi brunei. Antennæ fuscae. Thorax præter lineam dorsalem, puncto quoque fusco lateralí utrinque notatus. Abdomen alia linea fusca in singulo latere. Alæ hyalinæ, venis fuscis, puncto marginali fuscescente.

990. *Asilus Lineatus.*

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ linea & puncto fusco ad costam, lineola ad apicem aliaque in medio obliquis fuscis, variegatae.

In pratis.

Thorax cinereus: lineis longitudinalibus duabus fuscis in dorso, quibus tenuior & tertia interjacet. Alæ basi ferrugineæ, hyalinæ, venis fuscis. Halteres ferruginci. Abdomen fuscescens: seg-

men-

Asilus. HALTERATA. Asilus. 365

mentis margine pallidioribus. Femora & tibiæ ferrugineæ.

991. ASILUS *Setosus*.

— long. lin. 4.

Diagn. Thorax fusco-cinereus. Abdomen pedesque ferruginei. Setulæ nigræ in nucha, dorso, scutello, & marginibus segmentorum abdominis.

In umbrosis, herbidis, udisque.

Scutellum ferrugineum, setulis quatuor. Abdomen villosum. Palmæ pedum fuscæ.

992. ASILUS *Cinereus*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Thorax cum abdomine cinereus. Alæ apice fuscescentes. Femora tibiæque ferrugineæ.

In sylvestribus locis.

Thorax duabus lineis fuscis in dorso. Halteres ferruginei. Alæ basi subferrugineæ, linea fuscæ marginali. Abdomen (ut etiam thorax) villosum: basibus pilorum, lente observatis, totidem puncta referentibus. Palmæ nigræ.

993. ASILUS *Aestivus*.

— long. lin. 3.

Diagn. Cinerascens; thorace lineis pedibusque nigris.

Aestate occurrit, inter frutices.

Dorsum thoracis lineis quatuor nigris. Halteres albidi. Alæ pulchræ hyalinæ: linea nigra marginali. Abdomen maris apice mucronatum. Pedes toti nigri.

994. ASILUS *Pennipes*.

— long. lin. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 604. Empis. n. 2.

Faun. Svec. 2. 1896.

Diagn. Pedes postici longi: alteri sexui pennati.

M. April. 27. captus in herbido colle.

Totus niger. Halteres pallidi. Alæ immaculatae.

995. ASILUS Flavipes.

— long. lin. 2.

Diagn. Niger; antennis pedibusque testaceis.
In *Coryli* foliis reperitur.

Statura *Culicis*, agilis, niger. Palpi albidi rostro incumbentes, ut in *Tabanis*. Antennæ articulo pyriformi setula longa fusca terminato. Oculi subvirides. Ab occipite ad frontem linea alba. Alæ hyalinæ, immaculatæ: vasis testaceis. Halteres colore pedum. Femora media crassiora omnino villosa.

996. ASILUS Fulcratus:

— long. lin. 2.

Diagn. Thorax antice, alæ basi, pedesque ferruginei. Femora media crassa.

Majo M. in foliis arborum.

Antennæ fuscæ. Thorax postice fuscus. Alæ hyalinæ, immaculatæ: venis ferrugineis. Genua media spina nigra terminata. Abdomen singulo segmento pari uno punctorum & macula nigra lucida depressa.

997. ASILUS Dubius.

— long. lin. 3.

Diagn. Niger; halteribus ferrugineis; pedibus posticis longioribus crassioribasque.

In *Ceraso* & *Quercu* convenit, nuptias initurus, Aprili & Majo M.

Genere dubium Animal. Rostro uniseto brevi: vagina bivalvi: valva inferiore apice dilatata, obtusa, basi attenuata; superiore convergente, acuminata; Palpis e basi rostri natis. Potuerunt tamen aliæ duæ rostri setulæ, ob summae torte parvitatem, meos oculos, meaque vitra effugisse, hic aliis notis cum Asilo consentiens Dipterum, hoc loco posui, donec novis observationibus de rostri fabrica genuina certior factus fuero.

Antennæ triarticulatæ: articulo medio minore rotundo, ultimo unguiculato ut in *Tabanis* plerisque. Oculi contigui. Tuberculum in occidente. Thorax subrotundus, villosus. Halteres pallide ferruginei. Alæ hyalinæ, leuiter fuscescentes. Ab-

do-

Styrex. HALTERATA. Hirtea. 367

dominis tegamento singulo punctis quatuor impre-
fisis. Pedes nigri. Femora postica longiora, cras-
fiora, compresa.

Prædatur *Tipulas*, & *Muscas*.

S T Y R E X.

Os armatum rostro unifeto: vagina retrac-
tili, palpigera: apice dilatata, obtusa.

998. STYREX *Holofericeus*.

— long. lin. 3.

Diagn. Totus ater, villoque tenui denso te-
ctus. Alæ hyalinæ; puncto fusco marginali.

In pratis nostris submontanis, non rarus.

Rostrum singulare prorsus; nempe ovatum
corpus acumen profert, quod est ipsa feta; infra
hoc acumen oritur vagina retractilis, e cujus me-
dio palpi clavati prodeunt, hujus apex latior est
quam basis idemque obtusus & fere truncatus. An-
tennæ articulis binis, terminali rotundo & setula
terminato. Abdomen pone attenuatum, teres, cy-
lindraceum, inflexum. Pedes longi, lamellis un-
guium albidis.

H I R T E A.

Os armatum rostro unifeto: feta canaliculata
obtusa: vagina retractili, apice labiata,
basi palpigera.

999. HIRTEA *Longicornis*.

— long. lin. 5.

Diagn. Corpus semiunciale, pubescens. Oculi
fuscescentes: fasciis duabus violaceis.

In horto Collegii Labacensis captam, communi-
cavit R. P. WULFEN.

Frons, una cum thorace albido villo pube-
scens. Antennæ porrectæ, rostro duplo longiores.
Alæ subferrugineæ. Halteres albi, squamula albâ.
Abdomen lineas tres crassum, nigrum, basi trun-
catum

catum, thorace vix longius, supra fulvo villo tomentosum.

E M P I S.

Os armatum rostro unifeto: vagina: basi membranacea retractili palpigera; alibi lucida rigida attenuata porrecta longa.

1000. EMPIS *Petiolata*.

— long. lin. 3:

P. PODA. Mus. Græc. p. 118.

Diagn. Antennæ longæ, porrectæ, clavatæ, acuminatæ, absque plumula & seta. Abdomen petiolatum

In herbidis *Carnioliae* calidioris, non frequens.

Rostri vagina apice dilatata. Antennæ nigræ. Frons flava. Nucha nigra. Thorax niger, punctatus. Alæ hyalinæ dimidia parte longitudinali versus costam fusco-ferrugineæ. Halteres flavi, nudi. Abdomen est clava tufca, obtusa, nigricans, oblonga, leniter incurva, petiolata: petiolo rufo, basi & apice flavo. Pedes rufi.

1001. EMPIS *Calcitrans*.

— long. lin. 3:

LINN. Syst. Nat. p. 604. Conops. n. 2.

Faun. Svec. 2. 1900.

Diagn. *Musca Domestica* similis ut ovum ovo, ingruente pluvia tibias nostras valde pungens; abdome ovato, cinereo, nigris punctis testulato.

Habitat paßim.

Antennæ deflexæ nigræ, obtusæ, plumatæ. Frons iubaureo nitore fulgens. Punctum fulvum supra antenas. Thorax cinereus, punctis lineisque nigris variegatus. Abdomen basi obtusum subovatum. Alæ hyalinæ. Halterum squama alboscens. Fedes toti nigri. Alæ sedentis magis patulæ, quam in *Musca Domestica*.

1002. EMPIS *Rufipes*.

— long. lin. 2½.

Diagn. Cinerascens; antennis pedibusque rufis.

Ha.

Empis. HALTERATA. Sicus. 369

Habitat ruri, minus frequens.

Habitus & statura prioris. Antennæ plumatae, deflexæ. Oculi brunei. Caput alibi album. Rostri basis ferruginea. Thorax cinereus, villosus. Abdomen oblongum, segmentis margine setosiss. Femora omnia ferruginea.

1003. EMPIS *Palustris*.

— long. lin. 2.

Diagn. Antennæ setariæ: articulo ultimo nigro. Abdomen subovatum cinereo-rufum. Femora ferruginea.

Habitat circa paludes, Majo M.

Minor prioribus, cinerea sed cum aliquo rufo immixto colore, pilosa. Abdomine segmentis margine setosis.

S I C U S.

Os armatum rostro unisetosum: vagina rigida, porrecta, longa, e medio refracta & inflexa, basi palpigera.

1004. SICUS *Ferrugineus*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Antennæ seta brevi laterali. Abdomen teres, incurvum, ferrugineum.

Habitat in pratis, & etiam in sylvis.

Antennæ ferrugineæ. Frons aurea. Thorax fusco-rufus. Alæ immaculatæ. Abdomen spiraliter incurvum. Rostri vagina apice bifida.

1005. SICUS *Buccatus*.

— long. lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 605. Conops n. 6.

Faun. Svec. 2. 1905.

Diagn. Facies vesicularis, alba. Abdomen incurvum pedesque rufi.

In pratis.

Antennæ rufæ, setariæ. Oculi fuscæ. Alæ puncto medio fusco. Abdomen apice maculis lateralibus cinerascentibus utrinque (3-4). Pedes rufi. Genua pallidiora.

T A B A N U S

LINN. *Syst. Nat.* p. 601.

Os armatum rostro quinqueseto: vagina univalvi obtusa. Palpi duo acuminati, porrecti, paralleli, rostro incumbentes, quæ alteram vaginæ valvam constituunt.

1006. TABANUS *Bovinus*.

— long. lin. 8½.

LINN. *Syst. Nat.* p. 601.

Faun. Svec. 2. 1882.

Diagn. Maximus; abdominis dorso maculis trigonis, segmentisque margine lateraliter albidis.

Pasim occurrit Bobus & Equis infensus. Cepi etiam duos in medio ampli Lacus *Eldensis* supra naviculam. Insidet quoque floribus plantarum *Umbellatarum*.

Oculi modo virescentes absque fasciis, modo subvirides cum linea rubella transversa, modo denique immaculati & fuscescientes; cavendum itaque ne ex coloribus & fasciis oculorum, perpetram multiplicentur species in hoc Genere. Antennæ articulus primus rufus aut fuscus. Facies albo, aut pallide rufo villo pubescens. Circum oculos linea alba, vel nulla. Inter oculos lineola nigra, vel nulla. Thorax fuscus, villosus, lineis longitudinalibus cinerascentibus quatuor. Alarum nervi fusco-ferruginei. Abdomen tunc, sub alis rufescens: segmentis subtus margine albidis, in medio fuscis, absque maculis trigonis. Femora fusa. Tibiae ferrugineæ, aut fusco-ferrugineæ.

1007. TABANUS *Autumnalis*.

— long. lin. 5½

LINN. Faun. Svec. 2. 1883.

Diagn.

Tabanorum oculi in vivis animalibus examinandi; larvæ an ex stercore Bovino? an potius aquatice? copiosa certe hæc animalia circa fluvios, aquas, paludes, pecorum pâcua etiam alpina.

Tabanus. HALTERATA. Tabanus. 371

Diagn. Abdomen triplici ordine macularum albarum: mediis trigonis.

In Carniola frequentior priore.

T. Borino minor. Thorax fuscus; lineis longitudinalibus, cinereis, obsoletis, quinque. Abdomen supra fuscum, subtus cineratens. Alæ nervis fuscis. Halteres albi. Oculi virides: fasciis tribus ferrugineis, aut fuscis.

1008. TABANUS Tropicus.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 602.

Faun. Svec. 2. 1886.

Diagn. Oculi virides; fasciis tribus, fusco-ferrugineis. Abdomen supra lateribus, subtus basi ferrugineum vel fulvum.

In sylvestribus Carnioliae super. copiosior.

Variat 1. Linea alba inter oculos posita; punctis tribus nigris notata; thorace fusco: lineis (5), cinerascentibus, longitudinalibus; abdominis dorso maculis trigonis, albidis, obsoletis, eodem subtus fere toto ferrugineo.

2. Linea alba inter oculos, nigra lineola puntoque occipitali variegata, thorace fusco: lineis vix discernendis, abdomine fine maculis dorsalibus, subtus segmentis 1, 2, fulvis, cætris fuscis.

3. Linea frontali alba punctis tribus atris, thorace fusco fine lineis, abdomine absque maculis: subtus fulvo toto.

4. Linea frontali ut in Var. 3. thorace fusco: lineis pallidioribus obsoletis, abdomine fine maculis, supra fuico-cinereo, subtus ferrugineo.

1009. TABANUS Ferus.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Oculi virides: maculis tribus atris.

Corpus totum sordide flavesiens.

In Carniola super. frequens.

C c 2

Pun.

372 Tabanus. ORDO VI. Tabanus.

Punctum nigrum in fronte, supra antenæas ferrugineas. Rostrum vagina & palmarum extrema nigra. Alæ immaculatae: costa ferruginea. Villosum totus, cito feriens: ictu cruento.

1010. TABANUS *Alpinus*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Oculi virides: punctis confertis. Thorax cinereus. Antennæ, abdomen, pedesque ferruginei.

In alpibus Carnioliae super. in der Vochein.

Statura Muscae Cesaris. Punctum lucidum nigrum in fronte. Antennæ ferrugineæ: apice nigræ. Rostrum vagina nigricans. Thorax glaber. Halteres ferruginei. Abdomen ovatum. Palmarum extremitates nigricantes.

1011. TABANUS *Bromius*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 602.

Faun. Svec. 2. 1885.

Diagn. Oculi virides: fascia unica. Corpus cinereo fuscoque varium.

Frequens ubique, Equis præsertim molestissimus.

Linea frontalis alba: punctis tribus nigris. Thorax fuscus: lineis sex cinereis longitudinalibus. Abdomen fuscum: triplici ordine macularum albidarum. Corpus subtus cinereum. Palmæ fuscae.

1012. TABANUS *Pluvialis*.

— long. lin. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 602.

Faun. Svec. 2. 1887.

Diagn. Oculi brunei: fasciis quatuor, repandis, viridibus. Frons punctis tribus, nigris, in triangulum dispositis: impare minore. Alæ fuscentes: maculis albis.

Vulgaris ubique.

Antennæ capitis latitudinem sua longitudine sere æquantes, nigræ. Caput sub oculis nigropunctatum. Facies & corpus totum subtus cinereum. Thorax fuscus: lineis tribus unoque pari punctorum albidorum. Halteres capitulo albo.

Alæ

Tabanus. HALTERATA. Tabanus. 373

Alæ fuscæ, hyalinæ, præsertim versus marginem tenuiorem, cædem lineis curvis punctisque albis ubique variegatæ & deflexæ. Abdomen segmentis margine albidis, linea dorsali albida, alibi fuscum aut nigricans. Punctum fuscum circa medium in alæ costa. Tibiæ medizæ & posticæ ferrugineæ totæ: apice fasciaque fuscis. Variat fasciis (3) oculorum.

1013. TABANUS *Rufus*.

— long. lin. 6.

Diagn. Rufus; oculis viridibus; abdomine fasciis rostri vagina femoribusque nigris.

Submissus a R. P. WULFEN.

Totus pilis rufis pubescens. Oculi neque fasciati, neque punctati.

1014. TABANUS *Cæcutiens*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 602.

Faun. Svec. 2. 1888.

Diagn. Alæ fuscæ; macula prope basim lineaque postica albis. Abdomen basi supra pallide rufum; punctis duobus, ovatis, contiguis, divaricatis. Circa aquas non raro, & valde importunus.

Antennæ thoracis longitudine, villosæ: basi ferrugineæ. Tuberculum nigrum, lucidum in fronte, & aliud ad nucham. Thorax fuscus, dorso glaber: lineis duabus pallidioribus, latere rufo villo pubescens. Abdominis segmentum primum punctis dictis notatum, reliqua nigra: margine & macula dorsali trigona pallide rufis; idem subtus basi ad latera subpellucidum. Facies punctorum nigrorum lucidorum paribus tribus (:::).

1015. TABANUS *Salinarius*.

— long. lin. 4.

Diagn. Niger. Alæ fuscæ; lineis duabus, transversis, punctoque intermedio albidis.

Circa Tergestum alle Saline.

Statura, puncta nigra faciei, habitus prioris. Sed totus niger; abdomine punctis obsoletis dorsibus trigonis pallidioribus.

Variat macula antica, loco lineæ, abaquei, pallido: segmentis singulis uno pari punctorum nigrorum.

1016. TABANUS *Maritimus*.

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ albidae; fascia lata & margine crassiore fusca.

Circa littora *Maris Adriatici*, copiosus.

Habitus, antennæ, puncta faciei, ut in prioribus. Sed alæ aliter maculatae, & abdomen basi lateraliter rufescens, una cum puncto subrufo dorsali ad basim.

Hic potest esse *Tabanus Lugubris* LINN. Faun. Svec. 2. 1889. de cuius a prioribus binis vera differentia nihil nondum certo constat.

C U L E X.

LINN. Syst. Nat. p. 602.

Os armatum rostro quadriseto, fetis duabus brevioribus: vagina longa porrecta. Palpi duo incumbentes rostri basi.

1017. CULEX *Pipiens*.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 602.

Faun. Svec. 2. 1890.

P. PODA. Mus. Græc. p. 117.

Diagn. Cirratus; abdomine cingulis vel paribus punctorum nigrorum tot, quot segmenta.

Habitat in aquis stagnantibus.

Pupa albida, thorace crassio subrotundo, oculis nigris sphæricis, abdomine infexo subpiloso. Hæc paritura flavescit, tres lineas elevatas in capite gerit, & maculas duas subaurreas circa thoracem.

Copia horum animalium, solum paludosum, & acris insalubritatem indicat.

BOMBYLIUS.

LINN. Syst. Nat. p. 606.

Os armatum rostro bifeto: vagina longa
porrecta bivalvi: valva superiore breviore integer-
rima aristata, inferiore apice bifida mutica. Pal-
pi duo depresso, e basi valvæ inferioris.

1018. BOMBYLIUS Major.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. l. c.

Faun. Svec. 2. 1918.

Diagn. Rufo villo tomentosus; alis hyalinis,
immaculatis, basi fuscis.

Habitat circa fontium scaturigines, & in pratis,
non rarus.

Apud nos certe minor sequenti. Totus rufus,
seu rufo-canescens. Oculi fusco-virides. Frons
barbata.

1019. BOMBYLIUS Medius.

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. l. c.

Faun. Svec. 2. 1919.

Diagn. Totus subrufa hirsutie pubescens, po-
stice niger; alis fusco-punctatis.

Habitat cum priore.

Abdomen apice nigrum, ibidemque serie una
punctorum alborum in dorso, ani regione fulva.
Alæ basi & versuni costam fuscæ, vix hyalinæ.

1020. BOMBYLIUS Minor.

— long. lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 607.

Faun. Svec. 2. 1920.

Diagn. Totus subrufa lana tectus, unicolor; a-
lis immaculatis, hyalinis.

In pratis.

Minor priore.

1021. BOMBYLIUS Ater.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Niger; abdomine punctis quinque, argenteis; alis margine crassiore antice semifuscis.

Habitat in collibus herbidis, rario.

Totus pilosus & niger. Abdomen lateribus magis pilosis: pilis fasciculatis. Puncta abdominalis argentea dorsalia (5), nempe duo paria, cum intermedio quinto. Alae versus basim lineola repanda, & in medio puncto fusco notatae. Pedes nigri. Frons huic valde barbata.

HIPPOBOSCA.

LINN. *Syst. Nat.* p. 607.

Os armatum rostro unifeto: vagina bivalvi porrecta. Pedes tetraonichi.

1022. HIPPOBOSCA Equina.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. *Syst. Nat.* l. c.

Faun. Svec. 2. 1921.

FRISCH. *Ins.* 5. *Tab.* 10. p. 28.

Diagn. Corpus supra nitens, fuscum. Labium superius & scutellum macula alba.

Equis, Bobus, quandoque & Canibus infesta.

Oculi nitidi, nigri. Lineæ duæ flavæ parallelae elevatæ longitudinales inter oculos. puncto triangulo concolore in nucha. Thorax ad angulos anticos, arcuata albida linea, inter quam angulus ipse flavo-rufus. Abdomen villosum. Pedes rufostacei, villosi.

1023. HIPPOBOSCA Hirundinis.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. *Syst. Nat.* l. c.

Faun. Svec. 2. 1923.

Diagn.

Hippobosca. HALTERATA. Hippobosca. 377

Diagn. Abdomen postice dilatum emarginatum. Rostrum pilosum. Pedes singuli unguibus senis.

Habitat in *Hirundinum pullis.*

1024. HIPPOBOSCA Corvi.

Diagn. Femora viridia. Ungues nigri, longi, quatuor.

Habitat in *Corvo Corace.*

Statura *H. Equinae*, sed diversissima; tibiis non fasciatis; oculis minus nitidis & castaneis; occipite non tubere albido trigono, sed tuberculis tribus contiguis nigris; scutello thoracis non albo, sed concolore; ore non albo; alarum costa imberbi; abdomine non toto villoso; corpore rufescente.



ORDO VII. PEDESTRIA.

APTERA.

LINN. *Syst. Nat.* p. 608.

ALÆ NULLÆ IN OMNI SEXU.

LEPISSIMA.

LINN. *Syst. Nat.* 1. c.

1025. LEPISMA *Longicornis.*

Corporis long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. *Syst. Nat.* p. 608. saccharina?

Diagn. Antennæ corpore longiores.

Labaco missa a R. P. WULFEN Soc. J.

Corpus supra fuscescens, & squamulis imbricatis subargenteis tectum. Caput pilosum. Antennæ pallide ferrugineæ villosulæ. Tota subtus albida, tibiis antennarum colore. Femora compressa. Setæ caudales longiores tres, villosæ, corpore breviores, quibus subjacent duæ aliæ breviores.

1026. LEPISMA *Vulgaris.*

— long. lin. 4-5.

Diagn. Antennæ corpore paulo breviores. Squama denticulata adjacens femoribus singulis.

Habitat in cistis, inter vestes, & alibi in domibus, frequens.

Tota squamulis argenteis tecta, subtus argentea. Oculi fusti. Corpus angustius & longius ac in priore.

PO-

Insecta alata ab apteris ordine diversa, ut pisces inermes ab acanthopterygiis. Nonne vides hic Naturam Arti illudere, suaque arcana posteris reservare?

PODURA.

LINN. Syst. Nat. p. 608.

1027. PODURA Aquatica.

— long. lin. 18 $\frac{1}{2}$,

LINN. Syst. Nat. p. 609.

Faun. Svec. 2. 1934.

P. PODA. Mus. Græc. p. 120.

Diagn. Gibba, fusca, compressa; capite obovato, depresso; ore maxilloso; collo elongato.

Habitat in aquis stagnantibus.

Os palpis (4), duobus rectis setulis terminatum. Antennæ palpis breviores: articulis duobus. Oculi sunt tubercula duo fusco-rubinea. Caput subitus nitidius, duobusque sulcis longitudinaliter exaratum. Corporis segmenta decem, dempto collo, quæ pellucent in arido cadavere. Cauda setulis binis parallelis, lineam vix longis. Pedes untrinque tres, femoribus teretibus, tibiis triarticulatis. Corpus compressum, ut in *Cancro*, *Fulice*.

1028. PODURA Squamosa.

— long. lin. 5-6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 121. macroura.

Diagn. Corpus squamosum. Cauda extensa, tripilis, corpore longior aut eidem æqualis.

Habitat in muris, & sylvis ad arbores inter muscos.

Habitus *Lepismæ*, sed cauda saltatrix.

Corpus murinum, squamulis exiguis, quæ digitis facillime adhærent, ubique tectum. Antennæ caudali seta media breviores. Palpi longi, pediformes, inflexi, attenuati. Abdomen segmentis (11). Pedes albis annulis fasciati. Cauda nigra, triflata, erectiuscula in vivo animali.

Variat corpore nigro fuscoque vario.

1029. PODURA Terrestris.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 609. fimetaria?

Faun. Svec. 2. 1935. potest esse.

Diagn.

Diagn. Nivea; fetis caudalibus binis, corpore triplo brevioribus: apice ferrugineis.

Habitat in terra prægnante, & humo vegetabili, in hortis & sylvis, inter muscos.

Pediculo humano minor, pedibus villosum. Antennæ articulis (4).

1030. PODURA Arborea.

— long. lin. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 609.

Faun. Svec. 2. 1932.

Diagn. Fuscescens; pedibus furcaque albis.

Intra lamellas labyrinthiformes *Agarici querconi*, Januario M. reperit. R. P. WULFEN.

Rufo-fusca, lateribus atris, pilosissima; oculis nigris. Os sine palpis & maxillis. Oculi compo-
siti ex octo tuberculis atris, splendidis, inæqualibus.
Antennæ pilosæ, articulis quatuor. Abdomen api-
ce sub bruneum, subtus cavum, fovea eo canali
caudam bifidam, furca capillacea inæquali.

1031. PODURA Termiformis.

— long. lin. 1.

Diagn. Oblonga, fusca; dorso piloso; antennis binodiis.

Inveni in cortice *Fagi*, & circa hortos.

Habitus & statura *Termis Pulsatorii*. Dorsum gibbum, fasciculo pilorum, tanquam penicillo, cri-
statum. Setæ caudales pilosæ. Pedes pallidi, ni-
gro-annulati.

T E R M E S.

LINN. Syst. Nat. p. 609.

1032. TERMES *Pulsatorium*.

— long. lin. $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 610.

Faun. Svec. 2. 1937.

Diagn. Antennæ articulis (18). Os palpis bi-
nis, clavatis.

Termes. PEDESTRIA. Pediculus. 381

Currit velociter, inter Insecta adservata, in herbariis, cystisque ligneis.

Oculi magni, nigri, ad microscopium illuminatum flavi. Maxillæ sub bidentatæ. Os ex rufi nigricans. Antennæ villosæ. Thorax utrinque quasi bidentatus. Abdomen ovatum, villosulum. Pedes pilosi: primis ultra os extensis, uti postici ultra anum. Femora subclavata.

1033. TERMES *Sylvarum.*

— long. lin. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Ovatus, albus; antennis crassis uniarticulatis.

In terra sylvarum.

Abdomen pilosum, obtusum.

1034. TERMES *Florum.*

— long. lin. $\frac{4}{5}$.

Diagn. Fulvus; antennis trinodiis.

Vidi in flore *Allii Ursini*.

Oculi fusti. Corpus oblongum, agile. Antennæ albidæ, porrectæ: articulo ultimo setula terminato.

Hoc & prius Insectum ob os maxillosum huc retuli.

P E D I C U L U S.

LINN. *Syst. Nat.* p. 610.

(^c) *Avium.*

1035. PEDICULUS *Hæmatopus.*

Diagn. Abdomen ovatum album: margine pedibusque rubris.

Habitat in *Falcone Falunbrio*, & *Strige Ulula*.

Caput subcordatum, obtusum, antice declive, nudum, splendens, spadiceo-fulvum. Antennæ mobiles, capiti concolores. Abdomen linea dorsali nigra, utrinque.

In

382 Pediculus. ORDO VII. Pediculus.

In Stige idem prorsus, sed dorso absque macula nigra.

1036. PEDICULUS Maximus.

— long. lin. 4.

Diagn. Abdomen incisuris (9), marginatis: prope marginem punctatis.

Habitat in *Falcone Buteone*.

Fuscescens. Caput subcorditum, antice truncatum, postice in medio macula fuscoc-ferruginea, antice ad apicem punctis duobus fuscis. Thorax subrotundatus, laevis: lineis tribus fuscis longitudinalibus: media ad marginem posticam non protensa. Abdomen lanceolatum, marginatum: margine obscuriore, punctis duobus impressis prope marginem in singulis segmentis.

1037. PEDICULUS Coarctatus.

Diagn. Thorax latere acuminatus, capite duplo angustior. Abdomen utrinque maculis conicis lateralibus fuscis (7).

Habitat in *Lario. Cellar.*

Oblongus, albidus. Caput antice rotundatum, rufescens, pone truncatum: angulis acutis, pilo terminatis. Abdomen albidum, apice fascia fulva.

1038. PEDICULUS Ocellatus.

Diagn. Abdomen, maculis conicis lateralibus pallido puncto ocellatis, fasciatum.

Habitat copiosus in capite *Corvi Coracis*, & *Cornicis*.

Pilosus, lividus, & albidus. Caput subcordatum, obtusiusculum: antice nitens. Antennae 4-node, capite paulo breviores. Oculi nigri. Pedes nigro-fasciati. Ova circa oculos *Corvi*, in circulum disposita. Sub abdome prope apicem, macula lanceolata transversa, binis punctulis ocellata, rufa, uno latere plana, altero convexa.

1039. PEDICULUS Dolichocephalus.

— long. lin. 2.

Diagn. Albus; capite longo.

Habitat in *Coracia Oriole*.

Gla-

Pediculus. PEDESTRIA. Pediculus. 383

Glaber totus. Abdomen subtus marginatum, supra linea fusca dorsali. Pedes antici breviores.

1040. PEDICULUS *Fasciatus*.

Diagn. Abdomen albidum: fasciis fuscis.

Habitat in Cuculo Canoro..

Oblongus, depresso, nitens, linea brevior. Caput cordatum, thorace latius. Abdomen pilis longis raris adspersum. Pedes æquedissimi, pallidi: anticus brevioribus. Oculi fusti.

1041. PEDICULUS *Auritus*.

Diagn. Ad basim antennæ singulæ nervulus auriformis.

Habitat in Pico Majore, & Martio.

Caput subcordatum, obtusum, dilute fulvum: subtus ad latera oris pilosum. Antennæ longitudo thoracis, valde mobiles. Corpus ovatum: lateribus albis. Anus setosus. Pedes antici antennis breviores.

1042. PEDICULUS *Dentatus*.

— long. lin. 2.

Diagn. Abdominis incisuræ sex: lateribus dentatis.

Habitat in Anate.

Fusco-ferrugineus. Caput subtrilobum, latere postico singulo tripili. Thorax lateraliter acuminatus. Femora crassissima.

1043. PEDICULUS *Crafficornis*.

Diagn. Antennæ crassæ pedum instar. Pedes medii anticus fere duplo longiores: postici a reliquo remotores.

Habitat in Anate Boschate.

Longus valde, albus, fere linearis. Caput oblongum, obtusum: basi rotundatum. Os & caput rufum. Abdomen lanceolatum, capite quadruplo longius: segmento primo longiore: superne canali medio, seu sulco exaratum. Pedes antici posticos triplo breviores.

1044. PEDICULUS *Pilosus*.

Diagn. Caput rufum. Anus imprimis pilosus: pilis parallelis.

Habitat in *Fulica Atra*.

Caput rufum. Abdomen longum.

1045. PEDICULUS *Colymbinus*.

Diagn. Abdomen ovatum: macula elliptica nigra dorsali.

Habitat in *Colymbus Aurito*.

Priori similis; sed non adeo longus, nec pilosus adeo; capitis angulis posticis obtusis. Adultus rufescit.

1046. PEDICULUS *Ardealis*.

LINN. Syst. Nat. p. 613. n. 26.

FRISCH. Insect. 5. Tab. 4. nimis pilosa figura.

Diagn. Frons macula ferruginea. Maxillæ tridentatae.

Habitat in *Ardea Ciconia*.

Oblongus, albidus. Caput cordatum, obtusum. Antennæ articulo terminali apice fuscum. Oculi fuchi. Maxillæ subtus fuscæ. Abdomen albidum, ovatum.

1047. PEDICULUS *Ovalis*.

Diagn. Abdomen segmentis octo. Corpus depresso, ovatum.

Habitat in *Scolopace Arguata*.

Pediculo humano minor. Antennæ capite breviores, thorace longiores. Color rufo-bruneus.

1048. PEDICULUS *Junceus*.

Diagn. Thorax valde tenuis ad initium abdominis.

Habitat in *Tringa Vanello*.

Totus pallide bruneus, nitens. Caput marginè subrubro, pubescente. Abdomen oblongum. Pe-

Pediculus. PEDESTRIA. Pediculus. 385

Pedes primi a reliquis remotiores. Differt a *Pediculo Grafficorni*, quod brevior, pilosior, magis fuscus & lucidior, quod pedes antici non tam remoti a reliquis, quod abdominis suturæ fere æquales inter se, denique quod antennæ non sint pedibus anticus longiores.

1049. PEDICULUS *Cuspidatus*.

Diagn. Cuspis recta ad basim antennæ cujusque.

Habitat in *Rallo Aquat.*

Oblongus. Caput lucide rufum, nitidulum, læve. Corporis latera pilosa. Caput antice attenuatum, oblongum, depresso. Pedes subæquali inter se distantia. Ergo non idem cum *Pediculo Ralli Crecis LINN.*

1050. PEDICULUS *Bidendatus*.

Diagn. Caput hemisphæricum : angulis posticis bisetis. Thorax margine postice bidentato.

Habitat in *Columba Palumbo*.

Caput in medio foveam habet, lucidum, thorace latius. Abdomen ovatum, albidum, depresso : margine ciliatum. Pedes albi.

1051. PEDICULUS *Albiventris*.

Diagn. Caput rufum, cordatum. Oculi fuscii. Abdomen album, antice attenuatum.

Habitat in *Motacilla Troglodyte*.

Caput nitens, læve. Abdomen obovatum, late ciliatum, supra convexum. An vere diversus a *Pediculo Passerum LINN.*?

(**) *Insectorum:*

1052. PEDICULUS *Rostratus*.

Diagn. Abdomen & thorax hæmisphærici rubri ; pedes albi. Rostrum nigrum, inflexum.

385 Pediculus. ORDO VII. Pulex.

In *Gryllo Gryllotalpa* primus invenit, descripsit, & ad microscopium factam iconem, cum aliis benevole communicavit R. P. WULFEN.

Corpus cinnaberinum. Rostrum non videtur nisi in obverso corpore, quod utrinque cavernosum est. Pedes postici a reliquis remoti sunt.

1053. PEDICULUS Coccineus.

Diagn. Corpus ovatum, coccineum. Oculi fusci. Pedes pallidiores.

Habitat in *Hemerobiis*, *Musca Cynipsea*, *Leptura Melanura*. *Phriganea Bicaudata*.

Corpus ovatum: postice obtusum & villosulum; antice puncta duo nigra. Pedes pallidiores, æquedissiti. Situs quiescentis vere singularis; infidet enim capiti, pedesque retrorsum extensos gerit, quorum numerus senarius Genus indicat, licet habitu & figura *Acaris* accedit.

1054. PEDICULUS Cerambycinus.

Diagn. Antennæ corpore longiores.

Habitat in *Api Violacea*.

Albus, minutus, segnis. Corpus ovale. Antennæ assiduo & lente mobiles. Pedes sex, breves, pilosi, æquedissiti.

PULEX.

LINN. Syst. Nat. p. 614.

1055. PULEX Irritans.

LINN. Syst. Nat. l. c.

Faun. Svec 2. 1965.

Diagn. Antennæ articulis (4). Oculi nigri: pupilla alba.

Habitat in Domibus cum *Homine*, inter fissuras, afferum, quibus strata cubilia. Vidi etiam in tuguriis Pastorum, summis in alpibus; in *Sciuro Scanidente*; in *Erinaceo Europeo*; in *Felis Cato*, cuius adolescens corpus totum, adulti vero solam frontem

tem & oculorum regionem adit; in *Cane Familiari*; *Lepore Timido*.

Extirpatur frequenti scopatione, foliis *Alni* eorumque decocto, lavando saepe strata cubilium & lectorum lixivio cinerum saturatiore.

ACARUS.

LINN. Syst. Nat. p. 615.

1056. ACARUS Radiatus.

Corporis long. lin. 2.

Diagn. Corpus ovatum fuscum: margine fulvo, postice striato: striis octonis unipunctatis.

Habitat in *Testudine Mida*.

Paulo major, aut æqualis *Cimici Leptulario*. Os ferrugineum, truncatum, bifidum. Macula dorsalis excavata, ferruginea. Corpus margine subtusque fulvum; postice lineis (8) marginalibus, in quarum qualibet punctum impressum. Verrucæ duo posticæ, punctulo nigro notatae. Pedes fusi, albo-annulati. Posticis partibus *Testudinis* alte infixus est, ut *Acarus Ricinus*. in *Canibus*.

1057. ACARUS Ricinus.

LINN. Syst. Nat. p. 615.

Faun. Svec. 2. 1967.

FRISCH. Inf. 5. Tab. 19. p. 41-42.

Diagn. Fusco-ferrugineus, ovatus: macula dorsali subrotunda nitida fusca exarata lineis deprellis obsoletis obliquis quatuor.

Habitat in *Canibus*, circa caput.

Articuli pedum villosi.

1058. ACARUS Vestertilionis.

LINN. Syst. Nat. p. 611. Pediculus. n. 4.

Faun. Svec. 2. 1941.

FRISCH. Inf. 7. Tab. 7.

Diagn. Corpus rotundatum. Pedes æquedissiti: apice obtusi.

383 ACARUS. ORDO VII. ACARUS.

Habitat in Vespertilio Murino.

Pedum numerus imprimis Acarum indicat.

1059. ACARUS Cornicis.

Diagn. Pedes æquales. Abdomen postice bicorne: cornibus biletis.

In humeris Corvi Cornicis invenit. R. P. WULFEN. & iconem misit; sc. Febr. M.

Magnitudo pulvisculi Nicotianæ. Color dilute bruneus. Pilus pluviatus ad latus abdominis utrinque unus. Pedes pilosi: postici & medi ab aliis remotiores; antici filo brevi: apice fere palmato. Cornua ani teretiuscula, biseta divergentia.

1060. ACARUS Locusta.

Diagn. Abdomen setosum: lateribus sublobatis. Pedes postici longissimi.

Habitat in Paro Cæruleo; R. P. WULFEN, a quo iconem habui.

Albus, sed caput & femora ferruginea. Corporis pars antica fere quadrata convexiuscula. Abdomen apice valde setosum: setis parallelis. Pedes antici saepius palmati, medi longiores tenuiores minusque pilosi.

1061. ACARUS Cellurionis.

Diagn. Rostrum lateribus denticulatis, palporum longitudine. Pedes antici & postici longiores.

Inveni in Lanio Cellur. prope dextrum oris angulum 16. juli M.

Lineam longus, rotundus. Dorsum rufum, nitens. Abdomen glabrum, supra cinerascens. Pedes rufi, æquedistiti, vix villosi. Palpi porrecti.

1062. ACARUS Pici.

Diagn. Oblongus, postice acuminatus; pedibus anticis remotissimis, posticis brevioribus.

In remigibus Pici Medii R. P. WULFEN. 10. Junii.

Acarus. PEDESTRIA. Acarus. 339

Corpus adolescens ovatum, adutum lanceolatum. Seta una utrinque ex apice thoracis.

1063. ACARUS *Turdi*.

Diagn. Corpus subrotundum. Antennæ teretes, obtusæ, villosæ, extrorium leniter dilatatae, rostro crassiores.

Habitat in *Turdo Saxatili*.

Fuscus, lucidus, depresso, glaber. Rostrum longum, acuminatum. Pedes æquedilitti. Cursus celer. Statura est tertia pars lineæ.

1064. ACARUS *Coleoptratorum*.

LINN. Syst. Nat. p. 618.

Faun. Svec. 2. 1983.

FRISCH. Ins. 4. Tab. 10. p. 12-22.

ROESEL. Suppl. Tom IV. Tab. 1. fig. 4.

Diagn. Rufus, anō albicante.

In Insectis effectis Coleoptratis, Scarabæo Fimetro & Futilone, in Dermite Vespilli. & Agaricom, vidi etiam in *Api Bombinatrice* lapidaria.

Colore variat, ut habitu potius & domicilio dignoscatur.

1065. ACARUS *Coccinellæ*.

Diagn. Thorax rufus. Abdomen albidum, seriebus binis punctorum impressorum longitudinalibus.

Habitat in *Coccinella Populi*.

Ovatus. Pedes æquedilitti. villosuli.

1066. ACARUS *Muscarum*.

Diagn. Ovatus, nitidus, ferrugineus; pedibus pallidioribus.

Habitat in *Muscis*, sub ventre.

Palpi longi. Corpus glabrum, subtus pallidius. Pedes æquedilitti, medii & postici crassiores, hos vero longissimos & filiformes non invenio, nil de aliis *Acaro* loquatur LINNÆUS.

1067. ACARUS *Formicarum*.

Diagn. Ovatus, albidus, superne villosus. Antennæ motatoriae.

Habitat in *Formicis Alatis, Rufis.*

Junior albus, adultus obcurior est, agilis valde; antennis aut palpis abdomine longioribus.

1068. ACARUS *Holofericeus*.

LINN. Syst. Nat. p. 617.

Faun. Svec. 2. 1979.

Diagn. Ovatus, ruber: postice obtusus. Pedes duo postici ab aliis remoti; internedii breviores. Ab A *Aquatico* differt lateribus pectoris cinereo veluti colore tinctis.

Habitat in Hortis non raro; plures simul vidi in Cadavere *Falcnis* cuiusdam.

Totum corpus denso lucido villo, tanquam holoferico, tomentosum. Abdomen potius convexum, quam depresso. Palpi apice subtus appendiculam brevem habent.

1069. ACARUS *Cancroides*.

LINN. Syst. Nat. p. 616.

Faun. Svec. 2. 1968.

ROESEL. Suppl. Tab. 64. scorpio minus.

FRISCH. Liss. 8. Tab. 1. chelis imberibus.

P. PODA. Mus. Græc. p. 122. Tab. 1. fig. 14.

Diagn. Chelæ cancrinæ pedum anticorum. Incessus retrogradus.

Habitat in cystis ligneis, & Herbariis. Inveni etiam in sylvis.

1070. ACARUS *Nepiformis*.

— leng. lin. 4.

Diagn. Color & facies Nepæ Cimicoidis. Totus punctis eminentibus confertis scaber.

Reperi non seleni inter *Muscos*, ad *Fagorum* radices.

Ob-

Oblongus, depreclus initar folii, coloris terrei, iners valde. Antennæ moniliformes. Pedes antici & medii breviores. Os ovatum. Pedes secundi & postici corpore longiores.

1071. ACARUS *Muscorum.*

Diagn. Ovatus, nitidus, niger; pedibus ferrugineis.

Habitat inter *Muscos.*

Duplo major *Acaro Coleoprat.* Politissimus & longis villis instructus.

1072. ACARUS *Agaricorum.*

Linn. Syst. Nat. p. 618. fungorum?

Diagn. Ovatus, subfulvus; femoribus mediis crassioribus.

Habitat in *Agaricis.*

Statura *A. Coleoptratorum.*

1073. ACARUS *Lichenum.*

Diagn. Albus, ellipticus, postice obtusus; pedibus æqualibus pilosis.

Habitat inter *Lichenes* in arboribus.

Minor *Acaro Coleoprat.* Thorax binis veluti tuberculis. Abdomen pone pilosum, superne versus latera fuscescens. Pedes æquedifliti.

1074. ACARUS *Baccarum.*

Linn. Syst. Nat. p. 617.

Faun. Svec. 2. 1980.

Diagn. Ruber, abdomine postice pedibusque fulvis, palpis obtusis, ore nigro.

Currit super plantas.

Corpus subrotundum, pone obtusum, villis raris adspersum. Palpi pedesque villosi.

1075. ACARUS *Telarius.*

Linn. Syst. Nat. p. 616.

Faun. Svec. 2. 1974.

Dd 4

Diagn.

Diagn. Ovatus, nitidus; pedibus anticis longioribus.

- In folio *Tiliæ.*

1076. ACARUS *Piger.*

Diagn Ferrugineus; ovatus, nitens; macula dorsali, ovata, fulca.

Super *Lichenem crustaceum* vidi.

Vaide splendet, tarde incedit, dorso impo-
itus vix se invertere potest, irritatus caput in-
flectit pedesque ut solent *Onisci*. Pedes anticos
inflexos gerit: ovo *Pediculi Humani* minor est.
Huic anus infra apicem abdominis fuscelcens, pili
nonnulli ad apicem ventris, pedes parvi & æque-
dilitti.

A R A N E A.

LINN. *Syst. Nat.* p. 619.

(a) *Primariae*. Hoc situ oculorum. (:,:)

1077. ARANEA *Linnæi.*

Syst. Nat. p. 619. Diadema. n. 1.

Faun. Svec. 2. 1993.

ROESEL. *Tom. IV. Tab. 35. fig. 1.*

FRISCH. *Ins. 7. Tab. 4. fig. 1.*

Diagn. Abdomen subrotundum: cruce alba
dorsali facta maculis punctisque inæqualibus.

Habitat inter Arbores.

Au-

In immortibus nominibus clariss. virorum, qui
observationibus suis entomologicum studium
locupletirunt, meas species *Aranearum*, no-
vis ordinibus insignitas, venerabundus in-
scribo.

Araneæ meditabundæ, solitariæ, vigiles, fameli-
cæ, exosæ, fecunditate summa plurimum cala-
nitatum caute.

Auceps; tela perpendiculari, rotunda, laxa, in cuius centro Aranea

Magna, villosa, rufescens. Abdomen basi dilatum. Pedes fusco-fasciati. Palpi articulus ultimus tenuior. Varietas abdomine flavo femoribus pallide croceis, ex sylvis adlata sub finem Septembbris.

1078. ARANEA *Reaumurii.*

Diagn. Abdomen subrotundum, turgidum valde, albidum. lateraliter flavescentes: supra tredecim paribus punctorum nigrorum impressorum; subitus unicus.

In folio *Inulae helenii* convoluto, ad me lata.

Maxima, ventricosa: ventre lineas (8) longo, (7) crassi, post mortem crepante, subvillosa. Papillae nigræ. Thorax lineis tribus fuscis. Pedes pallidi: geniculis nigris. Immersa spiritui vini vixit decem minuta. Palpi prioris.

1079. ARANEA *Swammerdamii.*

Diagn. Fuscescens, thorace abdomeque albis pilis marginatis, pedibus longis: tibiis testaceo fasciatis.

Habitat Ruri.

Facies *Araneæ FRISCH.* Inf. 12. Tab. 13. sed oculis lateralibus non disjunctis. Palpi clavati. Abdomen ovatum, cum thorace villosum: margine linea repanda albida, in medio foveis rotundis nitidis binis. Femora antica longiora tota fusca, alia basi testacea. Pedes antici unciam & lineam unam longi. Abdominis longitudo lin. (5).

D d 5

1080.

Araneæ 1. *Textores* reti horizontali.

2. *Aucupes* — perpendiculari.

3. *Captivæ* se se includentes intra folia convoluta, fructus, graminum paniculas contractas &c.

4. *Erraticæ* prædam discurrendo quærentes.

5. *Geometræ*, pedibus anticis extensis.

6. *Vibrantes*, saltatoriæ contractatæ.

7. *Laterigrade*, incelsu etiam laterali.

1080. ARANEA Raji.

Diagn. Abdomen ovatum fuscum: maculis didymis dorsalibus, & quinque aliis in singulo latere flavis.

In arboribus.

Rete laxum obliquum, cui loco putei est folium ab Aranea convolutum. Palpi articulis æqualibus. Thorax fulvus. Abdomen quatuor fere lineas longum, tres crassum: basi subtus arcu flavescente, maculisque duabus flavis clavatis. Pedes fulvo-fuscoque varii.

1081. ARANEA Leuwenhoekii.

Diagn. Fusco-rufa, abdomine ovato: supra ad basim macula ovata fusca, subtus ibidem paro uno punctorum albidorum.

In gramineis, primo Vere.

Palpi articulis æqualibus. Corpus totum lin. (3 $\frac{1}{2}$) longum. Thorax fuscescens. Pedes fusco-rufi.

1082. ARANEA Aldrovandi.

Diagn. Fulva, abdomine subrotundo: fovearum paribus quinis, fasciis quatuor fuscis: una interrupta.

In collibus, inter frutices.

Auceps. Palpi æquales. Abdomen lin. (2) longum, prope basim lineis binis arcuatis obliquis oppositis albidis. Puncta impressa insident fasciis integris, quibus contiguum est punctum luteum.

1083. ARANEA Redii.

Diagn. Rufa, abdomine ovato: fasciis sex fuscis: primis duabus remotioribus punctoque albo in medio signatis.

Habitat in sylvis.

Auceps. Palpi æquales. Abdomen lin. (1 $\frac{1}{2}$) longum; basi lineam latum; subtus punctis duabus albis posticis.

1084. ARANEA *Merianæ*.

Diagn. Fusca, abdomine ovato, pedibus pallidioribus fusco fasciatis punctatisque.

Habitat inter *Muscos*, praesertim *Hypnum complanatum*.

Abdomen lineam cum dimidia longum, parvis villis pubescens. Thorax pedibus concolor. Palpi aequales, fuscocasiati vel punctati. Femora versus genua fasciis duabus, versus basim non nullis punctis fuscis; tibiæ fasciis quatuor fuscis.

1085. ARANEA *De Geerii*.

Diagn. Abdomen albidum ellipticum: fasciis arcuatis flavis lineisque tribus nigris.

Habitat in plantis.

Thorax cornei coloris, margine laterali fuscus. Palpi aequales. Abdomen duas lineas vix longum, superne lineolis tribus parvis anticus, quatuorque lateralibus obliquis, subtus nigro-flavoque varium. Pedes pilosi, colore thoracis.

1086. ARANEA *Frischii*.

Diagn. Flavicans, abdomine ovato: punctorum nigrorum paribus quinque submarginalibus.

Habitat inter *Corylos*, Majo M.

Thorax concolor pedibus sordide flavescentibus. Palpi clavati. Abdomen viridi-luteum, punctis binis pallidioribus in dorsi medio, subtus apice macula rubra notato. Variat thorace laterali margine fuscus, pedibus fulvis: articulis nigris, tibiis fascia nigra.

1087. ARANEA *Roeselii*.

Diagn. Thorax rufescens: linea media dorsali & lateribus albidis. Abdomen oblongum: supra nigricans: punctorum albescientium obsoletorum paribus quatuor.

In gramine rete parat horizontale; puteo obliquo longo ad terram usque producto, cui cadavera concredit.

Palpi

Palpi æquales. Papillæ textoriæ superiores longiores. Pedes fuscelcentes.

1088. ARANEA Goedarti.

Diagn. Fusca, abdomine ovato: lateribus albidis, pedibus rufis fuscotinctis.

Habitat in Pratis.

Non confundenda cum *Aran. Meriana*. Hæc enim *uceps*, tela horizontali, abdomine lin. $2\frac{1}{2}$. longo.

1089. ARANEA Albini.

Diagn. Abdomen ovatum nigrum: linea alba literaria; pedes rufi.

Habitat in Ericetis.

Palpi æquales. Punctum rufum ad basim abdominis inter extremitates linearum albarum lateralem conniventes. Rete horizontale, sparsum, absque puteo, Aranea sub reti in medio quiescente.

1090. ARANEA Clerkii.

Diagn. Ferruginea, abdomine subrotundo: duabus paribus punctorum impressorum.

Habitat inter folia plantarum.

Duas lineas longas, palpis æqualibus, abdome villoso: subitus ad lentem sublivido.

1091. ARANEA Malpighii.

Diagn. Palpi clavati, petiolati: petiolo abdominis longitudine. Maxillæ longæ, falcatae, tenues.

Habitat in domibus.

Oculi mediis antici protuberantes. Abdomen ovatum, fuscum, villosum: punctis (4) albidis, obsoletis, longitudinali seriem facientibus. Pedes villosi, pallidiores; geniculis fuscis.

(b) *Attentæ — — Ocul.* (::::).

[a] Oculis mediis seriei posticæ majoribus & remotioribus (:::::).

1092. ARANEA Schaefferi.

Diagn. Fusco-rufa, thoracis abdominisque lateribus albidis.

Habitat in gramineis.

Erratica. Palpi æquales. Abdomen oblongum: subitus fusco-ferrugineum, superne paulo obscurius, linea albida laterali a basi ad apicem excurrente; ejus longitudine lin. (3 $\frac{1}{2}$) est. Pedes fuscescens, pilosi: postici lineas (8-9) longi. Oculi seriei posticæ majores omnes.

1093. ARANEA Listeri.

Diagn. Fusco-grisea, abdome oblongo: subitus ad latera fulvo-rubo. Thorace linea alba dorsali media: postice bifida.

In pratis & collibus, Junio M.

Erratica, secum ferens saccum oviferum sphæricum albidum Pisi majoris magnitudine, corpore semiunciam tere longo, palpis longis æqualibus.

Huc proxima Aranea Palustris. LINN. Syst. Nat. p. 623. & FRISCHIANA, Ins. 8. Tab. 2.

1094. ARANEA Rolandri.

Diagn. Testacea, abdome elliptico lateribus angulisque anticus thoracis albidis.

In gramineis.

Captiva, *Erratica*. Thorax cinereo-rufescens: postice lineola alba dorsali. Abdomen duas lineas longum, duobus paribus punctorum impressorum. Palpi æquales.

1095. ARANEA Solandri.

Diagn. Maxillæ crassæ magnæ. Abdomen supra flavicâns: lineis longitudinalibus undatis rubellis (4).

Habitat in lacubus, super *Equiseta*.

398 Aranea.

ORDO VII.

Aranea.

Geometra. Thorax pedesque fusco-rufi. Abdomen oblongum, subtus fulcum lineisque duabus flavis: area interiecta nigra.

Variat abdomine subargenteo: lineis duabus auratis.

Conf. *Aranea Extensa* LINN.

1096. ARANEA Mouffeti.

Diagn. Abdomen cylindricum subargenteum: linea media fusca, lateribus luteis.

Habitat inter frutices.

Geometra. Thorax pedesque testacei. Palpi clavati. Maxillæ longæ, crassæ. Abdomen pallide argenteum, lineis lateralibus rep[er]tis aquotissime luteis; idem in medio lineam impressam habet, cui antice incubit alia transversa crucem faciens: extremis puncto impresso notatis.

(3.) Oculis æquedissimis.

1097. ARANEA Forskælii.

Diagn. Cinerascens, ab domine ovato: macula dorsali lanceolata nigra, thorace antice rugis tribus.

Habitat in apricis collibus *Carniolie super*.

Erratica. Oculi medii seriei posticæ valleculis plicarum impositi. Abdomen lin. (24) longum. Palpi æquales.

1098. ARANEA Petiverii.

Diagn. Nigra, ab domine ovato.

In herbidis sylvestribus. Martio M.

Palpi æquales. Corpus lineas tres longum. Abdomen basi planiusculum, foveola notatum.

(c) *Curiosæ* — — Ocul. (III)

(a) Laterigradæ; pedibus binis anticis longioribus, transversum expansum.

1099. ARANEA Kleinii.

Diagn. Ferruginea, ab domine punctis tribus impressis: subtus lateralibus plicis transversis.

L. 2-

Latet sub floribus *Scabiosæ*, aliisque, Apes Muscasque nectar collecturas invadens, jugulans.

Erratica, apivora. Palpi æquales. Abdomen tres lineas longum, fere totidem latum: apice rotundatum; basi angustius, obscurius coloratum; subtus plicis arcuatis striatum.

1100. ARANEA Osbekii.

Diagn. Albida, aut lutea; abdomine punctorum impressorum paribus duobus, & tribus cum impare majore ad basim.

In Umbellis *Angelicæ archangelicæ*, & *Herculei sphondylii*.

Hæc deorsum se demittens, pedes longiores expansos & deflexos tenet, cæteros vero contractos; eadem vitæ adeo tenax, ut acu transfixa viviterit a die 27 Julii, ad 6. Septembri. Habitus prioris, sed colores diversi. Abdomen tres lineas longum, subtus inter papillas & basim sex paribus punctorum exiguorum impressorum. Conf. FRISCH. Inf. 7. Tab. 5.

Hanc etiam, cum sociis indicat, definitio *Araneæ Levipedis* Ill. LINNÆI; sed tam diversa animalia in unam speciem conjungere, nobis nullo modo licet.

1101. ARANEA Kalmii.

Diagn. Fuscescens, abdomine ovato: lateribus fasciisque abruptis albis.

Habitat in sylvis.

Palpi clavati. Corpus lin. ($2\frac{1}{2}$) longum. Dorsum lineis duabus albidis postice coeuntibus. Irritata retroit, ut *Cancer*.

1102. ARANEA Hasselquistii.

Diagn. Virens, abdomine albo-luteo: lateribus fuscescentibus.

In cortice *Pruni hortensis*, M. Aprili.

Palpi æquales. Corpus lin. ($1\frac{1}{2}$) longum. Oculi nigri. Abdomen ovatum. Tibiæ punctis nigris piliferis.

1103. ARANEA Uddmanni.

Diagn. Flava, abdomine fulvo.

Inter frutices, rario.

Abdomen ovatum, lineam longum.

(b) Pedibus æqualiter expansis.

1104. ARANEA Derhamii.

Diagn. Pallide fusca, hirsuta; abdomine ovato fusco-maculato; palpis clavatis.

Habitat in domibus, rete struens in angulis cubiculum, & circa fenestras.

Pallide fusca, aut rufescens; Lippis Tonsoribusque nota.

1105. ARANEA Fonstoni.

Diagn. Thorax pedesque testacei. Maxillæ longæ crassæ nigræ. Abdomen oblongum subfuscum.

In sylvestribus Carniolie.

Captiva. Oculi medii autici majores. Abdomen villosum, lin. ($2\frac{1}{2}$) longum, subtus pallidius; supra punctis binis impressis.

1106. ARANEA Wilkii.

Diagn. Cinereo-nigroque varia. Pedes cinerei, nigro annulati.

Aprili M. in herbidis collibus.

Thorax antice macula laterali utrinque nigra. Palpi nigro-annulati, æquales. Abdomen linea paucio longius, ovatum, paribus tribus punctorum nigrorum, & sulco antice exaratum.

1107. ARANEA Roberti.

Diagn. Abdomen oblongum, villosum, fusco-rubrum: basi subtus punctis binis flavescensibus. Corpus alibi testaceum.

In pratis.

Aranea.

PEDESTRIA.

Aranea. 401

Abdomen lin. ($1\frac{1}{2}$) longum. Palpi æquales.

(d) *Peregrinatrices* — — Ocul. (⋮ ⋮). Vibrantes. Saltatoriæ.

1108. ARANEA *Sloanii.*

Diagn. Nigra; abdomine subrotundo rubro: macula media lanceolata nigra.

Habitat circa hortos, & agros.

Palpi clavati. Abdomine petiolo brevissimo nitido. Tibiæ supra obscuro quodam rubore tinctæ, subtus nigræ. Statura Araneæ Sacciferæ. Hæc una cum sororibus, palpos continuo movet, inquieta, antice retroque incedens, saltu ab hoste fugiens, rete non extruens, in saxosis habitat. Est Aranea *Chrysops*. R. P. FODA. Mus. Græc. p. 123.

1109. ARANEA *Catesbeii.*

Diagn. Tota cinereis pilis pubescens, thoracis dorso fusco, abdomine ovato fusco: lineis dorsaliibus binis longitudinalibus albis.

Habitat in muris siccis, seu saxis prata sepietibus.

Statura prioris. Palpi æquales. Abdomen subtus fuscum. Papillarum regio nigra.

1110. ARANEA *Rumpfi.*

Diagn. Griseo fuscoque varia. Abdomen ellipticum: linea albida dorsali: margine utrinque dentata.

Habitat in truncis arborum.

Caput inter oculos fulvum. Palpi æquales. Corpus lin. (4) longum. Abdomen subtus ad latera fuscum. Caput subtus fulvis pilis barbatum.

1111. ARANEA *Marcgravii.*

Diagn. Fuscum corpus. Palpi pedesque nigri. Lineæ duæ transversæ albæ palpos inter & oculos.

In plantis reperitur.

402 Aranea.

ORDO VII.

Aranea.

Minor prioribus. Palpi clavati, Oculi virore aliquo tincti. Abdomen ovatum, immaculatum, absque foveis.

III2. ARANEA *Blancardi.*

Diagn. Pallide rufescunt thorax & abdomen, utriusque margo albus. Pedes albo nigroque vari.

In sylvis.

Thorax antice & lateribus albis, postice niger. Abdomen lineam unam longum, ovatum, iubatus ad latera nigricans.

III3. ARANEA *Joblotii.*

Diagn. Nigra; abdomine fascia femoribusque rufis.

In convolutis foliis latet per totam hyemem. Reperi etiam in cotyla glandis tela tecta, sub qua latebat.

Statura & habitus formicæ minoris. Palpi clavati: clava pilosa oblonga. Abdomen oblongum, lucidum, subtus fascia pallidiore villosa. Femora antica basi nigra.

III4. ARANEA *Ritteri.*

Diagn. Aeneo-fusca, abdomine elliptico: punctorum impressorum unico pari.

In plantis.

Palpi clavati. Abdomen lineam longum. Femora pallide rufescens.

III5. ARANEA *Olearii.*

Diagn. Nigra, albis pilis adspersa; pedibus albo-fasciatis.

In arborum corticibus, primo vere.

Parvula; thorace lateribus albis; palpis clavatis. Abdomen ovatum.

Aranea.

PEDESTRIA.

Aranea. 403

(e) *Sedulea* — — Ocul. (III).

III6. ARANEA *Lyonetti*.

LINN. Syst. Nat. p. 623. *saccata*.
Faun. Svec. 2. 2021.

FRISCH. Ins. 8. Tab. 2. fig. 1.

Diagn. Fusca, terrestris, erratica; thorace linea dorsali pallidiore, pedibus rufo-fasciatis.

Passim in hortis & cuitis locis occurrit, fascium oviferum secum circumferens.

Abdomen ovatum, supra ad basim fasciculo pilorum alborum.

III7. ARANEA *R. P. Podæ*.

Diagn. Fusco-rufa. Maxillæ crassæ, nitidæ, nigrantes. Abdomen ovatum, in uno sexu superne albido-maculatum.

Currit per herbida loca, non infrequens.

Statura prioris. Palpi æquales. Corpus villosum. Abdomen subtus pallidius.

III8. ARANEA *Knorrii*.

Diagn. Fusca, ab domine elliptico villoso, lateribus subtusque pallidiore.

Cursitat super aquas, easque petit fugiens.

Non diveria ab *Aranea Fimbriata LINNÆI*.

Palpi clavati. Femora fusco-fasciata, rufescens-tia. Statura *Saccatæ*.

(f) *Senoculatæ* — — Ocul. (III)

III9. ARANEA *Hombergii*.

Diagn. Thorax niger, nitens, punctatus. Abdomen ellipticum, fusco-ferrugineum: foveolarum pari uno. Pedes nitidi fulvi.

Sub saxis, & antiquis lignis, reticulo oblongo, inclusam, non semel reperi.

Statura A. *Saccatæ*. Palpi æquales.

An hæc A. *Senoculata Celeberr. LINNÆI?*

Allum ordinem habet FRISCHUS, Oculis (III), nondum a me visis.

404 Phalangium. ORDO VII. Scorpio

(g) *Oeconomæ.* — — Ocul. (· · · ·)

1120. ARANEA *Pluchii.*

Diagn. Abdomen subcylindricum. Pedes longissimi: postici sedentis erecti.

Fila trahit varie implexa & inordinata, intra cubilia, minus lucidis in locis, ubi plures simul habitant.

Albo-cinerascens. Palpi clavati. Maxillæ apice nigræ. Abdomen maculis nigris.

PHALANGIUM.

LINN. *Syst. Nat.* pag. 618.

1121. PHALANGIUM *Opilio.*

LINN. *Syst. Nat.* l. c..

Faun. Svec. 2. 1992.

SPECTACLE de la NAT. Tom. I. Entr.
4. p. 109. le Faucheur.

Diagn. Corpus ovatum, depresso, rugosum, fuscum. Pedes basi ferruginei, alibi fusi: geniculis albidis.

In arboribus, sylvis, & domibus.

Maxillæ ut in *Araneis*, sed binis dentibus terminatae, ad instar chelæ. Oculi verticales duo approximati, nec alii. Palpi articulis quatuor. Abdomen pone obtusum. Corpus lineas duas longum, palpis æquale, subtus pallidius. Pedes secundi unciam & lineas decem longi; postici unciani unam & lineas sex.

An varietas alia? corpore postice dilatato, superne rubello: segmentis plerisque lateraliter punctatis.

SCORPIO.

LINN. *Syst. Nat.* p. 624.

1122. SCORPIO *Europæus.*

LINN. *Syst. Nat.* p. 625.

MATTH. *Biol.* p. 231.

Diagn.

Scorpio. FEDESTRIA. Cancer. 405

Diagn. Pectines singuli dentibus (9). Manus angulatæ. Thorax in medio tuberculis duobus, nigris. Oculi compositi.

Habitat circa *Vipacum* sub saxis, & *Goritiæ* passim, etiam in domibus, & circa *Neumarkt*.

Non raro biuncialis. Brachia biarticulata. Manus tetragonæ; digitis æqualibus. Pedes corpore pallidiores compressi. Cauda articulis sex: ultimo oblongo & mucronato. Abdomen incisuris (7). Pectinum dens unus in junioribus quandoque deficit.

C A N C E R.

LINN. *Syst. Nat.* p. 625.

1123. CANCER *Mænas.*

LINN. *Syst. Nat.* p. 627.

Faun. Svec. 2. 2026. absque descriptione.

MATTH. *Dios.* p. 226. 227.

Diagn. Thorax glaber a basi ultra medium dilatatus demum convergit: latere singulo convergente quinquedentato, antica parte obiter triloba.

Habitat in *Adriatico* Mari.

Incolæ ibidem vocant *Granci*.

Thorax lineas impressas, & rudem difformis faciei effigiem præferentes habet, hujus margo divergens marginatus, longitudine fere æqualis latitudini ab uno dente medio ad alterum delumpta. Pedes omnes testa longiores; unguibus antennarum longitudine. Brachii articulus secundus bidentatus. Manus subovatae: latere digito mobili respondentem angulari. Digitus mobilis quatuor fulcis exaratus, paulo longior, interno latere dentatus; fixus fulcis tribus, pariter interne dentatus: dentibus obtusis.

1124. CANCER *Depurator.*

LINN. *Syst. Nat.* p. 627.

Diagn. Differt a priore 1. Thoracis crusta molliore: antice tridentata, postice obtusiore; 2. Pedibus posticis lamina ovali, unguis loco, terminatis.

Habitat cum priore.

Incolis ibidem *Mafinetta*, quidam tamen priorum etiam ita vocant.

Antica pars testæ, dentibus (3-5) instruta, infra quos latus singulum quinquedentatum. Ab origine dentis quarti lateralis ad alium ducta linea recta, æqualis est rectæ a basi thoracis ad apicem ductæ. Brachii articulus secundus bidentatus: dente utroque acuminato.

1125. CANCER *Pagurus*.

LINN. Syst. Nat. p. 627.

Faun. Svec. 2. 2028.

MATTH. Diosc. p. 230.

Diagn. Thorax subrotundatus, lœvis: latere singulo intra orbitam oculorum dentibus (6): anterioribus quatuor bifidis; Oculi orbita dentata; antica pars thoracis inter oculos bifida, dupli serie dentium in singulo segmento; serie antica dentibus (5), altera (3).

Habitat cum prioribus.

Incolis *Grancipori*.

Huius brachia crassa valde. Manus tumidæ, supra tuberculis subacutis villisque interjectis hispidæ; qui in adultis decidunt, aculei vero obtusi sunt. Digihi castanei, ac demum nigri.

1126. CANCER *Maja*.

LINN. Syst. Nat. p. 629.

Faun. Svec. 2. 2031.

MATTH. Diosc. p. 229.

Diagn. Thorax ovatus, undique aculeis murecatus, ruber, villosus: antice birostris. Pedes corpore longiores, teretes, villis hispidi. Brachia pedibus similia; manibus cylindricis imberibus; digiti subulatis, lœvibus, subæqualibus, ex livido-fuscis, apice albis.

Habitat ibidem,

Incolis *Granceroli*.

Thorax dentibus longis lateralibus utrinque (7). Ova ruberrima, crepitantia in igne, valide purgantia, hinc abiicienda. Oculi non retractiles, sed oblique reponendi.

1127. CANCER *Gammarus*.

LINN. Syst. Nat. p. 631.

Faun. Svec. 2. 2033.

MATH. Diosc. p. 228. *Astacus*.

Diagn. i ongitudo & latitudo humani brachii. Thorax productus in rostrum supra sulcatum, lateribus subquadridentatis, subtus villosum, basi utrinque dente dupli. Manus spinis quatuor.

Habitat in sinu *Liburnico* & *Tergeſlino*, diciturque *Aſſische*.

Similis sequenti, profunde cæruleus. Thorax lœvis, semicylindrico-conicus, sulco transverso ut in *Cancro Astaco*. Corporis latera & caudæ maculis albis inordinatis. Pedes crassitie digitæ humani, prope apicem villosi: antici duo apice bipartiti, seu subcheliformes. Antennæ longitudine thoracis una cum cauda, ad latera corporis retrorsum projiciendæ: basi bicuspidatæ. Tentacula bipartita duo supra antennas. Cauda suturis (5); apex foliaceus, lobis (5) pulchre cæruleis. R. P. WULFEN.

1128. CANCER *Aſtacus*.

LINN. Syst. Nat. p. 631.

Faun. Svec. 2. 2034.

ROESEL. Suppl. Tab. 54-58.

MATH. Diosc. p. 227. *Gammarus*.

Diagn. Nigricans. Rostrum depresso: sub apice utrinque dente uno, & denuo alio minore utrinque ad basim. Manus, & digitæ latere interiore ferrati.

Copiosi in lacu *Zirchnicensi*, in cryptis *Kamine* & *Sueinskaiamma*; maximi ad *Gurk*, in fluvio ejusdem nominis (*Kerka*), quorum quinque hominis altitudinem æquasse meminit *VALVASOR Chron. Carn.* cap. 32. *Carn. Rak*; *Tergestinis Gambaro*.

Nutriuntur in Domibus hepate bovis, Urticæ foliis; conservantur dia vivi aceto adsperso. Hoc unum, cum fratribus, inter Inſecta, cibum Homini præbet delicitioſum.

1129. CANCER *Squilla*.

LINN. Syst. Nat. p. 632.

Faun. Svec. 2. 2037.

MATTH. Diosc. p. 229.

Diagn. Corpus pellucidum; rostro ancipiti aciebus verticalibus; superiore 5-8 dentata; inferiore antice tridentata; latere linea elevata longitudinali media.

Habitat in Mari & fossis circa *Tergestum*, *Gambarello* dictus.

Color lividus; vitreus, rubellus; laevis ubique & glaberrimus. Latera thoracis infra oculos utrinque denticulis duobus. Antennae toto corpore longiores. Tentacula duo tripartita: basi unidentata. Brachia pedibus similia. Manus basi cylindricæ. Digiæ æquales, fere recti.

1130. CANCER *Bernhardus*.

LINN. Syst. Nat. p. 631.

Faun. Svec. 2. 2032.

SPECTACLE DE LA NAT. TOM. III. p. 226. fig. f. g.

MATTH. Diosc. p. 239. Cancelli.

Diagn. Habitat intra testas concharum univalvium reformatarum, chelas laeves habens.

In *Trocho Muricato*, & *Turbonibus Turratis*, apud nos frequens, in *Adriatico Mari*. Testam obducit carne sicca spongiosa futco-rubra, incorruptibili, quim latere perforat, ibique degit *Cancer Eremita*, cauda temper introrsum, capite extrorsum vergente. Huic Thorax glaber, subcylindricus: pone paulo latior, infra medium linea arcuata deppressa, supri quam testa punctata appetet, præferuntim antice & lateraliter: infra hanc lineam thoracis latera rugosa sunt idem antice truncatus & tridentatus: dente medio majore; inter hos dentes oculorum petioli teretes, paralleli, prominent; antennæ articulis (38) pilo ad latera terminatis, quarum longitudo thoraci fere æqualis est. Brachia tuberculosa: articulo primo i interne glaberrimo & macula violaceo-rubra notato. Manus non cordata,

tæ, sed una cum digitis subovatæ figuræ. Digitæ in perfecta manu æquales, apice pilosæ. Pedes articulis 2, 3, superiore latere dentatis, ultimo compressio, ungue brevi concolore. Cauda thorace longior, sed tenuior, carnosa, difficulter examinanda.

1131. CANCER *Diogenes?*

LINN. Syst. Nat. p. 631.

Diagn. Facies prioris. Inter antennas lamellæ binæ denticulatæ. Antennæ articulis (12) manuum digitæ apice albi, iniberbes;

Habitat in Testis concharum, sed absque carnosa Eremo.

Lamellæ dictæ oculorum petiolis adpositæ. Thorax paribus duobus anticis punctorum rubrorum. Petioli oculorum leniter divergentes. Antennæ fusco-annulatae, articulis pilis verticillatis. Brachia pilosa. Manus tuberculatae, ovatae. Digitæ æquales, sine pilis. Pedes pilosi.

An prioris Varietas? An uterque *Diogenes?* An nova species?

1132. CANCER *Isirianus.*

Diagn. Brachyurus, thorace suborbiculato lævi: utrinque bidentato: apice inter oculos dentibus tribus; medio majore.

In sinu Liburnico.

In meo specimine Testa Cimice Lectulario pauculo major. Cancri totius color obscure rufus; corpus neque pilosum, neque tuberculatum. Thorax glaberrimus, modice convexus, ambitu fere circulare; postice marginatus, antice rotundatus, latere singulo, ubi testa convergit, dentibus duobus. Dens anticus major truncatus, denticulatus. Sternum subrotundum, basi minime excavatum, sulcis transversis parallelis, palati in modum, exaratum. Cauda brevis, fere conica. Brachia pedibus multo crassiora, articulo primo magno dente terminali, secunda subtus bidentato. Manus lanceolatae, brachio longiores, compressæ, subancipites, punctatæ; digitis rectis: mobili longiore. Pedum articulus ultimus subtus spinoso-dentatus, ungue parvo, concolore.

1133. CANCER Nutrix.

Diagn. Brachyurus, lævis, hexapus? In *Ostrea Edulibus* frequens, quas nutrit, ut ait Populus.

Habitat in Mari Adriatico.

Cancri hujus descriptionem hanc communicavit R. P. WULFEN. Si expansus, non longior quam latitudo unguis humani pollicis; si caudam supra ventrem incurvet, uti solet, vix dimidiam latitudinem unguis humani pollicis æquat, & tunc fere rotundus est. Cauda re ipsa reliquo corpore longior, sed supra ventrem reclinata, more Cancerorum brachyurorum, quibus etiam habitu similis. Cauda est elliptoidica, futuris sex: mediis latioribus & longioribus, sartus concava, supra convexiuscula, rotundata, obtusa, mollis; apice non foliaceo, sed circulariter fere rotundo. Thorax subrotundatus, lævis, supra convexiusculus, magnitudine lentis. Pedes utrinque tres tantum numeravi. Manus chelatae: chelis inflatis, latere interiore prope basim villosis. Digihi subæquales, latere interiore prope finum uno dente instructi. Oculi sunt puncta duo parva nigra in anteriore thoracis marginie. Antennæ minime capillaceæ. Infra caudam, quæ totum subetus tegit corpus, utrinque sex setæ, versum basim longiores. Autoptæ affirmant Ostreas majoribus cibum offerre, admitti a concha apertis valvis.

1134. CANCER Cruentatus.

LINN. Syst. Nat. p. 630.

Diagn. Testa triangularis, tuberculo acuminato, antice proferens rostrum lineare obtusiusculum: latere singulo bidentato. Pedes teretes, lineares, testa triplo longiores.

Habitat in Mari, circa Tergestum.

Testa convessa, postice sanguinea, antice pallidior. Frons cylindrica, linea media depresso, rostro dicto, duas lineas longo, terminata. Antennæ pilosæ. Brachi lateribus pilotis; articulo primo apice dentibus quatuor, secundo binis, utriusque latere postico crebris denticulis horrido. Manus ulna longiores, latere digitum fixum respiciente denticulato, altero similiter sed rarius dentato. Digihi incur-

Cancer. PEDESTRIA. Cancer. 411

incurvi, acuminati, punctati, postice fulco piloso exarati, basi dente crasto obtuso, aliisque minoribus armati.

1135. CANCER *Mantis.*

LINN. Syst. Nat. p. 633.

Faun. Svec. 2. 2035.

Diagn. Thorax oblongo-cordatus, laevis: lineis eminentibus (5). Manus adactylæ, falcatae, compressæ, dentibus (6) longis unilateribus. Abdomine futuris (10): anticis minoribus, omnibus sex lineis elevatis longitudinaliter angulatis.

Habitat frequens in Mari Adriatico, & Liburnico sinu, Canochia dictus.

Testa fere cartilaginea, antice attenuata, pone emarginata, laevis, angulata, posticorum pedum longitudine; antice utroque in latere denticulo terminata; rostro obtuso, marginato, oculorum longitudine. Antennæ tribus articulis: ultimo sustinente setas tres unciales, seu manuum fere longitudine. Lamina lanceolata, manuum longitudine plana, ciliata, basi biarticulata, retro oculos una utrinque. Corporis segmentum 1, latere acutum, brevius; 2, 3, 4, pediferum; reliqua marginata. Caudam constituit lamina magna, subquadrata, margine tumido dentatoque & rugoso: dentibus terminalibus lateribus longioribus; huic, ultimæ futuræ corporis inarticulatae adjacent laminæ aliae utrinque duæ lanceolatae: quarum superior longior, tribus articulis; altera brevior. Inter primam corporis futuram ac thoracem oriuntur Dactyli sex, ovali villosa lama terminati, pediformes. Sub abdomine utrinque squamæ quatuor obtuse cochleatae obliquæ. Articulus primus laminæ caudalis longioris, subtus auctus processu osseo bidentato. Brachii articulus primus inflatus angulatus; secundus compressus, longior, extrorsum latior. Manus est peñten uncialis, pallidior, quod ab animali ita movetur, ut fere ad primatur brachii articulo secundo.

1136. CANCER *Locusta?*

LINN. Syst. Nat. p. 634.

Faun. Svec. 2. 2042.

Diagn.

Diagn. Corpus oblongum, gibbum, nitens, lateraliter compressum. Palpi antennis triplo longiores: articulis (20). Corpus sese incurvando & explicando saltans, *Poduræ* adinstar.

Habitat abunde, circa littora Maris, sub saxis, prope *Tergefium*.

Statura fere *Poduræ Aquaticæ*. Habitus *Cancri Pulicis*. Corpus pellucens, ferrugineum, suturis (11), & denuo septem aliis utrinque ad bases femorum. Antennæ attenuatae, articulis sex. Oculi susci, minime petiolati. Pedes utrinque sex, hinc simul duodecim, quorum 1, 2, 3, 6. (a cauda antrosum numerando) femora ovata, compressa gerunt, Tibiæ vero primi paris pariter ovatae, compressæ, & margine denticulatae. Par ultimum capiti proximum, seu brachia, manu falcata unguiformi, unico dente in medio armata. Cauda adscendens, conica, linea brevior, subjectas habet setas duas ad basim usque bifidas. Hæc *Podura Maritima* R. P. *Poda*. Mus. Græc. p. 121.

1137. CANCER *Pulex*.

LINN. Syst. Nat. p. 633.

Faun. Svec. 2. 2041.

FRISCH. Ins. 7. Tab. 18. fig. 1.

Diagn. Facies prioris, sed duplo minor, & albidus. Antennæ palpis longiores, sed non crassiores. Pedes pilosi. Maculæ croceæ laterales.

Habitat sub *Hypnis*, & saxis, ad scaturigines fontium.

Hic certe idem, qui a **FRISCHIO** pictus, sed semper habitans in aquis dulcibus, non vero circa Mare, hinc dubito cum priore a **LINNAEO** confundi, cum *Cancer Locusta* ab eo aliter describatur, quam a nobis. Hic, quando exsiccatus, fulvus redditur, natat in latere, rarius in dorso; os fulvum gerit, nec corpus postice acuminatum. Interim certum adeo nobis cum priore a *Cancris* aliis diversum esse, ut novum Genus non immerito constitueret.

MONO-

MONOCULUS.

LINN. *Syst. Nat.* pag. 634.

1138. MONOCULUS *Apus.*

LINN. *Syst. Nat.* p. 635.

Faun. Svec. 2. 2046.

FRISCH. *Ins. 10. Tab. 1. fig. a. b. c.*

Habitat in fossis.

1129. MONOCULUS *Quadricornis.*

LINN. *Syst. Nat.* p. 635.

Faun. Svec. 2. 2049.

ROESEL. *Polyp. Tab. 98. fig. 2. 4.*

Habitat in lacubus, copiosus primo vere.

ONISCUS.

LINN. *Syst. Nat.* p. 636.

1140. ONISCUS *Bicaudatus.*

P. PODA. *Mus. Græc.* p. 120. *Lepisma bifurca.*

Diagn. Cauda duplex: utraque biseta.

Habitat copiosus *Tergesti* ad litus maris, inter taxa cursitans.

Corpus ellipticum, fuscum, semiunciam non æquans. Thorax segmentis septem marginatis: margine fusco-punctato, sordido. Cauda segmentis sex. Oculi fusti, prominuli, rotundati. Quælibet cauda duas setas habet, quarum altera longior. Pedes (14). An *On. Aquaticus* LINN?

1141. ONISCUS *Tridens.*

P. PODA. *Mus. Græc.* p. 125.

Diagn. Semicylindricus, caudæ apice tridentato truncato.

Habitat in Mari Adriatico.

Corpus

414 *Oniscus.* **ORDO VII.** *Oniscus.*

Corpus lin. 7-8. longum, dua. crassum, semicylindricum; thorace tamen in medio latiore.

Thorax segmentis (7), quibus utrinque squamula inarticulata est, hinc similia foliolis lateribus caudæ *Cancri Aftaci*; squama hæc pallidior, fusco-punctata, & marginata est. Caput conve-xum, subquadratum, marginatum. Antennæ longitudo æquat latitudinem segmentorum corporis; articulis tribus primis crassioribus punctatis, cæteris (17) extrorsum tenuioribus. Palpi articulis 2-4. Cauda fit una longa squama: apice tridentata: dente medio majore & acutiore; hæc subtus gerit lamellas binas parallelas, fusco-punctatas, factasque articulis duobus: extime breviore & obtuso. Pedes utrinque septem, pallidiores, fusco-punctati: articulis apice spinosis.

1142. *Oniscus Afellus.*

LINN. Syst. Nat. p. 637.

Faun. Svec. 2. 2058.

MATTH. Diosc. p. 257.

Diagn. Antennæ sexnodiae. Cauda segmentis (6): ultimio tribus squamis facto: media majore.

Habitat in Domibus, lucifugus. Maxime in cel-lis vinariis *Tergeflinis* fere uncialis.

Var. 1. Colore fuscescente: macula albida semi-circulari prope caput.

2. Colore subferrugineo, corpore immaculato.

3. Corpore lineis maculisque parvis sor-didis variegato, quali in sylvis habi-tat intra truncos cariosos.

1143. *Oniscus Afilus?*

LINN. Syst. Nat. p. 636.

P. PODA. Mus. Græc. p. 125.

Diagn. Antennæ articulis (18). Cauda squamulis lanceolatis marginalibus utrinque binis.

Inveni sub faxis, *Tergefl.*, prope Mare, post refluxum.

Corpus

Corpus ovatum, subferrugineum, fusco-punctatum, incisuris (8); caudali unica majore. Squamae ad latera caudae, una alteri. ita impositae, ut videatur unica.

1144. ONISCUS *Armadillo*.

LINN. Syst. Nat. p. 637.

Faun. Svec. 2. 2059.

P. PODA. Mus. Græc. p. 125. 8.

Diagn. Corpus ovatum: segmentis (10). Antennæ articulis (5) ultimo crassiore. Pedes a singulo latere (14).

Habitat circa *Vipacum*, *Goritiam*, *Tergeflum*, & alibi sub faxis.

Niger totus & lucens: segmento primo maculis rubris quatuor, aliis 4, 5, 6, 7, unico pari punctorum rubrorum. Cauda fit unica squama obtusa, bipunctata. Si tangatur, contrahitur in globum, & diutius in hoc situ manet, quam *On. Afilus*. Proprietate hac *Erinaceum* imitatur.

1145. ONISCUS *Muscorum*.

Diagn. Oblongus, antennis quadrinodiis, cauda lamellis parvis lanceolatis binis acuminatis.

Apud nos non rarus in sylvis inter muscos, imo & circa hortos sub faxis.

Ab omni alio hactenus noto diversus. Corpus fuscum, luteo maculatum. Segmenta corporis (7), caudae (6). Antennæ attenuatæ. Caudæ futura ultima mucronem effert, sub quo alias bifidus: segmentis pilo terminatis. Lamellæ duæ posticæ, huic uni propriæ,

SCO-

SCOLOPENDRA.

LINN. *Syst. Nat.* pag. 637.

Corpus planiusculum. Pedes sub plerisque corporis segmentis utrinque unus. Antennæ setaceæ.

1146. SCOLOPENDRA *Forficata.*

LINN. *Syst. Nat.* p. 638.

Faun. Svec. 2. 2064.

Diagn. Pedes utrinque quindecim.

Habitat sub saxis, in sylvis.

Apud nos uncia longior. Caput marginatum, basi truncatum, antice rotundatum. Antennæ articulis (30). Maxillarum paria duo: inferiore maiore. Corporis articuli (14): alternis majoribus.

1147. SCOLOPENDRA *Aranea.*

Diagn. Pedes utrinque tredecim.

Labaco missa.

Ferruginea, decem lineas longa, habitu prioris. Antennæ setaceæ, decem lineas longæ. Pedes sex postici lin. 9-10. longi, femoribus fusco-bifasciatis. Corporis articuli emarginati; macula fusca ibidem notati, (7); idem subtus segmentis (15), quæ tribus squamis composita: media emarginata.

1148. SCOLOPENDRA *Nivea.*

Diagn. Pedes utrinque duodecim.

Habitat sub saxis, in sylvis, non frequens.

Distincta a *Julo Jaguro*, defectu penicillorum, & pedum numero. Hæc lineam longa, tenuis & alba tota. Antennæ obtusæ, teretes, pilosæ, pedibus duplo longiores. Inter corporis articulos duos quosque pilus albus prodit.

Scolopendra. PEDESTRIA. Scolopendra. 419

1149. SCOLOPENDRA *Clavicornis.*

Diagn. Pedes utrinque septemdecim. Antennæ subclavatae, quinque nodiae.

Cuni *Agaricis* autumno domum delata.

Duas lineas longa, superne obsolete rubens, subtus pallidior. Antennæ pilosæ, articulis tribus ultimis crassioribus. Frons villosa. Corporis articuli margine tridentati. Pedes, sub tribus primis articulis utrinque tres, seu unicus e singulo articulo, ex aliis vero articulis singulis utrinque duo.

1150. SCOLOPENDRA *Julacea.*

P. PODA. Mus. Græc. p. 127. Julius Scolopendricus.

Diagn. Pedes utrinque triginta & unus.

Habitat in sylvis, inter *Muscos*, non rara.

Corpus unciale, planum, subfuscum, margine colore pedum; quandoque segmenta postica in medio glauca sunt, lateribus fusco-rufis, non raro latera segmentorum 2, 6, 9, 11. pallide lutea. Inveni etiam totam ferrugineam. Segmentum singulum linea transversa, & tuberculis nonnullis notatum, margine laterali crenulato. Antennæ articulis (6) pilosis. Pedes e segmentis primis tribus utrinque tres, seu unus e quolibet articulo utrinque, alibi vero utrinque duo e singulis articulis.

1151. SCOLOPENDRA *Marina?*

LINN. Syst. Nat. p. 639.

MATTH. Diosc. p. 235. fig. infer.

Diagn. Corpus tenue lumbriciforme, pedibus utrinque ultra centum & quinquaginta.

Habitat in *Fucis* & *Algis* Maris Adriatici, frequens.

Corpus uncias duas longum, lineam crassum, planum, glabrum, lucens: segmentis alternis majoribus, in medio fuscis: laterali margine tumido ferrugineo. Pedes subpellucidi, ferruginei.

JULUS.

LINN. Syst. Nat. p. 639.

Corpus convexum aut semicylindricum. Pedes e quolibet corporis articulo utrinque duo. Antennæ monili-formes.

1152. JULUS Terrestris.

LINN. Syst. Nat. p. 639.

Faun. Svec. 2. 2056.

Diagn. Corpus aenulatis (50); singulis utrinque duos pedes habentibus.

Habitat in terra, & sub saxis.

Annuli laeves, duri. Intra mandibulas utrinque palpus flavescens, articulatus. Antennæ pedibus longiores: articulis rotundis. Pedes luteoli, aut albidi.

1153. JULUS Lagurus.

LINN. Syst. Nat. p. 637. Scolopendra n. 1.

Faun. Svec. p. 2. 2063.

Diagn. Pedes utrinque duodecim.

Sub corticibus arborum, in Pomariis, & Salicetis.

Corpus oblongum. Antennæ articulis quinque. Corpus subtestaceum, articulis senis, qui superne pilis erectis verticillatis distincti. Caput antice pilosum. Fasciculi pilorum e singulo latere prostantes utrinque sex. Cauda penicillis duobus pilorum alborum terminata, qui in mortuo animali uniti, unicum repræsentant. Sub quolibet corporis segmento. seu fasciculo pilorum lateralium, oriuntur utrinque pedes duo, non vero unus. Hinc

Julus non *Scolopendra*.

F I N I S.



NOTANDA.

- §. 21. SCARABÆUS *Alpinus* valde similis SCARABÆO *Fimetario* & idem forte.
 §. 133. Delendus; est enim TENEBREO *Flavus* de-
 scriptus §. 160.
 §. 434. & §. 435. Papilioes non sunt distinctæ species.
 §. 461. P. *Arion*. P. *Argus* &c. usque ad §. 462. pro
 varietatibus habeo.

ERRATA.

| | | | |
|------|------|--------------------------------|--|
| Pag. | 2. | lin. 29. <i>Anthophylli</i> | lege <i>Anthophili</i> . |
| — | 3. | — 18. <i>Anthophyllus</i> | — <i>Anthophilus</i> . |
| — | 6. | — 8. res | — tres. |
| — | 23. | — 13. <i>Cirfio acanthoide</i> | — <i>Cirfio erisithale</i> JACQUIN. |
| — | 36. | — 5. BAUCHIN | — BAUHIN. |
| — | 42. | — 5. culis | — oculis. |
| — | 53 | — 31. <i>Vipacensi</i> | — <i>Vipacensi</i> . |
| — | 64. | — 29. <i>Afrantiae aculis</i> | — <i>Afrantiae epipa-</i> <i>etis</i> . |
| — | 99. | — 33. 287 - 292 | — 300 - 305. |
| — | — | — ult. 293 - 298 | — 306 - 311. |
| 142. | — | 19. ordinata | — ordinatæ. |
| 144. | — | 10. <i>Salice ceraso</i> | — <i>Salice, Ceraso</i> . |
| — | — | 15. duo | — duæ. |
| 145. | — | 9. corticinio | — corticino. |
| 147. | — | 19. duo | — duæ. |
| 156. | — | 17. ab basim | — ad basim. |
| 159. | — | 7. totas | — datas. |
| 171. | — | 14. exolere | — excolore. |
| — | — | 38. corticineo | — corticino. |
| 182. | — | 13. <i>Ocelata</i> | — <i>Ocelata</i> . |
| 190. | — | 17. duo | — duæ. |
| 259. | — | 7. long. lin. 7. | — long. unc. 7. lin. 7. |
| — | 276. | — 29. puncto | — puncta. |

Leviora vg. §. 301 *Fulipes* pro *Fulvipes*, §. 377 *Le-
tulurio* pro *Letulario*, p. 155 fuscis pro fuscis
&c. quivis nullo incommodo advertet.



MONITUM AUCTORIS.

Cum fama de vulgando hoc libello, typo pene jam absoluto, ad nostrates Entomologiæ cultores permanasset; petiere vehementer, ut ad expeditiorem ejus usum icones omnino omnes descriptorum entomorum adjicerentur. Horum itaque incitamento, favore, & forsan auspiciis, icones descriptorum in hac Entomologia Insectorum brevi dabo iis numeris distinctas, quibus superius Insecta ipsa enumeravi. Poterunt igitur Tabulæ iconum vel ad calcem opusculi hujus adjici, vel cum supplementis, quæ meditor, partem Entomologiæ alteram facere.



