

Ignatii a Born Eqv.

Academiae Imp. Naturae Curiosorum, Petropolit.  
Londinens. Helmens. Göttingens. Upsaliensis. Lendin.  
gethorum, Senens. Menacensis, Burghaus. Pata-  
vinæ nec non Physicorum Berlinensium Sodalit.


INDEX  
Rerum Naturalium  
Musei  
Caesarei Vindobonensis  
Pars I.<sup>ma</sup>  
Testacea

Verzeichniß  
Der natürlichen Seltenheiten  
des k.k.  
Naturalien Cabinets  
zu Wien  
Erster Theil  
Schalthiere

Vindobonæ, ex Officina Krausiana. 1778.

Division of Mollusks  
Sectional Library





## AD LECTOREM.

*Si publicas rerum naturalium collectiones  
opportuna atque efficacia ad dilatandam  
historiae naturalis cognitionem subsidia esse  
conuenit, finis hic nulla alia ratione obti-  
netur, quam si cuius naturae scrutatori  
aditus aperiatur ad ea ex thesauris istis de-*

## AD LECTOREM.

*promenda, quae siue ad vniuersale aliquod systema concinnandum, perpoliendumue, siue ad singulares obseruationes instituendas vsui ipsi esse possunt.*

*Patent quidem Musea rerum naturalium passim curiosorum conspectui, & quidquid in iis rarum & singulare admirandum est, a Praefectis diligenter ostenditur. At vero si perpendimus, quam velocibus, & quasi fugientibus oculis, totum hunc corporum naturalium apparatus, ob temporis, quod ei exhibendo definitum est, angustias, percurrere oporteat; quam exigua mora in hoc illoue corpore, quod animaduer-*

*uer-*



## A D L E C T O R E M.

*uersionem nostram maxime excitat, obtutum attentionemque defigere liceat; quam raro singulae partes naturali & continua serie sua exhiberi possint, ac demum quam plena molestiae tædiique eorum, qui Museis istis praesunt, sit occupatio, eandem, ut ajunt, crabem fere quotidie recoquere, operamque suam saepius apud homines scientiae naturalis prorsus ignaros & magis curiositati suae, quam scientiae amplificandae studio seruiantes perdere; facile profecto videbimus: Musea haec semper aliena fore a proposito, donec res naturales iis contentae accurate describantur, atque ea*

## AD LECTOREM.

*ratione ad notitiam manusque omnium, qui  
iisdem uti volent, perueniant. Sane si-  
ne tali instituto pretiosissima licet & varif-  
sima naturae cimmelia exteris maximam  
partem incognita, indigenis vero inutilia  
remanere necesse est.*

*Id animo reuoluens AVGVSTA on-  
stra, non patriae tantum, sed & scien-  
tiarum artiumque Mater, cuius gloriosif-  
simi, sapientissimique imperii haec aeterna  
& peculiaris erit memoria, prouidisse ip-  
sam singulari sollicitudine omnia, quaecun-  
que ad instituendos excolendosque subdito-  
rum animos conducere valeant, locupletif-  
si-*

# AD LECTOREM.

*simum ac pretiosissimum rerum natura-  
lium thesaurum, qui in palatio Caesa-  
reo Viennae adservatur, quemque FRAN-  
CISCO Augusto, Diuo illius Conjugi,  
sagacissimo rerum istarum aestimatori,  
conquisitorique solertissimo, acceptum re-  
ferimus, publici juris facere, atque ad id  
peragendum opera mea — quamvis praeter  
meritum — uti decrevit. Parui, ut par  
erat ILLIUS mandato, atque una cum ex-  
quisitis artificibus operi concinnando, exor-  
nando, perficiendoque illico manus admo-  
ui, cuius Volumen primum propediem typis  
exscriptum prodibit in lucem.*

*Quo-*

# AD LECTOREM.

. Quoniam vero neque omnes officii mei partes exsecutus, neque totam beneficentiae *AVGVSTAE* amplitudinem complexus videri poteram, si diligentiam meam soli illi operi adornando impenderem, majoris utpote pretii, quam ut a quolibet historiae naturalis studioso comparari possit, ad indicem hunc, facile cuius parabilem, conscribendum, animum adjeci. Is enim & iis, quibus Museum hoc Caesareum videndi est facultas, quidquid eodem continetur, intento velut digito commonstrabit, & aliis, qui alibi degunt, scientiae naturalis cultoribus, haud mediocri adjumento erit.

Ni-

# A D L E C T O R E M.

*Nil aliud Indici huic inferi poterat, nisi quod re ipsa in Museo nostro reperitur. Vnde & corpora eodem contenta non secundum novum quodpiam, a me fortasse condendum systema, sed secundum aliquod ex iis, quae jam ab aliis constituta habemus, disponi oportebat. Qua re & illa difficultate me expediui, qua naturalis historiae scriptores in novis novarum rerum nominibus apte imponendis passim implicantur.*

*In prima hac parte, quae Conchyliorum indicem exhibet, diligenti omnium prope Conchyliographorum instituto examine, mag-*



## A D L E C T O R E M.

*ni Linnaei systema secutus sum, propterea :  
quod omnium, quae adhuc extant — quid-  
quid alii obloquantur — sit absolutissimum ;  
quod characteres generum, familiarum, spe-  
cierumque singularum, quoad in systemate,  
quod sola testarum figura nititur, fieri po-  
tuit, accuratissime designet ; quodque tam-  
diu praestantiam suam, auctoritatemque  
tuebitur, donec Adansonii, Basteri, Otto-  
nes Mülleri consequentium seculorum, stu-  
dio, sagacitate & industria Svammerda-  
mii, Bradleii, Pouparti, & Reaumurii  
animati, accuratam descriptionem formae,  
partium, generis, vivendique rationis, quae*

## AD LECTOREM.

*unicuique testaceorum animalium propria sunt, praebeant; ut tandem genuinum Conchyliorum systema naturale, aut saltem ad naturam proxime accedens constitui possit.*

*Linnaei igitur, ut dixeram, systema secutus, nequaquam tamen presse adeo vestigiis ipsius institi, ut non interdum generum ac specierum definitiones ab ipso propositas distinctius enarrare, & si dicere fas est, emendare ausus fuerim. Neque non conatus sum, singulas Concharum partes decentioribus nominibus insignire; figuras a Linnaeo commemoratas rectius indicaui, du-*  
*bias*

A D L E C T O R E M.

*bias omisi, easque ex recentioribus Conchyliologis supplui, parum curans: quid teutonica Linnaeani systematis editio, Index Linnaeanus in Knorrjana Conchyliographia, & Jo. Sam. Schröterus in Bibliothecae lithologico conchyliographiae Tomo IV. peccauerit.*

*Eas Conchyliorum species, quas Linnaei systema haud complectitur, methodo, summo huic viro usitata, descripsi, illis familiis, quibus procul dubio ipse easdem inserturus erat, singulas inserui, notas omnes characteresque fusius declaravi, &*  
*ad*

## A D L E C T O R E M.

*ad accuratas earundum effigies, quae in maiori opere comparebunt, prouocauit.*

*Denique singulorum testaceorum nomina triuialia, quibus gallica, anglica & belgica lingua compellantur, ex optimis harum nationum scriptoribus adjeci; generaque, familias, species, & varietates eorum, quae hoc indice continentur, apposita alphabeti littera distinxi, ut ii, qui Museum lustraturi sunt, omnia facilius inueniant.*

*Eadem methodo & in aliis thesauri hujus Caesarei rerum naturalium Classibus describendis progrediar, quarum quidem*  
*ma-*

A D L E C T O R E M.

*maturationem , tametsi pluribus aliis negotiis destinear , tanto certius polliceri audeo , quod Viri doctissimi Georgii Sebastiani Helbling de Hirzenfeld , qui pro singulari , qua in rerum naturalium cognitionem fertur , studio , eximiam hoc in genere doctrinam sibi comparavit , amica opera me non parum adjuvari hic gratus profitear.*



## An den Leser.

Sollen öffentliche Naturaliensammlungen wirksame Hilfsmittel zu Erweiterung der Kenntnisse in der Naturgeschichte seyn, so wird dieser Entzweck nur dadurch erreicht, wenn jedem Naturforscher Gelegenheit verschafft wird, aus diesen Behältnissen natürlicher Seltenheiten die erforderlichen Materialien herzuholen, deren er etwann zur Darstellung eines allgemeinen Natursystems, zur Vervollkommnung desselben oder zu seinen einzelnen Beobachtungen bedarf. Zwar

\* \*

ste

An den Leser.

stehen die meisten Naturalien Kabinete dem  
Wißbegierigen offen , und werden von den  
Vorstehern derselben vorgezeigt. Wenn man  
aber weiß , wie flüchtig man meistens in dem  
kurzen Zeitraume , der zu diesen Vorzeigungen  
bestimmt ist , den ganzen Vorrath natürlicher  
Körper durchzugehen gezwungen werde ; wie  
wenig man sich bei einem oder dem andern Ge-  
genstände , welcher etwann unsre Aufmerksam-  
keit mehr reizet , verweilen dürfe ; wie selten  
alle einzelne Stücke in ihrem Zusammenhange  
vorgezeigt werden können ; wie unangenehm  
es den Vorstehern dieser Sammlungen fallen  
müsse , eine und eben dieselbe Sache fast täg-  
lich

## An den Leser.

lich zu wiederholen , und ihre Mühe öfters an Leute zu verschwenden , welche ohne alle Vorbereitung und Kenntniß in diesem Fache mehr aus Neugierde , als aus Verlangen sich zu unterrichten herbeigelockt werden ; und daß endlich bei derlei Anstalten dennoch immer diese Schätze der Natur dem auswärtigen oder entfernten Gelehrten verborgen bleiben ; so wird man sich leicht überzeugen , daß der Hauptzweck , welcher die Errichtung öffentlicher Naturalienkabinete veranlasset hat , in so lang verfehlet werde , bis diese nicht durch eine vollständige Beschreibung aller einzelnen Theile derselben allgemein bekannt gemacht und

## An den Leser.

auf diese Art gleichsam in die Hände eines jeden,  
der solche benützen kann, gebracht werden.

Unsere erhabene Monarchinn, deren weis-  
seste Regierung sich durch eine unumschränkte  
Sorgfalt für alles, was zum Unterrichte und  
zur Aufklärung ihrer Unterthanen beitragen  
kann, vorzüglich auszeichnet, hat aus diesen  
Beweggründen die öffentliche Bekanntmachung  
des k. k. Naturalienkabinets, dessen Entstehung  
und Daseyn wir Allerhöchst Ihrem verewigten  
Gemahl verdanken, anzubefehlen, und diese  
Arbeit — wieder meine Verdienste — mir auf-  
zutragen geruhet, an welche sowohl ich, als  
die zur Vervollkommnung und Verschönerung

die-

## An den Leser.

dieses Werks ausersehenen Künstler unverzüglich Hand angelegt haben; so daß wir im kurzen den ersten Band der Beschreibung des k.k. Naturalienkabinetts zu Wien herauszugeben, im Stande seyn werden.

Vielleicht würde ich aber meiner Pflicht und der allerhöchsten Absicht nicht ganz Genüge leisten, wenn ich mich bloß auf jene kostbare Ausgabe, die ihres höhern Preises wegen nicht gemeinnützig genug werden dürfte, einschränken sollte. In dieser Rücksicht habe ich das gegenwärtige, minder kostbare Verzeichniß entworfen, welches jenen, die dieses Cabinet selbst zu besehen Gelegenheit haben, zu einem

## An den Leser.

Handbuche dienen, den von dieser Hauptstadt entfernten Naturforschern aber immer noch einen zureichenden Begriff von den darinn befindlichen Seltenheiten geben kann.

Da ich in diesem Verzeichnisse bloß diejenigen natürlichen Körper, welche sich wirklich in diesem Kabinete befinden, anführen darf, so folgt aus diesem Umstande, daß ich solches nach keinem eigenen Systeme, welches immer sehr unvollkommen ausgefallen seyn würde, ordnen konnte, sondern hiezu eines der schon bekannten Systeme wählen mußte, wodurch ich zugleich der unvermeidlichen Schöpfung neuer

Bez



## An den Leser.

Benennungen , welche das Studium der Naturgeschichte so sehr erschweren , auswich.

Bei diesem ersten Theile , welcher das Verzeichniß der Konchylien enthält , habe ich nach einer sorgfältigen Prüfung der meisten Konchylien Werke das Linneische System gewählt , weil es , was man auch immer dagegen einwenden mag , unter den bisher bekannten , das vollständigste ist , die unterscheidenden Kennzeichen der Geschlechter , Abtheilungen und Arten — so viel es sich in einem künstlichen Systeme , welches sich bloß auf die Gehäuse der Schalthiere gründet , thun läßt — an richtigsten und bündigsten angiebt , und diesen

## An den Leser.

seinen Vorzug in so lang behaupten wird; bis uns nicht die Abdansone, Bastere, und Otto Müllere der künftigen Zeiten, mit dem Scharfsinn dem Beobachtungsgeist und der Genauigkeit eines Swammerdams, Bradley, Poupert, und Reaumur ausgerüstet, die vollständige Beschreibung der Gestalt, Theile und Lebensart eines jeden Schalthieres liefern werden, um alsdenn ein natürliches, oder der Natur sich mehr näherndes Ronchyliensystem zu erbauen.

So pünktlich ich nun in dieser Beschreibung der Ronchylien, der Linneischen Ordnung und Eintheilung nachgegangen bin, so habe ich dennoch meinem Führer nicht so knechtlich folgen

gen

## An den Leser.

gen wollen, daß ich mir nicht hätte erlauben sollen, die meisten Bestimmungen seiner Geschlechter und Arten deutlicher zu erklären, und — wenn ich mich so was zu sagen erlauben darf — vielleicht zu verbessern. Auch wagte ich es die Benennungen der einzelnen Theile der Muscheln anständiger auszudrücken; dann berichtigte ich die von Linne angeführten Figuren, ließ die zweydeutigen hinweg, und ergänzte dieselben aus den neuern Konchyliologen, ohne mich durch die Deutsche Ausgabe des Linneischen Natursystems, und durch die Linneischen Register in dem Knorr'schen Konchylienwerke, und in dem vierten Bande des Schröter'schen

## An den Leser.

rischen Journals für die Liebhaber des Steinreichs und der Konchyliologie irre führen zu lassen.

Diejenigen Konchylien, welche in dem Linneischen Systeme nicht enthalten sind, beschrieb ich nach dieses berühmten Systematikers Methode, ordnete sie in jene Familien, wohin er sie vermuthlich selbst gesetzt haben würde, erklärte sie durch eine weitläufigere Beschreibung ihrer Kennzeichen, und berief mich auf die Abbildungen, welche wir in der Beschreibung des k. k. Kabinetts sowohl von diesen als von allen jenen, die bisher in keinem Konchylienswerke

## An den Leser.

werke gemallet, oder etwan nicht gut gemallet sind,  
liefern werden.

Endlich habe ich die holländischen, franz-  
zösischen und englischen Trivialnamen aus den  
bessern Schriftstellern einer jeden Nation hinzu-  
gefügt, und die in diesem Verzeichnisse enthal-  
tenen Geschlechter, Unterabtheilungen, Arten  
und Abarten mit einem nach alphabetischer Ord-  
nung hinzugesetzten Buchstaben bezeichnet, um  
denjenigen, welche dieses Kabinet besuchen, die  
Auffindung der Stücke, die sie etwann vorzüg-  
lich zu sehen wünschen, zu erleichtern.

Nach diesem Plane werde ich in der Be-  
schreibung der übrigen Theile dieser kais. Samml-  
ung

## An den Leser.


lung fortschreiten ; deren baldige Vollendung ich — ungeachtet meiner übrigen Beschäftigungen — um so gewisser versprechen darf, da mir diese Arbeit durch die freundschaftliche Mitwirkung des Hrn. Helbling von Hirzenfeld — eines Mannes der von einem seltenen Hange zur Naturgeschichte hingerissen, diese Wissenschaft, in welcher er sich die ausnehmendesten Kenntnisse erworben hat, sein einziges Geschäft seyn läßt, treflich erleichtert wird.





# EXPLICATIO


## CITATIONVM ABBREVIATARVM.



### Erklärung

der

### angeführten Verkürzungen.



*Adans. Seneg.* Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages par M. Adanson, avec des figures, a Paris 1757. 4.

*Argenv. Conch. Zoom.* L'histoire naturelle éclaircie dans une des ses partie principales la Conchyliologie, augmentée de la Zoomorphosie; nouvelle edition, avec des figures en taille douce, par M. (Argenville) a Paris 1757. 4.

*Aldrov. Test.* Ulyssis Aldrovandi de exanguibus. Libri quatuor &c. cum figuris, Bononiae 1642. fol.

*Bast. Subf.* Jobi Basteri Opuscula subseciva, Tomus I. & II. cum Figuris, Harlemi 1762. 1765.

Bell.

# EXPLICATIO

*Bell. aq. Petr. Bellonii de aquatilibus, cum figuris*  
*Parif. 1553. fol.*

*Berlin. Mag. (Hrn. D. Martini) Abhandlung von*  
*Erdschnecken mit Kupfern im II. und III. Ban-*  
*de des berlinifchen Magazins. Berlin 1766. 8.*

— — (Ebendes.) *Abhandl. von Conchylien der füßen*  
*Wäßer, mit Kupfern im IV. Bande des Ber-*  
*linifchen Mag. 1767.*

*Bonan. Mus. Kirch. Museum Kircherianum a Philip-*  
*po Bonnano S. I. cum figuris, Romae 1709.*  
*fol.*

*Brown. Hift. Jam. The civil and natural history*  
*of Jamaica with figures, by Patrik Browne.*  
*London 1756. fol.*

*Chem. Naturf. Herrn Paf. Chemnitz Abhandlung*  
*von dem innern Wunderbau mancher Schne-*  
*cken, mit einer ausgemalten Kupfertafel im*  
*IX. Stücke des Naturforschers. Halle 1776. 8.*

*Column. purp. Fabii Columnae opusculum de Pur-*  
*pura cum figuris. Kiliae 1675. 4.*

*Da Cost. Elem. Elements of Conchology by Emanuel*  
*Mendes Da Costa with seven illuminated Pla-*  
*tes. London 1776. m. 8.*

*Dav.*

CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Dav. Cat. syst.* Catalogue systématique , & raisonné de Curiosités de la nature , & de l'art , qui composent le cabinet de M. Davila. avec figures en taille douce. Tome I. a Paris 1776. 8.

*Ellis. Transact.* An Account of several rare species of Barnacles in a Letter from. John Ellis. with figures, in the philosophical Transactions. Vol. L. Part. II. for the Year 1758. Wittenberg. 1771. 4.

*Fav. Dictionnaire* d'histoire naturelle, qui concerne le testacées ou les coquillages de Mer , de terre , & d'eau-douce par M. l'Abbé Favart d'Herbigny. Tome I. — III. a Paris 1775. 8.

*Geof.* Traité sommaire des coquilles tant fluviatiles, que terrestres, qui se trouvent aux environs de Paris par M. Geoffroy. a Paris 1767. 12.

*Gev. Belust.* Monatliche Belustigungen im Reiche der Natur an Konchylien und Seegewächsen mit illuminirten Kupfern. Hamburg 1755. gr. 4. mit deutsch und französischen Text.

*Ginan. adr.* Opere postume del Conte Giuseppe Ginanni Ravennate con figure. Tomo II. in Venezia 1757. fol.

*Gualt.*

## EXPLICATIO

*Gualt. Test.* Index testarum conchyliorum , quae  
adservantur in Museo Nicolai Gualtieri cum  
tabulis aeneis. Florentiae 1742. fol.

*Helbl. Abb. e. Priv. Ges. in Boehm.* Georg. Sebast.  
Helblings Beiträge zur Kenntniß neuer und  
seltener Conchylien mit Kupfertafeln , im IV.  
Bande der Abhandlungen einer Privatgesellschaft  
in Böhmen. 1778. gr. 8.

*Hill. Hist. of. Anim.* An History of Animals illustra-  
ted with figures. by John Hill. London 1752.  
fol.

*Klein Meth. Ostr.* Jac. Theod. Klein Tentamen  
methodi ostracacologicae cum figuris. Lugd.  
batav. 1753. 4.

*Knor. Del. Nat.* Deliciae naturae , von Georg  
Wolfg. Knorr , mit deutschen und französischen  
Text und ausgemalten Kupfertafeln. I. Theil.  
Nürnberg 1766. gr. fol.

*Knor. Vergn.* Vergnügen der Augen und des Ge-  
müthes in Vorstellung einer Sammlung von  
Schnecken und Muscheln , mit ausgemalten  
Kupfertafeln I. — VI. Theil. Nürnberg. 1757 —  
1772. 4.

*Mus.*

CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Koelr. nov. com. petr.* Descriptio tubiporae maris albi indigenae, auctore J. T. Koelreuter cum tabulis aeneis in nouis commentariis academiae scientiarum petropolitanae. Tom. VII. Petropoli 1761. 4.

*Linn. S. N. Car.* a Linné Systema naturae, editio duodecima. Holmiae 1766. Tom. I. m. 8.

*Linn. It. vvestg.* Karl von Linne Reisen durch einige schwedische Provinzen II. Theil, welcher die Reise durch Westgothland enthält. mit Kupfern. Halle 1765. gr. 8.

*List. angl.* Martini Lister, Historiae animalium angliae tres tractatus, unus de araneis, alter de cochleis tum terrestribus tum fluuiatilibus, tertius de cochleis marinis. cum figuris. Londini 1678. 4.

*List. Hist. Conch.* Martini Lister, Historiae conchyliorum liber I — IV. Volumina duo cum tabulis aeneis, Londini 1685 — 1688. fol.

*Mart. berlin.* Beschaeft. Konchyliologische Rhapsodien von Friedr. Heinr. Wilh. Martini; im II. Bande der Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, mit gemalten Kupfern. Berlin 1776. gr. 8.

Ebendesselben — Zwoschalige Konchylien überhaupt beschrieben; mit ausgemalten Kupfern im III. Bande derselben Beschäftigungen. Berlin 1777. gr. 8.

\* \* \*

*Mart.*

# EXPLICATIO

*Mart. Konch. Kab.* Neues systematisches Konchylien-kabinet von Friedr. Heintz. Wilh. Martini, I — IV. Band mit illuminirten Kupfertafeln. Nürnberg 1769 — 1778. 4.

*Müll. Linn. Naturf.* Von Linne vollständiges Natursystem aus dem Lateinischen von Phil. Ludw. Stenius Müller mit Kupfern. VI. Th. 1. Band. Nürnberg 1775. gr. 8.

*Müll. Hist. Verm.* Vermium terrestrium & fluviatilium succincta historia auctore Othon. Friderico Müller. Volumen II. Havniae 1774. 4.

*Müll. Zool. dan.* Zoologiae danicae icones editae ab Othone Friderico Müller. Fasciculus I. Hafn. 1777. fol.

*Murr. Fund. Test.* Fundamenta testaceologiae auctore Adolpho Murray. Upsaliae 1771. 4.

*Mus. Caes. Vindobon.* Museum Caesareum Vindobonense jussu MARIAE THERESIAE Augustissimae edidit Ignatius Eq. a Born latine & germanice cum tabulis pictis. Beschreibung des kais. kön. Naturalienkabinetts auf Befehl Ihrer Majestät der Kaiserin Königin herausgegeben von Ignaz Edlen von Born, mit ausgemalten Kupfertafeln, deutschen und lateinischen Text. Wien 1779. fol.

*Mus.*



CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Mus. Olear.* Adami Oleari Museum gottorpiense.  
cum figuris. Schleßv. 1674. 4.

*Mus. Tessin.* Museum Tessinianum opera Comit-  
tis Car. Gust. Tessin. latine & suecice, cum  
tabulis aeneis Havniae. 1753. fol.

*Mus. Worm.* Museum Wormianum seu Historia  
rerum tam naturalium, quam artificialium &c.  
adornata ab Olao Worm, cum iconibus. Lugd.  
batav. 1655.

*Petiv. Gaz.* Jacobi Petiveri Opera ad historiam  
naturalem spectantia. containing Gazophyla-  
cium naturae & artis &c. with figures. Vo-  
lume I. London 1712 — 1767. fol.

*Petiv. amb.* Aquatiliū animalium amboinae &c.  
icones & nomina with their latin, englisch,  
and native names, and figures by James Pe-  
tiver, London 1713. fol.

*Planc. Conch.* Jani Planci de conchis minus notis.  
Venetiis 1739. 4.

*Reaum. Mem. de Paris.* De differentes manieres  
dont plusieurs especes d'animaux de mer s'atta-  
chent au sable, aux pierres & les uns aux au-  
tres par M. de Reaumur — Decouverte d'une

## EXPLICATIO

nouvelle teinture de Pourpre &c. avec figures, par le meme, dans l'histoire de l'academie royale de sciences de l'année 1711. a Amsterdam 1715. 12.

*Regenf. Samml.* Sammlung von Muscheln, Schnecken und andern Schalthieren auf Befehl Seiner Königl. Majestät von Dänemark 2c. mit deutschen und lateinischen Text, und illuminirten Kupfertafeln gezeichnet und gestochen, von Franz Michael Regensfuß. Kopenhagen 1758. Regalsfolio. Ou Recueil de coquillages, de Limaçons, & de crustacés par ordre de Sa Majesté le Roi de Danemark gravés en taille douce, & illuminés de couleurs naturelles par Franc. Mich. Regensfuß, avec le text françois & allemand. Coppenhague 1758. fol. royal.

*Rondel. Test.* Guil. Rondeletii universae aquatilium historiae pars altera, cum figuris, folio transverso. Lugd. 1555. fol.

*Rumph. amb.* Georg Ebeh. Rumph's amboinische Raritätenkammer von den steinschalichten Thieren, mit Kupfertafeln, aus dem Holländischen übersetzt von Ph. Ludw. Statins Müller, und mit Zusätzen vermehret von Joh. Hieron. Chemnitz. Wien 1766. fol.

*Schlott.*

CITATIONVM ABBEVIATARVM

*Schlott. Act. helv.* Observatio physica de cochleis quibusdam, nec non de turbinibus nonnullis &c. Philipp. Jac. Schlotterbeccii, cum figuris aeneis in actis helveticis physico medicis. Volum. V. Basil. 1762. 4.

*Schroet. Erd'.* Versuch einer systematischen Abhandlung über die Conchylien um Thangelstadt von Joh. Sam. Schröter m. K. Berlin 1771. 8.

*Seb. Thes.* Lucupletissimi rerum naturalium thesauri descriptio (idiomate latino & belgico) cum iconibus Albert. Seba. Tomus III. Amstelod. 1757. fol. Regal.

*Spengl. Berlin. Beschaeft.* Beschreibung einer besonders schönen Korallenmuschel mit einer ausgemalten Abbildung, im II. Bande der Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Berlin 1775. 8.

*Ebendesselben.* Beschreibung einer seltenen Dünnmuschel mit ausgemalten Figuren, im III. Bande derselben Beschäftigungen. Berlin 1776. 8.

*Swammerd. Bibl. nat. Jo.* Swammerdam Biblia naturae seu historia insectorum in classes redacta, idiomate latino & belgico, cum tabulis aeneis. Lugdun. bat. 1737 — 1738. fol.

EXPLIC. CITAT. ABBREVIATARVM.

*Valent. Abb.* Franz Valentyns Abhandlung von Schneckenmuscheln und Seegewächsen um Amboina aus dem Holländischen übersezt von Phil. Ludw. Stätius Müller mit Kupfern. Wien 1773. fol.


*Walch. Naturf.* Beschreibung einiger Conchylien von Emanuel Walch, mit ausgemalten Figuren im achten Bande des Naturforschers. Halle 1776. 8.



# *PARTES CONCHARVM* NONNVLLAE EXPLICATAE.

## E r f l ä r u n g

einiger Benennungen der Theile an Muschel-  
schalen.



**C**ARDO, Pars ambitus, vbi  
valvae coherent.

**D**as Schloß ist derjenige  
Theil des Umfanges, an wel-  
chem die Klappen aneinander  
passen.

**L**ATVS cardinis, ANTI-  
CVM ; huicque oppositum  
POSTICVM vocatur.


Die Seite am Schlosse  
heißt die vordere ; die entge-  
gengesetzte die hintere Sei-  
te.

**L**IGAMENTVM, Hymen  
*Linn.* Membrana cartilaginea  
valvas connectens.

Das Band ist die knorpe-  
lige Haut, welche die Klap-  
pen mit einander verbindet.

**A**REA ANTICA. *Vulva*  
*Linn.* Regio extra liga-  
mentum ; quae si introrsum  
declivis sit SINVS audit.

Die Vorderfläche ist die  
Gegend ausser dem Bande  
und heißt, wenn sie einwärts  
abhängig ist eine Vertiefung.



**LABIA EXTERNA** *Labia Linn.* ca vocantur, quae extra ligamentum locata sunt. Die äußeren Lefzen heißen diejenigen welche außer dem Bände stehen.

**LABIA INTERNA**, *Nymphae Linn.* sunt labella intra ligamentum, & cum eo devincta. Die inneren Lefzen heißen diejenigen kleineren Lefzen, welche inner dem Bände stehen, und mit demselben verbunden sind.

**VMBONES**, *Protuberantiae ventricosae valvae cuiusvis extra cardinem.* Die Backen sind die häufigen Erhöhungen einer jeden Klappe außer dem Schlosse.

**APEX**, *Nates Linn.* *Protuberantiae cuiusvis finis attenuatus.* Die Spitze ist das Ende in welches sich jede verdünnte Backe verlängert.

**RIMA**, *Hiatus a ligamento tectus.* Die Spalte ist die Oefnung, welche von dem Bände gedeckert wird.

**AREA POSTICA** aut **AREOLA**, *Anus Linn.* Die Hinterfläche heißt die der Vorderfläche entgegengesetzte Seite.





# GENERA TESTACEORVM.

## METHODO LINNEANA.

### Geschlechter der Schalthiere

nach Linneischer Ordnung.

#### MVLTIVALVIA.

#### Vielflappige.


|            | Pag. |                      | Seite. |
|------------|------|----------------------|--------|
| A. Chiton. | 1.   | A. Die Käfermuschel. | 1.     |
| B. Lepas.  | 2.   | B. Die Meerichel.    | 2.     |
| C. Pholas. | 7.   | C. Die Steindattel.  | 7.     |

#### BIVALVIA.

#### Zweiflappige.

|               |     |                       |     |
|---------------|-----|-----------------------|-----|
| D. Mya.       | 10. | D. Die Klafmuschel.   | 10. |
| E. Solen.     | 13. | E. Die Messerscheide. | 13. |
| F. Tellina.   | 17. | F. Die Tellmuschel.   | 17. |
| G. Cardium.   | 27. | G. Die Herzmuschel.   | 27. |
| H. Mastra.    | 39. | H. Die Korbmuschel.   | 39. |
| I. Donax.     | 40. | I. Die Stumpfmuschel. | 40. |
| K. Venus.     | 43. | K. Die Venusmuschel.  | 43. |
| L. Spondylus. | 63. | L. Die Klappmuschel.  | 63. |
| M. Chama.     | 65. | M. Die Gienmuschel.   | 65. |
| N. Arca.      | 72. | N. Die Arche.         | 72. |

O. Ostrea.



|             | Pag. |                        | Seite. |
|-------------|------|------------------------|--------|
| O. Ostrea.  | 80.  | O. Die Muschel.        | 80.    |
| P. Anomia.  | 101. | P. Die Vastardmuschel. | 101.   |
| Q. Mytilus. | 106. | Q. Die Rießmuschel.    | 106.   |
| R. Pinna.   | 115. | R. Die Steckmuschel.   | 115.   |

## VNIVALVIA.

## Einschalige.

|               |      |                           |      |
|---------------|------|---------------------------|------|
| A. Argonauta. | 119. | A. Der Segler.            | 119. |
| B. Nautilus.  | 121. | B. Die Kammer Schnecke.   | 121. |
| C. Conus.     | 123. | C. Die Zutenschnecke.     | 123. |
| D. Cypraea.   | 155. | D. Die Porzellanschnecke. | 155. |
| E. Bulla.     | 183. | E. Die Blasenschnecke.    | 183. |
| F. Voluta.    | 195. | F. Die Faltenschnecke.    | 195. |
| G. Buccinum.  | 228. | G. Das Kinkhorn.          | 228. |
| H. Strombus.  | 264. | H. Die Flügelschnecke.    | 264. |
| I. Murex.     | 282. | I. Die Stachelschnecke.   | 282. |
| K. Trochus.   | 330. | K. Die Kräuselschnecke.   | 330. |
| L. Turbo.     | 345. | L. Die Mondschnecke.      | 345. |
| M. Cornu. *   | 371. | M. Die Hornschnecke *     | 341. |
| N. Helix.     | 372. | N. Die Schnirkelschnecke. | 372. |
| O. Nerita.    | 410. | O. Die Schwimmschnecke.   | 410. |
| P. Haliotis.  | 427. | P. Die Ohrschnecke.       | 427. |
| Q. Patella.   | 430. | Q. Die Napf schnecke.     | 430. |
| R. Dentalium. | 448. | R. Die Zahnschnecke.      | 448. |
| S. Serpula.   | 452. | S. Die Röhrenschnecke.    | 452. |

TE-

\* Vide tab. huius indicis.

\* Sieh die Tafel dieses Verzeichnisses.

# TESTACEA.

## Schalthiere.

Ordo primus. Erste Ordnung.

Multivalua.

Vielflappige.

A. Chiton.

A. Die Käfermuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 300.*

Valvae plures longitudinaliter digestae, dorso incumbentes.

Die Schale bestehet aus mehreren, nach der Länge des Rückens hintereinander liegenden Klappen.

A. 1. Chiton squamosus.

A. 1. Die schuppige Käfermuschel.

*Linn. S. N. Sp. 5.*

Testa octovalis carinata; valvulis oblique angulatis, striatis, corio squamato.

Die acht Klappen der Schale sind oben keilförmig, der Quere nach eckig, und gestreift, mit einer schuppigen Haut.

*Petiv. Gaz. t. 1. f. 3. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

A. 2. Chiton cinereus.

A. 2. Die kleine Käfermuschel.

A

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 8.*

Testa ovalui obtuse ca- Die etwas flache aschengrau-  
rinata, planiuscula, cinerea. Schale hat einen stumpfen Rü-  
cken, und bestehet aus acht  
Klappen.

*Insidens ostreae eduli L.*

Sie sitzt auf einer gemeinen Muschel.

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 11.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. Lepas.

B. Die Meereichel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 301.*

Valvae plures inaequa- Die festsetzende Schale  
les, per paria opposita bestehet aus mehrern un-  
affixae, gleichen, einander paar-  
weise entgegen gesetzten  
Klappen.

B. 1. Lepes Balanus.

B. 1. Die große Meer-  
eichel.

*Linn. S. N. Sp. 10.*

*Belg. Zee puisten. Gall. Gland de Mer Tulipe. Dav. Angl. The com-  
mon english Barnacle. Ellis.*

Testa conica truncata, val- Die kegelförmige oben abge-  
uis longitudinaliter sulcatis; stuzte Schale hat nach der Längs-  
areis interjectis transverse stria- ge gefurchte Klappen, und in  
tis. die Quere gestreifte Zwischen-  
flächen.

Oper

DSI



Operculum valvulis quatuor,  
binis conniventibus, unguicula-  
tis, altioribus; binis transuerse  
fulcatis, minoribus.

Der Deckel besteht aus vier klei-  
nen Klappen, deren zwei, die un-  
ter einem Winkel zusammenstoßen,  
klauenförmig und höher; zwei aber  
in die Quere gefurchet, und klei-  
ner sind.

Inſidet Murici deſpecto.

Sie ſißt auf einer nordiſchen  
Spindel feſt.

*Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 286.*

*Ellis. Tranſact. angl. 1758. t. 34. f. 17.*

*Baſter. Subs. t. 12. f. 7 — 10.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. 2. *Lepas balanoides.* B. 2. Die Seepocke.

*Linn. S. N. Sp. II.*

*Belg. Zee pocke. Gall. Glands de mer rayés. Dav. Angl. The nar-  
row mouth'd grey Balanus Hill.*

Testa conica truncata, va- Die kegelförmige abgeſtuzte  
luis glabris, operculis obtusis. Schale hat glatte Klappen,  
und ſtumpfe Deckeln.

*Liſt. angl. t. 5. f. 41.*

— *Hiſt. Conch. l. 3. f. 287.*

*Klein. Meth. Oſtrac. t. 12. f. 94. 95.*

*Argenv. Conch. Pl. 26. f. D.*

*Hill. Hiſt. of. Anim. II. Pl.*

*Da Coſt. Elem. Pl. I. f. 12.*

4



B. 3. *Lepas Tintinabulum*.

B. 3. Die Meertulpe.

*Linn. S. N. Sp. 12.*

*Belg.* Tulpen; *Rumph. Angl.* The great wide mouth'd Balanus.  
*Hill. Gall.* Gland de mer *Turban. Dav.*

Testa conica, gibba, areis  
transuersa striatis.

Die kegelförmige ungleiche  
Schale hat in die Quere ge-  
streifte Zwischenflächen.

α coloris rosei.

α rosenfarbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β ex rosea violacea.

β rosenfarbig und violet.

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 285.*

*Rumph. amb. t. 41. f. A.*

*Gualt. Test. t. 106. f. H.*

*Ellis. Trans. angl. 1758. 34. Pl. 8. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 26. f. A.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 11.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 6. f.*

— — *V. 30. t. 1. f.*

B. 4. *Lepas Diadema*.

B. 4. Die Wallfischpoche.

*Linn. S. N. Sp. 13.*

*Belg.* Zeefcheiling. *Rumph. Angl.* The wrinkled Star-Cake. *Petiv.*  
*Gall.* Pou de Baleine. *Dav.*

Testa





Testa subcylindrica, valvis Die etwas walzenförmige  
longitudinaliter sulcatis, costis Schale hat nach der Länge ge-  
decussatim, arcis transverse furchte Klappen, mit kreuz-  
striatis, weise durchschnittenen Ribben,  
und in die Quere gestreiften  
Zwischenflächen.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 288.

Petiv. amb. t. 1. f. 11.

Rumph. amb. Rarit. K. t. 14. f. H.

Gualt. Test. t. 160. f. Q.

Mus. Caes. Vindobon.

B. 5. Lepas testudina-  
ria.

B. 5. Die Schildkrö-  
tenpocke.

Linn. S. N. Sp. 14.

Belg. Schildpa de Luis. Rumph. Angl. The tortoise - wart Barnacle.  
Ellis. Ital. Ballano, Gin.

Testa suborbiculari plano- Die scheibenrunde, unten fla-  
convexa laevi, intus lamellis che, oben erhabene und platte  
ferrulatis; arcis excavatis, Schale hat inwendig gezähnel-  
transverse sulcatis, te Blättchen, und ausgehöhl-  
te nach der Quere gefurchte  
Zwischenflächen.

Operculum valvis sex, binis ho- Der Deckel bestehet aus sechs  
rizontalibus, quatuor erectis, ob- kleinen Klappen, davon zwei wag-  
tus, conniuentibus, rima supera recht, vier stumpfe aber, aufge-  
longitudinali. richtet gegen ein inder geneigt stehen,  
und in die Höhe eine nach der Län-  
ge laufende Spalte bilden.



*Bonan. Mus. Kirch. cl. I. f. 36.*

*Petiv. Gaz. t. 9. f. 9.*

*Rumph. amb. 40. t. K.*

*Planc. Conch. t. 5. f. 2. 3.*

*Gualt. Test. t. 106. f. M. N. O.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 12. f. 99.*

*Ellis. Trans. angl. 1758. t. 34. f. 12. 13.*

*Ginan. adr. II. t. 30. f. 175.*

*Knor. Vergn. III. 30. t. 3. 4. f.*

B. 6. *Lepas anatifera*,

B. 6. Die Aentenbrut.

*Linn. S. N. Sp. 18.*

*Holl. Ende Schulpe. Angl. The goose Schell. Hill. Gall. Conque anatifere Dav. Ital. Conca anatifera, Gin.*

Testa compressa quinqueval-  
ui laeui, affixa intestino mem-  
branaceo.

Die zusammengedrückte  
Schale bestehet aus fünf glat-  
ten Klappen, und sihet Mittels  
einer darmförmigen Haut fest.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 544.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 2.*

*Mus. Wormian. p. 256.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 282.*

*Planc. Conch. t. 5. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 106. f. A. D.*

*Seb. Thes. III. t. 16. n. I. a, b.*



*Hill. Hist. of. Anim. Pl. II.*

*Ginan. adr. II. t. 30. f. 182.*

*Knor. Vergn. II. 30. | t. 4. 5. f.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 10. t. 8. f.*

*Da Cost. Elem. I. Pl. f. II.*

## C. Pholas.

## C. Die Steindattel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 302.*

Testa bivalvis, lata, utrinque diuarcata, accessoriis prope cardinem; cardinis margo replicatus, ligamento nexus intermedio.

Die Schale ist zweiflügelig, breit, an beiden Enden klappend, mit einigen Nebenschalen am Schlosse. Das Schloß hat einen auswärts übergeschlagenen Saum, und ein dazwischen liegendes Band.

### C. I. Pholas Dactylus.

### C. I. Der Steinbohrer.

*Linn. S. N. Sp. 20.*

*Belg. Steen - Scheede. Angl. The oblong withe Pidak Hill. Gall. Dail. Ital. Ballano. Ginan.*

Testa lata, ventricosa, plicis transuersis, striisque lon-

Die bäuchige Schale ist nach ihrer gestreckten Breite gefal-



gitudinalibus decussata, post- ten, der Höhe nach kreuzweise ge-  
ce reticulata. streifet, hinterwärts netzförmig.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 455. f. 3.*

*Rond. Test. t. 23. f. 2.*

*Bonon. Recr. cl. 2. f. 25. 26. 27.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 276.*

*Petiv. Gaz. t. 79. f. 10, 11.*

*Gualt. Test. t. 105. f. A. B. C. D.*

*Seb. Tbes. III. t. 16. f. 6.*

*Hill. Hist. of. Anim. II. Pl.*

*Ginan. adr. II. t. 31. f. 184.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 3.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

C. 2. *Pholas costatus.*

C. 2. Der geribbte  
Steinbohrer.

*Linn. S. N. Sp. 21.*

Belg. Ecviger Gapper. Angl. The deeply furrowed *Pholas*. Hill.  
Gall. La grande Pholade de l'Amerique. Favart.

Testa lata ventricosa trans-  
verse striata, costis longitudi-  
nalibus, extimis acutis remo-  
tioribus.

Die Schale ist in die Brei-  
te gestreckt, bäuchig, in die  
Quere gestreifet, mit nach der  
Länge laufenden Ribben, deren  
äusserste scharf sind, und etwas  
von einander entfernt stehen.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 3. f. 277.*

*Gualt. Test. t. 105. f. G.*

*Knor. Vergn. II. 25. t. 4. f.*



*C. Schütz.*



# Ordo secundus. Zweyte Ordnung.

Bivaluia.

Zwenklappige.

D. Mya.

D. Die Klammschel.

*Linn. S. N. Gen. 303.*

Testa bivalvis, altera extremitate hians; cardinis dente primario crasso.

Die zwenklappige Schale klast an einem Ende; der Hauptzahn des Schloßes ist dick.

D. 1. Mya Glycimeris.

D. 1. Die bäuchige Klammschel.

Testa umbonata, extremitatibus oblique truncatis, dense antice crassissimo, longitudine ngamenti,

Die bäuchige Schale hat schiefe stumpfe Seitenende, und einen sehr dicken Vorderzahn nach der Länge des Bandes.

*Aldrov. Test. l. 9. p. 473. 474.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 258.*

*Gualt. Test. t. 9. f. A.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subovata umbonata laevis, pone apices utrinque coarctata, und glatte Schale ist an den Spitzen beiderseits ausgehölet. Die extremitates oblique truncatae Seitenende sind schief und stumpf. rudine ligamenti, crassissimus, Der Vorderzahn ist sehr dick, fast posticus minor, subjacens apicibus von der Länge des Bandes: der

in-





incurvatis, retro quos series crenularum extenditur. Color pallido griseus.

Hinterzahn ist kleiner, liegt unter den einwärts gekrümmten Spitzen, hinter welchen eine Reihe kleiner Kerbe ausläuft; ihre Farbe ist lichtgrau.

D. 2. *Mya pictorum*.

D. 2. Die Mahlermuschel.

*Linn. S. N. Sp.* 28.

*Gall. Moule des peintres. Angl. The Pearl River Muscle. Da Cost. Ital. Concha de Pittori. Ginan.*

Testa lata, convexa, cardinis dente primario crenulato, laterali elongato, quous in altera testa duplicato.

Die Schale ist breit, eysförmig, und bänchig, der Hauptzahn ist gekerbet, der Nebenzahn verlängert, und an einer Klappe doppelt.

*Bonanz. Recr. cl. 2. f. 40. 41.*

*List. angl. t. 2. f. 30.*

— *Hist. Conch. l. 2. f. 145. 147.*

*Swammerd. Bibl. nat. t. 10. f. 6, 7.*

*Gualt. Test. t. 7. f. E.*

*Berlin. Magaz. IV. 12. t. 66. 67. f.*

*Ginan. adriat. II. t. 4. f. 17.*

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 12. f.*

D. 3. *Mya margaritifera*,

D. 3. Die Flußperlmuschel.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 29.*

*Gall. Telline fluviatile. Dav.*

Testa lata, ovata, planiuscula, infra coarctata, dente nig, etwas platt gedrückt, primario crasso, lateralibus am Unterrande eingebogen; der Hauptzahn dick und die Neben Zähne verlängert.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 149.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 10. f. 47.*

*Berlin. Magaz. IV. 12. r. 65. f.*

*Knor. Vergn. IV. 25. t. 2. f.*

D. 4. Mya Vulsella.

D. 4. Der Bartkneifer.

*Linn. S. N. Sp. 31.*

*Be'g. Baardnyper. Rumph.*

Testa elongata linguiformi, Die Schale ist der Höhe cardine terminali concavo nach zungenförmig verlängert; undato. das Schloß bildet am Unterende eine rundliche Höhlung.

*Rumph. amb. n. 46. t. A.*

*Gualt. Test. t. 90. f. H.*

*Mus. Tessin. t. 6. f. 3.*

*Knor. Verg. V. 2. t. 1. — 3. f.*



Habitu a congeneribus diversissima, utrisque linnaeae prior.

Dem Ansehen nach unterscheidet sich diese von allen ihren Nebenarten, sie gehöret auch mit mehr Recht unter das Geschlecht der Auster des Linne.

## E. Solen.

## E. Die Messerscheide.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 104.*

Testa bivalvis, aequalis, latissima, utrinque hians. Cardinis dens unus reflexus aut duplex, non insertus testae oppositae.

Die Schale bestehet aus zweien gleichen Klappen, welche in die Breite sehr verlängert sind, und an beiden Enden klaffen. Der Zahn des Schloßes ist zurückgebogen, oft doppelt, und heisset nicht in die entgegen gesetzte Klappe ein.

## E. 1. Solen. Vaginā.

## E. 1. Die Rinne.

*Linn. S. N. Sp. 33.*

Belg. Orgelpypen. *Rumph. Angl.* The thick Razor - Shell. *Hill. Gall.* Manche de Couteau. *Day. Ital.* Languetti.

Testa



Testa lineari, recta; cardine prope extremitatem alteram truncatam unidentato.

Die Schale ist gleichbreit und gerad, nahe am abgerundesten Ende mit einem einzelfachen Zahne versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 256.*

*Rumph. Amb. 45. f. M.*

*Gualt. Test. t. 95. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. K.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 11. f. 65.*

*Knor. Vergn. I. 28. t. 3. f.*

*Cinan. adriat. II. t. 27. f. 170.*

*Da Cost. Elem. Pl. 7. f. 8.*

E. 2. Solen Siliqua.

E. 2. Das Messerheft.

*Linn. S. N. Sp. 34.*

*Belg. Messerhecht. Angl. The little Strait Razor. Hill. Gall. Manche decouteau lemelle. Venet. Cappa lunga. Bonon. Pefche cancella.*

Testa lineari recta, extremitatibus rotundatis, cardine pone alteram bidentato.

Die Schale ist gleich breit, und gerad, die Ende sind rundlicht, an einem davon ist das Schloß mit zweien Zähnen versehen.



*Bell. aq. t. 414. f. 2.*

*List. angl. t. 5. f. 37.*

— *Hist. Conch. l. 2. 255. f.*

*Bonan. Regr. cl. 2. f. 57.*

*Planc. Conch. t. 3. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 95. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Müll. Linn. N. S. VI. I. B 11. t. 1. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

E. 3. Solen Ensis.

E. 3. Die Erbsenschotte.

*Linn. S. N. Sp. 35.*

*Belg.* Beu Idoublet. *Angl.* The blucifch crooked Razor. *Hill. Gall.* Manche de couteau courbée. *Day.*

Testa lineari subarcuata, Die Schale ist gleichbreit,  
extremitate utraque rotunda- etwas gekrümmt, an beiden  
ta, cardine pone alteram bi- Enden rundlich, an deren ei-  
dentato. nem das Schloß mit zweien  
Zähnen versehen ist.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 257. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. L.*

*Hill. Hist. of. Anim. 10. Pl.*

*Knor. Vergn. VI. 7, t. 1. f.*

E. 4.



E. 4. *Solen radiatus*.

E. 4. Die blaue Strahlscheide.

*Linn. S. N. Sp.* 38.

*Belg.* De violetblauwe. Zonnestraal. *Rumph. Gall.* Le soleil le vant.  
*Dav. Angl.* The violet-purple papyraceus *Solen.* *Hill.*

Testa lineari recta, subdiaphana, laevi, costa cardinis obliqua, depressa.

Die Schale ist gleich breit, gerad, halb durchsichtig und glatt. Die Rippe inner dem Winkel lauft schief, und ist platt gedrückt.

*Violacea radiis quatuor albis.*

Violettfarbig mit vier weissen Strahlen.

*List. Hist. Conch.* 1. 3. f. 266.

*Rumph. amb.* 45. t. E.

*Petiv. amb.* t. 21. f. 16.

*Gualt. Test.* t. 91. f. E.

*Argenv. Conch. Pl.* 22. f. P.

*Knor. Delic.* I. t. B. III. f. 9.

— *Vergn.* I. 6. t. 5. f.

E. 5. *Solen strigilatus*.

E. 5. Die rosenrothe Strahlscheide.

*Linn. S. N. Sp.* 39.

*Belg.* Roose - roodt Zonnestraal. *Angl.* The thick red *Solen.* *Hill.*  
*Gall.* Lanterne rouge rayonnée de blanc.





Testa lineari recta, crassa, Die Schale ist gleichbreit,  
 conuexa, lineis oblique in- gerad und dick, die Klappen  
 sculptis, costa cardinis nulla. gewölbt, mit schiefen ausge-  
 schnittenen Linien, ohne Aus-  
 gestrippe.

Rosea, radiis duobus albis.

Rosensarbig mit zween weißen  
 Strahlen.

*Bonan. Recr. el. 2. f. 77.*

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 260.*

*Gualt. Test. t. 91. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 19. f. 2.*

*Knor. Vergn. VI. 5. t. 4. f.*

## F. Tellina.

## F. Die Tellmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 305.*

Testa bivaluis antice Die zweyflappige Schale  
 hinc inflexa; dentes late- le ist am Vorderrande um-  
 rales alterius testae plani. gebogen. Die Seitenzäh-  
 ne sind an einer Klappe  
 platt.

F. I. Ouatae crassiusculae.

F. I. Mit eysförmigen dicken  
 Schalen.

F. I. 1. Tellina lingua felis. F. I. 1. Die Katzenzunge.

*Linn. S. N. Sp. 45.*



Belg. Katetonge Rumph. Gall. Le Chagrin Dav.

Testa lata subouata, scabra Die Schale ist breit, eyrund,  
squamis fornicatis quincuncia- und mit hohlen ins Gevierte  
libus. stehenden Schüppchen besetzt.

Rumph. amb. t. 45. f. G.

Gualt. Test. t. 76. f. B.

Klein Meth. Ostr. t. 11. f. 62.

Knor. Vergn. II. 2. t. 1. f.

F. I. 2. Tellina rugosa. F. I. 2. Die runzelsichte  
Tellmuschel.

Testa subouata lata, ru- Die etwas eyförmige breite  
gis membranaceis transuersis, Schale hat häutige nach der  
rima hiantes. Quere laufende Runzeln, und  
eine klaffende Spalte.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa lata, subouata, scabra, Die Schale ist breit, etwas eyförmig, und durch querlaufende erhabene  
membranis eleuatis rugosis trans- dünne Runzeln raub. Die Spalte klaf-  
uersis. Rima hians. Labra promi- fet. Die Lippen ragen hervor. Die  
nula. Apices acuti contingui, an- Spitzen sind dünn, vorwärts gekrüm-  
trorsum recurui. Ligamentum in- met, und berühren einander. Die Lip-  
uestiens labra, alterumque retro pen werden von dem Bande bedec-  
apices tenuius. Color totius testae ket, ein anderes dünneres Band  
albus. läßt sich hinter den Spitzen wahr-  
nehmen. Die Farbe der ganzen  
Schale ist weiß.

F. I. 3. Tellina virgata. F. I. 3. Der gestreifte  
Sonnenstrahl.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 46.*

*Belg. Zonnentraal. Rumph. Angl. Rayed Tellin. Petiv. Gall. Telline radiée Dav.*

Testa lata subouata, antice angulata, lineis eleuatis transuerlis, radiis rubentibus. Die breite etwas eysförmige, und vorne eckige Schale hat erhabene Querlinien, und rothe Strahlen.

*Rumph. amb. t. 45. f. H.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 19.*

*Argenv. Conch. Pl. 25. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 21. t. 4. f.*

—— ——— *IV. 25. t. 1. f.*

F. I. 4. Tellina angulata.

F. I. 4. Die eckige Tellinmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 47. ?*

Testa lata subouata, striis transversis recuruatis, antice oblique angulata, labris prominulis, dentibus lateralibus nullis. Die breite etwas eynlange, vorne schief eckige Schale hat erhabene zurückgekrümmte Querstreife, hervorragende Rippen, und keine Seitenzähne.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 241.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



F. I. 5. Tellina Gari.

F. I. 5. Die Bacassan-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp.* 48.

*Belg.* Bacassandoulet *Rumph.* Gall. Telline bariolée de violet , &  
de blanc. *Argenv.*

Testa lata subaequilatera, Die breite beinahe gleichseis-  
striis transuersis deflexis, la- tige Schale hat zurückgeboge-  
bris prominentibus, dentibus ne Quersstreife , und keine Sei-  
lateralibus nullis. tenzähne.

Violacea , radiis pallidis.

Violettblau mit bläßen Strah-  
len.

*List. Hist. Conch.* l. 3. f. 261.

*Rumph. amb. t.* 45. f. D.

*Argenv. Conch.* Pl. 22. f. F.

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. I. 6. Tellina ano-  
mala.

F. I. 6. Die unächte  
Tellmuschel.

Testa subouata lata, ven- Die etwas ensförmige breite  
triosa, longitudinaliter rugo- bäuchige Schale ist der Länge  
sa , striis transuersis utrinque nach runzelicht , und durch  
scabra, limbo antico intus Quersstreife an den Seitenenden  
violaceo, rauh , inwendig am Vorder-  
rande violet.

Die etwas ensförmige breite  
bäuchige Schale ist der Länge  
nach runzelicht , und durch  
Quersstreife an den Seitenenden  
rauh , inwendig am Vorder-  
rande violet.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 3. f. 273.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.*

— — — VI. II. 1. 2. f.

Testa subovata lata ventricosa, antice utrinque obsolete carinata. Sulci longitudinales undulati, liriis transversis prope extremitates exasperati. Apices umbonati incurvati. Ligamentum crassius ante apices, & retro hos tenuius alterum. Dentes primarii duo, alter bifidus, laterales nulli. Limbus internus praesertim anticus violaceus.

Die Schale ist etwas eysförmig, breit und bündig, an beiden Seiten vorne mit einer stumpfen Ecke versehen. Nach der Länge herab laufen runzelichte Furchen, welche von Querstreifen durchkreuzet den Seiteneenden ein rauhes Ansehen geben. Die Spitzen sind aufgeblasset und einwärts gekrümmet. Vor den Spitzen ist das gewöhnliche dicke Rand, und hinter denselben noch ein anderes dünneres. Das Schloß hat zween Hauptzähne, deren einer zweispaltig ist. Die Seitenzähne fehlen. Der innere Rand ist besonders vorne violet.

α pallide lutescens intus lutea.

α blaßgelb, inwendig gelb.

β alba apicibus violaceis, intus tota violacea.

β weiß, mit violeten Spitzen und gleichfärbiger Höhlung.

γ violacea, alboradiata intus violacea, albaque.

γ Violet mit weißen Strahlen, mit blau und weiß gefleckter innerer Höhlung.

δ alba, cavitate & apibus miniatis.

δ weiß mit meningfarbiger Höhlung und Spitzen.

F. II. Ovatae compressae.

F. II. Mit eyrunden platgedrückten Schalen.

F. II. 1. Tellina albida.

F. II. 1. Die blaßrothe Tellmuschel.

Linn. S. N. Sp. 50.?



Testa lata ovali laevi, sub- Die breite ensförmige Schas-  
tus transverse inaequaliter sul- le ist glatt, unten mit unglei-  
cata, labiis prominentibus, den- chen Quersfurchen, die Lippen  
tibus lateralibus obsoletis. ragen hervor, die Seitenzäh-  
ne sind undeutlich.

Knor. Vergn. IV. 3. t. 4. f.

— — V. 9. t. 3. f.

F. II. 2. Tellina punicea.

F. II. 2. Die dunkelro-  
the Tellmuschel.

Testa lata ovali, sub aequi-  
latera, glabra, striis trans-  
uersis approximatis.

Die breite ensförmige glän-  
zende Schale ist beinahe gleich-  
seitig, und mit gedrängt an-  
einander stehenden Querstreifen  
überzogen.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovalis lata complanata, la-  
teribus utrinque subaequalibus. Api-  
ces tenues breues. Labia testata.  
Dentes primarii, & laterales se-  
cundum characterem generis. Co-  
lor pallide incarnatus, prope api-  
ces & in superficie interna puni-  
ceus.

Die Schale ist breit, lensförmig,  
und platgedrückt, an den Seiten  
beinahe gleichlang. Die Spitzen  
sind kurz und fein. Die Lippen  
bedeckt. Die Hauptzähne haben wie  
die Seitenzähne das gemeine Merk-  
mal dieses Geschlechtes. Die Far-  
be ist an der Oberfläche fleischroth,  
an den Spitzen und inwendig dun-  
kelroth.

F. II. 3. Tellina pla-  
nata.

F. II. 3. Die scharf-  
randige Tellmuschel.

Linn. S. N. Sp. 52.

Testa





Testa lata, ouata, compressa, transuersim substriata, marginibus acutis. Die breite eysförmige Schale ist platt gedrückt, der Quere nach sehr fein gestreift, an den Rändern scharf.

*Gualt. Test. t. 89. f. G.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. II. 4. Tellina radiata. F. II. 4. Der glatte Sonnenstrahl.

*Linn. S. N. Sp. 54.*

*Belg* Een roode witsraalige Tellmossel. *Angl.* The tulip tellina. *Da Cost. Gall.* Telline rayée de couleur de chair. *Favart. Roman.* Capparozole. *Venet.* Capparole.

Testa lata substriata glabra, labris hiantibus, arcuola lanceolata. Die breite Schale ist feinstreift und glänzend, mit hervorstehenden Lippen und einer lanzettförmigen Hinterfläche.

Cavitas citrina. Apices rosei. Fasciae saepe radiantes roscae. Die Farbe der inneren Fläche ist schwefelgelb, die Spitzen und öfters auch die Strahlen sind rosenroth.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 240.*

*Gualt. Test. t. 89. f. J.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 28. f. 8. t. 22. f.*

*Knor. Vergn. II. 19. t. 1. f.*

— — — IV. 2. t. 24. f.

— — — Del. nat. I. t. B. III. f. 3.

*Da Cost. Elem. Pl. 6. Fig. 11.*

B 4

F. II. 5.

24



F. II. 5. *Tellina ro-*  
*strata.*

F. II. 5. Das Schind-  
chen.

*Linn. S. N. Sp. 55.*

*Belg* Banket Hammetjes. *Angl.* Wedge Muscle. *Petiv.* Gall. Pince  
de Chirurgien *Dav.*

*Testa* ovata antice angulato  
rostrata, transuersim subtilis-  
sime striata.

Die eiförmige Schale hat  
vorne einen verlängerten eckig-  
gen Schnabel, und ist der  
Quere nach sehr fein gestreift.

α Flauz, rostro breuiore.

α gelb, mit kürzerem Schnabel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β incarnata, rostro longiore.

β fleischfarbig, mit längerem Schna-  
bel.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 225.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 20.*

*Gualt. Test. t. 38. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. O.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 5. f.*

F. II. 6. *Tellina inae-*  
*quialuis.*

F. II. 6. Die Bastard-  
telline.

*Linn. S. N. Sp. 56.*

*Belg.* Platzydige Telline.

*Testa*



Testa lata ouata rostrata, Die breite eynlange schnabel-  
 valua altera plana, dentibus förmige Schale hat eine ganz  
 lateralibus nullis. flache Klappe, und keine Sei-  
 tenzähne.

*Spengl. berlin. Beschaeft. III. 7. t. 25 — 28. f.*

F. II. 7. Tellina incar-  
 nata.

F. II. 7. Der kleine  
 Sonnenstrahl.

*Linn. S. N. Sp. 58.*

*Belg. Rood Juffertje.*

Testa lata ouata rostrata Die Schale ist breit eynlang  
 complanata, apicibus acutis, und schnabelförmig, mit fei-  
 pallido radiata. nen Spitzen und weißen Strah-  
 len.

*List. angl. app. t. I. f. 8.*

*Gualt. Test. r. 88. f. M.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. III. Suborbiculatae.

F. III. Mit rundlichen Schalen.

F. III. 1. Tellina Re-  
 mies.

F. III. 1. Die Sand-  
 telline.

*Linn. S. N. Sp. 62.*

*Belg. Remies. Rumph.*



Testa subrotunda , crassa, Die rundliche dicke Schale  
transuersim tenuissime striata, ist nach der Quere sehr fein  
rima patula. gestreift , und mit einer klaf-  
fenden Spalte versehen.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 102.*

*Rumph. amb. t. 43. f. J.*

*Mus Caes. Vindobon.*

F. III. 2. Tellina sco-  
binata.

F. III. 2. Die schuppige  
Tellinuschel.

*Linn. S. N. Sp. 64.*

*Gall. La guillochée. Dav.*

Testa orbiculari , scabra, Die scheibenrunde Schale  
squamis lunatis in quincun- ist wegen der mondfärbigen ins  
eem digestis. Gevierte stehenden Schüppchen  
rauh anzufühlen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 143.*

*Gualt. Test. t. 76. f. E.*

*Knor. Vergn. VI. 37. t. 3. f.*

F. III. 3. Tellina car-  
naria.

F. III. 3. Die Fleisch-  
linse.

*Linn. S. N. Sp. 66.*



Testa orbiculata, striis obliquis, deorsum reflexis, undulatis.

Die scheibenförmige Schale hat eingeschnittene schiefe und rückwärts herabgebogene wellenförmige Streifen.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 176.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. III. 4. Tellina balrhica.

F. III. 4. Die dreneckige Tellmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 68.*

Testa triangulo rotundata, laevi, transuersim subtilissime striata, incarnata.

Die Schale ist dreneckig, rundlicht, glänzend, in die Quere sehr fein gestreift, von fleischrother Farbe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. Cardium.

G. Die Herzmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 306.*

Testa bivaluis, aequaluis, dentibus cardinis mediis binis, alternatis; lateralibus remotis insertis.

Die Schale bestehet aus zween gleichen Klappen; an dem Schlosse stehen zween wechselweise Mittelzähne, mit entfernten einbeißenden Seitenzähnen.

G. I.



G. 1. *Cardium costatum*. G. 1. Die geribbte Herzmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 73.*

*Belg.* Geribte Venus doublet. *Rumph.* *Angl.* The exotick Heart Cockle. *Hill.* *Gall.* Conque exotique. *Dav.*

Testa lata ventricosa, costis longitudinalibus, carinatis, concavis. Die breite und bäuchige Schale ist nach der Länge herab mit kielförmigen hohlen Rippen besetzt.

*Column.* purp. t. 27.

*List.* Hist. Conch. l. 3. f. 164.

*Rumph.* amb. 48. t. 6. f.

*Gualt.* Test. t. 72. f. D.

*Argenv.* Conch. Pl. 23. f. A.

*Adans.* Seneg. Pl. 18. f. 2.

*Hill.* Hist. of. Anim. Pl. 10.

*Knor.* Vergn. I. 28. t. 2. f.

G. 2. *Cardium Caridissa*. G. 2. Das Menschenherz.

*Linn. S. N. Sp. 74.*

*Belg.* Venus hart. *Angl.* human Heart-Cockle. *Hill.* *Gall.* Cocur de Venus. *Dav.*

Testa cordata, valvis compressis carinatis, apicibus inflexis contiguis. Die herzförmige Schale hat flachgedrückte kielförmige Klappen, mit eingerollten nahe aneinander stehenden Spitzen.

α Ca-





α Carina valvularum integra.

α mit ganzem Riele.

β Carina valvularum crenata.

β mit gekerbtem Riele.

*Bonan. Recr. el. 2. f. 49.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 155. 156.*

*Rumph. amb. t. 42. f. E. ^*

*Gualt. Test. t. 84. f. B. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. 7.*

*Klein. Meth. Ostr. 1. 10. f. 39.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.*

— — — VI. 11. t. 1. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 3. Cardium retu-  
fum.

G. 3. Das Nabelherz.

*Linn. S. N. Sp. 75.*

Testa cordata oblique cari-  
nata, sinu politico lunari in-  
truso.

Die herzförmige und schief  
gekielte Schale hat hinter den  
Spizen eine tief eingedrückte  
mondförmige Höhlung.

Valva solitaria.

Eine einzelne Klappe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 4. Cardium imbri-  
catum.

G. 4. Das schuppige  
Herz.

Testa



Testa cordato trilatera, inter sulcos longitudinales tenues transverse & dense squamulosa.

Die herzförmige dreiseitige Schale ist nach der Länge mit feinen Furchen, und dazwischen in die Quere mit dicht aneinander liegenden Schüppchen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 152.*

*Gualt. Test. t. 83. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa cordata trilateralis. Valvae utrinque angulatae longitudinaliter sulcatae, sulcis tenuibus, inter quos squamulae, undique arcuatae, & dense imbricatae locantur. Marg. crenatus, anticus serratus. Color testae niueus, squamularum citrinus.

Die Schale ist herzförmig und dreiseitig. Die Klappen sind an beiden Seiten eckig erhoben, nach der Länge herab laufen linienförmige Furchen, zwischen welchen sich allenthalben bogenförmig gedrängt aneinanderstehende Schüppchen befinden. Der Rand ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die Schale ist von schneeweiß, die Schüppchen von zitronengelber Farbe.

G. 5. Cardium Hemiacardium.

G. 5. Das dreiseitige Herz.

*Linn. S. N. Sp. 76.*

Holl. Driezydig Venus hart. Gall. Coeur triangulaire Dard. Engl. Strawberry Heart Cockle. Petiv.

Testa cordata subtrilatera, valvis angulatis, sulcis tenuibus excavato punctatis, utrinque transverse tuberculatis.

Die Klappen der herzförmigen beinahe dreiseitigen Schale sind eckig, mit tief punktierten dünnen Furchen, und in die Quere stehenden Körnern besetzt.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. H.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 83. f. C.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 2. f.*

G. 6. Cardium me-  
dium.

G. 6. Das Mittelherz.

*Linn. S. N. Sp. 77.*

Testa subcordata, valvis,  
longitudinaliter sulcatis, an-  
gulatis, laevibus.

Die Klappen der einiger-  
maßen herzförmigen Schale  
sind nach der Länge gefurchet,  
eckig und glatt.

*Knor. Vergn. V. 20. t. 5. f.*

G. 7. Cardium aculea-  
tum.

G. 7. Das Nagelherz.

*Linn. S. N. Sp. 78.*

*Belg. gedornte Nageldoublet. Angl. Coeur de boeuf. epineux Dav.*  
*Angl. The Oxheart Cockle. Hill.*

Testa subcordata costis spi-  
noso ciliatis.

Die einigermaßen herzför-  
mige Schale ist mit spizen  
Dörnern besetzt.

« Spinis fornicatis compressis.

« Mit hohlen zusammengebrückten  
Dörnern.

ß Spinis fornicatis crassis inflexis.

ß Mit hohlen dicken umgebogenen,  
oder nagelförmigen Dörnern.

*Aldrov.*



*Aldrov. Test. l. 3. p. 452.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 96. 97.*

*Gualt. Test. t. 72. f. A.*

*Argenv. Concb. Pl. 23. f. B.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 1. f.*

G. 8. *Cardium tuber-  
culatum.*

G. 8. Das knotige  
Herz.

*Linn. S. N. Sp. 81.*

*Angl. Grain Cockle Petiv.*

Testa subcordata fulcata,  
costis obtusis transverse stria-  
tis, extus nodosis.

Die etwas herzförmige ge-  
furchte Schale hat stumpfe, in  
die Quere gestreifte, und au-  
ßen knotige Rippen.

*Rumph. amb. t. 48. f. 11.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 7.*

*Knor. Vergn. V. 30. t. 2. f.*

G. 9. [*Cardium Ico-  
fardia.*

G. 9. Das Ziegelherz.

*Linn. S. N. Sp. 82.*

*Belg. Nagelschulp. Rumph. Gall. Cœur. de boeuf tuilé. Argenv.  
Ang. The rough Oxheartshell. Hill.*

Testa



Testa subcordata sulcata, Die einigermaßen herzför-  
 squamis fornicatis erectis. mige Schale ist gefurchet, und  
 mit aufgerichteten hohlen  
 Schuppen besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 95.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 160.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 152. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. 10. Pl.*

*Regensf. Samml. I. 5. t. 56. f.*

G. 10. Cardium Une- G. 10 Die rothe Erde-  
 do. beere.

*Linn. S. N. Sp. 84.*

*Belg. Aardbesie. Rumph. Angl. The red Straw - Berry. Gall. La  
 Fraise rouge. Argenv.*

Testa subcordata trilatera Die etwas herzförmige und  
 obtuse angulata, multifulca- dresseitige Schale hat an ih-  
 ta, lunulis transuersis color- ren Klappen stumpfe Ecken,  
 tis sparlis. viele Furchen, und zerstreute  
 gefärbte Querschüppchen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 375.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 151.*



*Rumph. amb. t. 44. f. F.*

*Gualt. Test. t. 83. f. A. B.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 25. f.*

*Knor. Vergn. IV. 14. t. 3. f.*

— — VI. 3. t. 4. f.

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 8. f.*

G. 11. *Cardium magnum.*

G. 11. Die große Herzmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 85. ?*

Testa subcordata ventricosa sulcata, costis angulatis posticis transuersis, striatis.

Die etwas herzförmige, bäuchige und gefurchte Schale hat eckige Rippen, deren hintere mit nach der Quere laufenden Streifen besetzt sind.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 158.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 12. *Cardium leucostomum.*

G. 12. Das gelbmündige Herz.

Testa subovata sulcata, costis anticis muricatis, posticis transuersim crenatis, areola lanceolata,

Die etwas eysförmige gefurchte Schale ist an den Vorderribben rauh, an den Hinterribben nach der Quere gekerbt, ihre Hinterfläche ist eysförmig.

*List.*





*List. Hist. Conch. l. 3. f. 168.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subouata crassa, sulcis 33. longitudinalibus. Costae compressae angulatae, posticae muricatae, anticae squamulis dense imbricatae; sulci intermedii transversum striati. Margo crenatus, antice serratus. Areola plana lanceolata, qua ab adfinibus differt. Limbus aurantii coloris.

Die Schale ist dick, einigermassen herzförmig, mit 33 nach der Länge laufenden Furchen besetzt. Die Rippen sind etwas flach gedrückt und eckig; die hinten stehenden sind rauh, die vordern mit ziegelförmigen Schüppchen dicht besetzt. Die Zwischenfurchen sind in die Quere gestreift. Der Rand ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die Hinterfläche ist platt und lanzettförmig, wodurch sie sich besonders unterscheidet. Der innere Rand ist pomeranzenfarbig.

G. 13. *Cardium flauum.*

G. 13. Das gelbe Herz.

*Linn. S. N. Sp. 87.*

Testa subouata, longitudinaliter obsolete sulcata, marginem crenato.

Die fast herzförmige Schale ist nach der Länge schwach gefurchet, und am Rande gekerbt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 14. *Cardium laevigatum.*

G. 14. Das glatte Herz.

*Linn. S. N. Sp. 88.*



Testa subouata glabra, Die etwas eysförmige Scha-  
striis longitudinalibus, obso- le ist glatt, und mit matten  
letis. Streifen nach der Länge besetzt.

*Gualt. Test. t. 82. f. 4.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 4. f.*

— — — *V. 10. t. 7. f.*

G. 15. Cardium aeoli-  
cum.

G. 15. Die Ost- und  
Westmuschel.

*Belg. Oost en West-Doulet.*

Testa subouata sulcis tenui- Die etwas eysförmige Scha-  
bus longitudinalibus, plicis- le ist mit dünnen Furchen nach  
que transuersis obtusis postice. der Länge, und rückwärts mit  
stumpfen Quersalten besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 91.*

*Knor. Vergn. V. 26. t. 2. f. 27. t. 3. f.*

Testa subouata umbonata glabra, Die Schale ist einigermaßen ey-  
longitudinaliter sulcata, postice pli- sförmig, bäuchig und glatt, nach  
cis transuersis, complanatis, sur- der Länge gefurchet, und hinten  
sum imbricatis. Margo anticus cir- mit platt gedrückten aufwärts  
ca ligamentum laevis. Labia retro ziegelförmig gestellten Falten verse-  
apices crassa prominentia. Color hen. Der Borderrand ist neben  
albo roseoque varius. dem Bande glatt. Hinter den Spiz-  
zen ragen dicke Lippen hervor. Die  
Farbe ist weiß mit Rosenroth ver-  
menget.



G. 16. *Cardium latum*. G. 16. Die breite Herzmuschel.

Belg. Blaafagtig Hart. Gall. Coeur enflé.

Testa lata ovali, longitudinaliter sulcata striata, utrinque scabra, margine antico serrato. Die breite eysförmige Schale ist nach der Länge gefurchet und gestreift, an beiden Enden rauh, und am Vorderrande sägeförmig.

Knor. Vergn. VI. 7. t. 6. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

Testa lata ovalis, longitudinaliter sulcata striata. Costae anticae posticaeque acutae, muricatae, mediae obtusae laeves, interstitiis duplicato striatis. Umbones tenuissime striati, antrorsum subcarinati; Apices incurvi laeves. Cardo, dentibus generis characterem exhibens; Limbus striatus. Margo anticus acute serratus. Die breite eysförmige Schale ist nach der Länge mit Furchen und Streifen besetzt. Die vordern und hintern Ribben sind scharf und rauh, die mittleren stumpf und glatt, mit zweifach gestreiften Zwischenräumen. Die Wölbungen sind sehr zart gestreift und vorwärts einigermassen tielförmig. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt und glatt. Das Schloß hat an den Zähnen das dem Geschlechte eigenthümliche Kennzeichen. Der innere Rand ist gestreift. Der Vorderrand hat scharfe sägeförmige Ausschnitte.

α alba, luteo maculata.

α weiß und gelb gefleckt.


β alba, rubro maculata.

β weiß mit rothen Flecken.

G. 17. *Cardium pectinatum*. G. 17. Die kammbahnliche Herzmuschel.

C 3

Testa



*Testa rotundata complanata, Die rundliche etwas flach  
costis triangulis, lateribus mu- gedrückte Muschel hat dreieckig-  
ricatis. ge Rippen, und rauhe Seiten.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

*Testa suborbiculari profunde sul- Die Schale ist einigermassen schei-  
cata Costae triangulae transuersim cre- benrund, tiefgefurchet. Die Rippen  
ratae; extimae squamulis fornicatis sind dreieckig in die Quere geger-  
scabrae. Margo crenatus, anticus ser- bet, die äußern davon sind durch  
vatus Superficies externa albida, hohle Schüppchen rauch. Der Rand  
maculis dispersis fuscis. Cavitas ist gegerbet, vorne sägeförmig. Die  
longitudinaliter sulcata, alba. äußere Fläche ist weiß mit zerstreuten  
braunen Flecken. Die innere  
Höhlung aber ganz weiß und nach  
der Länge gefurchet.*

*Die Schale ist einigermassen schei-  
benrund, tiefgefurchet. Die Rippen  
sind dreieckig in die Quere geger-  
bet, die äußern davon sind durch  
hohle Schüppchen rauch. Der Rand  
ist gegerbet, vorne sägeförmig. Die  
äußere Fläche ist weiß mit zerstreuten  
braunen Flecken. Die innere  
Höhlung aber ganz weiß und nach  
der Länge gefurchet.*

*G. 18. Cardium rusticum.*

*G. 18. Das Hahnen-  
herz.*

*Linn. S. N. Sp. 91.*

*Belg. Bonte Kokhaan. Gall. Le Coq bigarré.*

*Testa subcordata, umbona- Die etwas herzförmige häu-  
ta, antiquata, sulcis remotis chige Schale hat Ansätze, und  
longitudinalibus, transuersim ru- nach der Länge laufende von  
gosis. einander entfernte Furchen, die  
in die Quere runzelicht sind.*

*Die etwas herzförmige häu-  
chige Schale hat Ansätze, und  
nach der Länge laufende von  
einander entfernte Furchen, die  
in die Quere runzelicht sind.*

*α alba, fasciis ferrugineis.*

*α weiß, mit rothbraunen Bändern.*

*β niuea.*

*β schneeweiß.*

*Aldrov. Test. l. 3. p. 480.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 166.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. K.*

*Gualt. Test. t. 71. f. M.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 24. f. 12. t. 77. 78. f.*

*Knor. Vergn. VI. 8. t. 3. f.*

## H. Mastra.

## H. Die Korbmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 307.*

*Testa* bivaluis aequi- Die Schale hat zwei  
ualuis. *Cardinis* dente gleiche Klappen. Der ge-  
medio complicato, cum faltene Mittelzahn des  
adjecta foueola; dentibus Schlosses hat neben sich  
lateralibus remotis infer- ein Grübchen, und etwas  
tis. entfernte einbeißende Sei-  
tenzähne.

## H. 1. Mastra Spreng- leri.

## H. 1. Die sprengleri- sche Korbmuschel.

*Linn. L. N. Sp. 94.*

*Testa* cordato triangulari, Die herzförmige dreiseitige  
laevi, area complanata, utrin- glatte Schale hat eine flache  
que carinata. an beiden Seiten keilsförmige  
Vorderfläche.



*Gualt. Test. t. 85. f. F.*

*Knor. Vergn. VI. 34. t. I. f.*

**H. 2. Mastra glauca.**

**H. 2. Die fahle Korbmuschel.**

Testa subouata umbonata,  
apicibus laeuissimis, lateribus  
undique striatis.

Die eysförmige bäuchige  
Schale ist an den Spizen glatt,  
und an den Seiten allenthal-  
ben gestreiset.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subouata tenuis, conuexa,  
apicibus glabris. Area, areolaeque  
indistincta, tenuiter striata. Val-  
uae solitariae dens primarius  
complicatus, laterales elongati.  
Color sordide albidus.

Die eysförmige Schale ist dünn,  
bäuchig, gegen die Spizen zu glatt.  
Die Vorder- und Hinterflächen sind  
undeutlich und gestreift. Der Haupt-  
zahn der einzelnen Klappe ist zusam-  
men gelegt, die Seitenzähne lang  
auslaufend. Die Farbe schmutzig  
weiß.

*Valua solitaria.*

Eine einzelne Klappe.

**I. Donax.**

**I. Die Stumpfmuschel.**

*Linn. Syst. Nat. Gen. 308.*

Testa binaluis, margi-  
ne antico obtusissimo. Den-  
tibus insertis, marginali po-  
stice solitario, subremoto.

Die zweyklappige Scha-  
le hat einen stumpfen  
Vorderrand. Die Zähne  
am Schlosse sind einbeiß-  
end, der hintere Seiten-  
zahn stehet einzeln, und  
entfernet.

**I. I.**





I. 1. *Donax Scortum*.

I. 1. Das Dreyeck.

*Linn. S. N. Sp.* 102.

*Gall.* Came coupée. *Dav.* *Angl.* The violet and white Chama Hill.

Testa cordato triangulari; Die Schale ist herzförmig,  
area explanata lacui, utrin- dreysseitig, die Vorderfläche  
que carinata, striis transuer- ausgebreitet und glatt, und an  
sis alternatim excurrentibus. beiden Seiten kielförmig. Die  
Querstiche verlängern sich  
wechselweise.

*List.* Hist. Conch. 1. 3. f. 220.

*Argenv.* Conch. Pl. 21. f. L.

*Petiv.* Gaz. t. 19. f. 11.

*Hill.* Hist of. Animal. Pl. 9.

*Müll.* Linn. Natursyst. VI. 1. B. 11. t. 5. f.

*Mus.* *Caes.* *Vindobon.*

I. 2. *Donax pubescens*.

I. 2. Die stachelichte  
Stumpfmuschel.

*Linn. S. N. Sp.* 103.

Testa cordato triangulari Die herzförmige dreysseitige  
decussatim striata, area ex- Schale ist kreuzweise gestreifet,  
planata utrinque carinata, spi- die Vorderfläche platt, und  
nisque canaliculatis armata. beiderseits kielförmig, mit rin-  
nenförmigen Stacheln besetzt.



*Mus. Caes. Vindobon.*

I. 3. Donax Trunculus. I. 3. Das Stümpchen.

*Linn. S. N. Sp. 105.*

*Belg. Stombje. Gall. La Tronquée.*

Testa cuneiformi, antice Die keilsförmige Schale ist oblique truncata, laevi, lim- vorne schief abgestumpft, und be crenato, glatt, am inneren Rande ge- kerbet.

*List. angl. t. 5. f. 35.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 47.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 217.*

*Gualt. Test. t. 88. f. 0.*

*Adans. Seneg. Pl. 10. f. 1.*

*Klein Meth. Ostr. t. 11. f. 61.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. 4. Donax denticulata. I. 4. Die Säge.

*Linn. S. N. Sp. 107.*

*Belg. Zaagertjes. Gall. La Scie. Dav.*

Testa cuneiformi, striata, Die keilsförmige Schale ist antice obtusissima, transverse gestreifet, vorne gerad abge- ru-



rugosa , limbo denticulato.

stumpft und nach der Quere  
runzelicht , am inneren Rande  
gezähnt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 219.*

*Petiv. Gaz. t. 18. f. 4.*

*Knor. Vergn. II. 23. t. 3, 4, 5. f.*

I. 5. *Donex cuneata.*

I. 5. Der Keil.

*Linn. S. N. Sp. 108.*

Testa cuneiformi compres-  
sa lacui, antice rugosa, mar-  
gine integerrimo.

Die keilförmige Muschel ist  
platt gedrückt und glatt, am  
Rande ganz.

*Knor. Vergn. V. 7. t. 3. f.*

K. *Venus.*

K. Die Venusmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 309.*

Testa bivalvis, aequi-  
valvis, sinu longirudina-  
li; areola vestigiata. Car-  
dinis dentes tres appo-  
ximati, laterales diuergen-  
tes,

Die Schale , welche  
aus zweien gleichen Klap-  
pen bestehet , hat vorne  
eine längliche Vertiefung,  
und eine eingedrückte Hin-  
terfläche. Am Schlosse  
stehen drey Zähne nahe  
beisammen , deren äussere  
auswärts laufen.

K I.



K. I. Testae subcordatae, antice muricatae.

K. I. Herzförmige vorne rauhe Schalen.

K. I. I. Venus Dione.

K. I. I. Die ächte Venusmuschel.

Linn. S. N. Sp. 112.

Belg. De rechte Venus - Schulp mit Hair, Rumph. Angl. The Maiden Muscle Pet. Gall. Conque de Venus a pointes Day.

Testa subcordata, cingulis eleuatis membranaceis, area utrinque spinosa.

Die etwas herzförmige Schale hat erhabene blätterige Keiße und eine mit Stacheln besetzte Vorderfläche.

Bonan. Mus. Kirch. el. 2. f. 121.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 140.

Rumph. amb. t. 48. f. 4.

Petiv. Gaz. t. 31. f. 9.

Olear. Mus. p. 29. f. 4.

Gualt. Test. t. 76. f. D.

Argenv. Conch. Pl. 21. f. 7.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Knor. Vergn. I. 4. t. 3, 4. f.

— Delic. nat. I. t. B. V. f. 9.

Murray. Fund. Test. t. 2. f. 16. 17.

Müll. Linn. Naturfyst. VI. I. B. 11. t. 6. f.

K I. 2.



K. I. 2. Venus Paphia.

K. I. 2. Das alte Weib.

*Linn. S. N. Sp.* 113.

*Belg.* Gerimpelde, oude Wyfs - schulp. *Rumph.* *Angl.* The old Woman. *Hill.* *Gall.* La Vieille ridée, *Argenv.*

Testa subcordata, cingulis Die etwas herzförmige Scha-  
crassis, antice attenuatis. le hat dicke Reife, die sich  
vorne verdünnen.

*Bonap.* *Recr. cl.* 2. f. 75.

*Rumph.* *amb. t.* 48. f. 5.

*Gualt.* *Test. t.* 85. f. A.

*Argenv.* *Conch. Pl.* 21. f. B.

*Regenf. Samml.* I. 7. t. 11. f.

*Hill.* *Hist. of. Anim. Pl.* 9.

*Knor. Vergn.* II. 28. t. 2. f.

—— — VI. 6. t. 2. f.

K. I. 3. Venus Marica.

K. I. 3. Die Bastard-  
venus.

*Linn. S. N. Sp.* 114.

*Belg.* De gestreepte Kousdoublet.

Testa rotundata, decussata, Die rundliche Schale ist  
striis elevatis, antice lamel- mit erhabenen, vorne blätteri-  
losis, areola carinata circum- gen Streifen durchkreuzt, die  
scripta, Hinterfläche ist kielförmig er-  
haben, und eingesägt.

*Mus.*



*Mus. Caes. Vindobon.*

K. I. 4. Venus Dysera.

K. I. 4. Die Dünnribbe.

*Linn. S. N. Sp.* 114.

*Gall. La Levantine Argenv.*

Testa subcordata, cingulis remotis membranaceis, limbo crenulato.

Die etwas herzförmige Schale hat dünne erhabene in die Quere laufende Ribben, und am inneren Rande kleine Kerben.

*List. Hist. Conch. l. 3. f.* 114. 115.

*Petiv. Gaz. t. 24. f.* 5.

*Argenv. Conch. Pl. 21. f.* K.

*Klein. Meth. Ostrac. t. 10. f.* 48, 49.

*Knor. Vergn. II. 28. t. 3. f.*

K. II. Testae subcordatae, antice incrimatae.

K. II. Herzförmige vorne ungewafnete Schalen.

K. II. 1. Venus verrucosa.

K. Die warzige Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp.* 116,

*Gall. Cloniffe. Daw.*





Testa subcordata umbonata, cingulis arctis membrana-  
naceis verrucosis, limbo cre-  
nulato.

Die etwas herzförmige bäu-  
chige Schale mit blätterigen  
warzenförmigen Ribben und  
gedrängt stehenden Keifen be-  
setzt, am inneren Rande mit  
feinen Kerben versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 122.*

*Gualt. Test. t. 75. f. H.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 2. Venus circi-  
nata.

K. II. 2. Die gereifte  
Venus.

Testa subcordata, mem-  
branis transuersis arctis, areo-  
la impressa ouata, limbo in-  
tegro.

Die fast herzförmige Scha-  
le ist mit häutigen Querringen  
umgeben, mit einer eysförmig-  
en eingedrückten Hinterfläche  
und ganzem Rande.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa figura V. Dionis subcorda-  
ta, umbonata transuersis eleuatis im-  
bricatis arctis. Sinus utrinque labia-  
tus, labiis subaequalibus. Areola  
cordata impressa. Limbus integer-  
rimus. Color pallide roseus, radiis  
obsoletis albis.

Die herzförmige bäuchige Schale  
hat die Gestalt der achten Venus-  
muschel. Sie ist der Quere nach  
mit erhabenen ziegelförmiggestellten,  
hintereinander stehenden Ringen  
umgürtet. Die vordere Vertiefung  
ist beiderseits mit einem beinahe  
gleichgroßen Lefzen versehen. Die  
hintere Fläche ist eysförmig und ver-  
tieft. Der innere Rand ohne allen  
Einschnitt. Der Farbe nach ist  
sie blaßroth, mit matten weißen  
Strahlen.

K. II. 3.



K. II. 3. Venus cancellata.

K. II. 3. Die breitblättrige Venusmuschel.

Linn. S. N. Sp. 118.

Testa subcordata complanata, cingulis erectis membranaceis remotis, antice elongatis, patentibus; limbo crenulato.

Die herzförmige plattgedrückte Schale ist mit erhabenen blättrigen Keifen umgeben, die sich vorne verlängern, und ausbreiten; der innere Rand ist fein gekerbet.

Gualt. Test. t. 38. f. D.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 4. Venus sinuata.

K. II. 4. Die ausgefehlte Venusmuschel.

Testa subcordata, transverse inaequaliter sulcata, sinu antico lato declivi, limbo crenulato.

Die fast herzförmige Schale hat ungleiche Quersfurchen, eine vertiefte Vorderfläche, und einen innwendig feingekerbten Rand.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 131.

Knor. Vergn. V. 14. t. 2. 5. f.

Testa subcordata complanata glabra, sulcis transuersis inaequalibus. Sinus anticus latus introitum decliuis. Areola plana. Limbus crenulato.

Die Schale ist einigermaßen herzförmig, plattgedrückt und glatt, der Quere nach mit ungleichen Furchen versehen. Die vordere nula



nulatus. Color pallidus fuscone-  
lofus, radiis obfolotis pallidis.

Vertiefung ift breit und einwärts  
abhängig. Die Hinterfläche ift eben.  
Der innere Rand fein gekerbet. Die  
Farbe braun nebelicht, mit matten  
bleichen Strahlen.

K. II. 5. Venus flexuo-  
fa.

K. II. 5. Die fchiefe  
Venusmufchel.

Linn. S. N. Sp. 121.

Testa cordato triangula,  
transuerfum fulcata, area fi-  
nuofa utrinque carinata, areo-  
la plana.

Die herzförmige dreneckige  
in die Quere gefurchte Scha-  
le hat eine ebene Hinterfläche,  
und eine vertiefte Vorder-  
fläche, die beiderfeits mit ei-  
ner erhabenen Ecke begränzet  
ift.

Rumph. amb. t. 43. f. O.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 6. Venus Buc-  
cardium.

K. II. 6. Das unäch-  
te Ochfenherz.

Testa cordata folida laeui,  
areolae excauatae vestigio in-  
diftincto, limbo integro.

Die herzförmige dichte glatte  
Mufchel ift an der Hinterfläche  
ausgehöhlet ohne deutlichen  
Eindruck, und am inneren Rand  
de glatt.

D

Mus.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa cordata solida, laevis, transuersim tenuissime striata, undique umbonata; retro apices recuruatos contiguos concaua, vestigio nec intruso, nec circumscripto. Dentes generi proprii, crassi.

Die dicke herzförmige glatte nach der Quere sehr fein gestreifte Schale ist allenthalben bündig; hinter den rückwärts gebogenen Spitzen, die einander berühren, ausgehöhlet, ohne deutlichen Eindruck oder Einsassung. Die Zähne sind dick und nach der Art des Geschlechtes beschaffen.

K. II. 7. Venus Chione.  
ne.

K. II. 7. Die Spiel-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 125.*

*Belg. De Speel doublet. Gall. Came marquée de verges.*

Testa cordata glabra, transuersim obsolete sulcata, pallide radiata, arcola plana.

Die herzförmige glatte nach der Quere schwach gefurchte Schale ist mit blassen Strahlen und einer kleinen platten Hinterfläche versehen.

*Gualt. Test. t. 86. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. C.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 1. f.*

*Knor. Vergn. II. 4. t. 1. f.*

K. II. 8. Venus maculata.

K. II. 8. Die Albatmus-  
schel.

*Linn. S. N. Sp. 126.*

*Belg.*



*Belg.* D'achaat - gaaper. *Angl.* The Agate chama. *Hill.* Gall. Camé truitée. *Dav.*

*Testa cordata glabra, maculis dispersis inaequalibus; ale hat zerstreute ungleiche Flecken, und eine keilsförmig eingefasste Hinterfläche.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 106.*

*Gualt. Test. t. 76. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 17. f. 15.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 16. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 5. f.*

— — — *V. 20. t. 4. f.*

K. II. 9. Venus Meringatrix.

K. II. 9. Die Braunlippe.

*Linn. S. N. Sp. 127.*

*Gall. La Gourgandine. Argeuv. Angl. The Smooth egg, truncated Chamé Hill.*

*Testa cordata laevi, antice complanata fusca, labris hiantibus.* Die herzförmige glatte Schale ist vorne plattgedrückt braun und mit weit hervorragenden Lippen versehen.



*Argenv. Conch. Pl. 21. f. F.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. VI. 6. t. 3. f.*

K. II. 10. Venus mac- K. II. 10. Die Korbvenus.  
troides.

*Belg. Gestraalde Kwaker. Gall. Quacre rayonné.*

Testa triangula umbonata Die dreieckige bäuchige glat-  
laeui, utrinque complanata; te Schale ist beiderseits platt-  
cardinis dente laterali remoto. gedrückt, und am Schlosse  
mit einem entfernten Seiten-  
zähne versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 85.*

*Knor. Vergn. V. 15. t. 2. f.*

— — — VI. 10. t. 5. f

Testa, similis Mastrae stultorum  
L; triangula subaequilatera laevis,  
transuersim tenuissime striata, utrin-  
que prope apices complanata, pla-  
nis subaequalibus. Apices incurui.  
Dentes primores tres, structura con-  
generum, quibus accedit postice  
lateralis remotus. Color testae  
extus fulvus, radiis albis; apicem  
violaceus.

Die Schale, welche die Gestalt des  
Strahlkorbes hat, ist dreieckig, beina-  
he gleichseitig und glatt, in die Quere  
fein gestreift, an den Seiten nächst den  
Spitzen mit zweien fast gleich groß-  
en platten Flächen versehen. Die  
Spitzen krümmen sich einwärts. Drei  
Mittelzähne sind am Schlosse von  
gewöhnlicher Gestalt, ausser wel-  
chen hinten ein entfernter Seiten-  
zahn steht. Die Schale ist außen  
braunroth mit weißen Strahlen,  
an den Spitzen violett.

K. II.





K. II. 11. Venus paradoxa.

K. II. 11. Die blaustreifige Astervenus.

Testa triangula, solida, utrinque complanata, labris prominentibus.

Die dreysseitige dichte beiderseits zusammengedrückte Schale ist mit hervorragenden Lippen versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ponderosa, triangula, laevis, utrinque complanata. Labra porrecta crassa. Dentes cardinis primarii duo, lateralis utrinque unus brevis solidus. Color testae albus, lateribus radiisque latis violaceis.

Die Schale ist schwer, dreyeckig, und glatt, an beiden Seiten platt gedrückt. Die dicken Lippen ragen hervor. Am Schlosse sind zween Mittelzähne, und beiderseits ein dicker Nebenzahn. Die Schale ist weiß, mit breiten Strahlen, die Seitenflächen von violetter Farbe.

K. II. 12. Venus castrensis.

K. II. 12. Die Lagermuschel.

*Linn. S. N. Sp. 129.*

*Belg. De griekische A Doublet. Rumph. Angl. The zizzag Chama. Hill. Gall. L'écriture grecque.*

Testa triangulo rotundata, umbonata glabra, characteribus angulatis picta, areola circumscripta plana.

Die rundliche, dreyeckige, bäuchige glatte Schale ist mit eckigen Zierathen bemalt, und mit einer platten eingefassten Hinterfläche versehen.



*Bonan. Recr. el. 3. f. 376.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 98.*

*Rumph. amb. t. 42. f. K.*

*Gualt. Test. 1. 82. f. H.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 3. f. 4. t. 41. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 4. f.*

—— ——— II. 20. t. 2. f.

—— ——— VI. 6. t. 5, 6. f.

K. II. 13. Venus Me-  
röe.

K. II. 13. Die weitlip-  
pige Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 131.*

*Gall. Le Zig - zog. Dav.*

Testa lata subovata com-  
pressa, transversim striata; sinu  
antico dilatato hiant; limbo  
crenato.

Die breite etwas eiförmige  
flachgedrückte in die Quere ge-  
streifte Schale ist vorne mit ei-  
ner erweiterten klaffenden Ver-  
tiefung versehen, und inwendig  
am Rande mit Kerben besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 321.*

*Argenv. Supp. Pl. 3. f. E.*

*Knor. Vergn. VI. 7. t. 2, 4. f.*

K. II. 14. Venus un-  
dulata,

K. II. 14. Die wellen-  
förmige Venus.

Testa



Testa ovali lata, striis transuersis undulatis, planis utrinque lanceolatis.

Die ensförmige breite Schale ist der Quere nach mit runzelichten Streifen, und beiderseits mit lanzetförmigen Flächen versehen.

*Petiv. Gaz. t. 105. f. 2.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 4. f.*

Testa ovalis complanata lata, glabra, striis transuersis undulatis, ad apices utrinque longitudinaliter complanata, planis laeuibus lanceolatis. Dentes cardinis duo bifidi, tertius indiuisus. Color albus, venis angulatis fulvis, planorum venis transuersis undulatis, rubro purpureis.

Die Schale ist plattgedrückt, breit, glatt, mit wellenförmigen nach der Quere laufenden Streifen umgeben, nächst den Spizen beiderseits nach der Länge flach gedrückt, mit glatten lanzetförmigen Flächen. Am Schlosse sind zweien zweispaltige Zähne, der dritte äußere ist spizig und ungetheilt. Die Farbe ist weiß mit braungelben winkelförmigen Adern, über die Quere der Flächen laufen wellenförmige purpurrothe Adern.

K. II. 15. Venus Calipyga.

K. II. 15. Die weißbackige Venus.

Testa ouata latiuscula, transuerse inaequaliter striata, lineis picta angulatis, areola ovali.

Die ensförmige breite Schale ist der Quere nach mit ungleichen Streifen besetzt, mit winkelförmigen Linien bemalt, und an der Hinterfläche ensförmig.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 62.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa ovata latiuscula parumper  
complanata, striis transverfis inae-  
qualibus, picta lineis angulatis,  
sursum convergentibus, fuscis.  
Areola ovalis, impressa, striata.  
Color lutescens; characteribus an-  
gulatis fuscis. Umbones nivi.

Die herzförmige etwas breite  
Schale ist einigermaßen flachgedrückt,  
und in die Quere ungleichförmig  
gestreift. Die winkelförmigen Li-  
nien, mit welchen sie bemalet ist,  
laufen aufwärts zusammen. Die  
Hinterfläche ist eyförmig, einge-  
drückt und gestreift. Die Schale  
gelblich, die Winkelzüge braun,  
und die Wölbung schneeweiß.

K. II. 16. Venus de-  
florata.

K. II. 16. Die Blau-  
lippe.

Linn. S. N. Sp. 132. ?

Testa lata umbonata ovali,  
longitudinaliter rugosa, lim-  
bo antico intus violaceo.

Die breite bäuchige eyförmige  
Schale ist der Länge nach  
runzelig, und am innwendigen  
Vorderrande violett.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 17. Venus fim-  
briata.

K. II. 17. Die Wafel-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 133.

Belg. Wafelyser Rumph. *Angl.* Honeycomb Cockle. *Pet. Gall.* La  
Tricotée. *Dav.*

Testa lata, umbonata ovali,  
longitudinaliter striata, trans-  
versae sulcata, margine cre-  
nato.

Die breite bäuchige eyförmige  
Schale ist nach der Länge  
gestreift, in die Quere ge-  
furcht, und am Rande mit  
Kerben versehen.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 3. f. 172.*

*Rumph. amb. t. 43. f. F.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 75. f. C.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 18. Venus reticulata.

K. II. 18. Die Gitter Venus.

*Linn. S. N. Sp. 124.*

*Gall. Le Rézeau blanc. Dav.*

Testa subcordata umbonata longitudinaliter striata, cingulis eleuatis membranaceis, limbo crenulato.

Die fast herzförmige bäuchige Schale ist der Länge nach gestreift, mit erhabenen häutigen Keifen, und am inneren Rande mit Kerben versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 273.*

*Gualt. Test. t. 77. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 16. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. F.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 10. f. 12.*

*Knor. Vergn. VI. 10. t. 1. f.*

K. III. Orbiculatae antice inermes. k. III. Scheibensformige, vorne unbewafnete Venusmuscheln.



K. III. 1. Venus tige-  
rina.

K. III. Die Tiegerzunge.

*Linn. S. N. Sp. 136. 141.*

*Belg. De wilde Tyger-tong. Rumph. Angl. Checker-grained  
cockle, Petiv.*

Testa orbiculata decussatim  
striata, areola impressa, corda-  
ta.

Die scheibenförmige Schale  
ist kreuzweise gestreift, und  
mit einer eingedrückten herz-  
förmigen Hinterfläche versehen.

*Nata, imbo praesertim postico  
roseo.*

Weiß, und am inneren Rande  
besonders hinten rosenfärbig.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 69. .*

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 174.*

*Rumph. amb. t. 43. f. H.*

*Petiv. amboin. t. 18. f. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 2. t. 1. f.*

— — — VI. 37. t. 2. f.

K. III. 2. Venus con-  
centrica.

K. III. 2. Die Gürtel-  
venus.

*Angl. The girdled Heart Cockle. Petiv.*

Testa orbiculata laevi, striis  
transuersis concentricis, areo-  
la impressa cordata.

Die scheibenförmige glatte  
Schale ist mit gleichabstehen-  
den Zirkelfurchen besetzt, und  
mit einer eingedrückten herz-  
förmigen Hinterfläche versehen.

*List.*





*List. Hist. Conch.* l. 3. f. 99. 102. 104.

*Petiv. Gaz.* t. 16. f. 1. t. 93. f. 15. 18.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbicularis solida, laevis, fulcis transuersis circularibus concentricis. Apices breues recurui. Areola cordiformis impressa. Limbus integerrimus. Color totius testae niueus.

Die scheibenförmige dicke glatte Schale, hat concentrische Quersurken. Die Spitzen sind kurz und rückwärts gebogen. Die Hintersfläche ist herzförmig und vertieft. Der Rand glatt. Die Farbe der ganzen Schale schneeweiß.

K. III. 3. Venus prostrata.

K. III. 3. Die Zirkelscheibe.

*Linn. S. N. Sp.* 137.

Testa orbiculata transuersa striata, antice membranaceo scabra, areola ouata impressa.

Die scheibenförmige in die Quere gestreifte Schale ist vorne durch erhabene Häute rauh, an der Hintersfläche einsörmig eingedrückt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. III. 4. Venus rinularis.

K. III. 4. Die aderige Venus.

Testa orbiculata, transuersa striata, umbonibus complanatis rugosis, areola plana.

Die scheibenförmige in die Quere gestreifte Schale ist auf den flachgedrückten Wölbungen durch erhabene Adern runzelicht, und mit einer platten Hintersfläche versehen.

*Mus.*



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbiculata gibba, transuerse  
striata; Umbones complanati, ru-  
gis bifariam diuergentibus obsiti.  
Areola plana laeuis. Color pallide  
luteus, areolae fuscus.

Die Schale ist scheibenrund, höckerig, in die Quere gestreift. Die Wölbungen platt gedrückt, und mit Runzeln besetzt, welche nach zweien Seiten auseinander laufen. Die Hinterfläche ist eben und glatt; Die Farbe bleich gelb, die Hinterfläche braun.

K. III. 5. Venus pen-  
sylvanica.

K. III. 5. Der Abrikos-  
sen Stein.

*Linn. S. N. Sp. 138.*

*Gall. La Jamaïque. Argenv.*

Testa rotundata, umbonata,  
membranis elcuiatis transuer-  
sis, antice sulco utrinque lon-  
gitudinali arcuato, areola im-  
pressa cordata.

Die runde bäuchige Schale ist in die Quere mit erhabenen Blättern umgeben, vorne beiderseits der Länge nach mit einer bogenförmigen Furche bezeichnet, an der Hinterfläche herzförmig eingedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 138.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f N.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. III. 6. Venus incru-  
stata.

K. III. 6. Die punktir-  
te Lagervenus.

*Linn. S. N. Sp. 139. ?*

*Belg.*



Belg. Het türkische Leger. Rumph. Angl. The türkische Campe.  
Gall. Le campement turque.

Testa rotundata glabra, striis Die rundliche glänzende  
conuergentibus excauato punc- Schale hat zusammenlaufende  
tatis, areola circumscripta tiefpunktirte Streifen, und  
laui. eine eingefasste glatte Hinter-  
fläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 146.

Regenf. Samml. I. 1. t. 4. f.

K. III. 7. Venus exo- K. III. 7. Die Strahl-  
lera. scheibe.

Linn. S. N. Sp. 142.

Belg. Slet.

Testa lentiformi, transuer- Die linsenförmige in die Que-  
sim striata, albida, obsolete re gestreifte weißlichte Schale  
radiata, areola cordata. hat schwache Strahlen und ei-  
ne herzförmige Hinterfläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 98.

Gualt. Test. t. 75. f. F. G.

Adans. Seneg. Pl. 16. f. 4.

Mus. Caes. Vindobon.

K. III. 8. Venus pecti- K. III. 8. Die Kamme-  
nata. venus.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 144.*

*Belg.* Scherfje. *Rumph.* *Angl.* Crofs Cockle *Petiv.* *Gall.* L'Amande *Dav.*

*Testa rotundata, solida, Die rundliche dicke Schale*  
*longitudinaliter anticeque ob-* *le ist der Länge nach, und vor-*  
*lique costata, costis decussa-* *ne in die Quere geribbet, über*  
*tis, limbo crenato.* *die Ribben gestreifet, und am*  
*inneren Rande gekerbet.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 148. 149.*

*Rumph. amb. t. 42. f. D.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 72. f. E. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. P.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 3. f.*

*K. IV. Latæ, antice subangulatae, K. IV. Breite, vorne etwas eckig*  
*inermes.* *ge, und unbewafnete Venusmuscheln.*

*K. IV. 1. Venus litte-*  
*rata.*

*K. IV. 1. Die dicke*  
*Schildmuschel.*

*Linn. S. N. Sp. 147.*

*Belg.* De langaagtige Letter-Schulp. *Rumph.* *Angl.* The arabian  
*Shell, Hill. Gall. L'écriture arabique. Argenv.*

*Testa lata ouata, antice an-* *Die breite, eiförmige, vorne*  
*gulata, striis transversis und-* *eckige Schale hat wellenförmige*  
*latis.* *ge Querstreifen.*

*Picta.*



Picta saepe lineis angulatis.

Defters mit liniensförmigen Winkelzügen bemalt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 67.*

*Rumph. amb. t. 43. f. B.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 2.*

*Valent. Abb. 13. t. 6. f. 14. t. 10 — 13. f.*

*Gualt. Test. t. 86. f. E. F.*

*Argenv. Concb. Pl. 21. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 39. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 4. f.*

— — II. 28. t. 4. f.

## L. Spondylus.

## L. Die Klappmuschel.

*Linn. S. N. Gen. 310.*

Testa inaequalis, cardinis dentibus duobus craf-  
fis, cum scrobiculo inter-  
medio.

Die Schale besteht aus  
ungleichen Klappen, am  
Schloße sind zweien dicke  
Zähne, zwischen eine Gru-  
be.

L. I. Spondylus Gae-  
deropus.

L. I. Die gezackte Klapp-  
muschel.

*Linn.*



Linn. S. N. 151.

Belg. Getackte Lazarus-Klappen. Angl. The great prickly Oyster.  
Hill. Gall. Nuitre epineuse.

Testa subaurita spinosa, apic- Die stachlichte Schale ist  
cum altero longiore secto. einigermaßen mit Ohren, und  
einer längeren abgesägten Spitze  
versehen.

α valvis foliaceo spinosis.

α mit blätterichten und dornigen  
Klappen.

β valvis spinosis, spinis elongatis, β mit dornigen Klappen, deren Dör-  
net lang und stumpf sind.  
obtusis.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 20. 21.

Rumph. amb. t. 47. f. E.

Petiv. amb. t. 20. f. 6.

Gualt. Test. t. 100. 101. f. A, B. t. 99. f. F. G.

Argenv. Conch. Pl. 21. f. B. G. I. M.

Klein. Meth. Ostr. t. 9. f. 37.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Seb. Test. III. t. 88. f. 1—11. t. 89. f. 4—8.

Knor. Vergn. V. 9. t. 1. f. 13. t. 1. f.

— — VI. 9. t. 1. f.

— — Delic. nat. I. t. B. IV. 1. f.





L. 2. Spondylus plicatus.

L. 2. Die Faltenklappe.

Linn. S. N. Sp. 153.

Testa subspinosa, transuerse plicata.

Die Schale ist einigermaßen dornig, und in die Quere gefalten.

„ crocea,

„ safransarbig.

Gualt. Test. t. 99. f. E.

Knor. Vergn. III. 6. t. 1. f.

— — — VI, 12. t. 3. f.

ß lutea.

ß gelb.

Knor. Vergn. I. 6, t. 3. f.

M. Chama.

M. Die Gienmuschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 311.

Testa bivaluis absque labris. Cardinis dens callosus, gibbus, insertus fossulae obliquae.

Eine zweiflappige Schale ohne Lippen. Das Schloß hat einen höckerigen schwielenförmigen Zahn, der sich in ein entgegengesetztes Grübchen versenket.

E

M. I.



M. 1. Chama cor.

M. 1. Die Narren-  
kappe.

Linn. S. N. Sp. 154.

Belg. Zotskap. Gall. Coeur de Boeuf. Dav. Ital. Bucardia. Ginan.

Testa cordata subglobosa, Die herzförmige, einigermas-  
laevi, apicibus recurvatis, sen fuglichte glatte Schale, hat  
rima lanceolata hiante. schnirkelförmig zurückgerollte  
Spizen, und eine lanzetförmige  
ge klafende Vorderpalte.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 88.

List. Hist. Conch. l. 3. f. III.

Rumph. amb. t. 48. f. 10.

Gualt. Test. t. 71. f. E.

Seb. Thes. III. t. 86. f. 1.

Ginan. adr. II. t. 19. f. 129.

Knor. Vergn. VI. 8. t. 1. f.

M. 2. Chama Gigas.

M. 2. Das Waschbecken.

Linn. S. N. Sp. 155.

Belg. Fonteinbak. Angl. The wife of the Nail - Scalop. Gall.  
La Fautiere, Argenw.

Testa



Testa lata, plicata, fornicato squamosa; limbo politico hiantes, crenato. Die breite gefaltene Schale ist mit hohlen Schuppen besetzt, und an der stumpfen Hinterfläche mit einer gekerbten Defnung versehen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 83. 84.*

*Rumph. amb. t. 42. f. A. B.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 92. f. A, G. t. 93. f. E.*

*Argenw. Conch. Pl. 23. f. E.*

*Klein Meth. Ostr. t. 1. f. 53.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 48. f.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 3. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. III. 1. f.*

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 4. f.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 19. 20.*

M. 3. Chama Hippopus. M. 3. Der Pferdefuß.

*Linn. S. N. Sp. 156.*

*Belg. Paardenoetje. Rumph. Angl. The Horse hoofe. Gall. Feuille de Chou. Argenw.*



Testa plicata, squamis spinosis muricata, margine postico obtusissimo, clauso, dentato. Die gefaltene Schale ist mit dornigen Schüppchen besetzt, die stumpfe Hinterfläche ist geschlossen und am Rande gezähnt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 81. 82.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 187. 188.*

*Rumph. amb. t. 42. f. C.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 93. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 49. f.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 1, 2. f.*

—— ——— VI. 9. t. 3. f.

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 10. f.*

M. 4. *Chama antiquata.* M. 4. Die Seenuß.

*Linn. S. N. Sp. 157.*

Testa subcordata, sulcis longitudinalibus, striisque transuersis. Die fast herzförmige Schale ist nach der Länge gefurchet, und in die Quere gestreift.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 98.*

*Gualt. Test. t. 71. f. L.*

*Adans. Seneg. Pl. 16. f. 2.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 3. f.*

M. 5.



M. 5. Chama calycu-  
lata.

M. 5. Die Eichelmu-  
schel.

*Linn. S. N. Sp. 160.*

*Gal. Coeur allongé. Dav.*

Testa lata gibba, subtus  
coarctata, sulcis longitudina-  
libus crenulatis.

Die breite höckerige Scha-  
le ist unten eingebogen, und  
nach der Länge mit gekerbten  
Furchen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 184. 185.*

*Gualt. Test. t. 90. f. F.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

M. 6. Chama phreni-  
tica.

M. 6. Die nierenförmige  
Giennmuschel.

Testa reniformi, sulcis lon-  
gitudinalibus striisque trans-  
uersis, margine postico ser-  
rato, excurrente.

Die nierenförmige nach der  
Länge gefurchte, und in die  
Quere gestreifte Schale hat  
einen rückwärts hervorragenden  
sägeförmigen Hinterrand.

*Valent. Abb. 16. t. 27. f.*

*Knor. Vergn. II. 23. t. 7. f.*

Testa reniformis, antice lata, ro-  
tundata, postice angustata, supra  
arcuata, infra coarctata; sulci lon-

Die Schale ist nierenförmig, vor-  
ne breit und rundlich, hinten schmal,  
oben bogenförmig erhoben, unten  
girtu-



gitudinales, transversim striis decus-  
sati. Areae, areolaeque vestigium  
nullum. Apices subterminales re-  
curui. Margo anticus complanatus,  
inferior introrsum excavatus, re-  
trorsum in formam lobi excurrentis,  
limbo crenato. Dentes duo crassi, po-  
sticus brevis, anticus elongatus curva-  
tus. Ligamentum validum crassum,  
exviridi flavoque resplendens. Color  
rufus, postice prope apices] albus.  
Cavitas alba, limbo externo fusco.

eingedrückt. Die nach der Länge  
laufenden Furchen sind mit Quer-  
strichen durchgezogen. Weber am  
Vorder- noch am Hinterrande zet-  
get sich eine merkliche Fläche. Die  
Spitzen sind rückwärts gekrümmt,  
und stehen nahe an dem einen Ende.  
Der Vorderrand ist flach gedrückt,  
der untere einwärts ausgehölet.  
und verläuft sich rückwärts in ei-  
nen lappenförmigen Fortsatz. Der  
innere Rand ist gekerbet. Am  
Schlosse sind zween starke Zäh-  
ne, davon der vordere kürzer,  
der hintere verlängert und gekrümm-  
met ist. Das dicke starke Band hat  
im Bruche einen grüngelben Glanz.  
Die Schale ist außen braunroth,  
hinter den Spitzen weiß. Die Höb-  
lung weiß, am äußeren Rande braun-

M. 7. Chama Lazarus.

M. 7. Die Muskatenz-  
blütthe.

Linn. S. N. Sp. 164.

Belg. Foelie Bladeren. Gall. Gateau feuilleté.

Testa lamellis patentibus,  
laceris, apice altero oblique  
subspirali.

Die Schale ist mit ausge-  
breiteten krausen Blättern be-  
setzt, mit einer schiefen und  
fast schnirkelförmigen Spitze.

Rumph. amb. t. 48. f. 3.

Seb. Thes. III. t. 89. f. 5, 6, 9, 11.

Knor. Vergn. I. 8. t. I. f.

Mus. Caes. Vindobon.

M. 7.





M. 8. Chama gryphoides. M. 8. Die Felsengien-  
muschel

*Linn. S. N. Sp. 165,*

*Belg.* The ockergeele Oester. *Gall.* Huître écailleuse à feuilles de couleur de citron. *Argen.*

Testa orbiculari muricata, Die scheibenrunde rauhe  
valva altera planiore, altera Schale hat eine flache, und  
productiore subspirali. eine beinahe schnirkelförmig ver-  
längerte Schale.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 22.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 47. 53.*

*Gualt. Test. t. 101. f. C — I.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.*

*Regenf. Samml. l. 4. t. 44. f.*

*Knor. Vergn. l. 21. t. 2. f.*

—— — VI. 16. t. 1. f.

M. 9. Chama Arcinella. M. 9. Der dornige  
Pferdhuf.

*Linn. S. N. Sp. 167.*

*Belg.* Rotz doublet,



Testa spinosa, sulcis longitudinalibus, excavato punctatis; areola postica papillosa, intrusa. Die stachelige Schale ist nach der Länge mit höhlpunktierten Furchen besetzt, und hinten mit einer warzigen eingedrückten Fläche versehen.

Knor. Vergn. IV. 14. t. 1. f.

— — VI. 36. t. 1, 2. f.

## N. Arca.

## Die Arche.

Linn. Syst. Nat. Gen. 312.

Testa bivalvis, cardine articulo, dentibus numerosis, alternatim infertis. Die zweiflappige Schale hat an dem Schlosse eine Reihe vieler wechselweise ineinander passender Zähne.

N. I. Margine integro; apicibus recurvis. N. I. Mit ganzen Rande und zurückgekrümmten Spitzen.

N. I. 1. Arca tortuosa. N. I. 1. Die gedrehte Arche.

Linn. S. N. Sp. 168.

[ Belg. Gedraaide Oester. Rumph. Angl. Twisted Lighter. Petiv. Gall. La Bistournée. Dav.

Testa inaequivalvi, oblique parallelipeda, striata, valvula sinistra carinata, apicibus recurvis, margine integro. Die Schale hat die Gestalt eines gedrehten Parallelepipedums. Die Klappen sind gestreift, davon die linke eine kiel förmige Schneide hat. Die Spitzen sind rückwärts gerollt, der Rand ganz.



*Rumph. amb. t. 47. f. K.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 95. f. B.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 16.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 3. f.*

N. II. Margine integro, apicibus inflexis. N. II. Mit ganzem Rande, und einwärts gekrümmten Spizen.

N. II. I. Arca Noae. N. II. I. Die Arche Noah.

*Linn. S. N. Sp. 169.*

Belg. De rechte Noachs - Ark. *Rumph. Angl. Noahs - Lighter Petiv. Gall. L'Arche de Noe. Dav.*

Testa transversa, nauculari, rhombea, striata, antice compressa, retusa, apicibus incuruatis remotissimis, margine integro, subtus hiantes. Die Schale ist gestreckt, hat eine schiefartige rautenförmige Gestalt, ist gestreift, vorne zusammengedrückt und stumpf. Die Spizen sind einwärts gerollet, von einander weit entfernt; der Rand ganz und unten klappend.

*Aldrov. Test. l. 3. t. 15.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 32.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 208. 209.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 10.*



*Rumph. amb. t. 44. f. P.*

*Gualt. Test. t. 87. f. H. H. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 73. f.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. V, 2. f.*

—— *Vergn. I. 16. t. 1. 2. f.*

*Martin. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 5. f.*

N. II. 2. Arca barbata. N. II. 2. Die Bartar-  
che.

*Linn. S. N. Sp. 170.*

*Belg. Arcke Noachs Soort. Mus. Oud. Angl. The coated Muscle.*  
*Hill. Gall. Amande à cils. Dav. Ital. Cozze, Bonan.*

Testa transuerfa, striis bar- Die Schale ist gestreckt, an  
batis, apicibus incuruis ap- den Streifen langharig; die Spi-  
proximatis, margine integro, zen sind einwärts gerollt, und  
subtus hiantes. aneinander genähert, der Rand  
ganz, und unten klappend.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 65.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 79.*

*Gualt. Test. t. 91. f. F.*

*Mus. Tessin. t. 6. f. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. M.*

*Ginan. adr. II. t. 23. f. 160.*

*Adans. Seneg. Pl. 18. f. 9.*

*Knor.*



*Knor. Verg. II. 27. t. 7. f.*

*Murr. Fund. Testac. t. 2. f. 22.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 8. f.*

N. III. Margine crenato, apicibus recuruatis. N. III. Mit gekerbtem Rande, und eingerollten Spizen.

N. III. I. Arca anti-quata.

N. III. I. Die Bastart-arche.

*Linn. S. N. Sp. 174.*

*Belg. Maagt Bloem. Rumph. Angl. Virgin Ark. Petiv. Gall. Coeur en Arche de Noc. Favart.*

Testa oblique cordata, sulcato striata, area cardinis rhomboidali, antrorsum elongata.

Die Schale ist schiefherzförmig, mit gestreiften Furchen besetzt, die Angelfläche rautenförmig, vorne lang zugespitzt.

<sup>a</sup> Testa transversim striata, antrorsum angulata, compressa, area cardinis plana.

<sup>a</sup> Die Schale ist über die Quere gestreift, vorne eckig und zusammengedrückt. Die Angelfläche eben.

*Bonon. Recr. cl. 2. f. 73.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 70.*

*Gualt. Test. t. 87. f. B.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 3. 4. f.*



- β Testa costis decussatim striatis, β Die Ribben sind kreuzweise ge-  
 antice subexcurrente, rotundata, streift, der Vorderrand ist etwas  
 area introrsum declivi. verlängert und rundlicht, die  
 Schloßfläche g-gen die Mitte ab-  
 hängig.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 65.*

*Rumph. amb. t. 44. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 87. f. A. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 18. f. 8.*

*Murray. Fund. Testac. t. 2. f. 15.*

*Mart. Berl. Beschaeft. III. 6. t. II. f.*

N. III. 2. Arca rhom-  
 bea.

N. III. 2. Das Rau-  
 tenförbchen.

Testa cordata, multifulcata, costis mediis transuersim striatis, apicibus incuruatis remotis, area cardinis rhombea. Die herzförmige Schale hat viele Furchen, die Ribben sind in die Quere gestreift, die Spitzen einwärts gerollt, und die Angelsfläche rautenförmig.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 75.*

*Knor. Vergn. IV. 14. t. 2. f.*

Testa cordata, aequivaluis, longitudinaliter sulcata, costis 26. inter- Die Schale ist herzförmig, gleich-  
 clappig, nach der Länge gefurchet,  
 termediis transuersim striatis. Api- mit 26. Ribben, davon die mittlere  
 ces incuruato recurui, remoti. Area ren in die Quere gestreift sind.  
 inter-





interjecta plana, vere rhombea, lineis incilis rhomborum concentricorum figuram exacte referentibus; ligamentum membranaceum aream obtegens, incituras lineares explens. Sutura cardinis intus armata dentibus minutis, diagonalem areae majorem constituit.

Die Spitzen sind einwärts gerollt, etwas zurückgekrümmt, und von einander entfernt. Die dazwischen liegende Angelsfläche ist genau rautenförmig, auf welcher gleichfalls rautenförmige in einander liegende Linien ausgeschnitten sind. Das häutige Band bedeckt die ganze Angelsfläche und versenket sich in die ausgeschnittenen Rautenlinien. Die Naht des Angels bildet die größere Diagonallinie, und ist inwendig mit einer Reihe kleiner Zähne besetzt.

N. III. 3. Arca decussata.

N. III. 3. Die gefleckte Ruchenmuschel.

Linn. S. N. 177.

Gall. Furie flamboyante; Favart.

Testa orbiculari conuexa, glabra, sulcis longitudinalibus, striisque transversis obsoletis, fusco maculata, apicibus incurvis, limbo acute crenato.

Die Schale ist rund und gewölbt, glänzend, mit schwarzen Furchen der Länge nach, und feinen Streifen über die Quere besetzt; auf der Oberfläche braun gefleckt. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt. Der innere Rand hat scharfe Kerben.

Habitus A. pilosae, cujus forte varietas.

Sie hat die Gestalt der Samtmuschel, davon sie vielleicht eine Abänderung ist.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 82.

Bonan. Rœr. cl. 2. f. 60.

Knor.



*Knor. Vergn. VI. 14. t. 4. f.*

N. IV. Margine crenato, apicibus inflexis. N. IV. Mit gekerbten Rande und einwärts gekrümmten Spizen.

N. IV. 1. Arca Pectunculus.

N. IV. 1. Die gestrahlte Kuchenschel.

*Linn. S. N. Sp. 180.*

Belg. Geribde Poffer - doublet. Mus. Leers. Gall. Petoncle sans oreilles. Dav. Angl. Spotted Ark.

Testa orbiculari, complanata, sulcata, radiata, transuersim rugosa, apicibus incuruis, area decliui lanceolata, limbo plicato.

Die Schale ist rund und etwas platt, mit strahligen Furchen und nach der Quere laufenden Rinzelsstreifen. Die Spizen sind einwärts gekrümmt, die Angelfläche schmal, gegen die Mitte abhângig; der innere Rand gefalten.

*Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 129.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 73.*

*Knor. Vergn. V. 12. t. 4. f.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 3, 4. f.*

N. IV. 2. Arca pilosa.

N. IV. 2. Die Sammtmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 182.*

Belg. See Noot. Angl. Cockle with heavy streaks. Petiv. Gall. Noix de Mer Argeny. Ital. Musculo hirsuto. Mus. Moscard,

Testa



Testa rotunda, umbonata, longitudinaliter tenuissime striata, apicibus incuruis, limbo crenato.

Die Schale ist rund, bauchig, der Länge nach sehr feinst gestreift, die Spizen einwärts gekrümmt, der innere Rand gekerbet.

α holosericea, fusca.

α mit sammtartigen Ueberzug, von brauner Farbe.

β glabra, fulva.

β mit glatter gelbbrauner Schale.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 80.

Petiv. Gaz. t. 95. f. 7.; t. 74. f. 7.

Gualt. Test. t. 73. f. A.

Knor. Vergn. VI. 12. t. 4. f.

Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 1. f.

N. IV. 3. Arca scripta.

N. IV. 3. Die gezeichnete Kuchenmuschel.

Testa orbiculari convexa laevi, lineis angulatis fulvis picta, apicibus incuruis, limbo crenato.

Die Schale ist rund und gewölbt, von glatter, und mit gelbbraunen Winkelförmigen bemahlter Oberfläche. Die Spizen sind einwärts gekrümmt, der innere Rand gekerbet.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 80.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa



Testa conuexa laevis, striis longitudinalibus tenuissimis, ut in A. pilosa, cujus forte varietas est. Area declivis, angustata; Cardo rectus linearis. Dentes intus 20 in arcum digesti, extimi utrinque crassiores. Ambitus orbicularis. Limbus crenatus.

Die Schale ist gewölbt, und der Länge nach wie die Sammtmuschel, davon sie vielleicht eine Abänderung ist, sehr zart gestreift. Die Schloßfläche ist einwärts abhängig, und schmal. Die Schloßlinie gerade. Inner derselben stehen 20 Zähne in bogenförmiger Stellung. Der Umfang ist zirkelrund. Der innere Rand gekerbt.

## O. Ostrea.

## O. Die Muschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 313.

Testa bivalvis; subaurita; Cardo edentulus, fossula media excavata ovali, striis lateralibus transversis.

Die zweyflappige Schale ist einigermaßen gekrümmt. Das Schloß ist ohne Zahn, in der Mitte mit einem ausgehohlten schalenförmigen Grübchen, an den Seiten mit Querstreifen versehen.

O. I. Pectines auricularis aequalibus.

O. I. Kammuscheln mit gleichseitigen Ohren.

O. I. I. Ostrea maxima.

O. I. I. Die Pilgrimsmuschel.

Linn. S. N. Sp. 185.

Belg.



*Belg.* St. Jacobs Schulp. *Rumph.* *Angl.* St. James Shell. *Gall.*  
*Conque de St. Jacques bariolée.* *Argenv.* *Ital.* Capa santa.

Testa inaequivalui , radiis Die ungleichseitige Schale  
 roduntatis , longitudinaliter hat rundliche nach der Länge  
 striatis, gestreifte Schalen.

*List. angl. t. 5. f. 29.*

— *Hist. Conch. l. 3. f. 163.*

*Gualt. Test. t. 98. f. A. B.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 19. f.*

*Knor. Vergn. I. 14. t. 1, 2. f.*

— — II. 14. t. 1. f

O. I. 2. Ostrea Jaco- O. I. 2. Die Jakobs-  
 baea. muschel.

*Linn. S. N. Sp. 186.*

*Belg.* Spaansche St. Jacobs deubler. *Gall.* Coquille de St. Jacques  
 d' Espagne.

Testa inaequivalui , radiis Die ungleichklappige Scha-  
 rectangulis , longitudinaliter le hat geradwinklichte, nach  
 sulcatis. der Länge gefurchte Strahlen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 3, 4.*

*Gualt. Test. t. 99. f. B.*

*Ginan. adr. II. 1. 16. f. 123.*

F

Regenf.



*Regenf. Samml. I. 7. t. 3. f.*

*Knor. Vergn. VI. 38. t. I. f.*

O. I. 3. Ostrea Ziczac.

O. I. 3. Die Neptuns-  
dose.

*Linn. S. N. Sp. 187.*

*Belg. Joppe doublet.*

Testa inaequali, radiis (18) complanatis, plicis le hat (18) plattgedrückte  
intus prope limbum duplica- Strahlen, mit gedoppelten Fal-  
tis. ten am inneren Rand.

*Regenf. Samml. I. 11. t. 53. f.*

*Knor. Vergn. II. 19. t. 3. f. 20. t. I. f.*

O. I. 4. Ostrea Pleu-  
ronectes.

O. I. 4. Die Kompass-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 190.*

*Belg. Kompass - Schulp. Angl. The thin Scallop. Hill. Gall. L'Euen-  
tail. Dav.*

Testa aequali orbiculata Die gleichklappige scheibens-  
laevi, radiis internis (24) runde glatte Schale, hat inne-  
geminatis. wendig (24) gepaarte Strah-  
len.

Color operculi rufus, fornicis Der Deckel ist braunroth; die ge-  
albus. wölbte Klappe weiß.

*Rumph.*





*Rumph. amb. t. 45. f. A. B.*

*Petiv. Gaz. t. 49. f. 13.*

—— *amboin. t. 17. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 73. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. G.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 9. f. 30.*

*Hill. Hist of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 20. t. 3. 4. f.*

O. I. 5. Ostrea Radula. O. I. 5. Die Jägertasche.

*Linn. S. N. Sp. 191.*

*Belg. Jaegers Weytsch. Angl. Common Amboina Scallop. Petiv. Gall. Gibeciere en Manteau.*

Testa subaequali ovali, Die einigermaßen gleichklappe  
radiis (12) convexus decus- pige eysförmige Schale hat  
satina striatis, auriculis aequa- (12) erhabene kreuzweis ge-  
libus, streifte Strahlen, und gleich-  
große Ohren.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 44. f. A.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 1.*

*Knor. Vergn. V. 9. t. 4. f.*



O. I. 6. Ostrea Plica.

O. I. 6. Der gewölkt  
Mantel.

Linn. S. N. Sp. 192.

Angl. The little yellow Scallop. Hill.

Testa aequivalui glabra, Die gleichklappige glatt  
radiis (6) conuexis glabris, Schale hat (6) erhabene Kreuz-  
decussatim striatis. weis gestreifte Strahlen.

Rumph. amb. t. 44. f. O.

Argenv. Conch. Pl. 24. f. C.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. V. 10. t. 5. 6. f.

O. II. Pectines auriculis inaequa-  
libus, altera excisa, scabra.

O. II. Rammuschel mit unglei-  
chen Ohren, deren eines ausge-  
schnitten und raub ist.

O. II. 1. Ostrea Pallium.

O. II. 1. Der Königs-  
mantel.

Linn. S. N. Sp. 193.

Belg. Königs-Mantel. Angl. The Ducal Mantle Scallop. Gall.  
Manteau ducal.

Testa aequivalui rotundata,  
radiis 12. obtusis striata, squa-  
misque imbricata.

Die gleichklappige rundliche  
Schale hat 12. stumpfe, ge-  
streifte, und mit ziegelförmig-  
gen Schuppen bedeckte Strah-  
len.

Rumph.



*Rumph. amb. t. 44. f. B. C.*  
*Gualt. Test. t. 71. f. F.*  
*Argenv. Conch. Pl. 24. f. 7*  
*Regenf. Samml. I. 6. t. 59. f.*  
*Knor. Vergn. I. 19. t. 2. f.*  
 ——— II. 21. t. 1, 2. f.  
 ——— V. 27. t. 2. f.  
*Da Cost. Elem. 6. Pl. 1. f.*

O. II. 2. *Ostrea nodosa.* O. II. 2. Die Korallen-  
 muschel.

*Linn. S. N. Sp. 194.*

*Belg.* Koraal - doublet. *Rumph. Gall. La Coralline.* *Dav. Angl.*  
 The Coral Scallop. *Hill.*

*Testa aequivalui, radiis* Die Strahlen der gleichklap-  
*convexis, sulcatis, nodoso* pigen Schale sind erhaben, ge-  
*articulatis.* streifet, und mit knotigen Bu-  
 cheln unterbrochen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 24.*  
*Bonan. Recr. cl. 2. f. 18.*  
*Rumph. amb. t. 48. f. 8.*  
*Gualt. Test. t. 91. f. C. D.*  
*Argenv. Conch. Pl. 24. f. F.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. IV. 13. t. 5. f.

Spengl. berlin. Beschæft. II. 13. t. 12. f.

O. II. 3. Ostrea elongata.

O. II. 3. Der lange Mantel.

Testa ovato elongata, longitudinaliter striata, radiis (8) transuersim rugosis, auricula altera minima.

Die eysförmige verlängerte und der Länge nach gestreifte Schale hat (8) in die Quere gerunzelte Strahlen, und ein sehr kleines Ohr.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata, elongata, planiuscula subpellucida; striae eleuatae longitudinales; costae 8. transuersim rugosae. Margo repandus plicatus. Auriculae inaequales supra muricatae, altera minima. Color pallide incarnatus.

Die Schale ist eysförmig, verlängert, flach und halb durchsichtig. Nach der Länge laufen erhabene Streifen. Die acht Rippen sind runzelicht. Der Rand ist ausgeschwemmt und gefalten. Die ungleichen Ohren, deren eines sehr klein ist, sind oben raub. Von blasser fleischrother Farbe.

O. II. 4. Ostrea sulcata.

O. II. 4. Der gefurchte Mantel.

Testa aequiualui rotundata, longitudinaliter striata, radiis

Die gleichklappige rundliche Schale ist nach der Länge ges



(12), auriculis subaequalibus. streifet, mit (12.) strahligen Ribben und einigermaßen ungleichen Ohren versehen.

α albo fuscoque maculata,

α Weiß und braun gefleckt,

β tota flava.

β ganz gelb.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subpellucida rotundata, connexa, aequivalvis, striis arctis longitudinalibus; Costis duodecim radiatis. Auriculæ fere aequales latæ.

Die Schale ist rundlich, bündig und halb durchsichtig; die Klappen von gleicher Größe, mit gedrängten nach der Länge laufenden Streifen besetzt. Die Ohren sind bet nahe gleich und breit.

O. II. 5. Ostrea cinna-  
barina.

O. II. 5. Der bandir-  
te Mantel.

Belg. Gebänderde Mantel. Gall. Manteau bandé.

Testa aequivalvi, radiis numerosis inaequalibus, transversim rugulosis.

Die gleichklappige Schale ist mit sehr vielen ungleichen, und in die Quere gestreiften Strahlen versehen.

Gualt. Test. t. 73. f. C.

Regenf. Samml. I. 3. t. 36. f. 4. t. 38. f.

Knor. Vergn. V. 15. t. 1. f.



Testa rotundata, magna, conuexiuscula, aequivaluis, longitudinaliter multisulcata; Radii numerosi inaequales, striis transversis undulatis decussati; Auricula altera latior, antice excisa, margine ciliato. Color extus cinnabarinus, cingulis aliquot pallidis.

Die rundliche große, etwas bäuchige und gleichklappige Schale ist der Länge nach gefurchet. Die bäuchigen Strahlen sind ungleich, und mit wellenförmigen Querstreichen durchkreuzet. Ein Ohr ist breiter, vorne ausgeschnitten, und am Rande rau. Die ganze Schale ist auswendig zinnoberroth mit bloßen Querstreifen.

O. II. 6. Ostrea miniata.

O. II. 6. Der menningrothe Mantel.

Testa inaequivalui multistriata scabra, auriculis subaequalibus.

Die ungleichklappige Schale hat sehr viele raue Streife, und beinahe gleiche Ohren.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa rotundata, striis longitudinalibus numerosis muricatis. Valvae inaequales, altera plana, altera conuexa, excrescentiis transversis lameloso laceris. Auriculae subaequales, altera excisa margine ciliato. Color albus maculis confluentibus miniatis.

Die rundliche Schale ist der Länge nach mit rauhen Streifen versehen. Die Klappen sind ungleich, deren eine flach, die andere erhaben, und in die Quere mit krausen Blättern besetzt ist. Die Ohren sind beinahe gleich, eines ausgeschnitten, und am Rande rau. Die Farbe ist weiß mit zusammenfließenden menningfarbigen Flecken.

O. II. 7. Ostrea varia.

O. II. 7. Der bunte Mantel.

Linn.





*Linn. S. N. Sp. 199.*

*Belg. Gellipelte Mantel. Gall. Manteau pointillé.*

*Testa aequalivalvi, radiis (30) fabris, auricula altera minima.* Die gleichklappige Schale hat (30) rauhe Strahlen, und ein sehr kleines Ohr.

*α cinnabarina, maculis albidis violaceisque.* α zinnoberfarbig mit weißen und violeten Flecken.

*Knor. Vergn. V. 13. t. 2. f.*

*♂ atro violacea.*

♂ schwarz violet.

*γ alba nebulis violaceis.*

γ weiß mit violeten Flecken.

*δ lutescens, fuscoque varia.*

δ gelblich, und braun gefleckt.

*Gualt. Test. t. 74. f. R.*

*Knor. Vergn. II. 18. t. 3. f.*

— — V. 11. t. 3. f.

*O. II. 8. Ostrea glabra.* O. II. 8. Der glatte Mantel.

*Linn. S. N. Sp. 201.*

*Testa aequalivalvi, radiis (10) laevibus planiusculis, striis internis elevatis, duplicatis.* Die gleichklappige Schale hat (10) glatte etwas flache Strahlen, und innwändig erhabene gedoppelte Streifen.

F 5

α flava

90

$\alpha$  flava.

$\beta$  nigra.



$\alpha$  gelb.

$\beta$  schwarz.

Gualt. Test. t. 73. f. H.

Regenf. Samml. I. 1. t. 10. f.; 8. t. 15. f.

Knor. Vergn. I. 8. t. 5. f.

O. III. 9. Ostrea maculata.

O. III. 9. Der gefleckte Mantel.

Testa aequivalui, longitudinaliter striata, radiis (10) conuexis.

Die gleichklappige Schale ist nach der Länge gestreift, und mit (10) erhabenen Strahlen versehen.

Regenf. Samml. I. 3. t. 30. 31. f.

Knor. Vergn. II. 18. t. 5. f.

Testa aequivaluis conuexa glabra, longitudinaliter striata; Costae (10) conuexae. Auriculae subaequales. Color supra ex albo fuscoque nebulosus.

Die gleichklappige bäumige glatte Schale ist der Länge nach gestreift. Die (10) Strahlrippen sind erhaben. Die Ohren fast gleich. Die Karbe ist weiß, und braun welllicht.

O. II. 10. Ostrea coarctata.

O. II. 10. Das Schüsselfchen.

Testa conuexa glabra, radiis (6) conuexis, margine coarctato.

Die bäumige glatte Schale hat (6) erhabene Strahlen und einen eingesakten Rand.

Val-



*Valva solitaria.*

Eine einzelne Klappe.

*Knor. Vergn. II. 21. r. 5. f.*

Testa convexa tenuis glabra, longitudinaliter obsolete striata. Radii (6) convexi crassi. Margo deorsum flexus undique coarctatus; Limbus crenulatus. Auriculae inaequales; hinc distincta ab *O. Plica*.

Die häuchige dünne glatte Schale ist der Länge nach mit matten Streifen versehen. Die (6) Strahlen sind erhaben und dick. Der Rand ist mit einer Stulpe eingefast und innwändig gekerbt. Die Ohren sind ungleich, wodurch sich diese Art von dem gewölkten Mantel unterscheidet.

*O. II. 11. Ostrea solitaria.*

*O. II. 11. Der goldgelbe Mantel.*

Testa rotundata glabra, radiis (20) convexis, sulcis longitudinaliter striatis.

Die rundliche glatte Schale hat (20) erhabene Strahlen, und nach der Länge gestreifte Zwischenfurchen.

*Valva solitaria.*

Eine einzelne Klappe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

*Valva complanata rotundata, radiis (20) convexis laevibus, sulcis intermediis obsolete striatis. Auriculae subaequales? Color vividissimus aurantiacus.*

Die Klappe ist rund und flach gedrückt, die (20) Strahlen sind erhaben und glatt. Die Zwischenfurchen matt gestreift. Die Ohren etwas ungleich. Die Farbe ist ein lebhaftes goldgelb.

*O. II. 12. Ostrea opercularis.*

*O. II. 12. Die scharfrübbige Kammuschel.*

*Linn.*



Linn. S. N. Sp. 136. 202.

Belg. Oranje Mantel. Gall. Manteau d'Orange.

Testa rotundata, radiis (20) Die rundliche Schale hat  
carinatis, decussatim striato (20) kesselförmige, und durch  
scabra, operculo conuexiore. Querstreife durchkreuzte Strah-  
len; und einen etwas bäuchig-  
gen Deckel.

Knor. Vergn. II. 3. t. 2. 3. f.

Regenf. Samml. I. 2. t. 17. f.

O. II. 13. Ostrea Nu-  
cleus.

O. II. 13. Der Stein-  
fern.

Testa aequivalui, radiis (20) Die gleichklappige, beider-  
conuexis glabris, valua utra- seits bäuchige Schale hat (20)  
que conuexa. erhabene glatte Rippen.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa rotunda aequivaluis costis Die rundliche gleichklappige Schale  
elevatis (20), sulcis intermediis hat (20) erhabene Strahlrippen,  
latis transverse sulcatis. Auriculae und breite nach der Quere gestreifte  
subaequales. Valua utraque umbo- Zwischenfurchen. Die Ohren sind  
nata, albo fuscoque nebulosa. beinahe gleich. Beide Klappen  
bäuchig, von weiß und braun ge-  
wölfter Farbe.

O. II. 14.



O. II. 14. *Ostrea gibba*.

O. II. Die gewölbte Dose.

*Linn. S. N. Sp. 203.*

*Belg. Adama Doublet.*

Testa aequivalui, radiis (24) subangulatis, sulcis intermediis decussatim striatis, valua utraque conuexa.

Die gleichklappige, beiderseits bänchige Schale hat (24) einigermassen eckige Strahlen, die mit Querstreifen durchkreuzet sind.

*Brown. Hist. of. Fam. t. 40. f. 10.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 16. f.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.*

— — — II. 5. t. 4. f.

O. II. 15. *Ostrea pyxidata*.

O. II. 15. Die gefurchte Dose.

Testa inaequivalui, radiis (32) conuexis laevis. Valua altera plana.

Die Schale, welche aus einer bänchigen, und einer flachen Klappe bestehet, hat (32) erhabene glatte Strahlen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, radiis (32) conuexis laevis. Valua una plana, altera conuexa, prope auriculam excisam ciliata. Color albus, fusco carneque variegatus.

Die ründliche Schale hat (32) erhabene glatte Strahlen. Eine Klappe ist flach, die andere bänchig und nächst dem ausgeschnittenen Ohre rauh. Weiß mit fleischrothen Flecken.

O. II.

O. II. 16. Ostrea undata.

O. II. 16. Die wellenförmige Tasche.

Testa aequivalui ovata, radiis (18) convexus, sulcis transuersim striatis.

Die gleichklappige Schale hat (18) erhabene Strahlen, mit nach der Quere gestreiften Zwischenfurchen.

Knor. Vergn. II. 4. t. 2. 3. f.

Valvae solitariae ovatae, radiis (18 - 20) convexus glabris, striis transuersis intercostalibus. Color albus, maculis transuersis undatis sulcis.

Die einzelnen Klappen haben (18 - 20) erhabene Strahlen, und in die Quere gestreifte Zwischenfurchen. Die Farbe ist weiß mit wellenförmigen braunen Querstreifen.

O. III. Pectines cardine subobliquo, auricularis breuibus, acutis.

O. III. Kammuscheln mit etwas schiefen Schloße, und kurzen spitzigen Ohren.

O. III. 1. Ostrea fasciata.

O. III. 1. Die Eismuschel.

Linn. S. N. Sp. 204.

Testa aequivalui gibba, radiis (20) tenuibus scabris, cardine obliquo, auriculis acutis.

Die gleichklappige höckerige Schale hat (20) dünne rauhe Strahlen, ein schiefes Schloß, und spitzige Ohren.

Gualt.



*Gualt. Test. t. 74. f. E. E. ?*

*Mus. Caes. Vindoben.*

O. III. 2. Ostrea Lima, O. III. 2. Die Feile.

*Linn. S. N. 206.*

*Belg. Rasp. Doubler. Rumph. Angl. Grater Scallop. Petiv. Gall. Ratifsoir. Argenv.*

*Testa aequivalui, antice com-* Die gleichklappige vorne  
*planata, radiis (22) forni-* flachgedrückte Schale hat (22)  
*cato squamosis, cardine ob-* mit rinnenförmigen Schuppen  
*liquo, auriculis inaequalibus.* besetzte Strahlen, ein schiefes  
Schloß, und ungleiche Ohren.

*List. Hist. Conch. t. 3. f. 14.*

*Rumph. amb. t. 44. f. D.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. E.*

*Knor. Vergn. VI. 34. t. 3. f.*

O. III. 3. Ostrea bul- O. III. 3. Die Blä-  
lata, sentasche.

*Testa ovata aequivalui um-* Die gleichklappige eiförmige  
*bonata, sulcis longitudinali-* ge bäuchige Schale hat (22)  
*bus (32); cardine transuer-* nach der Länge laufende Fura-  
*so, auriculis aequalibus.* chen, einen schiefen Rand, und  
gleiche Ohren.

*Mus.*



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa oblongo ovata, tumida, Die eysförmig längliche aufgeblä-  
sulcis (32) longitudinalibus. Um- sene Schale hat (32) nach der  
bones attenuati in apices breves re- Länge laufende Furchen. Die Wül-  
curuos. Cardo transuersus. La- bungen verdünnen sich in kurze,  
euna media lata. Auriculae utrin- rückwärts gekrümmte Spizen. Das  
que acutae aequales, Color albus. Schloß steht schief. Die Höhlung  
in der Mitte derselben ist breit.  
Die Ohren sind spizig, und einan-  
der gleich. Von weißer Farbe.

O. III. 4. Ostra scabra. O. III. 4. Die rauhe  
Tasche.

Testa ovata complanata, Die eysförmige zusammen-  
striis longitudinalibus deorsum gedrückte Schale hat nach der  
scabris, auriculis inaequali- Länge laufende abwärts rauhe  
bus, altera emarginata. Strahlen, und ungleiche Oh-  
ren, deren eines eingesäumt ist.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 13.*

*Knor. Vergn. VI. 38. t. 5. f.*

Testa ovata compressa; striae lon- Die eysförmige zusammenge-  
gitudinales numerosae, deorsum drückte Schale ist nach der Länge mit sehr  
ad tactum scabrae. Cardo subobli- vielen Runzeln besetzt, und hinab-  
quus. Auriculae inaequales, mino- wärts rauh anzufühlen. Das Schloß  
re emarginata, inter quas testa steht etwas schief. Die Ohren sind  
hiat. Color niveus. ungleich, deren kleineres eingesäu-  
met ist, zwischen welchen die Scha-  
le klapet. Von schneeweißter Farbe.

O. IV.



O. IV. Rudes. Ostreac,

O. IV. Raube, eigentliche Auster.

O. IV. 1. Ostrea Mal-  
leus.

O. IV. 1. Der polni-  
sche Hammer.

Linn. S. N. Sp. 207.

Belg. Mes hamer. Rumph. Angl. The Hammer - Oyster. Hill. Gall.  
Le Marteau. Dav.

Testa rudi flexuosa trilo-  
ba, lobis transuersis opposi-  
tis,

Die raube gedrehte Schal-  
le besteht aus drey Lappen, des-  
sen zweien einander entgegen  
gesetzt sind.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 54.

Rumph. amb. t. 47. f. A.

Petiv. amb. t. 20. f. 10.

Gualt. Test. t. 96. f. D. E.

Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 14.

Seb. Thes. III. t. 91. f. 4. 5. t. 93. f. 12.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Argenv. Conch. Pl. 19. f. H.

Knor. Vergn. III. 4. t. 1. f.

Müll. Linn. Naturfyst. VI. 1. B. 2. t. 2. f.

O. IV. 2. Ostrea Fo-  
lium.

O. IV. Das Lorbeer-  
blatt.

Linn. S. N. Sp. 209.

Belg. Laurier-blad. Angl. The tree Oyster. Hill. Gall. La Feuille  
du Laurier.

G

Testa



Testa ouata, margine obtu-  
se plicato, valvae planioris  
rachi spinosa amplexicauli.

Die eyrunde am Rande  
stumpf gefaltene Schale hat  
an der flächeren Klappe eine  
stachlichte klauenförmige Mittel-  
ribbe.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 32.*

*Rumph. amb. t. 47. f. A.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 1.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 22.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 2. f.*

O. IV. 3. Ostrea cri-  
stata.

O. IV. 3. Die Kamme-  
auster.

Testa rotundata, lamellis im-  
bricatis, margine obtuse pli-  
cato, dentato, apice altero  
porrecto.

Die rundliche Schale ist  
mit Blättchen ziegelförmig bes-  
etzt, am Rande stumpf, und  
zahnförmig gefalten. Eine  
Schloßspitze raget hervor.

*Gualt. Test. t. 104. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa inaequalius membran-  
is imbricatis rugosis. Margo repa-  
ndus, obtuse plicato dentatus. Apex  
valvae alterius parvior longior,  
prominens. Cardinis tendo me-  
dius latus conicus. Color albus, ma-  
culis dispersis nigris.

Die Schale welche aus unglei-  
chen Klappen bestehet, ist mit run-  
zelichten Blättern ziegelförmig bes-  
etzt. Der Rand ausgeschweifet,  
mit stumpfen zahnförmigen ineinan-  
der beißenden Falten. Die Spitze  
der aufstehenden Schale ist verlän-  
gert, und in die Höhe gestreckt.  
In der Mitte des Schloßes ist ein  
breiter kegelförmiger Knorpel. Die  
Farbe ist weiß mit zerstreuten  
schwarzen Flecken.

O. IV. 4.



O. IV. 4. *Ostrea edulis*. O. IV. 4. Die gemei-  
ne Auster.

*Linn. S. N. Sp.* 211.

*Belg.* Oester. *Angl.* Oyster. *Gall.* Huitre. *Ital.* Ostrea. *Gin.*

*Testa* subrotunda complana- Die rundliche plattgedrückte  
ta, membranis undulatis im- Schale ist mit runzelichten  
bricata, valvula altera plana Blättern ziegelförmig bedeckt;  
integerrima. mit ganzem Rande an der fla-  
chen Klappe.

*List. angl. t.* 4. f. 21.

*Bonap. Recr. cl.* 2. f. 70.

*List. Hist. Conch. l.* 3. f. 195. 196.

*Gualt. Test. t.* 102. f. B.

*Klein. Meth. Ostrac. t.* 8. f. 21.

*Ginan. adr. II. t.* 18. f. 127.

*Brst. subf. I. t.* 8. f. 12.

*Knor. Vergn. III. 24. t.* 2. f. 25. t. 2. f.

O. IV. 5. *Ostrea denti-* O. IV. 5. Die gezäh-  
culata. nelte Auster.

*Testa* rotundata foliacea, Die rundliche blätterige  
valva altera plana parasitica, Schale hat eine flache aufstü-  
cardine utrinque denticulato. zende Klappe, und an beiden  
Seiten des Schloßes kleine  
Zähnen.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa inaequivalvis, valva altera convexa subovata glabra, altera explanata, rotunda, majore, parasitica. Cartilago latissimus nitidus, Latera postica utrinque acute denticulata, inferenda foucolis testae oppositae.

Die Klappen der Schale sind ungleich, deren eine etwas bäuchig eiförmig und glatt, die andere aber, welche aufsteht, ist flachgedrückt, rundlich und größer. Der Knorpel ist sehr breit und glänzend. An den Seiten des Schloßes ist beiderseits eine Reihe kleiner spitziger Zähne, die in die Grübchen der entgegen gesetzten Schale einbeissen.

O. IV. 6. *Ostrea cucullata.*

O. IV. 6. Die Runzelschappe.

Testa inaequivalvi plicato rugosa, margine dentato, intus striato; valva majore cucullata.

Die ungleiche Schale ist gefalten, und runzelicht, der Rand gezähnt, und innwändig gestreift, die größere Klappe kappenförmig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa solida ponderosa, plicis longitudinalibus, rugisque transuersis inaequalis. Valvae inaequales; altera cucullata, rudi, apice porrecto, postice longitudinaliter secundo; altera minore plana. Margo utriusque obtuse dentatus. Limbus striis distantibus elevatis geminis. Color extus atro violaceus.

Die dicke schwere Schale ist der Länge nach mit breiten Falten, und in die Quere mit Runzeln besetzt. Die Klappen sind ungleich, die eine kappenförmig, rauh, mit hervorstechender stumpfen Spitze, die hinten flach abgeschnitten ist; die andere ist kleiner und flach. Der Rand beider Klappen hat stumpfe Zähne. Am Innerrande sind erhabene paarweis stehende Streifen. Die Farbe ist auswändig dunkelviolett.

O. IV.





O. IV. 7. Ostrea Ephem-  
pium.

Ö. IV. 7. Der polni-  
sche Sattel.

Linn. S. N. Sp. 215.

Belg. Poolische Zadel. Angl. Flat Pearl Oyster. Petiv. Gall. Seile  
de Pologne.

Testa aequivalui rotundata  
compressa membranacea, car-  
dine transuersim sulcata.

Die rundliche glatt gedrückt-  
te häutige Schale hat gleiche  
Klappen, und ein in die Quere  
gefurchtes Schloß.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 62.

Rumph. amb. t. 47. f. B.

Petiv. amb. t. 20. f. 4.

Seb. Thes. t. 90. f. 10.

Knor. Vergn. VI, 21. t. 1. f.

Da Cost. Elem. Pl. 6. f. 6.

Müll. Linn. Naturfyst. VI. 1. B. 13. t. 1. f.

Mart. Berl. Beschaeft. III. 7. t. 22. f.

P. Anomia.

P. Die Bastardmu-  
schel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 314.



Testa inaequivalvis, val-  
ua altera planiuscula, car-  
dinis cicatricula lineari.

Die Schale hat unglei-  
che Klappen, deren eine  
etwas flach ist, und eine  
kleine linienförmige Narbe  
am Schlosse.

P. 1. Anomia Ehip-  
pium.

Linn. S. N. Sp. 218.

Gall. Pelure d'oignon. Argenv.

Testa suborbiculata rugoso  
plicata, valua planiore per-  
forata.

Die rundliche mit Runzeln  
und Falten besetzte Schale hat  
eine flache durchbohrte Klappe.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 38.

Argenv. Conch. Pl. 19. f. C.

Ginan. adr. II. t. 27. f. 172.

Müll. Linn. Naturf. VI. 1. B. 12. t. 3. f.

P. 2. Anomia Cepa.

P. 2. Die Zwibelschale.

Linn. S. N. Sp. 219.

Belg. Paarſche Bernſteen Oeſter. Gall. Huitre électrique.

Testa subrotunda amethy-  
stina, valua superiore conue-  
xa, inferiore perforata.

Die rundliche Schale ist  
amethystfärbig, ihre obere Klap-  
pe bäuchig, die untere durch-  
bohret.

Knor. Vergn. VI. 9. t. 5. f.

P. 3.



P. 3. *Anomia electrica*.

P. 3. Die Bernstein-  
auster.

*Linn. S. N. Sp. 220.*

*Belg.* Bernsteen - Oester.  
*Huitre d'ambre jaune.*

*Angl.* Small Amber Oyster. *Petiv. Gall.*

Testa subrotunda laevi fla-  
ua, valua altera conuexa  
gibbosa.

Die rundliche glatte gelbe  
Schale hat eine bäuchige hö-  
ckerige Klappe.

*Rumph. amb. t. 47. f. L.*

*Knor. Vergn. V. 25. t. 6. f.*

P. 4. *Anomia truncata*.

P. 4. Die gestumpfte  
Bastardmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 229.*

Testa suborbiculata, obsole-  
te striata, cardine truncato,  
limbo denticulato.

Die rundliche feingestreifte  
Schale ist am Schloße abge-  
stumpft, am inneren Rande  
aber gezähelt.

*List. angl. l. 9. f. 50.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

P. 5. *Anomia caput*  
*serpentis.*

P. 5. Der Schlangenz-  
kopf.

*Linn. S. N. Sp. 236.*

*Gall. Le scarabee Dar.*



Testa ovata striata, valvae  
alterius apice longiore perfo-  
rato, margine crenulato.

Die eysförmige gestreifte  
Schale hat an der einen Klap-  
pe eine längere durchbohrte  
Spize, und am Rande feine  
Kerben.

*Colum. purp. p. 22. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 96. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

P. 6. *Anomia vitrea.*

P. 6. Die Glasbohr-  
muschel.

*Gall. La Poullete. Dav.*

Testa ovata convexa laevi,  
valvae alterius apice incurva-  
to pertuso, margine integer-  
rimo.

Die eysförmige bäuchige glat-  
te Schale ist an der schnabel-  
förmigen Spize der einen Klap-  
pe durchbohret, und am Rande  
ganz.

Ob plicarum defectum à Tere-  
bratula Linnaei distinguenda.

Sie muß wegen ihrer ungefalt-  
ten Oberfläche von der Bohrmu-  
schel des Linne unterschieden werden.

*Argenv. Conch. Suppl. Pl. 3. f. E.*

*Knor. Vergn. IV. 30. t. 4. f.*

*Da Cost. Elem. 6. Pl. 3. f.*

Testa



Testa ovata laevis tenuissima, instar membranae pellucida. Valvae conuexa conuexae absque striis, aut plicis. Valva superior ovata, postice in apicem incurvata prominente & pertusum; Foramen repletum ligamento filiformi. Valva inferior rotunda, postice gerens callos. Margo tenuis, clausus, integerrimus, anticus retusus. Color albus.

Die Schale ist eysförmig glatt, von der Dünne einer feinen Haut, und durchsichtig. Beide Klappen sind bündig, ohne Streifen und Falten. Die obere ist eysförmig, und verlängert sich in eine gekrümmte oder schnabelförmige hervorstehende durchbohrte Spitze, in deren Oefnung sich ein fadenförmiges Band befindet. Die untere Klappe ist rund, und hinten mit zweien Schwellen versehen. Der Rand ist dünn, geschlossen, ganz, und vorne stumpf. Die ganze Schale weiß.

P. 7. Anomia Placenta.

P. 7. Die Fensterscheibe.

Linn. S. N. Sp. 241.

Belg. Transparent. Angl. The chinese pellucid Oyster. Du Cost. Gall. Vitre chinoise. Dav.

Testa orbiculata complanata foliacea, cardinum callis linearibus adnatis.

Die scheibenrunde plattgestrichelte schieferige Schale hat am Schlosse zwei wulstartige angewachsene Erhöhungen.

„ valvis planis.

„ mit flachen Klappen.

Gualt. Test. t. 104. f. B.

Seb. Thes. t. 90. f. 8, 9.

Knor. Vergn. II. 24. t. I. f.

Da Cost. Elem. 7. Pl. 13. F.



β valuis flexuoso bilobis.

β mit lappenförmig gefaltene Klappen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. Mytilus.

Q. Die Miesmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 315.*

Testa biualvis, cardinis linea excavata, longitudinali, edentula.

Die zweiflappige Schale hat am Schlosse einen vertieften langen Streif ohne Zahn.

Q. I. Parasitici, unguibus affixi.

Q. I. Angewachsene mittelst eines klauenförmigen Fortsatzes.

Q. I. r. Mytilus Crista Galli.

Q. I. r. Der Hahnenkamm.

*Linn. S. N. Sp. 243.*

Belg. Haanekam. Rumph. Angl. Curry Comb Oyster Pet. Gall. Oreille de Cochon. Dav.

Testa angulato plicata, dorso limboque punctato scabris, valua spinosa parasitica.

Die eckiggefaltene Schale ist auf dem Rücken und an dem inneren Rande mit erhabenen Punkten besetzt, und an einer Klappe stachelig und angewachsen.

Rumph.





*Rumph. amb. t. 47. f. D.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. D.*

*Gualt. Test. t. 104. f. C.*

*Knor. Verg. IV. 10. t. 3, 5. f.*

—— ——— *V. 16. t. 1. f.*

—— *Delic. nat. I. t. B. IV. f. 8.*

Q. I. 2. *Mytilus Hyo-*

Q. I. 2. Der Blätter-

ris.

famm.

*Linn. S. N. Sp. 244.*

*Belg. Getakte Haane Kam. Rumph. Angl. Great Finger Oyster.*  
*Pet. Gall Crete de Coq. Dav.*

*Testa plicata, transuerse rugosa, valuis fornicato spinosis, limbo laeui.* Die gefaltene und der Que-  
re nach runzelichte Schale ist  
auf beiden Klappen mit rin-  
nenförmigen Stacheln besetzt,  
und am inneren Rande glatt.

*Rumph. amb. t. 47. f. C.*

*Petiv. Gaz. t. 20. f. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. H.*

*Gualt. Test. t. 103.*

*Knor. Vergn. I. 29. t. 2. f.*

Q. I. 3.



Q. I. 3. *Mytilus Frons.* Q. I. 3. Das Kamm-  
blatt.

*Linn. S. N. Sp. 245,*

*Belg.* Gekamd Laurierblad, *Angl.* The Hogs Ear Oyster. *Hill.*  
*Gall.* La Feuille. *Dav.*

*Testa angulato plicata, val-* Die eckig gefaltene in die  
*uis transuersim rugosis, lim-* Quere, gerunzelte Schale ist  
*bo alterius punctato scabro.* am inneren Rande mit erha-  
benen Punkten versehen.

*Argenv. Conch. t. 19. f. D. ?*

*Gualt. Test. t. 104. f. D.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Kuor. Vergn. IV. 8. t. 3. f.*

Q. II. *Plani subauriti.*

Q. II. Platte, mit unvollkom-  
menen Ohren.

Q. II. 1. *Mytilus mar-* Q. II. 1. Die Perlmutter-  
*garitiferus.* ter.

*Linn. S. N. Sp. 246.*

*Belg.* Perle moer-Schulp. *Rumph.* *Angl.* Pearl Oyster. *Pet. Gall.*  
*Mere* Perle *Dav.*

*Testa compressa rotunda-* Die plattgedrückte rundliche  
*ta subaurita, tunicis membra-* und einigermaßen mit Ohren  
*naceis imbricata, cardine* versehene Schale ist mit ziegel-  
*transuersim elongato.* förmigen Blättern bedeckt,  
und mit einem in die Quere  
verlängerten Schlosse versehen.

Color



Color tunicarum sordide viridescens, radiis latis albis. Specimenis unius valua ponderosa crassa, spithamam diametro excedens, margaritam fouens adnatam praegrandem.

Die Farbe der Blätter ist schmutzgrün, mit breiten weißen Strahlen. Die Klappe eines Stückes ist schwer, dick, im Durchmesser mehr denn eine Spanne lang und enthält eine sehr große angewachsene Perle.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 1.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 56, 57, 58.*

*Rumph. amb.. t. 47. f. F.*

*Gualt. Test. t. 84. f. E. F. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 25. t. I. f.*

*Müll. linn. Naturf. VI. I. B. 13. t. 2, 3. f.*

Q. III. Ventricosiusculi.

Q. III. Eträs bäuchige.

Q. III. I. *Mytilus lithophagus.*

Q. III. I. Die Steinschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 248.*

*Belg. Steen Mossel. Angl. Stone Peirceer. Pet. Gall. La Datte. Dav.*

Testa subcilindrica, extremitatibus rotundatis, apicibus recurvis.

Die einigermaßen walzenförmige Schale hat rundliche Seitenende, und zurückgekrümmte Endspitzen.

Epidermis decidua, castanea, saepe transuersim striata.

Die Oberhaut fällt ab, ist von kastanienbrauner Farbe, und öfters in die Quere gestreift.

*List.*



*List. angl. t. 8. f. 37.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 46. f. F.*

*Petiv. amb. t. 19. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 90. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. L.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 2. *Mytilus exustus.*

Q. III. 2. Die geferbte  
Mießmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 251.*

Testa ovata, elongata, decussatim striata, limbo crenulato.

Die ensförmige verlängerte Schale ist in die Quere gestreift, und am Rande mit feinen Kerben versehen.

Color extus roseus.

Von rosenfarber Oberfläche.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 206.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 3. *Mytilus edulis.*

Q. III. 3. Die gemeine  
Mießmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 253.*

*Belg. Mossel. Gall. Moule. Ital. Musculo. Gin.*

Testa



Testa ovato trilatera laeui  
violacea, antice carinata,  
apicibus acuminatis, terminali-  
bus bidentatis.

Die eysförmige dreyseitige  
glatte Schale ist von viole-  
ter Farbe, vorne mit ei-  
ner kielförmigen Schneide, und  
an den Endspitzen mit zween  
Zähnen versehen.

α violacea, unicolor.

α violet, einfärbig.

β violacea, radiis rubris.

β violet, mit rothen Strahlen.

*List. angl.* l. 4. f. 28.

— *Hist. Conch.* l. 3. f. 200.

*Bonan. Recr. cl.* 2. f. 30.

*Gualt. Test. t.* 91. f. E.

*Ginan. adr.* II, t. 23. f. 168.

*Memoir. de Paris.* 1711. t. 3. f. 4, 5.

*Bast. Subf.* t. 11. f. 11.

*Regenf. Samml.* I. 12. t. 71. 72. f.

*Knor. Vergn.* IV. 15. t. 1. f.

Q. III. 4. *Mytilus pi-*  
*ctus.*

Q. III. 4. Die gefärbte  
Mießmuschel.

*Gall. Moule arborifée. Dav.*

Testa ovata trilatera, grisea,  
laeui, antice carinata, apici-  
bus acuminatis terminalibus,  
bidentatis.

Die eysförmige, dreyseitige,  
lichtgraue glatte Schale ist vor-  
ne mit einem kielförmigen Rande,  
und an den Endspitzen mit  
zween Zähnen versehen.

α grisea



α grisea, unicolor.

α lichtgrau, einsärbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β grisea, lineis angulatis rufis.

β lichtgrau, mit rothbraunen Winkelzügen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

γ ex luteo virens, maculis lacte viridibus, lineis angulatis rufis.

γ gelblich grün, mit hellgrünen Flecken, und rothbraunen Winkelzügen.

*Knor. Vergn. IV. 15. t. 5. f.*

Testa ovato elongata laevis, antice carinata, postice complanata hians, ideoque trilatera, Apices terminales acuminati, dentibus duobus acutis validis, mutuo insertis, extus conspicuis. Cavitas variegante nitore replendens. Priori similis, qua tamen gracilior, colore insuper dentiumque structura praecipue distinguitur.

Die eiförmige verlängerte glatte Schale ist vorne keilförmig erhoben, hinten flachgedrückt klappend, und daher dreiseitig. Die Spitzen stehen an einem verdünnten Ende, wo sich zwei starke spitzige von außen sichtbare Zähne befinden. Die Höhlung hat einen bunten Glanz. Diese Art ist der vorigen ähnlich, aber schwächer, und weicht davon durch die Verschiedenheit der Farbe und der Zähne vorzüglich ab.

Q. III. 5. *Mytilus unguicularis*.

Q. III. 5. Die Klauenmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 254.*

Belg.





Belg. De breede purpuragtige Mossel.

Testa ouato elongata lae- Die eysförmige verlängerte  
ui, valuis conuexis postice glatte Schale hat bäuchige hin-  
incuruatis, extremitatibus at- ten eingebogene Klappen; und  
tenuatis, denticulatis. zugespitzte gezähnelte Ende.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 201.

Gualt. Test. t. 91. f. E.

Regenf. Samml. I. 4. t. 47. f.

Q. III. 6. Mytilus bi-  
dens.

Q. III. 6. Die geribbte  
Mießmuschel.

Linn. S. N. Sp. 255.

Angl. Deep furrowed Cape Muscle, Petiv. Gall. Gueule de Sou-  
ris. Dav.

Testa ouato elongata, lon- Die eysförmige verlängerte  
gitudinaliter sulcata, apicibus nach der Länge gefurchte Scha-  
terminalibus dentatis. le hat gezähnelte Endespitzen.

Petiv. Gaz. t. 57. f. 9.

Knor. Vergn. IV. 30. t. 3. f.

Q. III. 7. Mytilus Mo-  
diolus.

Q. III. 7. Die Papyrus-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 256.



Belg. Zand Mossel. Angl. The Caroline Muscle Hill. Gall. Moule de la terre des Papous. Dav.

Testa ovato elongata laevi, Die eyrunde verlängerte postice coarctata, hiantē, apicibus recurvis, subterminalibus. glatte Schale ist hinten eingedrückt und klappend, mit zurückgebogenen nahe am Ende stehenden Spizen.

$\alpha$  margine cardinali obtuso.

$\alpha$  mit stumpfem Schloßrande.

$\beta$  margine cardinali excurrente, seu  $\beta$  mit auslaufendem, oder, vorne antrorsum angulato. zu, eckigem Schloßrande.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 198.

Petiv. Gaz. t. 71. f. 11.

— amboin. t. 19. f. 16.

Rumph. amb. t. 46. f. B.

Gualt. Test. t. 91. f. H.

Argenv. Conch. Pl. 22. f. C.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.

Knor. Vergn. IV. 15. t. 3. f.

Q. III. 8. Mytilus Hirundo.

Q. III. 8. Die Vogel-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 252.

Belg. Vogeltje. Angl. Flying Muscle. Petiv. Gall. L'hirondelle. Dav.

Testa



Testa complanata laevi, Die plattgedrückte glatte  
valuis basi transuersa bilobis, Schale ist an dem nach der  
lobo altero elongato. Quere stehenden Schloßrande  
mit zween Flügeln versehen,  
deren einer verlängert ist.

\* castanea, fuscoque radiata.

\* kastanienfärbig, mit braunen  
Strahlen.

β viridis, radiis obsoletis ferrugi-  
neis.

β grün, mit matten eisenrosthigen  
Strahlen.

*Donan. Recr. cl. 2. f. 58.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 55.*

*Rumph. amb. 1. 46. f. G*

*Petiv. amb. t. 19. f. 9.*

*Argenv. Conch. Pl. 19. f. B.*

*Gualt. Test. t. 94. f. A. B.*

*Knor. Vergn. IV. 8. t. 5. f.*

——— *V. 10. t. 1, 2. f.*

——— *Del. nat. I. 1. B. IV. f. 7.*

R. Pinna.

R. Die Steckmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 316.*

Testa bivaluis, valuis Die Schale hat zwei  
coalitis, cardine edentu- aneinander verwachsene  
lo. Klappen, und am Schloß-  
se keine Zähne.



R. 1. *Pinna pectinata*.

R. 1. Der geräucherte Schinzen.

*Linn. S. N. Sp. 264.*

*Testa fastigiata grisea glabra, obtuse sulcata, squamis fornicatis cylindricis.*

Die graue Schale ist zugespitzt, glatt, mit stumpfen Furchen, und hohlen zylindrischen Schuppen besetzt.

*Gualt. Test. t. 79. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 91. f. 3.*

*Knor. Vergn. II. 26. t. 1. f.*

—— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 3.*

R. 2. *Pinna nobilis*.

R. 2. Der edle Schinzen.

*Linn. S. N. Sp. 265.*

*Testa fastigiata sulcata rubicunda, squamis canaliculato tubulosis.*

Die zugespitzte gefurchte röthliche Schale hat hohle rinnenartige Schuppen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 24.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 5.*

*Knor. Vergn. II. 26. t. 2. f.*

R. 3.



R. 3. Pinna muricata. R. 3. Die gedornete  
Steckmuschel.

Linn. S. N. Sp. 266.

Belg. Gedoord Hammetje. Angl. Prickley Ham Muscle Petiv. Gall.  
Jamboneau épineux.

Testa striata albida, squa- Die gefurchte weißliche Scha-  
mis fornicatis, approximatis, le hat hohle, dünne, gedrängt  
acutis. stehende Schüppchen.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 215.

Rumph. amb. t. 46. f. M.

Petiv. amb. t. 19. f. 14.

Gualt. Test. t. 79. f. D.

Knor. Vergn. VI. 20. t. 1. f.

R. 4. Pinna incurvata. R. 4. Der lange Schin-  
fen.

Testa fastigiata, ouata, squa- Die eyförmige' zugespizte  
mis fornicatis breuibus, ex- Schale ist mit kurzen hohlen  
tremite altera rotundata. Schuppen besetzt, und an ei-  
nem Ende rundlich.

Seb. Thes. t. 91. f. I.

Gualt. Test. i. 80.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ouata elongata grandis, ex- Die Schale ist eyförmig verlän-  
tremite una attenuata, altera gert, an einem Ende zugespizet, am  
rotundata, Valvae convexae super- andern rundlich, von beträchtlicher  
ficies externa vix manifeste striata, Größe. Die Klappen sind gewölbet  
testa squamulis fornicatis breuibus die äußere Oberfläche kaum merk-  
approximatis. Color praesertim ca- lich gestreift, und mit gedrängten  
H 2 uita-



uitatis carneus, Apices intus saepe margaritacei.

kurzen hohlen Schüppchen besetzt. Die Farbe besonders der Höhlung ist fleischroth. Die Spitzen haben inwendig oft einen Perlmutterglanz.

R. 5. Pinna Vexillum.

R. 5. Die Fahne.


Testa fastigiato triangula laevi, margine postico excurrente lobiformi.

Die zugespitzte dreyeckige glatte Schale hat einen lappenförmig ausgebreiteten Vorder- rand.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa fastigiata, conuexa, crassa, laevis. Valvae triangulae, extremitate una attenuata, opposita obtusa, lata; Margo posticus curvilineus, supra excurrente lobiformis. Color fuscus.

Die Schale ist zugespitzt, bäuchig, dick und glatt. Die Klappen sind dreyeckig, das eine End zugespitzt, das andre stumpf und breit. Der Hinterrand ist krummlinig, und oben lappenförmig ausgebreitet. Von brauner Farbe.







# Ordo tertius. Dritte Ordnung.

Univaluia.

Einschalige.

A. Argonauta.

A. Der Segler.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 317.*

Testa unilocularis, cym- Die einkammerige, na-  
biformis, membranacea, chenförmige, dünne Scha-  
spira inuoluta. le hat einen eingerollten  
Schnirkel.

A. 1. Argonauta Argo.

A. 1. Der papierne  
Segler.

*Linn. S. N. Sp. 271.*

*Belg. Docks huijnen. Rumph. Angl. The paper Nautilus. Hill.*  
*Gall. Nautilé papyracé. Argenv. Ital. Polpo Moscardino.*

Testa compressa, carina no-  
dulosa.

Die zusammengedrückte  
Schale hat einen knotigen Kiel.

“ carina tenui, testae rugis bi-  
furcatis.

“ mit schmalem Kieler und gabel-  
förmigen Runzeln.

*Belg. Docks - huijse Rumph. Angl. The great brittle Saylor. Petiv.*  
*Gall. Nautilé papyracé à carene retrecie Ital. Moscarolo. Bonan.*  
*Germ. Der schmalkeilige Seegler.*



- List. Hist. Conch.* l. 4. s. 4. f. 7.  
*Rumph. amb.* t. 18. f. A.  
*Petiv. amb.* t. 10. f. 1.  
*Gualt. Test.* t. 11. f. A. B. t. 12. f. A.  
*Klein. Meth. Ostr.* t. 1. f. 3.  
*Seb. Tbes.* III. t. 84. f. 5, 7.  
*Gev. Belust.* 2. t. 4, 5. f.  
*Argenv. Conch. Pl.* 5. f. A.  
 ——— *Zoom. Pl.* 2. f. 2.  
*Hill. Hist. of. Anim.* 7. Pl.  
*Knor. Vergn.* I. 2. t. 1. f.  
 ——— ——— VI. 31. t.  
 ——— *Delic. nat.* I. t. B. I. f. 3.  
*Mart. Konch. Kab.* I. 17. t. 157 f.  
*Da Cost. Elem. Pl.* 3. f. 6.

‡ *carina lata, obtuse serrata, cos-* β mit breitem Riele und von eins  
*tis rarioribus.* ander entfernten Rippen.

† *Belg.* Breedkielde papiere Nautilus. *Angl.* The Course brittle Say-  
*lor. Petiv. Gall.* Nautilé papyracé à large carène.

- List. Hist. Conch.* l. 4. f. s. 4. f. 6.  
*Rumph. amb.* t. 18. f. B.  
*Petiv. amb.* t. 10. f. 2. t. 22. f. 10.  
*Gualt. Test.* t. 12. f. C.  
*Gev. Belust.* 2. t. 6, 7. f.



*Argenv. Conch. Pl. 5. f. B.*

*Seb. Thes. III, t. 84. f. 9 — 12.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 2. f.*

— *Del. nat. I. t. B. 1. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. I. 17. t. 158, 159. f.*

*Murray. Fund. Testac. t. 1. f. 8.*

## B. Nautilus.

## B. Die Kammerschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 318.*

Testa polythalamia, dissepimentis siphone communicante perforatis.

Die Scheidewände der vielkammerigen Schale sind mit einer gemeinschaftlichen Röhre durchbohret.

B. I. Nautilus Pompi-  
lius.

B. I. Der dicke Schif-  
boot.

*Linn. S. N. Sp. 273.*

*Belg. Parl - Slakke; Rumph. Angl. Thick Sail - Shell. Gall. Nautilé à cloisons. Argenv.*

Testa subrotunda compressa, apertura cordata, anfractibus obtectis, inuolutis, laevis.

Die rundliche zusammenge-  
drückte Schale hat eine herz-  
förmige Mündung und verborgene, eingerollte, glatte Windungen.



*Bonan. Recr. cl. I. f. 1, 2.*

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 4. f. 3, 4.*

*Rumph. amb. t. 17. f. A.*

*Valent. Abb. I. t. 4. f.*

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 9.*

— amb. t. 3. f. 7.

*Gualt. Test. t. 17. f. A, B.*

*Argenv. Conch. Pl. 5. f. E.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 1, 2.*

*Knor. Vergn. I. I. t. 1. f. 2. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 18. t. 164. f.*

— — — — 19. t. 165, 166, 167. f.

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 16.*

B. 2. Nautilus Spirula.

B. 2. Das Posthorn.

*Linn. S. N. Sp. 279.*

*Belg. Posthoortje Rumph, Angl. The Rams Horn. Da Cost. Gall Corne d'Ammon.*

Testa inuoluta, tereti, anfractibus conspicuis, apertura orbiculari.

Die eingerollte walzenförmige Schale hat sichtbare Windungen, und eine runde Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 4. f. 2.*

*Bonan. Mus. Kirzb. cl. I. f. 39.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 20. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 19. f. E.*

*Swammerd. Bibl. nat. I, 7. t. 7. 8. f.*

*Gev. Belust. 3. t. 8. f. a. b.*

*Knor. Vergn. I, 2, t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 20. t. 184. 185. f.*

*Da Cost. Elem. Pl, 2. f. 19.*

## C. Conus.

## C. Die Zutenschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 319.*

Testa conuoluta turbidatissima; apertura longitudinalis edentula; columella laevis.

Die zusammengerollte zutenförmige Schale hat eine nach der Länge herablaufende Mündung, ohne Zähne, und eine glatte Spindel.

C. I. Spira planiuscula.

C. I. Mit einem flachen Wirbel.

C. I. 1. Conus marmoreus.

C. I. 1. Die Herztute.

*Linn. S. N. Sp. 290.*

Testa



*Testa conica, maculis sub-*  
*cordatis albis; spirae anfra-*  
*ctibus canaliculatis.*

Die kegelförmige Schale hat  
herzähnlige weiße flecken, und  
rinnenförmig ausgeflehte Wir-  
belgewinde.

*α nigrescens, maculis aggregatis.*

*α schwärzlich, mit nahe aneinander*  
*stehenden Flecken,*

*Belg. Hart-Toot. Rumph. Angl. Tyger-Shell Hill. Gall. Tigre*  
*noir. Argenv.*

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 39.*

*Rumph. amb. t. 32. f. N.*

*Petiv. Gaz. t. 47. f. 11.*

*Valent. Abb. t. 3. f. 25. t. 7. f. 65. A.*

*Gualt. Test. t. 22. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 46. f. 1 — 4. 13 — 19.*  
*— — — t. 47. f. 1. t. 55. f. 23.*

*Adans. Seneg. Pl. 6. f. 1.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 53. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 685. f.*

*β testa rufa, maculis aggregatis.*

*β rothbraun, mit nahe aneinander*  
*stehenden Flecken.*

*Belg. Root-Hart-Toot. Gall. Leopard rouge. Argenv.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 123.*

*Rumph. amb. t. 32. f. 1.*

*Valent.*





*Valent. Abb. t. 5. f. 43.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 2. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. 0.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 2. f.*

—— ——— *IV. 17. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 686. f.*

7 testa nigra, maculis rarioribus. 7 schwarz, mit etwas zerstreuten Flecken.

*Belg. Schout by Nagt. Gall. Contre Ammiral*

*Valent. Abb. t. 2. f. 10. t. 5. f. 44.*

*Seb. Thes. III. t. 46. f. 5 — 12. t. 47. f. 5. 6.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 687. 688. f.*

C. I. 2. *Conus imperialis.*

C. I. 2. Die Kroutute.

*Linn. S. N. Sp. 291.*

*Belg. Kroon - Horn. Rumph. Angl. Crown - Stamper. Petiv. Gall. Couronne imperiale Argenv.*

Testa conica alba, fasciis ochraceis, lineisque articulationis transuersis.

Die kegelförmige weiße Schale hat ochergelbe Bänder, und linienförmige unterbrochene Quergürteln.

Spi-



*Spirae anfractus coronati.*

Die Wirbelgewinde sind mit Kränzen gekrönt.

*Rumph. amb. t. 34. f. H.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 22. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 47. f. 18 — 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. F.*

*Knor. Vergn. II. II. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 690. 691. f.*

C. I. 3. *Conus fusca-*  
*tus.*

C. I. 3. Die schwarz-  
braune Kroutute.

Belg. Tueete Kron-hoorn. Angl. Blaauw's Stamper. Pet.

Testa alba fusco maculata, Die weiße und braungefleck-  
lineis transversis obscurioribus te Schale hat linienförmige  
interruptis. unterbrochene schwarzbraune  
Gürteln.

*Rumph. amb. t. 34. f. J.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 17.*

*Klein Meth. Ostr. t. 4. f. 84.*

*Seb. Thes. III. t. 3. f. 35.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. E.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 35. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 692. 693. f.*



Testa obuerse conica fusca, maculis longitudinalibus confluentibus albis. Cingula tenuia transversa, atrofusca, interdum albo articulata. Spira planiuscula. Anfractus dentibus coronati. Mucro centralis prominulus.

Die Schale ist verkehrt kegelförmig, von brauner Farbe. Nach ihrer Länge herab, laufen zusammenfließende weiße Flecken. Die linienförmigen schwarzbraunen Gürteln sind manchmal weiß gegliedert. Der Wirbel ist etwas flach. Die Gewinde sind mit knottigen Kronen besetzt. Die Wirbelspitze ragt in der Mitte hervor.

C. I. 4. Conus litteratus.

C. I. 4. Die Tigertute.

Linn. S. N. Sp. 292.

Belg. Letter-Hoorn. Rumph. Angl. Horn - Book - stamper. Pet. Gall. Damier. Dav.

Testa conica alba, maculis quadratis, seriatim digestis.

Die kegelförmige weiße Schale ist mit würflichten Flecken reihenweise besetzt.

Bonan. Recr. el. 3. f. 363.

List. Hist. Conch. l. 4. 5. 10. p. 2. f. 20.

Rumph. amb. t. 31. f. D.

Petiv. Gaz. t. 41. f. D.

— amb. t. 2. f. 5.

Gualt. Test. t. 21. f. O.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. 1.

Seb.



*Seb. Thes. III. t. 45. f. 1. — 5.*

*Regenf. I. 3. t. 29. f.*

*Knor. Vergn. I. 16. t. 3. f.*

—— ——— III. 3. t. 2. f.

—— ——— IV. 26. t. 1. f.

—— 'Delic nat. I, t. B. III, 4. f.

*Mart. Konch. Kab. II, 60. t. 666 — 669. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 9.*

α punctis fuscis subaequalibus; abs-  
que fascia transuersa.

α mit beinahe gleichgroßen brau-  
nen Punkten, ohne Querbänd.

β punctis fuscis subaequalibus, abs-  
que fascia transuersa, spira nodo-  
so coronata.

β mit beinahe gleichgroßen braunen  
Punkten ohne Querbänd, und  
gekrönter Wirbelspitze,

γ punctis fuscis confertis, fascia  
gemina flaua.

γ mit gedrängt stehenden brau-  
nen Punkten und gedoppelten  
gelben Bänden.

δ punctis fuscis distinctis. fasciis  
tribus flauescentibus.

δ mit zerstreuten braunen Punkten,  
und drey gelblichen Bändern.

ε maculis quadratis fuscis, fasciis-  
que tribus transuersis latis.

ε mit würflichten braunen Flecken,  
und drey breiten Querbändern.

ζ maculis punctisque confluentibus  
fauis.

ζ mit zusammenfließenden rothgel-  
ben Flecken, und Punkten.



C. I. 5. *Conus generalis.* C. I. 5. Das Klöppel-  
füßen.

*Linn. S. N. Sp. 293.*

*Belg.* Speeldewerk Kuffen. *Rumph.* *Angl.* Net - listed - Stamper  
*Petiv.* *Gall.* La Flamboyante *Argenv.*

Testa conica ferruginea, fa- Die kegelförmige rostfar-  
sciis tribus interruptis albis, bige Schale hat drey weiße un-  
anfractibus canaliculatis, terbrochene Bänder, und aus-  
gefehlte Wirbelgewinde.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 34.*

*Petiv. Gaz. I. t. 27. f. 11.*

— amb. t. 3. f. 9.

*Rumph. amb. t. 33. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 20. f. G.*

*Seb. Thes. III. t. 54. f. 11 — 13.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. T.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 65. f.*

*Knor. Vergn. III. 17. t. 4, 5. f. 18. t. 3, 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 648 — 652. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. F. 8.*

α fasciis fuscis.

α mit braunen Bändern.

β fasciis fulvis.

β mit rothgelben Bändern.



C. I. 6. *Conus candi-*  
dus.

C. I. 6. Die weiße Kron-  
tute.

Testa conica glabra alba,  
spirae anfractibus coronatis.

Die kegelförmige glatte weiß-  
se Schale hat gekrönte Wirbel-  
gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica solida niuea; Ven-  
ter conuexiusculus; Apex centra-  
lis prominulus, decorticatus, ame-  
thytinus.

Die kegelförmige dichte Schale  
ist weiß, einigermaßen bläulich. Die  
abgenützte in der Mitte hervorra-  
gende Wirbelspitze ist amethystfarbig.

C. I. 7. *Conus Virgo.*

C. I. 7. Die Menmoni-  
tentute.

*Linn. S. N. Sp. 294.*

*Belg. Mennonist Toet. Rumph. Angl. Wax - stamper. Petiv. Gall.*  
*Bout de Chandelle. Day.*

Testa conica pallida, trans-  
uersim rugoso striata, basi  
violacea.

Die kegelförmige weißliche,  
der Quere nach runzelicht ge-  
streifte Schale hat eine violette  
Grundspitze.

*List. Hist. Conch. l. 4 s. 10. p. 2. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 31. f. E.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 20. f. E.*

*Seb.*



*Seb. Tbes. III. t. 47. f. 8, 9.*

*Knor. Vergn. III. 22. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Konch II. 53. t. 585. f.*

**C. 1. 8. Conus tessula-** **C. I. 8. Der Estrich.**  
**tus.**

*Belg. Italienische Vloerken. Angl. The italien Parement. Gall. Nappe d'Italie.*

*Testa conica alba, maculis oblongis cinnabarinis; basi fulcata, amethystina.* Die kegelförmige weiße Schale hat langwürflichte zinnoberrothe Flecken und eine gefurchte amethystfarbige Grundspitze,

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 17.*

*Valent. Abb. 6. t. 52. f.*

*Gualt. Test. t. 21. f. H.*

*Seb. Tbes. III. t. 55. f. 4 — 9.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 19. f.*

*Knor. Vergn. II. 12. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 653. f.*

An praecedentis varietas?

Vielleicht eine Abänderung des vorhergehenden Art.

**C. I. 9. Conus Capita-** **C. I. 9. Die Käsetute.**  
**neus.**

*Lin. S. N. Sp. 295.*





Belg. Groene Kaas Rumph. Angl. Green Ramper. Pet. Gall. L'Her-  
mine Dav.

Testa conica glabra, fasciis Die kegelförmige glatte  
duabus albis fusco maculatis. Schale hat zwey braun gefleck-  
te Querbänder.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 27.

Rumph. amb. t. 33. f. X.

Petiv. amb. t. 9. f. 11.

Gualt. Test. t. 22. f. M.

Seb. Thes. III. t. 22. f. 26, 27, 30, 31, 33.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. K.

Regenf. Samml. 1. 7. t. 7. f.

Knor. Verg. I. 15. t. 3. f.

—— V. 16. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 660-662. f.

$\alpha$  olivacea.

$\alpha$  olivengrün.

$\beta$  rufa.

$\beta$  rothbraun.

C. I. 10. Conus miles. C. I. 10. Die Zwirnz-  
tute.

Linn. S. N. Sp. 296.

Belg. Arakans - Garen. Rumph. Angl. Garter Ramper. Petiv. Gall.  
Le Navet. Argenv.

Testa conica albida, fasciis Die kegelförmige weiße  
duabus transuersis fuscis. Schale hat zwey braune Quers-  
bänder.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p 2. f. 34.*

*Rumph. amb. t. 33. f. W.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 20. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 23, 25.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. L.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 4. f.*

— — — — — III. 1. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 663. 664. f.*

C. I. II. Conus Centurio.

C. I. II. Der Drangen-  
fegel.

Testa conica, basi attenuata transuerfim sulcata, anfractibus canaliculatis.

Die kegelförmige Schale ist au dem zugespitzten Grunde in die Quere gefurchet, und an den Gewinden ausgekehlet.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica, laevis; Basis attenuata, sulcis transuerfis. Spira planiuscula. Anfractus contigui, canaliculati. Vertex obtusus centralis. Color aurantius. Fasciae duae transuersae albae, lineis aurantiis angulatis oblique transcurrentibus.

Die Schale ist kegelförmig und glatt. Der Grund zugespitzt, und in die Quere gefurchet. Der Schnir-  
fel flach. Die Gewinde berühren einander, und sind rinnenförmig ausgekehlet. Der stumpfe Wirbel steht in der Mitte. Die Farbe ist orangengelb. Zwen breite Querbänder sind mit schiefen orangensfarbigen eckigen Linien durchzogen.



C. II. Spira pyramidata. -

C II. Mit einem pyramidenförmigen Wirbel.

C. II. 1. Conus Princeps.

C. II. 1. Die Bastardbauernmusik.

. Linn. S. N. Sp. 297.

Belg. Balfert Tygers Katje. Gall. La fausse Hebraïque. Dav.

Testa turbinata fusco nigra, lineis longitudinalibus, flexuosis, pallidis.

Die spizwirblige Schale ist braunschwarz, und mit blassen gekrümmten Strichen nach der Länge herab besetzt.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 26.

Valent. Abb. II. t. 94. f.

Gualt. Test. t. 25. f. Q.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. B.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 30, 31.

Knor. Vergn. III. 4. t. 2. f.

Mart. Conch. Kab. II. 63. t. 699. 700. f.

C. II. 2. Conus Ammiralis.

C. II. 2. Die Admiraltute.

Linn. S. N. Sp. 298.

Belg. Opper-Admiral. Angl. Burg's-stamper. Petiv. Gall. Le grand Admiral. Argenv.

Testa



Testa fulva, maculis disper-  
sis albis, fasciisque transuer-  
sis reticulatis.

Die rothbraune Schale ist  
mit zerstreuten Flecken besetzt,  
und mit nezförmigen Querbän-  
dern umgeben.

$\alpha$  fasciis transuersis tribus, se-  
cunda cingulo articulado bifariam  
diuisa.

$\alpha$  mit drey Querbändern, davon  
das zweyte durch einen gegliederten  
Gürtel abgetheilet ist.

*Rumph. amb. t. 34. f. B.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 18.*

*Argenv. Conch Pl. 12. f. N.*

*Adans. Seneg. Pl. 6. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 5, 6.*

*Knor. Vergn. I. 8. t. 2. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 6.*

$\beta$  fasciis quatuor, secunda obso-  
leta tenui, tertia cingulo articula-  
to bifariam diuisa.

$\beta$  mit vier Bändern, davon das  
zweyte unvollkommen und schmal,  
das dritte durch einen gegliederten  
Gürtel abgetheilet wird.

$\gamma$  fasciis quatuor, secunda obso-  
leta tenui, tertia lata, cingulis  
articulatis duobus trifariam partita.

$\gamma$  mit vier Bändern, davon das  
zweyte unvollkommen und schmal  
ist, das dritte breite aber durch  
zwei gegliederte Gürteln dreyimal  
abgetheilet wird.

*Petiv. amb. t. 15. f. II.*

*Argenv. Suppl. Pl. I. f. P.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 4, 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



C. II. 3. Conus Sena-  
tor,

C. II. 3. Die Schild-  
krötentute.

*Linn. S. N. Sp.* 300?

*Belg. Schildpad - Toot. Gall. Ecaile de tortue,*

Testa ouata nebulosa laeui, Die eysförmige nebelichte  
transuersim articulado striata. glatte Schale ist mit unterbro-  
chenen Querstreifen umgeben.

*Seb. Thes. III. t. 43. f. 29, 36.*

*Knor. Vergn. VI. I. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 609 — 611. f.*

C. II. 4. Conus genuanus,

C. II. 4. Die guineische  
Tute.

*Linn. S. N. Sp.* 302.

*Belg. Geneesche Toot. Gall. Aile de papillon. Argenv.*

Testa pallido rubra, cingu- Die blaßrothe Schale ist  
lis albo fuscoque articulatis. mit weiß und braun unterbro-  
chenen Bändern umgeben.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 337.*

*List. Hist. Conch. I. 4. s. 10. p. 2. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 34. f. G.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 1 — 3.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 623 — 625.*

C. II. 5. *Conus Mo-*  
*nachus.*

C. II. 5. *Der Mönch.*

*Linn. S. N. Sp. 304.*

*Belg. Graeue Munniker. Rumph. Angl. Gray Monk. Petiv.*

Testa laevi fusca, albo &  
coerulefcente nebulata, basi  
transuerse sulcata.

Die glatte braune, weiß  
und hellblau wolfigte Schale  
hat eine in die Quere gefurchte  
Grundspize.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 126.*

*Rumph. amb. t. 33. f. CC.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 7.*

*Valent. Abb. 9. t. 74. f.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 45.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 68. f.*

*Knor. Vergn. III. 16. t. 2. f.*

— — V. 18. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 614. f.*



C. II. 6. *Conus minimus*.

C. II. 6. Der graue Mönch.

*Linn. S. N. Sp. 305.*

*Gall. La minime, Dar.*

Testa ovato oblonga, glauco albideque nebulosa, lineis fuscis interruptis cincta.

Die eysförmige längliche blaulicht graue Schale hat weisse Wolken und braune unterbrochene Querstreife.

Variat etiam spira coronata.

Es giebt auch eine Abänderung mit gekröntem Wirbel.

*Valent. Abb. 3. t. 24. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.*

*Knor. Vergn. III, 27. t. 2. f.*

C. II. 7. *Conus Mercator*.

C. II. 7. Die bandirte Reztute.

*Linn. S. N. Sp. 307.*

*Belg. Net - Tootje.*

Testa ovata alba, fasciis latis reticulatis fulvis.

Die eysförmige weisse Schale hat breite eysförmige rothgelbe Bänder.

*Lift. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 41.*

*Valent. Abb. 7. t. 65. B. f.*

*Argene.*





*Argenv. Conch. Pl. 12. f. P.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 3.*

*Knor. Vergn. II. 1. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 620. f.*

C. II. 8. *Conus reticulatus.*

C. II. 8. Das Fische-  
netz.

*Gall. Drap à réseau.*

Testa ovato oblonga niuea,  
undique fuluo reticulata.

Die eysförmige längliche  
weiße Schale ist allenthalben  
mit einem rothbraunen Netze  
überzogen.

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 621. f.*

Testa ovata, pyriformis, gla-  
berrima niuea, filis reticulatis ful-  
vis intertexta, areolis lanceolatis,  
transuersis Basis attenuata trans-  
uersim sulcata. Spira pyramidata  
laevis, anfractibus contiguus. Ver-  
tex centralis acuminatus.

Die eylange birnförmige Schale  
ist glatt, schneeweiß, mit roth-  
braunen netzförmigen Fäden be-  
setzt, deren Zwischenflächen länglich,  
und in die Quere gestellet sind.  
Der Schnirkel ist pyramidenförmig  
und glatt, die Gewinde aneinander  
verwachsen. Der Wirbel raget aus  
der Mitte spizig hervor.

An prioris Varietas?

Etwan eine Abänderung der vo-  
rigen Art?

C. II. 9. *Conus betuli-*  
*mus.*

C. II. 9. Die gelbe But-  
terweide.

*Linn.*

140



*Linn. S. N. Sp. 308.*

*Belg.* Boterweg. *Rumph. Angl.* Great yellow Leopard Stamper  
*Pet. Gall.* Pelote de beurre. *Dav.*

*Testa turbinata laeui, maculis fuscis per series cincta, basi rugosa.*

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunen Flecken reiheweise umgeben, und an der Grundspize runzelicht.

*List. Hist. Conch. l. 4, s. 10. p. 2. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 31. f. C.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 21. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 1 — 4.*

*Knor. Vergn. II. 11. t. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. II. 60 t. 665. f.*

C. II. 10. Conus figurinus.

C. II. 10. Die Eichenholztute.

*Linn. S. N. Sp. 309.*

*Belg.* Eckenhouts-Toot. *Rumph. Angl.* The Oacken-wood stamper.  
*Gall.* Le bois de Chene.

*Testa turbinata laeui, lineis transversis fuscescentibus.*

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunlichen Quersstrichen umgeben.

*List.*



*List. Hist. Conch. t. 4. s. 10. p. 2. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 31. f. v.*

*Gualt. Test. t. 20. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.*

*Regensf. Samml. I. 10. t. 47. f.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 23. f.*

— — — *V. 25. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 656, 657. f.*

C. II. 11. *Conus ermi-  
neus.*

C. II. 11. *Der Her-  
melinschwauz.*

*Belg. Hermelin Staart. Gall. Queue d'Hermine. Dav.*

*Testa pyriformi fulva basi striis punctatis scabra, fasciis transuersis niuis.* Die birnförmige rothgelbe Schale hat am Grunde erhabene punktirte Streife, und schneeweiße Querbänder.

*Valent. Abb. 5. t. 47. f.*

*Gualt. Test. t. 20. f. Q.*

*Seb. Tbes. III. t. 42. f. 31 — 40.*

*Mart. Kouch. Kab. II. 57. t. 631. f.*

*Testa pyriformis glabra, basi transversim striata, striis elevatis punctatoscabris. Spira conica. Anfractus glabri planiusculi. Color fulvus; spira albo maculata; ventris* Die Schale ist birnförmig, und glatt, am Grunde in die Quere gestreift, und auf den erhabenen Streifen mit Körnern besetzt. Der Schnirkel ist kegelförmig. Die

cin-



cingula duo interrupta alba. Puncta eleuata alba.

Gewinde glatt und etwas flach. Die Farbe rothgelb an dem Schnirfel weißgefleckt, und um den Leib mit zweyen unterbrochenen Querbändern umgeben. Die erhabenen Punkte, oder Körner sind weiß.

C. II. 12. Conus Hebraeus.

C. II. 12. Die Bauernmusik.

Linn. S. N. Sp. 310.

Belg. Büeren - mysyk, Rumph. Angl. Black Diamond Stamper  
Pet. L' Hebraique. Dav.

Testa ouata, maculis oblongis per series transuersum cincta.

Die eysförmige Schale ist mit länglichen Flecken der Quere nach reiheweise umgeben.

α maculis fuscis

α mit braunen Flecken.

β maculis rufis.

β mit rothgelben Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 122.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 25.

Rumph. amb. t. 33. f. BB.

Petiv. amb. t. 9. f. 12.

— Gaz. t. 99. f. 12.

Gualt. Test. t. 2. f. T.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. G.

Adans. Seneg. t. 6. f. 5.

Seb.



Seb. Thes. III. t. 47. f. 28 — 29.

Knor. Vergn. III. 6. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 617. f.

C. II. 13. *Conus Stercus muscarum.* C. II. 13. Die Sand-  
tute.

Linn. S. N. Sp. 311.

Belg. Vliegge - Schettje. Rumph. Angl. Sand - Stamper. Pet.  
Gall. Piquure de mouche.

Testa oblonga punctis pictis Die längliche Schale ist  
adpersa ; anfractibus canali- mit gefärbten Punkten bestreuet,  
culatis. und an den Gewinden ausge-  
fehlet.

α elongata, spirae anfractibus ae- α länglich, mit glatten Wirbel-  
qualibus. winden.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 9.

Petiv. Gaz. t. 75. f. 1.

— amb. t. 15. f. 21.

Rumph. amb. t. 33. f. 2.

Gualt. Test. t. 25. f. N. 0.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. E.

Seb. Thes. III. t. 55. f. 1.

Regenf. Samml. I. 7. t. 2. f.

Knor. Vergn. I. 7. t. 5. f.

— Del. nat. I. t. B. 5. f. 7.

Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 711 — 713. f.

β ventri-



β ventricosa, spirae anfractibus coronatis. β bäuchig, mit gekrönten Wirbelgewinden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 2. f. 10.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. S.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

C. II. 14. *Conus varius.*

C. II. 14. Die Löwenturte.

*Linn. S. N. Sp. 312.*

Belg. Westindische Landcharten. Gall. Peau de chagrin. Argenv.

Testa elongata, punctis elevatis cincta, spirae anfractibus coronatis.

Die längliche Schale ist mit erhabenen Punkten umgeben, und an den Gewinden gekrönt.

α fusca, maculis confluentibus ramosis. α braun, mit weißen zusammenfließenden Flecken.

β lutea, maculis albis dispersis solitariis. β gelb, mit weißen zerstreuten einzelnen Flecken.

*Gualt. Test. t. 20. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 20 — 22.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 5. f.*

— — II. 1. t. 5. f.

— — VI. 1. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 6. I. t. 678. 679. f.*



C. III. Elongati.

C. III. Lange Tuten.

C. III. 1. Conus Nuffa-  
tella.

C. III. 1. Der punktir-  
te Bohrer.

*Linn. S. N. Sp.* 314.

*Belg.* Gegränuleerde Kuipers - Boor. *Rumph.* *Angl.* Grain girdled  
*Stamper.* *Petiv.* *Gall.* Tarriere chagrinee.

Testa subcylindrica, striis  
transuersis eleuatis punctato  
maculatis.

Die fast walzenförmige  
Schale ist der Quere nach mit  
erhabenen Streifen umgeben,  
und mit gefleckten Punkten be-  
setzt.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 10. p. 1. f. 35.

*Rumph. amb. t.* 33. f. EE.

*Petiv. amb. t.* 15. f. 13.

*Gualt. Test. t.* 25. f. L.

*Argenv. Conch. Pl.* 13. f. P.

*Knor. Vergn.* II. 4. t. 7. f.

— — — III. 19. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab.* II. 51. t. 567. f.

C. III. 2. Conus Tere-  
bra.

C. III. 2. Der Zirkelboh-  
rer.

*Belg.* Witte gevoorde Kuypers - Boor. *Gall.* Tarriere blanche &  
*reclée.*

K

Testa





Testa oblonga albida, striis Die längliche weiße Schale  
elevatis transuersis parallelis. ist mit erhabenen parallelen  
Querstreifen umgeben.

Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 577. f.

Testa oblonga crassa, transuer-  
sim striata; striis elevatis paralle-  
lis. Spira conica; anfractus decli-  
ves, striati, contigui. Color ru-  
bellus, fasciis duabus transuersis  
obsoletis albis. Vertex, & basis  
spoliata, amethystina.

Die Schale ist länglich, und dicht,  
in die Quere gestreift. Die Strei-  
fen erhaben, und gleichweit von  
einander entfernt. Der Wirbel  
kegelförmig, die Gewinde ab-  
hängig, gestreift, und aneinander  
gewachsen. Die Farbe blaßroth mit  
zweyen matten weißen Querbän-  
dern, und die Grundspitze  
haben, wenn sie abgezogen sind,  
eine Amethystfarbe.

C. III. 3. Conus gra-  
nulatus.

C. III. 3. Der gefurch-  
te Bohrer.

Linn. Syst. Nat. Gen. 315.

Belg. Bastert Orangie Admiraal. Angl. Small chain Stamper. Petiv.  
Gall. Faux Amiral orangé.

Testa oblonga transuersim  
fulcata, fasciis albis fusco  
maculatis.

Die längliche in die Quere  
gefurchte Schale ist mit weiß-  
sen braungefleckten Querbän-  
dern umgeben.

Rumph. amb. 1. 32. f. T.

Petiv. amb. 1. 15. f. I.

Gualt.



*Gualt. Test. t. 25. f. H.*

*Seb. Tbes. III. t. 48. f. 26.*

*Knor. Vergn. III. 6. t. 5. f.*

— — — *V. 24. t. 2. f.*

C. III. 4. Conus circum-  
ciscus.

C. III. 4. Der Draniens-  
bohrer.

Testa subcylindrica fusco-  
que maculata, striis incisis  
transuersis.

Die fast walzenförmige  
Schale ist braungefleckt, und  
mit eingeschnittenen Querstri-  
chen umgeben.

*Valent. Abb. t. 2. f. II.*

*Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 571. f.*

Testa subcylindrica laevis striis  
transuersis incisis parallelis. Spira  
planiuscula. Vertex prominens, acu-  
tus centralis. Color ex flavescenti  
rubescens, fasciis transuersis obso-  
letis albis, punctis dispersis rubris.

Die walzenförmige Schale ist  
in die Quere mit eingeschnittenen,  
parallelen Strichen umgeben. Der  
Schnirkel ist flach. Der spizige  
Wirbel ragt aus der Mitte hervor.  
Die Farbe ist gelblich roth, mit  
matten weißen Querbändern, und  
verstreuten rothen Punkten.

C. III. 5. Conus planor-  
bis.

C. III. 5. Der Platte-  
wirbel.



Testa conico ventricosa ful-  
ua, basi transuersim striato  
punctata; spira plana canali-  
culata.

Die kegelförmige rothgelbe  
Schale ist am Grunde mit  
punktirten Streifen umgeben,  
und auf dem flachen Schnirkel  
ausgekehlet.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica ventricosiuscula,  
prope basin transuersim striata, striis  
eleuatis, punctato scabris. Spira  
plana. Anfractus canaliculati, mar-  
gine extimo acuto. Color ventris  
fuluus, spirae albo fuluoque ma-  
culatus. Basis intus amethystina.

Die kegelförmige etwas bäuchige  
Schale ist am Grunde in die Quere  
gestreift, die Streifen erhaben,  
und mit Körnern besetzt. Der Schnir-  
kel flach. Die Gewinde ausgekehlet,  
am äußersten Rande scharf. Die  
Schale ist rothgelb, der Schnirkel  
weiß gestreift. Der Grund inwän-  
dig amethystfärbig.

C. III. 6. Conus Magus.

C. III. 6. Das gefleck-  
te Käzchen.

*Linn. S. N. Sp. 317.*

*Belg. Geplekte Katje. Rumph. Angl. Tabby Stamper. Petiv. Gall.  
la; Picotée. Argenv.*

Testa subcylindrica, fasciis  
longitudinalibus albo puncta-  
tis.

Die fast walzenförmige  
Schale hat nach der Länge  
laufende punktirte Bänder.

*Rumph. amb. t. 32. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 10.*

*Argenv. Suppl. Pl. 2. f. C?*

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 20. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 27.*

*Knor. Vergn. VI. 16. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 641. f.*

C. III. 7. *Conus striatus.*

C. II. 7. *Die Wolfenrolle.*

*Linn. S. N. Sp. 318.*

*Belg. De Wolkhoorn. Rumph. Angl. Tyger Stamper. Petiv. Gall. l'Ecorchée. Argenv.*

Testa ouato oblonga nebulosa, lineis parallelis transversim picta.

Die ensförmig längliche wolflichte Schale ist mit gleichweit entfernten Linien bemalet.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 6.*

*Valent. Abb. 7. t. 60. 61. f.*

*Rumph. amb. t. 31. f. F.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 4.*

— *Gaz. t. 98. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 5, 10.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 13. f.*

*Knor. Vergn.* I. 18. t. 1. f.

— — — *III.* 12. t. 5. f. 21. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab.* II. 64. t. 714 — 716. f.

*C. III. 8. Conus Tex-*  
*tile.*

*C. III. 8. Die Spitzen-*  
*rolle.*

*Linn. S. N. Sp.* 319.

*Belg. Gouldlaken. Rumpā. Angl. Galdbrocade Schell. Hill. Gall.*  
*Le Drap d'or. Dav,*

*Testa ovato oblonga, venis*  
*reticulatis fuscis, maculis lu-*  
*teis fulcisque.*

*Die ensförmige, längliche*  
*gelb, und braun gefleckte Scha-*  
*le ist mit netzförmigen braunen*  
*Adern bemalet.*

*Bouan. Recr. cl.* 3. f. 135.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 10. p. 2. f. 43.

*Rumph. amb. t.* 32. f. O. P.

*Petiv. amb. t.* 15. f. 9.

*Gualt. Test. t.* 25. f. X.

*Argenv. Conch. Pl.* 13. f. F. I.

*Adans. Seneg. Pl.* 6. f. 7.

*Seb. Tbes. III. t.* 43. f. 6 — 12. t. 47. f. 13 — 17.

*Regensf. Samml. I.* 6. t. 62. f.

*Knor. Vergn. I.* 18. t. 6. f.

— — — *II.* 8. t. 3. f.

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 598 — 600.*

C. III. 9. *Conus aulicus*. C. III. 9. Die Brunette.

*Linn. S. N. Sp. 320.*

*Belg. Bruinet - Toot Rumph. Angl. The Porphyry Shell. Hill. Gall. La Brunette. Dav.*

Testa subcylindrica, maculis dispersis inaequalibus trigonis. Die beinahe walzenförmige Schale ist mit zerstreuten ungleichen dreieckigen Flecken bezeichnet.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 133.*

*Rumph. amb. t. 33. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. G.*

*Seb. Thes. t. 43. f. 1, 2, 4, 5; t. 47 f. 13 — 15.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 25. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. II. 5. t. 3. f.*

—— III. 19. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 592. f.*

C. III. 10. *Conus pen-naceus*. C. III. 10. Die Federtute.

Belg. De Zilver Lakén Rumph. Gall. Volute pannacchée.

Testa conica cinnamomea, Die kegelförmige zimmtfar-  
lineis punctatis transuersis, & bige Schale ist mit punktirten  
maculis pennatis dispersis pal- Querlinien, und zerstreuten  
lidis picta. weißlichen federförmigen Fle-  
cken bemalt.

Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 596. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica crassa glaberrima. Die Schale ist kegelförmig, dicht  
Spira obtusa anfractibus infimis pla- und glatt, der Schnirkel stumpf,  
nis, supremis eleuatis in ver- die unteren Gewinde flach, die ober-  
ticem centalem pyramidatum ob- ren in der Mitte pyramidenförmig  
tusum. Color cinnamomeus. Li- erhaben, und zugespitzt, zinno-  
neae pictae transuersae ex seriebus berfarbig mit rothbraunen aus  
punctorum ruforum. Maculae di- Punkten zusammengesetzten Quers-  
persae, albiae, aut pallide vio- linien. Die zerstreuten weißen, oder  
laceae, pennatae. weißblauen Flecken, sind federförmig.

C. IV. Laxi, ventricosi.

C. IV. Weltbauchige Tuten.

C. IV. 1. Conus Spe-  
ctrum.

C. IV. 1. Das Gespenst.

[ Linn. S. N. Sp. 321.

Belg. Spookje. Rumph. Angl. Fairy-Stamper Petiv. Gall. Le Spec-  
tre.

Testa oblōga gibba, fas- Die längliche höckerige  
ciis longitudinalibus undula- Schale hat nach ihrer Länge  
tis. wellenförmige Bänder.

Rumph.





*Rumph. amb. t. 32. f. S.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 5.*

*Valent. Abb. 5. t. 39. f.*

*Gualt. Test. t. 25. f. S.*

*Seb. Thes. III. t. 47. f. 24.*

*Knor. Vergn. II. 8. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 581. 583.*

C. IV. 2. *Conus bullatus.*

C. IV. 2. Die Wolkensacke.

*Linn. S. N. Sp. 322.*

*Belg. Wolkbakje.*

*Testa oblonga, nebulosa  
columella flexuosa, emarginata.*

Die länglichte neblichte Schale hat eine gedrehte eingesäumte Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 1. f. 43.*

*Gualt. Test. t. 26. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 1.*

*Knor. Vergn. V. 8. t. 2. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 65. t. 726. 727. f.*

C. IV. 3. *Conus Tulipa.*

C. IV. 3. Die Tulpe.

*Linn. S. N. Sp. 323.*

K 5

Belg.



**Belg.** Achaat toot. **Angl.** The Tulip - Shell *Hill. Gall.* La Tulipe. *Argenv.*

*Testa oblonga laeui, aper- Die längliche glatte Schale*  
*tura patente, anfractibus su- hat eine weite Mündung, und*  
*premis coronatis. die obersten Gewinde gekrönet.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 2. f. 7.*

*Rumph. amb. t. 34. f. K.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 14.*

*Argenv. Conch. Pl. 16. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 16, 20. t. 43. f. 20 - 22.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 20. f.*

*Knor. Vergn. V. 20. t. 1, 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 718, 719.*

**C. IV. 4. Conus Geo-**  
**graphus.**

**C. IV. 4. Die Kronen-**  
**hülle.**

*Linn. S. N. Sp. 324.*

**Belg.** Wolkje. **Rumph.** **Angl.** Cloudy - Stamper *Petiv. Gall.* Brocard  
**de Soie.** *Argenv.*

*Testa oblonga, spira corona-*  
*ta, apertura patente.*

*Die längliche Schale hat*  
*gekrönte Gewinde, und eine*  
*weite Mündung.*

*Bonan.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 319.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 1. f. 41.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 8.*

— amb. t. 15. f. 3. A.

*Rumph. amb. t. 31. f. G.*

*Gualt. Test. t. 26. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. A.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 1—4.*

*Knor. Vergn. III. 21. t. 2. f.*

— — VI. 17. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 717. f.*

## D. Cypraea.

## D. Die Porzellanschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 320.*

Testa conuoluta, sub-  
ouata, apertura longitudi-  
nali, utrinque denticulata,  
extremitatibus effusis.

Die Schale ist zusam-  
mengerollet, einigermassen  
enförmig, ihre Mündung,  
welche der Länge nach he-  
rabläuft, ist beiderseits ge-  
zähnelte, und an den En-  
den ausgeschnitten.

156



D. I. Mucronatae.

D. I. Spizwirblige,

D. I. 1. Cypraea Exanthema.

D. I. 1. Der Bastard Argus.

*Linn. S. N. Sp. 325.*

*Belg.* Bastert Argus. *Angl.* Great hebrew Gowry. *Petiv. Gall.* Le faux Argus. *Dav.*

Testa turbinata, pallide maculata, characteribus inscripta, linea longitudinali subramosa.

Die spizwirblige Schale ist weißgefleckt, mit buchstabenhähnlichen Strichen bemalt, und nach der Länge des Rückens mit einer geschlängelten Linie versehen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 45, 46.*

*Petiv. Gaz. t. 96. f. 6.*

*Seb. Thes. III. t. 76. f. 16, 18.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 38. f.*

*Knor. Vergn. I. 5. t. 3, 4. f.*

—— II. 24. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 289. f. 29. t. 298. f.*

D. I. 2. Cypraea Mappā.

D. I. 2. Die Landcharte.

*Linn. S. N. Sp. 326.*

*Belg.* Kaaphoorn. *Angl.* The Map - Shell. *Hill. Gall.* La Carte géographique. *Dav.*

Testa



Testa turbinata, characteribus inscripta, linea longitudinali ramosa.

Die spizwirblige Schale ist mit buchstabenähnlichen Zügen bemalt, und mit einer ästigen Linie nach der Länge des Rückens durchzogen.

*Rumph. amb. t. 38. f. B.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 76. f. 3, 13, 17.*

*Knor. Vergn. I. 26. t. 3. f.*

—— *Delic nat. I. t. B. IV. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 25. t. 245. f.*

D. I. 3. *Cypraea arabica.*

D. I. 3. Die arabische Buchstaben = Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 327.*

*Belg. Arabische Letters Hoorn. Gall. La fausse Arlequine. Dav.*

Testa turbinata, pallide maculata, characteribus inscripta, linea longitudinali simpliciter.

Die spizwirblige Schale ist blaßgefleckt mit arabischen Buchstaben ähnlichen Zügen und einer einfachen Linie nach der Länge des Rückens bemalt.

α maculis inter characteres irregularibus.

α mit unregelmäßigen Flecken zwischen den Zügen.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 38. f. M.*

*Gualt. Test. t. 16. f. V.*

*Knor. Vergn. III. 12. t. 2. f.*

—— ——— VI. 20. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 328. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 1.*

β maculis rotundis inter caracte- β mit ründlichen matten Flecken  
res obsoletos. zwischen den Bügen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 51.*

*Argenv. Conch. Suppl. t. 2. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 331. f.*

D. I. 4. Cypraea Argus. D. I. 4. Der doppelte  
Argus.

*Linn. S. N. Sp. 328.*

*Belg. De dubbelde Argus. Angl. The Argus Shell. Hill. Gall.  
Le grand Argus. Dav.*

Testa turbinata, subcylindrica, supra adpersa ocellis, Die spiewirblige Schale ist  
subtus maculis quatuor fuscis. walzenförmig, oben mit aus-  
genähnlichen Ringen, und  
unten mit vier braunen Fle-  
cken bezeichnet.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 54.*

*Benan. Recr. cl. 3. f. 263.*

*Petiv.*



*Petiv. Gaz. t. 97. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 38. f. D.*

*Gualt. Test. t. 16. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. D.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 57. f.*

*Knor. Vergn. III. 11. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 285. 286. f.*

D. I. 5. *Cypraea testudinaria*.

D. I. 5. Die Schildkrötenporzellane.

*Linn. Syst. N. Sp. 329.*

*Belg. Schilpad - hoorn. Angl. Great tourtle Gowry. Petiv Gall. Le Lièvre. Dav.*

*Testa subcylindrica, pallida fuscomaculata, extremitatibus depressis.* Die einigermaßen walzenförmige Schale ist weißlich, und braungefleckt, an den Enden plattgedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 36.*

*Rumph. amb. t. 38. f. C.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 7.*

*Knor. Vergn. IV. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 271. 272. f.*

D. I.



160



D. I. 6. *Cypraea sterco-*  
*raria*,

D. I. 6. Das Weitz-  
aug.

*Linn. S. N. Sp. 320.*

*Belg. Wyd - Oog.*

*Testa subturbinata, liuido* Die einigermaßen spizwirts-  
*testaceoque maculata, utrin-* lige Schale ist blaulich grau,  
*que marginata, subtus plana.* mit ziegelfarbigen Flecken bei-  
derseits eingesäumt, und unten  
flach.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 15. f. S. T.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. I. A.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

α *pallida griseoque maculata, tu-*  
*berculo laterali mammillari.*

α blaß und grau gefleckt, mit einer  
warzenförmigen Erhöhung an  
einer Seite.

β *glauco griseoque maculata;*

β faßl und grau gefleckt.

γ *cerea unicolor, tuberculo laterali*  
*mammillari.*

γ wachsgelb, einfarbig, mit einer  
warzenförmigen Erhöhung an ei-  
ner Seite.

D. I. 7. *Cypraea Car-*  
*neola.*

D. I. 7. Der Fuchs.

*Linn. S. N. Sp. 331.*

*Belg.*



Belg. De roode Mol. Angl. Buff Gowry. Petiv. Gall. Taupe rousse.

Testa subturbinata pallida, Die blaße Schale hat eine  
fasciis incarnatis. etwas hervortretende Wirbel-  
spitze, und fleischfarbige Quer-  
bänder.

α ore violaceo.

α mit violetter Mündung.

β ore albido, labio exterioro vix β mit weißer Mündung, und un-  
dentato. deutlich gezählter Lefze.

Rumph. amb. t. 38. f. K.

○ Petiv. Gaz. t. 80. f. 8.

Knor. Vergn. VI. 17. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 287. 288. f.

Mus. Caes. Vindobon.

D.I. 8. Cypraea Zebra- D.I. 8. Der graue Maul-  
wurf.

Linn. S. N. Sp. 332.

Belg. De grave Mol.

Testa turbinata cinerea, Die bleisfarbige Schale hat  
fasciis latis griseis, aperturac eine hervorragende Spitze, brei-  
denticulis fuscis. te graue Querbänder, und an  
der Mündung braune Zähne.

L

Bman.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 266.*  
*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 15.*  
*Seb. Thes. III. t. 76. f. 5, 15.*  
*Argenv. Conch. Pl. 18. f. G.*  
*Knor. Vergn. II. 24. t. 3. f.*  
*Mart. Konch. Kab. I. 26. t. 2; 6 f.*  
*Mus. Caes. Vindobon.*

D. I. 9. *Cypraea Talpa.* D. I. 9. Der Maulwurf.

*Linn. S. N. Sp. 333.*

*Belg. Mol. Angl. The yellow zoned Porcellane Hill. Gall. La Taupe. Dav.*

*Testa turbinata subcylindrica testacea, fasciis albidis, basi incrassata atro fusca.* Die braunlichgelbe walzenförmige Schale hat eine hervorstehende Wirtelspitze, blaße Querbänder, und einen aufgeschwellenen schwarzbraunen Boden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 14.*  
*Rumph. amb. t. 38. f. 7.*  
*Petiv. amb. t. 16. f. 1.*  
*Gualt. Test. t. 16. f. N.*  
*Argenv. Conch. Pl. 18. f. H.*  
*Regenf. Samml. I. 10. t. 37. f.*  
*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

Knor.



*Knor. Verg. I. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 273, 274. f.*

D. I. 10. *Cypraea lurida.* D. I. 10. Die Maus.

*Linn. S. N. Sp. 335.*

*Belg. De Muis. Gall. La Souris. Dav.*

Testa turbinata, obsolete Die spizwirblige Schale  
fasciata, extremitatibus nigro hat matte Duerbänder, an den  
bimaculatis, basi alba, Enden zwei schwarze Flecken  
und einen weissen Boden.

*List. Hist. Conch. t. 4. f. 9. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 13. f. E. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. C.*

*Adans. Seneg. t. 5. f. D.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 315. f.*

D. I. 11. *Cypraea lota.* D. I. 11. Die Milchs-  
porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 337.*

Testa subturbinata, utrin- Die einigermassen spizwirb-  
que marginata, denticulis aper- lige Schale ist beiderseits ein-  
turae acutis. gesäumet, und an der Münz-  
dung mit spizen Zähnen versehen.



*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 322. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. I. 12. *Cypraea fragilis*.

D. I. 12. Die Dünnschale.

*Linn. S. N. Sp. 338.*

*Belg. Turke Papier Porcelain - Hoorn. Gall. Porcellaine marbrée.*

Testa turbinata, ouata, glauca, picta maculis angulatis pallidis.

Die spizwirblige enförmige schale ist mit blaßen eckigen Flecken bezeichnet.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 16. f. 2.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. II. Obtusae, seu absque Spira manifesta.

D. II. Stumpfwirblige, oder mit undeutlicher Wirbelspize.

D. II. 1. *Cypraea Caput serpentis*.

D. II. 1. Der Mohrenbauch.

*Linn. S. N. Sp. 339.*

*Belg. Klene Slang Kop. Angl. Smal Snake Gowry. Pet. Gall. La petite tete de Serpent.*

Testa obtusa, triquetra gibba, dorso albo maculato, labris albis.

Die stumpfwirblige dreysseitig höckerige Schale ist auf dem Rücken weißgesteckt, an den Lippen ganz weiß.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 50.*

*Rumph. amb. t. 38. f. F.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 7.*

— *Gaz. t. 96. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 15. f. O.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. G.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 316. f.*

D. II. 2. *Cypraea mauritiana.*

D. II. 2. Der große  
Schlangenkopf.

*Linn. S. N. Sp. 340.*

*Belg. Slang Kop Rumph. Angl. Great turtle Leopard. Pet. Gall. Tete de Serpent. Dav.*

Testa obtusa plano convexa, dorso gibbo pallide maculato, basi nigricante.

Die stumpfwirbige, unten flache, oben erhabene Schale hat einen höckerigen blaß gefleckten Rücken, und schwärzlichen Boden.

α dorso fusco pallide maculato; lateribus fuscis.

α mit braunen blaßgefleckten Rücken, und braunen Seiten.

β dorso griseo albido maculato, lateribus lividis.

β mit lichtgrauen weißgefleckten Rücken, und blaulich grauen Seiten.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 52.*

*Petiv. Gaz. I. t. 96. f. 8.*

*Rumph. amb. t. 38. f. E.*

*Knor. Vergn. I. 13. t. 1, 2. f.*

—— — II. 27. t. 5. f.

*Mart. Kouch, Kab. I. 30. t. 317. f.*

D. II. 3. *Cypraea Vi-*  
tellus.

D. II. 3. Die Salzform  
Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 341.*

*Belg. Zout - Koreltje ; Angl. Salt - speckled Gowry Petiv. Gall.*  
*La Grélee.*

Testa obtusa, livida, albido  
maculata,

Die stumpfwirblige Schale  
ist blaulichgrau, mit weißen Fle-  
cken.

*Bonan. Recr. el. 3. f. 254.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 23.*

*Petiv. Gaz. I. t. 80. f. 2.*

*Rumph. amb. t. 38. f. L.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 3. f.*

*Mart. Konch, Kab. I. 23. t. 238. f.*

D. II. 4. *Cypraea Mus.*

D. II. 4. Die Kröte.

*Linn. S. N. Sp. 342.*

*Belg.*





*Belg.* Cartageense Wit-rugge. *Angl.* Carthagena Cowry *Petiv.*  
*Gall.* Le Crapaud *Dav.*

*Testa* obtusa, gibba, cinerea, *Die stumpfwirblige höckeri-*  
*fascia* longitudinali nigro ma- *ge Schale* ist von aschengrauer  
*culata.* *Farbe*, mit einem nach der  
Länge laufenden schwarzgesteck-  
ten Bände.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 2.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 8.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 76. f. 33, 34.*

*Knor. Vergn. III. 12. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 222. 223. f.*

D. II. 5. *Cypraea* Ti-  
gris.

D. II. 5. Die Tigere  
porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 343.*

*Belg.* Getygerde Kliphooorn. *Angl.* The great Leopard *Pet. Gall.*  
*La Peau de Tigre. Dav.*

*Testa* obtusa, antice rotun- *Die stumpfwirblige vorne*  
*data*, dorso maculato, basi *rundliche Schale* ist auf dem  
*niuea.* Rücken gesteckt, am Boden  
schneeweiß.

“ *linea* longitudinali nulla.

“ ohne Linie über die Länge des  
Rückens.



β linea longitudinali dorsali az-  
uo rubente.

β mit einer nach der Länge des  
Rückens laufenden gelbrothen  
Linie.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 29.*

*Rumph. amb. t. 38. f. A.*

*Petiv. Gaz. t. 96. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 14. f. G, H, I, L.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 4, f. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 232. 236. f.*

D. II. 6. *Cypraea Lynx.* D. II. 6. Die Masern-  
Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 344.*

*Belg. Mazelen. Rumph. Angl. Thick Saffron - tooth' dGowry. Pet.  
Gall. La Truitée. Dav.*

Testa obtusa maculis fuscis, Die stumpfwirblige brauns-  
linea longitudinali fulva, ore gefleckte Schale hat nach der  
rufo. Länge des Rückens einen roth-  
gelben Strich, und eine brauns-  
rothe Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 38. f. O, P.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 14. f. C, D.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 6, 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. 29. t. 303, 304. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. II. 7.



D. II. 7. *Cypraea Isabella*.

D. II. 7. Die Isabelle.

*Linn. S. N. Sp. 293.*

*Belg. Isabelle, Rumph. Angl. Isabella Gowry Pet. Gall. L' Isabelle. Dav.*

*Testa obtusa subcylindrica, extremitatibus croceis.*

Die stumpfwirblige einigermaßen walzenförmige Schale hat safranrothe Endspitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 4.*

*Rumph. amb. t. 39. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 16.*

— *amb. t. 16. f. 16.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. P.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 27. t. 275. f.*

D. II. 8. *Cypraea cylindrica*.

D. II. 8. Die Walzenporzellane.

*Testa obtusa cylindrica, vertice complanato, extremitatibus fusco bimaclatis.*

Die stumpfwirblige walzenförmige Schale ist an dem Wirbel plattgedrückt, an den Endspitzen mit zweien braunen Flecken gezeichnet.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa cylindrica, spira complanata. Dorsum pallide amethystinum; Latera maculis raris fulvis. Extremitates utrinque marginatae bimaculatae. Rima inaequalis. Dentes labii extimi remotiores. Basis niuca.

Die Schale ist walzenförmig. Die Wirbelspiße plattgedrückt. Der Rücken von bläßer Amethystfarbe. Die Seiten sind beiderseits eingesäumt, und mit braunlichen zerstreuten Flecken, die Endspitzen aber mit zweien braunen Flecken gezeichnet. Die Spalte der Mündung ist ungleich. Die Zähne der äußeren Lefze stehen etwas mehr von einander entfernt. Der Grund ist schneeweiß.

D. III. Umbilicatae.

D. III. Mit nabelförmig eingedrücktem Wirbel.

D. III. 1. Cypraea Hirundo.

D. III. 1. Die Schwalbe.

Linn. S. N. Sp. 350.

Belg. Het blaevue Katje.

Testa umbilicata subcylindrica, extremitatibus fusco bimaculatis.

Die nabelförmig eingedrückte walzenförmige Schale hat an den Enden zweien braune Flecken.

List. Hist. Conch. 1. 4. f. 9. f. 20.

Petiv. Gaz. t. 30. f. 3.

Mus. Caes. Vindobon.

D. III. 2. Cypraea Asellus.

D. III. 2. Das Eselchen.

Linn. S. N. Sp. 351.

Belg.



*Belg.* Ezeltje. *Rumph.* *Angl.* Ass Gowry. *Pet.* Gall. Le petit Ane.  
*Ar. eriv.*

*Testa umbilicata albida,* Die nabelförmig eingedrückt-  
*fasciis dorsalibus tribus fuscis.* te weißliche Schale hat drey  
braune Querbänder.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 39. f. M.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 11.*

—— *amb. t. 16. f. 18.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. T.*

*Adams. Seneg. Pl. 5. f. H.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. IV. 25. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 280 f.*

D. III. 3. *Cypraea Er-*  
*rones.*

D. III. 3. Das Ba-  
starddrachenhöpfchen.

*Linn. S. N. Sp. 352.*

*Belg.* Poolische Muts. *Angl.* Freckled Olive Gowry *Petiv. Gall.*  
*Le Bonnet polonois.*

*Testa umbilicata oblonga,* Die nabelförmig eingedrückt-  
*fauce violacea, macula dor-* te längliche nebelichte Schale  
*fali testacea.* hat einen violeten Mund, und  
einen braun grauen Fleck auf  
dem Rücken.

*Petiv.*



*Pesiv. Gaz. t. 97. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 294. 295. f.*

D. IV. Marginatae.

D. IV. Eingefäumte.

D. IV. 1. *Cypraea cribraria*.

D. IV. 1. Das Argus Weibchen.

*Linn. S. N. Sp. 353.*

*Belg.* Het Klene Wyfje van den Argus. *Angl.* The little Wife of the Argus. *Gall.* Le petit Argus *Argenv.*

|                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Testa umbilicata oblonga lutea, maculis rotundatis albis, basi emarginata alba.</p> | <p>Die nabelförmig eingedrückte, längliche, gelbliche Schale, ist mit rundlichen Flecken besetzt, und mit einem eingesäumten Boden versehen.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 42.*

*Pesiv. Gaz. t. 8. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 39. f. R.*

*Argenv. Test. t. 18. f. X.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 74. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 336. f.*

D. IV. 2. *Cypraea Moneta*.

D. IV. 2. Die guineische Münze.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 354.*

*Belg.* Gemeene geele Kauris. *Angl.* Black moors Thooth. *Petiv. Gall.* Monnoye de Guinée.

Testa marginata albida, lateribus nodolis. Die eingesäumte weißliche Schale hat knotige Seitenränder.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 233.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 59.*

*Rumph amb. t. 39. f. C.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 14.*

—— *Gaz. t. 97. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 14. f. 4, 5.*

*Argenz. Conch. Pl. 18. f. K.*

*Knor. Vergn. IV. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 337. 338. f.*

D. IV. 3. *Cypraea Anulus.* D. IV. 3. Der Ring.

*Linn. S. N. Sp. 355.*

*Belg.* Blauwe Kauris. *Gall.* La Colique. *Dar.*

Testa marginata, annulo flavo discum dorsi ambiente. Der Mittelrücken der eingesäumten Schale ist mit einem gelben Ringe eingefasst.

*Petiv.*





*Rumph. amb. t. 39. f. D.*

*Petiv. Gaz. t. 6. f. 8.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 4. f.; 16. t. 4. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 11.*

*Mart. Konch. Konch I, 24. t. 239. 240. f.*

D. IV. 4. *Cypraea caurica.*

D. IV. 4. Die gefleckte Cauris.

*Linn. S. N. Sp. 356.*

*Belg. Pockjes. Rumph. Angl. Long Massle Gowry. Petiv. Gall. La peau d'Ane. Dav.*

Testa dorso luteo alboque nebuloso, margine inaequali albido, fusco punctato. Der Rücken ist gelb und weiß nebelicht, der Rand ungleich, weißlich mit braunen Punkten.

*Rumph. amb. 38t. f. P.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 15. f. X.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 13.*

*Mart. Konch. Kab, I, 29. t. 301. 302. f.*

C. IV. 5. *Cypraea Draena.*

D. IV. 5. Das Drachenhaupt.

*Belg.*



Belg. Draackje. Angl. Dragon Gowry. Pet. Gall. Tete de Dragon.

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Testa derofo marginata, lateribus albis fusco maculatis; dorso luteo nebuloso, macula media testacea.</p> | <p>Die Schale hat einen gleichsam zernagten Saum, die weißen Seiten sind braun gefleckt, der Rücken gelb, neblicht, mit einem braunen grauen Flecke in der Mitte.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Petiv. amb. t. 16. f. 10.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 292. 293. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Testa oblongo ouata. Vertex umbilicatus retusus. Dorsum carinis duabus transuersis obsoletis. Latera emarginata, margine incrassato eroto. Dentes latitudinem labii extimi occupantes. Color dorsi luteo nebulosus; Latera alba punctis fuscis dispersis maculata. Basis alba.</p> | <p>Die Schale ist länglicht eysförmig. Der Wirbel ist mit einem stumpfen nabelsförmigen Eindruck, der Rücken mit zweien stumpfen Schnitten der Quere nach besetzt. Die Seiten sind eingesäumt, der Saum aufgeworfen, und gleichsam zernagt. Die Zähne erstrecken sich über die ganze Breite der äußeren Lefze. Der Rücken ist von gelber neblichter Farbe. Die Seiten sind weiß, mit zerstreuten braunen Punkten. Der Boden ganz weiß.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

D. IV. 6. Cypraea erosa.

D. IV. 6. Das Weißaug.

Linn. S. N. Sp. 357.

Belg. Witoogje. Rumph. Angl. Whis-eyed Gowry Petiv. Gall. Pointillage blanc.

Testa



Testa crenato marginata, Die weiß punktirte Schale  
albo punctata, lateribus ma- hat einen gekerbten Saum, und  
cula fuscente. an jeder Seite einen braunli-  
chen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 39.*

*Petiv. Gaz. I. t. 97. f. 19.*

— amb. t. 16. f. 12.

*Rumph. amb. t. 39. f. A.*

*Gualt. Test. t. 15. f. H.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 320, 321. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 7. *Cypraea fla-*  
*ueola.*

D. IV. 7. Der Brand-  
fleck.

*Linn. S. N. Sp. 358.*

*Belg. Brand - vlakje.*

Testa derosa, lutea albo- Die gelb und weiß neblichte  
que nebulosa, lateribus ful- Schale hat einen zernagten  
uis. Rand, und braunrothe Seiten.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 14. f. E.*

*Mart. Konch. Kab. I. 26. t. 267, 268. f.*

D. IV. 8.



D. IV. 8. *Cypraea spur-*  
ga.

D. IV. 8. Der Gelb-  
schmuz.

*Linn. S. N. Sp. 359.*

*Belg. Geelsmetje.*

Testa subemarginata, spira  
plana orbiculari, labio exter-  
no vix dentato.

Die etwas eingesäumte Scha-  
le hat einen flachen runden Wir-  
bel, und an dem äußeren Rande  
keine deutliche Zähne.

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 9. *Cypraea sto-*  
lida.

D. IV. 9. Das Rost-  
flecken.

*Linn. S. N. Sp. 360.*

*Belg. Het Soostolakje. Angl. The Beetle Porcellane. Hill.*

Testa marginata pallida, ma-  
culis quadrangularibus testa-  
tis.

Die eingesäumte weißliche  
Schale ist mit rostfarbigen vier-  
eckigen Flecken bemalt.

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 18.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. 1.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 305. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

178



D. IV. 10. *Cypraea*  
heluola.

D. IV. 10. Die Stern-  
porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 361.*

*Belg. Sterretje. Angl. Star Gowry Petiv. Gall. Porcellaine e to-  
lée. Dav.*

Testa crenato marginata, Die höckerige weißpunktirte  
gibba, albo punctata, sub- und unten rothbraune Schale,  
tus ruffa. hat einen zernagten Saum.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 38.*

*Rumph. amb. t. 39. f. B.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 17.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 326. 327. f.*

D. IV. 11. *Cypraea*  
ocellata.

D. IV. 11. Das Schwarz-  
aug.

*Linn. S. N. Sp. 362.*

Testa submarginata, ocellis Die einigermaßen eingesäum-  
nigris inter annulos pallidos. te Schale hat schwarze mit blaß-  
gelben Ringen eingefasste Augen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 43.*

*Petiv. Gaz. t. 9. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 333. 334. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 12.



D. IV. 12. *Cypraea* D. IV. 12. Die Frie-  
poraria. selporzellane.

*Linn. S. N. Sp. 363.*

Testa marginata, ocellis Die eingesäumte Schale hat  
albis, annulo fusco cinctis; weiße mit Ringen eingefasste  
basi amethystina. Augen, und einen amethyst-  
farbigen Boden.

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 324. 325.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 13. *Cypraea* Pe- D. IV. 13. Die Laus.  
diculus.

*Linn. S. N. Sp. 364.*

*Belg. Zee Vloog Rumph. Angl. Louse Gowry Petiv. Gall. Pou  
de Mer. Argenv.*

Testa marginata subglobosa, Die eingesäumte fast kugel-  
striis eleuatis transuersis, in förmige Schale ist mit erhabes-  
rimam usque protensis. nen Duerstreifen besetzt, die  
sich bis zur Spalte erstrecken.

α sulco dorfi longitudinali.

α mit einer Furche nach der Länge  
des Rückens.

β sulco dorfi longitudinali nullo. β ohne Furche nach der Länge des  
Rückens.

*List. angl. t. 3. f. 17.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 56, 57.*



*Rumph. amb. t. 39. f. P.*  
*Petiv. amb. t. 16. f. 22.*  
*Gualt. Test. t. 14. f. P. t. 15. f. P, R.*  
*Argenv. Conch. Pl. 18. f. L.*  
*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 3.*  
*Knor. Vergn. VI. 17. t. 6. f.*  
*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 310, 311. f.*

D. IV. 14. Cypraea      D. IV. 14. Die Reiss-  
 Nucleus.                      farnporzellane.

*Linn. S. N. Sp. 365.*

*Belg. De Rys Korrel. Angl. The Rice Gowry Petiv. Gall. La petite Verole. Dav.*

Testa utrinque marginata,      Die beiderseits eingesäumte  
 sulcis tuberculisque exaspera-      Schale ist mit Furchen, und  
 ta,                                      Körnchen besetzt.

\* alba (major) subrostrata.

\* weiß (und größer) mit schnau-  
 zenförmigen Endspitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 58.*  
*Petiv. Gaz. t. 97. f. 12.*  
 ——— amb. t. 16. f. 11.  
*Rumph. amb. t. 39. f. 7.*  
*Gualt. Test. t. 14. f. S.*

*Argenv.*





*Argenv. Conch. Pl. 18. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 22.*

*Knor. Vergn. IV. 17. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 312. f.*

utrinque obtusa, punctis eleuatis annulo ferrugineo cinctis (minor). β an beiden Enden stumpf (und kleiner) die erhabenen Körner sind mit roßfarbigen Ringen eingetaucht.

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 15. *Cypraea staphylaea.* D. IV. 15. Die Affel.

*Linn. S. N. Sp. 366.*

*Belg. Pisseped. Gall. La Cloporte. Argenv.*

Testa punctis eleuatis, sine striis, extremitatibus luteis. Die Schale ist mit erhabenen Körnern besetzt, ohne Streifen, und an den Endspitzen gelb.

*Gualt. Test. t. 14. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. S.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. t. 29. f. 313. 314. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

182



D. IV. 16. *Cypraea* D. IV. 16. Das Korn-  
*Cicercula*, Knöpfchen.

*Linn. S. N. Sp. 367.*

*Belg. Korelye Knoopje. Rumph. Angl. Wart Gowry. Petiv.*

*Testa utrinque rostrata, ad-* Die an beiden Enden schnau-  
*sperla punctis eleuatis.* zenförmige Schale ist mit er-  
habenem Punkten besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 62.*

*Rumph. amb. t. 39. f. K.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 243. 244. f.*

D. IV. 17. *Cypraea* D. IV. 17. Das glatte  
*Globulus*, Knöpfchen.

*Linn. S. N. Sp. 368.*

*Belg. Paerltje. Rumph. Angl. Pearl Gowry. Petiv.*

*Testa laeui, utrinque rostra-* Die Schale ist glatt und an  
*ta.* beiden Enden schnauzenför-  
mig.

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 4.*

— *amb. t. 16. f. 19.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 39. f. L, N.*

*Gualt. Test. t. 14. f. M.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 242. f.*

*Murray. Fund. Test. t. 1. f. 12.*

E. Bulla.

E. Die Blasenschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 322.*

Testa conuoluta laevis; Die Schale ist zusammen-  
Apertura subcoarctata ob- gerollet und glatt; ihre  
longa; Columella obli- Mündung, welche der Län-  
qua edulenta, ge nach herabläuft, mei-  
stens nur an einem Ende  
ausgeschnitten; die Spin-  
del schief und ohne Zähne.

E. 1. Bulla Onum.

E. 1. Das Ey.

*Linn. S. N. Sp. 369.*

*Belg. Porselein - hoorn. Rumph. Angl. White Egg - Gowry. Petiv. Gall. L'oeuf Dav.*

Testa ouata, obtuse biro- Die eysförmige Schale ist  
stri, labro exteriore dentato. an beiden Enden mit einer  
stumpfen Schnauze versehen,  
an der äußeren Kefze gezähnt.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 252.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 65.*

*Rumph. amb. t. 38. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 6.*

— *Gaz. t. 97. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 15. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 76. f. 6, 10.*

*Knor. Vergn. VI. 33. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 205. 206. f.*

E. 2. *Bulla birostris.*

E. 2. Der kleine We-  
berspuhl.

*Linn. Syst. N. Sp. 371.*

*Belg. Bastert Wewers - Spoeltje. Gall. Petite Navette.*

Testa oblonga, margine in-  
crassato, angulato, rostris elon-  
gatis laevibus.

Die längliche Schale hat  
einen aufgeschwollen eckigen  
Rand, und glatte schnabelför-  
mige Endespitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 66.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 217. f.*

E. 3. *Bulla Spelta.*

E. 3. Das Joch.

*Linn. S. N. Sp. 372.*

*Belg.*



Belg. Jockje. Angl. Smal Leghorn Gowrikin. Pet.

Testa oblonga utrinque ob- Die längliche Schale hat  
tusiuscula, labro arcuato in- etwas stumpfe Endspitzen, und  
crassato. eine gebogene verdickte Lefze.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 68.

Petiv. Gaz. t. 66. f. 2, 3.

Gualt. Test. t. 15. f. 4.

Ginan. adr. II. t 13. f. 95.

Mart. Konch. K&b. I. 23. t. 215. 216. f.

E. 4. Bulla verrucosa. E. 4. Der Hochrückten.

Linn. S. N. Sp. 373.

Belg. Witte Jamboeze; Rumph. Angl. White Nipple Gowry - Kín.  
Petiv. Gall. La Boslue. Dav.

Testa gibbosa transuersim Die höckerige Schale hat  
carinata, extremitatibus gra- einen eckigen Quervulst, und  
no rotundo adnato. an jedem Ende ein rundes an-  
gewachsenes Knöpfchen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 67.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 22.

— amb. t. 16. f. 23.

Rumph. amb. t. 38. f. H.

Gualt. Test. t. 16. f. F.

M 5

Argenv.



*Argenv. Conch. Pl. 18. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 17.*

*Knor. Vergn. IV. 26. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 220, 221.*

E. 5. *Bulla gibbosa.*

E. 5. Der Wulst.

*Linn. S. N. Sp. 374.*

*Belg. Hoogruggetje. Gall. La petite bouche.*

Testa subcylindrica, angu- Die einigermaßen walzen-  
lo dorsali eleuato transuerso. förmige Schale führt auf den  
Rücken einen in die Quere lie-  
genden erhabenen Gürtel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 249. 339.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 64.*

*Petiv. Gaz. t. 15. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 15. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 18.*

*Knor. Vergn. I. 14. t. 3, 4. f.*

—— — VI. 32. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 211. 212. f.*

E. 6. *Bulla Naucum.*

E. 6. Das Taubeney.

*Linn. S. N. Sp. 375.*

*Belg.*



Belg. Witte Kievits - Ey. Valent. Gall. La Bulle d'eau. Dav.

Testa rotundata subpellucida, transuersim striata, utrinque umbilicata, Die rundliche halbdurchsichtige Schale ist in die Quere gestreift, und an beiden Enden mit einem Nabelloche versehen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 4.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 73.

Rumph. amb. t. 27. f. H.

Gualt. Test. t. 13. f. G. G.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. Q.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 45.

Knor. Vergn. VI. 38. t. 2, 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 200. f.

E. 7. Bulla aperta.

E. 7. Die offene Blase.

Linn. S. N. Sp. 376.

Testa subrotunda pellucida, apertura patentissima, Die rundliche durchsichtige Schale hat eine ganz erweiterte offene Mündung.

Gualt. Test. t. 13. f. EE.

Mus. Caes. Vindobon.

E. 8. Bulla Ampulla.

E. 8. Das Kiebigen.

Linn. S. N. Sp. 378.

Belg.





Belg. Kievits - Ey. Angl. The Indian Dipper. Pet. Gall. La  
Muscade Dav.

Testa rotundata opaca, ver-  
tice umbilicato.

Die rundliche undurchsichti-  
ge Schale hat einen nabelför-  
mig eingedrückten Wirbel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 3.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 12.

Petiv. Gaz. t. 50. f. 13. t. 99. f. 14.

Rumph. amb. t. 27. f. G.

Gualt. Test. t. 12. f. E — F.

Adans. Seneg. Pl. 1. f. 2.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 34 — 44.

Regenf. Samml. I. 5. t. 58. f. 8. t. 21. f.

Knor. Vergn. II. 8. t. 1. f.

—— — V. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 188. f. 22. t. 202-204f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 4, 5.

E. 9. Bulla lignaria.

E. 9. Die Papierrolle.

Linn. S. N. Sp. 379.

Belg. Opperolde Papier. Gall. 1' Oublie. Dav.

Testa obouato oblonga Die verkehrt eysförmige läng-  
transuersim striata, vertice liche Schale ist in die Quere  
umbilicato. gestreift, und mit einem ge-  
nabelten Wirbel versehen.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 71.*

*Knor. Vergn. VI. 37. t. 1, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 194 195. f.*

E. 10. *Bulla Physis.*

E. 10. Die Staaten-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 380.*

*Belg. Staate Vlaggetje. Valent. Gall. Condole rayée. Argenv,*

Testa ovato oblonga, picta  
lineis transversis undulatis,  
spira horizontali.

Die eysförmige längliche  
Schale ist in die Quere mit  
wellenförmigen Linien bemalt,  
und mit einem wagrechten  
Schnitzel versehen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 75.*

*Bonan. Mus. Kirch, cl. 3. f. 403.*

*Valent. Abb. t. 2. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 13. f. F. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. 7.*

*Seb. Tbes. III. t. 38. f. 46 — 50.*

*Murray. Fund. Test. t. 1. f. 9.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 196. 197. f.*

E. 11. *Bulla Amplu-*  
stre.

E. 11. Das rothe Band.

*Linn.*

190



*Linn. S. N. Sp. 381.*

*Belg. Rood - bandje.*

*Testa subglobosa albida, Die einigermaßen kugelför-*  
*cingulis transuersis fuscis, mige weißliche Schale hat brau-*  
*spira obtusa. ne Quergürteln, und einen*  
*stumpfen Schnirkel.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 198. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

*E. 12. Bulla Ficus.*

*E. 12. Die Feige.*

*Linn. S. N. Sp. 382.*

*Belg. Spaansche Vyg. Rumph. Angl. Fig - whelk. Pet. Gall, La*  
*Figue.*

*Testa obouato clauata, re- Die verkehrt kegelförmige,*  
*ticulato striata, rostro exser- kaulähnliche und nezförmig ge-*  
*to, spira oblitterata. streifte Schale hat einen ver-*  
*längerten Schnabel, und un-*  
*deutlichen Schnirkel.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 15.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 46.*

*Rumph. amb. t. 27. f. K.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. J. M.*

*Argens.*



*Argenv. Conch. Pl. 17. f. O.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 93.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 1.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 4. f.*

—— III. 23. t. 1. f.

—— *Delic. nat. I. t. B. II. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. III. 66. t. 734. f.*

E. 13. *Bulla Rapa.*

E. 13. *Die Rube.*

*Linn. S. N. Sp. 383.*

*Belg. Knollhoorn. Rumph. Angl. Round Partridge. Petiv Gall.*  
*Le Radix. Dav. Ital. Il Radiccio.*

Testa rotundato turbinata, Die runde birnförmige Scha-  
spira exserta, rostro incurua- le hat einen hervorragenden  
to. Schnickel, und umgedrehten  
Schnabel.

*Rumph. amb. t. 27. f. F.*

*Petiv amb. t. 9. f. 8.*

*Valent. Abb. 9. t. 82. f.*

*Gualt. Test. t. 26. f. H.*

*Argenv. Conch Pl. 17. f. K.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 4. f. 80.*

*Seb. Thes. t. 38. f. 13-16. 18-20, 22, 23,*

—— t. 68. f. 7, 8.

*Knor.*



*Knor. Vergn. I. 19. t. 5. f.*

— *Del. nat. I. t. B. II f. 8.*

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 747-749. f.*

E. 14. *Bulla Terebellum.* E. 14. Der glatte Böttchenbohrer.

*Linn. S. N. Sp. 388.*

*Belg. Kuipers - Boor. Rumph. Angl. The speckled Augur - Peg. Petiv. Gall. La Tarriere. Dav.*

*Testa cylindrica, spira subulata, basi truncata.*

Die walzenförmige Schale hat einen zugespizten Schnirkel, und eine abgestumpfte Grundspize.

*α alba, punctis dispersis minutissimis.*

*α weiß, mit sehr kleinen zerstreuten Punkten.*

*β pallida, punctis maculisque nebulosis.*

*β blaß, mit nebelichten Punkten und Flecken.*

*γ pallida, lineis punctatis.*

*γ blaß, mit punktirten Linien.*

*δ pallida, lineis obliquis angularis.*

*δ blaß, mit schiefen Winkelzügen.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 57.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 30. f. S.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 13. f. 24.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. G.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. II. 4. t. 4. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 568. 569. f.*

E. 15. *Bulla Cypraea.* E. 15. Die Porzellan-  
blase.

*Linn. S. N. Sp. 389.*

*Belg. Bruin gebandeerd Bakje; Gall. Baquet bandé.*

Testa ovato oblonga, spi- Die eysförmige längliche  
rae apice prominulo, colu- Schale hat eine hervorragende  
mella torta, Wirbelspize, und eine gewun-  
dene Spindel.

*Knor. Vergn. VI. 4. t. 5. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

E. 16. *Bulla virginea.* E. 16. Die Prinzen-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 390.*

*Belg. Prince Vlag. Gall. Le Ruban. Dav,*

Testa subturrita erecta, co- Die einigermaßen gethürmte  
lumellae basi truncata, cin- und aufrechte Schale ist an  
gulis coloratis transuersis, dem Grunde der Spindel ab-  
gestumpfet, und mit gefärbten  
Querbändern bemalt.

N

*z. fasciis*



- α fasciis miniatis flavisque, lineis mit meningrothen und gelben  
roseis & purpurascensibus. Bändern; wie auch rosenrothen  
und purpurfarbigen Linien.
- β fasciis flavis & viridibus, lineis mit gelben und grünen Bändern;  
purpureis & violaceis. wie auch purpurothen und vio-  
letten Linien.
- γ lineis fulvis, cum fasciis inter- mit rothgelben Linien, die mit  
ruptis, solum in anfractibus su- unterbrochenen Bändern auf den  
premis alternantibus. oberen Gewinden allein abwech-  
seln.
- δ tota alba, lineis miniatis prope ganz weiß, mit meningfarbigen  
sutures. Linien an den Näthen.
- ε fusca, anfractuum fascia media braun, deren jedes Gewind in  
& utrinque saturali alba. seiner Mitte, wie auch beider-  
seits an der Naht eine weiße Binde  
trägt.
- η alba, fasciis parallelis fuscis. η weiß, mit gleichweit abstehenden  
braunen Bändern.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 66.*

*Petiv. Gaz. t. 22. f. 11. t. 151. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 6. f. A. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. N. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 116.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 62-74. t. 40. f. 38. 39.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 46. f.*

*Knor. Vergn. I. 30. t. 7. f.*

— — — V. 25. t. 4. f.

— — — Del. nat. I. t. B. II. f. 6.





E. 17. *Bulla achatina*.

E. 17. Die französische Schellenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 391.*

*Belg. Fransche Belhoorn.*

Testa ouato oblonga, columellae basi truncata.

Die eiförmige längliche Schale hat eine am Grunde abgestumpfte Spindel.

α fasciis longitudinalibus undulatis α mit nach der Länge laufenden breiten Wellen, und rother Spindel.  
latis, columella rubra,

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 192.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 34.*

*Petiv. Gaz. t. 44. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 45. f. B.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 60.*

*Seb. Thes. III. t. 71. f. 1 — 3.*

*Knor. Vergn. IV. 24. t. 1. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. V. f. 1.*

β fasciis longitudinalibus undulatis β mit nach der Länge laufenden schmalen Wellen, und weißer Spindel.  
tenuibus, columella alba.

*Seb. Thes. III. t. 71. f. 4, 5.*

*Knor. Verg. V. 12. t. 2. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

γ ponderosa, alba unicolor. γ schwer, weiß, einsärbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. *Voluta*.

F. Die Faltenschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 322.*

N 2

Testa



Testa conuoluta, columella transuerse plicata.

Die zusammen gerollte Schale ist an ihrer Spindel mit Quersalten versehen.

F. I. Apertura coarctata.

F. I. Mit eingefaster Mündung.

F. I. I. Voluta Auris Midae.

F. I. I. Das Midasohr.

Linn. S. N. Sp. 392.

Belg. Midas - Oor. Rumph. Angl. Midas - Ear. Petiv. Gall. Oreille de Midas. Argenv.

Testa ouali oblonga, spira, basique rugulosa, columella bidentata.

Die eysförmige längliche Schale, ist an dem Wirbel und Grunde gerunzelt, an der Spindel mit zwei Falten versehen.

α nivea (major.)

α schneeweiß (größer.)

β fusca (minor.)

β braun (kleiner.)

Bonan. Mus. Kirch. cl. 3. f. 412.

Rumph. amb. t. 33. f. H.H.

Petiv. amb. t. 8. f. 2.

Gualt. Test. t. 55. f. G.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.

Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 122.

Seb. Tbes. III. t. 71. f. 21. 22.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 43. t. 436 — 438. f.

Testa



F. I. 2. Voluta Auris  
Sileni.

Testa ouali gibba umbilica-  
ta, columellae plica unica cras-  
sa flexuosa.

F. I. 2. Das Langohr.

Die eysförmige höckerige  
Schale hat an der Spindel ei-  
ne dicke gedrehte Falte.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ouata gibba, laevis, longitu-  
dinaliter obsolete striata. Spira  
obtrusa, ex anfractibus quatuor con-  
uexis, subito decrefcentibus, in ver-  
ticem obtusum terminata. Apertu-  
ra ouata coarctata. Labium exte-  
rius marginatum, interius tenue  
replicatum, & super columellam  
expansum, dente subtus oblique  
flexuoso, crasso. Basis perforata. Co-  
lor badius, fasciis undulatis longi-  
tudinalibus rufis.

Die Schale ist eysförmig, und  
glatt, nach der Länge herab matt  
gestreift. Der Schnirkel besteht  
aus vier gewölbten geschwinde ab-  
nehmenden Windungen, die sich in  
eine stumpfe Spitze endigen. Die  
Mündung ist eysförmig, ganz ein-  
gefaßt. Die äußere Lefze ist eine  
gesäumt, die innere dünne über  
die Spindel ausgebreitet, an wel-  
cher unten eine dicke schief gedreht-  
te Falte liegt. Der Grund ist  
durchbohret. Die Farbe schwarz-  
braun, mit rothbraunen nach der  
Länge herablaufenden Wellen.

F. II. Cylindroideae effusae,

F. II. Einigermassen walzenförmig,  
mit ausgeschnittener Mündung.

F. II. 1. Voluta por-  
phyria.

F. II. 1. Die Lager-  
walze.

*Linn. S. N. Sp. 398.*

Belg. Porphy. Daadel. Oud. Angl. The Camp. Da Cost. Por-  
phyre Argeny.

Testa subcylindrica laeui,  
spirae anfractibus acute mar-  
ginatis, infimis planiusculis, co-  
lumella incrassata oblique pli-  
cata.

Die walzenförmige glatte  
Schale hat scharfrandige Win-  
dungen, deren unterste etwas  
flach sind, mit einer dichten  
schief gefalteten Spindel.

Picta lineis angularis.

Mit eckigen Winkelzügen bemalt.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 142.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 11.*

*Petiv. Gaz. t. 102. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 24. f. P.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 15. f.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 1. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV f. 4.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 498. f.*

F. II. 2. *Voluta Oliua.* F. II. 2. *Die Olivenwalze.*

*Linn. S. N. Sp. 399.*

*Belg. Daadel. Angl. The Olive Shell. Hill. Gall. l'Olive. Day.*

*Testa subcylindrica laevi, spirae anfractibus planiusculis, extimo tumido reflexo; columella incrassata, oblique plicata.* Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat etwas flache Schnirkelgewinde, deren äußerstes aufgeworfen, und umgebogen ist; mit einer dichten schiefgefaltenen Spindel.

« *albida lineis undulatis, fasciisque reticulatis rufis.* » weiß mit rothbraunen wellenförmigen Linien, und netzartigen rothbraunen Querbändern.

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 561. f.*

β ex viridescenti reticulata, fasciis β mit grünlischen Netzen, zwey schwarzen Querbändern, und einer safranfarbigen Spindel.  
duabus transuersis nigris, columella crocea.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. c. 6. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. M.*

*Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 512. 513. f.*

γ ex coerulescente luteoque maculata, fasciis transuersis viridibus γ bläulich, und gelb gefleckt, mit grünen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 26.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. H. G.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 511. f.*

δ olivacea, fasciis transuersis interruptis nigris. δ olivengrün, mit unterbrochenen schwarzen Querbändern.

*Belg. Prince - Begraafenis. Rumph. Angl. Prinse Stamper. Petiv. Gall. Drap mortuaire. Dav.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 25.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 4.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 1.*

*Valent. Abb. 8. t. 68. f.*



*Argenv. Conch. Pl. 13. f. S.*

*Seb. Tbes. III. t. 53. f. F. a.*

*Knor. Vergn. V. 19. t. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 480. f.*

♂ lutescens, fasciis longitudinalibus ♂ gelblich, mit rothbraunen nach  
undulatis rufis. der Länge laufenden wellenförmigen Bändern.

*Mart. Konch. Kab. II. 47. t. 505. f.*

♂ alba, luteo fuscoque nebulosa, fa- ♂ weiß, mit gelben und braunen  
sciis duabus transuersis fuscis. Wolken, und zwei braunen  
Querbändern.

*Belg. Porphyristeene Daadel. Rumph. Angl. The purple Marble Date  
Gall. Olive satinée a bandes. Oud.*

Fauce rosea.

Mit rosenrothem Schlunde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 14.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 24. f. O.*

*Seb. Tbes. III. t. 53. f. A. — D.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 15. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 476, 477. f.*

♀ aurantia; fasciis obsoletis trans- ♀ orangenroth, mit violetten matten.  
uersis violaceis. Querbändern.

*Belg. Achaatje. Rumph. Gall. La Cornaline.*

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 495. f.*

9 aurantia, fascia media transversa 9 orangenroth mit einem schneeweißen Querbande um die Mitte.

*Mus. Caes. Vindobon.*

8 pallide lutea, maculis adpersa, bläßgelb, mit bläulichen Flecken  
coerulescentibus, fauce violacea, besetzt, und einem violeten Schlunde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 6.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 23. f. H, J, E.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. W.*

*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 493, 494. f.*

κ brunna unicolor.

κ braun einfärbig.

*Belg. Grauvve Munnik. Valent. Olive de Satin. Pet.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. K.*

*Knor. Vergn. V. 27. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Konch II, 47. t. 501. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. F. 7.*

λ ex fusco nigra, unicolor.

λ schwarzbraun.

*Belg. Svarte Daadel. Rumph. Gall. La Moresque Dar.*





*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 27.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 23. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. L.*

*Knor. Vergn. V. 28. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 472, 473. f.*

F. II. 3. *Voluta gibbosa.* F. II. 3. Die dicke  
Schlauchdattel.

*Belg. Sluik - Daadcl Mus. Oud. Angl. The clouded Olive. Hill.*  
*Gall. Agate bossue. Mus. Oud.*

Testa ovali ventricosa, co- Die eysförmige dickbäuchige  
lumella callosa, & spirac acu- Schale, hat eine schwülige  
minatae anfractibus infimis in- Lesze, und aufgetriebene Un-  
crassatis. tergewinde mit zugespizten  
Schnirkel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 19. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 24. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. II. 12. t. 4, 5. f.*

— — V. 4. t. 4. f.

*Mart.*



Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 565. 566. f.

Testa ovata, oblonga, ponderosa, glabra. Spira acuminata. Anfractus fulco futurali distincti, infimi tumidi gibbi. Labium exterius integerrimum, acutum; interius reflexum, tumidum, callosum, supra incrassatum, subtus oblique, fuscum, emarginatum. Venter extus brunneus, maculis oblongis, & fascia transversa albida. Faux alba.

Die Schale ist länglich eiförmig, schwer und glatt. Der Schnirkel zugespitzt. Die Windungen sind durch eine gefurchte Naht von einander abgesondert, deren untere aufgeschwollen und ungleich. Die äußere Lefze hat einen ganzen scharfen Rand die innere ist übergeschlagen, schwülzig, und oben dick aufgeworfen, unten schief gefurchet, und eingesäumt. Der Leib ist außen braun, mit weißen länglichen Flecken und einem Quersbände. Der Schlund weiß.

F. II. 4. Voluta Ispidula.

F. II. 4. Die Spizdatstel.

Linn. S. N. Sp. 400.

Testa subcylindrica laevi, spira conica, suturis acutis, columella incrassata oblique plicata.

Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat einen glatten kegelförmigen scharf randigen Schnirkel, und eine dicke schief gespaltene Spindel,

α albida, brunno maculata.

α weißlich, mit braunen Flecken.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 10. f. 12.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. Q.

Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 526. f.

β alba, maculis undatis fuscis.

β weiß, mit wellenförmigen braunen Flecken.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 21.*

*Gualt. Test. t. 23. f. M. 00.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. V.*

*Adans. Seneg. Pl. 4. f. 6. t.*

*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 487. 488. f.*

γ albida, maculis venisque fuscis. γ lang, mit braunen Flecken, und Adern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 102. f. 18.*

*Knor. Vergn. III. 17. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 553. f.*

δ niuea unicolor.

δ schneeweiß, einfarbig.

*Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f.*

ε alba, maculis raris, & fascia ε weiß, mit seltenen Flecken, und prope spiram transuersa rufa. einem Querbande an dem Schnir, kel von rothbrauner Farbe.

*Seb. Thes. III. t. 53. f. X.*

*Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 524, 525. f.*

ζ alba parua, undis fuscis tenuissi- ζ weiß, mit sehr feinen braunen mis. Wellen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 22.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 543. 544. f.*

η grisea



η grisea, parua, lineis angulatis violaceis.

η lichtgrau klein mit violeten Wellenfalten.

List. Hist. Conch. t. 4. f. 10. f. 13.

Petiv. Gaz. t. 152. f. 6.

Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 545. 547. f.

3 castanea.

3 Kastanienbraun.

1 fusca alboque maculata.

1 braun, und weiß gefleckt.

Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 537, 538. f.

\* alba punctis luteis, maculisque undatis fulcis, fauce violacea.

\* weiß, mit gelben Punkten, braunen Wellen, und einem violeten Schlunde.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 3.

Petiv. Gaz. t. 156. f. 18.

Rumph. amb. t. 98. f. 5.

Gualt. Test. t. 23. f. T.

Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 518. 521. f.

F. III. Ouatas, esufac.

F. III. Eßdringige, mit ausgeschnittener Mündung.

F. III. 1. Voluta bulbata.

F. III. 1. Die Blasenwalze.

Testa



Testa emarginata, ouata, Die eingesäumte enförmige  
laeui, spira oblitterata, com- glatte Schale hat einen stum-  
planata, columella quadripli- pfen plattgedrückten Wirbel,  
cata. und drey Falten an der Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. II.*

*Knor. Vergn. IV. 23. t. 1. f. 27. t. 1. f.*

Testa ouata laeuis. Spira oblitterata, complanata. Apertura lanceolata, extremitatibus subefusis. Columella conuexa glabra, subtus plicata, plicis crassis, obliquis, quatuor. Labrum obtusum extrorsum reflexum, incrassatum. Basis infra plicas oblique marginata. Color pallide rubescens, fasciis transuersis obsoletis albis.

Die Schale ist enförmig, und glatt. Der Schnirkel stumpf, und plattgedrückt. Die Mündung lanzettförmig. Die Ende mit unvollkommenen Auschnitten. Die erhabene glatte Spindel hat unten vier schief stehende dichte Falten. Die äußere Lefze ist stumpf, auswärts überschlagen, und aufgeworfen. Der Grund hat unter den Falten einen schiefen Saum. Die Farbe ist blasroth mit matten weißen Querbändern.

F. III. 2. Voluta Persicula.

F. III. 2. Die Kornelkirsche.

*Linn. S. N. Sp. 404.*

Testa emarginata laeui, spiram retuso umbilicata, columella septem plicata, labro marginato crenato.

Die eingesäumte glatte Schale ist mit einem stumpfen genabelten Schnirkel, und an der Spindel mit sieben Falten versehen; an der äußern Lefze eingesäumt und gefurct.

α lineis transuersis fuluis cincta.

α mit rothgelben Querstreichen.

*Belg. Gebandeerde Kornelkirsche. Gall. La Cornouille fasciée.*

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 8. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 28. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 4. f. 4.*

*Knor. Vergn. VI, 21. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 419. 420. f.*

β punctis adpersa incarnatis.

β mit fleischrothen Punkten gezeichnet.

Belg. Gestoppelte Kornelkirsje. Gall. La Cornouille ponctuée.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 10.*

*Petiv. Gaz. t. 8. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 28. f. C, D, E.*

*Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 421. f.*

F. III. 3. *Voluta marginata.*

F. III. 3. Die eingesäumte Kornelkirsje.

Testa ovata, spira obsoleta, lateribus incrassato marginatis, columella quadriplicata.

Die eysförmige Schale hat einen unvollkommenen Schnirkel, aufgeworfene eingesäumte Seiten, und vier Falten an der Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa ovata, laevis; Spira turbina-  
ta, adnata labro incrassato; Late-  
ra cincta margine lato, tumido.  
Columella plicata, plicis cratlis ob-  
liquis quatuor. Apertura lanceo-  
lata, extremitatibus effusis. Color  
niveus.

Die Schale ist eysförmig, und  
glatt. Der Schnirkel zugespitzt,  
und mit der Vorderleiste verma-  
sen. Die Seiten sind mit einem  
breiten aufgeworfenen Rande ein-  
gefaßt. Die Spindel hat vier dicke  
Querfalten. Die Mündung ist lan-  
zettelförmig, an beiden Enden aus-  
geschnitten. Die Farbe schneeweiß.

F. III. 4. Voluta Faba.

F. III. 4. Die Bohne.

Linn. S. N. Sp. 406.

Belg. Bonje. Angl. Black Speckled Silver Cowrykin. Petiv. Gall.  
Cocombre pointée.

Testa ovata, laevis, spirae Die Schale ist eysförmig,  
mucronatae anfractibus plica- und glatt, ihr Schnirkel zus-  
tis, columella quadriplicata, gespitzt, und gefalten.

Color glaucus, punctis oblongis Die Farbe ist faßl, mit nach der  
fuscis, per series longitudinales Länge stehenden Reihen länglicher  
pictis. brauner Punkten bemalet.

Petiv. Gaz. t. 10. f. 5.

Gualt. Test. t. 28. f. Q.

Adans. Seneg. Pl. 4. f. 2.

Knor. Vergn. IV. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 432. 433. f.

F. III. 5. Voluta gla-  
bella.

F. III. 5. Die glatte  
Gurke.

Linn. S. N. Sp. 407.

Belg.





Belg. Pruim. Gall. La Prune.

Testa ouata laevi, mucro- Die eysförmige, glatte, spiz  
nata, columella quatriplica- wirblige Schale, hat an der  
ta, labro incrassato, reflexo. Spindel vier Falten, und eine  
verdickte, übergeschlagene Scha-  
lenleiste.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 326.

Gualt. Test. t. 28. f. L.

Adans. Seneg. Pl. 4. f. 3.

Knor. Vergn. IV. 21. t. 3, 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 422. 423. f.

F. III. 6. Voluta merca-  
toria.

F. III. 6. Das brüten-  
de Taubchen.

Linn. S. N. Sp. 409.

Belg. Broedende Duifje. Gall. Le Pigeon couvant.

Testa ouata, transversim Die eysförmige Schale ist  
striata; columella retusa, la- in die Quere gestreift, an der  
broque denticulatis. stumpfen Spindel, wie auch  
an der äußern Lefze gezäh-  
nelt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 42.

Petiv. Gaz. t. 9. f. 4.

Gualt. Test. t. 43. f. J. L.

O

Adans.



*Adans. Seneg. Pl. 9. f. 29.*

*Knor. Vergn. IV. 12. t. 5. f.*

—— ——— VI. 16. t. 6. 7. f. 18. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 452. — 458. f.*

F. III. 7. *Voluta rustica.* F. III. 7. Der Oliven-  
fern.

*Linn. S. N. Sp. 410.*

*Belg. Boetje.*

*Testa ovata, laevi, spira Die eysförmige, glatte, spiz-*  
*mucronata; columella, labro- wirblice Schale ist an der*  
*que denticulatis. Spindel, und äußeren Lesze*  
*gezähnel.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 48, 49.*

*Petiv. Gaz. t. 30. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 43. f. E. G. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 9. f. 28.*

*Knor. Vergn. VI. 18. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 469. f.*

F. III. 8. *Voluta pau-* F. III. 8. Das arme  
*percula.* Weibchen.

*Linn. S. N. Sp. 411.*

*Gall. La Mignature.*

*Testa*



Testa ouata oblonga, laevi,  
columella quatriplicata, la-  
bro obtuso.

Die eysförmige längliche  
Schale, hat vier Falten an  
der Spindel, und eine stumpfe  
Schalenleiste.

Color fuscus, aut ferrugineus, fas-  
ciis longitudinalibus albidis.

Braun, oder eisenrothig, mit weiß-  
lichen nach der Länge laufenden  
Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 35.*

*Gualt. Test. t. 54. f. L.*

*Knor. Vergn. IV. 26. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1386. f.*

F. III. 9. Voluta men-  
dicaria.

F. III. 9. Das trauren-  
de Täubchen.

*Linn. S. N. Sp. 412.*

Testa ouata, transuersim  
tenuissime striata, spira coro-  
nata; columella complanata,  
labroque denticulatis.

Die eysförmige, in die  
Quere fein gestreifte Schale,  
ist an dem Schnirkel mit Kör-  
nern, an der platt gedrückten  
Spindel, und der Schalenleiste  
mit Zähnen besetzt

Atra, fasciis transuersis tribus  
albis.

Schwarz mit drey weißen Quer-  
bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 47.*



*Petiv. Gaz. t. 11. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 52. f. E.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 460. 461. f.*

F. III. 10. *Voluta cancellata.*

F. III. 10. Die nezförmige Faltenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 413.*

Testa ovata, striis elevatis transuersis, plicisque obliquis reticulatim intertexta, columella umbilicata, biplicata, contorta. Die eysförmige Schale ist mit erhabenen Streifen, und schiefen Falten nezförmig überzogen, und mit einer durchbohrten, zweymal gefalteten, verdrehten Spindel versehen.

*Gualt. Test. t. 48. f. B. C.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 45. 46. 48.*

*Adans. Seneg. Pl. 8. f. 16.*

*Knor. Vergn. IV. 5. t. 5. f. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. IV. Fußförmige, marginatae, effusae.

F. IV. Spindelförmige, eingesäumte, mit ausgeschchnittener Mündung.

F. IV. 1. *Voluta filosa.*

F. IV. 1. Die Schnurwalze.

Testa



Testa fusiformi tenuissime Die spindelförmige Schale  
reticulato striata, cingulis ele- ist mit sehr feinen Strichen netz-  
uatis transuersis columella förmig gezeichnet, mit erhabenen  
quatriplicata, labro crenato. Querschnüren umgürtet, an  
der Spindel mit vier Falten ver-  
sehen, an der Schalenleiste ge-  
kerbet.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa fusiformis, striis minu- Die Schale ist spindelförmig,  
tissimis incis reticulata, cingulis mit sehr feinen Strichen besetzt,  
fili formibus eleuatis, remotis, und schnurförmigen erhabenen,  
tris duodecim, anfractuum quatuor. Quergürteln umgeben, deren zwölf  
Columella umbilicata, replicata, den Leib, vier die Gewinde umge-  
plicis eleuatis obliquis quatuor. ben. An der genabelten, und über-  
Labrum acutum, sub cingulis sul- geschlagenen Spindel sind vier er-  
catum. Basis effusa, extus margina- habene schiefe Falten. Die äußere  
ta. Color albus, cingulorum ru- Leiste ist scharfrandig, unter dem  
fus. Schnüren geschnitten. Der Grund  
ausgeschnitten und außen einge-  
säumt. Die Farbe weiß, mit roth-  
braunen Schnüren.

F. IV. 2. Voluta Sca-  
bricula.

F. IV. 2. Die rauhe  
Nadelwalze.

*Linn. S. N. Sp. 417.*

*Belg. Rauwe Pen - heorn.*

Testa fusiformi, striis eleua- Die spindelförmige Scha-  
tis transuersis, longitudinali- le hat erhabene Querstreife, und  
bus incis, columella qua- nach der Länge laufende einge-  
triplicata, labro crenato. schnittene Striche, eine gekerbte  
Schalenleiste und vier Quers-  
falten.

O 3

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 53. f. D.*

*Knor. Vergn. III. 27. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1389. f.*

F. IV. 3. *Voluta sanguifuga.*

F. IV. 3. Die Fahnennadel.

*Linn. S. N. Sp. 419.*

Testa fusiformi, longitundinaliter sulcata, striis incisissimis transversis, columella quadruplicata, labro laevi.

Die spindelförmige Schale ist der Länge nach gefurcht, in die Quere mit eingeschnittenen Strichen besetzt, ihre Spindel vierfach gefalten, die Schalenleiste glatt.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 11. f. 38.*

*Rumph. amb. t. 29. f. V.*

*Petiv. Gaz. t. 4. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 53. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 11. 12.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 5. f.*

*Knor. Vergn. IV. 11. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1367. f.*

F. IV. 4. *Voluta castra.*

F. IV. 4. Die braune Brandnadel.

*Linn. S. N. Sp. 420.*



Testa fusiformi, laevi, spi- Die spindelförmige glatte  
rac anfractibus longitudinali- Schale ist an den Wirbelge-  
ter rugosis, columella quatri- winden mit länglichen Run-  
plicata. zeln, an der Spindel mit vier  
Falten versehen.

Gualt. Test. t. 53. f. E.

Seb. Tbes. III. t. 49. f. 21, 22.

Knor. Vergn. V. 19. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1369. f.

F. IV. 5. Voluta Vul-  
pecula.

F. IV. 5. Der Fuchs-  
thurm.

Linn. Syst. N. Sp. 423.

Belg. Toornje Rumph.

Testa fusiformi longitudina-  
bus angulata, striis transuer-  
sis incisis, columella quatri-  
plicata.

Die spindelförmige Schale  
hat nach der Länge herablau-  
fende Ecken und eingeschnitte-  
ne Querstriche, mit einer vier-  
fach gefalteten Spindel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 39.

Petiv. Gaz. t. 56. f. 1.

Rumph. amb. t. 29. f. R.

Valent. Abb. 2. t. 10. f.

Gualt. Test. t. 54. f. B.

Knor. Vergn. V. 16. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1366. f.



216



F. IV. 6. *Voluta plicaria*.

F. IV. 6. Die knotige Bandnadel.

*Linn. S. N. Sp. 424.*

*Belg. Genobelde Band - Pen. Gall. Le Minaret. Dav.*

*Testa fusiformi, angulis antice subspinosis, columella quatriplicata, labro laevi.* Die spindelförmige Schale hat vorne zugespitzte Ecken, vier Falten an der Spindel, und eine glatte Schalenleese.

*Bonan. Recr. el. 3. f. 64.*

*Gualt. Test. t. 54. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 23, 24.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 5, 6. f.*

—— ——— III. 27. t. 4. f.

*Mart. Kouch, Kab. IV. 148. t. 1362. 1363. f.*

F. IV. 7. *Voluta pertusa*.

F. IV. 7. Die durchgestochene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 424.*

*Belg. Monniks Kappe.*

*Testa fusiformi, striis punctatis transversim pertusa, columella quinquaplicata.* Die spindelförmige Schale hat aus durchgestochenen Punkten bestehende Streifen, und fünf Falten an der Spindel.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 65.*

*Gualt. Test. t. 54. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 50. f. 28. 47. 48.*

*Knor. Vergn. IV. 28. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1358. 1359. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. IV. 8. *Voluta Mitra*  
*episcopalis.*

F. IV. 8. Die Bischofs-  
mütze.

*Linn. S. N. Sp. 425.*

*Belg. Penne hoorn. Rumph. Angl. The Bishops - Miter Shell.*  
*Hill. Gall. La tiare episcopale. Argenv.*

Testa fusiformi, laevi, co-  
lumella quatriplicata.

Die spindelförmige glatte  
Schale hat an der Spindel  
vier Falten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 120.*

*Rumph. amb. t. 29. f. K.*

*Petiv. amb. t. 13. f. II.*

*Gualt. Test. t. 53. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 33. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1360. f.*

F. IV. 9. *Voluta Mi-*  
*tra papalis.*

F. IV. 9. Die Pabst-  
frone.

O 5.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 426.*

*Belg. De Paus - Krone. Rumph. Angl. The papal - Crown. Da Cost. Gall. La tiare papale. Dav.*

Testa fusiformi, anfractibus coronatis, labro denticulato, columella quatriplicata. Die spindelförmige Schale hat gekrönte Windungen, eine gezähnelte Schalenleiste, und vier Falten an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 119.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 66 - 68.*

*Rumph. amb. t. 29. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 53. f. 7. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 51. f. 1. — 5, 37.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 1. f.*

*Knor. Verg. I. 6. t. 1. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1353. 1354. f.*

F. IV. 10. Voluta Musica.

F. IV. 10. Die Notenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 427.*

*Belg. Musiek - hoorn. Angl. The Musik Shell. Hill. Gall. La Musique Dav.*

Testa marginata, anfractibus obtuse spinosis, columella octoplicata. Die eingesäumte Schale ist auf den Gewinden mit stumpfen Stacheln, und an der Spindel mit acht Falten besetzt.

*Bonan.*



- Bonan. Recr. cl. 3. f. 296. 297.*  
*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 14.*  
*Gualt. Test. t. 28. f. Z.*  
*Argenv. Conch. Pl. 14. f. F.*  
*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 88.*  
*Seb. Thes. III. t. 57. f. 7 — 19. 20.*  
*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*  
*Knor. Vergn. I. 23. t. I. f.*  
*— — — III. 12. t. I. f.*  
*Murray. Fund. Test. t. I. f. 17.*  
*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 14. t. 5. f.*  
*Mart. Konch. Kab. III. 96, t. 926. 929. f.*

F. IV. 11. *Voluta Vespertilio.*

F. IV. 11. *Die Fledermaus.*

*Linn. S. N. Sp. 428.*

*Belg. De Vleermuis. Klein. Angl. Long Batt Music Stamper. Pet. Gall. Chauve Souris. Dav.*

Testa marginata, anfractibus acute spinosis, columella quatriplicata. Die eingesäumte Schale hat spizige Stacheln auf den Gewinden, und eine viermal gefaltene Spindel.

„ spinis breuibus.

„ mit kurzen Stacheln.

*List.*



- List. Hist. Conch.* l. 4. f. 11. f. 16.  
*Rumph.* amb. t. 32. f. 7.  
*Petiv.* amb. t. 15. f. 12.  
*Valent. Abb.* I. t. 1. f. ; 7. t. 62. f.  
*Gualt. Test.* t. 29. f. F, G, H, V.  
*Seb. Thes.* III. t. 57. f. 4, 5.  
*Knor. Vergn.* II. 6. t. 4. f.  
*Mart. Konch. Kab.* III. 98. t. 938, 939. f.

♂ spinis acutis rectis.

♂ mit spizigen geraden Stacheln.

- List. Hist. Conch.* l. 4. f. 11. f. 17.  
*Petiv. Gaz.* t. 70. f. 10.  
 ——— amb. t. 15. f. 8.  
*Gualt. Test.* t. 28. f. J. M.  
*Klein. Meth. Ostr.* t. 5. f. 89.  
*Seb. Thes.* III. t. 67. f. 1-5.  
*Knor. Vergn.* I. 22. t. 3. f.  
 ——— *Delic. nat.* I. t. B. VI. f. 5.  
*Mart. Konch. Kab.* III. 98. t. 937. f.

γ maxima, spinis acutis incurvis. γ sehr groß mit spizigen gekrümmten Stacheln.

- Mart. Konch. Kab.* III. 97. t. 934, 935. f.



F. IV. 12. Voluta hebraea.

F. IV. 12. Die wilde Musik.

*Linn. S. N. Sp. 429.*

*Belg. De wilde Musyk - hoorn. Engl. The oriental Music. Gall. L'hebraïque. Dav.*

Testa ovata, anfractibus acutis spinosis, plicis quinque crassioribus, tribusque obsoletis.

Die eysförmige Schale hat an den Gewinden spizige Stacheln, und an der Spindel fünf starke, und fünf schwächere Falten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 293.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 18.*

*Rumph. amb. t. 32. f. L.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 28. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. D.*

*Seb. Tbes. III. t. 57. f. 1 - 3, 6.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 1, 2. f.*

—— ——— VI. 15. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 96. t. 924. 925. f.*

F. IV. 13. Voluta Capitellum.

F. IV. 13. Die Vase.

*Belg. Witte Vazs, Engl. The white Music, Gall. L'Aigrette. Dav.*

Testa



Testa ovata, nodosa, rugosa, columella triplicata, basi umbilicata.

Die eysförmige, knotige, runzelichte Schale hat drey Falten an der Spindel, und am Grunde eine nabelsförmige Vertiefung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 37. f. A.*

*Argenv. Conch Pl. 15. f. K.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 76.*

*Knor. Vergn. VI. 35. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 947. 948. f.*

F. IV. 14. Voluta muricata.

F. IV. 14. Die rothmündige Vase.

*Belg. Capitaale Schwitzersbroek.*

Testa plicata, spinisque muricata, columella quinque plicata, perforata.

Die gefaltene und stachelichte Schale hat fünf Falten an der durchbohrten Spindel.

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 949. 950. f.*

Testa ponderosa, transversim fultata, fulcis acutis alternatim aequalibus. Spira conica, nodosa. Anfractus, ventrisque basis spinosa; spinis conicis, fornicatis, obtusis.

Die Schale ist schwer, in die Quere gefurchet, mit scharfen wechselweise ungleichen Furchen besetzt. Der Schnirkel kegelförmig und knotig. Die Gewinde, und der Aper-





Apertura oblonga. Labrum exte-  
rius denticulatum, subtus plicatum.  
Columella laevis, rugis transuer-  
sis tribus majoribus, duabus alter-  
nis minoribus. Basis perforata; Co-  
lor albus, aperturae roseus.

Grund des Leibes sind stachelicht;  
die Stachel kegelförmig, hohl und  
stumpf. Die Mündung länglich.  
Die Schalenfuge ist gezähnt, un-  
ten gefalten. Die Spindel glatt,  
mit fünf größeren, und zwei klei-  
neren Falten. Der Grund ist durch-  
bohret. Die Farbe weiß, die Münd-  
ung rosenroth.

F. IV. 15. Voluta ce-  
ramica.

F. IV. 15. Die gezakte  
Vase.

Linn. S. N. Sp. 432.

Belg. Getakte Swizers-broeck. Rumph. Angl. Ceram Spec Shell.  
Petiv. Gall. Chauffe - Trape.

Testa utrinque acuminata,  
spinis diuergentibus, colu-  
mella quinque plicata.

Die an beiden Enden zus-  
gespizte Schale ist mit aus-  
gebreiteten Stacheln besetzt, und  
an der Spindel mit fünf Fal-  
ten versehen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 368.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 51.

Rumph. amb. t. 24. f. A. t. 49. f. L.

Petiv. amb. t. 11. f. 13.

Gualt. Test. t. 55. f. D.

Argenv. Conch. Pl. 15. f. E.

Knor. Vergn. II. 2. t. 2. f.

— VI. 35. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. III, 99. t. 943. . f.

F. V:



F. IV. 16. *Voluta Py-*  
*rum.*

F. IV. 16. Die Birn-  
walze.

*Belg.* Witte offerhoorn. *Angl.* Gall. La rave. *Dav.*

Testa pyriformi, rostrata,  
ponderosa, columella tri-qua-  
triplicata,

Die birnförmige schwere  
Schale ist mit einem Schnas-  
bel, und drey bis vier Falten  
an der Spindel besetzt.

α major, alba, columella tripli-  
cata.

α größer, weißer, mit drey-mal  
gefaltener Spindel.

*Bonan.* Recr. cl. 3. f. 194.

*List.* Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 25.

*Rumph.* Amb. t. 36. f. 7.

*Gualt.* Test. t. 46. f. C.

*Knor.* Vergn. VI. 39. t. 1. f.

*Mart.* Konch. Kab. III. 95. t. 916. f.

β minor, fuscopunctata, columella  
quatriplicata.

β kleiner, braunpunktiert, mit vier-  
mal gefaltener Spindel.

*List.* Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 26.

*Klein.* Meth. Ostr. t. 4. f. 49.

*Knor.* Vergn. VI. 22. t. 2. f.

*Mart.* Konch. Kab. III. 95. t. 917. 918. f.



F. V. Ventricosae.

F. V. Bäuchige.

F. V. I. Voluta aethiopica.

F. V. I. Die Möhren-  
fron.

Linn. S. N. Sp. 435.

Belg. Gekroonde Bak. Rumph. Angl. Ceram Coronnet. Petiv. Gall.  
Couronne d' Ethiopie. Dav.

Testa ovata ventricosa, spi-  
ra coronata spinis fornicatis,  
apice papillari, columella  
quatriplicata.

Die eysförmige bäuchige  
Schale ist an dem Schnirkel  
mit hohlen Stacheln, und ei-  
ner warzenförmigen Spitze ver-  
sehen, mit vier Falten an der  
Spindel.

α spinis fornicatis erectis.

α mit hohlen aufgerichteten Stas-  
cheln.

Bonan. Recr. cl. 3. f. I.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 4.

Rumph. amb. t. 31. f. B.

Petiv. amb. t. 7. f. 5.

Gualt. Test. t. 29. f. H.

Seb. Thes. III. t. 64. f. 4.

Knor. Vergn. II. 4. t. I. f.

— Del. nat. I. t. B. 6. f. 2.

Mart. Konch. Kab. III. 73. t. 778. 779. f.

β spinis fornicatis decumbentibus. β mit darniederliegenden hohlen  
Stacheln.

Rumph. amb. t. 31. f. A.

Petiv. amb. t. 3. f. 13.

P.

Gualt.



*Gualt. Test. t. 29. f. 7.*

*Seb. Thes. III. t. 64. f. 2.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 15. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 75. t. 785. f.*

γ spinis obsoletis.

γ mit unvollkommenen Stacheln.

*Knor. Vergn. V. 8. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 72. t. 772. 773. f.*

F. V. 2. *Voluta Cymbium.*

F. V. 2. *Die Gondel.*

*Linn. S. N. Sp. 436.*

*Belg. Jacobs-Kruck. Engl. Clouded Melon. Gall. Cuiller de Neptune. Dav.*

*Testa ventricosa, anfractibus canaliculatis, acute marginatis, apice papillari, columella quadriplicata.*

Die bäuchige Schale hat rinnenartige scharfrandige Ge-  
winde mit einer warzenartigen  
Spitze, und vier Falten an der  
Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 6.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 29. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 3. f. 2.*

*Seb.*



*Seb. Thes. III. t. 65. f. 5, 6; t. 66. f. 5.*

*Knor. Vergn. II. 30. t. 1. f.*

—— ——— *V. 28. t. 1. f.*

—— *Delic nat. I. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 70. t. 762. - 765. f.*

F. V. 3. *Voluta Olla.*

F. V. 3. *Der Topf.*

*Linn. S. N. Sp. 437.*

*Belg. Teepel bak. Valent. Angl. The Melon Tun. Da. Cost. Gall. Tasse de Neptune, Dav.*

*Testa ovata ventricosa, spirae anfractibus canaliculato* Die eysförmige bäuchige  
*conuexis, columella bi-tri-* Schale hat gewölbte ausge-  
*plicata.* fehlte Windungen, und zwei  
 bis drey Falten an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 2.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 29. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. G.*

*Adans. Seneg. Pl. 3. f. 1.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 97.*

*Seb. Thes. III. t. 66. f. 18.*



*Knor. Vergn. V. 28. t. 7. f.*

— — — — — 11. 22. t. 2. f.

*Mart. Konch. Konch III. 71. t. 766. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 9.*

## G. Buccinum.

## G. Das Rinkhorn.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 323.*

Testa spiralis; apertura effusa desinens in canalibus retusum; labium explanatum.

Die schnirkelförmig gewundene Schale hat eine eingeschnittene Mündung, die in eine kurze Rinne ausläuft; und eine ausgebreitete Schalenleiste.

G. I. Ampullacea, inflata.

G. I. Flaschenartige, aufgeblasene.

G. I. 1. Buccinum Galea

G. I. 1. Das Schalenhorn.

*Linn. S. N. Sp. 439.*

*Belg. Geribde Belheorn. Gall. Tonne cannelée Dav.*

Testa subrotunda inflata, sulcis transversis, linea elevata interstinctis, labro edentulo.

Die rundliche aufgeblasene Schale ist mit Quersulchen besetzt, dazwischen mit einer erhabenen Linie umgürtet, und an der äußern Lippe ohne Zahn.

*Gi.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 183.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 42. f. A.A.*

*Ginan. adr. II. t. 12. f. 93.*

*Mart. Konch. Kab. III. 116. t. 1070. f.*

G. I. 2. Buccinum Per-  
dix.

*Linn. S. N. Sp. 440.*

*Belg. Patrys - hoorn. Angl. Indian Partridge Shell. Hill. Gall.  
Le Perdix. Argenv.*

Testa ovata inflata, trans- Die eysförmige aufgeblasene  
versum sulcata, albi maculata, Schale ist in die Quere gesur-  
labro edentulo. chet, mit weißlichen Flecken,  
und ungezählter äußerer Lippe.

G. I. 2. Das Rebhuhn.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 191.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 43.*

*Petiv. Gaz. t. 153. f. 13.*

— amb. t. 4. f. 11.

*Rumph. amb. t. 27. f. C.*

*Gualt. Test. t. 51. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 5.*

*Seb. Tbes. III. t. 68. f. 12, 13, 16.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 117. t. 1078, 1079. f.*



230



G. I. 3. Buccinum Po-  
mum.

G. I. 3. Die dicklippige  
Sturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 441.*

*Belg.* Diklipige Olyhoorn. *Rumph. Angl.* Thik lip'd Partridge.  
*Petiv. Gall.* Perdrix a grosse-levre. *Dav.*

Testa ovata, inflata, trans-  
verse sulcata, apertura den-  
tata.

Die eysförmige aufgeblasene  
Schale ist in die Quere ge-  
furchet, und an der Mündung  
ungezähnel.

Albo fulvoque maculata, fulcis  
concavis, spira brevis.

Weiß- und rothbraun gefleckt, mit  
hohlen Furchen, und kurzem Schnir-  
fel.

*Rumph. amb. t. 27. f. B.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 51. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. L.*

*Seb. Thes. III. t. 70. f. 2 — 4.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 36. t. 370. 371. f.*

G. I. 4. Buccinum sul-  
cosum.

G. I. 4. Die gefurchte  
Sturmhaube.

Testa ovata, inflata, trans-  
versim sulcata, labio explana-  
to granuloso.

Die eysförmige aufgeblasene  
Schale ist in die Quere gefur-  
chet, und an der ausgebreite-  
ten Spindellefze mit Körnern  
besetzt.

*Seb.*



*Seb. Tbes. III. t. 68. f. 15. 17.*

*Ginan. adr. II. t. 5. f. 44.*

• *Mart. Konch. Kab. III. 118. t. 1081. f.*

Testa ovata inflata ponderosa, sulcis numerosis transversim cincta. Anfractus contingui Spira acuminata, reticulatim striata. Labrum plicatum. Labium explanatum, punctis eleuatis scabrum. Basis definens in canalem recuruum, ascendentem. Color albidus, fasciis transversis rufis.

Die Schale ist eiförmig, aufgeblasen, und der Quere nach mit vielen Furchen umgürtet. Die Gewinde berühren einander. Der zugespitzte Schnirkel ist nezförmig gestreift. Die Schalenlesze gefalten. Die Spindellessze ausgebreitet und mit erhabenen Körnern besetzt. Der Grund verliert sich in eine krumme aufgerichtete Röhre. Von weißer Farbe, mit rothbraunen Querbändern.

G. I. 5, Buccinum Dolum.

G. I. 5. Das Faß.

*Linn. S. N. Sp. 442.*

*Belg.* Geplekte Belhoorn. *Angl.* Great spat rib'd Partridge. *Pet.* Gall. Tonne dentelée. *Dav.*

Testa rotundata ventricosa, cingulis eleuatis, sulcisque remotis transversis, rostro prominulo, labro dentato.

Die rundliche bäuchige Schale ist mit erhabenen Gürteln, und breiten Furchen der Quere nach umgeben, mit einem hervorragenden Schnabel, und gezählter Lesze versehen.

Albida cingulis albo fuscoque articulatis.

Weiß, mit weiß und braun unterbrochenen Gürteln.



*a* fulcis obtusis latis.

*a* mit stumpfen breiten Furchen:

*β* fulcis linea elevata interstinctis. *β* mit Furchen, die mit einer erhabenen Linie unterbrochen sind.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 17, 25.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 19.*

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 11.*

— *amb. t. 12. f. 5.*

*Rumph. amb. t. 27. f. A.*

*Gualt. Test. t. 39. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 6.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 9 t. 89. f. H, J, P.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 117. t. 1073. 1074. f.*

*G. II. Cassidea, rostro recurvo.*

*G. II. Sturmhäuben, mit umgebogenen Schnabel.*

*G. II. 1. Buccinum echinophorum.*

*G. II. 1. Die Knotenschelle.*

*Linn. S. N. Sp. 443.*

*Belg. Geknobbelte Belhoorn Rumph. Angl. Knot-listed Kasket. Petiv. Gall. Casque tuberculé.*



Testa rotundata , cingulis Die rundliche Schale hat  
tuberculatis, rostro ascenden- knotige Gürteln, und einen  
te. aufgerichteten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 18. 19.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 68.*

*Rumph. amb. t. 27. n. 1.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 14.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. P.*

——— *Zoom. Pl. 3. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 18.*

*Ginan. adr. II. t. 5. f. 43.*

*Knor. Vergn. I. 17. t. 1. f.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 16. t. I. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 8.*

*Mart. Konch. Kab. II. 41. t. 407, 408. f.*

G. II. 2. *Buccinum cor-  
nutum.*

G. II. 2. Die gestrick-  
te Sturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 445.*

*Belg. Gebreide Stormhoed. Rumph. Angl. Knot listed Kaskaz.  
Petiv. Gall. Casque tricoté. Dav.*

Testa turbinata reticulata, Die verkehrt kegelförmige  
tuberculis spinosis, apertura netzartig gestrickte Schale hat  
dentata. knotige Stachelgürteln, und  
eine gezähnte Mündung.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 155.*  
*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 73.*  
*Petiv. Gaz. t. 151. f. 9.*  
*Rumph. amb. t. 23. f. A.*  
*Gualt. Test. t. 40. f. D.*  
*Seb. Thes. III. t. 73. f. 7, 8, 17, 18.*  
*Knor. Vergn. III. 2. t. 1. f.*  
*Mart. Konch. Kab. II. 33. t. 348. 349. f.*

G. II. 3. Buccinum ru-  
 fum.

G. II. 3. Die rothe  
 Sturmhaube.

*Linn. S N. Sp. 446.*

*Belg. Roode Stormhoed. Rumph. Angl. Red Kasket-Shell. Pet.*  
*Gall, Le turban rouge. Argenv.*

Testa ovata striata, cingu- Die eysförmige gestreifte  
 lis nodosis, striis geminis in- Schale hat knotige Gürteln,  
 terstinctis; apertura dentata, und dazwischen gepaarte Strei-  
 cauda recurva. fen, mit gezählter Mündung,  
 und gekrümmten Schnabel.

*Rumph. amb. t. 23. f. B.*  
*Petiv. amb. t. 5. f. 5.*  
*Gualt. Test. t. 40. f. F.*  
*Seb. Thes. III. t. 73. f. 3, 6.*

*Regenf.*



*Regenf. Samml. I. 12. t. 69. f.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 52. t. 341. f.*

G. II. 4. *Buccinum tuberosum.*

G. II. 4. Die Knotensturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 447.*

*Belg. Volvvaffe turksche Papierkasket. Angl. The persian Whelk. Gall. Casque triangulaire. Dav.*

Testa ouata, albido fuscoque varia, cingulis tribus tuberculatis, rostro recuruo.

Die eysförmige, weiß und braun gefleckte Schale hat drey knotige Reihen, und einen umgebogenen Schnabel.

*Petiv. Gaz. t. 153. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 51.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 11, 14.*

*Knor. Vergn. III. 10. t. 1, 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 359, f. 38. t. 381. 382f.*

G. II. 5. *Buccinum flammeum.*

G. II. 5. Das attalische Kleid.

*Linn. S. N. Sp. 448.*

*Belg.*



Belg. Geribd westindische Stormhoedje. Klein. Gall. Drap d'argente  
Ital. Drappo d'argento. Ron.

Testa ovata longitudinali- Die eiförmige nach der Län-  
ter plicata, cingulis aliquot ge gefaltene Schale hat einige  
tuberculatis, rostro incurua- Knotengürteln, und einen ge-  
to, krümmten Schnabel.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 161.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 72.

Rumph. amb. t. 23. n. 2.

Valent. Abb. t. 11. f. 99, 100.

Seb. Thes. III. t. 73. f. 19. 20.

Knor. Vergn. IV. 4. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 353, 354. f.

G. II. 6. Buccinum pul-  
lum.

G. II. 6. Die Papiere-  
haube.

Belg. Turks - Papier zonder Lippen. Angl. Feather - Stamper.  
Petiv. Gall. Casque plume. Dav.

Testa ovata oblonga, ein- Die eiförmige längliche  
gulis transversim striatis, 12- Schale hat gestreifte Quergür-  
bro edentulo, rostro recurvo, teln, die äußere Lesze ohne Zahn,  
mit einem gekrümmten Schnabel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 71.

Rumph. amb. t. 23. f. C.

Petiv. .





*Petiv. amb. t. 10. f. 10.*

*Mart. Konch. Kab. II. 36. t. 373. 374. f.*

Testa ovata, laevis glabra, longitudinaliter striata. Cingula composita striis latis profundis parallelis quinatis. Spira planiucula, transverse striata, producta in mucronem centralem prominentem. Columella subtus umbilicata, & recurvata in rostrum ascendens. Labrum exterius nullum seu imperfectum. Color rufus, maculis dispersis albis.

Die Schale ist eysförmig, leicht und glatt, nach der Länge gestreift. Die Quergürteln bestehen aus fünf gleichweit laufenden vertieften Streifen. Der Schnirkel ist etwas flach, in die Quere gestreift, ihre Spitze raget in der Mitte hervor. Die Spindel hat eine nabelförmige Vertiefung, mit einem gekrümmten aufwärts gerichteten Rüssel. Die äußere Lefze manzelt, oder ist unvollkommen. Die Farbe ist rothbraun mit zerstreuten weißen Flecken.

G. II. 7. Buccinum Testiculus.

G. II. 7. Die polnische Mütze.

*Linn. S. N. Sp. 449.*

*Belg. Poolische Muz, Gall. Bonnet de Pologne. Dav.*

Testa ovata, striis elevatis longitudinalibus, apertura dentata, rostro recurvo.

Die eysförmige Schale ist der Länge nach mit erhabenen Streifen, an der Mündung mit Zähnen besetzt, und mit einem gekrümmten Schnabel versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 162.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 66.*

*Pe.*



*Petiv. Gaz. t. 152. f. 17.*

*Rumph. amb. t. 23. n. 3.*

*Valent. Abb. t. 7. . 59.*

*Gualt. Test. t. 39. f. C.*

*Seb. Thes. III, t. 72. f. 17-20.*

*Knor. Vergn. III. 8. n. 2. f.*

— — — — IV. 6. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 37. t. 375, 376. f.*

G. II. 8. Buccinum decussatum.

G. II. 8. Der Schuppen-Bezoar.

*Linn. S. N. Sp. 450.*

*Belg. Geschubde Bezoar. Gall. Casque pavé. Dav.*

Testa ovata, decussatim striata, tessulis luteis maculata, apertura dentata, rostro recurvo,

Die eiförmige kreuzweisgestreifte Schale ist mit gelben Flecken bemalet, an der Mündung gezähnt, mit einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Rear. cl. 3. f. 157.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 65.*

*Gualt. Test. t. 40. f. B.*

*Knor. Vergn. II. 10. t. 3, 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 360, 361. f.*

G. II.



G. II. 9. Buccinum G. II. 9. Das Gartene  
Areola. beetchen.

*Linn. S. N. Sp.* 451.

*Belg.* Gevlackte Bezoar. *Rumph.* *Angl.* Small Dice Kasket. *Petiv.*  
*Gall.* Casque truité. *Argenv.*

Testa substriata, tessulis Die einigermaßen gestreifte,  
oblongis transuersim macula- und mit länglichen Würfel-  
ta, apertura dentata, rostro flecken bemalte Schale ist an  
recuruo. der Mündung gezähnet, mit  
einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 154.

*Rumph. amb. t.* 25. f. E.

*Petiv. amb. t.* 2. f. II.

*Gualt. Test. t.* 39. f. H.

*Argenv. Conch. Pl.* 15. f. J.

*Seb. Thes. III. t.* 70. f. 7 - 9.

*Knor. Vergn. III. 8. t.* 5. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 34. t.* 355 - 356. f.

*Da Cost. Elem. Pl.* 4. f. 10.

G. II. 10. Buccinum gra- G. II. 10. Das gekörne-  
nulatum. te Beetchen.

*Belg.* Gestreepde Beddetje. *Angl.* Gray Kasket. *Petiv. Gall.* Gros  
Casque cannelé.

Testa



Testa ouata, transuersim obsolete sulcata, tessulis luteis seriatim maculata, labio granulato, cauda recurua.

Die eysförmige einigermaßen in die Quere gefurchte Schale hat einige Reihen gelber Würfelstecken, die Schalenlesze ist gezähnt, die Spindellesze gekörnet, der Schnabel gekrümmt.

Rumph. amb. t. 25. f. C.

Petiv. amb. t. 9. f. 6.

Gualt. Test. t. 39. f. B. t. 40. f. E.

Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 344. 345. f.

Testa ouata, transuersim obsolete sulcata, longitudinaliter tenuiter striata. Spira conica, decussatim striata. Apertura longa, utrinque dentata. Labrum exterius marginatum, extrorsum reflexum, intrus dentatum, interius transuersim plicatum, subtus expansum, punctisque eleuatis seu granis adpersum. Basis desinens in canalem rostratum recuruum. Sutura lateralis prope columellam nulla. Color albus, maculis quadratis luteis secundum series digestis.

Die Schale ist eysförmig, der Länge nach mit matten Furchen, in die Quere mit zarten Streifen besetzt; Der kegelförmige Schnitzel ist kreuzweise gestreift. Die Mündung länglicht, beiderseits gezähnt. Die Schalenlesze gesäumt, und auswärts überschlagen, von innen gezähnt. Die Spindellessen in die Quere gefalten, unten ausgebreitet, und mit erhabenen Punkten, oder Körnern besetzt. Der Grund endet sich in eine schnabelförmige, gekrümmte Rinne. An der Seite der inneren Lesze steht der Länge nach keine Rath. Die Farbe ist weiß mit gelben reiheweise gesetzten Würfelstecken.



G. III. Cassidea, labro muricato. G. III, Helmformige, mit gezackter Schalenlesse.

G. III. 1. Buccinum Eri-  
naceus.

G. III. 1. Das gefaltene  
Säumchen.

Linn. S. N. Sp. 452.

Belg. Gestreepte Zoomtje Rumph. Angl. Small curd Casket. Pat.

Testa ovata, longitudinaliter Die eysförmige längliche ei-  
subplicata, papillis coronata, nigermassen gefaltene Schale  
labro postice muricato, ist mit Knoten gekrönet, und  
an der Schalenlesse gezack.

List. Hist. Conch. 1. 4. f. 15. f. 73.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 152.

Rumph. amb. t. 25. f. D. 6, 7.

Petiv. amb. t. 9. f. 9.

Gualt. Test. t. 39. f. D, 7.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. G.

Seb. Thes. III. t. 53. f. II. 16.

Knor. Vergn. VI. II. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 363. f.

G. III. 2. Buccinum  
glaucum.

G. III. 2. Der graue  
Bezoar.

Linn. S. N. Sp. 453.

Belg. Grauwe Kasket. Rumph. Angl. Smooth gray Casket. Petiv.  
Gall. Casque Bezoard. Dav.

Q

Testa



Testa ovata laevi, papillis  
coronata, labro postice muri-  
cato.

Die eysförmige glatte Schale  
ist mit Knoten gekrönet, und  
hinten an der Schalenleiste ge-  
zackt.

*Rumph. amb. t. 25. f. A.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 4. t. 11. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 40. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 71. f. 11 - 16.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 342. 343. f.*

G. III. 3. Buccinum  
Vibex.

G. III. 3. Der glatte  
Bezvar.

*Linn. S. N. Sp. 454.*

*Beig. Gladde Zoomtje. Rumph. Angl. Smooth - lip'd Casket. Pet.*

Testa ovata, laeuissima, la-  
bro postice muricato.

Die eysförmige ganz glatte  
Schale ist hinten an der Scha-  
lenleiste gezackt.

*Bonan. Rect. cl. 3. f. 151.*

*Rumph. amb. t. 25. f. E.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 9.*

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 39. f. F. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. 5-7, 10, 17.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 40. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 364, 365. f.*

G. III. 4. Buccinum p- G. III. 4. Das körnige  
pilosum. Rinfhorn.

*Linn. S. N. Sp. 455.*

*Belg. Ryfsenbry Hoorentje.*

Testa ouata oblonga, undi- Die enfförmige längliche  
que tuberculata, labro poti- Schale ist allenthalben mit er-  
ce muricato. höhten Körnern, und hinten  
an der Schalenlefe mit Za-  
cken besetzt.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 15. f. 23.*

*Rumph. amb. t. 29. f. M.*

*Gualt. Test. t. 44. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 57, 58, 59.*

*Knor. Vergn. II. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 125. t. 1204, 1205. f.*





G. III. 5. Buccinum  
Glans.

G. III. 5. Das linirte  
Kinshorn.

Linn. S. N. Sp. 456.

Belg. Modervlabje.

Testa ovata oblonga laevi,  
spirae apice longitudinaliter  
sulcato, labro pollice murica-  
to.

Die eysförmige längliche  
Schale ist glatt, an der Spitze,  
der Länge nach gesurhet, und  
hinten an der Schalenleiste mit  
Zacken besetzt.

Rumph. amb. t. 29. f. P.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 60.

Knor. Vergn. III. 5. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 125. t. 1196 - 1198. f.

G. IV. Callosa ad columellam re-  
flexam.

G. IV. Mit umgeschlagener schwie-  
liger Spindel.

G. IV. I. Buccinum  
Arcularia.

G. IV. I. Das weiße  
Kofferhörnchen.

Linn. S. N. Sp. 457.

Belg. Koffer Hoorntje. Gall. Arculaire blanc. Angl. Small koffer Shell.

Testa ovata, transversim  
striata, plicis longitudinali-  
bus, papillisque coronata,  
labio explanato, calloso.

Die eysförmige, in die Que-  
re gestreifte Schale, ist der  
Länge nach mit Falten und Kno-  
ten besetzt, mit einer ausge-  
breiteten schwieligen Spindel.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 27. f. M.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 44. f. R. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. C.*

*Sch. Tbes. III. t. 53. f. 32. 33.*

*Knor. Vergn. VI. 22. t. 3. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 125. t. 1174. 1175. f.*

G. IV. 2. Buccinum  
mutabile.

G. IV. 2. Die Asters-  
sturnhaube.

*Linn. S. N. Sp. 460.*

Testa ovata oblonga, spira  
acuminata, labio explanato.

Die eiförmige längliche  
Schale hat einen zugespitzten  
Schnükel, und eine ausge-  
breitete Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 30.*

*Gualt. Test. t. 44. f. B.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. IV. 3. Buccinum  
neritoideum,

G. IV. 3. Die Dose-  
schnecke.

Q 3

Testa



Testa orbiculata laevi, sub-  
tus planiuscula, labio expla-  
nato gibbo.

Die Schale ist scheibenrund  
und glatt, unten einigermaßen  
flach, und an der Lippe aus-  
gebreitet, und erhaben.

Gualt. Test. t. 65. f. J.

Mus. Caes. Vindobon.

G. V. Columella, quasi abrasa,  
plana.

G. V. Mit gleichsam abgeschabe-  
ter flacher Spindel.

G. V. I. Buccinum Har-  
pa.

G. V. I. Die Harpe.

Linn. S. N. Sp. 462.

Belg. Davids Harp. Angl. The Harp Shell. Hill. Gall. La Harpe.  
Argenv.

Testa costis longitudinalibus  
carinatis antice mucronatis, co-  
lumella plana laevi.

Die Schale ist nach der  
Länge mit scharfen, vorne spiz-  
igen Rippen besetzt, und an der  
Lippe flach.

α costis complanatis, laris.

α mit plattgedrückten breiten Rib-  
ben.

Bonani. Recr. cl. 3. f. 185.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 55.

Rumph. amb. t. 32. f. K. L.

Petiv. amb. t. 2. f. 2. t. 7. f. 8.

Gualt. Test. t. 29. f. C, E, G.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. D.

Seb.



*Seb. Thes. III. t. 70. f. 10.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 2.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 14. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 14.*

*Knor. Vergn. I. 9. t. 3. f.*

— — II. 8. t. 2. f; 19. t. 1, 2. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 119 t. 1090. 1091. 1092. f.*

*costis carinatis angustioribus.*

*ist scharsen schmälern Ribben.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

*G. V. 2. Buccinum per-*  
*ficum.*

*G. V. 2. Die Rudolphs-*  
*schnecke.*

*Linn. S. N. Sp. 464.*

*Belg. Wydmonder. Angl. The Persian - Shell. Hill. Gall. Conque*  
*perlique.*

*Testa ovata laevi, anfracti-* Die eysförmige glatte Schra-  
*bus tuberculatis, labro cre-* le ist an den Gewinden knotig,  
*nato, columella complanata.* an der Pesse geierbet, mit einer  
plattgedrückten Spindel.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 15. f. 46. 47.*

*Rumph. amb. t. 27. f. E.*

Q 4

Petiv.



*Gualt. Test. t. 51. f. H. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 72. f. 12 — 16.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 69. t. 760. f.*

G. V. 3. Buccinum  
Haemastoma.

G. V. 3. Der Roth-  
mund.

*Linn. S. N. Sp. 566.*

Testa ovata nodosa, labro  
intus striato, fauce fulva.

Die eiförmige knotige Schale  
ist an der Schalenleiste in-  
wendig gestreift, und im  
Schlunde rothgelb.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 48.*

*Gualt. Test. t. 51. f. A.*

*Knor. Vergn. IV. 5. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 965. f.*

G. V. 4. Buccinum La-  
pillus.

G. V. 4. Das Steins-  
chen.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp.* 467.

Testa ovata transuersim Die eysförmige Schale ist  
striata, spira tuberculata, co- der Quere nach gestreiset, an  
lumella plana. den Gewinden knotig, mit ei-  
ner flachen Spindel.

*Reaumur Mem. de Paris* 1711. Pl. 6. f. 45.

*List. angl. t.* 3. f. 5. 6.

*Adans. Seneg. Pl.* 7. f. 4.

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI.* 1. B. 16. t. 2. f.

*Mart. Conch. Kab. III.* 121. t. II. 1112. f.

G. V. 5. Buccinum Sma-  
ragdulus.

G. V. 5. Die Smaragds-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 468.

*Gall. l'Emeraude. Argenv.*

Testa ovata, glaberrima, Die eysförmige ganz glatte  
columella complanata, plica- Schale hat eine plattgedrückte  
ta. gefaltene Spindel.

Alba, lineis transuersis parallelis  
fuscis.

Weiß, mit gleichweitstehenden  
braunen Querstreichen.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 15. f. 45.

*Argenv. Conch. Pl.* 6. f. P.



*Seb. Thes. III. t. 54. f. 14 — 16.*

*Knor. Vergn. III. 14. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 120. t. 1104. 1105. f.*

G. VI. Glabra.

G. VI. Glatte Rinkhöerner.

G. VI. 1. Buccinum  
spiratum.

G. VI. 1. Die Treppe.

*Linn. S. N. Sp. 469.*

*Belg. Gevoord Bultje. Angl. Cloudy Dice - Shell. Pet. Gall. La tour de Coppenhague.*

Testa ovata oblonga laevis, Die eiförmige längliche glatte  
anfractibus canali plano distincte Schale hat flach ausgekehlt  
tis, columella abrupta, per- te Näthe, und eine abgestuzte  
forata. durchbohrte Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 70. 370.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 41.*

*Rumph. amb. 49. f. C. D.*

*Petiv. amb. 1. 9. f. 21.*

*Gualt. Test. t. 51. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 23 — 26.*

*Regensf. Samml. I. 10. 1, 41. f.*

*Knor.*





*Knor. Vergn. II. 6. t. 5. f.*

— — — *III. 3. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 122. t. 1118 — 1121. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 6.*

G. VI. 2. *Buccinum glabratum.*

G. VI. 2. Der Kanarienvogel.

*Linn. S. N. Sp. 470.*

*Belg. Gladde Knipers - boor.*

Testa ovato oblonga glaberrima, futuris obsoletis, basi ventricosa transuersim sulcata.

Die eysförmige längliche ganz glatte Schale hat undeutliche Rätze, und einen bäuchigen nach der Quere gefurchten Boden.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 149.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 29.*

*Gualt. Test. t. 43. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. prior.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 2. f. 47.*

*Knor. Vergn. II. 16. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 122. t. 1117. f.*

G. VI. 3. *Buccinum sulcatum.*

G. VI. 3. Das gefurchte Rinkhorn.

Testa



Testa ovata transversim sulcata, anfractibus contiguïs, re gefurchte Schale, hat an labro crenulato, intus striato. einander verwachsene Gewinde, und eine gekerbte inwendig gestreifte Schalenleſze.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 31.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata. Anfractus sex, transversim sulcati, suturis contiguïs. in die Quere gefurchte Windungen, deren Mäthe an einander verwachsen sind. Die Mündung ist wie bei den Nebenarten. Die Schalenleſze ſein gekerbt. Der Schlund gefirreiset. Die Spindelſeſze iſt übergeſchlagen, und ausgebreitet. Der Grund ausgeſchnitten, und verkürzt. Von brauner Farbe, mit zerſtreuten ſchneeweißen Flecken.

G. VII. Angulata.

G. VII, Eckige Rinkhörner.

G. VII. I. Buccinum undosum.

C. VII. I. Das Eckhorn.

Linn. S N. Sp. 472.

Belg. Boerenjonge. Angl. Small rough Whelke. Petiv.

Testa ovato oblonga transversim sulcata, obtuse quinqueangulata, labro intus striato. Die eysförmige längliche, in die Quere gefurchte Schale hat fünf stumpfe Ecken, und eine inwendig gestreifte Schalenleſze.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 33. 36.*

*Rumph. amb. t. 29. f. 0.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 61.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 26.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 122. t. 1126. 1127. f.*



G. VII. 2. Buccinum G. VII. 2. Die Muskas  
Bezoar. tennuß.

*Linn. S. N. Sp. 473.*

*Belg. Getackte Noote - Moskaat. Gall. Moskat.*

Testa ovata, decussatim ru- Die eysförmige Schale ist  
gosa, spinis transversis con- kreuzweise gerunzelt, mit hoh-  
cauis, anfractibus infimis la- len Stacheln der Quere nach,  
mellatis, columella perforata. und mit Blättern an den unter-  
sten Gewinden besetzt, sammt ei-  
ner durchbohrten Spindel.

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. G.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 40. t. 398, 399. f.*

G. VII. 3. Buccinum G. VII. 3. Das Wellen-  
undatum. horn.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 475.*

*Belg. Wulk. Angl. The Whelke.*

*Testa ovata, transuersim stria- Die eysförmige in die Quere*  
*ta, anfractibus curuato mult- gestreifte Schale hat runzelich*  
*angulis. te vieleckige Gewinde.*

α *dextrorsa.*

α *rechtsgewunden.*



*Bonon. Recr. cl. 3. f. 189.*

*List. angl. t. 3. f. 2.*

—— *Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 14.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 78 — 80.*

*Knor. Vergn. IV. 19. t. 1. f.*

*Müll. Linn. N. S. VI. 1. B. 16. t. 3. 4. f.*

β *sinistrorsa.*

β *linksgewunden.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. VII. 4. *Buccinum*  
*reticulatum.*

G. VII. 4. Das Gitter-  
 horn.

*Linn. S. N. Sp. 476.*

*Angl. Small latticed Whelk. Pef.*

*Testa*



Testa ovato oblonga, transversim striata, longitudinaliter rugosa, apertura dentata.

Die eiförmige längliche in die Quere gestreifte Schale ist der Länge nach mit Runzeln, und an der Mündung mit Zähnen versehen.

*Reaumur Mem. de Paris. 1711. Pl. 6. f. 9.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 21.*

*Petiv. Gaz. t. 64. f. 8; t. 75. f. 4.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. VII. 5. Buccinum elathratum.

G. VII. 5. Das Nezhorn.

Testa ovata, longitudinaliter plicata, striis elevatis transversis decussata; rostro recurvo.

Die eiförmige Schale ist mit nach der Länge laufenden Falten, und erhabenen Quersstreifen durchkreuzet, mit einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 62.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata ventricosa, reticulata, rugis longitudinalibus strias elevatas transversas decussantibus. Puncta decussationum nodosa. Spira acuminata porrecta. Labrum crenatum, intus sulcatum. Labium

Die Schale ist eiförmig häuchlig, und nehartig, mit nach der Länge laufenden Runzeln, welche durch erhabene Quersfalten durchkreuzet werden. Die Durchkreuzungspunkte sind knotig. Der zugespitzte Schnabel

repli-



replicatum tenue. Basis definens sel raget hervor. Die Schalenleiste  
in canalem, breuem recurvum. Co- ist gefaltet, und inwendig gefur-  
lor g'aucus. chet Die innere Leiste ist überge-  
schlägen, und dünn. Der Grund  
endiget sich in einen kurzen ge-  
krümmten Schnabel. Von leicht-  
grauer Farbe.

G. VIII. Turrita, laevis, subulata. G. VIII. Getbürmte, glatte, abt-  
förmige Rinkhöner.

G. VIII. I. Buccinum maculatum. G. VIII. I. Die Strif-  
nadel.

Belg. Malprieu. Angl. Tygers-tooth. Petiv. Gall. Le Cloud. Argenv.

Testa turrita subfusiformi, Die getbürmte einigermassen  
anfractibus laevis indivisis spindelartige Schale hat glatte  
integerrimis. ungetheilte, und ganzrandige  
Gewinde.

Pallida, maculis latis purpurascen- Bläß, mit breiten purpurrothen  
tibus. breiten Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 317.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 74.

Rumph. amb. t. 30. f. A. D.

Petiv. amb. t. 5. f. 4.

Gualt. Test. t. 56. f. 7.

Argenv. Conch. Pl. II. f. A.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 6.

Knor. Vergn. III. 23. t. 2. f.

— — VI. 19. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 153. t. 1440. f.

G. VIII.



G. VIII. 2. Buccinum  
subulatum.

G. VIII. 2. Die Tiger-  
nadel.

Linn. S. N. Sp. 480.

Belg. Dunne Tygerpen. Angl. Brown Tygers horn. Petiv. Gall. Vis-  
tigrée. Dav.

Testa turrita subulata, an-  
fractibus laevibus, indivi-  
sae duplici macularum fer-  
ruginearum pictis.

Die gethürmte spindelför-  
mige Schale hat glatte unge-  
theilte Gewinde, die mit einer  
dreyfachen Reihe rostfarbiger  
Flecken bemalt sind.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 118.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 70.

Rumph. amb. 30. t. B.

Petiv. amb. t. 4. f. 2.

Gualt. Test. t. 56. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. X.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 28.

G. VIII. 3. Buccinum  
candidum.

G. VIII. 3. Die weiße  
Nadel.

Testa turrita subulata laevi;  
anfractibus integerrimis, prope  
futuram incrassatis.

Die gethürmte ahlförmige  
glatte Schale hat ungetheilte  
ganzrandige Gewinde, die bei  
der Muth sich verdicken.

Mus. Caes. Vindobon.





Testa subulata laevis. Anfractus circiter viginti, indiuisi, integerrimi, supra prope futuram incrassati; supremi linea transuersa bifariam partiti, & juxta futuram crenulati. Apertura, & basis congenerum. Color niveus.

Die ahlförmige Schale ist glatt. Die Gewinde, deren heiläufig zwanzig sind, nahe an der Naht. Die obersten sind durch eine neue Querlinie in zwey Theile getheilet, und an der Naht gekerbet. Die Mündung und der Grund sind wie an den Nebenarten beschaffen. Die Farbe schneeweiß.

G. VIII. 4. Buccinum ferrugineum.

G. VIII. 4. Die rostfarbige Nadel.

Testa turrita subulata ferruginea, anfractibus laevis, bipartitis, integerrimis.

Die gethürmte ahlförmige, rostfarbige Schale ist glatt, zweythellig und ganzrandig.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 71.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata, laevis. Anfractus circiter sexdecim integerrimi, linea exarata transuersa bifariam diuisi. Apertura & basis congenerum. Color ferrugineus, maculis obsoletis albis.

Die Schale ist ahlförmig, und glatt. Die Gewinde häuchig, ganzrandig, und zweythellig; sechszehn an der Zahl. Die Mündung und der Grund nach Art der Unverswandten. Von eisenrothiger Farbe, mit matten weißen Flecken.

G. VIII. 5. Buccinum crenulatum.

G. VIII. 5. Die gekrümmte Nadel.

Linn S. N. Sp. 481.

Belg. Gekartelde Pen. Rumph. Angl. Tooth'd Bodkin. Pet.

Testa



Testa turrita, anfractibus bipartitis, margine superiore crenatis. Die gethürmte Schale hat zweitheilige am Oberrande gekerbte Windungen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 75.

Rumph. amb. t. 30. f. E.

Petiv. amb. t. 8. f. 13.

Gualt. Test. t. 57. f. L.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. Y.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 9. 35.

Knor. Vergn. I. 8. t. 7. f.

Mart. Conch. Kab. IV. 153. - 1442. f.

G. VIII. 6. Buccinum vittarum. G. VIII. 6. Die gekerbte Nadel.

Linn. S. N. Sp. 483.

Testa ventricoso turrita, transuersum striata, sutura anfractu duplicato crenulata, und an der Naht zweifach gekerbt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 34.

Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 121.

Mart. Conch. Konch IV. 155. t. 1461. f.

260



G. VIII. 7. Buccinum  
frigilatum.

G. VIII. 7. Die gestrie-  
gelte Nadel.

Linn. S. N. Sp. 484.

Belg. Naalde = Pen. Gall. Le Foret. Dav.

Testa subulata longitudi-  
naliter striata, anfractibus in-  
diuisis, cingulo suturali niveo  
rufo maculato.

Die ahlförmige Schale hat  
ungeheilte nach der Länge ge-  
streifte Gewinde, die an der  
Nath mit einem schneeweißen  
rothbraun gefleckten Bunde um-  
geben sind.

Rumph. amb. t. 30. f. H. . .

Gualt. Test. t. 57. f. O.

Argenv. Conch. Pl. II. f. R.

Mus. Caes. Vindoben.

G. VIII. 8. Buccinum du-  
plicatum.

G. VIII. 8. Die Nadel.

Linn. S. N. Sp. 485.

Gall. La Vis de pressoir. Dav.

Testa subulata anfractibus  
bipartitis, striatis.

Die ahlförmige Schale hat  
zweytheilige, gestreifte Win-  
dungen.

Bonon. Rect. cl. 3. f. 110.

Gualt. Test. t. 57. f. N.

Knor.



*Knor. Vergn. VI. 18. t. 6. f. 24. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 155. t. 1455. f.*

G. VIII. 9. Buccinum lanceolatum, G. VIII. 9. Die Lanzennadel.

*Linn. S. N. Sp. 486.*

*Belg. Piekenier. Angl. Furrow - Pen. Pet. Gall. L'alène. Dav.*

Testa subulata laevi, an- Die ablsförmige glatte Scha-  
fractibus integris, lineis lon- le hat ungetheilte Gewinde,  
gitudinalibus fulvis. die mit rothgelben Streifen  
nach der Länge herab bezeichnet  
sind.

*Rumph. amb. t. 30. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 13. f. 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. Z.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1450. f.*

G. VIII. 10. Buccinum dimidiatum, G. VIII. 10. Die un-  
wundene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 487.*

*Reig. Omwonden P n.*

Testa subulata laevi, an- Die ablsförmige glatte Scha-  
fractibus bipartitis integerri- le hat zweythellige ganzrandige  
mis. Gewinde.



\* macularum crocearum serie trans- α mit dreifacher Reihe safranfar-  
versa triplici picta. bigen Flecken in die Quere be-  
malet.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 16, 23, 24, 27.

[ Knor. Verg. I. 23. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1443. f.;

β lutescens, maculis longitudina- β gelblich, mit länglichen schnee-  
li us niueis, anfractuum margi- weißen Flecken, und plattgedrück-  
ne superiore compresso attenua- tem verdünntem Oberlande an den  
to. Gewinden.

Rumph. amb. t. 30. f. C.

Gualt. Test. t. 51. f. M.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 15, 19.

Knor. Vergn. I. 23. t. 5. f.

— — — VI. 18. t. 5. f.

G. VIII. 11. Buccinum  
cinereum.

G. VIII. 11. Die aschen-  
graue Nadel.

Testa subulata; anfractibus  
indivisis; prope futuram longi-  
tudinaliter striatis.

Die ahlförmige Schale hat  
ungetheilte, und an der Naht  
nach der Länge gestreifte Ge-  
winde.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa



Testa subulata glabra. Anfractus quatuordecim indiuisi, integerrimi. margine superiore longitudinaliter striati. Columella complanata. Apertura, & basis congenerum. Color cinereus; fascia transuersa prope suturam nigricante obsoleta.

Die Schale ist ablsförmig und glatt. Die vierzehn Gewinde sind eingetheilt, ganz glatt, und nur an der Nath der Länge nach gestreift. Die Spindel flach gedrückt. Die Mündung und der Grund wie an den Nebenarten dieses Geschlechtes. Von aschengrauer Farbe, mit einer undeutlichen schwärzlichen Querbinde unweit der Nath.

G. VIII. 12. Buccinum pertusum.

G. VIII. 12. Die durchstochene Nadel.

Testa subulata; anfractibus bipartitis, striis longitudinalibus eleuatis, & transuersis excavato punctatis.

Die ablsförmige Schale hat zwenytheilige Gewinde, die nach der Länge herab erhabene Streifen, und in die Quere vertiefte Punkten haben.

Mart. Kouch. Kab. IV. 155. t. 1457. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata. Anfractus circiter viginti striati, striis longitudinalibus eleuatis, punctisque ex auat's per seriem transuersam digestis. Apertura & basis congenerum. Color croceus aut albus, maculis dispersis fuluis.

Die Schale ist ablsförmig. Die Gewinde, deren ungefehr zwanzig sind, haben der Länge nach erhabene Streifen, und in die Quere eine dreysache Reihe ausgehöhlter Punkten. Die Mündung, und der Grund ist wie an den andern Nadeln dieses Geschlechtes. Von safrangelber, oder weißer Farbe mit zerstreuten rothgelben Flecken.





G. VIII. 13. Buccinum  
sinuatum.

G. VIII. 13. Die Fal-  
tennadel.

Testa turrita anfractibus  
longitudinaliter plicatis, prope  
futuram attenuatis, labro po-  
stice sinuato.

Die gethürmte nach der Län-  
ge gefaltene Nadel hat an der  
Nath zusammengedrückte Ge-  
winde, und eine hinten aus-  
geschnittene Schalenleſze.

Mart. Konch. Kab. IV. 155 t. 1464. 1465. f.

Testa turrita. Anfractus circiter  
nonem, longitudinaliter plicati,  
prope futuram complana i Labrum  
replicatum, postice sinu breui exci-  
sum. Columella replicata. Aper-  
tura, & basis congenerum. Color  
lutescens, epidermide decidua ni-  
gra.

Die Schale ist gethürmt. Die  
Gewinde, deren ungefehr neun sind,  
der Länge nach gefalten, nächst der  
Nath platt gedrückt. Die Schal-  
enleſze ist erweitert, und hinten  
mit einem kurzen Einschnitte ver-  
sehen. Die Spindel ist übergeschla-  
gen. Die Mündung, und der  
Grund, wie an andern Spindeln  
dieses Geschlechtes. Von gelblicher  
Farbe mit schwarzer abfallender  
Oberhaut.

H. Strombus.

H. Die Flügelſchnecke.

Testa spiralis; apertura  
dilatata, labro ampliato.

Die ſchneckenförmige  
Schale hat eine erweiterte  
Mündung, und ausgebrei-  
tete Schalenleſze.





H. I. Digitati, labro in lacinias  
tenues exeunte.

H. I. Gezackte, deren Schalen-  
lesze mit schmalen Zacken versehen  
sind.

H. I. I. Strombus Fusus.

H. I. I. Die Sterna-  
del.

Linn. S. N. Sp. 489.

Belg. Dicke Starre - Pen. Gall. Fuscau étoilé.

Testa turrita laeui, rostro  
subulato, labro dentato.

Die gehürnte glatte Scha-  
le hat einen ahlförmigen Schna-  
bel mit einer gezackten Schalen-  
lesze.

α testa crassa lutescens: apice longitu-  
dinaliter striato, labio incrassato.

α dickschalig gelblich braun, an  
der Spitze nach der Länge ge-  
streift, mit verdickter Spindel-  
lesze.

Bonon. Recr. cl. 3. t. 121.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. II, 18.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. D.

Klein. Hist. Conch. t. 4. f. 37.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 1. 2.

Knor. Vergn. V. 6. t. 1. f. 7. t. 2. f.

Chemnitz Naturforscher IX. 6. t. 1, 2. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 158. t. 1495. 1496. f.

β attenuata alba, apice reticula-  
tim striato, rostro elongato.

β Schmal, weiß, an der Spitze  
gitterförmig gestreift, mit einem  
verlängerten Schnabel.

R 5

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 56. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 159. t. 1500. 1502. f.*

An prioris varietas pulla?

Etwan eine unvollkommene Ab-  
änderung der vorigen?

H. I. 2. Strombus Pes      H. I. 2. Der Vogelfuß.  
pelicani.

*Linn. S. N. Sp. 490.*

*Belg. Pelikaans - Poot. Angl. Blobber - lipt. Petiv. Gall. Patte  
d'oie. Dav. Ital. Turbine pendatilo. Gin.*

Testa labro tetradaetylo, Die Schale hat eine vier-  
spirarum marginibus nodosis; zackige Schalenleiste, mit kno-  
fauce laevi. tigen Randen an den Gewin-  
den, und glattem Schlunde.

*Bonan. Recr. el. 3. f. 85. 87.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 20.*

*Petiv. Gaz. t. 79. f. 6; t. 127. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 53. f. A, B, C.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 2. f. 41. 42.*

*Ginan.*



*Ginan. adr. t. 7. f. 58. 60.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 17.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 4. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. III, 83. t. 848 - 850. f.*

H. I. 3. Strombus Chi-  
ragra.

H. I. 3. Die Bootschacke.

*Linn. S. N. Sp. 491.*

*Belg. Wufje - Bootschaak. Angl. Female Devil's Claw. Petiv. Gall. Araignée femelle Dav.*

Testa labro hexadactylo,  
digitis curvis, rostro recurva-  
to, labio striato.

Die Schale hat an der Scha-  
le sechs krumme Zacken, einen  
gekrümmten Rüssel, mit einer  
gestreiften Spindellese.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 314.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 35. f. A. B.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 35. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. 1, 6, 7, 9, 10.*

*Knor. Vergn. I. 27. t. 1. f.*

— Delic. nat. I. t. B. II. f. 1.

*Mart,*



Mart. Konch. Kab. III. 85. t. 851. 852. f.

— — — 87. t. 856. 857. f.

H. I. 4. Strombus Scorpio.

H. I. 4. Die Podagra-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 492.

Belg. Podagra kreeft. Valent. Angl. Knob-Fingers. Petiv. Gall.  
Le Scorpion. Argenv.

Testa labro heptadactylo, Die Schale hat sieben kno-  
digitis nodosis, postico lon- tige Zacken, deren hinterster  
ziffimo. sehr lang ist.

Liff. Hist. Conch. I. 4. f. 12 f. 22.

Rumph. amb. t. 36. f. K.

Valent. Abb. t. 3. f. 28.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. B.

Seb. Thes. III. t. 82. f. II. 15.

Knor. Vergn. II. t. 3. f. I.

Murray. Fund. Test. t. 1. f. 29.

Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 860. f.



H. I. 5. Strombus  
Lambis.

H. I. 5. Die Krabben-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 493.

*Belg.* Geele krabbe. *Angl.* The Spider Shell. *Hill. Gall.* Araignée  
male. *Dav.*

Testa labro heptadactylo, Die Schale hat an der Scha-  
digitis rectifuculis, sauce laeui. lenleße sieben einigermassen ge-  
rade Zacken, und einen glatten  
Schlund.

α digitis perfectis elongatis.

α mit vollkommenen verlängerten  
Zacken.

*Rumph amb. t.* 35. f. F.

*Petiv. amb. t.* 14. f. 5.

*Gualt. Test. t.* 35. f. C.

*Argenv. Conch. t.* 14. f. E.

*Seb. Thes. III. t.* 82. f. 8.

*Hill. Hist. of. Anim. Pl.* 8.

*Knor. Vergn. I.* 28. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. III.* 86. t. 855. f.

β digitis imperfectis, haud productis. β mit unvollkommenen verkürzten  
Zacken.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 12. f. 21.

*Rumph. amb. t.* 36. f. G.

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 14. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 82 f. 16. 17.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 1. f.*

H. I. 6. Strombus Mil-  
lepeda.

H. I. 6. Die Vielfuß-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 494.*

*Belg. Duizend - Beem. Rumph. Angl. The twelve Fingers. Petiv. Gall. Milleped Dav.*

Testa labro decadactylo,  
digitis inflexis, dorso gibboso  
compresso.

Die Schale hat zehn um-  
gebogene Zacken, und einen  
höckerigen plattgedrückten Rüs-  
sen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 311.*

*Lift. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 23.*

*Rumph. amb. t. 36. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. B.*

*Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 861. 862. f.*

H. II. Labro lobate.

H. II. Mit lappenförmiges  
Schalenlesze.

H. II. 1.



H. II. 1. Strombus lentiginosus.

H. II. 1. Die Sommersprossen.

*Linn. S. N. Sp.* 495.

*Belg.* Sproetje. *Rumph. Angl.* knobbed Broadlip. *Petiv. Gall.* Tete de serpent. *Dav.*

Testa labro antice trilobo, Die Schalenlesze ist vorne dorso tuberculato coronato, dreylappig, der Rücken knottig, rostro obtuso. und gekrönt, der Schnabel stumpf.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 300.

*Rumph. amb. t.* 37. f. Q.

*Petiv. amb. t.* 14. f. 10.

*Gualt. Test. t.* 32. f. A.

*Argenv. Conch. Pl.* 15. f. C.

*Seb. Thes. III. t.* 52. f. 17, 18.; t. 62. f. 11.

*Knor. Vergn. III. 13. t.* 2. f.; 26. t. 2, 3. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 80. t.* 825. 826. f.

H. II. 2. Strombus Galus.

H. II. 2. Der Kampfhabu.

*Linn. S. N. Sp.* 496.

*Belg.* Kemphaantje. *Rumph. Angl.* The Plough. *Da Cost.* Gall. Aile d'Ange. *Dav.*

Testa labro mucronato Die Schalenlesze hat einen longissimo, dorso spinoso, rostro recto. sehr langen hervortretenden Zinger, der Rücken ist stachlicht, der Schnabel gerad.

*Bonan.*





*Bonan. Recr. cl. 3. f. 309. 310.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 29. 30.*

*Rumph. amb. t. 37. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 32. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 1, 2.*

*Knor. Vergn. IV. 12. t. 1. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. III. 84. t. 841, 842. f.*

—— ——— 85. t. 846. f.

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 1.*

H. II. 3. Strombus Au-  
ris Dianae.

*Linn. S. N. Sp. 497.*

H. II. 3. Der Dianen-  
flügel.

*Belg. Wyzer. Rumph. Angl. Horned Broad - Lip. Petiv. Gall. Oreille  
& Ane. Argenv.*

Testa labro antice mucro-  
nato, dorso tuberculoso, ros-  
tro erecto.

Die Schalenleiste hat einen  
hervortretenden Finger, der  
Rücken ist knottig, der Schna-  
bel in die Höhe gebogen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 301. 302.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 26. 28.*

*Rumph. amb. t. 37. f. R.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 32. f. D, H.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. O.*



*Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 106.*

*Seb. Thes. III. t. 61. f. 1 — 6. t. 62. f. 13.*

*Knor. Vergn. II. 15. t. 1.2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 84. t. 838. 839. f.*

H. II. 4. Strombus Pu-  
gilis.

H. II. 4. Das Fleisch-  
horn.

*Linn. S. N. Sp. 498.*

*Belg. Vlees - Hoorn. Gall. Oreille de Cochon. Dav.*

Testa labro antice promi-  
nente rotundato, spira spino-  
sa, rostro trilobo, fauce ru-  
bra.

Die rundliche Schalenleiste  
ragt vorne hervor, der Schnir-  
kel ist stachlicht, der Rüssel  
dreylappig, mit einem roten  
Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 299.*

*Gualt. Test. t. 32. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. A.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 108.*

*Knor. Vergn. I. 9. t. 1. f.*

— — — III. 16. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 81. t. 830. 831. f.*



H. II. 5. Strombus Luvianus.

H. II. 5. Die Lohoen-  
jerschncke.

Linn. S. N. Sp. 500.

Belg. Lohoenſche Hoorntje. Rumph. Angl. Lohoe Broad - Lip. Petiv. Gall. Gueule noire. Argenv.

Testa labro prominulo, an-  
fractibus rotundatis aequali-  
bus, fauce sanguinea, colu-  
mella nigra.

Die Schalenleſze raget her-  
vor, die Gewinde ſind rund-  
lich, und gleich, der Schlund  
bluthroth, die Spindel ſchwarz.

Liſt. Hiſt. Conch. l. 4. f. 12. f. 6.

— — Gaz. t. 98. f. 10.

Petiv. amb. t. 14. f. 12.

Rumph. amb. t. 37. f. S.

Gualt. Teſt. t. 31. f. H, J.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. N.

Seb. Theſ. III. t. 61. f. 20, 21. t. 62. f. 31, 32.

Knor. Vergn. V. 16. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. III. 77. t. 789. 790. f.

H. II. 6. Strombus fasciatus.

H. II. 6. Die gebän-  
derte Flügelſchncke.

Testa labro prominulo, an-  
fractibus infimis obtuse spino-  
sis, ventre fasciis fuscis.

Die Schalenleſze raget et-  
was hervor, die unterſten Ge-  
winde ſind mit ſtumpfen Stä-  
cheln gekrönt, und der Leib  
mit braunen Bändern umgeben.

Mart.



*Mart. Konch. Kab. III. 78. t. 800 - 802. f.*

Testa laevis. Anfractus septem,  
infimi duo spinosi, spinis obtusis.  
Labrum rotundatum prominulum.  
Labium reflexum. Basis obtusa  
biloba. Color testae albus, ventris  
fasciis interruptis fuscis; faux ro-  
sea.

Die Schale ist glatt. Die Ge-  
winde der Zahl nach sieben, davon  
die untersten mit stumpfen Knoten  
besetzt sind. Die Schalenleiste ist  
rundlich, raget etwas hervor. Die  
Spindelkeule übergeschlagen. Der  
Grund stumpf und zweiflappig. Die  
Schale ist weiß, mit braunen un-  
terbrochenen Bändern bemalt; der  
Schlund rosenroth.

H. II. 7. Strombus gib-  
berulus.

H. II. 7. Die höckerige  
Kanarienschncke.

*Linn. S. N. Sp. 501.*

*Belg. Gebande Kanartje. Angl. Gall. Ailée bossue. Angl. Girdled Ca-  
narie. Pet.*

Testa labro prominulo, dor-  
so laeui, anfractibus gibbosis  
inaequalibus.

Die Schalenleiste raget her-  
vor, der Rücken ist glatt, die Ge-  
winde sind höckerig und ungleich.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 1.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 150.*

*Rumph. amb. t. 37. f. V.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 31. f. N.*

*Seb. Thes. III. 61. t. 53. f.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 3. f.*

— — — III. 13. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 77. t. 792—796. f.*

276



H. II. 8. Strombus Oniscus.

Linn. S. N. Sp. 502.

Belg. Graeuwe Moerbey. Valent.

Testa ovata, cingulis nodosis, spirae apice mucronata, labro granulato, basi obtusa.

H. II. 8. Die Affel-schnecke.

Die eiförmige Schale hat knotige Gürteln, eine verdünnte Wirtelspitze, mit körniger Schalenleiste und stumpfen Grunde.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 44.

Petiv. Gaz. t. 48. f. 16.

Gualt. Test. t. 22. f. 7.

Seb. Thes. III. t. 55. f. 23.

Knor. Vergn. IV. 12. t. 4. f.

—— — VI. 15. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 357. 358. f.

H. III. Strombi, ampliati.

H. III. Mit ausgebreiteten Stü-  
geln.

H. III. 1. Strombus Lucifer.

Linn. S. N. Sp. 503.

H. III. 1. Die Kameel-schnecke.

Belg. Gemarmelde Kameelhoorn. Angl. Spiked Whelk. Gall. Chameau.

Testa transversim dupliciter striata, spira carinata, minute tuberculato.

Die in die Quere doppelt gestreifte Schale hat keilsförmige feinknottige Schnirkelgewinde.

Bonan.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 303.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 4—6.*

*Rumph. amb. t. 49. f. M.*

*Valent. Abb. t. 10. f. 88.*

*Gualt. Test. t. 55. f. A. B. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. 7.*

*Seb. Tbes. III. t. 61. f. 8; t. 62. f. 38—40.*

*Knor. Vergn. II. 29. t. 1. f.*

— — — — — III. 5. t. 4. f; 16. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 90. t. 878. 886.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 2.*

H. III. 2. Strombus Gi-  
gas.

*Linn. S. N. Sp. 504.*

H. III. 2. Die gezakte  
Schweizerhose.

*Belg. Getakt Vleugel-Hoorn. Angl. The large Conch. Gall. La  
grande Ailée. Ital. Ognella.*

Testa labro rotundato ma-  
ximo, ventris spiraeque spi-  
nis patentibus.

Die rundliche Schalenleiste  
ist sehr groß, der Leib und  
Schnirkel mit ausgebreiteten  
kegelförmigen Stacheln besetzt.

Fauce rosea.

Mit rosenrothem Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 307. 321.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 19.*



*Gualt. Test. t. 33. f. A; t. 54. f. M.*

*Knor. Vergn. III. 17. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 80. t. 824. f.*

H. III. 3. *Strombus Epidromis*.

H. III. 3. Das Besanz-  
segel.

*Linn. S. N. Sp. 506.*

† Belg. Bezaantje Rumph. Angl. Great Canarie. Pet. Gall. La Tourterelle, Dav.

Testa labro rotundato, bre- Die rundliche Schalenleiste  
ui, ventre laevi, spira sub- ist kurz, der Leib glatt, der  
nodosa. Schnirkel etwas knorrig.

*Bonan. Mus. Kirch. f. 146.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 10.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 11.*

— amb. t. 14. f. 18.

*Rumph. amb. t. 36. f. M.*

*Seb. Toes. III. t. 62. f. 21 — 23. 26.*

*Knor. Vergn. VI. 33. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 821. f.*





H. III. 4. Strombus Ca-  
narium.

H. III. 4. Das Täub-  
chen.

*Linn. S. N. Sp. 507.*

*Belg. Bultje Rumph. Angl. Hunchbackt Canarie Pet. Gall. Pigeonne.*

Testa tumida, laevi; labro  
rotundato, breui, retuso.

Die bäuchige glatte Schale,  
hat eine rundliche, kurze, ein-  
gezogene Schalenleiste.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 146.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 13.*

— amb. t. 14. f. 17.

*Rumph. amb. t. 36. f. N.*

*Gualt. Test. t. 32. f. N. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 28, 29, 24, 25.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 73.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 817. 818. f.*

H. III. 5. Strombus vit-  
tatus.

H. III. 5. Das aufge-  
wickelte Besanssegel.

*Linn. S. N. Sp. 508.*

*Belg. Opgerolde Bezaantje. Rumph. Angl. Great net Whelk. Pet. Gall. Mitaine roulée.*



Testa labro rotundato, ventre laevi, spirae elongatae anfractibus sutura distinctis,

Die Schalenlesze ist rundlich, der Leib glatt, die Gewinde des verlängerten Schnirkels haben eine Zwischennath.

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 12.*

— *amb. t. 7. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 36. f. 0.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 18 — 20.*

*Knor. Vergn. III. 20. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 822. f.*

H. III. 6. Strombus ac-cinctus.

H. III. 6. Die breite Kanarienschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 509.*

*Belg. Geblomde Kanarie. Angl. Broad knobbed Canarie. Petiv.*

Testa labro rotundato, spirae anfractibus striatis, ventre laevi, cingulis quatuor albo maculatis.

Die Schalenlesze ist rundlich, die Gewinde gestreifet, der Leib glatt, mit vier weißen gefleckten Gürteln.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 37. f. X.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 19.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 10. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 61. f. 15.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

H. III. 7. Strombus Ur-  
ceus,

*Linn. S. N. Sp. 312.*

H. III. 7. Die knottige  
Kanarienschnecke.

*Belg. Gebulde Kanary. Rumph. Angl. Long knobbed Canarie. Pet.*

Testa labro attenuato, stria-  
to, ventre spiraque plicato  
nodosis.

Die Schalenlefze ist veren-  
get und gestreift, der Leib  
und der Schnirkel mit Knotten  
und Falten besetzt.

$\alpha$  alba transuersim striata, (major.)

$\alpha$  weiß, der Quere nach gestreift,  
(größer.)

$\beta$  fusco maculata, aut reticulata,  
laevis (minor.)

$\beta$  glatt, mit braunen Flecken, oder  
Rezen (kleiner.)

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 13.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 14.*

— amb. t. 14. f. 21.

*Rumph. amb. t. 37. f. T.*

*Gualt. Test. t. 32. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 28. 29.*

*Knor. Vergn. III. 13. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. III. 78. t. 804 — 806. f.*



H. IV. Turriti.

H. IV. Gethürmte Flügelschnecken.

H. IV. 1. Strombus turberculatus.

H. IV. 1. Die knottige Nadel.

Linn. S. N. Sp. 415.

Testa turrita, transuersum striata, nodis glabris cincta; in labro incrassato.

Die gethürmte Schale ist in die Quere gestreift, mit glatten Knotten umgeben, an der Schalenleiste verdickt.

Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1490. f.

Mus. Caes. Vindobon.

## I. Murex.

## I. Die Stachelschnecke.

Testa spiralis suturis longitudinalibus varicosis. Apertura desinens in canalibus rectum, aut subascendentem.

Die schnirkelförmig gewundene Schale ist der Länge nach mit wulstigen Röhren besetzt. Die Mündung endiget sich in eine gerade, oder etwas aufsteigende Rinne.

I. I. Spinoli, rostro elongato.

I. I. Dornige, mit verlängertem Rüssel.

I. I. 1. Murex Haustellum.

I. I. 1. Der Schnepfenschnabel.

Linn.



*Linn. S. N. Sp.* 518.

*Belg.* Scheppertje. *Rumph. Angl.* The commonon Woodcock Shell.  
*Gall.* Tete de Becasse. *Dav.*

Testa subovata tuberculata, Die etwas eysförmige knoti-  
rostro elongato subulato, recto, ge Schale hat einen verlänger-  
inermi. ten ahlförmigen, geraden, un-  
bewaffneten Rüssel.

α incarnata, maculis nigris. α fletschroth, mit schwarzen Flecken.

β niuea, maculis rufis. β schneeweiß, mit braunrothen  
Flecken.

*Bonan. Recr. el.* 3. f. 268.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 13. f. 23.

*Rumph. amb. t.* 26. f. F.

*Petiv. amb. t.* 4. f. 8.

*Gualt. Test. t.* 30. f. E.

*Argenv. Conch. Pl.* 16. f. B.

*Klein. Meth. Ostr. t.* 4. f. 81.

*Seb. Thes. III. t.* 78. f. 5, 6.

*Hill. Hist. of. Anim. Pl.* 8.

*Knor. Vergn. I.* 12. t. 2, 3. f.

— — — III. 9. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III, 115. t.* 1066. f.

I. I. 2. Murex Tribulus. I. I. 2. Die Spinne.

*Linn. S. N. Sp.* 519.

*Belg.*



Belg. Spinnekop. Rumph. Angl. Thorney Woodcock. Hill. Gall.  
La becasse epineuse. Dav.

Testa ovata, spinis setaceis Die eysförmige Schale ist  
trifariis, rostro elongato, sub- mit einer dreysachen Reihe bor-  
lato, spinoso. stiger Stacheln besetzt, und mit  
einem verlängerten, ablförmigen, stachlichten Rüssel versehen.

α spinis simplicibus, alternis majores α mit einfachen wechselweise größe-  
ribus. ren Stacheln.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 269.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 22.

Petiv. Gaz. t. 101. f. 16.

— amb. t. 6. f. 8.

Rumph. amb. t. 26. f. G.

Gualt. Test. t. 31. f. A.

Seb. Thes. III. t. 78. f. 4.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. I. 11. t. 3, 4. f.

— Delic. nat. t. B. V. f. 5.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 15.

Mart. Konch. Kab. III. 113. t. 1053. 1054. f.

Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 5.

β spinis subaequalibus duplicatis. β mit beynahe gleichgroßen doppelten Stacheln.

Rumph. amb. t. 26. f. 3.

Gualt. Test. t. 31. f. B.

Argenv.



*Argenv. Conch. Pl. 16. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 78. 1 — 3. f.*

*Knor. Verg. V. 27. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 113. t. 1052. f.*

I. I. 3. *Murex cornu-*  
*tus.*

I. I. 3. Der gezackte  
Schneppsenkopf.

*Linn. S. N. Sp. 520.*

*Belg. Gedoornde Snippekop.*  
*grande Massüe d'Hercule. Dav.*

*Angl. Thorney Snipe. Gall. La*

Testa subrotunda, spinis  
subulatis obliquis, rostro elon-  
gato, spinis sparsis.

Die rundliche Schale hat  
ahlsförmige schiefstehende Stä-  
cheln und einen verlängerten  
mit zerstreuten Stacheln besetz-  
ten Rüssel.

*Bonan. Recr: cl. 3. f. 283.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 26. f. 5. °*

*Gualt. Test. t. 30. f. D.*

*Adans. Seneg. Pl. 8. f. 20.*

*Seb. Thes. III. t. 78. f. 7 — 9.*

*Knor. Vergn. VI. 17. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 114. t. 1057. f.*





I. I. 4. Murex Brandaris.

I. I. 4. Der dornige Schnepfenkopf.

Linn. S. N. Sp. 521.

Belg. Getackte Snippekop Rumph. Angl. The common thorney Murex. Pet. Gall. Massüe d'Hercule. Dav.

Testa ouata, spinis rectis, rostro mediocri subulato, recto, labio excauato.

Die eysförmige Schale hat gerade Stacheln, einen mittelmäßig langen ablsförmigen geraden Rüssel mit einer ausgehöhlten Schalenleiste.

6

Bonan. Recr. cl. 3. f. 281.

Petiv. Gaz. t. 68. f. 12.

Rumph amb. t. 25. f. 4.

Gualt. Test. t. 30. f. F.

Argenv. Zoom. Pl. 4. f. C.

Ginan. adr. II. t. 8. f. 61. 62.

Regenf. Samml. 6. t. 67. f.

Knoy. Vergn. II. 18. t. 1. 2. f.

— — — 22. t. 4. 5. f.

Mart. Konch. Konch III. 114. t. 1060. 1061. f.

— — — 115. t. 1062 - 1065. f.

I. I. 5. Murex Trunculus.

I. I. 5. Das gehörnte Purpurhorn.

Linn. S. N. Sp. 522.

Belg.



Belg. Gebandeerde Purper - Hoorn. Gall. Pourpre 2 bandes.

Testa ovata nodosa, spinis Die eysförmige knotige Scha-  
anticis majoribus, rostro trun- le hat vorne größere Stacheln,  
cato breui, perforato. und einen stumpfen kurzen  
durchbohrten Rüssel.

Bonanz. Recr. cl. 3. f. 271, 274, 277.

Gualt. Test. t. 31. f. C.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. G.

Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 104.

Seb. Thes. III. t. 52. f. 15. 16.

Knor. Vergn. III. 13. t. 1. f.

—— — V. 13. t. 4. f.; 19. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. III. 109. t. 1019. 1020. f.

I. II. Suturis foliaceis: Purpuræ.  
dictæ.

I. II. Mit blätterigen Nätzen: so-  
genannte Purpurschnecken.

I. II. 1. Murex tripte-  
rus.

I. II. 1. Die dreysflüg-  
lige Purpurschnecke.

Belg. Vleugel - hoorntje. Gall. Pourpre triangulaire ailée. Dav.

Testa elongata triangulari, Die länglichte, dreyeckige  
angulis alato membranaceis. Schale hat flügel förmig aus-  
gebreitete Ecken.

Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1033. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa



Testa elongato triangularis, transuerſim rugoſa; rugae inaequales acutae, ſtriis eleuatis longitudinalibus ſubtiliſſimis; decuſſatae. Spira conſtans anſractibus ſeptem, tuberculis ſolitariis inter futuras obſita. Suturae longitudinales tres obſoletae, totidem conſtituentes angulos expansos in membranas plicatas aliformes. Apertura tuberculata ovato oblonga, deſinens in canalem rectum ſpira breuiorem. Color nitens niueus.

Die länglichte dreneckige Schale iſt in die Quere gerunzelt; Die Runzeln ſind ungleich, und ſcharf, und mit erhabenen feinen Streifen der Länge nach durchkreuzet. Der Schnirkel beſtehet aus ſieben Gewinden, die zwiſchen den Näthen mit einzelnen Körnern beſetzt ſind. Nach der Länge laufen drey undeutliche Näthe, welche eben ſo viele Ecken bilden, die ſich in häutige gefaltene Flügeln ausbreiten. Die länglicht eckförmige Mündung iſt mit Körnchen beſetzt, und endiget ſich in eine gerade Rinne, die kürzer als der Schnirkel iſt. Die Farbe iſt glänzend ſchneeweiß.

I. II. 2. Murex triquet-  
ter.

I. II. 2. Die dreyſeitige  
Purpurschnecke.

Belg. Geplekte Vleugel - Hoorentje. Gall. Pourpre triangulaire tacheté.

Testa elongata triquetra sub-  
alata, reticulatim costata, ro-  
stro recto clauſo.

Die länglichte dreyſeitige eini-  
germaßen geflügelte Schale iſt  
mit netzförmigen Ribben beſetzt,  
und mit einem geraden geſchloſ-  
ſenen Rüſſel verſehen.

Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1038. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa elongata, costis transuerſis,  
& longitudinalibus reticulatim de-  
cuſſata. Spira pyramidata compo-  
ſita ex anſractibus ſenis. Suturae  
longitudinales tres, eleuatae; angu-  
los totidem conſtituentes, in mem-  
branas plicatas obſoletas excreſcen-  
tes; quarum illa nonniſi labri ex-  
terni, manifeſta eſt. Apertura ellip-

Die Schale iſt länglicht, mit  
nach der Länge, und in die Quere  
laufenden Ribben durchkreuzet. Der  
pyramidenförmige Schnirkel beſet-  
zet aus ſechs Gewinden. Die drey  
nach der Länge ſtehenden erhabenen  
Näthe bilden eben ſo viele Ecken,  
welche ſich in gefaltene, unvoll-  
kommene Flügeln verbreiten, davon  
tica,



tica, desinens in canalem elongatum rectum clausum. Labrum crenulatum. Color albus maculis dispersis rubris.

nur tiefer an der Schalenleiste deutlich ist. Die Mündung ist elliptisch, und verlängert sich in eine gerade geschlossene Rinne. Die Schalenleiste ist gekerbt. Von weißer Farbe mit rothen Flecken.

I. II. 3. Murex ramosus.

I. II. 3. Die Kraußschnecke.

Linn. S. N. Sp. 523.

Belg. Ocean-Hoorn. Rumph. Angl. The Caltrup Shell. Hill. Gall. Chauffe Trape. Argenv.

Testa oblonga, triangula, trifariam frondosa, anfractibus contiguis, rostro truncato,

Die längliche, dreyeckige Schale hat drey Reihen kraußser Blätter, aneinander gewachsene Windungen, und einen abgestumpften Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 275. 276.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 41.

Rumph. amb. t. 26. f. A. I.

Petiv. amb. t. 12. f. 2.

Gualt. Test. t. 37. f. G. D. L.; t. 38. f. A.

Valent. Abb. t. 4. f. 38; 5. t. 42. f.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. C. E. H.

— Zoom. Pl. 4. f. D.

Seb. Thes. III. t. 77. f. 1. 2. 7.

Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 8.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.



*Regenf. Samml. I. 6. t. 6. f.*

*Knor. Vergn. I. 26. t. 1. 2. f.*

— — — *III. 9. t. 3. f.*

— — — *V. 11. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 102. t. 980. f.*

— — — *103. t. 981 — 983. f.*

— — — *104. t. 984 — 986. f.*

— — — *105. t. 987 — 989. f.*

*I. II. 4. Murex Scorpio. I. II. 4. Die Skorpion-  
schnecke.*

*Linn. S. N. Sp. 524.*

*Belg. Scorpioentje Rumph. Angl. Least ragged Whelk. Petiv. Gall.  
Patte de Crapaud. Dav.*

*Testa quadrifariam frondo- Die Schale hat drey Rei-  
sa, spira capitata, rostro trun- hen krauser Blätter, einen fels-  
cato. higen Schnirkel, und abge-  
stumpften Rüssel.*

*Rumph. amb. t. 26. f. D.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 14.*

*Valent. Abb. t. 4. f. 36. 37.*

*Gualt. Test. t. 37. f. M.*

*Argenv. Conch. Pl. 16. f. D.*

*Seb.*



Seb. Thes. III. t. 77. f. 13 — 16.

Knor. Vergn. II. II. t. 4. 5. f.

Mart. Konch. Kab. III. II2. t. 1040 — 1041. f.

Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 6.

I. II. 5. Murex saxati-  
s.

I. II. 5. Das Brand-  
horn.

Linn. S. N. Sp. 525.

Belg. Dubbelde Brana - Hoorn. Angl. The Endive - Shell. Hill. Gall.  
a Chicorée. Argenv.

Testa sexariam frondosa, Die sechsfach krausblätteri-  
nfractibus contiguis, rostro ge Schale, hat aneinander ge-  
bbreuiato, wachsende Windungen, und ei-  
nen verkürzten Rüssel.

brunna,

≈ braun.

nivea, frondibus nigris.

≈ schneeweiß, mit schwarzen Kraus-  
blättern

Rumph. amb. t. 26. f. C. 2.

Petiv. amb. t. 12. f. 1.

Argenv. Conch. Pl. 15. f. K.

Seb. Thes. III. t. 77. f. 5, 6.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. I. t. 2. f.



*Knor. Vergn. II. 7. t. 4. 5. f.*

— — — III. 9. t. 2. f.

— — — VI. 19. t. 1. 4. f.

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 26.*

*Mart. Kouch. Kab. III. 107. t. 1004 - 1010. f.*

— — — — — 108. t. 1011 - 1014. f.

I. II. 6., *Murex Erina-*  
*ceus.*

I. II. 6. Die vieleckige  
Purpurschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 526.*

Testa multifariam subfron-  
dosa, spirae anfractibus mult-  
angulis, rostro brevisculo.

Die Schale hat viele un-  
vollkommene Krausblätter, viel-  
eckige Wirbelgewinde, und ei-  
nen etwas verkürzten Rüssel.

*Gualt. Test. t. 49. f. H.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. III. Varicosi, futuris rotundis,  
torosis.

I. III. Warzige, mit runden knot-  
tigen Rätzen.

I. III. 1. *Murex Rana,*

I. III. 1. Die Kröten-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 527.*

*Belg. Padde-Hoorn. Rumph.*  
*Gall. Racrocheuse, Dav.*

*Angl. Wide cadoe Whelk. Petiv.*

Testa





Testa futuris oppositis, compressis, cingulis mucatis, te apertura ouata. Die Schale hat entgegengesetzte Zusammengedrückte Ränder, dornige Gürteln, und eine eifrunde Oefnung.

testa rotundata, spinis dorfi, & futurarum breuibus. mit runder Schale, deren Rücken und Ränder mit kurzen Dörnern besetzt sind.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 182.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15 f. 59.*

*Petiv. Gaz. t. 100. f. 12.*

— amb. t. 11. f. 15.

*Rumph. amb. t. 24. f. G.*

*Gualt. Test. t. 49. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 15 — 18.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 64. f.*

*Knor. Vergn. II. 13. t. 6. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 133. t. 1271. f.*

testa compressa, spinis futurarum elongatis. mit platgedrückter Schale, und verlängerten Stacheln auf den Rändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 44.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 19.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 133. t. 1275. 1276. f.*



I. III. 2. Murex Gyri- I. III. 2. Die Frosch  
nus. schnecke.

Linn. S. N. Sp. 528.

Belg. Vorscheen = Poppe. Gall. Grenouillete.

Testa futuris oppositis, con- Die Schale hat entgegen  
tinnatis, cingulis tuberculosis gesetzte ununterbrochene Rätze  
fasciata; apertura rotunda. und ist mit knottigen Gürteln  
und einer rundlichen Mündung  
versehen.

Seb. Thes. III, t. 60. f. 25 — 27.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 5. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV, 128, t. 1233. 1234. f.

I. III. 3. Murex Lam- I. III. 3. Der knottige  
pas. Delfuchen.

Linn. S. N. Sp. 529.

Belg. Gebulde Olykoek. Rumph. Angl. Knopped Trumpet. Petiv.  
Gall. Culotte de Suisse Dav.

Testa granulosa, futuris op- Die körnige Schale hat ent-  
positis, cingulis tuberculatis, gegengesetzte Rätze, knottig  
labro dentato, labio striato, Querbänder, eine gezähnt  
Schalenleiste, und gestreift  
Spindellippe.

Bonanz. Recr. ol. 3. f. 103.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 88.

Rumph. amb. t. 28. f. C.

Petiv. amb. t. 12. f. 16. 17.

Gualt.



*Gualt. Test. t. 50. f. D.*

*Argenv. Conch. t. 9. f. D.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 106. t. 998 — 123. f.*

I. III. 4. *Murex Olearium.*

I. III. 4. Der geribbte  
Delfuchen.

*Linn. S. N. Sp. 530.*

*Belg. Gebande Argus Oogen. Rumph. Angl. Girdled Argus Shell.*  
*Petiv. Gall. Argus a boutons-*

Testa futuris alternis, cin-  
gulis nodosis, dorso pollice  
transuersim striato.

Die Schale hat wechselwei-  
se stehende Rätze, knottige  
Gürteln, und einen hinten mit  
Querstreifen besetzten Rücken.

*Bonan. Recr. cl. 3. t. 289.*

*Rumph. amb. t. 49. f. E.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 50. f. A.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1223. f.*

I. III. 5. *Murex costatus.*

I. III. 6. Der eckige  
Delfuchen.



*Testa subfusiformi, costis transuersis angulatis, sutura solitaria, rostro elongato.* Die einigermaßen spindelförmige Schale, hat eckige Querrippen, eine einzelne Nath, mit einem verlängerten Rüssel.

*Seb. Thes. III. t. 57. f. 31.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 131. t. 1253. f.*

*Testa subfusiformis. Anfractus circiter octo, cincti costis crassis, conuexis, angulatis. Sulci intermedii striati, striis eleuatis, duplicatis. Sutura varicosa, solitaria, labro subopposita. Apertura plicata, ouato oblonga, deinens in rostrum umbilicatum, canaliculatum recuruum. Color pallide luteus.*

Die Schale ist einigermaßen spindelförmig. Die Gewinde, deren beiläufig acht sind, haben dicke erhabene eckige Rippen. Die Zwischenfurchen sind gestreift, die Streifen erhaben und doppelt. Die Nath ist knottig und einzeln, der Schalenletzte gegenüberstehend. Die gefaltene länglich eiförmige Mündung endiget sich in einen nabelförmig eingedrückten, rinnenartigen gekrümmten Rüssel. Die Farbe ist bläulich.

**I. III. 6. Murex Femorale.**

**I. III. 6. Das Fußhorn.**

*Linn. S. N. Sp. 531.*

*Belg. Voet - Hoorn. Rumph. Angl. Stooone Whellc. Gall. Rhinoceros. Dav.*

*Testa rugosa, trigona; spirae apice tuberculato, apertura edentula, antice transuersim expansa.*

Die runzelichte dreieckige Schale hat eine knotige Wirtelspitze, mit einer ungezähnten vorne in die Quere erweiterten Mündung.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 290.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 37.*

*Rumph. amb. t. 26. f. B.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 12. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 50. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 63. f. 7 — 10.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. I. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1039. f.*

I. III. 7. *Murex cuta-*  
*ccus.*

I. III. 7. Die Haut-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 532.*

*Belg. Vell. - Hoorn. Gall. Degrés bordés.*

Testa futura solitaria, no-  
disque transuersim decussatis,  
apertura dentata, columella  
perforata.

Die Schale hat eine einzels  
ne Nath, in die Quere durch-  
kreuzte Knotten, eine gezähnte  
Mündung, und durchbohrte  
Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 38.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 10. 11.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 118. t. 1085. 1086. f.*

I. III. 8. *Murex Pyrum.*

I. III. 8. Die getrock-  
nete Birne.

*Linn. S. N. Sp. 535.*

*Belg. Gedrooyede Peer. Rumph. Angl. Hairy Whelk. Petiv. Gall. Poire sèche.*

Testa ouata, nodosa, trans-  
uersim sulcata, rostro elonga-  
to flexuoso.

Die eysförmige knottige Scha-  
le ist in die Quere gesurchet,  
und mit einen langen geboge-  
nen Rüssel versehen.

*List.*



*Rumph. amb. t. 25. f. E.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 37. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 60. f.*

*Knor. Vergn. II. 7. t. 2. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 112. t. 1040. 1041. f.*

I. III. 9. *Murex Rubecula.*

I. III. 9. Die Libree-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 536.*

*Belg. Livreyhoorn. Gall.*

Testa futuris oppositis, cin-  
gulis nodulosis, apertura den-  
tata.

Die Schale hat entgegen-  
gesetzte Näthe, knottige Gür-  
teln, und eine gezähnte Mün-  
dung.

*Gualt. Test. t. 49. f. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. I.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 1 — 5.*

*Knor. Vergn. I. 13. t. 3. 4. f.*

— — — III. 5. t. 2. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. IV. 132. t. 1259 — 1266. f.*

I. III. 10.



I. III. 10. *Murex reticularis*.

*Linn. S. N. Sp.* 538.

I. III. 10. Die Netzschnecke.

Testa futuris suboppositis, Die knottige Schale hat einigermassen entgegengesetzte Nätze, striis elevatis reticulatis, rostro abbreviato, netzförmig durchkreuzte erhabene Streifen, und einen verkürzten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f.* 193.

*List. Hist. Conch. l. 4. f.* 14. f. 30.

*Petiv. Gaz. t.* 153. f. 6.

*Gualt. Test. t.* 49. f. M.

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. III. 11. *Murex Anus*.

*Linn. S. N. Sp.* 539.

I. III. 11. Das frumme Maul.

*Belg. Oorhorn. Valent. Angl. Hairy - Ear. Petiv. Gall. La Grimace.*

Testa gibbosa reticulatim Die höckerige, netzförmige, tuberculata, futuris, & labiis knottige Schale, hat ausgedilatato membranaceis, rostro breitete häutige Nätze und Lippen, mit einem aufgerichteten erecto. Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f.* 279. 280.

*List. Hist. Conch. l. 4. f.* 11. f. 57.

*Petiv.*





*Petiv. Gaz. t. 74. f. 9. ; t. 99. f. 10.*

— *amb. t. 6. f. 4.*

*Rumph. vmb. t. 24. f. F.*

*Gualt. Test. t. 37. f. B. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 6. 7.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 3. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 41. t. 403. 404. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 2.*

I. IV. Echinati, sine rostro.

I. IV. Dornige, ohne Rüssel.

I. IV. I. Murex Ricinus.

I. IV. I. Die gezackte Maulbeere.

*Linn. S. N. Sp. 540.*

*Belg. Gedakte Moerbey. Rumph. Angl. Small Spur Shell. Pet. Gall: L' Herisson. Dav.*

Testa ouata, spinis subulatis, apertura dentata.

Die eysförmige Schale ist mit ahlförmigen Dörnern besetzt, und an der Mündung gezähnt.

α ore luteo, spinis longioribus (minor).

α mit gelber Mündung, und längeren Dörnern (kleiner).

β ore amethystino, spinis breuioribus (major).

β mit amethystfarbener Mündung, und kürzeren Dörnern (größer).

*Rumph.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 24. f. E.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 28. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 37. 3942.*

*Knor. Vergn. I. 25. t. 5. 6. f.*

—— — VI. 24. t. 7. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 972. 973 f;*

—— — 102. t. 976. 977. f.

I. IV. 2. *Murex Nodus.* I. IV. 2. Die große Ka-  
stanie.

*Linn. S. N. Sp. 541.*

*Belg.* De bandeerde Castanje. *Angl.* The great Chesnut. *Gall.* La  
Chataigne a bandes.

|                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Testa</i> utrinque attenuata,<br/>spinis conicis, labro tubercu-<br/>lato, columella laevi.</p> | <p>Die beiderseits zugespitzte<br/>Schale ist mit kegelförmigen<br/>Stacheln besetzt, an der Scha-<br/>lenleiste knottig, an der Spin-<br/>del glatt.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 10.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 12.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 957. 958. f.*

I. IV. 3.



I. IV. 3. *Murex neritoides*.

*Linn. S. N. Sp. 542.*

I. IV. 3. Das Schmutzpflästerchen.

*Belg.* Roots = Hoorn met Moesjesjes. *Angl.* The Coequet. *Gall.* La Coquette.

Testa obtuse nodosa, labro angulato, columella complanata, bimaculata.

Die Schale ist mit stumpfen Knotten besetzt, an der Schalenleiste eckig, mit zweien Flecken an der flachgedrückten Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 50.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 173. 174.*

*Petiv. Gaz. t. 19. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 66. f. B. B.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 1. f. 30.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 959. 960. f.*

I. IV. 4. *Murex Mancinella*.

*Linn. S. N. Sp. 544.*

I. IV. 4. Die lange Maulbeere.

*Belg.* Langverpige Maerberzie. *Angl.* The Mulberry Shell, *Hill. Gall.* La Mure allongée.

Testa ovata oblonga, tuberculis acutis muricata, ore dentato amethystino.

Die eiförmige längliche Schale ist mit spitzigen Dornen bewafnet, mit einer amethystfarbenen gezähnten Mündung.

*List.*



- List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 5.*  
*Petiv. Gaz. t. 48. f. 14.*  
*Argenv. Conch. Pl. 17. f. H.*  
*Hill. Hist. of Anim. Pl. 8.*  
*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 970. f.*

I. IV. 5. Murex Hippo-  
 castanum.

I. IV. 5. Das Pimpel-  
 chen.

*Linn. S. N. Sp. 545.*

*Belg. Pimpeltje.*

Testa ovata striata, quadri-  
 fariam spinosa, columella um-  
 bilicata.

Die eysförmige gestreifte Schäl-  
 le ist mit vier Reihen Stä-  
 cheln umgeben, und an der  
 Spindel genabelt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 15.*

*Rumph. amb. t. 24. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 31. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 80 — 82.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 3. f.*

—— — V. 4. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. t. 40. f. 398.*

I. IV. 6. Murex rugo-  
 fus.

I. IV. 6. Die runze-  
 lichte Knotenschnecke.

Testa



Testa ovata, longitudinaliter rugosa, striis, carinisque nodosis transuersis, rostro umbilicato breui.

Die eiförmige, der Länge nach runzelichte Schale ist in die Quere gestreift, und knotig gefielel, mit einem genabelten kurzen Rüssel.

Mart. Konch. Kab. IV. 124. t. 1155. 1156. f.  
Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata. Anfractus quinque connati, longitudinaliter rugosi, transuersim striati, & carinati, carinis angulatis. Apertura ovalis columella umbilicata. Rostrum breue, effusum.

Die Schale ist eiförmig. Die fünf Gewinde sind zusammengewachsen, nach der Länge gerunzelt, in die Quere gestreift, mit eckigen Riesen. Die Mündung eiförmig. Die Spindel genabelt. Der Rüssel kurz und ausgeschnitten.

I. IV. 7. Murex sen-  
ticofus.

I. IV. 7. Die Distel-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 546.

Belg. Distel - Hoorntje. Angl. Small prickly Whelk. Petiv.

Testa subturrita, longitudinaliter costato muricata, transuersim cancellata, ore striato.

Die einigermaßen gerhürmte Schale ist der Länge nach stachlicht geribbt, in die Quere gegittert, an der Mündung gestreift.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 35.

Rumph. amb. 1. 29. f. N.

Petiv.



*Petiv. amb. t. 9. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 51. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. 0.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 45 — 47.*

*Knor. Vergn. IV. 23. t. 4. 5. f.*

I. IV. 8. Murex Melon-  
gena.

I. IV. 8. Das Bettzeug.

*Linn. S. N. Sp. 547.*

*Belg. Gedoorende Schildpadstaert. Rumph. Angl. The blue & white  
Murex. Hill. Gall. le Lard. Dav.*

Testa pyriformi, spira Die birnförmige Schale hat  
subspinosa prominente, aper- einen hervorragenden einiger-  
tura laevi, maßen dornigen Schnirkel,  
und eine glatte Mündung.

\* ventris transversim spinoso.

„ der Leib der Quere nach mit  
Stacheln besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 186. 295.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 24.*

*Rumph amb. t. 24. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 21. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. H.*



*Seb. Tbes. III. t. 72. f. 1 — 9.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 49. f.*

*Knor. Vergn. I. 17. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 39. t. 391 — 893. f.*

— — — — 40. t. 394. f.

β ventre sine spinis.

β der Leib ohne Stacheln.

*Rumph. amb. t. 24. f. 3.*

*Petiv. amb. t. 21. f. 8.*

*Knor. Vergn. II. 10. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 39. t. 393. f. 40. t. 395-397f.*

I. IV. 9. *Murex raphi-*  
*formis.*

I. IV. 9. Die dicke  
Rübe.

*Belg. Geknobbelde Knoll. Gall. Gros - Radix.*

*Testa* pyriformi , spinis Die birnförmige Schale ist  
fornicatis obtusis , anfractibus mit hohlen stumpfen Stacheln  
carinatis , rostro breui , in- besetzt , mit keilsförmig erhaben  
curuo , umbilicato. nen Gewinden , und einem  
kurzen krummen genabelten  
Rüssel.

*Testa* pyriformis , ponderosa. An- Die Schale ist birnförmig , und  
fractus sex , transversim striati , ca- schwer. Die sechs Gewinde sind  
rinati , carina spinis ; fornicatis ob- gestreift , und keilsförmig , am Riele  
tusis





*spis coronata. Sutura canaliculata. Spira pyramidata. Labrum incisum transversim striatum. Columella umbilicata; umbilicus latus, profundus, lamellosus, incurvatus. Rostrum breue inflexum.*

mit hohlen stumpfen Stacheln gekrönt; Die Nuth rinnenartig ausgehöhlet; Der Schnirkel pyramidenförmig; Die Schalenleuze inwendig in die Quere gestreift. Die Spindel genabelt; der breite, tiefe, und blätterichte Nabel ist in einen kurzen krummen Rüssel gebogen.

*subspinosa albida.*

„weiß, mit unvollkommenen Stacheln.

*Knor. Vergn. V. 21. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 750. f.*

*foliaceo spinosa, fusca.*

ß braun, mit Blättern und Stacheln besetzt.

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 754. 755. f.*

I. IV. 10. *Murex laceus.*

I. IV. 10. Der ausgeschnittene Morgenstern.

*Testa ovata, oblonga, striata; infractibus carinatis, spinosis; abro antice soluta; columella perforata.*

Die eysförmige länglichte gestreifte Schale hat tielförmige stachelichte Gewinde, eine vorne ausgeschnittene Schalenleuze, mit einer durchbohrten Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. II.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 56 — 58.*



*Seb. Thes. III. t. 60. f. 30 — 32.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 95 I. f.*

Testa ornata, utrinque attenuata. Anfractus quinque, transuersim carinati; carina spinis obtusis muricata. Ventris cingula spinosa b n. Apertura ouato oblonga. Labium antice sinu a columella solutum. Columella umbilicata. Color ex pallido roseus.

Die eyförmige Schale ist beiderseits zugespitzt. Die fünf Gewinde sind in die Quere gestreift, und keilsförmig, an dem Kiele mit stumpfen Stacheln besetzt. Um den Leib sind zweien stachelichte Bänder. Die Mündung ist länglicht eyförmig. Die Schalenlesze vorne durch einen Ausschnitt von der Spindel getrennet. Die Farbe ist blaß rosenroth.

I. V. Rostro recto elongato.

I. V. Mit einem geraden verlängerten Rüssel.

I. V. I. Murex babylonius.

I. V. I. Der Babelsthurm.

*Linn. S. N. Sp. 549.*

*Belg. Babilonse Tooren. Rumph. The Babel Shell. Pet. Gall. L. Tour de Babel. Dav.*

Testa turrita, cingulis acutis maculatis, labro fisso, rostro elongato recto.

Die gethürmte Schale ist mit scharfen gefleckten Gürteln umgeben, an der Schalenlesze gespalten, mit einem verlängerten geraden Rüssel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 29. f. L.*

*Gualt. Test. t. 52. f. N N.*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 79. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 9. f.*

*Knor. Vergn. IV. 13. t. 2. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 143. t. 1331. 1332. f.*

I. V. 2. *Murex javanus.* I. V. 2. Die javanische  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 550.*

Testa turrita, transuersum Die gethürmte in die Que-  
striata, asfractibus carinato re gestreifte Schale hat hies  
tuberculatis, labro antice so- förmige knottige Gewinde, und  
luto. eine vorne getrennte Spindel-  
leſze.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 79.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 42.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 143. t. 1334. 1335. f.*

I. V. 3. *Murex Colus.* I. V. 3. Die französi-  
sche Spindel.



*Linn. S. N. Sp. 551.*

*Belg. Tabaks-Pip. Rumph. Angl. Spindle-Shell. Pet. Gall. Le Fufeau.*

*Testa turrita, transuersim striata, carinato nodosa, labro crenulato, rostro recto elongato.* Die gethürmte in die Quere gestreifte Schale hat knottige Riele, eine geferbte Spindellette, und einen geraden verlängerten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 360.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 29. f. F.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 52. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. B.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 78.*

*Seb. Thes. III. t. 79. 4. 5.*

*Regenf. Samml. I. t. 12. f. 6.*

*Knor. Vergn. III. 5. t. 1. f. 14. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 144. t. 1339—1341. f.*

— — — — 145. t. 1343—1344. f.

*Müll. Linn. Naturf. IV. 1. B. 17. t. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 4.*

I. V. 4. Murex Morio.

I. V. 4. Der bandirte Mohr.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp.* 552.

Testa ventricosa nigra, fa- Die bäuchige schwarze Scha-  
scia transuersa alba, spirae le hat ein weißes Querbund,  
anfractibus nodosis, columella und fugezige Schnirkelgewinde  
rugosa. mit einer runzelichten Spin-  
del.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 357.

*Adans. Seneg. Pl.* 2. f. 31.

*Seb. Tbes. III. t.* 80. f. plurimae.

*Regenf. Samml. I. II. t.* 61. f.

*Knor. Vergn. I.* 20. t. 1. f.

—— ——— II. 6. t. 2. f.

—— *Del. nat. I. t. B. V. f.* 4.

*Mart. Koncb. Kab. IV.* 139. t. 1300. f.

I. V. 5. Murex Coch-  
lidium.

I. V. 5. Die indische  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp.* 553.

*Belg. Indian. Gall. L'Indien.*

Testa ventricosa, transuer- Die bäuchige Schale ist der  
sim fulcata, anfractibus spinis Quere nach gesurhet, an den  
coronatis, rostro elongato re- Gewinden mit Stacheln ge-  
cto. krönet, mit einem verlänger-  
ten geraden Küßel.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. o. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 57. f. 27. 28.*

*Knor. Vergn. VI. 15. t. 4. f.; 26. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Konch IV. 143. t. 1333. f.*

I. V. 6. *Murex Spirillus.*

I. V. 6. Die langschne-  
belige Rube.

*Linn. S. N. Sp. 554.*

*Belg. Langgestarte gladde Knoll. Gall. Maïsue lifse.*

*Testa ventricosa, spira acuminata, anfractibus acute marginatis, columellae labio expanso.*

Die bäuchige Schale hat einen zugespizten Schnirkel, scharfrandige Gewinde mit einer ausgebreiteten Schalen-  
lefze.

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 115. t. 1069. f.*

I. V. 7. *Murex canaliculatus.*

I. V. 7. Die gezackte  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 555.*

*Belg. Raap. Gall. Navet a longue queue.*

**Testa**



Testa ventricosa, spirae an-  
fractibus canaliculo diuinc-  
tis.

Die Gewinde der bäuchigen  
Schale sind mit einer Rinne  
von einander abgesondert.

*Liss. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 2.*

*Valent. Abb. II. t. 92. f.*

*Gualt. Test. t. 47. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 22.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. VI. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. III. 67. t. 742. 743. f.*

I. V. 8. Murex per-  
versus.

I. V. 8. Die linksge-  
wundene Feige.

*Linn. S. N. Sp. 557.*

*Angl. The pointed Murex. Hill. Gall. Buccin unique. Argenv.*

Testa ventricosa, anfracti-  
bus sinistrorsis, spinoso coro-  
natis, rostro elongato recto.

Die bäuchige Schale hat  
linksgerundene mit Stacheln  
gekrönte Windungen, und einen  
geraden verlängerten Rüssel.

*Gualt. Test. t. 30. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. F.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*





I. V. 9. *Murex pugilinus*.

I. V. 9. Das unächte Fleischhorn.

Testa ventricosa, anfractibus canaliculatis, acute coronatis, rostro recto, extus transuersim sulcato.

Die bäuchige Schale hat rinnenartig ausgefehlte, und spizig gekrönte Windungen, mit einem geraden auswändig in die Quere gefurchten Rüssel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. infra 6.*

*Gualt. Test. t. 47. f. B.*

*Knor. Vergn. I. 30. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1323. 1324. f.*

Testa ventricosa, crassa. Anfractus septem, infra tuturam canaliculati, in medio carinati; carina spini acuti breuibus coronata. Venter laevis, spira, & rostrum rectum, transuersim undulato striata. Columella subumbilicata. Color fulvus, aut pallide luteus.

Die Schale ist bäuchich, und dick. Die sieben Gewinde sind unter der Naht rinnenartig ausgefehlet, in der Mitte keilförmig erhaben, und allda mit kurzen spizigen Stacheln gekrönt. Der Leib ist glatt, der Schnirkel, und der gerade Rüssel in die Quere wellenförmig gestreift. Die Spindel einigermassen genabelt. Von gelbrother, oder blaßgelber Farbe.

I. V. 10. *Murex aruanus*.

I. V. 10. Die zwenkellige Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 556.*

Testa



Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige Scha-  
anfractibus bicarinatis, rostro le hat zwey erhabene rielsförmige  
elongato, Gürteln, und einen verlängerten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 101.*

*Rumph. amb. t. 28. f. A.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 138. t. 1295. 1296. f.*

I. V. II. Murex de- I. V. II. Die nordi-  
spectus. sche Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 559.*

*Belg. Noordfche Wulk. Angl. The common english Whelk. Da Cost.*

Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige Scha-  
anfractibus teretibus, rostro le hat runde Gewinde, und ei-  
recto. nen geraden Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 190.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 4. i f. 15. f. 15.*

*Linn. It. westg. t. 5. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 83. f. 3 — 6.*

*Da Cost. Elem. Pl. 1. f. 3 — 5.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 136. t. 1292. 1294. f.*

I. V. 12.



I. V. 12. Murex Tritonis.

I. V. 12. Die Tritons-Schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 560.*

*Belg.* Kink-Hoorn, *Rumph.* *Angl.* Tritons - trumpet. *Pet. Gall.* Trompe marine *Dav.*

*Testa* oblonga, anfractibus teretibus, prope suturam crenulatis, varicibus longitudinalibus, apertura denticulata. Die längliche Schale hat runde an der Naht gekerbte Windungen, mit nach der Länge laufenden Näthen, und einer gezähnelten Mündung.

*Sulci* transversi, striati. *Apex* roseus. Nach der Quere laufen gestreifte Furchen. Die Spitze ist rosenroth.

$\alpha$  attenuata rosea, & lutescens  $\alpha$  schmal, von rosenrother, oder immaculata. gelblicher Farbe ohne Flecken.

*Mart. Konch. Kab. IV. 134. t. 1278. 1279.f.*

$\beta$  ventricosa, albo fuscoque variegata.  $\beta$  bäuchig, weiß und braun gefleckt.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 188.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 12. 13.*

*Rumph. amb. t. 28. f. B.*

*Petiv. Gaz. t. 12. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 48. f. A.*

*Seb.*



*Seb. Tbes. III. t. 81. f. omnes.*

*Knor. Vergn. II. 16. t. 2. 3. f.*

—— ——— *V. 5. t. 1. f.*

—— ——— *Del. nat. I. t. B. VI. f. 1.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 134. t. 1277. f.*

—— ——— *136. 1282. 1283. f.*

I. V. 13. Murex Puf-  
fio.

I. V. 13. Die gefleckte  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 561.*

*Belg. Gnemoe - Hoorn,*

Testa oblonga, ventricosa, Die längliche bäuchige glat-  
laevi, anfractibus rotundatis, te Schale, hat runde Gewin-  
apertura laevi, rostro breui. de, eine glatte Mündung, samt  
einem kurzen Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 40.?*

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 14. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 52. f. 7.*

*Knor. Vergn. IV. 21. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 97. t. 1357. f.*

I. V. 14. Murex accin-  
tus.

I. V. 14. Die Gürtel-  
spindel.

Testa



Testa fusiformi, laevi, fusca, anfractibus conuexis, fascia articulata alba, rostro recto breui.

Die spindelförmige glatte Schale hat an den bäuchigen Gewinden einen gegliederten weißen Gürtel, mit einem kurzen geraden Rüssel.

Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1281. 1219. f.

Testa fusiformis, laevis. Anfractus octo conuexi, attenuati, connati. Apertura ouato oblonga. Labrum intus striatum. Columella laevis, supra plica una transuersa. Basis extus transuersim striata, constituens rostrum abbreviatum, rectum. Color atro fuscus, cingulo angusto anfractuoso albo, lineis angulatis rufis articulado.

Die Schale ist spindelförmig und glatt. Die acht bäuchigen zusammen gewachsenen Gewinde verbinden sich. Die Schalenleiste ist innwendig gestreift. Die Spindel glatt, und oben mit einer Quersalte versehen. Der Grund ist von außen in die Quere gestreift, und bildet einen geraden verkürzten Rüssel. Von schwarzbrauner Farbe mit einer weißen schmalen Quersbinde, die durch rothbraune Windfelzige unterbrochen wird.

I. V. 15. Murex vulpinus.

I. V. 15. Die rothbraune Spindel.

Testa oblonga, ventricosa, glabra, basi, anfractuosoque marginibus striatis, rostro breui, torto.

Die längliche bäuchige glatte Spindel ist an dem Rande der Windungen gestreift, und mit einem kurzen gedrehten Rüssel versehen.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa



Testa oblonga. Anfractus octo  
laeues, teretiusculi, prope futuram  
transuersim striati. Venter conue-  
xus subtus transuersim striatus,  
definens in rostrum breue extus in-  
tortum. Apertura laevis. Color ex  
fusco ruber.

Die Schale ist länglich. Die  
acht Gewinde glatt, rund, an der  
Nath in die Quere gestreift. Der  
erhabene Leib ist unten der Quere  
nach gestreift, und endiget sich in  
einen kurzen, auswändig gedrehten  
Rüssel. Die Mündung ist glatt.  
Von braunrother Farbe.

I. V. 16. Murex Tuli-  
pa.

I. V. 16. Die Achat-  
birne.

Linn. S. N. Sp. 562.

Belg. Agaate - Peer. Rumph. Gall. L'Agathine. Dav.

Testa oblonga ventricosa,  
laeui, anfractibus rotundatis,  
sutura geminata, columella uni-  
plicata, rostro patulo striato.

Die längliche bäuchige glatte  
Schale hat runde mit einer  
zweyfachen Nath versehene Ge-  
winde, mit einer Falte an der  
Spindel, samt einem erweiter-  
ten gestreiften Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 187.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. I. 2.

Rumph. amb. t. 49. f. H.

Gualt. Test. t. 46. f. A.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 23 — 31.

Regenf. Samml. I. 9. t. 35. f.



*Knor. Vergn. V. 18. t. 5. f.*

— — — *VI. 29. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 136. t. 1286. f.*

— — — *137. t. 1288. 1289. f.*

I. V. 17. *Murex Dolarium.*

I. V. 17. Die Vortreppe.

*Linn. S. N. Sp. 564.*

*Belg. Bostappen.*

Testa ventricosa, costis obtusis angulatis, labro plicato, columella umbilicata.

Die bäuchige Schale hat stumpfe, eckige Rippen, eine gefaltene Spindel, samt einer gebielten Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 347.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. II.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 5. f.*

I. V. 18. *Murex lignarius.*

I. V. 18. Die Holzspindel.

*Linn. S. N. Sp. 566.*

Testa





Testa oblonga , anfractibus Die längliche Schale hat longitudinaliter plicatis , ob- stumpfknottige nach der Länge tuse nodosis , rostro abbrevia- gefaltene Windungen mit einem to. verkürzten Schnabel.

Fulva , fascia ventris niuea.

Rotgelb, mit einer weißen Quer-  
binde um den Leib.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 32.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 4.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 7. f.*

I. V. 19. Murex Tra-  
pezium.

I. V. 19. Die Bände-  
spindel.

*Linn. S. N. Sp. 567.*

*Belg. Gebaande Knobbel - Hoorn. Rumph. Gall. Le Tapis. Dar.*

Testa oblonga , anfractibus Die längliche Schale hat carinato angulatis , apertura kielförmige eckige Windungen, dentata , rostro recto. eine gezähnte Mündung, mit einem geraden Schnabel.

Lineis transversis , geminatis fus- Mit gepaarten braunen Quere-  
cis. streifen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 287.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 26.*

*Rumph. amb. t. 49. f. K.*



Gualt. Test. t. 46. f. B.

- Argenv. Conch. Pl. 10. f. H.

Seb. Thes. III. t. 79. f. 1.

Knor. Verg. IV. 20. t. 1. f.

— — V. 10. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 139. t. 1298. 1299. f.

I. V. 20. Murex craticulatus.

I. V. 20. Die Wellenspindel.

Linn. Sp. N. Sp. 569.

Testa fusiformi longitudinaliter rugosa, cingulis elevatis acutis, labro dentato, rostro recto.

Die spindelförmige Schale ist der Länge nach gerunzelt, und in die Quere mit erhabenen scharfen Ringen umgürtet, an der Schalenleiste gezähnt, mit einem geraden Rüssel.

Niuea, maculis longitudinalibus croceis.

Schneeweiß, mit nach der Länge laufenden safranrothen Flecken.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 22.

Knor. Vergn. II. 3. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1382. 1383. f.



I. VI. Turriti, rostro brevi.

I. VI. Gethürmte, mit kurzem Rüssel.

I. VI. I. Murex Vertagus.

I. VI. I. Die Schnauzennadel.

Linn. S. N. Sp. 571.

Belg. Witte Tuitje. Rumph. Angl. White Inouted Peg. Petiv. Gall. Chenille blanche. Dav.

Testa turrita, anfractibus superne plicatis, rostro ascendente, columella bisplicata. Die gethürmte Schale hat oben gefaltene Bindungen, einen aufgerichteten Rüssel, und zwei Falten an der Spindel.

Bonap. Recr. cl. 3. f. 84.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 83.

Petiv. Gaz. t. 56. f. 4.

— amb. t. 13. f. 14.

Rumph. amb. t. 30. f. K.

Gualt. Test. t. 57. f. D.

Agenv. Conch. Pl. 11. f. P.

Adans. Seneg. Pl. 10. f. 2.

Knor. Vergn. III. 20. t. 3. f.

— — V. 15. t. 6. f.

— — VI. 40. t. 4. 5. f.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 28.

Müll. Linn. Naturfyst. VI. B. 17 t. 4 f.



*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1479. f.*

— — — — — 157. t. 1480. 2488. f.

**I. VI. 2. Murex fulcatus.**

**I. VI. 2. Die Manges-  
nadel.**

*Belg. Mauger - Naalde. Rumph. Angl. Mango's Peg. Pet.*

Testa turrita, longitudina-  
liter rugosa, transuerfim ful-  
cata, labro ampliato, rostro  
breuissimo recto.

Die gethürmte Schale ist  
in die Länge gerunzelt, der  
Quere nach gefurchet, an der  
Schalenlesze ausgebreitet, mit  
einem sehr kurzen geraden Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 68.*

*Rumph. amb. t. 30. f. T.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 22.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1484-1485. f.*

Testa turrita. Anfractus undeni,  
decliues, plani, longitudinaliter ru-  
gosi, transuersim sulcati. Labrum  
ampliatum, acute marginatum,  
antice solutum. Columella vix la-  
biata. Angulo labro opposito. Ro-  
strum breuissimum, rectum. Co-  
lor fuscus.

Die Schale ist gethürmet. Die  
elf Gewinde sind abhängig flach,  
nach der Länge mit Runzeln, in  
die breite mit Furchen besetzt. Die  
Schalenlesze ist ausgebreitet, scharf-  
randig und vorne abgesondert.  
An der Spindel ist kaum eine Lesze.  
Der Schalenlesze gegen über steht  
eine hervorragende Ecke. Der Rüs-  
sel ist sehr kurz und gerad. Die  
Farbe braun.



I. VI. 3. Murex gibbo-  
fus.

I. VI. 3. Die höckerige  
Stachelnadel.

Testa turrita anfracti-  
bus marginatis, ventre gibbo;  
labro nullo, denticulato, ro-  
stro breui.

Die gethürmte Schale ist an  
den Windungen eingesäumt,  
auf dem Rücken höckerig, an  
der gespaltenen Schalenlesze ge-  
zähnel, und mit einem kurzen  
Rüssel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus circiter  
nouem transuersum striati, plicis  
longitudinalibus decussati, supra  
prope futuram compresso margina-  
ti. Venter tubere dorsali gibbus.  
Apertura oblonga Labrum supra  
sinu transuerso lato fissum, mar-  
gine denticulatum Columella re-  
plicata, laeuis. Rostrum rectum,  
breue. Color albus, maculis pal-  
lide rubris.

Die Schale ist gethürmet. Die  
Gewinde, deren beiläufig neun sind,  
gestreift, mit nach der Länge  
laufenden Falten durchkreuzet, und  
oben an der Naht mit einem ein-  
gedrückten Rande versehen. Der  
Leib hat auf dem Rücken einen Hö-  
cker. Die Mündung ist länglich.  
Die Schalenlesze durch einen breit-  
Querausschnitt gespalten, am Ran-  
de gezähnel. Die Spindel ist über-  
geschlagen, und glatt. Der Rüssel  
gerad, und kurz. Von weißer Far-  
be mit blaßrothen Flecken.

I. VI. 4. Murex Aluco.

I. VI. 4. Die gefurchte  
Doruspindel.

*Linn. S. N. Sp. 572.*

*Belg. West Indische Pausc - Kroon. Rumph. Angl. Knopped Popes  
Crown. Petiva*



Testa turrita, anfractibus Die gethürmte Schale hat  
transuersim sulcatis in medio nach der Quere gefurchte, in  
tuberculatis, columella uni- der Mitte mit Knoten besetzte  
plicata, rostro ascendente. Gewinde, zwei Falten an der  
Spindel, und einen aufgerich-  
ten Rüssel.

α albidā.

α weißlich.

β alba, maculis lineisque fuscis.

β weiß, mit braunen Flecken und  
Strichen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 67.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 87.*

*Rumph. amb. t. 30. f. 0.*

*Petiv amb. t. 7. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 57. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 51. f. 25. t. 50. f. 15. 16.*

*Knor. Vergn. I. 16. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1473. 1474. f.*

I. VI. 5. Murex corona-  
rus.

I. VI. 5. Die gedornete  
Schneppennadel.

*Belg. Gedoornde Snuite Pen. Rumph. Angl. The rougheren Shell.*  
*Hill.*



*Testa turrita, substriata, an-* Die gethürmte Schale ist  
*fractibus coronatis, columella* einigermaßen gestreift, an den  
*uniplicata, rostro ascendente.* Gewinden gekrönt, mit einer  
 Falte an der Spindel, und ei-  
 nen aufgerichteten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 69.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 79.*

*Rumph. amb. t. 30. f. N.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 23.*

*Gualt. Test. t. 57. f. A.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Knor. Vergn. III. 16. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1478. f.*

*Testa turrita substriata. Anfrac-*  
*tus undeni, subtrus laeues, in me-*  
*dio spinis procumbentibus corona-*  
*ti, prope futuram attenuati. Aper-*  
*tura, & rostrum praecedentis. Color*  
*albidus, maculis latis, fuscis,*

Die Schale ist gethürmet, und  
 einigermaßen gestreift. Die elf  
 Gewinde sind unten glatt, in der  
 Mitte mit darnieberliegenden Ede-  
 nern gekrönt, nächst der Mündung  
 verengert. Die Mündung umhüllt  
 der Rüssel ist wie bei der vorhergehenden  
 Art. Weißlich mit braunen Fle-  
 cken.

I. VI. 6. *Murex littera-*  
*tus.*

I. VI. 6. Die Buchsta-  
 bennadel.

*Testa ventricosa turrita, ni-*  
*gro maculata, columella uni-*  
*plicata, rostro breui.*

Die bäuchig gethürmte  
 schwarzgefleckte Schale hat an  
 der Spindel eine Falte, und  
 einen kurzen Rüssel.





*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15 f. 89.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ventricosa, turrata. Anfractus circiter octo coaliti, supra prope futuram spinis erectis brevibus muricati. Apertura ampliata. Columella uniplicata, Rostrum breve, rectum. Color niueus, maculis punctatis, characteres nonnullam aemulantibus, nigris.

Die Schale ist häuchig und gethürmet. Die acht Gewinde sind zusammengewachsen, und oben mit kurzen aufgerichteten Dornen besetzt. Die Mündung ist erweitert. Die Spindel hat eine Quersalte. Der Rüssel ist kurz, und gerad. Die Farbe schneeweiß, mit schwarzen punktirten Flecken, die bisweilen buchstabenähnliche Zeichnungen bilden.

I. VI. 7. *Murex fusca-*  
*eus.*

*Linn. S. N. Sp. 573.*

I. VI. 7. Die gezackte  
Besansspindel.

*Belg. Getaakte Bezaanknop. Gall. Obelisce chinois. Dav.*

Testa turrata, anfractibus spinosis, prope futuram crenulatis, basi planiuscula.

Die gethürmte Schale hat stachelichte, an der Muth gekerbte Windungen, und einen etwas flachen Boden.

α alba.

α weiß.

β ex fusco luteo.

β braungelb.

γ atro fusca.

γ schwarzbraun.

*Gualt. Test. t. 56. f. E. H.*

*Argenv. Conch. Pl. II, f. L.*

*Knor.*



*Knor. Vergn. III. 26. t. 4. 5. f.*

I. VI. 8. *Murex Radula.* I. VI. 8. Die Nadel-  
feile.

*Linn. S. N. Sp. 575.*

*Testa turrita, anfractibus serie triplici punctatis, basi planiuscula sulcata.* Die gethürmte Schale hat auf den Gewinden eine dreysache Reihe hervorstehender Punkte, mit einem etwas flachen gefurchten Boden.

*α alba:*

*α weiß.*

*Knor. Vergn. III. 15. t. 3. f.*

*β cingulis albis, rufis, fuscisque.*

*β mit weißen, rothbraunen und dunkelbraunen Gürteln bemalt.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 327.*

*Gualt. Test. t. 58. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. VI. 9. *Murex atratus.* I. VI. 9. Die schwarze  
Stachelnadel.

*Testa turrita, atra, anfractibus transuersim striatis, tuberculatis, columella uniplicata, rostro recto.* Die gethürmte schwarze Schale hat knottige, in die Quere gestreifte Windungen, eine Falte an der Spindel, mit einem geraden Rüssel.

X 5

*Mus.*



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus decem, coaliti, transversim striati, duplici tuberculorum acutorum, & brevium serie cincti. Apertura oblonga. Labrum dilatatum, crenulatum. Columella uniplicata. Angulus labii margini oppositus. Rostrum rectum, breue. Color, ater, nitens.

Die Schale ist gethürmet. Die zehn Gewinde sind zusammenge wachsen, und mit einer doppelter Reihe kurzer spiziger Körnchen umgeben. Die Mündung ist länglich. Die Schalenlesze erweitert, und fein gekerbet. Die Spindel hat eine Quersalte. Der Spindellesze gegenüber steht eine hervorragende Ende. Der Rüssel ist gerad und kurz. Die Farbe ist glänzend schwarz.

**K. Trochus.**

**K. Die Kräuselschnecke.**

Testa spiralis. Apertura angulata, coarctata. Columella obliquata.

Die Schale ist schnirfelförmig gewunden. Die Mündung eckig, und eingefaßt. Die Spindel steht etwas schief.

K. I. Columella perforata.

K. I. Mit durchbohrter Spindel.

K. I. I. Trochus niloticus.

K. I. I. Die glatte Pyramide.

*Linn. S. N. Sp. 579.*

*Belg.*



Belg. Gvialakte Tol. Rumph. Angl. The great waved Top. Pet.  
all. Le Sabot marbré. Argenv.

Testa conica , anfractibus Die kegelförmige Schale hat  
onuexiusculis laevis, co- einigermaßen erhabene glatte  
imella perforata. Gewinde , und einen durchbohr-  
ten Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 102.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 3.

Rumph. amb. t. 21. f. A.

Gualt. Test. t. 59. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. C.

Gev. Belust. 5. t. 33 — 35.

Regenf. Samml. I. 4. t. 42. f.

Knor. Vergn. I. 12. t. 1. f.

—— — II. 5. t. 1. f. ; 6. t. 1. f.

K. I. 2. Trochus macu-  
latus.

Linn. S. N. Sp. 580.

K. I. 2. Die knottige  
Pyramide.

Belg. Bagyne - Drolle. Rumph.

Testa conica , tuberculata, Die kegelförmige klein-knote-  
umbilico obliquo , labio bi- tige Schale hat einen schiefen  
lobo. Nabel , und einen zweyfachen  
Lappen an der Schalenlippe.



α conica, anfractibus transuersim striatis; albida, rubro maculata.

α kegelförmig, mit in die Quere gestreiften Windungen; weiß mit rothen Flecken.

Gualt. Test. t. 61. f. E.

Knor. Vergn. II. 2. t. 4. 5. f.

Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 18. t. 1. f.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 20.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 13.

β conica, anfractibus oblique rugosis, prope futuram compressis; alba, viridisque, rubro maculata.

β kegelförmig, mit schiefer unregelmäßigen, an der Naht zusammengedrückten Windungen; weiß, und grün, mit rothen Flecken.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 5.

Rumph. amb. t. 21. f. 3.

Gev. Belust. 7. t. 52 f.

γ conica attenuata, anfractibus transuersim striatis, prope futuram compressis; viridis fusco maculata.

γ spitzkegelförmig, mit in die Quere gestreiften, an der Naht zusammengedrückten Windungen; grün mit braunen Flecken.

Gualt. Test. t. 61. f. D. D.

Gev. Belust. 7. t. 48. f.

Regenf. Samml. I. 2. t. 13. f.



K. I. 3. Trochus per-  
pectivus.

K. I. 3. Die Perspektiv-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 581.*

*Belg. Perspectiv - Hoorn. Rumph. Angl. Spinnet - Shell. Petiv. Gall.  
Cadran. Dav.*

Testa convexo conica, an-  
tibus decussatim striatis,  
umbilico lato crenato.

Die gewölbt kegelförmige  
Schale hat kreuzweise gestreif-  
te Windungen, und einen wei-  
ten gekerbten Nabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 27. 28.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 27. f. L.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 65. f. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.*

*Gev. Belust. 25 t. 266 — 272 f.*

*Seb. Thes. t. 40. f. 1, 2, 13, 14, 28, 41, 42.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 61. f.*

*Knor. Vergn. I. II. t. 1. 2. f.*

K. I. 4. Trochus pharao-  
ius.

K. I. 4. Die Pharao-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 584.*

*Belg.*



Belg. Plins Roberts Knop, Gall. Bouton de Camifole. Dav.

Testo subousta, striata, Die fast euförmige gestreifte  
punctis concatenatis globosis, Schale ist mit kettenförmig an-  
columella labioque dentato, einanderstehenden runden Kör-  
umbilico crenato. nern umgeben, an der Spin-  
del und Schalenfesse gezähnt,  
am Nabel geförter.

Bonan. Reer. 1. 3. f. 222.?

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 25.

Petiv. Gaz. t. 14. f. 10.

Gualt. Test. t. 63. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. L. Q.

Adans. Seneg. Pl. 12. f. 2.

Gev. Belust. 13. t. 101 — 107. f.

Knor. Vergn. I. 30. t. 6. f.

—— — IV. 26. t. 3. 4. f.

K. I. 5. Trochus Magus. K. I. 5. Der Herenz-  
meister.

Linn. S. N. Sp. 585.

Belg. Tovenaar. Gall. Le Sorciere. Dav.

Testa umbilicata striata: Die genabelte und gestreifte  
anfractibus supra plicatis. Schale hat an dem Oerrande  
gefaltene Bindungen.  
Gualt.





*Gualt. Test. t. 64. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.*

*Gev. Belust. 13. t 127. f.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 4. f.*

K. I. 6. *Trochus cinerarius.*

*Linn. S. N. Sp. 590.*

Testa umbilicata, conica, infractibus prope futuram calliculatis.

K. I. 6. Der schiefstrahlige Kräusel.

Die genabelte kegelförmige Schale ist an der Naht ausgekehlet.

Alba, fasciis oblique fuscis.

Weiß, mit schiefen braunen Querbändern.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. I. 7. *Trochus umbilicatus.*

*Linn. S. N. Sp. 592.*

Testa convexa, conica, infractibus substriatis, umbilico cylindraceo.

K. I. 7. Die Wirtelschnecke.

Die gewölbte kegelförmige Schale hat gestreifte Gewinde und einen walzenförmig ausgehöhlten Nabel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. I. 8.



K I. 8. *Trochus fascia-*  
*tus.*

K. I. 8. Die gebänderte  
Kräuselschnecke.

Testa conica, laevi, an-  
fractibus rotundatis supra com-  
pressis, umbilico profundo, la-  
bro crenulato.

Die kegelförmige glatte  
Schale hat rundliche oben ein-  
gedrückte Gewinde, einen tie-  
fen Nabel, mit einer gekerb-  
ten Spindelkante.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica. Anfractus quin-  
que rotundati, supra prope futuram  
complanati. Umbilicus verticalis  
profundus. Labium crenulatum.  
Color albidus, fusco maculatus, fas-  
cia transversa rosea.

Die Schale ist kegelförmig. Ihre  
fünf rundliche Gewinde sind oben  
an der Naht etwas flach gedrückt.  
Der Nabel ist tief und senkrecht.  
Die Schalenkante fein gekerbt. Die  
Farbe weiß mit braunen Flecken,  
und einem rosenrothen Querbande,

K. I. 9. *Trochus tessu-*  
*latus.*

K. I. 9. Der Würfel-  
kräusel.

Testa conica, anfractibus  
rotundatis transversim striatis,  
columella obsolete perforata.

Die kegelförmige Schale  
hat rundliche, in die Quere  
gestreifte Bindungen, und eine  
durchbohrte Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa conuexo conica. Anfractus quinque transuersim striati, conuexiusculi, decliues. Columella uniloba, replicata, obtegens foramen obliquum, tenue. Color albidus, luteo maculatus, tessulis oblongis purpureis seriatim digestis, infra hunc corticem margaritaceus.

Die Schale ist gewölbt kegelförmig. Die fünf Gewinde sind in die Quere gestreift, etwas bäuchig, und abhängig. Die Spindel hat eine lappenförmige Ecke, und bedeckt durch ihren Ueberschlag das schlefe dünne Nabelloch. Die Farbe ist weiß, mit gelben Flecken, und länglichen purpurrothen reiheweise stehenden Flecken; unter dieser Rinde perlenmutterartig.

K. I. 10. Trochus solaris.

K. I. 10. Das Sonnenhorn.

Linn. S. N. Sp. 593.

Belg. Zonne - Hoorn.

Testa umbilicata complanato conica, anfractibus spinoso radiatis, apertura semicordata,

Die genabelte flachgedrückte kegelförmige Schale hat um die Gewinde stachelichte Strahlen, und eine halb herzförmige Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 366. 367.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 9.

Rumph. amb. t. 20. f. K.

Gualt. Test. t. 65. f. N. P.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. H.

Gev. Belust. 20. t. 192 f.

Knor. Vergn. VI. 26. t. 4. f.



K. II. Imperforati.

K. II. Ohne Nabelloch.

K. II. 1. Trochus Pyramis.

K. II. 1. Die Spitzsäule.

Testa conica acuminata; anfractibus imbricatis, seriatim granulosis; columella contorta imperforata.

Die kegelförmige zugespitzte Schale hat ziegelförmig aufeinander liegende, reiheweise mit Körnern besetzte Gewinde, mit einer Krümmungsdrehen und durchbohrten Spindel.

Gev. Belust. 9 t. 68 f.

Knor. Vergn. I. 12. t. 4. f.

Testa conica. acuminata. Anfractus duodecim plani declines, serie transversa triplici granulorum cincti; margine inferiore imbricato, prominente, crenato, acuto. Basis plana, transversim striata. Color pallide virescens, fusco luteo maculatus; infra corticem argenteus.

Die Schale ist kegelförmig und zugespitzt. Die zwölf Gewinde sind abhängig, flach, mit einer dreifachen Reihe Körnchen besetzt, am ziegelbrünniggestellten scharfen hervorstehenden Unterrande gekerbt. Der Grund ist flach, und der Quere nach gestreift. Flaggelb mit brannen, oder gelben Flecken; unter der Rinde mit einem silberartigen Glanz.

K. II. 2. Trochus vestiarius.

K. II. 2. Das Wulstknöpfchen.

Linn. S. N. Sp. 594.

Belg. Bultslakja. Gall. Bouton de Camifole. Dav.

Testa



Testa conico orbiculata lae-  
ui, columellae basi callosa.

Die plattkegelförmige schei-  
benrunde Schale hat am Bo-  
den der Spindel einen erha-  
benen Wulst.

α rubella, cingulo albo.

α rötlich, mit einem weißen  
Gürtel.

β cinerea, cingulo albo fuscoque.

β aschengrau, mit einem weiß  
und braun gegliederten Gürtel.

γ alba, radiis obliquatis griseis.

γ weiß, mit schiefen hellgrauen  
Strahlen.

δ plumbea, cingulo albo reticu-  
late.

δ bleiförmig, mit einem weiß-  
gegliederten Gürtel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 64.

Petiv. Gaz. t. II. f. 6.

Gualt. Test. t. 65. f. E. F. G.

Gev. Belust. 19. t. 189. f.

Knor. Vergn. VI. 22. t. 7. f.

K. II. 3. Trochus La-  
bio.

K. II. 3. Die Dickschuppe.

Linn. S. N. Sp. 595.

Belg. Diklip. Angl. Thick-lip Top. Petiv.



|                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testa imperforata, ouata,<br>striato tuberculata, apertura<br>dentata, incrassata; columel-<br>la unidentata. | Die undurchbohrte euförmis-<br>ge mit Streifen und Knotten<br>besetzte Schale hat eine gezäh-<br>nte dicke Lippe, und an der<br>Spindel einen Zahn. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 8. f. 25. 26.

*Rumph. amb. t.* 21. f. E.

*Petiv. amb. t.* 12. f. 1.

*Gev. Belust.* 18. t. 165. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 4. *Trochus tur-*  
*binatus.*

K. II. 4. Der türkische  
Bund.

*Belg. Tulbande.*

|                                                                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testa ouata, laeui, anfrac-<br>tibus conuexis, columella uni-<br>dentata, imperforata. | Die euförmige Schale hat<br>erhabene Gewinde, mit einem<br>Zahne an der undurchbohrten<br>Spindel. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

α alba, maculis oblongis nigris.

α weiß, mit länglichen schwarzen  
Flecken.

β alba, venulis cingulisque ar-  
ticulatis nigris.

β weiß, mit schwarzen Adern,  
und gegliederten Gürteln.

γ alba, venulis, cingulisque ar-  
ticulatis purpureis.

γ weiß, mit purpurrothen Adern,  
und gegliederten Gürteln.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 33. 34. 35.*

*Gualt. Test. t. 63. f. D. E. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. N.*

*Gev. Belust. 20. t. 197. 198. 200. 201. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 6. 7. f.*

Testa ovata, Anfractus sex, con-  
uexi, laeues contigui. Apertura  
lunata, laevis. Columellae labium  
unidentatum.

Die Schale ist eiförmig. Die  
sechs Gewinde sind erhoben, glatt,  
und aneinander verwachsen. Die  
Mündung mondförmig, und glatt.  
Die Spindelstelle mit einem Zahne  
versehen.

K. II. 5. Trochus Tu-  
ber.

K. II. 5. Der Knottenz-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 596.*

Testa imperforata conica,  
anfractibus subcarinatis utro-  
que margine nodosis.

Die Gewinde der undurch-  
bohrten kegelförmigen Schale  
sind einigermaßen rielsförmig,  
und an jedem Rande knottig.

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. R. ?*

*Gev. Belust. 19 t. 179 f.*

*Regenf. Samml. 3. t. 27. f.*

*Knor. Vergn. I. 3. t. 2. f.*





K. II. 6. Trochus Co-  
nulus.

K. II. 6. Der Schnur-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 598.*

Testa imperforata conica  
striata; anfractibus linea ele-  
uata interstinctis.

Die undurchbohrte kegelfö-  
rmige gestreifte Schale hat  
die Gewinde durch eine erha-  
bene Querlinie abgesondert.

*List. angl. t. 3. f. 15.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 91. 99.*

*Gualt. Test. t. 61. f. M.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 2. f. 36.*

*Gev. Belust. 9. t. 69, 70. f.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 5. f.*

K. II. 7. Trochus Zy-  
ziphinus.

K. II. 7. Der Zuzuben-  
kräusel.

*Linn. S. N. Sp. 599.*

Testa imperforata, conica,  
laevi, anfractibus marginatis.

Die undurchbohrte kegelförmige glatte Schale hat ein-  
gesäumte Windungen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 93.*

*Rumph. amb. t. 21. f. 1.*



Gualt. Test. t. 91. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.

Knor. Vergn. III. 14. t. 2. 3. f.

K. II. 8. Trochus grā-  
nulus.

K. II. 8. Der gekörnte  
Kräusel.

Testa imperforata, conica,  
striis transversis tenuissimis, &  
granulatis, alternatim majo-  
ribus; suturis emarginatis.

Die undurchbohrte kegelför-  
mige Schale ist der Quere nach  
mit dünnen, und fein gekörn-  
ten Streifen von abwechseln-  
der Größe umgürtet, und an  
den Näthen eingesäumt.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica, ventricosa. An-  
fractus circiter decem, transversim  
striati; striis alternatim majoribus,  
& granulis moniliformi serie cin-  
ctis, supra prope suturam linea ele-  
vata marginatis. Basis convexius-  
cula, striis majoribus rufo articu-  
latis. Color griseus, faux marga-  
ritacea.

Die Schale ist kegelförmig häu-  
sig. Die Gewinde, deren unge-  
fähr zehn, sind in die Quere ge-  
streift; die Streifen wechselweise  
größer, mit Perlenknäulen umge-  
ben, oben an den Näthen mit et-  
was erhabenen Linie eingesäumt.  
Der Boden ist etwas häutig, an  
welchem die größten Streifen rotz-  
braun geädert sind. Von hell-  
grauer Farbe, mit einem perlen-  
mutterartigen Schlunde.

K. II. 9. Turbo croca-  
tus.

K. II. 9. Der Safran-  
Kräusel.

= Trochus see last page errata



Testa imperforata conica, Die undurchbohrte kegelför-  
laeui, futura sulcata, anfrac- mige Schale hat eine gefurch-  
tibus conuexis, spira crocea. te Nath, gewölbte Windun-  
gen, mit einem safranrothen  
Schnirkel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica, laevis. Anfractus Die Schale ist kegelförmig, und  
circiter quinque convexi, sulco su- glatt. Ungefähr fünf erhabene  
turali interstincti. Basis conuexa. Gewinde, die an der Nath mit ei-  
Columella angulata, replicata, te- ner Furche von einander abgese-  
gens foramen obsoletum. Color dert sind. Der Grund ist bäuchig.  
basis, & epidermidis nitens albus, Die eckige, übergeschlagene Spin-  
spirae sub epidermide croceus. del deckt ein undeutliches Nabel-  
loch. Der ganze Grund und die  
Oberhaut ist glänzend weiß, der  
Schnirkel unter der Oberhaut sa-  
franroth.

K. III. Turriti, columella exserta,

K. III. Gethürmte, mit hervor-  
ragender Spindellese.

K. III. I. Trochus Te-  
lescopicum.

K. III. I. Die See-  
tonne.

*Linn. S. N. Sp. 600.*

*Belg. Zeeton. Rumph. Angl. Indian Whirligig. Petiv. Gall. Le Te-  
lescope. Dav.*

Testa imperforata turrita, Die undurchbohrte gethürm-  
striata, columella exserta spi- te und gestreifte Schale hat ei-  
rali. ne hervorragende gewundene  
Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 92.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 10.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 21 f. 12.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 10.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. B.*

*Seb. Tbes. III. t. 50. f. 1 — 12.*

*Knor. Vergn. III. 22. t. 2. 3. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 9.*

K. III. 2. Trochus do-  
labratus.

K. III. 2. Die Schiffs-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 601.*

*Belg. Vlaggetje.*

Testa umbilicata turrata,  
glabra; columella exserta, re-  
curvata, triplicata.

Die genabelte gethürmte glat-  
te Schale hat eine hervorras-  
gende gedrehte, mit drey Fal-  
ten versehene Spindel.

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. L.*

*Knor. Vergn. VI. 29. t. 2. f.*

L. Turbo.

L. Die Mondschnecke.

Testa spiralis, apertu-  
ra coarctata, rotunda, in-  
tegra.

Die schnirkelförmig ge-  
mundene Schale hat eine  
eingefasste, runde, ganz-  
randige Mündung.



L. I. Imperforati, columella plana.

L. I. Undurchbohrte mit einer flachen Spindel.

L. I. 1. Turbo listoreus.

L. I. 1. Die Strandschnecke.

Linn. S. N. Sp. 607.

Belg. Aliëkruiken. Angl. Couvin. Gall. Bigourneau.

Testa subovata transuersim fasciata, columella plana.

Die etwas eiförmige Schale ist der Quere nach mit Bändern umgeben, und mit einer flachen Spindel versehen.

List. angl. t. 3. f. 9.

— Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 43.

Gualt. Test. t. 45. f. G.

Mus. Caes. Vindobon.

L. I. 2. Turbo muricatus.

L. I. 2. Die Reißbrenschnecke.

Linn. S. N. Sp. 608.

Testa umbilicata, subovata, cincta punctis eminentibus transuersim digestis, columella obtusa.

Die genabelte, etwas eiförmige Schale ist in die Quere mit erhabenen reihenweisen Körnern besetzt, und mit einer stumpfen Spindel versehen.

Gualt.



*Gualt. Test. 1. 45. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. II. Imperforati, solidi.

L. II. Undurchbohrte dickschalige.

L. II. 1. Turbo Pullus.

L. II. 1. Die Vock-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 610.*

*Belg. Bokje.*

Testa imperforata ovata, lae- Die undurchbohrte, eysför-  
ni; apertura antice angulata. mige glatte Schale hat eine  
vorne eckige Mündung.

Picta maculis, fasciisque purpu-  
eis & albidis.

Mit weißlichen, und purpuro-  
then Flecken, und Bändern bema-  
let.

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. II. 2. Turbo Petho-  
atus.

L. II. 2. Der Nassauer.

*Linn. S. N. Sp. 612.*

*Belg. Petool-Horn. Angl. Nassaw-Shell. Petiv. Gall. La Nassaviennne.  
Argenv.*

Testa imperforata ovata, lae- Die undurchbohrte eysförmi-  
ni, anfractibus versus futuram ge glatte Schale ist auf den  
obtusae carinatis. Gewinden gegen die Nath mit  
einer stumpfen Querkiele um-  
geben.

*List.*



*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 5. f. 39.

*Rumph. amb. t.* 19. f. D. 5. 6. 7.

*Petiv. amb. t.* 7. f. 15.

*Argenv. Conch. Pl.* 6. f. K.

*Seb. Thes.* III. t. 74. f. 23 — 29.

*Klein. Meth. Ostr.* t. 2. f. 51.

*Gev. Belust.* 21. t. 205 — 208 f.

*Regenf. Samml.* I. 8. t. 18. f. 9. t. 27 f.

*Knor. Vergn.* I. 3. t. 3. f.

—— ——— II. 22. t. 1. 2. f.

—— ——— III. 3. t. 3. f.; 23 t. 4. f. 28 t. 2 - 51

—— *Del. nat.* I. t. B. III. f. 7.

L. II. 3. Turbo Coch- L. II. 3. Der grün  
lus. Silbermund.

*Linn. S. N. Sp.* 613.

*Belg.* Zilvermond. *Angl.* Silver - Mouth Shell. *Gall.* Bouche d'Argent. *Argenv.*

*Testa* imperforata, ouata, Die undurchbohrte enfmis-  
transuersim obsolete sulcata, ge Schale ist mit matten Quer-  
cingulo unico dorsali crassiore. furchen umgeben, deren eine  
auf den Rücken dicker als die  
andern ist.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 5 f. 29.

*Rumph. amb. t.* 19. f. 4.

*Petiv. amb. t.* 9. f. 14.

*Argenv.*





*Argenv. Conch. Pl. 6. f. 7.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 20, 21.*

*Gev. Belust. 20 t. 9. f.*

*Regenf. Samml. I. I. t. 12. f.*

*Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. III. f. 6.*

L. II. 4. Turbo Chry- L. II. 4. Der Gold-  
ostomus. mund.

*Linn. S. N. Sp. 614.*

*Belg. Goud - Mond. Rumph. Angl. The golden mout'd Snail. Hill  
all. Bouche d'or. Dav.*

Testa imperforata subouata Die undurchbohrte etwas en-  
ugosa, anfractibus spinarum förmige runzelichte Schale hat  
ornicatarum serie duplici cin- auf den Gewinden mit einer  
dis. doppelten Reihe hohler Sta-  
cheln besetzt.

*Rumph. amb. t. 19. f. E.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 62 f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. D.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 126.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 9 — 11.*

*Hill.*

350



*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Gev. Belust. 18. t. 171. f.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 2. f.*

— — — *V. 13. t. 3. f.*

L. II. 5. Turbo Te-  
stum persicum.

L. II. 5. Das chinesi-  
sche Dach.

*Linn. S. N. Sp. 615.*

*Angl. The prikly Trochus Hill. Gall. Le toit chinois.*

Testa imperforata, ouata  
spinis obtusis depressis, sub-  
tus papillofa.

Die undurchbohrte eiförmige  
Schale ist unten mit Wärr-  
chen, oben mit stumpfen nie-  
dergedruckten Dörnern besetzt

*Argenv. Conch. Pl. 8. f. P.*

*Hill. Hist. of Anim. Pl. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. II. 6. Turbo Pago-  
dus.

L. II. 6. Die Pagodens-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 616.*

*Belg.*



*Belg.* Langleevende Tol. *Rumph.* *Angl.* Great Nestors Top. *Petiv.*  
*Gall.* La Pagode. *Dav.*

Testa imperforata, conica, Die undurchbohrte Kegelför-  
minis obtulis concatenatis, sub- mige untenher warzige und ge-  
us papillosa, striata. streifte Schale ist mit auf den  
Gewinden mit aneinander schlies-  
senden stumpfen Dörnern be-  
setzt.

*List.* *Hist. Conch.* l. 4. f. 8. f. 36.

*Rumph.* *amb.* t. 21. f. D.

*Petiv.* *amb.* t. 10. f. 8.

*Gualt.* *Test.* t. 22. f. B. C.

*Argenv.* *Conch.* Pl. 8. f. A.

*Gev.* *Belust.* 8. t. 62. f.

*Knor.* *Vergn.* I. 25. t. 3. 4. f.

L. II. 7. Turbo Calcar. L. II. 7. Der Sporn.

*Linn.* S. N. Sp. 617.

*Belg.* De Spoor. *Rumph.* *Angl.* Spur - Shell *Pet.* *Gall.* L' Eperon.  
*Dav.*

Testa subimperforata de- Die eigermassen undurchbohr-  
pressa, anfractibus scabris su- te niedergedrückte Schale ist  
pra spinis fornicato compressis. auf den Gewinden rau, und  
oben mit blattgedrückten hohlen  
Dörnern umgeben.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 45.*

*Rumph amb. t. 20. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 13.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. R.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 128.*

*Gev. Belust. 8. t. 60. f.*

*Knor. Vergn. III. 20. t. 1. f.*

L. II. 8. Turbo rugo-  
sus.

L. II. 8. Der Runzel-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 618.*

*Belg. Gerimpelde Tulband.*

Testa imperforata subouata, Die undurchbohrte einiger  
striata, anfractibus superne maßen ensförmige gestreifte Scha-  
rugosis. le hat am obern Umfange der  
Gewinde mit Knotten besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 12.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 41.*

*Gualt. Test. t. 63. f. C. F. H.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 13. 14.*

*Gev. Belust. 15. t. 136. f.*

*Knor. Vergn. III. 20. t. 1. f.*



L. II. 9. Turbo mar-  
noratus.

L. II. 9. Die Schlan-  
genhaut.

Linn. S. N. Sp. 619.

Belg. Slangen - Velle - Hoorn. Angl. The green Giants Ear. Gall.  
Oreille de geant.

Testa imperforata subouata  
aeui, anfractibus trifariam  
marginato nodosis, columella  
ubroltrata explanata.

Die undurchbohrte etwas  
eyförmige glatte Schale ist am  
Rande der Gewinde mit einer  
dreyfachen Reihe Knotten um-  
geben, und an der Spindel  
einigermassen in einen Rüssel  
verlängert, und flachgedrückt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 46.

Rumph. amb. t. 19. f. A. B.

Gualt. Test. t. 64. f. A.

Seb. Thes. III. t. 74. f. I. 2.

Klein. Metb. Ostr. t. 7. f. 124.

Gev. Belust. 13. t. 128 — 131 f.

Regenf. Samml. I. 5. t. 52. f.

Knor. Vergn. III. 26. t. I f.; 27. t. II. f.

L. II. 10. Turbo far-  
matus.

L. II. 10. Der Del-  
frug.

Z

Linn.



Linn. S. N. Sp. 620. .

Belg. Bont Knobbel - Hoorn. Rumph. Gall. Le burgau. Dav.

Testa imperforata, conuexo Die undurchbohrte erhabens-  
nodosa obtula, anfractibus su- runde stumpfe Schale hat  
pra nodosis, canali intertinctis. oben knottige Gewinde, die  
durch eine Rinne von einander  
abgesondert stehen.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. B.

Gev. Belust. 7. t. 52 f.

Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.

L. II. 11. Turbo galea-  
tus.

L. II. 11. Die Sturm-  
haubenartige Mondschnecke.

Testa turbinata transuersim Die birnförmige Schale ist  
sulcata, anfractibus oblique in die Quere gefurchet, auf  
angulatis, labio unidentato. den Gewinden mit schiefer  
Ecken, und an der Spindel-  
leste mit einem Zähnchen be-  
setzet.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 51.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa turbinata solida. Anfra- Die Schale ist dicht und blen-  
ctus quatuor, transuersim fulcati, sbrinzig. Die vier Gewinde sind der  
prope marginem externum angulis Quere nach gefurchet, am äußern  
obliquis, obtusis. Apertura luna- Rande mit schiefen, stumpfen Ecken  
ta. Labrum integrum acutum. versehen. Die Mündung mond-  
Columella subumbilicaria. Labium förmig. Die Schalenleste ganzran-  
reflexum plica, seu denticulo acu- dig, und scharf. Die Spindel et-  
to notatum. Color albus, punctis nigermaßen durchbohret. Die Spin-  
dispersis rufis. delreste übergeschlagen, und mit et-  
ner spitzigen zahnförmigen Kante  
besetzt. Von weißer Farbe mit  
zerstreuten rothbraunen Punkten.

L. II, 12.



L. II. 12. Turbo tro-  
chiformis.

L. II. 12. Die träu-  
selartige Mondschnecke.

Gall. La fripiere. Dav.

Testa imperforata conuexo  
conica, anfractibus plicato-  
rugosis, basi plano concaua,  
apertura falcata.

Die undurchbohrte, runder-  
habene kegelförmige Schale ist  
auf den Windungen mit Run-  
zeln und Falten besetzt, am  
Grunde flach und hohl, mit ei-  
ner sichelförmigen Mündung.

Knor. Vergn. III. 29. t. 1. 2. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conuexo conica, tenera,  
subpellucida. Anfractus decliues  
imbricati, plicato rugosi. Basis  
plano concaua. Labrum integerrimum,  
falcatum. Columnella sub-  
horizontalis, reflexa, imperforata.  
Color albus, radiis obliquis curua-  
tis luteis.

Die Schale ist runderhaben ke-  
gelförmig, dünn, und halb durch-  
sichtig. Die kegelförmig abhängi-  
gen Gewinde sind mit Runzeln und  
Falten besetzt. Der Grund ist flach  
und hohl. Die Schalenleiste ganz  
randig und sichelförmig. Die Spin-  
del beinahe wagrecht, ohne Nabel.  
Von weißer Farbe, mit krummen  
gelben Querstrahlen.

Vestigiata, testis alienis infidenti-  
bus.

Sie hat Eindrücke von fremden auf-  
stehenden Schalen.

L. II. 13. Turbo heli-  
cinus.

L. II. 13. Die Schnit-  
felmondschnecke.





Testa rotundata glabra, an-  
fractibus conuexis, columella  
incrassata, subimperfata.

Die rundliche glatte Schale  
hat gewölbte Windungen, eine  
verdickte Spindel, mit einem  
unvollkommenen Nabel.

*Knor. Vergn. V. 3. t. I. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, solida. Anfractus  
sex conuexi, laeues, contigui. Aper-  
tura ouata. Columella incrassata,  
replicata; Umbilicus obsoletus, tectus.  
Color epidermidis ex purpureo vi-  
ridescens, faucis argenteo marga-  
ritaceus.

Die Schale ist rundlich und  
dicht. Die sechs Gewinde sind er-  
haben, glatt, und berühren ein-  
ander. Die Spindel ist verdickt,  
übergeschlagen, mit einem gedeckten  
unvollkommenen Nabelloche. Die  
Oberhaut ist purpurfarbig und  
grünlich, der Schlund mit einer  
silbernen Perlenmutterglanz.

L. III. Solidi, perforati.

L. III. Dichte, durchbohrte.

L. III. I. Turbo cine-  
reus.

L. III. I. Die aschen-  
graue Mondschnecke.

Testa rotundata, laeui, an-  
fractibus conuexis, columellae  
basi elongata, fauce sulcata,  
umbilico lato.

Die rundliche glatte Schale  
hat erhabene Gewinde, einen  
gesulchten Schlund mit einem  
breiten Nabelloche.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa rotundata, laevis. Anfractus sex convexi, prope suturam complanati, & obsolete transversim striati. Apertura semicircularis. Columellae basis elongata, diducta. Umbilicus profundus. Color cinereus, maculis & lineis albis nigresque,

Die Schale ist rundlich und glatt. Die sechs Gewinde sind bäumig, nächst der Nath plattgedrückt, mit unvollkommenen Querstreifen. Die Mündung ist halbrund. Der Grund der Spindel ist verlängert, und ausgebreitet. Der Nabel tief. Von aschengrauer Farbe mit weissen und schwarzen Flecken und Strichen.

L. III. 2. Turbo nodulosus.

L. III. 3. Die knottige Mondschnecke.

Testa conico rotundata, anfractibus noduloso striatis, denticulo umbilicali.

Die runderhabene kegelförmige Schale ist an den Gewinden mit Knotten und Streifen besetzt, und an dem Nabelloche mit einem Zähnen versehen.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa simillima sequenti, sed transversim striata, nodisque obliquis obsita. Color niger, maculis dispersis niueis.

Die Schale ist der folgenden am ähnlichsten, nur ist sie mit schiefen Knotten und Streifen besetzt. Von schwarzer Farbe mit zerstreuten schneeweißen Flecken.

L. III. 3. Turbo Pica.

L. III. 3. Die Elster.



*Linn. S. N. Sp. 622.*

*Belg. Soldat. Angl. Magpye Top - Shell. Pet. Gall. La Pic. Dav.*

Testa umbilicata, conico ro- Die genabelte runderhabene  
tundata, lacui, denticulo um- kegelförmige glatte Schale ist  
bilicali. am Nabelloche mit einem Zähne-  
chen versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 29. 30.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 70. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 21. f. A.*

*Gualt. Test. t. 68. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 8. f. G.*

*Adans. Seneg. Pl. 12. f. 7.*

*Gev. Belust. t. 10 f. 74 — 77.*

—— — II. t. 78 — 80. f.

*Regenf. Samml. I. 6. t. 66. f.; II t. 57 f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. I. f.*

—— — II. 21. t. 3. f.

L. III. 4. Turbo Argy-  
rostomus.

L. III. 4. Der geribbte  
Silbermund.

*Linn. S. N. Sp. 624.*

*Belg. Geplekte Zilver - Mond. Angl. The spotted Silvermouth. Gall*  
*La bouche d'argent bariolée, Argenv.*

Testa



Testa umbilicata, suboua-  
ta, transuersim cingulata, lon-  
gitudinaliter striata.

Die genabelte eysförmige  
Schale ist in die Quere gegür-  
tet, und der Länge nach ge-  
streifet.

Alba, fasciis longitudinalibus fus-  
eis.

Weiß, mit nach der Länge herab-  
laufenden Bandern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 19. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 64. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 74. 4. 6.*

*Gev. Belust. 16. t. 153. 154. f.*

*Régenf. Samml. I. 10. t. 43. f.*

*Knor. Vergn. III. 15. t. 5. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 12.*

L. III. 5. Turbo mar-  
garitaceus.

L. III. 5. Der bunte  
Silbermund.

*Linn. S. N. Sp. 625.*

*Belg. Bonte Zilver - Mond.*



Testa umbilicata subouata Die genabelte, einigermassen  
cingulis eleuatis, intercostali- enförmige Schale hat erhabene  
bus laeuibus. zwischen den Furchen liegende  
Gürteln.

Alba maculis viridescentibus fus- Weiß, mit grünlichen und braun-  
cisque. nen Flecken.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 11.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 3.*

*Gev. Belust. 17. t. 155 — 158. f.*

L. III. 6. Turbo Del-  
phinus.

L. III. 6. Der gezackte  
Dolphin.

*Linn. S. N. Sp. 626.*

*Belg.* Getackte Dolphyn. *Angl.* The echinated Snail, *Petiv. Gall.*  
*le Dauphin. Dav.*

Testa umbilicato hispida, Die Schale hat einen gez-  
anfractuum spinis ramosis. ackten Nabel, und mit ästis-  
gen Stacheln besetzte Gewinde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 31.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 45.*

*Rumph. amb. t. 20. f. H.*



*Petiv. amb. t. 3. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 68. f. C.*

*Gev. Belust. 4. t. 26 — 28. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 15 — 27.*

*Knor. Vergn. I. 22. t. 4. 5. f.*

L. III. 7. Turbo distortus.

L. III. 7. Der geribbte Delfphin.

*Linn. S. N. Sp. 627.*

Testa umbilicata, submuconata, spinis indivisis.

Die genabelte und gezackte Schale ist an den Gewinden mit ungetheilten Stacheln besetzt.

*Gualt. Test. t. 68. f. D.*

*Gev. Belust. 4 t. 24 f.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 1 — 6.*

*Knor. Vergn. IV. 7. t. 2. 3. f. ; 8. t. 1. f.*

L. III. 8. Turbo carinatus.

L. III. 8. Die gefielte Mondschnecke.



Testa rotundata, anfractibus carinatis, umbilico spirali profundo.

Die runderliche Schale ist an den Gewinden mit Kielen umgeben, und mit einem tiefen schnirkelförmigen Nabel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, pyramidata, tenera, subpellucida. Anfractus quinque teretes, cincti carinis lamellois tribus sex, supremis tenuioribus. Apertura orbicularis. Umbilicus verticalis, spiralis, latus. Color albus.

Die Schale ist rund, pyramidenförmig, dünn und halbdurchsichtig. Die fünf Gewinde sind erhaben rund, mit drei bis sechs blätterichten Kielen, davon die obersten dünner sind, umgeben. Die Mündung ist rund. Der breite schnirkelförmige Nabel steht senkrecht. Von weißer Farbe.

L. IV. Cancellati.

L. IV. Gekitterte.

L. IV. 1. Turbo scalaris.

L. IV. 1. Die achte Wendeltreppe.

*Linn. S. N. Sp. 630.*

*Belg. Wenteltrap. Angl. Royal Stair - Case. Pet. Gall. La vraie Scallata. Dav.*

Testa umbilicata, ventricoso conica, anfractibus distantibus, fasciis longitudinalibus membranaceis intertextis.

Die genabelte bäuchige kegelförmige Schale hat entfernte Gewinde, die mit nach der Länge herablaufenden häutigen Klammern verwachsen sind.

*Rumph.*





*Rumph. amb. t. 49. f. A.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 10. f. ZZ.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. V.*

*Knor. Vergn. IV. 20. t. 2. 3. f.*

—— ——— *V. 23. t. 1. f.; 24. t. 6. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1428. 1431. f.*

—— ——— ——— *153. t. 1432. 1433. f.*

L. IV. 2. Turbo Cla-  
thrus.

L. IV. 2. Die gemei-  
ne Wendeltreppe.

*Linn. S. N. Sp. 631.*

*Belg Wentel-Trapje. Angl. Smaal Stair-Case. Petiv. Gall. La  
fausse escalata. Dav.*

Testa exumbilicata turrita, Die thurmformige Schale  
anfractibus contiguis, fasciis hat von einander entfernte Ge-  
longitudinalibus membrana- winde, und häutige nach der  
ceis. Länge laufende Klammern,  
ohne Nabelloch.

α niuea, unicolor.

α schneeweiß, einfarbig.

β niuea, maculis dispersis pur-  
pureis.

β schneeweiß, mit zerstreuten  
purpurrothen Flecken.

γ grisea, clathris niueis.

γ lichtgrau, mit schneeweißen  
Klammern.

Bonan.



- Bonan. Recr. cl. 3. f. III.*  
*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 51.*  
*Gualt. Test. t. 58. f. H.*  
*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 66.*  
*Ginan. adr. II. t. 6. f. 54.*  
*Knor. Vergn. I. II. t. 5. f.*  
*—, — IV. 20. t. 4 — 6. f.*  
*Mart. Kouch. Kab. IV. 157. t. 1484 f.*

L. IV. 3. Turbo Uua. L. IV. 3. Das Bienenkörbchen.

*Linn. S. N. Sp. 636.*

*Belg. Gebakerde Kindje. Gall. Enfant au maillot. Dav.*

Testa umbilicata, ouata, anfractibus contiguis, plicis longitudinalibus, columella uniplicata. Die genabelte eysförmige Schale hat aneinander genäherete Windungen, mit nach der Länge laufenden Falten, und einer Falte an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 140.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5 f. 47.*

*Petiv.*



*Petiv. Gaz. t. 27. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 58. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 12.*

*Knor. Vergn. VI. 25. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Konch IV. 153. t. 1439. f.*

L. IV. 4. Turbo Lin-  
cina.

L. IV. 4. Der Breit-  
rand.

*Linn. S. N. Sp. 639.*

Testa umbilicata oblonga,  
anfractibus decussatim striatis,  
aperturae limbo dilatato.

Die genabelte längliche  
Schale hat gleichbreite kreuz-  
weise gestreifte Windungen,  
mit einem erweiterten Mün-  
dungsrande.

*Petiv. Gaz. t. 118. f. 11.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 71.*

*Berlin. Mag. IV. 3. t. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. Turriti.

L. V. Gethürmte.

L. V. 1. Turbo imbri-  
catus.

L. V. 1. Die bunte  
Schraube.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 640.*

*Testa turrita, anfractibus  
deorsum imbricatis.*

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale sind niederwärts  
ziegelförmig gefalten.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 61.*

*Gualt. Test. t. 58. f. E.*

*Seb. Tbes. III. t. 56. f. 34.*

*Knor. Vergn. VI. 25. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1422. f.*

L. V. 2. Turbo acut-  
angulus.

*Linn. S. N. Sp. 642.*

L. V. 2. Die Scharf-  
ribbe.

*Testa turrita, anfractuum ca-  
rina unica majore, acuta.*

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale haben einen grö-  
ßeren und scharfschneidiger  
Querkiel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 117.*

*Gualt. Test. t. 58. f. B.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 67. t. 742. 743. f.*

L. V. 3. Turbo dupli-  
catus.

L. V. 3. Die Doppel-  
ribbe.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 643.*

Testa turrita , anfractu-  
carinis duabus acutis.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale haben zweien scharfe  
Querfiele.

*List. angl. t. 3. f. 7.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 114.*

*Gualt. Test. t. 58. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 7. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. 4. Turbo exole-  
tus.

L. V. 4. Die alte  
Schraube.

*Linn. S. N. Sp. 644.*

Testa turrita , anfractibus  
longitudinaliter rugosis, cari-  
nis duabus obtusis margina-  
libus.

Die Gewinde der gethürm-  
ten nach der Länge gerunzelten  
Schale haben zweien stumpfe  
am Rande stehende Querfiele.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 53.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 113.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. C.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. 5.



L. V. 5. Turbo torcularis.

L. V. 5. Die gestreifte Trommelschraube.

Testa turrita, anfractibus transuersim striatis, carinis duabus obtusis submarginalibus.

Die Gewinde der gethürmten Schale sind in die Quere gestreifet, und mit zween stumpfen vom Rande etwas entfernten Querkiehlen umgeben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus circiter duodecim transuersim striati, carinis cincti duabus distantibus, obtusis, margini cuius propinguis. Apertura allinium. Color albus, maculis longitudinalibus undulatis fuscis.

Die Schale ist gethürmt. Die Gewinde deren ungefähr zwölf, sind der Quere nach gestreifet, und mit zween stumpfen Querkiehlen umgeben, die nicht weit von jedem Rande entfernt stehen. Die Mündung ist wie an den anverwandten Arten. Die Farbe weiß mit wellenförmigen nach der Länge laufenden Flecken.

L. V. 6. Turbo Terebra.

L. V. 6. Die Trommelschraube.

Linn. S. N. Sp. 645.

Belg. Trommel-Schroef.

Testa turrita, anfractuum carinis sex, acutis.

Die Gewinde der gethürmten Schale haben sechs scharfe Querkiele.

Bo.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 115.*

*Rumph. amb. t. 30. f. M.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 58. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 10. f. 6.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 40.*

*Knor. Vergn. I. 8. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1425. f.*

L. V. 7. Turbo bidens. L. V. 7. Die gefleckte  
Zahnschraube.

*Linn. S. N. Sp. 649.*

Testa turrita, pellucida, Die gehürnte durchsichtige  
anfractibus contrariis, prope Schale hat linksgewundene  
futuram maculatis, apertura an der Nath gefleckte Windun-  
postice bidentata. gen, und hinten an der Mün-  
dung zween Zähnen.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 39.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 41.*

*Gualt. Test. t. 4. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 20.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 2.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. 4. f.*



370



L. V. 8. Turbo quin-  
quedentatus.

L. V. 8. Die fünfzäh-  
nige Schraube.

Testa turrita subpellucida,  
labio tridentato, labro bipli-  
cato.

Die gethürmte halbdurchsich-  
tige Schale hat an der Spin-  
dellefze drey, an der Schalen-  
lefze zwey Falten.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Simillima praecedenti. Testa cy-  
lindraceo turrita. Anfractus duo-  
decim. Columella subumbilicata.  
Labium plicis membranaceis tri-  
bus; labrum binis. Color albidus.

Die Schale ist der vorhergehenden am ähnlichsten, von gethürmter walzenförmiger Gestalt. Der Gewinde sind zwölf an der Zahl. Die Spindel ist einigermaßen genabelt. Die Spindellefze ist mit drey, die Schalenlefze mit zwey dünnen Falten besetzt. Von weißlicher Farbe.

L. V. 9. Turbo detri-  
tus.

L. V. 9. Die eyförmige Schraube.

*Müll. Hist. Verm. II. Sp. 300.*

Testa ovata, laevis, colu-  
mella subimperfectorata, aper-  
tura ovata.

Die Schale ist eyförmig,  
und glatt; die Spindel eini-  
germaßen durchbohret, die  
Mündung eyförmig.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. I. f. 1. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 5 f. N.*

*Berlin. Magaz. III. 5. t. 53. f.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. I. f.*

## M. Cornu.

## M. Die Hornschnecke.

Testa elongato conica Die verlängerte kegelförmige gedrehte Schale  
volutata. Anfractus cy-  
lindrici distantes. Aper- hat walzenförmige freyste-  
tura elabiata, imperfora- hende Gewinde, und eine  
ta, Mündung ohne Leisten und  
Nabelloch.

## M. I. Cornu Copiae.

## M. I. Das Füllhorn.

Testa conico turrita, anfra- Die kegelförmig gethürmte  
tibus duobus, apertura or- Schale hat zwey Gewinde,  
biculata. und eine ganz runde Mündung.

*Index Mus. Caes. Vindobon. I.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa conico turrata dextrorsum  
volutata. Anfractus duo continua-  
ti, teretes, distantes, infimo remo-  
tissimo. Apex obtusus. Apertura  
orbicularis latere interno patumper  
revoluta, sine columella, labio, &  
umbilico. Color lutescens, fasciis  
tribus longitudinalibus dorsa, fuscis.  
Hinc ab affine specie *Sebae* (\*)  
*Argenville* (\*\*) & vix non  
*Othon. Mülleri* (\*\*\*) distincta.

Die Schale ist kegelförmig und  
gethürmet, nach der Rechten gedre-  
het. Die zwey Gewinde sind un-  
terbrochen, walzenförmig, und  
stehen von einander sehr entfernt,  
davon das letzte am weitesten ab-  
stehet. Die Spitze ist stumpf. Die  
Mündung scheibenrund, an der  
inneren Seite etwas wenig aus-  
wärts übergeklagen, ohne Spitz-  
del, Lesze, und Nabelloch. Von  
gelblicher Farbe, mit drey nach  
der Länge des Rückens laufenden  
schwarzbraunen Bändern. Da-  
durch unterscheidet sie sich als eine  
besondere Art von jener, welcher  
*Seba* (\*) und *Argenville* (\*\*) und  
vielleicht auch von der, wel-  
cher *Otho Müller* (\*\*\*) gedenket.

## N. Helix.

Testa spiralis, anfra-  
ctibus contiguis, columel-  
la elabiata, apertura co-  
arctata.

## N. Die Schnirkel- schnecke.

Die schnirkelförmige  
Schale hat verwachsene  
Gewinde, an der Spitz-  
del keine Lesze, und an  
der Mündung keinen Eins-  
chnitt.

(\*) *Tbes. III. t. 40 f. 27.*

(\*\*) *Conch. II. Pl. 9. f. 2.*

(\*\*\*) *Hist. Verm. II. Sp. 313.*



N. I. Testa ancipiti.

N. I. Mit zweyschneidiger Schale.

N. I. 1. *Helix Scarabaeus*.

N. 1. 1. Die Käferschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 655.*

*Belg. Toover Slak. Angl. River ragged Mouth. Pet. Gall. Gucule de Loup. Dav.*

Testa ouata, ancipiti; apertura dentata.

Die eysförmige zweyschneidige Schale hat eine gezähnte Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 31. 32.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 44. 385.*

*Petiv. Gaz. t. 4. f. 10.*

— amb. t. 12. f. 3.

*Rumph amb. t. 27. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 4. f. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. T.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 23.*

*Berlin. Mag. III. 6. t. 67. f.*

*Knor. Vergn. VI. 19. t. 2. 3. f.*

N. II. Anfractibus carinatis.

N. II. Mit kielförmigen Gewindenden.

N. II. 1. *Helix Lapicida*.

N. II. 1. Der Steinspinner.



*Linn. S. N. Sp. 656.*

*Belg. Steenbikker. Angl. Land Cheese Shell. Pet. Gall. Le Planorbe terrestre. Geof.*

*Testa carinata, orbiculari,* Die gefielte scheibenrunde  
*umbilicata, utrinque conuexa,* genabelte Schale ist beiderseits  
*apertura marginata, transuer-* runderhaben, mit einer einge-  
*sali, ouata,* säumten, querliegenden, en-  
förmigen Mündung.

*List. angl. t. 2 f. 14.*

—— — *Hist. Conch. l. 1. f. 8. f. 68.*

*Petiv. Gaz. t. 92. f. 11.*

*Berlin. Magaz. II. 3 t. 15. f.*

*Slotterb. Aët. belv. V. 3 t. 36 f.*

*Schroet. Erdk. 2 t. 23 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 2. *Helix algira.* N. II. 2. Der Wachs-  
schirfel.

*Linn. S. N. Sp. 660.*

*Testa subcarinata, compla-* Die einigermaßen gefielte  
*nata, anfractibus teretibus,* flache Schale hat runde Ge-  
*supra reticulatim striatis, um-* winde, die oben kreuzförmig  
*bilico peruo.* gestreift sind, mit einem tiefen  
Nabel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 3.



N. II. 3. *Helix Planobis.*

N. II. 3. Die Schel  
henschnede.

*Linn. S. N. Sp. 662.*

Testa carinata, umbilicata,  
plana, supra concaua apertu-  
ra utrinque acuta.

Die gefielte, genabelte flas-  
che Schale, ist eben ausge-  
hölet, und mit einer beider-  
seits scharfen Mündung verse-  
hen.

*List. angl. t. 2 f. 27.*

— *Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 24.*

*Petiv. Gaz. t. 10. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 4. f. EE.*

*Klein. Meib. Ostr. t. 1. f. 8.*

*Gev. Belust. 4. t. 21. 23. f.*

*Berlin. Magaz. IV. 8. t. 18. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 4. *Helix margi-  
nata.*

N. II. 4. Der einge-  
säumte Kegelschnirkel.

*Müll. Hist. Verm. II. Sp. 241.*

Testa umbilicata, carinata,  
depresso conica, oblique stria-  
ta, apertura transuersa, tri-  
angulari.

Die genabelte und gefielte,  
flachkegelförmige Schale ist  
schief gestreift, und mit einer  
querliegenden dreyeckigen Münd-  
ung versehen.

A a 4

At-

376



Alba, fasciis transuersis rufis.

Weiß, mit rothbraunen Querbändern,

*Mus, Caes. Vindobon,*

N. II. 5. *Helix plicata.*

N. II. 5. Der Faltenmund.

Testa umbilicata, carinata, depressoconica, subtus convexa gibba, apertura quadrangulari, fauce plicata.

Die genabelte, gekielte, flachkegelförmige Schale ist unten erhaben rund, und höckerig, und inner der viereckigen Mündung mit Falten besetzt.

*Knor. Vergn. VI. 26. t. 5. f.*

Testa depresso conica. Anfractus supra sex, subtus vnicus, gibbus, margine acute carinato. Umbilicus centralis, spiralis, peruius. Apertura quadrangularis, margine reflexo. Faux prope columellam plica transuersa solitaria elongata, prope labrum plicis duabus marginalibus acutis. Color rufus.

Die Schale ist flachkegelförmig. Oben stehen sechs Gewinde, unten ein höckeriges, welches mit einer scharfen Kiele umgeben ist. Der schnirkelförmige, tiefe Nabel durchdringt die Mitte. Die Mündung viereckig, und eingesäumt. Inner derselben steht an der Spindel ein einzelner verlängerte Querspalte, an Rande der Schalenleszen aber zwei. Von brauner Farbe.

N. II. 6. *Helix obuersa.*

N. II. 6. Der Flachwirbel.

Testa





Testa imperforata turbinata,  
anfractibus supra planis, mar-  
ginato carinatis, columella  
imperforata.

Die Gewinde der zusammen-  
gedrückten birnförmigen Scha-  
le, sind oben flach, und an  
der Kiele geändert, die Spin-  
del undurchbohret.

Gualt. Test. t. 68. f. E.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa turbinata subtus convexa,  
supra plana, plicis transversis, &  
obliquis undique decussata. An-  
fractus quinque, supra plani, lim-  
bo carina marginata cincti. Aper-  
tura transversa, subtus arcuata Co-  
lumbellae labrum tenuissimum, re-  
plicatum, imperforatum. Color  
a bus.

Die Schale ist einigermaßen birn-  
förmig, unten erhabenrund, oben  
flach, mit schief und querlaufen-  
den Rinzeln besetzt. Die fünf Ge-  
winde sind oben flach, mit einer  
eingesäumten Kiele umgeben. Die  
Mündung steht in die Quere, und  
ist unten gekrümmt. Die Spin-  
delleiste ist übergeschlagen, sehr dünn  
und undurchbohret. Von weißer  
Farbe.

N. II. 7. Helix torna-  
ta.

N. II. 7. Der gedrehte  
Regel.

Testa subimperforata, tro-  
chiformi, anfractibus imbri-  
catis, apertura triangulari.

Die kaum durchbohrte kräu-  
selförmige Schale hat ziegelför-  
mig übereinander liegende Ge-  
winde, und eine dreyeckige  
Mündung.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 61.

Mus. Caes. Vindobon.



Testa trochiformis. Anfractus sex imbricatis declives, oblique subtriangulati, infimo margine acuto transuersim carinato, subtus conuexo. Apertura transuersa, triangularis. Labrum extorsum marginatum. Columella reflexa, obtegens foramen obsoletum, tenue. Color extus fuscus, faucis niueus.

Die Schale ist trichterförmig. 2 sechs ziegelförmig übereinanderliegende Gewinde sind schief geschrägt, das untere ist der Quere nach scharf gekielt, unten häufig erweitert. Die dreieckige Mündung liegt in die Quere. Die Schalenfläche ist auswärts gesäumt. Die übergeschlagene Spindeldecke bedeckt ein unvollkommenes dünnes Nabelloch. Die Farbe ist außen braun, der Schlund schneeweiß.

N. II. 8. Helix ringens.

N. II. 8. Das verkehrte Mundstück.

Linn. Sp. N. Sp. 664.

Testa subcarinata, imperforata, apertura resupinata, utrinque dentata.

Die einigermaßen gekielte undurchbohrte Schale hat ein aufwärts gekehrte beiderseits gezähnte Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 330. 331.

List. Hist. Conch. l. I. f. 11. f. 100.

Argenv. Conch. Pl. 28. f. 13. 14.

Berlin. Mag. II. 4. t. 42. f.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 9. Helix sinuata.

N. II. 9. Die ausgeschnittene Schnirkelschnecke.

Müll.



Müll. Hist. Verm. Sp. 217.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testa subcarinata, imperforata, apertura transuersa, labro extus triplicato, intus quadridentato. | Die einigermaßen gekielte undurchbohrte Schale hat eine querliegende Mündung, die an der Schalenleiste mit dreyn, an der Spindelleiste mit vier Zähnen besetzt ist, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

List. Hist. Conch. l. I. f. 99.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 10. Helix Caecocolla.

N. II. 10. Die Bastardlampe.

Linn. S. N. Sp. 665.

Gall, La Lampe antique. Argenv.

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Testa carinata, imperforata, utrinque conuexa. | Die gekielte undurchbohrte Schale ist beiderseits erhaben, rund. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

List. Hist. Conch. l. I. f. 10. f. 87.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. D.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 11.

380



N. II. 11. *Helix Cornu militare.*

N. II. 11. Der Kalkfalschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 666.*

Belg. Karkal.

Testa subcarinata, imperforata, conuexa, apertura patula, emarginata.

Die einigermaßen gekielte undurchbohrte runderhabene Schale hat eine erweiterte eingesäumte Mündung.

*Nitca, sutaris emarginata,*

Schneeweiß mit geränderten Gewinden.

*Gualt. Test. t. 3. f. 7.*

*Knor. Vergn. VI. 32. t. 2. f.*

N. II. 12. *Helix maculata.*

N. II. 12. Der gefleckte Schnirkel.

= *maculosa*  
*see errata last page*

Testa perforata, subcarinata, depressa, oblique striata, subtus conuexa.

Die etwas gekielte und flache Schale ist schief gestreift, und unten runderhaben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa rotundata depressa, subtus  
nnuxa. Anfractus sex, teretes,  
oblique striati, extus obsolete ca-  
nati. Apertura lunata. Labrum  
arginatum. Columella perforata.  
color albidus, maculis latis diffor-  
mibus fulvis.

Die rundliche etwas flache Schale  
ist unten erhabenrund. Die sechs  
runde schief gestreifte Gewinde sind  
einigermassen gekielt. Die Mün-  
dung mondförmig. Die Schalen-  
leiste gesäumt. Die Spindel durch-  
bohret. Von weißer Farbe mit  
breiten unformigen rothgelben Fle-  
cken.

N. II. 13. *Helix pun-*  
*tata.*

N. II. 13. Der punk-  
tirte Zahnwübel.

Testa subcarinata, rotunda-  
a, subperforata, labio increas-  
ato sinuato, labro tridentato.

Die stumpffleilige, rundliche,  
fast undurchbohrte Schale hat  
eine verdickte ausgeschnittene  
Spindelleiste, wie drey Zäh-  
nen an der Schalenleiste.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, subcompressa.  
Anfractus quinque conuexi, infimus  
carina obsolete cinctus. Apertura  
transuersa, oblonga. Labri margo in-  
crassatus, antice sinuatus. Labrum  
marginatum denticulis obtusis, mar-  
ginalibus, tribus. Columella forami-  
ne tenui subobtecto. Color fuscus,  
cingulo dorsali tenui, punctisque  
circa futuram radiantibus luteis.  
Apertura rubescens,

Die rundliche, etwas zusammen-  
gedrückte Schale hat fünf rund er-  
habene Gewinde, deren äußeres  
mit einem unvollkommenen Riele  
umgeben ist. Die längliche Mün-  
dung steht in die Quere. Die Spin-  
delleiste hat einen verdickten, vorne  
ausgeschnittenen Rand. Die Schalen-  
leiste ist gesäumt und am Ran-  
de mit drey stumpfen Zähnen be-  
setzt. Die Spindel hat ein dün-  
nes beynahe gedecktes Nabelloch.  
Die Farbe braun, mit einer schma-  
len Quersinde um den Rücken,  
und nach der Naht strahlförmig  
stehenden Punkten von hellgelber  
Farbe. Die Mündung ist röth-  
lich.

N. III.



N. III. Umbilicatae, anfractibus  
rotundis.

N. III. Genabelte, mit rund  
Gewinden.

N. III. 1. Helix cor-  
nea.

N. III. 1. Das Wall-  
horn.

Linn. S. N. Sp. 671.

Belg. Europäische Post-hoorn. Angl. Great River Cheese - Shell.  
Petiv. Gall. Le grande Planorbe. Geof.

Testa umbilicata plana, an-  
fractibus quatuor teretibus.

Die genabelte flache Sch-  
le hat vier runde Gewinde.

List. angl. t. 2. f. 26.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 316.

List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 40.

Petiv. Gaz. t. 92. f. 5.

Gualt. Test. t. 4. f. DD.

Geu. Belust. 3. t. 18. 19. f.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 17.

Argenv. Conch. Pl. t. 27. f. 8.

Ginan. adr. II. t. 2. f. 12.

Berlin. Mag. IV. 8. t. 17. f.

Knor. Vergn. V. 22. t. 6. f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 10.

N. III. 2. Helix poly-  
gyrata.

N. III. 2. Die Schnir-  
felscheibe.

Testa



Testa orbiculata, supra plana, Die schelbenförmige und  
 a, subtus concava, anfracti- unten hohle Schale bestehet  
 bs teretibus decem, aus zehn runden Gewinden.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbiculata. Supra plana, Die Schale ist schelbenförmig,  
 situs concava. Anfractus decem oben flach, unten hohl. Die zehn  
 teretibus tenuissime oblique striati. runden Gewinde sind sehr fein  
 Apertura rotundato oblonga. La- schief gestreift. Die Mündung ist  
 bium emarginatum. Color lutesc- länglicht rund. Die Scha'entelze  
 ens, fascia transversa fulva. gesäumt. Von gelblicher Schale,  
 mit einer rothgelben Querbände.

N. III. 3. *Helix Cornu* N. III. 3. Das Widder-  
 aetis. horn.

*Linn. S. N. Sp. 674.*

Belg. Rams-Hoorn. Angl. Great girdled Braile cheese Shell. Petiv

Testa umbilicata, planius- Die genabelte, etwas flache  
 ulo, anfractibus teretibus Schale hat sechs runde Ge-  
 nis, apertura ovali. winde, und eine eyförmige  
 Mündung.

Niuca, fascis transversis rufis. Schneeweiß, mit braunrothen  
 Querbänden.

*List.*





*Petiv. Gaz. t. 92. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 14 — 15.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 7.*

*Gev. Belust. 3 t. 12. 13. f.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 4. 5. f.*

N. III. 4. *Helix ampul-  
lacea.*

N. III. 4. Die Schlammschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 676.*

*Belg. Slyk-Slek. Angl. Smooth girdled Snail - Shell. Petiv.*

*Testa perforata, subglobosa, anfractibus teretibus, prope suturam complanatis; apertura oblonga.* Die durchbohrte kugelförmige Schale hat runde an der Naht plattgedrückte Windungen, mit einer länglichten Mündung.

*Rumph. amb. t. 27. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 1. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 1 — 7. 58. 59.*

*Gev. Belust. 27. t. 289. 291. f.*

*Berlin. Mag. III. 6. t. 68. f.*

*Knor. Vergn. V. 5. t. 2. f.*



N. III. 5. *Helix Poma-*  
a.

N. III. 5. Die gemeine  
Weinbergsschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 677.*

*Belg. Wyngards - Slak. Angl. Wine - Gard Snail. Gall. Le Vigne-*  
*on. Geof.*

Testa perforata subglobosa, Die durchbohrte einiger  
asciis transuersis obsoletis, maßen kugelförmige Schael  
apertura rotundato lunata, hat undeutliche Querbinden,  
mit einer rundlichen mondför-  
migen Mündung.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 316.*

*List. angl. t. 2. f. 1.*

— *Hist. Conch. l. 1. f. 46.*

*Gualt. Test. t. 1. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 1.*

— *Zoom. Pl. 9. f. 4.*

*Gev. Belust. 29. t. 330 — 342. f.*

*Berlin. Mag. II. 1. t. 1. f.*

*Schroet. Erdk. I. t. 10. f.*

N. III. 6. *Helix Po-*  
maria.

N. III. 6. Die linksge-  
wundene Weinbergsschnecke.



Müll. Hist. Verm. Sp. 244.

Testa perforata, subglobosa, sinistrosa, rufescente, fasciis transuersis obsoletis.

Die durchbohrte, einigermaßen kugelförmige, linksge-  
wundene Schale ist von braun-  
lichter Farbe, mit matten Quer-  
bändern.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 7. Helix creta-  
cea.

N. III. 7. Die Krei-  
denschnecke.

Müll. Hist. Verm. (nemoralis) Sp. 157.

Testa perforata subglobosa,  
laevi, albida, fasciis transuer-  
sis fuscis.

Die durchbohrte einigermaßen kugelförmige glatte Schale  
ist von weißlicher Farbe mit  
braunen Querbändern.

Mus. Caes. Vindobon.

N. III. 8. Helix glau-  
ca.

N. III. 8. Das Kuh-  
auge.

Linn. S. N. Sp. 678.

Testa umbilicata, subrotun-  
da, acuminata; labro margi-  
nato, apertura ouali.

Die genabelte, rundlichte spiz-  
wirblice Schale hat an der ey-  
förmigen Mündung eine gez-  
säumte Schalenleiste.

Seb.



*Seb. Thes. III. t. 38. f. 8.*

*Gev. Belust. 3. t. 20. f.*

*Knor. Vogn. V. 5. t. 5. f.*

N. III. 9. *Helix citri-*

*Linn. S. N. St. 679.*

*Belg. Navel - Slak.*

N. III. 9. Die Nabel-  
schnecke.

Testa perforata rotundata,  
ompressa, laevi, fascia transver-  
diuerficolor.

Die durchbohrte rundlichte  
flachgedrückte glatte Schale ist  
mit einem gefärbten Bande um-  
geben.

subpellucida, pallide sulphurea,  
fasciis duabus opacis niueis, su-  
prema tenuiore.

\* halbdurchsichtig, blaßschwefelgelb  
mit zwey schneeweißen Bändern,  
davon das obere schmale riß.

*Gev. Belust. . 26. t 285. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

lactea, fascia dorsali rufa, niueae  
opacae superne contigua.

β schneeweiß mit einem rothbrau-  
nen Querbande, unter welchem  
nabe eine schneeweiße undurchsich-  
tige Binde lieget.

*Mus. Caes. Vindobon.*



♂ butyracea, spira apice & fascia γ butterfarbig, mit einer rothfarblen  
dorsali ferrugineis. Schnirkelspitze, und Querbande  
um den Rücken.

*Gualt. Test. t. 2. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 10.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 1 — 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

♀ ferruginea, fascia dorsali alba. ♂ rothfarbig, mit einer weißer  
Querbinde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 57.*

*Gualt. Test. t. 3. f. E.*

*Gev. Belust. 26 t. 277 f.*

*Knor. Vergn. V. 22. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 10. Helix zona- N. III. 10. Die Gürtel-  
ria, schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 681.*

*Belg. Gebandeerde Post-hoorn. Gall. Corner de Possilon bandé.*



Testa-umbilicata, depressa, Die genabelte flache Schale  
apertura transuersa, labro hat an der querliegenden Mün-  
candido reflexo. dung eine weiße übergeschlagene Schalenleiste.

α alba, undis niueis, fasciis transuersis tribus rufis, infima latiore, α weiß, mit schneeweißen Wellen, und drey rothbraunen Querbändern, davon die untere schmäler ist.

β alba, fasciis octo inaequalibus rufis. β weiß, mit acht ungleich breiten rothbraunen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 72.*

*Gualt. Test. t. 3. f. L.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 52. 53. 55.*

*Knor. Verg. V. 21. t. 3. 4. f.*

N. III. 11. Helix Volvulus.

N. III. 11. Das Wirbelhorn.

*Müll. Hist. Verm. Sp. 280.*

Testa trochiformi, umbilicata, mucronata; apertura rotunda, labro reflexo. Die kräuselartige genabelte spizwirblice Schale hat an der runden Mündung eine übergeschlagene Schalenleiste.

*Petiv. Gaz. t. 77. f. 6.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 18. 19.*



N. III. 12. *Helix ungulina.*

*Linn. S. N. Sp. 682.*

N. III. 12. Das Schlangenhorn.

*Belg. Slangetje. Rumph. Angl. Thick - lipt Cake - Shell. Pet. Gall. Cornet de Chasseur. Dav.*

Testa utrinque umbilicata, subglobosa, apertura lunata, labro reflexo albo.

Die beiderseits genabelte, eiförmige Schale hat an der mondformigen Mündung eine übergeschlagene weiße Schalenleiste.

Basis obtuse carinata.

Der Grund hat eine stumpfe Querkiele.

*Rumph. amb. t. 27 f. R.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 13.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 11.*

*Gev. Belust. 7. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 13. *Helix Pileus.*

*Müll. Hist. Verm. Sp. 277.*

N. III. 13. Der Huthschirke.

Testa perforata, conica, alba, fasciis transversis rufis, apertura transversa, labro reflexo.

Die durchbohrte kegelförmige weiße Schale ist mit rothbraunen Querbändern umgeben, und an der querliegenden Mündung mit einer übergeschlagenen Schalenleiste versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 13.





N. III. 14. *Helix mam-*  
*millaris.*

N. III. 14. Der War-  
zenschnirkel.

*Linn. S. N. Sp. 685.*

Testa umbilicata, ouata;  
apertura oblonga, apici ad-  
nata.

Die genabelte eysförmige  
Schale hat eine länglichte mit  
der Schnirkelspize verwachsene  
Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 36.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 15. *Helix per-*  
*uerfa.*

N. III. 15. Der verkehr-  
te Schnirkel.

*Linn. S. N. Sp. 688.*

*Belg. Top - Slak. Gall. L' Unique.*

Testa subperforata, ouato  
oblonga, sinistrorsa, labro  
reflexo albo.

Die einigermaßen durchbohr-  
te, länglicht eyrunde links-  
gewundene Schale, hat eine  
übergeschlagene weiße Schalen-  
leiste.

„ aurantia, linea longitudinali una „  
alteraue purpurea.

orangengelb, mit einer, oder  
mehrern nach der Länge herablau-  
fenden purpurrothen Linien.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 116.*

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 33.*

*Gualt. Test. t. 5. f. P.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. interior.*

*Seb. Tbes. III. t. 40. f. 37.*

*Berlin. Mag. III. 28. t. 4. 5. f.*

♂ viridis, fasciis citrinis.

♂ grün, mit zitronengelben Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 5. f. P.*

*Knor. Vergn. V. 23. t. 4. f.*

γ alba, maculis longitudinalibus rufis.

γ weiß, mit nach der Länge herablaufenden rothbraunen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 64.*

*Petr. Gaz. t. 76. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 5. f. O.*

*Knor. Vergn. V. 23. t. 5. f.*

N. III. 16. *Helix jan-thina.*

N. III. 16. Die blane Schnirkelschnecke.

Linn.



*Linn. S. N. Sp.* 689.

*Belg.* Kwallen - Bootje.

*Testa subimperfurata sub-* Die einigermaßen genabelte  
*otunda, obtusa, fragili, apertu-* fast runde, stumpfwirbige, dün-  
*a dilatata, labro marginato.* ne Schale hat eine erweiterte  
 Mündung, mit einer überge-  
 schlagenen Schalenleiste.

*Rumph. amb. t.* 20. f. 2.

*Gualt. Test. t.* 64. f. 0.

*Berlin. Magaz. II.* 2. t. 2. f.

*Knor. Vergn. II.* 30. t. 2. 3. f.

*N. III.* 17. *Helix viui-*  
*para.*

*N. III.* 17. Die leben-  
 dig gebährende Schnirkel-  
 schnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 690.

*Testa subimperfurata, ouato* Die einigermaßen durchbohr-  
*oblonga, ventricosa, fasciis* te länglichte ensförmige bänchi-  
*transuersis fuscis; apertura* ge Schale hat braune Quer-  
*rotunda.* bänder, und eine runde Mün-  
 dung.

*List. angl. t.* 2. f. 18.

— *Hist. Conch. l.* 2. f. 26.

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 16.*

*Gualt. Test. t. 5. f. A.*

*Argenv. Zoom. Pl. 8. f. 2.*

*Seb. Thes. III. t. 93. f. 34.*

*Ginan. adr. II. t. 2. f. 8.*

*Berlin. Mag. IV. 7. t. 4—9. f.*

*Müll. Linn. Naturf. VI. 1. B. 18. t. 4. f.*

N. III. 18. *Helix vi-*  
*trea.*

N. III. 18. Der Glas-  
schirkel.

Testa subimperfiorata ouata,  
subpellucida, ventricosa, spi-  
rae anfractibus carinatis.

Die einigermaßen durchbohr-  
te eysförmige, halbdurchsichti-  
ge Schale hat kiel förmig erha-  
bene Schnirkelgewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ouata, fragilissima, sub-  
pellucida, laevis. Anfractus quin-  
que, infimus ventricosus, conue-  
xus; superiores spirales carinati.  
Apertura ouato ob'onga. Columel-  
la perforata, foramine tenui subob-  
tectio. Color luteo fuscus; fasciis  
longitudinalibus undulatis sulphu-  
reis.

Die Schale ist eysförmig und sehr  
gebrechlich, halbdurchsichtig und  
glatt. Sie bestehet aus fünf Ge-  
winden, davon das unterste bäu-  
chig, und runderhaben, die oberen  
aber, welche den Schnirkel bilden,  
kiel förmig erhaben sind. Die Mün-  
dung ist länglicht eysförmig; Die  
Spindel durchbohret, mit einem  
dünnen halbgedeckten Nabelloch. Von  
gelblich brauner Farbe mit nach  
der Länge herablaufenden wellen-  
förmigen schwefelgelben Bändern.

N. IV.



N. IV. Rotundatae, imperforatae.

N. IV. Rundlichte, undurchbohrte.

N. IV. I. *Helix nemoralis*.

N. IV. I. Die Waldschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 691.*

Testa imperforata, rotundata, labro fusco.

Die undurchbohrte rundlichte Schale hat eine braune Mündung.

$\alpha$  lutea unicolor.

$\alpha$  gelb, einfärbig.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 54.*

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 9.*

*Gev. Belust. 32. t. 398. f.*

$\beta$  lutea, fascia transversa fusca.

$\beta$  gelb mit einer rotthbraunen Querbinde.

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 2. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 18.*

*Gev. Belust. 32. t. 403. f.*

*Schroet. Erdk. 2. t. 38. f.*

$\gamma$  lutea, fasciis tribus fuscis, infima & media latissima.

$\gamma$  gelb, mit drei braunen Querbänden, davon die unterste und mittlere die breitesten sind.

*Gev.*

*Gev. Belust. 32. t. 407. f.*

♂ lutea, fasciis quatuor fuscis. ♂ gelb, mit vier braunen Querbändern.

*Gev. Belust. 32. t. 408 f.*

*Berlin Magaz. II. 3. t. 30. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 9. f.*

♀ lutea, fasciis quatuor fuscis, inferioribus subaequalibus, suprema angustiore. ♀ gelb, mit vier braunen Querbändern, davon die oberste schmaler, die unteren gleichbreit sind

*Berlin. Mag. II. 3. t. 27. 28. 29. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 2. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

♂ lutea, fasciis quinque fuscis, summum decrescentibus. ♂ gelb, mit fünf braunen Querbändern.

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 2. f. F.*

*Berlin. Mag. II. 3. t. 31. 32. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 10. f.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. 17. f.*

η rosea,

7 rosea, fasciis quinque transuer- 7 rosenroth, mit fünf braunen  
sis fuscis, binis, infimis latiori- Querbändern.  
bus.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. IV. 2. *Helix hor-*  
*tenfis.*

N. IV. 2. Die Garten-  
schnecke.

Testa imperforata, subglo-  
bosa, labro albo.

Die undurchbohrte rund-  
liche Schale, hat eine weiße  
Mündung.

Lutea, fasciis quinque transuer-  
sis fuscis, sursum decreascentibus.

Gelb, mit fünf braunen Quer-  
bändern, davon die oberen schmä-  
ler sind.

*Gen. Belust. 31. r. 374. 375. f.*

N. IV. 3. *Helix picta.*

N. IV. 3. Die gemalte  
Schnirkelschnecke.

Testa imperforata, subglo-  
bosa, obtusa, laeui, columel-  
la anfractuumque margini-  
bus coloratis.

Die undurchbohrte rundlich-  
te glatte Schale, ist an der  
Spindel, und an dem Rande  
der Gewinde gefärbet.

Testa subglobosa, laeui. Anfra-  
ctus quatuor conuexi, infimus ven-  
tricosus, spirales obtusi, compla-  
nati. Apertura lunata. Columella  
spiralis, patens.

Die Schale ist einigermaßen ku-  
gelförmig, und glatt. Die vier  
Gewinde sind erhabenrund, davon  
das unterste häuchig, die aber den  
Schnirkel ausmachen, stumpf und  
flach gedrückt sind. Die Mündung  
ist mondförmig, Die Spindel  
schnirkelförmig und offen.

α gri-



α grisea, columella lineaque sutu- α lichtgrau, mit brauner Spindel,  
rali & transuersa dorſi fulca. und einer braunen Querlinie  
näçß der Naht, und um die  
Mitte des Rückens.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β rosea, columella lineaque sutu- β rosenroth, mit brauner Spindel,  
rali & transuersa dorſi fulca. und einer braunen Querlinie  
näçß der Naht, und um die  
Mitte des Rückens.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 5.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 2. f.*

γ sulphurea, columella lineaque γ schwefelgelb, mit brauner Spindel,  
sutrali anfractuum rubra. und rothen Linie an den  
Rändern der Gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. IV. 4. *Helix versicolor.*

N. IV. 4. Die bunte  
Schnecke.

Testa imperforata subglobo-  
sa niuea, columella rosea, li-  
neis transuersis fasciisque in-  
termediis discoloribus.

Die undurchbohrte, rundlich-  
te Schale hat eine rothe Spindel,  
dünne Querlinien, mit  
dazwischen liegenden Bändern  
von verschiedenen Farben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Te-



Testa subglobosa laevis. Anfractus conuexi, infimus ventricosus, spirales obtusi. Apertura lunata. Columella spiralis, imperforata. Color niueus, lineis transversis parallelis fuscis, fascisque intermediiis sulphureis, roseisque; columella rosea.

Die Schale ist rundlich, und glatt. Die sechs Gewinde sind erhabenrund, das unterste bäuchig, die den Schnirkel bilden stumpf. Die Mündung ist ensförmig. Die Spindel schnirkelförmig, und durchbohret. Von schneeweißer Farbe mit braunen gleichvertheilenden Quertlinien, mit safrangelben, und rothrothen Zwischenbändern. Die Spindel ist rosenroth.

N. IV. 5. *Helix aperta*.

N. IV. 5. Die offene Schnirkelschnecke.

Testa imperforata, subglobosa, spira obtusa, minima, columella spirali aperta.

Die undurchbohrte rundliche Schale hat einen stumpfen kleinen Schnirkel, und eine schnirkelförmige offene Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subglobosa, tenuis, longitudinaliter obsolete striata. Anfractus tres, infimus ventricosus, superior spirales obtusi, breues, complanati. Apertura lunata. Columella imperforata, spiralis, aperta. Color fuscus.

Die Schale ist einigermaßen kugelförmig, dünn, und nach der Länge sehr fein gestreift. Sie besteht aus drei Gewinden, davon das unterste bäuchig, die oberen Schnirkelgewinde aber stumpf, kurz, und flach gedrückt sind. Die Mündung ist mondförmig. Die Spindel undurchbohret, schnirkelförmig, und offen. Die Farbe braun.

N. IV. 6.

N. IV. 6. *Helix Haemastragus*.

N. IV. 6. Das Bluthr.

Testa conuexo trochiformi, castanea, fascia transuersa alba; apertura transuersim elongata rosea.

Die runderhabene kräuselförmige kastanienbraune Schale hat ein weißes Querband und eine querliegende länglichte rosenrothe Mündung.

*Liszt. Hist. Conch. l. 2. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 6. 7.*

*Gev. Belust. 28. t. 328. 329. f.*

Testa trochiformis. Anfractus quinque conuexi, uniformiter de crescentes, & eleuati in spiram conicam obtusam. Suturae contiguae crenulatae. Apertura transuersim elongata auriformis. Columella imperforata complanata. Color castaneus, fascia infra medium dorso transuersa alba. Apertura, & spirae apex rosea.

Die Schale ist kegelförmig. Die fünf Gewinde sind erhabend, und nehmen gleichförmig ab in einer kegelförmigen Schnirkel. Die Näthe sind an einander verwachsen und gefeibet. Die Mündung ist in die Quere verlängert und ohrförmig. Die Spindel undurchbohret und flach. Von kastanienbrauner Farbe mit einem weißen Querbande unter der Mitte des Rückens. Die Mündung und die Schnirkelspitze sind rosenroth.

N. IV. 7. *Helix Melanotragus*.

N. IV. 7. Das Schwarzh.

Testa



Testa conuexa, trochiformi, castanea, fasciis duabus transuersis niueis; apertura transuersim elongata nigra.

Die runderhabene kauselförmige kastanienbraune Schale hat zwey schneeweiße Querbänder und eine in die Quere verlängerte schwarze Mündung.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa simillima priori: parum depressior, castanea, fascia transversa niuea, prope futuram tenui, lata vero infra medium dorsi. Apertura ex fusco nigra.

Die Schale ist der vorhergehenden am ähnlichsten: nur etwas flacher, von kastanienbrauner Farbe, mit zwey schneeweißen Querbändern, davon das schmalere nächst der Naht, das breite aber unter der Mitte des Rückens liegt. Die Mündung schwarzbraun.

N. V. Turritae.

N. V. Gethürmte.

N. V. 1. *Helix decollata*.

N. V. 1. Die abgestuzte Schnirkelnadel.

*Linn. S. N. Sp. 695.*

Testa turrita, subperforata; vertice obtuse truncato, apertura ouata.

Die gethürmte, einigermaßen durchbohrte Schale hat eine stumpf abgestuzte Schnirkelspize; mit einer eyförmigen Mündung.



*Bonap. Recr. cl. 3. f. 56.*

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 1. f. 12.*

*Petiv. Gaz. t. 66. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 4. f. O. P. Q.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. 5.*

*Knor. Vergn. VI. 12. t. 3. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 3.*

N. V. 2. *Helix calca-*  
*rea.*

N. V. 2. Die Marmor-  
nadel.

Testa turrita, longitudinali-  
ter striata, alba; anfractibus  
decem, apertura ovata.

Die gehürmte nach der Längs-  
ge feingestreifte weiße Schale  
hat eine stumpf abgestuzte  
Schnirkelspize mit einer eysför-  
migen Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 1. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 6. f. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa priori simillima: at triplo  
major, nitens, longitudinaliter re-  
nuissime striata. Anfractus decem,  
teretes, vniformiter decrescetes.

Die Schale ist der vorigen am  
ähnlichsten: aber dreymal größer,  
glatt, und nach der Länge sehr  
fein gestreift. Die zehn Gewinde  
Aper-



Apertura ovata. Columella torta, sind rund, und nehmen gleichförmig ab. Die Mündung ist eysförmig. Die Spindel gedreht, und mit einer ausgebreiteten dünnen Lesze gedeckt. Von weißer Farbe.

An prioris varietas perfecta?

Vielleicht eine vollkommene Abänderung der vorigen Art.

N. V. 3. *Helix plicata*.

= *plicaria*

in ovata laut page

N. V. 3. Die gefaltene Schnirkelnadel.

Testa subulata, anfractibus plicis longitudinalibus coronatis.

Die ahlförmige Schale ist an den Gewinden mit erhabenen nach der Länge herablaufenden Falten gekrönt.

Gualt. Test. t. 6. f. H.

Berlin. Magaz. IV. 10. t. 51. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata subpellucida. Anfractus decem conuexi, prope suturam superiorem plicis elevatis longitudinalibus coronati. Apertura ovata. Columella elabiata.

Die Schale ist ahlförmig und halb durchsichtig. Die zehn Gewinde sind erhabenrund, und an der obern Naht mit nach der Länge herablaufenden Falten gekrönt. Die Mündung ist eysförmig. Die Spindel ohne Lesze.



N. V. 4. *Helix macu-  
lata.*

N. V. 4. Die gefleckte  
Schnirkelnadel.

Testa subulata laeui, pic-  
ta undis longitudinalibus ru-  
tis.

Die ahlförmige glatte Scha-  
le ist mit nach der Länge her-  
ablaufenden rothbraunen Wel-  
len bemalt.

*Gualt. Test. t. 6. f. G.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subulata, laevis, striis  
transuersis subtilissimis circumdata.  
Anfractus circiter duodecim conue-  
xi. Apertura ouata. Labium lae-  
ue. Color pallidus, fasciis undu-  
latis longitudinalibus rufis.

Die Schale ist ahlförmig und  
glatt, mit sehr feinen Quersstreifen  
umgeben. Die Gewinde deren henz-  
läufig zwölf, sind erhabenrund Die  
Mündung eiförmig. Die Spindel-  
leiste glatt. Von bläßer Farbe mit  
nach der Länge laufenden roth-  
braunen Wellen bemalt.

N. V. 5. *Helix fusca-  
tus.*

N. V. 5. Die braune  
Schnirkelnadel.

Testa subulata laeui, anfra-  
ctibus teretibus.

Die ahlförmige glatte braun-  
ne Schale hat flachrunde Ge-  
winde.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 6. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa





Testa subulata laevis, transuersim  
subtilissime striata, Anfractus de-  
cem reteres. Apertura ouata. La-  
bium laeue. Faux cinerea. Color  
ex luteo fuscus.

Die Schale ist eysförmig und  
glatt, in die Quere sehr fein ge-  
streift. Die zehn Gewinde sind  
flachrund. Die Mündung eysförmig.  
Die Spindelöse ist glatt.  
Der Schlund aschengrau. Die Scha-  
le außen gelblichbraun.

N. VI. Ouatae, imperforatae.

N. IV. Eysförmige, undurchbohrte,

N. VI. 1. Helix Ama-  
rula.

N. VI. 1. Die Fluß-  
Papstkrone.

Linn. S. N. Sp. 702.

Belg. Rivier Pauze - Kroon, Rumph. Angl. River - Mitter - Shell.  
Petiv. Gall. La tiare fluviatile. Dav.

Testa ouata imperforata, ni-  
gra; anfractibus sursum spino-  
so dentatis.

Die eysförmige undurchbohr-  
te schwarze Schale ist oben an  
den Gewinden mit zahnsförmigen  
Stacheln besetzt.

Dorsum notatum cicatricibus oua-  
libus, margine albo cinctis, queni-  
admodum Nerita pulligera.

Der Rücken ist nach Art der  
bruttragenden Schwimmschnecken,  
mit eysförmigen Narben besetzt, die  
mit einem weißen Saume eingesaßt  
sind.

List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 33.

Rumph. amb. t. 33. f. F. F.



*Petiv. amb.* 1. 4. f. 3.

*Gualt. Test.* t. 6. f. B.

*Argenv. Conch. Pl.* 27. f. post 6tam.

*Seb. Thes. III.* t. 53. f. 24. 25.

*Berlin. Magaz. IV.* 9. t. 38. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. VI. 2. *Helix stagnalis.*

N. IV. 2. Das Teichhorn.

*Linn. S. N. Sp.* 703.

Testa ovato subulata, imperforata, subangulata, ventricosa; apertura ovata.

Die eysförmige ahlförmig zugespitzte Schale ist bäuchig und etwas eckig, mit einer eysförmigen Mündung.

*List. angl.* t. 2. f. 21.

—— *Hist. Conch. l.* 4. p. 1. f. 21.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 55.

*Gualt. Test.* t. 5. f. 7.

*Argenv. Conch. Pl.* t. 27. f. 6.

—— *Zoom. Pl.* 8. f. 5.

*Seb. Thes. III.* t. 39. f. 41 — 46. 52. 53.

*Klein. Meth. Ostr.* t. 3. f. 69.

*Slotterb. Aët. helv. V.* t. 3 f. 25. 26.

Ginan.



*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. A. B. C.*

*Berlin. Mag. IV. 9. t. 33. 35. 36. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. VI. 3. *Helix auricularia.*

N. VI. 3. Das Ohrhorn.

*Linn. S. N. Sp. 708.*

*Gall. La Conque spherique.*

Testa subimperfata am-  
pullacea, spira mucronata  
breui, apertura ampliata.

Die undurchbohrte aufgebla-  
sene Schale hat kurze, ver-  
dünnte Schnirkelspize, und  
eine weite Mündung.

*List. angl. t. 2. f. 23.*

—— *Hist. Conch. l. 1. p. 1. f. 23.*

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 54.*

*Gualt. Test. t. 5. f. F. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. 7.; Pl. 28. f. 22.*

*Schlott. Aët. belv. V. 3. t. 27. 28.*

*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. 3.*

*Berlin. Mag. III. 5. t. 66. f.*

—— ——— *IV. 11. t. 59. f.*

*Schroet. Erdk. I t. 3 f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 4.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



N. VI. 4. *Helix solidida.*

N. VI. 4. Die dickschalige Schnirkelschnecke.

Testa ovato oblonga, imperforata solida, glabra; anfractibus convexus, columella incrassata.

Die eiförmig länglichte und durchbohrte Schale ist dicht und glatt, mit erhabenrunden Gewinden, und einer verdickten Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa oblonga, solida, glabra. Anfractus sex convexus, continui. Apertura rotundato oblonga. Columella imperforata, labio incrassato, breui. Color roseus, lineis transversis tenuissimis rubro alboque articulatis.

Die Schale ist länglicht, dicht, und glatt. Die sechs Gewinde sind an einander verwachsen, und erhabenrund. Die Spindel ist undurchbohret, mit einer verdickten Fesze. Von rosenrother Farbe, mit sehr feinen roth und weiß unterbrochenen Querlinien.

N. VI. 5. *Helix halioidea.*

N. VI. 5. Die Milchschale.

Linn. S. N. Sp. 713.

Belg. Witte Oor - Schulp. Angl. White Ear. Pet. Gall. Oreille de Venus. Dav.

Testa



|                                                                                            |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Testa elliptica, complana-<br/>ta, imperforata; apertura ad<br/>picem usque hiante.</p> | <p>Die elliptische, plattgedrück-<br/>te undurchbohrte Schale hat<br/>eine bis in die innerste Wirbel-<br/>spitze offene Mündung.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 21.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 29.*

*Rumph. amb. t. 40. f. R.*

*Gualt. Test. t. 69. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 5. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 2.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 114.*

*Knor. Vergn. VI. 39. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 15. t. 151. 152. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 8.*

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>N. VI. 6. <i>Helix ambi-</i><br/><i>gua.</i><br/><i>Linn. S. N. Sp. 714.</i></p> | <p>N. VI. 6. Der Halb-<br/>mond.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                               |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Testa subimperforata, ro-<br/>tunda, a, solida; apertura se-<br/>niorbiculari; labio incrassa-<br/>to.</p> | <p>Die undurchbohrte, rund-<br/>liche, dichte Schale hat eine<br/>halbrunde Mündung mit einer<br/>verdickten Spindellese.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Labium citrinum.*

Die Spindellese ist zitrongelb.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 39. 40.*

*Adans. Seneg. Pl. 1. f. 6. 7.*

*Gev. Belust. 28. t. 319. 320. f.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 5. 6. f.*

O. Nerita.

O. Die Schwimm-  
schnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 329.*

Testa spiralis. Aper-  
turae labio transuerso pla-  
niusculo.

Die Schale ist schnir-  
felförmig. Die Mündun-  
g hat eine flachgedrückt  
querliegende Spindellefze

O. I. Umbilicatae.

O. I. Genabelte.

O. I. 1. Nerita Can-  
rena.

O. I. 1. Der Knoten-  
nabel.

*Linn. S. N. Sp. 715.*

*Belg. Navel-Slak. Angl. Dice Nerit.*

Testa umbilicata, laeui;  
spira mucronata; umbilico  
gibbo bifido.

Die genabelte, glatte, spiz-  
wirblice Schale hat einen hö-  
ckerigen zweytheiligen Nabel.

α albi-



*albida*, punctis adspersa ferrugineis.  $\alpha$  weißlich, mit rostfarbigen Punkten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 228.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 67. f. Q. S.*

*Adams. Seneg. Pl. 13. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 60. 61.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 3. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 23.*

$\beta$  *albida*, seriebus transuersis macularum ferruginearum.  $\beta$  weißlicht, mit Querbändern von rostfarbigen Flecken.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 224.*

*Gualt. Test. t. 67. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 62. 63.*

*Gev. Belust. 27. t. 303. 304. f.*

$\gamma$  *albida*, lineis longitudinalibus angulatis ferrugineis.  $\gamma$  weißlicht, mit nach der Länge laufenden rostfarbigen Winkelzügen.

*List.*





*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 67. f. X.*

*Gev. Belust. 27. t. 295. 302. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. C.*

*Adams. Seneg. Pl. 13. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 1. 54.*

*Regensf. Samml. I. 3. t. 34. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 4. f.*

♂ grisea, fasciis transuersis albo ♂ gelbgrau, mit weiß und braun  
fuscoque articulatis. unterbrochenen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 3. 4. 8.*

*Gualt. Test. t. 67. f. V.*

*Seb. Thes. t. 38. f. 27. 28. 51. 52. 64. 65.*

*Gev. Belust. 27 t. 294. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 5. f.*

—— ——— II. 10. t. 5. f.

—— ——— III. 15. t. 4. f. ; 20. t. 4. f.

O. I. 2. *Nerita glau-*  
*cina.*

O. I. 2. Die dicklipp-  
ge Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 716.*

Belg.



*all.* Limaçon du Rivage.

Testa umbilicata laeui, Die genabelte glatte stumpf-  
 fra obtusa, umbilico semi-wirblige Schale hat einen halb-  
 cufo; labio gibbo decolore, gedeckten Nabel, mit einer hö-  
 ckerigen gefärbten Lippe.

*List. angl. t. 3 f. 10.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 10.*

*Rumph. amb. t. 22. f. C.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 67. f. M. P. T.*

*Adans. Seneg. Pl. 13. f. 4.*

*Seb. Tbes. III. t. 38. f. 33.*

*Knor. Vergn. VI. 13. t. 7. f.*

O. I. 3. *Nerita rufa.*

O. I. 3. Die braune  
*Nerite.*

*Angl. Twin girdled Nerit. Petiv.*

Testa umbilicata, laeui, Die genabelte glatte stumpf-  
 spira obtusa, umbilico bis- wirblige Schale, hat einen  
 do, zweispaltigen Nabel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 34.*

*Rumph. amb. t. 22. f. D.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 11. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. Z.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 30.*

*Gev. Belust. 27. t. 296. f.*

Testa subglobosa, laevis. Anfractus quatuor, infimus ventricosus, superiores efformantes spiram complanatam, obtusam. Apertura semirotonda. Labium reflexum, glabrum, non claudens umbilicum. Umbilicus profundus, costa elevata bipartitus.

Die Schale ist einigermaßen genabelt und glatt. Von den vier Gewinden ist das unterste bündel, die obern bilden einen zusammen gedrückten stumpfen Schnirkel. Die Mündung ist halbrund. Die Epibellefze ist übergeschlagen, und glatt mit einem offenen tiefen Nabe, welcher durch eine erhabene Kante in zwey getheilet wird.

O. I. 4. *Nerita Vitellus.*

*Linn. S. N. Sp. 717.*

O. I. 4. *Der Eyerdotter.*

*Belg. Strand - Doijer. Angl. Doyer Velk Nerit- Pet. Gall. Jaas d' oeuf. Dav.*

Testa umbilicata subglobosa laevi, umbilico aperto aequali.

Die genabelte einigermaßen kugelfunde glatte Schale hat einen offenen glatten Nabel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 22. f. A.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 67. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. D.*

*Gev. Belust. 27. t. 292 f.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 30. 31.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 2. f.*

— — II. 8. t. 5. f.

O. I. 5. Nerita Albu-  
n.

O. I. 5. Der geschobene  
Eyerdotter.

*Linn. S. N. Sp. 718.*

*Belg. Platte Doyer. Angl. Velk Nerit. Gall. Jaune d'oeuf applati. Dav.*

Testa umbilicata conuexa, Die genabelte erhabenrunde  
umbilico subcordato, labio ex- Schale hat einen etwas herz-  
anato. förmigen Nabel, mit einer aus-  
gebreiteten Spindellippe.

*Rumph. amb. t. 22. f. B.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 67. f. A. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. T.*

*Gev. Belust. 28. t. 309. f.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 54. f.*

*Knor. Vergn. II. 11. t. 1. f.*

— — IV. 7. t. 4. 5. f.

O. I. 6. Nerita Mam-  
milla.

O. I. 6. Der Warzen-  
dotter.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 719.*

*Belg. Slek-hoorn. Angl. White Nerit. Petiv. Gall. Mammelo blanc. Dav.*

*Testa umbilicata, ouata, Die genabelte, eysförmige glabra; umbilico obtecto, a- glatte Schale hat einen gedeck- pertura ouata. ten Nabel, mit einer eysförmigen Mündung.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 22.*

*Rumph. amb. t. 22. f. F.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 67. f. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. X.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 9. 10.*

*Gev. Belust. 28. t. 306. f.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 6. 7. f.*

— — — IV. 8. t. 4. f.

— — — VI. 40. t. 2. 3. f.

*O. I. 7. Nerita fulca- ta.*

*O. I. 7. Die gefurchte Schwimmschnecke.*

*Testa subglobosa, sulcis longitudinalibus, obliquatis; Die einigermaßen kugelförmige Schale hat nach der Länge herab, etwas schief laufende Strahlen, und einen zweispaltigen Nabel.*

*Knor.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subglobosa. Anfractus quatuor. Spira mucronata. Sulci seu olicae incisae secundum longitudinem descendentes. Umbilicus perforatus, costa eleuata bipartitus. Color lacteus.

Die Schale ist einigermaßen kugelförmig. Der Gewinde sind vier. Der Schnirkel ist zugespitzt. Nach der Länge herab und etwas schief laufen ausgeschnittene Furchen oberhalb. Der Nabel ist offen, und mit einer erhabenen Rille in zwei getheilt. Von schneeweißer Farbe.

O. II. Imperforatae, labio edentulo.

O. II. Undurchbohrte, ohne Zähnen an der Spindelöffnung.

O. II. 1. Nerita Radula.

O. II. 1. Die rauhe Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 721.*

Testa transuersim sulcata, costis intermediis acute tuberculatis.

Die Schale ist der Quere nach gefurchet, und auf den Zwischenribben mit spizigen Körnern besetzt.

*Gev. Belust. 23 t. 241 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. II. 2. Nerita litorealis.

O. II. 2. Die Strandschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 723.*

D d

Testa



Testa laeui', vertice obtu-  
siusculo, labio acuto eden-  
tulo.

Die glatte etwas stumpf-  
wirblice Schale hat eine schar-  
fe Schalenleiste ohne Zähne.

*List. angl. t. 2. f. 2.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 35 — 38.*

*Gev. Belust. 24. t. 250. 252 257. f.*

Picturis, & coloribus innumeris  
varians.

Davon giebt es der Farbe und  
Zeichnung nach unzählbare Spiel-  
arten.

O. II. 3. *Nerita lacustris.*

O. II. 3. Die Sumpf-  
nerite.

*Linn. S. N. Sp. 725.*

Testa laeui, apice exqui-  
sito, labiis edentulis.

Die glatte Schale hat eine  
hervorragende Wirbelspitze, und  
ungezähnelte Leisten.

*List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 38. ; l. 4. f. 6. f. 43*

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 4. f. M. LL.*

*Gev. Belust. 24. t. 258 — 255. f.*

*Berlin. Mag. IV. 8. t. 27. 28. f.*

O. III. Imperforatae, labio den-  
rato.

O. III. Undurchbohrte mit un-  
gezählter Spindelkeule.

O. III. 1. *Nerita pul-  
liger.*

O. III. 1. Die brutt-  
tragende Nerite.

*Linn. S. N. Sp. 726.*

*Belg. Rood-Oog. Angl. Red Nerit.*

Testa



Testa laeui, spirae apice Die glatte Schale hat eine na-  
excauato umbilicato, labio belsförmig ausgehöhlte Schnir-  
renulato. kelspize, und eine glatte fein-  
gekerbte Spindellefze.

*List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 37.*

*Petiv. Gaz. t. II. f. 4.*

— amb. t. II. f. 4.

*Rumph. amb. t. 22. f. H.*

*Gualt. Test. t. 4. f. HH.*

*Seb. Thes. III. t. 41. f. 23 — 26.*

*Gev. Belust. 31. 23. t. 242. f.*

*Berlin. Mag. IV. 8. t. 31. f.*

*Knor. Verg. VI. 13. t. 3. f.*

O. III. 2. *Nerita cor-* O. III. 2. Die Horn-  
nea. nerite.

*Linn. S. N. Sp. 722.*

Testa rotundata, obsolete Die rundlichte mattgestreifte  
striata, labiis edentulis. Schale hat an den Lippen kei-  
ne Zähne.

Nigra, punctis fasciisque trans- Schwarz, mit gelben Punkten  
uersis, luteis. und Querbändern.

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. M.*

*Gev. Belust. 22. t. 226. f.*

O. III. 3. *Nerita viri-* O. III. 3. Die grüne  
dis. Schwimmschnecke.

D d 2

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 729.*

Testa laeui viridi, labio  
crenulato.

Die glatte grüne Schale hat  
eine feingekerbte Schalenleſze.

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 4. *Nerita virgi-  
nea.*

O. III. 4. Der Blutz  
zahn.

*Linn. S. N. Sp. 730.*

*Belg. Ploedige Tand. Gall. Quenotts.*

Testa laeui, ouata, labio  
gibbo, crenulato.

Die glatte eysförmige Scha-  
le hat eine höckerige feingekerb-  
te Schalenleſze.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 204.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 25. 26.*

*Petiv. Gaz. t. II. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. P.*

*Geu. Belust. 24. t. 251. f.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 2. f.*

O. III. 5. *Nerita pen-  
nata.*

O. III. 5. Die gefiederz  
te Schwimmschnecke.

Testa



Testa rotundata, laeui, labio plano crenulato.

Die rundliche glatte Schale hat eine flache feingekerbte Schalenleſze.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 29.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, laeuis. Anfractus circiter quatuor, infra suturam complanati. Spira obtusa; Apex erosus. Apertura semicircularis. Labrum acutum. Labium complanatum, crenulatum. Color oliuaceus alboque varius, maculis transuersis pennatis nigris.

Die Schale ist rundlich und glatt. Die Gewinde, deren ungeſehr vier ſind, an der Naht ſammengedrückt. Der Schnirkel iſt ſtumpf; die Spitze ausgeſtreſſen. Die Mündung halbrund. Die Schalenleſze ſcharfrandig. Die Spindel-leſze flach, und gekerbet. Die Farbe olivengrün, und weiß geſpelt, mit federförmigen querliegenden ſchwarzen Flecken.

O. III. 6. Nerita polita.

O. III. 6. Die glatte Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 731.*

Testa laeui, obtusa, labio dentato, labro crenulato.

Die Schale iſt glatt und ſtumpfwirblig, die Spindel-leſze gezähnt, die Schalenleſze gekerbet.

α fusco alboque nebulosa, fasciis α braun und weiß nebelicht, mit rothen Querbändern.



*Lift. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 66. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 43. f..*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 1. 3.*

*Gev. Belust. 22. t. 223. 224. f.*

♂ albo, fuscoque nebulosa,

♂ weiß, und braun nebelicht.

*Rumph. amb. t. 22. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 20.*

*Gualt. Test. t. 66. f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. K.*

*Gev. Belust. 22. t. 220 — 221. f.*

γ griseo rubroque nebulosa, fasciis γ lichtgrau, und rothnebelicht,  
transuersis niueis. mit schneerweißen Querbändern.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 221.*

*Gev. Belust. . 24. t 245. f.*

O. III. 7. Nerita Pello-  
ronts.

O. III. 7. Der Peles-  
ront Nerite.

*Linn. S. N. Sp. 732.*

*Belg. Poelorontje. Rumph. Angl. Poeloroon Nerit. Petiv.*

**Testa**

Testa striata, labiis den- Die gestreifte Schale hat  
tatis, interiore planiusculo gezähnte Lippen, deren innere  
rugoso. flach, und runzelicht ist.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. II.*

*Rumph. amb. t. 22. f. K.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 6.*

*Gev. Belust. 27. t. 299. f.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 4. f.*

O. III. 8. Nerita Albi-  
cilla.

O. III. 8. Die stumpfe  
Schwimm Schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 733.*

Testa striata, spira obtu- Die gestreifte Schale hat  
fissima, labiis dentatis, inte- einen sehr stumpfen Wirbel,  
riore tuberculato. und gezähnte Lippen, deren  
innere mit Körnern besetzt ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. 8.*

*Gev. Belust. 23. t. 229. f.*

*Knor. Vergn. VI. 13. t. 4. f.*



O. III. 9. *Nerita plicata*.

O. III. 9. Die Falten  
nerite.

*Linn. S. N. Sp. 735.*

Testa sulcata, labiis den-  
tatis, interiore rotundato,  
exteriore utrinque dentibus  
acutis.

Die gefaltene Schale ha-  
gezähnte Lippen, deren inner  
rundlicht, die äussere aber bei  
derseits mit spizigen Zähnen be-  
setzt ist.

*Knor. Vergn. V. 15. t. 4. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 10. *Nerita grossa*.

O. III. 10. Die geribbte  
Schwimm Schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 736.*

Testa sulcata, labiis den-  
tatis, interiore conuexo ru-  
goso.

Die gefurchte Schale hat  
gezähnte Lippen, deren innere  
runderhaben, und runzelicht  
ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. N.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 8.*

*Gev. Belust. 22. t. 228. f. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 9.



O. III. 11. Nerita Cha-  
maeleon.

Linn. S. N. Sp. 737.

Pelg. Kamelotje. Rumph. Angl. Camel Nerit. Petiv.

O. III. 11. Das Kame-  
lotchen.

Testa sulcis viginti, labiis Die Schale hat zwanzig  
dentatis, interiore rugoso, Furchen, und gezähnte Lippen,  
tuberculato. deren innere mit Runzeln und  
Körnern besetzt ist.

Rumph amb. t. 22. f. L.

Petiv. amb. t. 11. f. 7.

Gev. Belust. 23. t. 234. f.

Regenf. Samml. I. 3. t. 26. f.

Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f. *omit see last page*

O. III. 12. Nerita un-  
data.

Linn. S. N. Sp. 738.

O. III. 12. Die Wellen-  
nerite.

Testa sulcis triginta, labiis Die Schale hat dreißig  
dentatis, interiore rugoso, tu- Runzeln, und gezähnte Lip-  
berculato. pen, deren innere mit Run-  
zeln und Körnern besetzt ist.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 215.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 6.

Rumph. amb. t. 22. f. 4.





*Gev. Belust.* 22. t. 227. f.

*Knor. Vergn.* VI. 13. t. 2. f.

O. III. 13. Nerita Exuvia.

O. III. 13. Die breithürchige Schwimmschnecke

*Linn. S. N. Sp.* 739.

*Belg.* Geworte Alykruyk. *Angl.* Deep - rigd Nerit. *Petiv.*

Testa sulcata, labiis dentatis, interiore tuberculato. Die gefurchte Schale mit gezähnte Lippen, deren innere mit Körnern besetzt ist.

*Bonap. Recr. cl.* 3. f. 220.

*List. Hist. Conch.* I. 4. f. 6. f. 14.

*Petiv. Gaz.* t. 100. f. 6.

— amb. t. 11. f. 9.

*Rumph. amb.* t. 22. f. M.

*Gualt. Test.* t. 66. f. CC.

*Argenv. Conch. Pl.* 7. f. 7.

*Seb. Thes.* III. t. 59. f. 4—9.

*Gev. Belust.* 23. t. 239. 240. f.

*Knor. Vergn.* III. 1. t. 5. f.

*Da Cost. Elem. Pl.* 3. 14. 15. f.



P. Haliotis.

P. Die Ohrschnecke.

Testa auriformis, foraminibus secundum longitudinem digestis. Spira occultata laterali.

Die Schale ist ohrförmig und der Länge nach mit Löchern durchbohret. Der Schnirkel stehet verborgen an der Seite.

P. I. Haliotis Midas.

P. I. Das Hohlohr.

Linn. S. N. Sp. 740.

Belg. Groot Holzeeor. Angl. The great Ear-Shell. Hill. Gall. La grande Oreille de Mer.

Testa subrotunda, rugosa, limbo lato.

Die beinahe runde und runzelichte Schale hat einen breiten Rand.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 5.

Gualt. Test. t. 96. f. B.

Valent. Abb. 12. t. 102. f.

Argenv. Conch. Pl. 3. f. A.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Knor. Vergn. V. 20. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 14. t. 136. f.

P. 2.

P. 2. *Haliotis striata*.

P. 2. Das gestreift  
Ohr.

*Linn. S. N. Sp. 742.*

*Belg. Gestrepte Zeeohr. Gall. Oreille de mer striée.*

Testa ovata, transversim Die eysförmige Schale  
rugosa, longitudinaliter stria- nach der Quere gerunzelt, un-  
ta. in die Länge gestreift.

*Knor. Vergn. I. 20. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 14. t. 138. f.*

P. 3. *Haliotis marmo-  
rata*.

P. 3. Das Marmorohr.

*Linn. S. N. Sp. 744.*

*Gall. Oreille marbrée.*

Testa ovata, striis longitu- Die eysförmige Schale ist de-  
dinalibus, transversis, obsole- Länge nach gestreift, und i-  
tis. die Breite mit matten Strei-  
fen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 6.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. B.*

*Knor. Vergn. II. 17. t. 4. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 14. t. 139. f.*



P. 4. *Haliotis asinina*.

P. 4. Das Eselohr.

*Linn. S. N. Sp. 745.*

*elg. Lange Parlemoor - Schulp. Angl. Long Sea Ear. Hill. Gall.*  
*ille d'ane. Dav.*

Testa ovato oblonga, glabra, Die eysförmige, länglichte  
rgine subsulcato, dorso glatte Schale ist am Rande  
iato. einigermaßen gefurchet, und  
auf dem Rücken gestreiset.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 40 f. E. F.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 69. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. E.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Regenf. Samml. III. 9. t. 29. f.*

*Knor. Vergn. III. 15. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 16. t. 150. f.*

Q. Pa.

Q. Patella.

Q. Die Napfſchnecke.

Testa fornicata, subconica, absque spira.

Die Schale iſt gewölbet kegelförmig, ohne Schnirkel.

Q. I. Labio interno.

Q. I. Mit einer Lippe in der inneren Wölbung.

Q. I. I. Patella equestris-

Q. I. I. Die Fiſchweiberhaube.

Linn. Sp. N. Sp. 747.

Belg. Viſchhuifje. Rumph. Angl. Beaked Limpet. Hill. Gall. L. Cabochon. Dav.

Testa conica, vertice obliquo, labio subverticali canaliculato.

Die kegelförmige Schale hat einen ſchiefen Wirbel, und eine rinnenförmige nahe unter dem Wirbel ſtehende Lippe.

Bonan. Recr. cl. 1. f. 12.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 39.

Rumph. amb. t. 40. f. P. O.

Petiv. amb. t. 16. f. 28.

Gualt. Test. t. 9. f. Z.

Hill.



*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Dav. Cat. syst. I. Pl. 2. f. B. b.*

*Mart. Konch. Kab. I. 13. t. 117 — 110. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 5.*

*Walch Naturf. IX. 3. t. 1. 2. f.*

Q. I. 2. *Patella fornicata*, Q. I. 2. Der Pantosel.

*Linn. S. N. Sp. 751.*

*Belg. Pantoseltje. Angl. Small indian Canoe-Shell. Gall. Le Sane. e. Dav.*

Testa ouata, vertice marginali, mucronato, incuruo, la- Die euförmige Schale hat  
o interno concauo. an einem Ende einen spitzigen  
gekrümmten Wirbel, mit einer  
hohlen Lippe.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 33.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. N.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 8.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Konch I. 13. t. 129. 130. f.*

Q. II.

Q. II. Margine angulato.

Q. II. Mit eckigem Rande.

Q. II. 1. Patella saccharina,

Q. II. 1. Die Sternpatelle.

Linn. S. N. Sp. 754.

Belg. Bonnetje. Angl. White rib'd Limpet. Pet. Gall. Astrolepas. Das

Testa margine angulato, costis carinatis acutis.

Die Schale hat einen eckigen Rand, und scharfkielig Rippen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 10.

Rumph. amb. t. 40. f. B.

° Petiv. amb. t. 3. f. 3.

Gualt. Test. t. 9. f. M. O.

Argenv. Conch. Pl. 3. f. M.

Klein. Meth. Ostr. t. 8. f. 4.

Knor. Vergn. III. 29. t. 3. f.

Mart. Conch. Kab. I. 9. t. 76. f.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 6.

Q. II. 2. Patella barbara.

Q. II. 2. Die Mütze.

Linn. S. N. Sp. 755. °

Belg. Grasje.

Testa





Testa angulata , costis viginti undatis , tuberculatis.

Die eckige Schale hat 3. un-  
zig wellenförmige knottige Ri-  
ben.

*Knor. Vergn. V. 13. t. 3. f.*

Q. II. 2. Patella plicata.

Q. II. 2. Die Falten-  
patelle.

*Gall. La tete de Meduse, Dav.*

Testa angulata , costis tri-  
ginta obtusis , undulosis , trans-  
versim rugosis.

Die eckige Schale hat drey-  
ßig stumpfe , wellenförmige ,  
in die Quere gerungelte Ribben.

*Knor. Vergn. III. 30. t. 1. f.*

*Dav. Cat. syst. 1. Pl. 3. f. D.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata. Margo dentatus,  
dentibus 30 - 34. Costae totidem  
dorsales , undatae , transversim ru-  
gosae. Vertex subcentralis , obtu-  
sus. Color albus , maculis fuscis.

Die Schale ist eiförmig. Der  
Rand mit 30 — 34 Zähnen umge-  
ben. Auf dem Rücken liegen eben  
so viele wellenförmige und in die  
Quere gerungelte Ribben. Der stumpfe  
Wirbel steht nahe am Mittelpunk-  
t. Weiß mit braunen Flecken.



Q. II. 3. *Patella granularis*.

Q. II. 3. Die Festung.

*Linn. S. N. Sp.* 756.

*Belg.* De Fortresse. *Angl.* The Fortresse. *Gall.* La Forteresse. *Dav.*

*Testa angulata, dorso squamis angulatis imbricato, fundo fusco.*

Die eckige Schale hat auf dem Rücken ziegelförmig gestellte eckige Schuppen, und einen braunen Boden.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. I. f. 13.

*Gualt. Test. t.* 9. f. F.

*Argenv. Conch. Pl.* 2. f. G.

*Hill. Hist. of. Anim. Pl.* 7.

*Regenf. Samml. I.* 9. t. 31. f.

*Knor. Delic. nat. I.* t. E. V. f. 8.

— *Vergn. I.* 30. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I.* 9. t. 71.

Q. II. 4. *Patella Oculus*.

Q. II. 4. Das Bocksaug.

*Angl.* Goat's Eye Limpet. *Da Cost.* *Gall.* L'oeil de bouc. *Argenv.*

**Testa**



Testa angulata, costis ca- Die eckige Schale hat viel-  
rinatis, vertice fundoque förmige Ribben, den Wirbel  
albo. und Grund von weißer Farbe.

Gualt. Test. t. 9. f. H. 1

Argenv. Conch. Pl. 2. f. B.

Mart. Konch. Kab. I. 10. t. 86. f.

Da Cost. Elem. Pl. 2. f. I.

Testa similis priori, a qua differt: Eine Art die der vorhergehenden  
colore fundi verticisque albo, squa- ähnlich ist, von der sie sich durch die  
marumque defecta. weiße Farbe des Wirbels und Grund-  
des, und durch den Mangel der  
Schuppen unterscheidet.

Q. II. 5. Patella grana-  
tina.

Q. II. 5. Das Körner-  
schild.

Linn. S. N. Sp. 757.

Belg. Gedoornd Kapje. Gall. Lepas granuleux.

Testa multifulcata, punctis Die Schale ist mit vielen  
elevatis muricata, margine Furchen und erhabenen Punk-  
dentato. ten besetzt, und mit einem er-  
habenen Rande versehen.



*List. Hist. Conch.* t. 4. f. 1. f. 15.

*Bonan. Mus. Kirch.* cl. 2. f. 22.

*Argenv. Conch. Pl.* 2. f. H.

*Regenf. Samml.* I. 2. t. 14. f.

*Mart, Konch. Kab.* I. 8. t. 61.

Q. II. 6. *Patella coerulea*.

Q. II. 6. Die blaue Napfschnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 759.

Testa inaequaliter sulcata, cavitate coerulescente, margine subangulato.

Die Schale ist mit ungleichen Furchen besetzt, in der Höhlung blaulicht, und am Rande einigermassen eckig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. II. 7. *Patella miniata*.

Q. II. 7. Der Sonnenschirm.

*Belg. Gestraalde Kapje. Gall. Le Parasol. Dav.*

Testa ovata, striis inaequalibus decussatis, margine subangulato.

Die eiförmige Schale ist mit ungleichen Strichen durchkreuzet, und am Rande einigermassen eckig.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 21.*

*Knor. Vergn. V. 8. t. 4 — 6. f. ; 19. t. 2. 3. f.*

*Mart. Conch. Kab. 1. 7. t. 52. f. ; 8. t. 63. f.*

Testa ovata. Margo obsolete anguatus. Dorsum striis longitudinalibus transuersisque decussatim striatum. Vertex obtusus. Color albus, punctis minutis, radiisque roseis.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand hat vollkommene Ecken. Der Rücken ist der Länge und Quere nach mit feinen Streifen durchkreuzet. Der Wirbel stumpf. Weiß mit kleinen Punkten und Strahlen von rosenrother Farbe.

Q. II. 8. Patella Cochlear,

Q. II. 8. Der Löffel.

Gall. La Cuilliere.

Testa ovata, complanata, postice attenuata, margine subangulato.

Die Schale ist eiförmig und plattgedrückt, hinten verschmälert, und am Rande einigermaßen eckig.

*Knor. Vergn. II. 26. t. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovalis. Margo crenatus. Dorsum antice planiusculum, postice attenuatum, utrinque compressum.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand gekerbt. Der Rücken vorne etwas flach, hinten verlängert, an beiden Seiten abgeplattet.



fum. Striatum, striis longitudina-  
libus inaequalibus. Cavitas post-  
riorum canali ulata. Color albus,  
cavitas macula lata purpureo coe-  
rulea.

den Seiten zusammengebrückt, mit  
ungleichen Streifen der Länge nach  
besetzt. Die Höhlung ist ruckwärts  
rinnenartig ausgehöhlet. Weiß,  
mit einem breiten purpurblauen  
Flecke in der Höhlung.

Q. II. 9. Patella pen-  
tagona.

Q. II. 9. Der spani-  
sche Huth.

Testa pyramidata subquin-  
quangula, margine explana-  
to inaequali.

Die pyramidenförmige ein-  
germaßen fünfeckige Schale  
hat einen ausgebreiteten runden  
Rand.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa pyramidata, angulis quin-  
que obtusis, latere uno ampliore  
Basis explanata quinquangula, cre-  
nata. Vertex centralis obtusus.  
Color albidus, Fundi rubellus.

Die Schale ist pyramidenförmig  
mit fünf stumpfen Ecken, und ei-  
ner breiteren Seite. Der Rand  
ist ausgebreitet, und gekerbt. Der  
stumpfe Wirbel steht in der Mitte.  
Die Farbe ist weißlich, der Boden  
röthlich.

Q. III. Vertice acuminato eur-  
vato.

Q. III. Mit einem gespalzten krum-  
men Wirbel.

Q. III. 1. Patella unga-  
rica.

Q. III. 1. Die Matro-  
senkarpe.

*Linn. S. N. Sp. 761.*

*Belg.*



Belg. Lots - Kap, Rumph, Gall. Bonnet de Dragon. Dav.

Testa conica, vertice acuminato spiraliter curvato.

Die kegelförmige Schale hat einen zugespitzten schnirkelförmig gekrümmten Wirbel.

Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 13.

Gualt. Test. t. 9. f. IV.

Klein. Meth. Ostr. t. 8. f. 10.

Knor. Vergn. VI. 16. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 12. t. 107. 108. f.

Q. III. 2. Patella deflexa.

Q. III. 2. Die einseitige Napfschnecke.

Testa ovata, longitudinaliter sulcata, vertice dextror-um curvato.

Die Schale ist eysförmig, der Länge nach gestreift, mit einem nach der linken Seite gekrümmten Schnirkel.

Helbl. Abb. e. Priv. Ges. in Boehm, IV. I. t. 2. 10. f.

Testae ambitus ovatus. Dorsum torricatum, utrinque compressum, longitudinaliter sulcatum. Vertex obtusus, compressus, in latus dextrum decurvatus. Color fuscus, striae radiantes & fundus albus.

Der Umfang ist eysförmig. Der Rücken gewölbet, beiderseits zusammengedrückt, und der Länge nach gesurchet. Der Wirbel ist stumpf, zusammengedrückt, und nach der rechten Seite gekrümmt. Von schwarzer Farbe mit weißen Strahlen und Wirbelboden.

E c 4

Q. III. 3.





Q. III. 3. *Patella mamillaris*.

Q. III. 3. Die Kopfschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 764.*

*Belg. Getepelte Patelle.*

*Testa integra, conica, striata, vertice reflexo laevi.*

Die ganzrandige, kugelförmige, gestreifte Schale hat einen zurückgebogenen glatten Wirbel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. I. f. 17.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. I.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab. I. 7. t. 58. 59. f.*

Q. III. 4. *Patella tricarinata*.

Q. III. 4. Die dreynkieselige Napfschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 764.*

*Testa reticulato striata, antice tricarinata, vertice recurvo.*

Die nezförmig gestreifte Schale hat vorne dreyn Kiele, mit einem zurückgebogenen glatten Wirbel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 5.



Q. III. 5. *Patella pecti-*  
*nata.*

Q. III. 5. Die Kamm-  
patelle.

*Linn. S. N. Sp. 765.*

Testa integra, ouata, mem-  
branacea, squamis imbricatis,  
vertice reflexo submarginali.

Die ganzrandige, eysförmige,  
dünnhäutige Schale ist  
mit hohlen Schuppen ziegelför-  
mig bedeckt, und nahe am  
Rande mit einem zurückgebo-  
genen Wirbel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 6. *Patella lutea.*

Q. III. 6. Der gelbe  
Huth.

*Linn. S. N. Sp. 766.*

Testa integra, ovali, striata,  
vertice submarginali reflexo  
mucronato.

Die ganzrandige eysförmige  
gestreifte Schale, hat nahe  
am Rande einen zurückgeboge-  
nen gespizten Wirbel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Q. IV. Integerrimae , vertice  
obtus.

Q. IV. Mit ganz glatten Rand,  
und stumpfen Wirbel.

Q. IV. 1. Patella pellu-  
cida.

Q. IV. 1. Die Glas-  
patelle.

*Linn. S. N. Sp. 770.*

Testa ouata , ventricosa,  
membranacea pellucida , ra-  
diis coeruleis.

Die eysförmige , bäuchige ,  
dünnhäutige , und durchsichtige  
Schale , hat blaue Strahlen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 27.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. IV. 2. Patella testu-  
dinaria.

Q. IV. 2. Der Schild-  
krötennapf.

*Linn. S. N. Sp. 771.*

*Belg. Gedygerd Schild, Gall. Bouclier de Tortue. Dav.*

Testa integerrima ouata ,  
glabra, fusco maculata.

Die ganzrandige , eysförmige ,  
glatte Schale ist braun  
gefleckt.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 8. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. P.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 1. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 6. t. 45 — 48. f.*

*Walch Naturf. VIII. 4. t. 2. 3. f.*

Q. IV. 3. *Patella radiata.*

Q. IV. 3. Die Strahlpatelle.

Testa integerrima, ouata, striata, vertice radiisque fuscis.

Die ganzrandige, eiförmige, gestreifte Schale hat einen braunen Wirbel, mit gleichfarbigen Strahlen,

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ouata. Margo integerrimus. Dorsum longitudinaliter striatum. Vertex subcentralis. Color albidus Cavitae margaritacea Fundus & fasciae radiantes fuscae.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand ganz glatt. Der Rücken der Länge nach gestreift. Der Wirbel stehet beinahe in der Mitte. Von weißlicher Farbe. Die Höhlung hat einen Perlglanz. Der Boden und die strahligen Bänder sind braun.

Q. IV. 4.



Q. IV. 4. *Patella compressa*.

Q. IV. 4. Der Strohhuth.

*Linn. S. N. Sp. 772.*

*Belg. Geele Kapje.*

Testa integerrima, oblonga striata, dorso utrinque compresso.

Die ganzrandige länglicht gestreifte Schale hat einen beiderseits zusammenge-drückten Rücken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 25.*

*Knor. Vergn. VI. 28. t. 1. f.*

*Walch Naturf. VIII. 4. t. 1. f.*

Q. IV. 5. *Patella rustica*.

Q. IV. 5. Die Bauernschuppe.

*Linn. S. N. Sp. 773.*

Testa integerrima, conica sulcato striata, obtusa.

Die Schale ist ganzrandig kegelförmig, stumpfwirblig, mit Furchen und Streifen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 8. f. P.; t. 9. f. C.*

*Mart.*





Testa ouata reticulato striata, antice fissa, vertice recuruo.

Die eysförmige nezartig gestreifte Schale, ist vorne gespalten, mit einem zurückgebo- genen Schnirkel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 28.*

*Petiv. Gaz. t. 75. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. I. 12. t. 109. 110. f.*

*Müll. Zool. Dan. t. 24. f. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. V. 2. Patella graeca.

Q. V. 2. Das Kumpelgitter.

*Linn. S. N. Sp. 780.*

*Belg. Griechsche Patelle. Angl. Thimble Limpet. Pet. Gall. Le Treillis. Dav.*

Testa ouata, costata, decussatim striata, vertice perforato.

Die eysförmige geribbte, in die Quere gestreifte Schale hat einen durchbohrten Wirbel.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 6.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 1.*

*Petiv. Gaz. t. 80. f. 11.*

Klein.





*Klein. Melb. Ostr. t. 8. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 9. f. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. J.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 7.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 23. f.*

*Knor. Vergn. I. 30. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. II. t. 98. 99. f.*

Q. V. 3. *Patella nim-*  
*bosa.*

Q. V. 3. Das Strahl-  
gitter.

*Linn. S. N. Sp. 781.*

Testa ouata longitudinali-  
ter sulcata, transversim stria-  
ta, vertice perforato.

Die eysförmige Schale ist  
nach der Länge gefurchet, und  
in die Quere gestreift, mit  
einem durchbohrten Wirbel.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 3.*

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 1. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 9. f. Q. R. S. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. I. II. t. 91. 92. f; 12. t. 105. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 1. f. 3.*

Q. V. 4.



Q. V. 4. *Patella nodosa*.

Q. V. 4. Das Knottengitter.

*Angl.* Wart-rib'd Limpet.

Testa onata sulcata, costis nodosis, vertice perforato.

Die eysförmige gesuchte Schale hat knottige Ribben, und einen durchbohrten Wirbel.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 1. f. 6.

*Petiv. Gaz.* t. 153. f. 5.

*Mart. Conch. Kab.* l. II. t. 94. f.

Testa ovata. Dorsum longitudinaliter sulcatum, costis intermediis nodosis. Vertex subcentralis, pertusus; foramine oblongo. Color rubellus.

Die Schale ist eysförmig. Der Rücken der Länge nach gesuchtet, mit knottigen Zwischenribben. Der durchbohrte Wirbel steht an der Mitte. Die Oefnung ist länglicht. Von röthlicher Farbe.

R. Dentalium.

R. Die Zahnschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen.* 332.

Testa conico tubulosa, libera, utrinque pervia.

Die freye Schale ist kegelförmig, hohl, und an beiden Enden offen.

R. I.



R. 1. Dentalium ele-  
phantinum.

R. 1. Der Elephanten-  
zahn.

*Linn. S. N. Sp. 783.*

*Belg. Oliphants - tand. Rumph. Angl. Elephant's - Ttooth. Pet. Gall.*  
*Dentale. Dav.*

Testa decemangula, subar-  
cuata, striata.

Die Schale ist zehneckig,  
etwas gekrümmt, und gestrei-  
fet.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 8.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 2. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 33.*

*Gualt. Test. t. 10. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. H.*

*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. 1.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 5. f. A.*

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 19. t. 1. f.*

R. 2. Dentalium stria-  
tum.

R. 2. Das gestreifte  
Zähnen.



*Angl.* The striated Tooth - Shell. *Hill.*

Testa octangula, subarcuata, dense striata.

Die Schale ist achteckig, etwas gekrümmt, und mit Streifen dicht besetzt.

*Gualt.* Test. t. 10. f. G.

*Hill.* Hist. of. Anim. Pl. 7.

*Mart.* Konch. Kab. I. 1. t. 5. f. B.

Differt a praecedente crassitie minore, & striis densis numerosis.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch ihre Dünne, und die vielen gedrängt an einander stehenden Streifen.

R. 3. Dentalium Dentalis.

R. 3. Der Wolfszahn.

*Linn.* S. N. Sp. 785.

*Gall.* La dent de loup. *Dav.*

Testa subarcuata, longitudinaliter sulcata, tenui, rubella.

Die röthliche dünne Schale ist etwas gekrümmt, und nach der Länge gefurchet.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 41. f. 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

R. 4. Dentalium Enta-

R. 4. Der Hundszahn.

S.  
*Linn. S. N. Sp. 786.*

*Belg. Witte Wolfstand. Augl. The Dog - tooth Shell. Pet. Gall. ntales. Dav.*

Testa subarcuata, laeviss- Die Schale ist etwas ge-  
aa. frümmet, und ganz glatt.

*Bonn. Recr. cl. 1. f. 9.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 2. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 65. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 10. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. K. K.*

*Ginan. adr. II. t. 1. f. 2.*

*Knor. Vergn. I. 29. t. 4. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 1. t. 1. 2. f.*

R. 5. Dentalium poli-  
tum.

R. 5. Der Polirzahn.

452



Linn. S. N. Sp. 788.

Testa subarcuata , striis Die etwas gekrümmte Schale ist in die Quere mit gedräng-  
annularibus confertissimis. stehenden Streifen umgürtet.

Gualt. Test. t. 10. f. F.

Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 3. f. A.

S. Serpula.

S. Die Röhrenschnecke

Linn. S. N. Gen. 333.

Testa tubulosa , adna- Die Schale ist röhrig  
ta , saepius isthmis inter- und angewachsen, auch öf-  
cepta. ters durch Scheidewand  
abgetheilet.

S. 1. Serpula triquetra.

S. 1. Die dreieckig  
Röhre.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 795.*

*Gall. Vermiculaire blanc & triangulaire.*

Testa repente, flexuosa, triquetra. Die dreneckige Schale ist in einander geschlungen, und klebet auf andern Körpern fest.

*Gualt. Test. t. 10. f. P.*

*Bast. subs. I. t. 9. f. 2.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

S. 2. *Serpula filograna.* S. 2. Die Flechtenröhre.

*Linn. S. N. Sp. 797.*

Testis capillaribus, fasciculatis, ramosis, confluentibus. Mehrere haarförmige, büschelweise und ästig an einander verwachsene Schalen.

*Seb. Thes. III. t. 100. f. 8.*

*Koelr. Nov. Comm. Petr. VII, t. 16. f. 3.*



454



S. 3. *Serpula contor-*  
*uplicata.*

S. 3. Der Fischdarm.

*Linn. S. N. Sp. 799.*

*Gall. L'assemblage des bijoux.*

Testa rugosa, flexuosa, ca-  
rinata.

Die Schale ist runzelicht,  
geschlungen und gefaltet.

*Bonan. Recr. cl. 1. t. 20. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 4. f. D.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. 24. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 6.*

S. 4. *Serpula glome-*  
*rata.*

S. 4. Der Vogelldarm.

*Linn. S. N. Sp. 800.*

*Gall. Bijoux des oiseaux. Dav.*

Testa decussatim striata, con-  
torta, glomerata.

Die Schale ist kreuzweise  
gestreift, und klumpenweise  
in einander geschlungen.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 20. E.*

*Gualt. Test. t. 10. f. T.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. 23. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 7.*

S. 5.



S. 5. *Serpula lumbricalis*.

S. 5. Die Hornschlangenge.

*Linn. S. N. Sp. 801.*

*Belg. Zeeslangetje. Gall. Vilebrequin. Dav.*

Testa flexuosa, apice spirali.

Die geschlungene Schale hat eine schnirkelförmig gewundene Endspitze.

z solitaria.

z einzeln.

*Bonon. Recr. cl. 1. f. 20. A.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 10. f. Q. V.*

*Argenv. Conch. Pl. t. 4. f. 7.*

*Ginan. adr. II. t. 2. f. 14.*

*Knor. Vergn. II. 13. t. 1. f.*

—— ——— IV. 17 t. 2. f.

*Mart. Conch. Kab. I. 2. t. 12. f. B.*

β testis aggregatis.

β mit angehäuften Schalen.

*Adans. Seneg. Pl. II. f. 1.*

S. 6. *Serpula polythalamia*.

S. 6. Die Sandpfeffe.

F f 4

*Linn.*

456



*Linn. S. N. Sp. 802.*

*Angl. The chambered Vermiculus. Da Cost.*

*Testa ponderosa, tereti, con-*  
*camerata, bifurcata.*

Die schwere, runde Schale  
ist in Kammern abgetheilet,  
und zweytheilig.

*Seb. Thes. III. t. 49. f. V.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 6. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 5.*

**S. 7. Serpula arenaria. S. 7. Der Ochsendarm.**

*Linn. S. N. Sp. 803.*

*Belg. Hondsdarm. Rumph. Angl. Ovenshell. Pet.*

*Testa supra angulata, subtus*  
*planiuscula.*

Die Schale ist oben eckig,  
und unten flach.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 20. B.*

*Rumph. amb. t. 41. f. L.*

*Gualt. Test. t. 10. f. L. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 4. f. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 11. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. f. 19.*

**S. 8.**



S. 8. *Serpula anguina*.

S. 8. Der Hühnerdarm.

*Linn. S. N. Sp. 804.*

*Belg. Hornslangetje. Rumph.*

Testa tereti, rima longitu-  
dinali, apice cylindrico spi-  
rali.

Die runde Schale hat nach ih-  
rer Länge eine Spalte, und eine  
walzenartige schirkeiförmig  
gedrehte Endspitze

α laevis.

α glatt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 2.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. I. 2. t. 13. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

β angulata, & muricata.

β mit einer eckigen, und stach-  
lichten Schale.

*Rumph. amb. t. 41. f. H.*

*Mart. Konch. Kab. I. 2. t. 13. f. B.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

S. 9. *Serpula Penis*.

S. 9. Die Gießkanne.

*Linn. S. N. Sp. 806.*

*Belg. Venus - Schagt. Rumph. Angl. The wattering Pot. Gall. L'arro-  
soir. Dav.*



Testa tereti, extremitate Die runde Schale ist an  
lata, tubulis cylindricis per- dem breiten Ende mit walzen-  
tulä. förmigen Röhrchen durchsto-  
chen.

*Bonan. Mus. Kircb. cl. I. f. 38.*

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 3. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 7.*

*Valent. Abb. t. 10. f. 87.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 10. f. M.*

*Argenw. Conch. Pl. 3. f. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 28. t. 2. f.*


— — VI. 40. t. 1. f.

*Mart. Conch. Kab. I. 1. t. 7. f.*

— — berl. Beschaeft. II. 11. t. 1 — 5. f.

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 8.*



N O M I N A  
T R I V I A L I A  
O R D I N E A L P H A B E T I C O.

---

Benennungen  
d e r  
K o n c h y l i e n  
in alphabetischer Ordnung.

---

NOMENCLATOR GERMANICVS.  
Deutsche Benennungen.

Seite.

Mbrikosenstein

60. K. III. 5.

Achatbirne

319. I. V. 16.

Admiralstute

134. C. II. 2.

Antenbrut

6. B. 6.

Astersturmhaube

245. G. IV. 2.

Aster

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                          | Seite.          |
|--------------------------|-----------------|
| Astervenus blaustreifige | 53. K. II. 11.  |
| Agatmuschel              | 50. K. II. 8.   |
| Arche Noah               | 73. N. II. 1.   |
| Argus doppelter          | 158. D. I. 4.   |
| Argus Weibchen           | 172. D. IV. 1.  |
| Affel                    | 181. D. IV. 15. |
| Affelschnecke            | 276. H. II. 8.  |
| Auster gemeine           | 99. O. VI. 4.   |
| —— gezähnelte            | 99. O. IV. 5.   |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>B</b> abelsturm     | 308. I. V. 1.   |
| Bakassanmuschel        | 20. F. I. 5.    |
| Bandnadel braune       | 216. F. IV. 6.  |
| Band rothes            | 189. E. 11.     |
| Bandspindel            | 321. I. V. 19.  |
| Bartarche              | 74. N. II. 2.   |
| Barikneifer            | 12. D. 4.       |
| Bastardarche           | 75. N. III. 1.  |
| Bastardargus           | 156. D. I. 1.   |
| Bastardbauernmusik     | 134. C. II. 1.  |
| Bastarddrachenköpfchen | 171. D. III. 3. |

Bastard.



# Deutsche Benennungen.

|                           | Seite.          |
|---------------------------|-----------------|
| Vastardlampe              | 379. N. II. 10. |
| Vastardmuschel gestumpfte | 103. P. 4.      |
| Vastardrielline           | 24. F. II. 6.   |
| Vastardvenus              | 45. K. I. 3.    |
| Bauernkappe               | 444. Q. IV. 5.  |
| Bauernmuß                 | 142. C. II. 12. |
| Beetchen gekröntes        | 239. G. II. 10. |
| Bernstein Muster          | 103. P. 3.      |
| Besansfegel               | 278. H. III. 3. |
| — — aufgewickelte         | 279. H. III. 4. |
| Besansspindel gezackte    | 328. I. VI. 7.  |
| Beizung                   | 305. I. IV. 8.  |
| Beizer grauer             | 241. G. III. 2. |
| — — glatter               | 242. G. III. 3. |
| Bienenkörbchen            | 364. L. III. 3. |
| Birne getrocknete         | 297. I. III. 8. |
| Birnwalze                 | 224. F. IV. 16. |
| Bischofsmütze             | 217. F. IV. 8.  |
| Blase offene              | 187. E. 7.      |
| Blasentasche              | 95. O. III. 3.  |
| Blasenwalze               | 205. F. III. 1. |
| Blätterkamm               | 107. Q. I. 2.   |
| Biaulippe                 | 56. K. II. 17.  |

Blute

# MONENCLATOR GERMANICVS.

|                                | Seite.          |
|--------------------------------|-----------------|
| Blutohr                        | 400. N. IV. 6.  |
| Blutzahn                       | 420. O. III. 4. |
| Bocksaug                       | 434. Q. II. 5.  |
| Bockschnecke                   | 347. L. II. 1.  |
| Bohne                          | 208. F. III. 4. |
| Bohrer gefurchter              | 146. C. III. 3. |
| — — punktirter                 | 145. C. III. 1. |
| Bootsacke                      | 267. H. I. 3.   |
| Böcherbohrer                   | 192. E. 14.     |
| Brandfleck                     | 176. D. IV. 7.  |
| Brandhorn                      | 291. I. II. 5.  |
| Brandnadel braune              | 214. F. IV. 2.  |
| Braunlippe                     | 51. K. II. 9.   |
| Breitrand                      | 365. L. IV. 4.  |
| Brunette                       | 151. C. III. 9. |
| Buchstabennadel                | 327. I. VI. 6.  |
| Buchstabenporzellane arabische | 157. D. I. 3.   |
| Bund türkischer                | 340. XII. 4.    |
| Butterwecke gelbe              | 139. C. II. 9.  |

**C**auris gefleckte

174. D. IV. 4.

Dach

# Deutsche Benennungen.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Dach chinesisches     | 350. L. II. 5.  |
| Delphin geribbter     | 361. L. III. 7. |
| — gezackter           | 360. L. III. 6. |
| Dienestflügel         | 272. H. II. 3.  |
| Dicklippe             | 339. K. II. 3.  |
| Düfelfchnecke         | 303. I. IV. 7.  |
| Doppelribbe           | 366. L. V. 3.   |
| Dornspindel gefurchte | 325. I. VI. 4.  |
| Dose gefurchte        | 39. O. II. 15.  |
| — gewölbte            | 93. O. II. 14.  |
| Dofenschnecke         | 245. G. IV. 3.  |
| Drachenhaupt          | 174. C. IV. 5.  |
| Dreheck               | 41. I. 1.       |
| Dünnribbe             | 46. K. I. 4.    |
| Dünnschale            | 164. D. I. 12.  |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Eckhorn          | 252. G. VII. 1. |
| Eichelmuschel    | 69. M. 5.       |
| Eichenholzstutze | 140. C. II. 10. |
| Eismuschel       | 94. O. III. 1.  |
| Elephantenzahn   | 449. R. 1.      |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                | Seite.          |
|----------------|-----------------|
| Elster         | 357. L. III. 3. |
| Erbſenſchotte  | 15. E. 3.       |
| Erdbeere rothe | 33. G. 10.      |
| Eſelchen       | 170. D. III. 2. |
| Eſelohr        | 429. P. 4.      |
| Eſtrich        | 131. C. I. 8.   |
| En             | 183. E. 1.      |
| Eyerdotter,    | 414. O. I. 4.   |
| — geſchobener  | 415. O. I. 5.   |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Fahne                    | 118. R. 5.        |
| Fahnenmadel              | 214. E. IV. 3.    |
| Faltenklappe             | 65. L. 2.         |
| Faltenmund               | 376. N. II. 5.    |
| Faltenmadel              | 264. G. VIII. 13. |
| Faltennerite             | 424. O. III. 9.   |
| Faltenpatelle            | 433. Q. II. 5.    |
| Faltenschnede nezförmige | 212. F. III. 10.  |
| Faß                      | 231. G. I. 5.     |
| Feige                    | 190. E. 1.        |
| — linksgewundene         | 313. I. V. 8.     |

# Deutsche Benennungen.

|                           | Seite.          |
|---------------------------|-----------------|
| Feile                     | 95. O. III. 2.  |
| Felsengienmuschel         | 71. M. 8.       |
| Fenster Scheibe           | 105. P. 7.      |
| Festung                   | 434. Q. II. 4.  |
| Fischdarm                 | 454. S. 3.      |
| Fischernez                | 139. C. II. 8.  |
| Fischweiberhaube          | 430. Q. I. 1.   |
| Flachwirbel               | 376. N. II. 6.  |
| Flechtentröhre            | 453. S. 2.      |
| Fledermaus                | 219. F. IV. 11. |
| Fleischhorn               | 273. H. II. 1.  |
| — — — mächtiges           | 314. I. V. 9.   |
| Fleischlinse              | 26. F. III. 3.  |
| Flügelschnecke gebänderte | 274. H. II. 6.  |
| Flußpabstkrone            | 405. N. VI. 1.  |
| Flußperlmuschel           | 11. D. 3.       |
| Frieselporzellane         | 179. D. IV. 12. |
| Froschschnecke            | 294. I. III. 2. |
| Fuchs                     | 160. D. I. 7.   |
| Fuchsturm                 | 215. F. IV. 5.  |
| Füllhorn                  | 371. M. 1.      |
| Fußhorn                   | 296. I. III. 6. |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>G</b> artenbeetchen    | 238. G. II. 9.   |
| Gartenschnecke.           | 397. N. IV. 2.   |
| Gelbschmuz                | 177. D. IV. 8.   |
| Gespennst                 | 152. C. IV. 1.   |
| Gienmuschel nierenförmige | 69. M. 6.        |
| Gieskanne                 | 457. S. 9.       |
| Gitterhorn                | 254. G. VII. 4.  |
| Gittervenus               | 57. K. II. 18.   |
| Glasschirmmuschel         | 104. P. 6.       |
| Glasschnirkel             | 394. N. III. 18. |
| Glaspatelle               | 442. Q. IV. 1.   |
| Goldmund                  | 349. L. III. 4.  |
| Gondel                    | 226. F. V. 2.    |
| Gurke glatte              | 208. F. III. 5.  |
| Gürtelschnecke            | 388. N. III. 10. |
| Gürtelspindel             | 317. I. V. 14.   |
| Gürtelvenus               | 58. K. III. 2.   |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>H</b> ahnenherz | 38. G. 18.     |
| Hahnenkamm         | 106. Q. I. 1.  |
| Halbmond           | 409. N. VI. 6. |

Hahn

# Deutsche Benennungen

Seite.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Hammer polnischer  | 97. O. IV. 1.   |
| Harfe              | 246. G. V. 1.   |
| Hautschnecke       | 297. I. III. 7. |
| Hermelinschwanz    | 141. C. II. 11. |
| Herz dreysseitiges | 30. G. 5.       |
| — gelbes           | 35. G. 13.      |
| — gelbmündiges     | 34. G. 12.      |
| — glattes          | 35. G. 14.      |
| — knottiges        | 32. G. 8.       |
| — schuppiges       | 29. G. 4.       |
| Herzmuschel breite | 37. G. 16.      |
| — geribbte         | 28. G. 1.       |
| — große            | 34. G. 11.      |
| — kammähnliche     | 37. G. 17.      |
| Herztute           | 123. C. I. 1.   |
| Hexenmeister       | 334. K. I. 5.   |
| Hochrücken         | 185. E. 4.      |
| Hohlohr            | 427. P. 1.      |
| Holzspindel        | 320. I. V. 18.  |
| Hornmerle          | 419. O. III. 2. |
| Hornschlange       | 455. S. 5.      |
| Hühnerdarm         | 457. S. 8.      |
| Hundszahn          | 451. R. 4.      |



# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nuth, spanischer | 438. Q. II. 10.  |
| — gelber         | 441. Q. III. 6.  |
| Nuthschnirkel    | 190. N. III. 13. |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>N</b> ägertasche | 83. O. I. 5.   |
| Jakobsmuschel       | 61. O. I. 2.   |
| Nock                | 184. E. 3.     |
| Nfabelle            | 169. D. II. 7. |
| Nujubenkräusel      | 342. K. II. 7. |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>N</b> äfermuschel kleine | 1. A. 2.         |
| — — schuppige               | 1. A. 1.         |
| Näferschnecke               | 341. N. I. 1.    |
| Nammauster                  | 98. O. IV. 3.    |
| Nammblat                    | 18. Q. I. 3.     |
| Namelschnecke               | 276. H. III. 1.  |
| Namelotchen                 | 425. O. III. 11. |
| Nammuschel scharfröbige     | 91. O. II. 12.   |
| Nammipatelle                | 441. Q. III. 5.  |
| Nampfhahn                   | 271. H. II. 2.   |

Namm,

# Deutsche Benennungen.

Seite.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Kammvenus                  | 61. K. III. 8.  |
| Kanarienschnecke breite    | 280. H. III. 6. |
| — — — höckerige            | 275. H. II. 7.  |
| — — — knottige             | 281. H. III. 7. |
| Kanarienvogel              | 251. G. VI. 2.  |
| Kartalschnecke             | 380. N. II. 11. |
| Käsetutte                  | 131. C. I. 8.   |
| Kastanie große             | 301. I. IV. 2.  |
| Kätzchen geflecktes        | 148. C. III. 6. |
| Käsenzunge                 | 17. F. I. 1.    |
| Keil gedrehter             | 377. N. II. 7.  |
| Keilschnirkel eingesäumter | 375. N. II. 4.  |
| Keil                       | 43. I. 1.       |
| Kiebitz                    | 187. E. 8.      |
| Kornhorn gefurchtes        | 251. G. VI. 3.  |
| — — — körniges             | 243. G. III. 4. |
| Klammuschel bäuchige       | 10. D. 1.       |
| Klammuschel gezackte       | 63. L. 1.       |
| Klammuschel                | 112. Q. III. 5. |
| Klebbaufer                 | 102. P. 1.      |
| Kleid attalisches          | 235. G. II. 5.  |
| Klöppelkissen              | 129. C. I. 5.   |
| Knöpfchen glattes          | 182. D. IV. 17. |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                             | Seite           |
|-----------------------------|-----------------|
| Knottenbund                 | 341. K. II. 5.  |
| Knottengitter               | 448. Q. V. 4.   |
| Knottennabel                | 410. O. I. I.   |
| Knottenschelle              | 2 32. G. II. I. |
| Knottenschnecke runzelichte | 303. I. IV. 6.  |
| Knottensturmhaube           | 235. G. II. 4.  |
| Kofferhörnchen weißes       | 244. G. IV. I.  |
| Kompasmuschel               | 82. O. I. 4.    |
| Königsmantel                | 84. O. II. I.   |
| Kopfspatelle                | 440. Q. III. 3. |
| Korallenmuschel             | 85. O. II. 2.   |
| Korbmuschel fahle           | 40. H. 2.       |
| — — sprenglerische          | 39. H. 1.       |
| Korbvenus                   | 52. K. II. 10.  |
| Kornelkirsche               | 206. F. III. 2. |
| — — eingesäumte             | 207. F. III. 3. |
| Körnerschild                | 435. Q. II. 6.  |
| Kornknöpfchen               | 182. D. IV. 16. |
| Krabbenschnecke             | 269. H. I. 5.   |
| Krauschnecke                | 289. I. II. 3.  |
| Kräusel geförntes           | 343. K. II. 8.  |
| Kräuselschnecke gebänderte  | 396. K. I. 8.   |
| Kreidenschnecke             | 386. N. III. 7. |

# Deutsche Benennungen.

|                         | Seite.          |
|-------------------------|-----------------|
| Kronenbacke             | 154. C. IV. 4.  |
| Krontute                | 125. C. I. 2.   |
| — — schwarzbraune       | 126. C. I. 3.   |
| — — weiße               | 130. C. I. 6.   |
| Kröte                   | 166. D. II. 4.  |
| Kröten- <i>schnecke</i> | 292. I. III. 1. |
| Kuhaug                  | 386. N. III. 8. |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>L</b> agermuschel         | 53. K. II. 12.   |
| Lagervenus <i>punktierte</i> | 60. K. III. 6.   |
| Lagerwalze                   | 197. F. II. 2.   |
| Landcharte                   | 156. D. I. 2.    |
| Langohr                      | 197. F. I. 2.    |
| Langzennadel                 | 261. G. VIII. 9. |
| Laus                         | 179. D. IV. 13.  |
| Livreeschnecke               | 298. I. III. 9.  |
| Löffel                       | 437. Q. II. 9.   |
| Lorbeerblatt                 | 97. O. IV. 2.    |
| Löventute                    | 144. C. II. 14.  |
| Luchonesers- <i>schnecke</i> | 274. H. II. 5.   |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                       | Seite.           |
|-----------------------|------------------|
| <b>M</b> ahlermuschel | 11. D. 2.        |
| Mangosnadel           | 324. I. VI. 2.   |
| Mantel bandirter      | 87. O. II. 5.    |
| —— bunter             | 88. O. II. 7.    |
| —— gefleckter         | 90. O. VI. 9.    |
| —— gefurchter         | 86. O. II. 4.    |
| —— gewölbter          | 84. O. I. 6.     |
| —— glatter            | 89. O. II. 8.    |
| —— goldgelber         | 91. O. II. 11.   |
| —— langer             | 86. O. VI. 3.    |
| —— menningrothe       | 88. O. II. 6.    |
| Marmornadel           | 402. N. V. 2.    |
| Marmorohr             | 423. P. 3.       |
| Masernporzellane      | 168. D. I. 11.   |
| Matrosenkappe         | 438. Q. III. 1.  |
| Maul krummes          | 299. I. III. 11. |
| Maulbeere gezackte    | 300. IV. 1.      |
| —— lange              | 302. I. IV. 4.   |
| Maulwurf              | 162. D. I. 9.    |
| —— — graue            | 161. D. I. 8.    |
| Maus                  | 163. D. I. 10.   |
| Mennonitentate        | 130. C. I. 7.    |

# Deutsche Benennungen.

|                         | Seite.          |
|-------------------------|-----------------|
| Menschenherz            | 28. G. 2.       |
| Meereiche grosse        | 2. B. 1.        |
| Meertulpe.              | 4. B. 2.        |
| Messerheft              | 14. E. 2.       |
| Midasohr                | 196. F. I. 1.   |
| Miesmuschel gefärbte    | 111. Q. III. 4. |
| —— geferbte             | 110. Q. III. 2. |
| —— geribbte             | 113. Q. III. 6. |
| —— gemeine              | 110. Q. III. 3. |
| Milchporzellane         | 163. D. I. 11.  |
| Milchschale             | 408. N. VI. 5.  |
| Mittelherz              | 31. G. 6.       |
| Mohr bandirter          | 310. I. V. 4.   |
| Mohrenbauch             | 164. D. II. 1.  |
| Mohrenkrone             | 225. F. V. 1.   |
| Mönch                   | 137. C. II. 5.  |
| —— grauer               | 138. C. II. 6.  |
| Mondschncke aschengraue | 356. L. III. 1. |
| — — — gefielte          | 361. L. III. 8. |
| — — — knottige          | 257. L. III. 3. |
| — — — kräuselartige     | 355. L. II. 12. |
| — — — sturmhaubenartige | 354. L. II. 11. |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                              | Seite.          |
|------------------------------|-----------------|
| Morgenstern ausgeschnittener | 307. I. IV. 10. |
| Mundstück verkehrtes         | 378. N. II. 8.  |
| Musik wilde                  | 221. F. IV. 12. |
| Muskatenblüthe               | 70. M. 7.       |
| Muskatennuß                  | 253. G. VII. 2. |
| Münze guineische             | 172. D. IV. 2.  |
| Münze                        | 432. Q. II. 2.  |
| Münze polnische              | 237. G. II. 7.  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>N</b> abelberg  | 29. G. 3.         |
| Nabels oeneße      | 387. N. III. 9.   |
| Nadel aschengraue  | 262. N. VIII. 1.  |
| —— durchgestochene | 216. F. IV. 7.    |
| —— durchstochene   | 263. G. VIII. 2.  |
| —— gefärbte        | 259. G. VIII. 6.  |
| —— gekrönte        | 258. G. VIII. 5.  |
| —— gestricelte     | 260. G. VIII. 7.  |
| —— knottige        | 282. H. IV. 1.    |
| —— rostfarbige     | 258. G. VIII. 4.  |
| —— umwundene       | 261. G. VIII. 10. |



# Deutsche Benennungen.

Seite.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Nadel weisse        | 257. G. VIII 3.  |
| Nadelfeile          | 329. F. IV. 2.   |
| Nadelwalze rauhe    | 213. F. VI. 8.   |
| Nagelherz           | 31. G. 7.        |
| Nähnadel            | 260. G. VIII. 8. |
| Napfsschnecke blaue | 436. Q. II. 7.   |
| — — — dreykielige   | 439. Q. III. 2.  |
| — — — einseitige    | 440. Q. III. 4.  |
| Narrenkappe         | 66. M. 1.        |
| Nassauer            | 347. L. II. 2.   |
| Neptunsdose         | 82. O. I. 3.     |
| Nerite braune       | 413. O. I. 3.    |
| — — — brunttragende | 418. O. III. 1.  |
| Nezhorn             | 255. G. VII. 5.  |
| Nezschnecke         | 299. I. III. 10. |
| Neztute bandirte    | 138. C. II. 7.   |
| Notenschnecke       | 218. F. IV. 10.  |

**D**chsendarm

456. S. 7.

Dchsenherz unächtes

49. K. II. 6.

Del.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                      | Seite.          |
|----------------------|-----------------|
| Deßkuchen cckiger    | 295. I. III. 6. |
| — — — geribbter      | 295. I. III. 4. |
| — — — knottiger      | 194. I. III. 3. |
| Deßkrug              | 353. L. II. 50. |
| Dhr gestreiftes      | 428. P. 2.      |
| Dhrhorn              | 407. N. VI. 3.  |
| Olivenkern           | 210. F. III. 7. |
| Olivenwalze          | 198. F. II. 2.  |
| Orangenegel          | 133. C. I. 11.  |
| Oranienboprer        | 147. C. III. 4. |
| Dst. und Westmuschel | 36 G. 15.       |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>M</b>           |                 |
| abstkrone          | 217. F. IV. 9.  |
| Pagodenschnecke    | 350. L. II. 6.  |
| Pantoffel          | 431. Q. I. 2.   |
| Papierhaube        | 236. G. II. 6.  |
| Papierrolle        | 188. E. 9.      |
| Pavusmuschel       | 113. Q. III. 7. |
| Pellerontnerice    | 422. O. III. 7. |
| Perlmutter         | 108. Q. II. 1.  |
| Perspektivschnecke | 333. K. I. 3.   |

# Deutsche Benennungen.

## Seite.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Pferdefuß                   | 67. M. 3.       |
| Pferdehuß dorniger          | 71. M. 9.       |
| Pharaoschnecke              | 333. K. I. 4.   |
| Pilgrimsmuschel             | 8. O. I. 1.     |
| Pimpelchen                  | 303. I. IV. 5.  |
| Platwirbel                  | 147. C. III. 5. |
| Poda-graschnecke            | 268. H. I. 4.   |
| Polierzahn                  | 451. R. 5.      |
| Porzellanblase              | 193. E. 15.     |
| Posthorn                    | 122. B. 2.      |
| Prinzenfahne                | 193. E. 16.     |
| Purpurhorn gehörntes        | 286. I. I. 5.   |
| Purpurschnecke dreyflüglige | 287. I. II. 1.  |
| — — — dreyseitige           | 288. I. III. 2. |
| — — — vieleckige            | 292. I. II. 6.  |
| Pyramide glatte             | 330. K. I. 1.   |
| — — knottige                | 331. K. I. 2.   |

**S**autenkörbchen

76. N. III. 2.

Nebhun

229. G. I. 2.

Reisbrey Mondschnecke

346. L. I. 2.

Reis

# NOMENCLATOR GERMANICVS,

|                        | Seite.          |
|------------------------|-----------------|
| Reiskorallenporzellane | 180. D. IV. 14. |
| Ring                   | 173. D. IV. 3.  |
| Rinne                  | 13. E. 1.       |
| Röhre dreyeckige       | 452. S. 1.      |
| Rostfleckchen          | 177. D. IV. 9.  |
| Rothmund               | 148. G. V. 3.   |
| Rübe                   | 191. E. 13.     |
| Rübe dicke             | 306. I. IV. 9.  |
| —— langschnabelige     | 312. I. V. 6.   |
| Rudolphsschnecke       | 247. G. V. 2.   |
| Runzelbund             | 352. L. II. 8.  |
| Runzelgitter           | 446. Q. V. 2.   |
| Runzelklappe           | 100. O. IV. 6.  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Safranträusel      | 343. K. II. 9.  |
| Säge               | 42. I. 4.       |
| Salzkornporzellane | 166. D. II. 3.  |
| Sammelmuschel      | 78. N. IV. 2.   |
| Sandpfeife         | 455. S. 6.      |
| Sandtelline        | 25. F. III. 1.  |
| Sandtrutte         | 143. C. II. 13. |

# Deutsche Benennungen.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Sattel polnischer             | 101. O. IV. 7.   |
| Säumchen gefaktenes           | 241. G. III. 1.  |
| Scharfrinne                   | 366. L. V. 2.    |
| Scheibenschnecke              | 375. N. II. 3.   |
| Schellenhorn                  | 228. G. I. 1.    |
| Schellenschnecke französische | 195. E. 17.      |
| Schiffsboot dicker            | 121. B. 1.       |
| Schiffsfahne                  | 345. K. III. 2.  |
| Schildkrötennapf              | 442. Q. IV. 2.   |
| Schildkrötenpocke             | 5. B. 5.         |
| Schildkrötenporzellane        | 159. D. I. 5.    |
| Schildkrötentute              | 137. C. II. 3.   |
| Schildmuschel achte           | 62. K. IV. 1.    |
| Schindchen                    | 24. F. II. 5.    |
| Schinke edle                  | 116. R. 2.       |
| — — geräucherte               | 116. R. 1.       |
| — — lange                     | 117. R. 4.       |
| Schlammuschnecke              | 384. N. III. 4.  |
| Schlangenhaut                 | 353. L. II. 9.   |
| Schlangenhorn                 | 390. N. III. 12. |
| Schlangenkopf                 | 103. P. 5.       |
| — — — der grosse              | 165. D. II. 2.   |
| Schlauchdattel dicke          | 202. F. II. 3.   |
| Schminkeplästerchen           | 302. I. IV. 3.   |

Schnauz

# NOMENCLATOR GERMANICVS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Schnauzennadel                    | 323. I. VI. 1.   |
| Schnepfentopf dorniger            | 286. I. I. 4.    |
| — — — gezackter                   | 285. I. I. 3.    |
| Schnepfennadel gedörnte           | 326. I. VI. 5.   |
| Schnepfenschnabel                 | 282. I. I. 1.    |
| Schnirkel gefleckter              | 380. N. II. 12.  |
| — — — verkehrter                  | 391. N. III. 15. |
| Schnirkelmondschnecke             | 355. L. II. 13.  |
| Schnirkelnadel abgestuzte         | 401. N. V. 1.    |
| — — — braune                      | 404. N. V. 5.    |
| — — — gefaltene                   | 403. N. V. 3.    |
| — — — gefleckte                   | 404. N. V. 4.    |
| Schnirkelscheibe                  | 382. N. III. 2.  |
| Schnirkelschnecke ausgeschnittene | 378. N. II. 9.   |
| — — blaue                         | 392. N. III. 16. |
| — — bunte                         | 398. N. IV. 4.   |
| — — dickschalige                  | 408. N. VI. 4.   |
| — — gemalte                       | 397. N. IV. 3.   |
| — — lebendig gebährende           | 393. N. III. 17. |
| — — offene                        | 399. N. IV. 5.   |
| Schnurbund                        | 342. K. II. 6.   |
| Schnurwalze                       | 212. F. IV. 1.   |
| Schraube alte                     | 567. L. V. 4.    |
| — — bunte                         | 365. L. V. 1.    |

Schup-

# Deutsche Benennungen.

|                                | Seite.           |
|--------------------------------|------------------|
| Schuppenbezoar                 | 238. G. II. 8.   |
| Schüßelchen                    | 90. O. II. 10.   |
| Schwalbe                       | 170. D. III. 1.  |
| Schwarzang                     | 178. D. IV. 11.  |
| Schwarzohr                     | 400. D. IV. 7.   |
| Schweizerhose gezackte         | 277. H. III. 2.  |
| Schwimmuschnecke breitfurchige | 426. O. III. 13. |
| — dicklippige                  | 412. O. I. 2.    |
| — gesiederte                   | 420. O. III. 5.  |
| — gefurchte                    | 416. O. I. 7.    |
| — geribbte                     | 424. O. III. 10. |
| — glatte                       | 421. O. III. 6.  |
| — grüne                        | 419. O. III. 3.  |
| — stumpfe                      | 423. O. III. 8.  |
| Seenusß                        | 68. M. 4.        |
| Seepocke                       | 3. B. 2.         |
| Seetonne                       | 344. K. III. 1.  |
| Segler breitkieliger           | 120. A. I. β.    |
| — papierner                    | 119. A. I.       |
| — schmalkieliger               | 119. A. I. α.    |
| Silbermund bunter              | 359. L. III. 5.  |
| — geribbter                    | 358. L. III. 4.  |
| — grüner                       | 348. L. II. 3.   |



# MONENCLATOR GERMANICVS.

|                          | Seite.          |
|--------------------------|-----------------|
| Skorpionschnecke         | 290. I. II. 4.  |
| Smaragdschnecke          | 249. G. V. 5.   |
| Sommerprosse             | 271. H. II. 1.  |
| Sonnenhorn               | 337. K. I. 10.  |
| Sonnenschirm             | 436. Q. II. 8.  |
| Sonnenstrahl gestreifter | 18. F. I. 3.    |
| — glatter                | 23. F. II. 4.   |
| — kleiner                | 25. F. II. 7.   |
| Spalte                   | 445. Q. V. 1.   |
| Spielmuschel             | 52. K. II. 7.   |
| Spindel französische     | 309. I. V. 3.   |
| — gefleckte              | 317. I. V. 13.  |
| — gezackte               | 312. I. V. 7.   |
| — javanische             | 309. I. V. 2.   |
| — indische               | 311. I. V. 5.   |
| — nordische              | 315. I. V. 11.  |
| — rothbraune             | 318. I. V. 15.  |
| — zweifelhige            | 314. I. V. 10.  |
| Spinne                   | 283. I. I. 2.   |
| Spizdattel               | 203. F. II. 4.  |
| Spizsäule                | 338. K. II. 1.  |
| Spizenrolle              | 150. C. III. 8. |
| Sporn                    | 351. L. II. 7.  |

# Deutsche Benennungen.

Seite.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Stachelnadel höckerige    | 325. I. VI. 3.   |
| — schwarze                | 329. I. VI. 9.   |
| Staatenfahne              | 189. E. 10.      |
| Steinbohrer               | 7. C. 1.         |
| — geribbter               | 8. C. 2.         |
| Steinchen                 | 248. G. V. 4.    |
| Steinkern                 | 92. O. II. 13.   |
| Steinmuschel              | 109. Q. III. 1.  |
| Steckmuschel gedornite    | 117. R. 3.       |
| Sternnadel                | 265. H. I. 1.    |
| Sternpatelle              | 432. Q. II. 1.   |
| Steruporzellane           | 178. D. IV. 10.  |
| Strahlgitter              | 447. Q. 5. 3.    |
| Strahlpatelle             | 443. Q. IV. 3.   |
| Strahlscheibe             | 61. K. III. 7.   |
| Strahlscheide blaue       | 16. E. 4.        |
| Strandmondschnecke        | 346. L. I. 1.    |
| Strandnerite              | 417. O. II. 2.   |
| Stricknadel               | 256. G. VIII. 1. |
| Strohhut                  | 444. Q. IV. 4.   |
| Stümpfchen                | 42. I. 3.        |
| Stumpfmuschel stachlichte | 41. I. 2.        |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                         | Seite.           |
|-------------------------|------------------|
| Sturmhaube dicklippige  | 230. G. I. 3.    |
| — gefurchte             | 230. G. I. 4.    |
| — gestricke             | 233. G. II. 2.   |
| — rothe                 | 234. G. II. 3.   |
| <br>                    |                  |
| Passer rauhe            | 96. O. III. 4.   |
| — wellenförmige         | 94. O. II. 16.   |
| Taubchen                | 279. H. III. 4.  |
| — brütendes             | 209. F. III. 6.  |
| — trauendes             | 211. F. III. 9.  |
| Taubeney                | 186. E. 6.       |
| Teichhorn               | 406. N. IV. 2.   |
| Tellinmuschel blaßrothe | 21. F. II. 1.    |
| — dreyeckige            | 27. F. III. 4.   |
| — dunkelrothe           | 22. F. II. 2.    |
| — eckige                | 19. F. I. 4.     |
| — runzelichte           | 18. F. I. 2.     |
| — scharfrandige         | 22. F. II. 3.    |
| — schuppige             | 26. F. III. 2.   |
| — unächte               | 20. F. I. 6.     |
| Tiefernadel             | 257. G. VIII. 2. |

# Deutsche Benennungen.

|                  | Seite.          |
|------------------|-----------------|
| Tiegerporzellane | 167. D. II. 5.  |
| Tiegertüte       | 127. C. I. 4.   |
| Tiegerzunge      | 158. K. III. 1. |
| Topf             | 227. F. V. 3.   |
| Treppe           | 250. G. VI. 1.  |
| Trinkschale      | 445. Q. IV. 6.  |
| Tritonschnecke   | 316. I. V. 12.  |
| Trommelschraube  | 368. L. V. 6.   |
| — gestreifte     | 368. L. V. 5.   |
| Tulpe            | 153. C. IV. 3.  |
| Tute guineische  | 136. C. II. 4.  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Vase               | 221. F. IV. 13. |
| — gezackte         | 223. F. IV. 15. |
| — rothmündige      | 222. F. IV. 14. |
| Venusmuschel ächte | 44. K. I. 1.    |
| — aderige          | 59. K. III. 4.  |
| — ausgeflehte      | 48. K. II. 4.   |
| — breitblättrige   | 48. K. II. 3.   |
| — gereifte         | 47. K. II. 2.   |
| — schiefe          | 49. K. II. 5.   |

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                      | Seite.          |
|----------------------|-----------------|
| Venusmuschel warzige | 46. K. II. 1.   |
| — weißbackige        | 55. K. II. 5.   |
| — weitlippige        | 54. K. II. 13.  |
| — wellenförmige      | 54. K. II. 14.  |
| Vielfußschnecke      | 270. H. I. 16.  |
| Vogeldarm            | 454. S. 4.      |
| Vogelfuß             | 266. H. I. 2.   |
| Vogelmuschel         | 114. Q. III. 8. |
| Vortreppe            | 320. I. 5. 17.  |


|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Wachsschnirkel     | 374. N. II. 2.   |
| Wafelmuschel       | 56. K. II. 17.   |
| Waldhorn           | 383. N. III. 3.  |
| Waldschnecke       | 395. N. IV. 1.   |
| Walffischpocke     | 4. B. 4.         |
| Walzenporzellane   | 169. D. II. 8.   |
| Warzendotter       | 415. O. I. 6.    |
| Warzenschnirkel    | 391. N. III. 14. |
| Waschbecken        | 66. M. 2.        |
| Weberspuhl kleiner | 184. E. 2.       |

# Deutsche Benennungen

|                           | Seite            |
|---------------------------|------------------|
| Weib altes                | 45. K. I. 2.     |
| Weilchen armes            | 210. F. III. 8.  |
| Weinbergsschnecke gemeine | 385. N. III. 5.  |
| — links gewundene         | 385. N. III. 6.  |
| Weißaug                   | 175. D. IV. 6.   |
| Weitaug                   | 160. D. I. 6.    |
| Wellenhorn                | 253. G. VII. 3.  |
| Wellenmerite              | 425. O. III. 10. |
| Wellenspinde              | 322. I. V. 20.   |
| Wendeltreppe ächte        | 362. L. IV. 1.   |
| — gemeine                 | 363. L. IV. 2.   |
| Winkelhorn                | 389. N. III. 11. |
| Winkelschnecke            | 335. K. I. 7.    |
| Widderhorn                | 383. N. III. 3.  |
| Wolfszahn                 | 450. R. 3.       |
| Wolkenbacke               | 153. C. IV. 2.   |
| Wolkenrolle               | 149. C. II. 7.   |
| Wulst                     | 186. E. 5.       |
| Wulstknöpfchen            | 338. K. II. 2.   |
| Würfelkräusel             | 336. K. I. 9.    |


# NOMENCLATOR GERMANICVS.

|                        | Seite.          |
|------------------------|-----------------|
| Zähnen gestreiftes     | 449. R. 2.      |
| Zahnschraube gefleckte | 369. L. V. 7.   |
| Zahnwirbel             | 381. N. II. 13. |
| Ziegelherz             | 32. G. 9.       |
| Zirkelbohrer           | 145. C. III. 2. |
| Zirkelscheibe          | 59. K. III. 3.  |
| Zwibelschale           | 102. P. 2.      |
| Zwirntute              | 132. C. I. 10.  |



# NOMENCLATOR BELGICVS.

## Holländische Benennungen.



|                          | Pag.              |
|--------------------------|-------------------|
| A doublet, de griekische | 53. K. II. 12.    |
| Aardbesie                | 33. G. 10.        |
| Achaat - gaapcr          | 51. K. II. 8.     |
| Achaatje                 | 200. F. II. 2. η. |

Achaat-



# Holländische Benennungen.

Pag.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Achaat-peer           | 319. I. V. 16.   |
| Achaat-toot           | 154. C. IV. 3.   |
| Adama - doublet       | 93. O. II. 14.   |
| Admiral, opper        | 134. C. II. 2.   |
| Alykruik              | 346. L. I. 1.    |
| — geworte             | 426. O. III. 13. |
| Arabische Lettershorn | 157. D. I. 3.    |
| Arakans-garen         | 132. C. I. 10.   |
| Arke Noachs foort.    | 74. N. II. 2.    |
| Argus, dubbelde       | 158. D. I. 4.    |
| Argus Oogen, gebande  | 295. I. III. 4.  |

## Baardnyper .

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Babilonfe Tooren      | 12. D. 4.      |
| Bacassan doublet      | 308. I. V. 1.  |
| Bagyne - drolle       | 20. F. I. 3.   |
| Bak gekroonde         | 331. K. I. 2.  |
| Bakje bruingebandeerd | 225. F. V. 1.  |
| Bandpen               | 193. E. 15.    |
| — genobelde           | 214. F. IV. 4. |
| Banket hammetje       | 216. F. IV. 6. |
|                       | 24. F. II. 5.  |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                           | Pag.            |
|---------------------------|-----------------|
| Baſtert - Argus           | 156. D. I. 1.   |
| Baſtert - Oranje Admiral  | 146. C. III. 3. |
| Baſtert - tygers katje    | 134. C. II. 1.  |
| Baſtert - Wewers ſpoeltje | 184. E. 2.      |
| Beddetje, geſtreepte      | 239. G. II. 10. |
| Belhorn, franiſche        | 195. E. 17.     |
| — geknobbelde             | 232. G. II. 1.  |
| — geplekte                | 231. G. I. 5.   |
| — geribbde                | 228. G. I. 1.   |
| Bernſteen - Oeſter        | 103. P. 3.      |
| — paariſche               | 102. P. 3.      |
| Beuldouplet               | 15. E. 3.       |
| Bezaan Knop, getaakte     | 318. I. VI. 7.  |
| Bezaantje                 | 278. H. III. 3. |
| — opgerolde               | 279. H. III. 5. |
| Bezoar, geſchubde         | 238. G. II. 8.  |
| — gevlackte               | 239. G. II. 9.  |
| Boerenjonge               | 252. G. VII. 1. |
| Boeren Myſik              | 142. C. II. 12. |
| Boetje                    | 210. F. III. 7. |
| Bokje                     | 347. L. II. 1.  |
| Bonne je                  | 432. Q. II. 1.  |
| Bonje                     | 208. F. III. 4. |

# Holländische Benennungen

|                      | Pag.            |
|----------------------|-----------------|
| Bootshaak Wuifje     | 267. H. I. 3.   |
| Bostrappen           | 320. I. V. 17.  |
| Boterweg             | 140. C. II. 9.  |
| Brana Hoorn dubbelde | 291. I. II. 5.  |
| Brandvlakje          | 176. D. IV. 7.  |
| Broinet - toot       | 151. C. III. 9. |
| Buitslakje           | 338. K. II. 1.  |
| Bultje               | 279. H. III. 4. |
| — gevoord            | 250. G. VI. 1.  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Castanje, bandeerde | 301. I. IV. 2. |
|---------------------|----------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Daaadel          | 198. F. II. 2.  |
| — swarte         | 201. F. II. 2.  |
| Davids harp      | 246. G. V. 1.   |
| Diklip           | 339. K. II. 3.  |
| Dokje huifje     | 119. A. 1.      |
| Dolphyn, getakte | 360. L. III. 6. |
| Doyer, platte    | 415. O. I. 5.   |

Draakje

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                   | Pag.            |
|-------------------|-----------------|
| Draakje           | 175. D. IV. 5.  |
| Duifje, broedende | 209. F. III. 6. |
| Duizend been      | 270. H. I. 6.   |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>E</b> cken - houts toot | 140. C. II. 10. |
| Eende - Schulpe            | 6. B. 6.        |
| Ezeltje                    | 171. D. III. 2. |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>F</b> oelie - Bladeren | 70. M. 7.      |
| Fonteinbak                | 66. M. 2.      |
| Fortrefse                 | 434. Q. II. 3. |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>G</b> apper, eeviger | 8. C. 2.        |
| Gelsmetje               | 177. D. IV. 8.  |
| Geneefche toot          | 136. C. II. 4.  |
| Gnemoë hoorn            | 317. I. V. 13.  |
| Goldlaken               | 150. C. III. 8. |

Goud-

# Holländische Benennungen.

|          | Pag.           |
|----------|----------------|
| Goudmond | 349. L. II. 4. |
| Grasje   | 432. Q. II. 2. |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>H</b> aanekam  | 106. Q. I. 1.            |
| — getakte         | 107. Q. I. 2.            |
| Hammerje, gedoord | 117. R. 3.               |
| Hart, blaasagtig  | 37. G. 16.               |
| Hart toot         | 124. C. I. I. $\alpha$ . |
| — roodt           | 124. C. I. I. $\beta$ .  |
| Hermelin Staart   | 141. C. II. 11.          |
| Holzeoor, groot   | 427. P. 1.               |
| Honds darm        | 456. S. 7.               |
| Hoogruggetje      | 186. E. 5.               |
| Hornslangetje     | 457. S. 8.               |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>J</b> aager - Weytafch   | 83. O. I. 5.  |
| Jacobs - doublet, spaanfche | 81. O. I. 2.  |
| Jacobs Kruck                | 226. F. V. 2. |

Jacobs

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                  | Pag.           |
|------------------|----------------|
| Jacobs - schulp. | 81. O. I. 1.   |
| Jamboeze, witte  | 185. E. 4.     |
| Indian           | 311. I. V. 5.  |
| Jokje            | 185. E. 3.     |
| Joppe - doublet  | 82. O. I. 3.   |
| Isabelle         | 169. D. II. 7. |
| Juffertje, rood  | 25. F. II. 7.  |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>K</b> aaphorn  | 156. D. I. 2.    |
| Kaas, groene.     | 132. C. I. 9.    |
| Kamelhoorn        | 276. H. III. 1.  |
| Kamelotje         | 425. O. III. 11. |
| Kanartje, gebande | 275. H. II. 7.   |
| — geblomde        | 280. H. III. 6.  |
| — gebulde         | 281. H. III. 7.  |
| Kapje, gedooord   | 435. Q. II. 5.   |
| Kapje, geele      | 444. Q. IV. 4.   |
| — gestraalte      | 436. Q. II. 7.   |
| Karkal            | 380. N. II. 11.  |
| Kasket, graeuwe   | 241. G. III. 2.  |

# Holländische Benennungen.

|                           | Pag.               |
|---------------------------|--------------------|
| Katetonge                 | 18. F. I. 1.       |
| Katje, geplekte           | 148. C. III. 6.    |
| —— blaauwe                | 170. D. III. 1.    |
| Kauris blaauwe            | 173. D. IV. 3.     |
| —— gemeene geele          | 173. D. IV. 2.     |
| Kemphaantje               | 271. H. II. 2.     |
| Kievits - Ey              | 188. E. 8.         |
| —— witte                  | 187. E. 6.         |
| Kindje, gebakerde         | 364. L. IV. 3.     |
| Kinkhorn                  | 316. I. V. 12.     |
| Kliphorn, getygerde       | 167. D. II. 5.     |
| Knobbelhorn               | 321. I. V. 19.     |
| —— bonte                  | 354. L. II. 10.    |
| Knoll, geknobbelde        | 306. I. IV. 9.     |
| —— langestaarte gladde    | 312. I. V. 6.      |
| Knollhorn                 | 191. E. 13.        |
| Kofferhoortje             | 244. G. IV. 1.     |
| Kokhaan, bonte            | 38. G. 18.         |
| Kompas - Schulp           | 82. O. I. 4.       |
| Königs Mantel             | 84. O. II. 1.      |
| Koral - doublet           | 85. O. II. 2.      |
| Korelye - Knoopje         | 182. D. IV. 16.    |
| Kornoelkersje gestippelte | 207. F. III. 2. β. |

Kor-



# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                         | Pag.               |
|-------------------------|--------------------|
| Kornoeltje, gebandeerde | 206. F. III. 2. 2. |
| Kousdoublet, getireepte | 45. K. I. 3.       |
| Krabbe, geele           | 269. H. I. 5.      |
| Kroon - hoorn           | 125. C. I. 2.      |
| — tuetee                | 126. C. I. 3.      |
| Knipers - Boor          | 192. E. 14.        |
| — gegranuleerde         | 145. C. III. 1.    |
| — gladde                | 251. G. VI. 2.     |
| — witte gevoorde        | 145. C. III. 2.    |
| Kwaker, gestraalde      | 52. K. II. 10.     |
| Kwalle - Bootje         | 393 N. III. 16.    |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>L</b> andcharten, westindische | 144. C. II. 14. |
| Laurierblad                       | 97. O. IV. 2.   |
| — gekamd                          | 108. Q. I. 3.   |
| Lazarus Klappen, getakte          | 64. L. I.       |
| Leger, turkische                  | 61. K. III. 6.  |
| Letterschulp, langaagtige         | 62. K. IV. 1.   |
| Livrey - hoorn                    | 298. I. III. 9. |
| Lohoensche Hoorntje               | 274. H. II. 5.  |

# Holländische Benennungen

Lotskap Pag. 439. Q. III. 1.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>M</b> aagt - Bloem   | 75. N. III. 1.   |
| Malpriema               | 256. G. VIII. 1. |
| Mantel, gebandeerde     | 87. O. II. 5.    |
| — — gestippelte         | 89. O. II. 7.    |
| Mauger Naalde           | 324. I. VI. 2.   |
| Mazelen                 | 168. D. II. 6.   |
| Mennonist - toot        | 130. C. I. 7.    |
| Meshammer               | 97. O. IV. 1.    |
| Messehecht              | 14. E. 2.        |
| Midas - Oor             | 196. F. I. 1.    |
| Modervlakje             | 244. G. III. 5.  |
| Moerberzie, langverpige | 302. I. IV. 4.   |
| Moerbey, getakte        | 300. I. IV. 1.   |
| — — graeuwe             | 276. H. II. 8.   |
| Mol                     | 152. D. I. 9.    |
| — graeuwe               | 161. D. I. 8.    |
| — roode                 | 161. D. I. 7.    |
| Monniks - Kappe         | 216. F. IV. 7.   |
| Mossel                  | 110. Q. III. 3.  |
| — breede purpuragtige   | 113. Q. III. 5.  |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                | Pag.              |
|----------------|-------------------|
| Muis           | 163. D. I. 10.    |
| Munnik graeuwē | 201. F. II. 2. 2. |
| — —            | 137. C. II. 5.    |
| Musikhoorn     | 218. F. IV. 10.   |
| — — wilde      | 221. F. IV. 11.   |
| Muts poolſche  | 171. D. III. 3.   |
| — —            | 237. G. II. 7.    |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>N</b> aalde - pen      | 260. G. VIII 7. |
| Nagel doublet , gedoornte | 31. G. 7.       |
| Nagel - ſchulp            | 32. G. 9.       |
| Navel - Slak              | 387. N. III. 9. |
| — —                       | 410. O. I. 1.   |
| Net - tootje              | 138. C. II. 7.  |
| Noachs Arck , rechte      | 73. N. II. 7.   |
| Noote Moskat , getakte    | 253. G. VII. 3. |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>O</b> cean - hoorn | 289. I. II. 5. |
| Oeſter                | 99. O. IV. 2.  |

## Holländische Benennungen.

|                            | Pag.             |
|----------------------------|------------------|
| Oester gedraaide           | 72. N. I. 1.     |
| — okergeele                | 71. M. 8.        |
| Offerhoorn, witte          | 224. F. IV. 16.  |
| Oiitelhoornkje             | 304. I. IV. 7.   |
| Olyfaats, tand             | 449. R. 1.       |
| Olyhoorn, diklippige       | 230. G. I. 3.    |
| Olykock, gebulde           | 294. I. III. 3.  |
| Oorhoorn                   | 299. I. III. 11. |
| Oorfhulp, witte            | 408. N. VI. 5.   |
| Oranje - Mantel            | 92. O. II. 12.   |
| Orgelpypen                 | 13. E. 1.        |
| Oit en Weft - doublet      | 36. G. 15.       |
| Oude Wyfs fhulp gerimpelde | 45. K. I. 2.     |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> aadehoorn             | 292. I. III. 1. |
| Paardevoetje                   | 67. M. 3.       |
| Paertje                        | 182. D. IV. 17. |
| Pantofeltje                    | 431. Q. I. 2.   |
| Papier - turkfe, zonder lippen | 236. G. II. 6.  |
| — — — porcellain horn          | 164. D. I. 12.  |
| Papier-Kasket, volwaffe turkfe | 235. G. II. 4.  |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                                | Pag.                 |
|--------------------------------|----------------------|
| Papiere Nautilus, breed kielde | 120. A. I. $\beta$ . |
| Parlslakke                     | 121. B. I.           |
| Patelle getepelte              | 440. Q. III. 3.      |
| — — griekifche                 | 446. Q. V. 2.        |
| Patrys horn                    | 229. G. I. 2.        |
| Pauſe Kroon                    | 218. F. IV. 9.       |
| — — — weſtindiſche             | 325. I. VI. 4.       |
| Pelicans - Poot                | 266. H. I. 2.        |
| Pen, gekartede                 | 258. G. VIII. 5.     |
| — — — omwondene                | 261. G. VIII. 10.    |
| Pennhoorn                      | 217. F. IV. 8.       |
| — — rauwe                      | 213. F. IV. 2.       |
| Peer, gedroyede                | 297. I. III. 8.      |
| Perle - moer ſchulp            | 108. Q. II. I.       |
| — — — — lange                  | 429. P. 4.           |
| Perspectiv - hoorn             | 333. K. I. 3.        |
| Petool - hoorn                 | 343. L. II. 2.       |
| Pickenier                      | 261. G. VIII. 9.     |
| Pimpeltje                      | 203. I. IV. 5.       |
| Piffeped                       | 181. D. IV. 15.      |
| Podagra - Krefst               | 268. H. I. 4.        |
| Poelorontje                    | 422. O. III. 7.      |
| Pofferdoubled, gerib'd         | 78. N. IV. I.        |

# Holländische Benennungen.

|                            | Pag.              |
|----------------------------|-------------------|
| Pokje                      | 174. D. IV. 4.    |
| Porphyry Daadel            | 197. F. II. 1.    |
| Porphyrysteene Daadel      | 200. F. II. 2. 5. |
| Porcelain hoorn            | 183. E. 1.        |
| Pothoorentje               | 122. B. 2.        |
| Pothoorn , europische      | 382. N. III. 1.   |
| — — gebandeerde            | 383. N. III. 10.  |
| Prince Begræfenis          | 199. F. II. 2. 9. |
| Prince Robertshoorn        | 334. K. I. 4.     |
| Prince - Vlag              | 193. E. 16.       |
| Pruim                      | 209. F. III. 5.   |
| Purper - Hoorn gebandeerde | 287. I. I. 5.     |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>P</b> aap             | 312. I. V. 7.   |
| Ramshoorn                | 383. N. III. 3. |
| Raspdoulet               | 95. O. III. 2.  |
| Remies                   | 25. F. III. 1.  |
| Rivier Pauze Kroon       | 405. N. VI. 1.  |
| Rood . bandje            | 190. E. II.     |
| Rood - Oog               | 418. O. III. 1. |
| Rootshoorn met Moesjeses | 302. I. IV. 3.  |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                             | Pag.             |
|-----------------------------|------------------|
| Rorzdoulet                  | 71. M. 9.        |
| Rys - Korrel                | 180. D. IV. 14.  |
| Ryſtenbry - hoorentje       | 243. G. III. 4.  |
| <b>S</b> cheppertje         | 283. I. I. 1.    |
| Scherfje                    | 49. K. II. 5.    |
| Shild , getygerd            | 442. Q. IV. 2.   |
| Schildpad - hoorn           | 159. D. I. 5.    |
| Schildpad Luis              | 5. B. 5.         |
| Schildpad - toot            | 136. C. II. 4.   |
| Schildpaſtaert , gedoorende | 305. I. IV. 8.   |
| Schout by Nagt              | 125. C. I. I. 7. |
| Schwitzersbroek , capitaale | 222. F. IV. 14.  |
| — — — — getakte             | 223. F. IV. 15.  |
| Scorpioentje                | 290. I. II. 4.   |
| See - Noot                  | 78. N. IV. 2.    |
| Slange - Kop                | 165. D. II. 2.   |
| — — — — kleene              | 164. D. II. 1.   |
| Slangen Vellehoorn          | 352. L. II. 9.   |
| Slangetje                   | 390. N. III. 12. |



# Holländische Benennungen.

|                         | Pag.            |
|-------------------------|-----------------|
| Slek - hoorn            | 416. O. I. 6.   |
| Slet                    | 61. K. III. 7.  |
| Sluik - daadel          | 202. F. II. 3.  |
| Slyk - Slek             | 384. N. III. 4. |
| Snippckop , gedoornde   | 285. I. I. 3.   |
| — getakte               | 286. I. I. 4.   |
| Snuite - pen, gedoornde | 326. I. VI. 5.  |
| Soldat                  | 358. L. III. 3. |
| Sooftolatje             | 177. D. IV. 9.  |
| Speeldouplet            | 50. K. II. 7.   |
| Speldewerk kuffen       | 129. C. I. 5.   |
| Spinnekop               | 284. I. I. 2.   |
| Spockje                 | 152. C. IV. 1.  |
| Spoor                   | 351. L. II. 7.  |
| Spraetje                | 271. H. II. 1.  |
| Staate Vlagetje         | 189. E. 10.     |
| Starre - pen , dikke    | 265. H. I. 1.   |
| Steenbikker             | 374. N. II. 1.  |
| Steen - moffel          | 109. Q. III. 1. |
| Steenfcheede            | 7. C. 1.        |
| Sterretje               | 178. D. IV. 10. |
| Stombje                 | 42. I. 3.       |
| Stormhoed , gebreide    | 233. G. II. 2.  |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                                | Pag.           |
|--------------------------------|----------------|
| Stormhoed, geribd westindische | 236. G. II. 5. |
| — — roode                      | 234. G. II. 3. |
| Strand - Dayer                 | 414. O. I. 4.  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>T</b> abaks - pip             | 310. I. V. 3.    |
| Tand, ploedige                   | 420. O. III. 4.  |
| Teepel bak                       | 227. F. V. 3.    |
| Telline, platzydige              | 24. F. II. 5.    |
| Tellmoffel, roode with straalige | 23. F. II. 4.    |
| Toll, gevlake                    | 331. K. I. 1.    |
| — langleevende                   | 351. L. II. 6.   |
| Toornje                          | 215. F. IV. 5.   |
| Toover - Slak                    | 373. N. I. 1.    |
| Top - Slak                       | 391. N. III. 15. |
| Tovenaar                         | 334. K. I. 5.    |
| Transparant                      | 105. P. 7.       |
| Trommel - Schroef                | 368. L. V. 5.    |
| Tuitje, witte                    | 323. I. VI. 1.   |
| Tulbande                         | 340. K. II. 4.   |
| Tulband, gerimpelde              | 352. L. II. 8.   |
| Tulpen                           | 4. B. 3.         |

Tyger-

# Holländische Benennungen.

|                      | Pag.             |
|----------------------|------------------|
| Tyger - pen , dunne  | 257. G. VIII. 2. |
| Tyger - tong , wilde | 58. K. III. 1.   |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>V</b> aas , witte           | 221. F. IV. 13. |
| Vellhorn                       | 297. I. III. 7. |
| Venus - doublet , geribde      | 28. G. 1.       |
| Venus hart                     | 28. G. 2.       |
| — driezydig                    | 30. G. 5.       |
| Venus Schagt                   | 457. S. 9.      |
| Venus schulp , rechte met Hair | 44. K. I. 1.    |
| Vjſch huifje                   | 430. Q. I. 1.   |
| Vlagetje                       | 345. K. III. 2. |
| Vleermuis                      | 219. F. IV. 11. |
| Vleeshoorn                     | 273. H. II. 4.  |
| Vleugelhoorn , getakte         | 277. H. III. 2. |
| Vleugelhoorntje                | 287. I. II. 1.  |
| — geplekte                     | 288. I. II. 2.  |
| Vliegge ſchettje               | 143. C. II. 13. |
| Vloerken , italianſche         | 131. C. I. 8.   |
| Voethoorn                      | 196. I. III. 6. |
| Vogeltje                       | 114. Q. III. 8. |

# NOMENCLATOR BELGICVS.

|                               | Pag.            |
|-------------------------------|-----------------|
| Vorfchen - poppe              | 294. I. III. 2. |
| Vyg , spaanfche               | 190. E. 12.     |
| <b>W</b> afelyfer             | 56. K. II. 17.  |
| Wenteltrap                    | 362. L. IV. 1.  |
| Wenteltrapje                  | 363. L. IV. 2.  |
| Whulk                         | 254. G. VII. 3. |
| — noordfche                   | 315. I. V. 11.  |
| Witooge                       | 175. D. IV. 6.  |
| Wit - rugge , cartageenfche   | 167. D. II. 4.  |
| Wolfstand, witte              | 451. R. 4.      |
| Wolkbakje                     | 153. C. IV. 2.  |
| Wolkhoorn                     | 149. C. III. 7. |
| Wolkje                        | 154. C. IV. 4.  |
| Wydmonder                     | 247. G. V. 2.   |
| Wyd - Oog                     | 160. D. I. 6.   |
| Wyfje , kleene, van den Argus | 172. D. IV. 1.  |
| Wyingards - Slak              | 385. N. III. 5. |
| Wyzer                         | 272. H. II. 3.  |

# Hollandsche Benennungen.

Pag.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Z</b> aaagertje | 42. I. 4.       |
| Zadel, poolfche    | 101. O. IV. 7.  |
| Zandmoffel         | 114. Q. III. 7. |
| Zeeohr, geftrepte  | 428. P. 2.      |
| Zeepocke           | 3. B. 2.        |
| Zeepuiften         | 2. B. 1.        |
| Zeefchelling       | 4. B. 4.        |
| Zeeslangetje       | 455. S. 5.      |
| Zeeton             | 334. L. II. 3.  |
| Zes Vloog          | 179. D. IV. 13. |
| Zilverlaken        | 152. C. IV. 1.  |
| Zilvermond         | 348. L. II. 3.  |
| — — bonte          | 359. L. III. 5. |
| — — geplekte       | 358. L. III. 4. |
| Zoomtje, geftrepte | 241. G. III. 2. |
| — gladde           | 242. G. III. 3. |
| Zooneltraaf        | 19. F. I. 3.    |
| — roofe roodt      | 16. E. 5.       |
| — violet blauwe    | 16. E. 4.       |
| Zotskap            | 66. M. I.       |
| Zoute Koreltje     | 166. D. II. 3.  |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

## NOMENCLATOR GALLICVS.

### Französische Benennungen.



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>A</b> dmiral, faux orangé | 146. C. III. 3.  |
| — — — grand                  | 134. C. II. 2.   |
| Agate bossue                 | 202. F. II. 3.   |
| Agathine                     | 319. I. V. 16.   |
| Aigrette                     | 221. F. IV. 13.  |
| Aile d'ange                  | 271. H. II. 2.   |
| Aile de papillon             | 136. C. III. 4.  |
| Aïce bossue                  | 275. H. II. 7.   |
| —— grande                    | 277. H. III. 2.  |
| Alene                        | 261. G. VIII. 9. |
| Amande                       | 62. K. III. 8.   |
| Amande a cils                | 74. N. II. 2.    |
| Ane , petit                  | 171. D. III. 2.  |
| Antale                       | 451. R. 4.       |
| Araignée femelle             | 267. H. I. 3.    |
| — male                       | 269. H. I. 5.    |
| Arche de Noe                 | 73. N. II. 1.    |

Ar-

# Französische Benennungen.

|                      | Pag.            |
|----------------------|-----------------|
| Arculaire blanc      | 244. G. IV. 1.  |
| Argus a boutons      | 295. I. III. 4. |
| Argus, faux          | 157. D. I. 3.   |
| — — grand            | 158. D. I. 4.   |
| — — petit            | 172. D. IV. 4.  |
| Arlequine, la fausse | 157. D. I. 3.   |
| Arrofoir             | 457. S. 9.      |
| Assemblage de bojaux | 454. S. 3.      |
| Altrolepas           | 432. Q. II. 1.  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>B</b> aquet bandé | 193. E. 15.     |
| Becasse epineuse     | 284. I. I. 2.   |
| Bigourneau           | 346. L. I. 1.   |
| Biltournée           | 72. N. I. 1.    |
| Bois de chene        | 140. C. II. 10. |
| Bonnet de Dragon     | 439. Q. III. 1. |
| — polonois           | 171. D. III. 2. |
|                      | 237. G. II. 7.  |
| Bossüe               | 185. E. 3.      |
| Bouche d' Argent     | 348. L. II. 3.  |
| — — — bariolée       | 358. L. III. 4. |

Bouche



# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                    | Pag.            |
|--------------------|-----------------|
| Bouche d'or        | 349. L. II. 4.  |
| — — petite         | 186. E. 5.      |
| Bouclier de Tortue | 442. Q. IV. 2.  |
| Bout de Chandelle  | 130. C. I. 7.   |
| Bouton de Camifole | 334. K. I. 4.   |
|                    | 338 K. II. 1.   |
| Brocard de Soye    | 154. C. IV. 3.  |
| Brunette           | 151. C. III. 9. |
| Buccin unique      | 313. I. V. 8.   |
| Bulle d'eau        | 187. E. 6.      |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>C</b> abochon    | 430. Q. I. 1.   |
| Cadran              | 333. K. I. 3.   |
| Came coupée         | 41. I. 1.       |
| — marquée de Verges | 50. K. II. 7.   |
| — truitée           | 51. K. II. 8.   |
| Campement turque    | 61. K. III. 6.  |
| Carte géographique  | 156. D. I. 2.   |
| Casque Bezoard      | 241. G. III. 2. |
| — cannelé, gros     | 239. G. II. 10. |
| — pavé              | 238. G. II. 8.  |

Cas-

# Französische Benennungen.

Pag.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Casque plume          | 236. G. II. 6.   |
| — trinangulaire       | 235. G. II. 4.   |
| — tricoté             | 233. G. II. 2.   |
| — truité              | 239. G. II. 9.   |
| — tuberculé           | 232. G. II. 1.   |
| Chagrin               | 18. F. I. 1.     |
| Chameau               | 276. H. III. 1.  |
| Chataigne a bandes    | 301. I. IV. 2.   |
| Chausse trappe        | 223. F. IV. 15.  |
| — — —                 | 289. I. II. 3.   |
| Chaeuve Souris        | 219. F. IV. 11.  |
| Chenille blanche      | 223. I. VI. 1.   |
| Chicorée              | 291. I. II. 5.   |
| Cloniffe              | 46. K. II. 1.    |
| Cloporte              | 181. D. IV. 15.  |
| Cloud                 | 256. G. VIII. 1. |
| Cocombre pointée      | 208. F. III. 4.  |
| Coeur allongée        | 69. M. 5.        |
| Cocur en Arche de Noe | 75. N. III. 1.   |
| Cocur de boeuf        | 66. M. 1.        |
| — epincux             | 31. G. 7.        |
| — tuillé              | 32. G. 9.        |
| Cocur enflé           | 37. G. 16.       |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                                  | Pag.               |
|----------------------------------|--------------------|
| Coeur triangulaire               | 37. G. 5.          |
| — de Venus                       | 28. G. 2.          |
| Colique                          | 173. D. IV. 3.     |
| Conque anatifere                 | 6. B. 6.           |
| — exotique                       | 28. G. 1.          |
| — de St. Jaques, bariolée        | 81. O. I. 1.       |
| — persique                       | 247. G. V. 2.      |
| — de Venus, a pointes            | 44. K. I. 1.       |
| Contre Admiral                   | 125. C. I. 1. y.   |
| Coq bigaré                       | 38. G. 18.         |
| Coquette                         | 302. I. IV. 3.     |
| Coquille de St. Jaques d'Espagne | 81. O. I. 2.       |
| Coralline                        | 85. O. II. 2.      |
| Cornalline                       | 200. F. II. 2. η.  |
| Corne d'Amon                     | 122. B. 2.         |
| Cornouille fasciée               | 206. F. III. 2. α. |
| — ponctuée                       | 207. F. III. 2. β. |
| Couronne d'ethiopie              | 225. F. V. 1.      |
| — — imperiale                    | 125. C. I. 2.      |
| Crapaud                          | 167. D. II. 4.     |
| Crete de Coq                     | 107. Q. I. 2.      |
| Cuiller de Neptune               | 226. F. V. 2.      |

# Französische Benennungen.

Pag.

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cuillere          | 437. Q. II. 8.  |
| Culotte de Suisse | 294. I. III. 3. |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>D</b> ail  | 7. C. I.          |
| Damier        | 127. C. I. 4.     |
| Datte         | 109. Q. III. 1.   |
| Dauphin       | 360. L. III. 6.   |
| Degrés bordés | 297. I. III. 8.   |
| Dent de loup  | 450. R. 3.        |
| Dentale       | 449. R. 1.        |
| Drap d'argent | 236. G. II. 5.    |
| — mortuaire   | 199. F. II. 2. 8. |
| — d'or        | 150. C. III. 8.   |
| — a reseau    | 139. C. II. 8.    |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>E</b> braique  | 221. F. IV. 12. |
| — — —             | 142. C. II. 12. |
| — la fausse       | 134. C. II. 1.  |
| Ecaille de tortue | 136. C. II. 3.  |
| l'Ecorchée        | 149. C. III. 7. |

K k

Ecrit

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
|                   | Pag.           |
| Ecriture arabique | 62. K. IV. 1.  |
| — — grecque       | 53. K. II. 12. |
| l'Emeraude        | 249. G. V. 5.  |
| Enfant au maillot | 364. L. IV. 3. |
| Entonnoir         | 445. Q. IV. 6. |
| l'Eperon          | 351. L. II. 7. |
| l'Eventail        | 82. O. I. 4.   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>F</b> aitiere  | 66. M. 2.        |
| Feuille           | 108. Q. I. 3.    |
| — de Choux        | 67. M. 3.        |
| — de Laurier      | 97. O. IV. 2.    |
| Figue             | 190. E. 12.      |
| Flamboyante       | 129. C. I. 5.    |
| Foret             | 260. G. VIII. 7. |
| Forteresse        | 434. Q. II. 3.   |
| Fraise rouge      | 33. G. 10.       |
| Fripiere          | 355. L. II. 12.  |
| Furie flamboyante | 77. N. III. 3.   |
| Fuseau            | 310. I. V. 3.    |
| — étoilé          | 265. H. I. 1.    |

# Französische Benennungen.

|                                | Pag.             |
|--------------------------------|------------------|
| <b>G</b> ateau feuilleté       | 70. M. 7.        |
| Gibeciere en Manteau           | 83. O. I. 5.     |
| Gland de <sup>e</sup> mer rayé | 3. B. 2.         |
| — — tulipe                     | 2. B. I.         |
| — — turban                     | 4. B. 3.         |
| Gondolée rayée                 | 189. E. 10.      |
| Gourgandine                    | 51. K. II. 9.    |
| Grelée                         | 166. D. II. 3.   |
| Grenouillette                  | 294. I. III. 4.  |
| Grimace                        | 299. I. III. 11. |
| Gueule de Loup                 | 373. N. I. 1.    |
| — — noire                      | 274. H. II. 5.   |
| — — de souris                  | 115. Q. III. 6.  |
| Guilochée                      | 26. F. III. 2.   |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>H</b> arpe   | 246. G. V. 1.   |
| Herisson        | 300. I. IV. 1.  |
| Hermine         | 132. C. I. 9.   |
| Hirondelle      | 114. Q. III. 8. |
| Huitre          | 99. O. IV. 4.   |
| — d'ambre jaune | 103. P. 3.      |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

Pag.

Huitre ecailleuse a feuilles

|                   |            |
|-------------------|------------|
| couleur de citron | 71. M. 8.  |
| — électrique      | 102. P. 2. |
| — epineuse        | 64. L. 1.  |

**J**amaïque

60. K. III. 5.

Jambonneau epineux

117. R. 3.

Indienne

311. I. V. 5.

Isabelle

169. D. II. 7.

**L**ampe antique

379. N. II. 10.

Lanterne rouge rayonnée de blanc

16. E. 5.

Lard

305. I. IV. 3.

Leopard rouge

124. C. I. 1. α.

Lepas granuleux

435. Q. II. 5.

Lévantine

46. K. I. 4.

Lievre

159. D. I. 5.

**M**anche de Couteau

13. E. 1.

— — courbée

15. E. 3.

Mon-



## Französische Benennungen.

|                           | Pag.              |
|---------------------------|-------------------|
| Manche de couteau femelle | 13. E. 2.         |
| Monteau bandé             | 87. O. II. 5.     |
| — — ducal                 | 84. O. II. 1.     |
| — — d'orange              | 92. O. II. 12.    |
| — — pointillé             | 89. O. II. 7.     |
| Marteau                   | 97. O. IV. 1.     |
| Massue la grande          | 285. I. I. 3.     |
| — — d'Hercule             | 286. I. I. 4.     |
| — — lisse                 | 312. I. V. 6.     |
| Mere Perle                | 108. Q. II. 1.    |
| Mignature                 | 216. F. IV. 6.    |
| Milleped                  | 270. H. I. 6.     |
| Minaret                   | 216. F. IV. 6.    |
| Minime                    | 138. C. II. 6.    |
| Misaine roulée            | 279. H. III. 5.   |
| Monnoye de Guinée         | 173. D. IV. 2.    |
| Moresque                  | 201. F. II. 2. A. |
| Moskat                    | 253. G. VII. 2.   |
| Moule                     | 110. Q. III. 3.   |
| — arborisée               | 111. Q. III. 4.   |
| — des peintres            | 11. D. 2.         |
| — de la terre des Papous  | 114. Q. III. 7.   |
| Mure allongée             | 302. I. IV. 4.    |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|         | Pag.            |
|---------|-----------------|
| Muscade | 188. E. 8.      |
| Musique | 218. F. IV. 10. |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>N</b> appe d' Italie | 131. C. I. 8.         |
| Nassaviennne            | 347. L. II. 2.        |
| Navet                   | 132. C. I. 10.        |
| — a longue queue        | 312. I. V. 7.         |
| Navette petite          | 184. E. 2.            |
| Nautile a cloisons      | 121. B. 1.            |
| Nautile papyracé        | 119. A. 1.            |
| — — a carene retrecie   | 119. A. 1. $\alpha$ . |
| — — a large carene      | 120. A. 1. $\beta$ .  |
| Noix de mer             | 78. N. IV. 2.         |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>O</b> belisc chinois | 328. I. VI. 3.            |
| Oeil de bouc            | 434. Q. II. 4.            |
| Oeuf                    | 183. E. 1.                |
| Olive                   | 198. F. II. 2.            |
| Olive de fatin          | 201. F. II. 2. $\kappa$ . |
| — fatinée a bandes      | 200. F. II. 2. $\zeta$ .  |

# Französische Benennungen.

|                  | Pag.           |
|------------------|----------------|
| Oreille d'ane    | 272. H. II. 3. |
| — — —            | 429. P. 4.     |
| — de Cochon      | 106. Q. I. 1.  |
| — — —            | 273. H. II. 4. |
| — de Geant       | 352. L. II. 9. |
| — de Mer, grande | 427. P. 1.     |
| — marbrée        | 428. P. 3.     |
| — firiée         | 428. P. 2.     |
| — de Midas       | 196. F. I. 1.  |
| — de Venus       | 408. N. VI. 5. |
| l'Oublie         | 188. E. 9.     |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Pagode           | 351. L. II. 7. |
| Parasole         | 435. Q. II. 5. |
| Patte de Crapaud | 290. I. VI. 4. |
| — — d'Oie        | 266. H. I. 2.  |
| Peau d'ane       | 174. D. IV. 4. |
| — — de Chagrin   | 144. C. II. 6. |
| — — de Tigre     | 167. D. I. 12. |
| Pelote de beurre | 140. C. II. 9. |
| Pelure d'oignon  | 102. P. 1.     |
| Perdrix          | 229. G. I. 2.  |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                               | Pag.            |
|-------------------------------|-----------------|
| Perdrix a grosse levre        | 230. G. I. 3.   |
| Petoncle sans Oreilles        | 78. N. I. 1.    |
| Pholade, grande de l'Amerique | 8. C. 2.        |
| Picotée                       | 148. C. III. 6. |
| Pie                           | 358. L. III. 3. |
| Pigeon couvant                | 209. F. III. 6. |
| Pigeonne                      | 279. H. III. 4. |
| Pince de Chirurgien           | 24. F. II. 5.   |
| Piquure de Mouche             | 143. C. II. 13. |
| Planorbe , grand              | 382. N. III. 1. |
| — — terrestre                 | 374. N. II. 1.  |
| Pointillage blanc             | 175. D. IV. 6.  |
| Poire seche                   | 297. I. III. 8. |
| Porcellaine etoilée           | 178. D. IV. 10. |
| — — marbrée                   | 164. D. I. 12.  |
| Porphyre                      | 197. F. II. 1.  |
| Pou de Baleine                | 4. B. 4.        |
| — de Mer                      | 179. D. IV. 13. |
| Poulette                      | 104. P. 6.      |
| Pourpre a bandes              | 287. I. I. 5.   |
| — — tacheté                   | 288. I. II. 2.  |
| — — triangulaire ailé         | 287. I. II. 1.  |
| Prune                         | 209. F. III. 5. |

# Französische Benennungen.

Pag.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Q</b> uacre rayonné | 52. K. II. 12.  |
| Quenotte               | 420. O. III. 4. |
| Queue d'Hermine        | 141. C. II. 12. |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>R</b> acrocheuse | 292. I. III. 1. |
| Radix               | 191. E. 13.     |
| — le gros           | 306. I. IV. 9.  |
| Ratiffoir           | 95. O. III. 2.  |
| Rave                | 224. F. IV. 16. |
| Rezeau blanc        | 57. K. II. 18.  |
| Rhinoceros          | 296. I. III. 6. |
| Ruban               | 193. E. 16.     |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>S</b> abot marbré | 331. K. I. 1.  |
| Sandale              | 431. Q. I. 2.  |
| Scalata, fausse      | 363. L. IV. 2. |
| — — vraie            | 362. L. IV. 1. |
| Scarabée             | 103. P. 5.     |

# NOMENCLATOR GALLICVS.

|                  | Pag.           |
|------------------|----------------|
| Scie             | 42. I. 4.      |
| Scorpion         | 268. H. I. 4.  |
| Selle de Pologne | 101. O. IV. 7. |
| Solcil levant    | 15. E. 4.      |
| Sorciere         | 334. K. I. 5.  |
| Souris           | 163. D. 10.    |
| Speître          | 152. C. IV. 1. |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>T</b> apis                      | 321. I. V. 19.  |
| Tarriere                           | 192. E. 14.     |
| — blanche et cerclée               | 145. C. III. 2. |
| — chagrinée                        | 145. C. III. 1. |
| Tasse de Neptune                   | 227. F. V. 3.   |
| Taupe                              | 162. D. I. 9.   |
| — rouffe                           | 161. D. I. 7.   |
| Telescope                          | 344. K. III. 1. |
| Telline bariolée de violet & blanc | 20. F. I. 5.    |
| — fluviatile                       | 12. D. 3.       |
| — radiée                           | 19. F. I. 3.    |
| — rayée de couleur de chair        | 20. F. I. 5.    |

# Französische Benennungen.

|                  | Pag.            |
|------------------|-----------------|
| Tete de Becasse  | 283. I. I. 1.   |
| — de Dragon      | 175. D. IV. 5.  |
| — de Meduse      | 433. Q. II. 2.  |
| — de Serpent     | 165. D. II. 2.  |
| — — —            | 271. H. II. 1.  |
| — — petite       | 164. D. II. 1.  |
| Tiare episcopale | 217. F. IV. 8.  |
| — papale         | 218. F. IV. 9.  |
| Tigre noir       | 124. C. I. 1.   |
| Tonne cannelée   | 228. G. I. 1.   |
| — dentelée       | 231. G. I. 5.   |
| Tour de Babel    | 308. I. V. 1.   |
| — de Coppenhague | 250. I. VI. 1.  |
| Tourterelle      | 278. H. III. 3. |
| Treillis         | 446. Q. V. 2.   |
| Tricotée         | 56. K. II. 17.  |
| Tronquée         | 42. I. 3.       |
| Truitée          | 168. D. II. 6.  |
| Tulipe           | 154. C. IV. 3.  |
| Turban rouge     | 234. G. II. 3.  |



## NOMENCLATOR GALLICVS.

| <b>V</b>                    | Pag.             |
|-----------------------------|------------------|
| erniculaires blanc & trian- |                  |
| gulaires                    | 452. S. I.       |
| Verole petite               | 180. D. IV. 14.  |
| Vieille ridée               | 45. K. I. 2.     |
| Vilebrequin                 | 455. S. 5.       |
| Vis de pressoir             | 260. G. VIII. 8. |
| Vis tigrée                  | 257. G. VIII. 2. |
| Vitre chinoise              | 105. P. 7.       |
| Volute panachée             | 152. C. III. 10. |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Z</b> ig - zag | 54. K. II. 13. |
|-------------------|----------------|

---

## NOMENCLATOR ANGLICVS.

### Englische Benennungen.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>A</b> gathe Chama    | 51. K. II. 8.  |
| Amber - Oyster, small   | 103. P. 3.     |
| Amboina scallop, common | 83. O. I. 3.   |
| Arabian - shell         | 62. K. IV. 1.  |
| Arck, spotted           | 78. N. IV. 1.  |
| — virgin                | 75. N. III. 1. |

Ar-

# Englische Benennungen.

|                              | Pag.            |
|------------------------------|-----------------|
| Argus, little Wife of        | 172. D. IV. 1.  |
| Argus shell                  | 158. D. I. 4.   |
| Argus shell, girdled         | 293. I. III. 5. |
| Ass Gowry                    | 171. D. III. 2. |
| Augur Peg, speckled          | 192. E. 14.     |
| <b>B</b> abel Shell          | 308. I. V. 1.   |
| Balanus, great, wide mouthed | 4. B. 3.        |
| — — grey, narrow mouthed     | 3. B. 2.        |
| Barnacle, common english     | 2. B. 1.        |
| — — tortoise wart            | 5. B. 5.        |
| Batt Musik stamper, long     | 219. F. IV. 11. |
| Beetle Porcelaine            | 177. D. IV. 9.  |
| Bischops Miter shell         | 217. F. IV. 8.  |
| Blaaws stamper               | 126. C. I. 3.   |
| Black - moors - tooth        | 173. D. IV. 2.  |
| Blobber - lip                | 266. H. I. 2.   |
| Bodkin, tooth'd              | 258. G. VIII 5. |
| Brittle Saylor, course       | 120. A. I. β.   |
| — — — great                  | 119. A. I. α.   |
| Broadlip, horned             | 172. H. II. 3.  |

Broad

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                  | Pag.           |
|------------------|----------------|
| Broadlip knobb'd | 271. H. II. 1. |
| Buff Gowry       | 161. D. I. 7.  |
| Bug's stamper    | 134. O. II. 3. |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>C</b> ados Shell, wide  | 292. I. III. 1.  |
| Cake Shell, thik - lipt    | 390. N. III. 12. |
| Caltrup Shell              | 289. I. II. 3.   |
| Camel - Nerit              | 425. O. III. 11. |
| Camp                       | 197. F. II. 1.   |
| — turkische                | 61. K. III. 6.   |
| Canary, broad knobbed      | 280. H. III. 6.  |
| — girdled                  | 275. H. II. 7.   |
| — great                    | 278. H. III. 3.  |
| — hunch - bakt             | 279. H. III. 4.  |
| — long knobbed             | 280. H. III. 7.  |
| Canoe Shell, smal indian   | 431. Q. I. 2.    |
| Carpe muscle, deep furowed | 113. Q. III. 6.  |
| Caroline muscle            | 114. Q. III. 7.  |
| Cartagena Gowry            | 167. D. II. 4.   |
| Ceram Coronet              | 225. F. V. 1.    |
| Ceram Spuc - Shell         | 223. F. IV. 13.  |
| Chain stamper, small       | 146. C. III. 3.  |

Cha-

# Englische Benennungen.

Pag.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Chama, truncated, smouthed           | 51. K. II. 9.   |
| — violet and white                   | 41. I. 1.       |
| Cheefe Shell, great, girdled, Brasil | 383. N. III. 3. |
| — great, River                       | 382. N. III. 1. |
| — Land                               | 374. N. II. 1.  |
| Cheker Cockle, grained               | 58. K. III. 1.  |
| Chesnut, great                       | 301. I. IV. 2.  |
| Cloudy - Stamper                     | 154. C. IV. 4.  |
| Cockle, with heary streaks           | 78. N. IV. 2.   |
| Cocquet                              | 302. I. IV. 2.  |
| Conch, large                         | 277. H. III. 2. |
| Corall scallop                       | 83. O. I. 5.    |
| Couvin                               | 346. L. I. 1.   |
| Cross Cokle                          | 62. K. III. 8.  |
| Crown, papal                         | 218. F. IV. 9.  |
| Crown stamper                        | 125. C. I. 2.   |
| Curry Comb Oyfter                    | 106. Q. I. 1.   |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>D</b> evils Claw, female | 267. H. I. 3.   |
| Diamond stamper, blak       | 142. C. II. 12. |
| Dice Gowry cloudy           | 250. G. VI. 1.  |

Dice

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                   | Pag.           |
|-------------------|----------------|
| Dice Nerit        | 410. I. 1.     |
| Dog - tooth Shell | 451. R. 4.     |
| Doyer whelk       | 414. O. I. 4.  |
| Dragon Gowry      | 175. D. IV. 5. |
| Dvelwe Fingers    | 270. H. I. 6.  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>E</b> ar, hairy | 299. I. III. 11. |
| — white            | 408. N. VI. 5.   |
| Ear - Shell, great | 427. P. 1.       |
| Endive Shell       | 291. I. II. 4.   |
| Egg Gowry, white   | 183. E. 1.       |
| Elephan's - tooth  | 449. R. 1.       |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>F</b> ary stamper | 152. C. IV. 1.  |
| Feather Stamper      | 236. G. II. 6.  |
| Finger Oyster great, | 107. Q. I. 2.   |
| Flying Muscle        | 114. Q. III. 8. |
| Fortresse            | 434. Q. II. 3.  |

# Englische Benennungen.

|            | Pag.             |
|------------|------------------|
| Furrow pen | 261. G. VIII. 9. |
| Fyg whelk  | 190. E. 12.      |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>G</b> arter stamper | 132. C. I. 10.  |
| Giants Ear , great     | 352. L. II. 9.  |
| Goats Ey Limpet        | 434. Q. II. 4.  |
| Goldbrocade            | 150. C. III. 8. |
| Goose Shell            | 6. B. 6.        |
| Govry saffron toothed  | 168. D. II. 6.  |
| Saltspekled            | 166. D. II. 3.  |
| — whit eyed            | 175. D. IV. 6.  |
| Grain Cockle           | 32. G. 8.       |
| Grain Girdled stamper  | 146. C. III. 3. |
| Grater - scallop       | 95. O. III. 2.  |
| Green stamper          | 132. C. I. 9.   |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>H</b> am Muscle , priley | 117. R. 3.    |
| Hammer Oyster               | 79. O. IV. 1. |
| Harp Shell                  | 246. G. V. 1. |

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                      | Pag.           |
|----------------------|----------------|
| Heart Cockle exotic  | 28. G. 1.      |
| — — girdled          | 58. K. III. 2. |
| — — human            | 28. G. 2.      |
| Hebrew Gowry , great | 156. D. I. 1.  |
| Hogs Ear - Oyster    | 108. Q. I. 3.  |
| Honez Comb Cockle    | 127. C. I. 4.  |
| Horfe - hoof         | 67. M. 3.      |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| St. James Cockle | 81. O. I. 1.   |
| Indian Dipper    | 188. E. 8.     |
| Isabelle Gowry   | 169. D. II. 7. |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kasket, knot-listed | 232. G. II. 1.  |
| — — —               | 233. G. II. 2.  |
| — — smal curl'd     | 241. G. III. 1. |
| — — smooth, gray    | 241. G. III. 2. |
| — — smooth, lipd    | 242. G. III. 3. |
| Kasket Shell red    | 234. G. II. 3.  |
| Knob fingers        | 268. H. I. 4.   |
| Koffer Shell, small | 244. G. IV. 1.  |



# Engliſche Benennungen.

Pag.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>L</b> eghorn Govry kin, ſmall | 185. E. 3.      |
| Leopard, great                   | 167. D. II. 5.  |
| Leopard - ſtamper, great yellow  | 140. C. II. 9.  |
| Lighter, twiſted                 | 27. N. I. 1.    |
| Limped beaked                    |                 |
| — — craked Barnſtable            | 445. Q. V. 1.   |
| — — thimble                      | 446. Q. V. 2.   |
| — — wart rib'd                   | 448. Q. V. 4.   |
| — — white, rib'd                 | 432. Q. II. 1.  |
| Lohoe broad - lip                | 274. H. II. 5.  |
| Louſe - Gowry                    | 179. D. IV. 13. |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>M</b> agos Peg    | 324. I. VI. 2.    |
| Magpye. top Shell    | 358. L. III. 3.   |
| Maiden - Muſcle      | 44. K. I. 1.      |
| Mantel ſcallop ducal | 48. O. II. 1.     |
| Map - Shell          | 158. D. I. 4.     |
| Marble date, pourple | 200. F. II. 2. 5. |
| Maſſe Gowry, long    | 174. D. IV. 4.    |
| Melon, clouded       | 226. F. V. 2.     |
| Melon - tun          | 227. F. V. 3.     |

## NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                           | Pag.             |
|---------------------------|------------------|
| Midas Ear                 | 196. F. I. 1.    |
| Monk, gray                | 137. C. II. 5.   |
| Mulberry Shell            | 302. I. IV. 4.   |
| Murex blue and white      | 305. I. IV. 8.   |
| — common, thormey         | 286. I. I. 4.    |
| — pointed                 | 313. I. V. 8.    |
| . Muscle conted           | 74. N. II. 2.    |
| Musik Shell               | 218. F. IV. 10.  |
| — oriental                | 221. F. IV. 12.  |
| — white                   | 221. F. IV. 13.  |
| <br>                      |                  |
| Nail scallop, wife of     | 66. M. 2.        |
| Nassau Shell              | 347. L. II. 2.   |
| Nerit, deep, rig'd        | 426. O. III. 13. |
| — red                     | 419. O. III. 1.  |
| — twin girdled            | 413. O. I. 3.    |
| — white                   | 406. O. I. 6.    |
| Nestors - top, great      | 351. L. II. 6.   |
| Nipple Gowry - kin, white | 185. E. 4.       |
| Noahs Lighter             | 73. N. II. 1.    |

# Englische Benennungen.

|                              | Pag.            |
|------------------------------|-----------------|
| <b>O</b> aker - wood Stamper | 140. C. II. 10. |
| Olive Gowry, freckled        | 171. D. III. 3. |
| Olive Shell                  | 198. F. II. 2.  |
| — clouded                    | 202. F. II. 3.  |
| Oren Shell                   | 456. S. 7.      |
| Oxheart Cockle               | 31. G. 7.       |
| Oxheart Shell, rough         | 32. G. 9.       |
| Oyster                       | 99. O. IV. 4.   |
| — chinese pelluind           | 105. P. 7.      |
| — great prikley              | 64. L. 1.       |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>P</b> aper Nautilus     | 119. A. 1.      |
| Parement, italian          | 131. C. I. 8.   |
| Partridge great, spat ribd | 231. G. 1. 5.   |
| — indian                   | 229. G. I. 2.   |
| — round                    | 191. E. 13.     |
| — thik lipd                | 230. G. I. 3.   |
| Pearl Gowry                | 182. D. IV. 17. |
| Pearl Oyster               | 108. Q. II. 1.  |
| — the flat                 | 101. O. IV. 7.  |

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                           | Pag.              |
|---------------------------|-------------------|
| Pearl river muscle        | 11. D. 2.         |
| Peg , white snouted       | 323. I. VI. 1.    |
| Persian Shell             | 247. G. V. 2.     |
| Pholas , deaeep furrowed  | 8. C. 2.          |
| Pidak , oblong white      | 7. C. 1.          |
| Plough                    | 271. H. II. 2.    |
| Poeloroon Nerit           | 422. O. III. 7.   |
| Popes Crown , knopped     | 325. I. VI. 3.    |
| Porcellain , yellow zoned | 162. D. I. 9.     |
| Porphyry Shell            | 151. C. III. 9.   |
| Pot wattering             | 457. S. 9.        |
| Prince Stamper            | 199. F. II. 2. 8. |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>R</b> amshorn              | 122. B. 2.      |
| Razor Shell , blueish crooked | 15. E. 3.       |
| — — little , strait           | 13. E. 2.       |
| — — thik                      | 13. E. 1.       |
| Rice Gowry                    | 180. D. IV. 14. |
| River ragged mouth            | 373. N. I. 1.   |

# Englische Benennungen

|                               | Pag.                  |
|-------------------------------|-----------------------|
| Sail Shell thick              | 121. B. 1.            |
| Sandtamper                    | 143. C. II. 13.       |
| Saylor, coarse brittle        | 120. A. I. $\beta$ .  |
| — great brittle               | 119. A. I. $\alpha$ . |
| Scallop, litte yellow         | 84. O. II. 1.         |
| — thin                        | 82. O. I. 4.          |
| Sea Ear, long                 | 429. P. 4.            |
| Seeren Shell, rough           | 326. I. VI. 1.        |
| Silver Gowry kin, blakspekled | 208. F. III. 4.       |
| Silvermouth                   | 348. L. II. 3.        |
| — — spotted                   | 858. L. III. 4.       |
| Snail, echinated              | 360. L. III. 6.       |
| — golden mouthed              | 349. L. II. 4.        |
| Snailshell, smouth girdled    | 384. N. III. 4.       |
| Snake Gowry, small            | 164. D. II. 1.        |
| Snippe, thorney               | 285. I. I. 3.         |
| Solen, thik, red              | 16. E. 5.             |
| — violet purple, papyraceons  | 15. E. 4.             |
| Spider Shell                  | 269. H. I. 5.         |
| Spindle Shell                 | 310. I. V. 3.         |
| Spinnet Shell                 | 333. K. I. 3.         |
| Spur Shell                    | 351. L. II. 7.        |

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                         | Pag.            |
|-------------------------|-----------------|
| Spur Shell small        | 300. I. IV. 1.  |
| Stair Cafe, royal       | 362. L. IV. 1.  |
| — — small               | 363. L. IV. 2.  |
| Stamper, net lifted     | 129. C. I. 5.   |
| Starkake, wrinkled      | 4. B. 4.        |
| Star Gowry              | 178. D. IV. 10. |
| Strawberry heart Cockle | 30. G. 5.       |
| — — red                 | 33. G. 10.      |
| Stone piercer           | 109. Q. III. 1. |
| Stone whelk             | 196. I. III. 6. |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>T</b> abby Stamper | 148. C. III. 6. |
| Tellin, rayed         | 19. F. I. 3.    |
| Thik - top            | 339. K. II. 3.  |
| Top, great waved      | 331. K. I. 1.   |
| Tooth Shell, striated | 449. R. 2.      |
| Tourtlet Govry, great | 159. D. I. 5.   |
| —— Leopard great      | 165. D. II. 2.  |
| Tree Oyster           | 97. O. IV. 2.   |
| Tritons Trumpet       | 316. I. V. 12.  |

# Engliſche Benennungen.

|                   | Pag.             |
|-------------------|------------------|
| Trochus , prikley | 350. L. II. 5.   |
| Trumpet - knobbed | 294. I. III. 3.  |
| Tullip tellina    | 23. F. II. 4.    |
| Tulip Shell       | 154. C. IV. 4.   |
| Ty,er Shell       | 124. C. I. 1.    |
| Tygershorn brownn | 257. G. VIII. 2. |
| Tygerſtamper      | 149. C. III. 7.  |
| Tyger tooth       | 256. G. VIII. 1. |

|             |               |
|-------------|---------------|
| V elk Nerit | 415. O. I. 5. |
|-------------|---------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| W art Gowry      | 182. D. IV. 16. |
| Wax Stamper      | 130. C. I. 7.   |
| Wedge Muſcle     | 24. F. II. 4.   |
| Whelk            | 254. G. VII. 3. |
| — common english | 315. I. V. 11.  |
| — great net      | 279. H. III. 4. |
| — heary          | 297. I. III. 8. |
| — leaſt ragged   | 290. I. II. 4.  |



# NOMENCLATOR ANGLICVS.

|                   | Pag.            |
|-------------------|-----------------|
| Whelk persian     | 235. G. II. 4.  |
| — small laticed   | 254. G. VII. 4. |
| — small prikke    | 304. I. IV. 7.  |
| — small rough     | 252. G. VII. 1. |
| — spiked          | 276. H. III. 1. |
| Whirligig, Indian | 344. K. III. 1. |
| Woman, old        | 45. K. I. 2.    |
| Woodcock Shell    | 283. I. 1.      |
| — — thorney       | 284. I. I. 2.   |

**Z**igzag Chama 53. K. II. 12.

---

W I E N ,  
gedruckt bei Joseph Gerold, kais. Reichshof-  
raths- und Universitätsbuchdruckern.

I 7 7 8.

# E R R A T A.

| Pag.                                             | corrige                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 21. F. I. 6. Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.       | II. 20. t. 5. f.                             |
| 21. F. I. 6. ——— VI. 11. t. 2. f.                | V. 11. t. 2. f.                              |
| 23. F. II. 4. ——— II. 19. t.                     | 1; 19. t.                                    |
| 23. F. II. 4. ——— IV. 2. t; 24. f.               | IV. 2. t. 4. f.                              |
| 24. F. II. 5. ——— II. 2. t.                      | IV. 2. t.                                    |
| 26. F. III. 1. List. H. C. 1. 2.                 | List. H. C. 1. 3.                            |
| 26. F. III. 2. mond'arbigen                      | mondförmigen                                 |
| 27. F. III. 3. List. H. C. 1. 2.                 | List. H. C. 1. 3.                            |
| 29. G. 2. Knor. Vergn. I, 18. t. 2. f.           | I. 18. t. 3. f.                              |
| 42. I. 3. Das Stümpchen                          | Das Stümpchen.                               |
| 42. I. 5. Donex                                  | Donax.                                       |
| 42. I. 5. Knor. Vergn. V.                        | Knor. Vergn. VI.                             |
| 50. K. II. 7. ——— II.                            | ——— VI.                                      |
| 54. K. II. 12. ——— I. 21. t. 4. f.               | ——— I. 21. t. 5. f.                          |
| 54. K. II. 13. Zigzag                            | Zigzag.                                      |
| 63. L. dicke Zähne, zwischen eine Grube          | dicke Zähne, und dazwi-<br>schen eine Grube. |
| 71. M. 8. verlängerte Schale                     | verlängerte Klappe.                          |
| 75. N. II. 2. Knor. Vergn. II. 27. t.            | II. 2. t.                                    |
| 97. O. III. 9.                                   | O. II. 9.                                    |
| 97. O. III. 4. Ostrea                            | Ostrea.                                      |
| 101. O. IV. 7. platgedrückte                     | platgedrückte.                               |
| 135. C. II. 7. breite eysförmige                 | nezförmige.                                  |
| 158. D. I. 4. Grand Argus                        | Grand Argus.                                 |
| 160. D. I. 6. Linn. S. N. Sp. 320.               | S. N. Sp. 330.                               |
| 174. D. IV. 3. Knor. Vergn. II. 9. t.            | IV. 9. t.                                    |
| 188. E. 9. verkehrt eysförmige                   | fast eysförmige                              |
| 203. F. II. 4. schief gespaltene                 | schief gefaltene.                            |
| 204. F. II. 4. γ. lang mit braunen               | weiß mit braunen                             |
| 204. F. II. 4. δ. Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f. | VI. 34. t. 4, 5. f.                          |
| 209. Knor. Vergn. IV. 21. t. 3, 4. f.            | IV. 21. t. 3. f.                             |
| 215. F. IV. 1. longitudinalibus                  | longitudinaliter.                            |
| 221. D. Hebraique                                | L'hebraique.                                 |
| 224. F. IV. 16 β. Knor. Vergn. VI. 22. 2. f.     | VI. 27. t. 2. f.                             |
| 227. F. V. 2. Knor. Vergn. V. 28. t. 1. f.       | V. 28. t. 2. f.                              |
| 233. G. II. 7. ——— III. 8. n. 2. f.              | III. 8. t. 2. f.                             |
| 276. H. III. 1. tuberculato                      | tuberculata.                                 |
| 283. I. I. 1. the comonon                        | the common.                                  |
| 309. I. V. 1. Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.       | Pl. 9. f. M.                                 |
| 312. I. V. 5. ——— Pl. 10. f. A.                  | Pl. 9. f. A.                                 |
| 319. I. V. 16. ——— Pl. 12. f. K.                 | Pl. 10. f. K.                                |
| 328. I. VI. 7. ——— Pl. 11. f. L.                 | Pl. 11. f. α.                                |
| 328. I. VI. 7. Obelisc chinois                   | Obelisc chinois.                             |
| 328. I. VI. 7. β. ex fusco luteo                 | ex fusco lutea.                              |
| 333. K. I. 3. Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.        | Pl. 8. f. M.                                 |
| 334. K. I. 4. ——— Pl. 11. f. L. Q.               | Pl. 8. f. L. Q.                              |

Pag.

corrige

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| 334. K. I. 5. le Sorciere                     | la Sorciere.           |
| 335. K. I. 5. Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.    | Pl. 8. f. S.           |
| 343. K. II. 9. Turbo crocatus                 | Trochus crocatus.      |
| 348. Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.              | I. 2. t. 4.            |
| 349. L. 4. Schale hot                         | Schale ist             |
| 351. L. II. 6. ist mit auf den Gewinden       | ist auf den Gewinden.  |
| 351. L. II. 7. blattgedrückten                | platgedrückten.        |
| 352. L. II. 7. Knor. Vergn. III. 20 t. 1. f.  | IV. 4 t. 2. f.         |
| 352. L. II. 8. gestreifte Schale hat          | gestreifte Schale ist. |
| 354. L. II. 10. convexo nodosa obtusa         | convexa obtusa.        |
| 365. L. IV. 4. Berl. Mag. IV. 2. t. 3. f.     | omittatur.             |
| 376. N. II. 5. Knor. Vergn. VI. 26. t.        | V. 26 t.               |
| 380. N. II. 12. Helix maculata                | Helix maculosa.        |
| 381. N. III. 2. gelblicher Schale             | gelblicher Farbe.      |
| 403. N. V. 3. Helix plicata                   | Helix plicaria.        |
| 425. O. III. 11. Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f. | omittatur.             |
| 449. R. I. Knor. Vergn. I. 19. t.             | 29. t.                 |
| 458. Knor. Vergn. IV. 28. t. 2. f.            | IV. 28. t. 1. f.       |



