


Geologische Karte des Weizer Berglandes

Aufgenommen von
H. FLÜGEL und V. MAURIN (1954–1957)

Herausgegeben von der Geologischen Bundesanstalt, Wien


Ausgegeben 1958
Direktion: H. Köpper



Druck und Kartographie: Kartographische Anstalt Freytag-Berndt, Wien
Topograph. Grundlage: Ausschnitt aus Freytag-Berndt Touristenwanderkarte Bl. 13

Originalzeichnung: J. Kerschhofer

Maßstab 1:25.000
1000m 500 0 1 2 km



Verlag der Geologischen Bundesanstalt
Wien, III, Rasumofskygasse 23

- ### Holozän und Pleistozän
- Rezente Talböden
 - Rezente Schuttkegel
 - Hangschutt
 - Starke Vernäsuren
 - Pleistozäne Terrassenlehme
 - Pleistozäne Terrassenschotter

- ### Pliozän
- Stadelberg-Niveau (Lavantin)
 - Hochstraden-Niveau (Daz; Landsche-Niveau von Weiz mit Schotter)
 - Schotterüberstreuung des Daz (nur im Dürnthal ausgeschieden)
 - Trahüttner-Niveau (Oberpannon); mit Schotter
 - Kapfensteiner Schotter (Pannon D)
 - Grobschotter des Hühnerberg (Pannon C)
 - Woltscheneck-Niveau (Unterpannon); mit Schotter
 - Unterpannone Talung am Wolfsattel
 - Feinsande und Lehme des Unterpannon (Pannon B)
 - Süßwasserkalke des Unterpannon

- ### Miozän
- Schotter und Sande von Perndorf (Pannon, Sarmat?)
 - Sarmat von Oberdorf
 - Süßwasserkalke bei Hart-Puch
 - Konglomerat von Trennsattel (Miozän?)
 - Grobschotter von Trog
 - Travertin von Auen
 - Eggenberger Breccie
 - Konglomerate
 - Lehne und Sande (Oberhelvet?)
 - Rotschutt und Konglomerate von Naas (Oberhelvet?)
 - Grobschotter von Naas-Oberdorf (Oberhelvet?)
 - Tuff von Passail
 - Lignitflöze im Mio- und Pliozän

- ### Mesozoikum (?)
- Dunkle Tonschiefer, helle Serizitschiefer (nicht überall ausgeschieden)
 - Quarzite (nicht überall ausgeschieden)
 - Kalke, Dolomite und Rauchwacken
 - Kalke des Raasberggipfels
 - Plattenquarzite des Naintschgrabens

- ### Altpaläozoikum
- Mitteldevon: Striatoporenkalke, Dolomit und Kalkschiefer
 - Helle Kalke, Dolomite und Rauchwacken des Stroh
 - Sandsteine, z. T. quarzitisches
 - Dunkle Tonschiefer
 - Dunkle, chloritoidführende Tonschiefer
 - Dunkle Tonschiefer mit Grünschieferlagen
 - Kalkbänder mit Grünschieferlagen
 - Quarzite des Hundsberges
 - Diabase und Diabasschiefer
 - Schöckelkalk

- ### Höhermetamorphe Gesteinsserie
- Granatführende dunkle Phyllite
 - Dunkle Kalkschiefer
 - Marmore (z. T. gebändert) und Kalksilikatschiefer
 - Amphibolite
 - Raaltalkristallin, ungebändert
 - Schiefergneise des Rabenwaldes
 - „Weißsteine“
 - Pegmatite und Pegmatitgneise
 - Quarzgänge

- ### Bergbau:
- derzeit außer Betrieb
 - K Kohle
 - Gr Grubst
 - Pb Blei – Zink – Silber
 - S Kieselerz
 - Ba Schwefel (ohne Bergbauzeichen)
 - Fd Feldspat
 - Halden
 - Tiefe Bohrungen
 - Steinbrüche
 - Größere Sand- u. Kiesgruben (in Betrieb)
 - Fossilfundpunkte:
 - Wirbellose
 - Wirbeltiere
 - Planken (bei Passail)
 - Schichtlagerung:
 - schlig
 - 16°–45°
 - 46°–85°
 - salger
 - Raumlage der Faltenachsen
 - Verwerfungen

- ### Verkarstung:
- Karstschwinden
 - Dolinen
 - Größere Karstquellen:
 - I Kohlbrunn
 - II Gänsebrunn
 - III Finzer-Quelle
 - IV „Patschwasser“
 - V Boar-Quelle
 - VI Baumhöl-Quelle
 - VII Fädelner-Quelle
 - VIII Kalkiten-Quelle
 - IX Steinbrunn-Quelle
 - X Waller in Oberdorf
 - XI Urbrunn
 - XII Raas-Quelle
 - XIII Zetzbach-Quelle
 - Bedeutende Höhlen:
 - 1 Peterbauer-Pumperskirchen
 - 2 Schachnerbauer-Pumperskirchen
 - 3 Bärenhöhle
 - 4 Tropfsteinhöhle
 - 5 Schellstall
 - 6 Einsiedlerhöhle
 - 7 Hildebrand-Höhle
 - 8 Grassl-Höhle
 - 9 Katerloch
 - 10 Adolf-Mayer-Höhle
 - 11 Geyloch
 - 12 Topfloch
 - 13 Großer Spalt
 - 14 Klement-Grotte
 - 15 Felsenrot
 - 16 Rabloch
 - 17 Patschloch
 - 18 Windloch
 - 19 Steinbruchhöhle

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Geowissenschaften Gemischt](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [0062](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Geologische Karte des Weizer Berglandes 1](#)