

188 WOLFSBERG

6709

Bearbeitet von P. BECK-MANNAGETTA

Quartär

- Schuttdeponie, Bergwerkshalde
- Alluvium i. a.
- Rezenter Schotterfächer
- Rutschmasse
- Vernässung
- Torfmoor
- Alluviale Terrasse der Lavant
- Hangschutt, Blockwerk, Bergsturzmasse
- Schuttwanne (südliche Koralpe)
- Nichtrezipienter Schotterfächer
- Lokales, pleistozänes Schottervorkommen
- Lehmbedeckung
- Blockwall des Firnfeldstadiums
- Moränenrest (stadial)
- Niederterrassen (Würm)
- Moränenrest (tw. jünger verschwemmt; Hochwürm)
- Moränenwall (Würm)
- Schotterfächer der Lavant (Würm)
- Stauseeterrasse der Lavant (Hochwürm)
- Blockstreu (Garanas; Vorwürm)
- Terrassenschotter (7R18)
- Lehm mit Blöcken (Vorwürm)

Jungtertiär

- Reibebener Schotter (Blockschotter mit Lehm; Oberpliozän—ältestes Quartär)
- Schotter (Wölch, Schiefing, Preitenegg; Pliozän)
- Blockstreu
- Süßwasserschichten im Hangenden der Kohleführenden Schichten (kalkfreie Sande, und Schotter, Tone; Unterpannon)
- Kohleführende Schichten (vorw. sandige Mergel; Oberbadener—Untersarmat)
- Dachbergsschotter (Quarzsand mit Kalkgeröll; Oberbadener—Untersarmat)

Kristallin der Koralpe

- Granatglimmerschiefer (mit $\pm$ Staurolith und Disthen)
- Quarzit
- Marmor, Kalksilikatschiefer
- Dolomitmarmor
- Amphibolit
- Eklogitamphibolit
- Gneisglimmerschiefer i. a. (pegmatoid durchtränkt)
- Waldensteiner Gneisglimmerschiefer (ohne Disthen)
- $\pm$ rekrystallisierte, kataklastische Gneisquarzit („Zentrale Serie“)
- Paramorphosenschiefer (mit Paramorphosen von Disthen nach Andalusit)
- Massiger Gneis mit Auflösung der Schieferstruktur (Migmatit; Bärengraben in der südwestlichen Koralpe)
- Disthenfaserigneis (blastomylonitischer Disthenigneis)
- Hirschegger Gneis (unruhiger, blastomylonitischer Augengneis mit Plattengneislineation)
- Augengneis (mit Feldspat-Augen, ohne deutliche Lineation)
- Streifengneis (plattig, glimmerreich; Übergangstyp von Gneisquarzit zu Plattengneis)
- Waldensteiner Plattengneis (Gneisquarzit ohne Disthen, mit Plattengneislineation)
- Plattengneis (Typus Stainz; $\pm$ blastomylonitischer, ebenflächiger Augengneis)
- Pegmatit, Quarzgang (Q)


Kristallin der Stubaipe, Wolfsberger Serie

- Granatglimmerschiefer (mit Staurolith und Disthen)
- Granatgneis (mit $\pm$ Staurolith)
- Marmor, Kalksilikatschiefer
- Amphibolit (mit $\pm$ Granat)
- Bronzit-Olivinfels (serpentinisiert)
- Wolfsberger Granitgneis, Augengneis

Diverse Zeichen


- Störung i. a. (beobachtet, vermutet)
- Streichen und Fallen von Schieferung und Schichtung
- Streichen und Fallen der Faltenachsen
- Plattengneislineation
- Ausblinie eines Kohlenhorizontes an der Quartärbasis
- Steinbruch
- Stollen, Gesenke
- Schacht
- Bohrpunkt
- Quelle
- Schwefelquelle
- Bergbau und Gewinnungsstätten in Betrieb
- aufgelassen
- Au Gold Fe Eisen
- Ag Silber Gl Glimmer
- F Feldspat Q Quarz

Tektonische Übersicht 1:400.000




- Jungtertiär
- Kristallin der Koralpe
- Plattengneis im Kristallin der Koralpe
- Kristallin der Stubaipe
- Wolfsberger Serie
- Horizontale
- Geneigte
- Vertikale
- Lokale Störung
- Regionale Störung (Lavantaler Störungszone)
- Antiklinalzone (W. A. = Wolfsberger Antiklinalzone)
- Synklinalzone
- Achsenknickzone
- Stellstehungszone

Verteilung der Aufnahmegebiete



- P. BECK - MANNAGETTA 1961-1978
- V. ERTL 1975
- R. GOD 1972
- O. HOMANN 1962
- W. MORAUF 1974, 1975

Lage der Karte in Österreich



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Geowissenschaften Gemischt](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [0073](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Geologische Karte der Republik Österreich 1:50000, 188 Wolfsberg 1](#)