

BILDER-ATLAS

ZUR WISSENSCHAFTLICH-POPULÄREN

NATURGESCHICHTE DER VÖGEL

IN IHREN

SÄMMTLICHEN HAUPTFORMEN.

VON

LEOP. JOS. FITZINGER,

DR. DER PHILOS. UND MED., DIRECTOR DES ZOOLOGISCHEN GARTENS IN MÜNCHEN, MITGLIEDE DER KAINS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU WIEN, DER KAINS. LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER, DER AKADEMEN ZU PHILADELPHIA UND NEAPEL, DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFTEN ZU BERLIN, HALLE, DRESDEN, LEIPZIG, FRANKFURT A. M., HAMBURG, FREIBURG, NÜRNBERG, BRESLAU ETC.

Enthaltend 347 Abbildungen.



WIEN.

DRUCK UND VERLAG DER KAISERL. KÖNGL. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1864.

g QL
674
F55
1864
Atlas
BIRKEL

Fig. 1



Fig. ?




Fig. 1. Der grosse rothe Ara. (Ara Macao.)

Fig. 2. Der neu-hollandische Erd-Papagei. (Pecoporus formosus.)

(DS)

Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 3. Der grosse Halsband - Parkit

(*Poicephalus Alexandri*).

Fig. 4. Der grünflügelige Scharlaach Parkit

(*Aprosmictus scapulatus*).

Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 5. Der violetthöckige Lorbeer
(*Lorius domicella*).
Fig. 6. Der graue Papagei
(*Psittacus erythrosene*)

Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 7.



Fig. 7. Der weißköpfige Amazonen Papagei (*Chrysopsitta luteorhyncha*).
Fig. 8. Der spätlingartige Zamore-Papagei (*Psittacula palmerina*).
Fig. 9. Der rothbaudige hakadu (*Cacatua moluccensis*).

LEHR. u. S. 32. — Taf. 12. — Fig.

Fig. 10. Der große gelbhalsige Kakadu.

*Fig. 10. Der große gelbhalsige Kakadu.
(Chlorurus galerita L.)*

*Fig. 11. Der gemeine Rohen Kakadu.
(Calyptorhynchus banksii L.)*

Fig. 10.



Fig. 12.




Fig. 13.



Fig. 12. Der schwarze Kuckuck oder Kakadu (*Cacatua* (*Aterglossum alternans*)).

Fig. 13. Der langschmälige Nestor (*Nestor productus*).



Fig. 14. Der südamerikanische Greif-Vogel oder Cordilleren-Condor (*Gymnogyps Condor*).

Fig. 16



Fig. 16. Der rothkopfige „Aas-eisgäss“ (*Cathartes aura*)

Fig. 15



Fig. 15. Der süd amerikanische Königs-Eisgäss oder Geier-Eisgäss (*Sarcoramphus Papa*)

Fig. 18.



Fig. 18. Der weißköpfige Irren-Gärt (Gyps fulvus).

Fig. 17.



Fig. 17. Der ägyptische Schopf-Gärt (Neophron percnopterus).


Fig. 18. Der weißköpfige Irren-Gärt (Gyps fulvus).

Fig. 19.



Fig. 19 Der grosse oder Wandergässer (Diomedea exulans).

Fig. 20 Die angolische Pinguine (Spheniscus demersus).



Lithographie nach einer Zeichnung von Dr. G. Ritter.

Fig. 21. Der gewöhnliche Bussard oder hämmer Gerv. (*Gypaetus barbatus*).
Zeichnung Farben nach d. v. Hertw. Stahl. Druck v. C. F. W. Müller.





Fig. 22. Der afrikanische Stelzen Geier. (*Gypogeranus serpentarius*).

Fig. 23.




Fig. 23. Der blauhaarsche Vireone
(*Polyphorus chloronotus*)
Fig. 24. Der Gold - Adler
(*Aquila chrysaetos*)

Fig. 24. Der Gold - Adler
(*Polyphorus chloronotus*)
Lith. u. in Farben gedr. in der Kgl. Hof - u. Staatsdruckerei.
a. Sparta Argenteos.)



Fig. 24.



Fig. 25. Der Weißstorch oder hängende Säule (*Ciconia helvola*). a alter Vogel b jünger Vogel



Fig. 26.

Fig. 27.



Fig. 26. Der amerikanische Habicht- oder Harpyien-Aller
Fig. 27. Der afrikanische Schaufel-Aller
(*Speldius Bacha!*)

(*Thrasatus Haematocephalus*)

Druckerei und Verlag von Dr. A. Seemann, Berlin.

Fig. 28.



Fig. 28.

Fig. 28. Der meistfischwähnige oder gemeine See-Erler. (*Haliaeetus albicilla*).
Fig. 29. Der gewöhnliche Fluss- oder Fisch-Erler
(*Pandion haliaetus*).

Fig. 31.




Fig. 30.



Fig. 30. Der rothe Milan oder Hühner Greif. (*Milvus regalis* J.)
Fig. 31. Der weisse Gabel-Kiech. (*Vulturina ferruginea*).

Fig. 32




Fig. 32




Fig. 32. Der islandische Eichel- oder Jagd-Habicht

(*Hierofalco islandicus*).

Fig. 33. Der gemeine Thurm Falke

(*Tinamurus alaudarius*).

U. F. A. v. V. - 1872

Fig. 34.
Fig. 35.





Fig. 34. Der gemeine oder Hühner-Habicht. (*Aquila palumbarius*).
Fig. 35. Der gemeine Sperber oder Sperlings-Habicht. (*Accipiter Nisus*)

Fig. 36



Fig. 36 Der gemeine Buscharend oder Hauß-Gäger
(*Buteo undulans*)
Fig. 37 Die Reiher - Reihe
(*Circus aeruginosus*)

Fig. 38






Fig. 38. Die braune Sperber - Eule. (*Ninox vittata*).

Fig. 39. Die gewöhnliche Schreieule. Blau, und der Stein - Eule. (*Megascops asio*).

Fig. 40. Die Pumpes Höhlen - Eule. (*Phalacrocorax carolinus*).




Fig. 41.

Fig. 41. Der gewöhnliche Uhu oder die große Ohr-Eule
Bubo virginianus
Fig. 42. Der gewöhnliche Wald-Häubl. oder die Baum-Eule
Gymnasion flavov.

Fig. 42.



(*Bubo maximus*)
Gymnasion - flavov.

Fig. 44.



Lith. u. v. Barth, gedr. d. K. Hofn. Staatsdruckerei.

Fig. 43. Die gemeine Hörn-Ohr-Nute (*Otus vulgaris*).

Fig. 44. Die gemeine Schleier-Nute (*Myotis planiceps*).

Fig. 43.






Fig. 45.



Fig. 46.

Fig. 47.

Fig. 45. Der große Tukan (Ramphastos Toco).

Fig. 46. Der grünschnäbelige Tukai (Tucanus discolorus).

Fig. 47. Der vielbändige Araçari (Pteroglossus pluricinctus)



Fig. 48. Die afrikanische Narina. (*Chapaloderma Narina*).

Fig. 49. Der glänzende Curruc. a Männchen, b Weibchen. (*Citurus resplendens*).

Fig. 51.




Fig. 51. Der große schwarzen Vogel (*Trochilus major*).

Fig. 50.



Fig. 50. Der große schwarzen Vogel

(*Seythrops Vultur Hollandicus*)

(*Trochilus major*)

(*Seythrops Vultur Hollandicus*)



Fig. 52

Fig. 52. Die grüne Malkoha (Phoenicophaeus curvirostris)
Fig. 53. Der laugrohmannige Habicht - Bilduk (Accipiter philippinus).

Fig. 53

Fig. 53. Der laugrohmannige Habicht - Bilduk (Accipiter philippinus).

Fig. 54.



Fig. 54 Der grüne Hühnchen *(Guttera euroana)* a. älter. Manchmal b. braune Varietät

Fig. 55 Der weißschwanzige Hühnchen *(Indicat. albirostris)*

Fig. 56.



Fig. 57.



Fig. 58.




Fig. 56. Der langschwänzige Fledgeln-Hinuk
(*Saurothera velata*). Fig. 57. Der rotflügelige Regen-Hinuk
(*Coccyzus americanus*)

Fig. 58. Der schwanzschwundige Sparr-Hinuk.
(*Centropus melanorhynchus*)

Fig. 55. Der rothüngelige Regen-Hinuk
(*Coccyzus americanus*)

Fig. 59.



Fig. 60.



Fig. 61.



Lith. u. in Farb. ged. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 59. Der hunte Kehl-Schnurrvogel (*Megalaema versicolor*).

Fig. 60. Der furchenschnäbige Bartvogel (*Pogonias dubius*).

Fig. 61. Der grossschnäbige Dickkopf (*Tumatia macrorhyncha*).

Fig. 62.




Fig. 63.



Fig. 65.



Fig. 62. Der grüne Glanzvogel (Gelbula viridis).

Fig. 63. Der brasilianische Stummel-Glanzvogel (Jacamaralcyon tridactylus).

Fig. 64. Der schwarze Baum-Specht oder Schwarzspecht (Dryocopus Martius).

Fig. 65. Der gemeine Flamm-Specht (Piculus tridactylus).

Fig. 66.



Fig. 67.




Fig. 68.



Fig. 69.



Lücke. Für großes Holz ist es zweckmässig:

Fig. 66. Der graue Gras-Specht oder Grauspecht.

(*Gecinus canus*).

Fig. 67. Der goldflügelige Erd-Specht oder Goldspecht

(*Colaptes auratus*).

Fig. 68. Der wellenstreifige Zwerg-Specht

(*Picumnus minutissimus*).

Fig. 69. Der gemeine Wendehals

(*Trochocercus torquilla*).

Fig. 71.



Lithau in Farb. Abb. S. 1. t. v. 12. m. 1890. (Vogelkunst.)

(*Buceros rhinoceros*).

Fig. 70.




Fig. 70. Der grosse Kastorn-Vogel (*Buceros rhinoceros*).

Fig. 71. Der indische Doppelkastorn-Vogel (*Buceros bicornis*).

Fig. 73.



Fig. 73. Der langschwänzige Tocko.
(*Picus canus*.)

(*Torinus macrourus*)

Fig. 74.




Fig. 74. Der gebauchte Nashornvogel. (*Picumnus cristatus*)

(*Pachyramphus hypoxanthus*)

Fig. 75. Der langschwänzige Tocko.
(*Picus canus*.)

(*Torinus macrourus*)

(*Pachyramphus hypoxanthus*)

Fig. 76.

Fig. 75.




Fig. 78.



Fig. 77.



Fig. 75. Der grosse Jäger-Kisvogel

(*Ducelo gigas*).

Fig. 77. Der violette Mummel-Kisvogel

(*Ceyx purpurea*).

Fig. 76. Der molukkische Paradies-Kisvogel

(*Tanysiptera Pea*).

Fig. 78. Der gemeine Kisvogel

(*Alcedo Lapida*).

Fig. 79.



Fig. 80.



Fig. 81.



Fig. 79. Der gemeine Bieneßesser.

Digitized by Google from a scan of a page in the Biodiversity Heritage Library

Fig. 80. Der brasilianische Stäger,

(*Momotus brasiliensis*).

Fig. 81. Der grüne Plattschnebel.


(*Todus viridis*).



Fig. 83.



Fig. 84.



- Fig. 82. Der sumatraische Starvogel liebenschababel (*Coragyps sumatrensis*).

Fig. 83. Der rothe Ziervogel (*Pipra aureola*).

Fig. 84. Der guianische Lippenvogel (*Rhipidura crocea*) a. Stämmchen b. Weibchen.

Fig. 85.




Fig. 86.



Jack u. Farben - verl. v. A. K. - Ant. u. Gedruckerei

Fig. 85. Der capische Turako (*Tauraco albocristatus*).

Fig. 86. Der violette Pisangfresser (*Musophaga violacea*)



Fig. 87. Der grosse Hauben-Turako.
(*Chrysococcyx giganteus*).

Fig. 88. Der amerikanische Sasa.
(*Opisthocomus cristatus*).

Fig. 89.



Fig. 90.



Fig. 91.



Fig. 92.



Fig. 89. Der capische Klammervogel.

(*Colius capensis*).

Fig. 90. Der chileische Zahnschnabel

(*Phytotoma Rara*).

Fig. 91. Der Fichten-Kreuzschnabel.

(*Loxia curvirostra*).

Fig. 92. Der gemeine Gimpel.

(*Pyrrhula vulgaris*).




Fig. 93



Fig. 95



Fig. 95




Fig. 96

Fig. 94 Die Feld-Lärche (*Alauda arvensis*)
Fig. 95 Der Gold-Finnoo (*Carduelis carduelis*)

Fig. 93 Die gewöhnliche Stäbchen-Lärche (*Alauda arvensis*)
Fig. 96 Der Sedge-Wimmer (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Fig. 97.



Fig. 99.



Fig. 100.



Fig. 101.



Fig. 97. Der Haus-Sperling. (Passer domesticus). Fig. 98. Der Erlen-Zeissig. (Chrysomiris Spinus).

Fig. 99. Der Buch-Fink. (Fringilla Coelebs.).

Fig. 100. Der gemeine Kernbeisser. (Coccothraustes vulgaris).

Fig. 101. Der virginische Hauben-Kernbeisser oder Cardinal-Vogel. (Cardinalis virginianus).

Fig. 102.



Fig. 103.




Fig. 104.



Fig. 105.



Fig. 102. Der Paradies-Tanarevogel oder die Paradies-Witwe (*Vidua paradisaea*).

Fig. 103. Der rotschlämmbige Wiberregel (*Platycercus sanguinolentus*).

Fig. 104. Der guianische Paradies-Tanagra (*Vidua guianensis*).

Fig. 105. Der urtümliche Dick schnabtl. (*Pitylus grossus*).

Fig 106




Fig 107



Fig 108




Fig 109



Fig 106 Die gemeine Bart Meise (*Panurus barbatus*) a Männchen b Weibchen

Fig 107 Die gemeine Schwan's Meise (*Orius canadensis*) a Männchen b Weibchen.

Fig 108 Die gemeine Haubten Meise (*Lophophanes cristatus*)

Fig 109 Die Sicht Meise (*Parus major*)

Fig. 110.



Fig. 111.



Fig. 112.



Fig. 113.



Lith. u. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 110. Der chinesische Sammtvogel. (*Liothrix sinensis.*)

Fig. 111. Der guianische Feuer-Schmuckvogel. (*Phoenicocerous carnifex.*)

Fig. 112. Der gemeine Seidenschwanz. (*Ampelis garrulus.*)

Fig. 113. Der amerikanische Kuhlgrahel. (*Gymnoderus foetidus.*)

Fig. 114.



Fig. 115.



Fig. 116.



Fig. 114. Der weißbaulige Schwanz-Würger (*Dicrurus soror*).

Fig. 115. Der philippinische Bluchanga Würger (*Dicrurus philippinus*).

Fig. 116. Der molukkische Paradies Lebu Würger (*Dissemurus paradiseus*).

Fig. 117.



Fig. 120.



Fig. 119.



Lith. u. in Farben gedr. zu d. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 117. Der fenerfarbene Phönixvogel. (*Pericrocotus flammeus*.)

Fig. 118. Der gauamusche Sperlingswürger. (*Tityra cayana*.)

Fig. 119. Das dreifarbiges Würgerhälinchen. (*Heteroxolmis tricolor*)

Fig. 120. Der langschwänzige Spern - Würger. (*Chubernetos Veturus*)

Fig. 121.



Fig. 122.




Fig. 123.



lith. u. F. Kurb. gebr. i. d. k. k. Hofn. Staatsdruckerei.

Fig. 121. Der nordamerikanische Königsmüller (*Tyrannus tyrannus*).

Fig. 122. Der gehäubte Tschitru - Fliegenschläpper (*Tyrannus cristata*).

Fig. 123. Der gespaltene Fliegenschläpper (*Myiobius Griseo*).

Fig. 124.



Fig. 125.



Fig. 126.



Fig. 124. Der Sing-Grünwürger — (*Vireo nonaboruensis*). Fig. 125. Der grosse Würger — (*Lanius excubitor*).

Fig. 126. Der gewellte Buschhäher — (*Thamnophilus undulatus*).

Fig. 127.



Fig. 128.



Fig. 127. Die pfiefende Bürgerkrähe

Fig. 128. Die stahlfarbene Pleiskrähe

(*Gymnorhina tibicen*)

(*Phonygama viridis*).

Fig. 130.



Fig. 129.



Lith. u. lit. f. farb. ged. in ddkk. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 29 Die genuine Maudelkrähe. (*Coracias garrulus*)

Fig. 30 Die abyssinische Maudelkrähe. (*Coracias caudata*.)




Fig. 131. Die violettfarbene Rolle (*Burtonia madagascariensis*). Fig. 132. Der Eichel- oder Fusslärcher (*Garrulus glandarius*).
Fig. 133. Die gekräuselte Elster-Lilie (*Ptilorhynchus quatuorlineatus*).

Fig. 134.



Fig. 135.



Lith. u. far. J. G. F. K. nach einer Zeichnung von A. G.

Fig. 134. Die grüne Hitze. (*Cissa thalassina*.)

Fig. 135. Die wandernde Elsterkräh'e. (*Dendrocitta vagabunda*.)

Fig. 136.



Fig. 137.



Fig. 136. Die gehaubte Brüderkräh'e. (*Coracina cephaloptera*)

Fig. 137. Die guianische Brüderkräh'e. (*Gymnophaps caloua*)



Friedr. Focke gedruckt & Hof v. Stadt druckt.

Fig. 138. Die rothbrästige Schmuckkrähe
(*Pyroderus scutatus*).

Fig. 139.




Fig. 139. Der gemeine Paradiesvogel (*Paradisea apoda*).

Fig. 141.



Fig. 140.




Fig. 140. Der prachtvolle Königs-Paradiesvogel (*Cicinnurus regius*) Fig. 141. Der neuguianische Gold-Paradiesvogel (*Parotia amara*)

Fig. 143.




Fig. 142.



Lith. u. i. Furb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 142. Der höll- oder Steirrabe

(*Corvus Corax*)

Fig. 143. Die gemeine Saatkrähe

(*Frugilegas vulgaris*).


Fig. 146.



Fig. 144.



Fig. 145.



Lith. u. in Farb. gedr. d. k. k. Hof's. Staatsdruckerei.

Fig. 144. Die gemeine Dohle

(*Monedula turrium*.)

Fig. 145. Die gemeine Elster

(*Pica caerulea*.)


Fig. 146. Die gemeine Steinkrähe

(*Frugilus graculus*.)

Fig. 147.



Fig. 148



Lith. u. i. Farb. gedr. v. d. k.k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 147. Der Tannen oder Steinheher

Fig. 148. Der gemeine oder Kirsch-Pirol

(*Nucifraga Caryocatactes*).

(*Oriolus Galbula*).

Fig. 149.



Fig. 150.



Fig. 149. Der violettblaue Atlasvogel

(*Ptilorhynchus holosericeus*).

Fig. 150. Der sumatraische Grakel

(*Gracula religiosa*).

Ink & w : Farb. gedr. v d. K. bei u Staatsdruckerei

Fig. 151.

Fig. 153.



Fig. 152.



Lith. von F. A. K. Holz u. Staatsdruckerei

Fig. 151. Der afrikanische Maienthauner. (*Buphagus africanus*). Fig. 152. Der Rosensturz. Hirundinell. (*Pistor roseus*).

Fig. 153. Der gemeine Sturz. (*Sturnus vulgaris*).

Fig. 154.




Fig. 155.



Fig. 156.




Fig. 154. Der ionesische Kehlschwanz

(*Dicrurus forficatus*).

Fig. 155. Die zweibindige Sturzohle

(*Coccycuas bicolor*).

Fig. 156. Der gemeine Troupial

(*Icterus galbula*).

Fig. 157.



Fig. 159.



Fig. 158.



Fig. 157. Der königl. Amakihi

(*Myiotheretes imperator*).

Fig. 158. Die große Pitta

(*Pitta coerulescens*).

Fig. 159. Die gemeine Wasser-Amself

(*Cinclus aquaticus*).

Fig. 160.



Fig. 161.



Fig. 162.



Fig. 163.



Lith. u. Burckhardt & Kellholz Staats Druckerei.

Fig. 160. Der rothliche Sumpf-Schwalzer (*Crateroprus rubiginosus*). Fig. 161. Der rufische Ruhud (*Pyconotus ruficeps*).
Fig. 162. Die Sing-Drossel. (*Turdus philomelos*). Fig. 163. Der gemeine Wiesen-Pieper. (*Anthus pratensis*).

Fig. 164.



Fig. 165.



Fig. 166.



Fig. 167.



Fig. 164. Die weiße Bachstelze (*Motacilla alba*). Fig. 165. Der gekrönte Buschkrickerler (*Sylvicola coronatus*).

Fig. 166. Das Gart'n-Rotschwänzchen (*Erithacus phoenicurus*). Fig. 167. Das genuine Rothkehlchen (*Rubecula familiaris*).

Fig. 168.



Fig. 169.



Fig. 170.




Fig. 171.



Fig. 168. Der schwarzkehlige Wiesenlärmzter

(*Pratincola Rubecula.*)

Fig. 169. Das gemeine Goldhähnchen

(*Regulus cristatus.*)

Fig. 170. Der Wald - Laubsänger

(*Phyllopteneste sibilatrix.*)

Fig. 171. Die Mönchs - Grasmücke oder das Schwarzpäälättchen (*Curruca atricapilla.*)

Fig. 172.




Fig. 173.



Fig. 175.



Fig. 174.



Fig. 172. Die Wiedl-Nachtigall. (*Luscinia Philomela*).

Fig. 173. Der Teich-Rohrsänger oder Rohr-Spiessvogel. (*Calamonastes arundinaceus*.)

Fig. 174. Der gelockte Buschschlüsler. (*Drymocichla maculosa*.)

Fig. 175. Der europäische Zaunschlüpfer oder Zaunkönig. (*Troglodytes europeus*.)

Fig. 176.




Fig. 176. Der neuhollandische Leiervogel (*Menura superba*).
Foto: C. Lütkebeil, um 1900, nach einer Zeichnung von A. G. M.

Fig. 178.



Fig. 177.

Fig. 177. Der gemeine Wiedehopf

Fig. 178. Der große krause Wiedehopf

(*Upupa Epops*).

(*Eupenichus speciosus*)

Fig. 179.




Fig. 180.




Fig. 179. Der schillernde Glanz-Wiedehopf. (*Seleneoides albicus.*)

Fig. 180. Der geschnürte Brunk-Wiedehopf. (*Craspedophora magnifica.*)

Fig. 181.



Fig. 182.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. K. Hof v. Seeger. Berlin.

Fig. 181. Der braune Töpfervogel

(*Eurnarius rufus*).

Fig. 182. Der gemeine Mauerläufer

(*Tachodroma muraria*).

Fig. 184.



Fig. 183




Fig. 185.




Fig. 186



Fig. 183. Der guauische Baumlätterer

(*Aethopyga gaiavensis*).

Ziehen zu Port au Prince. Hoc u. suum dico

Fig. 184. Der gewöhnliche Baumläufer

(*Certhia familiaris*).

Fig. 185. Der gemeine Sichelbaumläufer

(*Xiphorhynchus praeauratus*).

Fig. 186. Die gemeine Spechtmeise

(*Sitta europaea*).

Fig. 187.




Fig. 188.



Fig. 189.




Fig. 190.



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 187. Der rothe Honigschleicher (*Myzomela sanguinolenta*).

Fig. 188. Der gemrene Honigfresser (*Meliphaga phrygia*).

Fig. 189. Der schwarzköpfige Honigschlürfer. (*Melithreptus lunulatus*).

Fig. 190. Der blaue Zuckerongel (*Cnemidophanes cyaneus*).



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 191. Der caffersche „Paradies“-Honigvogel

(*Promerops caffer*).

Fig. 193.

Fig. 192.




Fig. 194.



Fig. 195.



Fig. 192. Der stahlblauene Prunk-Honigvogel

Fig. 193. Der grüne Blauz-Honigvogel

Fig. 194. Der goldkehliges Topaz-Hülibri

Fig. 195. Der säbelschnablige Wald-Hülibri

Lith. u. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

(*Cinnyris chalybeus*)

(*Hydrydipna metallicus*)

(*Topaza petta*)

(*Hylocharis rufirostris*).

Fig. 196.




Fig. 197.

Fig. 198.




Fig. 199.




Fig. 200.

Litb. in Flarb. ged. a. k. k. Hof.-Stratsdruckerei.

Fig. 196. Der prächtige Honig-Kolibri (*Mellisuga magnifica*). Fig. 197. Der goldohrige Strahlen-Kolibri (*Heliangelus cornutus*).Fig. 198. Der goldschmückende Komel-Kolibri (*Suphonia sparganura*). Fig. 199. Der columbische Schnäbel-Kolibri (*Ducimaster ensifer*).Fig. 200. Der angenehme Sonnen-Kolibri (*Practornis superciliosus*).

Fig. 201.




Fig. 202.



Fig. 203.



Fig. 204.



Lith. u. i. Barb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 201. Die gemeine Hausschwalbe (*Chlidon. urbica*).


Fig. 202. Die langflügelige Stachelschwalbe (*Acanthylis caudata*).

Fig. 203. Die gemeine Satangan-Schwalbe (*Collocalia esculenta*).

Fig. 204. Die gemeine Mauer- oder Thurmschwalbe (*Cypselus apus*).



Fig. 205.



Stich u. in Buch ged. i d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 205. Die afrikanische Steuer-Nachtschwalbe. (*Macropsalis longipennis.*)

Fig. 206. Die langstielige Gabel-Nachtschwalbe. (*Hydropsalis fasciata.*)

Fig. 207.





Fig. 208.



Katharina Lohmöller, die k. k. Div.


Fig. 207. Der gewöhnliche Nachtschwalbe oder die Zugennelker (Caprimulgus europaeus).

Fig. 208. Der langohrige Buchenwogel (Barbastellus cornutus).

Fig. 209.



Fig. 210.



Lith. u. i Farb. gedr. i. d. k. h. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 209. Die Gewürz-Baum-Taube. (*Treron aromaticus*.)

Fig. 210. Die Feldtaube. (*Columba Livia*.)

Fig. 211



Fig. 212.



Lith. u. in Frankl. ged. in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 211. Die Kropftaube. (*Columba guernei*.)

Fig. 212. Die Trommeltaube. (*Columba dasypus*.)

Fig. 213.




Fig. 214.



Dr. G. Hartlaub's Vogel-Atlas

Fig. 213. Die Pflaumentaube (*Columba laticeuda*).

Fig. 214. Die kanadische Wander-Taube (*Ectopistes migratorius*).

Fig. 2/5.



Fig. 2/6.




Fig. 2/5. Die mikoharsche Zier Taube (*Columba microharica*).

Fig. 2/6. Die hirsche - Kied Panther (*Gamer curonata*).

Bild u. i. Herb. geogr. v. d. k. Hof - u. Staatsdruckerei



Lith. u. Farb. gebr. v. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 217. Der plumpse Dromed
(*Didus ineptus*).




Fig. 218.



Fig. 218. Das braune Jaka - Huhn (*Practope cristata*).

Fig. 219. Das gemeine Purrugua Huhn (*Ortalis motmot*).



Fig. 290.

Lith. in Buch. ged. in d. K. Hofl. Staatsdruckerei.

Fig. 290. *Bras generv. Shaco Hahn. (Cuc. Acton.)*



Hab. 227. Das Paar - Holm - Huhn (*Phasianus gallopinus*)

Fig. 222.




Fig. 223.



lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 222. Das niederländische Talegalla Huhn

(*Tinamotis Lathami*).

Fig. 223. Das gefleckte Leipou Huhn

(*Tinamotis ocellatus*).



Litho u. Parkt gedr. v d. k. K. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 224. Der gemeine Pfau. (Pavo cristatus.)



Lith. n. N. O. und d. A. H. 175.

Fig. 225. Der doppelsporige Sporn-Pfau (*Polyplectron bicalcaratum*, ♂)




Fig. 226. Der Riesen-Pfau - Augen-Pfau oder Argus (*Argusianus argus*)

Lith. a. i. Farb. gear. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei




Fig. 227.

Fig. 228.

卷之三

Fig. 24. Der genueze Phasian (*Phasianus colchicus*).

Fig. 228. Der chinesische Gold-Hasan (*Phanmada picta*).




Lith. u. Farb. graviert d. k. k. Hofp. Staatsdruckerei.

Fig. 229. Der indische Glanz-Paun
(Lophophorus impejanus)




Fig. 231.




Lith. u. i. Farb.-golz. v. d. k. K. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 230. Das grüne Huhn - Huhn (*Gallus Bankiva domesticus*) Das Huhn
Fig. 231. Das grüne Huhn Huhn (*Gallus Bankiva domesticus*) Das Huhn
Das Hähnchen
Das Hühnchen



— Dr. von A. K. E. von Boettcher

Fig. 22. Der schwarzköpfige Horn-Huhn. (*Tragopan Hastingsii*)



Lith. u. i. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 233. Das gemeine Truthahn (Meleagris Gallopavo) Das Männchen.





Fig. 235.



Erth u. Farb geähr. a. d. si. n. Ho. u. Steinstruktur.

Fig. 234. Das genuine Truth-Huhn. (*Meleagris gallopavo*.) Das Weibchen.

Fig. 235. Das genuine Perl-Huhn. (*Numida meleagris*.)



Fig. 236.




Fig. 237.


Fig. 238.

Lith. von Rieb. gal. in d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 236. Der gemeine Francolinus. (*Francolinus vulgaris*)

Fig. 237. Das gemeine Rappihuhn. (*Sturnus Perdix*)

Fig. 238. Die gemeine Hähnchen. (*Coturnix communis*)



Lith. u. i. Farb.-gedr. i. d. h. Haf. u. Staatsdruckerei

(*Lophophorus cristatus*.)

(*Turix pugnax*.)

(*Callipepla californica*.)

Fig. 239. Der gekrönte Bulbul.

Fig. 240. Das Haupt - Laufhuhn.

Fig. 241. Das kalifornische Colihuhn.



Lith. u. i. Forb. gegr. i. d. k. k. Hof' u. Stadtschreiter
(*Tetrao urogallus vulgaris*).
Fig. 292. Das gemeine Auerhuhn



Litho von Farbgrind nach H. K. Straats brukkeri

Plig. 363. Drei Röth-Waldrallen oder Schuhlaubahn (Phalaropus tricolor)





Fig. 244.



Lith. u. i. Rieb, gedr. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 244. Das nordamerikanische Heide-Huhn (*Capidonia Cupido*).

Fig. 245. Das Moor-Schneehuhn (*Lagopus ulnas*).

Fig. 246.




Fig. 248.





Fig. 247.



Lith. u. r. Farb. gedr. v. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei

Fig. 246. Das tatarische Fausthuhn

(*Syrrhaptes paradoxus*).

Fig. 247. Das Ganga - Sandhuhn

(*Pterocles Alchata*).


Fig. 248. Das gemeine Strandhuhn

(*Pterocles orbignyanus*).

Fig. 249.



Fig. 250.



Lith u. Farb grdr v.d. k.k. Hof u. Staatsmalerer

Fig. 249. Der weiße Sandgrouse (Phoenis alba)

Fig. 250. Das rostfarbene Schnabel-Sternschnäbel (Rhyachotus rufescens).



Lith. u. Farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 251. Der afrikanische Strauss. (*Struthio camelus.*)




Litho. in Farbe ged. in d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 252. Der große Bande oder große amerikanische Strauss. (*Struthio americanus*)



Fig. 253. Der Emu oder neuholländische Casuar. (Dromaeus Novaehollandiae)




Lith. u. in Farb. ged. in der k.k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 254 Der indische Cassuar. (*Casuarius Benn.*)



Lith. u. farb. gr. v. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 255. Der langschmücke Rium (*Rhinocrypta australis*).



Lith. u. v. Kurb. gedr. i d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 256. Der grmeine Trappe (*Otis tarda*)



Fig. 256.




Fig. 257.

Fig. 257) Der gemeine Ziergallappe. (*Tinamus campestris*.)

Fig. 258) Der gemeine Bragentrappo. (*Houbara undulata*.)

Fig. 256 ist Fuchs' goldr. Vogel im K. Naturhist. Mus. zu Berlin.

Fig. 259.

Download from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/>; www.biologiezentrum





Fig. 260.



Lith. u. in Farb. ged. in d. k.k. Hof. u. Staatsdruckerei

Fig. 259. Der grosse Tretl. (Otidicenus eremita.)

Fig. 260. Der isabellfarbene Renngogel. (Cursorius gallicus.)

Fig. 261.





Fig. 262.



Lithogravur. Farb. gezeichnet. A. K. 12. Auflage. Druck. am

Fig. 261. Der gemeine Wiesenvogel oder die Brachschmalbe (Glareola pratincola).

Fig. 262. Der gemeine Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria).

Fig. 263.





Fig. 264.



Lith. u. in Farb. ged. v. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 263. Der gemeine Sporn-hibitz (*Hoplopterus spinosus*).

Fig. 264. Der gemeine hibitz (*Vanellus cristatus*).

Fig. 265.





Fig. 266.



Ende u. in Farb gedr. v. K. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 265. Der gemeine Steinwälzer (*Arenaria interpres*).

Fig. 266. Der europäische Austernfischer (*Haematopus ostralegus*).

Fig. 267.





Fig. 268.



Zwei von Föhrenz. 3. Februar 1860.

Fig. 267. Die Wald-Schnepfe (*Scolopax rusticola*).

Fig. 268. Die gemeine Heer-Schnepfe oder Beccassine (*Gallinago scolopaceus*).




Fig. 269.




Fig. 269. Der Alpen-Sumpftäuber. (*Peltidna cinerea*).

Fig. 270. Der grosse Brachvogel. (*Numenius arquata*).

Fig. 270. Der grosse Brachvogel. (*Numenius arquata*).



Fig. 274. Die gemeine Streitshuhpe (Arenaria interpres).

Fig. 272.




Fig. 273.




Fig. 272. Der Teich-Wasserläufer (*Totanus stagnatilis*).

Fig. 273. Die grasse Pfuhlschnepfe (*Limosa aegaecephala*).




Fig. 274.

Fig. 275.




Fig. 274. Der schnarzköpfige Süßwasserschnäbler (*Recurvirostra Avosetta*).
Fig. 275. Der schwarzflügelige Strandreiter (*Himantopus himantopus*).

Lith. u. in Farb. gezeichnet. A. v. C. 1. 1807-11

Fig. 276.




Fig. 277.





Fig. 276. Der plattschnäbige Wassertreter
(*Phalaropus fulicarius*).

Fig. 277. Das schwarze Wasserhuhn
(*Fulica atra*).

Lithogravur nach einer Zeichnung von A. Naumann.



Fig. 278.



Lith. u. Farb. gedr. a. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.


Fig. 278. Das grünfüssige Rohrluhn (*Gallinula chloropus.*)

Fig. 279. Das europäische Porphyrr oder Sultanuhn (*Porphyrio antiquorum.*)

Fig. 280.



Fig. 281.



färb. u. i. St. farb. gedr. v. d. k. k. Hof' u. Staatsdruckerei

Fig. 280. Die Wasser-Ralle (*Rallus aquaticus*).

Fig. 281. Die Wiesen-linarre oder der Wachtelkönig (*Ortygornis Crex*).

Fig. 282.



Fig. 282.



Fig. 282. Der Jakana-Spornflügel (Parra Jacana).

Fig. 283. Der chinesische Wasser-Fasan (Hydrophasianus sinensis).



Fig. 284. Der südamerikanische Wühlgans oder hanichi (*Patamedea cornuta*).

Fig. 285.



Lith. u. im Farb.-gcl. d. K. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 285. Der gemeine Kreischvogel oder die Chaja (Chama Chana.)

Fig. 286. Der gemeine Trompetenvogel (Psophia crepitans.)

Fig. 286.





Fig. 287.



Lith. und i. Farb. ged. in d. k. Hof. v. Steindorff.

Fig. 287. Der südamerikanische Schreier oder die Karame. (*Casuarius cristatus*)

Fig. 288.




Fig. 288. Verschiedenfarbige Rallenart. (*Casuarius cristatus*)



Lith. a. in Barbged in d. k. K. Akademie. Staatsdruckerei

Fig 289. Der gemeine oder graue Kranich. *Grus cinerea.*



Fig. 290. Der nomadische Jungfränen-Kranich. (*Anthropoides Virgo*)

Dr. J. K. Tragardh. (Finsch's Vogelkunde.)



Lith. u. in Farb. ged. in d. k.k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 291. Der gemeine Kronen- oder Pfauenkraxich. (*Balearica pavonina*)



Tafel 11. in Farb. gecl. u. d. Holz - in Dr. C. Schreber's

Fig. 292. Hor grane oder Fisch-her: (Ardea cinerea).



Farbig gedr. & Hot. u. Stained u. color.

Fig. 293. Der grosse Silberreiher (*Egretta alba*).

Fig. 294.



Fig. 295.



Litho u. in Farbe gedr. in d. Hdt. zu Wien von F. K. 2^o

(*Ardeola minuta*).

Fig. 294. Die gemeinsame Zwerg-Rohrdommel
(*Botaurus stellaris*).




Fig. 296

Fig. 297.



Fig. 296 Der gemeine Sootireiher (*Onychoprion fuscatus*)

Fig. 297. Der afrikanische Braun - oder Überwings (Sula dactylatra).

Luth n im Fisch geht in d.k.p. Hod n Steuerstrucken

Fig. 299.




Fig. 299. Der brasiliense Blaustrichender (Gancrona cochlearia.)

Fig. 298.




Fig. 298. Der gemeine Lanthier (Dromas ardeola.)



Fig. 300. Der sudanische Walfischschnäbler (*Balaeniceps Rex*).



Fig. 301. Der weisse Storch (*Ciconia alba*).



Fig. 302. Der amerikanische Ringstorch oder Jabiru. (*Mycteria americana*.)

Fig 302. Der amerikanische Ringstorch oder Jabiru. (*Mycteria americana*.)




Fig. 303. Der afrikanische Krapfstorch oder Marabu (*Leptoptilos crumenifer*).

Fig. 303. Der afrikanische Krapfstorch oder Marabu (*Leptoptilos crumenifer*).

Fig. 305.




Fig. 306.



Fig. 304. Der afrikanische Klaffschwanz
(*Batrator tamelligrus*).

Fig. 305. Der afrikanische Schluher oder Vimmersatt
(*Tantalus Ibis*).



Fig. 306. Der rothe Prunk-Ibis (Ibis ruber).

Fig. 307. Der gelbe Prunk-Ibis (Ibis niger).

Fig. 307. Der gelbe Prunk-Ibis (Ibis niger).



Fig. 308 Der massive Falt-Schnecke: (*Pomatia luteoradicis*).



Fig. 309. Der rosafarbene Flamingo. (*Phoenicopterus roseus*).




Fig. 310 Her stammt older Mücke - Schmid. / *Olor macrourus.*)

Fig. 311.




Fig. 312.




Fig. 311. Die neuholländische Hühnergans (*Cereopsis novaehollandiae*).

Fig. 312. Die gemeine Ringelgans (*Brennula brenta*).

Fig. 313.



Fig. 314.




Fig. 313. Die kanadische Schwanen- oder Trompetengans (*Cygnopsis canadensis*).

Fig. 314. Die graue oder Wild-Gans (*Anser anser*).




Fig. 316.




Fig. 315. Die ägyptische Fuchsente (*Netta erythrophthalma*).

Fig. 316. Die gemeine Fuchs- oder Brautente (*Netta rufina* Vulpina).

Fig. 317.





Fig. 318.



Lith. u. Druck. gedr. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei

Fig. 317. Die Stock- oder Wild-Eente

(*Anas Boscus*).

Fig. 318. Die gemeine Spieß-Eente

(*Anas crecca*).

Fig. 319.



Fig. 320.




Fig. 319. Die chinesische Pracht- oder Mandarin-Ente. (*Aix galericulata*.)

Fig. 320. Die gewöhnliche Löffelente. (*Rhopachaspis clypeata*.)

Fig. 321.




Fig. 322




Fig. 321. Die gemeine oder türkische Bisam-Eule (*Anas moschata*).

Fig. 322. Die nordische Kie Eule (*Anas clypeata*).

Fig 323.




Fig 324




Fig 323. Die gemeine Eider-Eide oder Eider-Gans. (*Somateria mollissima*)

Fig 324. Der gemeine Schnabel-Sägelaicher (Merganser serrator.)

Fig. 325.



Fig. 326.




Fig. 325. Der schwarze Scheerenschnabel

Lith. Farb gedr. d. K. Hof - Druckerei zu München
(*Rynchops nigra.*)

Fig. 326. Die gemeine Nee - Schwalbe

(*Sterna Hirundo.*)




Fig 327.




Fig 327. Die gemeine Lach-Möve (*Chroicocephalus ridibundus*).

Fig 328. Die gemeine Stutzschwanz-Raubmöve (*Gutierrezia shumardi*).

Fig. 329.




Fig. 330.




Fig. 329 Der gemeine Schmalbarts Sturmvogel. (*Thalassarche pelagica*.)

Fig. 330 Der arktische Sturmvogel. (*Procellaria glacialis*.)




Fig. 33. Der grüne Mantress (*Biomitra viridis*)

Seite u. 1 Kürbysdr. d. k.k. Akad. für Naturk.

Fig. 332.




Fig. 333.




Fig. 332. Der gemeine Fregattenvogel (Tachypterus Aquila).

Fig. 333. Die gemeine Scharbe oder der grosse Cormoran (Phalacrocorax Carbo).



Lith u i Fins. gelb i d k. k. Hofr. Staatsdruckerei

Fig. 334. Der gemeine Pelikan oder die grosse Kropftaube (*Pelicanus onocrotalus*.)

Fig. 336.




Fig. 335.




Fig. 335. Der gemeine oder Bassan's Tölpel (*Larus bassana*)

Fig. 336. Der gemeine Sonnen oder Tropikvogel (*Phaëton aethereus*)




Fig. 337.




Fig. 338.

fith. u. farb. gedr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.

Fig. 337. Der amerikanische Schlangenvogel

(Platys. Albipectus).

Fig. 338. Der senegalese Lappenfuss

(Vanellus senegalensis).

Fig. 340.




Fig. 339. Der gehabte Lappentucher oder Siefstut *(Puffinus cristatus)*.
Fig. 340. Der grasse Küs- oder Siefenacher *(Calonectris glauca)*.

Fig. 339.




Fig. 342.



Fig. 343.



Fig. 341.



lith. u. farb. gr. d. k. Hof- u. Staatsdruckerei

(Mergulus albellus)

(Gymnophaps columba)

(Phalacrocorax sulcirostris)

(Strecker Tucher)

Fig. 345.



Lith. u. Farb. gear. i. d. k. k. Hof u. Staatsdruckerei.

Fig. 344. Der gemeine Laruentaucher (*Morus arreus*)

Fig. 345. Der gemeine Schnabidentaucher (*Uria marina Torda*.)

Fig. 344.

Fig. 346.



Fig. 347.



Fig. 346 Der grosse Alk *Uria impennis*.
Fig. 347. Der patagonische Flaschenhals oder königs-Pinguin
(Aptenodytes patagonicus).

Lith. u. i. Farb.-gdr. i. d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
Fig. 347. Der patagonische Flaschenhals oder königs-Pinguin
(Aptenodytes patagonicus).